

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

619.05

DE


v. 36

VETERINARY
MEDICINE

**VETERINARY MEDICINE
LIBRARY**

Deutsche

Tierärztliche Wochenschrift.



Sechsunddreissigster Jahrgang
1928.



Hannover
Verlag von M. & H. Schaper.

619.05
DE
v. 36 Vet. Med

Sachregister.

A

- Abortus - Bang - Kulturen, Ueber die im Tierseucheninstitut zu Hannover angestellten Versuche zur Lösung der Frage, ob tragende Tiere mit lebenden — geimpft werden dürfen. 688.
- Abortus des Rindes. Bekämpfung des infektiösen —. 598.
- Abstimmungs - Denkmal in Allenstein. Einweihung des —. 505.
- Accomplement et fécondation du *Fasciola hepatica*. 109.
- A comparison of strains of *B. clauveiformis* from cattle and sheep. 534.
- Adams-Stokes'sche Krankheit bei zwei Pferden. 183.
- A Danish research worker's notes. 63.
- Adendorf, Lehrgut. 567.
- Adendorf, Lehrgut. Kursus auf dem —. 778.
- Adenome in der Lunge bei Tieren. Beitrag zur Kenntnis der —. 500.
- Adonis vernalis. Herzwirksame Glykoside von —. 788.
- Ueber die Behandlung von Herzkrankheiten mit —. 774.
- Adrenalin. Ueber die Wirkung des — auf die Oxydationsprozesse. 655.
- Affinität des Hodengewebes zur pathogenen Wirkung d. Bangschen Abortusbazillus. 860.
- Agarnährböden. Eine neue Anwendungsweise der gebräuchlichen —. 440.
- Agglutinationsprüfung. Ist es erforderlich, bei der — auf Abortus-Bang Richtlinien aufzustellen? 697.
- Akademische Legion. 812.
- Akarusräude. Experimentelle Untersuchungen mit modernen in die Haut eindringenden Mitteln als Vehikel für die Therapie der —. 370.
- Aktinomykose. Behandlungsversuche mit Röntgenstrahlen bei —. 774.
- Alimentäre Hyperglykämie als Funktionsprüfung des Inselorgans. Die —. 873.
- Alkohol. Untersuchungen über den —. 609, 655.
- Alkoholresistenz d. Virus. Ueber die — der infektiösen Anämie der Pferde. 353.
- Alkoholtherapie. Zur — der zentralen Sepsis. 205.
- Allgemeininfektion. Ueber die Behandlung der septischen —. 439.
- Ambulatorische Klinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Festschr. 97.
- A more refined method for obtaining blood from fowls for serologic work. 111.
- Amyloids beim Menschen. Ueber das Entstehen und Verschwinden des —. 184.
- Anämia perniciosa. Zur Behandlung der — mit Leber. 483.
- Anämie. Erfahrungen mit der Behandlung der perniziösen — durch Leberdiät. 608.
- Anämie des Pferdes. Der weitere Ausbau der Diagnostik der infektiösen — mit Hilfe der Serologie. 311.
- Der weitere Ausbau der Diagnostik der infektiösen — mit Hilfe der Serologie. 507.
- Die Diagnose der infektiösen — mit Hilfe des Hühnerversuches. Festschr. 61.
- Weitere Beiträge zur Diagnose der infektiösen — mit Hilfe des Hühnerversuchs. 735.
- Anämien der Pferde. Die Eisentherapie bei den sekundären —. 609.
- Anaphrodisie des Rindes. Heilversuche bei der — durch Injektion von Ovarialextrakten. 10.
- Anaeroben - Oberflächenkultur. Der Wert der — für die veterinärpolizeiliche Feststellung des Rauschbrandes. 516.
- Anaerobenzüchtung im luftverdünnten Raum. Apparatur zur —. 494.
- Anaerobierkultur. Vereinfachte —. 598.
- Anästhesiedauer bei jontoporetischer Cocainisierung. Ueber Verlängerung der kornealen —. 621.
- Anatomisches Institut der Hochschule Hannover. Festschr. 19.
- Anatoxine. Ueber die antigenen Eigenschaften der —. 188.
- Anemia in young pigs. 318.
- Angstneurose beim Hund. 622.
- An investigation on the production of *B. Abortus aggrassin*. 440.
- Antidiphtherin. Immunität mittels —. 139.
- Antikörperbildung in Gewebekulturen. Untersuchungen über —. 406.
- Antikörperbildung. Weitere Versuche zur Theorie der —. 286.
- Antisera verkregen door inspuiting van ciwitcoagulaat. 843.
- Antrittsvorlesung a. d. Tierärztl. Hochschule, Hannover. 845.
- Aptenseuche des Meerschweinchens. Infektion und Immunität bei der experimentellen —. 531.
- Apotheke d. Tierärztlichen Hochschule, Hannover. Die —. Festschr. 102.
- Apropos d'un cas d'hydropisie des enveloppes foetales. 390.
- Arbeitsgemeinschaft deutsch. tierärztlicher Buchführungs- und Verrechnungsstellen. 80.
- Arnold, Geh. Rat, 50jähr. Doktor-Jubiläum. 762.
- Arnold, Karl, 75. Geburtstag. 191.
- Arsalyt. Beiträge zur Behandlung der Brustseuche mit —. 516.
- Arsenpräparate. Chemotherapeutische Versuche mit — an rotzkranken Pferden. 125.
- Arthritiden verschiedener Ätiologie. Ueber ein neues Präparat zur Behandlung von —. 452.
- Arzneien. Berechnung der vom Tierarzte dispensierten —. 145.
- Aerztehausgenossenschaft Hannover. 64.
- Aerztlicher Verein, Hannover. 147, 191, 242, 310, 762.
- Ascaris vituli*. Experimentelle Untersuchungen betreffend die Biologie u. die toxische Wirkung des Körpersaftes der —. 125.
- Ascolireaktion mittels der Thermoprazipitine bei der Milzbranddiagnose. Ueber die Leistungsfähigkeit der —. 189.
- Askarideneier in Pferdefäzes. Ueber die Abtötung von —. 141.
- Askarisextrakte. Ueber Hautreaktionen auf —. 94.
- Askaris-Larven. Zur Frage über die pathologischen Veränderungen bei der Migration der — im Körper des Wirts. 270.
- Assistentenverband, Deutscher Akademischer —. 549.
- Ätiologie der tierischen Ruhr. Die —. 405.
- Atresia coli. Ueber die —. 757.
- Atropinwirkung an der Katze. Demonstration einer paradoxen —. 655.
- Auf der Weide. 6.
- Aufzuchtkrankheiten. Beitrag zur Entstehung und Bekämpfung von —. 454.
- Aufzuchtkrankheiten des Schweines. Ueber —. 35.
- Augenerkrankung der Gensen. Untersuchungen über eine anscheinend infektiöse —. 453.
- Ausbildungslehrgang für Aerzte und Tierärzte. 310, 460.
- Auslandslebern. Zur Untersuchung von —. 565.
- Ausschuß der Preussischen Tierärztekammern. 309, 486.
- Ausstellung „Die Ernährung“. 354, 428.
- Autovakzinen. Zur Behandlung mit —. 637.
- Avertin (E 107). Ueber Narkose mit — und ihren Einfluß auf den Serumkalziumspiegel beim Hunde. 368.
- Zur Bekämpfung des Geburtsschmerzes in der Eröffnungs- und Austreibungsperiode. 503.

Avertinnarkose beim Hunde. Ergebnisse der —. Festschr. 82.
Avertin zur Behandlung des Tetanus. 368.
Azetonämie der Rinder. Die —. Festschr. 98.

B

Bacillus abortus-Bang. Beitrag zur Züchtung des — mit Hilfe der Leuchtgasmethode. 481.
— Infektionen beim Menschen. 374.
Bacillus Bang. Ueber menschliche Infektion mit —. 45.
Bacillus enteritidis Gärtner. Ueber eine durch den — hervorgerufene seuchenhafte Erkrankung. 756.
Bacillus pullorum. Todesfälle bei erwachsenen Hühnern infolge Infektion mit dem —. 112.
Bacillus pyogenes suis, ein fast unbekannter Feind im Schweinestall. Der —. 843.
Bacillus pyogenes. Zur Frage der Identität des neuen Pfeilerschen Erregers der „Schlesw.-Holst. Euterseuche“ mit dem —. 12.
Bacillus Sordelli, a cause of malignant edema in man. 534.
Backhaus. Das preußische Tierärztekammergesetz vom 13. April 1928. 600.
Bact. abortus Bang als Erreger septischer Erkrankungen beim Menschen. 740.
Bacterium bipolare. Das —. 868.
Bacterium gallinarum Klein 1889. Ueber Infektion von Hühnern mit dem —. 407.
Bact. gallinarum Klein und Gallinarumbazilliose. 745.
Bact. paratyphi B. Einige Bemerkungen zum Schleimwallbildungsphänomen des —. 110.
Bacterium paraviscosum equi. 759.
Bact. pullorum (Rettger). Zur Differenzierung des — vom Bact. paratyphenteriae. 291.
Bacterium pyogenes. Das — als Krankheitserreger bei Rindern und Kälbern. 615.
— Morphologische und kulturelle Eigenschaften des —. 585.
Bakteriengifte. Zur Genese und Charakteristik der —. 579.
Bakterienkulturen. Antigeneigenschaften der Destillate gewisser —. 127.
Bakterienkulturen. Ueber ein einfaches Verfahren zur Konservierung lebender —. 13.
Bakterien. Die Verwendung lebender — zur Therapie. 623.

Bakterienvermehrung im Fleisch. Praktische Methoden zum Nachweis der —. 143.
Bakterienzüchtung a. künstlichen Nährböden. Ueber —. 286.
Bakteriologische Institute der Landwirtschaftskammern. Verhandlungen der Leiter der —. 642.
— Dienstversammlung der Leiter der —. 680, 692, 714.
Bang, 80. Geburtstag. 408.
Bang, Prof., 80. Geburtstag. 427.
Banginfektion beim Menschen. Ueber die Frage der —. 740.
— des Rindes. 743.
— Die — des Menschen. 781.
Bang'sche Abortusbazillen. Ueber die durch — verursachte Erkrankung der männlichen Geschlechtsorgane. 67.
Bang'scher Abortbazillus. Untersuchungen über die Rolle des — als menschenpathogenen Mikroben. 741.
Barbitursäurederivaten. Ueber die Ausscheidung von — im Harn beim Hund. 637.
Bariomyl. Beiträge zur Kolikbehandlung mit —. 724.
— Ueber die Anwendung des — bei der Kolikbehandlung. 201.
Basophile Substanz. Arbeiten über die — in den jugendlichen roten Blutkörperchen. 75.
Bauchbrüche. Ueber — und ihre Behandlung. 45.
Bauchwunden beim Hund. Perforierende —. 141.
Baum. Das Lymphgefäßsystem des Pferdes. 552.
Baumwollsamenkuchen. Fälle von Vergiftung bei Schweinen nach Fütterung mit —. 563.
„B C G“-Eigenschaften. Ein Beitrag zur Kenntnis der —. 313.
Bedingungen optimaler chemotherapeutischer Wirkung. Ueber die —. 467.
Befruchtungsergebnis der Stuten. Untersuchungen über den Einfluß der Jahreszeit auf das quantitative und qualitative —. 220.
Behandlung der Genickfistel beim Pferde. Zur —. 842.
Behme, Hans, der erste Berliner Stadttierarzt. Vet. Hist. Mitteilungen. 29.
Beiling, Min.-Rat Dr. †. 695.
Beitrag zur mikroskopischen Darstellung d. Darmtrichinen. 858.
Beiträge zur Kenntnis der Bienenkrankheiten Nr. 1, 2. 861.
Beitrag zur Kenntnis der Mairkrankheit. 861.
Beiträge zur Kenntnis der Milbenseuche d. Honigbiene. 860.

Bekämpfung der Leberegelkrankheit in der Osterstader Wesermarsch (Kr. Geestemünde) in den Jahren 1927/28. Die —. 838.
Berliner Gesellschaft zur Erforschung der Euterkrankheiten der Rinder. 631.
Besoldung in den Freien Städten Hamburg und Bremen. 48.
Bestrahlung mit künstlicher Höhensonne. Der Einfluß der —. 594.
Betäubung des Schlachtviehes. Die elektrische —. 390, 519.
Betäubung. Zur elektrischen —. 638.
Bewegungshindernis. Ein eigenartiges —. 739.
Bilirubin. Experimentelle Untersuchungen über den Bildungs-ort des —. 637.
Biophysik der niederen Organismen. Zur —. 612.
Bläschenausschlag des Rindes. Beitrag zur Aetiologie des —. 636.
Blasensteinbildung beim Pferd. 362.
Bleiforschungen. Ueber —. Festschrift. 15.
Blumenhagen. Stammschäferi. Untersuchungen in der —. 596.
Blutbild v. Serumpferden. Ueber die Wandlung des — nach Aderlässen. 529.
Blutdiagnostik bei Ernährungsstörungen. Pathologisch-chemische —. 731.
Blutfleckenkrankheit des Pferdes. Ist die — ein anaphylaktischer Vorgang? 62.
Blutgruppen bei unseren Haustieren. Ueber das Vorkommen von —. 797.
Blutgruppenbestimmung bei Pferden. Zur Frage der —. 503.
Blutgruppen. Einführung einer internationalen einheitlichen Bezeichnung für die menschlichen —. 802.
Blutplättchen. Die — beim gesunden und kranken Pferd, Hund und Schwein. 140.
Blutstillung. Experimentelle Untersuchungen über den Mechanismus der spontanen —. 559.
Blutungen beim Schweine. Die multiplen —. 141.
Blutungen im Bauchfell der Schlachtpferde und ihre Entstehung. 658.
Blutzuckerreaktion auf Gifte. Die periphere Steuerung der —. 636.
Böhme, Martin, ein deutscher Veterinär um 1600. Vet. Hist. Mittlgn. 33.

Borna'sche Krankheit. Beiträge zur Histopathologie des Gehirns bei der — des Pferdes. 626.
— Praxiserfahrungen mit Hexamethylentetraminlösungen bei der —. 561.
— Weitere Untersuchungen über die —. 300.
Bostroem. Der Krebs des Menschen. 796.
Botulismus der Haustiere. Der —. 389.
Braun. Anleitung für das Photographieren von Tieren. Heft 22 der „Anleitungen der D. L. G.“ 2. Auflage. 444.
Breslauinfektion der Mäuse. Studien über die —. 402.
Bromostronturan, ein Mittel zur Behandlung der Ekzeme und der nervösen Staupe des Hundes. 873.
Bronchitiden und von sich im Anfangstadium befindlichen Bronchopneumonien bei Pferden. Die Behandlung von — durch intramuskuläre Aetherinjektionen. 201.
Bronchitis- und Bronchopneumonie beim Rind. Ueber das Vorkommen einer infektiösen — in Oesterreich. 352.
Bruchoperation. Ueber eine neue Art der —. 592.
Brustdrüsenfunktion. Ueber die Steigerung der — durch die Bestrahlung mit der künstlichen Höhensonne. 808.
Brustseuche der Pferde. Die Behandlung der — mit intravenösen Gaben von Chinosol. 179.
— Immunisierungsversuche b. der —. 438.
Bücherei der Tierärztlich. Hochschule, Hannover. Festschr. 105.
Büffelizeucht in Bulgarien. Die —. 547.

C

„Calmette'sche Tuberkelbazillen“. Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose durch intrakutane Einverleibung der —. 423.
„Cardiazol“. Versuche mit —, einem neuen Analeptikum. 282.
Catgutsterilisation. Die einfachste und sicherste Methode der —. 623.
Cejodyl-Atarost. Ueber die Wirkung der Komponenten des — und dessen Indikationsgebiet. 577.

- Cestoden und Nematoden. Die parasitischen — der Hunde in Weißrußland. 109.
- Chemisches Institut der Hochschule Hannover, Festschr. 14
- Chinin. Ueber die Wirkung des — auf den respiratorischen Stoffwechsel des Menschen. 656.
- Chinitherapie. Ueber eine neuartige —. 608.
- Chinosol. Der Einfluß von — auf Bakterien und Protozoen im Reagenzglas und im Tierkörper. 544.
- Wird durch die innerliche Verabreichung von — das Fleisch unserer schlachtbaren Haustiere in bezug auf Farbe, Geruch oder Geschmack beeinträchtigt? 110.
- Chirurgische Klinik der Tierärztl. Hochschule, Hannover. Festschrift 70.
- Chloralhydrat. Bei welcher Konzentration des — tritt in der Subkutis des Pferdes Abszeßbildung auf? 201.
- Chloralhydratnarkose. Maximaldosis bei der —. 576.
- des Pferdes. Beitrag zur —. 774.
- Chlorbarium und Bariomyl. Zur Frage der Herzwirkung von —. 249.
- Chlorgehalt der Milch. Die Bestimmung des —. 640.
- Chlorofunk-Methode b. d. Milchuntersuchung. Ueber den Wert der —. 542.
- „Chlorofunk-Probe“. Die — ist für die Bekämpfung des gelben Galt unzuverlässig. 548.
- „Chlorofunk“. Eignet sich der Milchlorprober — zur Erkennung fehlerhafter u. krankhaft veränderter Milch. 640.
- Chlorom beim Schwein. Ein Fall von —. 252.
- Chromosomenzahl beim Rinde. Ueber die —. 756.
- Chylothorax beim tuberkulösen Hunde. 201.
- Cibalbumin. Erfahrungen mit — bei infektiöser Sterilität. 27.
- Clausnitzer, Vet.-Rat †. 778.
- Coccidiosis. 407.
- Coccum beim Pferde. Die Behandlung hartnäckiger Obstipationen des — durch Punktion des Coccums. 218.
- Coli-Bakterien. Ueber den Antagonismus von — auf Milzbrandbazillen. 440.
- Colikulturen an Granulatkohle. Ueber Adsorption ein. Gruppe biologisch-aktiver Zersetzungsprodukte in —. 544.
- Conférence internationale du rat. 290, 344.
- Considérations sur les affections de l'onglon du boeuf. 559.
- Contribution à l'étude clinique, anatomo-pathologique, épidémiologique de la trypanosomiose des chevaux d'Annam. 580.
- Crista galli mit Cranioschisis b. Rinde. Eine seltene Bildungsanomalie im Bereiche der —. 495.
- Cupal. Die Impfung beim Rinde mit —. 559.
- Cuprex und Nissex bei Hund, Katze und Geflügel. Toxikologische Versuche mit —. 544.
- „Cuprocollargol“. Versuche mit kolloidalen Metallgemischen — bei septischen Erkrankungen in der Veterinärmedizin. 723.
- D**
- Dammannbüste. Enthüllung der —. 268.
- Därme, getrocknete. Zur Untersuchungspflicht eingeführter getrockneter —. 565.
- Darmentzündung. Tödliche — nach Aufnahme von Kalkstickstoff. 268.
- Darmerkrankungen. Ueber die Behandlung von — mit Knoblauch. 483.
- Darmverdrehtungen bei Pferden. Eine eigenartige Ursache von —. 621.
- Dasselfliegenplage. Eine wirksame Methode zur Bekämpfung der —. 142.
- Dauerpasteurisierung der Milch. Ueber die sog. — mit besonderer Berücksichtigung der Abtötung von Seuchenerregern. 744.
- Deckunfähigkeit beim Sprungbullen. Ein seltener Fall von —. 28.
- De la transmission de la fièvre aphteuse des animaux à l'homme. 77.
- Dermanyssus-Anämie. Ein Beitrag zur Kenntnis der — unter bes. Berücksichtigung der Blutveränderungen. 369.
- Derengadera und ihre Bekämpfung. Die —. 749.
- Desinfektion d. Eisenbahnwagen. 77.
- milzbrandiger Trockenhäute. Weitere Versuche zur Frage der —. 438.
- Desinfektionsmittel. Vergleichende Untersuchungen chemischer — in ihrer Bedeutung für Rotz. 299.
- Desoform, ein billiges Wundstreupulver. 140.
- Deux cas consécutifs de tetanos grave guéris par la promenade forcée, sans aucun traitement médical. 143.
- Diabetes mellitus. 183.
- Diagnostik der infektiösen Anämie der Einhufer. Der weitere Ausbau der — mit Hilfe der Serologie und des Kleintierversuches. 717.
- Diarrhöe des Weideungviehs. Zur Ätiologie der in Schleswig-Holstein gehäuft auftretenden chronischen —. 118.
- Dickdarmadenom, als Ursache wiederholter Darmblutung b. Schwein. 775.
- Dijozolseife. Ueber — als Händedesinfektionsmittel. 789.
- Diphtherie. Weitere Untersuchungen über Störungen im Kohlehydratstoffwechsel bei —. 789.
- Dispensierrecht der Tierärzte. Die Landwirtschaft gegen das —. 112.
- Ein unglaublicher Angriff der Apotheker auf das —. 98.
- Dissertationen der Tierärztl. Hochschule, Berlin. 208, 410, 538.
- der Tierärztlichen Hochschule Hannover. 16, 148, 410, 538, 878.
- der Veterinär-medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. 16, 226, 584, 630.
- der vet.-med. Fakultät der Universität München. 208, 538.
- Distomatose bei Rindern und bei Schafen. Vergleichende Untersuchungen über die —. 251.
- der Rinder und Schafe. Zur Statistik der —. 422.
- Distomeneier. Nachweis von — durch Anreicherung mit 50-prozentigem Glycerin. 94.
- Does the flesh of animals suspected to be infected by foot and — mouth disease form a source of danger for the spreading of virus? 95.
- Doflein, Lehrbuch der Protozoenkunde. 1. Teil. 568.
- Doktorinstitute. 863.
- Doppelnieren beim Schwein. Ein Fall von beiderseitiger —. 752.
- Dormancy in bacteria. 12.
- Drahtsägen-Embryotom. Die neue Modifikation des —. Festschr. 92.
- Drüsen-exokrine. Ueber Bau und Funktion —. 386.
- Duerst'sche Rippenwinkel als Kennzeichen für die Milchleistung. Der —. 875.
- Dummkoller. Ueber einen durch Schimmelpilzvergiftung hervorgerufenen Fall von —. 250.
- Dürener Rinderkrankheit. Zur Frage der Ursachen der —. 318.
- Dysenterie bei neugeborenen Tieren. Ueber die Ursache der —. 831.
- E**
- Echinokokkenkrankheit b. Menschen. Ueber die Verbreitung der — in Bulgarien. 125.
- Die Bedeutung der Kutanreaktion für die Diagnose der —. 626.
- Echinokokkuskrankheit. Zur Serodiagnostik der —. 252.
- Ecobol, ein sicher wirkend. Heilmittel gegen die Leberegel-seuche. 77.
- Edelschweinsau. Höchstleistung einer ostpreussischen — in Form des Ferkelgewichts. 742.
- E 107. Die Rektalmarkose mit — bei gynäkologischen Untersuchungen. 76, 368.
- Ehrhardt, Vet.-Rat †. 696.
- Eigenblutbehandlung. Ueber — bei septischen Prozessen. 544.
- Eihautwassersucht. Ein Fall von —. 45.
- Eileiter beim Huhn. Zwei —. 220.
- Einfluß des Reifestadiums des Mais auf die Qualität von Silage für d. Milchproduktion. Der —. 860.
- Eiweißdifferenzierung von stark gekochtem Fleisch. Eine Methode der präzipitatorischen —. 641.
- Ekzem bei Mensch und Tieren. Vom —, seine Behandlung durch Organtherapie. 76.
- Ekzem des Jungrindes. Das — und seine wirtschaftliche Bedeutung. 466.
- Ellenbergers 80. Geburtstag. 307.
- Ellenberger-Stiftung. 191, 506.
- Ellenberger, Wilhelm, 80. Geburtstag. 209.
- Ellenberger-Schütz. Jahresbericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinärmedizin. 46. Jahrgang. 116.
- Endokrine Funktionen. 219.
- Enteritis bei Kühen durch Bact. enteritidis breslaviense. 106.
- Enteritisinfektion bei Kühen. Eine —. 417.
- Entwurf. Erster — der Tierärztlichen Hochschule Berlin (1767). Vet. Hist. Mittlgn. 45.
- Entzündung. Zur Lehre von der —. 484.

Epidermis bei eineiigen Zwillingen. Ueber homoioplastische Transplantation von —. 218.
 Erfahrungen m. Sulfoliquid. Einige praktische —. 842.
 — mit der Sakral- und Lumbalanästhesie beim Rinde. 833.
 Erkennung von Störungen in der Milchsekretion. Zur —. 839.
 Erkrankungen des Pferdes. Zur Kenntnis der häufigsten —. 528.
 Erythrozyten. Beiträge zur Frage nach der Senkungsgeschwindigkeit der —. 26.
 — Die Lebensdauer direkt transfundierter —. 608.
 — methode. Untersuchungen über die Zuverlässigkeit der — zum Nachweis eines Wasserzusatzes zu Milch nach M. J. N. Schuurma. 518.
 Essais de culture du virus aphteux dans le cerveau de lapin. 219.
 Etude sur la morphologie du virus peripneumonique. 30.
 Etudes expérimentales sur les piropasmoses bovines d'Algérie. 189.
 Euterentzündung b. Rinde. Nachweis und Bekämpfung der —. 641.
 Euterentzündungen der Kühe. Amtliche oder freiwillige Bekämpfung d. ansteckenden —. 679.
 Euterinsufflation. Ueber den Mechanismus der —. 219.
 Eutertuberkulose. Vorläufiges Ergebnis der im Bakt. Institut in Halle ausgeführten Versuche zur Frühdiagnose der — durch den Lymphozytennachweis in der Milch. 664.
 Excretion of antiseptic dyes through the mamary gland. 580.
 Expériences concernant de virus aphteux. 96.
 Experiments on foot — and — mouth disease. 63.
 Extremitätenentwicklung und Polydaktylie beim Pferde. 16.
 von Drahn.

F

Fachtierärztetagung zur Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten in Jena. 51.
 — zur Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten. 72.
 Fall von Adams - Stokes'scher Krankheit beim Pferd. Ein —. 842.
 Fasciola hepatica bei der Distomatose der Rinder und Schafe. Ueber den Invasionsweg der —. 545.
 „Federsche Zahl“. 658.

Feier des 150jährigen Jubiläums der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover. 412.
 Feldmäuse. Ueber eine bartonellartige Infektion der —. 580.
 Femurfraktur bei einem Zwergpferde. Vollständige Heilung einer —. 576.
 Fibrosarkome im Herzen eines Rindes. 251.
 Finkenbrink, Dr. †. 257.
 Finnickigkeit des Schweinefleisches in historischer Beleuchtung. Die —, Fortsetzung. Vet. Hist. Mittlgn. 13, 17, 30.
 Fischer. Der Fuß des Pferdes. 13. Aufl. 66.
 Fischkrankheiten. Neues über —. 601.
 Fischmehl. Ueber den Kochsalz- und Eiweißgehalt des Serums von Schweinen bei Verfütterung von — mit verschiedenem Kochsalzgehalt. 47.
 Fischuntersuchungen. Die in den Bakteriolog. Instituten der Landwirtschaftl.-Kammern 1927/28 ausgeführten —. 602.
 Fisteln an den Hintergliedmaßen. 41.
 — an d. Vordergliedmaßen beim Pferde. 91.
 Fleischbeschau. Bakteriologische —. 639.
 — Beaufsichtigung der —. 78.
 — Beiträge zur Technik der bakteriologischen —. 391.
 — Besprechung über —. 506.
 — Die Rationalisierung der bakteriologischen —. 565.
 — Unterlassung der bakteriologischen —. 534.
 — Zur Ausführung der bakteriologischen —. 640.
 Fleischbeschaugesetz. Die Notwendigkeit der Neuregelung des —. 432.
 Fleischerei-Berufsgenossenschaft. 428.
 Fleischgemengen. Die histologische Untersuchung von —. 638.
 Fleischhygiene. Die — in ihren Beziehungen zur öffentlichen Gesundheitspflege. 229.
 Fleischqualitäten beim veredelten deutschen Landschwein. Beitrag zur Feststellung der Gewichtsverhältnisse der —. 598.
 Fleischsalatfabriken. Fachgruppe. 600.
 Fleischuntersuchung. Beobachtungen bei der bakteriologischen —. 565.
 Fleischvergifterinfektion. Die wechselseitigen Beziehungen intravitaler — von Großrindern und Kälbern zur Außenwelt. 111.

Fleischvergiftungen. Ein Beitrag zur Arbeitsweise bei der Untersuchung von verdächtigen Fleischwaren bei —. 535.
 Fleischvergiftungsbakterien. — Ueber das Vorkommen von — im Darminhalt notgeschlachteter Tiere. 767.
 Fortbildung. Zur tierärztlichen —. 815.
 Fortbildungskursus des Dtsch. Vet. Rates. 344.
 Fortbildungskurse für beamtete Tierärzte. 116.
 Fortbildungskursus für die in dem Tuberkulosestillungsverfahren tätigen Vertrauens-tierärzte in Ostpreußen. 192, 207.
 Fortbildungskurse in Schleswig-Holstein. 100.
 Fortbildungskursus für prakt. Tierärzte. 522.
 Fortbildungskursus für prakt. Tierärzte a. d. Tierärztlichen Hochschule, Hannover. 344, 460.
 Fortbildungskursus für prakt. Tierärzte in Leipzig. 793.
 Fortbildungskursus für Tierärzte. 147.
 Fortbildungskursus f. Tierärzte a. d. Tierärztl. Hochschule, Berlin. 567.
 Fortbildungskursus für Tierärzte in Rostock. 223.
 Fortbildungskursus für Vertrauens-tierärzte der Prov. Ostpreußen. 100.
 Fortbildungskursus in Insterburg. 662.
 Fortbildungslehrgang über bakteriologische Fleischbeschau. 191.
 Fortbildungsrundfunk. Tierärztlicher. 15, 360, 428.
 Fortpflanzung und Aufzucht. Ueber —. 548.
 Freibank Berlin I. Tierärztliche Erfahrungen an der —. 128.
 Frick, Geh. Rat. Einweihung der Gedenktafel. 535.
 Friedmann'sches Präparat. Behandlung auf Tuberkulin reagierender Tiere mit dem —. 186.
 Fritz, Dr. †. 377.
 Fröhner-Feier in Berlin. 206.
 Fröhner, Geh. Rat. 70. Geburtstag. 177.
 — Lehrbuch der Gerichtlichen Tierheilkunde, 6. Aufl. 258.
 Fröhner's 70. Geburtstag. 359.
 Fröhner-Stiftung. 257.
 — für Studierende der Tierärztl. Hochschule, Berlin, Eugen. 847.
 Frosch, Prof. †. 459.
 Frühdiagnose der Gravidität beim Rind. 743.

Fuchsinährboden nach Endo. Haltbare Modifikation des —. 759.
 Führer durch das Studium der Landwirtschaft an der Universität Göttingen. 258.
 Fumisol. Untersuchungen über die Desinfektionskraft des —. 26.
 Further observations on foot — and — mouth disense. 237.
 Furunkel- und Karbunkelbehandlung. Ueber konservative —. 515.
 Futteraufnahmefähigkeit des Rindes. Die —. 860.
 Futtereiweiß. Ueber den Bedarf der Milchkuh an —. 301.
 Fütterung unserer Nutztiere. Die — nach dem Stand neuerer Erkenntnis. 597.
 — von Schweinen mit Molken u. Buttermilch. Ergebnisse einer längeren — von dauerpasteurisierter Milch in einer Molckerei. 663.
 Futtergerste. Gesundheitsschädliche amerikanische —. 752.
 — Pilzbefallene amerikanische —. 696.
 Futterkuchen. Beitrag zur Kenntnis der Schädlichkeiten und Vergiftungen durch —. 29.

G

Gallenblase beim Hund. Die röntgenologische Darstellung der — und ihre Wirkung der dabei verwendeten Kontrastmittel auf Askariden und Leberegel. 368.
 Gallensteine. Ueber den Bau der —. 499.
 Gallinarumbazilliose der Küken. Ein Beitrag zur Aetiologie und Bekämpfung der —. 111.
 Gareis, Bäuerliche Geflügelzucht, Hst. 17. 50.
 Gärtner, Aug. 80. Geburtstag. 274.
 Gärtnerinfektion bei Rindern und Meerschweinchen in Japan. 573.
 Gasödem. Fränkelsches — beim Rinde. 117.
 Gastrophiluslarven. Krankmach. Wirkung und Abtreibung der —. 754.
 Gaternann's Kalender für Tierzüchter 1928. 132.
 Gebärpause beim Rind. Langsam verlaufende —. 579.
 Geburtshilfliche Praxis. Aus der —. 122, 284, 297.
 Geburtshindernis — durch Mißgeburt als Gewährsmangel. 126.

- Geburtsrauschbrand, Beitrag zur Kenntnis des — beim Rinde. 484.
- Gefäßendothel. Die Rolle des — bei septischen Prozessen. 202.
- Geflügel. Unfruchtbarkeit und Aufzuchtkrankheiten beim —. 582.
- als Patient des Tierarztes. 460.
- Geflügelcholera. Untersuchungen über einen dem Geflügelcholeraerreger ähnlichen Bazillus. 375.
- Geflügeldiphtherie. Die Impfung gegen die — und die Geflügelpocken m. Antidiphtherin. 581.
- Geflügelkrankheiten. Erfahrung bei der Untersuchung von — in den Niederlanden. 13, 32, 47.
- Geflügelpest. Desinfektionsversuche bei — mit Sulfoliquid D. S. 583.
- Geflügeltuberkelbakterien. Versuche zur Uebertragung von — auf Schweinen. 757.
- Geflügeltuberkelbazillen beim Schwein. Weitere Untersuchungsergebnisse über das Vorkommen von —. 707.
- Geflügeltuberkulose. Weitere Untersuchungen über die —. 701.
- beim Schwein. Das Vorkommen von —. 594, 746.
- Geflügelzucht. Was muß der praktische Tierarzt von der — wissen? 220.
- Gefrierfleisch. Zur Kontingentierung des zollfreien —. 99.
- Gefrierfleischkontingent. 257.
- Gehäufte Fälle von Vergiftung durch Luzerne. 860.
- Geheimmittel. Chemische Untersuchungen von —. 465.
- Gehirnhyperämie des Hundes. Die Beeinflussung der — mit Luminal-Natrium. 498.
- Gehirn von Rindern. Beitrag zu den vergleichenden Untersuchungen des — mit zentralen nervösen Störungen. 739.
- „Gelbe Salbe“, Die —. 269.
- Genitalorgane des weiblichen Rindes. Zur Pathologie der — mit Berücksichtigung der Histologie des Eileiters. 500.
- Gerste, Amerikanische. Ungeklärte Schädlichkeit —. 662.
- Gesamtblutmengenbestimmung nach der Griesbach'schen Kongorotmethode. Ein Versuch der —. Festschr. 35.
- Geschwülste, bösartige. Hat das Alter mit der Entstehung der bösartigen — ursächlich etwas zu tun? 403.
- Gesellschaft der Freunde d. Tierärztlichen Hochschule zu Berlin. 15.
- Gesellschaft für Züchtungskunde. Deutsche —. 34, 114, 646, 448.
- Deutscher Naturforscher und Aerzte. 99, 474, 490.
- Gestütswesen in Bulgarien. Ueber das —. 578.
- Gestüt Wiesenburg. Veterinäre Betrachtungen im —. 281.
- Giesenhagen †. 308.
- Gladden, Franz, Schlachthofdirektor, Gelsenkirchen-Buer †. 845.
- Glykämie. Ueber — bei experimenteller Wutkrankheit. 384.
- Goldschmidt. Die Lehre von der Vererbung. 100.
- Einführung in die Vererbungswissenschaft. 522.
- Einführung in die Wissenschaft vom Leben oder Ascaris 1. und 2. Teil. 208.
- Greve. Jahresbericht über das Veterinärwesen in Oldenburg. 226.
- Groll'sche Agglutinationsbilder —, ihr Wert und ihre Brauchbarkeit für die Zuchtwahl in der Pferdezucht. 285.
- Growth of Cl. Botulinum and C. Sporogenes in veol infusion both under reduced pressure. 319.
- Günther. Rassenkunde des deutschen Volkes. 552.
- Gutbrod. Die rehfärbige Frankenziege. 192.
- H**
- Haaruntersuchungen von Rind und Ziege. Vergleichende mikroskopische Unters. der Haare von —. 351.
- Habronemose der Haut der Pferde. Ueber — und einige beobachtete Besonderheiten in Nieder-Languedoc. 108.
- Haeseler, Prof. †. 794.
- Hafer, gequetschter. Die Fütterung von —. 63.
- Haftkrankheit der Menschen. Ueber die Beziehungen der — zur Hämoglobinurie der Tiere. 807.
- Haftpflcht und Haftpflichtversicherung des Tierarztes. 877.
- Hakenwurm des Schafes. 403.
- Hakkí, Parasitologie. 584.
- Hämatologische Studien bei einigen Krankheiten des Rindes, des Schweines u. der Ziege. 445.
- Hammer. Geschichte der Erkennung und Heilung von Geistes- und Seelenkrankheiten bei Tieren. 2. Aufl. 748.
- Hamoglobinämie. Betrachtungen über die — der Pferde. 299.
- Hämolysinen. Zur Frage der Wirkung einer tuberkulösen Infektion auf die Bildung von —. 387.
- Hanspach. Die Bedeutung der Trichinose für die öffentliche Gesundheitspflege. 796.
- Harnblasenrupturen beim Hund. Fünf weitere operierte traumatische —. 789.
- Harnstoff gegen Warzen. 513.
- Hartwig, B. †. 614.
- Hauck. Das seelische Verhalten des Pferdes und des Hundes. 780.
- Hauskatze. Zur Stammes- und Typenkunde der —. 595.
- Hauttuberkulose bei einer Pute. Ein Fall von —. 111.
- Heine. Taschenkalender für Fleischbeschauer und Trichinenschauer 1928. 148.
- Heiss, 65. Geburtstag. 661.
- Helmich, Dr. †. 661.
- Henkels. „Die Chirurgie des Tierarztes, Systematische Anleitung zum selbständigen Denken und Handeln“. 490.
- Henneberg. Das technisch- und landwirtschaftlich-bakteriologische Studium. 34.
- Hepatitis interstitialis multiplex des Schweines. Zur Ursache der —. 545.
- Hepke, Vet.-Rat †. 359.
- d'Hérelle'sche Baktriophagen. Die Blausäuresistenz des —. 319.
- Herzvorhofverknöcherung mit Verkalkung beim Pferd. Totale —. 523.
- Hexamethylentetramin. Ausgezeichnete Heilerfolge mit — bei Geflügeldiphtherie bzw. Pocken. 543.
- Heyden, Ob.-Reg.-Rat †. 832.
- Dr. Paul, Oberregierungs- u. Veterinärat Düsseldorf †. 845.
- Hinselmann. Mond und Wetter 1928. 310.
- Histogenese des Nierentuberkels. Untersuchungen über die —. 184.
- Histogénese et évolution des vésicopustules aphteuse chez le cobaye. 95.
- Hochfrequenzströme in der Veterinärmedizin. 269.
- Klinisch experimentelle Untersuchungen über die therapeutische Verwendung der —. 724.
- Hochgebirgs- und Niederungsvieh. Blutbeschaffenheit und Körperbau bei —. 757.
- Homologisierung der Darmkröseabschnitte. Allgemeines zur Frage der — bei den Säugetieren. Festschr. 23.
- Hormonale Sterilisierung. Ueber — weiblicher Tiere. 124.
- Hornschuh bei einem Maultier. Verlust des —. 41.
- Huf. Die Bearbeitung des — zum Beschlage von Lafosse bis in die Jetztzeit in historisch-kritischer Betrachtung. 592.
- Hufbeschlag. Der nagellose — in geschichtlicher und chirurgisch-kritischer Bedeutung. 774.
- Die Bedeutung des — für den praktischen Tierarzt. Festschrift 103.
- Die forensische Bedeutung der Anwendung von Zwangsmitteln beim —. 62.
- nach Ertel. Ein neuer nagelloser —. 559.
- Hufkrebsmittel. Ein neues —. 724.
- Huflederkitt. Bericht über die Verwendung des —. 27.
- Hüft- und Kniebeugehaltung als Geburtshindernis. Ueber eine —. 419.
- Huhn. Beiträge zur Blutmorphologie des —. 659.
- Hühner. Immunisierungsversuche gegen Pocken und Diphtherie der —. 711, 713.
- Hühnerdiphtherie. Untersuchung nach der bakteriellen Art der —. 31.
- Hühnerdiphtherievirus. Versuche über die Wirkung des Antidiphtherins gegenüber künstlicher und spontaner Infektion mit —. 581.
- Hühnerhaltung. Die Bedeutung der — für Deutschland. 220.
- Hühnerpocken und Hühnerdiphtherie. Ein neues Instrument zur kutanen Schutzimpfung gegen —. 584.
- Zur Frage der Schutzimpfung gegen —. 760.
- Hühnertyphus bei jungen Enten. Ein Fall von —. 121.
- Hundestaupe. Zur Kenntnis der patholog. Histologie des Zentralnervensystems bei —. 625.
- Hygienisches Institut der Anhaltischen Kreise in Dessau. 427.
- der Tierärztl. Hochschule in Hannover. Festschr. 42.
- Hypercholesterinämie beim Rindvieh. Ueber — während der Laktationsperiode. 533.
- Hyperplasien der Nebennierenrinde bei Hunden. Ueber die knotigen —. 499.
- Hypodermenlarven. Letale Wirkungen bei medikamentöser Behandlung von —. 404.
- Hypospadia interscrotalis beim Ziegenbock. Ein Fall von —. 532.
- Hystrostrongylus rubidus. 37.

I
Ikterus der neugeborenen Fohlen und Maultiere. 45.
— Zur Frage der Pathogenese des —. 610.
Immunisierung. Die Schutzimpfung bei Tieren durch aktive —. 404.
— per os gegen Pneumokokken. Weitere Versuche über aktive —. 13.
— und Schutzimpfung. Aktive —. 441.
Immunität und Infektion. Einfluß der Umgebungstemperatur auf —. 12.
Immunität bei Tuberkulose. 849.
Impfstoffe zur aktiven Immunisierung. Eine neue Methode zur Herstellung von —. 189.
Incidence of mastitis and the infecting organisms in four dairy herds. 595.
Indolbildung durch Bakterien. Eine vereinfachte Methode zum Nachweis der —. 534.
Infektionserreger. Ueber das Eindringen von — in die regionalen Lymphdrüsen. 30.
Infektionskrankheiten d. Schwitzkuren. Die Beeinflussung von —. 420.
Injektionstherapie in der Veterinärmedizin. Zur —. 608.
Insel Riems. Besichtigung der staatlichen Forschungs-Anstalten. 778.
Institut für Tierzucht und Vererbungs-forschung der Hochschule Hannover. Festschr. 34.
Insulin. Chemische und mikroskopische Untersuchungen über das Verhalten des Glykogens in der Leber unter der Einwirkung des —. 656.
— und Ovarium. Ueber Beziehungen zwischen — und ihre therapeutische Verwertung bei der Behandlung von Uterusblutungen. 10.
Intelligenz bei Tieren. Ein Beitrag zur Frage von der —. 28.
Internationaler Kongreß für Ziegenzucht. 550.
— Tierärztlicher Kongreß 1930. 410.
Internationales Tierseuchenamt in Paris. 424.
Intoxikation — durch einige niedere Monamine als Fäulnisgifte. Festschr. 79.
Intoxications chez le — mouton. 61.
Introcid. Meine Erfahrungen mit —. 61.
Intradurale Hypophysininjektionen während der Schwangerschaft. 875.

Jahrbuch der Milchwirtschaft. III. Band. 583.
— für wissenschaft. und praktische Tierzucht. 19. Jahrg. 2. Teil. 192.
— für wissenschaftliche u. praktische Tierzucht einschließlich der Züchtungsbiologie. 20. Jahrgang. 1. Teil. 646.
— für wissenschaftliche u. praktische Tierzucht. 20. Jahrg. 2. Teil. 732.
— über neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Weidewirtschaft und des Futterbaues. 148.
Jahresveterinärberichte. 115.
Jchthyol. Ueber konservative Furunkelbehandlung mittels —. 218.
Jerseyrinder. Gelbfärbung bei —. 565.
Jod. Zur Frage der physiologischen Bedeutung des —. 758.
Jod-Alkoholfrage. Zur —. 608.
Jung. Derzeitiger Stand der Milchversorgung in Sachsen. 208.

K

Kadaverfleisch. Verwendung von —. 453.
Kaiserschnitt beim Rinde. Der —. Festschr. 86.
Kälberruhr. Beitrag zur Bekämpfung der — und des Paratyphus der Ferkel durch Impfung. 125.
Kälte. Künstliche —. 256.
Kammosan-Präparate. Ueber die therapeutische Verwendbarkeit von —. 724.
Kammer der Deutschen Studentenschaft der Tierärztlichen Hochschule Wien. 812.
Kampfsport. Lebensgefahr im —. 62.
Karbolsäure. Die Einwirkung der — auf das Virus fixe. 637.
Kästner, P. Anleitung zur Eierprüfung. 848.
Kastration der Hengste. Zur — mit der Eschini-Zange und der Schopperschen Derbyligatur. 593.
Kastrationsverfahren. Beiträge zum — nach Hetzel. 93.
Kesseltik der Knochenbrüche b. Pferde. Zur —. 544.
Kehlkopfpeifen als Hauptmangel. 299.
Keratitisfrage. Experimentelle Untersuchungen zur —. 108.

Kersting's Elternhaus. 426.
Kindermilchgewinnung. 255.
Kitt, 70 Jahre. 746.
Klatt. Entstehung der Haustiere. Bd. III, Lfg. 2. 568.
Klauen des Rindes. Beitrag zur Ringbildung an den —. 774.
Klein. Sind geschächtete Tiere sofort nach dem Schächtschnitt bewußtlos? 116.
Klieneberger. Die Blutmorphologie der Laboratoriumstiere. 310.
Klinik für Geburtshilfe und Rinderkrankheiten der Tierärztl. Hochschule, Hannover. Festschrift 85.
— für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Festschr. 78.
Klitoridektomie. Die Bedeutung der — als Behandlungsmethode bei Nymphomanie der Stute. 388.
Klopmeier, Dr. †. 360.
Knell, Prof. Dr. †. 49.
Knochtuberkulose. 627.
— Trockenkost zur Behandlung von —. 273.
Knochen- und Gelenktuberkulose. Die Unterbringung der Rinder mit —. Festschr. 108.
Kohle aus Granulatstäben. Untersuchungen über die Verteilung der — bei Fiebertemperatur. 623.
Kohlewirkung. Zur Theorie der intrauterinen — in ihrer Beziehung zur Prophylaxis und Therapie der komplikativen Metritis. 807.
Kokain-Injektion. Wie weit reicht die Anästhesie bei der — in die Volarnerven. 740.
Koktoimmunogens von Tuberkelbazillen. Ueber die immunisierende Wirkung des —. 484.
Kokzidienoozysten. Das Sichöffnen der — im Darm des Säugetiers. 93.
Kokzidienruhr des Junggeflügels. Die Bekämpfung der —. 220.
Kolik des Pferdes. Einiges zur Spezialdiagnose der —. 774.
Kollargol. Zur Therapie des seuchenhaften Abortus der Rinder mit —. 517, 548.
Kolostrum. Ueber die Bedeutung des —. 301.
Kombinierte Schweiß-Sphinkteren-Lähmung des Pferdes. Die —. 873.
Konservierungssalze. Halten die — des Hackfleisches wirklich eine bakterielle Zersetzung hintan? 396.
Kontrolle, Tierärztliche. Die — i. Vorzugsmilchviehstallungen. 111.

Kopfverband bei kleinen Haustieren. Ein praktischer —. 621.
Köpfe. Vererbung des Milchfettgehaltes in der ostfriesischen Rinderzucht. 568.
Koppen. Zur Differentialdiagnose des —. 724.
Korschelt und Stock. Geheilte Knochenbrüche b. wildlebenden u. in Gefangenschaft gehaltenen Tieren. 584.
Kösler, Vet. Dir. Dr. in Ruhestand. 343.
Koch, Robert (Einweihung der Gedenktafel). 475.
Kohlensäureschnee. Die Behandlung akut entzündlicher Prozesse der Haut und ihrer Anfangsgebilde mit —. 576.
Kraftfahrervereinigung deutscher Aerzte. 646.
— Deutscher Aerzte, Gau IX. 428, 732, 811, 878.
Kraftwagen zur Beförderung von lebenden Tieren. Reinigung und Desinfektion von —. 657.
Krankheiten d. Geflügels. Wichtige parasitäre —. 582.
Krankheit, welche vom Hasen a. Menschen übertragbar ist. Ueber eine neue —. 318.
Kreislauforgane. Vergleichende pathologische Physiologie der —. 422.
Krewel. Landesökonomierat — 70 Jahre. 343.
Kriebelmückenschäden. Die — in Preußen während d. Jahre 1925/26. 133.
Kronacher, Allg. Tierzucht, 1. Abteilung. 226.
Kronbeinbeuger des Pferdes. Etwas vom —. 182.
Kryptorchismus beim Hunde. 141.
Kühe kleinster Rassen mit hervorragend. Milchleistung. 285.
Kühn. Grundriß der allgemeinen Zoologie. 630.
Kükenruhr. Das Auftreten und die Bedeutung der — in Deutschland. 581.
— in Schlesien. Beobachtungen über die bakterielle —. 708.
— und Hühnertyphus. Untersuchungen über —. 504.
Kultur B C G. Experimentelle Untersuchungen an Rindern über die Schutzwirkung der —. 638.
Kulturfiltraten. Ueber die Anwendung von — in der Veterinärmedizin. 202.
Kupfer-Dermasan. Erfahrungen mit — bei der Behandlung schlechthaltender Affektionen der Haut. 201.
Kürbiskerne als Bandwurm-mittel. 545.
Küst, Prof. Dr., Berufung nach Gießen. 810.

L

Labfähigkeit der Milch. Die — im Dienste der tierärztlichen Milchhygiene. 4.
 Lammert, Amtstierarzt †. 810.
 Landesgruppe Nordwestdeutschland im Reichsverband der deutschen Gemeinde-Tierärzte. 442.
 Landwirtschaftliche Woche Berlin. 49.
 Landwirtschafts-Gesellschaft. Deutsche —. 66, 191, 662, 682.
 Landwirtschafts-Kammertierärzte. 612, 629.
 La préimmunisation des nouveau-nés par le BCG. 142.
 Lauterbach. Festschr. 61, 311, 507, 717, 735.
 Laxantien. Klinische Untersuchungen über die Wirkung einiger parenteral applizierbarer — beim Hunde. 724.
 Leberatrophie des Pferdes. Die akute —. 500.
 — Eine unter dem Bilde der akuten gelben — auftretende Erkrankung des Pferdes. 625.
 Leberegelbekämpfung. Praktische Erfahrungen mit der — in Bayern. 94.
 — Rentabilität der — und Ergebnisse bei Behandlung mit Neoserapis. 484.
 — Zur jüngsten Geschichte der —. 279.
 Leberegeleier i. Kote. Der Nachweis von — mit Hilfe einer Anreicherungs-methode. 77.
 Leberegelhend im Herzen eines Rindes. Ueber einen —. 545.
 Leberegelmittel. Ein Einblick in das Gebiet der —. 84, 123.
 — Welche — sind wirksam, relativ ungefährlich und besonders preiswert? 685.
 Leberegelschnecken. Ueber den Befallsgrad der — mit Redien und Zerkarien des gemeinen Leberegels. 251.
 Leberegelseuche. Der Streit um die Heilmittel gegen die —. 6.
 — Die Bekämpfung der — in der Gemeinde Nesse. Festschr. 55.
 — Einiges über Diagnose und Behandlung der —. 236.
 — Hexachloräthan in der Behandlung der —. 626.
 — Wie kann man die Verlustziffer der wegen — behandelten Tiere noch um ein wesentliches drücken? 515.
 — Zur Statistik der —. 626.
 — beim Rinde. Die — und ihre Behandlung mit Neoserapis. 753.
 Leberegeltherapie. Ein weiterer Fortschritt in der —. 353.

Leber-Gasbrand der Rinder. Seuchenhafter — in Chile. 243.
 Lebertranfütterung der Jungtiere. Ueber die subakute Leberatrophie, ein Beitrag zur —. 534.
 Le contrôle bactériologique du lait par la Méthode de Skar. 97.
 Lecksucht bzw. Osteomalzie. Beobachtungen über seuchenartig auftretende —. 532.
 Legeakt des Geflügels. Untersuchungen beim normalen und gestörten — mittels Röntgendurchleuchtung nebst statistischen Beiträgen zur Legenot. 376.
 Lehrgang für Milchproduzenten. 115.
 Lehrgut Adendorf der Tierärztl. Hochschule Hannover. Festschrift 110.
 Leistenkanal des Pferdes. Chirurgisch-anatomische Studien am — im Hinblick auf die Kastration und ihre Komplikationen. Festschr. 71.
 Leistikow, A. †. 256.
 Leistikow †. 308.
 Lendenparalyse bei Ziegen. Untersuchung über das Wesen der —. 402.
 Le phémonène de Kurt Schern dans les trypanosomiasés. 30.
 Le processus régénératif au niveau des lésions cutanées et linguales provoquées chez le sobage par le virus aphteux. 219.
 Les affinités tissulaires du virus aphteux. 95.
 Les piropasmoses bovines. 30.
 Le trypanosome de la dourine traverse — t'il la peau ou ies muqueuses saines? 30.
 Lichttherapie. Ein Beitrag zur —. 498.
 Lipoiden in Rotznötchen. Zur Frage des Vorkommens von —. 109.
 Litauische Methode der Immunisation. 656.
 Lobelin. Zur Pharmakologie des —. 655.
 Ludloff, Dr. †. 410.
 Luftembolie. Experimenteller Beitrag zur venösen —. 482.
 Lungenatelektase bei Schlachtschweinen. Untersuchungen über die —. 499.
 Lungen b. infektiösen Schweinekrankheiten. Beitrag zur Kenntnis der pathologisch-anatomischen Veränderungen der —. 753.
 Lungenseuche der Rinder. Ueber die diagnostischen Hilfsmittel bei der Ermittlung der —. 595.

Lungenseucheforschung. Fortschritte auf dem Gebiete der —. 283.
 Lungwitz. Der Lehrmeister im Hufbeschlagnagel, ein Leitfaden für die Praxis und die Prüfung. 584.
 Lymphatische Herde in der Thyreoidea trächtiger Tiere. Ueber Vorkommen —. 532.
 Lymphgefäße. Zur Technik der Injektion der —. 546.
 — der Gelenke der Schulter- u. Beckengliedmaße der Haustiere. 60.
 — des Kehlkopfes der Haustiere. Die —. 351.
 Lyse als Funktion der Temperatur. Die übertragbare —. 127.
 Lysin. Vermehrung des bakteriophagen — durch abgetötete Bakterien. 127.
 Lyssa. Ueber den diagnostischen Wert der Komplementbindungsreaktion bei —. 283.
 Lyssa durch Präzipitation. Zur Diagnose der —. 185.
 Lyssainfektion. Ueber das Verhalten der Muriden nach —. 341.
 Lyssavirus im menschlichen Speichel. 874.

M

Magen-Darmkrankheiten d. Hundes. Zur Diagnostik und Therapie der —. 491.
 Magen der Wiederkäuer. Ueber die —. 723.
 Magensaftuntersuchungen — bei gesunden und kranken Hunden. 739.
 Magensonden. Die richtige Anwendung der — beim Pferd. 140.
 Magentrichostrongylose d. Schafe. Ueber die —. 339.
 Magenwurmkrankheit der Schweine. Ueber die —. 754.
 Magnesiumsalze. Versuche mit — zur Tötung von Hunden. 140, 352.
 Malariapigment. Das — und seine chemische Natur. 127.
 Malaria. Das gegenwärtige und frühere Vorkommen der — und die Verbreitung der Anophelesmücken im Gebiete des Deutschen Reiches. 407.
 Malkmus. Grundriß der klinischen Diagnostik der inneren Krankheiten der Haustiere. 10. Aufl. 748.
 Malkmus-Jubiläumstiftung. 147.
 Mallein. Zur Wertbestimmung des —. 423.

Malophagen beim Huhn. Zur Bekämpfung der — mit Natriumfluorid. 759.
 Mamma und Inkretdrüsen. Zur Frage der Beziehungen zwischen —. Festschr. 26.
 Mann, Dr., Ehrenbürger der Tierärztlichen Hochschule Hannover. 191.
 Martin, Paul, Ordin. f. Anatomie a. d. Univ. Gießen. 521.
 Maschinenmelken. Beitrag zur Untersuchung des Einflusses des — auf Menge und Zusammensetzung der Milch. 46.
 Mastdarmbetäubung mit E. 107.
 Zur Theorie und Praxis der —. 299.
 Mastitiden. Beitrag zur Kenntnis der durch Stäbchen aus der Coli-Paratyphusgruppe bedingten —. 17.
 Maul- und Klauenseuche. 656.
 Maul- und Klauenseuche-Ausbreitung. Untersuchungen über die Art der —. 531.
 Maul- und Klauenseuche. Dänische Bekanntmachung zur Bekämpfung der —. 237.
 Die Behandlung der —. 219.
 Die Dauer der Infektiosität der Mundschleimhaut bei der —. 237.
 — Die Immunität bei —. 530.
 — Die Infektiosität des Blutes simultan geimpfter Meerschweinchen bei —. 531.
 Die Rolle des Menschen bei der Verbreitung der —. 683.
 Die sero-therapeutische Behandlung der — mit Hochimmunserum. 63, 237.
 — Experimentelle Untersuchungen über die Fenazität des Virus der —. 530.
 — Ist das Renntier für — empfänglich? 500.
 — Schutzimpfung gegen — mit Loeffler-Serum. 77.
 — Schutzimpfungen geg. —. 386.
 — Ueber die Veränderungen der Milch bei —. 219.
 — Verbreitung der — im Reg.-Bez. Düsseldorf. 726.
 — Vergleiche mit dem Virus der —. 742.
 — Weitere Untersuchungen über —. 531.
 — Zwei Beobachtungen über die Ansteckungsfähigkeit bei —. 395.
 Maul- und Klauenseucheerreger. Der —. 546.
 — Gibt es verschiedene Typen von — ohne wechselseitige Immunität? 142, 531.
 Maul- u. Klauenseucheforschung. Zusammenfassung der von der Kommission für — angestellten Beobachtungen. 741.

- Maul- u. Klauenseuchenforschung. Gibt es verschiedene Typen von — ohne wechselseitige Immunität? 531.
- Maul- und Klauenseuchemittel. Eine Blütenlese unter — 63.
- Maul- und Klauenseuche-Virus. 725, 726.
- Beobachtungen über das — 546.
- Die Pluralität des — 530.
- Zur Frage der Verbreitung des — durch Flußwasser, 754.
- Mäuseseptikämie. Ein bisher unbekannter Erreger einer — 406.
- Mayr. Tierärztlicher Taschenkalender 1928. 132.
- Medizinische Klinik der Tierärztlichen Hochschule, Hannover. Festschr. 60.
- Meerschweinchen, tuberkulöse. 758.
- Meerschweinchentuberkulose. Einwirkung von Strahlen auf die experimentelle — 203.
- Meinicke - Trübungsreaktion mit gefärbtem Antigen. Die — 440.
- Melkerknoten. Die — und ihre Actiologie. 373.
- Melkgerät. Das neue — 355.
- Melkzeiten und Zusammensetzung der Milch. Unterbrechung der — 46.
- Meningitis bei einer Kuh. Ein Fall von — 727.
- Menschenkrankheiten und Tierkrankheiten. 575.
- Mercks Jahresbericht 1926. XI. Jahrgang. 34.
- Messungen an ostpreußischen Kavalleriepferden. 503.
- Metallhydroxyden. Ueber den Wirkungsmechanismus von — gegenüber pathogenen Mikroorganismen. 609.
- Metallsalztherapie. 11.
- Metritiden des Rindes. Ein Beitrag zur Ätiologie der — 610.
- Metritis-Yokzin. Erfahrungen mit — 579.
- Meyer, Vet.-Rat, Diepholz †. 427.
- Meysahn, Flaschenmilch. 444.
- Mikroorganismen in Staubform. 628.
- Milch. Die Gärkochprobe und die anaeroben Gärkochproben der Milch. 658.
- Enthält die — tuberkulös infizierter oder verdächtiger Wöchnerinnen Tuberkelbazillen? 658.
- D. R. Milchflaschenverschluß. Der neue — 190.
- Milchgenuß im Kindesalter. Art und Umfang regelmäßigen — 97.
- Milchkontrolle in Schleswig-Holstein. Die Entwicklung der freiwilligen — 677.
- Milchleistung einer Kuh. Außerordentliche — 743.
- Milchpolizeigesetzgebung. 319.
- Milchsäure. Die Verwendung von — bei infektiösen Darm-Erkrankungen. 637.
- Neue Erkenntnisse über die biolog. Wirkungen der — 574.
- Milch während der Brunst der Kühe. Untersuchungen über die Zusammensetzung der — 126, 532.
- Militär - Veterinärapotheke um 1828. Eine hannoversche — Vet. Hist. Mittlgn. 47.
- Milz. Neue Ansichten über die Funktion der — 26.
- Milzbrand. Beitrag zur Diagnostik des — 577.
- Die Wichtigkeit der Keimzahl in Milzbrandimpfstoffen und die Wirkung der Eiweiße bei der Immunisierung gegen — 126.
- Ueber die Hautinfektion und Hautimmunität bei — 577.
- bei einem Hunde. Ein Fall von — 627.
- der Tiere. Zur Epidemiologie und Bekämpfung des — 627.
- Milzbrandepidemie b. Schweine. Ueber die Entstehung und den Verlauf der nordwestdeutschen — 283.
- Milzbrandhäute. Desinfektionsversuche an ausländischen — 282.
- Milzruptur u. Kolik. 249.
- Mißbildungen. Einiges über — 348.
- Mitteilungen des Tierhygienisch. Institutes d. Universität Freiburg i. Br. im Jahre 1926. 843.
- Model, Vet.-Rat. 80. Geburtstag. 289.
- Molkereiwesen in Argentinien. Untersuchungen über die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse des — 518.
- und seine Beziehung zur Typhusfrage. Das — in Pomern. 391.
- Morbus Basedowii bei einem Hunde. 287.
- Moritz, Kommentar zum Futtermittelgesetz. 132.
- Morphin. Die Giftwirkung des — und seine gastrointestinale Ausscheidung. 656.
- Müller'sche Gänge. Gehemmte Entwicklung der — verbunden mit Inzucht. 186, 203, 238, 253, 270.
- Mulomedicina Chironis eine Kollegniederschrift. Die? Vet. Hist. Mittlgn. 2.
- eine Kollegniederschrift. Die? (Schluß.) Vet. Hist. Mittlgn. 5.
- Muskelblutungen beim Schwein. Ueber die Entstehung der multiplen — 124.
- Zur Frage der multiplen — 658.
- Muskelfinnen bei Rehen. 124.
- Muskelfinne des Rehes. Die — 370.
- Muskelrheumatismus. Ueber einen Fall von — 514.
- Muskeltrichinellen. Ueber Jodaufspeicherung und Jodbindung durch die — 775.
- Muskelzerreißen. Einiges über die fibrillären — 621.
- Mutterkorn. Ueber die pharmakologische Wertbestimmung des — 655.
- N**
- Nachweis der Schmutz- u. Farbstoffbakterien in der Milch. Zum — 876.
- Nährwert des Kochens. 29.
- Nasenschlundsonde. Ein Beitrag zur Technik der Anwendung der — 27.
- Naturforscher und Aerzte. Deutsche — 629, 659.
- Naturforscher- und Aerzte-Versammlung. Deutsche — 537.
- Nebennieren von Katzen. Verkalkungen und Nekrosen in den — 775.
- Nebennieren von Katzen. Verkalkungen und Nekrosen in den — 775.
- Nematoden aus dem Schafe. Zur Charakteristik des — 527.
- Nephritis b. Rinde. Zur Kenntnis der diffusen chronischen interstitiellen — 252.
- Neubesoldung der Amtstierärzte in den Remonteamtern. Betrachtungen über die — 356.
- Neues vom betäubungslosen Schächten. 116.
- Niedersachsengruppe des Reichsverbandes prakt. Tierärzte. 221, 732.
- Nieren beim Pferd. Verlagerung und Verwachsung der — 556.
- Nierentee Koemis Koetjing. Der indische — 298.
- Noemin. Erfolgreiche Wurmtherapie mit — 251.
- Noguéli, Hideyo †. 661.
- Noktal. Ueber die Ausscheidung des — 774.
- „Normung“. Mehr — in der wissenschaftlichen Literatur. 794.
- Nörner. Der Weltkrieg. 290.
- Notes upon the Action of Mercurochrome on Horses. 109.
- Notschlachtstempel. Brauchen wir einen —? 248.
- Notschlachtungen. Beurteilung von — 297.
- Notschlachtungen und Freibank. 366.
- Novalgin in der Hundespezialpraxis. 61.
- Nowak. Documenta Microbiologica. I. Teil: Bakterien. 50.
- Nutt, Vet.-Rat 70. Geburtstag. 131.
- Nymphomanie bei Stuten. Die Beseitigung der — durch Kastration. 502.
- Nystagmus bei Tieren. Studien über — speziell beim Rind. 108.
- O**
- Oberarmbein beim Pferde. Splitterfraktur des — 287.
- Observations on Entamoeba histolytica. 206.
- Obstgenuß. Ueber Erkrankungen und Tod nach — 255.
- Oedem-Studien. 656.
- Ohrfistel, angeborene. 453.
- „Ohrfistel“ eines Pferdes. Ueber einen Fall von sog. — 498.
- Oleum Chenopodii. Kymographische Untersuchungen über die Adsorption wurmaktiver Substanzen aus — durch Kohle aus Oelemulsion. 368.
- Oligochaeten, schmarotzende. Festschr. 18.
- Operation nach Hofmann. 183.
- Operation nach Steinach. Die — am wilden Ziegenbocke der Art Capra cylindricornis Blyth. 284.
- Opiaten und Kokain. Verordnung über die Verschreibung von — 630.
- Opsonogen. Erfahrungen mit — in der Praxis. 201.
- Organe in Rückbildung begriffen. Die Bedeutung der in Rückbildung begriffenen Organe für das biolog. Geschehen. 275.
- Organismus — fiebernder. Wasserretention und Wasserbedürfnis im — 281.
- Osteomalazie. Betrachtungen über — im Engadin mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 593.
- Otitis externa beim Pferde. Durch seborrhoisches Ekzem erzeugte — 466.

Otitis externa parasitaria. Beiträge zur Kenntnis der Erkrankung von Hund pp. an —, 76, 124.
 Ovarialblutung. Kastration bei —, 439.
 Ovarialblutungen beim Rind. Ueber —, 439.
 Ovariectomie der Kuh. Beitrag zur —, 219.
 Oxydasereaktion. Die — in den Rotzknötchen bei Pferden. 94.

P

Paarungsinfektion bei der Verbreitung des seuchenhaften Verwerfens. Ueber die Bedeutung der —, 477.
 Panaritium der Schafe. Ueber das —, 467.
 Pansentokar. Beiträge zur geschichtlichen Entwicklung des —, 8.
 Papillomen in der Mundschleimhaut eines Pferdes. 183.
 Pararanschbrand — beim Rind. 87.
 Paracholera der Puten. Die — und ihre Beziehung zur Pseudo-Tuberkulose der Nagetiere. 375.
 Parasiteneier und Parasiten bei Haustieren. Ueber den Nachweis von —, 185.
 Parasiten unserer Pelztier. Die wichtigsten —, 763.
 Paratyphusähnliche Stämme. Vergleichende Untersuchungen natürlich vorkommender und künstlich erzeugter —, 97.
 Paratyphus B. Perorale Immunisierung bei der Maus gegen —, 274.
 — Ueber das Vorkommen von — in Organen frisch geschlachteter gesunder Tiere. 144.
 — Ueber das Vorkommen von — und paratyphusähnlichen Stämmen in Organen frischgeschlachteter, gesunder Tiere. 519.
 Paratyphusbakterienhaltiges Fleisch. Freigabe des —, 255.
 Paratyphus der Kälber. Zur pathologischen Anatomie des —, 752.
 Paratyphus - Enteritisbakterien. Beitrag zur Diskussion der Artumwandlung der —, 786.
 Paratyphus - Enteritis - Gruppe. Zum Vorkommen von Erregern aus der — bei Kälbern und erwachsenen Rindern. 278.

Paratyphus - Enteritis - Gruppe. bei Kälbern. Zum Vorkommen von Erregern aus der — 317.
 — bei Kälbern. 350.
 Paratyphusgruppe. Die Bakterien der —, 518.
 — Zur Type Spezifität in der —, 286.
 Paratyphus-B.-Gruppe. Das Vorkommen von Bazillen der — im Darmkanal in gesunden Schlachttieren. 47.
 Paratyphus B. Schottmüller-Bazillen. Das Vorkommen von echten — bei Tieren. 518.
 — Ueber das Vorkommen von echten — bei Tieren. 534.
 Paratyphus - Infektionen beim Rinde. Rattentyphusbazillen als Erreger von —, 516.
 — der Schlachttiere. Kritische Bemerkungen zur Müllerschen Theorie über die Latenz der —, 110.
 — des Rindes. Beitrag zur — und ihre Behandlung. 754.
 Paronychium. Die Behandlung des — mit grauer Salbe. 124.
 Pasteur'sche und „Verdünnungs“ Methode. Ergebnisse der antirabischen Impfungen nach der —, 185.
 Pathogene Bakterien. Ueber das Verhalten — bei langsamer Injektion. 188.
 Pathologisch-anatomisch. Institut der Tierärztl. Hochschule Hannover. Festschr. 38.
 Pentadactylie beim Schwein. Ein Fall von echter —, 562.
 Perikarditis bei der Kuh. Zwei wegen der Symptome und der Komplikationen eigentümliche Fälle von traumatischer —, 420.
 Pernokton. Ueber — zur Narkose des Hundes. 576.
 Pernoktonnarkose beim Hund. Ein Beitrag zur —, 461.
 Perubalsam. Ueber die antiseptische und antitoxische Wirkung des — in Wunden. 41.
 Pfeiffer, Prof. Dr. R. 70. Geburtstag. 224.
 Pferdeblut. Individualitätsreaktionen des normalen —, 578, 786.
 — Zur Kryoskopie des normalen —, Festschr. 32.
 Pferdehaar. Das. Untersuchungen über Struktur und Pigment des Pferdehaares. 285.
 Pferdehuf. Ueber den Bau und die Funktionen des — und ihre Beziehungen zur Hufknorpelverknöcherung und z. Hufmechanismus. 592.

Pferdelazarettwesen. Die historische Entwicklung des — im Heeresdienst bis zum Jahre 1918. 529.
 Pferdeputzen mit Maschinen. Das —, 46.
 Pferdezucht, russische. 562.
 Pharmakotherapie nebst Stellungnahme zur Homöopathie. Ueber Prinzipien der —, 623.
 Phaseolus-Präparate. Ueber die blutzuckersenkende Wirkung von —, 789.
 Physikalisches Institut der Hochschule Hannover. Festschr. 17, 25.
 Piroplasmose der Rinder. 759.
 Piroplasmose und Kokzidiose des Rindes. 440.
 Plate, Hannover, Ehrenbürger d. Tierärztl. Hochschule Hannover. 729.
 Plazentare Uebertragung der Wut. 874.
 Pocken und Diphtherie der Hühner. Beitrag zur aktiven Immunisierung gegen —, 582.
 Polizeidrüse. 218, 877.
 Polizeihund. Der — und seine Verwendung. 226.
 Präparate der Pyridenreihe. Pharmakologisch - biologische Versuche mit —, 386.
 Praxis. Aus der —, 622.
 — Kleine Mitteilungen aus der —, 402.
 Präzipitationsverfahren nach Ascoli. Vergleichende Untersuchungen über das Verhalten von Essigsäure- und Karbolsäure-Auszügen beim Milzbrandnachweis an Häuten durch das —, 438.
 Preparation of Salmonella pulorum antigens for complement fixation tests. 583.
 Preuß. Gestütverwaltung. Zum Wechsel in der Leitung der —, 747.
 Processus vaginalis der Hündin. Ueber den —, Festschr. 20.
 Prolapsus uteri. Erfahrungen über —, 388.
 Propositiones para la instrucción de tamberos, lecheros, sobre la higiene de la leche. 190.
 Protozoen. Die Bewegung der —, 31.
 Prüfung für Veterinärärzte. 33.
 Prüfungsordnung für Aerzte. 15.
 Pseudo-Fowlpest. 745.
 Pseudotuberkulosebakterien. Studien über — die aus Krankheitsherden des Menschen gezüchtet wurden. 319.
 Pseudotuberkulose der Nagetiere 659.
 Puerperalinfektion. Eigenartige — bei der Kuh. 517.

Pupille. Kann die — als Indikator des Gleichgewichtszustandes im vegetativen Nervensystem angesehen werden? 624.
 Putenzucht. Ueber —, 40.
 Pyridinreihe. Chemotherapeutica aus der —, 401.

Q

Quiroga, Dr. S., Direktor d. Bakt. Laborat. 567.

R

Rachitis. Ueber die Wirkung des Ergosterins auf —, 401.
 Rattenkampftage Wien 1927. Die —, 185.
 Räucherapparate. Hygienische Betrachtungen über einige — zur Vernichtung tierischer Schädlinge. 403.
 Räude der Schafe. Bekämpfung der — in Preußen. 725.
 Rauschbrand. Kultur- und Immunisierungsversuche bei —, 142.
 — Zur bakteriologischen Diagnose des —, 595.
 Rauschbrand-Aggressine. Untersuchungen über —, 238.
 Rauschbrand- und Pararanschbrandbazillen. Ueber die serologische Differenzierung der —, 518, 599.
 Rautmann, Staatliches Rindertuberkulosebekämpfungs-Verfahren. 50.
 Réapparition des foyers de fièvre aphteuse et conservation du virus dans la nature. 95.
 Recherches sur le mode de propagation de la fièvre aphteuse. 77, 96.
 Recherches sur l'hémolysine streptococcique. 188.
 Redlich, Vet.-Rat. 80. Geburtstag. 242.
 Referierabend —, 10, wissensch. an der Tierärztl. Hochschule Hannover. 863.
 Refraktionsanomalien d. Pferdeauges. Untersuchungen über —, 41.
 Reichsfleischbeschaugesetz. 564.
 — Zum 25jährigen Bestehen des —, 227.
 Reichsgründungsfeier Berlin. 65.
 — Hannover. 65.
 Reichsverband der deutschen Fleischwaren-Industrie. 731.

- Reichsverband der Deutsch. Gemeinde-Tierärzte. 224.
 — der Deutsch. Gemeinde-Tierärzte. 410.
 — der Deutsch. Gemeinde-Tierärzte. 550.
 — Deutscher Gemeindetierärzte. 613.
 — der Deutsch. Gemeinde-Tierärzte. 727.
 — der Deutsch. Gemeinde-Tierärzte. 792.
 — der Deutsch. Gemeinde-Tierärzte, Landsgruppe Nordwestdeutschland. 309.
 — Deutscher Gemeindetierärzte, Landesgruppe Nordwestdeutschland. 490.
 — der Deutsch. Gemeinde-Tierärzte, Landesgruppe Sachsen. 32.
 — Deutscher Gemeindetierärzte, Landesgruppe Sachsen. 274.
 — der Deutsch. Gemeinde-Tierärzte, Landesgruppe Sachsen. 342.
 — praktischer Tierärzte. 377.
 — praktischer Tierärzte, Gruppe Magdeburg-Anhalt. 551.
 — praktischer Tierärzte, Gruppe Magdeburg-Anhalt. 760.
 — praktischer Tierärzte, Gruppe Schleswig-Holstein. 288.
 — praktischer Tierärzte, Niedersachsengruppe. 80.
 — praktischer Tierärzte, Niedersachsengruppe. 344.
 — praktischer Tierärzte, Niedersachsengruppe. 391.
 Rein- und Rohchloramin Heyden. Neue Desinfektions-Versuche mit — unter besonderer Berücksichtigung anaerober Sporenbildner. 352.
 Rekurrensspirochäten. 406.
 Relationsentre le nombre des Trypanosomes et les variations glycémiqes dans l'infection expérimentale par Trypanosoma equiperdum. 31.
 Reposition des Prolapsus uteri. Ueber die — beim Rind. 284.
 Resorption. Experimentelle Studien über die intrakutane —. 352.
 Resorptions- und Ausscheidungsgeschwindigkeit verschiedener Substanzen. Ueber das Verhältnis der — bei intraperitonealer Injektion. 26.
 Resorptions- und Ausscheidungsgeschwindigkeit. Ueber das Verhältnis der — verschiedener Substanzen. 367.
 Restnitrogengehalt — des Blutes bei Hühnern. 76.
 Retikulo-endothelialer Apparat. 528.
 — Die Bedeutung des — bei Infektionskrankheiten. 579.
 Retikulo-endotheliales System. 284.
 Retikuloendothel. Ueber die Bedeutung des — für die Generalisierung des Vakzinevirus. 270.
 Retentio secundinarum im rechten und linken Uterushorn. Beobachtungen über —. 742.
 Retentio secundinarum des Rindes. Zur Kenntnis der pathologisch-histologischen Veränderungen bei der —. 440.
 Revision der Geschäfte. Die polizeitierärztliche —. 137.
 Reichsausschuß für hygienische Volksbelehrung. 863.
 Reichsstatistik des tierärztlichen Personals — Zur. 863.
 Reichsverband der Deutschen Fleischwaren-Industrie E. V. 878.
 Rheinischer Tierärztetag. 475.
 Riemser Immunserum. Ueber den Erfolg der Schutzimpfung mit — auf Viehmärkten. 238.
 Rinderabortus in Dänemark. Aus dem Gebiete der Bekämpfung und Diagnostizierung des seuchenhaften —. 562.
 Rinderfinnenfrage. Zur —. 519.
 Rindergallezusatz z. Endo-Nährboden. Empfehlung eines 3-prozentigen — zwecks Verhütung einer Ueberwucherung der Kulturen durch Bact. proteus auf Grund praktischer Bewährung. 441.
 Rinderpest in dem Transkaukasus. Bekämpfung der —. 354.
 Rindertuberkulose. Ist es möglich, die — durch Schutzimpfung wirksam zu bekämpfen? 330.
 — Schutzimpfungsversuche gegen — mit massiven Dosen schwach virulenter Rindertuberkelbazillen. 203.
 — Unters. über den therap. Wert einer aus modifizierten Tuberkelbazillen hergestellten Yakzine „Tebecin“ zur Heilung der —. 283.
 Rindertuberkulosebekämpfung in der Prov. Sachsen i. d. Jahren 1926-27. 379.
 Rindertuberkulose in Schweden. Ein 30jähriger Krieg gegen die —. 104.
 Rindviehzucht. Unters. in der holländisch-friesischen —. 597.
 Römer, Neuere Erfahrungen und Bestrebungen auf dem Gebiete der Geflügelzucht und -haltung. 360.
 Röntgenstrahlen. Zur Frage der Umstimmung durch — beim Ekzem. 621.
 Rösiö, Birger.: Die Bedeutung des Exterieurs und ae. Konstitution des Pferdes für seine Leistungsfähigkeit. 394.
 Rössle, Dr. A. †. 811.
 Rotlauf. Aktive Immunisierung gegen —, durchgeführt an weißen Mäusen. 561.
 — Zur Epidemiologie des —. 318.
 Rotlaufbazillen. Die Virulenz der —. 205.
 Rotlaufkultur. Selbstinfektion durch — mit nachfolgender Serumkrankheit. 125.
 Rotlaufkulturen. Immunisierungsversuche an Mäusen mit avirulenten —. 388.
 Rotlaufkultur von Sabella. Weitere Untersuchungen über die —. 287.
 Rotlaufschutzimpfung. Einfluß der — auf das Vorkommen des Rotlaufs in Sachsen. 561.
 — Zur — tragender Sauen. 125.
 Rotwurmseuche des Geflügels. Entstehung und Bekämpfung der —. 803.
 Rotztülgung in Oesterreich. Zur — in den Jahren 1916 bis 1926. 423.
 Ruhr der Küken. Bakterielle weiße —. 505.
 Ruhr der neugeborenen Tiere. Ueber die Ursachen der —. 747.

S

 Sachs-Georgi, — Meinicke — und die Wassermann-Reaktion. 127.
 Sachverständigenkomitee für veterinärpolizeiliche Maßnahmen. Bericht über die Tagung des — in Genf. 808.
 Salvinol. Versuche über die Einwirkung mit — versetzten Trinkwassers auf Säugetiere. 298.
 Sanarthritis. Beitrag zur Behandlung chronischer Gelenkerkrankungen des Pferdes mit —. 514.
 — Ueber Erfahrungen bei veralteter Ischias mit Injektionen von —. 124.
 Sanocrysins gegen Lungentuberkulose. Beitrag zur Beurteilung der Wirkung des —. 186.
 Santonin. Ist — ein brauchbares Mittel zur Abtreibung der Spulwürmer des Schweines? 515.
 Saponine. Ueber Resorptionsförderung und Potenzierung der Alkaloide und Salze durch —. 655.
 Sarkom der Parotis beim Rinde. Ueber ein metastasierendes —. 422.
 Sauerstoffkammer. Das Ueberleben der Gewebe in der —. 622.
 Säugetiertuberkelbazillen. Ein Beitrag zur Empfänglichkeit der Hühner und Tauben für 745.
 Säurebehandlungsverfahren. Die Züchtung von Tuberkelbakterien aus verschiedenen Ausgangsmaterialien mit Hilfe des sog. —. 406.
 Die deutschen Tierärzte gegen das betäubungslose Schächten. 116.
 Schächten. Ueber das Bewegungsverhalten eines großhirnlosen Schafes beim —. 451.
 Schafzucht. Staatl. Maßnahmen zur Förderung der — in Preußen. 597.
 Schaper, Verlagsbuchh. Ehrenbürger d. Tierärztl. Hochschule, Hannover. 224.
 — M., 60. Geburtstag. 206.
 Scharlachsäbe. Versuche mit —. 201.
 Scharr, Berlin, 25jähr. Jubiläum. 79.
 Schimmelbildung auf ausländisch. Schmalz. 190.
 Schlachthöfe. Projektion auf —. 743.
 Schlacht- und Viehhöfe im Deutschen Reiche. 823.
 Schlacht- und Viehhöfe. Verwendung der Ueberschüsse der Einnahmen der —. 640.
 Schlachttiere. Die Zucht und Haltung von — in ihren Beziehungen zu den Verschiebungen des Vieh- u. Fleischmarktes. 581.
 Schlachtviehversicherung in Sachsen. 567.
 Schlafmitteltherapie. Probleme der —. 609.
 Schlägel, Vet.-Rat †. 393.
 Schlangenbiß. Ueber die Gefährdung durch —. 594.
 Schlundschnitt beim Bullen. Zum —. 593.
 — bei einer Kuh. 386.
 Schlundverstopfung. Eine ungewöhnliche Ursache einer —. 108.
 Schmaltz, Anatomie des Pferdes. 506.
 — Geh, Rat im Ruhestand. 392.
 Schmidt, Die Geflügeltuberkulose. 378.
 Schmidts, Albrecht, Ein Berliner Marstallveterinär Friedrichs des Großen. Vet. Hist. Mitteilgn. 41.
 Schmitt †. 794.
 Schlops und Tänzer, Entstehung und Grundlagen der Pelztierzucht in Deutschland. 444.

- Schutzimpfung gegen die Tollwut. Zur Frage der — der Hunde 817.
- Schwangerschaftsdiagnose. Die biologische —, 563.
- Schwerarbeiter. 862.
- Schwefelung von Rindervierteln. 367.
- Schweine, Fischige. 641.
- Schweine- und Geflügelrotlaufbakterien, Vergleichende Untersuchungen über —, 334.
- Schweinepest. Die sanitätspolizeil. Beurteilung der —, 390.
- Schweinepest-Serum. Erfahrungen bei der staatlichen Prüfung ausländischen —, 827.
- Schweinepest. Simultane Schutzimpfungen gegen —, 755.
- Ueber bemerkenswerte Fälle von akuter —, 282.
- Ueber das derzeitige Auftreten der —, 317.
- im Norrland. Das Wesen der — und amerikanischer Speck. 371.
- Schweinepest- und Schweineseuchekreise. Aetiologie, Diagnose und Bekämpfung der Krankheiten des —, 193.
- Schweinepest- und Schweineseuchekreis. Aetiologie, Diagnose und Bekämpfung der Krankheiten des —, 214.
- Schweinepraxis. Aus der —, 483.
- Schweineseuche. Methylenblau und —, 274.
- Schweineseuchen. Begriffsbestimmung und Namengebung der —, 515.
- Schweinezucht. Leistungsprüfungen und —, 596.
- Scours in suckling pigs. 368.
- Seefischerei. 310.
- Seefischverkehr. Tierärztliche Kontrolle des —, 97.
- Sehnen und Muskeln. Ueber einige Methoden zur Prüfung der Funktion von —, 736.
- Seifried, Die wichtigsten Krankheiten des Kaninchens mit besonderer Berücksichtigung der Infektions- und Invasionskrankheiten. 444.
- Seiler, Vet. Rat †. 344.
- Sekretion der Drüsen. Ueber die Beziehungen zwischen äußerer und innerer —, 420.
- Sekretionsstörungen im linken Schenkelviertel. Vorwiegendes Auftreten von —, 145.
- Selbstdispensieren. 583.
- Selektantherapie. Beiträge zur —, 201.
- Sensibilisierung von Meerschweinchen gegen Alt tuberkulin. Versuche einer —, 831.
- Septicaemia haemorrhagica. Die Feststellung der — bei Not schlachtungen. 628.
- Serodiagnostik bei Milzbrand. Zur Frage der —, 282.
- Sertürner, der Entdecker des Morphins. Festschr. 102.
- Serum. Das antigangränöse — und seine Anwendung in der Therapie. 202.
- Serumbilirubin. Das Verhalten des — bei Malaria. 127.
- Serum therapy of botulism in monkeys. 744.
- Seuchenhaftes Verkalben. Richtlinien für die Bekämpfung des —, 468.
- Zur Erforschung und Bekämpfung des —, 429.
- Seuchenhaftes Verwerfen. Ueber die Bekämpfung des — durch systematische Blutuntersuchungen. 768.
- Seuchentilgungsgemeinschaften. 605.
- Sexual-Hormone. Ueber weibliche —, 579.
- Simon, Vet.-Rat †. 409.
- Skelettmuskulatur bei Trichinose. Ueber die Veränderungen der —, 141.
- Sobre Tripanosomas. 189.
- Sokolowsky, Carl Hagenbeck und sein Werk. 584.
- Solganalbehandlung. Ueber —, 637.
- Solvochin „Homburg“. 622.
- Sonnenblumenkuchen. Untersuchung betreffend —, seine Zusammensetzung, seine Verdaulichkeit u. seinen Einfluß auf die Milchproduktion. 11.
- Sonnenlicht und Fensterscheiben. 108.
- Soyabohnenschrot. Ist die Verfütterung von — gefährlich? 47.
- Spatium retromucosum der Trachea beim Rinde. Tuberkulose des —, 535.
- Spindelzellensarkom. Primäres — des Harnleiters beim Hund. 251.
- Spirillen als Ursache ansteckenden Verwerfens. 757.
- Spirochétose de la souris blanche et infection mixte trypanospirochétique. 12.
- Spontanavitaminose des jungen Hundes. Eine —, 842.
- Sporotrichose der Eier. Die —, 110.
- Spreize für die Schweineschlachtungen. Eine einfache —, 722.
- Stall-Luft Untersuchungen über den Kohlensäure- u. Wasserdampfgehalt der —, 183.
- Standfuß, Bakteriolog. Fleischbeschau. 132.
- Ständiger Ausschuß der Internat. Tierärztl. Kongresse. 506.
- Starkfönnigkeit bei einem vier Wochen alten Kalbe. 519.
- Starling'sches Herz-Lungen-Nierenpräparat. 609.
- Staupe der Hunde. Einige Bemerkungen über die —, 452.
- Staupe, Ueber. 273.
- Steißgeburten beim Rind. Ueber reine —, 28.
- Sterilität. Behandlung der — mit Ovarien des Schweines. 579.
- beim Rindvieh. 503.
- des Rindes. Aus dem Gebiete der —, 1.
- des Rindes. Beitrag zur —, 388.
- des Rindes. Die Therapie der — unter bes. Berücksichtigung der Yaten-Vakzine Therapie. 610.
- Sterilitätsursachen bei den Stuten. Beiträge zur Frage der — mit besonderer Berücksichtigung des klinischen und therapeutischen Auswertung. 10.
- Sterin. Versuche mit ultraviolett bestrahlten, fettgebundenem — bei normaler Jungtier- und Geflügelzucht. 386.
- Stölzle Gerichtliche Entscheidungen über den Viehkauf, II. Folge. 584.
- Stomatitis vesicularis. Vergleichende Untersuchungen über — und Maul- u. Klauenseuche 726.
- Stoss, A. Zum 70. Geburtstag. 645.
- Strafrechtlichen Verantwortung des in der Fleischschau tätigen Sachverständigen bei Zuwiderhandlungen gegen die Ausführungsbestimmungen des Fleischbeschaugesetzes. Zur —, 876.
- Strahlentherapie. Die in der Pferdeseuchenstation Berlin mit — angestellten Versuche. 269.
- Streptokokkenmastitis des Rindes. Ueber die Behandlung der — mittels der Ausmelkmethode. 126.
- Streptokokken. Zur Trennung einiger in der Milch vorkommender — mit bes. Berücksichtigung der Isolierung des Str. agalactiae Guillibea. 599.
- Streptokokkeninfektionen. Studien über das sog. Antivirus nach Besredka bei experimentellen —, 580.
- Streptokokkenmastitis. 287, 361.
- bei Kühen. Erforschung und Behandlung der —, 375.
- der Rinder. Beitrag zur —, 674.
- Streptokokken-Mastitis. Ueber die Bekämpfung der — und der Euterseuche. 676.
- Streptokokkensepsis. Die — und des retikulo- und otheliele System. 201.
- Strongyliden der Pferde. 101.
- der Pferde in Deutschland. 590.
- der Schaf- und Ziegenlunge. Beiträge zur Kenntnis der —, 353.
- Strongylus equinus, edentatus u. vulgaris. Zur pathogenen Wirkung von — auf die Dickdarmschleimhaut des Pferdes. 719.
- Strychnin. Modellversuche über den Einfluß des — auf die respiratorische Funktion des Blutes. 637.
- Strychnin, Pikrotoxin und Samandarin. Ueber die Gefäßwirkung der Krampfgifte. —, 624.
- Studententag in Danzig. 549.
- Studentenschaft der Tierärztlichen Hochschule Wien. Deutsche —, 222.
- Studentenschaft der Tierärztlichen Hochschule Wien. Deutsche —, 344.
- Studierende an Tierärztlichen Hochschulen. 428.
- Stutenabort. Ueber den auf der Insel Hokkaido ausgebrochenen infektiösen —, 7.
- Sublimatvergiftung. Pathologische Anatomie der endokrinen Drüsen bei —, 422.
- Sur l'immunisation antiaphteuse par le virus formolé —, 96.
- Sur quelques maladies parasitaires des petits animaux domestiques observées dans le canton de Vaud. 184.
- Symptomes rabiformes non rabiques chez les carnassiers. 547.

T

- Taurke, Die Fischzucht u. Fischhaltung. 66.
- Tebbe, Die Schweinezucht in Oldenburg. 378.
- Teer, Wasserlöslicher. 420.
- Tetanus beim Rinde. 36.
- Tetanus nach aseptischer Fußoperation. Ueber einen Fall von —, 352.
- Tetanuserum. Tetanusbehandlung durch subdurale Injektion von —, 273.
- Wann ist bei offenen Verletzungen die prophylaktische Einspritzung von — notwendig? 142.
- Tetralolpräparate. Untersuchungen über die keimtötende Kraft von —, 27.
- Thaer-Feier. 762.

- „The Corpus luteum of Pregnancy in the domestic Cow and a brief Discussion of cyclical ovarian Clanges“, 439.
- The Effect of Fowl Typhoid Vaccination upon the macroscopic Agglutination Test for *Salmonella pullorum* Infection. 221.
- The influence of purulent infection on the development of experimental scurvy. 253.
- Thelaziaarten aus der Conjunctiva des Rindes in der U. S. S. R. Drei —. 553.
- Therapogalt. Neuere Erfahrungen mit —. 610.
- The reaktion of vesicular stomatitis virus to ultra violet light. 238.
- Thermometer für Haustiere. Ein neues —. 352.
- Thiosal. 608.
- Tierärzte für Schleswig-Holstein. 613.
- Tierärzte-Kalender, Deutschösterreichischer 1928. 148.
- Tierärztekammer Brandenburg-Berlin. 49.
- für die Prov. Brandenburg. 80.
- für die Provinz Brandenburg. 486.
- für die Provinz Brandenburg. 566.
- für die Prov. Hessen-Nassau. 307.
- für die Prov. Ostpreußen. 99.
- für die Prov. Ostpreußen. 290.
- für die Prov. Ostpreußen. 357.
- für die Provinz Sachsen. 487.
- für die Rheinprovinz und die Hohenzollernschen Lande. 146.
- für Westfalen und Lippe. 344.
- für die Prov. Westfalen. 469.
- Tierärztekammergesetz, Preussisches. 302.
- Preussisches. 321.
- Tierärzterundfunk. 475.
- 682.
- Tierärzterverband Niedersachsen. 779.
- Tierärzterverein für Schleswig-Holstein. 551, 728.
- Stade-West. 225, 320, 660.
- Unterweser. 583.
- Westfalen. 662.
- der Provinz Westfalen. 729.
- Tierärztl. Beratungsstelle. Tätigkeitsbericht der — über das Jahr 1927. 497.
- Tierärztliche Buchführungsstelle Pommern. 290, 376.
- Buchstelle Sachsen-Anhalt. 147.
- Buchstelle Sachsen-Anhalt, Magdeburg. 192.
- Tierärztl. Fortbildungskursus der Landw.-Kammer Niederschlesien. 810.
- Tierärztlicher Fortbildungsrundfunk. 116, 208, 290.
- Tierärztliche Sterbeunterstützungs-Kasse in Sachsen. 324.
- Verrechnungsstelle f. d. Prov. Brandenburg. 33.
- Tierarzneimittel, Neue. 250.
- Tierärztliche Gesellschaft in Königsberg. 307, 310.
- Hochschule Berlin. 115, 360.
- Hochschule Hannover. 16, 33, 48, 64, 66, 115, 128, 131, 241, 242, 259, 310, 344, 356, 392, 393, 409, 426, 428, 489, 520, 521, 522, 551, 732, 762, 777, 778, 796, 809.
- Hochschule Hannover (150jähr. Bestehen). 377.
- 150 Jahre Tierärztl. Hochschule Hannover. Festschr. 5.
- Tierärztliche Hochschule, Hannover, 150-Jahrfeier. 569.
- Hochschule Hannover. Spendung zur 150-Jahrfeier. 457.
- Tierärztl. Hauptverein von Hamburg und Umgegend. 583.
- Tierärztlicher Verein der Neumark u. Grenzmark. 132, 145, 444.
- Verein der Neumark. 832.
- Zentralverein f. d. Provinz Sachsen. 290, 309, 470, 779, 796.
- Tierärztliches aus der badischen Stallmeister-Ordnung (1590). Vet. Hist. Mittlgn. 36.
- Tierexperiment. Die Bedeutung des — für die Bakteriologie und Hygiene. 647.
- Tierexperimentelle Nachprüfung der Schutzimpfung gegen Tuberkulose mit BCG. 875.
- Tierheilkundliches in den naturwissenschaftlich. Schriften der Hildegard von Bingen. Vet. Hist. Mittlgn. 21, 26.
- Tierkadaver. Die Beseitigung der —. 733.
- Tierlazarette. Transporteinrichtung in —. 498.
- Tierwelt, die im Gesetze Mosis. Vet. Hist. Mittlgn. 40.
- Tierzüchterische Beobachtungen in Bayern. 399.
- Zeitfragen. 208.
- Tinctura Opii simplex D. A. B. Versuche über die styptische Wirkung der — bei subkutaner Applikation an Meerschweinchen. 269.
- Titelabkürzung der Zeitschriften. 567.
- Tollwut. Ein Beitrag zur Frage der Selbstheilung der —. 341.
- Ein seltener Fall von — 638.
- Schutzimpfung gegen die — der Tiere. 595.
- der Hunde. Ueber einmalige obligatorische Schutzimpfung gegen — 516, 547.
- Torsio uteri. Beiträge bezw. Beobachtungen über —. 548.
- Torsio uteri. Beiträge über —. 611.
- Trächtigkeit bei Stuten. Ueber die frühzeitige Feststellung der —. 374.
- einer Kuh. Ein Fall von sekundärer, extrauteriner —. 517.
- Train's Veterinär-Taschenbuch 1928. 100.
- Trattato di Igiene Zootechnica. 80.
- Trichinellen-Infektion. Studien über den Mechanismus der —. 369, 545, 626.
- Trichinose. Die Pathologie der —. 236.
- Ueber die — und ihre Bekämpfung. 202.
- menschliche. Ueber die Beteiligung des Augapfels an der Trichinosen-Einwanderung bei —. 236.
- Ueber Gehirnveränderungen bei menschlicher —. 202.
- Ueber — und ihre Bekämpfung. 483.
- Zur Pathologie der —. 403.
- Trichinöses Fleisch. Ueberweisung von — an das Institut f. Nahrungsmittelkunde d. Tierärztl. Hochschule zu Berlin. 731.
- Trichinoskop. Ueber die Verwendbarkeit des —. 143.
- Trichostrongylose beim Hasen. 753.
- bei Kälbern. 858.
- Trypanosomen. Das Verhalten des Blutzuckers und des Leberglykogens bei mit — infizierten Ratten. 110.
- Sind — filterpassierbar? 363, 432.
- Tuberkelbakterien. Der kulturelle Nachweis von — und seine praktische Bedeutung. 666.
- Tuberkelbazillen. Direkte Züchtung von — aus dem strömenden Blut. 518.
- Die Kultur der — und ihre diagnostische Bedeutung in der patholog. Anatomie. 758.
- Infektionsversuche mit einzelnen —, durchgeführt mit der mikrurgischen Methode. 441.
- Kolbenkranzbildung um tote — als Reaktion des Wirtsorganismus. 628.
- in Milch und Sputum. Der Wert des Zentrifugierens für die Anreicherung von —. 144.
- Zur Frage der Differenzierungsmöglichkeit humaner und boviner — durch Komplementablenkung. 189.
- im Lungenschleim. Ueber den Nachweis von — des Rindes. 125.
- Tuberkelbazillus. Ueber die filterbare Form des —. 612.
- Tuberkelbazillen. Zur Frage der Differenzierungsmöglichkeit humaner und breiner — durch Komplementablenkung. 580.
- Zur Frage der Filterbarkeit der —. 580.
- Tuberkulinreaktion. Ueber das Wesen der —. 96.
- Tuberkulosen-Burow bei der Sterilitätsbehandlung. 610.
- Tuberkulose. Aktive Immunisierung gegen — durch intrakutane Einreibung virulenter Tuberkelbazillen. 423.
- Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Reinfektion bei geheilter —. 273.
- Schutzimpfung gegen mit BCG nach Calmette. 454.
- Ueber die Desinfektionsfragen bei der —. 577.
- Uebertragung der — durch filterbare Erreger. 254.
- Ueber weitere Erfolge mit dem Friedmann-Mittel bei der — exotischer Tiere im Tierpark Stellingen. 561.
- beim Reh. 238.
- Tuberkulosebekämpfung. Fünfzehn Jahre staatliche —. 210.
- Tuberkulose-Diagnostik. Beiträge zur — vermittelt der Komplementablenkung. 561.
- Tuberkulose des Rindes. Ein Beitrag zur Behandlung der —. 561.
- des Hausgeflügels. Der derzeitige Stand der Bekämpfung der —. 365, 463, 558.
- Tuberkulosefälle. Einige interessante —. 669.
- Tuberkulose-Immunität. Ueber —. 578.
- Tuberkulose-Immunisierungsversuche an Kaninchen. 143.
- Tuberkulöse Infektion des Menschen im Vergleich zu den übrigen bakteriellen Infektionen des Menschen. Die —. 874.
- Tuberkulose-Schutzimpfungsverfahren mit BCG. Internationale Konferenz über das —. 775.
- Tuberkuloseschutzimpfungs-Versuche. 631.
- , 405.
- Tuberkulose und Milch. Ueber Tuberkulose von Hund u. Katze. Beiträge zur klinischen Kenntnis der — und Bewertung der für die Diagnose intra vitam heranzuziehenden Untersuchungsmethoden. 353.
- „Tussex“-Räucherkerzen. Inhalationstherapie bei Erkrankungen der Atemwege mit —. 636.

Tutokains. Ueber den Einfluß verschiedener Muzilaginosa auf die korneale Anästhesie, besonders des —, 93.
 Typhusinfektion. Die bakteriziden Kräfte des Darms und ihre Bedeutung. 516.
 Typhus- und Paratyphusbazillen. Neue Farbstoffnährböden zur Elektivzüchtung von —, 743.
 Typhusvirus. Versuche zur Frage des unzüchtbaren —, 580.

U

Ueber die Herkunft einiger Stellen im C. H. G. II. (Schluß.) Vet. Hist. Mittlgn. 1.
 Ueber die Verbreitung des Bacillus Tetani Nicolaier im Erdboden der Schweiz, unter spezieller Berücksichtigung der Kantone Graubünden, Waadt und Wallis und der Höhenverbreitung. 844.
 Ultraviolett bestrahltes animalisches Oel. Experimentelles über die antirachitische Wirksamkeit von —, 608.
 Ultraviolettes Licht. Ueber Dosimetrie des —, Festschr. 106.
 Ultraviolette Strahlen — in der Hundepraxis. 386.
 Universität Gießen. 505.
 Unseren Gästen. Festschr. 1.
 Unterchlorige Säure. Die — und ihre Verwendung in der Wundasepsis. 654.
 Unterstützungskasse für Tierärzte (E. V.) 847.
 Untersuchung des Rindes. Die klinische — von Dr. Ew. Weber. 878.
 Untersuchungen über den Nachweis von Präzipitinogenen in Eihäuten und Organen von Feten beim infektiösen Abortus (Bang) beim Rinde. 860.
 — über die Dosierung und die Elimination des Avertins, Experimentelle. 858.
 — über die Haltbarkeit von Hackfleisch aus Frischfleisch und Gefrierfleisch —, Vergleichende. 876.
 — über die Uebertragung und Aetiologie der Schweine-Influenza. 843.
 Uterusschnitt nach dem Tode des Tieres. 374.
 Uterus-Torsion. 28.
 Uterusmittel. Zur Auswertung von —, 579.

V

Vakzine. Aktive Immunisierung mit Formolvakzine gegen —, 254.

Vakzine und Antivirus. Die klinische Anwendung der lokalen Immunisierung mittels —, 202.
 Vakzinevirus im Blut. Ueber den Nachweis des — nach kutaner Impfung. 353.
 Valutin. Erfahrungen mit — bei Spulwurmerkrankungen. 515.
 Veeartsennijkundig Instituut. 789.
 Ventralse. Untersuchungen über die Verwertbarkeit der —, Zur Therapie des Intestinaltrakts beim Hund. 624.
 Verabreichung flüssiger Medikamente durch das Maul und die Einspritzung derselben durch die Nase bei Schweinen. Die —, 873.
 Veränderungen bei Pferden. Zur Histologie der parasitären —, 625.
 Verbände Besredkas. Experimentelle Untersuchungen über die präventive u. lokaltherapeutische Wirksamkeit feuchter Verbände, insbesondere der sog. spez. —, 402.
 Verdauung der Wiederkäuer. Neue Untersuchungen über die —, 756.
 Verdauungsapparat des Rindes. Fremdkörper im —, 577.
 Verdauungskrankheiten des Rindes. Beiträge zur Diagnostik und Behandlung der —, 559.
 Verein beamteter Tierärzte. 240.
 — beamteter Tierärzte Preußens. 115.
 — beamteter Tierärzte Preußens. 207.
 — der beamteten Tierärzte Preußens. 223.
 — beamteter Tierärzte Preußens. 696.
 — beamteter Tierärzte Preußens. 791.
 — der Getreidehändler der Hamburger Börse. 779.
 — Verein der Schlachthof- und Gemeindetierärzte Westfalens. 222.
 — der Schlachthof- u. Gemeindetierärzte Westfalen. 844.
 — der Tierärzte des Reg.-Bez. Aachen. 309.
 — der Tierärzte des Reg.-Bez. Aachen. 716.
 — der Tierärzte des Reg.-Bez. Düsseldorf. 274, 342, 779, 862.
 — der Tierärzte des Reg.-Bez. Hannover. 779.
 — der Tierärzte des Reg.-Bez. Hildesheim. 191, 288, 681.
 — der Tierärzte des Reg.-Bez. Lüneburg. 600.
 — der Tierärzte des Reg.-Bez. Wiesbaden. 129, 488, 644.
 — Kurhessischer Tierärzte. 392, 761.

— Oberschlesisch. Tierärzte. 241.
 — Ostfriesischer Tierärzte. 391, 877.
 — Ostpreußischer Tierärzte. 80, 357, 681.
 — Schlesischer Tierärzte. 33, 290, 565, 732.
 — Verein Thüringer Tierärzte. 49, 129, 258, 630, 760.
 Vereinigung der städtischen Milchgroßbetriebe. 657.
 — der Tierärztl. Hochschulen Deutschlands. 221.
 — der Tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten Deutschlands. 790.
 — für Mikrobiologie. Deutsche —, 66, 289, 568.
 Vererbungserkenntnis, Neuzeitliche. 596.
 Vergiftigung mit Chenopodii. 532.
 Verkauf von Zucht- und Nutztieren. Aus dem Kapitel —, 539.
 Verknöcherungen im Gekröse des Schweines. Die —, 546.
 Veröffentlichungen aus d. Gebiete der Medizinalverwaltung. Bd. XXVI, Heft 3. 780.
 Versorgung der Nachkommenschaft m. spezifischen Agglutininen fetaler oder laktogoner Herkunft? Ist die —, 844.
 Versuche an Meerschweinchen zwecks Immunisierung mittels „verseifter“ Kochscher Bazillen gegen nachträgliche Infektion mit lebenden Tuberkelbazillen. 875.
 Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammer-Institute. 474.
 Vertretung der Tierärzte. Die parlamentarische —, 519.
 Verwandtschaftsreactie by de praecipitatie. (Verwandtschaftsreaktion bei der Präzipitation. 860.
 Verwerfen der Rinder. 517.
 — des Rindes. Ueber Schutzimpfung mit lebenden Kulturen gegen das seuchenhafte —, 562.
 Vesicular stomatitis in its relation to the diagnosis of foot — and — mouth disease. 95.
 Veterinärbericht über die Remonteamter. 529.
 Veterinärhandschriften, Deutsche. Vet. Hist. Mittlgn. 4.
 Veterinärhygiene. Beitrag zur Geschichte der — der Deutschen des Mittelalters und der neueren Zeit. 560.
 Veterinärinstitut der Univ. Leipzig. 50 Jahre —, 325.
 — der Universität Leipzig. 50-Jahrfeier des —, 358.
 Veterinär-Kalender. (Oesterreichischer). 258.

Veterinärmedizin. Chemische u. chemisch-physikalische Untersuchungen in der internen —, 497, 498.
 Veterinärmediz. Fachgruppe der Deutschen Studentenschaft. 129, 811.
 Veterinärmedizinische Fachschaft Giessen. 864.
 Veterinärmedizinische Fachschaft Leipzig. 812.
 — Fachschaft, München. 812, 864.
 Vet. med. Fakultät der Universität Leipzig. 809.
 Veterinär-medizinische Gesellschaft für Südwest-Deutschland. 132, 455.
 — Studien zu Hannover vor hundert Jahren. Die —, 415.
 Veterinäroffizier. Welcher Anteil fällt dem — bei der Ueberwachung der Fütterung und Pflege des Truppenpferdes zu? 503.
 Veterinäroffizierbund. 14.
 — Deutscher. 33, 443 796.
 Veterinär-Rat, Deutscher. 16, 34, 49, 66, 80, 99, 148, 192, 290 535, 566, 696, 716, 746, 776, 780, 796.
 Veterinärschule. Die Wiener — um 1812. V. Hist. Mittlgn. 37.
 Veterinärwesen in der Türkei. Reorganisation des —, 129.
 V. H. M. 1927, Nr. 6, Nachträgliches zu —, — (Fortsetzung —Schluß). Vet. Hist. Mittlgn. 7, 9.
 Vibrionenseuche der Karpfen. Ueber die —, 345.
 Vielhörigkeit bei Ziegen. 562.
 Viehseuchengesetz. 500.
 Viehseuchenpolizeiliche Anordnungen, Revisionsentscheidung betr. —, 252.
 Virus fixe bei subkutaner Injektion. Zur Frage der Unschädlichkeit des —, 628.
 — fixe. Zur Frage der Unschädlichkeit des — bei subkutaner Injektion. 454.
 Virusschweinepest. Diagnose und Bekämpfung der —, 20.
 Virusschweinepestserum. Versuche über Wertbemessung des — an kleinen Versuchstieren. 605.
 Vitalspeicherung. Das retikulo- und otheliale System des Pferdes und seine Darstellung durch —, 624.
 Vitamin-B-Gehalt verschiedener Brotgebäcke. Untersuchungen über den —, 535.
 Vitamin D Geht — in die Milch über? 126.
 — D. Hypervitaminose durch große Dosen —, 808.

Vitamin E. 127.
Vogt's Scheidenverschluß. 620.
Vor 100 Jahren. Vet. Hist. Mitteilgn. 25.
Vorlesungen d. vet. med. Fakultät d. Univ. Gießen. 207.
— a. d. Tierärztl. Hochschule Hannover. 79.
— b. d. Veterinär-med. Fakultät d. Univ. Leipzig. 225, 661.
„Vreesziekte“ bij Honden. 622.

W

Warzen. Ueber Suggestivbehandlung von —. 218.
Wasserglas-Zentrifugierschwimm - Methode nach Vajda. 251.
Wehrle, Geh. Zu — 60. Geburtstag. 813.
— Dr. E., Danksagung. 863.
Weideuterentzündung der Kühe und Färsen in Ostfriesland. Zur Aetiologie der —. 200.
Weideseuche der Rinder in Schleswig-Holstein. Beitrag zur Morphologie des Erregers der —. 199.
Weil'sche Krankheit. Ueber die Aetiologie der —. 547.
Weiße Ruhr der Küken. Zur Bekämpfung der —. 23.
— Ruhr der Küken. Amerikanische Studien auf dem Gebiete der bazillären — und Versuche über den Wert der Agglutinationsprobe. 375.
— Ruhr der Küken. Die Agglutinationsprobe angewendet bei der Kontrolle der bazillären —. 581.
— Ruhr der Küken. Festschr. 44.
Weiße Ruhr des Geflügels. Ueber die —. 582.

Werbeheft 1927 der Fleischwaren-Industrie. 80.
Why eradicate foot — and — mouth disease by the slaughtering method, instead of endearing to control it by quarantine methodes? 77.
Wiederkäuer und ihre Krankheiten im Altertum. 61.
Wiemann, Der deutsche Viehbestand und die Tierseuchen in Zahlen, Karten und Tafeln. 506.
Wildrind Osteuropas und seine Domestikation. 220.
Wild- und Rinderseuche und Schweineseuche. 865.
Wilhelm, Dr. †. 257.
Winke für die Simultanimpfung bei Virusschweinepest. Einige prakt. —. 843.
Winterball der Tierärztl. Hochschule, Berlin. 864.
Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte e. G. m. b. H. in Hannover. 877.
Wochenmärkte. Die polizeitierärztliche Ueberwachung der —. 135.
Wöhler, Gen. Vet., 70. Geburtstag. 629.
Wundbehandlung. Ueber neuere —. 514.
Wundinfektionen. Anaerobe — im Frieden. 405.
Wurf-, Niederlege- und Zwangsmethoden. Einige der gebräuchlichsten —. 544.
Wurmerkrankungen des Schweines. Ueber die Bedeutung einiger —. 515.
Wurstuntersuchung. Die Bedeutung der histologischen —. Festschr. 39.

— Die histologische — und das Lebensmittelgesetz. 814.
Wutkrankheit. Schutzimpfung der Haustiere gegen die — im Jahre 1926. 755.
Wutschutzimpfungen an Hunden und Pferden. Bericht über die —. 238.
Wutschutzimpfung bei Hunden. Beiträge zur —. 755.
Wutschutzimpfungen. Zur Frage der Dezentralisation der —. 283.

Y

Yatren-Behandlung. Ueber — u. über einen Fall von Ovariectomie. 514.
„Yatren purissimum“ in der Wundtherapie. 514.
Yatren. Toxikologische Versuche mit —. 281.
— Tierexperimentelle Studien an Tauben über die bakterizide Wirkung des —. 9.
Yatren-Vakzin E 104. Zur Anwendung des — in der Praxis. 298.

Z

Zahl und Masse der Infusorien im Pansen und ihre Bedeutung für den Eiweißaufbau beim Wiederkäuer. Die —. 875.
Zahlen aus der landwirtschaftlichen Verwaltung, die den Tierarzt angehen. 846.
Zaumschütteln beim Pferd als Untugend. 453.
Zellen des retikulo-endothelialen Systems. Eine für Kursus-

zwecke sehr geeignete Methode zur Darstellung der Zellen des —. 109.
Zellgröße. Untersuchungen über die Größe der Zellen in ihren Beziehungen zur Körpergröße. 302.
Ziege. Die Körperentwicklung der Ziege von der Geburt bis zum Alter. 611.
Ziegenmichanämie. Untersuchungen über die —. 404.
Ziele der Lehre und Forschung an den tierärztlichen Bildungsanstalten. 263.
Zietzschmann, Prof. Mitgl. d. Akademie der Naturforscher. 535.
Zoologisches Institut der Hochschule Hannover. Festschr. 18.
Zsigmondy. Kolloidchemie. II. Spezieller Teil. 5. Aufl. 50.
Zuckerrübenkraut Untersuchungen über die Fütterung von Rindern mit —. 389.
Zu dem Artikel von F. Froboese „Neue Erkenntnisse über die biologischen Wirkungen der Milchsäure“. 872.
Zungenspielen beim Rind. Die operative Heilung des —. 218.
Zur bakteriologischen Differentialdiagnose zwischen Geflügelcholera und Hühnertyphus. 870.
Zwei Fälle aus der Pferdepraxis (Tibiafraktur, Torsio uteri, Heilung.) 842.
Zwiebeln und Knoblauch. Ueber den Einfluß von — auf das Wachstum von Bakterien in Würsten. 658.

Abbildungen.

U = Umschlag.

A

Anatomie von M. Lafosse. U. 30.
Arnold, Geh. Rat. U. 45.
Aerztevereinshaus Hannover. U. 9.

B

Bang, Prof., Dr., Kopenhagen. U. 23.
Bucephalus, Pferd Alexander des Großen. U. 38.

D

„Dammannbüste“. U. 2.

E

Eingang zu den Instituten der Tierärztlichen Fakultät der Univers. München. U. 47.
Einladung zum Festcomers der Studierenden der Tierarzneischule. U. 40.
Ellenberger, Wilhelm. U. 12.
Enthüllung der „Robert Koch“-Gedenktafel. U. 27.
Epona, die schützende Gottheit der Reit- und Zugtiere. U. 46.

F

Festakt anlässlich des 150jährigen Jubiläums der Tierärztl. Hochschule Hannover. U. 25.

Frick, Geh. Reg.-Rat Hannover. U. 31.
Fröhner, Geh. Rat Dr. U. 10.
Führende Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften. U. 48.

G

Gärtner, Geh. Rat Dr. U. 15.
Gesner, Conrad. U. 51.
Grundsteinlegung zu den Neubauten d. Tierärztl. Hochschule Hannover. U. 26.

J

Impfung durch den engl. Arzt E. Jenner. Die erste —. U. 14.
Institute der Veterinär-medicinischen Fakultät der Universität Leipzig. U. 52.
150-Jahrfeier d. Tierärztl. Hochschule Hannover. U. 34.
Jodlbauer, Prof. Dr. U. 37.

K

Klimmer, Oberm.-Rat., Prof. Dr. Dr. Leipzig. U. 35.

L

Löhneysen, Georg Engelhard von. U. 32.

M

Malkmus, Geh. Rat †. U. 5.
Marks, Vet.-Rat, Dr. Dr. U. 29.
Maschine zur Heilung eines Beinbruchs. U. 22.
Mießner, Prof. Dr. U. 3.
Müssemeier, Dr. h. c., Ministerialdirigent U. 33.

O

Olt, Geh. Rat., Prof. U. 18.
Oppermann, Prof., Dr. U. 1.
Ostertag v., Min.-Rat. Prof. U. 13.

P

Pferd des Caesar. U. 41.

R

Richter, Dr. med. vet., Ministerialrat, Dessau. U. 7.

S

Schaper, Verlagsbuchhändler. U. 11.
Schöttler, Dr., Prof. U. 20.
Speisen-Karte. Zur 100jährigen Jubelfeier der Tierarzneischule. U. 24.
Stoß, Geheimrat. — Geheimrat Kitt, 70 Jahre alt. U. 44.

T

Tagung 4. der Fachtierärzte für die Bekämpfung d. Aufzucht-krankheiten. U. 4.
Teilnehmer am ersten internationalen tierärztlichen Kongreß zu Hamburg 1863. U. 17.
— an der 90. Versammlung „Deutscher Naturforscher und Aerzte. U. 42.
Thaer, Albrecht. U. 43.
Tierärztl. Hochschule Hannover im Festkleid. U. 28.
Tractat. Georg Simon Winters Neuer — von der Stutercy oder Fohlenzucht. U. 16.

U

Uhlenhuth, Geh. Reg.-Rat, Prof. U. 39.

V

Veterinärklinik eines Heerlagers des Cinquecento (anno 1532). U. 36.
Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Gießen. U. 50.

W

Wehrle, Geh. Reg.-Rat, Dr. h. c. U. 49.

Z

Zwick, Prof., Dr. U. 8.

Autoren.

A

Albien, Dr. 432.
Arieß, Dr. B., Vet. Hist. Mittlgn. 40.

B

Bahr 786.
Baß 583.
Baudet, E. A. R. F. 858.
Bechdel S. J. 860.
Becker 40, 297.
Behnke 114, 417.
Beller 827.
Benner 843.
Berge, Festschr. 44.
Biermann 814.
Blanc, Le 874.
Blick-de 139.
Bohnekamp 465.
Böttcher, Festschr. 35.
Böttcher, Th. 875.
Bryde, Mc. 843.

C

Cernaianu, C., Dr. 543.
Clausberg 875.
Collier 363, 749.

D

Dankwortt. Festschr. 14, 15, 465, 794.
David 345.
Depisch, E. 873.
Dexler 451.

E

Ebstein, Erich, Vet. Hist. Mittlgn. 19.
Eber 121, 325, 330.
Edelmann, Geh Rat 79.
Ehrhardt K. 875
Ehrlich 56.
Eickmann 631.
Elsässer 752.
Erschow 553.

F

Ferber, Karl-Erich 875.
Fiebiger 345.
Fleischhauer 542.
Foth 733.
Freese, Festschr. 82, 461.
Frick, Festschr. 70, 536.
Friedmann 365, 463.
Froboese 574.
Froehner, Reinhard. Vet. Hist. Mittlgn. 16, 19, 20, 21, 25, 26, 32, 40, 44.

G

Gach, G. A. Vet. Hist. Mittlgn. 13, 17, 30.
Geiger 20.
Gerke, Festschr. 102.
Gerlach, Dr., E. 849.
Giese 815.
Glässer 193, 214, 865.
Goedecke 106.

Golaszewski 842.
Götze, Festschr. 81, 85, 86, 92, 110, 117.
Götze, R. 1, 36, 833.
Gressel 291.
Greve 348.
Grüttner 106.
Gulisan 610.

H

Hafemann 248.
Hasenörl 873.
Heckscher, Dr., Kurt. Vet. Hist. Mittlgn. 43.
Heine 227, 361.
Henkels, Festschr. 71.
Herrmann, O. 874.
Heßler 842.
Heuner 417.
Hildebrandt, Dr. med. vet. 838.
Hink 108.
Hirt 37.
Hobmaier 495.
Hobstetter 601.
Hódosy, J. 860.
Hopfengärtner 59.
Hoppe, Dr. K., Vet. Hist. Mitteilgn. 1, 5, 9.
Hupka 419, Festschr. 97, 98.

J

Ito, S. 7.
Junack 229.
Jüterbock 58.

K

Kallert, E. 876.
Karmann 200, 817.
Karsten 317, 688, 713.
Kasai 7.
Kiessig 676, 677.
Knoth 767.
Kohanawa 7.
Koldajew 384.
Konno 573.
Kotlán 37.
Kozma 842.
Kraus 432.
Kronacher, Festschr. 34, 35, 875.
Krüger 736.
Krüger, W., Festschr. 23.
Künemann, Festschr. 78; 79.

L

Lang, W. J. 844.
Lange, L. 875.
Lehr 278, 350.
Lendle, L. 858.
Lentz 57, 631, 707.
Lerche 708, 803.
Ließ, Festschr. 92.
Lührs 605.
Lund, Festschr. 38, 39.
Lüttschwager 713.
Luy Festschr. 32.

M

Mann, Dr. phil. 146.
Manninger 747, 870.

Marcis 67.
Mathieu 135, 137, 367, 396.
May 297.
Merkens, J. 843, 860.
Meyer, R. 823.
Meyn 334.
Mießner Festschr. 5, 42, 44, 53, 55, 105, 206, 263, 475, 569.
Mikuschkka, G. 873.
Morgenthaler, O. 861.
Moskey 843.
Müller, Dr., Hermann 118.
Müller, K. 842.
Müller, R. 876.
Murner, Thomas, Vet. Hist. Mitteilgn. 16.
Murray, J. A. 860.

N

Niles 843.
Nöller 84, 123.

O

Ochmann 842.
Oehl 362, 395.
Ogura 7.
Opel 6, 279.
Oppermann, Festschr. 60, 61, 268, 311, 507, 539, 717, 735.
v. Ostertag, B. 842.
v. Ostertag, R. 876.

P

Paechtner, Festschr. 1.
Pallaske, G. 523, 860.
Patow, von 399, 875.
Petrov 527.
Plasaj 199.
Poppe 781.
Precht, Festschr. 17.
Prell H. 860.
Priewe 179.
Pröscholdt 663, 674.

R

Raebiger 602, 685, 701, 711.
Raschke, Otto 877.
Rasenzauber, Vet. Hist. Mittlgn. 43.
Rautmann 379, 664, 669, 679.
Régner 104.
Richter 53, 114, 556.
Rieck, Wilhelm, Dr., Vet. Hist. Mittlgn. 29, 32, 33, 36, 37, 41, 45, 415, 426.
Rieken 722.
Ritzer 620.
Roeder, Dr., Georg 839.
Rolle 313, 585, 615, 868.
Rösch, G., 861.
Rudolf, Dr., J. 17.
Rudolf, 60, 445, 481.

S

Saling 133.
Sanz 243.

Schachowzewa 527.
Schäle 429.
Schauder, Prof. Dr., W. 695.
Scheibner, Festschr. 103.
Schermer 797.
Schern, Dr., K. 4, 872.
Schlegel 843.
Schlenker 543.
Schmidt, Fritz 558.
Schmidt, Hermann, Vet. Hist. Mittlgn. 47.
Schmidt-Hoensdorf 365.
Schmidt, J., 873.
Schneider, L. 844.
Schreiber, Dr., O. 35.
Schroeder, E., Festschr. 39.
Schubert 605.
Schumann 53, 697.
Sedemeier, H. 858.
Selechan 842.
Siebler 465.
Skibe 243.
Sokolowsky 23.
Sprehn 339, 763.
Stümpke, Festschr. 106.
Székely, E. 842.

T

Thaer, Albrecht 730.
Theil 843.
Thomsen 477, 768.
Timofeeff, P. P. 842.
Trautmann, Festschr. 25, 26.
Trautwein 683.

U

Ude, Festschr. 18.
Uhlenhuth 647.
Ullmann, A. 860.

V

Vajda 873.
Valentin, Festschr. 108.
Vogt 182, 739.
Völker 491.

W

Walch 122.
Waldmann 683.
Wetzel, Festschr. 51, 55, 72, 101, 590, 719.
Wiemann 210.
Wiesbader, H. 875.
Wolff, Wilhelm Vet. Hist. Mitteilgn. 20.
Wolters 666.
Wulff 366.

Z

Zeibler 494.
Zeller 813, 827.
Zietzschmann, Festschr. 19, 20, 209, 275, 520.
Zimmermann 58.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelman, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezueher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 1.

Ausgegeben am 7. Januar 1928.

36. Jahrgang.

Aus dem Gebiete der Sterilität des Rindes.*)

Von R. Götze.

(Aus der Klinik für Geburtshilfe und Rinderkrankheiten der Tierärztlichen Hochschule Hannover.)

Auf die im Laufe des Berichtsjahres zur Frage der Sterilität der Haustiere gelieferten Beiträge aus dem Institut und die sonst in der Klinik gesammelten bemerkenswerten Erfahrungen soll im folgenden kurz hingewiesen werden.

Entzogen in seiner Dissertationsschrift die Verbreitung, die Ursachen und die Bekämpfung der Unfruchtbarkeit des Rindes im Kreise Emden einer speziellen, die örtlichen Verhältnisse berücksichtigenden Bearbeitung. Nach seiner Schätzung bleiben im Kreise Emden 5—10 Prozent aller weiblichen Rinder jährlich güst. Das sind bei einem Rindviehbestande von — laut Viehzählung vom 1. Dezember 1926 — rund 20 000 Stück 1000 bis 2000 Tiere jährlich. Hinzu kommen noch die sehr erheblichen Verluste durch spezifische Infektion, insbesondere den feuchten Abortus.

Dafür, daß die Inzucht als Sterilitätsursache in Frage kommt, konnte im Kreise Emden kein Beweis erbracht werden. Es liegen auch heute noch keinerlei feste Anhaltspunkte vor, ob und inwieweit sich überhaupt die Inzucht beim Rinde auf die Fruchtbarkeit auswirkt. Mit der Möglichkeit aber, daß durch Verwandtschaftspaarung von Individuen, deren Erbgut für das Genitale und für die Geschlechtstätigkeit beeinflussenden anderen Organe nach der Seite des Minusvariante hinneigt, familiäre Störungen der Fruchtbarkeit zustandekommen können, muß theoretisch gerechnet werden. Durch maßvolle Inzucht, wie sie die ostfriesischen Züchter treiben, wird dies aber vermieden werden können.

Größer erscheint im Zuchtgebiete die Gefahr, daß Störungen der Fruchtbarkeit durch Überzüchtung herbeigeführt werden. Die einseitige Zucht auf Leistung, d. h. die fortgesetzte Paarung von Leistungstieren, sehen wir im Emdener Bezirke wie im gesamten ostfriesischen Hochzuchtgebiete sich immer wiederholen. Es handelt sich hierbei zwar nicht um absolute Sterilität, sondern mehr um eine gewisse Trägheit und ein Darniederliegen der Geschlechtstfunktionen dadurch, daß offenbar andere Organe infolge erbter Veranlagung vom Stoffwechsel begünstigt werden. Die im Zuchtgebiete erstrebten Leistungen sind Milch und Fleisch. Beide Leistungsrichtungen sollen nach

Möglichkeit bei ein und demselben Tier zu gleicher Zeit vorhanden sein und sich gegenseitig ergänzen. Solange die Milchleistung zurücktritt, soll der Fleischansatz im Vordergrund stehen. Daraus mag es zu erklären sein, daß manche ostfriesischen Färsen, solange sie eben nicht in Laktation sind, die Neigung zeigen, fett zu werden. Und gerade diese Tiere sind es, bei denen die erste Befruchtung oft große Schwierigkeiten bereitet. Im Kreise Emden sind derartige Rinder immer zu beobachten. Aus der Statistik der Landwirtschaftskammer sind sie nicht besonders zu erkennen. Wahrscheinlich betreffen aber die dort genannten 32 negativen Befunde, die bei sterilen Färsen erhoben wurden, zum größten Teile derartige Tiere.

Ähnliches gilt für die übertriebene Milchleistung. Es sind eine ganze Reihe besonders guter Milchleistungskühe bekannt geworden, die ohne nachweisbare organische Veränderungen an den Geschlechtsorganen, immer Schwierigkeiten bei der Befruchtung machten, ohne jedoch absolut steril zu sein. Die Statistik der Landwirtschaftskammer enthält 19 wegen Sterilität untersuchte Kühe mit negativem Befund an den Geschlechtsorganen. Die Milchleistung dieser Tiere ist leider nicht angegeben.

Daß rein konditionelle Einflüsse, wie die Fütterung und das Überstehen von Krankheiten auf die Fruchtbarkeit der Haustiere von einschneidendem Einfluß sein können, ist durch das Experiment an Laboratoriumstieren einwandfrei erwiesen. Richter, Zieger und Zschieche haben erstmalig die sogenannte Hungersterilität bei Rindern infolge Unterernährung in den Kriegs- und Nachkriegsjahren erwähnt. Derartige Fälle sind im Kreise Emden während der Beobachtungszeit nicht aufgetreten.

Größer ist hierzulande die Gefahr der Überfütterung, der zu reichlichen, vielleicht auch einseitigen Ernährung und der spontanen Futterfäulnis durch Kraftfuttermittel, die an sich keine lebensgefährlichen Giftstoffe, wohl aber vielleicht Bestandteile enthalten, die ihrerseits nach Speicherung oder Belastung des Stoffwechsels auf die Fruchtbarkeit einzuwirken vermögen. Unser tatsächliches Wissen über diese Dinge ist noch gering und unbestimmt.

Im Jahre 1924 wurde die obligatorische Milchkontrolle im Kreise Emden eingeführt. Seit dieser Zeit sind die Züchter

*) Berichterstattung an die Zentrale für Aufzuchtkrankheiten für das Jahr 1926/1927. Eingegangen am 8. August 1927.

dazu übergegangen, durch Fütterung besonders mit ausländischen Kraftfuttermitteln die guten Leistungsanlagen der ostfriesischen Kühe bis zum äußersten zu realisieren und die Milcherträge wenigstens während der Stallperiode möglichst zu steigern. Manche Besitzer setzen ihren Ehrgeiz darin, einzelne Kühe vorwiegend durch die Fütterung — z. B. auch durch Zufüttern auf der Weide — zu Spitzenleistungen anzutreiben und so richtige „Milchmaschinen“ daraus zu machen. Im Kreise Emden werden durch Verabreichung hochprozentigen Futters mit verhältnismäßig geringem Ballast bei Einzeltieren Milchleistungen bis zu 50 kg am Tage und darüber erreicht. Daß diese künstliche Überproduktion geeignet ist, die Leistungen der übrigen Organe zu beeinflussen, ist kaum zu bezweifeln und die Annahme, daß insbesondere die komplizierten Funktionen des Genitalapparates und auch dessen Widerstandskraft gegen Infektionen gestört werden, erscheint nicht gewagt. Diese Ansicht bestätigt auch Holfing für das Zuchtgebiet, indem er über das erste Berichtsjahr 1924/1925 schreibt: „Ferner fanden sich diese Entzündungen der Gebärmutter, insbesondere bei hochgezüchteten Tieren, die für Ausstellungszwecke oder, um bei der Milchkontrolle gute Resultate zu erzielen, übermäßig gefüttert worden waren.“

Die infolge Überzüchtung eintretende Unfruchtbarkeit ist gewissermaßen ihr eigener Feind. Dadurch, daß derartige Tiere keine oder nur wenige Nachkommen haben, unterbleibt die erhebliche Übertragung, denn die Nachkommenschaft fällt ganz fort oder ist gering. Es wirft sich überhaupt die Frage auf, die auch Keller anschnidet, ob an Tieren, von denen man annehmen muß, daß sie an einer erblichen Störung der Geschlechtsfunktionen und der Fruchtbarkeit leiden, Behandlungsversuche unternommen werden sollen. Derartige Kühe sollten von der Zucht ausgeschlossen werden, ebenso wie es mit denjenigen geschieht, welche zu geringe Milchleistungen haben. In Frage kommen Tiere, bei denen die Befruchtung jedes Mal erhebliche Schwierigkeiten bereitet, ohne daß ein organisches Leiden nachzuweisen ist oder die Fütterung und Haltung verantwortlich zu machen sind.

Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß konditionelle, vorübergehende Schädigungen der Fruchtbarkeit durch Fütterungsfehler oder interkurrierende Krankheiten vorliegen, so werden entsprechende diätetische Anordnungen zu treffen sein. Die Wirkung derartiger Maßnahmen läßt in der Regel Wochen und Monate auf sich warten. Es ist daher in solchen Fällen, bei denen es sich meist um Anaphrodisie handelt, z. B. bei den fett gewordenen nicht rindernden Färsen, angebracht, ein Aphrodisiacum zu verabreichen. Nach Untersuchungen, die von Grüter in der Schweiz und in der hiesigen Klinik durch Rulffes auch in unserem Zuchtgebiete bereits unternommen worden sind, scheint das in der Rinder- und Schweinefollikelflüssigkeit enthaltene Follikelhormon geeignet zu sein, die darniederliegenden Geschlechtsfunktionen wieder in Gang zu bringen. Die Wirkungen mit Yohimvetol, Vethormon und Oleum Terebinthinae sind nach unseren Erfahrungen nicht immer zufriedenstellend.

Unter den sporadischen Anomalien und Krankheiten des Genialtraktes spielt im Emdener Zuchtgebiete der alte und schlecht verheilte Dammriß bzw. die Kloakenbildung eine erhebliche Rolle. Merkwürdigerweise wird in den Veröffentlichungen über die Sterilität des Rindes dieser Verletzung nur wenig Beachtung geschenkt. Dabei gibt er in unserem Hochzuchtgebiete nicht selten Anlaß zu dauernder Sterilität. Alte, schlecht verheilte Dammrisse bekommt man in den Beständen des Kreises sehr oft zu sehen. Als Sterilität bedingende Ursache sind sie in der Berichtszeit fünfmal beobachtet worden. Die im Emdener Hochzuchtgebiete übliche Verwendung wüchsiger und starker Bullen und die intensive Fütterung haben häufig die

intrauterine Entwicklung zu großer Früchte und damit schwerer Geburten zur Folge.

Die Urovagina, die Richter erstmalig als Ursache der Sterilität beschrieb, wurde im Kreise Emden insgesamt siebenmal festgestellt. Die Anomalie spielt demnach eine ernstliche Rolle.

Die Behandlung der Sterilität beim Vorhandensein alter kompletter Dammrisse oder einer Urovagina ist vielfach erfolglos, namentlich dann, wenn aufsteigend bereits eine Endometritis entstanden ist. Scheidenpülungen vor dem Deckakt werden empfohlen. Mehr Erfolg verspricht bei gefundem Uterus die künstliche Nachbefruchtung unmittelbar nach dem Deckakt. Das in der Scheide befindliche Sperma wird sofort mit Hilfe des hohlstieligen Befruchtungsöffels oder nach Auffangen mit Hilfe eines Uteruskatheters in die Gebärmutter gebracht. Ferner kommt bei schlecht verheilten klaffenden Dammrissen Trockenfütterung in Frage, damit die Verunreinigung der Scheide auf ein Mindestmaß beschränkt wird. Die Operation solcher veralteter Dammrisse unter Epiduralnarkose kann bei wertvolleren Tieren mit Erfolg versucht werden. Wesentlich erscheint dabei nach Auffrischung und Naht der Dammriß-Lippen das gleichzeitige Anlegen eines hochsitzenden Scheidenverchlusses.

Erkrankungen der Zervix und der Gebärmutter bilden ebenso wie in anderen Gegenden auch im Kreise Emden die häufigste Ursache der Unfruchtbarkeit bei Kühen. Bei den im Jahre 1925 und 1926 untersuchten 491 Kühen wurde 340mal, d. h. in 69 Prozent der Fälle, Endometritis festgestellt.

Die Sekretprüfung wie überhaupt die Untersuchung der Portio läßt sich am besten und sichersten mit einem langen Scheidenpekulum ausführen. Empfehlenswert ist das Spekulum nach Polansky. Es lassen sich mit Hilfe dieses Instrumentes und einer Lichtquelle die unberührte Portio und das Orificum externum voll sichtbar machen. Die manuelle Untersuchung und auch das Hervorziehen der Zervix nach Albrechtien haben verschiedene Nachteile gegenüber der Spekulumuntersuchung. Bei den Manipulationen entstehen Rötungen und Sugillationen, die vorher gar nicht vorhanden waren. Wird die untersuchende Hand vor der Untersuchung eingeölt, so bilden sich aus dem an sich ganz normalen glasig-klaaren Zervikalsekret und dem Öl Emulsionen, die sehr oft irrtümlicherweise als eitriger Ausfluß angesehen werden. Die untersuchende Hand ist daher bei Sterilitätsuntersuchungen nur mit warmem, klarem Wasser anzufeuchten. Ferner ist zu beachten, daß es erschwerend ist, die Diagnose: Endometritis bei einer Kuh zu stellen, wenn diese gerade brünstig ist, denn der dabei selbst von kranken Tieren in großer Menge bei geöffneter Zervix abgeforderte Brünstschleim läßt einen eitrigen Katarrh nicht immer erkennen und verwischt selbst das Vorhandensein schwerer Prozesse. Das vorher etwa abgeforderte eittrige Sekret wird durch die reichliche Schleimproduktion hinweggeschwemmt. Auch läßt die rektale Untersuchung im brünstigen Zustande meistens im Stich, weil der Uterus während der Brunst stets erigiert ist und vergrößert und sich nicht von einem entzündlich verhärteten Uterus unterscheiden läßt. Im übrigen gibt die rektale Untersuchung, abgesehen von produktiven Veränderungen an der Gebärmutter wie Verhärtungen, Vergrößerungen und Asymmetrien der Hörner, uns selten ganz bestimmte Anhaltspunkte für die Diagnose Endometritis. Der Hauptwert muß auf den vaginalen Befund und die Sekretprüfung gelegt werden. Die oft diagnostizierte „Schlaffheit der Gebärmutterwand“ muß mit einigem Zweifel betrachtet werden. Vielfach wird im Augenblick einer kurzen Untersuchung der Uterus eben im physiologischen Zustande der Erschlaffung gefühlt. Die Erektion, die mitunter — auch an der normalen Gebärmutter — 3—5—10 Minuten auf sich warten läßt, wird nicht abgewartet.

Eine von vornherein kombinierte Behandlung mit dem Prinzip der Reinigung, Keimtötung und örtlichen Leistungssteigerung erscheint bei der Endometritis am aussichtsreichsten. Hierzu dienen sauber und nicht zu oft ausgeführte Gebärmutterspülungen mit nachfolgender Jodbehandlung in mindestens 8—14tägigen Zwischenräumen; in Abständen von 2—3 Tagen ausgeführte heiße (40—45 Grad), leicht desinfizierende und hyperämiefördernde Scheidenduschen, ferner Abdrücken des Corpus luteum menstruationis, wenn es älter als 10—12 Tage ist und die Uterusmassage. Zur örtlichen Hyperämieförderung und Leistungssteigerung können gleichzeitig Aphrodisiaca und die Yaten-Vakzine herangezogen werden.

Die Eierstocksleiden traten bei den Kühen zurück, gelbe Körper fanden sich in 13,6 Prozent, Zysten in 5,3 Prozent der Fälle. Bei den Färsen spielen die Eierstockserkrankungen die Hauptrolle, bei 54 Prozent behandelten Erstlingen wurden gelbe Körper, bei 10,2 Prozent Zysten abgedrückt. Es ist dabei nicht immer zu entscheiden gewesen, ob tatsächlich persistente gelbe Körper vorlagen, vielmehr sind auch solche corpora lutea abgedrückt worden, die ganz im Sinne des normalen ovariellen Zyklus entstanden sind. Beim Abdrücken eines corpus luteum im Stadium der Vaskularisation, während der ersten zehn Tage nach der Brunst, besteht Blutungsgefahr. Solche Verblutungsfälle sind im Zuchtgebiet vereinzelt vorgekommen. Die Nachkompression sollte nicht unterlassen werden, wenn sie auch nicht jeden Verblutungsfall verhindern kann, weil sich ihre Wirkung nicht mit den Augen verfolgen läßt. Tiere, bei denen ein gelber Körper abgedrückt ist, sollten 6—8 Stunden unter aufmerksamer Beobachtung gestellt werden. Bei Verblutungsgefahr ist die direkte Blutstillung nach Vornahme des Scheidenschnittes die einzige Rettung.

Unter den spezifischen Infektionen des Genitale spielt neben der Vaginitis granulosa infectiosa und der Tuberkulose der Abortus infectiosus Bang in unserem Zuchtgebiete bei weitem die Hauptrolle. Die Infektionsmöglichkeiten sind stets gegeben durch die bei den Aborten und Geburten massenhaft ausgestreuten Bazillennengen und sehr wahrscheinlich auch durch die aus den Sammelmolkereien täglich in die Gehöfte zurückkommende Magermilch.

Der Schwerpunkt der Bekämpfung muß nach den im Zuchtgebiete gemachten Erfahrungen auf die hygienischen Maßnahmen gelegt werden, die leider seitens der Züchter zu ihrem eigenen Schaden viel zu wenig Beachtung finden, oft aber auch infolge der unzulänglichen Stallverhältnisse vielfach nicht durchführbar sind. An zweiter Stelle stehen die Impfungen. Zu bedenken ist, daß durch die immer mehr in Gebrauch kommenden Massenimpfungen, insbesondere mit lebenden Kulturen, das Ergebnis der Blutuntersuchung an Wert verliert, denn die Impflinge reagieren stets eine längere Zeit nach der Impfung positiv. —

Über die Wirkung von Follikelflüssigkeit aus Schweine- und Rinderovarien und des fabrikmäßig von der Firma Degewop-Berlin hergestellten „Folliculin“ auf den Geschlechtsapparat des Rindes stellte Rulffes Untersuchungen teils in der Klinik, teils in der Praxis an.

Bei den 19 durchgeführten Versuchen mit 10 Kühen und 9 Färsen wurden insgesamt 39 Injektionen vorgenommen. Hatte die erste Injektion keinen oder nur unvollständigen Erfolg, so wurde in Abständen von 1—3mal 24 Stunden eine zweite eventuell eine dritte Einspritzung gegeben. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Versuchstiere wurde Follikelflüssigkeit aus Schweineovarien benutzt und zwar wurden Einzeldosen von 20—60 ccm subkutan verabreicht. — Rinderovarien lieferten eine viel geringere Ausbeute, deshalb konnte nur eine Kuh damit behandelt werden. Sie erhielt in drei aufeinanderfolgenden Dosen von 40 ccm insgesamt 120 ccm Rinderfollikelfaß subkutan. — Bei drei

Verfuchstieren wurde das Folliculin intravenös gegeben. Die einzelne Dosis des Folliculins betrug 13 bzw. 24 Mäuse-Einheiten = 3 bzw. 6 ccm. Die Injektionen wurden bis dreimal wiederholt.

Weder durch die subkutanen noch durch die intravenösen Injektionen wurde das Befinden der Tiere beeinflusst. Anaphylaktische Erscheinungen, Milchrückgang, verminderte Freßlust usw. konnten nicht beobachtet werden. An den Injektionsstellen traten bei den mit Trikreßolzusatz vorgenommenen Injektionen keine Reaktionen auf. Nur bei einer Kuh entstanden nach Injektionen mit reinem Follikelfaß am Halbe zwei Abszesse.

In jedem Falle sowohl nach den Injektionen von Follikelfaß aus Schweine- und Rinderovarien als auch nach Verabreichung von Folliculin in genügenden Mengen konnten Erscheinungen der normalen Brunst in abwechselnder Stärke beobachtet werden.

Die psychischen Symptome (Brüllen, Unruhe und Verlagen des Futters) sind nicht immer voll ausgeprägt, ebenso wenig wie dies bei der normalen Brunst des Rindes stets der Fall ist. Immerhin haben sich von 19 Versuchstieren, darunter zwölf nachweislich sterile Kühe und Färsen, 17 Tiere ein bis fünf Tage nach der letzten Injektion ohne besondere Schwierigkeiten decken lassen.

Die Erscheinungen an den äußeren Genitalien: Schwellung und Wärme der Vulva, Rötung und Schleimabsonderung der Scheidenschleimhaut sind auch in den Fällen vorhanden gewesen, in denen der Bulle abge schlagen wurde.

Die inneren Veränderungen an Geschlechtsorganen waren schwieriger nachzuweisen. Rötung und Öffnung der Portio vaginalis uteri, Öffnung des Orificium uteri externum wurden in vier Fällen einwandfrei durch die Spekulum-Untersuchung beobachtet. Veränderungen der Gebärmutter (dauernde Erektion, Reizbarkeit) zeigten sich bei drei Versuchstieren. In sieben Fällen konnte Rulffes die Heranbildung von Follikeln am Eierstock im Anschluß an die Behandlung durch die manuelle Untersuchung verfolgen.

Bei Anaphrodisie, wo erhebliche pathologische Veränderungen am Genitale nicht bestehen, sind nach Anwendung der Follikelpräparate gute Erfolge zu erwarten. Wenn auch durch die vorläufigen Untersuchungen nicht erwiesen ist, daß die im Anschluß an die künstlich ausgelöste Brunst vollzogenen Deckakte zur Befruchtung führen, so zeigen sie doch, daß die darniederliegende Geschlechtslust durch Verabreichung von Follikelfaß einen wirklichen Impuls erhält.

Über das fabrikmäßig hergestellte, z. Zt. noch recht teure Folliculin kann noch kein abschließendes Urteil gegeben werden, weil die zur Verfügung stehende Versuchsmenge zu gering war, um eine genügende Anzahl von Behandlungen durchzuführen. Da die Transplantation von Ovarien in der tierärztlichen Praxis wegen der Schwierigkeit der Beschaffung der Ovarienspender nur selten ausgeführt werden kann, so glauben wir mit Bestimmtheit annehmen zu können, daß der vorgezeichnete Weg für die Praxis größere Bedeutung gewinnen wird, zumal dann, wenn das Follikelhormon als gebrauchsfertiges Präparat preiswert in den Handel kommt.

In zahlreichen Fällen sind an der hiesigen Klinik der Scheidenschnitt und die Kastration an Kühen ausgeführt worden. Kühe, bei denen der Zervikalschleim bzw. das Scheidensekret nicht glasig-klar war, wurden wegen der Infektionsgefahr von der Operation auf vaginalen Wege ausgeschlossen. Unter Anwendung der Epiduralnarkose mit 10—20 ccm einer 1/2prozentigen Tuto-kainlösung zwischen 1. und 2. Schwanzwirbel in den Rückenmarkskanal verläuft die Operation fast schmerzlos. Nach gründlicher Reinigung und Einölen der äußeren Geschlechtsteile und ihrer Umgebung wird die Albrechtsensche Zange

an die Portio vag. uteri angefetzt, der Muttermund herangezogen und damit das Scheidengewölbe gespannt. Direkt über der gestreckten Portio erfolgt bei gleichzeitig durchgebogenem Kreuz unter allmählichem Druck — nicht ruckartig — der Durchstich nach der Bauchhöhle hin mit einem verdeckten Messer, einer Lanzette oder einem Skalpell und zwar so tief, daß das Bauchfell mit zertrennt wird. Die Wunde, die nicht größer als für einen Finger passierbar sein soll, wird nunmehr stumpf so erweitert, daß die ganze Hand in die Bauchhöhle eindringen kann. Der ausgekochte Efe-minator nach Reifinger wird nachgeschoben, ohne daß die Hand die Bauchhöhle verläßt. Beide Eierstöcke werden nacheinander, ohne daß die Hand die Scheide und das Instrument die Bauchhöhle verlassen, abgesetzt. Die Infektionsgefahr wächst mit jeder unnötigen Passage der Hand oder der Instrumente. Sie wächst auch, wenn Eierstock und Uterus in die nicht immer bakterienfreie Scheide hereingezogen werden. Wird die Operation sauber und schnell, ohne daß zu große Luftmengen in die Bauchhöhle einströmen, ausgeführt, so treten bemerkenswerte postoperative Erscheinungen nicht auf. Naht und Nachbehandlung der Wunden sind nicht erforderlich. Empfehlenswert ist das Hochstellen bzw. Hochlegen der kastrierten Tiere in der Nachhand während eines Tages nach der Operation.

Daß das Bauchfell des Rindes durchaus nicht etwa ganz unempfindlich ist, beweisen zwei Peritonitistfälle, die im Anschluß an die Kastration bei Kühen auftraten. Die Kühe waren von Studierenden bzw. Kurfusteilnehmern kastriert und unmittelbar danach von 10—15 weiteren Studierenden bzw. Kurfusteilnehmern vaginal untersucht worden. Die Folge war in beiden Fällen eine chronisch verlaufende lokale abszedierende Peritonitis, die zwar nicht zum Tode führte,

aber doch die Futteraufnahme den Nährzustand und die Leistungsfähigkeit der Tiere derart beeinflusste, daß sie unwirtschaftlich wurden.

Die Vaginatomie ist deshalb absolut sauber und nur bei wirklich vorliegender Indikation mit Einverständnis des Besitzers auszuführen. Solche Indikationen sind: Unklare Befunde bei der rektalen Untersuchung (Tuberkulose, dickwandig zystös entarteter Eierstock, Eierstocksblutungen, Verlängerung der Laktationsperiode usw.) Die Untersuchung der inneren Genitalien der Bauchhöhle nach dem Scheidenschnitt schafft in allen Zweifelsfällen Klarheit. Uterus, Eierstock, Eileiter usw. können nach Einführung des Laparoskopes auch sichtbar gemacht werden.

Die künstliche Befruchtung konnte in der Klinik an sechs Kühen und Färsen ausgeführt werden. Vom Schlachthof wurden lebenswarme Hoden ausgewachsener Bullen beschafft. Das Sperma ließ sich nach Zerschneiden und Ausdrücken der cauda epididymitis leicht gewinnen und in Ringerischer oder physiol. Kochsalzlösung auffangen. Einige Tropfen Preßsaft aus dem Hodenparenchym und der Samenblase wurden zugefügt. Ein besonderes Instrumentarium zur künstlichen Befruchtung ist nicht notwendig. Die Portio vaginalis uteri wird mit der Albrechtischen Zange fixiert, das dünne Innenrohr des Rücklaufkatheters nach Söderlund durch den Zervikalkanal in den Uterus eingeführt, die mit dem Hauptnerkonus versehene Rekordspitze aufgesetzt und 20—40 ccm der Spermaflüssigkeit injiziert.

Bis jetzt sind fünf Tiere nachweislich tragend geworden. Bei rein vaginaler Sterilität mit normalem Zyklus wäre die künstliche Befruchtung bzw. die Nachbefruchtung praktisch ins Auge zu fassen.

Die Labfähigkeit der Milch im Dienste der tierärztl. Milchhygiene.

Von Professor Dr. Kurt Schern, Montevideo.

Das Interesse für die Milchhygiene ist in Deutschland augenblicklich besonders groß und die Labfähigkeit der Milch fängt jetzt auch an, Gegenstand von Erörterungen in weiteren tierärztlichen Kreisen zu werden. Seit 1909 (1.) ist mein Bemühen darauf gerichtet gewesen, die Tierärzte mit der Bedeutung der Labfähigkeit der Milch, besonders der pathologischen Milch vertraut zu machen. Teilweise ist mir das gelungen. In meinen früheren Publikationen 1, 2, 3, 4, 5 habe ich mitgeteilt, daß die Wirkung des Labfermentes von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Besonders ist von mir geprüft worden, ob normales, frisches Rinderferum, zu Milch hinzugesetzt, das Lab in seiner Wirkung paralyisiert, wie es nach den vorhandenen Literaturangaben wahrscheinlich war. Zu diesen Versuchen ist f. Zt. eine nach der Vorschrift von Morgenroth hergestellte Labstandardlösung benutzt worden. Dabei hat sich als Endresultat ergeben, daß normales Rinderferum, zu normaler, frischer Milch hinzugesetzt, die Labwirkung hemmt, bzw. die Labfähigkeit so

weit einschränkt, daß die Milch nicht gerinnt.

Nach diesen Feststellungen hat es für mich nahe gelegen, Milch, die von euterkranken Kühen stammt, bezüglich ihrer Labfähigkeit zu untersuchen. Denn meine Überlegung ging dahin, daß bei der Entzündung eines Euters Flüssigkeit aus den Gefäßen in das betroffene Gewebe übertrete und daß sich diese Flüssigkeit m. o. w. schnell in vielen Fällen der Milch beimischen müßte. Infolgedessen würde diese Flüssigkeit in der Milch nachweisbar sein und durch eine verringerte Labfähigkeit der Milch zum Ausdruck kommen. Tatsächlich hat sich mein Gedankengang als richtig erwiesen: Milch, welche z. B. in ihrem Aussehen schalem Berliner Weißbier ähnelt, gerinnt nicht nach Zusatz von Lab. Hat dagegen das pathologische Eutersekret noch eine milchähnliche Beschaffenheit, so ist die labhemmende Wirkung desselben nicht so stark wie im ersten Fall.

Im Verfolg meiner weiteren Arbeiten sind die labhemmenden Substanzen quantitativ ausgewertet worden. Zur Gerinnung einer pathologischen Milch ist das Mehrfache der Labfermentmenge erforderlich, welche gesunde Milch zum Gerinnen bringt. Dieses „Mehr“ von zugefetztem Lab gibt den Maßstab ab für die Berechnung der Menge labhemmender Substanzen, welche in einem mastitischen Eutersekret vorhanden sind (1.).

Bei allen diesen Untersuchungen ist besonders die Tatsache von Bedeutung gewesen, daß es häufiger gelungen ist, verminderte Labfähigkeit der Milch festzustellen, welche bei der Trommsdorffprobe usw. besondere Werte nicht ergeben hat. In diesen Fällen ist Verdacht auf eine beginnende Mastitis mit zur Erklärung des Phänomens herangezogen worden.

1) Schern: Über die Hemmung der Labwirkung durch Milch. Biochemische Zeitschrift, 20. Band, 3., 4. und 5. Heft, Seite 231.

2) Derf.: Über die quantitative Bestimmung des Antilabgehaltes der Milch durch die Labhemmprobe nebst Bemerkungen über einige andere hygienische Milchuntersuchungsmethoden. B. T. W. 1910, Nr. 5. 3) Derf.: Zur Technik der Milchlabbemmprobe. B. T. W. 1911, Nr. 38.

4) Derf.: Über die historische Entwicklung und prinzipielle Bedeutung biologischer Milchuntersuchungen in klinischer, milchhygienischer und forensischer Beziehung. B. T. W. 1911, Nr. 42. 5) Derf.: Labtabletten für die Labhemmprobe zur Diagnose der pathologischen Milch und Mastitiden. B. T. W. 1913, Nr. 49.

6) Kraus und Uhlenhuth: Handbuch der mikrobiologischen Technik. Band II und III.

Andernteils hat auch festgestellt werden können, daß bezüglich der Gerinnung der aus gefunden Eutern stammenden Milchen physiologische Schwankungen vorkommen, die man in das Bereich der „Schwellenwerte“ legt.

Das Gesamtergebnis aller dieser Arbeiten hat sich für die Praxis zur Labhemmprobe der Milch verdichtet, welche bei den täglichen Untersuchungen besonders der Kinder- und Vorzugsmilch in allen modernen Laboratorien ausgedehnte Anwendung zur Diagnose der Eutererkrankungen, der Kolostralmilch usw., findet. Diese Probe gibt aber auch weiter in hygienischer Beziehung mit Rücksicht auf die Verdaulichkeit Aufschluß, was gerade für Säuglings- und Vorzugsmilch eine von mir schon f. Zt. (2) gewürdigte Bedeutung hat. Über die Milch, deren Labfähigkeit besonders herabgesetzt ist, habe ich gesagt, daß sie „vielleicht Gefundheitschädigungen infolge des durch sie gestörten Verdauungsprozesses bedingen kann“.

Weiter habe ich ausgeführt: „Beruht der vermehrte Antilabgehalt einer Milch auf pathologischer oder auf physiologischer Grundlage, so wird die Milch im Magen zwecks Verdauung einer erhöhten Labmenge bedürfen und es wird an die das Lab sezernierenden Drüsen die Forderung einer einseitigen Höchstleistung gestellt werden. Daß eine derartige, vermehrte Produktion von Lab, durch die Labdrüsen des Organismus zu Verdauungsstörungen Veranlassung geben und somit auch die Prädisposition für andere Magen- und Darmleiden abgeben kann, ist ohne weiteres ersichtlich.“

Der vermehrte, spezifische Antilabgehalt der Milch geht gewöhnlich mit erheblicher Verminderung des Säuregrades einher, das kann zur Folge haben, daß ein Teil der im Magen vorhandenen Salzsäure abgefätigt wird. Dann muß, ähnlich wie bei den das Lab liefernden Drüsen, eine vermehrte Produktion von Salzsäure stattfinden, und somit müssen die Drüsen, welche die Salzsäure liefern, zu einer einseitigen Höchstleistung gezwungen werden, was für die Dauer schädlich sein kann. Oder aber, die Salzsäure liefernden Drüsen produzieren fernerhin nicht die erwünschte Menge Salzsäure. Dann gerinnt die im Magen aufgenommene Milch nicht ausreichend, ferner unterbleibt die sonst durch die Salzsäure stattfindende Desinfektion des Magens, sodann kann das Pepsin, welches nur in Gegenwart der Salzsäure wirkt, nicht in Aktion treten und die Eiweißverdauung ist behindert. Daß durch alle diese Umstände abnorme Gärungsprozesse und eine erschwerte Resorption im Darm stattfinden können, ist ohne Zweifel. Auch auf diese Weise werden durch Milch der erwähnten Art Verdauungsstörungen und Prädispositionen für Leiden des Verdauungsapparates geschaffen. Das wird besonders für den zweiten Organismus der Säuglinge, ferner für Rekonvaleszenten oder für solche Personen zutreffen, die eine abnorme Empfindlichkeit ihres Verdauungsapparates aufweisen. Völlig gesunde Menschen werden den einmaligen Genuß einer Milch der bezeichneten Qualität besser vertragen. Für Säuglingsmilch und Vorzugsmilch ist demnach zu verlangen, daß sie nicht „bedingt tauglich“ und „nicht minderwertig“ ist. Diese beiden Milcharten müssen in jeder Beziehung einwandfrei genußtauglich und vollwertig sein.

Soweit meine damaligen Ausführungen, aus denen übrigens auch hervorgeht, daß ich schon 1910 die Bezeichnungen der hygienischen Beschaffenheit einer Milch entsprechend den Normen des Fleischuntersuchungsgesetzes vorgenommen wissen wollte. Es ist das eine Bezeichnung, die sich jetzt erfreulicherweise auch Matschke¹⁾ bei seinen Vorschlägen zum Entwurf des neuen Lebensmittelgesetzes zu eigen gemacht hat und von der zu wünschen ist, daß sie im neuen Gesetz verankert wird.

Wie aus den obigen Darlegungen ersichtlich ist, wird schon seit meinen Untersuchungen (l. c.) in tierärztlichen Kreisen der Labfähigkeit der Milch eine ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wie auch aus der Arbeit von Palla-

mann²⁾ hervorgeht, welche dieser unter Leitung von Herrn Prof. Reinhardt angefertigt hat. Auch Abderhalden³⁾ legt der Labfähigkeit der Milch für ihre Verdauung große biologische Bedeutung bei und er sagt, „dadurch, daß das Kaseinogen in den festen Zustand übergeführt wird, ist eine umfassendere Verdauung durch das Pepsin möglich“. Auch ist die von mir gefundene Probe in den einschlägigen Handbüchern usw. beschrieben (Heine, Kraus und Uhlenhuth, Ernst, Schern).

Die große Bedeutung, welche die Labfähigkeit einer Milch für deren hygienische Beurteilung besitzt, hat es wünschenswert erscheinen lassen, die Milchlabhemmprobe, die uns Aufschluß gibt über die Labfähigkeit einer Milch, in eine Form zu bringen, in welcher sie jeder Tierarzt ohne weiteres ausführen kann. Pipettieren, Herstellung von Lablösungen usw. sind für die tägliche tierärztliche Praxis der Milchuntersuchungen nicht immer sehr willkommen. Ich habe deshalb schon 1913 Labtabletten anfertigen lassen, deren Herstellung seit einiger Zeit Herr Chemiker Janke, Berlin W 30, Rosenheimerstr. 3 übernommen hat. Ich habe bis jetzt 30 000 Labtabletten von der genannten Firma bezogen und feststellen können, daß die Tabletten innerhalb von 1½ Jahren ihren Labwert unverändert gehalten haben. Die verschiedenen Mengen Lab enthaltenden Tabletten sind so hergestellt, daß nach ihrer Auflösung in je 5 ccm Milch Labverdünnungen im Verhältnis 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 3000, 1 : 4000, 1 : 5000, 1 : 6000 entstehen. Sie werden in die Milch gegeben, in welcher sie gewöhnlich in 2—3 Minuten aufgelöst sind. Danach schüttelt man kräftig und die Tabletten lösen sich dadurch völlig in der Milch auf.

Für die gewöhnlichen Untersuchungen werden nur Tabletten Nr. 1 bis Nr. 6 abgegeben. Denn nach den bisherigen Erfahrungen gerinnen normale Milchen schon bei der Zufügung des Labs im Verhältnis 1 : 1000 nicht immer mit Sicherheit. Man nimmt deshalb hier die Grenze der Labfähigkeit normaler Milch für die tägliche Untersuchungspraxis an, weil die Probe für die Praxis nicht mit zu großen Feinheiten ausgestattet sein darf. Gerinnt die Milch mit Labtablette Nr. 6 nicht, oder nur „halbdick“, so hat das keine besondere Bedeutung („Schwellenwert“). Die Ausschläge der Probe sollen deutlich und markant sein. Milch, die z. B. nicht bis zur Grenze von 1/1000 Gramm Lab gerinnt, ist in ihrer Labfähigkeit schon erheblich herabgesetzt. Will man sich schnell über die Labfähigkeit reiner Milch orientieren, so setzt man z. B. nur zwei Röhrchen mit Labtabletten 1 : 1000 und 1 : 3000 an.

Für die Ausführung der Probe füllt man von der zu untersuchenden Milch je 5 ccm in sechs saubere Röhrchen und numeriert diese entsprechend (Nr. 1—6 z. B. usw.). Die Milch darf nicht saurer als normal sein (Lactoacidometer Schern). In Röhrchen Nr. 1 gibt man eine Labtablette Nr. 1, in Röhrchen Nr. 2 gibt man Labtablette Nr. 2 usw. bis Nr. 6. Angebrochene oder gespaltene Labtabletten verwendet man nicht. Die Röhrchen werden nach Auflösung der Labtabletten 20 Minuten in den Eischrank und hierin nach in ein auf 37 bis 38 oder bis 39 Grad C gehaltenes Wasserbad gestellt. Bei normaler Milch erfolgt hier die Gerinnung „blitzartig“ und sie ist in wenigen Minuten beendet. Jedoch darf man die Milch in den Röhrchen während des Ablaufes der Reaktion im Wasserbad nicht durch öfteres Herausnehmen usw. bewegen, sonst wird der Prozeß gestört und verzögert. Ist die Milch nach einstündigem Aufenthalt im Wasserbad nicht geronnen, so ist die Untersuchung beendet und es wird berechnet, um wieviel die Labfähigkeit der betreffenden Milch verringert ist, bezw.

²⁾ Palla mann, Die Milchlabhemmprobe. Freudenstadt, Druck von Oskar Kaupert, 1912.

³⁾ Abderhalden, Lehrbuch der physiol. Chemie. I. Teil. 3. Auflage, 1914. Seite 477.

¹⁾ Matschke, Der Entwurf des neuen Lebensmittelgesetzes, D. T. W. Nr. 10. 1927.

wieviel Lab sie zu ihrer Gerinnung mehr benötigt, als die zur Kontrolle mit in den Versuch gesetzten normalen Milchen. Die Berechnung gestaltet sich folgendermaßen, wenn z. B. die Milch nur in Nr. 1 geronnen ist ($\frac{1}{1000}$ Gramm

Lab), dann lautet der Ansatz $x = \frac{6000}{1000}$, $x = 6$. Demnach beträgt die Quantität der labhemmenden Substanzen in der fraglichen Milch = 6. Bei normaler Milch ist sie = 0.

Der Streit um die Heilmittel gegen die Leberegelseuche.

Von Dr. Opel, Direktor des städt. Schlacht- und Viehhofes, München.

Die Feststellungen von Privatdozent Dr. Kögell¹⁾, daß das bisher so angefehene Distol seit mindestens Sommer 1927 nicht mehr das alte Filixpräparat ist, sondern nunmehr in der Hauptsache aus dem Hexachloraethan, einem wirklichen Bestandteil des seit Jahresfrist eingeführten Neoserapis besteht, hat den Streit für oder gegen die einzelnen Leberegelmittel in ein neues, akutes Stadium gerückt. Wie zu erwarten war, haben die angegriffenen Heilmittelfabriken zu dem Vorwurf „der Unterschlebung des einem andern bekannten Mittel entlehnten wirklichen Bestandteiles unter einem alten Namen und unter Ausnutzung der auf das alte Präparat bezüglichen Literatur“ in einzelnen Erwidern Stellung genommen. Aus diesen Erklärungen werden nun verschiedene ebenso interessante wie allgemein wichtige Einzelheiten bekannt. So erfährt man aus der Erwidern der ungarischen Distolfabrik in Ujpest bei Budapest erst jetzt, daß das Altdistol nicht weniger als siebenmal in seiner Zusammensetzung geändert worden ist, ohne daß dies in der Öffentlichkeit bekannt gegeben worden wäre. Dies Geständnis muß schon deshalb überraschen, weil noch im März 1927²⁾ eine dem Distol nahestehende, auf dem Gebiet der Leberegelforschung führende Persönlichkeit die Herstellerin des Serapis SB 444 deshalb scharf angegriffen hat, weil eine das Prinzip übrigens gar nicht berührende Veränderung an demselben „ohne besondere Bekanntgabe in der Fachpresse“ vorgenommen worden war. Vielleicht erklären aber diese fortgesetzten Änderungen jene gehäuft aufgetretenen Zufälle bei Anwendung von Distol, wie z. B. den Fall in Niederbayern, wo in einem Bezirk in 20 Stallungen Vergiftungsfälle auftraten, die zum Teil mit Notschlachtungen, Tod oder Erblindungen endigten³⁾. Merkwürdig ist die Feststellung, daß diese Distolfabrik schon im Winter 1926/1927 das Distol mit dem im Neoserapis enthaltenen wirklichen Bestandteil Hexachloraethan in außerdeutschen Ländern an 200 000 Rindern mit glänzendem Erfolg angewandt hat, obwohl Marek's Arbeit über seine Versuche an 53 Rindern erst im August 1927 erschien⁴⁾. Wozu man nach so glänzenden praktischen Erfolgen größten Stils noch so begrenzte Versuche benötigt, ist nicht so recht verständlich.

Die weiteren Angaben der Alt-Distolfabrik, daß zur Erreichung der optimalen Wirkung eine Vereinigung der Filicin-Komponente mit Hexachloraethan erforderlich sei⁵⁾, stehen im Widerspruch mit folgender Feststellung: Eine in Deutschland angekaufte Packung Distol mit dem Kontrollstreifen Prof. Nöller's bestand laut chemischer Analyse aus 0,9 eines Drogenextraktpulvers, vermutlich Filicin, + 10,1 Hexachloraethan; eine in Wien angekaufte Packung aus 9,2 Hexachloraethan + 4,0 Benzol + Spuren eines gelben Harzes (deklariert als 3,0 Inhaltsstoffe von rad. fil. mar. dispergiert in einem lipoidlöslichen Medium); eine weitere Probe aus Wien nach Kögell⁶⁾ nur aus Hexachloraethan (trotz Deklaration: Inhaltsstoffe von rad. fil. mar. disperg. in einem lipoidl. Med.). Auf keine dieser Kombinationen können die bis jetzt vorliegenden Veröffentlichungen über Distol bezogen werden. Denn die Marek'schen Versuche sind laut Veröffentlichung in der

D. T. W. 1927, S. 513, mit einem ganz anderen Produkt gemacht worden, nämlich mit einem Distol dahin modifiziert, daß die bisherige lipoidlösliche Komponente (4,0 Benzol) durch eine feste lipoidlösliche Komponente (4,0 Hexachloraethan?) ersetzt worden ist. Also muß die Marek'sche Kapsel bestanden haben aus 3,0 Filicin + 4,0 Hexachl. Das zur Zeit in Deutschland und Österreich im Handel befindliche Distol zeigt aber eine hiervon völlig abweichende Zusammensetzung. Der kritische Wissenschaftler findet auch hier unlösbare Rätsel.

Im Laufe der Auseinandersetzungen über den Wert oder Unwert der verschiedenen Leberegelheilmittel werden auch wieder eine Reihe von unrichtigen Behauptungen aufgestellt, bzw. längst widerlegte neu aufgewärmt. So rollt Kögell, der den objektiven wissenschaftlichen Wert seiner Arbeit durch allzu auffallende einseitige Hervorhebung des Filinols selbst stark beeinträchtigt hat, die Prioritätsfrage hinsichtlich der Einführung des Tetrachlorkohlenstoffes wieder auf. Im eigenen und wissenschaftlichen Interesse möchte ich daher wie schon Thienel⁷⁾ nochmals feststellen, daß die Priorität der Einführung des zu großer Bedeutung gelangten und in seiner Anwendungsweise noch nicht erschöpften Tetrachlorkohlenstoffes in die Therapie der L.E.S. der Forschungsgemeinschaft Serapis zukommt. Gewiß hat Hall mit Anderen umfassende Arbeiten über Tetrachlorkohlenstoff als Mittel gegen alle Arten von Eingeweidewürmern, von den kleinsten Tieren bis hinauf zum Menschen schon 1921 veröffentlicht; als Mittel gegen Leberegel wurde daselbe aber nicht angewandt. Hall schrieb mir darüber am 5. Juli 1927 persönlich u. a. wörtlich: I have had no opportunity to work along this line... Auch Montgommery hat seine Versuche mit Tetrachl. an Schafen in England erst Ende 1925 begonnen, und zwar nach dem die Chem. Fabrik Aubing das Serapis SB 444 in England auf den Markt gebracht hatte.

Ähnlich steht es mit der Behauptung, daß die Anwendung des Hexachloraethans, das als Distolkorrektiv plötzlich zu so starker Bedeutung gelangt ist, im Neoserapis eine Nachentdeckung sei⁸⁾. Während Nöller im Juli 1926 die peinlichste Reinigung des Tetrachlorkohlenstoffes von allen giftigen Beimengungen wie Schwefelkohlenstoff, sonstige schwefelhaltige organische Veränderungen und etwaiges Hexachloraethan fordert⁹⁾, Hexachl. also für giftig hält, während Hall und Cram dem gegen andere Würmer, nur nicht gegen Leberegel versuchten Hexachl. keine Wirkung zuerkennen¹⁰⁾, wurde das erstmalig von uns als Ergebnis der im Jahre 1924 begonnenen Arbeiten für hochwirksam erkannte Leberegelgift Hexachloraethan in Versuchen Mitte 1926 ausprobiert und von der Chemischen Fabrik Aubing als das neue Mittel Neoserapis für Rinder noch Ende 1926 in Verkehr gebracht. Der erste Bericht hierüber in der Literatur erschien von Thienel¹¹⁾, worauf in höchst dankenswerter Weise Nöller die Analyse des Neoserapis bekannt gab¹²⁾. Es steht also nach der Literatur auch bezüglich des Hexachloraethans fest, daß daselbe in dem Neoserapis erstmalig durch die Forschungsgemeinschaft Serapis in die Therapie der L.E.S. eingeführt worden ist. Hätte sich die Serapisgesellschaft durch die paar von einer

¹⁾ M. T. W. 1927, S. 601; 617. ²⁾ M. T. W. 1927, S. 149. ³⁾ M. T. W. 1927, S. 645. ⁴⁾ D. T. W. 1927, S. 513. ⁵⁾ M. T. W. 1927, S. 652. ⁶⁾ M. T. W. 1927, S. 617.

⁷⁾ M. T. W. 1927, S. 191. ⁸⁾ T. R. 1927. ⁹⁾ M. T. W. 1926, S. 277. ¹⁰⁾ Arch. f. Schiffs- und Tropen-Hyg. 1926, 30, S. 231. ¹¹⁾ M. T. W. 1927, S. 617. ¹²⁾ M. T. W. 1927, S. 149.

übelwollenden Kritik immer wieder hervorgezerrten Unfälle bei den ersten Versuchen in der Praxis, die in gar keinem Verhältnis zu den großen Problemen, die es zu lösen galt, einschüchtern lassen, wäre die deutsche Wissenschaft und Wirtschaft heute um zwei wertvolle Mittel im Kampfe gegen eine der verlustreichsten Schädlingskrankheiten unserer Haustiere ärmer. So gingen wir unverdrossen weiter unseren Weg, die hochchlorierten Kohlenwasserstoffe auf ihre wurmtötenden Eigenschaften zu prüfen, mit dem Ziel, die als zuverlässig und gefährlich in der Wirkung erkannten Farnwurzelpreparate und andere Pflanzendrogen durch chemisch darstellbare Körper zu ersetzen, mit dem Nebenzweck, die deutsche Wirtschaft auf diesem Gebiete vom Ausland unabhängig zu machen.

Und das Ende vom Lied? Am Schlusse seiner Arbeit¹³⁾ stellt Kögel fest, daß heute außer den beiden chemischen Präparaten Serapis SB 444 und Neoserapis nur mehr ein reines Filicinpräparat, das Filinol und eines aus Extr. Filicis (? der Verf.), das Hepatol existiert, daß aber die anderen Leberegelmittel von Bedeutung einschließlich des Distol nur Kombinationen von Hexachl. oder Tetrachlorkohlenstoff mit Rohfilicin, und von Tetrachl. mit Extractum Filicis darstellen.

Fürwahr! Eine glänzendere Anerkennung hätte dem Neoserapis nicht zuteil werden können als die Tatsache, daß Marek sein eigenes alteingeführtes Filicinpräparat verbesserte — sit venia verbo! — „modifizierte“ durch das wirksame Prinzip des Neoserapis.

Wichtiger als alle Prioritäts- und Konkurrenzstreitigkeiten über Leberegelheilmittel sind aber die therapeutischen Werte derselben und deren Auswirkung auf unsere landwirtsch. Interessien. Um die hier einzig zuständige Praxis selbst sprechen zu lassen, erscheint gerade im rechten Augenblick die vom bayer. Staatsministerium des Innern zur Verfügung gestellte Zusammenstellung der bayer. Veterinärpolizeilichen Anstalt in Schleißheim über die Erfahrungen mit einzelnen Mitteln gegen die Leberegelheute in Bayern¹⁴⁾. Wie schon ähnliche diesbezügliche Arbeiten aus Schleißheim bringt auch diese Klarheit in das viel umstrittene Problem, indem die Ergebnisse der mit Leberegelmitteln während der letzten bayer. Staatsaktion vom 7. Februar bis 31. März 1927 gemachten Erfahrungen nach amtstierärztlichen Berichten kurz geschildert werden.

Aus der Zusammenfassung ist hervorzuheben, daß neben einigen nur in geringem Umfang verwendeten Präparaten als vorzügliche Mittel angesprochen werden: Distol, Filinol, Neoserapis und Serapis SB 444. Der Zahl nach wurden verwendet:

Distol von 80 Tierärzten bei 9024 Rindern, 1087 Schafen, 285 Ziegen; Filinol von 51 Tierärzten bei 3557 Rindern, 232 Schafen, 42 Ziegen; Neoserapis von 94 Tierärzten bei 8311 Rindern, 1932 Schafen u. 2 Schafherden, 12 Ziegen; Serapis SB 444 von 54 Tierärzten bei 141 Rindern, 11 397 Schafen sowie 7 und einige Schafherden, 395 Ziegen.

Bezüglich der Zahl behandelter Tiere wird angegeben, daß nur in etwa der Hälfte der Berichte Zahlen angegeben wurden, dieselben also ungefähr zu verdoppeln sind. Daß diese Zahlen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können, beweist u. a. die Tatsache, daß in der gleichen Zeit ein prakt. Tierarzt in Niederbayern (Münich), allein 6122 Rinder mit vollem Erfolg mit Neoserapis behandelt, infolge eines Mißverständnisses aber hierüber amtlich nicht berichtet hat¹⁵⁾. In dem Bericht wird noch bemerkt, daß im allgemeinen fäktliche vier Mittel ohne schwere Begleiterscheinungen vertragen werden, doch können solche gelegentlich in verschiedener Form bei allen vier Arzneien vorkommen. Neoserapis hat zwar häufig Raufchzustände im Gefolge, sie sind aber in der Regel ohne nachteilige Folgen. Die wenigen Fälle von Lähmungen und Verwerfen beschränken sich auf die ersten drei, Erblindungen auf die ersten zwei der genannten Mittel. Allen vier Präparaten wird eine durchwegs sehr gute egeltötende Wirkung zugesprochen. Die Behandlung hat fast stets einen raschen, nachhaltenden Erfolg. Ausnahmen kommen bei allen vier Mitteln vor. Den beiden Serapis-Präparaten wird noch der Vorzug größerer Billigkeit zugesprochen.

In den letzten Jahren und im Verlauf des ganzen Streites ist keine Arbeit erschienen, welche als Ergebnis einer umfangreichen amtlichen Enquete und als Äußerung einer nach keiner Richtung hin interessierten staatlichen Anstalt eine größere Bedeutung für die praktische Bekämpfung der Leberegelheute besitzt.

Aus den Feststellungen der veterinärpolizeilichen Anstalt mit den Berichten von nahezu 300 Praxis ausübenden Tierärzten, denen auch die von mehreren österreichischen Länderregierungen eingeholten amtlichen Gutachten entsprechen, scheint doch das eine mit Sicherheit hervorzugehen, daß die Farnwurzelpreparate heute schon überholt sind und der von uns mit dem Neoserapis beschrittene Weg, rein chemisch darstellbare Körper an Stelle der Drogen-Präparate zu setzen, der richtige gewesen ist.

So glauben wir auch chemisch-wissenschaftlich den Weg zum Fortschritt gezeigt zu haben und hoffen zuversichtlich, daß unsere fortlaufenden Arbeiten noch weitere positive Ergebnisse in therapeutischer Hinsicht zeitigen werden.

¹³⁾ M. T. W. 1926, S. 771. ¹⁴⁾ M. T. W. 1927, S. 645.

¹⁵⁾ B. T. W. 1927, S. 554.

Über den auf der Insel Hokkaido („Jezo“) im Norden Japans ausgebrochenen infektiösen Stutenabort.

Von K. Kafai, C. Kohanawa, K. Ogura und S. Ito.

Seit dem Jahre 1921 herrschte der infektiöse Stutenabort in den verschiedenen Pferdezüchtgebieten der Insel Hokkaido im nördlichen Teile Japans. Es war bei dieser Seuche ganz charakteristisch, daß die trächtigen Stuten ganz plötzlich ohne Prodromalsymptome abortierten, abnormal die Nachgeburt (Fruchtkack) ausgeschieden wurde und die Wiederherstellung der abortierenden Stuten sich verzögerte. Im allgemeinen trat das Verwerfen mit zunehmender Trächtigkeitsdauer öfter auf. Bei der Sektion der abortierten Fohlen zeigten sich nur hämorrhagische und septikämische Veränderungen. Aus vier abortierten Fohlen, die von uns sezziert wurden, konnten wir ein Stäbchenbakterium, den *Bazillus Coli* und *Streptokokken* isolieren; das Stäbchenbakterium aus drei Fällen, das *Bakterium Coli* und *Streptokokken* aus einem Falle. Nach unseren Untersuchungen

über die morphologischen und biologischen Eigenschaften, Färbungs- und Kulturbefunde des erstgenannten Bakteriums handelt es sich um das *Bact. paratyphi abortus equi* = „*Salmonella abortivo-equina*“, das in Europa und in Amerika von verschiedenen Forschern gefunden worden ist, wenn wir auch den experimentellen Abort mit den betreffenden Bazillen nicht versuchten. Obwohl die Bakterien Stäbchen mit zwei abgerundeten Enden waren, hatten sie doch die Neigung, in künstlichen Nährböden polymorph zu wachsen und zwar von Kokkenform bis Langfadenform. Die Bakterien waren mit Anilinfarbstoffen leicht färbbar und gramnegativ. Manchmal wurden einige chromatinähnliche feinere Körnchen in dem Bakterienkörper gefunden, wenn man die Bakterien nicht so tief färbte. Sie hatten die Tendenz, je nach den verschiedenen Stämmen eine ver-

schiedene Anzahl von Geißeln zu bilden, z. B. hatte ein Stamm „Wakafada“ durchschnittlich eine oder zwei Geißeln gegenüber vier oder fünf bei den anderen zwei Stämmen. Abgesehen davon, daß die *Salmonella abortivo-equina* im Vergleich zu anderen *Salmonellabazillen* eine geringere Anzahl von Geißeln besitzt, hatten wir zwei eigenartige Stämme, „Wakafada“ und „Wakagawa“, aus welchen vollständig geißelfreie Varietäten entstanden. Die Geißelform dieser Bakterien war gewöhnlich grobwellenförmig, aber nicht selten gab es auch Bakterien, bei der die Geißeln feine und regelmäßige wellenförmige Windungen zeigten. In der Kultur bildeten die Bakterien zuweilen Riesengeißeln. Sie zeigten eine lebhafteste Vorwärtsbewegung unter Körperdrehung; aber man konnte auch häufig solche Bakterien finden, die ganz glatt ohne Körperbewegung sich fortbewegen konnten.

Sämtliche Kulturbefunde der von uns isolierten Bakterien stimmen mit den von anderen Autoren veröffentlichten über *Salmonella abortivo-equina* vollständig überein. Die Bakterien gedeihen gut in Nährböden mit Zusatz von Galle, Harn oder Kot. Auf Blutagar wuchsen sie vorzüglich und zeigten dabei eine hochgradige Hämolyse. Gegen die Hämolyse der Bakterien schienen die Kaninchenerythrozyten viel empfindlicher zu sein als die Pferdeerythrozyten.

Die Kolonien der Bakterien auf Agar zeigten sich feucht faltenlos (glatt), als wir sie frisch isolierten, aber sie veränderten sich durch die künstliche Kultur allmählich und wurden trocken faltig. Da diese Eigenschaft der Faltenbildung nicht ganz konstant ist, sah man manchmal Schwankungen darin. Diese Fähigkeit zur Faltenbildung konnte künstlich in hohem Grad beeinflusst werden; z. B. konnte ein faltiger Stamm durch Blutagarkultur faltenlos (glatt) werden und man konnte auch aus einem faltenlosen Stamme sehr leicht einen faltigen Stamm bekommen, indem man ihn nach langdauernder Bouillonkultur Häutchen bilden ließ und ihn dann auf festen Nährböden weiter züchtete. Wenn man die getrennte Kultivierung mit dem einmal faltig gewordenen Stamme weiter fortsetzte, so bekam man zwei verschiedene Sorten Bakterien: einen Stamm, der faltenlose feuchte Kolonien zeigte und einen anderen Stamm mit faltigen trockenen Kolonien. Man konnte die zwei oben beschriebenen Bakterienstämme mit relativ fixierten konstanten Eigenschaften bekommen, indem man den oben erwähnten Prozeß wiederholte und immer die faltigen aus den faltigen Stämmen, und die faltenlosen auch aus den faltenlosen fortlaufend auswählte. Wir benannten den erstgenannten Stamm „den faltigen Stamm“, und den letztgenannten „den faltenlosen Stamm“.

Wir untersuchten das Kohlehydratspaltungsvermögen der Bakterien in bezug auf 29 Kohlehydratarten. Sämtliche drei von uns isolierten Bakterienstämme erwiesen sich positiv bei acht Arten (Mannit, Arabinose, Xylose, Dextrose, Laevulose, Mannose und Maltose), aber negativ bei 19 Arten (Erythrit, Adnit, Dulzit, Inosit, Rhamnose, Trehalose, Melibiose, Saccharose, Laktose, Raffinose, lösliche Stärke, Dextrin, Inulin, Glykogen, Salizin, Phloridin, Saponin, Amygdalin und Digitalin). Bei Glycerin und Sorbit waren sie nicht konstant, aber wenn man sie darin sehr langdauernd kultivierte, dann zeigten sie sich gegen die beiden auch positiv.

Die Bakterien hatten weder die Fähigkeit der Indol-, noch die der Schwefelwasserstoffbildung. Sie waren sehr widerstandsfähig; die Agarkulturen blieben 1½ Jahre lang bei Zimmertemperatur lebensfähig, Bouillonkulturen fast 1 Jahr; in Bouillon-Glycerin wurde die Lebensdauer der Bakterien kürzer; je größer der Zusatz von Glycerin zu der Bouillon war, desto mehr verkürzte sich die Lebensdauer. Der Trockenheit widerstanden sie 1–2 Monate. Die Bakterien werden bei Erhitzung auf 60 Grad C binnen fünf Minuten abgetötet, ebenso binnen 30 Minuten bei einer fol-

chen von 56 Grad C; aber sie lebten noch nach einer einstündigen Erhitzung auf 50 Grad C.

Die Bakterien werden binnen 5 Minuten in 1,5 Prozent Karbolsäure, 0,01 Prozent Caporit- und 0,002 Prozent Sublimatlösung; binnen 30 Minuten in 1,0 Prozent Karbolsäure-, binnen 15 Minuten in 0,005 Prozent Caporit- und in 0,001 Prozent Sublimatlösung abgetötet, nicht dagegen nach einstündigem Aufenthalt in 0,05 Prozent Karbolsäure-, 0,0005 Prozent Caporit- und 0,0001 Prozent Sublimatlösung.

Da das Blutserum der abortierenden Stuten ziemlich deutliche Agglutination und Komplementbindung gegen die Bazillen zeigte, konnten wir die beiden Reaktionen als Hilfsmittel für die Diagnose der Seuche verwenden. Es fanden sich keine Unterschiede zwischen den Bakterien, die von uns in Hokkaido gefunden wurden, und den Bakterien, die von anderen verschiedenen Autoren in anderen Gegenden Japans nachgewiesen worden waren, in bezug auf die Agglutination und Komplementbindung; also scheint es, daß alle *Salmonella*-Stämme, welche in verschiedenen Gegenden Japans gefunden wurden, serologisch als dieselben Bakterien anzusehen sind.

Alle Stämme von *Salmonella abortivo-equina* in Japan hatten fast dasselbe Verhalten bezüglich der Kohlehydratspaltungen, mit Ausnahme einiger Kohlehydratarten, wie Dulzit, Rhamnose und Trehalose. Auf Grund dieser letzteren Eigentümlichkeit konnten wir die *Salmonella*-Bakterien Japans in folgende vier Varietäten einteilen:

1. Die Dulzit, Rhamnose und Trehalose nicht spaltende,
2. die die oben genannten drei Kohlehydratarten spaltende,
3. die Dulzit und Trehalose spaltende, aber Rhamnose nicht spaltende und
4. die Dulzit und Rhamnose spaltende, aber Trehalose nicht spaltende Varietät.

Zusammenfassend stellen wir fest: Die drei Stämme der Bakterien, die von uns in Hokkaido bei abortierten Fohlen gefunden wurden, stimmen in bezug auf die morphologischen und serologischen Eigenschaften unter sich überein; in bezug auf die serologischen Eigenschaften und das Kohlehydratspaltungsvermögen mit den Bakterien, die von anderen Forschern in anderen Gegenden Japans nachgewiesen wurden, ferner mit den Stämmen von *Salmonella abortivo-equina*, welche in Europa und in Amerika gefunden worden waren.

Innere Medizin und Chirurgie.

Gil m o w s k i, S.: Beiträge zur geschichtlichen Entwicklung des Pansentokars (In: Dissert. Leipzig 1925.)

Im Altertum war die akute Tympanie infolge der natürlichen Lebensweise des Rindes eine seltene Erscheinung, die praktisch nicht in Betracht kam. Über eine regelrechte Ausführung des Pansenstiches ist Verfasser nichts bekannt geworden. Die älteste Urkunde der Veterinärmedizin in Ägypten, der Veterinärpapyrus von Kahun, bringt die Schilderung einer Krankheit, die man mit einiger Wahrscheinlichkeit als Trommelsucht ansprechen kann. Die dafür empfohlenen Heilmethoden sind sehr mannigfaltig. Uns interessiert hier lediglich die Anwendung eines Glüh eisens, das man bei dieser Erkrankung nach O e f e l e und P a g e l in den Pansen gestoßen haben soll. Da aber diese Angabe im Veterinärpapyrus von Kahun selbst nicht enthalten, sondern ergänzt worden ist, und die Analogien, nach denen O e f e l e zu dieser Ansicht gelangt, nicht genügend Beweiskraft besitzen, hält Verfasser die Ausführung des Pansenstiches bei den alten Ägyptern für unwahrscheinlich. In der chinesischen Medizin spielte die Chirurgie eine ganz geringe Rolle, lediglich die Akupunktur, das Einstechen von Nadeln an gewissen Körperteilen, war ein be-

liebtet Allheilmittel. Obwohl diese Operation dem Pansenstiche nahekommt, ist von einer Behandlung der Tympanie überhaupt nirgends die Rede. In der Bibel ist nichts enthalten. Das älteste Werk der Juden der nachbiblischen Zeit — der Talmud — bietet keinen Anhaltspunkt für das Vorhandensein der Tympanie, noch weniger für das Vorhandensein des Pansenstichs. Im Gegenteil, die religiösen Vorschriften der jüdischen Fleischbeschau waren dergestalt, daß die Anwendung des Pansenstiches ganz ausgeschlossen ist. Die alten Inder besaßen ein Instrumentarium von bewunderswerter Mannigfaltigkeit. Auch ein dreischneidiger Trokar war erwähnt. Er diente zur Behandlung der Bauchwassersucht. Aber über seine Verwendung zum Pansenstich ist nichts berichtet. In ähnlicher Weise war den Römern der Trokar bekannt, ohne daß sich über dessen Verwendung zum Pansenstich irgend etwas feststellen läßt. Im Mittelalter lag die Tierzucht darnieder, und die Rinder waren kümmerlich genährt. Die Behandlung der Tympanie verlor dadurch an Bedeutung. Die traurige Lage der Technik und Wissenschaft machten eine rationelle Behandlung der Tympanie und die Konstruktion geeigneter Instrumente so gut wie unmöglich. In der Neuzeit entwickelte sich die intensive Tierzucht und damit die rationelle Bekämpfung der Trommelsucht durch den Pansenstich zuerst in England. Zunächst verwandte man ein Messer, später einen Trokar, wie er in der Humanmedizin zum Bauchstich üblich war, nur in veränderter Größe. Die Franzosen haben diesem Zweige unserer Wissenschaft große Aufmerksamkeit gewidmet und sich durch Konstruktion vieler Instrumente verdient gemacht, doch konnte Verfasser die Entwicklung des Trokars in Frankreich nur wenig klarlegen, da Anfragen unbeantwortet blieben. In Deutschland wird Hauk, ein Grobschmied aus Handschuchsheim bei Heidelberg, als Erfinder des Trokars angesprochen. Er konstruierte 1771 jedoch nur eine Hülse, die am unteren Ende eine Spitze zum Einstechen und darüber einige Löcher zum Entweichen der Gase aufwies. Ernst Riem konstruierte im Jahre 1775 einen vollständigen Trokar mit Stilet und Hülse, der ein rundes Stilet und eine dreischneidige Spitze besaß. Die Kanüle trug jederseits sechs Löcher. Der runde Trokar machte sicherlich Schwierigkeiten beim Einstechen, und das führte zur Entstehung von flachen Trokaren einerseits, andererseits zu Versuchen, den runden Trokar zu verbessern. Der erste flache Trokar ist, soweit sich feststellen ließ, von Viborg 1795 hergestellt worden. Als erste Verbesserung des runden Trokars ist der von Schwab zu betrachten, dessen Stilet um eine halbe Linie nach vorn ansteigt, damit ein besseres Anlegen der Kanüle bewirkt wird. Als bedeutender Fortschritt der Neuzeit muß die Einführung ungefensterter und gefederter Trokare bezeichnet werden. Der Nachteil gefensterter Trokare besteht darin, daß nach dem Einstechen durch die Löcher der Kanüle Futterteile und Gase in die freie Bauchhöhle gelangen und Bauchfellentzündung hervorrufen können. Doch hat diese einfache Erkenntnis erst verhältnismäßig spät Eingang gefunden. Man gebrauchte bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts meistens gefensterter Trokare. Durch den Einfluß von Brosche (1828), Hayne (1836) und Spinola (1850) u. a., die sich in richtiger Beurteilung der Sachlage für die Einführung des ungefensterten Trokars einsetzten, gelangte aber dieser allmählich zur Geltung. Der gefederte Trokar ist eine Erfindung von Falke im Jahre 1831. Am unteren Ende der Kanüle findet sich jederseits ein ungefähr 3 cm langer Längsspalt, der in einer rundlichen Öffnung endigt. Der Übergang des Stilets zur Spitze ist verjüngt, der Grund der Spitze selbst ist verdickt. Die Federung soll ein dichteres Anlegen der Kanüle an das Einstichende des Stilets ermöglichen und das Herausziehen des Stilets begünstigen, indem das Ende der Kanüle diesem Zuge nachgibt. Die Entwicklung des gefederten Trokars wurde durch die technische Unvollkom-

menheit lange gehemmt, weil eine besondere Bearbeitung des Metalles zur Herstellung einer elastischen und genügend festen Federung notwendig ist. Der gefederte Trokar bürgert sich erst um das Ende des 19. Jahrhunderts allgemein ein. Um diese Zeit verschwindet auch der flache Trokar, der seit Viborgs Erfindung in gleichem Maße mit dem runden im Gebrauche war. Als erster empfiehlt Vogel im Jahre 1885, vom flachen Trokar Abstand zu nehmen. In neuester Zeit bemüht man sich um die Herstellung von Trokaren, die man als „fixierbare“ bezeichnen darf, jedoch ist eine weitere Ausbreitung derselben ihrer Umständlichkeit und Kostspieligkeit wegen bisher ausgeblieben. Die Länge des Trokars hat im Laufe der Zeit einige Wandlungen erfahren. Die heutigen besitzen eine Länge von 15–31 cm. Von besonderen Trokarkonstruktionen, die zur Zeit gebraucht werden, sind zu nennen: 1. Der Trokar von Nüesch; derselbe stellt ein Stilet mit einer Längsrinne dar, die die fehlende Kanüle ersetzen soll. 2. Der Trokar von Schmitt, Wolfratshausen, unterscheidet sich von ersterem bloß dadurch, daß zu dem Stilet eine besondere runde Kanüle hinzukommt. 3. Der Trokar von Brücher, dieser stellt eine Kombination eines runden Stilets mit flacher Spitze vor, die sonst nie üblich, sondern dreikantig ist. Weniger gebräuchlich sind die sogenannten zusammensetzbaren Trokare; dieselben bestehen aus 3–4 Trokaren in einer Hülse, die in einen Griff passen. Der Schöpfer dieses Systems ist der Franzose Mathieu. A.—

Gatterdam, P.: **Tierexperimentelle Studien an Tauben über die bakterizide Wirkung des Yatrens.** (In.-Dissert. Leipzig 1925.)

Nach einleitender Darstellung des Problems der Desinfektionswirkung im allgemeinen, wird die Wirkung der neuzeitlichen Desinfektionsmittel, der sogenannten Tiefen-antiseptica, besprochen, darunter das Yatren, eine Jodoxylinolinkarbonsäure, herausgegriffen, in seiner Wirkung auf den Rotlaufbazillus vornehmlich geprüft und zwar in der höchstmöglichen Konzentration der 5prozentigen Lösung. In Reagenzglasversuchen stellt sich heraus, daß die abtötende Wirkung auf den Rotlaufbazillus sehr schnell eintritt, er wird so beeinflusst, daß es schon am nächsten Tage nicht mehr möglich ist, aus einer Kultur, auf die eine 5prozentige Yatrenlösung in verhältnismäßig geringer Menge eingewirkt hat, noch ein Angehen der Stäbchen auf künstlichen Nährböden zu erzielen. Der Tierversuch zeigt einwandfrei, daß die Rotlaufstäbchen noch nicht abgestorben sind, denn dasselbe Material in einer Menge von 0,3 cm an Tauben verimpft, tötete diese noch, trotzdem die Einwirkungsdauer des Yatrens in den geringeren Konzentrationen sich mittlerweile auf vier Tage belief. Stärkere Yatrenkonzentrationen erwiesen sich auch im Taubenversuch als wirksam zur schnellen Abtötung der Rotlaufbazillen. Dieses Versuchsergebnis stellt von selbst vor die Notwendigkeit, den Tierversuch zur Beurteilung der Wirkung des Yatrens auf den Rotlaufbazillus ausschließlich heranzuziehen. Dabei wurde zuerst die Dosis tolerata und die Dosis letalis ermittelt und dabei ein ganz verschiedenes Verhalten des Yatrens bei gleicher Dosis gegenüber Tauben beobachtet, wenn es sich um verschiedenaltige Tiere handelt. Das Gewicht ist nicht so sehr ausschlaggebend. Die Versuchsergebnisse wurden bessere, als halbjährige Tauben verwandt wurden. Es stellte sich dann heraus, daß selbst große Mengen Yatrens nicht imstande waren, dem Vordringen des Rotlaufbazillus Einhalt zu gebieten, Mengen, die bestimmt ausgereicht hätten, im Reagenzglasversuch den Rotlaufbazillus zu töten. Die Tauben starben in allen Fällen, gleichgültig, ob das Yatren zugleich mit der Kulturdosis oder, um die schwellenreizende Komponente mitwirken zu lassen, vor der Kultureinspritzung in zeitlichen Abständen verimpft wurde. Demgemäß waren auch von vornherein Zweifel an der Auffassung berechtigt, ob das Behringsche Yatren-Serum, wie angenommen

wurde, in Rotlauffällen in so erheblichem Maße eine Doppelwirkung entfalten würde, wie von der herstellenden Firma angenommen wird. Es wurden absichtlich andere Sera von zwei verschiedenen Firmen ohne Zusatz im Vergleich geprüft, um wenigstens dadurch eher zu einem Urteil über die Bewertung des Yatrenserums zu gelangen. Dabei zeigte sich, daß die blanden 100fachen Rotlaufsera in drei Versuchsreihen bessere Wirkungen zu entfalten vermochten, als verschiedene Operationsnummern der Yatrensera.

A.—

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Vogt, E.: **Über Beziehungen zwischen Insulin und Ovarium und ihre therapeutische Verwertung bei der Behandlung von Uterusblutungen.** (Aus der Universitäts-Frauenklinik zu Tübingen.) (Zentralbl. für Gynaekologie 1927, S. 719.)

Verf. gelangt auf Grund seiner Beobachtungen zu folgenden Ergebnissen:

1. Das Insulin hat ganz verschiedene Wirkungen. Bei Diabetischen beeinflusst es den Kohlehydratstoffwechsel. Das ist zweifellos seine Hauptwirkung. Bei Nichtdiabetischen kann es am Gesamtstoffwechsel angreifen, das ist die mästende Wirkung des Insulins, und schließlich wirkt es auch auf das endokrine System.

2. Von der Wirkung des Insulins auf das endokrine System kennen wir bis jetzt die Beziehungen zu der Schilddrüse durch die Beeinflussung der Basedow'schen Krankheit, ferner die hemmende Wirkung des Insulins auf das Wachstum der Krebse mit Besserung der Krebskachexie, dadurch, daß das Insulin gleichzeitig die Funktion von verschiedenen endokrinen Drüsen reguliert, und schließlich die Wirkung auf die Ovarialtätigkeit.

3. Das Insulin beeinflusst die innere Sekretion des Ovariums während der Menstruation und damit indirekt die Fähigkeit des ganzen endokrinen Systems und die Erregbarkeit der vegetativen Nerven, welche wieder vom Kalkgehalt des Blutes abhängt. Das Insulin vermindert schließlich die menstruelle Hyperglykämie und setzt die Stärke und Dauer der Menstruationsblutung herab. Auch die Insulinwirkung auf das Ovarium zeigt die innigen Beziehungen zwischen den Hormonen, dem vegetativen Nervensystem und dem Ionengehalt des Blutes.

4. Es gelingt durch verhältnismäßig kleine Insulindosen pathologisch gesteigerte Menstruationsblutungen günstig zu beeinflussen. Die Insulintherapie eignet sich hauptsächlich für die ovariellen Blutungen. Wir verstehen darunter die verschiedenen Formen der Metropathia haemorrhagica mit Einschluß der juvenilen und der klimakterischen Blutungen, und ferner die mit einer Ovarialinsuffizienz einhergehenden Blutungen bei allen möglichen entzündlichen Prozessen.

Carl.

Tiedemann, D.: **Beiträge zur Frage der Sterilitätsursachen bei den Stuten mit besonderer Berücksichtigung der klinischen und therapeutischen Auswertung.** (In.-Dissert. Berlin, ohne Jahrgangabe.)

Zur Untersuchung und Behandlung der inneren Geschlechtsorgane steriler Stuten ist eine Sicherung der Diagnose „nicht trächtig“ unbedingt erforderlich. Dieses ist durch Untersuchung per rektum möglich und ungefährlich. Zur vereinfachten und gründlichen Untersuchung steriler Stuten per vaginam ist die Anwendung eines Spekulum und künstliche Beleuchtung dringend anzuraten, wenn nicht gar erforderlich. Untersuchung erfolgt am zweckmäßigsten in nicht rossigem Zustand. Ursachen der Sterilität sind: 1. Vaginalveränderungen: angeborene Stenose, Strikturen, Tumoren. 2. Cervixveränderungen: Verlagerungen, Verengerungen, Wucherungen (Hyperplasie) der Plicae palmatae, Tumoren, spastische Zustände. 3. Uterusveränderungen: Verlagerungen, Tumoren, leichtere Endometritiden, Metritiden mit anschließender Salpingitis. 4. Ovarverände-

rungen: Zysten in gewissen Fällen, Sklerose. — Scheidenanomalien können meist manuell, nötigenfalls operativ beseitigt werden. Größere Tumoren lassen sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht immer entfernen. Einfache Scheidenverschleimung mit saurer Reaktion ist durch 1prozentige Kochsalzlösung ausreichend zu beheben. Hyperplasie der Plicae palmatae, strichförmige Rötung dieser oder ramiforme Rötung der Scheidenschleimhaut weisen meist auf leichtere oder schwerere Endometritiden hin. Größere Hyperplasien der Plicae palmatae oder Zysten am Orificium externum werden operativ entfernt (Reste mit Jodtinktur betupfen). Beseitigung von Cervixverlagerungen und -verengerungen sind mit wenigen Ausnahmen manuell zu beseitigen. Verwachsungen derberer Art, angeborene Mißbildungen und Tumoren der Cervix sind prognostisch ungünstig und meist nicht zu beseitigen. Bei Verdacht auf leichtere Endometritis Probespülung mit physiologischer Kochsalzlösung vorläufig angezeigt (peinlichste Anti- und Asepsis unbedingt erforderlich). Bei Endometritiden (bei Stuten meist ohne erhebliche Sekretion) bevorzugt Verf. Vorspülung mit abgekochtem lauwarmem Wasser und nachfolgendem Einlauf von 50,0 Lugol auf 1 Liter Wasser, das nach einigen Minuten ausgehebert wird. In schwereren Fällen sind stärkere Desinfizientien und Adstringentien angebracht, wie Neurogen 2 Prozent, Alumen 1 Prozent, ebenfalls nach Vorspülungen und Einlagen von einigen Iolkapseln in den Uterus (Abheilung eines Falles von Pyometra und Eintritt von Konzeption). Schwere Metritiden mit organischen Veränderungen sind im allgemeinen von der Behandlung auszuschließen (Vermeidung von Mißerfolgen). Metritiden sind meistens mit anatomischen Veränderungen in den Ovarien verbunden, seien es Zystenbildung und Sklerosen. Genaue und wiederholte Untersuchung der Ovarien, vorsichtige aber nachhaltige Massage, um Graaf'sche Follikel zur schnelleren Reife und festgestellte Zysten möglichst zur Resorption zu bringen (Zysten können ohne schwere Blutungen nicht gesprengt werden). Bei multipler Zystenbildung (schwerere Metritis anzunehmen) Unterlassung der Massage der Ovarien, Hauptaugenmerk auf Uterusbehandlung, Prognose zweifelhaft bis ungünstig. Eine einzelne Blase ist nur durch periodische Untersuchungen und evtl. nach ihrem Sitz differentialdiagnostisch zu bestimmen. Vereinzelt Blasen größer als Walnuß sind nach Obigem leichter als Zysten anzusehen. Darin liegende Eierstockstätigkeit ist vielleicht durch Ol. Terb. oder Jodimbin subkutan oder per os, neben der Massage anzuregen. Zysten scheinen dem Verf., sofern sie nicht durch ihre Größe Druckatrophie des Ovarparenchyms erzeugen, nicht die Ursache der Sterilität zu sein. Deckunlust der Hengste kann durch Jodimbin-Vet. 15,0 subkutan günstig beeinflusst werden. Im Interesse der Sache und zwecks Hebung des Vertrauens der Züchter in die Behandlung der Unfruchtbarkeit halten es auch Schöttler und Oppermann für richtiger, prognostisch zweifelhafte Fälle von einer Behandlung auszuschließen, als die Zahl der Mißerfolge durch sie zu erhöhen. Ein Mißerfolg schadet mehr als 100 Erfolge wieder gut machen können.

A.—

Dolder, E.: **Heilversuche bei der Anaphrodisie des Rindes durch Injektion von Ovarialextrakten.** (Schweiz Arch. für Tierheilkde. 1926, S. 595—630.)

Die zur Verwendung gelangten Ovarialextrakte (nach Krupski aus Kuhovarien mit reifen Follikeln und frischen gelben Körpern, Schweinsovarien hergestellt; Titration: 1 cm³ Extrakt = 1 g Ovarium) enthalten Stoffe, welche beim Rind die Ovarialfunktion erhöhen. Dabei sind die wirksamen Inkrete nicht ortsspezifisch. In den meisten Fällen bleibt das behandelte Ovar aktiv und bleibt es, auch wenn inzwischen Konzeption und Geburt eingetreten ist. Ausnahmen können gelegentlich vorkommen. Die Wirkung ist intensiver nach intravenöser oder intramuskulärer als nach subkutaner Injektion. Bei stiller Brunst genügt eine

einzigste Injektion, um eine völlig normale Brunst zu erzeugen. Je stärker die Rückbildungsvorgänge in den Genitalien sind, um so zahlreicher sind die zur Erreichung der Brunst notwendigen Injektionen. Dabei ist an frische Extrakte gedacht. Es gelang nur in drei Fällen durch einmalige Injektion von 50—70 cm³ nach 5 bis 11 Tagen Brunst auszulösen, wobei der Zeitpunkt der Geburt nur 9 bis 12 Wochen zurücklag. Müssen mehrere Injektionen vorgenommen werden, so wählt man 5 bis 15 Tage Zwischenraum. Es scheint, daß die Vorgänge an den Ovarien bis zu einem gewissen Stadium absolut parallel gehen mit der kreisenden Menge des wiederholt injizierten Injekts; man muß also in Fällen weiterer Rückbildung die Behandlung fortsetzen, sonst bilden sich die Ovarien wieder zurück. Bei zystöser Degeneration (klinische Diagnose!) wird durch eine einmalige Injektion die Zystenbildung sehr stark befördert. Man kann daher den Extrakt als Diagnostikum bei latenter bzw. klinisch noch nicht feststellbarer zystöser Degeneration anwenden. Man kann dann die par force entwickelten Zysten behandeln und dadurch die Sterilitätsdauer abkürzen. Corpus luteum persistens hemmt oder hindert die Extraktwirkung. Von 21 behandelten Fällen kamen 19 zur Brunstbildung, wobei drei durch Stimulation der Zystenbildung vorbehandelt waren. Von den 19 positiv ausgefallenen Versuchen trat bei 16 Konzeption auf, wovon eines abortierte, eines abgetan werden mußte (Haubenabszeß, Pyämie, trächtiger Uterus!). Die übrigen 14 brachten normale Kälber zur Welt, wurden wieder trächtig. Zwei zeigten in der Folgezeit Störungen im Sexualzyklus (C. l. perist.; Verödung des Follikelapparates). — Diese Behandlungsmethode bringt Fälle von Anaphrodisie zur Heilung, die den gewöhnlichen trotzen, ist bequemer als die Implantation, immerhin betrifft sie nicht alle Fälle der Sterilität, die von den Keimorganen ausgehen. Sie dürfte aber zur Zeit die beste Methode darstellen. H. Graf.

Kroon, H. M. und van der Plank, G. M.: Untersuchung betreffend Sonnenblumenkuchen, seine Zusammensetzung, seine Verdaulichkeit und seinen Einfluß auf die Milchproduktion. (Aus dem Institut für Tierzucht der Reichsuniversität zu Utrecht. — Direktor: Prof. Dr. H. M. Kroon.) (Tijdschrift voor Diergeneeskunde Deel 53, 1926, S. 8.)

Der Sonnenblumenkuchen wird als Nebenprodukt bei der Herstellung von Öl aus dem Samen der Sonnenblume (*Helianthus annuus*) gewonnen und hauptsächlich an Milch- und Mastvieh verfüttert. Früher wurden die Samen häufig aus Rußland eingeführt, jetzt aber auch aus Südamerika. Sie werden meistens geschält, bevor sie gepreßt werden, doch kommen auch Kuchen von schlecht geschälten und von ungeschälten Samen in den Handel.

Der Sonnenblumenkuchen ist ein graubrauner, sehr derber Kuchen, der nicht leicht verdirbt.

Die Verfasser untersuchten die Zusammensetzung der Kuchen und suchten durch Tierversuche ihre Verdaulichkeit und ihren Einfluß auf die Milchproduktion zu ermitteln.

Das Roheiweiß bestimmten sie nach der modifizierten Methode Kjeldahl, den Gehalt an Rohfaser durch Extraktion mit Tetrachlorkohlenstoff, den Gehalt an Asche durch Verbrennen des Trockenstoffes und durch Wiegen der übrigbleibenden Mineralbestandteile. Ihre Untersuchungen ergaben nun, daß der Sonnenblumenkuchen 88,2 Prozent Trockenstoff, 21 Prozent Roheiweiß, 9,9 Prozent Rohfett, 23,9 Prozent N-freie Extraktivstoffe, 29 Prozent Rohfaser und 4,4 Prozent Asche enthielt.

Um die Verdaulichkeit der Bestandteile zu bestimmen, wurden Fütterungsversuche mit 2 Milchkühen in voller Laktation angestellt. Als Füllfutter wurde dabei Heu verwendet. Zunächst wurde die Zusammensetzung und die Verdaulichkeit des Heues und dann die Verdaulichkeit des Sonnenblumenkuchens bestimmt. Der Dünger der beiden Tiere wurde, nachdem acht Tage lang die zu untersuchende Futtermischung verabreicht worden war, aufgefangen und unter-

sucht. Dabei wurde dafür gesorgt, daß kein Urin in den Dünger gelangen konnte. Zum Auffangen des Düngers diente ein Sack aus Ballonzeug, der mittels eines eisernen Ringes und eines Streifens Ballonzeug zwischen den Sitzbeinen befestigt war. Der Sack berührte, auch wenn die Kuh stand, den Boden. War er mit Dünger gefüllt, so wurde er abgeknöpft und durch einen anderen ersetzt.

Der Dünger wurde zunächst auf dem Wasserbade und darauf im Trockenofen erhitzt und auf diese Weise getrocknet.

Von dem Dünger jeder Kuh wurde täglich eine Probe untersucht. Die beiden Kühe erhielten täglich 8 kg Heu und 3 kg Sonnenblumenkuchen. Dieser wurde gebrochen und eingeweicht. Waren acht Tage lang Heu und Kuchen gefüttert worden, so wurde zehn Tage lang der Mist gesammelt, das Eiweiß, das Fett und die Rohfaser, die sich in ihm befanden, bestimmt und der Verdauungskoeffizient wurde berechnet. Von 100 kg Kuchen wurden 18 kg Eiweiß, 7,9 kg Fett und 9 kg Rohfaser verdaut, der Verdauungskoeffizient betrug also 86,80 und 31mal für N-freie Extraktivstoffe 70 bei beiden Kühen.

Zur Kontrolle der Milchproduktion wurden drei Kühe von mittlerer Milchproduktion in der Zeit vom 19. April bis 29. Mai gefüttert. Dieser Zeitraum wurde in drei Abschnitten von je zehn Tagen geteilt. Zwischen den einzelnen Perioden blieb ein Zeitraum von fünf Tagen. In der ersten Periode wurden die drei Kühe mit 8 kg Heu, 2 kg Leinkuchen und 1 kg Maiskuchen gefüttert. In dem Abschnitt zwischen der ersten und zweiten Periode wurden der Lein- und der Maiskuchen durch 3 kg Sonnenblumenkuchen ersetzt. In der zweiten Periode wurden 8 kg Heu und 3 kg Sonnenblumenkuchen gefüttert, und die Milchproduktion wurde kontrolliert. In den nächsten fünf Tagen wurden die 3 kg Sonnenblumenkuchen wieder durch 2 kg Leinkuchen und 1 kg Maiskuchen ersetzt und diese Fütterung zusammen mit 8 kg Heu in der dritten Periode beibehalten. In den drei Perioden wurde die Milch auf Menge und Fettgehalt untersucht. Dabei ergab sich, daß bei allen drei Kühen nach der Fütterung der Sonnenblumenkuchen die Menge Milch sich verringerte, der Fettgehalt aber stieg und daß die Menge Butterfett etwas geringer ist als bei der Fütterung von Lein- und von Maiskuchen. Ob dies aber so bleibt, wenn der Sonnenblumenkuchen andauernd verabreicht wird, müssen weitere Untersuchungen ergeben. Baß.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Walbum, L. E.: Metallsalztherapie. Sterilisation des infizierten Organismus (Tetanus und Tuberkulose).

(Aus dem Staatlichen Seruminstitut zu Kopenhagen.) (Zeitschr. f. Tuberkulose 1927, Bd. 48, S. 193.)

Verschiedene Autoren, z. B. Reymann haben nachgewiesen, daß Tetanussporen, die durch Erhitzung auf 80 Grad ihres Toxins beraubt wurden, ohne Schaden für die Versuchstiere in größeren Mengen in die Gewebe injiziert werden können. Erst wenn man geringe Mengen lebender Staphylokokken demselben Tiere einverleibt, kommt es klinisch zu Tetanus, offenbar deshalb, weil die neue Infektion in irgend einer Weise die bisherigen Hindernisse der Sporenkeimung beseitigt. Die Versuche des Verf. wurden im Hinblick auf dieses Untersuchungsergebnis in der Weise vorgenommen, daß mit Mangan behandelten Mäusen zwei Stunden lang auf 85 Grad erhitzte Tetanussporen injiziert wurden, worauf nach 32 Tagen die Injektion der Staphylokokken erfolgte. Bei den weiteren Versuchen mit Tuberkulose wurde ein hochvirulenter Stamm boviner Herkunft benutzt. Die Ergebnisse der Arbeit finden sich in folgender Zusammenfassung: 1. Durch Behandlung von mit virulenten Tetanussporen infizierten Mäusen mit kleinen optimal wirkenden Mangandosolen gelingt es, die Tiere völlig

zu sterilisieren. Die Tetanussporen verlieren ihre Virulenz einige Zeit bevor sie zugrunde gehen. 2. Durch Behandlung von Kaninchen, die mit virulenten Tuberkelbazillen intravenös infiziert wurden, mit kleinen, optimal wirkenden Dosen von Mangan, Cerium, Lanthan oder Kadmium gelingt es — wenn die Behandlung etwa 7 Tage nach der Injektion eingeleitet wird —, die Tiere gegen das Tuberkulöserwerden völlig zu schützen, indem die injizierten Tuberkelbazillen allmählich zugrunde gehen oder jedenfalls ihre Virulenz verlieren, d. h. dieselbe Wirkung, welche von Madsen und Mörch unter denselben Versuchsbedingungen durch Sanocrysinbehandlung (Natriumaurothiosulfat) erzielt wurde. 3. Durch Behandlung von Kaninchen, die mit virulenten Tuberkelbazillen intravenös infiziert worden waren, mit kleinen, optimal wirkenden Dosen von Kadmium gelang es — wenn die Behandlung 33 Tage nach der Infektion eingeleitet wurde —, die Tiere völlig von Tuberkulose zu heilen. Daß es sich hier um eine Heilung von Kaninchen mit vorgeschrittener Tuberkulose handelt, wird dadurch wahrscheinlich gemacht, daß einzelne der Kontrolltiere zu demselben Zeitpunkte nach der Infektion, wo die Metallsalzbehandlung der übrigen angefangen wurde, mit ausgedehnten tuberkulösen Veränderungen in den Organen starben. 4. Bei Behandlung von subkutan mit virulenten Tuberkelbazillen infizierten Meerschweinchen mit kleinen Dosen von Kadmium gelang es in keinem Falle, die Tiere gegen Tuberkulose zu schützen. Während die beiden Kontrolltiere an allgemeiner Tuberkulose starben, starb nur ein einziges der acht behandelten Tiere an Tuberkulose in ähnlicher Ausdehnung, während die Lungen der sieben übrigen gar keine makroskopisch nachweisbare Tuberkulose aufwiesen. Dies deutet vielleicht die Möglichkeit an, auch bei der experimentellen Meerschweinchen-tuberkulose durch passende Metallsalzbehandlung günstige Wirkungen erzielen zu können. 5. Durch Behandlung von mit virulenten Tuberkelbazillen infizierten Mäusen mit kleinen, optimal wirkenden Mangadosen gelang es, die Tiere völlig zu sterilisieren. Carl.

Seelemann, M.: Zur Frage der Identität des neuen Pfeilerschen Erregers der „Schleswig-Holsteinischen Euterseuche“ mit dem *Bacillus pyogenes*. (B. T. W. 1927 Seite 361.)

Zu Beginn 1927 hatte Pfeiler mitgeteilt, daß er in den Weidegegenden Schleswig-Holsteins einen bisher unbekannten Erreger von Euterinfektionen festgestellt habe. Diese Ansicht wurde von verschiedenen Seiten bezweifelt mit dem Hinweis, daß es sich wahrscheinlich um den *Bacillus pyogenes* gehandelt habe. Zur Klärung der Sachlage hat es Verfasser unternommen, Pfeilersche Originalstämme des Mikroorganismus kulturell und im Tierversuche zu prüfen. In ersterer Beziehung ergab sich, daß der Pfeilersche Bazillus sich gänzlich verschieden verhält vom *Bacillus pyogenes*. Gegenüber Meerschweinchen, Kaninchen und weißen Mäusen verhielt sich der Pfeilersche Bazillus bei Anwendung verschiedener Infektionsmodi vollständig apathogen. Ein mit 0,5 ccm Agarkulturabschwemmung intravenös geimpftes Kaninchen wies beispielsweise bei der Sektion nach vier Wochen keine auf die Infektion hindeutende pathologische Veränderungen auf, während ein mit *Pyogenes*bakterien auf dieselbe Weise infiziertes Kaninchen nach 4 Wochen Erscheinungen von schwerem Marasmus und Vereiterung der Gelenke aufwies. Morphologisch haben beide Bazillen eine gewisse Ähnlichkeit. Nur in einem Punkte unterscheiden sich beide Bazillentypen wesentlich: Der Pfeilersche Typ zeigt deutliche Beweglichkeit, eine Eigenschaft, die seither anscheinend übersehen wurde und dem *Pyogenes* nicht zukommt. Nach den seitherigen Beobachtungen tritt letzterer in Weidegegenden gehäuft, wesentlich seltener bei Stallhaltung auf. Es wäre festzustellen, ob der Pfeilersche Bazillus aus Originalmaterial von der Westküste Schleswig-Holsteins isoliert

werden kann. Im negativen Falle wäre der Pfeilersche Bazillus den Saprophyten zuzurechnen. Carl.

Friedberger, E. und Seidenberg, S.: Einfluß der Umgebungstemperatur auf Immunität und Infektion. (Aus dem Forschungsinstitut für Hygiene und Immunitätslehre Berlin-Dahlem.) (Klin. Wschr. 1927, S. 1515.)

Anlaß zu vorliegenden Untersuchungen gaben folgende experimentelle Beobachtungen: Wenn man Meerschweinchen täglich ein- oder mehrmals mit kleinen Mengen artfremden Eiweißes impft, so tritt die Anaphylaxie in chronischer Form als anaphylaktische Kachexie auf, und es gehen innerhalb weniger Wochen durchschnittlich 80 Prozent der Tiere zugrunde. Es ergab sich nun gelegentlich dieser Versuche die auffallende Tatsache, daß während der Kälteperiode Ende 1926, als die Temperatur im Versuchstall auf + 3 bis + 5 Grad sank, sämtliche Tiere am Leben blieben. Daraufhin wurden genauere derartige Versuche in der Weise angestellt, daß eine größere Anzahl Meerschweine aktiv mit je 0,1 Hammelserum präpariert wurden. Die Hälfte der Tiere kam in einen Stall, dessen Temperatur 6 Grad nicht überstieg, die andere Hälfte wurde im gut geheizten Laboratorium bei 17—21 Grad gehalten. Als nach 17 Tagen der Grad der Überempfindlichkeit bei beiden Gruppen ermittelt wurde, ergab sich folgendes: Die im warmen Laboratorium gehaltenen Tiere waren überempfindlich gegenüber der intravenösen Zufuhr von 0,01 des Serums der Vorbehandlung (Hammel). Die in gleicher Weise vorbehandelten, aber dann in der Kälte gehaltenen Tiere vertrugen ohne nennenswerte Symptome mehr als das 150fache der Dosis der vorerwähnten Serie, d. h. sie waren völlig unempfindlich gegenüber dem Serum der Vorbehandlung. Sie verhielten sich wie normale Tiere. Brachte man die Kältetiere wieder in Zimmertemperatur und reinjizierte denselben nach 6 bzw. 14 Tagen das 30fache der bei den Wärmetieren eine schwere Anaphylaxie auslösenden Dosis, so trat auch hier keinerlei Reaktion ein. Dies beweist, daß in der Kälte das Antigen während der Inkubationszeit entweder ausgeschieden wurde oder unwirksam geworden ist. Verf. glaubt durch die gemachten Beobachtungen die Tatsache erklären zu können, daß der Aufenthalt in freier Luft während des Winters den Ablauf von Infektionskrankheiten außerordentlich günstig beeinflusst. Carl.

Burke, Sprague and Barnes: Dormancy in bacteria. (Das Ruhestadium der Bakterien.) (The Journal of Infectious Diseases 1925, 36, S. 555.)

Die Zeit von der Verimpfung einer Bakterienzelle auf einen frischen Nährboden bis zur ersten Zellteilung („lag phase“) dauert in der Regel nur wenige Stunden, kann aber auch über Tage und Wochen hinaus ausgedehnt sein („dormant phase“). Verf. konnten mit Hilfe des Ein-Zellkulturverfahrens feststellen, daß dieses Ruhestadium z. B. bei *Bact. coli* bis 16 Tage dauern kann. Die Mehrzahl der Keime (85 Prozent) entwickelt sich allerdings innerhalb der ersten beiden Tage. Bei Sporen von gewöhnlichen Bazillen kann das Ruhestadium selbst unter günstigsten Wachstumsbedingungen monatelang anhalten. So verharrten Sporen von *Bac. subtilis* 39 Tage, und Sporen von *Bac. megatherium* 90 Tage im Ruhestadium. Die Mehrzahl der Sporen keimt innerhalb 4—5 Tagen aus.

Verf. glauben, daß durch das verlängerte Ruhestadium die Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens einer Infektion herabgesetzt wird, insofern als sich die Erreger zu verschiedenen Zeiten entwickeln und den Abwehrreaktionen des Körpers somit zur selben Zeit nur ein Teil der eingebrachten Keime gegenübersteht. Meyn.

Vinzent, R.: Spirochétose de la souris blanche et infection mixte trypanospirochétique. (Annales de l'Institut Pasteur T. 41, 1927, S. 131.)

Gelegentlich von Versuchen zur Auswertung chemotherapeutischer Mittel gegen Trypanosomiasen wurde bei

einer Maus eine Spirochaetose entdeckt, deren ursächliche Spirochaete derjenigen des Rekurrenzfiebers sehr ähnlich ist. Diese Spirochaete schützt die Maus gegen die Infektion mit *Trypanosoma somaliense*; der Schutz erlischt jedoch mit dem Aufhören der Spirochaetenerkrankung. Die Spirochaete ist für Mäuse, junge Ratten und den Menschen pathogen, nicht dagegen für erwachsene Ratten, Meer-schweinchen, Kaninchen und Hühner. Baars.

Kimura, R.: Weitere Versuche über aktive Immunisierung per os gegen Pneumokokken. (Zeitschr. für Hyg. 1927, Bd. 107, H. 2, S. 390.)

Durch Verabreichung großer Mengen abgetöteter Bakterien per os ließ sich auch bei erwachsenen Mäusen ein großer Teil der Tiere gegen Infektion mit kleinen, aber sicher tödlichen Dosen (bis zu 100-, gelegentlich auch 1000fach tödlicher Dosis) schützen. Die Versuche ermuntern zur Anwendung der Immunisierung per os beim Menschen. Insbesondere kämen Kinder für die praktische Anwendung in Betracht, die einerseits besonders gefährdet, andererseits per os leichter zu immunisieren sein dürften. Ziegler.

Dikomeit, B.: Über ein einfaches Verfahren zur Konservierung lebender Bakterienkulturen. (Inaug.-Dissertation der Universität Freiburg i. Breisg. 1926.) (C. f. Bakteriologie I. Abteilg. Originale Bd. 101.)

Auf Grund einer Beobachtung Nibbles, der einen Coli-Stamm nach sieben Jahren in einer Fettmischung von Lanolin. anhydr. und Paraffin liqu. aa völlig lebensfähig und im vollen Besitz seiner typischen Eigenschaften fand, wurden vom Verf. Versuche angestellt zur Feststellung, ob sich andere Keime in dieser Fettmischung längere Zeit lebensfähig halten konnten; und ob sie darin ihr Verhalten irgendwie änderten, schließlich, ob darauf ein Konservierungsverfahren gegründet werden könnte. Die Versuche wurden angestellt mit Streptokokken, Pneumokokken, Meningokokken, Diphtheriebazillen, Typhus- und Shiga-Kruse-Bazillen. Sie führten zu folgenden Resultaten: Streptokokken hielten sich in erwähnter Fettmischung fast ein Jahr lang unverändert lebensfähig, Pneumokokken sechs Monate, Meningokokken 31 Tage, Diphtheriebazillen 7½ Monate, Typhusbazillen 7½ Monate und Shiga-Kruse-Bazillen ebenfalls 7½ Monate. Eine längere Beobachtung war aus äußeren Gründen nicht möglich. Das Verfahren kommt infolge seiner einfachen Ausführung (Aufbringen der bei 37 Grad verflüssigten, vorher sterilisierten Fettmischung mittelst Pipette in ein enges Röhrchen, an dessen Wand vorher die zu konservierende Bakterienkultur abgestrichen wurde) als praktisch brauchbare Konservierungsmethode in Frage und besitzt in mancher Hinsicht nennenswerte Vorteile gegenüber den bisher üblichen Methoden. Carl.

Geflügelkrankheiten.


van Heelsbergen: Erfahrung bei der Untersuchung von Geflügelkrankheiten in den Niederlanden. (Aus dem Institut für parasitäre und Infektionskrankheiten der Reichsuniversität in Utrecht (Holland). Direktor: Prof. Dr. De Blieck.) (Tijdschrift voor Diergeneeskunde 1927, Deel 54, Aflevering 6, S. 250.)

1. Pulloruminfektion der Küchlein und bei erwachsenen Hühnern.

(Mit 3 Abbildungen.)

Die Pulloruminfektion kommt bei Küchlein und bei erwachsenen Hühnern vor. Jene werden via Ei und dann durch gegenseitige Berührung (Kunstmutter, Glucke) angesteckt, die überlebenden werden Ansteckungsstoffträger, und zwar findet sich der Ansteckungsstoff hauptsächlich im Eierstock, wodurch die Eier und in der Brutzeit auch die Küchlein infiziert werden. Aber auch andere Organe, z. B. das Herz (graue Entzündungsherde) enthalten den Infektionsstoff. Die Mortalität unter den Küchlein kann bis 100 Prozent betragen. Todesfälle kommen auch unter den erwachsenen Hühnern häufig vor. Hauptsächlich

werden sie veranlaßt durch die Herde im Herzen und durch innere Verblutung. Am heftigsten tritt die Infektion bei den Küchlein im April, im Mai und im Juni auf. Es sterben etliche Zehntausend, aber auch unter den erwachsenen Tieren fordert die Krankheit viele Opfer, wie die Kurve



(Abb. 1) zeigt. Massensterben tritt weniger in den Vordergrund, aber nach und nach nimmt die Krankheit einen akuten Verlauf, und in kurzer Zeit sterben zahlreiche Hühner.

In derselben Zeit, in welcher die Pulloruminfektion ihren Höhepunkt erreicht, also im April, im Mai und im Juni, richtet auch die Eileiterentzündung und die gleichzeitig damit auftretende Peritonitis großen Schaden unter den Hühnerbeständen an und tritt ebenfalls am wenigsten im Dezember, im Januar und im Februar auf. Häufig sind bei der Eileiterentzündung die Eidotter mißgebildet (Pulloruminfektion). Meistens werden aus der Eileiterentzündung mit Peritonitis Colibazillen isoliert, doch werden wiederholt Pullorumbazillen nachgewiesen, und deswegen glaubt der Verfasser, daß Pulloruminfektion und Eileiterentzündung miteinander in kausalem Zusammenhang stehen.

Nahe verwandt mit der Pulloruminfektion ist die Kleinsche Krankheit. Dafür spricht, daß der Ansteckungsstoff der beiden Krankheiten sich gleicht, und ferner spricht dafür der Verlauf. Beide Krankheiten gehen, wie wiederholt beobachtet wurde, ineinander über. Zuerst treten bei erwachsenen Hühnern einige sporadische Todesfälle auf, und dabei findet man bei der Sektion mißgebildete Dotter und graue Entzündungsherde im Herzen. Nach und nach sterben immer mehr Hühner unter den Erscheinungen einer schleimigen Enteritis und starker Schwellung der Milz, also unter dem Krankheitsbild der sogenannten Kleinschen Krankheit. Es entwickelt sich also via der chronischen Träger der Pullorumbazillen unter günstigen Verhältnissen ein Krankheitsbild, das stark an die Kleinsche Krankheit erinnert. Allerdings müssen, um darüber Sicherheit zu gewinnen, Untersuchungen angestellt werden, ob die chronisch kranken Tiere Träger der Pullorumbazillen oder der Kleinschen Krankheitskeime waren. Gegen die Einheit beider Ansteckungsstoffe spricht das seltene Auftreten der Kleinschen Krankheit in hygienisch gehaltenen Hühnerparks, wo die Pulloruminfektion sehr häufig auftritt, ferner daß überall in den Niederlanden die Küchlein infolge von Pulloruminfektion sterben, während die Kleinsche Krankheit hauptsächlich nur in einem bestimmten Teil der Provinzen Utrecht und Gelderland vorkommt, und schließlich, daß in Belgien die Kleinsche Krankheit selten, die Pulloruminfektion der Küchlein sehr häufig auftritt. Der Pullorumbazillus

ist sehr pathogen für Küchlein. Bei Hühnern verursacht er schleichende Krankheitsprozesse (Ansteckungsstoffträger). Akute Todesfälle unter den Erscheinungen einer schleimigen Darmentzündung (Diarrhoe) und der Bronzeleber werden in der Regel nicht durch diesen Bazillus verursacht, doch kann sich die Pathogenität für die erwachsenen Hühner anscheinend derartig steigern, daß diese unter den Erscheinungen einer schleimigen Darmentzündung sterben. Dabei braucht die Pathogenität für Küchlein nicht gesteigert zu werden.

Im Laufe der Jahre ändert sich das Krankheitsbild der Pulloruminfektion. Früher wurden in Belgien und in den Niederlanden charakteristische Veränderungen (Entzündungsherde) in Lunge, Herz, Leber und Darm nachgewiesen, jetzt sind diese Organe sehr wenig verändert, und das Sektionsbild ist negativ. Anscheinend nimmt der Bazillus in den Niederlanden an Pathogenität zu, die Tierchen sterben schneller, so daß gröbere Organveränderungen sich nicht bilden können.



a = innere Verblutung via des Eierstocks (Dotter).

Die primäre Ursache zu der wiederholt bei erwachsenen Hennen beobachteten inneren Verblutung und Leberblutung ist in der starken Veränderung der Ovarien und der Dotter infolge chronischer Pulloruminfektion zu suchen. Vielfach ist der ganze Dotter mit Blut gefüllt, die Dotterhaut kann dann zerreißen und das Tier an innerer Verblutung sterben. Bei Pulloruminfektion ist neben solchen



Kreislauf der Pulloruminfektion. Nach Dr. Bedler. Verlag Spinger.

mißgebildeten Eierstöcken zugleich das Lebergewebe brüchig (Leberblutung). Möglicherweise veranlassen solche abnormen Ovarien, da ihre innere Sekretion aufgehört hat, Verfettung und evtl. Zerreißen der Leber.

Um die Pulloruminfektion zu bekämpfen, sind die Ansteckungsstoffträger unter der Zuchtbrut mit Hilfe der Blutuntersuchung auszumerzen. Außerdem kann noch durch Immunisierung der Hennen die Immunität auf die Küchlein übertragen werden. Die Immunisierung mit dem abgetöteten Ansteckungsstoff muß im Januar und im Februar erfolgen. Geimpft wird im Kehllappen. Dabei schwillt dieser bei den infizierten Tieren an, und diese Schwellung bleibt einige Tage bestehen. Tiere mit deutlich positiver Impfreaktion müssen entfernt werden. Die Impfung wird vier Wochen später wiederholt, und zwar am Brustmuskel. Daneben müssen die Tiere gut gepflegt und gefüttert (Buttermilch usw.) werden. Bevor diese Immunisierungsmethode allgemein eingeführt wird, ist zunächst festzustellen, ob die Immunität wirklich von der Mutter auf das Junge übertragen wird und ob die gesunden Küchlein, die mit den kranken in Berührung gekommen sind, keine Ansteckungsstoffträger sind. Bass.

Standesangelegenheiten.

Mitteilungen des deutschen Veterinäroffizierbundes. (E. V.).*)

1. Befolgung der Offiziere nach der neuen Befoldungsordnung vom 16. Dezember 1927.

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1927 tritt das neue, lange Zeit heiß umftrittene Befoldungsgefez (B.G.) vom 16. Dezember 1927 in Kraft.

Besoldungsgruppe	Tarifklasse des Wohnungsgeldzuschusses	Dienstgrad	Stufen
3.	II	Generalstabsveterinär	16000
4.	II	Generalveterinär	12000
5.	III	Generaloberveterinär	9700
6.	III	Oberstabsveterinär	7700. 8400
7.	In d. erst. Stufe IV, dann III	Stabsveterinär	4800. 6000. 6900
9.	IV	Oberveterinär Veterinär	3400. 3600. 3800. 4000
15.	V	Unterveterinär	2400

Der Wohnungsgeldzuschuß ist nicht geändert, er stellt sich z. Zt. einschließlich der prozentualen Erhöhung um 20 Prozent wie folgt:

In Ortsklasse	In Tarifklasse				
	I.	II.	III.	IV.	V.
Sonderklasse	2526	2016	1584	1152	864
A	2100	1728	1368	1008	732
B	1800	1440	1080	792	606
C	1368	1080	864	648	474
D	1008	792	648	474	348

Ledige Beamte und Offiziere erhalten bis zum vollendeten 45. Lebensjahre den Wohnungsgeldzuschuß der nächstniedrigsten Tarifklasse (§ 10). Die Kinderzuschläge betragen allgemein für jedes Kind 20 RM. im Monat. Die Frauenzulage ist im Gehalt eingerechnet. Die Grundgehälter werden mit Ausnahme der festen Gehälter nach Dienstaltersstufen geregelt. Sie steigen von zwei zu zwei Jahren bis zur Erreichung des Höchstgehaltes.

2. Die Pensionen der Veterinäroffiziere der alten Wehrmacht und der vor dem 1. Oktober 1927 ausgeschiedenen Offiziere der Reichswehr nach dem neuen Befoldungsgefez vom 16. Oktober 1927.

Die Bezüge der beim Inkrafttreten der neuen Befoldungsordnung im dauernden Ruhestand befindlichen Beamten und Ruhegehalt und

*) Wegen Raummangels gekürzt wiedergegeben. Die Schriftleitung.

Übergangsgebührrnisse beziehenden Soldaten sowie die Bezüge der Hinterbliebenen verstorbener Beamten und Soldaten werden mit Wirkung vom 1. Oktober 1927 in der Weise erhöht, daß zu dem für die Berechnung des ruhegehaltstfähigen Diensteinkommens maßgebend gewesenen Grundgehalt bei einem Grundgehalt

bis einschließlich 1800 RM.	25 vom Hundert
von mehr als 1800 bis 3500 RM.	22 vom Hundert
von mehr als 3500 bis 6000 RM.	19 vom Hundert
von mehr als 6000 bis 12000 RM.	16 vom Hundert

hinzutreten.
Dagegen werden die Bezüge der Wartegeldempfänger mit Wirkung vom 1. Oktober 1927 nach den geltenden Vorschriften neu festgesetzt (§ 25).

Neben den erhöhten Grundgehältern wird der Frauenzuschlag nach den bis zum 30. September 1927 geltenden Vorschriften (12 RM. pro Monat) gewährt (§ 30).

Der Kinderzuschlag beträgt monatlich 20 RM. für jedes Kind. Der Wohnungsgeldzuschuß wird, wie bisher, für alle Pensionäre nach den Sätzen der Ortsklasse B und der jeweils zuständigen Tarifklasse + 20 Prozent Zuschlag gewährt.

Die Grundgehälter, die für die Berechnung des ruhegehaltstmäßigen Diensteinkommens bisher maßgebend waren, sind folgende:

Besoldungsgruppe	Dienstgrad	Stufen							
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII	Veterinär	2640	2888	3036	3234	3366	3564	3762	3960
IX	Oberveterinär	3100	3300	3500	3696	3888	4012	4290	4554
X	Stabsveterinär	3960	4290	4554	4818	5080	5346	5610	5970
XI	Oberstabsveterinär	4620	4950	5280	5610	5940	6270	6600	6930
XII	General-Obervet.	5346	5742	6138	6534	6996	7456	7920	
XIII	Generalveterinär	6930	7920	8910	9570	10560			
B 2	Generalstabsvet.	13200							

Der in Frage kommende Wohnungsgeldzuschuß für Pensionäre nach Ortsklasse B beträgt:

Ortsklasse	Jahresbetrag bei einem Grundgehalt				
		von 2620 bis 4554 M.	über 4554 bis 7920	über 7920 bis 13200	über 13200
	Tarifklasse V	Tarifklasse IV	Tarifklasse III	Tarifklasse II	Tarifklasse I
	Goldmark	Goldmark	Goldmark	Goldmark	Goldmark
B	606	792	1080	1440	1800

Bei den infolge der einschränkenden Vorschriften der Ziffer 24 der Ausführungsbestimmungen zum P.E.G. in der Eingangsstufe verbliebenen Altverforungsberechtigten werden die vorher genannten prozentualen Zuschläge in den Grundgehältern auf 8 vom Hundert (auf 33, 30, 27 und 24 v. H.) erhöht. Eine gleiche Erhöhung erhalten diejenigen Altverforungsberechtigten, die im Falle der Ausdehnung der in Ziffer 25 der vorerwähnten Ausführungsbestimmungen vorgesehenen Fußnoten auf sie in eine höhere Befoldungsgruppe einzureihen gewesen wären (§ 27 Abf. 1 und 2). Für eine Erhöhung nach Abf. 1 und 2 kommen nur diejenigen der bezeichneten Altverforungsberechtigten in Frage, deren gesetzliches Ruhegehalt für September 1927 zusammen mit dem Frauenzuschlag den Betrag des Ruhegehalts erreicht hat, zu dem ihnen auf Grund des § 1 P.E.G. vom 1. April 1920 ab ein Zuschuß gewährt worden ist oder hätte gewährt werden müssen (§ 22 Abf. 3). In Berlin, Hamburg, Altona, Wandsbek, tritt zum Grundgehalt noch ein örtlicher Sonderzuschlag von 3 Prozent, in den besetzten Gebieten von 8 Prozent hinzu.

3. Die Eingruppierung der Remonteamtstierärzte (R.A.T.) nach A. 2c der neuen B.O.

Allseitig Freude wird es erregen, daß es dem D.V.O.B. endlich gelungen ist, die R.A.T. ihrer Vorbildung und akademischen Ausbildung entsprechend in die Gruppe der Akademiker zu bringen. Die Geheimniskrämerei des Reichsfinanzministers in der Befoldungsänderung hatte es zu Wege gebracht, daß wir erst ziemlich spät den Entwurf der neuen

B.O. zu Gesicht bekamen, wonach die R.A.T. in A. 3a eingruppiert waren. Wenn auch damit unsere Forderung, die R.A.T. nach X und XI einzureihen, erfüllt war und tatächlich in 3a nur Beamte aus X und XI der alten B.O. eingruppiert waren, so war doch die Gruppe 2c die eigentliche Gruppe der Akademiker. Wir machten darauf eine begründete Eingabe an den Haushaltsausschuß des Reichstages unter Überreichung einer Abschrift davon für jeden Abgeordneten des Hauses brachte die R.A.T. nach einer neuen Gruppe 2c (Regierungsvorlage 2c), gehören. Der Haushaltsausschuß strich dann die Gruppe 3a und brachte die R.A.T. nach einer neuen Gruppe 2c (Regierungsvorlage 2b), in welcher nach einem Anfangsgehalt von 4800 RM. in elf Stufen ein Endgehalt von 8400 RM. erreicht wird. Die R.A.T. a. W. kommen dadurch, daß der Reichstag beschloffen hat, die Bezüge der Wartegeldempfänger nach der neuen B.O. neu festzusetzen, in den Genuß der neuen Gehälter. Die R.A.T. a. D. erhalten leider, wie alle Ruhegehaltsempfänger, nur eine prozentuale Erhöhung ihrer Pensionen. Unter Bezugnahme auf den Härteparagrafen des neuen B.G. (§ 33) wird der D.V.O.B. einen Ausgleich bei der obersten Reichsbehörde für sie beantragen.
Der 1. Vorf.: Wöhler, Generalveterinär a. D.

Prüfungsordnung für Ärzte.

Der Reichsrat nahm in seiner Sitzung vom 21. Dezember die Änderung der Prüfungsordnung für Ärzte, die u. a. die Studienzeit von 10 auf 11 Semester erhöht, an.

Berichtigung. Dr. Flatten legt Wert darauf, um einem Mißverständnis, das aus den Worten in Nr. 52, S. 855 „Nach einer kurzen Polemik Flatten's ufw.“ geschlossen werden könnte, vorzubeugen, daß seine Diskussionsbemerkungen wörtlich wiedergegeben werden. „Ich betonte, daß die unbestimmte Zahl x für die Zahl der Delegierten von mir in Leipzig zuerst angeführt sei und kam alsdann auf meinen Artikel in Nr. 49 der B. T. W., betitelt: „Zum Neubau des D.V.R.“ zu sprechen. Ich führte an, daß ohne Gründung der Adat das Verhältnis der Delegiertenzahl des R.P.T. und der Festbefoldeten $\frac{X}{2} : \frac{X}{2}$ zu empfehlen sei, besonders da ein Antrag mit Stimmgleichheit als Ablehnung gelten sollte. Ich empfahl angelegentlich den Roedekischen Antrag, damit die Einheit im tierärztlichen Stande hergestellt werde.“

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Der Privatdozent in der Vet.-med. Fakultät der Universität Leipzig, Dr. med. vet. Ewald Berge, ist unter dem 23. Dezember 1927 zum nichtplanmäßigen außerordentlichen Professor in dieser Fakultät ernannt worden.

Gesellschaft der Freunde der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin.

I. Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 18. Januar 1928, 11¼ Uhr, im Hörsaal des anatomischen Instituts der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin NW 6, Luifenstraße 56. 1. Jahresbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr. 2. Abnahme der Jahresrechnung und des Berichts der Rechnungsprüfer, sowie Erteilung der Entlastung des Vorstandes, Feststellung des Haushaltplanes für das Geschäftsjahr 1928. 3. Ersatzwahl für ausgeschiedene Vorstandsmitglieder. II. 12 Uhr: Teilnahme an der Reichsgründungsfeier. III. 14¼ Uhr: Gemeinsames Essen in den Räumen der Deutschen Gesellschaft, Berlin NW 7, Schadowstraße 6—7 (Preis des trockenen Gedeckes Mk. 6,—). Nach dem Essen: 1. Vortrag (mit Lichtbildern) von Regierungs- und Baurat Wolff über bauliche Notwendigkeiten der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin. 2. Vorführung wissenschaftlicher Filme. — Bindende Anmeldungen zur Teilnahme an dem Essen werden erbeten spätestens bis zum Sonnabend, den 14. Januar 1928, an Prof. Dr. Bongert, Berlin, Luifenstraße 56.

Tierärztlicher Fortbildungsrundfunk.

Die Rundfunkgesellschaft „Die deutsche Welle“ ist gezwungen, vom 1. Januar 1928 ab zunächst bis auf weiteres die ständigen fachwissenschaftlichen Vortragsdarbietungen (Juristenfunk, Ärztesfunk, Zahnärztesfunk, Tierärztesfunk, Funk für Kaufleute und Gewerbetreibende und pädagogischer Funk) je auf die Hälfte zu reduzieren, so daß der Tierärzterundfunk ab 1. Januar vorläufig nur einen tierärztlichen Vortrag im Monat veranstalten kann. Der Januarvortrag findet am Freitag,

den 27. Januar, in der Zeit von 7.20 bis 7.45 statt. Es spricht Prof. Dr. Bongert „Über die Bedeutung der Fleischbefchau“.

Dr. Giefe.

15. Fortbildungskursus des D.V.R. in Oldenburg (Oldenburg)

am 21. und 22. Januar 1928.

Sonnabend, den 21. Januar: 2.30 Uhr nachm.: Professor Dr. Oppermann-Hannover: „Organtherapie und innere Sekretion“. 3.30 Uhr nachm.: Prof. Dr. Bongert-Berlin: „Milchhygiene“. Anschließend Prof. Dr. Silberfieppe-Berlin: „Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der Chirurgie“. Anschließend Besprechung. — Sonntag, den 22. Januar: 9 Uhr: Prof. Dr. Bongert-Berlin: „Fleischbefchau“. 10 Uhr: Prof. Dr. Goetze-Hannover: „Euterkrankheiten“. Anschließend Prof. Dr. Stang-Berlin: „Tierzucht“. Anschließend Besprechung. — Die Vorträge finden in den Räumen des Bakteriologischen Instituts der Landwirtschaftskammer statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 10 Mark für beide Tage. Stang.

Wissenschaftliche Referierabende an der Tierärztl. Hochschule Hannover.

Montag, den 16. Januar 1928, 20.15 Uhr, im Hörsaal des Physiologischen Institutes. Thur: Über die Bedeutung des wissenschaftlichen Filmes für Unterricht und Forschung, erläutert an Beispielen. (1. Thur: Versuche am isolierten Froschherzen und am freigelegten Säugetierherzen. 2. Thur: Die Registrierung des Blutdruckes. 3. Thur: Bewegungsvorgänge an Pflanzen, Mimosa pudica. 4. Thur: Die amöboide Bewegung der Leukozyten. 5. Krogh: Kapillarkreislauf und Kapillarreaktionen am Frosche.)

Otto Zietzschmann.

Berichtigung. Über die Neubefetzung der durch Ausscheiden von Ministerialrat Prof. Dr. Edelmänn freierwerdenden Stelle eines Landestierarztes im Freistaate Sachsen ist noch nicht entschieden, wie veröffentlicht in voriger Nummer gemeldet worden war. Vielmehr führt Geheimrat Edelmänn die Dienstgeschäfte bis auf weiteres fort.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Fritz Drahn: **Extremitätenentwicklung und Polydaktylie beim Pferde.** Die Ontogenese des Hand- und Fußskeletts, Varianten am Carpus und die Beurteilung der „entwicklungsbedingten“ Polydaktylie bei Equus caballus. Zoologische Bausteine. Ausschnitte aus dem Gesamtgebiet der Zoologie, Bd. 1, Heft 3, S. 1—206, 1927. Berlin, Bornträger. Preis 16,— Mk.

Das mit 130 Abbildungen ausgestattete Werk stellt eine umfassende kritische Studie dar, die schon so oft behandelten Problems der Polydaktylie des Pferdes, das in der landläufigen Literatur trotz der einen wesentlichen Fortschritt bedeutenden Untersuchungen von Boas ein Tummelplatz steriler Mitteilungen und Urteile geworden ist. Mit um so größerer Freude lernt man die Ergebnisse der tiefgründigen Untersuchungen des eifrigen Verfassers kennen, die dem Problem von neuen Gesichtspunkten aus, d. h. vom ontogenetischen Geschehen her an den Leib rückt. Der erste Teil der ausführlich geschilderten und vorzüglich illustrierten Abhandlung betrifft die normale Entwicklung des Pferdefußes, aber auch weiter proximal gelegene Teile des Gliedmaßen skeletts, wobei der Variabilität der Karpalknochen besondere Beachtung geschenkt wird. Und das in Rücksicht auf die Frage der Mißbildungen am Fuße, speziell der Polydaktylie, die im letzten Abschnitt großzügig behandelt wird. Entwicklungsgeschichtlich ließ sich an einem reichen Materiale bei Foeten von 16 Wochen Alter bis zu 3 Wochen post partum im Gegensatz zu den vermeintlichen Funden Ewarts nicht der geringste Anhalt für das Vorhandensein einer Zehenanlage an den Metapodien II und IV (an den Griffelbeinen) ermitteln. Die Griffelbeine tragen niemals auch nur Andeutungen von Zehengliedern und entbehren selbst der eignen distalen Epiphyse. Das zehenseitige Ende, Knöpfchen, wird von der Diaphyse selbst gebildet. Ulna und Fibula stellen in frühester Zeit (2,5 bis ca. 4 cm und darüber) vollkommen ausgebildete Knorpelscheiben dar, die der Reduktion erst bei der Verknöcherung verfallen und beide dann ihre distale Epiphyse dem stärkeren Partner des Zeugopodiums (Radius bzw. Tibia) einverleiben. Am Distale der knorpeligen Metapodien II und IV konnte Verfasser (bei drei Embryonen übereinstimmend) in frühen Entwicklungsstadien je eine mesenchymatöse Gewebsverdichtung nachweisen, die mit Rücksicht auf homologe Bildungen bei anderen Säugetieren als ein zelliges, undifferenziertes Bildungsgewebe für Phalangen wohl mit Bestimmtheit angesehen werden muß, das normaliter später wieder zu-

grunde geht. Damit ist aber durch einen ontogenetischen Normalzustand gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, das unter besonderen Umständen beim Pferde im Anschluß an ein Griffelbein auch ein Zehenapparat auftreten kann, eine Möglichkeit, die Verfasser nun mit Recht für die Beurteilung der Polydaktylie auswertet. Für das Bestehenbleiben und die Weiterbildung zu Phalangen hat Verfasser ursächlich logischerweise besondere Verhältnisse in der morphologischen Gestaltung der Nebenstrahlen des Metapodiums angenommen. Mangelhafter Anschluß an den Hauptstrahl bedingt freies Weiterwachsen des Nebenstrahls, und das liefert die von Polydaktylietfällen her bekannten zehentragenden „Griffelbeine“ bei Pferden. Die überaus gründliche Kritik der in der Literatur niedergelegten Fälle von Polydaktylie des Pferdes und einiger eigens beschriebener führt Verfasser zur Einteilung der Polydaktylie in I. Teratologische P. (Spaltung, Verdoppelung usw.), echte Mißbildungen, Terata; und II. Entwicklungsbedingte P., bisher „atavistische“ genannt, Fälle, die auf abnormer Weiter- bzw. Überentwicklung normaler ontogenetischer Grundlagen beruhen. Sie können phylogenetische Entwicklungsstadien mehr oder weniger gut kopiert haben, oder die ursprüngliche Form hat bei der Weiterentwicklung gelitten. Demnach sind zu unterscheiden IIa Formgerechte entwicklungsbedingte Polydaktylie und IIb Mißgestaltete entwicklungsbedingte Polydaktylie. Gruppe I—IV der Schilderungen des Verfassers gehören zu IIa, Gruppe V und VI zu IIb. Otto Zietzschmann.

Dissertationen der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Friedrich Büngeener: „Das Schillingsche Hämogramm kranker Rinde“. Wilhelm Gippmann: „Über die Wirkung d'Hérelle'scher Lysate auf B. pullorum“. Curt Himstedt: „Beitrag zur Pathologie der Streptokokken-Mastitis“. Ernst Liebsch: „Untersuchungen über die diagnostische Wertung des aufgekümmten und versteiften Rückens beim Rinde“. Hans Mißfeld: „Zur Frage des Vorkommens allergischer Erkrankungen bei Haustieren unter Berücksichtigung der neueren Erfahrungen beim Menschen“. Franz Müller: „Beitrag zur Pathologie der Veränderungen des Lebergewebes nach Fremdkörperverletzung beim Hunde“. Gustav Niehage: „Beitrag zur intravenösen Chloralhydratnarkose beim Rinde“. Erich Riepe: „Histologische Untersuchungen über die Reaktion der Haut (Integumentum commune) des Tieres auf Röntgenstrahlen“. Otto Strerath: „Die Bedeutung der Membranfilter nach R. Zsigmondy für die bakteriologische Diagnose der Tuberkulose“. Ewald Wilhelm: „Vergleichende Untersuchungen über Zahl und Hämoglobingehalt der roten Blutkörperchen der weißen Maus“.

Dissertationen der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig.

Sigurd Helsingius: „Der nagellose Hufbeschlag in geschichtlicher und chirurgisch-kritischer Beleuchtung“. Erich Peschke: „Untersuchungen über die Verwendbarkeit der Ventrase zur Therapie des Intestinaltrakts beim Hund“. Siegfried Mempel: „Klinisch-experimentelle Untersuchungen über die therapeutische Verwendung der Hochfrequenzströme in der Veterinärmedizin unter Berücksichtigung der Erfahrungen in der Humanmedizin“. Wilhelm Linnenkohl: „Beitrag zur Feststellung der Gewichtsverhältnisse der Fleischqualitäten beim veredelten deutschen Landschwein“. Jan Hård af Segerstad: „Beiträge zur Histologie der Lymphknoten des Elefanten“. Hans Häussermann: „Beitrag zur Kenntnis der Adenome in der Lunge bei Tieren (Hund, Schaf)“.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Veterinärmedizinischer Rat im Bayr. Staatsministerium des Innern Dr. Ludwig Drefcher zum Direktor der Veterinärpolizeilichen Anstalt in Schleißheim; Bezirkstierarzt Hugo Bühlmann in Mindelheim zum Oberveterinär; Oberveterinär Dr. Oskar Wucher in Augsburg zum Oberregierungsrat bei der Regierung von Schwaben und Neuburg; Distrikts- und Grenztierarzt Karl Menzner in Nesselwang zum Bezirkstierarzt für den Verwaltungsbezirk Landau (Pfalz).

Ausgeschieden: Dr. Ernst Adleff, wissensch. Assistent, aus seiner Stellung im Institut für Tierzucht und Geburtshilfe der Univ. Leipzig.

Approbiert: in Leipzig: Hans Norwig aus Nienburg a. d. Wefer.

Gestorben: Oberveterinär Professor Dr. Wilhelm Knell in Gießen; Kreistierarzt i. R. Veterinär Carl Hoehne in Swinemünde; Oberamtstierarzt i. R. Ludwig Maile in Stuttgart.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Aug. Eberlein & C., Hannover-Linden.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelman, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Ausperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Erlatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 2.

Ausgegeben am 14. Januar 1928.

36. Jahrgang.

(Aus dem Institut für Bakteriologie und Hygiene der Tierärztlichen Hochschule Wien. — Vorstand: Prof. Dr. Schnürer.)

Beitrag zur Kenntnis der durch Stäbchen aus der Coli-Paratyphusgruppe bedingten Mastitiden.

Von Tierarzt Dr. Johann Rudolf, Wien.

Aus der Geschichte der Fleischvergiftungen wissen wir, daß nach Genuß von Fleisch, das von Kühen stammt, welche wegen schwerer Mastitis notgeschlachtet werden müssen, gelegentlich die Gesundheit des Menschen gefährdet werden kann. (Nach Standfuß (1) Fleischvergiftungen in Wurzen, auf Rittergut bei Riesa in Sachsl., in Sanddorf (Westpreußen) und in Cotta). Nach unseren gegenwärtigen Erkenntnissen werden durch Bakterien aus der Coli-Paratyphusgruppe in der Regel akute parenchymatöse Euterentzündungen hervorgerufen, wobei die durch Bakterien aus der Paratyphusgruppe erzeugten Mastitiden meist einen septischen Verlauf zeigen. In der mir zugänglichen Literatur konnte ich verhältnismäßig wenige Arbeiten finden, die sich mit den durch Paratyphus-Enteritisbakterien bedingten Mastitiden befassen.

Zwick und Weichel (2) sind wohl die ersten, welche Untersuchungen über die Erreger der Mastitis acuta des Rindes mit besonderer Berücksichtigung der Beteiligung von Fleischvergiftungen anstellten. Sie konnten in 21 Fällen von akuter, parenchymatöser Mastitis 19mal Bakterien aus der Coli-Arogenesgruppe finden. Bei den zwei restlichen Fällen, wovon einer zur Notchlachtung führte, fanden sich Mikroorganismen aus der Paratyphusgruppe. Nach dem serologischen Verhalten war das aus dem Euter der notgeschlachteten Kuh erhaltene Bakterium ein Paratyphus-B-Bakterium, während der zweite Bakterienstamm von dem wiedergehenen Tier in die Gruppe der Enteritis-Bakterien-Gärtner einzu-reihen war. In den Schlusssätzen heben die genannten Forscher aber hervor, daß auch die durch Fleischvergiftungs-erreger bedingten Euterentzündungen manchmal in ihrem klinischen Verlaufe mit einer gewöhnlichen, akuten Mastitis übereinstimmen können.

Herrlich (3), der die Befunde vorstehender Forscher an zehn akuten Mastitisfällen, bei welchen aus dem Eutersekrete ausschließlich Coli-Bakterien-ähnliche Stäbchen herausgezüchtet worden waren, nachprüfte, konnte die Angaben Zwick und Weichel's bestätigen, denn zwei Bakterienstämme mußten nach ihrem biochemischen und kulturellen Verhalten in die Gruppe der Fleischvergifter eingereiht werden. Die Mastitis hatte in beiden Fällen zur Notchlachtung geführt. Serologisch verhielt sich ein Stamm

wie ein Paratyphus-B-Bakterium, während der zweite Stamm weder durch Gärtner- noch durch Paratyphus-B-Serum beeinflusst wurde.

In den letzten Jahren hatte ich reichlich Gelegenheit, mich mit der Klinik und der Ätiologie der Mastitiden zu beschäftigen; bei diesen Untersuchungen wurde auch den durch die gramnegativen, coliähnlichen Stäbchen bedingten Mastitiden ein besonderes Augenmerk zugewendet, denn die Milch eines an Paratyphus-Mastitis erkrankten Tieres ist wohl geeignet, die menschliche Gesundheit zu schädigen. Auch dürfte es Mastitisfälle geben, bei denen eine auffällige Funktionsänderung der infizierten Milchdrüse, bei den durch Paratyphusbazillen hervorgerufenen Mastitiden erst innerhalb einiger Tage vor sich geht, so daß gerade diese gefährlichen Euterentzündungen anfänglich unentdeckt bleiben und die noch nicht besonders auffällig veränderte Milch des bereits erkrankten Viertels dem übrigen Gemelke beige-mischt wird. Diese Tatsache hat auch Zwick durch künstliche Infektionsversuche an Ziegen experimentell feststellen können. Auch mir gelang es bei der Durchführung von allgemeinen Stallkontrollen, zwei Fälle von Mastitis zu ermitteln, bei welchen die Milch makroskopisch für wenig geübte Untersucher nicht auffällig verändert war. Bei der bakteriologischen Untersuchung des Sekretes konnten aber Reinkulturen von Bakterien, die biochemisch in die Paratyphusgruppe zu rechnen waren, gefunden werden.

Eigene Untersuchungen.

Unter 535 Mastitis-Sekretproben konnten 29mal gram-negative coliähnliche Stäbchen in Reinkultur ermittelt werden. Von diesen waren fünf Fälle in die Gruppe der Fleischvergifter einzureihen; die Zahl der Streptokokken-Mastitiden betrug 413, die durch Staphylokokken bedingten 30, die durch Diplokokken 16, durch Pyogenes 9 und durch Tuberkelbazillen 5. Der Rest der untersuchten Mastitiden hatte eine polybakterielle Grundlage. Ausführliches ist in einer Arbeit Rudolf (4) „Über die Verbreitung der Mastitiden unter den Melkviehbeständen Niederösterreichs, deren rechtzeitige Erkennung, Bekämpfung und wirtschaftliche Bedeutung“ enthalten. Durch die Untersuchung der gewonnenen Reinkulturen gramnegativer, coliähnlicher Stäbchen von diesen Mastitisfällen auf ihr morphologisches und

biochemisches Verhalten, versuchte ich einen Beitrag zu folgenden Fragen zu liefern.

1. Unterscheiden sich die bei Mastitis gefundenen Bakterien der Coli-Ärogenesgruppe von dem Bacterium Coli communae?
2. Wird durch Bakterien aus der Paratyphusgruppe eine besondere Form von Mastitis (septische Mastitis) erzeugt, die klinisch sicher als solche ermittelt werden kann?
3. Kann es gelegentlich auch zu feuchtenhafter Ausbreitung der durch die beiden Bakterienarten erzeugten Mastitiden kommen?

Morphologische, kulturelle und biochemische Untersuchung der Mastitis-Stämme 1 bis 24.

Diese Stämme zeigten bei eingehender Prüfung so weitgehende Übereinstimmung, daß eine summarische Beschreibung — um Wiederholungen zu vermeiden — genügt. Morphologie und Beweglichkeit: Es handelte sich in allen Fällen um gramnegative Kurzstäbchen, deren Länge meistens die Breite um das zwei- bis fünffache übertraf. Im Ausstrich von Agarplattenkulturen und aus gewöhnlicher Pferdefleischbouillon konnten häufig bedeutend längere, gebogene Formen gesehen werden. Zur Beweglichkeitsprüfung dienten 10—18stündige Bouillon- und Agarkulturen. Das Ergebnis war kein einheitliches. Manche Stämme zeigten lebhafte Eigenbewegung, während andere träge durch das Gesichtsfeld zogen; ja, bei drei Stämmen war eine Untercheidung von der Brown'schen Molekularbewegung mit Sicherheit nicht zu finden. Pferdefleischbouillon: Uppiges Wachstum mit diffuser Trübung, bei manchen Stämmen an der Oberfläche ein dünnes Häutchen. Nach einigen Tagen Klärung der Nährflüssigkeit unter Bildung eines manchmal flockigen, manchmal mehr zügigen Bodensatzes. Agarplatte ohne Zusatz: Ausgezeichnetes Wachstum von großen Kolonien. Einige Stämme fielen durch ihre stark schleimigen, besonders großen hellgrau bis bräunlichen Kolonien auf. Unter schwacher Vergrößerung waren die Kolonien aller Stämme verschieden stark granuliert. Agarstich: Gutes Wachstum, das sich über die Oberfläche des Nährbodens ausbreitete. Traubenzucker-Agar-Schüttelkultur: 2 Prozent aller Stämme, starke Gasbildung. Gelatine-stich: Keine Verflüssigung. Wachstum bei den meisten Stämmen mehr gekörnt, bei den übrigen etwas schleimig. Drigalski: Rötliche Verfärbung des Nährbodens und rötliche Kolonien. Endo: Rötung des Nährbodens mit Fuchsinabscheidung, besonders stark an den Kolonienrändern. Gassner: Dunkelgrüne Kolonien, die bei manchen Stämmen einen fast metallischen Glanz hatten. Barfiekow: I. und II. (Trauben- und Milchsucker), sowie Hefsch-Lösung: In allen drei Nährböden Rötung und Gerinnung meist schon nach 18 Stunden. Azolithminlösung: Bei allen Stämmen nach höchstens drei Tagen ziegelrot. Chinablaulösung: Bei allen Stämmen verschieden stark blau, bis dunkelblau. Neutralrot-Agar-Schüttelkultur: Bei allen Stämmen schon nach 24 Stunden eine auffällige gelbgrüne Fluoreszenz mit stürmischer Gasproduktion. Kuhmilch, steril: Bei den meisten Stämmen schon nach 24 Stunden Gerinnung unter Auscheidung eines grobflockigen Kaseingerinnsels. Lackmusmilch, 7 Prozent: Dieser Nährboden wurde nur bei einem Teil der Stämme verwendet. Das Verhalten derselben war nicht bei allen gleich. Manche Stämme brachten diese Milch schon nach 14 Stunden unter vollständiger Entfärbung zur Gerinnung, wobei gleichzeitige Rötung von der Oberfläche aus einsetzte. Diese Rötung schritt langsam bis auf den Boden der Eprövetten fort und brauchte manchmal, um den Boden zu erreichen, sogar 10 Tage. Andere Stämme entfärbten die Lackmusmilch langsamer unter diffuser Rotfärbung und gleichzeitiger Gerinnung. Sämtliche Stämme bildeten Schwefelwasserstoff und Indol in verschiedener Stärke. Indolbildung konnte bei einigen Stämmen erst sehr verspätet festgestellt werden. Virulenzprüfung: Dazu verwendete ich nur weiße Mäuse. Diese erhielten 0,1 ccm einer 18 Stunden alten Bouillonkultur, intraperitoneal. Von den 24 Stämmen waren 19 im Stande, die Mäuse schon nach 12 bis 24 Stunden zu töten, während die restlichen fünf Stämme die Tiere nur stark krank machten.

Nach den vorstehenden Prüfungen auf verschiedenen

Nährböden müssen die gramnegativen Stäbchen, die aus dem Sekrete der Euter bei akuten Mastitiden erhalten wurden, in die Gruppe der Coli-Ärogenes-Bakterien eingereiht werden. Übereinstimmend mit Zwick und Weichel konnten keine Merkmale gefunden werden, die eine Einteilung in bestimmte Gruppen zuließen. Die Bakterien dürften auch nicht als eine besondere Art des Bacterium coli communae aufgefaßt werden. Schon Jentien hat das Bacterium coli communae bei einigen Mastitis-Fällen gefunden und auch durch Impfversuche bewiesen, daß dieser Mikroorganismus im Stande ist, eine Euterentzündung zu erzeugen. Er hält den Bacillus phlegmasiae uberis-Kitt und den Bac. Guillebeau-A mit dem Colibazillus identisch, welcher Ansicht ich mich anschließen möchte.

Wie die folgenden Ausführungen ersehen lassen, können die im Darmkanal vorkommenden Coli-Bakterien, die unter gewissen Bedingungen und Verhältnissen eine Virulenteigerung erfahren, nach ihrem Eindringen in die Milchwege, Anlaß zu auch feuchtenhaft auftretenden Mastitiden geben. In einem 24 Stück zählenden Rinderbestande traten nach Verfütterung von stark verdorbenen Rübenblättern schwere Darmentzündungen auf, an die sich bei 10 Kühen schwere akute parenchymatöse Mastitiden anschlossen. Die bakteriologische Untersuchung der Eutersekrete ergab in allen Fällen ein mit dem Bac. coli communae übereinstimmendes Bakterium. Der gleiche Bazillus konnte auch aus den Kotproben fast in Reinkultur erhalten werden. Futterwechsel, gründliche Stalldesinfektion und Zusammenstellen der mastitiskranken Tiere auf einen eigenen Standplatz, brachte die Euterseuche zum Stillstand. Die gleichen Verhältnisse konnte ich auch auf einem Gutshofe feststellen. Nach Errichtung einer eigenen Spiritusbrennerei war man zur Schlempefütterung übergegangen. In der ersten Zeit erkrankten zahlreiche Tiere an Enteritiden. Gleichzeitig häuften sich auch Mastitiden. Bakteriologisch konnten in den eingefandten Sekreten stets Coli-Bakterien gefunden werden, die mit den in den Kotproben von darmkranken Tieren morphologisch, kulturell und biochemisch übereinstimmten. Der Verlauf der Mastitiden war in diesem Bestande ein milder. Die akuten Entzündungsercheinungen gingen in der Regel nach 1—3 Tagen zurück und es stellte sich nach entsprechender Therapie wieder normale, wenn auch etwas verminderte Milchsekretion ein. Nach den kurz geschilderten feuchtenhaften Coli-Mastitiden ist der galaktogene Infektionsmodus mit virulent gewordenen Coli-Bakterien des Darmes als sicher anzunehmen, denn die Kühe erkrankten nie auf allen vier Euterviervierteln gleichzeitig, sondern wurden meist nur auf einem, höchstens zwei Vierteln ergriffen.

Morphologische, kulturelle und biochemische Untersuchungen der Stämme 20 bis 24.

Morphologie und Beweglichkeit: Gramnegative Coli-ähnliche Stäbchen, die nicht zur Fadenbildung neigen und lebhaft beweglich sind. Pferdefleischbouillon: Diffuse Trübung schon nach 18stündiger Bebrütung bei 37 Grad C. Bei längerem Brutfrankenaufenthalt bildet sich ein beim Schütteln zopfartig aufwirbelnder Bodensatz. Agarplatten: Uppiges Wachstum von stecknadelkopfgroßen, manchmal auch bedeutend größeren Kolonien, die im auffallenden Licht lichtgrau und bei durchfallendem Licht bläulich, opalisierend aussehen. Agarstich: Gutes Wachstum mit schleimigem Belag an der Oberfläche des Agars. Neutralrot-Agar, Schüttelkultur: Gasbildung, verschieden stark, unter gelblich-grüner Verfärbung des Nährbodens. Traubenzucker-Agar-Schüttelkultur 2%ig: Gutes Wachstum bei verschieden starker Gasbildung. Gelatine-stich: Kein so üppiges Wachstum als das der Stämme 1 bis 24. Keine Verflüssigung der Gelatine. Drigalskiplatte: Form der Kolonien wie auf gewöhnlichem Agar, Farbe blau unter Bläuung des Nährbodens. Fuchsin-Agar-Endo-Platte: Fast farblose Kolonien ohne Fuchsinabscheidung. Gassner-Platte: Uppiges

Wachstum von gelben Kolonien mit Gelbfärbung des Nährbodens. Barfiekow I: (Traubenzucker-Nutrofe-Lösung): Nach 24—36 Stunden Rötung und Gerinnung. Barfiekow II: (Milchzucker-Nutrofe-Lösung): Bleibt unverändert. Hetsch-Lösung: Nach 24—36 Stunden Rötung und Gerinnung. Azolithmin-Lösung: Der rötliche Farbton schlägt in blau um. Chinablau-Lösung: Allmähliche Entfärbung. Kuhmilch, steril: Keine Gerinnung, selbst nach drei Wochen dauerndem Brutschrankaufenthalt. Die weiße Milchfarbe ging in einen gelblich-weißen Farbton über. Lackmusmilch, 7%ig: Keine Gerinnung, der rötlich-blaue Farbton nahm nach ca. einer Woche einen schönen lichtblauen Farbton an. Die Stämme zeigten keine Indol-, wohl aber Bildung von Schwefelwasserstoff. Virulenzprüfung: Diese wurde an weißen Mäusen vorgenommen. $\frac{1}{10}$ ccm einer 18 Stunden alten Bouillonkultur von vier Stämmen tötete die Tiere. Der fünfte Stamm machte das Tier offensichtlich krank, doch erholte es sich wieder.

Nach den kulturellen und biologischen Eigenschaften stimmen die vorstehend untersuchten Mastitisstämme weitgehend mit dem Paratyphus-B-Bazillus und dem Bac. Enteritis Gärtner überein. Leider ist aus äußeren Gründen eine serologische Prüfung der Stämme auf ihr agglutinatorisches Verhalten gegenüber spezifischen Seris der Fleischvergiftergruppe unterblieben, wodurch allerdings der Wert der Ergebnisse meiner Untersuchungen bedeutend beeinträchtigt wird.

Nach den klinischen Befunden und dem Aussehen der Eutersekrete unterschieden sich die durch Bakterien aus der Paratyphusgruppe erzeugten Euterentzündungen wenig von den Coli-Mastitiden. Meine fünf Fälle hatten wohl einen schweren, nicht aber tödlichen Verlauf. Nur in einem Fall hatte das Sekret ein jaucheähnliches Aussehen. Auch Zwick und Weichel konnten bei ihren, in jeder Richtung exakten Untersuchungen, feststellen, daß der Paratyphus-B-Bazillus und seine Verwandten eine septische Mastitis mit jaucheähnlichem Aussehen des Sekretes nicht in jedem Fall hervorrufen müssen. Durch Infektionsversuche konnte je nach Menge des Infektionsmaterials ein nach dem klinischen Verlauf wechselndes Bild erzeugt werden.

Bei den von mir bis jetzt beobachteten fünf Fällen von Paratyphus-B-Mastitiden muß gleich den Coli-Mastitiden eine Infektion auf galaktogenem Wege angenommen werden, da eine Erkrankung aller vier Euterviertel nicht auftrat. Eine feuchthafte Ausbreitung der Paratyphusmastitiden konnte ich bis jetzt nicht feststellen. Eine durch Bakterien aus der Paratyphus-Gruppe bedingte Mastitis dürfte besonders gleich manchen Coli-Mastitiden auch durch Bakterien, die bei Darmentzündungen mit dem Kot ausgeschieden werden, hervorgerufen werden können, wie die folgenden Feststellungen und Tatsachen zeigen. Erkrankungen auf paratyphöler Grundlage bei Kälbern, durch den Bac. Enteritidis - Gärtner sind als Kälber - Paratyphus (Karsten) wohl bekannt. Über Erkrankungen der gleichen Art beim Großrinde ist trotz der häufigen Verseuchung der Kälberbestände wenig berichtet worden. Es ist das Verdienst Lütjes (5), darauf hingewiesen zu haben, daß nach seinen Beobachtungen Paratyphus - Gärtner - Infektionen häufiger auch beim erwachsenen Rinde, ja selbst in feuchthafter Form, besonders in Weidebezirken vorkommen können. Das klinische Bild wechselt je nach der Schwere der Erkrankung. Meist ist aber der Magen-Darm-Traktus in klinisch auffälliger Weise ergriffen. Leider hat er bei seinen Untersuchungen die Frage der Ausscheidung von Gärtner-Bazillen durch die Milch der erkrankten Tiere nicht berücksichtigt. Er gibt auch nicht an, ob Miterkrankungen der Euter auftraten. Für die Milchhygiene wären Untersuchungen in dieser Richtung sehr wertvoll, weil dadurch manche unaufgeklärt gebliebene Paratyphus-Befunde in Marktmilch ihre Erklärung finden könnten. So fanden Uhlenhuth und Hübener in 100 Marktmilchproben zweimal,

Hübener (6) in 70 Handelsmilchproben siebenmal und Klein in 39 Mischmilchproben neunmal den Bac. Enteritidis-Gärtner. Diese Befunde konnten weder durch eine primäre Euterinfektion, noch durch eine sekundäre Kontaktinfektion der Milch vom Tier oder durch den Menschen begründet werden.

Nach einem Bericht von Lehr (7) über eine durch den Bazillus - Enteritidis - Gärtner hervorgerufene feuchthafte Darmentzündung in einem Rinderbestande, gelang der Nachweis dieser Bakterien im Kot, im Harn und auch tatsächlich in der Milch.

Über das Vorkommen von Paratyphus-Bazillen im Kot von Großrindern bei Darmerkrankungen mit diarrhöischen Entleerungen habe ich einige Untersuchungen anstellen können; in zwei Dörfern mit sumpfigen Weiden, die in einem Überschwemmungsgebiete liegen, traten feuchthafte Darmerkrankungen auf. Die Untersuchung der eingefandten Kotproben ergab für Magen-Darmparasiten ein negatives Resultat. Die bakteriologisch-kulturelle Prüfung ergab bei drei von fünf eingefandten Proben, die von Tieren verschiedener Besitzer stammten, reichlich Bakterien der Paratyphus-Gruppe. Die Reinkulturen töteten weiße Mäuse nach 16 bis 48 Stunden.

Gleiche Befunde konnte ich noch bei zwei Kotproben von Rindern mit unstillbarem wässerigen Durchfall aus einer anderen Gegend erheben. Wenn auch mit den aus den Kotproben gezüchteten Stämmen, die zur endgültigen Differenzierung notwendigen serologischen Prüfungen nicht durchgeführt werden konnten, so sprach die negative Indolprobe und die Pathogenität für weiße Mäuse doch für Vertreter aus der Paratyphus-Gruppe.

Nach den Untersuchungen Lütjes, Lehrs und eigenen Feststellungen kommen somit auch beim erwachsenen Rind Paratyphus-Erkrankungen vor. Nach Lehr können Paratyphus-Bakterien auch durch die Milch ausgeschieden werden. Es muß somit damit gerechnet werden, daß solche Tiere auch nach der Genesung Dauerausseider bleiben können. Durch besondere, prädisponierende Momente könnte dann plötzlich eine Mastitis der gleichen Ätiologie zustandekommen. Jedenfalls wären Untersuchungen in der angegebenen Richtung angezeigt.

Zusammenfassung.

Bei 29 akuten Mastitisfällen wurden 24-mal Coli-Bakterien und fünfmal Bakterien aus der Paratyphusgruppe gefunden. Die bei Mastitis ermittelten Coli-Bakterien unterschieden sich nach ihrem morphologischen, kulturellen und biochemischen Verhalten in keiner Weise von dem Bac. coli commune.

Die Coli-Bakterien können gelegentlich auch ein feuchthafes Auftreten von Euterentzündungen hervorrufen; in solchen Fällen dürften hochvirulent gewordene Bakterien des Darmes die Ursache sein. Durch die Bakterien der Paratyphus-Gruppe wird nicht immer eine besondere Mastitis-Form erzeugt, die bei der klinischen Untersuchung als septische Mastitis zu diagnostizieren ist. Das Aussehen des Sekrets und der klinische Verlauf kann mit der durch Coli-Bakterien erzeugten Mastitis übereinstimmen.

Weitere Untersuchungen über die Verbreitung von Paratyphus-Erkrankungen bei Großrindern wären zur Klärung der Mastitis-Frage in milchhygienischer Beziehung angebracht.

Schrifttum.

1. Standfuß, R.: Bakteriologische Fleischschau, Berlin 1922
2. Zwick und Weichel: Bakteriologische Untersuchungen über die

Erreger der Mastitis acuta des Rindes mit bef. Berücksichtigung der Beteiligung von fog. Fleischvergiftungen an der Entstehung der Krankheit. Arb. aus dem Kaiserl. Gesundheitsamt, Bd. XXIV, Heft 4, 1910. 3. Herrlich, H.: Beitrag zur Kenntnis der Erreger der Mastitis parenchymatosa acuta des Rindes. Dissert. Wien, 1913. 4. Rudolf, J.: Über die Verbreitung der Mastitiden unter den Melkviehbeständen Niederösterreichs, deren rechtzeitige Erkennung, Bekämpfung und wirtschaftliche Bedeutung. D. ö. Tzt. W. 1927, 1.—2. 5. Lütje: Paratyphus-Erkrankungen durch das B. ent. Gaertneri bei erwachsenen Rindern. D. T. W. 1926, 24—25. 6. Lehr: Über eine durch den Bacillus enteritidis Gärtner hervorgerufene feuchthafte Darmentzündung in einem Rinderbestande. B. T. W. 1927, 17. 7. Uhlenhuth, Hübener, Klein, Ernst: Grundriß der Milchhygiene f. Tzt., Stuttgart 1926.

Diagnose und Bekämpfung der Virusschweinepest.¹⁾

Von Dr. W. Geiger, Eystrup (Wefer).

Wenn wir die amtliche Statistik über Schweinefeuche und Schweinepest aufmerksam verfolgen und die halbmonatlich vom Reichsgesundheitsamt veröffentlichten Seuchenziffern zu Kurven zusammenfügen, so genügt ein Blick, um uns zu zeigen, daß in der Verbreitung der Schweinepest eine gewisse Gefetzmäßigkeit herrscht. Im großen und ganzen laufen nämlich die Kurven der einzelnen Jahre miteinander parallel und zwar derart, daß jeweils in den Monaten März/Mai ein Tiefstand besteht, von dem aus etwa im Juni ein mehr oder weniger scharfer Anstieg beginnt, der seinen Höhepunkt stets im September/November erreicht. Diese Beobachtung trifft zu sowohl für Deutschland in allen Jahren nach dem Kriege als auch für andere Länder, in denen die Virusschweinepest stark herrscht, z. B. Ungarn, Tschechoslowakei, Jugoslawien usw. Die Tatsache, daß im laufenden Jahre 1927 die Zahl der verfeuchten Bestände von ihrem tiefsten Punkt 372 am 15. Mai auf 387 am 1. Juni, 447 am 15. Juni und 504 am 1. Juli gestiegen ist, läßt im Zusammenhang mit den angegebenen Erfahrungen der früheren Jahre auf eine erhöhte Zunahme der Virusschweinepest in den kommenden Wochen und Monaten schließen.²⁾ Die rechtzeitige Erkennung und Bekämpfung dieser gefährlichsten Schweinefeuche erscheint daher als ein Gebot der Stunde.

Die Diagnose der Virusschweinepest liegt, da alle mikroskopischen, kulturellen und serologischen Methoden bisher verfaßt haben, vor allem in der Hand des Tierarztes in der Praxis. Sie muß sich notwendigerweise aufbauen auf den klinischen und pathologisch-anatomischen Symptomen. Die klinische Diagnosestellung bereitet bekanntlich beim Schwein oft erhebliche Schwierigkeiten, besonders in Einzelfällen oder in kleinen Beständen. Deshalb sind die epidemiologischen Verhältnisse weitgehendst zu berücksichtigen. Durch geschickte Aufnahme des Vorberichtes ist festzustellen, ob und wann im Bestande die Rotlaufimpfung durchgeführt wurde, ob Tiere zugekauft sind, ob Fleisch- und Küchenabfälle verfüttert wurden usw.

Beim pestkranken Tier bestehen die ersten Erscheinungen gewöhnlich im Nachlassen der Munterkeit, in Teilnahmslosigkeit, Schlaffucht, verminderter Freßlust, schlaffer Körperhaltung, Verkriechen, langsamen Bewegungen. Bald treten Schwellung der Augenlider und Ausfluß aus den Augen auf. Eine Unterscheidung der Virusschweinepest von anderen Krankheiten, z. B. dem Rotlauf, ist in diesem Stadium schlechterdings unmöglich. Wertvolle Anhaltspunkte bietet jetzt die Temperaturnahe bei möglichst vielen Schweinen der gleichen Bucht oder des Bestandes. Sie dient dazu, im Inkubationsstadium befindliche Schweine frühzeitig zu ermitteln und gibt Aufschluß über die Verbreitung der Seuche innerhalb des Bestandes. Dabei sind Temperaturen zwischen 40,5° C und 41,5° C gerade bei Virusschweinepest außerordentlich häufig zu treffen, während hohes Fieber bis zu 42° C und darüber meist nur bei Rotlauf beobachtet wird. Klinisch seit längerer Zeit erkrankte Tiere sind dagegen oft fieberfrei, haben bisweilen sogar subnormale Temperatur, was auf den bevorstehenden Exitus

hinweist. Im weiteren Verlauf der Erkrankung kommt es oft zur Ausbildung von charakteristischen Hautveränderungen in Form von linsen- bis pfennigstückgroßen Blutungen, vornehmlich an den Ohren, an den Schenkeln und am Bauch, oder aber in Form von rundlichen oder viereckigen Papeln und Quaddeln, die sich von Backsteinblättern manchmal schwer unterscheiden lassen, vielfach aber im Gegensatz zu diesen zur Krusten- und Schorfbildung neigen und als pockenartiger Hautauschlag bekannt sind. Die diffuse Rötung der Haut, die so gerne zur Diagnose Rotlauf verleitet, beruht auf Störungen der Herzfunktion, ist also eine Stauungserscheinung und unterscheidet sich durch ihre schmutzigblau- bis graurote Färbung von den hell-, himbeer- oder kupferroten Hautveränderungen beim Rotlauf, die durch eine entzündliche aktive Hyperämie erzeugt werden. Zu den angegebenen Symptomen tritt meist frühzeitig, nachdem in den ersten Tagen Verstopfung bestanden hat, ein dünnbreiiger bis wässriger Durchfall von graugrüner bis graugelber, bisweilen blutiger Farbe. Zuweilen wird Erbrechen, vereinzelt einmal Nasenbluten beobachtet. Mit zum Bilde der reinen Virusschweinepest gehört vielfach eine Erkrankung der Lungen, die sich in Nasenausfluß, Husten und Atembeschwerden äußert und zur Beschleunigung des Krankheitsverlaufes in hohem Maße beitragen kann. Die in solchen Fällen oftmals gestellte Diagnose „Schweinefeuche“ oder „Mischinfektion“ führt meist auf Abwege. Gegen Ende der Erkrankung treten Schwanken in der Nachhand, manchmal auch Zwangsbewegungen, Zittern, Muskelzuckungen auf, bis die Tiere unfähig sind, sich zu erheben oder aufrechtzuhalten. In manchen Fällen gelingt es, durch Kombination der verschiedensten oben angeführten Symptome bei einem oder mehreren Tieren des Bestandes die Diagnose zu sichern, meist ist aber dazu der Nachweis pathognostischer Organveränderungen an einem verendeten oder geschlachteten Tier nötig.

Wählt man dazu, wie üblich, eines der am schwersten erkrankten Schweine aus, so wird man oft enttäuscht sein über den so gut wie negativen pathologisch-anatomischen Befund, der mit den ausgesprochenen klinischen Veränderungen im schärfsten Widerspruch steht. Der Charakter der Virusschweinepest als hämorrhagische Septikämie tritt jetzt deutlich zu Tage. Dem aufmerksamen Beobachter fallen zunächst bestimmte Veränderungen an den Organ- und Körperlymphknoten auf. Sie sind z. T. geschwollen, serös infiltriert und peripher gerötet. Neben makroskopisch völlig unveränderten Lymphknoten finden sich andere, die am Rande und im Verlauf der Septen schwarzrot verfärbt sind und so ein marmoriertes Aussehen aufweisen, im Gegensatz zum Rotlauf, wo die Lymphknoten wenig vergrößert, saftreich und in toto von blaugrauer Farbe sind. Besonders häufig sind nach unseren Beobachtungen die Nieren-, Lungen-, Leber- und inneren Darmbeinlymphknoten betroffen, weniger häufig die Mesenteriallymphknoten. In den Kehlgangslymphknoten finden sich sehr oft stippchenförmige Blutungen. All diese Veränderungen sind so charakteristisch, daß ihr Nachweis allein in Verbindung mit dem klinischen Befund zur Diagnose Virusschweinepest schon genügt. Jedenfalls sollten sie aber Veranlassung geben, an anderen Or-

¹⁾ Rundfunkvortrag vom 23.-Juli 1927.

²⁾ Der Höchststand mit 1053 verfeuchten Gehöften wurde am 15. November erreicht.

ganen nach Veränderungen zu suchen, die sich auch meist finden werden. So treten etwa in drei Viertel aller Fälle in den Nieren, die im Gegensatz zum Rotlauf makroskopisch nicht vergrößert und blaß sind, oft nur vereinzelte, oft sehr zahlreiche punktförmige Blutungen auf. Sehr häufig finden sich ferner Blutungen am Kehledeckel und in der Stimmritze des Kehlkopfes. In zwei Drittel aller Fälle treffen wir eine katarrhalische Entzündung des Magen-darmtraktes, die vielfach verbunden ist mit Blutungspunkten in die Schleimhaut, besonders am analen Ende des Mastdarms. Die Milz ist entgegen den Verhältnissen beim Rotlauf kaum einmal geschwollen, dafür aber in etwa 30 Prozent der Fälle mit unregelmäßigen dunkelroten hämorrhagischen Infarkten am Hylus ausgestattet, die für die Viruschweinepest außerordentlich charakteristisch sind. Häufig findet sich eine schwarzrote Färbung des Knochenmarkes. Besonders typisch sind ferner die meist punktförmigen Blutungen an den Organen, auf den Schleimhäuten und serösen Häuten. Betroffen davon sind vornehmlich das Herz, am linken Ventrikel und Herzrohr, die Lungen unter der Pleura, weniger häufig die Harnleiter, die Blase, die Gallenblase, das Brustfell und Zwerchfell, selten die Muskulatur. An der Leber finden sich makroskopisch kaum einmal Veränderungen. In vorgeschrittenen Fällen kommt es öfter zu hämorrhagischen Entzündungen der Schleimhaut des Magens, Dünn- und Dickdarms und der Blase. Der akuten Viruschweinepest sind ferner zuzurechnen die kruppös-hämorrhagischen nekrotisierenden Pneumonien, die in manchen Seuchengängen geradezu vorherrschen. Oft sind nur einzelne Lobuli ergriffen, die dann als pralle, dunkelrote, saftreiche Herde über das umgebende Lungengewebe hervorragen. Bei längerdauernder Erkrankung kommt es unter der Einwirkung der verschiedensten Sekundärbakterien zu ausgedehnteren hämorrhagischen Pneumonien, die Neigung zur Bildung multipler Nekrosen haben. Nicht zu verwechseln sind damit die bei den meisten Schweinen in den Spitzenlappen anzutreffenden bronchopneumonischen Prozesse, die auf Haltungs- und Fütterungsfehler im jugendlichen Alter zurückzuführen sind. Es mag auffallen, daß bei der vorstehenden Aufzählung der häufigsten und auffälligsten pathologischen Symptome der Viruschweinepest die bekannten Boutons im Dickdarm noch nicht erwähnt sind! Betrachtete man doch lange Zeit die Viruschweinepest als eine ausgesprochene Darmerkrankung. Das dem nicht so ist, haben neuere Untersuchungen mit aller Deutlichkeit gezeigt. Die diphtheroiden Prozesse im Darm sind nach unseren Beobachtungen relativ selten. Wir konnten sie nur in etwa 10 bis 12 Prozent nachweisen als Ausdruck einer länger bestehenden, subakuten bis chronischen Erkrankung. Sie treten bekanntlich in drei Formen auf und zwar als diffuse diphtheroide Entzündung, dann als Übergang in Form der bandförmigen diphtheroiden Entzündung und schließlich als umschriebene, konzentrisch geschichtete Einzelherde, vornehmlich an der Hüft-Blinddarmkappe, als sog. Boutons. Für die Viruschweinepest sind diese diphtheroiden Prozesse zwar außerordentlich charakteristisch und sichern schon im Einzelfalle die Diagnose. Es wäre aber verfehlt, von ihrem Nachweis, wie es leider noch häufig geschieht, die Diagnose Viruschweinepest abhängig zu machen.

Bei sorgfältiger Beachtung der angegebenen hauptsächlichsten klinischen und pathologisch-anatomischen Symptome wird es in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle möglich sein, die Diagnose Viruschweinepest zu stellen. Für die Abgrenzung des Rotlaufs, die unter Umständen Schwierigkeiten bieten kann, steht uns letzten Endes die einfach auszuführende bakteriologische Untersuchung zur Verfügung, sofern nicht neben den anderen differential-diagnostisch wichtigen Merkmalen die kurze Inkubation und der schnelle Verlauf der Erkrankung beim Rotlauf genügend Anhaltspunkte bieten.

Hand in Hand mit der Feststellung der Seuche im infizierten Bestand gehen die Maßnahmen, die der Vorbereitung der späteren ätiologischen Bekämpfung dienen. Wie sich diese im Einzelfalle zu gestalten hat, sollen die folgenden Ausführungen zeigen. Neben der Durchführung der veterinärpolizeilichen Bestimmungen ist die Anwendung des spezifischen Immunserums vornehmlich geeignet, den Seuchengang innerhalb des Gehörtes wirksam zu bekämpfen.

Das aus Schweinen durch Hyperimmunisierung mit virulentem Blut pestkranker Tiere gewonnene Immunserum gegen Viruschweinepest hat in der Hauptsache prophylaktische Wirkung. Der Schutz, der durch die intramuskuläre Injektion des artgleichen Serums erzielt wird, dauert nach unseren Beobachtungen etwa 14 Tage bis drei Wochen. Die Heilwirkung des Serums ist gering, wie das bei der deletären Wirkung des Virus auf den Gesamtorganismus nicht anders zu erwarten ist. Trotzdem gelingt es, durch rechtzeitige Anwendung erhöhter, mindestens doppelter, Serumdosen bei Tieren im Inkubationsstadium und in den ersten Fiebertagen vielfach völlige Genesung und Immunität herbeizuführen.

Diese Erfahrungstatsachen sind es, die für die Bekämpfungsmethoden im einzelnen wegweisend sind.

Im infizierten Bestand ist das erste Erfordernis, sich über den Grad der Ausbreitung der Seuche einen Überblick zu verschaffen, soweit das nicht schon gelegentlich der Diagnosestellung geschehen ist. Der Erfolg der Schutz- bzw. Notimpfung mit Serum hängt in erster Linie davon ab, daß die Seuche nicht allzuweit vorgeschritten ist. Es ist also zunächst notwendig, sich darüber zu informieren, wann die ersten Krankheitserscheinungen bemerkt wurden, wann die ersten Todesfälle auftraten und wieviel Tiere des Bestandes bereits verendet sind. Hat man so den sog. Mortalitätsindex festgelegt, so wendet sich die Aufmerksamkeit zweckmäßigerweise den klinisch erkrankten Tieren zu, deren Zahl (Morbiditätsindex) gleichfalls zu errechnen ist. Wie hoch diese Zahl auch sein mag, es muß, so hart es klingt, unbedingt die Abchlachtung sämtlicher offensichtlich kranken Schweine gefordert werden. Wir kennen bisher kein Mittel, klinisch kranke Tiere zu heilen. Das gelingt weder mit noch so hohen Dosen hochwertigen Immunserums, das schließlich am ersten dazu berufen wäre, noch mit anderen angeblich spezifischen und unspezifischen Mitteln. Das in letzter Zeit empfohlene Introcid ist nach unseren Versuchen³⁾ völlig wirkungslos, selbst bei ganz leicht und nur fieberhaft erkrankten Tieren. Der Prozentsatz der durch Tod und Abchlachtung ausgeschiedenen Tiere gibt wertvolle Fingerzeige, was von der Impfung zu erwarten ist: je geringer er ist, desto besser die Erfolge der Serum-Schutz- und Notimpfung. Am günstigsten liegen die Aussichten, wenn nicht mehr als 5—10% erkrankt oder verendet sind. Es wäre nun falsch, sofort zur Durchführung der Impfung zu schreiten. Denn wahren Aufschluß über die Verbreitung der Pest im Bestande gibt uns erst die Temperaturmessung bei den übrigen gesund erscheinenden Schweinen. Sie sollte nicht unterlassen werden, so unbequem, anstrengend und zeitraubend sie auch ist. Dabei sind Beunruhigungen und Aufregungen der Tiere nach Möglichkeit zu vermeiden, da dadurch leicht bei vielen Tieren eine vorübergehende Erhöhung der Mastdarmtemperatur herbeigeführt werden kann, die zu Trugschlüssen Veranlassung gibt. Bei Schweinen über 1 Zentner sind Temperaturen von 40,0° C ab, bei Ferkeln und Läufern Temperaturen von 40,5° C ab als fieberhaft zu bezeichnen. Im allgemeinen werden durch die Temperaturaufnahme alle die Tiere ermittelt, bei denen die Infektion vor mindestens 4—5 Tagen eingetreten ist. Handelt es sich nur um wenige, schlachtreife Tiere, mit hohem Fieber, so wird man zweckmäßigerweise zur Schlachtung

³⁾ Meyer, D. T. W. 1927, S. 846.

schreiten. Ist die Zahl der fieberhaft erkrankten Schweine jedoch beträchtlich, und sind vorwiegend Ferkel und Zucht-tiere betroffen, so ist der Versuch der Heilimpfung angezeigt. Dazu sind natürlich erhöhte, mindestens doppelte Dosen hochwertigen Serums zu verwenden. Die intravenöse Applikation kann dabei nur von Vorteil sein. Sie ist bei etwas Übung leicht durchführbar und mit Nachteilen, abgesehen von vorübergehenden Unruheerscheinungen, die durch den Karbolgehalt des Serums hervorgerufen werden, nicht verbunden. Es darf nun nicht erwartet werden, daß die Heilimpfung fiebernder Tiere in jedem Falle zum Erfolge führt. Schon länger infizierte, hoch fieberhaft erkrankte oder von vornherein wenig widerstandsfähige Tiere können der Infektion trotzdem erliegen. Meist aber feuchen rechtzeitig geimpfte Tiere unter mehrtägigem Fieber und leichten klinischen Erscheinungen durch und erwerben, was als besonderer Vorzug zu buchen ist, aktive Immunität.

Es bleibt jetzt noch die dritte Gruppe der fieberfreien gefunden Tiere. Sie werden mit einfachen Dosen der Notimpfung unterzogen. Natürlich muß damit gerechnet werden, daß bei dem einen oder anderen Tier dieser Gruppe die Infektion ebenfalls schon stattgefunden hat, trotzdem die Temperatur noch normal erscheint. Vom Eintritt des Erregers bis zum ersten Fieber vergehen ja mindestens drei bis vier Tage. Hochwertiges Serum in genügender Dosierung und hinreichende natürliche Abwehrkräfte des Organismus vorausgesetzt, ist ein geringer Vorsprung der Infektion in dieser noch symptomlosen Form keineswegs ein Nachteil, da dann mit dem Eintritt aktiver Immunität unter Serumschutz eher gerechnet werden kann. Die reine Schutzimpfung bei völlig gefunden Tieren, die die Möglichkeit zur Infektion noch gar nicht hatten, bewirkt nur kurze passive Immunität und läßt vielfach trotz nachträglicher Virusaufnahme eine langdauernde aktive Immunität nicht eintreten. Andererseits ist eine Superinfektion, wie sie im ständigen Zusammensein mit kranken Tieren im verseuchten Stall gegeben ist, geeignet, auch ursprünglich kräftigen, im Abflauen begriffenen, Serumschutz zu durchbrechen. Deswegen muß stets nach 10—12 Tagen gründliche Reinigung und Desinfektion des Stalles erfolgen.

Die Durchführung der Serum-Schutz- und -Notimpfung in infizierten Beständen darf also keineswegs rein schematisch geschehen. Wohl können allgemeine Richtlinien angegeben werden. Jeder Fall verlangt jedoch seine spezifische Beurteilung und Behandlung. In den letzten fünf Jahren, 1922 bis 1926, sind in der Praxis zahlreiche Impfungen unter den verschiedensten Bedingungen durchgeführt worden. Die Erfolge waren jederzeit zufriedenstellend, sofern nur die oben gegebenen Richtlinien eingehalten und die besonderen Erfordernisse berücksichtigt wurden. Wir hatten zudem Gelegenheit, in einer Anzahl von verseuchten Beständen die Ausführung der Impfung und den weiteren Verlauf des Seuchenganges selbst zu beobachten. Die Ergebnisse sind in den Arbeiten aus dem Reichsgesundheitsamt von Uhlenhuth und Mießner unter dem Titel „Die Bekämpfung der Virus Schweinepest durch Serumimpfung“ vor etwa 1 Jahre veröffentlicht worden. Sie zeigen, daß es bei Beachtung der angegebenen Gesichtspunkte gelingt, mit der Serumimpfung den Seuchengang rasch und wirksam zu kupieren.

Neuerdings sind wir dazu übergegangen, in infizierten Beständen an Stelle der Serumimpfung die Simultanimpfung anzuwenden. Die Simultan-Impfung besteht bekanntlich darin, daß den Tieren neben der üblichen oder höchstens um ein geringes erhöhten Serummenge gleichzeitig an einer anderen Körperstelle, meist hinter dem Ohr, 1 bis 2 ccm Virus in Form von filtriertem Serum oder defibriniertem Blut eines pestkranken Tieres einverleibt werden. Sie wird in Amerika seit mehr als 20 Jahren als Schutzimpfung, ähn-

lich wie bei uns die Rotlaufimpfung, bei gefunden Schweinen gefunder Bestände mit bestem Erfolg durchgeführt, und hat die Serumimpfung fast völlig verdrängt. Wir haben in den letzten Jahren in unseren Versuchsstallungen die Simultanimpfung ebenfalls bei mehreren Tausenden von Schweinen angewandt und konnten dabei im großen und ganzen die Erfahrungen der Amerikaner usw. bestätigen. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Impflinge tritt etwa am fünften Tage eine fieberhafte Reaktion auf, die gewöhnlich eine Woche anhält, um dann wieder abzuklingen. Alle auf diese Weise durchgefeuchten Schweine haben sich nach unseren Beobachtungen ausnahmslos dauerhaft immun erwiesen. Ein ideales Verfahren also, wenn es nicht auch seine Nachteile hätte, wie jede biologische Methode. Bei einem von vornherein nicht zu bestimmenden Prozentsatz der simultangeimpften Schweine kommt es nämlich zu mehr oder weniger schweren Erkrankungen mit ausgeprägten klinischen Erscheinungen, die sich in nichts von denen bei sonstigen natürlichen Pestfällen unterscheiden und statt zur Genesung und Immunität zum Tode führen können. Die Ursache für den ungünstigen Ausgang bei dem einen oder anderen Impfling läßt sich natürlich schwer feststellen. Neben minderwertigem Serum, zu geringer Dosierung des Serums, zu kräftigem Virus sind vor allem Rasse und Alter des Tieres, Widerstandsfähigkeit, Fütterung, Haltung und Pflege, Stallverhältnisse, Witterung usw. verantwortlich zu machen. Auf alle Fälle ist die Simultanimpfung nicht ungefährlich, schon deshalb nicht, weil die Impflinge während der etwa eine Woche dauernden Reaktion ständig durch Kot und insbesondere Urin Virus ausscheiden und so zur Verbreitung der Seuche beitragen können. In gefunden Beständen kommt die Simultanimpfung deshalb in Deutschland aus veterinärpolizeilichen Gründen nicht in Frage. Anders liegen die Verhältnisse in verseuchten Beständen.

Hat die reine Serumimpfung den Zweck, die noch gefunden Tiere vor der Infektion zu schützen, so ist es das Ziel der Simultanimpfung, alle Tiere des Bestandes möglichst milde, gleichmäßig und rasch durchfeuchen zu lassen. Diese im gewissen Sinne künstliche Infektion kann, wie gesagt, Verluste mit sich bringen, sie führt aber zu sicherer aktiver Immunität, was bei der reinen Serumimpfung trotz gelegentlicher Aufnahme des Virus per os selten der Fall ist, so daß also nach Ablauf des Serumschutzes neue Erkrankungen auftreten können, die eine nochmalige Impfung nötig machen und den Seuchengang erheblich verlängern. Es kommt weiter hinzu, daß in der Praxis die Diagnosestellung vielfach erst zu einer Zeit erfolgt, wo schon mehr als 10 bis 20 Prozent des Bestandes erkrankt oder verendet sind, wo also die Voraussetzungen für die reine Serumimpfung weniger günstig liegen. Eine sichere Diagnose ist selbstredend für die Simultanimpfung mindestens ebenso conditio sine qua non, wie für die reine Serumimpfung, da sonst durch die künstliche Infektion mit lebendem Virus unermesslicher Schaden angerichtet werden kann. Wir sind deshalb gerne einer dankenswerten Anregung von Herrn Ministerialrat Wiemann vom preussischen Landwirtschaftsministerium gefolgt, zunächst nur jeweils das Virus aus dem betreffenden verseuchten Bestande zu verwenden. Für die Durchführung der Simultanimpfung ist vorläufig ein beschränkter Bezirk Nordwestdeutschlands freigegeben, der von dem Eystruper Institut leicht erreicht werden kann. Die Impfung wird dann in Anwesenheit eines auf Anforderung vom Institut entsandten Sachverständigen durchgeführt. Das Vorgehen ist zunächst das gleiche, wie oben bei der Serumschutzimpfung erörtert. Die offensichtlich erkrankten Tiere werden geschlachtet. Von einem oder mehreren akut erkrankten Schweinen wird unter möglichst sterilen Kautelen bei der Schlachtung Blut gewonnen und sofort in ausgekochten Gefäßen oder in eigens mitgebrachten Apparaten defibriniert. Es dient später als Virus für die Simultanimpfung. Nach Temperaturentnahme bei den üb-

rigen Schweinen werden die fieberhaft erkrankten mit erhöhten Dosen heilgeimpft, sofern nicht aus oben dargelegten Gründen, die Schlachtung vorgezogen wird. Die fieberfreien Schweine werden jetzt der Simultanimpfung unterzogen. Nach der Impfung ist auf sorgfame Haltung und Pflege besonderer Wert zu legen. Die Fütterung soll kurz vor und die ersten 14 Tage nach der Impfung knapp sein, indem etwa die Hälfte des sonst gegebenen Futters gereicht wird. Natürlich sollte nicht unterlassen werden, den Besitzer vorher über die Möglichkeit des Eintritts von Verlusten unter den Impfungen entsprechend aufzuklären.

Wir haben bis jetzt die Simultanimpfung unter den verschiedensten Bedingungen in sieben kleineren und größeren Beständen durchgeführt. Die Verluste durch Tod betrugen 5,3, 7,1, 12,2, 16,3, 33,3, 44,4 und 59,3 Prozent. Die Bestände waren also teilweise schon sehr schwer und lange verfeucht. Das geht auch aus der Zahl der klinisch und fieberhaft erkrankten Tiere hervor, die in fünf Beständen zwischen 5 und 58,3 Prozent schwankte. Diese Tiere wurden entweder geschlachtet oder heilgeimpft, während die ge-

funden und fieberfreien Tiere der einzelnen Bestände simultangeimpft wurden. In vier Beständen sind Verluste unter den simultangeimpften Tieren nicht aufgetreten, in den drei übrigen Beständen fielen nur wenige, von vornherein schwächlichere Tiere aus, so daß sich der Gesamtverlust auf 2,9 Prozent belief. Bei der Mehrzahl der simultangeimpften traten nur geringe Reaktionen auf, die sich klinisch hauptsächlich im vorübergehenden Nachlassen der Freßlust und Munterkeit in der zweiten Woche äußerte. Nach etwa drei bis vier Wochen hatten, abgesehen von einzelnen Tieren, sämtliche überlebenden Schweine durchgefeucht und aktive Immunität erworben.

Die Simultanimpfung kann nach den vorliegenden Versuchen im verfeuchten Bestände mit Vorteil zur Anwendung kommen. Sie wird in vielen Fällen die reine Serumimpfung ersetzen und übertreffen. Welche von den beiden Methoden im Einzelfalle zweckmäßig anzuwenden ist, hängt jeweils von den besonderen Umständen ab. Im Rahmen der durch die Natur gezogenen Grenzen ist mit beiden Methoden eine wirkfame Bekämpfung der Virus Schweinepest möglich.

Zur Bekämpfung der „Weißen Ruhr“ der Küken.

Von Dr. Alexander Sokolowsky, Hamburg.

(Mit 1 Abbildung.)

Unter den Geflügelkrankheiten, welche den Erfolg der deutschen Geflügelzucht erschweren, steht zur Zeit die „Weiße Ruhr“ der Küken oben an. Es bedarf heute keines Zweifels mehr, daß die deutsche Geflügelzucht auf dem Wege ist, sich zu wirtschaftlicher Bedeutung zu entfalten. Früher ein Stiefkind des Landwirtes, das im landwirtschaftlichen Betriebe nur eine Nebenrolle spielte, oft nur geduldet wurde, hat er seit einer Reihe von Jahren erkannt, daß der Geflügelzucht gleich den anderen Zweigen der Tierzucht ein hoher wirtschaftlicher Wert zukommt. Voraussetzung für den Erfolg ist aber dabei, daß diese Tierzuchtspezialität den Errungenschaften der Neuzeit auf dem Gebiete der Tierzucht entsprechend durchgeführt wird. Das erstreckt sich nicht allein auf die wirtschaftlich gesunde Fundierung des Unternehmens, sondern auch auf die tierzüchterischen und sanitären Maßnahmen bei der Haltung und Aufzucht des Geflügels, sowie auf die der neuzeitlichen Erfahrung entsprechenden technischen Einrichtungen der Geflügelfarm. Ohne auf diese Forderungen, deren Erfüllung eine rentable Geflügelzucht gewährleisten, weiter einzugehen, möchte ich dennoch an dieser Stelle vor meinen Auseinandersetzungen über das von mir zu behandelnde Thema auf die Wichtigkeit derselben hingewiesen haben.

Herr Professor Dr. Mießner hat in seiner Arbeit über das Thema „Die Bekämpfung der Weißen Ruhr der Küken“ im „Archiv für Geflügelkunde“ mit Recht hervorgehoben, daß die Massenzusammenhaltung von Geflügel, wie sie in der Farm besteht, die Seuchengefahr besonders erhöht. Nach dem genannten Gelehrten wurde für die „Kükenruhr“ bisher bei uns in Deutschland ebenso wie in Amerika in allen Fällen sowohl in den Eiern wie in den kranken Küken das Bacterium pullorum und zwar in einer in Traubenzucker teils gaslosen, teils gasbildenden Form festgestellt. Es ist damit erwiesen, daß der Erreger dieser kükenmordenden Krankheit, wie es in Amerika zum Schaden der Geflügelzüchter konstatiert wurde, mit demjenigen, der unsere deutschen Zuchten heimsucht, identisch ist. Aufgabe unserer Tiermedizin ist es daher, diese Seuche mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpfen. So außerordentlich wichtig und notwendig die therapeutische Wegrichtung zur Bekämpfung dieser Seuche gewertet werden muß, so bedarf es meines Erachtens nicht minder der prophylaktischen Einstellung zur Abwehr der Seuchengefahr. Es kann doch

nicht unsere höchste Aufgabe sein „zu behandeln“, sondern wir sollen in erster Linie versuchen „zu verhüten“. Prophylaktisch-hygienischen Maßnahmen spreche ich die größte Bedeutung bei der Bekämpfung der „Weißen Ruhr der Küken“ zu. Um diese meine Ansicht zu begründen, möchte ich folgende Erwägungen bekannt geben:

Das Grassieren der Seuchen bei unseren Haustieren ist eine Folge ihres „Haustierzustandes“. Das wilde Tier in freier Wildbahn wird unter natürlichen Lebensverhältnissen nicht, oder nur durch Infektion von unseren Haustieren von diesen Seuchen heimgesucht. Woher kommt das? Das wilde Tier ist mit allen Fasern seines Seins auf das innigste — den biologischen Verhältnissen seines Lebensraumes angepaßt. Dieser „Naturschutz“, den dasselbe mit auf den Lebensweg von Seiten der Natur erhält, erstreckt sich nicht nur auf die Abwehr äußerer schädigender Einflüsse, sondern auch auf die inneren Lebensvorgänge des Organismus. Namentlich ist es die der betreffenden Tierart entsprechende natürliche Ernährung, diese im weiten Sinne des Wortes gefaßt, die einen normalen Ablauf der physiologischen und chemischen Vorgänge im Körper gewährleisten. Bei der Aufnahme der Nahrung werden nicht nur Nährsubstanzen dem Körper zugeführt, sondern auch die Lebensenergie erhaltenden, die Lebensfunktionen aufrecht erhaltenden und regulierenden Stoffe, außerdem auch solche, denen eine prophylaktische Bedeutung zukommt. Ist es auf der einen Seite vitaminreiche Nahrung, so bilden sich im Körper auf der anderen Seite Antitoxine; um die schädigenden Wirkungen von pathogenen Bakterien und der von ihnen gebildeten Toxine zu verhindern. Tausendfältig sind die Beziehungen der Lebewesen zur Umwelt, nicht minder mannigfaltig die Einwirkungen dieser auf die Tierwelt. Diese Wechselbeziehungen zwischen Geschöpf und Lebensraum sind es, welche die größte Gewähr bieten, daß die Lebewesen den Daseinskampf bestehen und nicht schädigenden Einflüssen erliegen. Mit dem Eingriff des Menschen in die natürlichen Lebensverhältnisse des Wildes ändert sich aber die Sachlage! Schon das in seiner Freiheit durch Eingatterung beschränkte Wild, dessen natürliche Äsungsverhältnisse verschmälert wurden, so daß künstliche Beifütterung sich notwendig machte, zeigt widrigen Einflüssen gegenüber ein weit weniger widerstandsfähiges Verhalten. Sehen wir doch nicht selten bei solchem eingatterten Wilde Haustierkrankheiten auftreten, wie ich dieses seiner Zeit in

meiner kleinen Arbeit über das Thema „Scheckbildung beim Wilde“ nachzuweisen versucht habe.

Als der Mensch anfang vor Jahrtausenden sich aus den wilden Tieren, die er zunächst nur zur Unterhaltung und in seiner Eigenschaft als Jäger aus Tierfreundschaft hielt, Haustiere zu gewinnen, änderte sich das Verhältnis der Tiere zu ihrem Lebensraum. Der Haustierwerdegang ist für die davon betroffenen Tiere mit einer Abkehr von ihren natürlichen Lebensverhältnissen verbunden. An Stelle des regelmäßig gewordenen Naturschutzes bot nun der Mensch seinen Haustieren „Kulturschutz“. Je nach der Kulturhöhe der Völker und dem Stande der dadurch bedingten Tierhaltung mußte der letztere natürlich auch eine niedere oder höhere Ausbildung erfahren. Wir können heute das Verhältnis des Menschen zu seinen Haustieren bei den verschiedenen Völkern studieren. Naturvölker, Halbkulturvölker und Kulturvölker lassen in dieser Hinsicht eine Steigerung im Abhängigkeitsverhältnis der Haustiere zu ihren Besitzern erkennen. Selbst bei den Kulturvölkern lassen sich bei den einzelnen Haustierrassen diesbezügliche Unterschiede nachweisen. Unsere Landrassen erfreuen sich robusterer Gesundheit, weil sie in engerem Zusammenhang mit der Umwelt stehen, als unsere hochgezüchteten Kulturrassen. Bei diesen letzteren hat der Mensch die Fürsorge völlig übernommen und hat durch planmäßige Zucht für die speziellen Forderungen seiner Wirtschaft die Produktionsleistung seiner Haustiere hochgetrieben. Dabei ist er in vieler Hinsicht zu weit gegangen, da er in übermäßiger Weise bei der Zucht, Haltung und Fütterung den wirtschaftlichen Erfolg im Auge hatte, ohne dabei genügend auf die Gesunderhaltung seiner Haustiere bedacht gewesen zu sein. Trotz der erstaunlichen und bewunderungswürdigen Leistung in der Hochzucht, läßt die Gesundheit, namentlich aber die Widerstandskraft widrigen Einflüssen der Außenwelt sehr viel zu wünschen übrig. Es bildete sich eine „Bereitschaft zu Krankheiten“ heraus, die bei den einzelnen Rassen verschiedenes Verhalten zeigt. Namentlich ist das Stallvieh solchen schädigenden Einflüssen sehr unterworfen. Der in der Gegenwart in hohem Maße durchgeführte Weidegang beruht auf einer richtigen Erkenntnis des gesundheitsschädigenden Einflusses der Stallhaltung und der dadurch verursachten Abkehr von den Beziehungen zur Natur. Das hat aber nicht etwa nur für die Haussäugetiere, sondern auch für unser Hausgeflügel Gültigkeit. Auch dieses ist den gleichen gesundheitswidrigen Einflüssen durch den Haustierwerdegang wie die Haussäugetiere unterworfen. Hinzu kommt noch die massenhafte Zusammenhaltung zahlreicher Individuen, die bei dem Geflügel oft noch weit schlimmer als bei den Säugetieren ist. Das „Bereitssein zu Krankheiten“ ist demnach nicht eine von der Natur gegebene, sondern durch die Haltung und Zucht der Menschen erworbene Eigenschaft. Haben wir dieses aber erkannt, müssen wir Mittel und Wege suchen, um dieser unliebsamen Einwirkung entgegenzuarbeiten. Das können wir aber nur auf dem Wege biologischer Einsicht und Erkenntnis. Auf der einen Seite ist es eine der Natur der betreffenden Haustiere entsprechende Haltung, welche die Gesundheit der Tiere fördert und befestigt, ohne dabei aber dem Rassencharakter und der Produktionsleistung Abbruch zu tun, auf der anderen Seite ist es eine vernunftgemäße und rationelle Ernährung. Wir müssen nicht nur leistungsfähige Zuchttiere, sondern vor allen Dingen gesunde Zuchttiere gewinnen, deren Lebensenergie ungeschwächt ist und die Krankheiten gegenüber große Widerstandsfähigkeit besitzen. Da, wie ich vorher auseinandersetzte, die Gesundheit der Tiere und die Widerstandskraft derselben von dem Funktionieren der Stoffwechselvorgänge abhängig ist, die das Tier in freier Wildbahn durch die naturgemäße Lebensweise und Äsung reguliert, so muß bei den Haustieren durch Experiment und Untersuchung nachgeforscht werden, welche Maßnahmen

notwendig sind, um ihnen etwaige fehlende Stoffe durch die Fütterung zuzuführen. Ich möchte diese Stoffe in zwei Kategorien einteilen:

1. Lebensenergieerhaltende Stoffe.
2. Stoffwechsel und Ernährung fördernde Stoffe.

Unter die Rubrik 1 fallen solche Stoffe, die als die Lebensenergie fördernde und Krankheiten abwehrende Stoffe erkannt wurden.

In Rubrik 2 sind solche Stoffe enthalten, deren Vorhandensein ernährungsnotwendig ist, deren Fehlen aber Ernährungs- und Wachstumsstörungen zur Ursache haben.

Als ein in dieser Hinsicht außerordentlich wichtiges und die Gesundheit förderndes Mittel habe ich für unsere Haustiere die Milchsäure erkannt. Für das Gedeihen und die Hebung der Geflügelzucht halte ich die Zufuhr von Milchsäure als Beigabe zur Fütterung für geradezu unentbehrlich. Diese Überzeugung habe ich nach einer nunmehr zweijährigen Erfahrung gewonnen, in welcher Zeit ich die mannigfaltigste Gelegenheit hatte, den günstigen Einfluß der Milchsäure auf die Gesundheit unserer Haustiere kennen zu lernen. Als Milchsäureträger diente mir bei den Experimenten, die ich veranlaßte, die aus Amerika stammende Ha-Bu, welches Präparat, abgesehen von seinem Gehalt an Nährsubstanzen infolge der Methode bei seiner Herstellung, seines Gehalts an Milchsäure, der 6—8 Prozent beträgt, noch den Vorteil hat, daß die Vitamine nicht vernichtet werden. Der Wert der Ha-Bu besteht meiner Auffassung nach daher in der Kombination der aufgezählten günstigen Eigenschaften als sanitäres Beifutter für die Haustiere. Obwohl nicht abzustreiten ist, daß dieses Präparat auch für die Mast der Tiere gut zu verwenden ist, so erblicke ich doch seinen Hauptwert in seiner sanitären Einwirkung auf den Tierkörper. In dieser Anerkennung stehe ich nicht vereinzelt, sondern finde in dem Urteil hervorragender Fachmänner Bestätigung derselben. So schreibt mir u. a. Herr Geheimrat Professor Dr. Franz Lehmann in Göttingen am 8. September des laufenden Jahres: „Unter Bezugnahme auf unsere wiederholten Unterredungen erlaube ich mir, Ihnen heute mein Urteil über die halbfeste Buttermilch zu bestätigen. So oft ich davon gefüttert habe, konnte ich feststellen, daß dieselbe auf die Tiere und zwar Geflügel und Schweine, wohltätig einwirkt. Die Feststellung dieser sanitären Wirkung erachte ich für gesichert.“

In der letzten Zeit habe ich mich eingehend mit der Einwirkung der Ha-Bu auf Krankheitserreger beschäftigt. Durch Laboratoriumsversuche, die auf meine Anregung die Herren Obertierarzt Dr. h. c. Glage in Hamburg und Prof. Dr. Henneberg in Kiel in liebenswürdiger Weise ausführten, ließ sich feststellen, daß die Ha-Bu auf verschiedene Bakterien, unter diesem auf Colibakterien und Tuberkelbazillen eine vernichtende Wirkung ausübt.

Seit einem Jahre hat die Ha-Bu als Beifutter für Geflügel in zahlreichen Geflügelzüchtereien sich Eingang verschafft. Es wurde bekannt, daß sie in ihrem Erzeugungslande, in Nordamerika, in beträchtlichem Maße für die Geflügelzucht aus sanitären Gründen Verwendung findet. Namentlich ist es die „Weiße Ruhr der Küken“, gegen welche die Ha-Bu aus vorbeugenden Gründen zur Anwendung gelangt. Professor Dr. Richard Reinhardt sagt in seinem „Lehrbuch der Geflügelkrankheiten“ hierüber: „Von amerikanischen Forschern wird die Verabreichung von Buttermilch, saurer Milch oder von Milchkulturen des *Bac. bulgaricus* empfohlen und zwar nicht bloß als Heil- sondern auch als Vorbeugemittel. Saure Milch soll von Anfang an den Küken zur beliebigen Aufnahme bereit stehen. Doch sind die Aussichten auf Heilung bei Küken sehr gering. Größere Bedeutung kommt

den Maßregeln zur Vorbauung und zur Verhütung der Ausbreitung zu.“

Diese in amerikanischen Geflügelfarmen gewonnenen Resultate hat sich eine Anzahl deutscher Geflügelzüchter zu Nutzen gemacht und die Ha-Bu zur Bekämpfung des Auftretens der „Weißen Ruhr“ verfüttert. Mir liegen eine Anzahl von Gutachten aus der Praxis vor, die diese günstige vorbeugende Einwirkung auf den Gesundheitszustand des Geflügels auch aus deutschen Geflügelfarmen bestätigen. So berichtet der Besitzer der Geflügelfarm „Lohbrügger-Höhe“ bei Bergedorf-Hamburg folgendes: „Halbfeste Buttermilch (Ha-Bu) ist anerkanntermaßen nicht allein ein glänzendes Futtermittel für Hühner und Schweine, sie wirkt außerdem infolge der in ihr enthaltenen Milchsäure regulierend auf Magen und Darm. Tiere, die mit Halbfester Buttermilch gefüttert werden, sehen vorzüglich aus, sind lebhaft, freßlustig und infolgedessen Krankheiten weniger ausgesetzt als andere.“ Über die Einwirkung auf die „Weiße Ruhr“ äußert sich u. a. Herr Landwirtschaftsrat Stoll, Leiter des Staatsgutes Farmsen bei Hamburg: „Zu erwähnen sei noch, daß neuerdings Halbfeste Buttermilch sehr gern genommen wird. Diese ist besonders für das Verdauungssystem der Küken sowie auch der Hühner von großem Werte, die z. B. bei Verfütterung von Halbfester Buttermilch von dem gewöhnlichen Weißen Durchfall verschont werden.“

Nach dem günstigen Urteil dieser und anderer ausgezeichneten Geflügelzüchter über die sanitäre Einwirkung der Ha-Bu auf das Geflügel hielt ich es für geboten, das Problem der prophylaktischen Einwirkung des genannten Präparates weiter zu verfolgen. Da ich auf dem Standpunkt stehe, daß ein abschließendes Urteil über den Wert desselben sich keineswegs nur durch Laboratoriumsversuche und Experimente beschränkten Ausmaßes in Forschungsanstalten erreichen läßt, sondern nur unter Mitarbeit der praktischen Geflügelzüchter zu erzielen sein wird, habe ich an eine größere Anzahl von Geflügelfarmen einen Fragebogen, den ich aufstellte, durch die die Ha-Bu importierende Firma Emil Hauenschild in Hamburg senden lassen. Wir müssen in Deutschland mehr als zuvor die Wechselbeziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis aufnehmen. Die Zeit der Gegenwart drängt hierzu, da die mißliche wirtschaftliche Lage in unserem Vaterland die größte Förderung praktischer, wirtschaftlicher Bestrebungen verlangt. In dieser Hinsicht können wir von Amerika lernen.

Eine Beantwortung des Fragebogens sandten zahlreiche Geflügelzüchter ein. Ohne den dadurch gewonnenen Angaben vom wissenschaftlichen Standpunkte aus eine maßgebende Bedeutung beizumessen, erstrecken sich doch u. a. die gesammelten Erfahrungen auf einen zu kurzen Zeitraum, so halte ich dennoch das dadurch erzielte Allgemeinresultat für wichtig genug, um an dieser Stelle darüber zu berichten. Ich lasse mich dabei von der Überzeugung leiten, daß das in Frage stehende Problem nach verschiedenen Richtungen hin aufgerollt wird, um der wissenschaftlichen Forschung Anregung zu geben, die Angaben zu prüfen und durch Experiment und kritische Prüfung zur Lösung zu bringen.


Wenn ich die verschiedenen Gutachten, die aus der Geflügelpraxis eingesandt wurden, kritisch zusammenfasse, so läßt sich sagen, daß in fast allen Fällen der die Gesundheit des Geflügels fördernde Einfluß der Ha-Bu-Fütterung zum Ausdruck gelangt.

Folgende Angaben wurden in diesem Gutachten als erlangte Resultate zur Mitteilung gebracht:

1. Keine Kümmerer mehr, Erzielung gleichmäßiger Tiere.

2. Beschleunigtes Wachstum und glattes, glänzendes, gut entwickeltes Federkleid, keine Struppigkeit mehr.
3. Frischeres und günstigeres Aussehen, lebhafteres Temperament.
4. Fortbleiben des Weißdurchfalls.
5. Die Mauserung geht schneller von statten.
6. Die Sterblichkeit ist geringer.
7. Bei schwachen und geringe Freßlust zeigenden Exemplaren, sowie auch bei Abmagerung werden mit der Ha-Bu-Fütterung gute Erfolge erzielt.
8. Vermehrung der Eiablage.
9. Die Sterblichkeit ist um 3 Prozent zurückgegangen.
10. Die Kükenaufzucht erweist sich erheblich besser.
11. Verlängerung der Legeperiode.
12. An Darmkrankheiten erkranktes Geflügel erhält mit Erfolg für die Gesundheit Ha-Bu als Abführ- und Heilmittel.
13. Die Knochenbildung wird gefördert.
14. Die Qualität des Fleisches wird gehoben.
15. Die Verdauung wird gefördert.
16. Die Entwicklung geht schneller von statten.
17. Als Mastfutter für Hühner gut zu empfehlen.
18. Junge Hähne, die mit Ha-Bu gefüttert werden, sind vorzüglich.
19. Günstiger Einfluß bei Kropfkrankheiten.
20. Puten werden bei Ha-Bu-Fütterung ohne Verlust aufgezogen.
21. Bei der Putenzucht wird der Weißdurchfall ebenfalls dadurch beseitigt.
22. Keinen Kalkkot bei den Küken mehr.

Ohne diesen Gutachten mehr als den Wert vorläufiger Angaben beizumessen, läßt sich aus dem übereinstimmenden Charakter ihres Inhalts erkennen, daß durch die Ha-Bu-Fütterung eine Hebung und Befestigung der Gesundheit, eine Förderung der Lebensenergie und dadurch bedingte Abwehrfähigkeit Krankheiten gegenüber bei dem Geflügel erzielt wird. Es bedarf demnach wohl keines Zweifels mehr, daß die Ha-Bu-Fütterung eine günstige sanitäre Wirkung auf das Geflügel ausübt. Aufgabe der Wissenschaft muß es nun sein, im Speziellen nachzuforschen, wie es sich mit der Richtigkeit der gemachten Angaben verhält. Es ist anzunehmen, daß durch die Hebung der Lebensenergie durch den Genuß von Milchsäure die Funktionen des Körpers in normale Bahnen gewiesen werden. Da es bewiesen ist, daß die Erreger der „Weißen Ruhr“ von dem geschlechtsreifen Geflügel auf die Eier und mithin auf die demselben entschlüpfenden Küken übertragen werden, so sollte der Kampf gegen das Auftreten und die Verbreitung der genannten Geflügelseuche bereits aus vorbeugenden Gründen durch Ha-Bu-Fütterung bei dem ersten begonnen werden. Je günstiger sich der Gesundheitszustand der erwachsenen Hühner erweist, um so geringer ist die Gefahr, daß sich bei den Küken Kümmerer einstellen und das Geneigtsein zu Krankheiten sich herausbildet. Da es sich aber, wie Mießner betont, durch serologische Untersuchung nachweisen läßt, ob die Bestände Krankheitserreger in sich tragen, so lassen sich



solche für die Haltung und Zucht ungeeignete Tiere ausmerzen. Gesundes und dadurch widerstandsfähiges Geflügel wird die Ha-Bu-Fütterung ohne Beschwerden auch in frühestem Lebensalter mit Erfolg ertragen. Geschwächtes und den Keim der Krankheit in sich tragendes Geflügel wird begreiflicher Weise empfindlicher dabei sein. Es empfiehlt sich daher in zweifelhaften Fällen nur ganz allmählich mit der Ha-Bu-Beimischung zu beginnen, um die geschwächten Tiere langsam an die Zuführung der Milchsäure zu gewöhnen. Ich habe die Überzeugung, daß auf solche Weise auch in diesem Falle ein günstiger Erfolg erzielt wird. Es darf nicht vergessen werden, daß Mißerfolge, die scheinbar von der Verabreichung eines Futtermittels herzuleiten sind,

ganz andere Ursachen haben können. Ganz abgesehen von der geschwächten Gesundheit durch vererbte Anlage und Krankheit kann auch die ungünstige Witterung, wie der überaus nasse verfllossene Sommer, die eigentliche Veranlassung zur Erkrankung respektive zum Tode des Geflügels gewesen sein. Im allgemeinen empfiehlt es sich, den Küken pro Tag 5—10 Gramm Ha-Bu zu verabfolgen, Hühner und anderes Geflügel erhält 10—15 Gramm täglich. In den meisten Fällen kann die Ha-Bu dem Geflügel unverdünnt, wie sie aus der Tonne kommt, auf ein Brett gestrichen zum Abpicken vorgesetzt werden. Bei schwächlichen Exemplaren würde ich eine Verdünnung vornehmen, um sie langsam an dieses Beifutter zu gewöhnen.

Anatomie und Physiologie.

Krzywanek, F. W.: **Neue Ansichten über die Funktion der Milz.** (Aus dem Veterinär-Physiologischen Institut der Universität Leipzig.) (B. T. W. 1927, S. 393.)

Die frühere Auffassung von der geringen Bedeutung der Milz für den Organismus, die dadurch bewiesen schien, daß Exstirpationen dieses Organs recht gut vertragen wurden, hat in neuerer Zeit eine Wandlung erfahren, woran auch das Scheunertsche Institut in Leipzig beteiligt ist. Auf Grund der diesbezüglichen neueren Veröffentlichungen und eigener Forschungsergebnisse ergibt sich, daß nach den neuesten, von verschiedenen Beobachtern gewonnenen Ergebnissen die Milz neben den bekannten, mehr nebensächlichen Funktionen eine bisher unbekannte Funktion ausübt, indem sie als ein Organ angesehen werden kann, das gewissermaßen wie ein Schwamm eine an Erythrozyten sehr reiche Flüssigkeit aufnehmen und diese je nach Bedarf wieder in den allgemeinen Kreislauf senden kann. Diese Funktion kann unter normalen Verhältnissen vom Körper entbehrt werden; denn die Splenektomie ist kein lebensbedrohender Eingriff. Daß aber unter besonderen Umständen das Vorhandensein dieser Funktion der Milz lebenswichtig sein kann, geht aus Versuchen von Barcroft hervor, nach denen splenektomierte Meerschweinchen einer Gasvergiftung eher zum Opfer fallen wie die gleichzeitig in demselben Raume befindlichen ihrer Milz nicht beraubten Tiere. Carl.

Innere Medizin und Chirurgie.

Krüger, v. F.: **Beiträge zur Frage nach der Senkungsgeschwindigkeit der Erythrozyten. Welchen Einfluß übt die Plasma- bzw. Serumverdünnung auf die Senkungsgeschwindigkeit der Erythrozyten aus?** (Physiol.-chem. Abteilung des physiolog. Instituts der Universität Rostock.) (Zeitschrift für Biologie, Bd. 83, 1925, S. 435.)

Aus den Kurven geht aufs deutlichste hervor, daß die Sedimentierungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen mit steigender Verdünnung des Serums bzw. Plasmas mehr und mehr abnimmt. Doch eine genauere Analyse der Kurven belehrt uns weiter darüber, daß die Herabsetzung der Sedimentierfähigkeit der Erythrozyten, ceteris paribus, bei Verdünnungen des Serums bzw. Plasmas mit destilliertem Wasser, 0,95 Prozent und 2prozentige Kochsalzlösung trotz gleicher Viskosität der Gemische verschieden groß ist, und zwar ist sie am größten bei Verdünnung mit 2prozentiger Kochsalzlösung und am geringsten bei Verdünnung mit Wasser. Aus dieser Tatsache müssen wir den Schluß ziehen, daß die Änderung der Viskosität der Suspensionsflüssigkeit zum mindesten nicht die einzige und alleinige Ursache der Änderung in der Senkungsgeschwindigkeit ist, sondern daß auch der Salzkonzentration in diesem Prozeß eine gewisse Rolle zukommt. Die Versuche, in denen zur Verdünnung des Plasmas Kochsalzlösungen dienten, fallen in ihren Ergebnissen vollkommen mit den oben angeführten

Versuchen zusammen: mit steigender Verdünnung des Plasmas nimmt die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen ab, und zwar bei Verdünnung mit hypertonischer Kochsalzlösung in höherem Maße als bei Verdünnung mit isotonischer Kochsalzlösung. Das gilt sowohl für das Schweine- wie auch für das Pferdeblut. In gleichem Sinne wirkte die Verdünnung mit isotonischer und hypertonischer Rohrzuckerlösung. Auch durch diese wird die Sedimentierungsgeschwindigkeit der Erythrozyten durch die Verdünnung herabgesetzt, und zwar auch hier stärker durch Verdünnung mit hypertonischen als durch Verdünnung mit hypotonischen Lösungen. Sehen wir jedoch näher zu, so können wir wahrnehmen, daß das Pferde- und Schweineblut gegenüber den genannten Lösungen gewisse Unterschiede aufweisen. Während beim Schweineblut die entsprechenden Kochsalz- und Rohrzuckerkurven nahezu zusammenfallen, die Rohrzuckerlösungen vielleicht sogar eine etwas geringere Hemmung der Senkungsgeschwindigkeit zeigen als die Kochsalzlösungen, setzen erstere die Sedimentierungsgeschwindigkeit der Erythrozyten im Pferdeblut stärker herab als die entsprechenden Kochsalzlösungen. Das tritt besonders deutlich bei den größeren Zusätzen und den höheren Konzentrationen hervor. Daß die Ursache für diese Erscheinung in der ein wenig größeren Viskosität der Plasma-Rohrzucker-Gemische im Vergleich zu der der entsprechenden Plasma-Kochsalz-Gemische liegt, darf nicht gut angenommen werden, denn erstens wirkt eine gesteigerte Plasmaviskosität im allgemeinen, wenn eine gewisse Grenze nicht überschritten wird, bekanntlich beschleunigend auf die Blutkörperchensenkung, und zweitens sehen wir in den Versuchen mit Schweineblut dieselben Viskositätsunterschiede auftreten wie in den Versuchen mit Pferdeblut, ohne den gleichen Effekt zu zeigen. A.—

Dürbaum: **Über das Verhältnis der Resorptions- und Ausscheidungsgeschwindigkeit verschiedener Substanzen bei intraperitonealer Injektion im Vergleich zur subkutanen und intravenösen Applikation beim Hunde.**

(Aus dem Pharmakologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Berlin. Direktor: Professor Dr. W. Hinz.) (T. R. 1926, S. 649.)

Die an Hunden mit Yatren, Kaliumferrozyanid, Indigokarmin, Morphinchlorhydrat, Apomorphinchlorhydrat und Strychninnitrat ausgeführten Versuche führten, zusammengefaßt, zu folgenden Ergebnissen: Die Resorptionszeit parenteral eingeführter Stoffe ist verschieden und abhängig von der Geschwindigkeit der von dem Applikationsort abführenden Strombahn. Die Zeiten sind direkt proportional der resorbierenden Fläche bzw. der Strömungsgeschwindigkeit des abführenden Blut- oder Lymphstromes. Die Ausscheidungsgeschwindigkeiten verhielten sich im Mittel wie iv. = 1:1, 44 ip. : 4,16 sk. In bezug auf den Eintritt einer Wirkung war das Verhältnis iv. = 1:1, 35 ip. : 3,7 sk. Die für die intravenösen und intraperitonealen Injektionen gültigen Resorptionszeiten sind praktisch also einander gleich. Beim Hunde kann also die einfachere ip.-Injektion die schwieriger auszuführende intravenöse ersetzen. Weiteren Untersuchungen muß es vorbehalten bleiben, ob diese

Beobachtungen auch für andere Arzneistoffe und Tierarten gültig sind. Geiger.

Glietenberg, P.: Untersuchungen über die Desinfektionskraft des Fumosols. (In-Dissert. Gießen 1922.)

Das Fumisol ist eine Kalk-Kreosot-Phenolverbindung und stellt eine Flüssigkeit dar, die je nach den Holzarten, aus denen ihre wesentlichen Bestandteile durch trockene Destillation gewonnen werden, in Farbe und Geruch etwas verschieden ist (an Holzrauch erinnernd). Mit zwei angeblich voneinander verschiedenen Fumisolarten und einer Fumisol-Pyoktanin-Lösung — wie sie vom Darsteller empfohlen worden sind — sind Versuche über die Entwicklungshemmung von Bakterien angestellt worden, und zwar mit dem Bakterium Coli, Staphylokokken und dem Bazillus Enteritidis Gärtner als Testbakterien. Es ergab sich, daß alle drei Fumisolarten in der Wirkung vollkommen übereinstimmen, und daß sie auf das Bakterium Coli und den Bazillus Enteritidis Gärtner in einer Verdünnung von 1:20 und auf Staphylokokken in einer Verdünnung von 1:100 entwicklungshemmend eingewirkt haben. Zur Prüfung der bakterientötenden Eigenschaften ist nur eine Fumisolart verwandt worden. Als Testbakterien kamen neben den drei obengenannten der Bacillus liquefaciens fluorescens, sowie der Bacillus prodigiosus zur Anwendung. Alle gewählten Mikroorganismen sind schließlich abgetötet worden, allerdings erfolgte die Zerstörung erst in einer Verdünnung des Fumosols von 1:2 innerhalb 24 Stunden. Der Bacillus liquefaciens fluorescens war als einziger bereits innerhalb einer Stunde vernichtet worden. Nach diesen Ergebnissen kann Fumisol nicht als Konservierungsmittel von Fleisch- und Wurstwaren bewertet werden. Es kann allenfalls anderen wirksamen Konservierungsmitteln beigelegt werden, wenn ein den Räucherwaren spezifischer Geschmack erzielt werden soll. A.—

Benthack, H.: Untersuchungen über die keimtötende Kraft von Tetralolpräparaten mit besonderer Berücksichtigung des 2-Tetralols. (In-Dissert. Gießen 1922.)

Die 3prozentige Lösung des 2-Tetralols hat im Vergleich zu den 3prozentigen Lösungen des 1-Tetralols, des Monobromtetralols und des Dibromtetralols die beste keimtötende Kraft gegenüber den geprüften Stämmen entfaltet. Sie versagte nur bei Staphylokokken. Diese zeigten nach 15 Minuten langer Einwirkung des Desinfizierens noch Wachstum. Das 1-Tetralol zeigte unter gleichen Bedingungen keine Einwirkung auf Staphylokokken, Ferkelruhr- und Typhusbazillen. Bei Ferkeltyphusbazillen bemerkte man schwache Wachstumshemmung. Monobrom- und Dibromtetralol waren sich ihrer Wirkung ziemlich gleich. Ihre keimtötende Kraft war bei der gewählten Konzentration und Einwirkungsdauer nur gering. Schwach überlegen war das Dibromtetralol bei der Einwirkung auf den Coli- und Staphylokokkenstamm, unterlegen zeigte es sich beim Typhusstamm. Jedoch darf man bei Betrachtung dieser Ergebnisse nicht den relativ verschiedenen Tetralolgehalt der einzelnen Präparate außer acht lassen. Für 2-Tetraloltürkischrotlösungen ergibt sich eine gute keimtötende Wirkung auf Bacillus enteritidis Gärtner, Proteus vulgaris, Rinderabortus-, Ferkeltyphus- und Suipestiverbazillen. Bei Einwirkung auf Bacterium coli commune, Ferkelruhr-, Gl. 3. Kl., Rotlauf-, Hühnertyphusbazillen, sowie auf die Mikroorganismen des Stutenabortus und Typhus ist die keimtötende Kraft noch recht zufriedenstellend. Bacterium coli commune und Rotlaufbazillen wurden je in zwei Stämmen geprüft. Die Stämme zeigten geringe Unterschiede in der Resistenz. Weniger energisch werden Staphylokokken und Paratyphus-B angegriffen, das zeigt sich namentlich bei den frischgezüchteten, vollvirulenten Stämmen dieser Bakterien. In der vorgesehenen Zeit (24 Stunden) wird mit keiner der angewandten Konzentrationen die Vernichtung der Keime des

Milzbrandes und des Rauschbrandes erreicht. Im allgemeinen muß man nach den in vitro gemachten Erfahrungen dem 2-Tetralol, gelöst in Türkischrotöl und Natronlauge, für die Mikroorganismen, die keine Dauerform bilden, einen recht hohen desinfektorischen Wert zuerkennen, zumal der Prozentgehalt an reinem 2-Tetralol nur zwei Neuntel des prozentmäßig angegebenen Wertes beträgt. A.—

Oppermann: Ein Beitrag zur Technik der Anwendung der Nasenschlundsonde. (T. R. 1926, S. 588.)

Zur Feststellung, ob die Sonde richtig im Schlund sitzt, empfiehlt Verf. das Einblasen von Luft und zwar in kurzen Stößen, wenn die Sonde etwa in der Mitte des Halses angelangt ist. Es kommt dadurch zu Kontraktionen des Schlundes und deutlichen Schluckungen, die leicht wahrgenommen werden können und für die richtige Lage der Sonde sprechen. Geiger.

Gauger: Bericht über die Verwendung des Huflederkitts bei den Pferden des Berittenmachungspersonals des Reichswehrministeriums. (Zeitschr. für Vet.-Kunde 1926, H. 12, S. 376.)

Wenn man Hufeisen für Einlagen mit umgebogenen Schenkelenden oder geschlossene Hufeisen in Verbindung mit Huflederkiteinlagen verwendet, um das Ausgleiten und Hinfallen der Pferde auf glatten und asphaltierten Straßen zu verhindern, so wird der beabsichtigte Zweck nicht erreicht, weil beide Hufeisenarten die glatte Bodenfläche der Hufeisen noch vergrößern. Um den Huflederkiteinlagen den erforderlichen, festen Halt zu geben, genügt es, von der Bodenfläche des Hufeisens an beiden Hufeisenschenkeln 10 mm von den Schraubstollenlöchern mit einem Rundhammer von 12 mm Durchmesser je eine Zunge nach der Tragfläche des Hufeisens zu ausziehen; die Abdachung bleibt dieselbe wie bei Hufeisen ohne Einlagen. Die beiden Zungen und die gewöhnliche Abdachung verhindert derart eine Lockerung, daß niemals eine Einlage verloren gegangen ist. Anscheinend im Kriege noch hergestellter Huflederkitt erwies sich als zu wenig elastisch, wurde steinhart, so daß einige Pferde bald sehr klamm gingen, andere mit empfindlichen Hufen lahm wurden. Besser bewährte sich Huflederkitt von H. Hauptner; er zeichnete sich durch genügende Festigkeit und hervorragende Elastizität aus. Pferde mit ganz flachen Sohlen und andere mit hochgradigem Trachtenzwang gingen mit den Einlagen besser als vorher. Vor dem Einlegen wurde der Hornstrahl mit Jodtinktur desinfiziert; bei Neubeschlag wurden die Einlagen erst nach ein bis zwei Tagen eingesetzt, um den Huf richtig austrocknen zu lassen. Es ist nicht bekannt geworden, daß jemals ein mit Huflederkiteinlagen beschlagenes Pferd auf glatter und asphaltierter Straße stark geglitten und gefallen ist. Nur auf festem Lehm Boden, der oberflächlich durch Regen angefeuchtet ist, gleiten Pferde mit Huflederkiteinlagen außerordentlich leicht und gehen schlechter als ohne Einlagen. A.—

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Blum, J.: Erfahrungen mit Cibalbumin bei infektiöser Sterilität. (Schweiz. Arch. für Tierheilkde. 1926, Bd. 68, S. 433.)

Infektiöse Sterilität ist jede auf Infektion direkt zurückzuführende Sterilitätsform: leitet sich bekanntlich meist ab von chronischen Entzündungen der verschiedenen Genital-Teilorgane. Je nach den betroffenen Organen modifiziert sich die Therapie, die teils symptomatisch, serologisch oder aber aspezifisch sein kann. Verf. hat in letztgenannter Richtung Versuche mit Cibalbumin (sterile, wasserklare Lösung von tierischem Eiweiß) angestellt. Die Applikation ist subkutan, wird ohne Nebenerscheinungen gut ertragen. Dosis bis 5 cm³ der 5prozentigen Lösung. Eine einzige Injektion genügt nicht, man wiederholt nach 3—5 Tagen, unter Verdoppelung der Dosis beim dritten

Mal. Selten sind vier Injektionen notwendig. Hier würde man dann 20 cm³ geben. Man halte sich möglichst an die 3—5 Tage. Die Resultate sind folgende: Die Sekretion hört gewöhnlich im Verlauf der Injektionen nach einer bis mehreren Wochen auf. Gelegentlich ändert sich der Schleimcharakter; auch kann nach einer Injektion Sistieren der Sekretion, nach der zweiten Wiederauftreten und dann Verschwinden beobachtet werden. Stinkendes Sekret verliert bald den Geruch. In einzelnen Fällen (Pyometra) tritt nach der ersten Injektion vermehrte Sekretion auf, und die Tiere werden nach einigen Tagen brünstig. Bei Pyometra ohne Sekretion kann dieselbe nach der ersten Injektion auftreten. Parallel der Sekretion nehmen Uterusgröße, -rigidität und -Wanddicke ab. Analoge Veränderungen (Provokation der Abwanderung) gehen auch in Cervix und Vagina vor sich. Man sieht auch, daß der Allgemeinzustand und die Milchleistung sich parallel den Erscheinungen am Uterus heben. — Persistierende gelbe Körper verschwinden ohne manuelle Behandlung meist in einigen Tagen bis Wochen, worauf wieder Brunst eintritt. Zentrale Zysten nehmen an Größe zu, werden dünnwandig, können dann leicht gequetscht werden oder platzen spontan. Falls man die Operation nicht zu früh vornimmt, wird der vorher gestörte Sexualzyklus wieder normal. Nymphomanie schwand innerhalb wenigen Tagen nach der ersten Injektion, wenn auch die Zyste bestehen blieb, die Brunst setzte dann mehrere Wochen aus, um dann wieder normal aufzutreten. Zu kurze Brunstperioden gehen vorerst in zu lange über und umgekehrt, nachher treten normale Intervalle ein; desgleichen zu starke und zu schwache Brunst normal. Mißerfolge erkennt man am Nichteintritt der Heilungsvorgänge, oder daran, daß dieselben in irgend einem Stadium stecken bleiben oder zu langsam vorschreiten. Hier ist die Ursache in den meisten Fällen ein Dosierungsfehler, d. h. die Behandlung wurde zu wenig lang fortgesetzt. Die Dosen (s. oben) sollen daher nicht unter 5 ccm sein. Versager dieser Therapie wurde in einem Fall (Uterusabszeß) festgestellt. Bei Peristenz der Sekretion wurde gefunden: Tuberkulose, Uterusgeschwür, foetale Knochenreste, E. chronica cystica. Bei Salpingitis war kein Erfolg zu erzielen, obschon die Veränderungen am Uterus und den Ausführungsgängen zurückgingen. Eine Sterilität kann auch daher kommen, daß die Heilungsvorgänge in der Uterusschleimhaut noch nicht vollständig sind. Man deckt daher die Tiere erst in der zweiten oder dritten Brunstperiode. — Die Erfolge dieser Methode, besonders bei chronischen Genitalleiden des Rindes sind mindestens ebenso gut, wenn nicht besser, als bei den symptomatischen Methoden. Außerdem schädigen die Injektionen bei vorhandener Trächtigkeit deren Verlauf nicht (Pyometra, Gravidität als Verwechslungen). Auch bei Trächtigkeit und gleichzeitiger Pyometra heilt die letztere aus, ohne den Foetus zu schädigen. Kontrollversuche mit Milcheiweiß hatten weit mehr Rezidive als Cibalbumin, demnach ist der Wirkungsmechanismus ein ganz anderer. — Kasuistik von acht Fällen. H. Graf, Berlin.

Bach, E.: **Uterus-Torsion.** (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 212—213.)

Eine Simmenthaler Kuh warf ohne Hilfe vor Ende der Trächtigkeit ein totes Kalb. Die Wehen hielten aber nach der Geburt noch an, so daß ein zweites Kalb erwartet wurde. Verf. untersuchte und nahm folgenden Befund auf: Allgemeinbefinden gut, Tier frist; kurze schmerzhaftes Wehen; Puls 80; Scheide oben eingezogen; Fruchtwasser von widerlichem Geruch; Scheide: Weiche Falte von h. l. nach v. r.; Muttermund kaum passierbar. Unter Spiraldrehung der Hand gelangt man nach r. in den zusammengezogenen, leeren Uterus. Perrektal: bekannte Torsionsfalten, Uterus als große Masse in der rechten Flanke; Foetus nicht fühlbar. Uterus auch von außen in der rechten Hungergrube fühlbar.

Diagnose: Torsio $\frac{3}{4}$ nach links mit starker Sepsis. Schlachtung. Sektion: Bestätigung der Diagnose, dazu Uterusruptur und in der Bauchhöhle ein gering aufgetriebener Foetus. Die Torsion ist demnach nach der Geburt des ersten Kalbes eingetreten! Die Wehen führten zur Zerreißung. Riß und Austritt des Foetus waren demnach klinisch nicht nachzuweisen. Unbegreiflich ist die geringe Trübung des Allgemeinbefindens in einem so schweren Falle.

H. Graf.

Wysmann, E.: **Über reine Steißgeburten beim Rind.**

(Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 61—74.)

Die reine Steißlage bildet beim Rind ein ziemlich häufiges Geburtshindernis (13 Prozent). Sie kommt bei Zwillingskälbern häufiger vor (19,5 Prozent) als bei Eingeburten (8,4 Prozent). Primipare Rinder sind mit 18,2 Prozent beteiligt, weisen aber diese abnorme Lage häufiger bei Eingeburten (22,2 Prozent) als bei Zwillingsgeburten (13,3 Prozent) auf. Die Verteilung auf die einzelnen Jahrgänge ist eine ganz ungleichmäßige. Die Prognose für den Foetus ist zweifelhaft bis ungünstig, da bei Eingeburten fast die Hälfte, bei Zwillingsgeburten zwei Drittel tot geboren werden. Das weibliche Geschlecht ist etwas stärker vertreten. Die Prognose für das Muttertier ist besonders bei Eingeburten in erheblichem Maße von der Vornahme embryotomischer Eingriffe abhängig, die vielfach die einzig richtige Behandlung darstellt, während bei mühevollen Haltungsberichtigungsversuchen leicht gefährliche Verletzungen und Entzündungen des Uterus eintreten. Die Behandlung in foetalen Fällen sowie bei noch lebenden Foeten und genügendem Raum in den Geburtswegen hat die vorsichtige Haltungsberichtigung der Extremitäten anzustreben. Bei Eingeburten gestaltet sich die Reposition der linken Hinterextremität in der Mehrzahl der Fälle leichter. Bei toten Foeten, die sich nicht in dieser Lage extrahieren lassen, und stark kontrahiertem Uterus ist die sofortige Amputation einer oder beider Extremitäten im Hüftgelenk angezeigt. Als Instrumente eignen sich gut die Drahtsägen (Bronzedrahtsäge nach v. Sta a, Stahldrahtsägen) sowie die Perssone'sche Kettensäge. H. Graf.

Lakowitz: **Ein Beitrag zur Frage von der Intelligenz bei Tieren.** (Biolog. Zentralbl. 1927, S. 321.)

Nachstehende Beobachtung läßt ein gewisses Auffassungsvermögen für räumliche Zusammenhänge erkennen. Es handelte sich um eine angepflochte Ziege, die der Nahrungsaufnahme nachging. Plötzlich stellte das Tier die Nahrungssuche ein und scheuerte zuerst mit der Spitze des linken, dann des rechten Hornes die auf diese Weise erreichbaren Stellen seines Rückens, offenbar wegen des durch Insektenstiche verursachten Juckreizes. Nun geschah aber etwas unerwartetes. Von den in der Nähe der Ziege befindlichen Pappeln waren kurze Zweige herabgefallen. Die Ziege faßte mit dem Maule einen der herumliegenden etwa einen halben Meter langen Knüppel an dem einen Ende, hob ihn auf, wandte den Kopf etwas zur Seite und scheuerte nun mit dem freien Ende des Stockes mehrere etwas weiter zurückliegende Stellen seines Rückens mit großem Behagen und dem erwünschten Erfolg. Nachher fraß das Tier ruhig weiter. Es hatte in richtiger Erkennung der räumlichen Zusammenhänge gewissermaßen durch zweckdienliche Verlängerung seiner Hörner den erstrebten Zweck erreicht. Carl.

Geisert, E.: **Ein seltener Fall von Deckunfähigkeit beim Sprungbullen — bedingt durch ein Exemplar von Taenia denticulata (Moniezia denticulata).** (B. T. W. 1927, S. 447.)

Ein aus der Schweiz eingeführter 1½-jähriger Zuchtbulle war bei leidlich vorhandener Decklust nicht instande, sich zum Sprunge aufzurichten. Das Tier gedieh bei bester Fütterung nicht, war matt und träge und schwankte beim Gehen in der Nachhand. Haarkleid glanzlos, struppig, Haut

hart, ledern sich anführend. Tuberkulose klinisch nicht nachweisbar. Yohimbin und Rivanol ohne Erfolg.

Nach der Schlachtung ergab sich, daß der hühnerigroße linke Bronchiallymphknoten auf dem Schnitt markig geschwollen war. Im Dünndarm ein Exemplar von *Taenia denticulata*. Verf. zitiert vergleichsweise einen von F a m a g a l l i beobachteten Fall von nervöser Störung (epileptische Anfälle, gesteigerte Reflexerregbarkeit) beim Rinde, das mit *Taenia alba* behaftet war. Carl.

Hohendorf, W.: Beitrag zur Kenntnis der Schädlichkeiten und Vergiftungen durch Futterkuchen bei unsern Haustieren. (In.-Dissert. Berlin 1927.)

Die Ursachen der Schädigungen bei Verfütterung von Futterkuchen und -mehlen sind zu suchen zunächst in zufälligen Umständen. Grobe Beimengungen aller Art, wie Eisenteile, Nägel, Nieten, Holz- und Glassplitter, Sand usw.; Zersetzungsprozesse bakteriologischer und chemischer Natur, hervorgerufen durch Witterungseinflüsse, unsachgemäße Aufbewahrung, Transport usw. In zweiter Linie kommen fahrlässige Ursachen in Betracht: Vorhandensein von Giften innerhalb der Samenrückstände, Chemikalien, die bei dem Entfettungsprozeß (Extraktion) nicht restlos entfernt wurden, und sei es direkt oder indirekt, durch Einwirkung auf die in den Rückständen enthaltenen Stoffe Schädigungen hervorrufen; fahrlässige Verunreinigungen mit giftigen Bestandteilen anderer Pflanzen, insbesondere mit dem überaus gefährlichen Rizinusamen; fehlerhafte Fütterung, wobei die Gattung, das Alter und die Nutzung der Haustiere bei der Verfütterung der Kuchen nicht entsprechend berücksichtigt werden. In dritter Linie spielen absichtliche Ursachen eine Rolle, so beispielsweise absichtliche Verfälschungen mit anderen Stoffen wie Unkrautsamen, minderwertige Produkte usw. Bei der Beurteilung der Frage, ob das Futtermittel schädliche Eigenschaften hat, ist stets die Erfahrung zu berücksichtigen, daß nicht jedes Tier, das schädliche Stoffe verzehrt, erkrankt oder stirbt. Meist sind es innerhalb einer Herde nur einzelne Individuen, bei denen sich Vergiftungserscheinungen zeigen, und oft vergehen Wochen und Monate, bevor eine Vergiftung, die eine schleichende, chronische Form angenommen hat, offenbar wird. Die Widerstandskraft des einzelnen Individuums ist sehr verschieden und abhängig von dem Gesundheits- und Ernährungszustand, vom Alter, Geschlecht, der evtl. Trächtigkeit und von vielen anderen Zufällen der äußeren Lebensbedingungen. Im Interesse des Schutzes des Käufers müßten andere gesetzliche Grundlagen, als es bisher der Fall war, geschaffen werden. Um einige Beispiele anzuführen, ist die Forderung zu erheben, daß Rapskuchen aus indischer Saat im Handel als solcher deklariert werden müßte. Die in erschreckendem Maße verbreitete Verunreinigung der Futterkuchen mit Teilen der Rizinusamen bedeutet eine so große Gefahr für den Käufer, daß den Rizinusölfabriken das „Inverkehrbringen“ der Rückstände ihrer Fabrikation verboten werden müßte. Nur wenn es gelingt, durch umfassende, wissenschaftliche Untersuchungen ein Verfahren zu finden, durch das man die Preßrückstände dieser Fabrikation entgiften kann, könnten derartig entgiftete Rizinusamenabfälle ungehindert in den Verkehr gebracht werden. Im übrigen muß der Käufer im Interesse der Gesundheit seines Tierbestandes und zur Vermeidung von Vergiftungen gewisse Regeln befolgen. Er muß von einwandfreien Firmen die Ware unter der Garantie der Reinheit und der Unverdorbenheit einhandeln, für sachgemäße Aufbewahrung Sorge tragen und darf die Futterkuchen nicht zu lange lagern lassen. In größeren Betrieben ist es wichtig, sie einer Prüfung durch geeignete Sachverständige zu unterziehen. Die Futternormen für die verschiedenen Ölkuchensorten sind genau innezuhalten; es darf über eine bestimmte Ration nicht hinausgegangen werden. In therapeutischer Beziehung ist die Behandlung in der Hauptsache

eine symptomatische. Daher steht die Prophylaxe im Vordergrund der Bekämpfung der Futterkuchenvergiftung. (Die Arbeit enthält auch Geschichtliches und die technische Herstellung der Ölkuchen.) A.—

Scheunert, A. und Wagner, E.: Über den Einfluß des Kochens auf den Nährwert und den sogenannten Anschlagswert der Nahrung. (Aus d. Veterinär-Physiologischen Institut der Universität Leipzig.) (M. m. W. 1927, S. 1134.)

Friedberger hat auf Grund von Fütterungsversuchen an Ratten die Ansicht vertreten, daß durch Kochen und insbesondere durch zu langes Erhitzen der Nahrung eine gewaltige Herabsetzung des Wertes derselben eintrete. Er bezeichnet daher die Rohkost für die Ernährung des Organismus als rationeller. Als Ausdruck dieser Gedankengänge hat Friedberger den Begriff „Anschlagswert“ eingeführt, den er als einen von der Kochdauer abhängigen Faktor bezeichnet, und der um so geringer sein soll, je länger die Nahrung gekocht ist. Verf. prüften die dargelegten Angaben zunächst durch Fütterungsversuche an Ratten nach. Die verwendete Nahrung hatte folgende Zusammensetzung: 250 g Milchpulver, 250 g Roggenmehl, 350 g Weizenkeime, 137 g Erdnußöl, 10 g Schlammkreide, 3 g Kochsalz und 0,010 mg Jodkali. Dieses Gemisch, mit Wasser versetzt, bildete die Versuchskost. Die Ratten wurden in drei Gruppen zu je vier Stück eingeteilt. Die erste Gruppe erhielt die angegebene Kost roh, die zweite dieselbe $\frac{1}{4}$ Stunde erhitzt. Für die dritte Gruppe wurde das $\frac{1}{4}$ Stunde lang gekochte Material noch vier Stunden lang im kochenden Wasserbad gehalten. Das Ergebnis der Fütterungsexperimente an jungen Ratten läßt sich dahin präzisieren, daß das Wachstum sämtlicher Versuchstiere ganz gleichmäßig erfolgte. Keine der drei Kostformen zeigte sich gegenüber den anderen über- oder unterlegen. Ein zweiter Versuch wurde mit der Kost angestellt, wie sie den Ratten des Instituts seit längerer Zeit gereicht wurde. Sie hatte täglich eine andere Zusammensetzung und bestand aus Fleisch oder Fisch, Zerkali, Hülsenfrüchten, Mehlen, Teigwaren, Blatt- und Wurzelgemüsen. Roh wurde täglich nur etwas Milch sowie ab und zu Grünfutter gegeben. Bei dieser Nahrung, die stets gekocht gereicht wurde, gediehen die Ratten vorzüglich und vermehrten sich stets. Der zweite Versuch wurde nun unter Verwendung der fraglichen Kost in derselben Weise angestellt wie der erste. Ergebnis: Die Rohkosttiere sind am schlechtesten, die mit der am längsten erhitzten Nahrung gefütterten Tiere am besten gewachsen, während die andern Tiere in der Mitte standen.

Bei einem dritten und vierten Versuch wurde Gasthauskost in garem und übergarem Zustande sehr fein zerkleinert als Nahrung für die wachsenden Ratten gereicht. Das Ergebnis entsprach den beiden andern Versuchen: Das Wachstum ging bei beiden Kocharten etwa gleichmäßig vonstatten. Schließlich wurde noch eine Kost bestehend aus gemischter Nahrung und verschiedenen erhitzter Milch geprüft, ebenso die Angaben Friedbergers über den verminderten Nährwert 10 Minuten lang gekochter Eier gegenüber Rohei und kurz gekochtem Ei. Diese Versuche führten zu dem gleichen negativen Resultat wie die vorher erwähnten. Das Gesamtergebnis der Versuche präzisieren die Autoren dahin, daß von einer Verschlechterung des Nährwertes gemischter Nahrung durch den im Haushalt üblichen Kochprozeß keine Rede sein kann. Auch eine vierstündige weitere Erhitzung nahe der Kochtemperatur schädigt den Nährwert nicht. Es ergibt sich daraus der Schluß, daß das Kochen der Nahrung, wie auch eine Jahrtausende alte Erfahrung gelehrt hat, als eine sehr zweckmäßige Maßnahme anzusehen ist, die die Kost eßbarer und verdaulicher macht. Sie schädigt den Nährwert einer gemischten Kost nicht, sondern setzt ihn im Gegenteil durch besseren Aufschluß der Nahrung herauf. Auch das Warmstellen der Speisen bei Temperaturen, wie sie im Haushalt und in öffentlichen Gaststätten üblich sind, bedingt keine

Herabsetzung des Nährwertes und keine Verschwendung an wertvollen Nahrungsmengen. Ein „Anschlagswert“ im Sinne Friedbergers wird daher von den Verf. abgelehnt.

Carl.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Schmidt-Ott: **Über das Eindringen von Infektionserregern in die regionären Lymphdrüsen und den Blutkreislauf nach kutaner Infektion.** Ein Beitrag zur Frage der lokalisierten und der Allgemeininfektion. (Aus dem Staatlichen Institut für experimentelle Therapie und dem Georg-Speyer-Haus, Frankfurt a. M. — Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. W. Knolle.) (Zeitschr. f. Hyg. 1927, Bd. 107, H. 2, S. 441.)

Die Anschauungen über die Beziehungen von Lokal- und Allgemeininfektion sind vielfach noch ungeklärt oder experimentell nicht genügend begründet. Namentlich bei chronischen und bei akuten Infektionskrankheiten, die mit der Bildung eines primären lokalisierten Herdes beginnen, ist die Frage, wie schnell nach dem Zeitpunkt des Eindringens der Erreger in die primäre Infektionsstelle eine Verbreitung von dieser aus in die regionären Drüsen, von da in das Lymph-Blutgefäßsystem stattfindet, nicht nur von theoretischer, sondern namentlich von praktischer Bedeutung. Deshalb wurde die Frage, inwieweit eine Infektion, die an den Geweben der Cutis erfolgt, im biologischen Sinne lokalisiert, mit mehreren Mikroorganismen von verschiedenen biologischen Eigenschaften studiert unter Bedingungen, die der natürlichen Infektion möglichst gleichen. Verf. hat die Untersuchungen mit unbeweglichen Schweinerotlaufbazillen, mit den relativ großen lebhaft beweglichen Trypanosomen und mit Rekurrensspirochäten durchgeführt. Seine Ergebnisse sind folgende: Trypanosomen, Rekurrensspirochäten und Rotlaufbazillen sind bereits sehr kurze Zeit nach der kutanen Infektion in den regionären Lymphdrüsen der Versuchstiere vorhanden. Trypanosomen konnten bereits zwei Minuten nach skrotaler Infektion in den Inguinaldrüsen des Kaninchens nachgewiesen werden. Die Infektiosität des Blutes ließ sich bei der skrotalen Trypanosomeninfektion erst später feststellen, als die der Inguinaldrüsen, aber früher als die der Popliteal-, Axillar- und Bronchialdrüsen. Die Größe der Erreger, Beweglichkeit und Virulenz derselben sind für die Zeit des Eindringens in die Drüsen offenbar nicht das Entscheidende. Dagegen spielt für die Schnelligkeit des Weitervordringens der Erreger von den regionären Lymphdrüsen in das Lymph- und Blutgefäßsystem die Menge der eingedrungenen Erreger neben der Virulenz die entscheidende Rolle. Die geschilderten Versuche geben einen Hinweis auf eine gewisse Schutzwirkung der regionären Drüsen gegen die Weiterverbreitung der Infektion im Organismus. Die Begriffsumgrenzung der lokalisierten Infektion und der Allgemeininfektion bedarf insofern der Präzisierung, als das ausschließliche Vorkommen einer lokalisierten Infektion bei virulenten Erregern überhaupt fraglich ist. Es wird durch weitere Experimentaluntersuchungen an Tieren und Studien bei infizierten Menschen bezüglich anderer akuter und chronischer Infektionen zu untersuchen sein, ob das Auftreten von lokalen Herden, insbesondere die lokale Gewebsreaktion nicht regelmäßig als Ausdruck einer Allgemeininfektion und der sich daran anschließenden Allgemeinreaktion zu betrachten ist.

Ziegler.

Orskov, J.: **Etude sur la morphologie du virus péripneumonique.** (Annales de l'Institut Pasteur T. XLI. 1927, S. 473.)

Verf. berichtet über die Beobachtung des Lungen-seuchevirus im Hellfeld in den verschiedenen Stadien seiner Entwicklung. Die ursprüngliche Form stellt ein kleines ovales Körperchen oder ein Kurzstäbchen dar, wel-

ches in ein verzweigtes Mycel auskeimt, das über eine eigenartige Formenmodifikationsfähigkeit verfügt, wie sie von keinem anderen Mikroorganismus bekannt ist. Das Lungen-seuchevirus hat die Tendenz sich zu autolysieren und dabei morphologisch sehr abweichende Elemente zu bilden, die die Fähigkeiten der Keimung verloren haben. Der Zeitpunkt des Auftretens der Autolyse ist bei den einzelnen Stämmen sehr verschieden.

Baars.

Sergent, E., Donatien, A., Parrot, L., Lestoguard, F. und Plautureux, E.: **Les piroplasmoses bovines. La fièvre de la côte orientale et la Theileriose nord-africaine.** (Etude experimentale comparative). Das Afrikanische Küstenfieber und die nordafrikanische Theileriose.) (Annales de l'Institut Pasteur, 1927, 41, S. 489.)

Theileria dispar (Institut Pasteur, Algier 1924), Erreger der nordafrikanischen Theileriose, stellt eine Abart der Theileria parva (Theiler 1904), Erreger des afrikanischen Küstenfiebers, dar. Der Beweis dafür ist in dem Nichtgelingen der kreuzweisen Immunisierung beider Krankheiten zu erblicken. Man hat bisher angenommen, daß beide Krankheiten auf Grund der Virulenz des Blutes bei der nordafrikanischen Theileriose und der Avirulenz des Blutes bei dem afrikanischen Küstenfieber unterschieden werden könnten, jedoch hat diese Unterscheidungsmethode ihre Beweiskraft verloren, seitdem es den Verf. gelungen ist, in zwölf Versuchen dreimal T. parva auf dem Wege der Blutübertragung zu übertragen. Die auf diese Weise erzielte Infektion verläuft bemerkenswerterweise gutartig. Das afrikanische Küstenfieber äußert sich häufig in Anämie und Milzschwellung. Diese Symptome sind jedoch weniger konstant und ausgesprochen als bei der nordafrikanischen Theileriose. Am zweckmäßigsten erfolgt die Unterscheidung beider Erkrankungen an der Form der im peripheren Blut auftretenden Parasiten. Bei T. parva herrschen stäbchenförmige Parasitenformen vor, während bei T. dispar mehr runde und ovale Formen angetroffen werden.

Baars.

Iwanow, E. und Mesnil, F.: **Le trypanosome de la dourine traverse — t'il la peau ou les muqueuses saines?** (Kann das Tr. equiperdum die Haut bzw. die gesunde Schleimhaut durchdringen?) (Annales de l'Institut Pasteur 1927, 41, S. 507.)

Das Trypanosoma equiperdum — und auch andere verwandte Trypanosomen — besitzen nicht die Fähigkeit, das tierische Gewebe zu durchdringen, denn sie wandern weder durch die gesunde Haut noch durch die nicht lädierte Schleimhaut. Diese Feststellung steht nicht im Gegensatz zu der Kenntnis von der Verbreitung der Dourine durch den Coitus, denn schließlich genügt eine ganz geringe Läsion um eine Infektion, die ja unter natürlichen Verhältnissen leicht ist, zustande kommen zu lassen. Eines der Hauptsymptome der Dourine ist das Oedem der äußeren Geschlechtsteile; es ist daher begreiflich, daß solche Organe leicht Trypanosomen mit serösen Ausscheidungen austreten lassen, die dann in geringe Läsionen an den Schleimhäuten der Geschlechtsteile, wie sie bei dem Geschlechtsakt leicht eintreten, eindringen. Mit der Vermeidung dieses Ansteckungsweges würde man die Krankheit zweckmäßig bekämpfen. Verf. schlägt daher vor, in Gegenden wo die Dourine herrscht, in Deckstationen und dergl. nicht mehr den natürlichen Deckakt zuzulassen, sondern die zugeführten Stuten künstlich zu befruchten.

Baars.

Dubois, A., mitgeteilt von Bruynoghe, R.: **Le phénonène de Kurt Schern dans les trypanosomiasés.** (Comp. Rend. Soc. Biol. 1926, 95, S. 1130.)

Die Veranlassung zu der Arbeit gab die Beobachtung Scherns, daß in vitro aufbewahrte Trypanosomen, die ihre Beweglichkeit verloren haben, durch Zusatz von Serum oder Leberextrakt wieder aktiv werden. Da Schern Glu-

kose hierbei als wirksame Substanz annimmt, wurden mehrere Zuckerarten in ihrer Wirkung auf im Lähmungsstadium befindliche Trypanosomen geprüft. Es zeigte sich, daß Glukose und Laevulose einen starken, Galaktose und Maltose einen etwas schwächeren Einfluß auf die Parasiten (Tryp. brucei) ausübten.

Da der durch Zuckerarten beeinflussbare Lähmungszustand (Labilität) um so ausgeprägter ist, je näher das Tier dem Tode, glaubt der Verfasser ihn der Prognostik dienstbar machen zu können. Er führt die Erscheinung auf Zuckermangel im Blut zurück. Schoop.

Savino, E.: **Relations entre le nombre des Trypanosomes et les variations glycémiques dans l'infection expérimentale par Trypanosoma equiperdum.** (Comp. Rend. Soc. Biol. 1927, 3, S. 220.)

Verfasser prüfte die Beziehungen zwischen der Trypanosomenzahl im kreisenden Blut und dem Zuckergehalt des Blutes. Durch Senkung des Blutzuckerspiegels erreichte er eine Verminderung der Trypanosomen, durch Applikation von Glukose dagegen eine Vermehrung. Jedoch blieb im Laufe der Infektion der Zuckergehalt des Blutes nicht im gleichen Verhältnis zur Trypanosomenzahl. Schoop.

Krijgsman, B. J.: **Die Bewegung der Protozoen.** (Laboratorium der tropischen Krankheiten.) (Sonderdruck aus: „Vakblad voor Biologen“ Nr. 12. 7. Jahrg.)

Die Bewegungen der verschiedenen Protozoengruppen zerfallen in die amöboide, die Gleitbewegung, die Bewegung der Myonemen und in diejenige der fadenförmigen Anhängsel.

Die amöboide Bewegung, die bei Amöben und bei den Protozoen beobachtet wird und bei welcher temporäre Plasmafortsätze, Pseudopodien, hervorgestreckt werden, zerfällt in a) die Tankbewegung, bei der sich das Tier mit seiner Unterseite gegen den Grund gepreßt bewegt und die bei dem Verrukosatypus vorkommt, b) die fließende Bewegung, wobei in der Mitte des Tieres ein Protoplaststrom sich nach vorn bewegt und sich dort entzweispaltet. Sie kommt bei den Amöben des Limaxtypus vor. Diese Art hat ebensowenig wie die Verrukosaformen ausgesprochene Pseudopodien, c) die Laufbewegung, bei der sich typische Pseudopodien bilden. Sie wird bei den Amöben vom Proteustypus beobachtet.

Die Gleitbewegung tritt bei Gregarinen sowie bei Sporozoiten und Merozoiten der Kokzidien auf und besteht in einem regelmäßigen Fortgleiten des ganzen Individuums, wobei das sich fortbewegende Tier regelmäßig Schleim ausscheidet, der hinten am Tier als eine Art sich verlängernden Stieles sitzen bleibt.

Die Bewegung durch Myonemen findet sich bei Gregarinen und vielen Ziliaten und erfolgt durch Fibrillen, in die das Protoplasma differenziert ist.

Bei der Bewegung durch fadenförmige Anhängsel unterscheidet man diejenigen durch Wimper (Cilien) und die durch Geißeln (Peitschenfäden). Die Wimperbewegung findet sich bei den Ciliaten mit regelmäßig angeordneten, verhältnismäßig kurzen, haarförmigen Anhängseln, den Wimpern oder Cilien. Im Zustand der Ruhe stehen diese senkrecht auf der Körperoberfläche, bei der Bewegung schlagen sie nach hinten, aber nicht gerade nach hinten, sondern schräg zur Körperachse.

Die Geißelbewegung stimmt mit der Wimperbewegung sehr überein, die Geißeln sind jedoch viel länger und nur in geringer Zahl bei dem Tier vorhanden und schlagen viel schneller. Wie bei der Dunkelfeldbeleuchtung zu erkennen ist, bilden die verschiedenen Geißelstellungen zusammen durch die schnelle Bewegung einen homogenen Lichtraum. Dieser ist aber die Summe aller von den Geißeln während ihrer Arbeit eingenommenen Stellungen. Um die verschiedenen Stellungen der Geißel sichtbar zu

machen, wird dem Medium ein indifferenten Stoff, z. B. Gelatine in 1prozentiger Lösung, hinzugefügt. Dadurch wird die Bewegung erschwert und damit verlangsamt. Die Geißelbewegung ist, wie der Verfasser bei einigen Monaden beobachten konnte, eine reine Ruderbewegung. Sie stimmt im Prinzip mit der Wimperbewegung überein und ist in zwei Phasen einzuteilen, in den effektiven Schlag, wobei die Geißel mit ihrer ganzen Oberfläche das Wasser berührt, und in den Rückschlag, wobei die Geißel wieder in die Stellung gebracht wird, von wo sie den effektiven Schlag beginnen kann. Dies gilt aber nicht für die Flagellaten mit ihren mehr aktiven Geißeln oder ondulierenden Membranen. Sicherlich dürfte beim Studium der Geißelbewegung die Kinematographie wichtige Dienste leisten. Bass.

Geflügelkrankheiten.

Picard, W. R.: **Untersuchung nach der bakteriellen Art der Hühnerdiphtherie und nach dem Zusammenhang dieser Krankheit mit der Diphtherie des Menschen.** (Aus dem Institut für parasitäre und infektiöse Krankheiten der Reichsuniversität Utrecht. Direktor: Prof. Dr. De Biltz.) Tijdschrift voor Diergeneeskunde 1927, Deel 54, Aflevering 9.)

Der Grund zu dieser Untersuchung war die Ansicht verschiedener Verfasser, daß neben dem Geflügelpockenvirus auch bakterielle Ursachen bei der Genese der Hühnerdiphtherie beteiligt sind und daß diese Geflügelkrankheit mit der Diphtherie des Menschen in engem Zusammenhang steht. Deswegen wurden Kulturversuche mit verschiedenen Bakterienarten aus diphtherischen Prozessen der Mundrachenhöhle kranker oder gestorbener Hühner und Infektionsversuche mit diesen Bakterien angestellt, und in positiven Fällen wurde die Kontagiosität der künstlich infizierten Versuchstiere untersucht. Die zu den Infektionsversuchen benutzten jungen Hähne wurden in einer streng isolierten diphtheriefreien Umgebung gezüchtet und auch nach der Infektion streng von einander geschieden in Ställen auf einem Gelände, in dessen nächster Umgebung keine Diphtherie herrschte. Vor der Infektion wurde die Mundrachenhöhle genau untersucht. Tiere mit den geringsten Scheimhautdefekten wurden nicht verwendet. Reingezüchtet wurden ein pasteurellaartiger Stamm, Bacillus pyocyaneus, ein koliartiger Stamm, drei verschiedene Mikrokokusarten, Micrococcus pyogenes albus et aureus, Bacillus subtilis, Bacillus mycoides (Flügge), Bacillus megatherium (de Bary), Bacterium vulgare (Proteus vulgaris Hauber) und außerdem aus einer Rinderleber der Bacillus necrophorus. Mit 24stündigen gut gewachsenen Bouillonkulturen und mit dem Bacillus necrophorus wurden jedesmal zwei Hähne im Rachen infiziert, und zwar der eine submukös in der Rachenhöhle ($\frac{1}{2}$ cm links und rechts von der Gaumenspalte), der andere dadurch, daß mit Kulturflüssigkeit getränkte Watte auf der vorher erodierten Schleimhaut abgerieben wurde. Nur der Bac. pyocyaneus verursachte einen lokalen diphtherischen Prozeß, der nicht generalisiert und mit leichten allgemeinen Krankheitserscheinungen verbunden ist. Der Bacillus necrophorus spielt als primärer Erreger der Geflügeldiphtherie keine Rolle, kann aber Ursache der Sekundärinfektion bestehender Metastasen in der Rachenschleimhaut und damit der Chronizität dieser Prozesse sein.

Um einen ätiologischen und epidemiologischen Zusammenhang zwischen Geflügel- und menschlicher Diphtherie festzustellen, wurden 48 verschiedene Fälle von Geflügeldiphtherie untersucht, ohne daß in einem Falle der Bazillus von Klebs-Löffler aus den diphtherischen Prozessen der Rachenhöhle des Geflügels hätte isoliert werden können. Auch die Versuche mit ursprünglichem Diphtheriematerial von Menschen bzw. mit Reinkulturen des Diphtheriebazillus und seiner Toxine oder mit Rein-

kulturen verschiedener diphtherieartiger Bazillen nach Skarifikation der Rachenschleimhaut durch Ingestion, durch submuköse Injektion, durch Übertragung von Diphtherieserumkultur auf den Larynx und die Trachea vermittelt gläsernen Spatels die menschliche Diphtherie auf Geflügel zu übertragen, fielen negativ aus. Submuköse Infektion mittels Kultur und mit Diphtherietoxinen veranlaßte erhebliche örtliche und allgemeine Krankheitserscheinungen, die auf die Wirkung der Toxine zurückzuführen sind. Der Kopf und die Infektionsstellen schwellen an, und gleichzeitig traten Depressionserscheinungen auf. In vielen Fällen starben die Tiere bereits nach 36 Stunden, in weniger akuten Fällen bildeten sich umschriebene diphtherische Membranen in der Rachenhöhle, die aber in der Regel fünf bis sechs Tage nach der Infektion wieder verschwunden waren. Schließlich stellte der Verfasser noch Untersuchungen an über die Contagiosität künstlich mit dem Klebs-Löfflerschen Bazillus infizierter Hühner für gesunde Hühner, über die Lebensfähigkeit des Diphtheriebazillus in der Rachenhöhle künstlich infizierter Hühner und über die Anwesenheit des Diphtheriebazillus in der Rachenhöhle der an Geflügeldiphtherie leidenden Hühner oder von gesunden, welche in Ansteckungsherden menschlicher Diphtherie gehalten wurden. Die Untersuchung ergab, daß nur bei der Übertragung sehr großer Mengen Diphtheriebazillen diese noch nach einigen Tagen auf der Rachenschleimhaut der Hühner zugegen sind, daß also das Huhn für die Diphtherie des Menschen nicht empfänglich ist, und demnach der Mensch durch infizierte Hühner kaum angesteckt werden kann, und daß ein epidemiologischer Zusammenhang zwischen der Diphtherie des Menschen und der Hühnerdiphtherie kaum bestehen dürfte. Bass.

van Heelsbergen: **Erfahrung bei der Untersuchung von Geflügelkrankheiten in den Niederlanden.** (Aus dem Institut für Parasitär- und Infektionskrankheiten der Reichsuniversität in Utrecht (Holland). Direktor: Prof. Dr. De Blicke.) (Tijdschrift voor Diengemeeskunde 1927, Deel 54, Aflevering 10, S. 449.)

3. Kokzidiosis.

Es erkrankten besonders junge Hennen, aber auch Küchlein im Alter von 12 Tagen können daran sterben. Auch überjährige Hennen können der Krankheit zum Opfer fallen. Die Monate Mai, Juni und Juli sind die echten Kokzidienmonate, November, Dezember und Januar wird die Krankheit nicht beobachtet. Wie der Ansteckungsstoff auf das Gebiet gelangt, ist nicht bekannt. Denn auch auf Gelände, auf dem vorher niemals Hühner gelaufen waren und wo der Besitzer ausschließlich mit Eintagsküken begonnen hatte, wurde die Krankheit gesehen. Sollten die Eintagsküken bereits den Ansteckungsstoff in sich tragen oder hatten andere Vögel das Gelände verseucht? Bei vielen völlig gesunden Tieren finden sich Kokzidien in den Därmen, ohne daß sie an Kokzidiose leiden. Die Krankheit kennzeichnet sich klinisch durch Apathie. Die Tiere sitzen teilnahmslos zusammengekauert, häufig einige zusammen. Beim Füttern kommen sie herab, unmittelbar nach dem Fressen setzen sie sich wieder ruhig hin. Sie magern ab und haben nicht selten blutigen Durchfall. Sie gähnen gewöhnlich. Kräftige und wenig infizierte Tiere zeigen häufig ein ganz normales lebhaftes Aussehen. Die Zahl der Todesfälle hängt von der Heftigkeit und der Jugend der Tiere ab. Bei Küchlein von 3—4 Wochen und bei heftiger Infektion können die Todesfälle 30 Prozent und mehr betragen. Todesfälle bei Küchlein unter zwei Wochen lassen an Pulloruminfektion denken, bei Todesfällen bei Küchlein über 2—3 Wochen besteht starker Verdacht auf Kokzidiosis. Nur die mikroskopische und bakteriologische Untersuchung sichert die Diagnose. Bei der Sektion wird Enteritis nachgewiesen. Die Schleimhaut ist meistens verdickt und sieht sammetartig aus, in heftigen Fällen liegt auf ihr eine gallertige, krümelige Exsudatmasse, in anderen Fällen ist die Schleim-

haut, besonders bei jungen Tieren, ganz hämorrhagisch. In vielen Fällen, hauptsächlich bei jungen Küchlein ist der Blinddarm angegriffen. Er ist erweitert und mitunter mit käsiger Exsudatmasse angefüllt. Bisweilen ist die Schleimhaut stark hämorrhagisch. In vielen anderen Fällen zeigt sich am Blinddarm nichts besonders.

Der Anfang der Kokzidieninfektion ist stets im Duodenum zu suchen.

Der kritische Punkt der Kokzidiose liegt wahrscheinlich nicht so sehr in der Schizogonie, sondern besonders im Freiwerden der Oozysten, wobei ausgebreitete Epitheldefekte entstehen. Um die Diagnose frühzeitig stellen zu können, muß ein ungefärbtes Präparat mikroskopisch nach Schizonten, Merozoiten, Makro- und Mikrogametozyten, nicht nur nach Oozysten, durchsucht werden.

Im Gegensatz zur Kokzidiose des Rindes und des Kaninchens hat beim Geflügel Creolin bisher nichts geleistet, doch sind die Versuche damit noch nicht abgeschlossen. Von vielen Seiten wird Catechu (ein kleiner Kaffeeelöffel des braunen Pulvers in vier Liter Wasser, Sublimat (1:1000) als Trinkwasser gerühmt. Wichtiger als die arzneiliche Behandlung sind die hygienischen Maßregeln, Fütterung, Wohnung und Pflege. Die Hauptquelle der Infektion sind die Faeces. Frisch sind sie nicht infektiös, wohl aber, wenn sie 2½—3 Tage alt sind. Daher müssen sie möglichst jeden Tag entfernt werden, und der Boden ist trocken zu halten. Da der Stall leichter desinfiziert und sauber gehalten werden kann als der Auslauf, so sind die Tiere 14 Tage aufzustallen und müssen mit dem Trinkwasser Catechu erhalten. Der Auslauf ist mit Kalk zu bestreuen und umzugraben. Kranke Tiere und solche mit Diarrhoe sind möglichst rasch zu isolieren. Küchlein sollen vom ersten Tage ausschließlich Buttermilch und nicht zuviel Futter erhalten. Guter zugfreier Stall (auch unter der Kunstmutter), gute Ventilation, Schutz im Auslauf gegen Regen und Wind, trockener Boden inner- und außerhalb des Stalles. Bass.

Standesangelegenheiten.

Landesgruppe Sachsen des Reichsverbandes der Deutschen Gemeindetierärzte.

Dresden, am 3. Dezember 1927.

Anwesend: 40 Mitglieder und 6 Gäste. Nach Begrüßung der Anwesenden Ehrung des Andenkens des verstorben. Koll. Loos-Eibenstock und Beglückwünschung des Herrn Ob.-Vet.-Rat Angermann zu seinem 25jähr. Dienstjubiläum als Direktor des Städt. Vieh- und Schlachthofes in Dresden. Durch den 1. Vorf. Thomas beschließt man den Wiederaufbau des D.V.R. mit allen Mitteln zu fördern, die Erhebung einer Gewerbesteuer auf die Einkünfte aus der ambul. Befchau als unberechtigt abzulehnen und einen Antrag auf Erhöhung der Fleischbefchaugebühren bis auf weiteres zu verschieben. Die Sammlung für ein Joest-Denkmal in Leipzig zu unterstützen, wird allen Mitgliedern zur Ehrenpflicht gemacht. Schmidt-Chemnitz: Vortrag über das neue Lebensmittelgesetz. In der folgenden Aussprache wird festgestellt, daß nach § 21 des Gesetzes die Schlachthöfe als öffentliche Anstalten gelten und zur Kosteneinzahlung berechtigt seien. In Zweifelsfällen habe das Ministerium zu entscheiden. Dr. Rühmekorf-Leipzig: „Zur Durchführung der Milchkontrolle in den sächsischen Gemeinden“. Im Anschluß an diesen Vortrag wird beschlossen: 1. Durch Dr. Rühmekorf Ausbildungskurse von dreitägiger Dauer in der Milchkontrolle für Gemeindetierärzte abhalten zu lassen, 2. folgende Resolution dem Sächs. Gemeindetag zuzustellen: Der Ausbau der Milchnerforschung in den sächs. Gemeinden ist eine dringende Notwendigkeit. Neben der chemischen Untersuchung, die in das Aufgabengebiet des Chemikers fällt, ist eine Untersuchung in bakteriologischer, hygienischer und biologischer Beziehung unbedingt erforderlich. Letztere Untersuchungen können nur von Tierärzten durchgeführt werden. In erster Linie sind gemäß ihrer fachlichen Vor-

bildung die Gemeindetierärzte berufen. Die Frühjahrsversammlung findet in Zwickau statt. Dr. Schneiderheinze, 1. Schriftf.

Verein Schlesischer Tierärzte.

126. Versammlung am 6. November 1927.

Prof. Dr. Casper begrüßte die Erschienenen, etwa 140 an der Zahl und gedachte der seit der Frühjahrsversammlung verstorbenen vier lieben Kollegen: Vet.-Rat Schirmeisen in Rosenberg (Ob.-Schl.), Stadttierarzt Dr. Littwitz in Breslau, Dr. Oyen in Kostenblut und Herfchel sen. in Görlitz. Der Heimgang der vier lieben Kollegen ist für den Verein ein schwerer Verlust. Ihr Andenken wurde in üblicher Weise geehrt. Wegen Verzug sind aus dem Verein ausgetreten: Vet.-Rat Scharsich in Liegnitz, Dr. Schildwächter in Heinrichau, Dr. Dohme in Breslau. Neu aufgenommen wurden: 1. Dr. Peissrich, Stabsvet., Militsch, 2. Dr. Schiche in Mittelwalde, 3. Dr. Priemer am Vet.-Institut in Breslau, 4. Dr. Rathmann, Vet.-Rat in Rosenberg (Ob.-Schl.), 5. Dr. Krämer, Vet.-Rat i. V. in Striegau, 6. Dr. Willkomm, bei der Prov.-Viehversicherung in Breslau, 7. Dr. Kern, Schlachthofdirektor in Grünberg, 8. Dr. Fröhlich, 9. Dr. Jargel, 10. Dr. Geyer, alle drei am bakteriol. Institut in Breslau, 11. Dr. Libon in Landeshut, 12. Dr. Tautz, Vet.-Rat in Goldberg, 13. Rohr in Guhrau. Reg.- und Vet.-Rat Oestreich in Oppeln, der am 17. September in jugendlicher Frische seinen 70. Geburtstag feiern konnte, brachte der Vorsitzende nachträglich im Namen des Vereins die herzlichsten Glückwünsche dar. Der geschätzte Kassierer des Vereins, Magistrats-Veterinär Gerlach, ist gelegentlich der 25jähr. Jubelfeier des Vereins Preussischer Schlachthof-tierärzte von der Berliner Hochschule zum Dr. med. vet. h. c. promoviert worden. Unter dem lebhaften Beifall der Versammlung beglückwünschte der Vorf. namens des Vereins den Kollegen Gerlach sowie seine Gruppe der Schlachthoftierärzte zu dieser großen Auszeichnung. Tierarzt Haering, früher in Sohrau (Ob.-Schl.), jetzt in Köfchenbroda i. Sa., der durch die unfelige Grenzziehung in Oberschlesien um seine Erparnisse gekommen und durch ein schweres Leiden an der Ausübung der tierärztlichen Praxis verhindert ist, bittet die Kollegen, Abschlüsse von Versicherungen aller Art bei ihm zu tätigen. Er vertritt den Stuttgarter Verein und die Konzerngesellschaft Stuttgart-Lübeck. Der Vorstand wurde ermächtigt, für die 150-Jahrfeier der Hochschule in Hannover einen Beitrag aus der Kasse zu leisten. Dr. Langner aus Deutsch-Lissa sprach über **Euterkrankheiten**. Er behandelte insbesondere ausführlich die Streptokokkenmastitis und die Pyogenes-Bacilllose. An der Aussprache beteiligten sich Dr. Schulz aus Goldberg, Dr. Schumann, der mit Vakzinen zwei gute Erfolge gehabt hat, Dr. Derksen und Dr. Skerlo. Dr. Brüggenmann empfahl neben der Vakzinierung rechtzeitiges Ausmerzen durch Abschachtung. Im Anschluß daran wurde der Geflügeltuberkulosefilm von Dr. Lerche vorgeführt. Dr. Bente forderte zum Beitritt an die Verrechnungsstelle auf. Dr. Peetz berichtete über üble Zufälle nach der Maul- und Klauenfeuche-Impfung, insbesondere über Abszeßbildungen. Dr. Rust glaubte, daß es sich hierbei um Zufälligkeiten und wahrscheinlich um eine Infektion durch die Impfnadel, nicht aber um eine Schädlichkeit im Serum handelte.

Vorf.: Prof. Dr. Casper. Schriftf.: Dr. Riedel.

9. Bundestag des D.V.O.B.

28. November, 17 Uhr, im Hörsaal des Heeres-Veterinär-Untersuchungs-Amtes Berlin.

Anwesend 29 Mitglieder. Der Vorf. gedenkt der im letzten Jahre Verstorbenen, der Generaloberveterinäre Dr. Bächstädt und Güntherberg, der Oberstabsveterinäre Beckmann und Pankritius, der Stabsveterinäre Brennecke und Abromeit. Die Versammlung erhebt sich zur Ehre der Verstorbenen. 1. Tätigkeitsbericht des Vorf. 2. Kassenbericht. Der Bestand der Kasse (ohne Nothilfefonds) betrug am 16. November 1926 3488,76 Mark. Die Einnahmen einschl. der Beiträge für den D.V.R. vom 16. November 1927 betrugen 2870,78 Mark. Die Ausgaben einschl. der Beiträge zum D.V.R. betrugen vom 16. November 1926 bis 16. November 1927 3619,27 Mark. Bestand der Kasse am 16. November 1927 (ohne Nothilfefonds) 2940,27 Mark. Außenstände an Mitgliederbeiträgen 264 Mark. 3. Neuwahl des Vorstandes. Der alte Vorstand wird wiedergewählt. 4. Haus-

haltsplan für 1928 mit 1954 Mark Ausgaben wird genehmigt. 5. Mitgliederbeitrag bis auf weiteres 3 RM. 6. Beitritt des D.V.O.B. zur neuen Organisation, die an die Stelle des bisherigen D.V.R. treten soll. Gegen den Beitritt bestünden insofern Bedenken, als der D.V.O.B. geschlossen so wie so nicht beitreten könne, da er zu seinen Mitgliedern auch Frauen zähle. Dann sei er auch in seiner männlichen Mitgliederzahl nicht einheitlich zusammengesetzt. Er enthalte aktive und verabschiedete Veterinäroffiziere, folche des früheren Beurlaubtenstandes und ehemalige Veterinäroffiziere a. K. Da die Gruppe der aktiven Veterinär-offiziere einer Organisation, die nicht alle Gruppen der Tierärzte umfasse, wie festgestellt worden ist, nicht beitreten könne, falle diese schon aus. Ein großer Teil der verabschiedeten Veterinäroffiziere, die Mitglieder des D.V.O.B. seien, seien auch folche des R.P.T., und würden gleichfalls einen Beitritt zu der geplanten Organisation der festbeforderten Tierärzte ablehnen. Damit würde aber ein für den D.V.O.B. gefährbringendes Trennungsmoment in ihn hineingetragen werden. Das Eingehen einer Arbeitsgemeinschaft mit der neu zu schaffenden Organisation bedeute daselbe. Die aus Mitgliederkreisen vorliegenden entgegengesetzten Anträge für und gegen den Beitritt des D.V.O.B. werden verlesen und die Versammlung kommt nach eingehender Aussprache zu dem einmütigen Entschluß, keinesfalls den Beitritt mit einer Schwächung des D.V.O.B., der im übrigen seine ganz besonderen eigenen Zwecke und Ziele habe, zu erkaufen. Von Dr. Maas wird folgender Antrag gestellt und angenommen: Die Bundesversammlung wolle beschließen, dem von Herrn Geheimrat Schmaltz propagierten Zusammenschluß der tierärztlichen Verbände gegenüber, bewahrt der D.V.O.B. vorläufig abwartende Neutralität.

1. Vorf.: Wöhler.

1. Schriftf.: Dr. Meyer.

Verschiedene Mitteilungen.

150-Jahrfeier der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover.

13. bis 15. Juni 1928.

Im Jahre 1928 vollendet die Tierärztliche Hochschule zu Hannover 150 Jahre ihres Bestehens. Ein solcher Zeitabschnitt fordert ein besonderes Gedenken. Das Gedächtnis der Gründung soll in den Tagen vom 13. bis 15. Juni 1928 durch eine der Bedeutung derselben entsprechende Feier festlich begangen werden. Einem Gartenfest am Abend des 13. Juni, das zugleich dem Empfang der zu erwartenden Gäste dienen soll, wird sich am Hauptfesttage, dem 14. Juni, ein akademischer Festakt in der Stadthalle anschließen. Am gleichen Tage werden sich alsdann die Festteilnehmer zu einem Festessen und einer Festvorstellung im Opernhaus vereinigen. Ein weiterer Festtag ist der Einweihung einer Gedenktafel Robert Koch's, des Meisters der Bakteriologie, an seiner Wirkungsstätte in Langenhagen b. Hannover sowie der Grundsteinlegung der gynäkologischen Klinik und der Befichtigung der Hochschulinstitute gewidmet. Am Abend wird die 150-Jahrfeier mit einem Kommers beschloffen werden. Der Tierärztlichen Hochschule wird es aus nahe-liegenden Gründen trotz besten Willens kaum möglich sein, alle diejenigen, die der 150-Jahrfeier Interesse entgegenbringen, zu erfassen und mit einer besonderen Einladung zu bedenken. Es wird deshalb höflichst gebeten, daß diejenigen, die dem Feste beiwohnen wollen, aber eine besondere Einladung nicht erhalten, ihre Anschrift und Wünsche dem Leiter des Festausschusses für die 150-Jahrfeier: Prof. Dr. Trautmann, Hannover, Misburger Damm 16, Physiologisches Institut, bis spätestens 15. März 1928 mitteilen. Etwaige Gaben für die Hochschule anlässlich ihres 150. Geburtstages sollen in der Hauptsache zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten verwendet werden. Ihr Verbrauch für Stipendien oder zur Ausgestaltung der Jubiläumsfeier ist nicht beabsichtigt, soweit nicht besondere Wünsche der Spender anders bestimmen.

Prüfung für Veterinärärzte.

Die nächste praktische-mündliche Prüfung für Veterinärärzte wird an der Tierärztlichen Hochschule in Berlin in der Zeit vom 20. Februar bis 1. März 1928 abgehalten werden. Müssemeier.

Tierärztliche Verrechnungsstelle für die Provinz Brandenburg.

Sonntag, den 22. Januar, nachmittags 2 Uhr, in Berlin bei Mitscher, Französische Straße 17—18. 1. Jahresbericht; 2. Verwendung des Über-

schusses aus dem Rechnungsjahr 1927; 3. Satzungsänderung; 4. Vorstands-wahl; 5. Vorschläge zur Verbesserung des Geschäftsbetriebes, (Einführung eines persönlich gehaltenen Liquidationsformulars); 6. Augenblicklicher Stand der Verforgung und Erweiterung durch die Einrichtung einer Krankenkasse. Nichtmitglieder sind als Gäste willkommen. Nach der Tagung gefelliges Kolloquium. Wir würden uns freuen, wenn an diesem auch die Damen teilnehmen würden.

Zur besonderen Kenntnis! Die Provinzial-Lebensversicherungsanstalt Frankfurt a. O. hat sich bereit erklärt, durch einen Zusatzvertrag zu unserem Kollektiv-Unfallvertrag den Prämienfatz erheblich herabzusetzen. Die Zusatzprämie für ein Tagegeld von 10,— Mark beträgt nur 45,— Mark jährlich. Die Mitglieder werden gebeten, von diesem einzigartigen Entgegenkommen der Anstalt Gebrauch zu machen. Vorf.: Reiche-Nauen.

Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde.

Wintertagung am 1. Februar 1928, 10 Uhr, Berlin, Meisterfaal, Köthener Straße 38. Prof. Dr. Keller-Wien: Über das Problem der Entartung mit besonderer Berücksichtigung des sexualbiologischen Standpunktes. (Zur Frage der Intersexualität.) (Mit Lichtbildern.) Prof. Dr. Walther-Hohenheim: Welche für die Tierzucht verwertbaren Fortschritte haben in den letzten Jahren die Forschungen auf dem Gebiete der Konstitution gebracht? Prof. Dr. Hensfeler-München: Die Wolle vom Schaf bis zum Schiff in Australien. (Mit Lichtbildern.) — Gäste sind willkommen.

16. Fortbildungskursus des D.V.R.

in Erfurt am 28. und 29. Januar 1928.

Sonabend, den 28. Januar, 10 Uhr: Ministerialrat Dr. Schotte-Weimar: „Die ansteckende Blutarmut der Einhufer“. 11 Uhr: Oberregierungsrat Dr. Traeger-Erfurt: „Tierärztlicher Berufsstand und Staat“. 12 Uhr: Prof. Dr. Richter-Leipzig: „Euterkrankheiten“. 15 Uhr: Regierungsrat Dr. Koch-Weimar: „Tierzucht“. 16 Uhr: Dr. Schmidt-Hoensdorf-Halle: „Was muß der prakt. Tierarzt von den Geflügelkrankheiten und ihrer Bekämpfung wissen“. Anschließend Befprechung der Vorträge.

Sonntag, den 29. Januar, 9 Uhr: Prof. Dr. Lund-Hannover: „Ausgewählte Kapitel aus den neuen Ausführungsbestimmungen A zum Reichsfleischbeschaugesetz“. Anschließend Prof. Dr. Götze-Hannover: „Operationen am Rind unter Lokalnarkose sowie neue Instrumente für Geburtshilfe und ihre Anwendung“. Prof. Dr. Nölker-Berlin: „Parasitäre Erkrankungen und Fragen ihrer Behandlung“. Befprechung der Vorträge. Die Vorträge und Demonstrationen finden sämtlich in den Räumen des Schlachthofes statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 10 Mark für beide Tage. Zimmervermietung übernimmt Dr. Gückel-Erfurt, Anger 9.

Stang.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Das technisch- und landwirtschaftlich-bakteriologische Studium. Von Prof. Dr. Henneberg. Verlag Paul Parey, Berlin.

Der in der Schrift niedergelegte Gedankengang des Verfassers ist folgender: Da die Zahl der Saprophyten weit höher ist als die Zahl der pathogenen Bakterien, ist auch das Gebiet der nichtmedizinischen Bakteriologie weit größer als das der medizinischen. Wohl haben sich neben der medizinischen die technische und landwirtschaftliche, d. h. die angewandte Bakteriologie zu großen Spezialgebieten entwickelt, nicht aber die rein wissenschaftliche Bakteriologie. Während es dem Mediziner vor allem darauf ankommt, sichere Nachweismethoden für das Vorhandensein oder Fehlen pathogener Bakterien zu haben, ist die technische und landwirtschaftliche Bakteriologie von Beginn an biologisch eingestellt, daher sind für alle, die sich auf dem Gebiet der nichtmedizinischen Bakteriologie betätigen wollen, botanische, biologische, physiologische, physikalische und chemische Vorkenntnisse durchaus notwendig. Wer sich mit bestimmten Spezialgebieten beschäftigen will, bedarf außerdem noch gewisser zoologischer, histologischer, anatomischer, medizinischer, technischer oder landwirtschaftlicher Kenntnisse. Nur bei möglichst guter allgemein naturwissenschaftlicher und allgemein bakteriologischer Vorbildung kann man im Bedarfsfalle sich schnell in die Einzelheiten einarbeiten. Verfasser macht

dann Vorschläge für das Spezialbakteriologische Studium mit dem Endziel, daß die Bakteriologie eine selbständige Wissenschaft wird und die Spezialbakteriologen ein Arbeitsfeld übernehmen, das sich auch auf die pathogenen Bakterien erstreckt und somit weit in die Gebiete der Mediziner und Veterinärmediziner hineingreift. Uns Tierärzte interessiert besonders, wie sich der Verfasser die Ausbildung solcher Spezialbakteriologen und ihre Tätigkeit auf dem Gebiete der Milchuntersuchung denkt. So schreibt er, daß, sobald es sich hierum handele, vor allem die Kenntnis der in Betracht kommenden pathogenen Bakterien notwendig sei. Es seien weiter für den Nachweis der Tuberkelbakterien Meerschweinchenimpfungen nicht zu umgehen. Deshalb müsse der Spezialbakteriologe gegebenenfalls während des Studiums Vorlesungen und Praktika in den hygienischen und bakteriologischen Instituten besuchen. Er erwähnt dabei besonders, daß viele Tierärzte meinen, nur ein Tierarzt verstehe bakteriologische Milchuntersuchungen zu machen. Der Nachweis pathologisch veränderter Milch könne aber erfahrungsgemäß sehr leicht im Laboratorium durch die sehr gut ausgearbeitete mikroskopische Analyse in Verbindung mit der chemischen ausgeführt werden. Dagegen werde sich der Bakteriologe oder der Chemiker niemals in die Behandlung der kranken Tiere einmischen. Der Herr Verfasser wird Verständnis dafür haben, wenn die Tierärzte seinen Standpunkt nicht für diskutabel halten. Er hatte doch Gelegenheit, die Ausstellung der hygienischen Institute der Tierärztlichen Hochschulen auf der Gesolei im Jahre 1926 zu sehen. Die Ausstellung brachte ein überwältigendes Material, sie zeigte, wie tief die Tierärzte in die Bakteriologie eingedrungen sind. Der Nachweis pathogener Bakterien in der Milch, soweit sie vom Tier übertragen sind, muß ebenso Aufgabe des Tierarztes bleiben wie der Nachweis sonstiger krankhafter Beimengungen und der Enzyme. Die Diagnostik pathogener Bakterien in der Milch ist zudem wirklich nicht so einfach, daß man sie schematisieren könnte. Ich erinnere nur an die wechselnden Formen, in denen die tierischen Streptokokken auftreten und an die mannigfaltigen Bilder der Leukozyten, auch daran, daß noch Epithelien oder deren Fragmente sich im mikroskopischen Bilde finden können und die Diagnose komplizieren. Auch muß der Tierarzt die Milchuntersuchungen schon deshalb vornehmen, weil die Behandlung der wichtigen Streptokokkenmastitis auf die Gestaltung stallspezifischer Impfstoffe beruht, die aus abgeschwächten Agarkulturen genommen werden, deren Herstellung doch unbestritten Aufgabe des tierärztlichen Bakteriologen ist. Soll nun außer der Untersuchung kranker Milch der Spezialbakteriologe auch die Untersuchung der übrigen von Tieren stammenden Nahrungsmittel vornehmen und die strafrechtliche Verantwortung dafür tragen, ob sie genußtauglich sind oder nicht, würde er doch manches Mal in bittere Verlegenheit geraten, sobald er sich nicht allein auf den Bakteriennachweis beschränkt, der nicht immer zur Beurteilung der Genußtauglichkeit genügt. Die Tierärzte haben auf dem Gebiet der Milchuntersuchung und der Untersuchung der übrigen von Tieren stammenden Nahrungsmittel so viel wertvolle Forscherarbeit geleistet, daß ihre Tätigkeit hierbei nicht mehr zu entbehren ist.

Dr. Heine.

E. Mercks Jahresbericht 1926, XL. Jahrgang, über Neuerungen auf den Gebieten der Pharmako-Therapie und Pharmazie ist erschienen. Er enthält Artikel von Privatdozent Dr. med. F. Holz: „Über das Nigantol“; Prof. Dr. E. Moro: „Über kutane Tuberkulin-Diagnostik“; Prof. Gadamer: „Über Bulbocapnin, ein Alkaloid der *Corydalis cava*“; Dr. de Jong: „Einige klinische und pharmakologische Bemerkungen über Bulbocapnin“. Der Jahresbericht bringt ferner eine 278 Seiten umfassende Übersicht über Präparate und Drogen, ein Verzeichnis der Indikationen und ein Literaturverzeichnis.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Reg- und Veterinärtrat Traeger in Erfurt zum Oberregierungs- und Veterinärtrat; Dr. W. Zengel in Malchow zum Veterinärtrat unter Übertragung der Veterinärstelle des Kreises Waren (Müritz).

Befördert: Zu Bezirkstierärzten der Bel.-Gruppe XI: Oberveterinärtrat Hugo Fäufle, Stark-Oberdorf; Oberveterinärtrat Friedrich Löhle, Geroldshofen; Adolf Hochenadl, Vilshofen.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck: von Aug. Eberlein & Co., Hannover-Linden.

Veterinärhistorische Mitteilungen

Herausgegeben von der

Gesellschaft für Geschichte und Literatur der Veterinärmedizin

Schriftleiter:

Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

zwanglos erscheinende Beilage zur Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift
Verlag von M. & H. Schaper in Hannover
Sonderbezugspreis 1,50 Goldmark das Jahr, freibleibend

Nr. 1.

1928.

8. Jahrgang.

Über die Herkunft einiger Stellen im C. H. G. II.

Von Dr. K. Hoppe, Krefeld.

(Schluß.)

b) Möglicherweise hat Africanus es aber auch aus Galen, der es XIV 146 aus Apollonius Mys anführt. Hierfür würde sprechen, daß sich, was Africanus § 16 über den sogenannten *δράκων ὄφις* berichtet, größtenteils (S. 209 1—) mit den Worten des Paulus von Aegina berührt (V 15), der in der Überschrift des Kapitels ausdrücklich Galen (gemeint ist XIV 234) als Quelle nennt. Da mir in hiesiger Industriestadt eine Galenausgabe nicht zur Verfügung steht, vermag ich der Sache augenblicklich leider nicht nachzugehen, ich kann nur feststellen, daß sich das von Africanus gegen diese Schlange empfohlene Mittel bei Paulus nicht findet, doch wird Galen von diesem auch nur für den Anfang des Abschnittes zitiert.

c) Wie ich im Verzeichnis der Eigenamen des ersten Bandes den dort zweimal vorkommenden Tarentinus versehentlich mit Herakleides von Tarent identifiziert habe (was Praefatio p. XII berichtigt ist), habe ich im Verfolg einer Andeutung Odors (Rhein. Mus. 51, 63) im zweiten Bande (Hipp. Cant. 62, 5) den Namen Herakleides fälschlich in den Text gesetzt. Es handelt sich um eine solche eines gewissen Moschion gegen Knochenbrüche mit Wunden, und ohne solche, deren Rezept der Überlieferung nach einer Schrift eines Herakleios entnommen sein soll. Daß nichts zu ändern sei, wurde mir klar, als ich in Heibergs Ausgabe des Paulus von Aegina VII 87 fand, daß dessen älteste Handschrift den Titel des Rezeptes in derselben Form bietet wie der Cantabrigiensis der Hippiatrica, nur daß die Urhebererschaft des Moschion verschwigen wird (*ἐν τῶν Ἱππιατρικῶν*, während die Mehrzahl der Paulushandschriften *Ἱππιατρικῶν* lesen). Der von Wellmann beratene Herausgeber verweist auf Galen XIII 546 und belehrt uns, daß in Wahrheit *ἐν τῶν Ἱππα* stimme. Heras aus Kappadokien wird dreimal von Celsus zitiert; nach Wellmann hat er um 40 v. Chr. geschrieben. Von Paulus können die Hippiatrica nicht abhängen, da sie den Namen des Moschion nennen. Die Überinstimmung mit der ältesten Paulusüberlieferung beweist aber, daß der Name Herakleios in ihnen nicht zu ändern ist. Man hat anzunehmen, daß Paulus wie der Autor, der in den Hippiatrica redet, dieselbe verfälschte Überlieferung in einer gemeinschaftlichen Quelle vorgefunden haben. Auch Paulus wird nicht *ἐν τῶν Ἱππιατρικῶν* geschrieben haben, wie Heiberg druckt, sondern *ἐν τῶν Ἱππιατρικῶν*.

In dem Notabilia Ouedam überschriebenen Abschnitte der Indices des zweiten Bandes, den ich leider mit Rücksicht auf den zur Verfügung stehenden

sigem Geiste (der Schriftsteller) abgefaßt war“. Der Verfasser hat vielmehr, was er über Pferdenacht bei seinen Gewährsmännern an verschiedenen Stellen zerstreut vorfand, aus geschiedenen, zusammengefaßt und daraus einen Auszug angefertigt. *meo naturali ingenio* hat etwa den Sinn „nach meiner natürlichen (nicht weiter ausgebildeten) Veranlagung nach meinen schwachen Kräften“. Eine Entschuldigung, wie sie in solchen Vorreden üblich war: es ist eine leise literarische Reminiscenz wie wahscheinlich auch der merkwürdige Ausdruck *motus animae*.

Die *Medicamentorum* bezeugt also mit eigenen Worten ihren kompilatorischen Charakter, der V.H.M. 1926, S. 4, aus den Verfasserbeischriften zweier Kapitel erschlossen wurde. Sie ist von Anfang an zur Veröffentlichung in Buchform bestimmt gewesen, die Vorstellung von ihr als Niederschrift eines veterinärmedizinischen Kollegs ist unhaltbar. (Schluß folgt.)

Bücherbesprechungen.

Deutsche Veterinärhandschriften.

Hermann Degerings, „Kurzes Verzeichnis der Germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek. I. Die Handschriften in Folioformat“ (Mitteilungen a. d. Preuß. Staatsbibliothek, VII) (Leipzig 1925) beschreibt folgende Veterinärhandschriften:

Ms. Germ. Fol. 64: Zinner, Giov. Giorgio, Libro que trata de los frenos a la Brida y Gieneta. Auf Bl. 61 r Gannß bewehrtes und künstliches Roß-Arztney-Puech (16./17. Jhdt.).

Ms. Germ. Fol. 89: Roßarztneibüchlein (16./17. Jhdt.).

Ms. Germ. Fol. 208: Meister Albrecht, Roßarztney (15. Jhdt.).

Ms. Germ. Fol. 1055: Stephan Grau, Viehe-Artztney-Buch (18. Jhdt.).

Ms. Germ. Fol. 1137: Bl. 13 r Ain vast. cöstlich Roß-Artztney-Puech vomm vmd für väll manicherlay geprechen vmd Mengel der Phärdren [1].

Ms. Germ. Fol. 1138: Handbuch der Pferdekunde (mit folg. Kapiteln: Was an einem Pferd zu betrachten, so mans kaufen will; Wie man sich vor der Roß-kemme oder Pferde-Verkhauffter Betriegerol hieten soll; Von Ungestalt, Mangel und Laster der Pferde; Vom Alter der Pferde; Von etzlichen bösen Lastern, die sich an jungen und alten Pferden uflegen zu begeben, wie man ihnen dieselben abgewelnen soll; Wie man die Pferdts das ganze Jahr durch fuettern soll.

Ms. Germ. Fol. 1139: Etliche probierte Künst der Roßartzney so durch Hannsen Stauber zusammen gezogen den 15. Martij Anno 1573 (Abschrift von 1647).

Ms. Germ. Fol. 1140: Roß-Artztney-Buech.

Die Mss. 1137- 1140 entstammen dem 17. Jhdt. und dem ehemaligen Besitze der Grafen von Starhemberg auf Riedegg.) Rudolph Zaunick, Dresden.

Mit der fachgeschichtlichen Bearbeitung der obenstehenden Berliner Handschriften beschäftigen sich seit zwei Jahren mehrere Berliner Mitglieder unserer Gesellschaft. W. Rieck.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Rieck, Berlin-Cöpenick, Kirchstraße 4. Verlag von M. & H. Schaper Hannover. — Druck von Aug. Eberlein & Co., Hannover.

Raum stark haben kürzen müssen, findet man unter dem Stichwort *ἐν ἀρχαῖον* ein Verzeichnis der zahlreichen Stellen, wo in den Hippokratia auf Heilung menschlicher Krankheiten Bezug genommen wird (hinzuzufügen ist II 263a). In dieselbe Kategorie gehören auch die beiden Rezepte des Azanites vol. I 130, 126; 127. Es geht doch zu denken, daß diese, worauf die Anmerkung hinweist, ebenfalls von dem Kapadokier Heras stammen. Wer da meinte, solche Beziehungen zu den Schriften der Menschenärzte fanden sich nur bei den griechischen Veterinären, die eben bei der Schweiterwissenschaft Anleihen gemacht hätten, weil sie selbst nichts Rechtes verstanden — mir ist diese Mißachtung als Tatsache bekannt — der würde sich schwer irren. Über Pelagionius, der sich ja im Gegensatz zu seinen griechischen Kollegen der Hochachtung erfreut, wird im laufenden Jahrbuch gehandelt werden. Aber auch die Mulomedicina Chironis macht keine Ausnahme: c. 825 *hi pastilli et hominibus utiles sunt, pro pipervato ieiunus in vino tepido bibat*, c. 853 *unctio ad venas calefaciendas sive in hominibus sive in iumentis, et in pessis, cum peperunt mulieres, supponit sibi, ut melius purgetur*, c. 884, wo gerade das von Oder angezeigte *hominibus* nach Ausweis von C.H.G. I 130, 17; II 267 (L 79) richtig ist, c. 891 *iumento impunito vel homini, c. 922 ex eo medicamento et hominibus ungues aufertur et lepra ex corpore aufertur*. Ein Menschenarzt wird im ihr sogar mit Namen genannt, der Erlauchtesten einer, Erasistratus. Allerdings ist c. 928 b in der Handschrift *Erasistratum liquidum* überliefert, und Odors Lesung *Erasistratum* hat wegen der doppelten Änderung nicht überall Anklang gefunden. Sie wird aber durch Ortheasus Synopsis III 135 (*Ἐρασιστράτου πύργυρος ὄργα θαυμαστή*) aufs glänzendste bestätigt. Die Parallele zeigt zugleich, daß statt der für ein Augenleiden höchst auffälligen Spezies *anisum tostum* vielmehr *anisum tostum* zu lesen ist; in dieser merkwürdigen Verballhornung scheint ja mit einer einzigen Ausnahme das griechische *μύρον* stets im Monacensis. Um zu erkennen, daß neben *aeris combusti* — II: *aerisusti* — I unhalbar, vielmehr eins von beiden eine in den Text geratene Randnotiz sei, bedurfte es der griechischen Überlieferung allerdings nicht. Es bestätigt sich also auch in der Mulomedicina Chironis, was Vegetius im Prolog sagt: *mulomedicinae doctrinam ab arte medicinae non adeo multis discrepat, sed in plerisque consentit*.

Karl Hoppe, Krefeld.

Die Mulomedicina Chironis eine Kollegieneinschrift?

Im zweiten Hefte des ersten Jahrgangs der V.H.M. ist von dem Charakter der Mulomedicina Chironis als einer Kollegieneinschrift aus der Zeit der im Zitierten gelehrten wissenschaftlichen Tiermedizin die Rede, und es wird die Vermutung als naheliegend bezeichnet, daß diese Glanzperiode der Veterinärwissenschaft etwa die Zeit Galens gewesen sei, der noch zwei tierärztliche Professoren mit Namen nenne. Sie habe wohl kurz nach Galen ihr Ende gefunden. Auf die nähere Begründung dieser chronologischen Hypothese darf man gespannt sein (vgl. V.H.M. 1925 Nr. 5). Doch soll von ihr hier nicht weiter geredet werden, wohl aber von der These, die dem Charakter des Werks betrifft.

Der Ausdruck Niederschrift läßt eine zweifache Auffassung zu: handelt es sich ursprünglich um die Aufzeichnungen, an die sich jener zünftliche Professor in seinen Vorlesungen hielt, oder um die Niederschrift eines seiner Zuhörer? Schwerlich um Letzteres. Denn wie es gleich am Schlusse der beiden

zu Anfang unvollständig erhaltenen Vorrede des ganzen Werks heißt *primum dieo de sanguinis tractione*, so findet sich bis zum neunten Buche immer wieder einmal die erste Person des Singular, z. B. noch 243a *dico*. Ohne ganz zwingenden Grund wird man aber dem mitschreibenden Zunftbrüder oder Veterinärstudenten doch nicht den Stumpfsinn zutrauen die verba magistri bis zur Beibehaltung der ersten Person in seinem Kolleghefte festgehalten zu haben.

So bliebe denn die eigene Niederschrift des Verfassers zum Zwecke seiner Vorlesungen. Dieser Annahme gegenüber behaupte ich: die Mulomedicina Chironis ist von Anfang an als Buch gedacht und zum Lesen bestimmt gewesen.

Die Einteilung des Ganzen in 9 oder, wenn man will, in 10 Bücher würde natürlich keine Gegenstanz gegen jene Behauptung bilden, da sie von einem späteren Herausgeber des Kollegheftes zum Zwecke der Veröffentlichung des Buches in Rollenform vorgenommen sein könnte. Sie stammt aber von dem Verfasser selbst her, wie folgende Stellen beweisen:

60²⁷ *sicut in alio libro docui*

171¹⁴ *absque his multitudinibus, quae in quinto libro plenissime demonstratae sunt, quidquid ita — corporibus accidere potest, in hoc sexto libro omnia demonstro*

220¹⁰ *ceteras passionis et curas totius corporis in quinto libro demonstravi*

232¹⁵ *plenus per hunc librum docui*

Wenn ferner der Text ursprünglich als mündlicher Vortrag gedacht war, so mußten die Verweisungen auf schon einmal Erwähntes oder erst später zu Erwähnendes in der Form *ut supra commemoravimus, ut infra demonstrabitur* o. ä. erfolgen, aber nicht so wie es tatsächlich geschieht, mit den Worten *ut supra* oder *infra scriptum est*. Auf eine Vorlesung trifft auch nicht zu:

235²¹ *et hoc quidem scribere oportuit*

237¹⁵ *necessarium debui et hoc scribere*

380¹ *propter compendium legentis demonstrare*.

Daß der Verfasser ein Kompilator war, sagt er selbst in der kurzen Vorrede zum achten Buche: *labore et diligentia tum equorum quam equorum et omnium iumentorum nationes et genus, magis quadrigiarum, ostendere volui, propter quod multis auctoribus inspectis et, quae ad equorum genus pertinent, secretis singulorum sensus et motus (?) animae in unum contruli et ex his epitoma feci et omnia, quae dispersa (überl. — o) fuerant, meo (überl. in eo) naturali ingenio plenus per hunc librum docui*. Die Worte sind (V.H.M. 1923 S. 16) in merkwürdiger Weise mißverstanden worden. Eine genaue Interpretation des Textes zeigt, daß *secretis* Partizip ist wie das dann mit *et* koordinierte *inspectis*; *epitoma* überliefert (= *ἐπιόμμη* mit itazistischer Aussprache), wie z. B. in der Überschrift des vierten Buches des Vegetius, wo die Handschriften PM *epithima*, dagegen V *epithoma* bieten. Das a. a. O. auf Grund der Überlieferung konjizierte griechisch-lateinische Wort *epithima* (*ἐπιόμμη*) ist in keiner der beiden Sprachen belegt, die ihm beigelegte Bedeutung „eine (auf das Wesentliche) losleuende Abhandlung“ ist nur aus dieser Stelle erschlossen. Ebenso unhalbar ist die Übersetzung der Überlieferung „alles, was in weisheitsvoller Darstellungsform in jenen unwürdigen

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edlmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 3.

Ausgegeben am 21. Januar 1928.

36. Jahrgang.

(Aus dem Bakteriologischen und Serum-Institut Dr. Schreiber, Landsberg a. W.)

Über Aufzuchtkrankheiten des Schweines. (Ferkelruß.)

Von Dr. O. Schreiber, Landsberg a. W.

Unter der Bezeichnung „Ferkelruß“ stellen sich uns fast alle solche Krankheiten der Ferkel vor, welche in der Hauptsache auf Aufzuchtfehler zurückzuführen sind. Wie bei den älteren Schweinen in erster Linie die verschiedenen Hautrötungen neben Freßunlust die hauptsächlichsten Krankheitszeichen sind, ist der ekzematöse Hautausschlag der neugeborenen Ferkel bis zum Absetzen von der Mutter das charakteristischste Bild mangelhaften Gedeihens und allmählicher Erkrankung bis zur Ausbildung des typischen Kümmerers. Mit Ausnahme der echten Pocken und der Räude ist der ekzematöse Hautausschlag kein für die einzelnen Krankheiten charakterisierendes Symptom, sondern in seinen verschiedenen Formen der Ausdruck beginnender Erkrankung an den Lungen und im Magendarmkanal. Abgesehen von der Rachitis finden wir in solchen Ferkeln die verschiedensten Infektionserreger, welche wohl in der Hauptsache Sekundärveränderungen setzen, aber durch enzootisches Auftreten und die dadurch bedingten Verluste Beachtung finden müssen. Durch spezifische Behandlung müssen jene Bakterien aus dem Körper entfernt und durch hinreichende Stalldesinfektionen unschädlich gemacht werden. Ich will hier nicht die einzelnen Krankheiten aufzählen, bei welchen der Ferkelruß uns als erstes Krankheitsbild entgegentritt, sie sind in den Lehrbüchern und besonders in dem Handbuch der Krankheiten des Schweines von Gläser ausgezeichnet und erschöpfend beschrieben. Ich will nur auf Grund der in der Landsberger Untersuchungs-Abteilung ausgeführten zahlreichen Sektionen, bakteriologischen Bearbeitungen und der gewissenhaften Kontrolle in hervorragenden Zuchten betonen, daß die Suisseptikus-Infektionen von verschiedenen Seiten zu Unrecht unterschätzt werden und ihnen eine praktische Bedeutung nicht beigemessen wird. Ich bin mir dabei wohl bewußt, daß nicht jede Suisseptikus-Infektion als „echte“ Schweinefleuche aufzufassen ist und daß es nicht immer leicht ist, die Grenze zwischen enzootischer Pneumonie und Suisseptikus-Infektion zu ziehen. Jedenfalls stehen diese, was die Häufigkeit anbetrifft, an zweiter Stelle nach den Colibazillofen, darnach kommen erst die Streptokokken- und Paratyphus-Infektionen. In den „Mitteilungen“ des Landsberger Institutes vom April 1927 haben wir einen Fall von Suisseptikus-Infektion beschrieben, der einerseits die Wichtigkeit solcher Infektionen lehrreich bewiesen hat und ebenso durch die Impfungen einen Erfolg zeitigte, der den

Besitzer allein wieder in die Lage brachte, seine Schweinezucht fortzusetzen. Dieser Fall hat uns ferner die Gelegenheit gegeben, durch Zusammenarbeit mit den Kollegen und ihrer Klientel auf der anderen Seite die Schmerzen solcher Landwirte zu verstehen, die in dem Tierarzt häufig nicht den gewünschten Berater finden. Wie in der Human-Medizin erstrebt wird, mehr Arzt und weniger Mediziner zu sein, so muß den jungen Kollegen zugerufen werden, mehr Interesse der Landwirtschaft entgegenzubringen. Der Tierarzt muß alle Nöte des Landwirtes verstehen lernen, um ihm auch in den verschiedenen Jahreszeiten ein beratender Hygieniker zu werden. Wenn er Gelegenheit hat, die Schweinefäße mit feinem Inhalt zu kritisieren, muß er auch bestrebt sein, das Für und Wider nicht nur zu erkennen, sondern auch für Besserung die erste Anregung zu geben. Der Schweinefall des kleinen Mannes ist sicher nicht der hygienischste, aber der Inhalt, die robuste Zuchtfau mit ihren 12 bis 14 rosigen, gleichmäßig runden Nachkommen zeigt uns, welche Aufmerksamkeit diesem Tier hier zugewendet wird im Gegensatz zum luxuriös ausgestatteten, in feiner kalten Pracht sich auswirkenden Schweinefall des Großgrundbesitzers. Wenn ich auch nicht damit behaupten will, daß auf diese Weise nicht Ferkel groß gezogen werden können, die später zur Schlachtbank das Gewicht von 2½ Zentner erreichen, so will ich doch betonen, daß der Erfolg in diesem Falle einen großen Umweg durch den Geldbeutel des Besitzers machen muß. Durch die Musteranstalt für Schweinezucht in Ruhlsdorf wird besonders auf die verschiedenen Mängel der Ställe, der Züchtung, Haltung und Fütterung hingewiesen und man hört häufig, daß die Besitzer ihre Schweinezucht ganz nach dem Ruhlsdorfschen System aufgebaut haben und keinen Erfolg aufweisen können, weil die Ferkelkrankheiten trotzdem zu Hause sind. In solchen Fällen kann meistens eben nur der Tierarzt der richtige Berater werden, wenn er viele Schweinefäße, Zuchten und Haltungen gesehen hat und Vergleiche anzieht, warum hier trotz fachlich ausgebildeten Schweinemeistern kein Erfolg und Fortschritt zu sehen ist und dort in schmutzigen, engen Hütten die schönsten Ferkel schon in einem ¾ Jahr zu schweren Mastschweinen herangefüttert werden.

Diese Beobachtungen drängen zu der Überzeugung, daß prädisponierende Momente die hauptsächlichsten Ursachen

für die Aufzuchtkrankheiten der Schweine darstellen. Die nachfolgenden Infektionen mit bipolaren Bakterien, Diplokokken, Streptokokken, Staphylokokken, dem Bact. pyogenes, paratyphi und insbesondere mit den ubiquitären Koli-bakterien können nur zur Entfaltung kommen, wenn die Schleimhäute der Bronchien und des Lungengewebes sich im Zustande eines Katarhes befinden, und ebenso, wenn die Magenschleimhaut vornehmlich ihres natürlichen Schutzes beraubt wird. Forchten wir in solchen Fällen von Erkrankungen näher nach, die als erstes Anzeichen den Ferkelruß zeigen, so haben wir es mit naßkalten Stallungen zu tun, in denen überzüchtete Mutterfauen ohne Blutauffrischung schwache Ferkel aufziehen sollen. Die Zuchtfauen werden vor dem Ferkeln nicht genügend vorbereitet und im letzten Moment wird die Fütterung zu intensiv, zu eiweißarm und zu stark reich durchgeführt ohne Rücksicht darauf, daß der Knochenaufbau für die Ferkel im Mutterleib vor sich geht. Es ist leicht zu verstehen, daß solche Ferkel dann bei der Geburt nicht genügend Nahrung erhalten, daß die Schweinemilch zu kalkarm ist, so daß das junge Tier sehr bald den Trieb verspürt, seinen Durst und sein Nahrungsbedürfnis anderweitig zu stillen. Es ist bald zu beobachten, daß die Ferkel in den Futtertrog der Mutter gehen oder daß sie vom Fußboden mit Jauche gemischte Flüssigkeiten aufnehmen, die einen Magendarmkatarh erzeugen. Wenn nun zum Überfluß die Buchten — durch steinerne Scheidewände getrennt — keine Ventilation zulassen, so daß die schwere, kalte Luft wie ein Nebel über den Tieren liegt, dann ist auch noch das zweite prädisponierende Moment für eine katarhalische Bronchopneumonie gegeben. Unter solchen Verhältnissen ist es natürlich ein Leichtes, daß die normaler-

weise ubiquitären Bakterien — sonst harmloser Natur — in diesen zarten und geschwächten Organen Ansiedlungspunkte finden, von wo aus sie bald zu den bekannten Krankheitsercheinungen führen. Wir wissen aus den Sammelberichten der Zentrale für die Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten, welche verschiedenen Bakterien gefunden worden sind. Wir wollen uns — und das ist der Zweck dieser Ausführungen — vor der Meinung hüten, daß wir damit allein die Aufzuchtkrankheiten bekämpfen können. Ich bestreite durchaus nicht, daß die bakteriologische Diagnose enorm wichtig ist, aber der Züchter will Abhilfe geschaffen haben.

Die Aufzuchtkrankheiten kann daher nur und allein der praktische Tierarzt draußen als beratender Hygieniker bekämpfen, allerdings unter der Voraussetzung, daß er bemüht ist, in jedem Falle den enzootischen Erreger der Sekundär-Infektion kennen zu lernen.

Wenn dieses der Fall ist, dann führen viele Wege zum Ziele. Sie müssen aber nicht nur dem Ferkel gelten, das in vielen Fällen durch spezifische und unspezifische Impfung gerettet werden kann, sondern — wie schon in den vorhergehenden Ausführungen angedeutet — durch Berücksichtigung der Zuchtverhältnisse, der Stallungen, Fütterung mit Futterzusammensetzung auch der Sauen und Eber und endlich, was die Hauptsache ist, zur Hebung des Verständnisses, durch geeignetes Personal.

Der praktische Tierarzt findet also in der Schweinezucht ein dankbares Arbeitsgebiet, um unter Berücksichtigung aller Momente nicht nur die Landwirtschaft in ihren Nöten und Leistungen kennen zu lernen, sondern ihr auch erfolgreich mithelfen zu können.

(Aus der Klinik für Geburtshilfe und Rinderkrankheiten der Tierärztlichen Hochschule Hannover.)

Tetanus beim Rinde.

Mit 2 Abbildungen.

Von R. Götze, Hannover.

Der Starrkrampf gehört in den gemäßigten Klimaten zu den seltenen Erkrankungen beim Rinde. Die Mortalitätsziffer ist nach Fröhner-Zwick mit 70—80 Prozent etwa dieselbe wie beim Pferde. Nach Hutyrá und Marek verläuft der Tetanus beim Rinde im allgemeinen etwas günstiger als beim Pferde. In beiden Lehrbüchern wird besonders auf die Störung der Vormägentätigkeit infolge des Krampfzustandes hingewiesen, wodurch die Heilungsaussichten vermindert werden. Als in die hiesige Klinik ein Jungrind mit Tetanus eingeliefert wurde, entschloß ich mich deshalb sofort zur Anlegung einer kleinen Panzenfistel. Die Krankheitsgeschichte sei im folgenden kurz wiedergegeben.

Ein etwa 7 Monate altes schwarzweißes mäßig genährtes Niederungs-rind wurde der Klinik mit dem Vorbericht zugeführt, daß es seit einigen Tagen aufgebläht, dabei steifbeinig geworden sei und auf der Weide nicht mehr grafe. Das Tier hält Kopf und Hals gestreckt. Die Gesichtsmuskelzüge modellieren sich eigentümlich deutlich durch die kurz behaarte Haut hindurch. Die Ohren werden unbeweglich starr nach hinten gehalten, die Augen o. B. Der Hals ist starr und bretthart, der Rücken nach oben gekrümmt und erweist sich beim Rückengriff versteift, der Schwanz wird abgehalten. Die Beine stehen gespreizt, sägebockähnlich, der Gang ist, namentlich in der Vorhand, sehr steif. Beim unvorsichtigen Führen und Wenden fällt das Jungrind hin und kann sich nicht erheben. Das Tier ist ganz im Gegensatz zu tetanuskranken Pferden nicht im geringsten erregbar und empfindsam, sondern völlig gleichgültig. Atmung, Puls und Körpertemperatur sind hochnormal.

Bei der Untersuchung des Verdauungsapparates fällt auf, daß die Mundspalte sich nur knapp soweit öffnen läßt, daß jederseits 1—2 Finger eingezwängt werden können.

Appetit fehlt, Rumination und Ruktus werden nicht beobachtet. Die linke Hungergrube ist tympanitisch vorgewölbt. Panzenbewegungen sind nicht fühlbar, die Auskultation des Panzens ergibt ein zeitweises metallisches glucksendes Geräusch. Der im Rektum befindliche Kot ist auffallend hart und klein geballt. Die übrige Untersuchung ist negativ. Eine äußere Wunde ist an dem Tier nach sorgsamster Untersuchung der Körperoberfläche nicht zu entdecken, die Mundhöhle konnte wegen des Krampfes der Backenmuskulatur nicht näher geprüft werden. Die Diagnose lautete: Tetanus mit unbekannter Infektionspforte, sekundäre Tympanie.

Die Behandlung besteht in sofortiger Anlegung einer kleinen für einen Finger gut passierbaren Panzenfistel in der linken Hungergrube. Die Fistel wird durch Einlegen einer 20 cm langen Trokarhülse, die mit einem Heft an die Haut locker fixiert wird, offen gehalten. Das Rind macht nach Entlastung der Vormägen bereits am nächsten Tage einen besseren Eindruck und versucht Getränk und Heu aufzunehmen (Abb. 1). Der Schluckakt beim Trinken bereitet aber erhebliche Schwierigkeiten. Hustenanfälle treten auf. Deshalb wird vorgezogen, die Flüssigkeit (Zuckerlösungen) durch die Panzenfistel zu verabreichen. Raufutter vermag das Jungrind mit den Lippen und den Schneidezähnen aufzunehmen. Das Futter kann aber nicht gekaut werden und wird infolge des Krampfzustandes der Kaumuskeln so festgehalten, daß es nur mit Gewalt herausgezogen werden kann.

Es werden ferner, am dritten Krankheitstage, 40 ccm Tetanusantitoxin lumbal verabreicht. Eine wahrnehmbare Wirkung ist jedoch nicht eingetreten. Der Krampf der Muskulatur breitet sich trotz alledem weiter von der Vorhand auf die Rückenmuskulatur und die Nachhand aus. Das

Tier hält sich meist stehend, kommt es zum Liegen, so muß ihm beim Aufstehen geholfen werden.

Am Ende der zweiten Krankheitswoche beginnt sich der Krampf der Kaumuskulatur zu lösen. Kleietrank wird gie-



Abb. 1. Starrkrampf beim Rind.

Das Futter wird in der Mundspalte festgehalten und kann weder gekaut noch abgeschluckt werden. Der Leib erscheint nach Entleerung der Vormägenkammer durch eine künstliche Panfenfistel aufgeschürzt und gespannt.

Orig.-Aufnahme des Verfassers.

rig aufgenommen. Die Besserung verläuft langsam weiter (Abb. 2), vier Wochen nach der Einlieferung wird das Jung-rind noch immer mit etwas gespanntem Gangwerk aber in der Nahrungsaufnahme, Rumination usw. völlig normal aus

der Klinik entlassen. Die kleine Panfenfistel hat sich nahezu geschlossen. —

Eine erhebliche Gefährdung des Lebens bedeutet beim Tetanus des Rindes in der Tat, wie aus diesem Einzelfalle



Abb. 2. Starrkrampf beim Rind im Rekonvaleszenzstadium.

Daselbe Tier wie in Abb. 1. Die Futteraufnahme ist wieder möglich, der Leib ist voll, die Panfenfistel in Abheilung.

Orig.-Aufnahme des Verfassers.

hervorgeht, die Behinderung bzw. Stilllegung des komplizierten Vormagengetriebes. Nachdem diese Gefahr durch Anlegen einer Panfenfistel behoben war, trat mit der üblichen langen Rekonvaleszenz Genesung ein.

(Aus dem parasitologischen Laboratorium — a. o. Prof. Dr. A. Kotlán — der k. ung. Tierärztlichen Hochschule zu Budapest und dem Laboratorium des Serum-Institutes Phylaxia. — Direktor: Priv.-Doz. Dr. J. Köves, Oberökonomierat, Budapest.)

***Hyostrogylus rubidus* (Hassall und Stiles) als Urheber einer mit Knötchenbildung einhergehenden Magenentzündung beim Schwein.**

(Mit 5 Abbildungen.)

Von Dr. A. Kotlán und Dr. G. Hirt.

Seit der durch Hassall und Stiles im Jahre 1892 erfolgten Erstbeschreibung des „*Strongylus rubidus*“ aus dem Hauschwein in Amerika, wurde diese mittlerweile von Hall (1921) in die Gattung *Hyostrogylus* Hall eingereihte Nematode sowohl in Nord- und Südamerika, wie auch in Europa (Deutschland, Ungarn, Rußland) wiederholt im Magen des Hauschweins beobachtet. Schon die Entdecker dieses Parasiten, dann Oppermann (1905), später Kotlán und Schwaner (1919) und neuestens Skrjabin und Bekensky (1925) weisen darauf hin, daß diese Parasiten besonders bei massenhaftem Befall die Magenschleimhaut nicht unbedeutend beschädigen, ja sogar Entzündungen ernsteren Charakters verursachen können. Die Veränderungen führen in nicht seltenen Fällen zum Tode der befallenen Wirtstiere.

Das Bild der durch die genannten Würmer hervorgerufenen pathologischen Veränderungen des Magens ist nicht einheitlich. Hassall und Stiles geben an, daß sie bei starkem Befall mit „*Strongylus rubidus*“ blutige Verfärbung des Magenschleimes, gelegentlich auch ausge dehnte Ulzerationen feststellen konnten. Da diese Veränderungen manchmal auch ohne gleichzeitig nachweisbare Würmer angetroffen wurden, fanden es die Verfasser vorläufig nicht gerechtfertigt, die angeführten Veränderungen den Würmern zuzuschreiben. In allen Fällen jedoch, wo zahlreiche Würmer anwesend waren, konnte als konstanter Befund das Vorhandensein von reichlichem, glasig-zähem Magenschleim festgestellt werden. Oppermann hatte eine durch „*Strongylus rubidus*“ bedingte Massen-erkrankung bei Zuchtsauen in Deutschland beobachtet. Die Veränderungen am Magen beruhten „in einer diphtheroiden

resp. chronisch entzündlichen Schleimhautaffektion“. Kotlán und Schwaner (1919) berichten über ähnliche Befunde aus Ungarn. In allen untersuchten Fällen wies die Magenschleimhaut erhebliche Veränderungen kruppös-diphtheroide Natur auf. Diese Verfasser konnten auf Grund der Befunde zwei Typen von Veränderungen auf der Magenschleimhaut unterscheiden, und zwar eine kruppös-diphtheroide Form mit gewöhnlich scharf umschriebenen, dicken, bröckelig-käfigen Auflagerungen (Abb. 1), und eine diffuse, chronische Entzündung, wobei die Schleimhaut stark verdickt, höckerig-runzelig erscheint (sog. Etat mamelonné) und stellenweise mit kleineren, höchstens linsengroßen kruppösen Membranen bedeckt ist (Abb. 2). Die letztere Form dürfte der von Oppermann beschriebenen chronischen Entzündung entsprechen.

Die Veränderungen sind gewöhnlich so charakteristisch, daß der Fachmann in gegebenen Fällen die Diagnose auch ohne eventuellen Nachweis der Würmer mit großer Wahrscheinlichkeit stellen kann. Die haardünnen, sehr oft rötlich verfärbten Würmer sind jedoch meistens leicht, insbesondere in der Umgebung der Auflagerungen oder im Magenschleim nachzuweisen. Eine Ausnahme bilden chronische Fälle, in welchen die Würmer nicht selten fehlen können.

Als Urheber der genannten Veränderungen wurden bislang geschlechtsreife Würmer festgestellt. Kürzlich hatten wir Gelegenheit, eine eigenartige Form der durch *H. rubidus* verursachten Magenstrongylose zu beobachten, wobei junge, noch nicht vollkommen geschlechtsreife Würmer angetroffen wurden.

Anfangs Januar dieses Jahres wurde vom Bezirkstierarzt

Dr. I Sz. der Magen eines geschlachteten Schweines dem Laboratorium des Serum Institutes Phylaxia mit der Anamnese zugeschickt, daß gelegentlich der Aufarbeitung des gan-

änderungen deutete auf den ersten Blick auf einen parasitären Ursprung hin. Diese Annahme wurde durch die histologische Untersuchung einwandfrei bestätigt; in Schnitten aus



Abb. 1. Durch *H. rubidus* hervorgerufene kruppös-diphtheroide Magenentzündung beim Schwein.

zen Schlachtschweines im Magen zahlreiche Knoten von kaum Haselnußgröße bemerkt wurden. Der Eigentümer hat sich, der brieflichen Angabe nach, dahin geäußert, daß er vom Genuß der schon zubereiteten Teile solange Abstand nimmt, bis er diesbezüglich vom Laboratorium eine beruhigende Information erhalten wird.

Die Untersuchung hat folgendes erbracht: Der aus einem erwachsenen Schwein stammende Magen ist von normaler Größe und Gestalt; er ist auf der kleinen Kurvatur eröffnet. Die Oberfläche der Schleimhaut ist mit glasig-zähem Magenschleim bedeckt. Die Fundus-Partie der Schleimhaut weist in einer ca. zwei handflächengroßen Ausdehnung gelblich-graue rundliche Erhebungen von etwa $\frac{1}{2}$ bis 1 cm Durchmesser und 3 bis 5 mm Höhe auf (Abb. 3). Sie liegen an einzelnen Stellen so dicht nebeneinander, daß man an einer Fläche von 10 Quadratzentimeter etwa 35 Knoten zählen kann. Die Oberfläche der Knoten ist etwas plattgedrückt, stellenweise sogar mit einer nabelförmigen Vertiefung versehen. Der Mittelteil erscheint mit freiem Auge betrachtet glatt oder höchstens äußerst fein granuliert. Untersucht man die Knoten mittels einer Handlupe, so sind an der Oberfläche kleine Unebenheiten, mehr oder weniger ausgesprochene Vertiefungen wahrnehmbar. Die Schnittfläche der Knoten besteht zum größten Teil aus grauweißem Bindegewebe. Der zentrale Teil weist insofern eine abweichende Struktur auf, daß hier der Oberfläche etwas genähert eine stecknadelkopfgroße Partie gelblich verfärbt und von bröckeliger Konsistenz ist. Die Magenserosa ist den Knoten entsprechend kaum merklich verdickt und getrübt. Die von Knoten nicht besetzten Schleimhautpartien sind von rötlich-grauer Farbe und normaler Beschaffenheit.

Das makroskopische Bild der kurz geschilderten Ver-



Abb. 2. Durch *H. rubidus* erzeugte chronische Magenentzündung (fog. „état mamelonné“) beim Schwein.

dem zentralen Teil der Knoten konnte nicht nur eine ausgesprochene Histocosinophilie, sondern auch der Parasit selbst, ein Fadenwurm, nachgewiesen werden.



Abb. 3. Durch *H. rubidus* bedingte Knoten auf der Magen Schleimhaut beim Schwein. $\frac{1}{2}$ der nat. Größe.

Das histologische Bild der Veränderungen kann in aller Kürze wie folgt zusammengefaßt werden: Die Grundsubstanz der Knoten ist von Bindegewebe gebildet, welches durch Vermehrung der Submukosa entstand. Die Wucherung des submukösen Bindegewebes reicht bis zur Oberfläche der Schleimhaut, so daß im zentralen Teil der Knoten das Drüsengewebe in einer Ausdehnung von $\frac{1}{2}$ bis 1 mm vollkommen fehlt und an seiner Stelle ein dichtes, bis zur Muskelschicht reichendes Bindegewebe eingeschaltet ist. Im Zentrum der Knoten, gewöhnlich der Oberfläche etwas genähert, kommen die Durchschnitte des unregelmäßig gewundenen Fadenwurmes zum Vorschein (Abb. 4). Dicht um




Abb. 4. Durchschnitt eines Knotens.

den Fadenwurm zeigt das Bindegewebe eine faserige-wellige Struktur; an anderen, etwas weiterliegenden Partien dagegen begegnet man zumeist zellenreichem Bindegewebe (Abb. 5). Sowohl die nächste, wie auch etwas ferner liegende Um-




Abb. 5. Wurmherd im Knoten. Stark vergrößert.

gebung des Parasiten ist zellig infiltriert. Die hier angetroffenen Zellelemente stellen zumeist eosinophile und zwar sowohl mononukleare (Myelocyten) wie auch polymorphkernige Zellen dar. Diese sind jedoch stellenweise auch in den knotenfreien Schleimhautpartien anzutreffen. In der nächsten Umgebung des Parasiten kommen zahlreiche Lymphozyten vor, neben diesen auch einzelne Plasmazellen, letztere sind aber an fernerer Partien aufzufinden.

Die in den Knoten histologisch festgestellten Würmer können mit freiem Auge kaum, mit einer Handlupe nur bei sehr aufmerksamer Betrachtung als haardünne Gebilde erkannt werden. Sie waren mit dem Gewebe der Knoten so innig verbunden, daß die Freilegung ganzer Exemplare bei größter Vorsicht nur ausnahmsweise gelang. Meistens erhielten wir nur Bruchteile des Wurmes, was jedoch zweifel-

los auch jenem Umfande zuzuschreiben ist, daß der Magen nach erfolgter makroskopischer Untersuchung baldigst in Formalin fixiert wurde. In frischem Zustande dürfte das Herauspräparieren der Parasiten keine besonderen Schwierigkeiten bereiten. Es gelang uns nicht endgültig festzustellen, ob alle Knoten einen Parasiten beherbergen. Während in den histologisch untersuchten Knoten ein Fadenwurm ohne Ausnahme leicht nachzuweisen war, gelang dies in den makroskopisch untersuchten sechs Knoten nur in vier Fällen. Es ist jedoch leicht möglich, daß die äußerst kleinen Würmer in dem durch Formalin gehärteten Gewebe übersehen wurden. Mit Rücksicht auf die Seltenheit des Objektes, welches als Museumspräparat zu erhalten war, konnten wir nur kleinere Partien des veränderten Magens aufarbeiten. Es gelang uns auf diese Weise nur einen ganzen Wurm zu isolieren, wogegen aus mehreren Knoten nur Bruchteile des Fadenwurmes herauspräpariert werden konnten. Die Länge des intakten, sowie auch der rekonstruierten Würmer beträgt 3—4 mm, ihre größte Breite 48—80 μ . Diese Würmer weisen folgende morphologische bzw. anatomische Merkmale auf: Die Cuticula des Körpers ist äußerst fein quer geringelt, sie besitzt aber außerdem eine Anzahl von regelmäßigen Längsleisten. Das Kopfende ist von einem kutikulären Ringe von etwa 8 μ Höhe umgeben. Mundöffnung glatt, mit winzigen papillenartigen Gebilden versehen. Unmittelbar hinter der Mundöffnung beginnt der zylindrisch gebaute, nach hinten zu sich mäßig erweiternde Ösophagus. Seine Breite beträgt am Vorderende 10—28 μ , am Hinterende 22—50 μ , seine Länge 0,3 bis 0,5 mm. Auf den Ösophagus folgt der annähernd ebenfalls zylindrische Darmkanal, dessen Endpartie, der Enddarm, sowie der Anus in unseren Präparaten nur unklar sichtbar ist. In den Mittelpartien des Körpers liegt ferner ein etwas dunkelpigmentierter Schlauch, das Ovarium. Im hinteren Fünftel des Körpers trifft man die Geschlechtsöffnung (Vulva), sowie den scharf konturierten Ovijector an. Der Uterus enthält keine Eier.

Auf Grund dieser Merkmale konnten die Würmer einwandfrei als *Hyostrogylus rubidus* (Hassall und Stiles) bestimmt werden. Männliche Exemplare haben wir unter den allerdings nur wenig zahlreichen isolierten Würmern nicht angetroffen. Die geringeren Körpermaße, ferner das Fehlen von mehr oder weniger entwickelten Eiern im Uterus spricht dafür, daß wir es mit jungen, noch nicht vollkommen geschlechtsreifen, jedoch schon im letzten Entwicklungsstadium befindlichen Exemplaren der genannten Nematodenart zu tun haben.

Gemäß der angeführten Angaben untersteht es keinem Zweifel, daß die im Magen angetroffenen Veränderungen mit der Anwesenheit der beschriebenen Würmer erklärt werden können. Es ist aber nicht leicht zu entscheiden, wie dieser ungewohnte Befund — der Aufenthalt der Würmer in der Tiefe der Schleimhaut — zu deuten ist.

Nachdem wir gegenwärtig über die Entwicklung¹⁾ von *Hyostrogylus rubidus* noch keine entsprechenden Kenntnisse besitzen, ist man wohl erklärlich nur auf Vermutungen angewiesen. Einestheils kann man nicht umhin, in dem Aufenthalt der Würmer in der Tiefe der Schleimhaut einen normalen Vorgang der Entwicklung zu erblicken. Ähnliche Vorgänge sind ja in der Entwicklungsgeschichte von verschiedenen Nematoden bekannt. Andererseits aber steht eine solche Annahme nicht im Einklang mit dem häufigen Vorkommen dieser Würmer im Magen des Haus-

¹⁾ Untersuchungen über die Entwicklung von *H. rubidus* wurden zwar von Schang (1925) ausgeführt, diese brachten jedoch so ungewohnte Ergebnisse zu Tage — wir kennen sie leider nur aus einem kurzen Referate — daß sie kurzin, ohne Nachprüfung kaum angenommen werden können. In der Schilderung des Entwicklungsganges spricht nichts dafür, daß diese Würmer sich regelmäßig eine Zeit lang in der Tiefe der Magenschleimhaut aufhalten würden.

schweines und der Seltenheit dieses Befundes. Man kann jedoch auch annehmen, daß die jungen Würmer zwar regelmäßig einen gewissen Zeitabschnitt in der Tiefe der Schleimhaut verbringen, dieser Histoparasitismus aber nicht immer die in diesem Falle beschriebenen Veränderungen zur Folge haben muß und dementprechend bisher nicht erkannt wurde.

Weitere, besonders entwicklungsgehistorische Untersuchungen werden diese Fragen zu klären haben.

Literatur.

1. Hassall und Stiles (1892), *Strongylus rubidus* a new

species of nematode, parasite in pigs. The Journ. of comp. Medic. and vet. Arch. XIII. 2. Kotlán und Schwanner (1919), Parasiták eredetű krupos gyomorguyladás háziállatokban. Allatorvosi Lapok, 1919. Nr. 11. 3. Oppermann (1905), Eine durch *Strongylus rubidus* bedingte Massenerkrankung bei Zuchtfauen in Deutschland. D. T. W. 1905, S. 469. 4. Schang (1924), Evolucion del „*Hyostrophylus rubidus*“ agente de la gastritis parasitaria de los cerdos. Rev. Centro de las Est. Med. Vet. Buenos-Aires. 118. S. 459. 5. Skrzjabin und Bekensky (1925), Wurmenzootie der Schweine, verursacht durch *Hyostrophylus rubidus* in Rußland. B. T. W. 41, S. 52.

Über Putenzucht.

Von Dr. Becker, prakt. Tierarzt, Bevensen (Hannover).

Die Zucht von Puten bringt, wenn sie rationell betrieben wird, mehr Gewinn als irgendein anderes Geflügel.

Leider ist aber die Aufzucht der jungen Puten in der Regel mit großen Schwierigkeiten verknüpft, da die Jungen in den ersten acht bis zehn Lebenswochen gegen Witterungsunbilden recht empfindlich sind, leicht erkranken und eingehen. Haben sie aber das genannte Alter erreicht, d. h. haben sie sich vollständig befiedert und haben sich die roten Warzen am Kopf und Hals gebildet, so pflegen sie sehr widerstandsfähig und wetterfest zu sein. Die Gründe für die große Empfindlichkeit in den ersten acht bis zehn Lebenswochen zu kennen, ist daher für den Züchter von Puten von allergrößter Bedeutung. Da sie verschieden sind, möchte ich auf Grund meiner langjährigen Erfahrungen in der Putenzucht den Kollegen, die sich für die Putenzucht interessieren sollten, die verschiedenen Momente, die bei der Putenaufzucht in Frage kommen, bekannt geben.

Da in der ursprünglichen Heimat der Truthühner, in Amerika, wo sie heute noch in den wenig bevölkerten Gegenden wild vorkommen, die Aufzucht der Jungen keine Schwierigkeiten bietet, so muß man annehmen, daß hier in Deutschland bestimmte Fehler in der Aufzucht der jungen Puten gemacht werden.

In erster Linie dürfen und sollen nur voll entwickelte, ausgewachsene, gesunde und kräftige, gut gemästete Tiere, die mindestens zwei Jahre alt sind, zur Zucht Verwendung finden, und der Zuchthahn darf mit den Zuchthennen nicht blutsverwandt sein. Aus diesem Grunde ließ ich mir vor langen Jahren durch einen mir befreundeten Schiffsingenieur einen Zuchthahn direkt aus Amerika mitbringen für einen hiesigen Landwirt, der eine größere Puterherde hielt und mit der Aufzucht der Puterküken größte Mühe hatte. Die von diesem kräftigen Zuchthahn abstammenden Küken gediehen vorzüglich und erreichten, ohne unter den Witterungsunbilden zu leiden, das kritische Alter von acht bis zehn Wochen. Sie entwickelten sich so prächtig, daß im Herbst die zahlreichen Jungen, die auf den Stoppelfeldern reichliche und kostenlose Nahrung fanden und auch die in jenem Jahre auf den jungen Roggen- und Weizenfeldern auftretenden Ackerschnecken vertilgten, nach kurzer Mast zu hohem Preise verkauft, nicht nur die nicht unerheblichen Kosten für den importierten Zuchthahn deckten, sondern auch noch einen beträchtlichen Überschuß lieferten. Die Erbrütung der regelmäßig gut befruchteten Putereier kann durch die Puterhenne, die stets eine vorzügliche Brüterin ist, oder in der Brutmaschine erfolgen.

Die Puter sind bekanntlich recht dumme Tiere, in ihrer kleinen Schädelhöhle befindet sich ein nur kleines Gehirn, und die kleinen Puterküken sind anfänglich oft so ungeschickt und dumm, daß sie nicht einmal zu fressen verstehen. Aus diesem Grunde gibt man zweckmäßigerweise die Puterküken einer Hühnerglucke zum Führen, die sie

die Futteraufnahme besser lehrt als die Puterglucke. Es empfiehlt sich auch, besonders bei künstlich erbrüteten mütterlosen Puterküken, daß man ihnen einige gleichalterige Hühnerküken beigibt, damit die Puterküken diesen das Fressen absehen. Eine Hühnerglucke kümmert sich auch mehr um die Jungen als die Puterglucke, sie legt ihnen das Futter vor und nimmt sie häufiger unter die Flügel, damit die frierenden Kleinen sich erwärmen und ausruhen können und vor Regen geschützt sind. Sie streift nicht so weit und andauernd im Freien umher wie die Puterglucke, weshalb auch die einer Hühnerglucke anvertrauten jungen Puterküken nicht so leicht ermüden.

Wie ich schon erwähnte, ist die Aufzucht der jungen Puten in den ersten acht bis zehn Lebenswochen oft recht schwierig. Bei richtiger Haltung und Pflege ist sie aber durchaus nicht schwieriger als die Aufzucht anderen Geflügels. Schützt man sie in der ersten Zeit vor Nässe und Kälte und gibt man den Puterküken vom dritten Lebenstage an ein Futter, bestehend aus gekochtem Fisch, Buchweizenschrot und Buttermilch, so gedeihen sie vorzüglich und Verluste sind fast ausgeschlossen. Bei diesem Futter, das alle drei Stunden am Tage gereicht wird, und zwar in solcher Menge, wie die Tiere gierig verzehren, wachsen die Jungen derartig schnell heran, daß sie schon im Alter von vier Wochen völlig befiedert sind, statt sonst erst im Alter von acht bis zehn Wochen, und daß auch schon die roten Warzen am Kopf und Hals sich gebildet haben, und die Geschlechter deutlich von einander unterschieden werden können, was bei anderer Fütterung erst bei acht bis zehn Wochen alten Tieren möglich ist.

Im Jahre 1926 sah ich am 4. August genau vier Wochen alte junge Puten, die in der angegebenen Weise gefüttert waren; die jungen Hähne „schlugen schon Rad“. Sämtliche 45 Tiere waren künstlich erbrütet, waren sehr gut genährt und kräftig entwickelte Tiere.

Sie wogen, als sie im Alter von fünf Monaten verkauft wurden, durchschnittlich 7½ kg und brachten dem Züchter einen erheblichen Reingewinn. Junge gut genährte oder gemästete Puter werden überall zu hohen Preisen gekauft, da das Fleisch von vorzüglichem Geschmack ist. Puter eingesperrt zu halten und dann zu mästen, hat keinen Zweck, weil sie sich abhärten, nicht fressen und abmagern würden. Auf beschränktem Raum lassen mehrere Tiere sich durch abwechselndes und reichliches Futter fett machen, wenn man ihnen regelmäßig einen steifen Brei aus gekochten Kartoffeln und Weizenkleie oder aus angequellten Körnern (abwechselnd Gerste, Hafer, Weizen, Mais) verabfolgt. Durch Zusatz von Milch zum Mastfutter wird das Fleisch schön weiß. Länger als höchstens drei Wochen darf die Mast nicht dauern. Auf zwölf Zuchttruten rechnet man einen Hahn, und da jede Henne jährlich 15 bis 30 Eier, also durchschnittlich über 20 Eier legt, so kann man, da auch die Eier stets sämtlich befruchtet

zu sein pflegen, von einem solchen Zuchtstamm ca. 250 Eier und aus diesen mindestens 200 Junge erwarten. Genügend Platz muß den Tieren zur Verfügung stehen, und ihre Ernährung wird sich um so billiger stellen, je mehr Nahrung sie auf Wiesen, Stoppelfeldern usw. sich selbst suchen können.

Berichtigung. In dem Vortrag von Prof. Dr. Raebiger „Der derzeitige Stand der Bekämpfung der Tuberkulose des Hausgeflügels“, D. T. W. 1927, Nr. 48, muß es auf S. 774 1. Sp. Abf. 4, Zeile 5 anstatt „Reichsbund Deutscher Geflügelzüchter“ heißen: der über das ganze Reich verbreitete Bund Deutscher Geflügelzüchter.

Innere Medizin und Chirurgie.

Brunner, C. und Silberschmidt: Über die antiseptische und antitoxische Wirkung des Perubalsams in Wunden. (Aus dem Hygienischen Institut der Universität Zürich.) (Zentralbl. für Chirurgie 1927, S. 261.)

Nach den Untersuchungen von Suter (1907) besitzt Perubalsam zwar nur schwache bakterizide Eigenschaften, er vermag jedoch bei Meerschweinchen die nach Injektion von Erde auftretende septische Gasphlegmone zu verhüten. Die mit Balsam behandelten Tiere bleiben entweder am Leben oder sie sterben nach einiger Zeit an Tetanus. Die von den Verf. angestellten analogen Versuche führten zu demselben Ergebnis: Der Perubalsam übt eine energische präventiv antiseptische Wirkung gegen die Erdinfektion aus. Die Autoren konnten außerdem noch nachweisen, daß Perubalsam tödliche Dosen von Tetanus- und Botulinusgift in vitro bei kurzdauerndem Kontakt derart zu neutralisieren vermag, daß mit der Mischung injizierte Meerschweinchen am Leben bleiben, während die Kontrollen, die die gleiche Giftmenge allein erhalten, sterben. Die Erklärung dafür, daß der Perubalsam mit Erde infizierte Tiere vor Erkrankung zu schützen vermag liegt darin, daß das beim Auskeimen der Anaerobiersporen sich bildende Toxin sukzessive von dem in der Wunde anwesenden Balsam neutralisiert bzw. paralysiert wird.

Carl.

Wiedemann: Untersuchungen über Refraktionsanomalien des Pferdeauges. (Zeitschr. für Vet.-Kunde 1926, H. 9, S. 257.)

Bei der Untersuchung von 240 Truppenpferden auf Refraktionsanomalien der Augen wurde festgestellt: Myopie bei 75 Pferden (= 31,2 Prozent); bei 5 Pferden Hypermetropie (= 2,0 Prozent); bei 9 Pferden Linsenastigmatismus (= 3,7 Prozent); bei 14 Pferden Hornhautastigmatismus (= 5,8 Prozent); bei 25 Pferden Anisometropie (= 10,4 Prozent). Die Myopie betrug 0,5–5 D., die Hypermetropie 0,5–1 D. Es ist nicht festgestellt, daß eine bestimmte Abweichung der Refraktion beim Pferde in einem bestimmten Alter besonders häufig vorkommt. Der Grad der Myopie und Hypermetropie ist unabgänglich vom Alter. Wallache zeigen prozentual mehr Abweichungen von der normalen Refraktion als Stuten. Die Refraktionsanomalien haben für den Gebrauchszweck des Truppenpferdes nur Bedeutung, wenn sie hochgradig sind, z. B. Myopie von 4 D und darüber.

A.—

Pronath: Verlust des Hornschuhs bei einem Maultier. (Zeitschr. für Vet.-Kunde 1926, H. 8, S. 246.)

Ein sehr wertvolles, fünfjähriges Maultier ging beim Scharfschießen im Gespann durch und blieb mit dem Hinterhufe an dem nicht gesicherten und nicht straff gespannten Verstreibungsdraht eines Lichtleitungsmaßes hängen, wobei es sich den ganzen Hornschuh vom Fuß losriß, noch etwa 50 Meter weit lief und dann erst zum Stehen kam. Es wurde zunächst zur Blutstillung ein dicker trockener Verband angelegt, und das Tier in eine Hängematte gebracht. Am nächsten Tage zeigte sich die Matrix nach Säuberung des Stumpfes mit warmer H_2O_2 -Lösung bis auf ein markstückgroßes Stück am Zehenteil unverletzt. Es wurde ein dicker Verband mit reichlich Ol. Olivarum 100,0 und Jodoform und Perugen je 10,0 angelegt und darüber ein eigens angefertigter Hufschuh, der gamaschenartig bis zur Mitte des Schienbeins reichte, angezogen. Nach drei

Tagen war die ganze Sohle bereits mit grauschwarzem Hornüberzug bedeckt. Das Tier stützte sich zeitweise schon auf den kranken Fuß; es blieb tagsüber in der Hängematte und legte sich nachts. Nach fünf Wochen erfolgte Trockenbehandlung (Tannoform und Protargol 3:1), die Krone wurde mit einer Salbe von Ol. Lauri und Adeps lanae aa mit etwas Kal. sulfurat. eingerieben. Nach weiteren vier Wochen war auch die Wandmatrix mit Horn überzogen, der auf 2 cm fehlende Tragrand wurde mit Defay'schen Hufkitt aufgebaut und täglicher Weidegang angeordnet. 4½ Monate nach dem Unfall wurde ein Beschlag mit Platteneisen und Hufkitt aufgelegt. Lahmheit bestand nur anfangs. Beim nächsten Beschlage erhielt der Huf dann ein gewöhnliches Hufeisen. Der Fall ist ein Beweis für die Heilkraft und Regenerationsfähigkeit beim Maultier. A.—

Mörkeberg, A. W.: Fisteln an den Hintergliedmaßen. (Maanedsskrift for Dyrlaeger, 1925, Heft 17.)

(Mit 1 Abbildung.)

1. Fistel am Kreuz bei einem Pferd, die durch einen Fremdkörper unterhalten wurde.

Vor vielen Jahren hatte ein Pferd sehr lange Zeit eine Fistel am Kreuz, die infolge einer Wunde entstanden war und etwas vor dem Trochanter major mündete, und war deswegen in die Klinik eingestellt worden. Als ich die Fistel aufspaltete, fand ich ein flaches Stück eines Wasserhahnes aus Metall, das in einer kleinen Abszeßhöhle innerhalb des äußeren Darmbeinmündermuskels (*M. gluteus superficialis*) lag. Wie später erklärt wurde, hatte das Pferd sich die Wunde dadurch zugezogen, daß es sich im Stalle mit dem Hinterteil gegen die Wand und den dort angebrachten Wasserhahn gesetzt hatte. Man hatte wohl bemerkt, daß dieser defekt war, doch niemand hatte sich gedacht, daß das abgebrochene Stück Metall im Pferde gefunden werden würde. Die gespaltene Fistel heilte, nachdem der Fremdkörper entfernt worden war.

2. Senkungsabszeß und Fisteln in der linken Flanke und auf dem linken Oberschenkel, hervorgerufen und unterhalten durch Carionekrose im Tubercosae.

Eine 11jährige Stute kam am 19. März 1919 zur Klinik, da sie wegen Fisteln in der Flanke behandelt werden sollte. Drei Monate vorher hatte sie sich bei einem Fall eine große, gequetschte Muskelwunde über dem linken Hüftwinkel zugezogen. Es war zu Eitersenkungen gekommen, und der behandelnde Tierarzt hatte Gegenöffnungen an- und Drainröhren eingelegt. Die Schnittöffnungen hatten sich aber zu Fistelmündungen zusammengezogen, durch die stinkender Eiter entleert wurde. Die ursprüngliche Wunde dagegen hatte sich geschlossen. Die oberste Fistelmündung lag 20 cm unterhalb des äußeren Hüftwinkels, etwas hinter dem vorderen Rande des Spanners der breiten Schenkelbinde (*M. tensor fasciae latae*), die andere etwas oberhalb und hinter dem Kniegelenk. Eine Sonde konnte durch eine Abszeßhöhle von der einen Fistelmündung zur anderen geführt werden. Von der obersten Fistelmündung konnte eine Sonde in eine recht geräumige Höhle hinauf zu dem Hüftwinkel und über ihn geführt werden. Durch die unterste Fistelmündung konnte die Sonde in eine geräumige Abszeßhöhle, deren unterster Teil etwa 10 cm unter der Fistelmündung lag, geführt werden, und es konnte daraus

eine reichliche Menge stinkender Eiter ausgedrückt werden. Die mediale Wand der flachen langgestreckten Abszeßhöhle, die sich vom Hüftwinkel bis unterhalb des Knies ausdehnte und deren Grenze an den Seiten sehr ausgebuchtet waren, wurden von *M. tensor fasciae latae* und von der *Fascia lata* gebildet.

Das Pferd wurde geworfen und narkotisiert, die Fistelmündungen wurden so weit gespalten, daß sich ein Finger einführen ließ. Im untersten Teil der Abszeßhöhle wurden außer einer geringen Menge stinkenden Eiters ein paar dattelgroße halbfeste Körper, die zum Teil aufgelöstes Knochengewebe enthielten, angetroffen. Die Haut über dem Hüftwinkel, der die äußere Wand für den obersten Teil der Abszeßhöhle bildete, wurde gespalten. Man fand nun, daß der Tubor coxae an der Dorsalfäche Sitz von Caries war. Die cariöse Fläche wurde mit dem scharfen Löffel kräftig abgekratzt. Ebenso wurden die Wände der Abszeßhöhle mit scharfen Löffeln bearbeitet, und Drainröhren wurden stufenweise dicht oberhalb des Hüftwinkels bis zur untersten Gegenöffnung, die unterhalb des Kniegelenks lag, eingelegt. Unter Baden und Ausspülungen mit Antiseptica verminderte sich das Sekret rasch, und die Abszeßhöhle schloß sich, so daß das Pferd 18 Tage nach der Operation nach Hause geschickt werden konnte. Die Sekretion war sehr gering, und von der Höhle war nicht mehr viel übrig als die Drainkanäle.

3. Fistel ganz oben auf der Innenseite des Oberschenkels bei einem Pferde, die durch einen Fremdkörper unterhalten wurde.

Ein Pferd, das vor mehreren Jahren in die Klinik eingestellt worden war, damit es behandelt werden sollte, hatte sehr lange eine Fistel, die ganz oben an der Innenseite des Oberschenkels mündete. Es wurde dort ständig eine reichliche Menge Eiter entleert, es war aber keine deutliche Geschwulst vorhanden, auch lahmt das Pferd nicht.

Als ich die Fistel mit der Sonde verfolgte, fand ich, daß sie zuerst gerade nach vorn lief und sich dann um die Vorderseite des vierköpfigen Streckers des Unterschenkels (*M. quadriceps femoris*) bog, um dann hoch hinauf in die Flanke zu gehen, medial vor dem Spanner der breiten Schenkelbinde (*M. tensor fasciae latae*). Dort oben fand sich in einer flachen Abszeßhöhle im zusammengebogenen Zustand ein 15 cm langer, fingerdicker, biegsamer Stecken. Als dieser entfernt und der Fistelkanal ausgekratzt und drainiert worden war, heilte es rasch. Der Fistelkanal war sehr weit. Daher gestattete er trotz seiner beträchtlichen Länge und seiner stark gekrümmten Gestalt guten Abfluß aus der eiternden Höhle um den Fremdkörper. Der gute Abfluß erklärt es auch, daß weiter keine Geschwulst weder um die Fistel noch vor der Abszeßhöhle zugehen war.

Ich mußte, um mit der Sonde dem ganzen langen, gebogenen Kanal folgen zu können, an zwei Stellen in ihm gegen die Spitze der Sonde eine Gegenöffnung legen, um dann von der neuen Öffnung aus mit der Sonde weiter zu dringen.

4. Fisteln am Kreuz und Oberschenkel bei einem Fohlen, die durch einen vom Tuber ossis ischii stammenden Sequester unterhalten wurden.

Ein Fohlen, das ich vor mehreren Jahren operierte, hatte mehrere Monate eine Phlegmone und mehrere Fisteln gehabt. Sie mündeten am Trochanter maximus und weiter unten an der Hinterfläche des Oberschenkels. Die Fisteln waren wiederholt dilatiert worden, die Eiterung hielt aber an. Als ich einen langen und tiefen Einschnitt an der Hinterfläche des Oberschenkels anlegte, fand ich tief drinnen zwischen dem zweiköpfigen Oberschenkelmuskel (*M. biceps femoris*) und dem halbsehnigen Muskel (*M. semitendinosus*) ein ziemlich großes, lose liegendes, abgestoßenes Knochenstück. Es war der Gestalt nach wahrscheinlich

ein abgesprengtes Stück des Sitzbeinhöckers (Tuber ischiadicum). Als dieses entfernt war, hörte die Phlegmone auf, und die Fisteln heilten.

5. Fistel im Oberschenkelumdreher bei einem Fohlen, unterhalten durch einen von der untersten Beckenwand stammenden Knochensequester.

Bei einem kostbaren zweijährigen Fohlen, das zur Klinik am 22. Mai 1921 kam, hatte sich nach dem Vorbericht bereits, als es drei Wochen alt war, ein Abszeß am Oberschenkel gebildet. Nachdem dieser entleert worden war, entstand eine Fistel. Sie heilte, an einer anderen Stelle aber in der Nähe bildete sich eine neue Fistel. So war es eine lange Zeit gegangen. Es bildeten sich immer wieder teils innen, teils hinten am Oberschenkel neue Fisteln. Nach und nach waren alle bis auf eine geheilt. Diese hatte sich sehr lange gehalten, und es bestand ständiger Ausfluß von Eiter. Das Fohlen war gut entwickelt. Sein Allgemeinbefinden war nicht gestört, das Tier lahmt auch nicht.

Die Fistelmündung lag weit unten an der Hinterfläche des Oberschenkels. Der recht enge Kanal ging in einer Länge von 30 cm nach oben und vorn tief in die Muskulatur hinauf gegen das Sitzbein (*Os ischii*) und konnte von dort, wie es sich bei der Operation zeigte, in einer Länge von 15 cm längs des äußeren Sitzbeinastes, gegen die Gegend des eirunden Loches, des Verstopfungsloches oder des verstopften Loches (Foramen obturatum) verfolgt werden. Das Fohlen wurde geworfen und narkotisiert. Dann wurde der 30 cm lange Kanal gespalten, und seine sehr feste, kallöse Wand wurde exstirpiert. Der Fistelkanal lag oben in einer Tiefe von 12 cm, so daß eine sehr große und tiefe Wunde entstand. Von dieser spaltete ich dann vorn so weit auf, wie ich es mit Rücksicht auf den Hüftnerve (*N. ischiadicus*) tun durfte, und darauf mit dem scharfen Löffel, mit dem ich der Fistel ganz bis zum Grunde zu folgen glaubte.

Trotz eifrigen Suchens gelang es aber nicht, einen Fremdkörper oder bloßgelegtes Knochengewebe zu finden, wie ich erwartet hatte. Das Fohlen stand sehr lange (3½ Monat) in der Klinik. Die Fistel heilte endlich unter Anwendung von Injektionen in ihrem übrigbleibenden Teil, wobei sie wiederholt mit dem scharfen Löffel ausgekratzt wurde. Aber sie trat einige Zeit darauf wieder auf, nachdem das Fohlen nach Hause gekommen war, und nun wurde es getötet. Bei der Sektion fand sich eine beschränkte Nekrose des Beckens weiter vorn, als ich mit meinem Eingriff gelangt war.

Darnach ist es mir klar, daß ich weiter vorn an der unteren Beckenwand hätte einschneiden und die Fistel an dieser Stelle aufsuchen müssen. Dabei hätte ich wahrscheinlich den Sequester finden und entfernen können.

6. Fistel an der hinteren Seite des Oberschenkels bei einem Pferde, die von ausgebreiteter Botryomykose in und zwischen den Muskeln herrührte.

Am 24. September 1913 exstirpierte ich in der Klinik bei einem siebenjährigen Pferde ein sehr großes Botryomykom, das in der hinteren Seite des Oberschenkels saß. Eine Fistel führte tief in das Botryomykom, das dem hintersten Rand der Beugemuskeln des Unterschenkels sowie einen Teil des Zwischenraumes zwischen ihnen einnahm. Es reichte vom Tuber ossis ischii bis vor den Muskelbauch des Zwillingsmuskels (*M. gastrocnemius*). Oben lag es recht oberflächlich, erstreckte sich weiter unten mehr und mehr in die Tiefe, so daß ein beträchtlicher Teil des Muskelgewebes entfernt werden mußte. Ganz unten mußte ich 10 cm tief hinein, bevor ich an die Außenseite des abnormen Gewebes gelangte. Die sehr lange Wunde heilte in

einem Monat, und die Funktion des betreffenden Hinterfußes wurde anscheinend nicht dadurch gestört, daß große Stücke der erwähnten Muskeln entfernt worden waren.

7. Fistel am Hinterknie bei einem Pferde, die durch einen von der Patella stammenden Sequester unterhalten wurde.

Am 4. Juli 1918 kam ein Pferd zur Klinik, das wegen zweier Fisteln behandelt werden sollte, die recht lange bestanden hatten, und welche in einer kleinen Entfernung von einander vorn am Knie, ungefähr vor dem oberen Rande der Tibia mündeten. Sie erstreckten sich, wie festgestellt wurde, als sie sondiert und gespalten worden waren, in einem Bogen über die Vorderfläche des Kniegelenks zum äußeren oberen Teil der Kniescheibe, wo sie in einer geräumigen Höhle mit granulierenden, eiternden Wänden endeten. In dieser Höhle lag, vollständig gelöst, von allen Weichteilen, ein aus einem Teil der Patella bestehender, recht großer, widerlich stinkender Sequester. Er war von unregelmäßiger Gestalt und maß $4 \times 2 \times 2$ cm. Er wurde durch einen Schnitt in die äußere Wand der Höhle entfernt. Die Abszeßhöhle wurde mit dem scharfen Löffel ausgekratzt, und es wurde ein Drainrohr eingelegt. Darauf füllte sich die Höhle recht schnell mit Granulationsgewebe, und die Fistel heilte. Das Pferd ging bald nach der Operation frei auf dem Beine, während es, als es in die Klinik gekommen war und auch lange Zeit vorher, stark gelahmt hatte.

8. Fistel am Hinterknie bei einem Pferde, die durch einen Fremdkörper unterhalten wurde.

Ein Pferd kam zur Klinik und sollte wegen einer Fistel, die in der Nähe des Knies mündete und lange Zeit bestanden hatte, behandelt werden. Es lahmt stark. Die kleine Fistelmündung, durch welche nur wenig Eiter ausfloß, befand sich lateral am Unterschenkel eine Handbreit unter dem Kniegelenk, einige Zentimeter hinter der Tibia. Die Fistel führte von dort nach oben und etwas nach vorn bis vor das untere Ende des Oberschenkels, bog sich aber um. Infolgedessen mußte ich eine Gegenöffnung anlegen, durch die ich eine Sonde einlegen und der Fistel weiter folgen konnte. Es zeigte sich nun, daß sie von der erwähnten Stelle in einem Bogen nach vorn und unten verlief, dann über die Vorderfläche des Kniegelenks und etwa 8 cm am Unterschenkel vor dem dreieckigen Auswuchs (Tuberositas tibiae) ging, wo sie in einer ganz kleinen Höhle endete. In dieser lag eine etwa 1,5 cm lange Spitze eines Hufnagels. Der ganze Kanal war ganz eng und lag subfaszial.

Der kleine Fremdkörper muß wahrscheinlich an der Stelle, wo sich die Fistelmündung befand, eingedrungen und dann durch Muskelwirkung in der von der Fistel gebildeten, etwas seltsamen Bahn geführt worden sein. Es stellte sich rasch Heilung ein, nachdem der Fremdkörper entfernt worden war.

9. Fistel an der Medialseite des Hinterkniegelenks bei einem Fohlen, die hinein zu einer granulierenden Höhle mit sehr dicken fibrinösen Wänden führte.

Die Figur zeigt die Hintergliedmaßen eines zweijährigen Fohlens, das am 29. Juni 1916 zur Klinik kam. Es sollte wegen eines innen am rechten Knie sitzenden, geschwulstähnlichen Knotens, der auf der Spitze eine Fistelmündung hatte, behandelt werden. Die Geschwulst war so groß wie ein Paar geballte Hände. Sie ragte 12 cm hervor, und ihre Basis hatte einen Durchmesser von 20 cm. Auf dem Bilde sieht man die sehr runde Gestalt und die glatte Oberfläche. Der kleine Knopf auf dem Gipfel der Geschwulst umgab eine Fistelmündung. Die Fistel führte in eine hühnereigroße Höhle, aus der etwas Eiter entleert wurde. Ein bloßgelegter Knochen oder ein Fremdkörper konnte nicht nachgewiesen werden. Die Haut über der

Geschwulst war verschiebbar, außer um die Fistelmündung, von der ein fester Strang (die Wand des Fistelkanals) zu der festen, indolenten Geschwulst führte. Die Gliedmaße wurde beim Vorführen etwas unregelmäßig geführt, Stützbeinlahmheit war aber nicht zugegen. Die ganze tumorähnliche Bildung mit der Abszeßhöhle wurde exstirpiert,



indem man zwei bogenförmige Schnitte in einer solchen Entfernung von der Basis anlegte, daß die übrigbleibenden Hautränder leicht genäht werden konnten. Es war kein Knochengewebe bloßgelegt worden. Die Wunde heilte regelmäßig.

Als die Geschwulst durchgeschnitten wurde, fand man, daß sie ausschließlich aus einem festen, fibrösen Gewebe bestand, das die Abszeßhöhle umschloß, deren Wand mit schlechten Granulationen ausgekleidet war.

10. Fistel am oberen Ende des Unterschenkels bei einem Fohlen, die zu einem Knochenabszeß in der Tibia führte, in dem ein kleiner, gelöster Sequester lag.

Ein zweijähriges Fohlen kam am 14. Juli 1915 zur Klinik und sollte wegen einer Fistel behandelt werden, die oben an der inneren Fläche des Unterschenkels ihren Sitz hatte. Die betreffende Gliedmaße war im ganzen beträchtlich geschwollen. Das Fohlen lahmt und war in der Gegend der Fistel so empfindlich, daß man eine nähere Untersuchung nicht vornehmen konnte, bevor es zur Operation niedergelegt und narkotisiert war. Dann konnte die Sonde bis zu einer bloßgelegten und kariösen Fläche der Tibia eingeführt werden. Nachdem die Weichteile gespalten waren, fand man in dieser Fläche eine kleinere Öffnung, die in eine pflaumengroße Höhle im Knoten führte. In dieser Höhle lag ein loser Sequester von der Größe eines Zweiforestückes. Dieser wurde entfernt. Die Mündung der kleinen Höhle wurde mit einem Hufmesser erweitert, und ihre Wände sowie die karierte Fläche außen am Knochen wurden mit dem scharfen Löffel abgeschabt, bis man auf gesundes Knochengewebe kam. Die Höhle lag so nahe am oberen Ende der Tibia, daß nur eine dünne Knochenwand zwischen ihr und dem Kniegelenk sich befand. Die Wände der Knochenhöhle bedeckten sich rasch mit guten Granulationen, und die Höhle füllte sich allmählich mit neuem Knochengewebe, so daß das Fohlen etwa 6 Wochen nach der Operation nach Hause geschickt werden konnte.

Es ist recht schwer, ein Pferd so zu fesseln, daß man bequem an der Medialseite des Kniegelenks oder hoch oben an der Innenseite des Unter-

schenkels operieren kann. Man kann indessen diese Schwierigkeit dadurch lösen, daß man so vorgeht, wie ich in diesem Falle getan habe, indem ich das Pferd mit Abildgaards Wurzeug mit dem betreffenden Bein nach unten niederlegte. Das obere Hinterbein wurde auf die gewöhnliche Weise am Rückenring am Brustgurt fixiert, die drei übrigen Gliedmaßen wurden aber, ohne daß sie am Bauchring befestigt wurden, zusammengezogen, und das Hinterbein, an dem operiert werden sollte, wurde dann mit einem Seil gespannt, aber ohne daß es aus der Verkoppelung mit den Vordergliedmaßen gelöst wurde.

11. Fistel am oberen Ende des Unterschenkels bei einem Pferde, die in eine Abszeßhöhle in der Tuberositas tibiae führte.

Am 7. Oktober 1912 operierte ich beim Tierarzt Flöystrup in Tingerup ein Pferd, das einen hühner-eigroßen fibrösen Knoten vorn und medial vor dem oberen Ende des Unterschenkels hatte. Im Knoten war eine Fistel, die in eine walnußgroße Abszeßhöhle im dreieckigen Auswuchs (tuberositas tibiae) führte. Der fibröse Knoten wurde exstirpiert, und die Abszeßhöhle im Knochen wurde mit dem scharfen Löffel ausgekratzt. Darauf füllte sich die Höhle aus, und die Wunde heilte.

12. Fistel am Hinterschienbein bei einem Hengst, die durch einen Sequester von dem großen Mittelfußknochen unterhalten wurde.

Ein seiner Zeit bekannter Gestütshengst, „Höyöbar“, hatte infolge einer Verletzung durch Stacheldraht einen größeren Substanzverlust außen an einem Hinterschienbein, eine Handbreit unterhalb des Sprunggelenks, sich zugezogen. Die Wunde heilte langsam, und es bildete sich eine Fistel, die in eine Granulationsfläche mündete. Als der Hengst im Juli 1907 zur Klinik kam, fand ich, daß die Fistel unter die Strecksehne führte und dort in einer Höhle im Knochen endete. Als die Fistel gespalten war, fand ich in der erwähnten Knochenhöhle einen vollständig gelösten, recht großen Sequester. Die Fistel und die granulierende Wundfläche heilten, nachdem der Sequester entfernt war. 3 Jahre darauf brach die Stelle wieder auf, und der Hengst wurde wieder zur Klinik geführt. Eine Sonde konnte durch die entstandene Perforationsöffnung in eine kleine Höhle unter der Strecksehne geführt werden. Knochengewebe war aber nicht bloßgelegt. Die Abszeßhöhle schloß sich, und die Fistel heilte, nachdem sie ausgekratzt und drainiert war.

13. Fistel am Hinterschienbein bei einem Fohlen, die bis zu einer Abszeßhöhle im großen Mittelfußknochen führte.

Ein einjähriges Fohlen hatte infolge einer Quetschwunde an der äußeren Seite des Hinterschienbeines, dicht unter dem Sprunggelenk eine recht bedeutende Verdickung des großen Mittelfußknochens bekommen, und vor der verdickten Partie des Knochens fand sich eine Fistel. Das Fohlen lahnte stark. Wie sich bei der Untersuchung zeigte, führte die Fistel zu bloßgelegtem Knochengewebe, und ich fand, nachdem die Weichteile gespalten waren, daß die Fistel sich in den Knochen hinein durch eine kleine Öffnung fortsetzte. Als diese mit Hilfe eines Meißels stark erweitert worden war, konnte man einen Finger in eine hühnereigroße Abszeßhöhle in dem verdickten Knochen führen. Die Höhle wurde mit dem scharfen Löffel ausgekratzt und ausgetamponiert und füllte sich darauf, wenn auch langsam, mit neugebildetem Knochengewebe. Die Wunde heilte. Die Lahmheit hörte auf, und die Geschwulst des Knochens verlor sich allmählich, so daß man, als das Pferd völlig ausgewachsen war, kaum einen Unterschied an den beiden Hinterschienbeinen sehen konnte.

14. Große Granulationsgeschwulst und Fistel am Hinterschienbein bei einem Pferd. Die Fistel führte durch die Granulationsgeschwulst in eine Höhle im Knochen, worin sich ein kleiner Sequester fand.

Am 23. Februar operierte ich bei Tierarzt Nielsen, Maribo, ein Pferd, bei dem nach einer Verletzung im Verlaufe einer langen Zeit sich eine mächtige Granulationsgeschwulst gebildet hatte, die ihren Sitz außen und vorn an einem Hinterschienbein dicht unter dem Sprunggelenk hatte. Eine Fistel führte durch die Granulationsgeschwulst bis auf das bloßgelegte Knochengewebe. Die große Granulationsgeschwulst, die 6 Kilogramm wog, entfernte ich mit Hilfe einer Drahtsäge, die genau längs der Haut an der Basis der Geschwulst geführt wurde. Wie sich dabei zeigte, bestand der tiefste Teil der Geschwulst aus Knochengewebe, das ebenso wie das Granulationsgewebe durchgesägt wurde. Die sehr große Wundfläche, die nach dem Absägen zurückblieb, bestand demnach aus einer stark blutenden Schnittfläche im Knochengewebe, und mitten in diesem führte eine Fistel in eine kleine Knochenhöhle, in der ein kleiner loser Sequester lag. Die Blutung aus der Knochenfläche wurde mit dem glühenden Eisen gestillt, und es wurde ein Druckverband angelegt. Durch eine sorgfältige Nachbehandlung gelang es Tierarzt Nielsen, die große Wundfläche zur Heilung zu bringen, ohne daß sich eine neue Granulationsgeschwulst bildete.

15. Sohlenfistel bei einem Pferd, die durch einen Sequester im Hufbein unterhalten wurde.

Als Beispiel für die nicht seltenen Fälle, in denen eine Nekrose im Hufbein einen Eiterungsprozeß und eine daraus folgende Fistel innerhalb des Gebietes des Hufes unterhält, führe ich folgenden Fall an.

Ein sechsjähriger Wallach kam am 23. September 1925 zur Klinik, wo er wegen eines Entzündungsprozesses in dem einen Vorderhuf behandelt werden sollte. Der Entzündungsprozeß war im Anschluß an eine Verletzung entstanden, die sich das Pferd 14 Tage vorher durch das Eintreten eines Nagels zugezogen hatte.

Das Pferd lahnte stark. Das Allgemeinbefinden war gut. Kein Fieber. Es bestand verstärkte Pulsation am Schienbein und starke Empfindlichkeit auf Druck mit der Visitierzange um den Hufrand vor der Grenze zwischen Zehen- und Seitenwand. In der weißen Linie fand sich hier ein Ausschnitt, durch den dicker, gelber Eiter entleert wurde. An der Krone bestand kein Durchbruch. Nachdem der Huf stark beschnitten war, wurde mit der Sonde eine Unterminierung der Hornsohle mit halbkreisförmiger Begrenzung und mit einem Radius von ein paar Zentimetern nachgewiesen. Die Sonde konnte an einer einzigen Stelle durch die Fleischsohle bis zum bloßgelegten Hufbein geführt werden. Nachdem das Pferd niedergelegt und narkotisiert worden war, wurde das unterminierte Sohlenhorn mit dem Hufmesser entfernt, und man sah dann in der etwas geschwollenen Fleischsohle zwei erbsengroße Fistelmündungen mit zerrissenen Rändern, die beide zu einer flachen Abszeßhöhle zwischen Fleischsohle und Unterfläche des Hufbeins ungefähr in demselben Umfange führten, den die Unterminierung der Hornsohle gehabt hatte. Das unterminierte Stück der Fleischsohle wurde entfernt, so daß die von Weichteilen entblößte Unterfläche des Hufbeins frei lag. In dieser Knochenfläche befand sich eine Höhle, die einen lose liegenden, nußgroßen unregelmäßigen geformten Sequester enthielt. Die untere Fläche des Sequesters war von dem Nagel, der die Verletzung hervorgerufen hatte, gekennzeichnet, die übrigen Flächen dagegen zeigten, das gewöhnliche abgenagte Aussehen, das man findet, wo nekrotisches Knochengewebe durch eine rarefizierende

suppurative Otitis demarkiert worden ist. Es ist wichtig, darauf zu achten, daß die Demarkation des toten Knochengewebes so rasch erfolgt ist. Die Höhle im Knochen reichte nicht ganz bis zum Hufbeinrand; an diesem fand sich aber an der äußeren Hufbeinfläche ein kleiner loser Knochensplitter. Die Wände der Höhle wurden mit dem scharfen Löffel ausgekratzt, bis man auf Knochengewebe gelangte, das gesund aussah. Darauf wurde die nun recht geräumige und tiefe Höhle mit Jodoformgaze austamponiert, und der in der Klinik stets nach Operationen im Hufe angewandte antiseptische, komprimierende Okklusivverband wurde angelegt. Nach der Operation befand sich das Pferd ganz wohl. Es zeigte keine Spur von Fieber und stützte nach wenigen Tagen voll und fest auf dem Bein. 8 Tage nach der Operation wurde es dann nach Hause geschickt. Da das Pferd dauernd gut stützte und sich im ganzen wohl befand und da nichts durchsickerte, so blieb der Verband noch 5 Wochen liegen. Reserve-tierarzt J a c o b s e n, der ihm abnahm, hat heute (17. November) mir mitgeteilt, daß nicht eine Spur Eiter im Verband und daß der Defekt ausgefüllt und vollständig mit Horn bedeckt war. Das Pferd lahmte nicht. Es wurde beschlagen und arbeitete sofort und hat seither jeden Tag gearbeitet. B a b.

G h i l l a u l t, A.: **Der Ikterus der neugeborenen Fohlen und Maultiere.** (In.-Dissert. Toulouse 1925.)

Die Natur dieser Krankheit war bis jetzt unbekannt, festgestellt ist in neuerer Zeit als Ursache ein Piroplasma, die *Nuttalia equi*. Die Erscheinungen haben einen typhoiden Charakter, zur Sicherung der Diagnose sind Blutausstriche zu machen und zur Untersuchung an ein Laboratorium einzusenden. Dies ist das einzige Mittel, um die Krankheit im Anfange auch bei den Müttern der Fohlen zu erkennen. Bemerkt sei, daß es die erste Piroplasmose ist, die in Frankreich konstatiert wurde. Die Piroplasmen sind nicht von einem Tier auf das andere übertragbar, sondern die Übertragung geschieht durch einen Zwischenwirt, nämlich durch die Zecken. Diese Zecken (deren Spezies noch zu bestimmen ist) setzen sich mit Vorliebe in den Ohren, an der Innenfläche der Schenkel und an den Geschlechtsteilen fest. Wir kennen nunmehr die Ursache, die Symptome und Veränderungen der genannten Krankheit. Was die Behandlung anbetrifft, so ist zu berücksichtigen, daß die jungen Tiere schnell sterben und die Behandlung meist zu spät kommt, da die Tiere sich meist im äußersten Zustande der Schwäche befinden. Verfasser glaubt, daß eine wirksame Bekämpfung nur in der präventiven Behandlung der Mütter, die von der Gelbsucht befallen sind, zu suchen ist. Hier werden sich allerdings manche Hindernisse von Seiten der Viehzüchter entgegenstellen, aber sie wären zu überwinden, wenn die Züchter Entgegenkommen zeigen und selbst Opfer bringen. Alle Pferde, Esel und Maultiere der Gegend müßten systematisch einer Blutuntersuchung unterzogen werden. Für die Behandlung sind Arzneimittel vorhanden, die sofort angewandt werden können (insbesondere Arsenik und Quecksilberpräparate — Neosalvarsan und Quecksilberbijdodid, Chinin-Bromhydrat, Bayer 205). Obschon das Trypanblau sehr wirksam sonst gegen Piroplasmose des Pferdes ist, leistet es weniger bei der *Nuttalia equi*. Die Anämie wäre mit Eisen- und Arsenikpräparaten zu behandeln. Vielleicht wird man später mit der Organ- oder Serumtherapie mehr erreichen. A.—

G a u b e t, M.: **Über Bauchbrüche und ihre Behandlung.** (In.-Dissert. Toulouse 1925.)

Verf. ist der Meinung, daß man bei frischen Bauchbrüchen stets von der Applikation von eigens für den Fall hergestellten Bandagen Gebrauch machen soll. Im Falle durch diese Behandlung die Hoffnung auf Heilung getäuscht wird und wir trotz der vorherigen Annahme einen alten Bruch vor uns haben, so ist die Radikalkur angezeigt, d. h.,

die chirurgische Behandlung; sie ist die sicherste Methode und bietet die geringere Gefahr. Alle anderen Verfahren sind beiseite zu lassen (außer evtl. Ligatur in gewissen Fällen), weil sie unsicher sind und durch ihre Folgen oft gefährlich werden können. Bei allen chirurgischen Maßnahmen ist aber die wirtschaftliche Seite (mit Ausnahme bei Luxustieren) in Rücksicht zu ziehen. Wird zur Operation geraten, so muß der Veterinär des Erfolges sicher sein, andernfalls sind die Kosten gegenüber dem Werte des Tieres abzuwägen, wobei in Betracht zu ziehen ist, daß einer vielleicht möglichen Heilung die Gewißheit vorzuziehen ist, daß der Besitzer einen Teil des Wertes des Tieres dadurch wettmachen kann, daß er es zur Schlachtung vorbereitet. G a u b e t gibt in einer Tafel die Behandlung für die verschiedenen Fälle: Arbeitstiere, verwertbar ohne Verlust beim Schlachten (Ochsen, Kühe, Schafe) bei frischen Brüchen: Bandage, bei alten und bei unheilbaren oder spontanen Schlachtung hinausschieben, bei abgeschnürten Brüchen unverzügliche Schlachtung. Bei Tieren mit Verlust bei Schlachtung (Pferde, Esel, Maultiere): bei alten Brüchen Radikalkur, bei unheilbaren oder spontanen Schlachtung hinausschieben, bei Abschnürung Radikalkur. Bei Fleischtieren: bei alten ferner bei unheilbaren oder spontanen Brüchen: Schlachtung hinausschieben, bei abgeschnürten sofortige Schlachtung; bei Milchtieren: bei alten Brüchen: Nutzbarmachung ohne Einspruch oder Radikalkur, bei unheilbaren oder spontanen Nutzbarmachung ohne Einspruch, bei abgeschnürten Brüchen Radikalkur. Bei Luxustieren: bei alten Brüchen Radikalkur, bei unheilbaren oder spontanen: Palliativ-Bandage oder abwartendes Verfahren, bei abgeschnürten Bauchbrüchen: Radikalkur. Bei frischen Bauchbrüchen ist wie oben erwähnt in allen Fällen zunächst von Bandagen Gebrauch zu machen. A.—

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

R u c h t i, E.: **Ein Fall von Eihautwassersucht (Hydrallantois).** (Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 211—212.)

Hydramnion, Hydrallantois, Hydrometra und Myopyometra findet man in der Rinderpraxis hin und wieder. Es wird ein eigenartiger Fall beschrieben. Eine Kuh, zum vierten Mal trächtig, wurde vom Verf. 14 Tage vor Ende der Trächtigkeit untersucht und zwar weil das Tier seit 14 Tagen wenig Freßlust zeigte, sich hin und wieder kurz niederlegte und am Untersuchungstage sich nicht mehr erheben konnte. Das Tier war stark abgemagert, indessen wurde durch den ungewöhnlichen Bauchumfang die Abmagerung stark verdeckt. Status: Angestrenzte Atmung, schmerzhaftes Expiration, schwacher Puls (134 Min.). Perkussion: dumpfer Schenkelton. Keine fötalen Bewegungen. Rektum der vollen Gebärmutter wegen nur auf 25 cm gangbar. Vaginal: Muttermund für vier Finger passierbar, durch langsame Bewegung kann die Hand eingeführt werden. Einleitung des Abortus durch Einreißen. Nachdem 96 Liter Flüssigkeit abgegangen sind, ist ein Foet festzustellen, weitere Entleerung von 120 Litern. Ohne Wehen werden zwei verschiedengeschlechtliche, scheinbar normale Kälber geboren (23/25 kg). Da Retentio secundinarum eintrat, irgendwelcher Nutzen nicht mehr in Aussicht war, wurde das Tier geschlachtet. Sektion: Uterus schlecht zusammengezogen, neben normaler Nachgeburt und unveränderten Kotyledonen noch 8 Liter trübe Flüssigkeit. Die Kälber starben nach drei Tagen; Sektion ist umständehalber unterblieben. — Es handelt sich somit um eine Eihautwassersucht mit einer Flüssigkeitsmenge von 224! Litern. H. Graf.

K r e n t e r, E.: **Über menschliche Infektion mit Bacillus Bang.** (Aus der chirurgischen Abteilung des Städtischen Krankenhauses in Nürnberg.) (Klin. Wochenschr. 1927, S. 1380.)

Nach für den Humanmediziner bestimmten aufklärenden Mitteilungen über den Bazillus Bang und seine Beziehungen zum Erreger des Maltafiebers berichtet Verfasser über folgenden sehr interessanten derartigen Fall:

Patient, ein 35 Jahre alter Kollege (Herr Dr. M. aus Fürth i. B.), hatte bei einer an fieberhaftem Abort erkrankten Kuh die Eihäute ausgeräumt. Etwa drei Wochen später bei gutem Appetit Erkrankung an leichtem Frösteln und heftigen Kopfschmerzen. Zuerst wurde die Krankheit für Grippe gehalten. In der zweiten Woche trat jedoch eine Verschlimmerung ein, die sich darin äußerte, daß fast täglich, Punkt 1 Uhr nachmittags, eine Temperatursteigerung auf 39 Grad einsetzte, die nach Mitternacht unter Schweißausbruch auf unter 38 Grad zurückging. Vormittags war das Befinden des Patienten regelmäßig leidlich. Puls 80 bis 100, Appetit befriedigend, keine Gewichtsabnahme. Diese täglichen Fieberremissionen hielten etwa 3 Monate an, und es war während dieser Zeit von verschiedenen Klinikern diagnostisch und therapeutisch alles mögliche, jedoch ohne Erfolg versucht worden. Auf Anraten eines Kollegen, der ein ähnliches Leiden durchgemacht hatte, ließ Dr. M. sein Blut in der veterinärpolizeilichen Anstalt in Schleißheim untersuchen, und er erhielt von Prof. Dr. Ernst den Bescheid, daß der Bazillus Bang durch Agglutination nachweisbar sei, und daß gegenüber dem Maltabazillus sich dieselbe positive Reaktion ergeben habe.

Inzwischen war der Patient nach der dreimonatlichen Erkrankung zwei Monate voll berufsfähig gewesen. Nach dieser Zeit kam es zu drei in mehrwöchentlichen Pausen auftretenden leichteren Rezidiven, denen um Ostern 1926 ein vierter sehr heftiger Rückfall folgte. Es trat Fieber bis 40,3 ein und eine akute sehr schmerzhaft. Orchitis und Epididymitis. Daß dies mit einer Infektion durch den Bazillus Bang auf dem Blutwege zusammenhängt, ist kaum zu bezweifeln, obwohl es nicht gelang, den Erreger färberisch oder durch Kultur in Punktaten aus dem entzündeten Organ nachzuweisen. Dasselbe negative Resultat ergaben die sehr häufig angelegten Blutkulturen.

Die vom bakteriologischen Laboratorium des Krankenhauses mit Serum des Patienten vorgenommenen Agglutinationsversuche ergaben bezüglich des Bazillenstammes Schleißheim einen Titer von 1 : 1600, gegen Bang Dresden I 1 : 3200, gegen Bang Dresden II 1 : 800 und gegen Bac. melitensis 1 : 6400! Später zeigten alle drei Stämme gleichmäßig einen Titer von 1 : 6200. Nach einigen Monaten reagierten die Bangstämme mit 1 : 400, Melitensis aber immer noch mit 1 : 3200. Aus diesen Zahlen ergaben sich die nahen verwandtschaftlichen Beziehungen der beiden Mikroorganismen. Das Blutbild des Patienten entsprach durchaus den in der Literatur für Maltafieber gemachten Angaben. Therapeutisch schienen von allen versuchten Mitteln noch am besten intravenöse Gaben von Trypaflavin zu wirken. Nachdem die Natur der Krankheit festgestellt war, empfahl Prof. Dr. Ernst die aktive Immunisierung. Von Dr. Süßmann wurde eine Milchvakzine von Bang und Bac. melitensis nach den üblichen Grundsätzen hergestellt, die sich vortrefflich bewährte. Schon nach der zweiten Injektion, die während der mit Orchitis verbundenen Attacke erfolgte, gingen die Temperaturen zurück. Nach fünf Einspritzungen waren sämtliche Krankheitserscheinungen verschwunden, und Patient ist seit neun Monaten vollständig gesund geblieben. Nach diesen Beobachtungen muß man mit der Möglichkeit rechnen, daß Personen, die mit abortierenden Tieren in Berührung kommen, sich infizieren, also hauptsächlich Tierärzte. Auch ist die Vermutung ausgesprochen worden, daß bei gesunden Landwirtfrauen, die häufiger ohne besondere Ursache abortieren, an eine ätiologische Mitbeteiligung des Bazillus Bang gedacht werden muß. Carl.

Schneek, A.: Beitrag zur Untersuchung des Einflusses des Maschinenmelkens auf Menge und Zusammensetzung der Milch. (Milchzw., Zentralbl. 1927, 56, S. 133—137.)

Verf. benutzte zu dem Versuch vier Ziegen des Haustiergartens des Tierzuchtinstituts der Universität Halle. Das Maschinenmelken erfolgte mit der allerdings heute veralteten Melkmaschine „Revallo“. Die Ziegen ließen sich das Maschinenmelken ohne Widerstreben gefallen und gaben bald das sonst durch Handmelken gewonnene Milchquantum. Im Hauptversuch ließ Verf. alle drei Tage ein Wechseln in der Melkart eintreten, indem entweder beide Euterhälften zugleich oder eine nach der anderen und zwar entweder zuerst die rechte und dann die linke oder zuerst die linke und dann die rechte Euterhälfte gemolken wurden. Auf diese Weise ergaben sich (durch jeweiligen Wechsel) sieben Melkperioden. In den ersten drei sinkt die Milchmenge, um dann in den nächsten vier zu steigen. Fettfreie Trockensubstanz und spezifisches Gewicht fallen zunächst beim Wechsel der Melkart, um bei Wiederkehr derselben wieder anzusteigen. Beim Brechungsexponenten lassen sich Wiederkehr der Perioden L + R (linke und rechte Euterhälfte gleichzeitig gemolken) abwechselnd höhere und niedrigere Werte bemerken. Zum Schluß führt Verf. an, daß die beim Wechsel der Melkweise gemachten Beobachtungen zeigten, daß einer Änderung der Milchmenge und der prozentualen Zusammensetzung der Milch bei Wiederkehr derselben Anordnung eine entgegengesetzte, ausgleichende durch Reizwirkung erklärte Änderung entspricht. me y.

Nottbohm, F. E.: Unterbrechung der Melkzeiten und Zusammensetzung der Milch. (Zeitschrift f. Unters. d. Lebensm. 1927, Bd. 53, Heft 5.)

Verfasser hat erneut Versuche angestellt, um festzustellen, wie der Vorgang des Trockenstellens durch vorsichtige Unterbrechung der gewohnten zwei Melkzeiten bei solchen Tieren wirkt, deren Euter kurz zuvor in allen vier Vierteln auf einwandfreie Sekretion geprüft worden sind. Eine einmalige Unterbrechung des Melkaktes erbrachte geringfügige Erniedrigung des Milchzuckergehaltes und entsprechend geringfügige Erhöhung des Chlorgehaltes, bei längerer Unterbrechung waren dagegen die Abweichungen erheblicher, dies ist am augenfälligsten beim Milchzuckergehalt zu beobachten, der von 4,86 auf 4,08 fiel. Bei Unterbrechung von fünf Melkzeiten ist ein erhebliches Ansteigen des Fettgehaltes und auch des Chlorgehaltes zu bemerken, wogegen der Milchzuckergehalt um fast die Hälfte fällt. Gesamt- und Casein-N nehmen von Beginn der Melkpausen an ständig zu. Bezüglich des Verhaltens der Alkalien beim Trockenstellen führt Verf. an, daß die Alkalizahl, also der Quotient $\frac{K_2 O}{Na_2 O}$, eine fortgesetzte Erniedrigung erfährt. Chlor und Milchzucker einerseits und Eiweißsubstanzen andererseits bilden Gruppen, die sich nicht immer nach der gleichen Richtung entwickeln brauchen. In seinen Schlußfolgerungen unterscheidet Verf. zwischen zwei Phasen, von denen die erste nur von geringfügigen, die zweite dagegen von weitgehenden Veränderungen in der Zusammensetzung der Milch begleitet ist. Grundsätzlich sollte jede Milch, die während des Trockenstellens, also nach Unterbrechung der üblichen zwei Melkzeiten täglich gewonnen wird, vom Verkehr ausgeschlossen werden, da sie von einwandfreier Milch erheblich abweicht. me y.

Fritsch: Das Pferdeputzen mit Maschinen. (Zeitschrift für Vet.-Kunde 1927, Heft 1.)

Gesundheit der Haut und Gesundheit des ganzen Körpers stehen in engen Beziehungen zu einander. Die wichtigste Aufgabe der Haut ist die Wärmeregulierung des Körpers, ferner dient sie zur Schweiß- und Wasserabgabe, in geringer Menge auch neben den Lungen zur Kohlensäureabscheidung. Die Hauttätigkeit wird durch die Einwirkung von Luft und Sonne besonders günstig beeinflusst. Da die Haustiere, im Besonderen auch die Pferde, durch die Stallhaltung den natürlichen Verhältnissen mehr oder minder entzogen werden, muß die Haut eine besondere Pflege durch Waschen, Bäder, Massage, — beim Pferde auch durch

Putzen — erhalten. Regelmäßiges Bürsten und Reinigen der Haut ist ein sicheres Mittel gegen Hautkrankheiten durch tierische Schmarotzer. Statt Striegel und Kardätsche zu benutzen, sind in letzter Zeit häufig Putzapparate angerepriesen worden. Im allgemeinen lassen sich zwei Systeme unterscheiden. 1. Durch Elektromotor erzeugte Saugwirkung (Elektrolux und Protos), 2. Durch Elektromotor erzeugte Rotation der Putzbürste (Flex). Aus den Versuchen mit den verschiedenen Apparaten ergibt sich, daß die Saugapparate den Vorteil haben, daß beim Putzen die Stallluft nicht durch Staub verunreinigt wird, diese Apparate vermögen aber nur den oberflächlichen Staub abzusaugen. Die rotierende Bürste (Hauptner), die neuerdings als „Modell Flex“ angewendet wurde, putzt an allen Körperteilen gründlich und reinigt auch den Hautgrund vorzüglich (frottierend). Trotz der Schutzhaube wird aber Staub in die Luft gewirbelt, wodurch sowohl der Putzer belästigt als auch die Stallluft verunreinigt wird. Erwünscht wäre daher technisch die Lösung, daß die Wirkung der rotierenden Bürste und die Saugwirkung vereinigt und der Motor vom Rücken des putzenden Mannes getrennt würde. Falls das nicht möglich ist, so erscheint die Einrichtung besonderer Putzstände das Gegebene und es wäre zu erwägen, den entstehenden Putzstaub durch Ventilatoren abzusaugen, oder den hygienischen Schutz des Mannes auf andere Weise zu bewirken (anderweitiges Aufhängen des schweren „Flex“). Der Umfang der Versuche reicht noch nicht aus, ob die benutzten Apparate in einer größeren Pferdehaltung dauerhaft genug sind. A.—

Stang: Ist die Verfütterung von Soyabohnenschrot gefährlich? (T. R. 1927, S. 288.)

Verf. konnte feststellen, daß durch längere Fütterung mit Soyabohnenschrot, das mit Trichloräthylen entfettet war, eine Abnahme der weißen Blutkörperchen und der Neutrophilen eintrat. Diese Veränderungen im Blutbild bestanden fort noch lange nach Aufhören der Fütterung. Es wird also durch eine ins Blut übergehende Schädlichkeit die normale Bildung von neutrophilen Leukozyten im Knochenmark verhindert. Dadurch wird die Widerstandsfähigkeit des Körpers herabgesetzt. Der Stoff, der den krankhaften Zustand des Körpers verursacht, ist weder das Trichloräthylen, noch die Soyabohne allein, sondern er entsteht durch das Verfahren der Entfettung. Soyabohnen, die mit anderen Chemikalien entfettet sind, sind ungefährlich. Zurzeit wird Trichloräthylen in den Ölmühlen nicht mehr verwendet. Geiger.

Rdeff: Über den Kochsalz- und Eiweißgehalt des Serums von Schweinen bei Verfütterung von Fischmehl mit verschiedenem Kochsalzgehalt. (Aus dem Institut für Tierzucht an der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin. — Direktor: Professor Dr. Stang.) (Archiv f. wiss. Tierheilk. 1926, 55, S. 300.)

Bei Schweinen, die mit täglich je 200 Gramm Fischmehl von 10, 6 bzw. 4,4 Prozent Kochsalzgehalt gefüttert worden waren, konnten weder im Kochsalz- noch im Eiweißgehalt des Serums Unterschiede ermittelt werden. Geiger.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Friesleben: Das Vorkommen von Bazillen der Paratyphus-B-Gruppe im Darmkanal in gesunden Schlachtieren sowie in Ratten und Mäusen. (D. med. Woch. Nr. 38, 1927, S. 1589.)

Das Vorkommen von Bazillen der Paratyphusgruppe im Darmkanal gesunder Tiere (Rinder, Kälber, Hammel, Schweine, Hunde, Pferde, Ratten und Mäuse) ist zuerst von Uhlenhuth und seinen Mitarbeitern und vielen anderen Autoren festgestellt worden. Von großer praktischer Bedeutung ist die Beantwortung der Frage: Sind diese gefundenen Paratyphus-B-Bazillen zu den menschenpathogenen oder zu den menschenapathogenen zu zählen? Zur Klärung dieser wichtigen Frage wurden bei gesunden Schlacht-

tieren (100 Rindern, 100 Kälbern, 50 Hammeln, 100 Schweinen) Stuhluntersuchungen vorgenommen, ferner bei 100 wilden Ratten und bei 50 wilden Mäusen. Die sehr interessanten und sorgfältig durchgeführten Untersuchungen ergaben bei den Schlachtieren folgendes: Es können die Befunde von Uhlenhuth und seinen Mitarbeitern dahin bestätigt werden, daß sich im Stuhl gesunder Schlachttiere Bazillen finden, die nach ihrem Verhalten in der bunten Reihe als Paratyphus-B-Bazillen anzusprechen sind und die auch von bestimmten Paratyphus-B-Sera (zum Teil übergreifend) agglutiniert werden. Doch lassen sich diese Stämme nicht in die menschenpathogenen einreihen. Ganz anders ist aber das Ergebnis der Untersuchungen bei wilden Ratten und wilden Mäusen zu bewerten. Es ergab sich nämlich aus den Untersuchungen, daß bei grauen Mäusen in 52 Prozent, bei wilden Ratten in 19 Prozent Gärtner- oder Paratyphus-B-Stämme zu finden waren, die sich weder kulturell noch serologisch von den menschenpathogenen Stämmen trennen ließen, womit allerdings noch nicht gesagt sein soll, daß diese Stämme wirklich menschenpathogen sind. Solange wir jedoch keine Methoden besitzen, welche die Unschädlichkeit dieser Stämme zeigen, ist es notwendig, immer an die Möglichkeit einer Übertragung von Fleischvergifterbazillen durch Ratten und Mäuse zu denken.

Es ergibt sich aus diesen Untersuchungen, daß ein wichtiger Teil der Bekämpfung paratyphöser Erkrankungen in einer wirksamen Schädlingsvertilgung, einer durchgreifenden Vernichtung der Ratten und Mäuse bestehen muß. Schney.

Geflügelkrankheiten.

van Heelsbergen: Erfahrung bei der Untersuchung von Geflügelkrankheiten in den Niederlanden. (Aus dem Institut für Parasitäre- und Infektionskrankheiten der Reichsuniversität in Utrecht (Holland). Direktor: Prof. Dr. De Baeck.) (Tijdschrift voor Diergeneeskunde 1927, Deel 54, Aflevering 11, S. 516.)

4. Geflügelpest.

W. in R. kauft von einem Geflügelhändler 110 Hühner und stellt sie in einen Stall dicht beim Gehöft. Am nächsten Tage sind zehn und innerhalb einiger Tage sämtliche angekauften Tiere gestorben. Am Tage nach dem Kaufe treten unter den 300 eigenen Hühnern, die mit den gekauften in Berührung gekommen sind, Todesfälle auf, und nach drei bis vier Tagen sind auch diese 300 fast ausgestorben. Mit diesen Hühnern auf dem Gehöft kam der Besitzer gar nicht in Berührung. Deswegen versorgte er weitere 700 Hühner, die sich etwa 600 m entfernt auf einem ganz abgelegenen Gelände aufhielten. Dabei benutzte er stets besondere Röcke und Holzschuhe. Trotzdem brach etwa acht Tage später, also 13 Tage nach dem ersten Ankauf, auch unter diesem Bestande und weitere acht Tage darauf unter Hühnern, die auf einem anderen Teil des Geländes gehalten wurden, die Seuche aus. Fünf Tage, nachdem die ersten Fälle bei W. aufgetreten waren, erkrankten zunächst die Hühner eines Nachbarn, die von den W.'schen nur durch einen Graben getrennt waren, und später durch Personenverkehr auch diejenigen anderer Nachbarn. Die Krankheit wird also übertragen durch gegenseitige Berührung zwischen gesunden und kranken Tieren. Dies geschieht bereits innerhalb von 1—2 Tagen. Ferner wird sie übertragen durch Personen, Gegenstände usw. Der Ansteckungsstoff kann auch durch wild lebende Vögel (Sperlinge usw.) verschleppt werden. Auch muß bei der Verbreitung der Seuche das Grabenwasser berücksichtigt werden.

Das Virus der Geflügelpest ist ziemlich stark spezifisch für die Tierart. Enten und Tauben, die auf zahlreichen

Gehöften in nahe Berührung mit dem aussterbenden Hühnerbestande kommen, bleiben von der Seuche verschont, und die Hühnerküchlein zeigen sich sehr resistent gegen die spontane Krankheit. Arzneimittel helfen gegen die Krankheit nichts, ebensowenig bisher Sera und Impfstoffe. Auch die Impfung mit der mit Formalin behandelten Milz gestorbener Tiere kann nicht empfohlen werden. In einer Pestumgebung Masseneinspritzungen vorzunehmen, ist sehr riskant. Denn 0,000 001 cem Blut genügt bereits, um die Seuche von einem Tier auf das andere zu übertragen. Daher muß erst die bakteriologische Diagnose gesichert sein, bevor subkutane Injektionen zu Impfzwecken, also Impfungen gegen Geflügelcholera und gegen die Kleinsche Krankheit mit Serumvakzin evtl. Bakteriophag, vorgenommen werden dürfen. Steht die Diagnose Geflügelpest fest, so ist es am besten, sämtliche Hühner, gesunde wie kranke, zu töten, und gründliche Desinfektion sowie strenge Orts- und Gehöftsperr durchzuführen. Deswegen müssen in den Niederlanden die ansteckenden Geflügelkrankheiten in das Seuchengesetz aufgenommen werden.

Bass.

Standesangelegenheiten.

Neuregelung der Befoldung in den Freien Städten Hamburg und Bremen ab 1. Oktober 1927.

Hamburg und Bremen haben sich insofern der im Reiche, Preußen ufw. getroffenen Regelung nicht angeschlossen, daß sie bei dem alten System geblieben sind, jedoch alle Beamten einschl. derjenigen, welche nach Sondergehältern befördert wurden, in 25 bzw. 20 Gruppen (Laufbahnen) zusammengefaßt haben. In Hamburg werden einzig die Senatoren nach Sondergehalt bezahlt, die in Bremen in Gruppe 21 aufgeführt sind. Wohnungsgelder sind im Gehalt enthalten.

a) Hamburg.

Amtstierärzte, Abteilungsärzte, Bauräte, Regierungsräte, Staatsanwälte, Gewerberäte, Vermessungsräte ufw. sind eingestuft nach Gruppe 18 (Anfangsgehalt 6100 RM., Endgehalt nach 20 Jahren 11 000 RM.). Studienräte sind für sich nach Gruppe 19 behandelt, sie haben daselbe Anfangsgehalt wie die Beamten der Gruppe 18, erreichen jedoch in 24 Jahren ein Endgehalt von 11 500 RM., da bei diesen Beamten bedeutend weniger Beförderungsaussichten bestehen als bei denjenigen der Gruppe 18. Oberärzte, Oberbauräte, Obergewerberäte, Oberregierungsräte, Obertierärzte ufw. erhalten nach Gruppe 21 ein Anfangsgehalt von 8000 und nach 16 Jahren ein Endgehalt von 12 000 RM. Der Landestierarzt, Schlachthofdirektor (Nichttierarzt), Direktoren verschiedener Institute, Oberstaatsanwälte ufw. bilden die Gruppe 23 (10 000—15 000 RM.).

b) Bremen.

Ärzte, Bauräte, Gewerberäte, Regierungsräte, Richter, Staatsanwälte, Staatschemiker, Vermessungsräte, Veterinärärzte ufw. beziehen in Gruppe 15 ein Anfangsgehalt von 6000 und nach 20 Jahren ein Endgehalt von 10 500 RM. Studienräte in Gruppe 16 daselbe Anfangsgehalt, jedoch nach 24 Jahren ein Schlußgehalt von 11 000 RM. Die Direktoren der Tierärztl. Abteilung des Beschauamts Bremen und des Beschauamts Bremerhaven sowie Oberveterinärärzte sind mit den Oberärzten, Oberbauräten, Oberregierungsräten ufw. in Gruppe 17 untergebracht (Anfangsgehalt 7500 RM., Endgehalt nach 16 Jahren 11 500 RM.). Die Direktoren der mittleren Betriebe sind nach Gruppe 18 und diejenigen der größten Betriebe, darunter der Schlachthofdirektor, nach Gruppe 19 befördert (9700—13 950 RM.).

Verschiedene Mitteilungen.

Rektoratsübergabe an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

17. Januar 1928.

Die Feier des Überganges der Rektorwürde von Prof. Dr. Oppermann auf Prof. Dr. Mießner gestaltete sich zu einem Festakt von besonderer Bedeutung. Die Aula vermochte die große Zahl der erschienenen Ehrengäste kaum zu fassen. Es waren anwesend als Vertreter des Landwirtschaftsministeriums Ministerialrat Dr. Wiemann, der Kurator der Hochschule Oberpräsident Noske, die Rektoren der

Landesuniversität Göttingen, der Technischen Hochschule Hannover, der Bergakademie Clausthal, Landesältester Dr. von Websky, Präsident der D.L.G., Generalstabsveterinär Dr. Pätz, Prof. Dr. Nöller-Berlin, Prof. Dr. Eber-Leipzig, Oberregierungsrat Dr. Ochmke-Braunschweig, Landestierarzt Dr. Elsässer-Bremen, Tierarzt Friebe, Dr. Machens sowie zahlreiche Vertreter der Reichswehr, der Landwirtschaft, des Handels, der Industrie und viele Tierärzte aus Nah und Fern. Von den Verwandten Dammanns waren erschienen der älteste Sohn akad. Bildhauer Hans Dammann, der Schöpfer des Denkmals, nebst Frau Gemahlin sowie die Tochter, Frau Geheimrat Poten mit Familie. Leider war Ministerialdirektor Dr. Dammann infolge Dienstgeschäfte am Erscheinen verhindert.

An den Ehrendoktor der Hochschule, den Herrn Reichspräsidenten, Generalfeldmarschall von Hindenburg, wurde ein Ergebnistelegamm gefandt.

Nach Begrüßung der erschienenen Gäste gab der scheidende Rektor, Prof. Dr. Oppermann, einen kurzen Bericht über die abgelaufene VI. Rektoratsperiode. Im Dozentenkollegium machten sich einige Neubereufungen notwendig. Es traten neu ein: Prof. Dr. Trautmann und Dr. Lund. Veterinärarzt Dr. Hupka und Privatdozent Dr. Henkels wurden zu a. o. Professoren ernannt. Zu Ehrendoktoren der Veterinärmedizin wurden ernannt: Staatsminister Steiger, Ministerialdirigent Müssmeier vom preuß. Landwirtschaftsministerium, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Schlossmann-Düsseldorf und Prof. Koch-Berlin. Die Ehrenbürgerwürde wurde verliehen an Prof. Dr. Paechter-München, Oberbürgermeister Dr. Menge, Generaldirektor Platz, Landwirtschaftskammerpräsident von Reden-Reden, Syndikus Dr. Finkenwirth-Hannover, Tierarzt Dr. Becker-Bevenfen, Präsident Bum und Direktor Wehrle vom Reichsgesundheitsamt. Der Rektor überbrachte im April 1926 dem Ehrendoktor und Ehrenbürger der Hochschule, dem Herrn Reichspräsidenten das goldene Ehrenbürgerabzeichen. Auch in den letzten beiden Jahren wies die Hochschule von allen tierärztlichen Bildungsanstalten Deutschlands die höchste Befuchsziffer auf. Die verschiedenen Fortbildungskurse für prakt. Tierärzte waren gut besucht. Nachdem ein großzügiger Plan für die bauliche Aufteilung des neu erworbenen, südlich der Hochschule am Bischofsholer Damm gelegenen Geländes aufgestellt worden ist, wird in diesem Frühjahr mit dem Bau der geburts-hilfflichen und buiatrischen Klinik und dem Neubau des Physiologischen Instituts begonnen werden. Die Gesellschaft der Freunde der Hochschule zählt über 600 Mitglieder; sie stellte der Hochschule größere Mittel für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung. Als besonders erfreulich ist die Erwerbung des in der Nähe Lüneburgs gelegenen, etwa 800 Morgen großen Hochschullehrgutes Adendorf zu verzeichnen, das praktischen Unterrichtskursen dienen soll. Mit lebhaftem Danke an die Staatsregierung, an das Kollegium, die Beamten und Angestellten der Hochschule schloß der Redner und überreichte mit den besten Wünschen die Insignien der Rektorwürde dem neugewählten Rektor.

Der neue Rektor, Prof. Dr. Mießner, übernimmt das Amt und dankt für die ihm zuteil gewordene Ehrung durch Wiederwahl nach einem Biennium zum Jubiläumsrektor. Die Hochschule feiert bekanntlich am 13. bis 15. Juni 1928 das Fest ihres 150jährigen Bestehens. Sodann spricht er seinem verehrten Vorgänger den Dank der Hochschule für die bisherige Führung der Rektoratsgeschäfte aus, insbesondere dafür, daß es ihm gelungen ist, die Hochschule um das Lehrgut Adendorf zu erweitern. Der Vortragende berichtet bei Ausführung seiner nun folgenden Rektoratsrede: „Ziele der Lehre und Forschung an den tierärztlichen Bildungsanstalten“ über die gewaltigen Fortschritte, die die Veterinärmedizin in den letzten Jahrzehnten gemacht. Er kommt dabei u. a. auf die wirtschaftliche Bedeutung der von dem deutschen Tierarzt Lorenz. geschaffenen Simultanimpfung gegen den Rotlauf der Schweine, die unserem Nationalvermögen jährlich Millionen erhält. Die Bekämpfung der Tollwut der Hunde, die auch im Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule mit Erfolg durchgeführt ist, die Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche und der Schweinepest sind in neue Bahnen geleitet. Der früher so gefürchtete Rotz der Pferde ist durch neuere diagnostische Verfahren völlig ausgerottet, die Brustseuche der Pferde ist durch die glänzenden Erfolge der Chemotherapie eine unbekannte Krankheit geworden. Trotzdem bleibt noch viel zu tun. Der baldige Ausbau des vor zwei Jahren erworbenen neuen Geländes ist dringend erforderlich zur Errichtung einer buiatrischen Klinik,

eines Instituts für Nahrungsmittelkunde, für veterinärmedizinische Parasitologie und für Physiologie. Neben den gynäkologischen Fächern muß die Parasitologie mit Rücksicht auf ihre Bedeutung bei unseren Haustieren auf breitere Basis gestellt werden. Ihr sind die Bienen- und Fischkrankheiten anzugliedern. Ein besonderes Ordinariat ist hierfür ebenso unentbehrlich, wie für die Lebensmittelkunde. Diese Disziplin hat sich heute derart erweitert und eine so große Bedeutung für die Gefunderhaltung der Menschen gewonnen, daß sie nicht wie bisher als Nebenfach, sondern als Hauptfach mit einem eigenen Ordinariat und Institut vertreten sein muß. Die Erforschung und Bekämpfung der heute im Vordergrund des Interesses stehenden Geflügelkrankheiten ist vom Hygienischen Institut mit aller Energie aufgenommen. Eine Erweiterung des Hygienischen Instituts, das seit Jahren infolge Zunahme der Arbeitsgebiete viel zu klein geworden ist, hat sich als notwendig erwiesen. Die Schaffung einer besonderen Untersuchungsstelle zum Nachweis von Futterschädlichkeiten und -verfälschungen liegt im dringendsten Interesse der Landwirtschaft, um unsere Tierbestände vor minderwertigen und schädlichen Futtermitteln zu schützen. Zur Ertüchtigung und körperlichen Ausbildung unserer Jugend ist der Bau einer Turnhalle nicht länger zu entbehren. Redner schließt mit dem Wunsche, daß der Staat, der bisher stets in entgegenkommender Weise die Belange der Tierärztlichen Hochschule gefördert hat, sich auch den gegenwärtigen Wünschen nicht verschließen und zu ihrer baldigen Erfüllung die Mittel in absehbarer Zeit zur Verfügung stellen möge.

Den Schluß der würdig verlaufenen Feier bildete die Weihe der Büste des Geh.-Rats Dammann, des letzten Direktors der Hochschule. Die Büste wurde vom Bildhauer Hans Dammann, Berlin, angefertigt. Prof. Dr. Oppermann hob in seiner Weiherede die großen Verdienste Dammann's um die Hochschule, die Wissenschaft und den tierärztlichen Stand hervor und dankte allen denen, die durch freiwillige Spenden die Aufstellung der Büste ermöglicht hatten.

Akademische Nachrichten.

Der Direktor des Landesinstituts für Bienenforschung und bienenwirtschaftliche Betriebslehre in Celle, Prof. Dr. Koch, ist vom Herrn Minister für Landw., Dom. u. Forsten als Honorarprofessor für Bienenkunde und Bienenkrankheiten an der Tierärztlichen Hochschule Hannover vom Sommersemester 1928 ab zugelassen worden.

Dem langjährigen Oberassistenten am Hygienischen Institut, Dr. med. vet. Baars, ist vom 1. Februar 1928 ab die kommissarische Verwaltung der Veterinärarbeitsstelle 2 des Stadtkreises Stettin mit dem Amtssitz in Stettin sowie die mit dieser Stelle verbundene nebenamtliche Leitung der Auslandsfleischbeschau in Stettin übertragen worden.

Professor Dr. Wilhelm Ernst-München sowie Prof. Dr. Walter Frei-Zürich wurden von der Wiener Gesellschaft für Mikrobiologie in Anerkennung ihrer großen Verdienste um die Mikrobiologie zu korrespondierenden Mitgliedern ernannt.

Prof. Dr. Wilhelm Knell †.

Am 24. Dezember 1927 verstarb infolge einer Berufsinfektion der Oberveterinärarzt Prof. Dr. med. vet. Wilhelm Knell im 51. Lebensjahre nach einem arbeitsreichen Leben. Er erwarb sich 1893 das Reifezeugnis des Realgymnasiums zu Mainz, legte 1895 die Vorprüfung in Gießen, 1897 die tierärztliche Prüfung in Berlin ab, war 1898 Assistent bei Prof. Lorenz in Darmstadt und 1900/1901 Assistent und Profektor am anatomischen Institut der tierärztlichen Hochschule in Berlin. Im Herbst 1901 trat er als Kreisveterinärarzt von Mainz in den Hessischen Staatsdienst und verwaltete seit Januar 1905 das Kreisveterinäramt Bingen mit dem Amtssitz in Gau-Algesheim. Im Jahre 1907 wurde ihm an der Hessischen Landes-Universität in Gießen ein Lehrauftrag für Poliklinik und Veterinärpolizei übertragen, nachdem er gleichzeitig von der Regierung zum Kreisveterinärarzt des Kreises Gießen ernannt worden war. Zu diesem Lehrauftrag kam in den folgenden Jahren noch Geburtshilfe hinzu und seit Erlass der Prüfungsordnung vom 24. Dezember 1912 in Gemeinschaft mit dem Ordinarius für Tierzucht der Unterricht in praktisch-züchterischen Kursen und Beurteilungslehre. Seine ausgezeichnete Lehrtätigkeit wurde am 22. November 1916 von der Regierung durch Verleihung des Charakters als „Professor“ anerkannt. Den Krieg hat er als Stabsveterinär von Anfang bis zu Ende teils bei Fronttruppen, teils als Leiter eines Pferde-

lazarets mitgemacht und das EK I erworben. Sein heiß ersehntes Ziel war die Errichtung einer geburtshilflichen Klinik und die Schaffung einer Professur für Geburtshilfe und Poliklinik. Im Jahre 1927 war es Rektor und Fakultät endlich gelungen, dieses Ziel zu erreichen. Die Klinik wächst empor und die Professur stand in naher Aussicht. Da hat ihn ein tragisches Geschick um den Erfolg seiner Arbeit gebracht. Wilhelm Knell befaß eine starke Rednergabe und verstand es, getragen von idealer Auffassung des Lehrberufs, in seltener Weise den Lehrstoff interessant zu gestalten und klar darzustellen. Er war eine gerade Natur von vornehmster Gefinnung, eine gewinnende Persönlichkeit von nicht gewöhnlicher allgemeiner Bildung, weitem Blick und klarer Erkenntnis für das Erreichbare und praktisch Wesentliche, zudem von großer Herzensgüte für seine Schüler. Ein besonderes Verdienst hat er sich durch seine fruchtbare praktische Arbeit auf dem Gebiete der Tierzucht erworben und sich namentlich für die Erhaltung des einheimischen Vogelsberger Viehs mit ganzer Kraft eingesetzt. Die Trauerfeier an seiner Bahre legte umfassendes Zeugnis von der Wertschätzung und Beliebtheit ab, die er sich erworben hatte. Rektor und Dekan hoben seine Verdienste um die Universität und Fakultät hervor, Ministerialdirektor Dr. Spamer legte im Auftrage des Ministeriums mit warmen Worten der Anerkennung für seine kreisveterinärärztliche Tätigkeit einen Kranz an seiner Bahre nieder und zahlreiche Ansprachen der Stadtverwaltung, der Studentenschaft, des Deutschen Veterinärates, tierärztlicher, landwirtschaftlicher, Krieger- und anderer Vereine zeugten von der Wertschätzung des Verstorbenen. Dr. Pfeiffer.

Große Landwirtschaftliche Woche Berlin 1928.

29. Januar bis 4. Februar 1928.

Pferde- und Rinderzucht-Abt., Donnerstag, den 2. Februar 1928, 9 Uhr. Beethovensaal, Köthener Straße 32. Gustav Rau: „Betrachtungen über die französische Pferdezucht auf Grund einer Studienreise“. Prof. Dr. Stang: „Neuzeitliche Ansichten über Inzucht“. Schafzucht-Abt., Donnerstag, den 2. Februar 1928, 13 Uhr. Meistersaal, Köthener Straße 38. Tierzuchtdirektor Braun: „Bericht über meine Studienreise nach England“. Dr. v. Falck, Prof. Dr. Golf, Prof. Dr. Frölich: „Was lehrt die Schafleistungsprüfung der letzten Wanderausstellung?“ Tierzucht- und Schweinezucht-Abt., Freitag, den 3. Februar 1928, 12 Uhr. Beethovensaal, Köthener Straße 32. Prof. Dr. Henseler: „Bilder aus der Tierzucht von Australien und Neuseeland“. (Mit Lichtbildern.) Dr. Frhr. v. Patow: „Der V. internationale Kongreß für Vererbungswissenschaft im September 1927 in Berlin und die deutsche Tierzucht“. Direktor Müller: „Die Beziehungen zwischen Schweinezucht und Schweinefleisch“.

Verein Thüringer Tierärzte.

104. Versammlung am Sonntag, den 29. Januar 1928 V. 8,30 Uhr s. s. t. auf dem Schlachthofe in Erfurt (Schlachthof-Restaurant). 1. Aufnahme neuer Mitglieder. 2. Ergänzungswahlen zum Vorstande.

Dr. Amelung, Stellv. Vorf. Dr. Loeb, Schriftf.

Tierärztekammer Brandenburg-Berlin.

Anträge für die nächste Vollkammer Sitzung erbitten wir bis zum 1. Februar 1928.

Berlin-Büch, den 11. Januar 1928.

I. A.: Kunibert Müller.

17. Fortbildungskursus des D.V.R.

4. und 5. Februar in Dortmund.

Es werden sprechen die Herren: Prof. Dr. Neumann-Berlin, über „Ausgewählte Gerichtliche Fälle“. Prof. Dr. Mießner-Hannover, über: „Geflügelkrankheiten“. Veterinärarzt Dr. Brügge-mann-Altona, über: „Tierärztlicher Berufsstand und Staat“. Direktor Dr. Sachweh-Münster, über: „Euterkrankheiten“. Veterinärarzt Dr. Bautz-Arnsberg, über: „Ambulatorische Fleischschau und Ergänzungsbeschau“. Prof. Dr. Götze-Hannover, über: Bujatrik und Geburtshilfe (mit Demonstrationen). Näheres über Ort und Zeit der Vorträge wird noch bekannt gegeben.

Gleichzeitig weise ich darauf hin, daß am 25. und 26. Februar 1928 ein Fortbildungskursus an der Tierärztlichen Hochschule Hannover stattfindet, dessen Tagesordnung noch veröffentlicht wird. Stang.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Ausperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezüher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 4.

Ausgegeben am 28. Januar 1928.

36. Jahrgang.

Bericht über die Fachtierärztetagung zur Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten in Jena vom 1. bis 4. Oktober 1927. *)

Zusammengestellt von Dr. R. Wetzel, Hannover.

Die Tagung fand im Hörfaal des Mineralogischen Institutes der Universität Jena statt. Über 100 Teilnehmer aus allen Teilen des Reiches, aus dem befreundeten Österreich und Ungarn sowie aus der Tschechoslowakei und Rußland haben sich in nachstehende Anwesenheitsliste eingetragen:

Aehle-Jena; Albrecht-Frankfurt (Main); Amelung-Weimar; Baars-Hannover; Bässmann-Berlin (D.L.G.); Becker-Kahla; Beller-Berlin; B. Bohl-Kafan; C. Bohl-Kafan; Cornelius-Eisenach; Damm-Perleberg; Detre-Budapest; Dießing-Beberbeck; Dietrichs-Neuhaldensleben; Drefcher-München; Ehrlich-Hannover; Eickmann-Bonn; Fischer-Oberursfel; Geiger-Eystrup; Geldfietzer-Landsberg; Götze-Hannover; Haag-Königshofen; Hehn-Junisroda; Heinke-Kiel; Hetzel-Budapest; Hay-Pyritz; Hobstetter-Jena; Hochmüller-Wien; Hofmann-Dessau; Hopfengärtner-München; Hueber-Halle; Jahn-Weimar; Jüterbock-Schönberg; Kanicke-Witterba; Keiser-Berlin (Preuß. Hauptlandwirtschaftskammer); Kern-Dresden; Klingner-Stadtroda; Knauer-Königsberg (Preuß.); Knell-Gießen; Köhler-Aussig; Kranich-Darmstadt; Laue-Lübben; Lehmknecht-Emmerich; Lenz-Berlin; Loer-Vieselbach; Lührs-Oldenburg; Lütje-Stade; Meyer-Altefeld; Miesfeld-Jena; Mießner-Hannover; Müller-Petersberg; Michalka-Wien; Neumüller-Jena; Nörr-Gießen; v. Ostertag-Stuttgart; Otto-Ruhlsdorf; Pfeiler-Jena; Pirker-Villach; Poppe-Rostock; Pröger-Jena; Präscholdt-Züllchow-Stettin; Raebiger-Halle; Richter-Leipzig; Richters-Berlin (Reichswehrministerium); Römer-Halle-Cröllwitz (Lehr- und Versuchsanstalt für Geflügelzucht); Roskopf-Gießen; Rudolf-Wien; Sachweh-Münster; v. Sarnowski-Rellehaufen; Schaaf-Hochheim; Schale-Witzenhausen; Scheffler-?; Schermer-Göttingen; Scheuer-Camburg; Schlegel-Freiburg; Schmidt-Leipzig; Schotte-Weimar; Schreiber-Landsberg; Schubarth-Berlin; Schubert-Radstadt; Schumann-Breslau; Schultze-Altenburg; Schwerdtfeger-Trakehnen; Scillardfy-Budapest; Sillig-Arnstadt; Sollemann-Jauer; Spiegl-Halle; Spierling-Berlin; Stephan-Höchst; Szasz-Budapest; Vogel-München (D.L.G.); Wagner-Graditz; Wächter-Rudolstadt; Weber-Leipzig; Weichlein-Prenzlau; Weiße-Münster; Wetzel-

Hannover; Wiemann-Berlin; Wittig-Jena; Wohler-Oldenburg; Zeh-Eilenburg; Zeller-Berlin (R.G.A.); Ziegler-Dresden; Zimmermann-Königsberg.

1. Oktober 1927.

Mießner-Hannover eröffnet die Tagung und heißt die Anwesenden, insbesondere die Vertreter des Reiches und der Länder sowie des Auslandes herzlich willkommen. Zur besonderen Freude gereicht es ihm auch Vertreter der praktischen Tierärzte und der Landwirtschaft (Reichslandwirtschaftsrat, D.L.G., Preuß. Hauptlandwirtschaftskammer, Thüringische Landwirtschaftskammer) begrüßen zu können.

Den Vorsitz führen:

Vogel, v. Ostertag, Schmidt, Knell, Hetzel.

Über die Organisation der Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten im Freistaate Thüringen.

Von Ministerialrat Dr. Schotte, Weimar.

Nachdem die vom Thüringischen Staatsministerium auf Vorstellung des damaligen Verbandes der landwirtschaftlichen Berufsvertretungen Thüringens die zur Durchführung der Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten benötigten Mittel beim Landtag beantragt und bewilligt worden waren, wurde mit der Organisation des Bekämpfungsverfahrens begonnen. Ihren Mittelpunkt bildet die Sterilitätsabteilung der Veterinäranstalt Jena. Im Interesse eines planmäßigen, möglichst einheitlichen Vorgehens sind vom Ministerium für Wirtschaft und Inneres im Einvernehmen mit den führenden landwirtschaftlichen Verbänden und des Thüringischen Tierärzterverbandes Richtlinien ausgegeben worden. Zwecks Einführung des Verfahrens fanden zunächst Besprechungen der Regierungsveterinärärzte mit den Tierärzten ihres Amtsbereiches statt. Dann begann die Aufklärungs- und Werbetätigkeit in den von der Unfruchtbarkeit betroffenen Gemeinden, um die Tierbesitzer aufzufordern, ihren Rindviehbestand dem Verfahren zu unterstellen. Wer seinen Rindviehbestand dem Verfahren anschließen will, hat einen Tierarzt mit der Durchführung der Untersuchungen zu beauftragen. Das Verfahren soll mindestens 1 Jahr lang vom Tage des Anschlusses zur Durchführung kommen. Der beauftragte Tierarzt hat innerhalb vier Wochen dem zuständigen Regierungsveterinärarzt die Zahl

*) Der ausführliche Verhandlungsbericht erscheint demnächst bei M. & H. Schaper, Hannover, in Buchform.

der in dem betreffenden Bestande vorhandenen $1\frac{1}{2}$ Jahre und darüber alten Tiere mitzuteilen. Nach Abschluß der im Sinne der Richtlinien ausgeführten Behandlung ist der Bestand vom Tierarzt im Jahre mindestens einmal zu besichtigen und der Besitzer in allen einschlägigen Fragen zu beraten. Blut und Ausscheidungsprobe hat der Tierarzt gegebenenfalls an die Sterilitätsabteilung zu Jena zur Untersuchung einzufenden. Bis spätestens zum 15. April j. Js. ist dem zuständigen Regierungsveterinär rat nach einem vorgeschriebenen Muster ein Bericht über jeden angefallenen Bestand vom Tierarzt einzureichen. Die Regierungsveterinär räte fertigen einen Gesamtbericht für ihren Amtsbezirk und reichen ihn bis zum 15. Mai jeden Jahres bei der Sterilitätsabteilung Jena ein. Diese hat einen Gesamtbericht für das ganze Land aufzustellen und bis zum 15. Juli dem Ministerium zu übersenden. Gleichzeitig ist auch dem Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule als der Reichszentrale für die Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten ein Gesamtbericht zur Verfügung zu stellen. Die Regierungsveterinär räte haben die beauftragten Tierärzte ihres Amtsbezirkes in der Regel zweimal im Jahre zu gemeinsamen Besprechungen zusammenzurufen.

Die Sterilitätsabteilung hat das Verfahren durch Veröffentlichung in geeigneten Zeitungen und durch Halten von Vorträgen in den Kreisen der Landwirte zu fördern. Bei Einfendungen teilt die Sterilitätsabteilung dem Tierarzt das Untersuchungsergebnis mit und gibt ihm das zweckmäßigste Bekämpfungsverfahren an. Ferner hat die Sterilitätsabteilung die im gegebenen Falle erforderlichen Impfstoffe nach Möglichkeit verbilligt zur Verwendung in den angefallenen Beständen an die Tierärzte zu liefern, die zur Erfassung der Proben erforderlichen Röhrchen usw. auf Erfuchen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Weiter muß sie bestrebt sein, die Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, soweit nötig, zu verbessern. Auch sind die Tierärzte im Falle des Bedürfnisses durch Abhaltung von Vorbereitungskursen in die neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden kostenlos einzuführen, und ist ihnen, soweit erforderlich und im Rahmen der verfügbaren Staatsmittel zugänglich, bei Durchführung des Verfahrens ein Assistent der Sterilitätsabteilung zur Verfügung zu stellen.

Im übrigen hat das Ministerium für Inneres und Wirtschaft in Anbetracht der hohen Bedeutung die der Bekämpfung der Unfruchtbarkeit des Rindes und der ansteckenden Kälberkrankheiten für die Allgemeinheit zukommt durch das Ministerium für Volksbildung und Justiz veranlaßt, daß das Wesen, die Ursachen und die Bekämpfung dieser Krankheiten zum Gegenstand des Unterrichts in den landwirtschaftlichen Schulen und den landwirtschaftlichen Berufspflichtschulen gemacht wird.

Die geschilderten Maßnahmen des Ministeriums haben sich als zweckmäßig erwiesen und das Bekämpfungsverfahren hat an der Zahl der Rinder gemessen von Jahr zu Jahr an Ausdehnung gewonnen. Neuerdings ist die Sterilitätsabteilung in Jena dazu übergegangen, die interessierten Tierärzte zu der Untersuchung und Behandlung kranker Bestände durch den Fachtierarzt der Sterilitätsabteilung heranzuziehen und hierbei die Tierärzte namentlich auch in der Behandlungsmethodik zu unterweisen. Diese Einrichtung scheint sich zu bewähren.

4. Sammelbericht der Zentrale für die Zeit vom 1. April 1926 bis 31. März 1927.

Von Prof. Dr. H. Mießner, Hannover.

Als Unterlagen für den vorliegenden Sammelbericht dienten der Zentrale 28 z. T. sehr ausführliche und wertvolle Berichte, für die den einzelnen Dienststellen besonderer Dank gebührt.

I. Pferd.

Die bestehenden ungünstigen wirtschaftlichen Verhält-

nisse, die fehlende Zollsperre, die geringen Preise für Fohlen haben die Rentabilität der deutschen Pferdezucht in der Berichtszeit noch mehr herabgemindert als in den vorhergehenden Jahren. Nach Lütje sind kaum 25 Prozent der zuchtfähigen Stuten gedeckt worden. Demzufolge ist auch das Interesse der Züchter für die Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten immer geringer geworden. Man benutzt nur solche Tiere zur Zucht, mit denen man nie Schwierigkeiten hatte.

Sterilität: Die Zahl der unterfuchten bzw. behandelten Stuten ist auf 670 gesunken. Als Sterilitätsursachen werden in den Berichten fast durchweg Gebärmutteraffektionen angegeben. So mußte z. B. das Kammerinstitut Breslau bei 85,5 Prozent der behandelten Stuten Uterusinfusionen vornehmen. Schwerdtfeger-Trakehnen erwähnt, daß nach dem sog. „Blubbern“, ein bei alten Stuten durch Erschlaffung des Genitaltraktes oder bei jungen Tieren bei Scheidenverletzungen bedingtes Ein- und Ausreten von Luft in die Vagina, häufig Gebärmutterkatarrhe auftreten. Erkrankungen der Ovarien und Eileiter sind als Sterilitätsursache überhaupt nicht erwähnt.

Für die Behandlung nicht rossender bzw. umrossender Stuten mit Endometritis haben sich Spülungen mit physiologischer Kochsalzlösung oder Kolapo von 37 Grad C sehr bewährt. Schwerdtfeger-Trakehnen behandelte Uteruskatarrhe infolge Zurückbleibens der Nachgeburt mit Introcid und E. 104. Die sich an das „Blubbern“ anschließenden Uteruskatarrhe sind meist nicht heilbar, da das primäre Leiden nicht oder nur selten abzustellen ist. Stuten mit normalem Befund an den Geschlechtsorganen wurden mit heißen Zervixduschen mit physiologischer Kochsalzlösung behandelt. Innerlich verabreichte man Tinct. cantharid. Das Kammerinstitut Königsberg hat durch ein Merkblatt die Züchter darauf hingewiesen, daß nur einwandfrei gesunde Stuten zum Deckhengst geführt werden dürfen.

Die angegebenen Durchschnitts-Heilerfolge schwankten zwischen 30,4 (Kammerinstitut Breslau) und 63 Prozent (Kammerinstitut Züllchow-Stettin). Das Kammerinstitut Breslau erreichte bei Endometritis mit Spülungen mit physiologischer NaCl-Lösung in 42,8 Prozent, mit physiologischer NaCl-Lösung und Kolapo in 20 Prozent und mit Kolapo allein in 15,3 Prozent der Fälle eine Heilung.

Abortus: Von allen Stellen wird über ein merkliches Zurückgehen des Verfohlens, insbesondere des feuchtenhaften Abortus, berichtet. Das letztere ist sicher darauf zurückzuführen, daß mit dem Zurückgehen der Zahl der Bedeckungen der Stuten die Möglichkeit der Ansteckung und Verbreitung der Seuche stark vermindert wird. Zur Abnahme der Fehlgeburten dürfte auch nach Lütje die bessere Haltung und erhöhte Sorgfalt, die dem Einzeltier zuteil werden, beitragen. Während nach den früheren Berichten die Paratyphusabortusinfektion etwa 45 Prozent aller Fälle ausmachten, wurde der Erreger in der Berichtszeit von fünf Instituten bei 103 Untersuchungen nur in 13 = 12,6 Prozent der Fälle ermittelt. Den vereinzelt Koliaborten ist ebenso wie den singulär auftretenden Pyoseptikum- und Diplokokkenaborten keine große Bedeutung beizumessen. Die abakteriellen Aborte machen 66 Prozent aller Fälle aus. Sie häufen sich im zweiten Drittel der Trächtigkeit und werden bekanntlich durch übermäßige Anstrengung der trächtigen Stuten während der Erntemonate und der Herbstbestellung ausgelöst. — Das Kammerinstitut Königsberg unterfuchte in der Berichtszeit das Ejakulat von 35 Deckhengsten z. T. mehrereremals. Doch konnten in keinem Falle Paratyphus-Bakterien oder Streptokokken ermittelt werden, obwohl in der betreffenden Gegend durch die Erreger bedingte Fälle von Abortus und Fohlenkrankheiten feuchtenhaft auftraten. — Bei strenger Durchführung hygienischer Maßnahmen (Abfohlboxen) gelang es, das feuchtenhafte Verwerfen nach mehrmaliger Impfung mit

Vakzine, am besten stallspezifischer, in den meisten Beständen zu tilgen.

Fohlenkrankheiten: Die Ätiologie der Fohlenkrankheiten ist unverändert. Es entfallen 20,6 Prozent der Fälle auf *Diplokokken*, 20,3 Prozent auf das *Bact. pyosepticum*, 13,5 Prozent auf *Bact. coli*, und 7,3 Prozent auf *Paratyphus*. Die meisten Pyoseptikuminfektionen ereignen sich innerhalb der ersten fünf Lebensstage. Von vielen Stellen wird aktive Immunisierung der Muttertiere propagiert. Die Neugeborenen werden dann sofort nach der Geburt ebenfalls mit Serum resp. mit Vakzine behandelt. Über die Mutterblutimpfung sind die Meinungen recht geteilt. Ebenso herrscht noch keine völlige Klarheit über die Frage der intra- oder extrauterinen Infektion der Fohlen. Hier sollten entschieden die Gestüte mehr mitarbeiten; denn nur durch sie und bei ihrem sorgfältig überwachten Material ist eine Lösung der Frage möglich.

II. Rind.

Sterilität: Die Notwendigkeit der planmäßigen Bekämpfung der Sterilität wird erfreulicherweise immer mehr von den Züchtern erkannt. Dies findet vor allem in den zahlreichen Neuanfchlüssen an die in den einzelnen Ländern und Provinzen bestehenden Bekämpfungsverfahren Ausdruck. Insgesamt wurden von 16 Instituten 91018 Tiere untersucht bzw. behandelt; das ist ein Mehr von rund 30 000 Stück gegenüber dem vorhergehenden Berichtsjahre. Bei der Bewertung dieser Zahl muß man aber noch bedenken, daß sie eben nur die von den einzelnen Instituten nicht aber die durch die große Zahl der praktischen Tierärzte untersuchten bzw. behandelten Tiere umfaßt.

Als Ursachen der Sterilität stehen nach den Angaben der meisten Berichte die Uterusaaffektionen an der Spitze. Dies ist besonders hervorzuheben, weil man in den vorhergehenden Berichten im Gegensatz zum Pferde beim Rind die Mehrzahl der Fälle von Unfruchtbarkeit auf Veränderungen an den Eierstöcken zurückführte. Die Angabe über die Erkrankungen des Uterus als Sterilitätsursache schwanken zwischen 35,8 und 73,5 Prozent. Für die Diagnose Endometritis gibt nach den Erfahrungen von Götze-Hannover die rektale Untersuchung, abgesehen bei produktiven Veränderungen der Gebärmutter, wie Verhärtung, Vergrößerung, Asymmetrien der Hörner, selten ganz bestimmte Anhaltspunkte. Der Hauptwert muß auf den vaginalen Befund und die Sekretprüfung gelegt werden. Zur Untersuchung der Portio empfiehlt Götze das lange Scheiden-spekulum von Polansky, mit dem man die unberührte Portio und das Orificium externum voll sichtbar machen kann. Bei der manuellen Untersuchung und dem Hervorziehen der Zervix nach Albrecht'sen entstehen oft Rötungen und Sugillationen, die geeignet sind, das Bild zu trüben. Die untersuchende Hand ist bei Sterilitätsuntersuchungen nur mit warmem klarem Wasser anzufeuchten. Wird Öl verwendet, bildet sich mit dem unter Umständen ganz normalen glasig-klaren Genitalsekret eine Emulsion, die dann oft irrtümlicherweise für eitrigen Ausfluß gehalten wird. Erkrankungen der Ovarien als Sterilitätsursache werden durchschnittlich in 30 Prozent der Fälle angegeben. Dabei überwiegen die Corpora lutea persistencia beträchtlich die Zahl der Eierstockzysten. Bei der Beurteilung der Corpora lutea als Sterilitätsursache muß Vorsicht geübt werden.

Der infektiöse Scheidenkatarrh wurde häufig gesehen, ein ursächlicher Zusammenhang mit der gleichzeitig bestehenden Sterilität mußte aber meistens verneint werden. Durch die von Laien oft vorgenommene unsinnige Behandlung des ansteckenden Scheidenkatarrhs mit ätzenden Mitteln wurden oft Scheidenstenosen verursacht. Gelegentlich wurden auch schlecht verheilte Dammrisse bzw. Kloakenbildung und Urovagina als Sterilitätsursache gefunden.

Eileitererkrankungen werden nur ganz ver-

einzelnt als Sterilitätsursache angeführt. Da die mit Genitaltuberkulose behafteten Tiere ausgemerzt werden, wird der Prozentsatz in den dem Sterilitätsbekämpfungsverfahren angeschlossenen Beständen jährlich geringer.

Weiter können nach den Beobachtungen einzelner Institute rein konditionelle Einflüsse, wie Über- und Unterernährung, Sterilität bedingen. Nach dem Bericht von Götze-Hannover konnte für die Inzucht als Sterilitätsursache im Kreise Emden kein Beweis erbracht werden. Größer scheint dagegen die Gefahr, das Störung der Fruchtbarkeit durch die Überzüchtung herbeigeführt werden.

In manchen Fällen (Kammerinstitut Hannover, Veterinäranstalt Jena) wurde auch der Bulle als Ursache der Unfruchtbarkeit festgestellt.

Die Behandlung der Endometritis erfolgt nach Götze am besten nach dem Prinzip der Reinigung, Keimtötung und örtlichen Leistungssteigerung. Die Behandlungserfolge bewegen sich durchschnittlich zwischen 70 und 80 Prozent.

Abortus: Auch in diesem Berichtsjahre wird von fast allen Stellen eine weitere Zunahme des seuchenhaften Verwerfens im Reichsgebiet festgestellt. Als Ursache der weiteren Verbreitung des seuchenhaften Verwerfens wird allgemein der lebhaftere Handel mit Vieh angesehen. Besonders gefährlich ist die Gepflogenheit vieler Landwirte, Tiere, die verkalbt haben, zu verkaufen, wodurch die Einschleppung der Seuche in gesunde Bestände erfolgt. Auch nicht genügend erhitzte Magermilch der Molereien soll zur Verbreitung des seuchenhaften Verkalbens beitragen. Paratyphus-Abortfälle werden nur vereinzelt gemeldet. In Oldenburg allerdings sollen sie etwa 50 Prozent aller Verkalbefälle ausmachen (!), ob dieser Angabe bakteriologische Untersuchungen zugrunde liegen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Diplokokken als Aborterreger wurden vom Institut für Tierheilkunde, Hohenheim, in 11 Fällen des eigenen Bestandes ermittelt. Auch über vereinzelte Spirillenaborte wird berichtet.

Besondere Aufmerksamkeit schenkte man der Infektion des Bullen mit Abortus Bang. Das Kammerinstitut Halle untersuchte fünf Blutproben, die sämtlich negativ waren. In Breslau zeigten von 296 Bullen-Blutproben sechs positive Agglutinationswerte. Im Sperma konnten dabei niemals Abortusbakterien nachgewiesen werden. Lütje fand ebenfalls zwei positiv reagierende Bullen. Das Kammerinstitut Hannover berichtet über einen Fall von Abortus-Bang-Infektion mit Hodenerkrankung.

Für die Bekämpfung der Seuche werden neben strengen hygienischen Maßnahmen Impfungen mit lebenden Kulturen empfohlen, die mindestens während zwei Trächtigkeitsperioden durchgeführt werden müssen. Dabei ist eine Kontrolle durch genaue Impflisten zu führen. Alle neuangekauften Tiere müssen ebenfalls geimpft werden. Vor einer Impfung von Bullen mit lebenden Kulturen wird vom Kammerinstitut Breslau dringend gewarnt. In mehreren Fällen wurde hierbei eine Infektion ausgelöst (Erkrankung der Geschlechtsdrüsen, Bauchfellentzündung), so daß eine Schlachtung erforderlich wurde.

Kälberkrankheiten: Die Zahl der Untersuchungen ist um rund 900 gestiegen. An der Ätiologie hat sich nichts geändert. Wie immer stehen zahlenmäßig die Coli-Ärogenesinfektionen an der Spitze. Die Enteritis-Gärtner-Infektionen machen 11,7 Prozent aller Fälle aus. Weiter werden erwähnt die Diplokokken, Vituliseptikum- und Pyogenesinfektionen. Große Verluste hat auch in einzelnen Gegenden die Maul- und Klauenseuche gebracht. Parasitäre Erkrankungen (Kokzidien, Lungenwürmer, Leberegel) werden nur vereinzelt erwähnt.

Für die Bekämpfung der Kälberkrankheiten werden hygienische Maßnahmen und Impfungen mit Seris und Vakzinen angegeben. Viele versuchen auch eine aktive Immunisierung der hochtragenden Muttertiere. Vom tierärztlichen Landesuntersuchungsamt Stuttgart erhielt in Coliruhr gefährdeten Beständen jedes Kalb sofort nach der Geburt eine Abschwemmung einer apathogenen Coli-Schrägagarkultur in aseptisch gewonnener Kolostralmilch per os. Das Kammerinstitut Königsberg verabreichte innerlich Colivakzine mit Milch. Die Übertragung von Mutterblut auf die Kälber hat sich nicht bewährt. Vereinzelt wurde bei Coliruhr die prophylaktische medikamentöse Behandlung angewendet.

III. Schaf.

Abortus: Das durch das *Bact. paratyphi abortus ovis* bedingte seuchenhafte Verwerfen wurde an mehreren Stellen beobachtet. Die meisten Fehlgeburten traten zwischen dem dritten und fünften Trächtigkeitsmonat in Erscheinung. Bei den Muttertieren sind nach dem Abortus Krankheitsercheinungen, abgesehen von einigen Fällen retentio secundinarum nicht beobachtet worden, dagegen sollen sie sich etwa eine Woche vor dem Abortus 1—2 Tage kränklich gezeigt haben. Vereinzelt beobachtete man auch Spirillenaborte. Allen übrigen Fällen von Verlammen lag keine bakterielle Ursache zugrunde. Es werden dafür meist Haltungs- und Fütterungsfehler verantwortlich gemacht.

Lämmerkrankheiten: Eine große Rolle scheinen die infektiösen Pneumonien zu spielen. Während sie in der Provinz Ostpreußen fast durchweg von dem Erreger der hämorrhagischen Septikämie verursacht wurden, hat das Kammerinstitut Halle niemals bipolare Bakterien beobachtet, sondern stets Diplokokken oder das *Bact. pyogenes*. Das Kammerinstitut Münster sah Paratyphus-Infektionen, die mit Verlammfällen in Verbindung standen (Protrahierte Abortfälle). In der Provinz Sachsen hat nach den Angaben von Halle noch die Pyosepticaemia neonatorum, hervorgerufen durch Diplokokken und Pyogenesbakterien, eine gewisse Bedeutung. Daneben werden noch vereinzelte Fälle von Coliruhr, Nabelinfektionen und Lämmerdiphtheroid gemeldet. Verhältnismäßig hoch ist die Zahl der Lungenentzündungen ohne bakteriologischen Befund, sie werden meist auf Haltungsfehler zurückgeführt. Parasitäre Erkrankungen fanden sich bei Sauglammern selten, doch waren sie bei den über acht Wochen alten Absatzlammern häufig anzutreffen. Halle erwähnt besonders die Magenstrongylose, während Kokzidiose, Strongyloidesinvasionen, Lungenstrongylose und Bandwürmer in der Provinz Sachsen selten gesehen wurden. In Baden scheint dagegen die Kokzidiose eine große Bedeutung zu haben. Das Kammerinstitut Halle berichtet auch noch über die Krankheiten der Mutterschafe, bei denen vor allem die infektiösen Eutererkrankungen eine große Rolle spielen.

IV. Schwein.

Über Sterilität und Abortus der Schweine enthalten die Berichte nur wenig Angaben. Nach den Erfahrungen des Kammerinstitutes Halle ist der Abortus der Schweine selten infektiös; meistens beruht er auf Haltungsfehlern.

Ferkelkrankheiten: Von den infektiösen Ferkelkrankheiten spielen die durch Strepto- bzw. Diplostreptokokken und das *Bact. coli* hervorgerufenen Erkrankungen der Saugferkel die bedeutendste Rolle. Nach Sachweh muß man unterscheiden zwischen einer Coli- und Diplo-Streptokokken-Nabelinfektion und einer Coliinfektion, Streptokokkeninfektion und Diplostreptokokkeninfektion, die ihren Ausgang nicht vom

Nabel nehmen. Als Eintrittspforte werden die Tonfillen (Sachweh) oder der Darm angenommen. Nach Sachweh handelt es sich bei der Mehrzahl der Diplo- und Streptokokken-Nabelinfektionen um intrauterine Infektionen. Weiter werden noch angeführt: Paratyphuserkrankungen, Bipolarinfektionen, fibrinöse Serosen- und Gelenkentzündung, das Ferkeldiphtheroid, Viruschweinepest, Maul- und Klauenfeuche und Strongyloidesinvasionen. Fast die Hälfte aller untersuchten Saug- und Absatzferkel ist an Haltungs- und Fütterungsfehlern zugrunde gegangen. Das Kammerinstitut Hannover berichtet über eine pockenartige Hauterkrankung, die mit der im 3. Sammelbericht S. 27 von Lütje als Ferkelpocken bezeichneten Krankheit identisch zu sein scheint.

Da die Erkrankungen der Ferkel zum größten Teile auf Haltungsfehlern beruhen, ist bei ihrer Bekämpfung hauptsächlich eine Besserung der Stallverhältnisse und sachgemäße Ernährung anzustreben. Liegen spezifische Infektionen z. B. mit Diplokokken, *Bact. coli* usw. vor, so werden die neugeborenen Tiere mit dem entsprechenden Serum, teilweise auch mit Vakzine schutzgeimpft. Sachweh weist darauf hin, daß gerade das Ferkel in ausgezeichneter Weise auf Impfungen reagiert, weil die retikulo-endotheliale Abwehr wohl bei keinem Tiere so gut funktioniert wie bei ihm. In Gemeinschaft mit Prof. Grossmann hat er festgestellt, daß in allen Fällen von Streptokokken und Streptokokken-nabelinfektionen die Kapillaren der Lungen, der Lymphknoten und der Leber vollgestopft mit Retikuloendothelien waren, die teils zerfallene rote Blutkörperchen, teils Kokken in Massen phagozytiert hatten. Es ist daher auch verständlich, warum die unpezifische Reiztherapie beim Ferkel so erfolgreich wirkt. Herrschte Coliinfektion unter den Saugferkeln, sah das Kammerinstitut Königsberg bei aktiver Immunisierung der Mutterfauen mit Colivakzine vier Wochen vor dem Abferkeln gute Erfolge. Paratyphuserkrankungen wurden mit Paratyphuserum zum Stillstand gebracht. Die hygienische Überwachung der dem Schweinezuchtverband angeschlossenen Verbände ist vom Kammerinstitut Halle in der gleichen Weise wie früher durchgeführt worden.

V. Geflügel.

Hühner: Die Untersuchungsergebnisse zeigen mit großer Deutlichkeit, daß die durch das *Bact. pullorum* verursachte „weiße Ruhr“ der Küken jetzt auch in Deutschland immer mehr an Bedeutung gewinnt. Vom Kammerinstitut Halle wurde sie in 23,7 Prozent aller Fälle gefunden. Vom Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover wurde das *Bact. pullorum* bei rund 17 Prozent der untersuchten Küken ermittelt. Auch das Kammerinstitut Breslau weist auf die zunehmende Ausbreitung der Seuche hin. Neben der weißen Kükenruhr wird die gewöhnliche durch das *Bact. coli* verursachte Kükenruhr häufig genannt. Die Diphtherie wurde vom Kammerinstitut Halle in 4,5 Prozent der Fälle beobachtet. Nichtbakterielle Lungenentzündungen wurden sehr oft bei Tieren ermittelt, die als Eintagsküken bezogen worden waren. Als Ursache konnten unzweckmäßig eingerichtete, insbesondere zugige Aufzuchtshäuser festgestellt werden. Von den parasitären Erkrankungen kommen vor allem der Coccidiose und der Capillariasis (Trichosomiasis) eine sehr große Bedeutung zu. Sie verursachten z. B. beim Kammerinstitut Halle zusammen annähernd 25 Prozent aller Verluste. Die Kokzidiose und die Capillariasis stellen neben der „weißen Ruhr“ die gefährlichsten Aufzuchtserkrankungen unserer Kükenbestände dar; Lütje erwähnt die Heterakiasis, die in seinem Bezirk eine geradezu verhängnisvolle Rolle spielt.

Die Bekämpfung der „weißen Ruhr“ der Küken erfolgt

mit Hilfe der Agglutinationsmethode. Trennung der gefunden und kranken Tiere, evtl. Abchlachten der letzteren. Es dürfen nur Hühner zur Zucht verwendet werden, die bei der Agglutinationsprobe mit *Bact. pullorum* negativ reagieren. Einstweilen liegen über die Impfungen, die sich nur auf Großtiere erstrecken können, zu wenig Erfahrungen vor. Die Impfung von Küken ist der hohen Kosten wegen praktisch nicht durchführbar. — Bei Coliruhr und Paratyphus wurde in Verbindung mit hygienischen Maßnahmen Impfungen mit Vakzinen vorgenommen. Das Kammerinstitut Münster stellte bei der Bekämpfung der Diphtherie in Versuchen auf breiter Basis ein vollkommenes Versagen des Antidiphtherins fest. Am Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover wurden Impfungen mit Antidiphtherin nach der Methode De Blieck und van Heelsbergen an einer größeren Zahl leicht sowie schwer erkrankter Tiere ausgeführt. Bei schwer erkrankten Tieren war der Erfolg ziemlich negativ, während leicht erkrankte Tiere bei gleichzeitiger operativer Behandlung (Entfernung der Beläge, Bepinselung mit Jodtinktur) wieder genasen. Die Impfung wird von vielen Kollegen als Schutzimpfung verschiedentlich mit gutem Erfolge angewendet.

Puten: Die Pseudotuberkulose ist identisch mit der Paracholera. Zur Bekämpfung haben sich Impfungen mit abgetöteten Erregern bewährt, doch war eine deutliche Heilwirkung bei erkrankten Tieren nicht festzustellen.

Gänse und Enten: Bei Gänsen spielt besonders die Nierenkokkidiose und Magenwurmfleuche (*Amidostomum anseris*) eine große Rolle. Letztere führt oft zu sehr starken Veränderungen des Muskelmagens, wobei das Epithel in eine bräunlich borkige Masse umgewandelt wird. Außer parasitären Erkrankungen beobachtete das Kammerinstitut Königsberg bei Junggänsen ziemlich oft Coli- und *Diplostreptokokken*-Infektionen. Auch werden einzelne Fälle von Aspergillose angeführt.

Zur Kenntnis der Eileitererkrankungen bei Rind und Pferd.

Von Prof. Dr. Richter, Leipzig.*)

Die in Gemeinschaft mit Roth und Kokkonen an den Eileitern von 100 Stuten und 100 weiblichen Rindern verschiedenen Alters ausgeführten Untersuchungen waren anatomischer Natur und hatten das Ziel, durch genaue makroskopische, vor allem aber histologische Prüfung einen Überblick über die eventuelle Häufigkeit und die Art von Oviduktanomalien bei Rind und Pferd zu gewinnen. Beim Rind wurden von angeborenen Abweichungen mehrfach Bindegewebsbalken, die das Lumen der Tube durchzogen, einmal ein Doppeltube der linken Ampulle und bei einer Färse eine einseitige Stenose gefunden. Ferner wurden verschiedentlich Zysten an und in der Wand des Eileiters beobachtet, die vereinzelt dessen Lumen zusammendrücken oder ausfüllten. Die erworbenen Eileitererkrankungen spielen eine große Rolle. Unter ihnen beansprucht die Salpingitis tuberculosa besonderes Interesse. Sie tritt ziemlich häufig und meist beiderseitig auf und zeigt in der Regel deszedierenden Charakter, was durch das fast immer stärkere Ergriffensein des Bauchendes der Tube zum Ausdruck kommt. Dieser Befund konnte in 14 Fällen vorgeschrittener Genitaltuberkulose erhoben werden, während in sechs anderen Fällen erst die mikroskopische Untersuchung die Diagnose auf beginnende Eileitertuberkulose stellen ließ. Mit einer Ausnahme gelang auch bei den nichtspezifischen Formen der Tubenkatarrhe die Feststellung erst durch histologische Prüfung, obwohl teilweise starke entzündliche Schwellung der Tubenschleimhaut und Ausfüllung des

Lumens mit Exsudat vorlag. Die septisch-fäprischen Oviduktaffektionen tragen entsprechend ihrer Genese vom erkrankten Uterus her ascendierenden Charakter.

Beim Pferd wurden ziemlich häufig und zwar 15mal bohnen- bis walnußgroße Zysten am Eileiter, zwischen den Blättern der Mesosalpinx, gesehen, durch welche in einem Fall eine Kompression der Tube entstanden war. Sonstige makroskopisch erkennbare Anomalien der Ovidukte selbst konnten bei zwei Stuten beobachtet werden. Einmal handelte es sich um eine Hyperplasie eines Eileitertrichters, der einen Durchmesser von 7 cm besaß, ohne sonstige Abweichungen aufzuweisen. Im zweiten Fall lag die sehr seltene Anomalie einer Tuboovarialzyste vor, wobei das stark erweiterte Bauchende des linken Eileiters mit dem Ovarium eine birnenförmige Blase bildete. Andere Abweichungen ließ das Material nicht erkennen, so daß die Mitteilungen anderer Autoren über das seltene Vorkommen von Tubenanomalien bei der Stute bestätigt werden konnten. Besonders hervorgehoben zu werden verdient, daß auch die histologische Untersuchung durchweg ein negatives Ergebnis zeitigte. Die Erklärung für den zwischen Rind und Pferd bestehenden, auffallenden Unterschied im Auftreten von erworbenen Tubenerkrankungen bietet neben dem Auscheiden der tuberkulösen Salpingitis beim Pferd dessen Schutz, den es in der anatomischen Beschaffenheit des Uterinendes der Tube in Gestalt seiner engen, muskulösen Papille gegen das Übergreifen von Gebärmutterkatarrhen auf den Eileiter besitzt.

Vom Standpunkt der Sterilität haben die kongenitalen Tubenanomalien nur geringe praktische Bedeutung. Höchstens dann, wenn Zysten oder Stenosen beiderseitig auftreten und den Eileiter zusammendrücken oder völlig verschließen, wird Unfruchtbarkeit die Folge sein. Die erworbenen Eileitererkrankungen spielen in der Frage der Sterilität der Stute als seltene Ausnahme eine nebensächliche Rolle, beim Rind hingegen erfordern sie unsere besondere Aufmerksamkeit. Ihre klinische Feststellung gelingt nur, wenn vorgeschrittene Veränderungen, meist tuberkulöser Art, vorhanden sind, während in den relativ zahlreichen Fällen versteckter Salpingitis höchstens eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose möglich ist, die durch erkennbare Symptome mitvorhandener Gebärmutterleiden und Ovarialzysten gestützt zu werden vermag. Die Behandlung ist bei klinisch feststellbaren Eileiterentzündungen nutzlos; in den Fällen vermutlicher Salpingitiden wird sie eine indirekte sein, wobei die Therapie der mitvorhandenen Gebärmutter- und Ovarialleiden sowie die Vakzineimpfung in Betracht kommen.

Beziehungen zwischen Tuberkulose und Sterilität bei Rindern.

Von Dr. Schumann, Breslau.

Ein Teil der Erkrankungen, die der Sterilität zugrunde liegen, ist unheilbar, sie können jedoch bei der orientierenden Untersuchung vor der Behandlung in der Regel noch nicht als unheilbar prognostisch beurteilt werden. Hierzu gehören vor allen Dingen Eileiter-Erkrankungen und die Anfangsstadien der Genitaltuberkulose. An der Hand des Sterilitätsmaterials aus der Provinz Schlesien wird nun die Bedeutung der Genitaltuberkulose hinsichtlich der Sterilitätskrankheiten erörtert. Zunächst konnte eine Zunahme der aufgefundenen Genitaltuberkulose festgestellt werden, eine Zunahme, die lediglich erklärt wird durch das Fortschreiten der Übung und der Vervollkommnung der Untersuchungsmethoden. — Die Symptome des Geschlechtslebens bei Gebärmuttertuberkulose werden erörtert. Es geht daraus hervor, daß sie an und für sich keine sicheren Erkennungsmerkmale abgeben. Besonders leicht entgehen die Anfangsstadien der Genitaltuberkulose der klinischen Feststellung, weil die Veränderungen bei Palpation vom Rektum aus selbst für den Geübten in der Regel nicht feststellbar sind.

*) Original B. T. W. 1927, S. 885.

Dagegen wurden in 67 Prozent der Fälle von Genitaltuberkulose katarrhalische Erscheinungen des Uterus gefunden. Es wird an Zahlenreihen festgestellt, daß jeder chronische Gebärmutterkatarrh verdächtig ist, tuberkulöser Ursache zu sein. Daher sollte möglichst in jedem Fall von chronischer katarrhalischer Endometritis eine Schleimprobe aus dem Inneren der Gebärmutter zur bakteriologischen Untersuchung auf Tuberkelbakterien entnommen werden. Hierzu hat sich als brauchbar ein nach Art des gebogenen Uteruskatheters geformter Gebärmutterfchleimlöffel bewährt. Tuberkelbakterien sind in positiven Fällen in der Regel zahlreich im Schleim vorhanden, sofern die Tuberkulose offen ist. Die hämatogenen Formen, die gar nicht so selten vorkommen scheinen, entgehen in der Regel der bakteriologischen Feststellung. Das Verhältnis der Tuberkulose zur Sterilität allgemein ist dahin zu definieren, daß die tuberkulöse Erkrankung an sich nicht eine Sterilitätsursache zu sein braucht, daß sie jedoch bei der Sterilitätsbekämpfung insofern zu berücksichtigen ist, als bei fortwährender Tuberkulose über das Bauchfell hinweg oder seltener auf hämatogenem Wege die Gebärmutter ergriffen wird und eine Sterilitätsursache abgibt.

Lührs - Oldenburg: **Klinisches zur Sterilitätsbekämpfung.**
Der Vortrag fiel aus.

Wechselrede zum Abschnitt Sterilität.

Richter - Leipzig weist darauf hin, daß eine einheitliche Festlegung des Sterilitätsbegriffes nötig ist, um die Behandlungserfolge vergleichen zu können. Die physiologische Seite darf über die Frage der Pathologie nicht vergessen werden. Schumann - Breslau beantwortet die von Prof. Richter gestellte Frage, ob bakteriologische Untersuchungen der Eileiter feiner Fälle vorgenommen worden seien dahin, daß dies nicht der Fall wäre. Schultze - Altenburg will sich bemühen, den R.P.T. zu erforschen, in der Presse usw. auf die stärkere Mitarbeit der praktischen Tierärzte bei der Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten hinzuweisen. Die Landwirte scheuen die Kosten. Vorträge von Tierärzten werden von den Landwirten oft ablehnend aufgenommen, weil sie argwöhnen, daß diese durch Einführung neuer Behandlungsmethoden nur Geld verdienen wollen. Meyer - Altfeld berichtet, daß Lütje bei systematischer Lochialsekretuntersuchung bei 30 güstigen Stuten ein- und bei 25 frisch abgefohlten Stuten zweimal Diplokokken festgestellt hat. Beide Stuten zeigten sich klinisch krank. Es wird angenommen, daß eine intrauterine Infektion stattgefunden hat. Lütje - Stade hat bei seinen Lochialsekretuntersuchungen wiederholt Paratyphusinfektionen bei Stuten mit postfetaler Erkrankung des Fohlens nachgewiesen. Auf die Anfrage Pfeilers, inwieweit bei den 3—8 Wochen alten Fohlen eine extrauterine Infektion ausgeschlossen werden kann, führt Lütje als Beweis an: 1. die Erreger sind in den Geburtswegen der Mutter, 2. postfetale Erkrankungen vorwiegend in immunisierten Beständen bei Fohlen und Stuten mit höchsten Blutwerten, 3. in Losfällen erkranken nur Fohlen, deren Mütter Bazillenträger waren, die anderen nicht, 4. Fohlen fremder Stuten, die Paratyphusstuten untergesetzt waren, erkrankten nicht, dagegen Fohlen von Paratyphusmüttern unter gesunden Ammenstuten. Sachweh - Münster bemerkt, daß er schon vor Jahren auf die intrauterine Paratyphusinfektion des Fohlens hingewiesen hat. Knell - Gießen erklärt den in der Humanmedizin gebräuchlichen Ausdruck Gebärmüdigkeit. Weiter erwähnt er das Durchblasen (Schnäuzen) der Tube, und regt an, es in der Veterinärmedizin zu versuchen. Mießner - Hannover betont, die Notwendigkeit der Mitarbeit der Gestüte, besonders bei der Klärung der Frage der intra- oder extrauterinen Infektion der Fohlen. Zu diesem Zwecke ist es aber unbedingt nötig, daß in einigen größeren Gestüten bakteriologische Untersuchungslaboratorien mit geeigneten Sachverständigen eingerichtet werden. Ein diesbezüglicher Antrag ist gemäß des Beschlusses der Münchener Fachtierärztetagung von der Reichszentrale an die Regierung der einzelnen Länder gerichtet worden. Leider ist er unter Hinweis auf die schlechte wirtschaftliche Lage von allen Stellen abschlägig beschieden worden. Mießner schlägt vor, die Anträge zu erneuern. Der Vorschlag wird wie folgt von der Versammlung genehmigt:

Die Zentrale wird ermächtigt, nochmals die Regierungen der einzelnen Länder zu bitten, in den grösseren Gestüten bakteriologische Untersuchungslaboratorien mit geeigneten Sachverständigen einzurichten zu lassen.

Erfahrungen mit verschiedenen diagnostischen Methoden zur Feststellung des feuchten Verkalbens.

Von Dr. Ehrlich, Hannover.

Im Tierfeucheninstitut der Landw.-Kammer für die Provinz Hannover wurden in den letzten Jahren folgende Feststellungsverfahren angewandt: Die mikroskopische und kulturelle Untersuchung des Fötus und der Eihäute, der Meerfchweinchenversuch, von den Blutuntersuchungsmethoden die Agglutination, die Komplementbindung mit aktivem und inaktivem Serum und neuerdings die Ballungsreaktion nach Prof. Müller - Wien. Für die mikroskopische Untersuchung von Ausstrichpräparaten leistet die Differenzierungsmethode mit verdünnter Essigsäure wertvolle Dienste. Es gelingt damit in einer großen Zahl von Fällen, in infizierten Föten mit Sicherheit Bang'sche Bazillen festzustellen. Ein recht leicht ausführbares und einfaches Verfahren zur Züchtung der Bang'schen Bazillen aus Föten ist die sog. Leuchtgasmethode, wobei schräg erstarrte, beimpfte Glycerin-Agarröhrchen durch Einströmenlassen von Leuchtgas (Öffnung nach unten) und nachfolgendem Paraffinverschluß anaeroben Wachstumsbedingungen ausgesetzt werden. Paratyphusbazillen wurden in der Provinz Hannover nur ganz vereinzelt, unter 326 Föten und 42 Eihäuten im Berichtsjahre 1926 nur dreimal, in abortierten Rinderföten ermittelt. Die Verimpfung von Abortusmaterial auf Meerfchweinchen und nachfolgende serologische Untersuchung des Meerfchweinchenblutes führte auch dann häufig noch zu einem positiven Ergebnis, wenn der mikroskopische und kulturelle Nachweis negativ verliefen. Unter 77 mikroskopisch und kulturell negativen Fällen wurde durch Verimpfung des Magensaftes von Föten bzw. eines Kochextraktes aus Nachgeburtsresten noch 24 als positiv ermittelt. Die betreffenden Meerfchweinchen zeigten in der Regel nach 14 Tagen bis drei Wochen Agglutinationstiter von 1:80 bis 320, nur in fünf von den 24 Fällen waren nach 14 Tagen noch keine Agglutinine nachweisbar, sondern traten erst später auf.

Es wurden ferner 2597 Blutproben aus 94 Beständen mittels der Agglutination, der Komplementbindung mit aktivem und inaktivem Serum und ferner 1262 Blutproben aus 115 Beständen nur mittels der Agglutination und der Komplementbindung mit aktivem Serum vergleichend untersucht. In der ersten Versuchsreihe war in 96 Prozent aller Fälle völlig Übereinstimmung der drei verschiedenen Methoden vorhanden und in der zweiten Versuchsreihe lag in 93 Prozent der Fälle ein völlig gleiches Ergebnis der zwei verschiedenen Untersuchungsarten vor. Zieht man jedoch die positiven Fälle allein in Betracht, so werden die Unterschiede größer. Dann herrschte nur bei Anwendung der drei Methoden in 46,5 Prozent, bei den zuletzt ausgeführten zwei Methoden in 71,2 Prozent Übereinstimmung. Die Komplementbindung mit aktivem Serum gab die meisten, die mit inaktivem Serum die wenigsten positiven Blutreaktionen, die Zahl der positiven Agglutinationen lag in der Mitte. Es ist daher zu empfehlen, neben der Agglutination noch die Komplementbindung mit aktivem Serum diagnostisch zu verwenden.

Es wurden weiterhin 104 Sera aus verschiedenen Abortusbeständen und gefundenen Herden mittels der Ballungsreaktion nach Müller geprüft. Die Ballungsreaktion ist jedoch mit dem von den Scheringwerken gelieferten Ballungsreagens für die Untersuchung von Rinderferen auf Abortusinfektion in der bisherigen Form nicht brauchbar, weil auch die meisten gefundenen Seren deutliche Ballung oder starke Flockungen zeigen.

Bezüglich der Bewertung der Blutreaktionen muß anerkannt werden, daß uns die Blutuntersuchungen, insbesondere die Agglutination, die Komplementbindung mit aktivem und inaktivem Serum, wertvolle Dienste leisten. Es kann jedoch auch nicht geleugnet werden, daß des öfteren Fehldiagnosen vorkommen. So wurde verhältnismäßig häufig festgestellt, daß Blutproben von Kühen, die feuchenhaft verworfen hatten, z. Zt. des Abortus sich serologisch inaktiv verhielten. Von 34 Blutproben solcher Kühe, in deren Föten oder Nachgeburten der Bang'sche Bazillus nachgewiesen worden war, agglutinierten 28 positiv (= 82 Prozent), 3 negativ (= 9 Prozent) und 3 unzweifelhaft (= 9 Prozent).

Die Zahl der nicht reagierenden Abortuskühe war noch größer, wenn die Blutproben längere Zeit vor dem Verkälben entnommen wurden. Es wird daher eine einmalige Blutuntersuchung in frisch infizierten Beständen zur Ermittlung aller infizierten Tiere als nicht genügend erachtet, vielmehr eine zweite Blutentnahme 4—8 Wochen nach der ersten anempfohlen. An Beispielen wird ferner hervorgehoben, daß des öftern Kühe, darunter auch solche, die nachweislich nie verkalbten, regelrecht austragen, trotzdem sich jahrelang hohe Blutwerte bei ihnen feststellen lassen.

Zum Schluß wird darauf hingewiesen, daß die Hilfsurfachen, die bei vielen anderen Infektionen den Bakterien erst das Eindringen in die Organapparate ermöglichen und so eine Vorbedingung der Erkrankung sind, auch beim Bang'schen Abortus wahrscheinlich eine größere Rolle spielen, als man geneigt ist anzunehmen. Abortusinfektionen und feuchthafte Verkälben müssen auseinander gehalten werden. Seuchenhaftes Verkälben ist ohne Abortusinfektion nicht möglich, wohl aber braucht einer Abortusinfektion feuchthafte Verkälben nicht immer zu folgen, wenn nicht gewisse Hilfsurfachen die krankhaften Zerstörungen in der Gebärmutter fördern. Worin diese Hilfsurfachen bestehen, ist bislang nicht hinreichend bekannt. Die Forschungen über die Ätiologie und Pathogenese des feuchthaften Verkälbens können daher noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden.

Die Bekämpfung des feuchthaften Verkälbens unter besonderer Berücksichtigung der Impfmethode des Bakteriologischen Institutes der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg und Berlin.

Von Dr. Lentz, Berlin.

Bei dem Impfverfahren des Institutes kommen nur lebende Abortuskulturen und Abortuserum in Anwendung. Die Vorversuche wurden zunächst mit Rekonvaleszenten-serum angestellt und nach dem günstigen Ausfall der Vorversuche gingen wir zur Verimpfung von Abortusimmunserum über. Nach Feststellung der Seuche wird zunächst der gesamte Bestand unter Impfschutz gestellt, indem die nichttragenden Tiere im ersten bis dritten Trächtigkeitsmonat zweimal mit lebenden Kulturen geimpft werden, die Tiere im vierten bis siebenten Trächtigkeitsmonat zweimal mit lebenden Kulturen und Abortuserum und die hochtragenden mit Abortuserum. Alle neu einzustellenden Tiere sind, soweit sich eine Neueinstellung nicht vermeiden läßt, vor der Einstellung zweimal mit Kultur zu impfen. Nach dem Abkalben bzw. Verkälben werden sämtliche Tiere zweimal mit lebenden Kulturen nachgeimpft und zwar frühestens 14 Tage nach dem Kalben, um zu vermeiden, daß evtl. vorkommender Geburtsraufchbrand vom Besitzer mit der Impfung in Zusammenhang gebracht wird. Von der Impfung der hochtragenden Tiere haben wir uns anfänglich wenig Erfolg versprochen, da anzunehmen war, daß bei einem Teil der Impflinge die krankhaften Veränderungen im Uterus zu weit vorgeschritten sein werden, als daß der Abortus durch eine Impfung noch aufzuhalten wäre. Die Erfahrung lehrte jedoch, daß es selbst in Fällen, in denen die Anzeichen einer vorzeitigen Ausstoßung der Frucht bereits

vorhanden waren, durch forcierte Seruminjektionen gelang, den Abortus aufzuhalten. Andererseits wollen wir durch den Impfschutz sämtlicher Tiere eine evtl. Virulenzsteigerung des Erregers durch Tierpassage verhindern und gleichzeitig durch diese Vorimpfung die später erfolgende Immunisierung mit lebenden Kulturen wirkfamer gestalten. Schädigungen durch die Verimpfung lebender Kulturen bei trächtigen Tieren wurden nicht beobachtet. Nach unseren Beobachtungen scheinen die Bedenken vieler Kreise vor der Verimpfung lebender Abortuskulturen bei trächtigen Tieren unbegründet zum mindesten aber zu groß zu sein. Schon Zeller und auch Schermer haben darauf hingewiesen, daß die künstlich einverleibten lebenden Abortusbazillen im Körper der Impftiere verhältnismäßig rasch zugrunde gehen und daß sie weder in Blut, Milch, Speichel, Harn und Kot noch in den inneren Organen der Tiere nach der Schlachtung nachzuweisen waren. Wir haben diese Angaben bestätigen und noch erweitern können, indem wir einer gefunden Kuh im fünften Trächtigkeitsmonat zweimal 50 ccm lebende Kulturen subkutan injizierten, also das fünffache der üblichen Immunisierungsdosis, ohne dadurch die Tragezeit unterbrechen zu können. Nach dem Abkalben erhielt diese Kuh gemeinsam mit einer zweiten nichtträchtigen Kuh in einem Zeitraum von 14 Tagen je 225 ccm lebende Kulturen subkutan injiziert. Bei der sechs Tage nach der letzten Impfung vorgenommenen Schlachtung waren Abortusbazillen im Uterus nicht nachzuweisen. Wegen der verhältnismäßig hohen Kosten konnten die Versuche leider nicht erweitert werden.

Ausschlaggebend für die Reaktion des einzelnen Tieres auf die Impfung wird selbstverständlich die Kultur sein. Es ist als sicher anzunehmen, daß ein Krankheitserreger, der nach Isolierung aus dem Tierkörper verhältnismäßig sehr schnell seine anaerobe Wachstumseigenschaft einbüßt, bei der Fortzucht auf künstlichen Nährböden, wie auch andere Bakterien, Änderungen in seiner Pathogenität durchmachen wird und dementsprechend auch die Reaktionen bei der Verimpfung verschieden sein werden. — Jedenfalls tragen wir keine Bedenken mehr gegen die Verimpfung lebender Kulturen in verseuchten Beständen bei trächtigen Tieren.

Die Impfung ist in der oben beschriebenen Weise bisher in ca. 200 Beständen an fast 13 000 Tieren zur Durchführung gekommen. Einzelne Klagen über angebliches Versagen der Impfung sind selbstverständlich nicht ausgeblieben, andererseits sind uns aber auch unaufgefordert zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben zugegangen. Die Klagen bezogen sich in der überwiegenden Mehrzahl auf Fälle, in denen sich die Tiere zur Zeit der Impfung bereits im vorgeschrittenen Stadium der Trächtigkeit befanden, so daß anzunehmen ist, daß die Impfung zu spät vorgenommen worden ist. In vereinzelten Fällen verkalbten jedoch auch Tiere, die vor dem Zulassen zweimal mit lebenden Kulturen geimpft worden waren. In der Regel waren es Tiere, die zum ersten- oder zweitenmal kalbten. Es muß angenommen werden, daß in diesen Fällen der Impfschutz nicht ausreichte. Ganz allgemein scheint die immunisierende Wirkung der lebenden Kulturen bei den einzelnen Tieren verschieden zu sein. Einwandfreie, praktisch verwertbare Befunde liegen hierüber nicht vor und werden wohl auch schwer zu beschaffen sein. Einen Anhalt bietet vielleicht die Blutuntersuchung. Bis zu einem gewissen Grade ist es wohl berechtigt, aus dem Verschwinden der komplementbindenden Substanzen aus dem Blut geimpfter Tiere einen Rückschluß zu ziehen auf die Immunitätsdauer. Wir wissen nun, daß bei geimpften Tieren im allgemeinen nach etwa sechs Monaten mit dem Verschwinden der komplementbindenden Substanzen gerechnet werden kann. Würde diese Zeitspanne auch für den Impfschutz zutreffen, dann würde die durch die Impfung vor der Trächtigkeit bewirkte Immunität gerade in der für die Auslösung des Abortus ge-

fährlichsten Zeit vorüber sein. Da wir für diese Theorie in der Praxis Bestätigung fanden, sind wir dazu übergegangen, unserem Impfverfahren eine dritte Kulturimpfung einzu-reihen und zwar nach Möglichkeit im dritten Trächtigkeitsmonat. Dadurch ist es uns gelungen, die Fälle von Verkälben in der ersten und zweiten Trächtigkeitsperiode noch zu vermindern. Bei gewissenhafter Beachtung unserer Impf-anweisung genügte häufig die Durchführung der Impfung während einer Trächtigkeitsperiode, um die Krankheit zum Stillstand zu bringen. In der Regel empfiehlt sich jedoch die Durchführung des Impfverfahrens während zweier Trächtigkeitsperioden, da nach unserer Erfahrung die Angaben Gminders über die Dauer der Immunität nicht zu-zutreffen scheinen. Gminder glaubt an eine Immunität bis zu zwei Jahren bei zweimaliger Verimpfung abgetöteter Kulturen und an eine noch nachhaltigere Immunisierung bei der Verwendung lebender Kulturen. Diese Zeitspanne ist u. E. viel zu weit gegriffen.

In einzelnen verseuchten Beständen wurde bei den aus-getragenen Kälbern häufig Durchfall beobachtet. Eine pas-sive Immunisierung dieser Kälber unmittelbar nach der Ge-burt durch subkutane Injektion von 50 ccm Abortusserum war in der Regel erfolgreich. Für die Zukunft ist in diesen Fällen die Verwendung eines Coli-Abortus-Mischserums geplant.

Die Bekämpfung des feuchten Verkälbens.

Von Dr. Zimmermann, Königsberg.

Neben hygienischen Maßnahmen kam folgende Impf-methodik in Anwendung: Frühträchtige Tiere bis zum dritten Monat einschließlich sowie höher-tragende mit posi-tivem Blutbefund bis zu $3\frac{1}{2}$ Monaten wurden mit Vakzine vorbehandelt und zweimal mit lebenden Kulturen in zehn-tägigem Abstand subkutan nachgeimpft. Über drei Monate trächtige Tiere mit negativem Blutbefund erhielten drei bis vier subkutane Injektionen mit steigenden Dosen von Vak-zinen. Nach dem Kalben wurden alle vorher vakzinierten sowie alle verkälbt und infizierten sowie die wegen Hoch-trächtigkeit ungeimpft gebliebenen zweimal mit Kulturen für die nächste Trächtigkeitsperiode immunisiert. Die mit Kulturen geimpften Tiere kamen frühestens drei Wochen nach der letzten Impfung zum Belegen. Zur Behandlung kamen 275 Bestände mit 185 000 Tieren. Die Erfolge waren nicht befriedigend, so daß auch dieses Impfverfahren trotz genauester unter praktischen Verhältnissen möglichen Befol-gung der Stall- und Weidehygiene als ideale Lösung nicht gelten kann. Meine Versuche, die Seuche auf chemothera-peutischem Wege zu bekämpfen, sind in mehr als tausend Fällen durchgeführt. Darüber schon heute zu sprechen, halte ich für verfrüht, da einwandfreie Unterlagen noch nicht zur Verfügung stehen.

Mit Rücksicht auf die noch unbefriedigenden Bekämp-fungsverfahren bei dem feuchten Abortus stelle ich fol-genden Antrag:

„Die Tagung der Fachtierärzte zu Jena hat festgestellt, daß in der Bekämpfung des feuchten Verkälbens, dessen Verbreitung über das deutsche Zuchtgebiet unser Nationalvermögen jährlich um Millionen schädigt und die Entwicklung zur Qualitätszucht schwer behindert, noch große Widersprüche bestehen. Sie machen es erforderlich, daß eine Kommission, die heute aus der Versammlung ge-wählt wird, die Vorarbeiten zur Schaffung eines Spezial-forschungsinstituts betreibt, zu dessen Unterhalt das Reich, Preußen, die interessierten Züchter und Handelsverbände herangezogen werden.“

Aus der Praxis der Bekämpfung des Abortus infectiosus beim Rinde.

Von Dr. Jüterbock, Schönberg.

Die Therapie des infektiösen Abortus hat in den letzten Jahrzehnten mancherlei Wandlungen erfahren. Als noch

der Scheidenkatarrh für den Abort verantwortlich gemacht wurde, habe ich mit Bacillolalbenbehandlung im ganzen gute Erfolge gehabt und das trotz ziemlich mangelhaften Isolierungsmaßnahmen. Impfungen nach Bräuer mit Karbolsäure habe ich öfter in großen Herden durchgeführt. Vom fünften bis siebenten Monat der Trächtigkeit wurden alle 14 Tage 20 ccm einer 2prozentigen Karbolsäurelösung injiziert. Wenn auch die Impfungen aus Sparfamkeitsrück-sichten nicht immer regelmäßig durchgeführt werden konn-ten, muß ich doch sagen, daß die Resultate dieser Behand-lung meist gut waren. Nach Einführung der Abortuslymphe habe ich im Laufe der Jahre viele Tausende von Abortus-impfungen vorgenommen. Der erzielte Erfolg war ungleich; in manchen Beständen kam trotz peinlichst durchgeführter Impfung immer wieder Abortus vor, in anderen flauten sie sichtlich ab, namentlich dann, wenn noch nicht viel Abort-fälle vor beginnender Behandlung zu verzeichnen waren. Zur Verwendung von Kulturen habe ich mich nur schwer ent-schließen können. Die Erfolge waren sehr ungleich und weniger gut als bei Impfungen mit Abortin und Karbol-säure. Der absolute Mißerfolg, den ich in einer großen Herde trotz Anwendung aller Mittel zu verzeichnen hatte, hat mich in Zukunft von Kulturimpfungen absehen lassen.

Innerlich zu verabfolgende Medikamente habe ich bei in-fektiösem Abort von jeher angewendet. Zuerst gebrauchte ich Karbolsäure nach N u e f c h. Das Ergebnis dieser Be-handlung war nicht schlecht. Benzoptol, wohl ein Phenol-präparat, entfaltete zwar ganz gute Wirkung, war aber schlecht löslich, so daß es für die Praxis zu gefährlich war. Die Wirkung des Geheimmittels „Verkalbin“, die ich natür-lich, ohne es verordnet zu haben, beobachten konnte, war indirekt proportional der dafür gemachten Reklame. Auch von mir selber zusammengesetzte Präparate habe ich schon vor 18 Jahren angewandt. Hauptbestandteile Jod, Phenyl- und Salizylverbindungen. Ich habe die Mittel verbessert und wie ausgedehnte Versuche in eigener und fremder Pra-xis zeigen, nicht ohne Erfolg. Die seit ca. 9 Monaten an einer Hochschulklinik laufenden Versuche haben das Resul-tat gehabt, daß bisher kein mit dem Präparat behandeltes Tier abortiert hat.

Wenn ich rückblickend, die mit den verschiedenen Mit-teln bei der Bekämpfung des feuchten Verwerfens ge-habten Erfolge betrachte, muß ich sagen, daß das un-spezifische dem spezifischen an Wirkung überlegen war. Auch das Abortin gehört meiner Meinung nach zu den unspezifischen Präparaten, es wirkt wohl durch seinen Gehalt an Eiweiß und vielleicht auch an Karbolsäure.

Wechselrede zum Abschnitt Abortus.

Schlegel-Freiburg hält die Impfungen zur Bekämpfung des Abortus nicht für ausreichend. Es sind daher die Anzeigepflicht für den infektiösen Abortus der Rinder- und veterinärpolizeiliche Bekämp-fungsmaßnahmen erforderlich. R u d o l f-Wien berichtet über feuchen-hafte Abortfälle während der ersten drei Trächtigkeitsmonate, an die sich eine Pyometra anschloß. Es gelang nicht die Ätiologie dieser Früh-aborte zu klären. — In zahlreichen Fällen, in denen nach der Anam-nese feuchthafte Verwerfen vorzuliegen schienen, wurde ein negatives Agglutinationsergebnis erhalten. Es gibt augenscheinlich sich atypisch verhaltende Abortusbazillensämme. Ihr serologischer Nachweis ist nur bei Verwendung, Stall- oder gegendispezifischen Stämme als Testflüssig-keit möglich. Die Kulturimpfung ist in manchen Fällen nicht ganz un-bedenklich. Wir empfehlen die Impfung mit lebenden Kulturen nur in Beständen mit über 50 Prozent serologisch positiv reagierender Tieren. B e l l e r-Dahlem macht darauf aufmerksam, daß viele Frühaborte über-sehen werden, weil die Tiere dann als güst gelten. Wenn eine Kuh nach dem Partus oder Abort regelmäßig umrindert, kann kein Zweifel bestehen, daß es sich dabei um Sterilität handelt. Wenn aber eine Kuh in längeren Intervallen rindert, ist der Verdacht wohl gerechtfertigt, daß hier eine Konzeption wohl stattgefunden, die Eientwicklung der Frucht aber infolge einer mehr kaudal gelegenen Entzündung des Genital-apparates unterbrochen wurde. K n e l l-Gießen weist auf die P e t-

tenkofer'sche Formel $X + Y = Z$ hin, wobei X den Krankheitserreger, Z die Krankheit und Y das unbekannte Agens, das die krankmachende Wirkung von X auslöst, darstellt. Hueber-Halle hat die Erfahrung gemacht, daß bei Niederungsvieh der Verlauf der Seuche intensiver, länger dauernder und in den Folgen schwerwiegender ist als beim Höhenvieh. Mießner-Hannover hält die Agglutinationsmethode für ausreichend zur Feststellung der Ausbreitung des feuchtenhaften Verwerfens in einem Bestande. Vereinzelt vorkommende Unstimmigkeiten vermögen den Wert der Agglutinationsmethode als diagnostisches Hilfsmittel nicht zu beeinträchtigen. Um sicher zu gehen, empfiehlt sich eine mehrmalige Untersuchung des Bestandes. Daß gewisse disponierende Momente das Zustandekommen der Seuche begünstigen, erscheint klar. An der Ätiologie läßt sich aber nicht rütteln. Sie wird durch die gewaltige Zahl der Untersuchungen in allen Kulturstaaen immer aufs neue bestätigt. Schultze-Altenburg hebt hervor, daß die Bekämpfung des feuchtenhaften Abortus noch besonders durch die verschiedensten Impfanweisungen erschwert wird, die von den einzelnen Instituten angegeben werden. Ein großer Teil der Anweisungen ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht durchführbar. Lütje-Stade tritt für die ätiologische Bedeutung des Bang'schen Abortusbazillus ein. v. Ostertag-Stuttgart weist darauf hin, daß der Bang'sche Abortusbazillus die drei klassischen Forderungen von Robert Koch für die ätiologische Bedeutung eines Erregers erfüllt: Er läßt sich reinzüchten, mit der Reinkultur läßt sich Abortus bei der Kuh erzeugen und aus den erkrankten Kühen läßt sich der Abortusbazillus wieder reinzüchten. Daß auch noch die Pettenkofer'schen auslösende Momente (das zeitliche, örtliche und individuelle Moment) eine Rolle spielen, ist ebenfalls unzweifelhaft. Schotte-Weimar spricht sich gegen die von Schlegel angeregte Anzeigepflicht für das ansteckende Verkalben aus. Die Viehbesitzer sind auf Selbstschutz hinzuweisen. Pfeiler-Jena bemerkt, daß der Bang'sche Abortusbazillus, wohl auch die vierte Forderung Robert Koch's erfüllt: künstlich angesteckte Tiere übertragen die Seuche auf gesunde. Von der Anzeigepflicht ist wegen der Rückwirkungen zu warnen. Die Immunitätsverhältnisse sind bei dieser Krankheit andere als bei anderen Krankheiten. Vielleicht handelt es sich überhaupt nach den Erfahrungen bei den praktischen Immunisierungsversuchen um keine „Moral“-Immunität, sondern um zellulärtherapeutische Vorgänge. Es ist im Interesse aller, besonders aber der Landwirtschaft, daß sich über den Antrag Zimmermann ausgesprochen wird. Es empfiehlt sich, die Angelegenheit einer Kommission zur Erledigung zu übergeben. Diese hat auch der Anregung v. Ostertag folgend Richtlinien für die Praktiker zur Bekämpfung der Seuche zu schaffen. Schermer-Göttingen weist auf die Konsequenzen der von Schlegel vorgeschlagenen Anzeigepflicht hin. In manchen Gegenden würden aus 50 Prozent aller vorhandenen Rinderbestände Verkäufe nur zum Schlachten stattfinden können, und zwar auf Jahre, ja auf Jahrzehnte hinaus. Die Verschleppung der Seuche läßt sich durch Selbsthilfe sehr gut vermeiden. Der Landwirt braucht nur seinen Bestand aus eigener Zucht zu ergänzen oder nur Kälber, Jungrinder und Bullen einführen. Wo aus wirtschaftlichen Gründen der Erwerb tragender Tiere erforderlich ist, muß stets noch eine Blutuntersuchung durchgeführt werden. Sie gewährt zwar keine absolute, aber immerhin eine 90prozentige Sicherheit. Ökonomierat Keiser-Berlin regt an, daß von einer Anzahl geeigneter wissenschaftlicher Stellen in engster Beziehung mit der Praxis nach einem bestimmten Plan in ein eingehendes Studium der weiteren Möglichkeiten der Bekämpfung des Abortus eingetreten wird. Er verspricht für die Bereitstellung von Mitteln einzutreten. Er spricht sich mit aller Entschiedenheit gegen die Anzeigepflicht aus, deren Einführung ungefähr das Gegenteil von dem erreichen würde, was man bezwecke. Knell-Gießen schließt sich im Prinzip der Auffassung von Schlegel, die Einführung der Anzeigepflicht betreffend, an. Es brauchen keine Sperren verhängt zu werden, sondern es genügen Dauerkennzeichnung der infizierten Tiere, die den Züchter als Käufer ermöglichen, den Zukauf kranker Tiere zu vermeiden. Ehrlich-Hannover regt an, die genaue Verbreitung des feuchtenhaften Verwerfens festzustellen, ähnlich wie es für die Verbreitung des Leberegel in die Wege geleitet worden ist. Mießner macht den Vorschlag, den Antrag Zimmermann dahin zu ändern, daß eine Kommission gewählt wird, die im Sinne von Ökonomierat Keiser festlegt, in welcher Richtung die Forschungsarbeiten hauptsächlich betrieben werden sollen. Mießner stellt darauf folgenden Antrag, der die Billigung der Versammlung findet:

„Es ist eine Kommission von Sachverständigen zu schaffen, die das ganze Abortusproblem eingehend prüft und die sich ergebenden noch ungeklärten Fragen als Richtlinien für die zukünftige Forschungsarbeit den Instituten bekannt zu geben hat. Gleichzeitig hat sie einen vorläufigen Bekämpfungsplan auszuarbeiten, der den praktischen Tierärzten als Richtschnur dienen kann. Die Auswahl der Kommissionsmitglieder wird der Zentrale für die Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten überlassen.“

Die Kommission besteht aus Ernst-München, Götz-Hannover, Karsten-Hannover, Mießner-Hannover, Schumann-Breslau und Zeller-Berlin-Dahlem.

Beitrag zum Studium der Kälberkrankheiten und ihrer Bekämpfung.

Von Dr. Hopfengärtner, Oberfleischheim.

Bei 322. untersuchten Fällen wurden Coliinfektionen (180), Proteusinfektionen (30), Paratyphusinfektionen (4), Enteritis-Gärtner-Infektionen (6) und Mischinfektionen (92) der genannten Erreger gefunden. Pathologisch-anatomisch fanden sich bei der Coliruhr meist Septikämieerscheinungen und ausgeprägte Darmveränderungen, besonders häufig im Rektum. Bei den Diplokokkeninfektionen wird auf die gummiartige Beschaffenheit der Milz hingewiesen. Für die Proteusinfektionen sind die schweren Veränderungen der Lunge, welche alle Stadien der Lungenentzündung zeigen kann, ferner die fibrinösen Auflagerungen auf Pleura-, Epi- und Endokard sowie häufig auch auf der Milz kennzeichnend. Die Obduktion in Fällen von Paratyphus- und Gärtnerinfektionen ergibt die Erscheinungen der Septikämie in wechselnder Ausprägung. Bei Paratyphusinfektionen ist das Bild der Septikämie häufig recht unvollständig und in manchen, besonders in Abheilung begriffenen Fällen, können lediglich abklingende Gelenkentzündungen, vereinzelte Organnekrosen und Darmschorfe, in denen sich die Erreger in lokaler Ansammlung befinden, festgestellt werden. Unbestimmt ist das pathologisch-anatomische Bild bei Mischinfektionen.

Die Coli- und Diplokokkeninfektionen beginnen mit schwerem Durchfall, der rasch bei verweigerter Nahrungsaufnahme zur Entkräftung und Hinfälligkeit führt. Bei den Proteusinfektionen beginnen die klinischen Erscheinungen zumeist am dritten Tage nach der Geburt. Die Kälber, die bis dahin gesund und munter erschienen, werden plötzlich schweratmig, trauernd und verweigern die Milchaufnahme. Beim Atmen oder beim Berühren des Thorax und Abdomens zeigen sie große Schmerzen. Auf die Füße gestellt, schwanken und zittern die Tiere. Sie gehen bei Beginn des Durchfalls spätestens in 48 Stunden zugrunde. Auch hier konnte ebenso, wie bei der Coliruhr, keine Genesung beobachtet werden. Das klinische Bild der Gärtnerinfektionen gleicht dem der Coliruhr, doch muß im Gegensatz dazu betont werden, daß die Gärtnererkrankungen erst in der dritten bis sechsten Lebenswoche aufzutreten pflegen. Mischinfektionen verlaufen unter den verschiedensten klinischen Symptomen, meistens äußerst stürmisch.

Neben allgemein hygienischen Maßnahmen, wie Auswahl gesunder, leistungsfähiger Zuchttiere, sachgemäße Haltung und Fütterung, peinlichster Nabelpflege, erscheint der Weg der aktiven Immunisierung mit stallspezifischen Erregern bei der Bekämpfung der Coliruhr, der Proteusinfektionen und der Paratyphus- und Gärtnerinfektion als besonders geeignet. Es ist der Veterinär-Polizeilichen Anstalt Schleißheim gelungen, auf dem Wege der aktiven Immunisierung der Muttertiere während der Trächtigkeit und der Kälber am ersten Lebenstage mit stallspezifischem Coliimpfstoff die Seuche in allen Fällen in kürzester Zeit zu tilgen. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß meist schon nach einmaligem Impfstoff Kälbersterbefälle nicht wieder aufgetreten sind. Dies spricht für eine kräftig einsetzende Schutzstoffbildung bei Einverleibung des spezifischen Antigens. Ähnliche Erfolge verspricht die Bekämpfung der Proteusruhr

mit stallspezifischen Erregern. Die Herstellung der Proteusvakzine bedarf besonderer Sorgfalt, da der hohe Toxingehalt und die bedeutende Virulenz von frisch aus den Organen gezüchteten Proteusstämmen leicht zu Impfschäden Veranlassung gibt. Die aktive Immunisierung war auch bei Paratyphus- und Gärtnerinfektionen von Erfolg begleitet.

Über den Wert der Mutterchutzimpfung bei der Coliruhr der Kälber und beim Paratyphus der Ferkel.

Von Dr. Rudolf, Wien.

Nach unseren gegenwärtigen Erkenntnissen gilt es als erwiesen, daß eine vom Muttertier gegen eine bestimmte Krankheit erworbene oder bereits vorhandene Immunität während des Fetallebens auch auf das Junge übergehen kann, wobei die vom Organismus gebildeten Antikörper durch den Blutkreislauf auf das Junge übertragen werden oder es findet das die Immunisierung auslösende Agens auf dem Plazentaring seinen Eintritt in das werdende Individuum. Man kann also nicht von einer „vererbten“ Immunität sprechen, sondern hier handelt es sich um eine „übertragene“ Immunität. Zur Bereitung der Vakzine gegen den Ferkeltyphus kamen abgetötete Paratyphus- und Schweinefeuchentämme, wie sie aus zur bakteriologischen Untersuchung eingefandten Kadavern gezüchtet worden waren, zur Verwendung. Die auf festen Nährböden gewonnenen Kulturen wurden abgescwemmt und in Porzellanschalen bei Brutkammertemperatur bis zur vollkommenen Eintrocknung gehalten. 15 Gramm des auf diese Weise erhaltenen Bakterienpulvers, das mit einem Spatel aus den Schalen abgeschabt wurde, gab in 1000 ccm $\frac{1}{2}\%$ Karbolkoehsalzlösung den gebrauchsfertigen Impfstoff. Bei der Kälberruhrvakzine wurden Coliruhr- und Paratyphusstämmen als Ausgangsmaterial verwendet. Die Gewinnung des Impfstoffes erfolgte auf die gleiche Weise wie bei der Ferkeltyphusvakzine nur mit der einen Abweichung, daß 2 Gramm des Bakterienpulvers in 1000 ccm $\frac{1}{2}\%$ Karbolkoehsalzlösung aufgeschwemmt wurden.

Die tragenden Mutterfäuen verfeuchter Bestände erhielten im zweiten oder bis zu Beginn des dritten Trächtigkeitsdrittels 10—15 ccm der Vakzine subkutan. Nach 14 Tagen Wiederholung der Impfung mit der doppelten Impfstoffmenge. Anfangs bekamen noch die neugeborenen Ferkel im Laufe der ersten Lebenswoche 2—3 ccm der Vakzine, eine Maßnahme, die, ohne den Erfolg zu beeinträchtigen, später unterlassen wurde. Die Kühe wurden stets zu Beginn des letzten Trächtigkeitsdrittels innerhalb 8 bis 14 Tagen anfangs mit 10—20 ccm der Vakzine geimpft. Die Impfdosis mußte aber im Verlauf der Versuche auf die Hälfte herabgesetzt werden, da unangenehme Impfreaktionen auftraten. Zur Vermeidung heftiger Reaktionen wurde mit gutem Erfolge zur fraktionellen Impfung geschritten. Die Kühe erhielten zunächst 2 ccm des Impfstoffes, traten innerhalb einer Stunde keine auffälligen Störungen zutage, so erfolgte die Einverleibung der restlichen Impfstoffmenge. Von Impfungen im letzten Trächtigkeitsmonat wurde Abstand genommen.

Aus den Erfolgen der Impfungen läßt sich schließen, daß mit einem entsprechend starken Antigen die intrauterine Immunisierung der Feten durch subkutane Impfung der Muttertiere möglich ist. Die Mutterblutimpfungen stellen daher ein wertvolles Hilfsmittel bei der Bekämpfung der Jungtierkrankheiten dar und verdienen weitgehend angewendet zu werden.

Am Nachmittage fanden eine Besichtigung des physikalischen Museums unter Leitung von Prof. Dr. Plate und eine Führung durch die Veterinäranstalt (Geheimrat Prof. Dr. Hobstetter) statt.

(Schluß folgt.)

Berichtigung.

Zur Typendifferenzierung der Bakterien der Paratyphus-Enteritisgruppe.

D. T. W. 1927, Nr. 40, S. 641, 1. Spalte unter 3, Reihe 12 muß es statt Zu 100 ccm einer 1prozentigen Peptonlösung heißen: Zu 1000 ccm einer 1prozentigen Peptonlösung.

Anatomie und Physiologie.

Baum, H.: Die Lymphgefäße der Gelenke der Schulter- und Beckengliedmaßen der Haustiere (Hund, Rind, Pferd und Schwein). Zeitschr. f. Anatomie u. Entwicklungsgeschichte (1. Abteilung der Zeitschr. f. die gesamte Anatomie), Bd. 84, Heft 1/2.)

Baum beschreibt vergleichend die Lymphgefäße der Gelenke der Schulter- und Beckengliedmaßen von Hund, Rind, Pferd und Schwein und die des Schweines im besonderen und macht Angaben über die in Frage kommenden Lymphknoten bei den vier Tierarten. Die einzelne Lymphknotengruppe bezeichnet er als Lymphocentrum (Lc.). Nach Baums Untersuchungsergebnissen suchen auf: a) Von den Gelenken der Schultergliedmaßen 1. die L. des Schultergelenkes beim: Hund das Lc. axillare, Rind das Lc. axillare (Ln. axillaris proprius und Lnn. axillares primae costae), Pferd das Lc. axillare, Lc. cervicale superficiale und Lc. cervicale caudale, Schwein das Lc. cervicale caudale. 2. die L. des Ellbogengelenkes beim Hund: das Lc. axillare, Rind das Lc. axillare (Ln. axillaris proprius und Lnn. axillares primae costae), Pferd das Lc. axillare und Lc. cubitale, Schwein das Lc. cervicale caudale. 3. die L. des Karpalgelenkes beim Hund: das Lc. axillare und das Lc. cervicale superficiale, Rind das Lc. axillare (Ln. axillaris proprius und Lnn. axillares primae costae und Lc. cervicale superficiale (ausnahmsweise), Pferd das Lc. cervicale superficiale (ausnahmsweise) und Lc. cubitale, Schwein das Lc. cervicale caudale und Lc. cervicale superficiale (aber nur die Lnn. cervicales superficiales ventrales). 4. die L. der Vorderzehengelenke beim: Hund das Lc. cervicale superficiale, Rind das Lc. cervicale superficiale,

Pferd das Lc. cervicale superficiale (aber nur vereinzelt) und das Lc. cubitale, Schwein das Lc. cervicale superficiale (aber nur die Lnn. cervicales superficiales ventrales) und Lc. cervicale caudale.

Die L. aller Gelenke der Schultergliedmaßen suchen auf: 1. beim Hund das Lc. axillare, Lc. cervicale superficiale, Rind das Lc. axillare, Lc. cervicale superficiale, Pferd das Lc. axillare, Lc. cervicale superficiale, Lc. cervicale caudale, Lc. cubitale, Schwein das Lc. cervicale superficiale (aber nur die Lnn. cervicales superficiales und Lc. cervicale caudale).

b) Von den Gelenken der Beckengliedmaßen suchen auf: die L. des Hüftgelenkes beim: Hund das Lc. iliacum mediale, Lc. inguinale profundum, Lc. sacrale (Ln. sacralis externus) (ausnahmsweise), Rind das Lc. iliacum mediale, Lc. inguinale profundum, Lc. sacrale (Lnn. sacrales externi) und Ln. ischiadicus, Pferd das Lc. iliacum mediale, Lc. inguinale profundum, Ln. coxalis und Ln. obturatorius, Schwein Lc. inguinale profundum. 2. die L. des Kniegelenkes beim: Hund das Lc. iliacum mediale, Lc. inguinale profundum und den Ln. femoralis medialis, Rind das Lc. inguinale profundum, beim Pferd das Lc. inguinale profundum, beim Schwein das Lc. inguinale profundum. 3. die L. des Tarsalgelenkes beim: Hund das Lc. iliacum mediale, Lc. inguinale profundum, Lc. popliteum und den Ln. femoralis medialis, beim Rind das Lc. inguinale profundum und Lc. popliteum, beim Pferd das Lc. inguinale profundum und Lc. popliteum, beim Schwein das Lc. inguinale profundum und Lc. popliteum. 4. Die L. der hinteren Zehengelenke beim: Hund das Lc. popliteum, Rind das Lc. popliteum und Lc. inguinale profun-

dum (nicht immer gelungen), beim Pferd das Lc. popliteum und Lc. inguinale profundum, beim Schwein das Lc. popliteum, Lc. inguinale profundum und Lc. inguinale superficiale.

Die L. aller Gelenke der Beckengliedmaßen suchen auf: beim Hund das Lc. iliacum mediale, Lc. inguinale profundum, Lc. sacrale (Ln. sacralis ext.), Lc. popliteum und den Ln. femoralis medialis, Rind das Lc. iliacum mediale, Lc. inguinale profundum, Lc. popliteum, den Ln. ischiadicus, das sacrale (Ln. sacralis ext.), Pferd das iliacum mediale, Lc. inguinale profundum, Lc. popliteum, den Ln. coxalis und Ln. obturatorius, Schwein das Lc. inguinale profundum, Lc. inguinale superficiales und Lc. popliteum.

Autoreferat.

Baum, H.: Die Lymphgefäße der Beckengliedmaßen des Pferdes. (B. T. W. Jg. 43, 1927.)

Baum beschreibt die Lymphgefäße der Beckengliedmaßen des Pferdes. Er schildert zunächst die in Betracht kommenden Lymphknoten, dann die Lymphgefäße der Haut, der Fascien, der Muskeln, Sehnen und Sehnencheiden, der Knochen und Gelenke der Beckengliedmaßen und die Lymphgefäße des Hinterhufes, dann von welchen Teilen der Beckengliedmaßen die einzelnen Lymphknotengruppen Lymphgefäße aufnehmen und zum Schluß die Topographie der Lymphgefäße der einzelnen Abschnitte der Beckengliedmaßen (Hinterhuf, Hinterzehe, Metatarsus, Tarsus, Unterschenkel, Kniegelenk, Oberschenkel, Hüftgelenk, Beckengegend, Schwanz).

Autoreferat.

Postma, C.: Über das Lymphgefäßsystem an Kopf, Hals und Schulter beim Schwein. (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene, Bd. 38, S. 1—2.)

Zur Klärung der Frage, ob der Buglymphknoten beim Schweine ein reiner Fleischlymphknoten ist, hat Postma die Untersuchungen Gregors wiederholt mit dem Ergebnis, daß man nicht berechtigt ist, dem Buglymphknoten noch einigen Wert für die Beurteilung des Fleisches beizulegen. Er erhält auch Lymphe aus dem Lymphknoten des Kopfes, indirekt aus den Tonfillen und stellt demgemäß einen Haut-Organ-Fleischlymphknoten dar. Im übrigen bestehen hinsichtlich des Lymphgefäßsystems an Kopf, Hals und Schulter des Schweines zahlreiche Variationen, von denen eine sehr wichtige ein Verbindungsgefäß zwischen Mandibular- und Buglymphknoten ist.

Edelmann.

Innere Medizin und Chirurgie.

Moussu, G.: Intoxications chez le mouton. (Recueil de méd. vét. 1927, T. C. III, S. 5.)

Verf. berichtet über größere Verluste in einer Schafherde hauptsächlich unter Lämmern, die auf das Verfüttern von Leinkuchen zurückgeführt werden mußten. Die vielfach vorgenommenen Untersuchungen der Kadaver der gefallenen Schafe verliefen stets negativ. Pathologisch-anatomische Veränderungen waren nicht nachzuweisen. Die Todesfälle hörten aber sofort unter den Schafen auf, die auf die Weide ohne Leinkuchenfütterung kamen, während unter den im Stalle verbliebenen männlichen Schafen die plötzlichen Todesfälle weiter vorkamen. Diese Tatsache führte zur Ermittlung der Ursache in der Leinkuchenverfütterung. In dem verfütterten ausländischen Leinkuchen wurde Linamarin, ein Blausäure abspaltendes Glycosid, nachgewiesen. Der Nachweis geschieht zweckmäßig durch Papierstreifen, die mit Pikrinsäure und nachfolgend mit Sodalösung getränkt sind. Bei Anwesenheit von Zyanwasserstoffsäure, die sich aus dem linamarinhaltigen Leinkuchen bei Feuchtigkeit und Brutwärme in 5—6 Stunden abspaltet, wird der gelbe Papierstreifen rotbraun — rot.

Baars.

Belitz, W.: Wiederkäuer und ihre Krankheiten im Altertum. (In.-Dissert. Berlin 1925.)

Da eine älteste Geschichte der Wiederkäuer und ihrer Krankheiten fehlte, hat es sich der Verfasser zur Aufgabe gemacht, alle erreichbaren Nachrichten darüber aus dem Altertum zu sichten und dabei der tierärztlichen Geschichtsforschung zu dienen. Nicht nur das antike Schrifttum, sondern auch alle anderen, bis in die graue Vorzeit reichenden Quellen, fanden eingehende Verwertung. Das Schächten der Wiederkäuer muß in den ersten Dynastien Ägyptens anders vor sich gegangen sein, wie wir es im mittleren Reiche sehen. Wir finden in Medun noch die Sitte, das Tier bei den Hörnern zu erfassen und zu köpfen; auch die Schnittwunde am Halse in den ältesten Darstellungen deutet darauf hin, daß den Tieren die Luftröhre in der früheren Zeit durchschnitten wurde. Diese Durchschneidung der Luftröhre fehlt in der 4., 5. und 6. Dynastie und erscheint erst wieder im neuen Reiche. Ein besonders hervorragendes literarisches Erzeugnis über Rinderkrankheiten und deren Behandlung ist der sog. Veterinärpapyrus von Kahun, zumal er der einzige Veterinärpapyrus ist und abgesehen vom Codex Hammurabi, das älteste vet.-lit. Dokument. — Die vielen krankhaften Veränderungen und Abnormitäten, die die Juden bei Untersuchung der Schlacht- bzw. Opfertiere fanden, haben sie in den „7 Hauptverletzungen“ untergebracht. Die Zahl verrät, daß aus babylonischen Quellen geschöpft sein muß. In der griechischen Literatur finden wir in der Einteilung der Krankheiten: Infektionskrankheiten, innere, äußere, durch schädliche Tiere hervorgerufene Krankheiten, Vergiftungen verzeichnet, ferner vorbeugende Maßnahmen, Steigerung des Nachwuchses in den Herden, Geschlechtsvorherbestimmung, Kastration, Mast und andere wirtschaftliche Maßnahmen. Bei den Römern ist diese Disposition der Krankheiten noch weiter ausgebaut. So erwähnt schon Vegetius 14 Maßnahmen, um die Rinder gesund zu erhalten. Die Arbeit von Belitz (128 Seiten mit 181 Literaturnummern) bietet im übrigen eine Fülle von interessanten Aufzeichnungen aller Völker im Altertum.

A.—

Grandérath: Novalgin in der Hundespezialpraxis. (B. T. W. 1926, S. 882.)

Verf. wendet das vorliegende Präparat in der Hundep Praxis meist subkutan mit bestem Erfolge an. Als einzige unangenehme Eigenschaft bei der Injektion muß ein nach letzterer auftretender heftiger Juckreiz mit in Kauf genommen werden, der sich aber durch kräftiges Massieren der Injektionsstelle und Ablenken des Tieres verhindern bzw. beheben läßt. Dosis bei kleinen Rassen dreimal täglich $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Tablette bzw. einmal täglich $\frac{1}{2}$ —1 ccm Novalgin subkutan, bei mittleren Rassen dreimal täglich 1—2 Tabletten bzw. 2 ccm subkutan, bei großen Rassen dreimal täglich 2 Tabletten bzw. 4—6 ccm subkutan.

Rheumatische und gichtische Fälle wurden durch das Mittel überraschend schnell gebessert und zur Heilung gebracht. Einige Fälle von schmerzhaftem Muskelrheismus bei Jagdhunden infolge Erkältung im Wasser gingen nach fünftägiger Behandlung (2 Injektionen im Tage) in Heilung über. Bei Staupe dient Novalgin im ersten Stadium symptomatisch als Entfieberungsmittel und regt den Appetit an. Eintretende Lungenaffektionen werden durch in kurzen Abständen verabreichte Injektionen abgekürzt, wobei sich das Allgemeinbefinden bessert. Gute Behandlungsergebnisse hatte Verf. außerdem bei Milchfieber, Wundfieber und fieberhaften Erkrankungen nach dem Gebären.

Carl.

Pohle: Meine Erfahrungen mit Introcid. (B. T. W. 1926, S. 902.)

Die Erfahrungen des Verf. erstrecken sich auf 7 Fälle von septischer Metritis bei Kühen und 2 Drusefälle bei Fohlen und sind in folgender Zusammenfassung niedergelegt:

Die von mir bei Anwendung des Introcids gemachten Erfahrungen bestätigen die souveräne Wirkung des Mittels bei septischen Prozessen, insbesondere Metritiden im Anschluß an Geburt oder Fehlgeburt, ferner bei Druse. Die Anwendung von höheren Dosen als 10 ccm dürfte in manchen Fällen angezeigt sein. Die lebensrettende Wirkung des Präparats tritt in solchen Fällen besonders stark hervor. Der wirtschaftliche Nutzen, den die Tierheilkunde besonders bei erkrankten wertvollen Muttertieren durch Erhaltung derselben für die Zucht leistet, rechtfertigt die Anwendung des Introcids an sich.

Carl.

Ritzenthaler, M.: Ist die Blutfleckenkrankheit des Pferdes ein anaphylaktischer Vorgang? (Schweiz. Arch. f. Tierheilkde. 1926, Bd. 68, S. 154—162.)

Verf. spricht die Vermutung aus, daß die Blutfleckenkrankheit zufolge ihres späteren Auftretens an eine Infektion möglicherweise ein Leiden anaphylaktischer Art sein könnte. Bei der Wichtigkeit, welche eine Auffassung in diesem Sinne haben muß, aber auch bei der Notwendigkeit diese Ansicht zu stützen, ist eine experimentelle Bearbeitung dieser Frage von sehr großer Bedeutung. Eingangs wird das Wesen der Serumanaphylaxie an einem Beispiel erläutert: Ein Kaninchen, das mit mehreren subkutanen Injektionen von Pferdeserum behandelt wird, zeigt nur örtliche Erscheinungen, während nach dieser genannten Vorbehandlung auf intravenöse Einspritzungen von Pferdeserum unter Atemnot, Krämpfen, Blutdrucksenkung, sehr rasch der Tod eintritt (anaphylaktischer Shock). Ein Tier, das diese tiefgreifende Wirkung überlebt, wird dann kachektisch und stirbt langsam, ohne direkte akute Symptome zu zeigen an Abmagerung, Ermattung, Hyperleukozytose. Die Anaphylaxie hat ein Inkubationsstadium von 7—8 Tagen, daran schließt sich eine Periode von wachsender, an diese eine solche stabiler Anaphylaxie an. Die Anaphylaxie kommt nur durch parenteral applizierte Proteine zustande. Die Anaphylaxie ist individuell verschieden, auch kann ein Eiweißkörper für einzelne Tiere ungiftig, für andere sehr giftig sein. Z. B. Pepton. Es gibt eine aktive und passive Anaphylaxie, eine spezifische und unspezifische. Darauf kann hier nicht eingegangen werden. — Es erhebt sich die Frage, ob beim Pferde mittelst einer primär untoxischen Proteinsubstanz ein anaphylaktischer Zustand erzeugt werden kann, dessen Erscheinungen denjenigen des Morbus maculosus ähnlich aussehen. Eine solche Substanz ist Hühnereiweiß. Dieses ist primär für Pferde ungiftig (intrajugulär bis 60 ccm). Bei kombinierter Injektion (subkutan und intravenös) tritt schon nach der 3. Injektion eine ausgesprochene Anaphylaxie auf, deren Symptome Gliedmaßenödem, Hämolyse, Petechien Epistaxis und lokale Läsionen, funktionelle Schwäche, Bradykardie, Fieber sind. Subkutane Injektionen von Hühnereiweiß sind jetzt von starken örtlichen Reaktionen (Abszeß) begleitet. Auch entstehen jetzt die Nasenpetechien, allgemeine Hyperämie und auch Cyanose der Schleimhäute. Injiziert man weiter, so werden die Erscheinungen schwächer: es bildet sich im Anschluß an die Anaphylaxie eine Immunität aus. Die geschilderten Erscheinungen gehören zum Symptomenbild des Morbus maculosus. D. h. durch Anaphylaxieversuch mit Hühnereiweiß erzeugt man beim Pferde einen dem Bild des Morbus maculosus ähnlichen Symptomenkomplex. Diese Erscheinungen beruhen nicht auf etwaigen Infektionen bei der Injektion. Der aktive anaphylaktische Zustand läßt sich auf ein zweites unvorbehandeltes Pferd durch Serum eines vorbehandelten Pferdes übertragen, das auf Hühnereiweiß dann mit ähnlichen Symptomen antwortet. Eine Ähnlichkeit zwischen den Symptomen des Morbus maculosus und der Anaphylaxie läßt sich somit nicht abstreiten. Jedenfalls sind hier sehr wichtige Befunde mitgeteilt.

H. Graf.

Friedrich: Die forensische Bedeutung der Anwendung von Zwangsmitteln beim Hufbeschlage. (B. T. W. 1927, S. 293.)

Auf Grund eigener Erfahrung und von Literaturstudien gelangt Verfasser zu folgenden diesbezüglichen Schlüssen: 1. Der Besitzer eines nicht schmiedefrommen Pferdes hat die Pflicht, sein Pferd durch geeignete Maßnahmen zum Beschlage vorzubereiten und den Schmied über die gefährlichen Eigenarten sowie über einen etwaigen, besonders hohen Wert des Pferdes in Kenntnis zu setzen. 2. Der Schmied darf ein nicht schmiedefrommes Pferd zum Beschlag nur dann annehmen, wenn er für den Umgang mit solchen Pferden geeignetes Personal in ausreichender Zahl und geeignete Räumlichkeiten und Zwangsmittel zur Verfügung hat. 3. Der Schmied ist berechtigt, die Zwangsmittel anzuwenden, die erfahrungsgemäß i. d. R. nicht zu erheblichen Beschädigungen der Pferde führen. Zu diesen sogenannten erlaubten Zwangsmitteln gehören: Das Strafen mit der Trense, das Verbinden der Augen, die Anwendung eines Handtuches zum Aufhalten der Füße, der Gebrauch des Kappzaums und der Strickbremse an der Oberlippe, das Ermüden durch Rückwärtstretenlassen, der Notstand. 4. Der Schmied hat die Art der anzuwendenden Zwangsmittel zu bestimmen und die ordnungsmäßige Anwendung derselben zu überwachen. 5. Mit Dummkoller behaftete Pferde, Vollblutpferde und solche, die zum Notstand zu klein sind, dürfen ohne Einverständnis des Besitzers im Notstande nicht beschlagen werden. 6. Nasenbremse und Betäubungsmittel dürfen bei Pferden, die im Notstande beschlagen werden, nicht angewendet werden. 7. Schmiedefromme Pferde nur mit Einwilligung dürfen im Notstande des Besitzers beschlagen werden. 8. In Gegenden, in denen die Anwendung eines sogenannten Beschlagstandes zum Beschlagen schwerer Pferde allgemein üblich ist, ist der Schmied berechtigt, schmiedefromme Pferde ohne besondere Erlaubnis des Besitzers in dem Beschlagstande zu beschlagen, sofern letzterer auf diese Pferde nicht beunruhigend wirkt.

Carl.

Braumann v., C.: Lebensgefahr im Kampfsport. (Aus der Chirurgischen Universitäts-Klinik Berlin.) (Münch. m. W. 1927, S. 634.)

Im Hinblick auf den vor kurzem vorgekommenen tödlichen Ausgang einer Schlägermenschur in Berlin wirft Verfasser die Frage auf, ob letztere als „Zweikampf mit tödlichen Waffen“ bewertet werden muß, und ob die Schlägermenschur im Verhältnis zu anderen, nicht angegriffenen Sportarten eine erhöhte Gefahr für das Leben bedeutet. Daß der Schläger als solcher eine tödliche Waffe darstellt, kann nicht geleugnet werden. Er verliert aber durch den bei der Bestimmungsmenschur üblichen Schutz des Körpers durch Bandagen seinen gefährlichen bzw. tödlichen Charakter. Verfasser konnte seit 1864 neun Fälle von Tod nach Schlägermenschur zusammenstellen, bei denen jedoch der Zusammenhang mit der Menschur insofern nur ein mittelbarer ist, als die Todesursache mit einer nachträglich eingetretenen Blutvergiftung, mit Straucheln während des Fechtens usw. zusammenhängt. Auf der andern Seite konnten sei 1900 neunzehn Todesfälle im Anschluß an den Boxkampf nachgewiesen werden. Von diesen müssen mindestens acht Fälle als direkte Folge des Boxens angesehen werden. Die Faust des Boxers ist also nach der Statistik eine viel lebensgefährlichere Waffe wie der Schläger. Verfasser gelangt am Schlusse seiner Ausführungen zu dem Ergebnis, daß die Schlägermenschur einen nationalen Sport darstellt, und daß keine Veranlassung dazu vorliegt, ein Kampfsport zu verbieten, daß mit Waffen ausgetragen wird, die bei Anwendung der vorgeschriebenen Schutzmittel keineswegs tödlich sind. Eine solche Entscheidung würde eine Sportart verbieten, die nachweislich so gut wie gar keine direkte Lebensgefahr darbietet, während zahlreiche andere Sportarten vom Staat weiter gebilligt werden; bei denen sich zahlreiche direkte Todesfälle als Folge der Ausübung dieser Sportzweige ereignen.

Carl.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Priewe, W.: Die sero-therapeutische Behandlung der Maul- und Klauenfeuche mit Maul- und Klauenfeuche-Hochimmunserum. (Tierärztl. Rundsch. 1926, S. 735.)

Auf Grund reicher Erfahrungen und Beobachtungen ist der Verf. in der Lage, die Impferfolge des Seuchenjahres 1926 zusammenfassend zu bewerten: Der Vergleich zwischen heil- bzw. simultanbeimpften Beständen und solchen, in denen keine oder nur andere Mittel zur Anwendung gelangten, spricht eindeutig zugunsten der erstgenannten Bekämpfungsmethode. Ganz unabhängig von dem Grad der Seuche wurde stets durch die Serumimpfungen ein günstiger Krankheitsverlauf herbeigeführt. Todesfälle wurden auf diese Weise ebenfalls vermieden. Bei Jungrindern und Schweinen schlug das Serum immer besonders vorteilhaft an. Die Verbindung der Serum- mit der symptomatischen Therapie hat sich als ratsam und erfolgreich gezeigt. Nachkrankheiten werden ganz zu Unrecht auf mangelhafte Serumwirkung zurückgeführt. — Die Ausführungen des Verfassers schließen mit einem Beitrag zur Geschichte der Maul- und Klauenfeuche. H.

Raebiger, H.: Eine Blütenlese unter Maul- und Klauenfeuchemitteln. (Tierärztl. Mitt. 1926, S. 553.)

Aphthex, Ammonit, Ernanin, Franz'scher Extrakt, Habeka, Halsusan, Kupferlecksalz, Matafto, Neosanob, Rumerol, Seegerol, Seethol und Taurisana sind als Auswahl aus der großen Zahl von Geheimmitteln herausgegriffen und ihrer negativen Bedeutung für die Bekämpfung und Heilung der Maul- und Klauenfeucheerkrankung entsprechend gekennzeichnet. Wohl verursachen sie dem Landwirt, den die in großer Reklame ausbreiteten Versprechungen anlocken, erhebliche Unkosten, ohne jedoch auf Grund ihrer meist primitiven Zusammensetzung und der ganz unzulänglichen Wirksamkeit ernster Kritik und gründlicher Nachprüfung standhalten zu können. Der Verf. betont, daß einer sachlichen Bewertung von Heilmitteln immer eine gründliche wissenschaftliche Bearbeitung und Erfahrung in den allgemeinen Seuchenverhältnissen zugrunde liegen muß. Die von Einzelfällen herrührende Zufriedenheit von Landwirten kann dafür nicht in Betracht gezogen werden. H.

Vendel, S. N.: A Danish research worker's notes. (Mitteilungen über experimentelle Untersuchungen in Dänemark.) (Veterin. record. 1926, Bd. 6, S. 931.)

Vendel hat sich mit der Auffindung des Maul- und Klauenfeucheerregers befaßt und glaubt ihn durch bestimmte Färbung im Blute akuter erkrankter Rinder sichtbar gemacht zu haben. Bei den vorgenommenen Blutuntersuchungen fielen ihm 3—7 μ große korpuskuläre Elemente auf, die zu Beginn der Erkrankung stets sehr zahlreich vorhanden waren. Der Verf. spricht sie für die Konidien einer Monila-Art und für die eigentlichen Erreger der Maul- und Klauenfeuche an. Beim Seuchenrückgang sind die bezeichneten Körperchen seltener und im Blute gefunder Tiere überhaupt nicht zu finden. Das Vorhandensein von filtrierbaren Sporen, die kaum oder nur schwer sichtbar zu machen sind und Ansteckungsfähigkeit besitzen, wird vom Verfasser nicht in Frage gestellt. Da die Abnahmeziffer des Blutzuckers maul- und klauenfeuchekranker Kühe bei 0,07 Prozent liegt, so wird die künstliche Züchtung auf zuckerhaltigen Nährböden für aussichtsvoll angesehen. Die sekundäre Bedeutung der anderen vom Verf. zahlreich bei der Maul- und Klauenfeuche gefundenen Bakterien wird mit der des Bac. suipestifer bei der Schweinepest verglichen. — Die therapeutische Wirkung des Jodkalium wird, nach entsprechender Anwendung bei 100 kranken Kühen, der des Rekonvaleszentenferum gleich- und auch übergeordnet. H.

Stockman, Steward and F. C. Minett: Experiments on foot-and-mouth disease. (Experimentelle Arbeiten über Maul- und Klauenfeuche.) (Journ. of comp. pathol. a. therapeut. 1926, Bd. 39, S. 231.)

Die Verff. bestätigen in dieser Veröffentlichung unter Aufgabe der früheren englischen Auffassung nicht nur die von Vallée und Carré begründete Dualität des Maul- und Klauenfeuchevirus, sondern auch die in dieser Richtung von Waldmann und Trautwein angelegte umfangreiche Nachprüfung sowie die gleichzeitig durch ihre Arbeiten ausgebaute Theorie von der Pluralität der Virustypen. Als Untersuchungsmaterial standen den englischen Forschern 20 Virusproben und als Versuchstiere Meerfischweinch, Rinder, Schafe und Schweine zur Verfügung. Experimentiert wurde mit einem Virusstamm G. F. aus Deutschland, zwei Virusstämmen A und O aus Frankreich und 17 Virusproben aus England. Das englische Material war aus zwölf spontan entstandenen Seuchenherden gesammelt worden. Es mußte von den Autoren nach den vorliegenden Ergebnissen 16mal zur Virusgruppe O und einmal zur Gruppe A als zugehörig bezeichnet werden. Darunter fanden sie nicht den von den deutschen Forschern ermittelten Virustyp C. Wie diese machten auch die englischen Autoren die Beobachtung, daß Pluralitätsversuche am Meerfischweinch stets exakte Ergebnisse zeigen, bei Rindern aber zu 23 Prozent negativ ausfallen. Hierfür glauben Stockman, Steward und Minett eine Erklärung geben zu können, indem sie spontan empfänglichen Tieren den Besitz einer Gruppenimmunität nach erfolgter Durchseuchung zuschreiben. Damit die Überwindung dieser Reinfektionshemmung mit einem fremdstämmigen Virustyp gelingen kann, wird der Anwendung einer ausreichenden Virusmenge ausschlaggebende Bedeutung zuerkannt. — In einem weiteren Abschnitt zusammengefaßt lassen die angestellten Ermittlungen hinsichtlich klinischer Erscheinungen keine besonderen Abweichungen der einzelnen Virusarten zum Ausdruck kommen. Bei Rindern, Schafen und Schweinen wurde die Infektion intramuskulär vorgenommen, die Inkubationszeit auf 16—212 Stunden berechnet und Todesfälle nicht verzeichnet. — Die Verf. schildern am Schluß ihrer Ausführungen Versuche an Meerfischweinch und Kälbern zur Erzielung von Kontaktinfektionen, die bei engstem Zusammenleben akut kranker mit gesunden Tieren nur nach künstlicher Öffnung der Primäraffekte des Meerfischweinchs die kontagiöse Erkrankung beim Kalbe zum Gelingen brachte. Aus diesem Grunde sind auch als Seuchenvermittler Ratten nicht ernstlich in Betracht zu ziehen. H.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Bemelmans, E.: Die Fütterung von gequetschtem Hafer. (Zeitschrift für Vet.-Kunde 1927, Heft 4.)

Bemelmans glaubt nachgewiesen zu haben (siehe Militaire Spectator 1926), daß ein Haferkorn, welches nicht zerkaut worden ist, in demselben Zustand unverändert mit dem Dünger ausgeschieden wird. Beweis dafür ist die unversehrte Keimkraft. Es ist nach ihm ganz ausgeschlossen, daß die Verdauungssäfte durch die unversehrte Spelze bis auf das Stärkekörnchen vordringen, die Nährbestandteile auflösen, und daß die aufgelösten Stoffe durch die unversehrte Spelze diffundieren können. Dies gilt auch für Menschen, die u. a. Beeren, Erbsen, Bohnen usw., wenn sie gierig und unzerkleinert verschluckt werden, selbst wenn die letzterwähnten in der unzerkleinerten Schale gargekocht sind. Indem von Pferden gewöhnlicher Hafer ungenügend gekaut wird, geht täglich eine ungeheure Menge an Nährstoffen des Hafers ungenutzt verloren. Dem wird dadurch vorgebeugt, daß der Hafer den Pferden gequetscht verabreicht wird. Unwiderleglich ist nachgewiesen, daß der Verdauungskoeffizient des gequetschten Hafers erheblich höher ist, da die Verdauungssäfte besser auf das Stärkekorn einwirken können (Gewichtszunahme, Besserung des Nährzustandes). Einwände, welche früher gemacht wurden, sind nicht stichhaltig (ungenügende Speichelung, Avenintheorie, Veranlassung zu Verdauungsstörungen, Schwierigkeiten bei

der Verteilung; rasches Schwitzen, schnellere Ermüdung usw.) Mit Rücksicht darauf, daß die Unkosten für das Quetschen des Hafers nur gering sind und daß der Nährwert des Hafers, wenn er gequetscht ist, sich erheblich steigert, ist die Ansicht widerlegt, als wäre der Nutzen, der damit erzielt wird, mit den Kosten nicht in Einklang zu bringen. Es ist sehr zu raten, daß gequetschter Hafer sowohl an Zivil- als an Militärpferde verfüttert wird. Leutnant v. Albert gibt an, daß er stets gequetschten Hafer an seine Pferde verfüttert und dabei solche Ersparnisse gemacht habe, daß er sich dauernd im Frieden ein Pferd über die Zahl hinaus halten konnte. Die Pferde waren bei dieser Fütterung stets in bester Kondition und großen Anstrengungen gewachsen. Niemals entstanden Krankheiten oder sonst irgend ein Nachteil.

Standesangelegenheiten.

2. Wissenschaftlicher Referierabend an der Tierärztlichen Hochschule Hannover am 16. Januar 1928.

Th. Thur: Die Bedeutung des wissenschaftlichen, insbesondere des biologisch-medizinischen Films, für Unterricht und Forschung.

Als bald nach Erfindung der Kinematographie suchte die Wissenschaft, die selbst und ganz besonders die Bewegungsphysiologie den Anstoß dazu gegeben hatte, auch dieses technische Hilfsmittel in ihren Dienst zu stellen. Das gelang zunächst nur teilweise, da sich mit den übernommenen Mitteln gewisse Vorgänge, wie Operationen und Vivisektionen, nur schlecht wiedergeben lassen. Es mußten für diese besonderen Zwecke wie auch für die Mikrokinematographie die vorhandenen Hilfsmittel erheblich modifiziert und neu geschaffen werden. Das Problem der Aufnahme von Operationen ist durch das Verfahren nach Dr. v. Rothe-Berlin, in einwandfreier Weise gelöst. Die Bedeutung des medizinischen Films für Unterricht einerseits und Forschung andererseits läßt sich nach diesen beiden Verwendungszwecken nicht reinlich scheiden und abgrenzen, da ja die Ergebnisse der Forschung Gegenstand des Unterrichts darstellen. Durch den Film läßt sich jedwede Bewegung im Makro- und Mikrokosmos festhalten und in vollkommen naturgetreuer Form reproduzieren. Für die Bewegungsphysiologie ist der Film zur Analyse von Bewegungsvorgängen aller Art ein unentbehrliches Forschungsmittel geworden. Durch Verwendung der Zeitlupe lassen sich Bewegungen ganz beträchtlich verlangsamen, so daß dadurch erst ihr eingehendes Studium ermöglicht wird. Mit dem Zeitraffer können träge Bewegungen zeitlich zusammengefaßt und auf diese Weise unter Umständen erst sichtbar werden. Durch den Film ist ferner die Möglichkeit der Fixierung und Sammlung wertvollen und selten zur Beobachtung kommenden Materials gegeben. Von ganz besonderem Wert für den Unterricht ist beim Film der gewaltige Vorteil der Unabhängigkeit von Raum, Zeit und Material, wodurch er als ganz besonders wertvolles Hilfsmittel der tierärztlichen Fortbildung zu dienen berufen ist. Ein erheblicher Vorteil gegenüber dem lebenden Material bei Demonstrationen ist in der gleichguten Sichtbarkeit von allen Plätzen des Unterrichtsraumes begründet. Vorwiegend für Zwecke des Unterrichtes hat der Referent auf Anregung des Direktors des Physiologischen Institutes der Tierärztlichen Hochschule, Prof. Dr. Trautmann, soweit Institutsmittel hierfür zur Verfügung standen, eine Reihe Filme aufgenommen, von denen einzelne im Verein mit einem fremden zur Illustrierung des Vortrages vorgeführt und erläutert wurden. Es wurden gezeigt: Thur: Versuche am isolierten Frochherzen und am freigelegten Säugetierherzen. Thur: Die Registrierung des Blutdruckes. Thur: Bewegungsvorgänge an Pflanzen: Mimosa pudica. Wetzel und Thur: Bewegungen der Onkosphären von Davainea proglottina. Thur: Die amöboide Bewegung der Leukozyten. Krogh: Kapillarkreislauf und Kapillarreaktionen am Frosche.

Um die Verwendung des Films auf dem weiten Felde der praktischen Medizin zu zeigen, führte Herr B. Valentin eine prachtvolle Aufnahme der Betätigung eines erwachsenen Mannes mit Phocomelie und solche über Bewegungsarten bei an spinaler Kinderlähmung Erkrankten aus dem Annaftift in Kleefeld vor. Zietzschmann.

Die Ärzteshausgenossenschaft e. G. m. b. H. Hannover.

Am 22. Januar 1928 wurde in Hannover im Beisein der Behörden,

der Direktoren der beiden hannoverschen Hochschulen sowie zahlreicher Akademiker das Haus der Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte und Apotheker in der Hildesheimer Straße 23–24 eingeweiht. Nach einem Vorspiel des bekannten Löffelquartetts sprach Architekt Rebahn, der Erbauer des Hauses, allen feinen Mitarbeitern besten Dank aus. Dr. med. dent. h. c. H. Addicks I begrüßte die Anwesenden. Der 1. Vorsitzende des Vorstandes Dr. med. Georg Meyer, der die Anregung zu dem Bau gegeben hatte, setzte in Kürze die Entstehungsgeschichte auseinander. Das Haus verfügt über einen großen Vortragsraum mit allen Einrichtungen der Neuzeit für etwa 500 Personen, dazu einen kleineren Sitzungsraum, einen Erfrischungsraum sowie zahlreiche Wirtschaftsräumlichkeiten zur Unterbringung der einzelnen Organisationen. Der Ausbau der Bücherei und die Schaffung einer Lesehalle sind in Aussicht genommen. Der Vortragsraum selbst soll nicht nur der Ärztesgenossenschaft, sondern auch den übrigen akademischen Berufen bereitwillig zur Verfügung gestellt werden. Im Anschluß daran sprach Prof. Dr. Kappis „Über den Schmerz“. Das Streichquartett beendete die eindrucksvolle Feier. Bei dem nun folgenden Festessen antworteten auf die Begrüßungsansprache des Vorsitzenden Dr. Georg Meyer, der Oberbürgermeister Dr. Menge, Prof. Dr. Mießner-Hannover und Prof. Dr. Lochte-Göttingen sowie der Vorsitzende des Verbandes der Ärzte Deutschlands Dr. Steffer-Leipzig.

Es ist erfreulich, daß an so günstiger Lage ein Haus entstanden ist, das den zu einer Genossenschaft vereinten medizinischen Berufszweigen eine dauernde Unterkunft gewährt. Hoffentlich findet dieses Beispiel in anderen Städten bald Nachahmung und führt die so nahen Berufe zu gemeinsamer Arbeit zusammen. Es wäre zu wünschen, daß die Tierärzte dort bald eigene Geschäftsräume bekämen, ebenso sollten alle Tierärzte der Provinz Hannover durch ihren Beitritt die Bestrebungen der Genossenschaft unterstützen und auch äußerlich ihre Zugehörigkeit bekunden.

Mr.

Verschiedene Mitteilungen.

Antwortschreiben des Herrn Reichspräsidenten.

Auf das Begrüßungstelegramm an den Herrn Reichspräsidenten gelegentlich des Rektoratswechsels an der Tierärztlichen Hochschule Hannover*) ist folgendes Antwortschreiben mit eigenhändiger Unterschrift eingelaufen:

Der Reichspräsident.

Berlin, den 20. Januar 1928.

Euer Magnifizenz und den zur Feier des Rektoratswechsels an der Tierärztlichen Hochschule Hannover Versammelten spreche ich für das freundliche Begrüßungstelegramm meinen herzlichsten Dank aus. Ich verbinde damit meine besten Wünsche für eine erfolgreiche Amtstätigkeit.

Mit freundlichem Gruss!
gez. Dr. med. vet. von Hindenburg.

Akademische Nachrichten.

Privatdozent Dr. Johannes Dobberstein aus Graudenz ist zum ordentlichen Professor für pathologische Anatomie an der Tierärztlichen Hochschule in Berlin ernannt worden.

Obermedizinalrat Prof. Dr. med. vet. et phil. Klimmer wurde für das Dekanatsjahr — 1. 11. 1927 bis 31. 10. 1928 — von der Vet.-med. Fakultät der Universität Leipzig zum Dekan gewählt.

Ehrenpromotionen.

Die veterinärmedizinische Fakultät der Universität München, hat anlässlich der 1. Sitzung der bayerischen Landeskammer für Tierärzte, Staatsminister des Innern Dr. med. h. c. Karl Stützel und Ministerialrat Dr. med. h. c. Heinrich Wirsching für ihre Verdienste um den tierärztlichen Stand zu Ehrendoktoren ernannt.

Tierärztliche Hochschule Hannover.

Für die Bearbeitung der im Studienjahr 1927/28 an der Tierärztlichen Hochschule Hannover gestellten Preisaufgabe „Die Ruhr der Küken und ihre Bekämpfung. Eine literarische Studie.“ ist durch Beschluß des Professoren-Kollegiums dem cand. med. vet. Hugo Wernery aus Münster i. W. der I. Preis verliehen worden. Dem cand. med. vet. Erich Deutsch aus München wurde der II. Preis zuerkannt.

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 3, S. 48.

Gemeinfame Reichsgründungsfeier der Tierärztlichen und Technischen Hochschule zu Hannover.

Die Akademische Reichsgründungsfeier der beiden Hannoverschen Hochschulen fand am 18. Januar 1928 mittags 12 Uhr in der Stadthalle statt. Nach Einzug der Choren mit Fahnen und der Professoren eröffnete der Rektor der Technischen Hochschule Prof. Dr. Quinke mit einer inhaltvollen Weiherede, in der er der Bedeutung des 18. Januar 1871 gedachte, die Feier. Als Vertreter der Hannoverschen Studentenschaften hielt cand. med. H. Becker folgende Ansprache:

Der großdeutsche Gedanke.

„Unser Blick schweift heute zurück zu jenem großen Tage, des 18. Januar 1871, und wir sehen in den Spiegelfällen von Versailles die Vollendung des Meisterwerkes eines Bismarcks. Dieser Tag hat für die Deutsche Studentenschaft mit ihrer großdeutschen Einstellung eine ganz besondere Bedeutung. In der Geschichte der Entwicklung des deutschen Volkes von Kleinstaaterei und Zerissenheit zu Geschlossenheit und Freiheit ist er uns ein Markstein. Von jeher finden wir in der deutschen akademischen Jugend Bestrebungen, die darauf hinzielen, das zerplitterte deutsche Studententum und darüber hinaus alle Teile des deutschen Volkes zu einen. Schon 1817 und 1848 entstehen aus diesen Bestrebungen die ersten Vorläufer der Deutschen Studentenschaft. Aber erst ein ganzes Jahrhundert später wurde die Deutsche Studentenschaft — wie wir sie heute vor uns sehen — gegründet. Nach dem unglückseligen Ausgange des schrecklichsten aller Kriege, der Deutschlands Größe und Freiheit zer schlagen hatte, wollte die studierende Jugend nicht von ihrem Ziele der Einheit und Freiheit des deutschen Vaterlandes lassen. Aus diesem Gedanken heraus schlossen sich die, die draußen im Felde Verantwortung gelernt hatten, zusammen und gründeten in Würzburg die Deutsche Studentenschaft. Über trennende Grenzen hinweg sollte die Deutsche Studentenschaft alle Studenten des deutschen Sprachgebietes umfassen. Sie wollte großdeutsch sein, und darin liegt die geschichtliche Bedeutung ihrer Gründung, daß in einer Zeit — wo äußerer Zwang und innere Unentschlossenheit eine staatliche Zusammenfassung aller Deutschen verhinderte — die studentische Jugend den **großdeutschen Gedanken** in der Form der eigenen Organisation in die Tat umsetzte. Aber noch ist kein Jahrzehnt ins Land gegangen, und eben beginnen die Wunden des Krieges zu vernarben, da regt sich auch wieder deutscher Parteigeist, der versucht, die Einheit der Deutschen Studentenschaft zu zerstören. Vor nicht ganz zwei Monaten mußten auch wir uns entscheiden, ob all dieses uns höher stand als staatliche Anerkennung. Und mancher, der bisher skeptisch der idealen Gefinnung der heutigen Studentenschaft gegenüberstand, hat sich durch ihre Stellungnahme eines Besseren belehren lassen müssen. Auch der heutige Student ist sich bewußt, daß die Geschichte des deutschen Studententums ihn verpflichtet zur Erfüllung hoher nationaler Pflichten. Für uns heißt es jetzt, nicht lange mehr dem nachzutraumern, was gewesen, sondern klaren Blicks in die Zukunft zu schauen und auf neuer Grundlage die Arbeit fortzusetzen, zum Wohle dessen, für das 20 000 Kommilitonen ihr junges Leben geopfert haben.“ Seinen Ausführungen folgte der gemeinschaftliche Gefang „Burichen heraus!“ Der Ordinarius für Anatomie an der Tierärztlichen Hochschule Prof. Dr. Zietzschmann hielt sodann die übliche wissenschaftliche Festrede^{*)}. Er sprach über „Die Bedeutung der in Rückbildung befindlichen (der rudimentären) Organe für das biologische Geschehen“.

M r.

Reichsgründungskommers der Alt- und Jungakademiker zu Hannover.

Die Studentenschaften der Technischen und Tierärztlichen Hochschule feierten am 18. Januar 1928 in Gemeinschaft mit den Altakademikern Hannovers den Reichsgründungskommers. Vertreten waren außerdem die Rektoren beider Hochschulen mit zahlreichen Professoren, die Spitzen der Behörden, von Industrie, Handel und Landwirtschaft. Der Kommers wurde durch cand. med. vet. Siegert (Burichenschaft „Cheruscia“) geleitet. Er gedachte in der Begrüßungsrede des engen Zusammenhaltes der Professoren und der übrigen Altakademiker mit der Studentenschaft. Prof. Dr. Mießner dankte im Namen der beiden Hochschulen und der Gäste und wies auf den erfreulichen Idealismus der Jugend hin und auf das, was die Deutsche Studentenschaft nach 1919

geleistet. Sie war führend auf dem Gebiete der Leibesübungen, der Wirtschaftshilfe, der Abwehr gegen Verunglimpfungen im Auslande. Die „Deutsche Studentenschaft“ hat sich von Anfang an vor allen anderen Volkskreisen in klarer und leuchtender Weise herausgestellt. Syndikus Dr. Vier hielt als Vorf. des Bundes Alter Akademiker zu Hannover die Festrede. „Zum ersten Male begehen Jung- und Altakademiker den Reichsgründungstag gemeinfam. Das soll uns ein Symbol sein! Wir wollen erhalten das Deutsche Reich vom 18. Januar 1871, wir wollen beseitigen das Versailles von 1919. Bittere Jahre liegen hinter uns, über uns schwebt das Dawes-Abkommen, Millionen deutscher Stammesbrüder sind noch von uns getrennt. Doch von Genf dürfen wir nicht allzu viel erwarten, denken wir nur an die Behandlung der Minderheitsfrage! Es ist gut um den Pazifismus, aber überlassen wir ihn jetzt einmal den anderen, wir haben genug davon gezeigt. Sorgen wir dafür, daß die große Zeit, die, wie jede Geschichte lehrt, einmal wiederkommen wird für Deutschland, auch große Männer findet. Man redet viel vom akademischen Führertum, aber mit unserer besseren Vorbildung ist noch nichts getan, wir müssen unsere sittlichen Qualitäten herausbilden, unsere Ichsucht beseitigen, es darf nicht bei schönen Kommersreden bleiben. Arbeiten Sie mit, liebe Kommilitonen, nicht mit Worten, sondern mit Taten. Auf zur Tat.“

M r.

Reichsgründungsfeier und Rektoratsübergabe an der Tierärztlichen Hochschule Berlin am 18. Januar 1928.

In der im Schinkel'schen Stil neu hergerichteten Aula bot die Reichsgründungsfeier ein schönes Bild. Nach dem Aufmarsch der Chargierten und Einzug der Professoren mit zahlreichen Ehrengästen erstattete der scheidende Rektor Prof. Dr. Schöttler den Bericht über die Tätigkeit und Vorgänge an der Hochschule in den letzten zwei Jahren. Er wies darauf hin, daß die Zahl der ordentlichen Professoren sich durch die Schaffung eines Institutes für Parasitenkunde und Veterinärmedizinische Zoologie um eine vermehrt hat, daß sieben Herren sich habilitiert haben, 109 Tierärzte promoviert wurden und 86 Kandidaten die Fachprüfung bestanden haben. Anschließend ernannte er Staatsminister a. D. Dr. h. c. Wendorff zum ersten Ehrenbürger der Hochschule. Als äußeres Zeichen erhielt dieser die von Bildhauer Wagner geschaffene Medaille, die an einem lila Bande mit rot-weißer Einfassung am Halbe getragen wird. Die Medaille zeigt auf der Vorderen Seite den Kopf Friedrichs des Großen als den Schöpfer der Berliner Hochschule und auf der Rückseite die Aesculap-Schlange. Danach übergab Prof. Schöttler dem neu ernannten Rektor Prof. Dr. Stang die Amtskette. Nach kurzen Worten des Dankes an den Prorektor sprach Prof. Stang über „Vererbungslehre und ihre Anwendung in der landwirtschaftlichen Tierzucht“. Er schilderte zunächst die große wirtschaftliche Bedeutung der Tierzucht, deren jährliche Erzeugnisse sich auf viele Milliarden belaufen. Danach gab er einen kurzen Überblick über die mannigfachen Theorien und Hypothesen der Vererbung, als deren erste er die von Hippokrates geschaffene Präformationstheorie bezeichnete, an deren Stelle später die Epigenesistheorie kam. Neuere Wege bahnten Lamarck und Darwin. Große Fortschritte machte aber die Vererbungslehre erst, als der planmäßige Versuch in den Dienst der Sache gestellt wurde. Der Redner schilderte dann kurz das Wesen der Variation, Mutation, der Vererbung erworbener Eigenschaften und Vererbung des Geschlechts. Als besonders wichtig für die landwirtschaftliche Tierzucht bezeichnete er die Lehre von Genotyp als dem durch die Erbmasse geschaffenen Veranlagungsprägen und dem Phänotyp als dem Ergebnis von Lebenslage plus Genotyp. Er warnte vor der viel verbreiteten Meinung, ein Zuchtstier nach seinem Äußeren auf den Zuchtwert beurteilen zu wollen, denn da das Äußere leicht einen Phänotyp darstellen kann, so ist eine Täuschung leicht möglich. Übergehend zu dem Wesen des Mendelismus schilderte er die Ergebnisse der Kreuzung verschiedener Rassen, mit denen wohl Gebrauchstiere, niemals aber Zuchtstiere geschaffen werden können. Für die Großtierzucht hat der Mendelismus nur mittelbare Bedeutung. Nach Mendel'schen Grundsätzen können höchstens kleine, sich schnell vererbende Tiere wie Kaninchen und Geflügel gezüchtet werden, denn die vielen Eigenschaften, die wir in Form, Farbe und Leistungen von unseren Großhaustieren verlangen, verbieten eine Kombination. Nützlich war aber der Mendelismus durch Aufklärung früher fraglicher Verhältnisse wie Atavismus, Verdrängungszucht, Züchtung intermediärer Vererbung sowie verschiedene Inzuchtfragen. Übergehend zu der Bedeutung der Tierzucht für die Ernährung des Volkes und erinnernd an die Not

^{*)} Erscheint im Original in dieser Wochenschrift.

während des Krieges, kam der Redner auf die heutigen vaterländischen Verhältnisse zu sprechen und schloß mit einem Hoch auf das Vaterland und den Reichspräsidenten. Cand. med. vet. Krüger-Teutoniae als der Sprecher der neu gegründeten „Vereinigung der Studierenden der Tierärztlichen Hochschule“ dankte dem scheidenden Rektor und begrüßte den neuen. Er versicherte, daß die Studierenden der Hochschule es als ihre hohe Aufgabe anfehen, an dem Aufbau des Vaterlandes mitzuarbeiten.

3. wissenschaftlicher Referierabend an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Montag, den 6. Februar 1928, 20,15 Uhr, im Hörsaal des Anatomischen Institutes Vortrag von Prof. Götze über: „Kaiserschnitt beim Rinde“ (mit Demonstrationen). Zietzschmann.

D. L. G.

Sonderauschuß für die Bekämpfung der Tierkrankheiten.

Mittwoch, den 1. Februar 1928, 18 Uhr, Berlin W 9, Köthener Straße 38, Brauner Saal: 1. Die Euterkrankheiten. Berichterstatter: Prof. Dr. Ernst-München. 2. Zur Frage der Vorbeuge gegen Euterentzündungen bei Milchkühen. Berichterstatter: Prof. Dr. Götze-Hannover.

München, den 2. Januar 1928. Vogel, Vorf.

Deutsche Vereinigung für Mikrobiologie.

Die Tagung wird statt 1929 bereits vom 6. bis 8. September 1928 in Bern abgehalten. Anmeldungen von Vorträgen sind frühzeitig zu richten an Geheimrat Dr. Otto, Berlin N 39, Föhrrerstr. 2.

17. Fortbildungskursus des D.V.R.

in Dortmund am 4. und 5. Februar 1928.

Sonabend, den 4. Februar, 14 Uhr: Prof. Dr. Mießner-Hannover: „Geflügelkrankheiten“ (mit Demonstrationen). 15 Uhr: Prof. Dr. Neumann-Kleinpaul-Berlin: „Ausgewählte gerichtliche Fälle“. 16 Uhr: Veterinärat Dr. Bautz-Arnsberg: „Ambulatorische Fleischbefchau und Ergänzungsbefchau (m. Demonstr.)“. Anschließend Besprechung. Sonntag, den 5. Februar, 9 Uhr: Veterinärat Dr. Brüggemann-Altona: „Tierärztlicher Berufsstand und Staat“. 10 Uhr: Direktor Dr. Sachweh-Münster: „Euterkrankheiten“. 11 Uhr: Prof. Dr. Götze-Hannover: „Praktische Demonstrationen aus der Buiatrik und der Geburtshilfe“. Anschließend Besprechung. Die Vorträge finden im Börsensaal des Magervieh Hofes-Dortmund statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 10 Mark für beide Tage.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Die Fischzucht und Fischhaltung. Mit einer Tabelle zum Bestimmen der deutschen Süßwasserfische nach leicht erkennbaren äußeren Merkmalen. Von Prof. Fr. Taunke, früher technischer Leiter des staatlichen Fischbruthauses zu Papiermühle bei Schivelbein in Pommern. Zweite durchgearbeitete, verbesserte und vermehrte Auflage. Hannover, 1927. Verlag von M. & H. Schaper. — Preis broch. Mk. 11.50, geb. Mk. 13.—.

Der Stoff des schönen Buches ist wie in der ersten Auflage in übersichtlicher Weise in Spezielle und Allgemeine Fischzuchtlehre gegliedert. Nach einer kurzen Einleitung, in der die wirtschaftliche Bedeutung der Fischzucht, die Einteilung der Lehre von der Fischzucht und der Unterschied zwischen Fischzucht und Fischhaltung dargelegt werden, sind im Abschnitt Spezielle Fischzuchtlehre die Karpfenzucht, die Schleienzucht, die Forellenzucht und die Zanderzucht eingehend abgehandelt. Jedes Kapitel gibt Auskunft über Rassen und Arten, Lebensweise, Züchtung und Haltung des betreffenden Fisches. Ein fünftes Kapitel ist der Fischzucht in natürlichen Gewässern gewidmet. Im ersten Kapitel der Allgemeinen Fischzuchtlehre sind die Eigenschaften und Wirkungen des Wassers in fischwirtschaftlicher Beziehung und das Pflanzen- und Tierleben dargestellt. In weiteren Kapiteln erfährt der Leser alles Wissenswerte über Taxation der Teiche und Seen, über Pflege der Teiche und Fütterung der Fische, über Fischfang, Aufbewahrung und Überwinterung der Fische sowie über die künstliche Fischzucht. Im siebenten Kapitel wird auf die wichtigsten Krankheiten und Feinde der Fische eingegangen. Am Schluß findet sich eine Tabelle zum Bestimmen der Süßwasserfische Deutschlands nach äußeren Merkmalen, die es jedem auch

ohne Vorkenntnisse ermöglichen soll, einen ihm unbekannten Fisch zu bestimmen. — Die kurze Inhaltsübersicht zeigt zur Genüge in wie erschöpfender Weise die ganze Materie dargestellt ist. Das Buch dürfte daher nicht nur dem Teichwirt, sondern auch manchem praktischen Tierarzt sehr willkommen sein.

Wetzel.

Der Fuß des Pferdes in Rücksicht auf Bau, Verletzungen, Hufbeschlag und Hufkrankheiten. 13. Aufl. Von Leisering und Hartmann: Der Fuß des Pferdes. Vollständig neu bearbeitet von Dr. med. vet. und Dr. phil. A. Fischer, Lehren des theoret. und prakt. Hufbeschlages und Direktor der staatlichen Lehrschmiede zu Dresden. Mit 621 Abb. Hannover 1927. Verlag von M. & H. Schaper. 653 S. Preis geb. 26,— Mk.

Nach einer Pause von 14 Jahren erscheint dieses bereits seit längerer Zeit vergriffene, wissenschaftlich und praktisch so glänzend fundierte, allbekannte Werk wieder im neuen Gewande, in seiner 13. Auflage. Wenn je ein Buch Anspruch darauf machen konnte, aus der glücklichen Paarung von Wissenschaft und Praxis hervorgegangen zu sein, so kommt dieser Arbeit dieses Prädikat ohne Überhebung zu. Bereits die ersten Herausgeber, Leisering und Hartmann, waren von dem großen Verantwortungsfühl wissenschaftlicher Autoren so tief durchdrungen, daß sie sich im Vorwort der ersten Auflage mit schärfster Kritik gegen jene Autoren wandten, welche nur Bücher aus Bücherweisheiten fabrizieren und auf den Markt werfen. Langjährige, praktische Erfahrungen und tiefeschürfendes, theoretisches Durchdringen der Materie sind von Anfang an die Grundpfeiler des vorliegenden Werkes gewesen. Und dieser solide Unterbau hat sich in der Geschichte des Buches reichlich verdient gemacht. Die am Fach interessierten Kreise erkannten in allen Auflagen, die das Buch erlebt hat, wie glücklich sich hier eine neugestaltende Anschauung, eine neue Theorie, die mit ungleich größerer Treffsicherheit, als es bis dato in der Hufbeschlagskunst geschehen war, die normale Anatomie und Physiologie des Pferdefußes berücksichtigte, auf praktischen Erfahrungen aufbaute. Und diese charakteristische Seite ist dem Buche bis heute erhalten geblieben. Dabei ist es von höchstem Vorteil gewesen, daß ihm unter der sicheren Führung bewährter Fachforscher stets die aktuelle Note gewahrt worden ist. Männer, wie A. Lungwitz und R. Lungwitz, haben dem Werke in der Fachliteratur auch im Wandel der Zeiten den Vorrang zu wahren gewußt. Und auch der neue Herausgeber, A. Fischer, hat keine Mühe gescheut, die in Wissenschaft und Praxis gezeigten Fortschritte in glücklicher Form dem altbewährten Buche einzufügen. Die modernen Kenntnisse über Ätiologie, Diagnostik, Verlauf und Therapie der durch untergeschobene Trachten erzeugten Lahmheiten, fernerhin Abschnitte über Vorkommen, Erscheinungen, Ursachen, Beurteilung und Behandlung der Hufe mit wellenförmiger Verbiegung der Hornwand bzw. mit Einbiegung der Hornwand und endlich ein Abschnitt über Wandfäule und ihre Behandlung sind ganz neu eingereiht. Eine bemerkenswerte Bereicherung hat das Werk weiterhin dadurch erfahren, daß in Anlehnung an die bewährte, klare Gliederung der Kapitel über den Pferdefuß, auch der Bau des Rinderfußes, des Klauenbeschlags und der Klauenpflege, eine diesen Gebieten in der modernen Nutztierpflege zukommende breitere Beachtung gefunden hat. Endlich sind die Illustrationen um 151 Abbildungen vermehrt worden. Ein Werk liegt vor, dessen Abhandlungen das zu bescheiden gewählte Kopftitel weit übertreffen, und welches jeder Tierarzt, der den modernen Forderungen seiner Praxis gerecht werden will, seiner Bibliothek einreihen wird. Hier ist Gelegenheit, eigenes Können zu potenzieren, um empirischer Arbeit im Standes- und eigenem Interesse stets voraus zu bleiben. Der Dank der veterinärmedizinischen Wissenschaft ist daher dem Herausgeber sicher. Dank gebührt auch dem Verleger für die gefällige und technisch hochstehende Ausschmückung des Werkes.

Henkels.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Dr. Curt Möller aus Neumünster zum städt. Tierarzt am Schlachthof in Flensburg (Holst.).

Verzogen: Tierarzt Dr. Stoppel von Weienberg i. Mecklbg. nach Mirow i. Mecklbg.-Strelitz; Tierarzt W. Heffe von Steinau (Oberfchl.) nach Berlin-Pankow.

Verstorben: Veterinärat Johannes Felbaum in Freystadt.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Aug. Eberlein & Co., Hannover-Linden.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zusendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 5.

Ausgegeben am 4. Februar 1928.

36. Jahrgang.

(Aus dem Institut für Seuchenlehre der königl. ungarischen Tierärztlichen Hochschule zu Budapest. — Direktor: Hofrat Prof. Dr. v. Huttyra.)

Über die durch Bang'sche Abortusbazillen verursachte Erkrankung der männlichen Geschlechtsorgane.

(Mit 5 Abbildungen.)

Von Privatdozent Dr. Árpád Marcis.

Seitdem Bang den Erreger des seuchenhaften Verwerfens entdeckt hat, ist man der Ansicht, daß die Abortusbazillen im Allgemeinen auf dem Wege des Verdauungsapparates mit dem infizierten Futter und Trinkwasser in den Körper des Muttertieres gelangen. Die Möglichkeit einer Infektion während des Deckaktes, wobei der Infektionsstoff mit dem infizierten Penis oder mit dem Samen in den Körper des Muttertieres gelangen würde, ließ man ziemlich unbeachtet und auch bei der Bekämpfung der Krankheit berücksichtigte man die Vätertiere wenig als Verbreiter des Ansteckungsstoffes.

Das Bureau of Animal Industry behauptet allerdings, daß eine Infektion der männlichen Geschlechtsorgane nicht selten sei. Nach den diesbezüglichen Erfahrungen führt nämlich die Blutuntersuchung von Stieren in 10 Prozent der Fälle zu positiven Resultaten und bei auf diese Weise als infiziert befundenen Tieren konnten im Samen in 10 Prozent der Fälle Abortusbazillen nachgewiesen werden. Schroeder und Cotton fanden ferner in den Nebenhoden, Buck und Creech von 37 bei der Blutuntersuchung positiv reagierenden Stieren zweimal in den Samenbläschen und zweimal selbst in den Hoden Abortusbazillen.

Auch Wall und Holth haben bei Zuchtstieren in der Präputialhaut, in den Samenbläschen und in den Hoden Abortusbazillen nachgewiesen. Während Barendregt solche in den Hoden eines Stieres fand, nachdem die von ihm gedeckten Kühe konsequent verworfen hatten, stellte Boxström in einem infizierten Bestande bei drei Stieren schwere Orchitis und Polyarthritiden fest.

Schweizer Tierärzte haben oft an der Rute von Stieren kleine Knötchen, an der Harnröhrenöffnung Geschwüre, am Hodensack schmerzende Schwellung, ferner nekrotisierende Hodenentzündung beschrieben. Neustens stellte auch Christianfen fest, daß bei Stieren durch Abortusbazillen verursachte nekrotische Hodenentzündungen nicht selten vorkommen. In den erkrankten Hoden ist in kleineren umschriebenen Herden oder ausgebreitet eine nekrotische Entzündung vorhanden, zu der sich eine schwere Periorchitis hinzugefügt, bei der die zwei Blätter der Tunica vaginalis

verklebt werden und zugleich im Samenstrang sowie im Nebenhoden eine ödematöse Infiltration entsteht. In chronischen Fällen stirbt der Hoden in seiner Größe ab und findet sich in dem mit serös-eitrigen Exsudat gefüllten Cavum vaginale als abgestorbener Sequester vor.

Christianfen beobachtete diese Hodenentzündung bei fünf Stieren in verschieden vorgeschrittener Form und züchtete aus allen Fällen den Abortusbazillus heraus. Durch Einspritzen kleiner Kulturmengen in gesunde Hoden konnte er vollkommen gleiche Hodenentzündungen hervorrufen. Bei den histologischen Untersuchungen gelang es ihm, sowohl in den Drüsenepithelien als auch außerhalb derselben, die Abortusbazillen nachzuweisen. Neben den bakterienhaltigen und noch aus mäßig erhaltenen Drüsenzellen bestehenden Drüsenkanälchen fand er auch solche, in denen die Drüsenzellen schon zugrundegegangen und mit eiterigem Exsudat ausgefüllt waren. Das interlobuläre Bindegewebe war verbreitert und mit Lymphozyten, Leukozyten und Plasmazellen infiltriert, zwischen denen auch Riefenzellen vorkamen, außerdem fanden sich stellenweise auch abgestorbene Herde. Die Kanälchen des Nebenhodens waren mit einer detritusartigen Masse ausgefüllt, das Bindegewebe stark verbreitert und mit Rundzellen sowie Plasmazellen infiltriert.

Nach der Auffassung des Autors befallen die Abortusbazillen mit Vorliebe die Drüsenepithelien, wo sie sich rasch vermehren und eine eiterige Entzündung hervorrufen, während die später sich einstellende Nekrose infolge Störung des Blutkreislaufs durch die Entzündung verursacht wird.

In einem sechsten Falle stellte er eine durch den Abortusbazillus und durch den Tuberkulosebazillus gleichzeitig hervorgerufene Orchitis fest, bei der das histologische Bild die für Tuberkulose und für Abortus charakteristische Hodenentzündung zeigte.

H. Ludwig kommt auf Grund seiner Erfahrungen zu der Schlußfolgerung, daß Kühe nach dem Bedecken mit gewissen Stieren stets verworfen und daß daher die männlichen Tiere bei der Verbreitung der Krankheit eine wesentliche Rolle spielen.

Über die Erkrankungen der Geschlechtsorgane von Ebern sind in der Literatur wenig Angaben vorhanden.

Nach Kinsley kommen bei Ebern Hodenentzündungen nur selten vor und sind meistens die Folge übertriebener Inanspruchnahme oder unhygienischer Verhältnisse. Tuberkulose oder durch Abortusbazillen bedingte Hodenentzündung soll sich nur ausnahmsweise entwickeln. Kinsley hat übrigens nach der Simultanimpfung bei der Schweinepest in größerer Zahl Hodenentzündungen beobachtet, deren Ursache er jedoch nicht ermitteln konnte.

Hetzl erwähnt in seinem Lehrbuche der Geburtshilfe, daß er einmal bei Ebern gehäuft eine durch Abortusbazillen verursachte Hodenentzündung beobachtete, zu der sich in zwei Fällen auch eine Bauchfellentzündung hinzugesellte hat.

Daß die Erkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane zufolge Infektion mit Abortusbazillen viel häufiger vorkommen und daß Vattertiere in der Verbreitung der Krankheit eine viel bedeutendere Rolle spielen, als dies bisher angenommen wurde, geht aus folgenden Erfahrungen hervor, die ich in den letzten drei Jahren sammelte.

Im Jahre 1923 beobachtete Prof. H. Hetzel in einem Schweinebestande schwere Hodenentzündungen bei Ebern, die verworfene Säuen gedeckt hatten. Die Natur des Verwerfens wurde bei den Säuen durch die bakteriologische Untersuchung als infektiös erkannt und infolgedessen lag der Gedanke nahe, daß auch die Hodenentzündung der Eber durch Abortusbazillen verursacht war. Das positive Ergebnis der Agglutinationsprobe der Tiere hat die Infektion mit Abortusbazillen nachgewiesen und mich in der obigen Annahme nur noch bestärkt.

Im Monat Oktober sandte Prof. Hetzel von drei notgeschlachteten Ebern die Hoden dem anatomisch-pathologischen Institut zur histologischen Untersuchung ein, während er zur Durchführung der bakteriologischen Untersuchung das Institut für Seuchenlehre ersuchte. Professor K. Jármai stellte mir die Resultate seiner Untersuchungen in liebenswürdiger Weise zur Verfügung, wofür ich ihm auch an dieser Stelle Dank sage. Seine Befunde lauten folgenderweise:

Hoden Nr. 1. Der mit der Tunica vaginalis communis bedeckte Hoden ist in jeder Richtung um 2–3 cm vergrößert. Die erwähnte Hodenhülle fluktuiert schwach, nach ihrem Aufschneiden entleert sich eine gelbliche, mit Fibringerinnfeln vermengte Flüssigkeit in der Menge von 3 Dl. Die ganze Oberfläche des Hodens ist mit einer 2–3 mm dicken, stellenweise sogar mit einer fingerdicken, gelblichen, schwach anhaftenden Fibrinschicht bedeckt, die an den breiteren Stellen mit Serum gefüllte Hohlräume enthält. Nach der Entfernung der Fibrinschicht kommt die Hodenkapfel zum Vorschein, die injiziert und getrübt erscheint. Die Schnittfläche des Hodens ist rotgrau, saftreich, sonst aber ohne makroskopisch sichtbare Veränderungen.

Unter dem Mikroskop sind in den Fibrinauflagerungen weiße Blutzellen, Endothelzellen und Fibrinfasern zu sehen, zwischen denen in spärlicher Zahl, stellenweise wohl auch in kleineren Gruppen und selbst in Zellen einverleibt, mit Karbolfuchsin sich lebhaft färbende, an Abortusbazillus erinnernde Gebilde sich befinden, deren Bazillennatur jedoch wegen ihrer kleinen Zahl dahingestellt bleiben mußte.

Der histologische Befund des Hodens ist folgender:

In der den Hoden überziehenden Fibrinschicht sind in dem der Hodenoberfläche anliegenden Teile viele Lymphozyten, dazwischen in beträchtlicher Anzahl auch Plasmazellen und außerdem zahlreiche polymorphe Leukozyten sichtbar. Stellenweise dringen von der Hodenkapfel in die Fibrinschicht lose Bindegewebsbündel (Organisation), zwischen denen auch etliche Riefenzellen lagern.

Die eigene Kapfel des Hodens ist in mäßig dicker Schicht mit Fibrin belegt und zellig infiltriert. Die Hodenkanälchen sind mäßig weit und während in einem Teile derselben die spezifischen Zellformen regelmäßig lagern, sind in anderen bloß die Vorformen der Spermiogenese vorhanden. Einige Tubuli enthalten auffallend viele nadelartige Kristalle, deren

Natur nicht näher bestimmt werden konnte (Hodenkristalle oder Kunftprodukte?). Entzündliche Erscheinungen sind im Parenchym nicht zu erkennen und auch die aus Leydig'schen Zellen bestehenden Inseln und das Interstitium bieten normale Verhältnisse dar.

Nach diesen Befunden ermittelte die histologische Untersuchung bloß eine serös-fibrinöse Periorchitis, wogegen das Hodenparenchym vom Entzündungsprozeß verschont blieb.

Hoden Nr. 2. Der von der Tunica vaginalis communis bedeckte Hoden ist kindskopfgroß, fluktuiert und läßt nach dem Aufschneiden aus dem Cavum vaginale $\frac{1}{2}$ Liter einer rötlichen, trüben, mit Eiterflocken vermengten Flüssigkeit entfließen. Das genannte Scheidenblatt besteht aus halbfingerdickem, zähem Bindegewebe, seine Innenfläche ist mit eiterig erweichtem Fibringerinnfeln bedeckt. In der Höhle des Scheidenfackes ist der faultgroße Hoden mit rotbraunen, runzeligen Fibrinmassen belegt, nach deren Entfernung die schmutzig-graue Oberfläche des Hodens zum Vorschein kommt. Die Schnittfläche des Hodens ist eintönig rotgrau, saftarm, an der Peripherie in einer Breite von einem $\frac{1}{2}$ cm von einer strukturlosen, mürben Substanz gebildet, innerhalb deren die drüsig Hodenstruktur zu erkennen ist. Der Nebenhoden ist vergrößert, auf seine Schnittfläche ergießt sich eine dickflüssige, eiterige Flüssigkeit.

Unter dem Mikroskop waren weder im Hoden, noch in dem zelligen Exsudat Bakterien nachweisbar.

Im histologischen Bilde zeigte die Tunica vaginalis communis starke Verdickung, zellige Infiltration und in ihrem Gewebe zahlreiche Eiterherde. Ihre innere Fläche war von einer zellig infiltrierten Fibrinschicht belegt, die zum Teil mit frischem Bindegewebe durchwachsen war.

An den Hodenschnitten ließ sich feststellen, daß die Hodenperipherie in $\frac{1}{2}$ cm tiefer Breite abgestorben war, während in den tieferen Partien die Kanälchen mit polymorphen Leukozyten ausgefüllt waren, deren Kerne teilweise zerbröckelt erschienen. Manche Kanälchen waren mit abgestorbenen Zellen derart ausgefüllt und mit fibrösem Bindegewebe umgeben, daß sie im Ganzen einem abgestorbenen Herd glichen. Ein anderer Teil der Kanälchen war von normaler Struktur, doch zeigte sich an ihrer Peripherie bereits zellige Infiltration, die sich außerhalb des Kanälchens sichtlich verstärkte. Dieser Befund sprach dafür, daß die Entzündung von außen her auf den Tubulus übergegriffen hat. Das Mediastinum testis und die interlobulären Inseln waren in ihrer ganzen Ausbreitung zellig infiltriert. Der ganze Nebenhoden war von Entzündungselementen überschwemmt, die Sammelkanälchen mit Zelltrümmern ausgefüllt und das Interstitium stark vermehrt.

Demnach konnte am Hoden Nr. 2 eiterig-fibrinöse Periorchitis, nekrotisierende Orchitis festgestellt werden, welche Vorgänge wahrscheinlich von der Scheidenhautentzündung her auf dem Wege des Mediastinums auf den Hoden übergegangen sind.

Hoden Nr. 3. Die auf Kindskopfgröße ausgedehnte Tunica vaginalis communis bildet einen fluktuierenden Sack, aus dem sich nach dem Aufschneiden 5 Liter einer rötlichen, dichten Flüssigkeit entleert, die haselnußgroße, strukturlose, rostbraune Gewebstrümmer enthält. Nach der Entleerung der Flüssigkeit bleibt die Scheidenhöhle leer, ein Zeichen dafür, daß die Gewebstrümmer die Reste des Hodens waren. Das Blatt der Scheidewand ist halbfingerdick und an der Innenfläche mit rostbraunem Fibringerinnfeln belagert.

Bei der mikroskopischen Untersuchung konnten bloß zellige Bestandteile aus dem Exsudat nachgewiesen werden.

Zur weiteren bakteriologischen Untersuchung wurden die drei Hoden dem Institut für Seuchenlehre überwiesen, wo ich sie in Behandlung nahm.

Es wurden in allen drei Fällen mit dem Hoden und dem Exsudate schwach alkalische traubenzuckerhaltige Agarröhrchen beimpft und mit Paraffin verschlossen bebrütet, ferner wurde in jedem Falle je ein Meerfischweinch geimpft.

Sowohl die Züchtungs-, wie auch die Tierversuche ergaben negative Resultate, ja sogar das nach vier Wochen den Meerfischweinch entnommene Herzblut agglutinierte nicht die Abortusbazillen, noch enthielt es komplementbindende Substanzen. Die nach sechs Wochen getöteten Versuchstiere ergaben einen negativen Obduktionsbefund.

und auch aus ihren Organen konnten keine Abortusbazillen gezüchtet werden.

Infolge dieser mißglückten Versuche kann nur aus den positiven Blutuntersuchungsergebnissen der Eber, ferner aus den charakteristischen Hodenveränderungen darauf gefolgert werden, daß in den vorliegenden Fällen die Hodenentzündung durch Abortusbazillen verursacht war.

Im Frühjahr 1925 trat in der Domäne Sz. unter den Ebern gehäuft eine Hodenentzündung auf. Von den kranken Ebern wurden Blutproben dem Institut eingefandt. Das positive Ergebnis der Agglutinationsprobe gestattete die Vermutung, daß die Hodenentzündungen durch eine Abortusinfektion bedingt waren.

Ende Juni desselben Jahres wurden aus diesem Bestande die Hoden zweier kastrierter Eber eingefandt, welche folgende Veränderungen zeigten:

Hoden Nr. 1 ist vergrößert, 13–14 cm lang und 8–9 cm breit; seine Oberfläche ist glatt, frei von Unebenheiten. Die Tunica vaginalis propria ist verdickt. Die Schnittfläche des Hodens erscheint größtenteils gelblichgrau, strukturlos, aus einer bröckeligen, mürben Masse bestehend und nur in Minderzahl sind rotgraue, Hodenstruktur aufweisende Inseln vorhanden. Der Nebenhoden ist ebenfalls vergrößert, auf seiner Schnittfläche sind die Sammelröhrchen gut sichtbar. Auf Druck entleert sich aus ihnen ein dichter, schleimiger, weißgrauer Inhalt.

Hoden Nr. 2 ist ebenfalls vergrößert, 10 cm lang und 7 cm breit, von gleichmäßiger Oberfläche, die Tunica vaginalis propria jedoch verdickt. Die Schnittfläche erscheint rotgrau, feucht, das interstitielle Bindegewebe grauweiß und verdickt. Der Nebenhoden ist dem Hoden entsprechend vergrößert, von ähnlicher Beschaffenheit, in seinem kaudalen Ende sitzt jedoch ein bohnen großer, rahmiger Eiter enthaltender Abzefß.

Durch die mikroskopische Untersuchung konnten weder im Hoden noch im Nebenhoden und in dem darin befindlichen Abzefß Bakterien nachgewiesen werden.

Die angelegten Züchtungsversuche verliefen negativ. Von der Hodensubstanz wurde ein Meerschweinchen geimpft und dessen Blut vier Monate später mit der Agglutinations- und Komplementbindungsprobe geprüft. Die Agglutinationsprobe gab bei der Verdünnung 1 : 100 ein positives Resultat, während die Komplementbindungsprobe mit der Serummenge 0.02 stark positiv (++++) bei der Verdünnung 0.01 dagegen nur zweifelhaft (++) ausfiel. Die gleichzeitig angelegten Kontrollversuche mit normalem Meerschweinchenferum ergaben alle ein negatives Resultat.

Drei Tage später wurde das Meerschweinchen getötet. Das seit der Impfung um 210 Gramm schwerer gewordene Versuchstier weist bei der Sektion in der Leber am unteren Rande des linken Lappens einen erfengroßen eiterigen Herd von gelbgrauer Farbe und rahmähnlichem Inhalt auf. Die Milz ist bedeutend vergrößert, von 3,7 cm Länge und 0,8 cm Breite, ihre Ränder sind abgerundet. Die Schnittfläche ist rotbraun, ihre Substanz mäßig erweicht, die grau durchscheinenden Follikel wölben sich merklich hervor. Die übrigen Organe ohne Besonderheiten.

Durch die mikroskopische Untersuchung lassen sich aus dem Eiter des Leberherdes stäbchen- und koryneartige Abortusbazillen nachweisen. In den mit dem Inhalt des Leberherdes beschickten Agarnährböden wuchsen am sechsten Tage tautropfenartige Kolonien, die sich aus Abortusbazillen bestehend erwiesen.

Am 24. Juli bekam ich aus demselben Bestande drei weitere Eberhoden, deren Untersuchung folgendes ergab:

Hoden Nr. 1 ist 13 cm lang, 8,5 cm breit, mit glatter Oberfläche, und läßt an seiner Schnittfläche normale Verhältnisse erkennen. Der Nebenhoden ist nach seiner Größe dem des Hodens proportionell, sein Parenchym mit Ausnahme einiger erbsengroßen, im kaudalen Ende sitzenden eiterigen Abzefßen, normal.

Die Länge des Hodens Nr. 2 beträgt 10,5 cm, seine Breite 7,5 cm. Die Schnittfläche erscheint unverändert. Im Kopfende des Nebenhodens

sitzt im sonst normalen Parenchym ein nußgroßer eiteriger Abzefß, der das Kopfende des Nebenhodens auf Kinderfaustgröße auftreibt.

Hoden Nr. 3 von 9 cm Länge und 7 cm Breite, besitzt auf der sonst normalen Schnittfläche einen haselnußgroßen, von losem Bindegewebe umgebenen, teils rahmartigen, teils mörtelartigen Inhalt aufweisenden Erweichungsherd. Der Nebenhodenkopf ist 3–4mal dicker als sein Körper, seine Oberfläche knotig und zeigt an seiner Schnittfläche mehrere erbsen- bis bohnen große, von losem Bindegewebe umgebene Abzefße, die einen rahmartigen gelblich-weißen Inhalt enthalten.

Die mikroskopische Untersuchung des Hodens Nr. 1 führte zu einem negativen Ergebnis, in den Abzefßen des Hodens Nr. 2 und 3 dagegen konnten zwischen verschiedenen anderen Bakterien auch zahlreiche kleine Bakterien nachgewiesen werden, die den Bang'schen Abortusbazillen ähnlich sahen.

Die Züchtungsversuche verliefen in allen drei Fällen negativ.

Mit dem aus allen drei Hoden entnommenen und vermengten Eiter wurde ein Meerschweinchen i. musc. geimpft, worauf dessen Blut am 23. Oktober positive Agglutinations- und Komplementbindungsreaktionen ergeben hat.

Am 26. Oktober wurde das an Gewicht zugenommene Meerschweinchen vertilgt, doch ließen sich bei der Zerlegung bloß in der Milz Veränderungen ermitteln. Die sichtlich vergrößerte Milz war 3,8 cm lang, 1,5 cm breit und hatte abgerundete Kanten, war von rotbrauner Farbe und zeigte an der Schnittfläche stark hervortretende Follikeln.

Bei der mikroskopischen Untersuchung gelang es, aus der Milz abortusbazillenähnliche Mikroorganismen nachzuweisen, deren Reinzüchtung jedoch mißlang.

Durch die angeführten Tierversuche glaube ich festgestellt zu haben, daß die eiterig-nekrotisierende Hodenentzündung der Eber in der Domäne Sz. durch den Bacillus abortus verursacht wurde. Damit ist auch erwiesen, daß das positive Ergebnis der Blutuntersuchungen der an Hodenentzündung erkrankten Eber tatsächlich von einer Infektion mit Abortusbazillen herrührte.

Da die Hoden, die Prof. H e t z e l seinerzeit eingefandt hat, bezüglich der pathologisch-anatomischen Veränderungen denen der eben besprochenen Hoden vollkommen ähnlich waren und auch bei diesen Ebern die Blutuntersuchungen positive Resultate ergaben, scheint die Schlussfolgerung begründet, daß die eiterig-nekrotisierenden Hodenentzündungen auch in diesen Fällen durch Abortusbazillen verursacht waren.

Zu Beginn des Jahres 1926 beobachtete Prof. H e t z e l bei zur Zucht noch nicht verwendeten Ebern von neuem gehäuft Hodenentzündungen. Die Hoden der einzelnen Tiere waren derart vergrößert, daß dies schon bei der bloßen Besichtigung aufgefallen ist. Diesbezüglich verweise ich auf die photographische Aufnahme von Prof. M a n n i n g e r (siehe Abb. 1).

Am 26. Februar 1926 sandte Prof. H e t z e l von zwei Ebern die Hoden, sowie eine Blutprobe ein.

Die Hoden sind größer als normal und weisen in ihrem rotgrauen, saftreichen Parenchym erbsen- bis bohnen große, gelblichgraue, stellenweise von trockener Substanz bestehende Herde auf, die von vermehrtem Bindegewebe umgeben sind. Die Nebenhoden sind von normaler Größe und Struktur, in dem kaudalen Ende des einen sind jedoch zwei eiterige Herde vorhanden.

Die Blutprobe ergibt bei der Verdünnung 1 : 50 eine positive, bei dem Titer 1 : 100 eine zweifelhafte Agglutinationsreaktion.

In den nekrotischen Herden des Hodens konnten zerstreut und hier und da auch in Gruppen Bazillen vom Typus des Bang'schen Abortusbazillus nachgewiesen werden, die besonders in der Peripherie der abgestorbenen Herde anzutreffen waren.

Im Züchtungsversuch konnten weder aus dem Hoden, noch aus dem Nebenhoden Bazillen nachgewiesen werden

und ein ebenfalls negatives Ergebnis ergab auch der Tierversuch. Das nach 20 Tagen getötete Meerschweinchen zeigte nämlich einen negativen Sektionsbefund und ebenso verlief



Abb. 1. Hodenentzündung bei einem zur Zucht noch nicht verwendeten Eber.

auch die bakteriologische Untersuchung negativ, bloß die Blutprobe des Meerschweinchens gab eine positive Agglutinationsreaktion, doch verlief die Komplementbindungsprobe negativ.

Histologisch konnte ich dieselben Veränderungen feststellen, die Prof. J á r m a i in den Hoden der Zuchteber ermittelte.

Die Hodenhüllen sind verdickt und rundzellig infiltriert, enthalten auch viel Plasmazellen und polymorphe Leukozyten. An der Oberfläche der Hodenkapfel läßt sich stellenweise eine Granulation des Bindegewebes wahrnehmen. Die Hodenkanälchen sind größtenteils mit polynukleären Leukozyten ausgefüllt, die zum Teil nekrotische Kerne enthalten. Einzelne Kanälchen sind vollkommen mit abgestorbenen Zellen verlegt. Das interlobuläre Bindegewebe ist bedeutend vermehrt, mit Lymphozyten, Plasmazellen und polymorphen Leukozyten infiltriert, zwischen denen in mäßiger Zahl auch Eosinophile vorkommen (f. Abb. 2 und 3).



Abb. 2. Normales Hodengewebe.

Die histologische Beschaffenheit der Hoden, das positive Ergebnis der Blutuntersuchung des einen zum Deckgeschäft noch nicht benützten Ebers, sowie des mit der Hodensubstanz geimpften Meerschweinchens sprechen dafür, daß die Hodenentzündung dieser Eber ebenfalls durch den B a n g -schen Abortusbazillus verursacht wurden. Diese Annahme

wird übrigens noch durch den Umstand bestärkt, daß die Tiere aus einem verseuchten Bestande stammten.

Nach dem Gefagten drängt sich die Frage auf, auf welche Weise sich die Eber anstecken und wie sich die Hodenentzündung entwickelt. Die Infektion mit Abortusbazillen kann nämlich nach unseren heutigen Kenntnissen entweder auf dem Wege des Verdauungsschlauches oder des Genitalapparates erfolgen. Da nach J á r m a i s histologischen Untersuchungen der Entzündungsprozeß von den Scheidenhäuten auf den Hoden übergreift, kann dieser Vorgang nur erklärt werden, wenn man annimmt, daß die per os aufgenommenen Abortusbazillen in die Bauchhöhle und von hier aus in das Cavum vaginale gelangen.

Für die orale Infektion sprechen auch die Hodenentzündungen, die bei den zur Zucht noch nicht verwendeten Ebern beobachtet wurden, da bei diesen Tieren ein Anstecken auf andere Weise unmöglich erscheint. Neuestens habe ich in verseuchten Beständen durch Blutuntersuchungen festgestellt, daß Eber mit gefunden Hoden, die niemals gedeckt hatten, wie auch noch nicht gedeckte Säue, in großer Zahl infiziert sein können und in diesen Fällen konnte die Ansteckung jedenfalls nur auf dem Verdauungswege zustandekommen. Solche Befunde drängen zu der Annahme, daß die Ansteckung der Eber häufiger auf dem Verdauungswege, als von den Geschlechtsorganen aus erfolgt.




Abb. 3. Krankes Gewebe aus dem Hoden eines zur Zucht noch nicht verwendeten Ebers. (Mit abgestorbenen Drüsenzellen und Entzündungselementen sowie mit Kalk ausgefüllte Kanälchen. Ringsum vermehrtes Bindegewebe.)

Da ferner nach meinen Erfahrungen die Vattertiere häufig mit Abortusbazillen infiziert sind und die Abortusbazillen sich in erster Linie in den Geschlechtsorganen ansiedeln, erscheint wohl auch die weitere Schlußfolgerung zulässig, daß die Eber bei dem Deckungsakt mit dem Samen gleichzeitig auch den Infektionsstoff entleeren. Infolgedessen muß den Vattertieren bei der Verbreitung der Krankheit eine weit größere Rolle zuerkannt werden als dies bisher geschehen ist und dieser Umstand sollte auch bei der Feststellung der Tilgungsmaßregeln beachtet werden.

Im Weiteren sei mir noch gestattet über Erfahrungen zu berichten, die beweisen, daß auch die Zuchtstiere bei der Verbreitung der Krankheit eine wichtige Rolle spielen.

Im August 1921 habe ich in dem Viehbestande der Domäne D. das feuchenhafte Verwerfen festgestellt. Die Seuche war stark vorgeschritten, da der größte Teil der Färlen im 5.—7. Monate der Trächtigkeit verkalbte. Ende November klagte mir der Eigentümer, daß seine zwei vortrefflichen Zuchtstiere der Simmenthaler Rasse vor 4—5 Wochen an einer Hodenentzündung erkrankten, da bei dem einen der rechte, bei dem andern der linke Hoden sich auf das Mehrfache vergrößerte. Die Tiere waren traurig, appetitlos und

ihre Hoden derart schmerzhaft, daß sich die Tiere kaum zu bewegen wagten. Nach vier Wochen besserte sich ihr Zustand, die Freßlust kehrte zurück, die Bewegungen wurden freier, ein Zeichen dafür, daß die Schmerzhaftigkeit der Hoden abgenommen hat, trotzdem blieben aber die Hoden vergrößert und hart. Die Blutuntersuchung ergab bei beiden Tieren ein positives Refultat, woraus ich folgerte, daß die Hodenentzündung durch Abortusbazillen verursacht war. Der Eigentümer verwertete die Tiere auf der Schlachtbank und überließ mir die Genitalorgane des einen Stieres.

Bei der makroskopischen Untersuchung konnten am Penis, an der Harnröhre, in der Harnblase und in den Samenbläschen keine Veränderungen wahrgenommen werden. Der rechtsseitige Hoden ist kindskopfgroß, der Hodensack stark gespannt und läßt bei der Betastung schwaches Fluktuieren erkennen. Der linksseitige Hoden ist faustgroß, der Hodensack kann in Falten gelegt werden. Nach dem Aufschneiden des Hodensacks ergibt sich, daß die Tunica vaginalis communis mit der Innenfläche des Hodensacks verwachsen ist. Nach Eröffnung der Scheidenhöhle entleeren sich aus dem Cavum vaginale zwei Dl. einer gelblichen, mit Gewebstrümmern und Fibringerinnfeln vermengten Flüssigkeit. Der hervortretende Hoden ist beinahe kindskopfgroß mit unebener Oberfläche, sein Parenchym größtenteils abgestorben, bloß in der Mitte befindet sich ein kleiner normaler Hodenteil. Nebenhoden und Samenstrang fehlten.

Bei der mikroskopischen Untersuchung gelang es weder im Exsudat, noch im Hodenparenchym Abortusbazillen nachzuweisen. Die üblichen Züchtungsversuche und das Tierexperiment verliefen ebenfalls negativ, so daß bloß das positive Blutuntersuchungsergebnis und der Umstand, daß der Stier in dem verfeuchten Bestande verkalbte Kühe gedeckt hat, darauf hinwiesen, daß die Hodenentzündung durch den Bang'schen Abortusbazillus verursacht war.

Am 29. November 1925 fandte Kreistierarzt Dr. B. R. die Blutprobe eines an Hodenentzündung leidenden Stieres ein, zur Feststellung, ob das Tier nicht mit Abortusbazillen infiziert sei. Nach seiner Mitteilung war der Stier 3½ Jahre alt und ist vor 8 Tagen an einer rechtsseitigen Hodenentzündung erkrankt. Der rechte Hoden hat sich aufs fünffache vergrößert, ist an der Oberfläche glatt, hart, schmerzhaft, der Samenstrang armdick. Das Tier hat mäßiges Fieber, ver-

änderliche Freßlust und zeigt trotz Behandlung keine Besserung.

Die Blutprobe ergab sowohl mit der Komplementbindungs-, wie mit der Agglutinationsprobe ein positives Refultat, woraus vermutet wurde, daß die Hodenentzündung zufolge einer Abortusinfektion entstand. Das Tier wurde am 10. Oktober notgeschlachtet, worauf an feinen Genitalorganen folgender Befund erhoben wurde (siehe Abb. 4).

An der Außenhaut des Hodensacks sind keine Verletzungen wahrzunehmen, der rechtsseitige Hoden ist 6—7mal größer, als der linksseitige. Nach dem Aufschneiden des rechten Hodensacks ergibt sich, daß die Tunica vaginalis communis durch feine, grauweiße Fasern mit der Tunica dartos verwachsen ist und ähnlich verlötet erscheint auch die Scheidenhülle mit der Tunica propria, trotzdem aber kann der stark vergrößerte Hoden aus dem Cavum vaginale unschwer herausgehoben werden. Der rechtsseitige Hoden hat ein Gewicht von 2650 Gramm, ist 22 cm lang und 13 cm breit, seine Oberfläche grauweiß, etwas uneben und mit faserigen Gewächsen bedeckt. Die Tunica propria ist derart verdickt, daß sie den Nebenhoden vollständig verdeckt. An der Schnittfläche sieht man um den Hoden die auf 1½ cm verdickte Tunica propria und auch die interstitiellen Septen erscheinen stark verdickt. Das Hodenparenchym besteht aus unregelmäßig geformten, gelblichen, von grauweißem, zähem Bindegewebe umgebenen Lappen, deren Inhalt stellenweise aus einer mörtelartigen Substanz bestehen, die sich leicht herausheben läßt. Gefundes Hodengewebe ist sehr spärlich vorhanden, dagegen befinden sich rings um den Hoden einige eiterige Herde. Der linke Hoden ist, abgesehen von einer mäßigen Vergrößerung, von normaler Struktur, sein Gewicht beträgt 315 Gramm, seine Länge 15, seine Breite 7 cm. Die übrigen Genitalorgane zeigen keine Veränderungen.

Mikroskopisch wurden aus den eiterigen Herden des Hodens kleine, an Abortusbazillen erinnernde und mit Karbolfuchsin sich gut färbende Bakterien nachgewiesen. In den trockenen Herden des kranken Hodens, sowie in den gefunden Hoden waren solche nicht vorhanden.

Die histologische Untersuchung ergab, daß die Hodenkapfel stark verdickt und zellig infiltriert ist. Die Hodenkanälchen haben größtenteils die normale Struktur verloren, viele sind mit Entzündungselementen, andere mit abgestorbenen Zellen ausgefüllt, die auch Kalkkristalle enthalten. Andere Kanälchen sind nur an der Peripherie infiltriert, im Inneren der Tubuli lassen sich dagegen bloß die Vorstadien der Spermio-genese beobachten. Zwischen den Samenkanälchen ist das Bindegewebe stark vermehrt und bildet dicke Scheidewände. An vielen Stellen haben sich die Kanälchen in abgekapfelte, eiterige Herde umgewandelt. Die Nebenhodenkapfel sowie die Wand der Sammelkanälchen erscheint verdickt und zellig infiltriert, das Lumen der Sammelkanälchen mit Zelltrümmern ausgefüllt.




Abb. 4. Linker, normaler Hoden eines Stieres. (Gewicht 315 Gramm.)

Rechter, kranker Hoden eines Stieres. (Gewicht 2650 Gramm.) (Hodenkapfel verdickt, abgestorbene Drüsen-substanz mit vermehrtem Bindegewebe, an der Peripherie des Hodens einige erbsengroße, eiterige Herde.)



Abb. 5. Krankes Gewebe aus dem Hoden eines Stieres. (Abgestorbene Drüsenzellen, mit abgestorbenen Zellen ausgefüllte Kanälchen, vermehrtes Bindegewebe.)

Die mit Hodensubstanz angestellten Züchtungsversuche ergaben ein positives Resultat, da in den mit dem Inhalt der Eiterherde beschickten Röhrchen Kolonien des Abortusbazillus sich entwickelten. Das mit der Hodensubstanz am 11. Oktober geimpfte Meerfischweinchchen ergab am 1. Dezember eine positive Komplementbindungs- und Agglutinationsreaktion und als das an Gewicht zugenommene Versuchstier am 5. Dezember getötet wurde, konnte ein follikulärer Milztumor festgestellt werden. Mikroskopisch gelang es in der Milz Abortusbazillen nachzuweisen, dagegen sind die Züchtungsversuche mißglückt.

Aus den mitgeteilten Versuchen geht hervor, daß die durch Abortusbazillen verursachte Erkrankung der männlichen Geschlechtsorgane keine Seltenheit ist. Bei Ebern kommen nämlich nicht selten gehäuft, bei Stieren ebenfalls ziemlich oft beiderseitige, fibrinöse Periorchitiden, ferner diffuse, mit Bindegewebswucherung einhergehende eiterig-nekrotische Hodenentzündung vor, die sich in derart charakteristischen Veränderungen äußern, daß sie schon makroskopisch erkannt werden können, immerhin empfiehlt es sich, gegebenenfalls die Diagnose durch bakteriologische und histologische Untersuchungen zu erhärten. Nach der Annahme Prof. Jármay's sowie nach meinen Erfahrungen erfolgt die Infektion größtenteils per os, wobei die Abortusbazillen teils auf dem Blutwege, teils lymphogen in die Geschlechtsorgane gelangen.

Die an Hodenentzündung erkrankten Zuchttiere sind aus der Zucht sofort auszumergen, weil diese Tiere bei dem Deckakte Abortusbazillen in die Gebärmutter ejakulieren können und dadurch die Seuchen verbreiten (in einer Wirtschaft verkalbten mehr als 50 Prozent der Kühe, die von einem an einseitiger Hodenentzündung leidenden Stiere gedeckt worden waren). Bei den an beiderseitiger Hodenentzündung erkrankten Tieren muß auch damit gerechnet werden, daß die Tiere wegen der Störung der Spermiogenese nicht mehr zeugungsfähig sind.

Ich bin der Ansicht, daß äußerlich für gesund geltende, aber durch die Blutuntersuchung als infiziert erkannte Vatertiere aus der Zucht ebenfalls auszuschließen seien, weil möglicherweise auch solche Tiere mit ihrem Samen Abortusbazillen ausscheiden.

Nach dem Gefagten dürften sich bei der Bekämpfung des seuchenhaften Abortus folgende Maßregeln empfehlen:

1. Vor allen Dingen müssen die hygienischen Maßregeln streng befolgt werden (Abkalbeställe, Vernichtung des Infektionsstoffes, Absonderung und fachgemäße Behandlung der Muttertiere, ferner 2—4monatige Ruhe vor dem Bedecken).

2. Vatertiere sind unter ständiger Aufsicht zu halten und beim Auftreten von Erscheinungen einer Hodenentzündung der Blutuntersuchung zu unterziehen.

3. Vatertiere sind zeitweise auch dann einer Blutuntersuchung zu unterwerfen, wenn ihre Geschlechtsorgane gesund erscheinen.

4. Blutprobenpositive Vatertiere sind aus der Zucht auszuschließen, ungeachtet dessen, ob ihre Hoden sichtlich erkrankt sind oder nicht.

5. Neue Vatertiere sind erst nach einem negativen Ausfall der Blutuntersuchung in die Zucht einzustellen.

6. Vatertiere dürfen nicht mit lebenden Bazillen enthaltendem Impfstoffe behandelt werden, da eine solche Impfung möglicherweise spezifische Hodenentzündung hervorruft.

Literatur.

Bang: Zeitschr. für Tiermed. 1897, S. 241. Barendregt: Tijdschrift voor Veeartsenijkunde, Bd. 40, 1913, S. 691. Boxström: Finsk Veterinärtdidskrift, Bd. 15, 1909, S. 71. Buck, Creech und Ladson: Journ. of Agric. Research, Bd. 17, 1919, S. 239. Christiansen: Maanedsskrift for Dyrlaeger, Bd. 37, 1926. Hetzel: Allatorvosi szülészet. 1925. Hutyla und Marek: Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. 6. Auflage, 1922. Kinsley: Veterinary Medicine, 1924. Ref. Tierärztl. Rundschau, 1924, Nr. 45, S. 739. Ludwig: Beitrag zur Kenntnis des infektiösen Abortus beim Rind. In.-Dissert. 1924 (Bern). Schroeder und Cotton: Journ. of Agric. Research, Bd. 9, 1917, S. 9.

Bericht über die Fachtierärztetagung zur Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten in Jena vom 1. bis 4. Oktober 1927.

Zusammengestellt von Dr. R. Wetzel, Hannover.

(Schluß.)

2. Oktober 1927.

Den Vorsitz führen:

Wiemann, Bohl, Szasz, Hochmüller, Hobstetter.

Die Ätiologie der sog. Coliruhr der Neugeborenen.

Von Dozent Dr. Detre und Dr. Rohonyi, Budapest.

Da wir mit den in vitro und vivo-Versuchen höchstwertigen Colifera prophylaktisch bloß unsichere Erfolge erzielten, da das Serum solcher Muttertiere, die infizierte Ferkel zur Welt gebracht hatten, die aus diesen Ferkeln gezüchteten Colistämme bloß in normaler Masse agglutinierten und da ferner mit solchen herausgezüchteten Stämmen weder subkutan, noch per os, noch intraperitoneal neugeborene Tiere infiziert werden konnten, suchten wir nach einem neuen Erreger, welcher die Koch'schen Forderungen vollständig erfüllte. Von der Voraussetzung ausgehend, daß der gesuchte Keim wohl in dem am meisten veränderten Gewebe in der größten Anzahl zu finden sein müßte, fertigten wir nach gründlicher Reinigung eines entzündeten Dünndarmstückes mittels des Wasserstrahles aus der Gewebstiefe Präparate an. Es zeigten sich neben wenigen anderen Keimen Unmassen von grampositiven, an beiden Enden flach abgerundeten sporenfreien, gradlinigen,

kapfulierten Bakterien von etwa Anthraxgröße (doch etwas dicker), die stellenweise in fischzuggleichen Strähnen, an anderen Stellen gleichmäßig verstreut im Gewebe lagen. Mikroskopisch rein wurde der Erreger erhalten, wenn man Präparate nach Entfernung der Serosa und Muskularis anfertigte. Die Züchtung des Erregers bereitete anfänglich große Schwierigkeiten, doch gelang die Reinzüchtung endlich aus einem hämorrhagisch veränderten Lymphknoten in Leberbouillon. Der Erreger läßt sich unter streng anaeroben Bedingungen auf Schrägagar weiterzüchten. Wir konnten das Bakterium aus den entzündeten Gewebslymphknoten von neun Ferkeln, einem Lamm und drei Kälbern züchten, die an „Ruhr“ eingegangen waren. Der Infektionsversuch gelang uns beim neugeborenen Ferkel bisher neunmal und zwar subkutan, per os, per conjunctivam, und per anum, wobei bemerkt werden soll, daß die sichersten Ergebnisse mit dem erwähnten Lämmerstamm erzielt wurden. Ältere Tiere zeigten sich fast ganz resistent und reagierten bei subkutaner Injektion weder mit rötlichen noch mit allgemeinen Symptomen. Es konnten also mit dem neuen Keim bei neugeborenen Ferkeln das charakteristische Bild der „Ferkelruhr“ erzeugt werden.

Der neue Bazillus wird „Bac. zoodysenteriae Hungaricus“ genannt. Er ist streng anaerob, gehört

sicher zu der Fränkelgruppe, besitzt eine Kapsel, bildet keine Sporen und kein Indol. Auf der Zeißler'schen Platte wächst er mit schönem hämolytischem Hof. Der Erreger ist stark pathogen für Meerschweinchen und Tauben, weniger stark für Kaninchen, kaum für Mäuse. Die Pathogenität der Reinkulturen nimmt schnell ab.

Schreiber-Landsberg: Über Aufzuchtkrankheiten des Schweines (Ferkelruß). Der Vortrag ist in der D. T. W. 1928, S. 35 in extenso erschienen.

Wechselrede zum Abschnitt Ferkelkrankheiten.

Pfeiler-Jena verweist auf die Möglichkeit, daß der Detre'sche Bazillus schon in bakteriologischen Instituten gesehen, aber nicht richtig gedeutet worden ist. Mießner-Hannover hält es für schwer, zu den Befunden von Detre jetzt schon Stellung zu nehmen. Der Ansicht Detre's, daß es sich bei der Ruhr der Neugeborenen um eine Krankheit handelt, vermag er nicht beizupflichten. — Unser oberster Grundsatz muß sein, die hygienischen Verhältnisse in der Schweinehaltung zu verbessern. Die Besitzer müssen über den Wert der hygienischen Maßnahmen aufgeklärt werden. Geiger-Eystrup hebt hervor, daß nach den Erfahrungen der letzten Jahre die Virus Schweinepest viel als chronische Ferkelkrankheit vorhanden ist, besonders in Beständen, die bereits einmal mit Pest verfeucht waren. Für Entstehung der Krankheit wird vielfach eine Übertragung von Seiten der Muttertiere verantwortlich gemacht. Die bisherigen Untersuchungen sprechen jedoch, abgesehen von Kümmerern, gegen das Vorkommen von Virusträgern und Dauerausscheidern bei Virus Schweinepest. Otto-Ruhlsdorf spricht über den Lochowstall und betont seine Vorteile. Bei der Fütterung erwähnt er die milchfreie Aufzucht der Ferkel. Pfeiler-Jena glaubt, daß Schreiber mit seiner Angabe über die Suisepitimusinfektionen die Verhältnisse für den Osten richtig kennzeichnet. Er bittet Geiger, anzugeben, ob er experimentelle Unterlagen für seine Bemerkung habe, daß es bei Virus Schweinepest keine Virusträger gibt. Ökonomierat Keiser-Berlin macht darauf aufmerksam, daß sich in der Schweinehaltung eine wirtschaftliche Umwälzung vorbereitet. Das Schwein zieht sich nach der Kartoffel und dem größeren Besitz. Besondere Aufmerksamkeit muß den Stall- und Haltungsfragen gewidmet werden. Aber sie müssen lokal behandelt werden. Weiterhin erscheint ein eingehendes Studium der Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse der verschiedensten Stallbauten in den verschiedensten Teilen des Landes nötig. Wetzler-Hannover weist auf die Bedeutung der Parasiten, z. B. der Strongyloides-Invasion bei Saugferkeln hin, die im Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover häufig beobachtet wurden. Die Parasiten verursachen mehr oder weniger schwere Darmentzündungen mit allen Folgeerscheinungen. Die entzündliche, aufgelockerte Schleimhaut dient Bakterien und Darmtoxinen als Eintrittspforte in den Körper, denen der durch den Parasitenbefall in seiner Widerstandsfähigkeit geschwächte Organismus leicht erliegt. v. Ostertag-Stuttgart hält die Frage der Virusausscheider noch nicht für geklärt. Er weist darauf hin, daß nach allen Erfahrungen über das Auftreten der Schweinepest in Ländern, wo die Schweine geweidet werden, angenommen werden muß, daß sich das Virus der Schweinepest sehr lange im Wühl- und Weideboden hält. Der Witz der Schweinefallhygiene besteht in Schaffung von Trockenheit und Wärme im Schweinefall, die am besten im alten Holzstall (v. Podbielski) gesichert ist und im Zementstall durch Einlage von Holzpfritzen als Lagerstätte, wenigstens hinsichtlich der Trockenheit erreicht wird. Knell-Gießen beschreibt den Bau eines Stallbodens nach Beobachtungen am Wildschwein. Beller-Berlin-Dahlem hält die Ausführungen von Otto für recht optimistisch. Er weist auf die Bedeutung von Tierzucht und Tierernährung für die Ausbildung und praktische Betätigung des Tierarztes hin. Otto-Ruhlsdorf stellt fest, daß seit acht Jahren in Ruhlsdorf exakte Temperaturaufzeichnungen zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ställen gemacht werden. Pfeiler-Jena betont, daß der Zementstall nicht schlechtweg unbrauchbar ist. Es gibt nicht wenige Betriebe mit Zementställen, die gute Aufzucht liefern. Schermer-Göttingen macht darauf aufmerksam, daß er vor zwei Jahren in München ausführlich über Untersuchungen von Ställen in bezug auf Temperatur, Feuchtigkeit und Kohlenstoffgehalt und über ihren Zusammenhang mit dem Auftreten von Krankheiten

berichtet hat. Detre-Budapest ergänzt in seinem Schlußwort noch die Angaben über den von ihm bei der „Ruhr“ der Ferkel gefundenen Bazillus.

Raebiger-Halle: Der derzeitige Stand der Geflügel-tuberkulosebekämpfung. Der Vortrag ist in der D. T. W. 1927, S. 773, in extenso erschienen.

Zur Differenzierung des Bact. pullorum (Rettger) vom Bact. paratyphosae. (Bac. gallinarum Klein, Bact. sanguinarium Moore, Bac. typhi gallinarum alcalifaciens Pfeiler).*)

Von Prof. Dr. Mießner, Hannover.

Es wurden 29 Stämme des Bact. pullorum und 28 Stämme des Bact. paratyphosae einer vergleichenden Prüfung unterzogen. Die Untersuchung der Stämme erstreckte sich auf das morphologische, kulturelle, biochemische und agglutinatorische Verhalten. Bei den Untersuchungen ergab sich, daß morphologische Unterschiede zwischen dem Bact. pullorum und dem Bact. paratyphosae nicht bestehen. Ebenso war eine Unterscheidung beider Erregertypen mittels der Agglutination nicht möglich, da beide Bakterienarten sowohl mit Kükenruhrserum wie mit Paratyphosenserum gleich hoch agglutinierten. Durch die kulturelle und biochemische Prüfung konnten jedoch 16 Stämme als typische Pullorumstämme ermittelt werden, da sie auf Agar und auf der Conradi-Drigalskiplatte sich durch zarteres Koloniewachstum auszeichneten, Traubenzucker meist vergärten (15 Stämme), Maltose und Dulcitol unverändert ließen und in der Methylrotprobe nach Rettger und Koser ein negatives Verhalten zeigten. Drei Stämme stimmten vollkommen mit dem Bact. paratyphosae überein, und zehn Kükenruhrstämme, die in Maltose oder in Dulcitol Säure gebildet hatten, werden als Zwischenstufen angesprochen, da sie weder die typischen Eigenschaften des Bact. pullorum noch die des Bact. paratyphosae besitzen. Um eine Eingruppierung dieser Zwischenstufen zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, solche Stämme dem Bakterium zuzurechnen, mit dem sie die meiste biochemische Übereinstimmung zeigen. Es müßten also Bakterienstämme, die Maltose angreifen und Dulcitol unverändert lassen (oder umgekehrt), wenn sie methylrotpositiv sind, dem Bact. paratyphosae, wenn sie methylrotnegativ sind, dem Bact. pullorum zugerechnet werden.

Beller-Berlin-Dahlem: Zur Ätiologie des Kükensterbens. Der Vortrag erschien in der D. T. W. 1927, S. 827.

Junggeflügelkrankheiten, ihre Bekämpfung und wirtschaftliche Bedeutung.

Von Schmidt-Hoensdorf, Halle.

Nach den Erfahrungen des Kammerinstitutes Halle sind die Kükenruhr, die Kokzidiose und die Wurminvasionen¹⁾ der Küken und des Junggeflügels eine große Gefahr für die deutsche Geflügelzucht. In der Zeit vom 1. April bis zum 27. September 1927 sind vom Institut 362 Küken und Jungtiere von Hühnern und Puten untersucht worden. Von diesen litten 94 = 26 Prozent an Kükenruhr, 125 = 35 Prozent an Kokzidiose und 43 = 11 Prozent waren mit Würmern, und zwar am häufigsten mit Haarwürmern, daneben aber auch mit Spulwürmern und Luftröhrenwürmern befallen. Die wichtigste Erkrankung ist ohne jede Frage die Kükenruhr²⁾. Sie wurde in 30 Beständen festgestellt, von denen 12 den Farmbetrieben, der Rest landwirtschaftlichen Betrieben zugerechnet werden müssen. Alle unternommenen Maßnahmen, die erkrankten Tiere zu behan-

*) Original erscheint in der D. T. W.

¹⁾ Schmidt: T. R. 1926, S. 859.

²⁾ Spiegl und Schmidt: Arch. f. pr. Tierheilkunde 1927, 56, S. 313.

deln, haben zu keinen praktischen Ergebnissen geführt, insbesondere konnte bei Bakterienausscheidern kein Aufhören des Verstreuens von Ansteckungskeimen erreicht werden. Es bleibt daher als einziger Weg der Bekämpfung die Ausmerzungen der kranken Tiere, bzw. der Bakterienausscheider übrig. Zur Feststellung der infizierten Tiere wird wie in allen übrigen Ländern mit intensiver Geflügelzucht die Agglutinationsprobe benutzt. Die Blutentnahme erfolgt aus der oberflächlichen, etwas distal vom Ellbogengelenk auf der Unterfläche des Flügels sichtbaren Vene, die mit einer kleinen Lanzette angestochen wird. 2—3 ccm Blut sind ausreichend. Auf diese Weise kann in einer Stunde mindestens bei 30 Tieren Blut entnommen werden. Zur Herstellung der Testflüssigkeit werden nun längere Zeit auf künstlichen Nährboden gezüchtete Stämme verwendet. Nach Einstellung des Systems wird von jedem Tier nur eine Probe in einer Verdünnung von 1 : 100 angesetzt. In einzelnen Beständen reagierten bis zu 80 Prozent der Tiere positiv. Die große wirtschaftliche Bedeutung der Kükenruhr wird durch die in 19 überwachten Beständen mit zusammen 17 336 Küken aufgetretenen Verluste, die sich auf $9\,956 = 57$ Prozent der Küken beliefen,argetan. Es ist dringend notwendig, daß mit der Bekämpfung und wenn möglich der Tilgung der Seuche in den Großbetrieben begonnen wird, bevor noch der bäuerliche Besitz, der in Deutschland der Hauptproduzent von Eiern ist, verfeuchtet wird.

Die in dieser Aufzuchtperiode zahlenmäßig an erster Stelle stehende Kokzidiose ist weit verbreitet und in landwirtschaftlichen und Farmbetrieben gleichmäßig anzutreffen. Häufig war sie mit der Kükenruhr vergesellschaftet. Die an Kokzidiose verendeten Tiere sind gewöhnlich etwas älter als die an Kükenruhr gestorbenen. Die Diagnose ist durch den Nachweis der Oozysten leicht zu erbringen. Nachdem bisher die Behandlung erkrankter Tiere wenig erfolgreich war, sind jetzt nach der Methode Krijnsman überraschend gute Erfolge mit Cresolpräparaten zu verzeichnen, die stark verdünnt mittels einer Pipette per os verabreicht wurden. Daneben sind selbstverständlich die schon immer üblichen Desinfektionsmaßnahmen, die besonders in der ausgiebigen Anwendung kochenden Wassers bestehen, durchzuführen. Ferner haben sich als besonders zweckmäßig Wechselfauläufe bewährt. — Bei der Bekämpfung der Haarwürmer empfiehlt sich die Anwendung von Anisöl. — Zuletzt wird noch kurz auf Lähmungserscheinungen bei Jungtieren eingegangen, deren Ätiologie noch unklar ist.

Experimentelle Studien mit Antidiphtherin.

Von Dr. Sachweh, Münster.

Es wird ein kurzer Überblick über die mit Antidiphtherin angestellten Versuche gegeben. Nach der Kutanimpfung wurden bei Hühnern jeden Alters die typischen Antidiphtherinreaktionen beobachtet, während nach intravenöser, intramuskulärer und intraperitonealer Impfung selbst mit hohen Dosen wenig Positives zu erreichen war. Durch kutane Verimpfung von Antidiphtherin oder von Material, das einem künstlich erzeugten Primäraffekt entstammte, konnten bei Hühnern mit noch bestehenden oder im Abflauen begriffenen Primäraffekten sekundär an beliebigen Stellen neue Reaktionen ausgelöst werden. Durch den Eingriff kann die Infektion des Primäraffektes, wenn sie im Abflauen begriffen ist, nochmals angehen und es kommt zu neuen Effloreszenzen in der Umgebung des künstlich gesetzten Primäraffektes. Die Reaktion bleibt streng lokalisiert. S. glaubt daher, daß die Reaktion nicht zu einer allgemeinen Immunität führen kann. Er ist der Ansicht, daß es sich hierbei um die Bildung unspezifischer Reizkörper handelt und die Immunität auf die Impfstelle lokalisiert bleibt. In Übereinstimmung damit erwiesen sich mit Antidiphtherin vorbehandelte Versuchstiere nach künstlicher und natürlicher Infektion mit Diphtherievirus als nicht immun. An Diphtherie erkrankte Hühner waren dagegen

meistens 6 Wochen nach erfolgter Genesung gegen künstliche und natürliche Diphtherie-Neuinfektion geschützt. Innerhalb der 6 Wochenfrist kann es nach Einwirkung spezifischer und unspezifischer Reize immer wieder zu Neueruptionen kommen, es können also latent oder geringgradig erkrankte Hühner nach der Antidiphtherinimpfung aufs neue mehr oder weniger stark erkranken. Nach intravenöser und intraperitonealer Verimpfung von in physiologischer Kochsalzlösung aufgeschwemmtem Antidiphtherin erwiesen sich die Versuchstiere gegenüber der Spontaninfektion widerstandsfähiger. Sie erkrankten zwar auch, aber nicht so typisch und umfangreich wie bei der Antidiphtherinhautimpfung. Wenn auch keine absolute Immunität gegenüber dem verwendeten Diphtherievirus zu erzielen war, so sind die Versuche doch so ausgefallen, daß sie die Beobachtungen der Praxis über die günstige Wirkungsweise des Antidiphtherins dem Verständnis näher gebracht haben.

Becker-Bevensen: Bekämpfung von Geflügelkrankheiten. Der Vortrag fiel aus.

Die Bekämpfung der Vogelmilben.

Von Dr. Neumüller, Jena.

Die bisher bekannten Bekämpfungsmittel sind zum Teil zu teuer, zu umständlich, mit zu viel Aufwand verknüpft oder zu unlänglich, wie z. B. das Moton. Die Bekämpfungsmethoden müssen mehr als bisher die Biologie der Vogelmilben berücksichtigen. Grundlegende Arbeiten hierüber haben Wood und Köhnlein geliefert, die aber anscheinend zu wenig beachtet worden sind. Ein Bekämpfungsmittel hat Rücksicht zu nehmen auf die große Lebensfähigkeit der Vogelmilben, insbesondere auf ihre Eigenschaft, lange Hungerperioden überdauern zu können, auf ihren Wandertrieb und auf die Eigenschaft, Kolonien zu bilden. Von physikalischen Eigenschaften muß verlangt werden, daß es gut benetzt, nicht allzu flüchtig ist und eine gallertige Konsistenz hat. In Anlehnung an das von Köhnlein ausgearbeitete Verfahren und auf Grund eigener Versuche mehr physikalischer Natur wird folgendes Verfahren empfohlen:

In warmem Wasser werden — vielleicht schon am Tage vor der Behandlung — 5 bis 7 Prozent Schmierseife gelöst. Vor der Verwendung werden dieser Lösung 5 Prozent des Desinfektionsmittels, also Kresolseifenlösung, Kohrsyl-Bazillol oder Bazillol zugesetzt. Die beiden ersten Präparate sind die billigeren; sie sind aber ebenso wirksam. Es ist zweckmäßig, wenn man die Lösung mit Regenwasser bereitet.

Bei Holzställen, namentlich wenn schon einmal behandelt ist, beginnt man von außen mit der Bekämpfung, indem man mittels Tüncherquaste die Außenflächen bestreicht, bis keine trockenen Flecken mehr vorhanden sind. Alsdann werden im Stall die Lieblingssitze der Milben und alle sonstigen Holzteile, die Legenester, Futtergefäße usw. bestrichen. Besondere Sorgfalt ist den Ritzen zu schenken. Die Desinfektionslösung muß in sie hineingespritzt werden. Danach nimmt man die Wände und die Decke vor. Der Boden mit samt dem Dünger wird gründlich benetzt. Jetzt erst werden die Sitzstangen und anderes Holzmaterial von ihren Plätzen weggenommen. Die Anheftungs- und Auflagerungsstellen der Sitzstangen, überhaupt alle bisher nicht von der Desinfektionsflüssigkeit berührte Stellen werden nochmals bepinselt. Nachdem das Desinfektionsmittel zehn Minuten eingewirkt hat, werden die Sitzstangen und die Holzgerätschaften mit heißem Wasser abgespült. Sollte die Schmierseifen-Desinfektionsmittellösung zu dick geraten sein und schlecht trocknen, dann muß man nach einiger Zeit auch die Stallwände mit warmem Wasser abwaschen. Legenester, die sich schlecht desinfizieren lassen, verbrennt man am besten. Ganz zum Schluß wird der Dünger entfernt und

der Boden nochmals mit der Desinfektionslösung bestrichen. Der Dünger selbst wird sicherheitshalber verbrannt oder vergraben. Diese Maßnahme hat eigentlich nur erzieherische Gründe.

Die Behandlung der Ställe ist am frühen Vormittag vorzunehmen. Danach sind sie offen zu halten, damit der Geruch abziehen kann und damit die Innenflächen trocken werden. Am Abend des gleichen Tages ist der Stall wieder beziehbare. Eine Behandlung der Hühner ist nur nötig, wenn man unter den Schuppen der Beine Milben nachweisen kann, was in der Regel jedoch nur bei starkem Befall vorkommt. Man kann zu ihrer Abtötung das gleiche Mittel anwenden, muß es aber später gut auswaschen.

Die nach diesem Verfahren behandelten Hühnerställe wurden 5 Monate lang kontrolliert und erwiesen sich in dieser Zeit als frei von Milben. Eine Wiederholung der Behandlung hat sich selbst da nicht nötig gezeigt, wo unter den ungünstigsten Umständen gearbeitet wurde.

Wechselfrede zum Abschnitt Geflügelkrankheiten.

Pfeiler-Jena weist darauf hin, daß die Geflügelcholera wieder stärker auftreten wird, sobald der Verkehr mit Rußland wieder voll im Gange sein wird. Für die Bekämpfung der Tuberkulose hat sich das Separationsprinzip bewährt. — Bezüglich der Identität des Kleinfischen Bakteriums ist zu sagen, daß die Originalstämme von *B. sanguinarum* (Moore) bzw. *gallinarum* (Klein) bis jetzt wohl noch nicht mit den in den letzten fünf Jahren in Deutschland isolierten Stämmen identifiziert worden sind. Ohne näher auf die Nomenklaturfrage einzugehen, weist Pfeiler an der Hand eines Beispiels auf die Notwendigkeit der Befolgung der Nomenklaturregeln hin. Die tierärztliche nomenklatorische Noia darf sich nicht weiter in die Para-Stellung begeben. Das ist eine Gefahr für sie. Auch dürfte es sich empfehlen, allzu wissenschaftliche Erörterungen auf den Fachtierärztetagen zu vermeiden. Diese lassen sich ebenso gut in der Fachliteratur austragen. Römer-Cröllwitz hebt hervor, daß den Tierärzten zu ihrer Mitarbeit Dank gebühre, da ungeheure Werte in der Geflügelzucht stecken. Wir dürfen in Deutschland nicht solche Verluste erleiden, wie es in Amerika der Fall ist. Das ist unter anderem durch Vorbeuge (gute Ställe, Sauberkeit, Auslaufpflege) zu erreichen. Es ist bedauerlich, daß an der Studienreise und dem Weltgeflügelkongress in Kanada nicht ein Tierarzt beteiligt war. Die deutsche tierärztliche Wissenschaft hat drüben gut abgeschnitten. Die ausgezeichneten Präparate und Tafeln des Hygienischen Institutes der Tierärztlichen Hochschule Hannover erregten große Aufmerksamkeit. — Mießner-Hannover gibt seiner Freude darüber Ausdruck, Herrn Römer hier begrüßen zu können und dankt ihm für seinen Bericht über die Amerikareise. Es ist unser Prinzip, Vertreter der Landwirtschaft heranzuziehen zu unseren Tagungen, weil wir davon eine gegenseitige Befruchtung erhoffen. — Ich bin entgegen der Ansicht Pfeiler's der Auffassung, daß auf der Fachtierärztetagung alle einschlägigen wissenschaftlichen Fragen ebenso ausführlich erörtert werden sollten wie die mehr rein praktischen Belange. Zur Bekämpfung der

weißen Ruhr der Küken ist auf eine hygienische Aufzucht, Säuberung der Brutkästen, tägliche Reinigung und Desinfektion der Kükenbüden, sofortige Vernichtung aller kranken Tiere, Beschränkung in der Zahl der Tiere unter einer Glucke größtes Gewicht zu legen. Die durch Blutuntersuchung als verdächtig erkannten Mutterhennen sind aus dem Zuchtstall zu entfernen und wenn möglich sofort abzuschlachten. Sachweh-Münster lehnt in Ermangelung eines besseren die Antidiphtherieschutzimpfung nicht ab. Schreiber-Landsberg hebt hervor, daß sich das Katebin gallin. an einem großen Material und nach den übereinstimmenden Mitteilungen der Berichterstatter als ein sicheres Mittel zur Schutz- und Heilimpfung bei Geflügeltuberkulose bewährt hat. Raebiger-Halle weist darauf hin, daß die unspezifische Impfung gegen die Geflügeltuberkulose keinen praktischen Wert hat, weil die dadurch erzielte Schutzwirkung von zu kurzer Dauer ist. Sie erlischt nach den von ihm gemachten Feststellungen schon nach 1½ Monaten. Detre-Budapest berichtet von einem von seinem Mitarbeiter Rohonyi beobachteten Fall, in dem durch den Import eines Hahnes mit hohem Blutwert für *B. pullorum* ein bisher seuchenfreier Bestand verseucht wurde.

Hobstetter-Jena schließt die Versammlung, nachdem Ministerialrat v. Ostertag noch dem Ortsausschuß sowie Prof. Mießner für die Vorbereitung der Tagung den Dank der Teilnehmer ausgesprochen hatte.

Am Nachmittag besichtigten die Teilnehmer die Mustergeflügelarm des Herrn Marschall in Lichtenhain bei Jena.

3. und 4. Oktober 1927.

Studienfahrt durch thüringische Zuchtgebiete. Zunächst wurde das Muttergut des Herrn Dr. Krebs-Holzdorf besichtigt. Besonders erwähnenswert ist der von der Firma Hüttenrauch-Apolda eingerichtete Kuhstall. Der Erbauer war selbst anwesend und bot ein kurzes Referat über seine Erfahrungen auf dem Gebiete des Stallbaues. Auch das schwarzbunte Niederungsvieh, die Schweinezucht und die Schafherde fanden große Beachtung. Auf der Weiterfahrt wurde dann die Merino-Fleischschafzucht des Oberamtmanns Werther-Schöndorf besucht. Der Staatsgutpächter Bührig in Liebestadt zeigte seine Zucht des veredelten Landfischweines, die allgemeine Anerkennung fand. Auch seine Rinderherde (schwarzbuntes Niederungsvieh) war hinsichtlich Form und Leistung beachtlich. Ganz hervorragend waren die Pferde und Rinder des Gutsbesitzers Kühn in Vieselbach, dessen Zucht dann besucht wurde. Besonders erwähnenswert ist das wertvolle Stutenmaterial, das zu den besten Thüringens gehört. Gelegentlich der Kaffeetafel gab Ob.-Regierungsrat Koch-Weimar in glücklicher Ergänzung des Gesehenen in großen Zügen ein Bild über die Organisation und den Stand der Tierzucht in Thüringen.

Am nächsten Morgen wurde von Eisenach aus dem preussischen Hauptgestüt Altfeld ein Besuch abgestattet.

Anatomie und Physiologie.

Brückner, H.: Arbeiten über die basophile Substanz in den jugendlichen roten Blutkörperchen. II. Mitteilung. Über die physikalisch-chemischen Eigenschaften der basophilen Substanz in den jugendlichen Erythrozyten. (Archiv f. Hygiene 1927, Bd. 98, S. 95.)

Die basophile Substanz im „Nativ“-zustand (feuchter Blutaustrieb) ist ein äußerst reaktionsfähiger labiler Körper im Kolloidzustand. Durch ganz einfache Manipulationen gelingt es, die Substanz in jeder beliebigen Erscheinungsform zur Darstellung zu bringen.

Durch plötzliche energische Wasserentziehung mit Hilfe der gewöhnlichen Fixierungsmittel (Alkohole) kann man die mit basophiler Substanz begabten Erythrozyten in den Flockungszustand der „Polychromasie“ überführen, während sowohl Osmiumsäuredämpfe als auch trockene Farbstoff-

pulver die basophilen Zellen unter der Form der Granulation zur Darstellung bringen.

Die Einwirkung höherer Temperaturen (60—100° C) auf die basophile Substanz im „Nativ“-zustand ruft infolge plötzlicher Wasserentziehung ausschließlich die Flockungsform der „Polychromasie“ hervor. Unter dem Einfluß fallender Temperaturen (50 Grad bis 4 Grad C) tritt dann mehr und mehr die Granulation neben der Polychromasie in Erscheinung. Die jeweilige Erscheinungsform der basophilen Substanz bei der gewöhnlichen Art der Fixierungs- und Färbemethoden (Alkoholfixierung der luftgetrockneten Blutaustriebe) kommt durch die Austrocknung an der Luft zustande. Das Verhältnis der Zahl der Polychromaten zur Zahl der basophilen punktierten Erythrozyten ist eine Funktion der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der Atmosphäre bzw. der Verdunstungsgeschwindigkeit des Wassers aus den Zellen.

Polychromasie, basophile Punktierung und vitalgranuläre Form der basophilen Substanz sind verschiedene Erscheinungsformen der gleichen Grundsubstanz.

Im kreisförmigen Blute oder im Knochenmark (Nativzustand) ist die basophile Substanz höchstwahrscheinlich im solvatisierten Zustand im Zellplasma vorhanden und gleichmäßig im Protoplasma verteilt. Die im mikroskopischen Bilde sichtbaren Erscheinungsformen der basophilen Substanz sind ausschließlich Kunstprodukte. Aus diesen „zufälligen“ Erscheinungsformen läßt sich die Abstammung der basophilen Substanz vom Kern (Theorien der Kernabstammung) nicht beweisen. In welchem Stadium der Entwicklung die basophile Substanz in das Protoplasma hineinkommt, ist eine Frage, die zurzeit nicht zu beantworten ist. Sicher ist nur, daß sie bereits in den allerfrühesten Embryonalzellen massenhaft vorkommt.

Baars.

Kaszás: Restnitrogengehalt des Blutes bei Hühnern. (Közlemények az összehasonlító élet-és kórtan köréből. 1927, XX, S. 155.)

Es wurde festgestellt, daß der Restnitrogengehalt im Blute mit der Zunahme des Körpergewichtes parallel wächst. Erst durch dreitägiges Hungern läßt sich eine Verminderung des normalen Wertes bis um 12 Prozent, durch viertägige Nahrungsentziehung um 20,5 Prozent erzielen. Bei künstlich hervorgerufenen Temperatursteigerungen zeigte der Gehalt an Restnitrogen keine Erhöhung, und daselbe wurde beobachtet in zwei Fällen von natürlich entstandenem Fieber. Der Bestimmung des Restnitrogengehaltes dürfte keine diagnostische Bedeutung zukommen, da dessen Werte schon unter normalen Verhältnissen große Schwankungen erkennen lassen.

Marek.

Innere Medizin und Chirurgie.

Polano, O.: Die Rektalnarkose mit E 107 bei gynäkologischen Untersuchungen und Operationen. (Aus der Gynäkologischen Universitäts-Poliklinik München.) (Münch. m. W. 1927, S. 630.)

Verf. berichtet des näheren über die vorliegende, bereits durch die Tageszeitungen bekannt gewordene Methode. Es handelt sich dabei um ein von Geheimrat Willstätter-München und W. Duisberg jun. gefundenes organisches Bromalkoholpräparat, das unter der Fabrikbezeichnung E 107 von den Elberfelder Farbwerken hergestellt wird, sich jedoch noch nicht im Handel befindet.

Als Nachteil jeder Rektalnarkose muß der Umstand gelten, daß es nicht wie bei der Inhalationsnarkose möglich ist, eine Unterbrechung der Narkose herbeizuführen. Jedoch ist es möglich durch Einführung eines Mastdarmrohres einen Teil der infundierten Flüssigkeit wieder zu entfernen.

Bei der Anwendung des Mittels in 200 Fällen hat sich gezeigt, daß eine geringe Dosierung am Platze ist und daß unter Umständen gleichzeitig mit Ätherinhalationen nachgeholfen werden muß. Die Technik besteht in der Verabreichung eines Einlaufes von 200 ccm Aqu. dest., in dem 0,1 g gepulvertes E 107 auf 1 kg Körpergewicht gelöst wird. Die Wirkung äußert sich 2—5 Minuten nach der Injektion in Form eines starken Müdigkeitsgefühles, dem manchmal ein leichter Erregungszustand vorangeht. Verf. sieht in der vorliegenden Methode ein hervorragendes, bisher auf andere Weise nicht erreichtes Mittel, um Frauen, die untersucht bzw. operiert werden sollen, auf einfache, sie nicht belästigende Art in ein Stadium der Amnesie und teilweisen Analgesie zu versetzen, das für Untersuchungszwecke und kleinere Operationen ausreicht, bei großen Eingriffen aber noch den Zusatz geringerer Mengen eines Inhalationsnarkotismus verlangt.

Carl.

Lehr, L.: Kryptorchismus beim Hunde und seine chirurgische Bedeutung. (W. t. Mschr. 1927, XIV Jahrg., S. 257.)

Als Operationsmethoden wurden angewendet: 1. Flankenschnitt, 2. Medianschnitt in der Linea alba, 3. Paramediane Kryptorchidektomie. Kryptorchismus kommt beim Hunde lange nicht so häufig vor als angenommen wird. Kryptorchide Hoden zeigen große Neigung zu maligner Tumorbildung. Der Arbeit sind 3 Bildtafeln histologischer Schnitte beigelegt.

Berge.

Jonquière, H.: Vom Ekzem bei Mensch und Tieren, seine Behandlung durch Organtherapie (Leber). (In.-Dissert. Toulouse 1925.)

Verfasser führt die verschiedenen Definitionen des Ekzems an. Nach Bröcq ist das Ekzem eine entzündliche Dermatoze, die durch Rötung (oft auch fehlend), durch Bläschenbildung, Exsudation und durch Krustenbildung bzw. Desquamation charakterisiert ist. Analog hiermit wird die unter dem Namen Hufkrebs (in Frankreich „cra-paud“) bekannte Pododermatitis betrachtet. Nach Jonquière ist das Ekzem beim Menschen und bei Tieren, ebenso das Ekzem des Hufes beim Pferde (Hufkrebs) als eine spezielle Art der Kutanreaktion auf die Gifte, die bei der Verdauung nicht durch die Leber neutralisiert worden sind, aufzufassen und daher eine Anaphylaxie in der Haut hervorrufen, wobei erworbene oder hereditäre Prädisposition eine Rolle spielt. Arbeitet der Verdauungsapparat nicht in der richtigen Weise und werden die Eiweißstoffe nicht normal abgebaut, so entstehen giftige Stoffe, welche absorbiert werden und in die Leber gelangen. Dieses Organ hält entweder die Gifte zurück, oder modifiziert ihre Struktur und macht sie unschädlich. Diese antitoxische Funktion kann jedoch verändert, defekt oder selbst zerstört sein, die Leber genügt nicht ihrer Aufgabe, sie läßt die Toxine intakt, welche sie normaler Weise zerstören sollte, damit sie eliminiert werden können. Sie zirkulieren im Blute. Zunächst sucht die Niere die ungenügende Tätigkeit der Leber auszugleichen, sie wird hierdurch jedoch überlastet, da es nicht ihre Aufgabe ist. Zuletzt dirigiert der Organismus diese Gifte nach der Lunge oder der Haut, wo sie die Rolle der Antikörper spielen, und auf die Zellen der Haut eine anaphylaktische Wirkung ausüben. Die sensibilisierten Zellen reagieren nunmehr auf den Reiz, das Ekzem tritt in Erscheinung und übernimmt eine regelrechte Rolle der Ausscheidung. Eine äußerliche Behandlung wie die Desensibilisation durch die Kutireaktion erscheint dem Verfasser in Wirklichkeit nur ein Palliativmittel zu sein; die Affektion wird die Haut verlassen und sich beispielsweise auf die Lunge übertragen (Asthma, Bronchialkatarrh). Eine Tatsache gibt nur den Schlüssel zu diesen Vorgängen und das ist die mangelhafte Funktion der Leber. Um diese zu ersetzen dient die Opothérapie (Organtherapie: in diesem Falle mit Lebersubstanz). In der Tat hat sich diese Hypothese durch das Experiment bewährt und die erhaltenen Resultate bekräftigen sie. Das Ekzem beim Menschen und Tier erscheint als eine Autointoxikation, dessen Ursprung im Verdauungsapparat und nicht in der Haut liegt, aber deren Schlüssel in der Leber zu suchen ist. Bei Behandlung des Menschen wurden Leberextraktpillen, beim Hunde rohe Rinderleber (bis 150 g pro Tag), auch in Form von Pulver gegeben; bei Hufkrebs wurden Mengen bis zu 1 kg auf 100 kg Lebendgewicht (in 25 Tagen bis zu 74 kg) mit Erfolg verabreicht.

A—

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

v. Düring: Beiträge zur Kenntnis der Erkrankung von Hund, Katze und Frettchen an Otitis externa parasitaria unter besonderer Berücksichtigung der Häufigkeit ihres Vorkommens, der Artbestimmung der Milben sowie Untersuchungen über ihre zweckmäßige Bekämpfung. (Aus der Klinik für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin. — Direktor: Prof. Dr. W. Hinz.) (Arch. f. wiss. Tierheilkunde 1926, 55, S. 253.)

In der I. Mitteilung, Geschichtliches, behandelt Verf. die Ansichten der Autoren über die Krätze und die Milben in früheren Zeiten. Der Erreger der Ohräude des Hundes und der Katze wurde erst 1838 durch Hering entdeckt, für das Kaninchen wurde er erst 1859, für das Frettchen 1893 gefunden. Was die Verbreitung der Milben betrifft, so gibt es beim Hund mindestens vier nicht parasitäre Formen. Katzen sind zu 70 Prozent von Otitis externa parasitaria befallen, sind aber nicht so empfindlich wie Hunde, die dann immer bestimmte Krankheitsercheinungen äußern. Besonders disponiert scheinen Jagdhunde zu sein. — Der Erreger der Otitis externa parasitaria der Karnivoren ist der *Otodectes cynotis* Hering 1838, während für das Kaninchen der *Psoroptes cuniculi* Railliet in Frage kommt. Die beiden Milben lassen sich durch ihre verschiedene Größe, das Größenverhältnis von Rumpf und Gliedmaßen zueinander und den Gliedmaßen untereinander, durch Anordnung und Form der Mundwerkzeuge und durch ihre biologische Entwicklung unterscheiden. — Die klinischen Erscheinungen bestehen bei Hunden vor allem in Unruhe, Schütteln, Kratzen, Störungen des Gleichgewichts, Krämpfen, Zuckungen. Es findet sich eine Vermehrung des Cerumens, das dabei von eigentümlicher, dunkelbrauner Farbe und mäßig weicher bis krümeliger Konsistenz ist. Bei der Katze finden sich mehr Milben als beim Hund. Hier sind auch die Kratzdefekte zwischen Auge und Ohr stärker. Ähnlich sind die Erscheinungen bei den Frettchen. Die Diagnose kann bei allen Tierarten nur durch den verhältnismäßig einfachen Nachweis der Milben gesichert werden. — Eine rechtzeitig eingeleitete Behandlung führt meist in 8—14 Tagen zur Heilung. Als beste Heilmittel haben sich erwiesen 1%ige Chloraminlösung in Verbindung mit Oleum zinci oder 5 prozentige Salben mit Carvi, Anisi, Oleum Thymi, Caryophyllorum nach vorhergegangener Reinigung des Gehörganges und gleichzeitiger Desinfektion des Lagers. Geiger.

Lentz: Ecobol, ein sicher wirkendes Heilmittel gegen die Leberegelseuche der Schafe. (Aus dem Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg und für Berlin. — Direktor: Dr. Scharr.) (T. R. 1927, S. 535.)

Das von der Chemischen Fabrik I. D. Riedel A.-G., Berlin, hergestellte Ecobol ist eine Auflösung eines hochkonzentrierten Filix-Extraktes in chemisch reinen halogenierten Kohlenwasserstoffen. Es wird in Form von Kapseln zu 3,5 ccm per os verabreicht. Eine besondere Dosierung nach Körpergewicht ist nicht notwendig. Bei neun kranken versuchsweise behandelten Schafen wurden keine unangenehmen Nebenerscheinungen beobachtet. Einige Tiere nahmen sogar an Körpergewicht nicht unerheblich zu. Nach der Behandlung wurden bei keinem der behandelten Tiere lebende Leberegel gefunden im Gegensatz zu dem unbehandelt gebliebenen Kontrollschaf. Geiger.

Vaida: Der Nachweis von Leberegeleiern im Kote mit Hilfe einer Anreicherungs-methode. (T. R. 1927, S. 717.)

0,25 Gramm frischen Schaf- oder 0,5 Gramm frischen Rinderkotes werden in einem Zentrifugenglas mit 3 ccm Leitungswasser und 3 ccm Wasserglaslösung vom spezifischen Gewicht 1430 (200,0 Natr. silicic. pur. sicc. pulv. in 350,0 heißem Aqua dest.) verrührt und zentrifugiert. Mit einem quer abgeschliffenen Glasstab werden von der Oberfläche des Zentrifugats 3×5 Tropfen zur Herstellung von drei Objektträgerpräparaten entnommen und sofort untersucht. Bei Anwendung dieses Verfahrens konnte die Anzahl von Leberegeleiern in einem Präparat bis auf 50—70 Stück angereichert werden. Geiger.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Desinfektion der Eisenbahnwagen.

MfLDuF vom 9. Januar 1928 — V. 12696 —.

Durch Runderlaß vom 20. März 1911 — I. A. IIIe 2403 — (LwMBL. S. 103) ist angeordnet worden, daß für sämtliche Eisenbahnwagen, die

zur Beförderung von Klauenvieh benutzt worden sind, die verschärfte Desinfektion vorzuschreiben ist. Ich bringe diesen Erlaß in Erinnerung und weise darauf hin, daß er inzwischen nicht außer Kraft gesetzt worden ist. Ich nehme an, daß auch die zufolge dieses Erlasses ergangenen Viehseuchenpolizeilichen Anordnungen sich noch in Kraft befinden. Sofern das nicht der Fall sein sollte, sind sie neu zu erlassen.

Vallée, H.: De la transmission de la fièvre aphteuse des animaux à l'homme. (Übertragbarkeit der Maul- und Klauenseuche der Tiere auf den Menschen.) (Semaine vétérin. 1926, S. 326.)

Die in der veterinär- und humanmedizinischen Literatur vorliegenden Veröffentlichungen und Stellungnahmen zur Maul- und Klauenseucheübertragung auf den Menschen bieten dem Verf. keine ausreichenden Unterlagen zu einer abschließenden Bewertung. Um hierfür künftig bessere Ergebnisse herbeizuführen und um der sicheren Beantwortung dieser Frage näher zu kommen, empfiehlt der Verf. den human-medizinischen Kliniken und den in Betracht kommenden Veterinäranstalten, ihre Beobachtungen auf diesem Gebiet auszutauschen und gegenseitig zu ergänzen. Er empfiehlt experimentelle Übertragungsversuche des verdächtigen Materials auf Meerschweinchen und empfängliche Großtiere. H.

Kling, C. et A. Höjer: Recherches sur le mode de propagation de la fièvre aphteuse. Transmission du contag. (Laborat. bactériol. de l'état, Stockholm.) (Cpt. rend. des séances de la soc. biol. 1926, Bd. 94, S. 615.)

Durch den regen Handels- und Reiseverkehr wurde die Maul- und Klauenseuche meistens aus Dänemark nach Schweden eingeschleppt. Sie fand in der dichtbevölkerten verkehrsreichen schwedischen Provinz Schonen stets günstige Ausbreitungsmöglichkeiten. Seit dem Jahre 1875 mußte Schweden die Seuche zwölfmal über sich ergehen lassen. Der Ursprungsherd befand sich dabei zehnmal auf Schonen und ganz besonders in dem südöstlichen Teil dieser Insel. Nach den reichbewaldeten Gegenden im Nordosten der Provinz drang die Seuche niemals vor. — Von den durch die Seuche betroffenen Gehöften entfielen 50 Prozent auf die großen, 40 Prozent auf die ganz großen (mit 100 ha und mehr Land) und nur 10 Prozent auf die kleinen Besitzungen. Die Zahlen werden für die Verkehrsverhältnisse bei der Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche mit herangezogen. H.

Büchlmann, E. d.: Schutzimpfung gegen Maul- und Klauenseuche mit Loeffler-Serum. (Deutsch. österr. tierärztl. Wochenschr. 1926, S. 1—2.)

Für eine österreichische Ausstellung in Zell a. See wurden 178 Zuchttiere mit Riemser Hochimmunserum gegen Maul- und Klauenseuche schutzgeimpft. Der denkbar gute Erfolg spricht für die Einführung der Schutzimpfungen in Österreich. Als Muster werden die für Preußen erlassenen Vorschriften hingestellt und staatliche Beihilfe zur Verringerung der hohen Serumkosten oder auch eigene Fabrikation von Maul- und Klauenseuchenserum empfohlen. H.

Golden, G. E.: Why eradicate foot-and-mouth disease by the slaughter method, instead of endeavoring to control it by quarantine methods? (Warum rotten wir die Maul- und Klauenseuchenausbrüche durch die Keulungsmethode aus, anstatt sie durch veterinärpolizeiliche Maßnahmen zu bekämpfen?) (Journ. of the Americ. vet. med. assoc. 1926, Bd. 69, S. 304.)

Der Verf. versucht vergleichende Berechnungen und statistisches Material zugunsten der Keulung sprechen zu lassen. In Deutschland kommen für das Jahr 1911 auf 51 319 000 Stück Klauenvieh 7 578 421 maul- und klauenseuchekranke Tiere. Der Gesamtbestand an Klauenvieh belief sich im Jahre 1924 für Nordamerika auf 170 661 000 Tiere. Davon würden etwa 24 285 414 Tiere an Maul- und Klauenseuche erkrankt sein, wenn in diesem Jahre in den Vereinigten Staaten ein Seuchenzug gewütet hätte, wie ihn Deutschland im Jahre 1911 über sich ergehen lassen mußte.

Die in einem solchen Falle für Nordamerika in Frage kommenden Gesamtkosten würden sich auf das Doppelte von der Summe belaufen, die zur gelungenen Lokalisierung aller Seuchenausbrüche seit dem Jahre 1902, ausschließlich des Jahres 1914, wirklich angewandt ist. Durch beigefügte Lichtbilder werden die Krankheitsercheinungen der Maul- und Klauenfeuche sehr gut zur Anschauung gebracht. H.

Nahrungsmittelhygiene.

Beaufsichtigung der Fleischbeschau, Durchführung der tierärztlichen Lebensmittelkontrolle, Berichterstattung über Verfehlungen in der Fleischbeschau.

Min. f. L., D. u. F.

Geschäfts-Nr. V 11723.

Berlin W 9, den 18. Januar 1928.

I. Die im § 48 B.B.A. vorgeschriebene fachmännische Kontrolle des Beschauersonals nach den Grundsätzen der §§ 75—78 A.B.I. ist künftig wieder planmäßig durchzuführen. Soweit es sich um die Beaufsichtigung des tierärztlichen Beschauersonals handelt, verweise ich hierbei auf meinen Erlaß vom 16. Dezember 1927 — V 12069 —. Aber auch sonst ist jede sich bietende Gelegenheit zu benutzen, um auf eine vorschriftsmäßige Ausübung der Fleischbeschau hinzuwirken. So dürfen auch Feststellungen bei der tierärztlichen Lebensmittelkontrolle, die auf eine nicht ordnungsmäßig durchgeführte Fleischbeschau schließen lassen, nicht unbeachtet bleiben.

II. Wenn bei der lebensmittelpolizeilichen Kontrolle des Fleischverkehrs Fleisch vorgefunden wird, bei dem die vorgeschriebenen Untersuchungs- und Kennzeichnungsmerkmale (a: Schnitte, b: Stempel) fehlen oder nur mangelhaft vorhanden sind, so liegt begründeter Verdacht vor, daß dieses Fleisch entweder keiner oder einer unzureichenden Untersuchung unterzogen war. Bei einem solchen Fleisch oder auch bei Fleisch, dessen Stempel gefälscht sind, können gegebenenfalls Merkmale der Verdorbenheit oder Gesundheitschädlichkeit vorhanden sein, die bei einer ordnungsmäßig durchgeführten Fleischbeschau ermittelt wären und zur Beanstandung des Fleisches geführt hätten. Der Tierarzt hat in solchen Fällen die Pflicht, die fehlende oder mangelhafte Untersuchung im allgemeinen nach den fleischbeschaulichen Vorschriften auszuführen oder zu ergänzen, gegebenenfalls auch eine bakteriologische Fleischbeschau herbeizuführen. Findet er Mängel, die ein Verbleiben des Fleisches im freien Verkehr ausschließen, so hat die Beurteilung jedoch nicht nach den Grundsätzen des Fleischbeschaugesetzes, sondern nach denen des Lebensmittelgesetzes zu erfolgen. Je nach dem Befunde ist das Fleisch als verdorben oder als gesundheitschädlich im Sinne dieses Gesetzes zu bezeichnen, auch dann, wenn Fleisch, das sich im freien Verkehr befindet und fleischbeschaulich als tauglich o. B. abgestempelt ist, Merkmale der Verdorbenheit oder Gesundheitschädlichkeit aufweist, die bei der amtlichen Fleischbeschau anscheinend nicht Beachtung gefunden haben (unvollkommenes Ausbluten, Wässerigkeit des Fleisches, Gelbsucht, Geruchsabweichung, Unreife, Tuberkulose usw.). Eine Kennzeichnung des so beanstandeten Fleisches mit einem der im § 43 B.B.A. aufgeführten Stempelzeichen ist nicht zulässig, da die lebensmittelpolizeiliche Untersuchung nicht als fleischbeschauamtliche Untersuchung anzusehen ist, worauf bereits in dem Erlaß vom 17. Juli 1914 — I A IIIc 2770 II — hingewiesen worden ist. Gegen eine anderweitige Kennzeichnung, aus der die lebensmittelpolizeiliche Untersuchung und Beanstandung des Fleisches ersichtlich ist, sind jedoch Bedenken nicht zu erheben. Eine solche Kennzeichnung findet z. B. in Berlin durch einen ovalen Stempelabdruck in grüner Farbe statt, dessen Inschrift „Polizeiliche Fleischkontrolle, Berlin“ lautet. Es ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn Fleisch, welches zwar als verdorben im Sinne des Lebensmittelgesetzes, aber für den menschlichen Genuß noch geeignet ist, unter Deklaration zum Verkauf, z. B. auf der Freibank, zugelassen wird.

III. Gelegentlich der tierärztlichen Lebensmittelkontrolle festgestellte Verfehlungen bei der Fleischbeschau sind in Zukunft in der gleichen Weise zu verfolgen, als wenn die Verfehlungen bei der fachmännischen Kontrolle des Beschauersonals oder anlässlich der Ermittlung bei einer Fleischvergiftung zur Kenntnis der Aufsichtsbehörde gelangt wären. Bei den anlässlich der Lebensmittelkontrolle ermittelten Verstößen gegen die fleischbeschaulichen Bestimmungen ist nach folgenden Richtlinien zu verfahren:

1. Von dem die Lebensmittelkontrolle ausübenden Tierarzt ist in jedem Falle ein genauer Befund zu erheben, der der Polizeibehörde des Kontrollortes einzureichen ist. Diefes hat fogleich, soweit noch erforderlich, unbeschadet etwaiger wegen Übertretung der lebensmittelpolizeilichen Vorschriften zu treffenden Maßnahmen, die Erhebungen über Besitzer und Vorbesitzer des Fleisches sowie über den in Betracht kommenden Beschauer bzw. Beschautierarzt anzustellen. Zur Vereinfachung des Geschäftsverkehrs hat die Polizeibehörde den Vorgang alsdann dem für die technische Aufsicht des Beschauersonals in dem Ort der ersten Untersuchung zuständigen Veterinärbeamten (Regierungs- und Veterinärarzt, soweit es sich um tierärztliche, Veterinärarzt, soweit es sich um nichttierärztliche Beschauer handelt) zur weiteren Veranlassung zu übersenden.

2. Soweit es ohne besondere Schwierigkeiten angängig ist, ist das beschlagnahmte Fleisch 24 Stunden aufzubewahren, um dem in Betracht kommenden Beschauer oder Beschautierarzt gegebenenfalls Gelegenheit zu bieten, das Fleisch zu besichtigen.

3. Der für die Aufsicht am Beschauorte zuständige Veterinärbeamte (Ziffer 1) hat, soweit nötig unter Zuhilfenahme der Polizeibehörde, die Sachlage zu klären und den Vorgang mit einer Stellungnahme der Anstellungsbehörde des Beschauers oder Beschautierarztes zur weiteren Veranlassung zu übersenden.

4. Gegen Verfehlungen des Beschauersonals ist je nach Lage des Falles und unter Berücksichtigung etwa bereits früher festgestellter Verfehlungen einzuschreiten (Belehrung, Verwarnung, nötigenfalls mit Androhung der Entziehung der Fleischbeschau oder Entlassung aus der Fleischbeschau). In geeigneten Fällen kann die Wiedenzulassung zur Fleischbeschau von der Ableistung eines Kurfufes in der Fleischbeschau an einem größeren Schlachthofe abhängig gemacht werden.

5. Eine Maßregelung von Beschautierärzten wegen Verfehlungen in der Fleischbeschau hat stets nach Weisung des Regierungspräsidenten zu erfolgen.

6. Da es nicht angängig ist, einem Beschauer, der in mehreren Verwaltungsbezirken Fleischbeschau ausübt, die Fleischbeschau in einem Bezirke zu entziehen, im anderen Bezirke dagegen zu belassen, ist hinfür in jedem Einzelfall, in dem der Beschauer in mehreren Bezirken tätig ist, den Nachbarbezirken von der Maßregelung des Beschauers Mitteilung zu machen, damit diese das Erforderliche veranlassen können. Kommt ein anderes Land des Deutschen Reiches in Betracht, so ist an mich zu berichten, damit ich das Weitere in die Wege leiten kann.

7. Auch ist die Genehmigung zur Übertragung von Fleischbeschaubefugnissen an einen neu anzustellenden Beschauer (auch in Fällen der Vertretung), namentlich an Tierärzte, die neu zugezogen sind, nur dann zu erteilen, wenn nach den Ausweispapieren, nötigenfalls nach den eingezogenen Erkundigungen (gegebenenfalls auch bei der Zentralbehörde) Zweifel an seiner Zuverlässigkeit nicht bestehen.

8. Wird eine Verfehlung gegen die fleischbeschaulichen Bestimmungen bei Fleisch festgestellt, das in einer Auslandsfleischbeschaustelle Preußens untersucht war, so ist nach den Richtlinien zu III Ziffern 1, 2 und 3 zu handeln. Die entstandenen Vorgänge sind mir in jedem Einzelfalle sofort einzureichen.

IV. 1. Über alle Verfehlungen in der Fleischbeschau, die gelegentlich der Ermittlungen bei Fleischvergiftungen, bei der technischen Beaufsichtigung der Fleischbeschau oder bei der tierärztlichen Lebensmittelkontrolle festgestellt werden, ist mir, soweit sie die in der Inlandsbeschau Preußens tätigen Tierärzte betreffen, von dem Regierungspräsidenten zu berichten, in dessen Bezirk sich der Wohnort des betreffenden Tierarztes befindet.

2. Die Berichte sind künftig, zusammenfassend alljährlich zum 15. Februar, zum erstenmale zum 15. Februar 1929, zu erstatten. Aus ihnen soll in jedem Einzelfalle die Art der Feststellung der Verfehlung, Name, Wohnort und Approbationsjahr des Beschautierarztes, Art der Verfehlung und Art der Maßregelung ersichtlich sein. Jedoch sind die im Berichtsjahre erfolgten „Belehrungen“ nur der Zahl nach anzugeben.

Die Erlasse vom 14. November 1904 — I. Ga. 9361 M. f. L. — Allgemeine Verfügung Nr. 60/1904 — und des Erlasses vom 29. Juli 1927 — V 7855 — werden aufgehoben.

3. Ist eine Verfehlung gegen die fleischbeschaulichen Bestimmungen an solchem Fleische ermittelt worden, das in einem anderen Lande des Deutschen Reiches der Inlands- oder Auslandsfleischbeschau unterzogen war, so ist zunächst nach III Ziffer 1 Abs. 1 zu verfahren. Alsdann

ist der Vorgang zugleich dem für den Feststellungsort zuständigen Regierungspräsidenten einzureichen. Die Bestimmung zu III Ziffer 2 bleibt dabei unberührt. Der Regierungspräsident berichtet in jedem Einzelfalle sofort an mich und sendet zugleich eine Abschrift dieses Berichtes an die in Betracht kommenden, nachstehend aufgeführten Stellen:

In Bayern: an die Regierungen, Kammern des Innern, in Sachsen: an das Wirtschaftsministerium in Dresden, in Württemberg: an die Oberämter, in Baden: an das Ministerium des Innern in Karlsruhe, in Thüringen: an das Thüringische Ministerium für Inneres und Wirtschaft in Weimar, in Hessen: an die Ministerialabteilung für öffentliche Gesundheitspflege in Darmstadt, in Hamburg: an den Landestierarzt, in Mecklenburg-Schwerin: an das Mecklenburg-Schwerin'sche Ministerium für Medizinalangelegenheiten in Schwerin, in Braunschweig: an den Braunschweigischen Minister des Innern, in Oldenburg: für den Landesteil Oldenburg an das Ministerium des Innern in Oldenburg, in Anhalt: an die Anhaltische Regierung — Abteilung des Innern — in Dessau, in Bremen: an die Medizinalkommission des Senats in Bremen, in Lippe-Detmold: an die Lippische Regierung — Wirtschaftsabteilung — in Detmold, in Lübeck: an die Senatskommission für Reichs- und Auswärtige Angelegenheiten in Lübeck, in Mecklenburg-Strelitz: an das Mecklenburg-Strelitz'sche Ministerium — Abteilung des Innern — Unterabteilung für Medizinalangelegenheiten — in Neustrelitz, in Waldeck: an den Herrn Landesdirektor in Arolsen, in Schaumburg-Lippe: an die Schaumburg-Lippische Landesregierung in Bückeburg.

4. Von Verfehlungen in der Fleischbefchau, die in anderen Ländern des Deutschen Reiches an solchem Fleisch festgestellt werden, das in Preußen amtlich untersucht war, werden die in IV Ziffer 3, aufgeführten Stellen den betreffenden preußischen Landespolizeibehörden direkt Mitteilung machen, die fogleich, falls es sich um Verfehlungen in der Inlandsfleischbefchau handelt, das Erforderliche zu III, Ziffern 3, 4, 5 und 6 zu veranlassen haben. Hierauf ist mir über jeden Fall zu berichten, worauf ich der Zentralbehörde des betreffenden Landes von dem Ergebnis der Feststellungen und von dem Veranlassten Mitteilung machen werde. Bei Verstößen gegen die auslandsfleischbefchaulichen Bestimmungen ist entsprechend wie zu III, Ziffer 8 zu verfahren.

Im Auftrage: Müssemeier.


Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Geheimer Medizinalrat Prof. phil. et Dr. med. h. c. Edelmann in Dresden, der, wie wir in Nr. 53 des Jahrganges 1927 dieser Wochenschrift mitgeteilt haben, infolge Erreichung der Dienstaltersgrenze mit Ende 1927 in den Ruhestand versetzt worden ist, aber noch einen Monat länger die Geschäfte als Landestierarzt und Ministerialrat im Sächsischen Wirtschaftsministerium geführt hat, ist am 31. Januar 1928 unter Belassung in seiner Stellung als Vorsitzender der II. Abteilung des Sächs. Landesgesundheitsamts endgültig aus dem Staatsdienst geschieden. Er hat 48 Jahre hindurch ununterbrochen im sächs. Militär-, Gemeinde- und Staatsdienst gestanden. Da die Landestierarztstelle mit Rücksicht auf eine im Gange befindliche Reform der Sächs. Staatsverwaltung z. Zt. nicht wiederbesetzt werden kann, ist Oberregierungsveterinärarzt Dr. Zietzschmann in Dresden mit ihrer vertretungsweisen Verwaltung beauftragt worden.

25jähriges Jubiläum von Dr. Scharr-Berlin.

Am 1. Februar 1928 feierte Dr. Scharr sein 25jähriges Jubiläum als Direktor des Bakteriologischen Instituts der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg und Berlin. Am 7. Juni 1875 in Berlin geboren, bestand er im Februar 1898 die tierärztliche Fachprüfung an der Tierärztlichen Hochschule Berlin. Bis zum Frühjahr 1901 übte er die tierärztliche Praxis aus, war bis gegen Ende 1902 Volontärassistent am Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin, erwarb während dieser Zeit das Fähigkeitszeugnis für die Anstellung als beamteter preußischer Tierarzt und übernahm am 1. Februar 1903 die Leitung des Bakteriologischen Instituts und der Geschäftsstelle für Seuchen- und Veterinärwesen der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg und für Berlin. Dr. Scharr hat während dieser Zeit das Institut hervorragend geleitet und zu seiner jetzigen Größe ausge-



baut, insbesondere war er führend auf manchen Gebieten des freiwilligen Tuberkulosebekämpfungsverfahrens, indem er verschiedentlich wertvolle Verbesserungen der Untersuchungsmethodik ausführte. Wir sprechen dem verehrten Jubilar unsere herzlichsten Glückwünsche aus. Möge er noch recht lange an der Spitze seines Institutes wirken. M r.

Vorlesungen und Übungen an der Tierärztlichen Hochschule Hannover im Sommerhalbjahr 1928.

Frick: Allgem. Chirurgie 3-st., chirurgisch-propädeutische Klinik 1-st., Operationslehre 3-st., ophthalmoskopische Übungen 1-st., chirurgische Klinik. Künnemann: Allgem. Therapie 2-st., Rezeptierkunde 1-st., propädeutische Klinik für kl. Haustiere 1-st., Toxikologie 2-st., Klinik für kl. Haustiere. Mießner: Mikrobiologie 1-st., Immunitäts- u. Seuchenlehre 4-st., Parasitologie 1-st., mikrobiologische und parasitologische Übungen 6-st. Oppermann: Medizinisch-propädeutische Klinik 2-st., Übungen in der klin. Diagnostik 1-st., gerichtl. Tierheilkunde 3-st., Übungen im Anfertigen von schriftl. Gutachten und Attesten 1-st., med. Klinik. Kronacher: Vererbungslehre 1-st., Allgem. Tierzucht 3-st., Fütterungslehre 2-st., Beurteilungslehre 1-st., Konstitutions- u. Inzuchtlehre 1-st., Übungen in der Tierbeurteilung 2-st. Danckwortt: Anorganische Chemie 6-st., chem. Übungen 6-st. Zietzschmann: Histologie: I. und II. Sem. = 3-st., III. und IV. Sem. = 2-st., mikroskopischer Kursus 4-st., Embryologie 4-st., zentrales Nervensystem 1-st., angewandte Anatomie 1-st. Götz: Diagnostik und Propädeutik am Rinde 2-st., Geburtshilfe 3-st., Sterilität der Haustiere 2-st., Klinik für Geburtshilfe und Rinderkrankheiten. Trautmann: Physiologie 6-st., chem.-physiol. Übungen 6-st., angewandte Physiologie 1-st. Lund: Allgem. Pathologie und pathol. Anatomie 6-st., pathol.-histol. Übungen 6-st., pathol.-anatom. Demonstrationen 2-st., Obduktionen 3-st. Precht: Physik 2-st., Übungen zur med. Physik 2-st. Gerke: Botanik 6-st., pharmaz. Übungen. Stümpke: Soziale Hygiene 1-st. Ude: Zoologie 2-st., zool. Übungen 2-st. Kappis: Betrieb u. Organisation des chir. Operationsraumes 1-st. Valentin: Sportärztliche Untersuchungen 1-st. Hupka: Einführung in die Geschichte der Tierheilkunde 1-st., ambulatorische Klinik. Scheibner: Hufbeschlagkurse tägl. 16—17 Uhr. Neuberth: Pflanzenbau 1-st., Ackerbau 3-st., landwirtschaftl. Betriebslehre 2-st., landwirtschaftl. Technologie 1-st., landwirtschaftl. Unterrichtskurse auf dem Lehrgute Adendorf. Henkels: Chir. Untersuchungsmethoden 1-st., Röntgenologie 1-st., Augenkrankheiten 1-st. Manegold: Fleischbefchaukurse mit je dreiwöchiger Dauer auf dem städtischen Schlachthofe. Koch: Einführung in die Bienenkunde und die Bienenzucht unter besonderer Berücksichtigung der Bienenkrankheiten 1-st. Heuter: Sportliche Übungen zweimal wöchentlich.

Verein Ostpreußischer Tierärzte.

12. Februar 11 h. s. t., im Körte-Saal der Stadthalle Königsberg.
 1. Dr. Nussbag-Perleberg über Schweinefleuchen mit Lichtbildern;
 2. Aussprache über das neue Verfahren bei der Tuberkulosebekämpfung;
 3. Die neuen Fleischbeschaugebühren; 4. Geschäftsbericht; 5. Abschluß eines Vertrages mit dem Tierversicherungs-Verband; 6. Kassenbericht; 7. Vorstandswahl. — Um 15 Uhr gemeinsames einfaches Mittagessen. Dr. Jacobsen, Vorf.

Niederfachengruppe des Reichsverbandes praktischer Tierärzte e. V.

22. Hauptversammlung am Sonnabend, den 11. Februar 1928, 14½ Uhr, im kleinen Saal des Ärztehauses zu Hannover, Hildesheimer Straße 23/24. 1. Geschäftsbericht; 2. Kassenbericht und Kassenprüfung; 3. Festsetzung der Beiträge für 1928; 4. Vorstandswahlen; 5. Aufnahme neuer Mitglieder; 6. 150jähr. Jubelfeier der Tierärztlichen Hochschule Hannover; 7. Deutscher Veterinärat; 8. Das Tierärztekammergesetz im Landtage; 9. Die Buchführungsstellen und ihre Wohlfahrtseinrichtungen.

N.B. Das Ärztehaus kann erreicht werden von Kaffee Kröpcke aus mit den Straßenbahnlinien 1, 18, 19, Haltestelle Schauspielhaus.

Elze und Parnsen, im Januar 1928.

Dr. Machens, Vorf. Dr. Heinemann, Schriftf.

Arbeitsgemeinschaft deutscher tierärztlicher Buchführungs- und Verrechnungsstellen.

Hauptversammlung am Sonnabend, den 18. Februar 1928, nachm. 1 Uhr, in Berlin bei Eggebrecht, Friedrichstraße 109. 1. Festsetzung und Genehmigung der Satzung nebst Beschluß der gerichtlichen Eintragung der A. d. t. B. V. in das Vereinsregister. 2. Beschlußfassung über den Ausbau der Wohlfahrtseinrichtungen der Fürsorgekasse der A. d. t. B. V. 3. Aufnahme neuer Buchführungs- und Verrechnungsstellen als neue Mitglieder. — Die Vorstände sämtlicher tierärztlicher Buchführungs- und Verrechnungsstellen werden dringend gebeten zu erscheinen oder stimmberechtigte Vertreter zu senden. Die Teilnahme von Tierärzten aus preussischen Provinzen und deutschen Staaten, in denen B- oder V.-St. noch nicht bestehen, aber Neigung vorhanden ist, solche zu gründen, sind als Gäste herzlich willkommen.

I. A.: Vet.-Rat Reiche-Nauen.

Tierärztekammer für die Prov. Brandenburg und den Stadtkreis Berlin.

Die Tierärztekammer Berlin-Brandenburg nimmt erneut Veranlassung, die Kollegen darauf aufmerksam zu machen, daß es unstatthaft ist, sich irgendwelchen Tierkrankenstellen zur Verfügung zu stellen.

I. A.: gez. Maak, gez. Munibert Müller.

18. Fortbildungskursus des D.V.R. in Hannover am 25. und 26. Februar 1928.

Sonnabend, den 25. Februar, 13,30 Uhr: Prof. Dr. Oppermann: „Neuere Forschungsergebnisse über die infektiöse Anämie der Pferde“. 14,30 Uhr: Prof. Dr. Mießner: „Geflügelkrankheiten“ (mit Demonstrationen). 15,30 Uhr: Prof. Dr. Lund: „Pferde-Sektion“ (Demonstration). Anschließend Besprechung. Sonntag, den 26. Februar, 9,15 Uhr: Prof. Dr. Zietzschmann: „Topographie der Eingeweide der Körperhöhlen, Demonstrationen an der Kuh“. 10,15 Uhr: Prof. Dr. Henkels: „Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie“. 11,15 Uhr: Prof. Dr. Götze: „Demonstrationen aus der Geburtshilfe und Bujatrik“. Anschließend Besprechung. — Der Kursus findet in der Tierärztlichen Hochschule Hannover statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 10 Mark für beide Tage. Stang.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Trattato di Igiene zootechnica. 2. Aufl. mit 280 Textfiguren. Von Dr. Ferruccio Faelli, Torino. Herausgeber Dr. Francesco Vallards, Mailand, 1927.

Faelli hat unter obigem Titel ein über 700 Seiten umfassendes Werk herausgegeben, das eine Hygiene darstellt und lediglich für den Tierzüchter zugeschnitten ist. Es ist auch für tierärztliche und landwirtschaftliche Studenten, für Anwärter auf den Titel „Hygienischer Sachverständiger“ und Züchter bestimmt. Der Aufbau des Werkes, das 280 Textabbildungen aufweist und eine große Menge von Tabellen und Zahlenmaterial, gliedert sich in der bekannten Weise, daß zunächst

Boden, Wasser und Luft abgehandelt wurde. Der Abschnitt über Ernährung ist außerordentlich sorgfältig und umfassend besprochen, insbesondere sind die Nahrungsmittel, getrennt in solche pflanzlichen und tierischen Ursprungs, eingehend gewürdigt. Vor allen Dingen sind unter den tierischen Nahrungsmitteln die Milch, die Eier, die Fette, die Überreste animalischen Ursprungs sehr eingehend besprochen. Im weiteren wird die Zubereitung der Nahrungsmittel, ihre Konservierung und die rationelle Fütterungslehre in eingehender Weise abgehandelt. Futtertabellen und Futterberechnungen nehmen einen großen Raum ein. Den umfangreichsten Teil des Werkes nimmt die Befprechung der Ställe und Unterkunftsräume für Tiere in Anspruch. Es werden Baumaterialien, Baupläne und alles, was zum Bau gehört, namentlich Lüftung, Beleuchtung, sowie schließlich auch Nebenräume zu den Aufenthaltsorten der Tiere durch zahlreiche Zeichnungen klar gemacht. Es geschieht dies vor allem gefondert für jede Tierart, auch für die kleinen Haustiere, für Hunde, Kaninchen, Hühner und Tauben. So großzügig, umfassend und eingehend das Werk angelegt ist, hat es für uns in Deutschland nur untergeordnetes Interesse, weil sich die Befprechung auf italienische, landwirtschaftliche Verhältnisse bezieht und gründet. Es wird daher das Werk, abgesehen von den Sprachschwierigkeiten, auch unsern örtlichen Verhältnissen nicht eingehend gerecht. Immerhin ist der Fleiß der Arbeit, die Ausstattung mit Abbildungen, Zahlenmaterial, Tabellen usw. sehr zu loben und das Werk kann dem Spezialisten auf diesem Gebiete sehr empfohlen werden. Frick.

Werbeheft 1927 der Fleischwaren-Industrie.

Das vom Reichsverbande der deutschen Fleischwaren-Industrie E. V., Berlin, in vorzüglicher Ausstattung herausgegebene Werbeheft enthält in seinem redaktionellen Teil Aufsätze von bekannten Führern der Ernährungswirtschaft und des Wirtschaftslebens. Geh. Rat Professor Rubner berichtet über „Das Fleisch als Nahrungsmittel des Menschen“, Ökonomierat Keifer über „Standardisierung und Qualitätsproduktion von Schlachtvieh“. Der geschäftsführende Vorstand der deutschen Fleischwaren-Industrie, Direktor Schwerdt, behandelt „Den Wert der deutschen Fleischkonserven“; Dr. Unger liefert drei Beiträge über „Die industrielle Erzeugung von Fleischwaren“, „Die Reichhaltigkeit der industriellen Fleischwarenerzeugung“ und „Die Organisation der deutschen Fleischwaren-Industrie“. Ob.-Reg.-Rat Dr. Tiburtius beschäftigt sich mit „Fleischwaren-Industrie und Einzelhandel“; Lili Vahlberg schreibt über „Kein Haushalt ohne Fleischwaren“. Aus der Feder von Prof. Dr. Bongert stammt ein Aufsatz über „Die Bedeutung des Forschungsinstitutes des Reichsverbandes der deutschen Fleischwaren-Industrie“. Im Inferatenteil findet sich ein Überblick über führende Firmen der deutschen Fleischwaren-Industrie und ihrer Erzeugnisse. Lund.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Tierarzt Dr. Ernst Liebsch, wissenschaftl. Assistent am Gesundheitsamt der Provinz Pommern Züllchow (Stettin), zum wissenschaftl. Assistent am Institut für Tierzucht u. Geburtkunde der Universität in Leipzig; Tierarzt Dr. Walther Lindner aus Sorau zum wissenschaftl. Assistent an der Klinik für kleine Haustiere der Tierärztl. Hochschule in Berlin; Tierarzt Dr. Korkhaus mit der Verwaltung der Stelle des Hochschulbibliothekars der Tierärztl. Hochschule in Berlin betraut.

Ausgeschieden: Tierärztl. Hochschule in Berlin: der wissenschaftl. Hilfsarbeiter Dr. Korth am hygienischen Institut; Reg.-Tierarzt a. D. Dr. Paul Hannemann als Verwalter der Assistentenstelle an der Klinik für kleine Haustiere; der Bibliothekar-Assistent Dr. Heitzenroeder.

Approbiert: in Berlin: Rudolf Suhr aus Heidemühl a. Rügen; in Leipzig: Karl Dose aus Bad Lauterberg a. Harz; Fritz Lange aus Erlbach i. Sa.; Kaarlo Parvainen aus Piekäsmäki (Finnland); Torsten Troberg aus Abö (Finnland).

Promoviert: in Berlin: Tierarzt Wendelin Kaiser aus Bad Homberg; Stabsveterinär Erich Gauger aus Voigtshagen b. Treptow a. d. Rega.

Gestorben: Vet.-Rat Ernst Hirsch-Liegnitz.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
 Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
 Druck von Ebert & Co., Hannover.

in der Mulomedicina eben vom Schicken nicht die Rede ist. Obiger Schluß hätte also nur dann einige Berechtigung, wenn suchen in dem Wenke durch ein anderes Wort, etwa *circare* (*chercher*), bezeichnet würde. Das ist aber nicht der Fall. Die Behauptung beruht aber überhaupt auf unzureichender Induktion.

Es ist richtig, *quaestio* heißt *Untersuchung* 47₂₀ *ad unam quamque rem simul questione vel lectione veniendum est*, wahrscheinlich auch 46₁₂ *Chironis Centauri quaestio*, wenn man so interpretiert, wie es V.H.M. 1923 S. 14, geschehen ist. Aber schon *quaestio* heißt das nicht durchgehend. Für 12₂₅ *non modica quaestio est intelligendi, qua ratione haec adutoria, cum sint separata, utrumque facere possint*, sowie für 12₃₂ *haec quaestio similis est in utionem invenitur, cuius quaestionis rationem demonstrare oportet* ist die treffende Übersetzung *Problem*, griechisch *ἔργον*. Es ist die für eine wissenschaftliche Diskussion zur Beantwortung aufgeworfene Frage. In dem allgemeineren Sinne des *Fragens* steht das Verb 45₉ *si quis a te quaerit, quare fortius spinam det . . reddas rationem*. Die Bedeutung des Suchens klingt durch in den Fällen, wo ein Infinitiv von ihm abhängt (Index S. 417) und sie liegt klar zutage 90₃ *girat interdum quasi quaerens aliquid*. 190₂ *venam inter nervos quaeres*. An der Zulässigkeit meiner Auffassung des *quaerere* 166₁₇ besteht also auch nicht der geringste Zweifel; im Gegenteil, sie ist überhaupt die einzig mögliche.

Gewiß kann *quaestio* die Untersuchung bedeuten, aber als geistige Tätigkeit, und entsprechend *quaerere de aliqua re* etwas auf diese Weise untersuchen. Die ärztliche Untersuchung dagegen, die mit Hilfe der Sinne erfolgt, kann so nicht ausgedrückt werden; wer „eine Wunde untersuchen“ mit *ulcus quaerere* übersetzen wollte, würde sich eines argen Germanismus schuldig machen. Das ist eine Tatsache, an der nicht zu rütteln ist. Der gewöhnlichste Ausdruck für solches Untersuchen ist bei den Medizinern *inspicere*, zunächst natürlich mit Hilfe des Gesichtssinnes, z. B. Pelagonius 216 *nudum te frequenter insperimus*; Mul. Chir. 239₁₂ *equa si prurire coeperit, virginalem sic inspicias*. Das ist dann auf andere Fälle übertragen worden. Bei Cassius Felix heißt es 30₁₈ (Rose) *canervulas de saeta inspicias*. 162₁₀ *si forte aliqua tensio insipientibus digitis occurrerit, 181₁₁ venter cum fuerit insipientis palma pulsatus*. Durch letztere Stelle wird Mul. Chir. 42₃₃ erläutert: *percussione inspicere mollior* (Gegensatz 55₁₂ *ad summum tergus manibus tractatum spinam difficiliter flectunt*). — Neben *inspicere* findet sich in der Mulomedicina auch *aspicere* 119₂₃ (*iliam quomodo ducat*), nach meiner Vermutung auch 173₃ *in sole eum aspicio, ne pulvis aut arista aut calculus incederit*. Ferner *scrutare*, vom Gesichtssinn 183₁₈ *huius scrutabis foramina, ne quid ulterius inter nervos distillatione sinus factus fuerit*, vom Tastsinn 38₁₁ *latera scrutant*. Von letzterem auch *temptare* 180₅ *manum supinam in orem coities et temptabis*; *genus vesicae sic invenies* und öfter *tractare*, z. B. 237₉ *oportebit virginalem eius manu tractare*. So also wird der Begriff des ärztlichen Untersuchens in der Mulomedicina ausgedrückt, nie (was kein Wunder ist) durch *quaerere* mit dem Accusativ.

Ist dem aber so, dann bleibt 166₁₇ nur die Übersetzung „suchen“ übrig, und es bleiben die Konsequenzen, die ich in Sudhoffs Archiv 1922, S. 61 gezogen habe. Wenn der *morsus* des *mus caecus* (= *μυράλη*) nach dem einleitenden hypothetischen Satze bereits festgesetzt ist, so begreift man nicht, wie man die *μυράλη* (= *mus caecus*) — im Sinne der konkreten Lokalisationen des Rauschbrandes — noch suchen soll. Wie die Verteidiger der Rauschbrandhypothese sich mit dieser in dem Worte *quaerere* liegenden Schwierigkeit abfinden werden, ist ihre Sache.

SVPVRATIO bei Columella.

Dabei sei doch gleich ein anderes philologisches Desideratum ausgesprochen. Worauf mag sich der Satz stützen, daß „für den Römer die *suppuratio* nicht mit der Vorstellung eines eitenbildenden Prozesses verbunden“ gewesen sei (V.H.M. 1924. S. 5)? Aus der dort besprochenen Columellastelle kann er natürlich ebenso wenig erschlossen werden, wie aus der Tatsache, daß die Erfahrung in Übereinstimmung mit Latosse lehre, die *musaraigne* zeitige keinen Eiter. Denn die Richtigkeit dieser Deutung steht ja gerade in Frage, ein solcher Schluß wäre ein *Circulus vitiosus*, wie er im Buche steht. Jene Behauptung steht mit unserer bisherigen Kenntnis der Sprache und der Etymologie (*suppuratio* von *pus, puris* = *πύον*) im Widerspruch, der „Vorgang der Abtötung, der das Getriebe des Lebens früher oder später in einen Haufen schmerziger Trümmer verwandelt“ heißt lateinisch sonst substantivisch *putor, putredo*, verbal *putrescere*. [Sonst hat wenigstens *suppuratio* und *suppurare* bei Columella die übliche Bedeutung: vgl. VI 11 *suppuratio melius ferro rescinditur, quam medicamento. expressus deinde sinus, qui eam continebat, calida bubula urina eluitur*. — 122 *hic idem sanguis nisi emissus fuerit, famicem creabit; qui si suppuraverit, tarde percurabitur*. — 3 *mediam ungulam ab inferiore parte non expedit aperire, nisi eo loco iam suppuratio facta est*. — 34.1 *suppuratio melius ignea lamina quam frigido ferramento reseratur* (also genau so wie an der in Frage stehenden Stelle 17.6). — 38.2 *suffraginosae (mulae) ordeacea farina imponitur, mox suppuratio ferro reclusa linamentis curator*.] Daß man dafür auch *suppuratio* und *suppurare* sagte, darf nicht bloß behauptet, es muß durch einwandfreie Belegen auch bewiesen werden. Solange das nicht geschehen ist, dürfte es um den Nachweis des Rauschbrandes bei Columella schlecht bestellt sein.

Karl Hoppe, Krefeld.

Nachträgliches zu V.H.M. 1927, Nr. 6.

Bloßes Kritisieren fördert die Erkenntnis nicht, und Behauptungen sind noch keine wissenschaftlichen Beweise. Es sei mir deshalb gestattet, dem Negativen, auf das ich mich in obiger Rezension beschränken mußte, etwas Positives an die Seite zu stellen und meine dort geäußerte abweichende Beurteilung einiger Stellen zu begründen.

1 Mul. Chir. 756. *Et hoc quidem scribere oportuit fieri ad Sarmatus naturaliter, equa cum facta fuerit mensum XIV, naturalum purgationem eis contingere et statim desiderare mixtionem masculi, quae cum tetigerit masculum, statim praegrantes fiunt*. So die Ausgabe. Den harten Wechsel zwischen Singular (*equa, tetigerit*) und Plural (*eis, fiunt*) muß man nach der Beobachtung im Index S. 386 unter *in mentum (saepissime Chiron singularum et plaralem permiscet)* hinnehmen. Dagegen ist Odors Änderung des überlieferten *qui in quae* nach dem heutigen Stande unserer Kenntnis des Vulgärlateins unnötig. Wenn man aber der obige Text überhaupt als unversucht erklärt worden ist, so steht dem, wie früher bemerkt, die Tatsache entgegen, daß der Hengst, nicht die Stute der berührende Teil ist. Ich hatte deshalb schon vor langer Zeit in der Anmerkung zu M 532 (jetzt C. H. G. II 70₃) zu lesen vorgeschlagen: *... desiderare mixtionem masculi: qui cum tetigerit uasculo, statim praegrantes fiunt*. Bei Petron ist nämlich *uasculum* ein vulgärer Ausdruck für *penis* (wie das entsprechende griechische *συνδός*). Auch heute noch halte ich diesen Gedanken für diskutabel; die hand-

Veterinärhistorische Mitteilungen

Herausgegeben von der

Gesellschaft für Geschichte und Literatur der Veterinärmedizin

Schriftleiter:

Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Copenick.

Zwangslos erscheinende Beilage zur Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift

Verlag von M. & H. Schaper in Hannover

Sonderbezugspreis 1,50 Goldmark das Jahr, freibleibend

Nr. 2.

1928.

8. Jahrgang.

Die Mulomedicina Chironis eine Kollegienhandschrift?

(Schluß.)

QVAERERE in der Mulomedicina.

Der freundliche Leser aus Veterinärkreisen erschrecke nicht: die angeordnete philologische Untersuchung soll nur Mittel zum Zweck sein. Des sachliche Verständnis der Mulomedicina geht nun einmal durch das Medium der lateinischen Sprache; deshalb darf der Philologe wohl für eine kurze Exkursion in sein Spezialgebiet Gehör erbitten, wenn nur nachher der Weg zum Sachlichen zurückführt.

Es heißt M. Ch. 1661r *quarere debes eundem migaem*. Ich hatte behauptet, das Pronomen der Identität könne sich nur auf den Z. 8 stehenden Ausdruck *mus caecus* beziehen. Die Synonymie von *myxalq*, *mus caecus* und *mus araneus* steht anderweit fest, und für die beiden ersten beweist sie M. Ch. 1663o *si aliquid . . . a mure caeco morsum fuerit, ipsim migaem discorias*. Dem ist entgegengehalten worden, das Pronomen stehe zu weit entfernt, als daß man jene Beziehung annehmen könne. Hier ist wohl der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen. Wenn nach dem handschriftlich verlorenen, aber im Index capitulum erhaltenen titulus der ganze Abschnitt *de mure caeco* handeln sollte, so schwelte dieser Begriff ganz natürlicherweise während der ganzen Auseinandersetzung vor Augen, so daß die Beziehung jederzeit klar war. Es ist dasselbe, wenn 205r *easdem mirmies* auf den gleichen Begriff 2043o geht. Daß hier 7, dort 9 Zeilen zwischen beiden Ausdrücken liegen, wird doch nichts ausmachen. Aber sei es darum: so wird der Begriff *humores putridi* 195r erst nach 17 Zeilen in dem Satze *sunt autem genera huius profui tria* wieder aufgenommen. Die von mir angenommene Beziehung von *eundem migaem* auf *mus caecus* ist also völlig anstandslos.

Ein anderer Einwand war der, *quarere* könne für die Mulomedicina nur *untersuchen* bedeuten, was *quaestio* 473o beweise. Ich hatte es als *suchen* gefaßt.

Mir scheint das eine menkwürdige Beweisführung zu sein. *quarere* hat im der ganzen Latinität bis in die späteste Zeit die Bedeutung *suchen* gehabt, warum will man die Möglichkeit derselben für die Mulomedicina bestreiten, selbst wenn sie sich an anderen Stellen nicht nachweisen ließe? Es wäre geradezu, als wollte man behaupten, weil *mittere* mit Compositis in diesem Buche so und so oft im Sinne des französischen *mettre* stehe, sei es undenkbar, daß es auch einmal *suchen* heißen könnte. Dies ließe sich höchstens dann hören, wenn dieser Begriff dort sonst etwa durch *inviare* (*envoyer*) ausgedrückt würde. Sonst würde aus dem Fehlen dieser Bedeutung von *mittere* nur zu schließen sein, daß

schriftliche Entstellung läßt sich paläographisch wahrscheinlich machen, kann aber auch, was mich wahrscheinlich dünkt, auf psychologischen Wege erklärt werden, da *masculi* kurz vorhergeht und *tettigit* ein Objekt zu erfordern schien; außerdem sieht man nicht ungern den allgemeinen Begriff des Bedürfnisses näher bestimmt. Indes ergibt sich die euphemistische Sonderbedeutung schließlich auch aus dem Zusammenhang, und es kann eingewendet werden, es sei mißlich, neben dem in der Mulomedicina gebräuchlichen *veretrum* ein in ihr sonst fehlendes Synonym auf bloße Vermutung hin in den Text zu setzen. Bedenkt man nun, daß im Montecensis die Nasalstriche (wie hier *masculi*) oft mit größter Willkür gesetzt sind, andererseits, daß von zwei aufeinanderfolgenden gleichen Konsonanten häufig der eine weggelassen ist (sog. Haplographie), so wird man vom paläographischen Standpunkte aus vielleicht folgende Änderung: *qui, cum tettigit masculi(s), statim praegnantis fuit* den Vorzug geben.¹⁾ *qui* stünde dann tatsächlich für *quae*, allerdings für das pluralische.

2 M. Ch. 418 *manum unctam in anum mittis et stercora excutito, deinde salem et mel in ipso foramine stentini immittito, ne lude m faciat*. So die Handschrift. Worauf die Behandlung hinzielt, zeigt die Entfernung des Kotes und die Einführung des Zäpfchens aus Salz und Honig: es handelt sich um Verstopfung (*obstructio*). Den mit *ne* eingeleiteten Satz würde man zunächst im finalen Sinne fassen, so daß er irgend einen Umstand enthalten müßte, der durch die Behandlung vermieden würde. Es ist mir jedoch nicht gelungen, hierfür ein Substantiv zu finden, dessen Entstellungen zu *ludem* einigermaßen begrifflich gemacht werden könnte. Mein Besserungsvorschlag, auf den ich ebenfalls vor Jahren gekommen bin, gründete sich ursprünglich auf Odors Angabe des handschriftlichen Befundes, die von *ne* schweigt. Das Monstrum *ludem* erinnerte mich jedesmal an das ebenso seltsame *uusse* 1371s, in dem Oder, wie die Parallelie 256a beweist, mit Recht *uusse* = *blisse* erkannt hat. Als ich es nun 1283s mit einer ähnlichen Erklärung der handschriftlichen Verderbnis versuchte, kam ich u. a. auf *ludem*, das bei der bekannten Vertauschung von intervokalischem *b* und *v* für *libidem* stehen mochte. Dies aber führte fast zwangsweise auf *libid(in)em*, einen Ausdruck, der auszeichnet in den Zusammenhang paßt: das Wort bezeichnet den Drang zur Erfüllung der natürlichen Bedürfnisse; vom Harnen gebraucht es Gellius, von Korbbleimung Marcellus. In Roeses Anecdota Bruxellensia 143 heißt es von der Dysenterie *si autem ita fuerit solutio ventris, ut cum stercore soluto sputa remaneant et generet conatus et libidine m*, was durch Theodorus Priscianus II 101 *dysenteria, quae conationibus et veluti desideratione m suaviu debilitata membra consumat* gut erläutert wird. Die gesperrten Worte machen es begreiflich, daß auch *dulcedo*, das nach Ausweis des Lexikons u. a. Reiz, Trieb, Bedürfnis nach etwas bezeichnet, M. Ch. 449 in demselben Zusammenhang gebraucht ist: *salis minuti acetabulum in anum mittito, vel si qua spurcicia interius obstat, eam manu abstrahas. dulcido enim sequitur et solutio ventris*.

(Fortsetzung, folgt!)

1) Ebenso erklärt sich 297a, der im ersten Jahrbuch S. 54 als falsch nachgewiesene Singular *muscam* statt des zu erwartenden Plurals: steht *muscas* war, das mit *s* beginnende Wort *super* folgt, *musca* geschrieben, worauf der Nasalstrich fälschlicherweise hinzugesetzt wurde. Hier ist die Änderung sicher, da der Plural im Tat folgt.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelman, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 6.

Ausgegeben am 11. Februar 1928.

36. Jahrgang.

Zur gefl. Beachtung!

Der Bezugspreis für das 1. Vierteljahr 1928 wird für die beim Verlag direkt bestellten Abonnements durch Nachnahme erhoben, wenn derselbe nicht bis zum 26. ds. Mts. in unseren Händen ist. —

Wir bitten ev. für Einlösung der Nachnahme besorgt zu sein.

M. & H. Schaper

Verlag der „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“.

(Aus der Klinik für Geburtshilfe und Rinderkrankheiten der Tierärztlichen Hochschule Hannover.)

Pararautschbrand beim Rind.

(Mit 3 Abbildungen.)

Von R. Götze, Hannover.

Das gehäufte Auftreten von Pararautschbrand beim Rind konnte im Frühjahr 1927 in der hiesigen Klinik beobachtet werden. Die hierbei gesammelten klinischen Erfahrungen am lebenden Tiere mögen vielleicht von Interesse sein, um so mehr als in der Lehrbuch- und Zeitschriftenliteratur die pathologisch-anatomischen und bakteriologischen Verhältnisse stets in den Vordergrund gerückt werden. Die Bakteriologie bemüht sich seit Jahren, die Gasödemerreger in verschiedenen Varietätengruppen unterzubringen. Es wäre interessant festzustellen, inwieweit tatsächlich auch klinische Unterschiede der Gasödemerkrankungen bestehen. Dies kann nur durch die Beibringung kausistischer, klinisch und bakteriologisch untersuchten Materials geschehen. Ein solcher Beitrag soll im folgenden geliefert werden.

Fall 1: Am 7. März 1927 wurde in die Klinik eine Kuh eingeliefert, bei welcher eine abgestorbene, absolut zu große Frucht, vorgebeten war. Seit wann die Geburt bereits im Gange war, ließ sich nicht feststellen. Der Zustand des Tieres wurde erst gelegentlich der Behandlung einer anderen Kuh im Bestande erkannt, bei welcher die Nachgeburt abgenommen und tags darauf die Notföhlachtung angeordnet werden mußte.

Der ca. 100 Pfund schwere Fötus, der in die Klinik eingestellten Kuh ließ sich nach Platzschaffung durch Absetzen des Kopfes und eines Vorderhockens im Karpalgelenk mit dem Vacuact soweit entwickeln, daß das steckengebliebene Hinterteil halbiert werden konnte. Der Fötus war leicht emphysematös und hatte den bekannten fischfaulen Geruch, wie er bei abgestorbenen Früchten oft zu Tage tritt. Die Nachgeburt war bereits gelöst und wurde durch geringen Zug entfernt. Die Embryotomie hatte sich ohne bemerkbare Verletzungen und Blutungen abgespielt. Trotzdem aber verschlechterte sich das Befinden des Tieres unmittelbar nach der Embryotomie derart, daß es sechs Stunden darauf notföhlachtet werden mußte. Es entwickelte sich eine zunehmende hochgradige Atembeschleunigung mit 40—60—65 Atemzügen. Die Herzfrequenz erhöhte sich stündlich zunehmend auf 100 bis 150 in der Minute. Das Herz arbeitete pochend, tumultuös. Der Puls an der Art. maxill. wurde bei gespannter Wand immer schwächer

und an den peripheren kleinen Arterien (Art. coccyg., Art. saphena) unfühlfar. Die Temperatur, die vor der Geburt 40,5 betrug, fiel allmählich auf 37,8. Die Körperoberfläche kühlte sich immer mehr ab. Es wurde an innere Verblutung gedacht, aber die Untersuchung des Genitales sowie der sichtbaren Schleimhäute boten dafür keine Anhaltspunkte.

Bei der Eröffnung der notföhlachten Kuh entleerten sich aus der Bauchhöhle 2—3 Liter einer serösen, rötlich gefärbten Flüssigkeit. Das Peritoneum zeigte namentlich an dem hinteren Teile der Bauchhöhle verschiedene ödematös-fulzige Stellen. Die breiten Mutterbänder sowie die gesamte Uteruswand erschienen ebenfalls stark ödematisiert und erreichten eine Dicke von 3—4 cm. Nach dem Anschneiden tropfte aus der Wandung gelblich seröse Flüssigkeit. Gasbildung wurde nicht beobachtet. Die großen Parenchyme erschienen degeneriert, Milz und Leber zeigten leichten Tumor, unter den serösen Häuten einzelne Blutungen. Das Fleisch war wegen sehr mangelhafter Ausblutung untauglich zur Nahrung und zum Genuß für Menschen. Eine bakteriologische Untersuchung fand nicht statt.

Fall 2: Einige Tage darauf, am 13. März 1927, spielte sich in der Klinik an demselben vorher gereinigten und desinfizierten Platze die Geburt einer Färlle mit relativ zu großer Frucht ab. Es gelang, das lebende Kalb mit verstärkter Zugleistung unter Schrägstellung der Querdurchmesser zu entwickeln. Dabei entstand ein unvollständiger Dammriß. Die Nachgeburt ging nach vier Stunden ab. Das Tier machte während der ersten beiden Tage des Puerperiums einen völlig gesunden Eindruck und wurde im Stalle neben einer frisch laparotomierten Kuh untergebracht. Am dritten Tage p. P. frühmorgens wurde eine über Nacht entstandene von der Dammwunde ausgehende, knapp kindskopfgröße, überaus schmerzhaft apfelharte Anschwellung der Vulvalippen bemerkt. Bei der leisesten Berührung weicht das Tier aus. Die Geschwulst (Abb. 1) ist heiß, an den Rändern scharf abgesetzt und so hart, daß Fingereindrücke sich nur bei starkem Druck hervorrufen lassen. Gasbildung war nicht festzustellen. Ein kleiner Probefchnitt in das Ödem wurde angelegt. Es tropfte ununterbrochen aus der zitronenfleischähnlichen Schnittfläche bernsteingelbe Flüssigkeit ab. Die bakterioskopische Untersuchung dieser Flüssigkeit sowie eines Gewebsausstriches verlief nach Färbung mit Methylenblau, Gentianaviolett und

Karbofuchsin völlig negativ. Kleine Gewebsproben sowie abtropfende Flüssigkeit wurden dem Hygienischen Institut zur Untersuchung auf Anaerobier überwiesen. Die Kulturen ergaben 1½ Tage nach der Einsendung Pararaufschbrand. Inzwischen hatte sich das Ödem weiter vergrößert, dehnte sich jederseits über die Sitzbeinhöcker und ventralwärts



Abb. 1. Pararaufschbrand des äußeren Genitale am 1. Krankheitstage, 3 Tage p. P. Orig.-Aufnahme des Verfassers.

auf den Milchspiegel und die Hinterfläche des Euters aus (s. Abb. 2). Das Ödem blieb weiter hart, heiß und sehr schmerzhaft ohne jede äußerlich feststellbare Spur von Gasbildung. An den haarlosen Stellen zeigte sich in der Haut eigentümlich violett und blaubunte baumähnlich verästelte Zeichnungen. Sobald die bakteriologische Diagnose feststand, etwa 48 Stunden nach dem ersten Auftreten des Ödems, waren tiefe Einschnitte an den Vulvalippen, dem Milchspiegel und am Euter vorgenommen worden (Abb. 2). Ein besonderer, ranziger, butterfäureähnlicher Geruch ist uns beim Einschnitten nicht aufgefallen. Die Wunden wurden mit 2prozentiger Kaliumpermanganatlösung ½ Stunde lang berieft. Außerdem umspritzten wir die Grenzen der Geschwulst vom Sitzbeinhöcker herunter, an der Außenfläche des Schenkels und am Euter mit derselben Lösung. Ferner wurden subkutan bzw. intravenös während der fünf Krankheitstage verabreicht: Introcid, Yatren, Eugalactan, Trypaflavin, Dispargen. Das Ödem hat trotz alledem seine Grenzen weiter vorgeschoben und drang wohl auch mehr in die Tiefe.

Das Allgemeinbefinden des Tieres zeigte vom Tage der Vulvaschwellung an eine deutliche, allmählich sich steigende Verschlechterung. Die Futteraufnahme, die anfangs noch gut war, ließ vom dritten Krankheitstage ab nach und hörte schließlich ganz auf, Durstgefühl blieb bestehen. Die Milch versiegte ebenfalls vom dritten Krankheitstage an.




Abb. 2. Pararaufschbrand des äußeren Genitale. Dasselbe Tier wie auf Abb. 1. Das Ödem hat sich trotz tiefen Inzisionen und Umspritzung mit sauerstoffabspaltenden Mitteln weiter ausgebreitet. Orig.-Aufnahme des Verfassers.

Das Tier lag viel, der Kopf wurde gern auf den Boden oder die Krippe und auch seitlich an die Brustwand gelegt. Wurde es aus dem Stall in neue Umgebung geführt, so erschien es munterer, etwas lebhafter. Das Sensorium war nicht gestört. Atem- und Pulsfrequenz nahmen von Tag zu Tag ständig zu. Der Herzschlag war von Anfang an laut und wurde im Laufe der Erkrankung schließlich pochend. Die Atmung zuletzt ächzend. In der Nacht vom fünften zum sechsten Krankheitstage (7 Tage nach der Geburt) verendete das Tier.

Bei der Sektion fiel auf, daß das Ödem tief in das Interstitium der Hinterbackenmuskulatur eingedrungen war. Das Beckenbindegewebe war ebenfalls ödematös. Auf dem schön gelb gefärbten, zitronenfleischähnlichen Querschnitt durch die Geschwulst stiegen einzelne gerade bemerkbare Gasbläschen auf, ohne daß ein deutlicher butterfäureähnlicher bzw. ranziger Geruch wahrzunehmen war. Die Cervix uteri und der Uterus erschienen ganz normal und soweit zurückgebildet, wie es sieben Tage nach der Geburt zu erwarten war. Milz und Leber waren leicht geschwollen. Die übrigen Organe und der Tierkörper ohne Befund.

Fall 3: Die zeitweise neben der Färle Nr. 2 stehende frisch laparotomierte Färle befand sich während der ersten drei Tage nach der Operation auf dem Wege der Heilung. Am vierten Tage wurden einige Entspannungshefte aus der Wunde entfernt und schon 24 Stunden nachher entstand eine zunächst etwa zweifautgroße Anschwellung, die sich aber bald nach allen Seiten hin ausbreitete, sehr schmerzhaft war, sehr derbe Konsistenz zeigte und sich heiß anfühlte. Stellenweise, besonders an den oberen Grenzen der Geschwulst, konnten durch Palpation einzelne Gasbläschen festgestellt werden. Auch bei der Entfernung weiterer Nähte aus der Wunde entströmte eine kleine Menge übelriechenden Gases. Weder in der bernsteinfarbenen Ödemflüssigkeit noch in dem Ödemgewebe konnten bakterioskopisch durch die bei Fall 2 genannten Farbstoffe Ödembazillen nachgewiesen werden. Die Kultur ergab nach 2×24 Stunden Pararaufschbrand.

Sofort mit dem Auftreten des Ödems waren auch die Atem-, Herz- und Tätigkeit sowie die Körpertemperatur verändert. Die Atemfrequenz erhöhte sich zunehmend bis auf 60 und darüber, das Atmen geschah im costoabdominalen Typus, angestrengt. Die Herzfrequenz erreichte 150 in der Minute. Der Puls in den kleinen Arterien schwand. Der Herzschlag war während der ersten Krankheitstage laut und wurde schließlich pochend tumultarisch, so daß Erschütterungen der linken und rechten Brustwand sichtbar wurden. Die Körpertemperatur stieg mit dem ersten Auftreten des Ödems von 39,2 auf 40,5, hielt sich während der gesamten Krankheitsdauer zwischen 40 und 41,2 und sank am letzten Krankheitstage auf 39,4 herab. Appetit, Verdauungstätigkeit und Milchergiebigkeit schwanden vom dritten Krankheitstage ab vollständig. Das nahende Ende kündete sich durch Abkühlung der Körperoberfläche und des Ödems sowie durch das Fallen der Körpertemperatur und zunehmende Mattigkeit an. Der Tod erfolgte nach Ablauf des fünften Krankheitstages, 10 Tage nach der Operation.

Die Sektion ergab ein ausgebreitetes, subkutanes und subperitoneales Ödem in der Umgebung der Operationswunde. Aus der gelblichen Schnittfläche entwichen einzelne Gasblasen. Ein besonderer Geruch ist neben dem Eigengeruch der Tierleiche nicht zu bemerken. Die Leber war leicht geschwollen, auf der Schnittfläche wurden einige, im Durchschnitt stecknadelkopfgroße hellere Herde sichtbar, leichter Milztumor, Herzdegeneration, keine Blutungen.

Fall 4: Nach dem Verlust der drei bisher genannten Tiere wurden Stallungen und Klinikraum, Instrumente und Geräte gründlich geäubert und desinfiziert. Ein junges Rind kam danach in denselben Raum, in dem die beiden Geburten stattgefunden hatten, zur Operation. Trotz größter Voricht war das Tier gleich bei der Operation infiziert worden, offenbar durch Sporen, die sich noch in den Matratzen bzw. Kissen erhalten hatten. Bereits 36 Stunden nach der Operation stellten sich die ersten allgemeinen und örtlichen Symptome ein. Die Atmung wurde frequent, das Herz arbeitete schnell und pochend, die Temperatur stieg. Appetit und Milchsekretion ließen bereits am zweiten Krankheitstage nach. An dem einen Wundrand entstand zunächst ein scharf umgrenztes, sehr schmerzhaftes, hartes und heißes Ödem, welches sich durch Einspritzung und Umspritzung mit Kaliumpermanganat und Wasserstoffsuperoxyd nicht eindämmen ließ. Die bakterioskopische Untersuchung der am lebenden Tier entnommenen Ödemflüssigkeit und Gewebsproben war negativ. Die Kultur ergab 36 Stunden nach Einsendung des Materials eine Reinkultur von Pararaufschbrand. Das

Ödem nahm schnell zu (Abb. 3). Gasbildung konnte klinisch nicht festgestellt werden. Alle Heilversuche wie bei 2 und 3 waren vergebens. Atmung, Puls, Herzstätigkeit, verschlechterten sich langsam aber sicher von Tag zu Tag und die Temperatur hielt sich stets über 40 Grad. Am fünften Krankheitstage, sechs Tage nach der Operation, wurden die Geschwulst und die Körperoberfläche kühl, das Tier wurde sehr matt. Notchlachtung.



Abb. 3. Pararauhbrand an Unterbauch und Unterbrust am 3. Krankheitstage, ausgehend von einer Operationswunde in der Unterbauchwand. Orig.-Aufnahme des Verfassers.

Bei der Sektion zeigte sich ein ausgebreitetes Ödem der Subkutis, des Unterbauches und der Unterbrust. Das subperitoneale Gewebe war frei. Die Gasbildung erschien sehr spärlich, ein besonderer Geruch des Ödems fiel nicht auf, die Ausblutung war mangelhaft, das Herz degeneriert, Blutungen am Endokard, Milz, Leber und Nieren sehr blutreich, leicht geschwollen, ebenso die Körperlymphknoten, die im Bereich des Ödemes lagen.

Nach einer zweiten gründlichen Reinigung und Desinfektion sind weitere Fälle von Pararauhbrand in der Klinik nicht aufgetreten.

Ein Rückblick auf die wiedergegebenen Krankheitsgeschichten ergibt zunächst, daß der Pararauhbrand als reine Wundinfektionskrankheit dann, wenn Infektionsgelegenheiten geboten sind, beim Rinde recht leicht gehäuft auftreten kann und die Gefahr der Weiterverbreitung nicht zu unterschätzen ist. Vielfach aber ist der Pararauhbrand klinisch sehr schwer zu erkennen. Schwierigkeiten der Diagnose bestehen besonders bei inneren Infektionsportalen und innerem Sitz der Krankheit.

So haben wir bei dem Fall 1 zunächst nicht nachzuweisen vermocht, daß es sich um Pararauhbrand handelte. Die bakteriologische Untersuchung wurde nicht ausgeführt, aus dem einfachen Grunde, weil an Pararauhbrand nicht gedacht wurde. Erst als das zweite Rind unmittelbar darauf tödlich erkrankte, mußte nachträglich aus dem emphysematösen Zustand der abgestorbenen Frucht und dem Sektionsbefund, insbesondere an der Gebärmutter, geschlossen werden, daß auch die Kuh Nr. 1 an Pararauhbrand zugrunde gegangen war. Die unter Fall 1 mit erwähnte Kuh, die nach Abnahme der Nachgeburt bald notgeschlachtet werden mußte, hatte vermutlich ebenfalls an Pararauhbrand gelitten. Es sind demnach in unserem Beispiel insgesamt fünf Rinder kurz nacheinander mit denselben Pararauhbrandkeimen durch Zwischenträger infiziert worden und eingegangen.

Der Verlauf der Krankheit scheint perakut zu sein (Fall 1), wenn die Erreger bzw. deren Sporen in fauerstoffarme Hohlorgane, beispielsweise die Gebärmutter, gelangen und gleichzeitig wie bei Schweregeburten, Abnahme der Nachgeburt viele oder ausgedehnte flächenhafte Infektionsportale geschaffen werden. Die gesamte Gebärmutterwand und die Umgebung des Organes erscheinen dann fulzig-ödematös (Fall 1), und die plötzliche Überschwemmung des Organismus mit Toxinen führt schnell, bereits am ersten Krankheitstage, zum Tode. — Weniger stürmisch, aber immerhin akut, ist nach unseren Beobachtungen der Ablauf der Krankheit, wenn die Erreger in die Subkutis

und die darunter liegenden interstitiellen Gewebe gelangen, und äußerliche Ödeme entstehen. Die Krankheitsdauer beträgt in diesen anscheinend häufiger vorkommenden Fällen bis zum letalen Ende 5—6 Tage (Fälle 2—4).

Die möglichst frühe Diagnose am lebenden Tiere wäre wichtig. Da der Pararauhbrand unheilbar ist und spätgeschlachtete Tiere zur Nahrung und demgemäß für Menschen untauglich werden, wäre eine schnelle Verwertung durch Schlachtung das Wirtschaftlichste. Auch die Gefahr der Weiterverbreitung würde durch sofortige Schlachtung verringert. Die Fälle mit inneren Infektionsportalen und perakutem Verlauf werden allerdings intra vitam kaum aufzudecken sein. Sie können in der Regel nur nach der Notchlachtung oder dem Tode des Tieres durch den Kulturversuch ermittelt werden.

Demgegenüber lassen sich unter günstigen Verhältnissen die weniger schnell verlaufenden Fälle mit Ödembildung an der Körperoberfläche intra vitam aufklären. Der Schwerpunkt liegt aber beim Auftreten von entzündlichen Ödemen im Einzelfalle darin, zu entscheiden, ob es sich um eine gutartige heilbare Gewebsschwellung handelt, wie sie bei Rindern im Anschluß an Verletzungen am äußeren Geschlechtsapparat und anderen Körperstellen nicht selten entsteht, oder ob Pararauhbrand oder sonst eine gefährlichere Gasödembazillen-Infektion vorliegt, kurz gesagt, ob es sich um einen der Fälle handelt, die im weiteren Sinne klinisch als „malignes Ödem“ zusammengefaßt werden können. Der Kliniker, dem ein solcher Patient vorgestellt wird, muß darnach streben, sich über die bakterielle Ursache des vorgefundenen Ödems und den Charakter der Krankheit Klarheit zu verschaffen.

Wir haben dies in den angeführten Fällen 2—4 sowie in einem Falle mit Fränkischem Gasödem beim Rinde, über den ich später berichten will, durch die bakteriologische Untersuchung der bernsteinklaren nicht verunreinigten Ödemflüssigkeit und des Ödemgewebes versucht. Der Erfolg war negativ. Es ist uns ebenföwenig wie dem Hygienischen Institut an unserer Hochschule gelungen, in der Ödemflüssigkeit und dem Ödemgewebe vom lebenden Tiere die Anaerobier färberisch mit Sicherheit nachzuweisen. — Der unter dem Kapitel „Malignes Ödem“ in verschiedenen Lehrbüchern (Fröhner-Zwick, Weber u. a.) gebrachten Angabe, daß der Nachweis der Erreger leicht gelinge, kann ich nach diesen Erfahrungen beim lebenden Rind nicht beistimmen.

Der Kulturversuch im Hygienischen Institut hat dagegen stets in verhältnismäßig kurzer Zeit zum Nachweis der pathogenen Anaerobier geführt, so daß wir bereits intra vitam über die bakteriologische Ursache der Krankheit unterrichtet waren. Leider wird dies unter den in der tierärztlichen Praxis gegebenen Verhältnissen nur selten möglich sein, weil die in Frage kommenden Untersuchungsstellen so leicht nicht zu erreichen sind.

Großer Wert muß demnach auf die klinischen Symptome, der offenbar verschiedenartig verlaufenden Anaerobier-Ödeme gelegt werden. Es gilt, den „malignen“ Charakter so früh wie möglich zu erkennen oder zu vermuten, damit in Zweifelsfällen die bakteriologische Untersuchung schnellstens in die Wege geleitet werden kann. Die klinischen Symptome des Pararauhbrandes haben wir an unseren Fällen genau verfolgen können. Schon die Beschaffenheit der äußerlich sichtbaren Anschwellung gibt gewisse Anhaltspunkte für die Diagnose. Die Anschwellungen sind in allen beobachteten Fällen auffallend heiß gewesen. Erst gegen Ende der Krankheit vom vierten Krankheitstage an kühlen sie sich von der Mitte her ab. Es handelt sich demnach um ein ausgesprochen entzündliches Ödem; auffallend ist ferner die Härte der Anschwellung. Fingereindrücke lassen sich nur mit erheblichem Druck und unter starken Schmerzensäußerungen hervorrufen. Der klinische Nachweis der Gasbildung gelang im Falle 1 an der abgestor-

benen Frucht und im Falle 3. Beide Fälle sind m. E. keine reinen Pararauschbrandinfektionen gewesen, sondern Mischinfektionen mit anderen gasbildenden Bakterien oder Fäulnisregnern. Bei den übrigen Tieren ließen sich zu Lebzeiten durch äußere Palpation und in den angelegten Schnittwunden der Ödeme keine Gasblasen ermitteln. Die klinisch nachweisbare Gasbildung ist demnach nicht als charakteristisches Symptom des Pararauschbrandes anzusehen. Sie braucht intra vitam nicht immer vorhanden zu sein. — Einen besonderen Geruch haben wir an den tagelang beobachteten Ödemen der Fälle 2—4 auch nach Vornahme der Einschnitte neben dem Eigengeruch der Tiere nicht feststellen können. Die emphysematöse Frucht der Kuh Nr. 1 zeigte einen fäullich-fauligen Geruch. Im Falle 3 entströmte aus der eröffneten Operationswunde, von der das Ödem ausging, ein übler, fauliger Geruch. Es wurde aber schon erwähnt, daß beide Fälle als Mischinfektionen angesehen werden müssen. Bei den Reinfektionen mit Pararauschbrand, wie sie offenbar bei den Färsen Nr. 2 und 4 vorlagen, ließen sich klinisch weder Geruch noch Gasbildung einwandfrei feststellen. Der reine Ödemcharakter trat vielmehr stark in den Vordergrund.

Wesentlich für die klinische Diagnose des Pararauschbrandes scheint nach den angestellten Beobachtungen vor allem die Schwere der mit Ödemen einhergehenden allgemeinen Krankheitsercheinungen, insbesondere das Verhalten der Atmung, des Zirkulationsapparates und der Körpertemperatur zu sein. Die Frequenzsteigerungen der Atmung, des Pulses und Herzschlags sind vom ersten Tage der Krankheit an so stark, daß man sich wohl scheuen möchte, sie mit dem anfänglich noch unscheinbaren Ödem in Zusammenhang zu bringen. Die Körpertemperatur bewegt sich zwischen 40 und 41 Grad und darüber, allerdings kommen bei fortlaufenden Messungen namentlich im letzten Stadium der Krankheit Remissionen unter 40 Grad vor. Abgesehen von den auffälligen Atmungs- und Zirkulationsstörungen und dem Fieber machen die Tiere zu Anfang der Krankheit rein äußerlich beobachtet mitunter noch einen verhältnismäßig guten Eindruck. Der Appetit und die Milchleistung bleiben bis zum zweiten bis dritten Krankheitstage, wenn auch von Tag zu

Tag sich vermindern, erhalten. Aber die unaufhaltsam fortschreitende Verschlechterung der Zirkulation und der Atmung, die bald sich einstellende Mattigkeit, völlige Appetitlosigkeit, das Versiegen der Milch, Schwanken beim Gehen, Zähneknirschen, werden dem Kliniker, wenn außer dem vorgefundenen Ödem sonst keine urfälligen Zusammenhänge aufzufinden sind, stets zu dem dringenden Verdacht auf Pararauschbrand und zur Einfendung von Untersuchungsmaterial (sauber entnommene Ödemflüssigkeit und Gewebeproben) nötigen. Auch die sofortige Anordnung von Vorichtsmaßnahmen, die eine Weiterverschleppung im Stalle verhindern können, ist geboten. Ödeme, die nach Verletzungen, Operationen, subkutanen Injektionen usw. beim Rinde auftreten, sich mitunter rasch ausbreiten, vielfach auch Gasbildung mit üblem Geruch zeigen, aber ohne erhebliche Störungen des Allgemeinbefindens, der Zirkulation und der Atmung einhergehen und durch Einschnitte und Anwendung von Sauerstoff abspaltenden Infektionsmitteln geheilt werden können, werden nach unseren bisherigen Erfahrungen nicht durch die Bazillen der Pararauschbrandgruppe verursacht.

Die Behandlung des Pararauschbrandes mit den z. Zt. zur Verfügung stehenden Mitteln erscheint völlig aussichtslos. Weder chirurgische Eingriffe noch die Chemotherapie, die Therapie sterilisans magna und die unspezifische Reizkörpertherapie haben den Krankheitsverlauf in unseren Fällen, bei denen Pararauschbrand kulturell festgestellt war, beeinflussen können. Eine erfolgreiche spezifische Heilmethode ist bisher trotz mancher Versuche ebenfowenig zu erreichen gewesen wie ein spezifischer Impfschutz. Nach dem gesamten Krankheitsbilde handelt es sich um eine schwere Intoxikation, die ähnlich wie der Tetanus von einem lokalen allerdings im lebenden Bindegewebe bald mehr Boden gewinnenden Infektionsherd ausgeht. Während aber beim Tetanus das Nervensystem besonders geschädigt wird, erfahren beim Pararauschbrand vermutlich die Funktionen des Blutes eine starke schließlich letal wirkende Beeinträchtigung (Zirkulations- und Atmungsstörungen!). Die Antitoxin-Therapie, für die aber z. Zt. die wissenschaftlichen Voraussetzungen noch wenig geklärt sind, verdient vielleicht in Zukunft mehr Beachtung als bisher.

Ein Einblick in das Gebiet der Leberegelmittel.

Zugleich Berichtigung und Erwiderung auf den Aufsatz des Herrn Dr. O p e l in der D. T. W., Jahrg. 36, Nr. 1, S. 6—7.

Von Dr. Wilhelm Nöller, Berlin.

Wer die Aufgabe hat, Leberegelmittel zu prüfen oder über ihre Wirkung gutachtlich oder beratend Aufschluß zu geben, wird allmählich belehrt, daß allen Menschen recht getan, eine Kunst ist, die niemand kann. Über das Maß des sonst im Verkehr Üblichen pflegen die Ansichten über das Verhalten bezüglich des Anstandes von der Norm abzuweichen, wenn der gegenseitige Konkurrenzneid mitpricht und geldliche Interessen auf dem Spiele stehen oder von Gutachten abhängen, welche über Leberegelmittel gefällt werden müssen.

Was einem in dieser Hinsicht geboten wird, davon heute eine kleine Kostprobe!

Zunächst wird man ein beehrter Mann. Daß Vorträge eifrig besucht werden, hat vielleicht seine Gründe darin, daß mancher Aufschluß über Fragen zu erhalten wünscht, welche in den Lehrbüchern noch nicht abgehandelt werden. Daß alle Äußerungen sorgfältig mehr oder minder verdreht an Interessenten gebracht werden, dafür habe ich schon früher Beispiele bekommen. Daß die Vorträge sogar hier und da nachstenographiert werden, war mir früher unbekannt, ist mir aber nunmehr durch schriftliche und mündliche Mitteilungen bekannt geworden.

Wie viele Fabriken sich in Unkosten stürzen, weiß ich heute freilich noch nicht. Weiterhin werden dienstliche

Gutachten (freilich meist falsch) in Arbeiten zitiert, obgleich sie nicht für den Druck bestimmt sind und obgleich der zitierende Fabrikangestellte, soviel ich weiß, nicht zu den preußischen Beamten gehört, denen die Gutachten und Rundschreiben auf Grund der Gutachten zugänglich sind. Wenn solche Sachen sich bei dem Angestellten einer Fabrik ereignen, die durch ihre Angestellten, Mitarbeiter oder Vertriebsstellen selbst den Löwenanteil der wissenschaftlichen Literatur über ihre Mittel herausbringt und die sich nicht scheut, irrtümlich auf dem Postwege ihr zugestellte Mitteilungen, die wegen falscher Bestimmungsadresse ihr durch Versehen in die Hände fallen, durch ihre Angestellten in Publikationen benutzen zu lassen, so ist das eben ein Vorgehen, das die Mehrzahl der anständig denkenden Menschen als ungewöhnlich hinstellen wird, das aber verständlich wird, wenn man sieht, daß jene Firma die Zusammenfassung ihrer Mittel entweder irreführend (um keinen schärferen Ausdruck zu wählen) an Wissenschaftler, die anfragen, bekannt gab oder später auf den Aufschriften eine falsche Zusammenfassung aufdruckte.

Und diese Mühe, sich mit nicht für den Druck bestimmten Äußerungen zu beschäftigen, macht sich noch ein Vertreter einer Fabrik, deren anderer Vertreter, der zwar kein Tierarzt ist, einem zu verstehen gab, man habe für die

Leberegelbekämpfung eigentlich ja nichts geleistet, wenigstens im Vergleich zu M a r e k, was ja zutrifft. Hat man sich dann den Unmut über solche löblichen Wertungen seitens eines Mannes, von dem man nicht weiß, wann er die Vokabel „Leberegel“ zum ersten Male gehört hat, von der Leber geschrieben und das Vorkommen ins Menschliche, Allzumenschliche übertragen, so bekommt man einen Brief dieses Mannes, in dem er mitteilt, daß er bereit sei, sich mit einem zu besprechen, um festzustellen, ob man in Zukunft von einer feindseligen Einstellung seinem Präparat gegenüber absehen wolle. Sonst würde durch eine in Norddeutschland zu verteilende aufklärende Broschüre Stellung genommen werden. Sei aber eine Besprechung erwünscht, so bitte er um Nachricht, wann und wo eine Besprechung genehm sei. Der Brief bleibt trotz aller Neugierde, einmal zu erfahren, was man bei einer Konferenz, zu der die Einladung in so verbindlicher Form erfolgt, zu hören bekomme, unbeantwortet. Die aufklärende Broschüre kommt nicht.

Zwei Tierärzte, von denen der eine im Tierärzte-Adressbuche unter den in der Serum- und Pharmazeutischen Industrie tätigen Tierärzten unter jener Firma aufgeführt wird,¹⁾ während der andere sich als Mitarbeiter jener Gesellschaft bezeichnet, springen nun für die Firma und ihr Mittel ein, der zweite etwas ruhiger, der erste in ungewöhnlicher Form.

Nun kann man auf solche Anzapfungen wie die letzte reagieren oder man kann über sie hinwegsehen, wenn sie durchsichtig genug sind, dem Leser zu zeigen, aus welchem Beweegrunde sie entstehen. Reagiert man, so freut sich der Schreiber der Beachtung, auch wenn er in der Antwort nicht gut wekommt. Reagiert man nicht, so ist entweder der Ärger groß und es wächst der Mut und eine neue Anzapfung ohne oder mit Namensnennung ist die Folge. Ich will nun keine lange Schlüsselgeschichte schreiben, sondern klipp und klar dartun, was sich auf dem hart umkämpften Gebiet der Leberegelmittel in einem Sektor des Schlachtfeldes, der von Personen der Firma Bloch-Aubing umkämpft wird, ereignet hat. Die Geschichte hat augenblicklich noch aktuelles Interesse, solange ein Tierarzt noch ein geschütztes Per-os-Präparat anwendet. Sobald der Kampf der Firmen untereinander und gegen die begutachtenden Wissenschaftler soweit fortgeschritten ist, daß kein Tierarzt mehr ein geschütztes Präparat bezieht, dürften sich die Gemüter insbesondere nach heißen und trockenen Sommern abkühlen, einesteils entweder weil das Geschäft gut war und die Firmeninhaber und ihre Angestellten saturiert sind, oder aber weil kein Geschäft mehr zu machen ist und sie infolgedessen die bisher für die Bekämpfung der Konkurrenz oder die nicht nach Wunsch begutachtenden Wissenschaftler verwendete Mühe auf andere Gebiete richten müssen, wenn sie von ihres Kopfes oder ihrer Feder Arbeit leben wollen. Dieser Zeitpunkt scheint nahe gerückt zu sein. Deshalb hat dieser Aufsatz bald nur noch geschichtlichen oder standesgeschichtlichen Alteisenwert. Ich werde also einen kurzen geschichtlichen Abriss geben, damit meine Antwort an die Herren Th i e n e l und O p e l besser verständlich wird. Für die Leser der Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift, welche die Münchener Tierärztliche Wochenschrift nicht halten, muß ich etwas weiter ausholen:

Mit den Leuten um Herrn Th i e n e l und O p e l kam ich zum ersten Male schriftlich in Berührung, als ich nach Preis und Zusammensetzung des Leberegelmittels SB 444 mich erkundigte. Ich erhielt die Antwort, das Mittel sei ein hydroaromatischer Oxykörper. Daß die Firma die chemischen Kenntnisse bezw. die Möglichkeit, sich über chemische Fragen Aufschluß zu holen, bei einem Professor einer Tierärztlichen Hochschule so einschätzt, daß sie es

wagt, eine solche Antwort zu geben, ist ein Stück für sich. Es blieb also nur der Weg der Analyse übrig. Die Analyse, welche von Herrn Dr. G l u s c h k e freundlichst durchgeführt wurde, ergab, daß die Angaben der Firma irreführend waren, um nicht einen schärferen Ausdruck zu gebrauchen, denn der wirkfame Bestandteil war Tetrachlorkohlenstoff, ein Körper, den man mit dem besten Willen nicht als hydroaromatischen Oxykörper bezeichnen kann. Höchstens das beigegebene Harz, dessen Unwirksamkeit außer Zweifel steht, könnte man mit diesem irreführenden Decknamen, wenn man den Wunsch hat, zu verschleiern, bezeichnen.

Außer der Irreführung, die wohl nur bei größter wissenschaftlicher Unbefangenheit des Briefschreibers als unbeabsichtigt gelten kann, war bei dem Mittel eine das übliche Maß überschreitende Verteuerung festzustellen, wie sie bei geschützten Leberegelmitteln mir bisher in dieser Form auch nicht annähernd entgegengetreten ist. Denn je nach der Herstellung aus chemisch reinem oder technischem Ausgangsmaterial (letzteres lag nach den Analysen zu schließen vor), berechnet betrug die Spanne zwischen Herstellungspreis und Verkaufspreis 1000—4000 Prozent. Diese Feststellungen sind in der Arbeit von N ö l l e r, G l u s c h k e und S c h m i d in der Münchener Tierärztlichen Wochenschrift Jg. 77, Nr. 21—24, veröffentlicht worden. Sachlich haben die Firma oder ihre Angestellten an den Feststellungen ernste Einwendungen nicht zu erheben fertig gebracht. Die Fabrik hat vielmehr das zunächst unglaublich überdosierte Mittel geändert, ohne die Namensänderung kenntlich zu machen und hat weiterhin für Rinder wegen der zahlreichen Unglücksfälle das Mittel aus dem Verkehr gezogen und für Schafe eine ganz wesentlich herabgesetzte Dosierung angewendet.

Für den Briefwechsel, der sich an die Arbeit angeschlossen, fehlt hier die Zeit und der Raum.

Die Firma brachte sodann für Rinder das Neo-Serapis heraus, das sie als Carboneum chloratum und Oxyhydrocarbonicum auf den Packungen deklariert. Als sich mit diesem Mittel in einem Bezirke, in dem ich zur Begutachtung der Leberegelbekämpfung zugezogen worden war, tödliche Vergiftungen bei Rindern ereigneten, wurden die vorgefundenen Flaschen analysiert. Es zeigte sich, daß die Firma falsch deklariert hatte. Denn von Tetrachlorkohlenstoff war trotz der Aufschrift in dem Mittel nichts vorhanden, sondern als wirkfame Bestandteile kamen Tetrachloraethylen und Hexachloraethan in Frage.

Mit der Veröffentlichung der Vergiftungsfälle und der falschen Deklaration diente ich mit meinen Mitarbeitern den Interessen der Tierärzte und erfüllte meine Pflicht im Interesse der Volkswirtschaft.

Daß ich nach dem ersten Vorkommnisse die Firma nicht noch einmal um die Angabe der Zusammensetzung bat, ist selbstverständlich. Denn wenn man einmal, gelinde gesagt, objektiv unwahre Auskunft erhalten hat, pflegt man zum zweiten Male nicht nachzufragen. Obgleich wir es in der gemeinsamen Arbeit N ö l l e r, G l u s c h k e und S c h m i d in der Münchener Tierärztlichen Wochenschrift, Jahrg. 78, Nr. 10 unterließen, die Preisberechnung für Neoserapis bekannt zu geben, weil sie sich schon vorteilhaft von der ersten Preisgebarung bei SB 444 unterschied, eröffnete die Firma durch Tierärzte und Nicht-Tierärzte eine Tätigkeit, bei der die Grenzen des im Verkehr Üblichen nicht gerade immer peinlichst innegehalten wurden. O p e l begann das Treffen in Nr. 12 der Münchener Tierärztlichen Wochenschrift als Tierarzt, und S o r g e, meines Wissens Chemiker, setzte das Treffen fort. Der Aufsatz von O p e l war an sich noch ziemlich sachlich und frei von Angriffen, denn in der Hauptsache lobt er das Mittel und die Firma, bei der er mitarbeitet, sucht Schadensfälle anderweitig zu erklären, beklagt sich darüber, daß andere Firmen das erste Mittel nachgemacht hätten und gab zu, daß Neoserapis keinen Tetra-

¹⁾ Nach neueren Feststellungen scheint das Angestelltenverhältnis beendet zu sein; doch besteht in beiden Fällen finanzielle Gewinnbeteiligung.

chlorkohlenstoff enthält. Seine Angabe über synthetisch hergestellte Mittel war vielleicht entschuldbar, wenn man ihm zubilligt, daß er den scharfen Unterschied zwischen Zusalmmenmilchen bekannter Substanzen und Synthese nicht ganz berücksichtigt hat.

In der gleichen Nummer 12 fuhr Herr Dr. Hermann Sorge sodann schweres Geschütz auf. Er verglich mich einleitend mit Marek, wobei ich naturgemäß schlecht wegkommen mußte. Sodann warf er mir den Verrat wertvollen geistigen und gewerblichen Eigentums deutscher Firmen dem Auslande gegenüber vor, wobei aber eine besonders schöne Stelle, die in der mir zugestellten Korrekturfahne noch stand, entweder von ihm oder von anderer Seite vor der Veröffentlichung gestrichen wurde. Weiter versuchte er, die Analyse von Herrn Dr. Gluschke zu bekritteln, ohne freilich exakte Grundlagen zu haben. Daß er freilich mir die Analyse zuschreibt, ist eine Erniedrigung meiner Mitarbeiter, gegen die ich diese vor aller Welt öffentlich in Schutz nehmen muß. Er wendet sich dann gegen Filix von Merck, das in ähnlicher Form wie ich es vorgeschlagen habe, jetzt im Auslande mit Erfolg angewendet wird. Er bekrittelt die Literaturangaben, wobei er nicht berücksichtigt, daß wir in unserer Arbeit kein Interesse daran hatten, Arbeiten anzuführen, welche über die Zusammensetzung des Mittels nichts bekannt geben. Er gab dann einige Unglücksfälle bekannt und wendet sich dann gegen Filix-Neu, das er offenbar in Verkennung der Sachlage mit meinem Namen in Verbindung brachte. Meine Antwort folgte in Nr. 12 der Münchener Tierärztlichen Wochenschrift und behandelte den Tierbesitzer, den Tierarzt und den Hersteller von Leberegelmitteln in ihrer Einstellung zur Behandlung der Leberegelseuche. Die Arbeit rechnet mit Dr. Sorge prinzipiell ab. Vor ihr stand aber noch eine Arbeit von Thienel, die zum Teil durch die folgende Antwort an Sorge schon ihre Beantwortung fand und im übrigen eine Tonart anstieß, auf die zu antworten ich für überflüssig hielt, da zumal auch von mir eine Veröffentlichung in der Münchener Tierärztlichen Wochenschrift nach Aufnahme des Sorge'schen Artikels und meiner Antwort seither nicht mehr erfolgt ist. Es sei aber bemerkt, daß Thienel und Opel aus der Nichtbeantwortung offenbar falsche Schlüsse gezogen haben und nun mit neuen Ausführungen kommen, so daß ich mich hier auf deren Artikel hin doch noch einmal äußern muß. Thienel wendet sich in dieser genannten Veröffentlichung zunächst an mich allein, in der Annahme, daß ich die Arbeiten, die mit Nöller, Gluschke und Schmid gezeichnet sind, redigiert und den tierärztlichen Teil auch selbst bearbeitet habe. Daß ich die Arbeit redigiert habe und die Leitung in den Händen habe, ist selbstverständlich. Daß ich den tierärztlichen und insbesondere den chemischen Teil auch allein bearbeitet haben soll, ist eine Beleidigung meiner Mitarbeiter, welche selbst in ihrem Gebiete bewährte bzw. ausichtsreiche Tierärzte sind und wenn sie selbst als Mitarbeiter zeichnen, ihren Anteil an der Arbeit haben. Wenn freilich Herr Thienel nur mich mit Angriffen beehren will, so bin ich gern bereit, diesen allein zu begegnen und mich für meine Mitarbeiter der Mühe der Abwehr von Unfachlichkeiten allein zu unterziehen.

Sodann behauptet er, daß mir im Spätsommer 1924 die Tetrachlorkohlenstoffliteratur in ihren wichtigsten Arbeiten noch nicht bekannt gewesen sei. Ja, ich glaube, Herr Thienel unterschätzt doch etwas die Arbeitsweise, die ich im Pathologischen Institute eingeführt habe. Es krankt ja gerade all das Arbeiten von Thienel an der enormen Überschätzung der eignen Leistungen und dem Unterschätzen der Leistungen des Auslandes. Längst, ehe Herr Thienel an Leberegel dachte, wurden im Pathologischen Institute Literaturverzeichnisse über die in- und ausländischen Wurmmittel angelegt und alle Zeitschriften, die in der Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule und die dem

damals von mir redigierten Referatewesen der Berliner Tierärztlichen Wochenschrift eingingen, nach dieser Richtung hin sorgfältig durchgesehen, wobei alle Assistenten des Institutes an der Durchsicht mit beteiligt waren, während einem die Zusammenstellung oblag. Daß mir die Arbeit von Sheather nicht entgangen ist, hatte auch noch seinen anderen Grund, da Sheather in der gleichen Arbeit ein Balantidium beim Rinde beschrieb, über dessen Auffinden ich damals in anderem Zusammenhange dienstlich berichtet hatte.

Es muß also aufs Schärfste zurückgewiesen werden, daß mir Thienel Nichtkenntnis der Literatur zutraut, wenn er dafür keine Unterlagen hat. Die Arbeit von Sheather in der Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift 1925, Nr. 46 anzuführen, lag kein Grund vor, da man in Fußnoten bekanntlich große Literaturverzeichnisse nicht zu bringen pflegt, und meine Arbeit nach ihrem ganzen Inhalte damals auch einen anderen Zweck hatte, als Thienel auf das aufmerksam zu machen, was er übersehen hatte. Wenn Thienel auf Grund seiner mangelhaften Kenntnis der Auslandsliteratur jenes Rinder-Massensterben in Bayern vielleicht mit hervorgerufen hat, das den Anlaß zur Anfrage im bayerischen Landtage gab, so muß gesagt werden, daß die Unkenntnis der Auslandsliteratur keinen Entschuldigungsgrund abgibt, insbesondere, wenn die Arbeiten in so bekannten Zeitschriften erscheinen, wie die von Sheather.

Weiter macht dann Thienel Ausführungen über seine Arbeiten über die Dosierung. Wenn er diese Ausführungen vorher öffentlich in der Literatur bekannt gegeben hätte, wäre ihm und seiner Firma das Fiasco des Serapis SB 444 beim Rinde erspart geblieben. Sodann regt er sich darüber auf, wie vorwurfsvoll ich gegen das Serapis-Präparat auftrete, während ich bei anderen Firmen anders vorgehe. Diese Aufregung Thienels ist unverständlich, denn ihm war ja bekannt, daß ich von der Firma, gelinde gesagt, objektiv falsche Mitteilungen bekommen habe und daß die gleiche Firma auch noch nach der ersten Veröffentlichung falsche Deklarationen durchgeführt hat. Er kann doch nicht verlangen, daß man einer Firma gegenüber, welche ihre Abnehmer und deren berufene Fachvertreter in dieser Weise hintergeht, noch einen besonders schonenden Ton an den Tag legt.

Dann aber enthält sein Aufsatz etwas, von dem man sich heute noch wundert, wie ein Tierarzt sich nicht schämt, sich eine solche Blöße zu geben. Er versucht nämlich, meine Prüfung des Distols und der Fabrikate, welche von der Chemisch-pharmazeutischen A.-G. Bad Homburg für Deutschland vertrieben werden, in Mißkredit zu bringen, indem er mitteilt, es sei ihm unverständlich, wie ich für jede Packung mit dem gelben Streifen die Gewähr für die Wirksamkeit übernehmen kann, wenn ich nicht ständig in der Fabrik kontrollieren kann. Dazu ist zu sagen, daß schon die Fassung dieses in besonderem Satz gedruckten Absatzes irreführend ist. Denn der Prüfungstreifen enthält nur den Vermerk, daß das Mittel von mir im Tierversuch geprüft ist. Wenn er noch keine Ahnung davon hat, wie das zu geschehen pflegt, so will ich ihm verraten, daß von jeder Charge der Filicinprodukte ein Versuch an einer Schaf-Serie durchgeführt wird, ehe die Freigabe des Mittels erfolgt. Vereinzelt beim Altdistol und sodann auch bei dem kombinierten Distol sind Prüfungen auch an Rinderferien durchgeführt worden, ehe eine Freigabe zur Verpackung erfolgte. Ich glaube, daß die Tierärzteschaft und Landwirtschaft nur dankbar sein können, daß eine Firma ihre Produkte an selbstbezahlten Schafen und teilweise an Rinderferien gründlich auf Wirksamkeit und Verträglichkeit auf ihre Kosten nochmals nachprüfen läßt, ehe sie sie herausgibt. Denn ein Selbstverantwortungsgefühl unterscheidet eben ernste Firmen von solchen, welche ihre Versuche ohne genügend umfangreiche Vorprüfung auf Wirksamkeit und Verträglichkeit fremder Leute machen, die für den Ankauf des Mittels dazu oft ungeheure Verdienstprozente zahlen müssen, Verhält-

nisse, wie sie bei Serapis SB 444 ja zur Genüge bekannt sind. (Vergl. Anfrage des Abgeordneten Dörffler im bayer. Landtage und den Aufsatz „Der Serapisfilm“!).

Nun kommt aber das Allerfeinste. Herr Thienel meint, wenn ich mit der gleichen Objektivität und kasuistischen Gründlichkeit Vergiftungsfälle publizieren würde, so hätte ich auch die in meiner unmittelbaren Nähe in der Ambulatorischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule Berlin vorgekommenen Vergiftungsfälle an Ochsen nach der Behandlung mit Filinol erwähnen müssen. Über all diese Vergiftungsfälle ginge ich schweigend hinweg. Es ist schwer zu sagen, wo bei diesem Anwurf die Grenze zwischen mangelhafter Kenntnis und anderen mildernden Umständen gezogen werden muß. Denn wenn Herr Thienel meint, ich hätte nichts weiter zu tun, als einzelne Vergiftungsfälle kasuistisch zu bearbeiten, so ist er eben auf dem Holzwege. Ich weiß, daß bei allen Leberegelmitteln vereinzelt Vergiftungsfälle vorkommen und kannte die Literatur über die Vergiftungen bei den Filicinprodukten vielleicht schon, ehe Herr Thienel angeblich aus Mitleid mit der Landwirtschaft an die Leberegelforschung heranging. Meine Veröffentlichungen und die meiner Mitarbeiter pflegen sich vielmehr Fälle bei neuen Mitteln herauszufuchen, bei denen falsche Deklaration vorlag oder wegen ungenügender Durchprüfung auf Verträglichkeit Unglücksfälle eintraten. Die Veröffentlichung der übrigen Unglücksfälle besorgen entweder die Statistik oder die Angestellten oder die Gefolgschaft der Konkurrenzfirmen, wenn sie es für geraten halten, die Öffentlichkeit mit diesen Einzelvorkommnissen in der Literatur möglichst genau bekannt zu machen.

Was nun die Fälle an den Ochsen in der Ambulatorischen Klinik anlangt, so haben mich diese Ochsen nicht recht schlafen lassen, bis ich Klarheit über die Zusammenhänge bekam. Mir waren diese Vergiftungen unbekannt geblieben, bis sie Herr Thienel in seiner Arbeit an das Licht des Tages zog. Da Ochsen in der Ambulatorischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule nicht existieren, mußte ich als vorsichtiger und pflichteifriger Chronist den Zusammenhängen nachgehen, die in der Tat außerordentlich interessant waren. Herr Dr. Schlichting hatte für eine Stelle außerhalb der Hochschule Filinol von Carl Buchner & Sohn, München, bestellt. (17. II. 1927.) Mit den Packungen kamen Giftwirkungen vor, die allerdings nicht tödlich verliefen, sondern alle in Heilung übergingen. Herr Schlichting teilte diesen Sachverhalt der Firma mit, verwechselte jedoch die Ortsanschrift und richtete das Schreiben nach Aubing, also dem Sitze der Konkurrenzfirma (vergl. seinen Brief vom 22. IV. 1927). Diese Firma, Chemische Fabrik Aubing, M. Bloch, übergab mit einem Schreiben des Inhalts, das beiliegende, wohl für Buchner bestimmte Schreiben sei wohl durch ein Versehen auf dem Kuvert bei ihr abgegeben worden, den Brief auf dem Postwege der Firma Buchner & Sohn, München. Dieser Sachverhalt ist mir auf meine Anfrage unter Abschrift des Briefwechsels von dem Vertreter der Firma Buchner & Sohn im Briefe vom 25. IV. 1927 übergeben worden mit der ausdrücklichen Ermächtigung, diesen Vorfall zur Veröffentlichung zu verwenden. Das geschieht hiermit. Jeder Leser, der die Vorgänge verfolgt hat, ersieht, daß es also Personen der Firma Chem. Fabrik Aubing als mit ihrer Ehre vereinbar halten, eigentlich nicht für sie bestimmte, sondern durch ein von der Firma selbst erkanntes Postversehen in ihre Hände geratene Schreiben, welche für Konkurrenzfirmen Ungünstiges enthalten, in Veröffentlichungen bekannt zu geben. Ich frage Herrn Thienel, wie er dieses Vorgehen in seiner Veröffentlichung in Nr. 13 der Münchener Tierärztlichen Wochenschrift mit den allerelementarsten Grundbegriffen des Anstandes in Einklang bringen kann. Man muß den Mut bewundern, den Thienel aufbringt, wenn er, der sich sein Material für die Mitteilung von Schadensfällen bei Konkurrenzfirmen auf diesem Wege be-

schafft, es wagt, mir (und wohl damit auch meinen Mitarbeitern) ungenügende Prüfung unserer Grundlagen bei Vergiftungen vorzuwerfen. Ja, ich glaube, in dieser Beziehung sind wir eben doch bessere Menschen (frei nach Sprichwort!).

Ich wundere mich nun freilich weiter, daß Herr Thienel bei dieser Sachlage sodann weiter eine Tonart anschlägt, in der er die Verdienste der Einführung des Tetrachlorkohlenstoffes in das rechte Licht zu setzen versucht und mit hämischen Bemerkungen gegen mich verknüpft. Er spricht davon, er habe die Arbeiten „mit dem Gefühl des Jammers über die Not unserer Landwirtschaft“ begonnen und setzt sodann seine ja dem Amerikaner Hall und dem Ungarn Kossa und Marek nachgebildete Entdeckung in das rechte Licht. Er polemisiert gegen Filix von Merck, vergißt dabei aber ganz, daß dieses Mittel zeitweise ganz gut war und daß es auch keine Massensterben von Rindern hervorgerufen hat wie Serapis SB 444.

Nun, ich will über einen Hausvogel mit Sehfstörungen hier nicht Betrachtungen anstellen, doch glaube ich, daß die Tetrachlorkohlenstoffeinführung, wenn sie auch vorher im Serapis unter Geheimhaltung des wirksamen Bestandteiles gemacht worden wäre, auch an anderer Stelle gefolgt wäre, da auch hier der Tetrachlorkohlenstoff zu den Versuchen schon bereit gestellt worden war. Es hinderte nur die Versuchstierknappheit, die ja in großstädtischen Laboratorien eine sehr viel größere Rolle spielt, als an einem Schlachthofe, dessen Direktor zugibt, daß er an der Ausarbeitung eines Mittels beteiligt ist. Die Angaben, daß man mit allen wissenschaftlichen und finanziellen¹⁾ Hilfsmitteln eines Institutes zu arbeiten in der Lage sei, ersetzen einen an den Versuchen interessierten Schlachthofdirektor nicht ganz. Soweit über den Aufsatz des Herrn Thienel in Nr. 13 der Münchener Tierärztlichen Wochenschrift!

Daß ich ihn bisher nicht beantwortete, hatte den Grund des Zeitmangels und vor allen Dingen auch den, daß die prinzipiellen Fragen der Serapis-Angelegenheit in meiner Entgegnung an Dr. Sorge, die unmittelbar auf den Thienel'schen Aufsatz folgte, schon geklärt worden waren. Nun hat Herr Thienel aus der Nichtbeantwortung seiner Ausführungen offenbar falsche Schlüsse gezogen. Er reichte an die Tierärztliche Rundschau mit einem kennzeichnenden Begleitbriefe einen Aufsatz ein, der leider durch Eingreifen des Verlegers nach ursprünglicher Annahme und Fertigstellung der Antwort der Zurückweisung verfiel. Dieser Aufsatz mit der Gegenäußerung wurde meinerseits einem Notar vorgelegt. Nach seiner Zurückgabe scheint er in vielen mich betreffenden Punkten die Vorlage für die Arbeit von Opel abgegeben zu haben, die nunmehr in der D. T. W. ihren Abdruck erfahren hat. Bei dieser Sachlage war es nötig, die Taktik des genannten Thienel'schen Aufsatzes hier zu beleuchten. Auf das Schnellfeuer der Veröffentlichungen über Neoserapis insbesondere von interessierter Seite, das nun folgte, näher einzugehen, liegt kein Grund vor. Das Hauptmerkmal aller dieser Veröffentlichungen war, soweit sie von interessierter Seite stammten, die Verhimmelung dieses Mittels, die Vertuschung oder milde Beurteilung der Nebenwirkungen und Vergiftungsfälle, und wo man sich Erfolg davon verspricht, auch die Veröffentlichung von Schadensfällen bei anderen Mitteln. Aus den lobenden Arbeiten herausgehoben sei bloß hier die Arbeit von München, der bei mehr als 6000 Rindern gute Erfolge angibt, aber verschweigt, bei wie vielen von diesen Rindern die Vornahme der Kotuntersuchung vor der Behandlung das Vorliegen von Leberegelsteineerwiefen hatte und wie hoch der Prozentsatz der

¹⁾ Von dem Umfange der Mittel, welche Lehr- und Forschungsinstituten in Deutschland nach dem Kriege zu Forschungen zur Verfügung stehen, scheint sich Herr Thienel märchenhafte Vorstellungen zu machen.

Tiere war, bei denen bei Schlachtung die Abtötung der Leberegel festgestellt wurde, nachdem die Kotunterfuchung vorher den Beweis für ihr Vorhandensein geliefert hatte. Wenn man so arbeitet, dann kann man ein Präparat leicht übermäßig loben. Der Eindruck der unfreiwilligen Komik den Münich's Satz: „An einer Anzahl von Tieren, welche mit Neoserapis behandelt waren und wegen Fremdkörper notgeschachtet wurden, konnte ich durch Schlachthofkontrolle bei der Fleischbefchau feststellen, daß schon nach zwei Tagen keine Leberegel mehr vorhanden waren“ bei dem Sachverständigen erweckt, möchte ich aber dem Leser nicht vorenthalten. Trat die Fremdkörpernotschachtung überall nach zwei Tagen ein? Waren die Leberegel schon nach zwei Tagen restlos verschwunden (das tritt nicht einmal bei dem viel wirksameren CCl_4 ein!)? Waren die Leberegel vorher durch Eiernachweis überall einwandfrei festgestellt worden? Man sieht, der Satz ist in seiner prägnanten Kürze vieldeutig. Wahrscheinlich ist er zu flüchtig niedergeschrieben worden.

Sodann ist aus neuester Zeit die Selbstbiographie der Thienel'schen Verdienste in der Tierärztlichen Rundschau Nr. 46 zu verzeichnen, in der sich Thienel in bescheidener Weise mit Leuckart und Marek als Führer einer neuen Epoche der Leberegelforschung vergleicht. Er berechnet hier, wieviel der Volkswirtschaft erspart würde seit Einführung der durch Zusammenmischung von in der chemischen Industrie gebräuchlichen Substanzen entstandenen Präparate der Firma Aubing, unterläßt aber die Gegenrechnung, nämlich die, wieviel die Volkswirtschaft gewinnen würde, wenn man an Stelle der geschützten Präparate die reinen Substanzen empfiehlt, wie das vom Unterzeichneten in seinen Vorträgen und Kursen für das Schaf seit langer Zeit geschieht. Boshafte Gemüter könnten geneigt sein zu behaupten, daß die Unterlassung dieser Berechnung vielleicht mit den Verdiensten zusammenhängt, die die Chemische Fabrik Aubing einstreicht, bei der Herr Thienel lt. Tierärzteadreßbuch angestellt war.

Nun zur letzten Leistung aus der Gruppe dieser Veröffentlichungen, nämlich der Veröffentlichung von Opel in der Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift Jg. 36, Nr. 1.

Opel sagt zunächst, daß das Distol seit Sommer 1927 nicht mehr das alte Filixpräparat sei, sondern in der Hauptsache aus Hexachloraethan bestehe. Man gestatte mir, daß ich als Prüfer der Produkte der Chem. pharm. A.-G. Bad Homburg auf Wirksamkeit im Tierversuche meine Überwachung ausdrücke über diese von überwältigender Sachkenntnis nicht getrübbte Mitteilung.

Meiner Kenntnis nach (— vertraglich ist mir mitzuteilen, was ich auf Wirksamkeit prüfe —) ist in Deutschland das kombinierte Distol von der ersten Packung ab als solches bezeichnet worden. Nur dieses stellt eine Kombination von Distol mit Hexachloraethan dar, eine Tatsache, die mir bekannt gegeben wurde und die ich wohl schon etwa zur Zeit des Vertriebes der ersten Packung in Deutschland, möglicherweise sogar schon vorher, mehrfach bekannt gegeben habe.

Zur Zahlung einer hohen Konventionalstrafe ist die Firma verpflichtet, wenn sie Mittel in Deutschland in den Handel bringt, die im Tierversuche nicht auf Wirksamkeit durch mich geprüft worden sind. Wenn also eine in Deutschland angekaufte Packung Distol Hexachloraethan mit Distolpulver enthalten hätte, wäre ich Herrn Opel dankbar für die aktenmäßige, gerichtlich genügende Feststellung und Übermittlung des Sachverhaltes, weil ich auf diese Weise die Summe der Konventionalstrafe mühelos verdienen könnte.

Oder sollte aber Opel den Zusatz comb. weggelassen haben? Wenn das der Fall wäre, würde meine Hoffnung auf die Straffumme leider schwinden, und ich würde bedauern, daß Opel mit seinem Worte Distol eben nicht das in Deutschland unter diesem Namen verstandene und vertriebene verstärkte Altdistol mit verstärktem Distolgehalte

in Benzol meint. Und ich glaube fast, daß sie schwindet, denn Koegel stellt ja fest, daß in Deutschland eben die Packungen mit kombiniertem Distol den Zusatz auf ihren Packungen trugen.

Ich nehme also bis zum Beweise des Gegenteiles an, daß sich Opel's Ausführungen auf das kombinierte Distol beziehen.

Soweit bei dessen Vertriebe anfängliche Mißbräuche mit kleinem Drucke des Satzes vorgekommen sind, gehöre ich zu denen, die diese am schärfsten verurteilen und bin derjenige, der um deren Abstellung rechtzeitig ersucht hat. Nun sagt Opel, daß das Geständnis der Zusammenfassung des kombinierten Distols deshalb überraschen müßte, weil noch im März 1927 eine dem Distol nahestehende, auf dem Gebiete des Serapis SB 444 deshalb scharf angriff, weil eine das Prinzip übrigens gar nicht berührende Veränderung an demselben „ohne besondere Angabe in der Fachpresse“ bekanntgegeben worden war.

Aus dem Literaturhinweise sehe ich, daß ich mit meinen Mitarbeitern Gluschke und Schmid gemeint bin. Sonst hätte ich bei einem der Firma Bloch, Aubing, nahestehenden Manne wie Opel nicht geglaubt, daß mir solche hohe unerwartete Anerkennung zuteil würde, weil in Arbeiten von Sorge und Äußerungen von Thienel ein anderer Wind weht.

Zu seinen Bemerkungen kann ich Opel das Folgende zur Beachtung empfehlen: Meiner Mitarbeiter und meine Veröffentlichung über die Zusammenfassungsänderung des Serapis SB 444 war die notwendige Folge der früheren falschen Zusammenfassungsangabe bei meiner Anfrage. Eine Zusammenfassungsänderung, bei der die Dosierung eines starkwirkenden Mittels auf einen Bruchteil der ursprünglichen herabgemindert wird, als das Prinzip nicht berührende hinzustellen, wie es Opel tut, dafür wird er in Fachkreisen wenig Verständnis finden.

Im übrigen besteht doch immerhin, auch wenn beim kombinierten Distol bei der Bezeichnung im Anfange formelle Fehler, die keine Entschuldigung finden, vorlagen, ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Vorgehen der Firma Bloch, Aubing, einerseits und dem der Chem.-pharm. A.-G. Bad Homburg andererseits. Die erstere hielt es nicht für unter ihrer Würde, auf Anfrage falsche Zusammenfassungsangabe vorzunehmen und ohne Hinweis die Zusammenfassung wesentlich zu ändern. Die zweite Firma brachte das kombinierte Distol mit Zusatz auf jeder Packung als Distol comb. bezeichnet und in wesentlich anderen Kapseln in den Handel. Daß die Arbeit von Marek nicht früher erschien, daran trifft mich keine Schuld. Wann sie bei der D. T. W. eingereicht worden ist, weiß ich nicht. Im ungarischen Texte sah ich sie gedruckt vor ihrem Erscheinen in deutscher Sprache.

Daß ich nicht selbst über den Gegenstand und über die eigenen Versuche in der Presse berichtete, liegt daran, daß die ersten grundlegenden Versuche von Prof. Marek geliefert worden sind, ihm also die erste Veröffentlichung zustand und meine Serienversuche diesen gegenüber mehr erweiternden Wert hatten. Im übrigen richten sich meine Veröffentlichungen mehr nach Zeit und Material und nicht nach den Wünschen der Leute um die Firma Bloch, Aubing. Daß Marek erst die Versuche gemacht hat, ehe er das Produkt in die Praxis gab, hätte sich Opel bei einigem logischen Denken wohl selbst sagen sollen. Oder sollte er etwa vermuten, daß erst 200 000 Tiere behandelt worden seien, ehe die grundlegenden Serienversuche am Schlachttiere kamen? Ich glaube, solche Art des Vorgehens konnte nur bei Serapis SB 444 (warum nicht 444444?) vorkommen.

Im übrigen weiß jeder, wie trügerisch klinische Massenerfahrungen ohne Laboratoriumskontrolle (— mit Kontrolltieren und Parasitennachweis und Schlachtung —) sind.

Wohin wären wir bei der Pferderäude im Kriege gekommen, wenn wir die Bekämpfung auf das oft auffällige

günstige Massenberichtsmaterial der Statistik und der amtlichen Berichte aufgebaut hätten, ohne uns über die Beweggründe günstiger Berichterstattung und der Mängel derselben klar zu werden.

Von Zusammenfassungsänderungen des Rinderdistols, das in Deutschland seit Übernahme der Wirkungsprüfung im Tierversuche durch mich als verstärktes Altdistol in den Handel kommt, ist mir nichts bekannt geworden. Es hat bis heute die gleiche Zusammenfassung. Daß die von Opel angeführten Vergiftungen durch Distol in Bayern (— wobei er die Zahl der behandelten Tiere und die Zahl der Vergiftungen nach ihrer Schwere geordnet anzugeben vermag!! —) mit angeblichen Zusammenfassungsänderungen verknüpfen möchte, ist ein reines Phantasieprodukt. Um 1925 hatte das Distol die Änderungsperiode der Entstehungszeit also wohl schon hinter sich.

Die Angaben Opel's über das modifizierte Distol Marek's sind Produkte der Phantasie Opel's. Denn was sollte in einer Zeit vollständiger Erschöpfung der Filicinprodukte auf dem Weltmarkte eine Kombination von 3,0 g Distolpulver mit 4,4 g Hexachloraethan, wenn er die ursprüngliche Menge des Distolpulvers im Altdistol enthält? Hier scheint bei Opel der Wunsch, etwas suggerieren zu wollen, der Vater des Gedankens zu sein. Der kritische Wissenschaftler findet in diesem Gedankengange Opel's schwer lösbare Rätsel.

Zum nächsten Abfatze Opel's ist zu sagen, daß in Prioritätsangelegenheiten die Serapisgesellschaft und mit ihr Thienel bisher Pech hatte. So ist die erste Tetrachlorkohlenstoffanwendung gegen Leberegel nunmehr Marek zuzuschreiben (vergl. Marek 1927!). Daß wir in der Arbeit Nöller, Glusckke und Schmid 1926 die ungarische Angabe übersehen, erklärt sich aus unserer Unkenntnis der ungarischen Sprache. Mit dem Hexachloraethan steht es für Opel-Thienel ähnlich.

Opel bekrittelt meine und Dr. Schmid's Behauptung, die Einführung des Hexachloraethans im Neo-Serapis sei eine Nachentdeckung. Ich behaupte mit Recht, daß die Beweisführung von Opel falsch ist, um nicht einen schärferen Ausdruck zu gebrauchen. Denn wenn die Firma Merck über ihre abgeschlossenen Versuche berichten läßt und diese Berichte den Dienstweg durchlaufen, so muß sie eben die Versuche haben durchführen lassen. Freilich steige ich nicht in jene Tiefen hinunter, in denen Thienel (vgl. Filinol-Vergiftungen!) seine Arbeiten zu halten beliebt. Ich pflege nämlich in meinen Veröffentlichungen nur dasjenige Material mitzuteilen, das ich mitzuteilen befugt bin. Denn so geistig arm bin ich nicht, daß ich meine Veröffentlichungen auf Material aufbauen muß, zu dessen Verwendung mir die Berechtigung fehlt. Ich konnte meine Mitteilungen über den mir schon Anfang 1926 bekannten Sachverhalt der Versuche der Firma Merck nicht ohne schriftliche Genehmigung verwerthen.

Vielleicht glaubt Opel, der Umstand, daß jemand irgend einmal Versuche mit einem chemischen Produkt machen wollte oder auch gemacht hat, ohne daß die Versuche publiziert worden sind, berechtige noch nicht, dem Betreffenden die Priorität zuzuschreiben, ähnlich wie das bei den zoologischen Nomenklaturgesetzen üblich ist, und er hat vielleicht auch an den Satz, „quod non est in litteris, non est in mundo“ gedacht. Ja, wenn man so vorgehen und die Priorität dem zuschieben will, der zum ersten Male das Mittel in der Literatur nennt, dann könnte man ja wohl Nöller, Glusckke und Schmid die Priorität der Tetrachlorkohlenstoffeinführung und auch der wissentlichen Hexachloraethaneinführung zuschieben. Opel und Thienel haben ja zunächst nie die Bestandteile der Mittel genannt, mit denen sie arbeiteten. Ob sie ihnen überhaupt bekannt gewesen sind, oder nur dem Chemiker Dr. Sorge, der sich in seinem Briefe vom 19. IV. 1927 mir gegenüber als den bezeichnet, dem die Herstellung der

Aubinger Präparate unterstehe, brauche ich hier nicht zu unterfuchen. Um jedenfalls das Verdienst der ersten Benutzung des Hexachloraethans gegen Leberegel in Deutschland demjenigen zukommen zu lassen, dem es nach meiner Kenntnis zugehört, wandle ich mich an die Firma Merck um die Genehmigung, die Tatsache der Versuche von Dr. Sprehn mitteilen zu dürfen. Die Genehmigung ist erteilt worden. Damit dürfte eine Klarstellung unzweideutig erfolgt sein.

Warum die Firma Merck nicht in der Literatur über ihre Versuche hat berichten lassen und warum sie auf den Versuchen von Dr. Sprehn, über die übrigens nach mündlichen Mitteilungen im Hessischen Schladgebiete auch ein Vortrag gehalten worden ist, nicht weitergebaut hat und ein Mittel auf dieser Grundlage herausgebracht hat, ist ihre Sache und mir nicht in seinen Einzelheiten völlig klar geworden. Wenn ich aber als einer, dem die Vertreter der Firma Bloch, Aubing, meist keine große Kenntnis im Leberegelgebiete zutrauen, trotzdem meine bescheidene Meinung äußern darf, so dürften die Gründe in verschiedenen Richtungen zu suchen sein.

Erstens herrscht bei größeren Firmen der chemischen Industrie im allgemeinen die Übung, daß Entdeckungen nur bekanntgegeben werden dürfen, wenn es im Interesse der Firma liegt. Die berechtigte Freude des Entdeckers an seiner Entdeckung muß dem Interesse der Firma gegenüber zurückstehen.

Zweitens hat vielleicht die Firma Merck eingesehen, daß Präparate mit Hexachloraethan so leicht zu analysieren und nachzuahmen sind, daß es sich nicht lohnt, das Gebiet weiter zu verfolgen, weil eine Möglichkeit der Schutzanmeldung mit Erfolg eben kaum vorliegt.

Drittens glaube ich, daß bei der notorisch milden Wirkung des Hexachloraethans, die den Filixpräparaten weit nachsteht, so große Dosen notwendig wurden, daß vom kaufmännischen Standpunkte aus Bedenken aufstiegen, ob es lohnte, das Gebiet weiter zu verfolgen. Jedenfalls war die Verwendung des Hexachloraethans, wie mir Gespräche mit Vertretern anderer Firmen zeigten, schon 1926 kein Geheimnis mehr. Ich muß natürlich annehmen, daß diese Vorgänge an dem sonst doch im allgemeinen nicht gerade rücksichtsvollen Nachrichtendienst der Chemischen Fabrik Aubing (vergl. Filinolvergiftungen!) spurlos vorübergegangen sind, wenn Herr Opel es jetzt noch fertig bringt zu behaupten, die Einführung des Hexachloraethans sei keine Neuentdeckung.

Weiter versucht mir Opel aus der Arbeit von Nöller, Glusckke und Schmid 1926 nachzuweisen, daß ich offenbar das Hexachloraethan für giftig gehalten haben soll, weil es bei den Verunreinigungen von CCl_4 aufgeführt wird.

Ich muß mit ehrlicher Erschütterung eingestehen, daß ich diesen Gedankengang zum ersten Male sah, als ich Opel's Arbeit las und daß ich an ihm unschuldiger bin als ein Lamm. Ich wußte nämlich nur, daß C_2Cl_6 im Literaturverzeichnis bei Hall und Cram erwähnt wurde, nicht im Texte, und hätte die dort erwähnte Formel als Nichtchemiker sicher auch leicht überlesen, obgleich damals der Bericht über Sprehn's Versuche schon vorlag.

Denn dort habe nicht ich den chemisch-pharmazeutischen Teil bearbeitet, sondern einer von meinen (— von Opel und Thienel ja nicht erwähnten —) Mitarbeitern, und zwar Herr Dr. Glusckke. — Im übrigen ersehe ich aus dem Texte, daß er die Frage der Giftigkeit offen läßt. Der Rest entstammt eben der Phantasie von Opel.

Die Angabe Opel's, wir (— Opel nennt wieder mich allein —) hätten in höchst dankenswerter Weise die Analyse von Neoserapis veröffentlicht, entbehrt der Komik nicht. Ich habe auf sehr dankenswerte Wohltaten, die ich jemanden antat, noch nie so merkwürdige Gegenreaktionen gesehen, wie sie in den schnellfeuerartig folgenden Arbeiten

von Opel, Thienel und Sorge eintraten. Oder sehen dort die Reaktionen auf dankenswerte Vorgänge immer so aus?

Im Absatz 4 auf Seite 7 oben spricht Opel von übelwollender Kritik, ohne Namen zu nennen. In der der Tierärztlichen Rundschau eingereichten Arbeit Thienel's, die der Verlag zurückgab, fand sich ein ähnlicher Passus, wobei ich genannt wurde. Da Opel keine Namen nennt, da aber bei der bekannten liebevollen Einstellung der Serapis-Freunde zu mir seit der Arbeit von Nöller, Glusckke und Schmid 1926 der Leser an mich denken könnte, zu einer Klarstellung!

Das Verfahren, vereinzelte Unglücksfälle bei einem jahrelang bewährten Mittel, bei Behandlung der Vorzüge eines anderen Präparates hervorzuheben, rührt von Thienel 1927 (M. T. W. Jg. 78, Nr. 6) her, der einen von ihm ja auch nicht selbst gesehenen Fall angeblicher Distolvergiftung mit dem ungewöhnlichen Befunde einer Luxation des femur ins foramen obtur. zur besseren Hervorhebung der Vorzüge seines Mittels als abschreckenden Kontrast aufführt. Ich habe mit meinen Mitarbeitern, wie erwähnt, ein solches Vorgehen, bekannte Einzelercheinungen hervorzuheben, vermieden, und mich auf neue Mittel beschränkt oder auf Fälle, bei denen solche Befunde nach der Zusammenstellung oder Dosierung überraschten.

Ebenso wie ich mich von jeder publizistischen Propaganda für Einzelmittel freigehalten habe, habe ich gegenpropagandistische Veröffentlichungen als unwürdig unterlassen, ein Standpunkt, der ja nicht nur bei selbständigen Wissenschaftlern, sondern sogar in der vornehmeren chemischen Industrie gegenüber Konkurrenzpräparaten üblich zu sein pflegt. Ich weise also jede derartige Unterstellung scharf zurück und betone, daß ich mehr zu tun habe, als wie ein Schnellfeuergeschütz immer wieder auf bekannte Mittel oder deren Eigenschaften loszuschießen. Wo ich mich in der Öffentlichkeit oder in Gutachten für den Dienstgebrauch über Leberegelmittel geäußert habe, bin ich niemals in den Fehler verfallen, wie ein harmloser Anfänger oder ein Fabrikangestellter das eine oder das andere Mittel als Allheilmittel zu loben, sondern ich habe meine Gutachten stets nach den Gesichtspunkten eingeteilt: Zusammenfassung, Wirkung, Eingabeweise, Preis, Vergiftungen und Nebenwirkungen. Wo ich in Vorträgen, Gutachten und Anfragen auf geschützte Mittel eingegangen bin, habe ich Neoserapis bei den Rindermitteln seit Frühjahr 1927 stets nach dem bei mir üblichen Schema auch mit besprochen, wobei ich stets sachlich das Mittel von dem Verhalten der Firma getrennt habe.¹⁾ Trotz meiner Einstellung gegen nichtdeklarierte Mittel und Geheimmittel mit anfechtbarer Preisfestsetzung habe ich wohl auch für alle geschützten Leberegelmittel durch meine Aufklärungstätigkeit unfreiwillig die größte Propaganda gemacht.

Die Art der Veröffentlichungen und Brieffreundlichkeiten von Thienel und die zarten Andeutungen Opel's sind der Dank für die von mir geleistete Arbeit in dieser Richtung. Aber Undank ist nun einmal der Welt Lohn!

Als ich das Räudegasverfahren ausgearbeitet hatte, ver-

¹⁾ Wenn ich einen Fehler gemacht habe, so ist es höchstens derjenige, daß ich die Wirkung des Neoserapis von meinen Hexachloraethanversuchen mit anderer Dosierung her beeinflusst und auf Grund von zu wenigen klinischen Erfahrungen ohne Schlachtbefund zu gut beurteilt habe. Denn aus einem Prüfungsprotokolle von Prof. Marek, der in der günstigen Lage ist, leichter Rinderferien zu Schlachtzwecken zu bekommen, ersehe ich schon, daß bei Rindern mit Neoserapis Verfäulnis hintereinander vorkommen. Es ist anzunehmen, daß diese Befunde bald bekanntgegeben werden. Bei der geringen Hexachloraethandosis überraschen sie mich bei meiner bekannten Einstellung zu der Hexachloraethanwirkung (Nöller und Schmid, Tierärztl. Rundschau, Jg. 33, Nr. 46, S. 851—857) nicht.

sprach mir der Leiter eines Pferdelazettes ein Denkmal, wenn ich ein von ihm bezeichnetes Räudepferd mit diesem Verfahren retten könnte. Das Pferd wurde gerettet. Das Denkmal bekam ich nicht (— wobei ich entschuldigend betone, daß damals Rohstoffmangel herrschte —). Aber Angriffe schönster Art, die damals ähnlich wie die von Thienel erwähnten Filinolvergiftungen auch in einem gewissen Zusammenhange mit Ochsen standen, bekam ich. Man möge in der Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift, Jahrg. 28, Nr. 3, S. 25—29 nachlesen! Ich war damals noch so jung und unhöflich, daß ich schnell, hart und lieblos antwortete.

Ich weiß, wie schon betont, daß ich in den Augen der Leute der Chemischen Fabrik Aubing wohl nicht viel von Leberegelmitteln verstehe. Denn der von solcher fachverständigen Stelle (Sorge) ausgehende ehrenvolle Vergleich mit Marek, den ich schon erwähnt habe, beweist das zur Genüge. Trotz dieser Ansicht, in der sich wohl auch Thienel befindet, wie ich aus einem Briefe entnehme, und die scheinbar nur bei Opel neuerdings gemildert ist, möchte ich nicht unterlassen, hier meine bescheidene und unmaßgebliche Ansicht über die Entstehung des kombinierten Distols bekannt zu geben.

Zufällig weiß ich, wie erwähnt, aus eigener Erfahrung, daß lange vor der Geburt des Neoserapis Vertretern verschiedener Leberegelmittel herstellender Firmen das Hexachloraethan bekannt war, ebenso wie die Versuche der Firma Merck in Hessen vielleicht teilweise aus einem Vortrage her kein Geheimnis waren. Das war im Winter 1925/1926, als die Chemische Fabrik Aubing den Großversuch der Leberegelbekämpfung beim Rinde mit Hilfe der Keulung durch SB 444 gemacht hatte. Ich nehme heute noch an, daß die Filicinprodukte herstellenden Firmen kein großes Interesse daran hatten, die Produkte einzuführen, die so leicht zu analysieren und nachzuahmen waren wie die Hexachloraethanmischungen. Es kam der Winter 1926/1927, in dem wohl alle Filicinprodukte ziemlich restlos ausverkauft worden sein dürften, wie ich hier vermute. Es ist bei dieser Sachlage klar, daß jetzt ältere und neuere Versuche mit Hexachloraethankombinationen mehr Beachtung fanden, insbesondere als auch nunmehr das Neoserapis mit einem geringen Herstellungspreise zwang, billigere Präparate auf den Markt zu bringen. Als die Chemisch-pharmazeutische A.-G. Bad Homburg 1927 nach ausgedehnten Versuchen der Firma Chinoin im Auslande unter Vorlegung der Protokolle und später der Angaben über fünfstellige Rinderferien in der Praxis im Auslande an mich herantrat, ergänzende Prüfungen durchzuführen, glaubte ich bei ihr keinerlei Interesse an einer Aufgabe der altbewährten Filicin-Präparate vermuten zu können. Meine Prüfungen am Rinde ergaben, das, was ich in dem von der Firma Bloch, Aubing, 1927 angezogenen, aber nicht recht bekannten Gutachten an das angebliche Preussische Ministerium des Innern festgestellt habe, nämlich daß die Wirkung des kombinierten Distols nach meiner Ansicht milder ist als die der reinen Filixprodukte in der auf meinen Rat zurückgehenden verstärkten Dosierung (4 g je Kapsel), wie sie in Deutschland nach den Erfahrungen im Hessischen Schadegebiet im Gegenfatze zum Auslande üblich ist und wie sie sich im Rinderversuche mit seltenen Ausnahmen ausgezeichnet bewährt hat. Auf Grund der Versuche lautete mein Ratsschlag der Chemisch-pharmazeutischen A.-G. gegenüber dahin, das Distol in seiner ursprünglichen Form als jahrelang einwandfrei bewährtes Präparat zu behalten, das kombinierte Distol dagegen als Präparat von praktisch hinreichendem Wirkungsgrade und ausgezeichneter Verträglichkeit als billigeres Präparat nebenbei zu führen.

Man sieht also, daß von einer Schwenkung an meiner Begutachtung des Präparates keine Rede sein kann. Auf die Art der Deklaration seitens Marek's habe ich naturgemäß keinerlei Einfluß. Daß ich die Genehmigung zur Anbringung des Prüfungstreifens nur erteilte, so lange die

Prüfungen im Tierversuche den Anforderungen an ein gutes Leberegelmittel entsprechend abgelaufen sind, dürfte selbstverständlich sein.

Was Zusammensetzung und Wirkung anlangt, so kann ein Vergleich des kombinierten Distols mit dem Neoserapis schon deshalb nicht ohne Weiteres gezogen werden, weil das Hexachloraethan im kombinierten Distol in mehr als der doppelten Dosis (je Zentner Rind umgerechnet) vorhanden ist als im Neoserapis.

Marek muß offenbar seine Gründe gehabt haben, als er so hohe Hexachloraethandosen neben Filicin anwandte.

Ich bezweifle, daß es gerade, wie man aus Opel's Ausführungen im Absatz 1 entnehmen könnte, die Angst vor den Nebenwirkungen des Alt-Distols war, die Marek zu der Modifikation brachte, auch deshalb, weil Thienel ja in der Münchener Tierärztlichen Wochenschrift Nr. 31 bei Neo-Serapis selbst mehr Schadensfälle, Vergiftungen und Nebenwirkungen angibt, als sie beim Distol selbst bei seiner in Deutschland angewandten verstärkten Form vorkommen. Man vermißt eben bei Opel die Kenntnis der Vorgänge auf dem Markte der Leberegelmittel und eine gerechte Wertung fremder Leistungen in Versuchen und Großversuchen zur Schaffung einer möglichst wenig giftigen Eingabeform und sicheren Dosierung.

Soviel für heute aus meinen Erfahrungen im Gebiete der Hexachloraethanpräparate!

Die Preisgebarung der einzelnen Firmen, ihre Reklame, Veröffentlichungen und die Zugabe oder Vertuschung von Nebenwirkungen zu beleuchten, würde hier zu weit führen, kann aber gelegentlich noch nachgeholt werden, ebenso wie die Einstellung der Firmen zu den Interessen des abnehmenden Tierarztes, der Volkswirtschaft und geschädigter Tierbesitzer.

Daß die Nachentdeckung Thienel's, deren Feststellung Opel bekrittelt, sofern er überhaupt gewußt hat, was im Neoserapis vorhanden ist, wofür in der Literatur aber die Grundlagen fehlen, durch die Art der Betrachtungsweise Opel's in seinem Aufsatze keine Neuentdeckung wird, ist hervorgehoben worden. Daß er das kombinierte Distol (— das er da, wo es ihm paßte, fälschlich als Distol bezeichnete —), obgleich die Dosierung der wertvollsten Substanz die Doppelte ist, die giftigste Substanz des Neoserapis fehlt und die Rauschzustände dadurch auf ein Minimum herabgedrückt worden sind, ähnlich wie Koegel beurteilt, darüber mag er sich mit der Kenntnis Koegel's

von den wahren Vorgängen und mit Prof. Marek auseinanderzusetzen.

Die Heiterkeit fehlt für mich bei allen Anstrengungen Opel's, soweit sie sich gegen mich erkenntlich richten, trotzdem nicht ganz. Seit der Veröffentlichung von Koegel oblag mir nämlich als Staatsbeamten die Pflicht, für preußische Gebiete die Anwendung des chemisch reinen Hexachloraethans in Kapfeln¹⁾ versuchsweise allein anzuraten, insbesondere aus Freude darüber, daß das von der Chemischen Fabrik Aubing begonnene und in die tierärztliche Literatur eingeführte Verfahren der irreführenden Deklaration und offenen oder verkappten persönlichen Angriffe auf diejenigen Wissenschaftler, welche auf Grund solcher Vorfälle Ungünstiges über ihre Präparate berichten müssen, in seinen Folgen es soweit gebracht hat, daß die Zusammensetzung leicht nachahmbarer geschützter Präparate heute in der Öffentlichkeit so weit bekannt geworden ist, daß die Leidtragenden wohl diejenigen Firmen sein werden, welche solche leicht nachahmbaren Leberegelmittel herstellen, also in erster Linie wohl die Chemische Fabrik Aubing.

Wie im übrigen sich die Interessen des Tierarztes, des Tierbesitzers und der Hersteller von Leberegelmitteln sich zueinander verhalten, daß habe ich in meiner Antwort an Sorge soweit klargestellt, daß ich weitere Worte hier nicht zu machen brauche. Ich möchte mit diesem Hinweis schließen, in der Hoffnung, daß ich Herrn Thienel und Opel und der Firma, der sie nahestehen, mit meinen Ausführungen den Dank für alles mir bisher Gebotene schon zu einem Teile habe abtragen können.

Bericht über die Fachtierärztetagung zur Bekämpfung der Aufzucht-krankheiten in Jena.

Berichtigung.

Die auf Seite 53 im Abschnitt Abortus des Rindes enthaltenen Angaben über Paratyphus-Abortfälle beziehen sich nur auf einen Bezirk in Oldenburg, nicht auf das ganze Land. Die diesbezüglichen Untersuchungen wurden im bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer Oldenburg ausgeführt.

¹⁾ Das Ergebnis der Versuche wird dargestellt werden, wenn genügend große Reihen vorliegen und wenn es klargestellt ist, ob und inwieweit man bei Tieren mit starken Gallengangsinkrustationen mit hohen Hexachloraethandosen allein auskommt oder die stärker wirkenden Filicinprodukte aushilfsweise heranziehen muß. Soweit ich übersehe, sind in den von mir eingeleiteten Versuchen bisher erst etwa 50 kg Hexachloraethan zur Anwendung gelangt.

Innere Medizin und Chirurgie.

Mörkeberg, A. W.: **Fisteln an den Vordergliedmaßen beim Pferde.** (Maanedsskrift for Dyrlaeger, 1925, Heft 17.)

(Mit 1 Abbildung.)

1. Fistel am Unterarm bei einem Pferde, die durch einen in der Muskulatur sitzenden großen Holzsplitter hervorgerufen und unterhalten wurde.

Am 28. April 1925 wurde in die Klinik ein dreijähriges Pferd eingestellt, das wegen einer Fistel am Unterarm, die es etwa dreiviertel Jahr lang gehabt hat, behandelt werden sollte. Es hatte im Sommer 1924 auf der Weide sich eine Wunde am Unterarm zugezogen, und diese heilte nicht trotz der eingeleiteten Behandlung, sondern zog sich zu einer Fistelmündung zusammen.

Das Pferd, dessen Allgemeinbefinden gar nicht gestört war, lahnte nicht. Die kranke Gliedmaße wurde ganz normal vorgeführt. Oben am linken Unterarm wurde eine sehr auffallende Geschwulst von ovaler Begrenzung vorgefunden. Sie begann, wie auf Fig. 1 zu sehen ist, lateral und vorn in Höhe mit dem Ellenbogengelenk, deckte die Mus-

kelkörper von M. extensor carpi radialis (äußerer Speichenmuskel, Strecker des Vordermittelfußes) und von M. extensor digitorum communis (gemeinschaftlicher Zehenstrecker), sprang in der Mitte etwa 4 cm vor, war fest und indolent und maß von oben nach unten 20 cm, von vorn nach hinten an der breitesten Partie 12 cm. An ihrer unteren Grenze wurde eine erbsengroße, stark trichterförmig eingezogene Fistelmündung vorgefunden, aus der etwas zäher, gelblicher Eiter floß. Dieser hatte die Haare an der Innenseite der Gliedmaße ganz hinab bis zum Hufe zusammengeklebt. Durch die Fistelöffnung konnte eine Sonde etwas in die Tiefe und darauf 6—7 cm nach vorn und oben (cranioproximal) in eine recht geräumige Höhle geführt werden. Durch drehende Bewegung mit der Sonde fing sich ihre Spitze in einem engen Kanal, der weiter nach vorn und oben führte, der aber tiefer lag als die größere Höhle. Einen Fremdkörper konnte man mit der Sonde nicht nachweisen. Eine andere Fistelmündung, durch die eine geringe Menge Eiter kam, fand sich an der obersten, vordersten Begrenzung der Geschwulst. Auch sie war trichterförmig eingezogen, sie war aber so eng, daß eine gewöhnliche Knopfsonde sie kaum passieren und nur 3—4 cm

vordringen konnte. Nachdem das Pferd niedergelegt war, gelang es jedoch, eine lange Sonde von der einen Fistelmündung durch die andere zu führen, so daß sie den ganzen 20 cm langen, etwas gekrümmten Fistelkanal passierte.

An dem niedergelegten, mit Chloral und Chloroform (65 Gramm Chloral per rectum und im ganzen während der Operation 35 Gramm Chloroform) narkotisierten Pferde wurde die Fistel von der untersten Mündung aus so weit dilatiert, daß ein Finger in die Abszeßhöhle eingeführt



werden konnte. Diese lag subfaszial außen am gemeinschaftlichen Zehenstrecker und hatte eine sehr dicke, fibröse äußere Wand. In der Abszeßhöhle wurde ein Fremdkörper, ein Holzsplitter (Tannenstecken) mit scharfen Rändern gefunden. Dieses kleine Stück Holz war 6 cm lang, 1,5 cm breit und ebenso dick. Es war vom Eiter so aufgeweicht, daß es sich, als man es befühlte, kaum von der Abszeßwand unterscheiden ließ, wenn es gegen sie lag; es war aber beweglich und mit einer Kornzange leicht zu entfernen. In dem tiefen Fistelkanal, der von der Abszeßhöhle durch die Muskelkörper des gemeinschaftlichen Zehenstreckers und des Streckers des Vordermittelfußes hineinführte, lag ein anderer kleiner Holzstecken derselben Art. Er war 3 cm lang und $\frac{3}{4}$ cm breit und wurde mit Hilfe eines scharfen Löffels und einer Kornzange entfernt. Nachdem der oberste Teil der Fistel etwas dilatiert worden war, konnte ein scharfer Löffel durch sie ganz eingeführt werden. Sie wurde nun gründlich ausgekratzt und dann mit Jodtinktur mit Hilfe eines mit der Tinktur getränkten Gazestreifens, der ganz durch die Fistel geführt wurde, touchiert. Schließlich wurde mit Hilfe einer Kupferdrahtschlinge ein Drainrohr durch den ganzen Fistelkanal eingelegt. Dieses konnte 14 Tage nach der Operation entfernt werden. Nach weiteren 8 Tagen war die Fistel (und die Abszeßhöhle) geheilt. Gleichzeitig war die Geschwulst unter der Behandlung mit Baden und mit verteilenden Salben stark zurückgegangen.

Es ist interessant zu sehen, daß das Pferd keine Funktionsstörung zeigte, trotzdem die Fistel durch die Muskulatur ging und ein Teil des Fremdkörpers in dieser saß.

2. Fistel am Unterarm bei einem Pferde, die durch einen Fremdkörper (ein Stück Holz) unterhalten wurde.

Bei einem Pferde wurde eine Fistel, die es viele Monate oben an der lateralen Seite des Unterarms hatte und die wiederholt von dem behandelnden Tierarzt mit dem spitzen, kegelförmigen Brenneisen ausgebrannt war, von mir mit einem geknüpften Bistouri erweitert. Ich konnte nun mit dem Finger einen beweglichen, festen Körper fühlen. Er lag in einer kleinen Tasche ganz innen

an der Oberfläche des Radius und war vom M. extensor digitor. communis bedeckt. Ich nahm an, daß es ein demarkierter Sequester war, der vom Radius stammte, fand aber als er extrahiert war, daß es ein regelmäßiger Sektor eines kleinen Stückchens eines Fichtenzweiges war. Es war 5 cm lang und an der bogenförmigen Fläche, an der sich ein paar kleine Knorren fanden, 4 cm breit. Das Stück Holz war von dem Brenneisen, das benutzt worden war, gezeichnet. Der Fremdkörper und die Fistel hatten die Arbeitskraft des Pferdes nicht behindert.

3. Fistel, die am hintersten Rande der Streckmuskeln des Vorarms mündete, durch die Muskeln gegen den hintersten Rand des Schulterblattes nahe dem Schultergelenk hineinführte und durch einen Fremdkörper (einen Holzsplitter) unterhalten wurde.

Von einem Kollegen, der jetzt weit weg wohnt, Tierarzt N. B. Lund, der seinerzeit in Nyköping bei M. praktizierte, jetzt aber seine Praxis in Brasilien ausübt, habe ich dieser Tage eine Mitteilung über ein Pferd mit einer Fistel erhalten, mit der Bitte, einen guten Rat darüber zu geben. Der Fall kann als gutes Beispiel bei Fisteln dienen, die durch Fremdkörper unterhalten werden, und deswegen will ich ihn hier anführen.

Das Pferd ist drei Jahre alt und sehr mager, lahmt aber nicht. Als Lund es vor drei Monaten zum ersten Mal sah, hatte es Jahr und Tag eine Fistel, die von der Mündung vor dem hintersten Rand der Streckmuskeln des Vorarms, eine gute Handbreit unterhalb des obersten Winkels des Schulterblattes nach innen, unten und vorn gegen den hinteren Rand des Schulterblattes führte. In der Tiefe war mit der Sonde ein Fremdkörper zu fühlen. Lund legte das Pferd hin und narkotisierte es, dann spaltete er die Fistel so weit, daß er mit einer Zange den festen Körper erreichen konnte, der, wie sich zeigte, ein Stück Holz war, und extrahierte davon ein Stück von der Stärke und der halben Länge eines Daumens. Es blieb aber etwas von dem Fremdkörper zurück. Dies zu entfernen gelang aber trotz vieler Mühe nicht.

Eine Zeit darauf warf Lund das Pferd abermals und legte nun einen Schnitt gerade über der Stelle, wo der Fremdkörper saß. Trotzdem er so viel wie möglich stumpf vorging, entstand dabei eine so starke Blutung, daß er die Operation abbrechen und die Blutung durch Tamponade und Naht stillen mußte. Die Blutung wiederholte sich, als er einige Tage später versuchte, die letzte Wunde stumpf zu erweitern, weswegen es nicht gelang, den zurückgebliebenen Teil des Fremdkörpers zu entfernen. Die letzte Operationswunde ist nun geheilt, die ursprüngliche Fistel hat sich aber wieder gebildet, und der Abfluß von Eiter ist beträchtlich.

Darüber, daß es bei der Anwendung des Messers in der Tiefe an der erwähnten Stelle zu einer starken Blutung kam, braucht man sich nicht zu wundern, wenn man daran denkt, daß die mächtige hintere Schulterarterie (A. subscapularis) und ihre großen Äste gerade dort verlaufen. Die Blutung bei dem letzten Eingriff, wo Lund nur stumpfe Instrumente benutzte, würde vielleicht vermieden worden sein, wenn die Operation ausgesetzt worden wäre, bis die bei dem ersten Eingriff verletzten Arterien durch einen Thrombus fest geschlossen gewesen wären.

Aber was nun? Ja, es kommt darauf an, wo der Fremdkörper sitzt, ob in den Streckmuskeln des Vorarms oder medial davor. Lund gebraucht selbst den Ausdruck, daß er ganz innen unter der Muskulatur liegt. Dies könnte ja auch auf das letzte deuten. In einem solchen Falle würde ich längs des hinteren Randes der Streckmuskeln des Vorarms vor dem Fremdkörper einen Schnitt legen, dann mit der Hand unter die Muskeln gehen und ihn zu fassen suchen. Die Tasche, die dadurch entsteht, daß man die Hand einführt, müßte nach unten zu drainiert werden. Man könnte dabei eine lange, stumpfe biegsame Sonde benutzen, die vom Grunde der Wundhöhle nach unten und hinten geführt wird, so daß sie unter der Haut weit unten hinter dem Rand der Streckmuskeln des Vorarms herverkommt. Hier müßte man eine Gegenöffnung schneiden (siehe Haandbog Veterinaerkirurgi II Deel S. 23).

Liegt der Fremdkörper dagegen in den Streckmuskeln selbst, d. h. nach der von Lund angegebenen Stelle im dicken Strecker des Vorarms

(Caput longum M. triceps brachii, M. anconaeus longus), so würde ich die alte Fistel durch einen Schnitt außen durch das Muskelgewebe, der mit der Schnittrichtung durch eine in die Fistel eingeführte Sonde geleitet wird, spalten und die Blutung aus größeren Gefäßen würde ich allmählich stillen. Ich würde so weit spalten, daß ich mit einer Kornzange den Fremdkörper gut fassen und extrahieren könnte, oder ich würde es mit einem scharfen Löffel ausführen. Schließlich würde ich vom Grunde der Fistel eine Gegenöffnung anlegen. Entweder würde ich dazu einen Drainierungsstroker (siehe das vorerwähnte Haandbog II. Deel S. 22) benutzen oder ich würde von außen durch einen Hautschnitt eine geschlossene Kornzange hinein bis zum Fistelkanal führen und dann die Zange mit offenem Schenkel herausziehen, so daß für den Drain Platz werden könnte. Ich habe früher große Schnitte ganz durch die genannten Muskeln gelegt, ohne daß dadurch ein Schaden entstanden wäre (siehe z. B. das erwähnte Haandbog Seite 479).

Man wird über die beiden erwähnten Eingriffe sich leicht orientieren können, wenn man Tafel I in dem 2. Teil des erwähnten Handbuchs betrachtet.

Lund erzählt in seinem Briefe von einem anderen Pferde, bei dem ein Stück Holz tief in einer langen Wundhöhle saß, wo sich aber doch keine Fistel bildete, da es ihm gelang, den Fremdkörper zu entfernen.

Es war eine verkohlte Holzstange, die vorn am Vorarm des Pferdes eingedrungen war, und zwar ganz hinauf zum oberen hinteren Winkel des Schulterblattes. Als der Besitzer versuchte, die Stange herauszuziehen, brach sie, so daß die Hälfte sitzen blieb. Lund entfernte den größten Teil des zurückgebliebenen Stückes durch einen Schnitt über dem oberen Teil des Wundkanales, konnte aber darauf, wobei er den Irrigatorschlauch als Sonde benutzte, fühlen, daß weiter unten im Kanal noch ein Stück lag. Es gelang ihm, dies mit dem Irrigatorschlauch so weit nach unten zu schieben, daß es durch die untere Öffnung (Eingangsöffnung) entfernt werden konnte.

4. Fisteln am Vorderknie bei einem Pferde, die durch Abszesse ohne besondere Komplikationen verursacht wurden.

Am 2. Juni 1925 wurde in die Klinik ein zweijähriges Fohlen eingestellt, das wegen ein paar Fisteln und der Überbleibsel einer Phlegmone um das Vorderknie behandelt werden sollte. Ein Vorbericht über das Fohlen konnte nicht erlangt werden. Es fand sich um das Vorderknie eine beträchtliche, ziemlich feste, nur wenig empfindliche Geschwulst mit einer kleineren geschwollenen Partie, die wie eine Einschnürung mitten über ihr lag. Gerade oberhalb des Vorderknies an der oberen Grenze der Geschwulst fand sich eine ganz kleine (1 cm lang, 3—4 mm breit) Fistelmündung, aus der ein kurzer Kanal in eine kleine Abszeßhöhle führte. An der unteren Grenze des Vorderknies fand sich eine andere, etwas größere Fistelmündung, die in eine flache, einige Zentimeter große Abszeßhöhle führte. Ein Fremdkörper oder nekrotisches Gewebe konnte nicht nachgewiesen werden, auch kein bloßgelegtes Knochengewebe war zu finden. Ebenso wenig konnte man eine Verbindung zwischen den beiden Fistelmündungen nachweisen. Die Fisteln wurden gespalten und die Abszeßhöhlen wurden ausgekratzt. Darauf wurden warme Seifenbäder und antiseptische Umschläge angewendet. 14 Tage nach diesem kleinen Eingriff waren die Fisteln geheilt, und die Geschwulst hatte etwas abgenommen. Es wurde dann eine scharfe Salbe über die ganze Geschwulst appliziert. Das Fohlen wurde nach Hause geschickt, damit es auf die Weide kommen konnte.

5. Fistel am Vorderknie bei einem Fohlen, die durch Caries in einem der Vorderfußwurzelknochen unterhalten wurde.

Vor einigen Jahren operierte ich beim Tierarzt Wamberg in Slagelse ein Fohlen, das infolge einer Wunde am Vorderknie eine Fistel und eine sehr bedeutende fibröse Verdickung, welche die ganze Vorderfläche des Vorderknies bedeckte, bekommen hatte. Die Fistel führte in den mittelsten der flachen Knochen in der untersten Reihe der Vorderfußwurzelknochen (Kopfbein, os carpal-

tertium). In diesem befand sich eine verhältnismäßig große Höhle mit karierten Wänden. Das Gelenk war nicht offen. Das Fohlen stützte gut auf dem Bein. Ich legte einen Längsschnitt mitten unten über dem Vorderknie und präparierte an den Seiten die Haut ab. Darauf exstirpierte ich mit dem Messer alles neugebildete fibröse Gewebe. Die Höhle im Knochen wurde mit dem scharfen Löffel ausgekratzt. Die große Hautwunde wurde vernäht, und ein Verband wurde angelegt. Es trat Heilung ein, das Vorderknie sah sauber aus, und das Gelenk war frei beweglich.

B a b.

K a j t á r, M.: Beiträge zum Kastrationsverfahren nach Hetzel. (Közlemények az összehasonlító élet-és kortan köréből. 1926. XX. S. 132. (In.-Dissert.))

Das Verfahren nach Hetzel, wobei der Samenstrang mit einer Aluminiumklemme komprimiert, darauf der Hoden abgetrennt, die Wunde genäht und mit einem gut klebenden Stoff überzogen wird, hat sich am besten bewährt beim Kastrieren von Stieren und Ebern. In 87 Prozent der so kastrierten Stiere heilte die Kastrationswunde per primam durchschnittlich in elf Tagen. Bei Ebern wurde in 86 Prozent der Tiere eine solche Heilung verzeichnet. Weniger gut eignet sich das Verfahren zur Kastration von Hengsten, da von 23 Hengsten nur bei zwei Tieren eine Heilung per primam zu erreichen war, während bei den übrigen Tieren die Heilung per sekundam eintrat und zwar bei sieben Tieren ohne Nachbehandlung in 10—12 Tagen, bei vierzehn Tieren mit Nachbehandlung erst in 17—48 Tagen. Das Nähen der Kastrationswunde bei Hengsten erwies sich als unzweckmäßig. Die Aluminiumklemme wird später von einer bindegewebigen Hülle umschlossen.

M a r e k.

G r a f, H. und K r u m h o l z, B.: Über den Einfluß verschiedener Muzilaginosa auf die korneale Anästhesie, besonders des Tutokains. (Schweiz. Arch. f. Tierheilkde. 1926, 68, S. 535.)

Wie beim Kokain und Novokain die Wirkung an der Kaninchenkornea durch gleichzeitig instillierte tierische Kolloide bedeutend verstärkt wird, so findet man gleichen Einfluß dieser Stoffe auf die Tutokainwirkung. (Serum vom Pferd, Hund, Kaninchen, Hühnereiweiß); pflanzliche serovisköse Schleime (Amyl. Oryzae, Amyl. Tritici, Rad. Althaeae, Fol. Malvae, Sem. Lini, Corrojeen, Trajanth) wirken mit Ausnahme der beiden letztern schwächend auf die Wirkung. Über die möglichen Ursachen werden einige Bemerkungen angeknüpft.

Autoreferat.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

K r i j g s m a n, B. J.: Das Sichöffnen der Kokzidienoozysten im Darm des Säugetiers. (Aus dem Laboratorium für tropische Krankheiten, Abteilung des Instituts für parasitäre und infektiöse Krankheiten der Reichsuniversität Utrecht. Direktor: Prof. Dr. De Blieck.) (Sonderdruck aus Ned. Tijdschrift v. Hygiene, Microbiologie en Serologie. Uitgave van S. C. van Doesburgh, Leiden. S. 180.)

Werden sporulierte Oozysten von einem Tiere per os aufgenommen, so wird im Duodenum die Zystenmembran angegriffen, und die Sporozoitien werden frei. Der Verf. suchte nun festzustellen, welches die Ursachen hierfür sind. Er sammelte nichtsporulierte Kokzidienoozysten aus den Faeces von Kaninchen, die an Kokzidiose litten, zerrieb die Faeces mit einer geringen Menge gesättigter Kochsalzlösung in einem Mörser zu einem dünnen Brei, filtrierte sie durch ein feines Sieb, um die groben Teile zu entfernen, brachte das Filtrat mit den Zysten in einen Erlenmeyer von 100 ccm, füllte mit gesättigter Kochsalzlösung an und ließ das Ganze eine Stunde ruhig stehen. In dieser Zeit sanken die Faeces zu Boden, die Oozysten kamen nach oben und wurden mit einer Pipette aufgesogen. Für Versuche mit sporulierten Oozysten wurden die Faeces mit den Zysten auf feuchtes Filtrierpapier ausgestrichen und bei 22 Grad feucht gehalten. Nach etwa 10 Tagen waren

die meisten Zysten sporuliert und wurden nach der Kochsalzmethode gesammelt. Für Infektionszwecke ist diese nicht geeignet. Dazu benutzt man die Glycerinmethode. Dabei werden die Faeces mit sporulierten Zysten mit Glycerin (spez. Gewicht 1,25) und Wasser gemischt, die Mischung wird eine Viertelstunde lang kräftig zentrifugiert, $\frac{3}{4}$ der obersten Flüssigkeit wird vorsichtig abgesogen, und das Röhrchen wird mit reinem Glycerin gefüllt. Hat sich das Sediment losgemacht und ist kräftig geschüttelt worden, so wird das Ganze abermals eine Viertelstunde zentrifugiert. Die Faecesteile sinken zu Boden, die Zysten schwimmen weiter. Die oberste Flüssigkeitsschicht kann für die Infektion benutzt werden. Zur Untersuchung werden den verwendeten Pepsinlösungen $\frac{1}{2}$ Prozent Salzsäure zugesetzt, die Pankreaspräparate wurden mit Natriumkarbonat schwach alkalisch gemacht. Die zu untersuchenden Zysten kamen in einem hängenden Tropfen mit der gewünschten Flüssigkeit in die feuchte Kammer unmittelbar unter das Mikroskop. Dieses wurde dann in den heizbaren Mikroskopkasten bei einer konstanten Temperatur von 37 Grad C aufgestellt. Ein Kompressium darf nicht verwendet werden. Es veranlaßt leicht ein Platzen der angegriffenen Oozysten.

Bei seinen Versuchen wusch der Verfasser zunächst die nach der Kochsalzmethode gesammelten Zysten mit destilliertem Wasser gründlich aus und brachte sie dann bei 37 Grad C unter das Mikroskop in Pepsin. Dieser Versuch wurde sieben Mal wiederholt. Jedesmal wurde nach 1, 2, 3, 6, 8, 10 und 24 Stunden kontrolliert. Wie sich dabei ergab, übt die Pepsinsalzsäure nach langer Einwirkung eine schwache Wirkung aus, doch kommen die Sporozysten niemals aus der Oozystenmembran frei. Weitere Versuche wurden angestellt, um festzustellen, ob diese Veränderungen durch die Salzsäure oder durch das Pepsin hervorgerufen werden. Dabei ergab sich, daß die Salzsäure die Oozystenmembranen etwas verändern, hauptsächlich eine Schwellung verursachen, das Pepsin nach langer Einwirkung eine wahrnehmbare Veränderung der Zystenmembran hervorrufen kann.

Ferner wurde untersucht, wie sich die Zystenmembran in den erwähnten Pankreaspräparaten oder in frischem Duodenalsaft verhielt. Es stellte sich heraus, daß Trypsin für sich selbst auf die Oozysten verdauend wirken kann, so daß nach 8—10 Stunden die Sporozysten aus der Zystenmembran freikommen können. Der Austritt der Sporozysten in den Darmkanal des Wirtstieres ist demnach die Folge der auf einanderfolgenden Wirkung der Magen und Darmenzyme auf die Zystenmembran. Diese Enzyme greifen aber nur vollständig sporulierte Zysten, niemals die eben im Darmkanal gebildeten Oozysten an, die Zystenmembran muß sich demnach während der Sporulation so verändern, daß sie von proteolytischen Enzymen angegriffen werden kann.

Bass.

Buzna, D.: Nachweis von Distomeneiern durch Anreicherung mit 50prozentigem Glycerin. Allatorvosi Lapok. 1927, S. 233.)

Als ein einfaches, billiges und rasch zum Ziele führendes Anreicherungsverfahren beim Nachweis von Leberegelern im Kote wird folgendes Verfahren angegeben. Man bringt etwa 1—3 Gramm Kot in ein einfaches Reagenzglas, setzt dann die gleiche Menge von 50prozentigem Glycerin (nach dem Augenmaß bestimmt) hinzu und zerreibt darin die Kotprobe mit einem Holz- oder Glasstabe. Hierauf folgt das Zentrifugieren 4—5 Minuten lang in einer Zentrifuge mit 1500—2000 Umdrehungen in der Minute. Dann entnimmt man mit Hilfe eines Glas- oder Holzstabes drei Tropfen von der obersten Schicht der Flüssigkeit, wo sich die leichteren Leberegeleier angesammelt haben, bringt sie auf einen Objektträger und überdeckt sie mit einem Deckglas, worauf das ganze Präparat besichtigt wird. Die

Distomeneier verlieren zwar während des Zentrifugierens ihre grünlichgelbe Farbe und werden durchscheinend, sie behalten aber ihre Form und körnige Struktur, die ihre Identifizierung gestatten. Mit diesem Verfahren ist es gelungen, 10—20—30 Leberegeleier auch in solchen Kotproben nachzuweisen, wo das Umrührverfahren nach Pataki erfolglos war.

Marek.

Münich, J., Praktische Erfahrungen mit der Leberegelbekämpfung in Bayern. (B. T. W. 1927, S. 554.)

Bayern war in den letzten Jahren von der Leberegel-
feuche stark heimgefucht. Nach Lang sind 1924/25 in diesem Lande 17—18 000 Rinder, 55—66 000 Schafe und 2500 Ziegen an der Krankheit gefallen. Die besten Erfahrungen mit der Behandlung erkrankter Tiere hatte Verfasser bei Anwendung des seit Dezember 1926 im Verkehr befindlichen von einer Fabrik in Aubing hergestellten Präparates „Neoserapis“ zu verzeichnen. Es konnten auf diese Weise 6122 Rinder in 1040 Stallungen geheilt werden. Das Mittel wurde hauptsächlich in flüssiger Form angewandt, da Pillen von den Landwirten nicht gerne eingegeben werden. Anfangs trat nach Verabreichung von Neoserapis ein rauch-ähnlicher Zustand ein, der nach einigen Stunden ohne Schädigung verschwunden war. Seit das Präparat mit 1—4 Liter kalten steifen Mehltranks gut vermischt eingegeben wird, sind derartige Zustände zur Seltenheit geworden. Die Behandlung wirkt besonders günstig auf die Milchproduktion ein, die sich rasch steigert. Außerdem hebt sich der Ernährungszustand. Ungünstige Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet, namentlich trugen alle derartig behandelten Kühe normal aus. Durch Kotuntersuchungen konnte Verf. sich in vielen Fällen überzeugen, daß keine Leberegeleier mehr im Kote vorhanden waren. Von Vorteil ist auch, daß der Preis des Neoserapis nur die Hälfte von dem der anderen Mittel beträgt. Aus diesen Gründen kann Verf. die Anwendung des Mittels zu dem vorliegenden Zweck aufs beste empfehlen.

Carl.

Höppli, R. und H. Vogel: Über Hautreaktionen auf Askarisextrakte. (Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hygiene. 1926, 31, S. 477.)

Alkohol- und Ätherextrakte der Askaristrockensubstanz erwiesen sich bei Kutanimpfung als nur schwach wirksam, stärker waren die Hautreaktionen auf wässrige Extrakte, am stärksten die auf unbearbeitete Askaristrockensubstanz, und fast eben so stark die auf Trockensubstanz, die einer Extraktion mit Wasser, Alkohol und Äther unterzogen worden war. Der fragliche Askarisreizkörper ist demnach nur zum kleinsten Teil durch die drei Lösungsmittel extrahierbar. Eine Filtration durch Ultrafilter machte die alkoholischen und wässrigen Extrakte bezüglich der Hautreaktion wirkungslos. Es scheint sich daher bei den Reizstoffen um hochmolekuläre Körper oder an solche gebundene Stoffe zu handeln. Eine passive Überschätzung der Überempfindlichkeit gegenüber Askarisextrakten konnte mittels Einspritzung von Serum oder Blut einer stark überempfindlichen Person auf eine wenig empfindliche nicht erzielt werden. Bei mehrfachen Impfungen zu verschiedenen Zeiten nahm die Reaktionsstärke derselben Versuchsperson allmählich zu. Eine lokale Eosinophilie in der unmittelbaren Umgebung der mit Askarisextrakt besickten Impfschnitte gegenüber der Bluteosinophilie ließ sich am Menschen nicht nachweisen; doch wurden die Auszählungen nur bei einer einzigen Versuchsperson vorgenommen. Unter die Haut gebrachte Askarisubstanzen bewirkten bei Meerfischweinen, nicht aber bei Ratten, eine lokale Gewebeeosinophilie.

Wetzel.

Petrow, A. M. und B. M. Gurwitsch: Die Oxydase-reaktion in den Rotzknötchen bei Pferden. (Aus dem Kabinett für Fleischkunde des Charkower Veterinär-Institutes, Prof. Dr. Petrow, und dem Militärveterinärbakteriologischen Laboratorium Nr. 1, Uv. O.). (Zeitschr. f. Infekt.-Krankheiten d. Haust. 1927, 31, H. 4, S. 290.)

In vorliegender Abhandlung beschränken sich die Verfasser darauf, einerseits die Existenz eines besonderen physiko-chemischen oxydativen Systems bei der Rotzerkrankung des Pferdes nachzuweisen, das unter dem Namen der „Oxydase“ bekannt ist, andererseits aber der Lösung der Frage über die extramedulläre Herkunft der myeloiden Zellformen bei Rotz und Rotzgranulomen näherzukommen. Auf Grund der Ergebnisse an 15 rotzkranken Pferden halten sich die Verfasser für berechtigt zu sagen, daß bei der Rotzerkrankung der Pferde eine lokale extramedulläre Hämpoese stattfindet. Die Lagerung der Myeloidformen den Gefäßen entlang, das Auseinanderdrängen der Adventitiafalten durch dieselben, ihre Anhäufung im Lumen der Sinus und der Kapillaren, dies alles spricht deutlich für eine bei Rotz wie bei Infektionskrankheiten überhaupt mögliche extramedulläre Hämpoese, die auf Kosten des Retikulo-Endothelialsystems und infolge der Veränderung des Milieus auftritt, welch letztere eine Reizung des ganzen Systems nebst Veränderung seiner Funktionen im Gefolge hat. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sprechen dafür, daß man sich beim Studium der pathologisch-anatomischen und histologischen Veränderungen beim rotzkranken Organismus nicht mit der morphologischen Analyse der Rotzgranulome begnügen darf, sondern daß auch eine physiko-chemische Untersuchung der Störungen erforderlich ist, die sich bei der Rotzerkrankung des Organismus in seinen Funktionen offenbaren, und als deren Symptom das Rotzgranulom auftritt.

Ziegler.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Lourens, L. F. D. E.: Does the flesh of animals suspected to be infected by foot-and-mouth disease form a source of danger for the spreading of virus? (Bildet das Fleisch von maul- und klauenfeucheverdächtigen Tieren eine Gefahrquelle für die Verbreitung des Virus?) (Netherlands state serum inst. Rotterdam.) (Veterin. record. 1926, Bd. 6, S. 995.)

Defibriertes Blut und Fleischsaft wurde von Schweinen entnommen, die teils spontan an Maul- und Klauenfeuche erkrankt, teils einer künstlichen Infektion unterzogen waren. Nach ihrer Schlachtung wurde das Material empfänglichen Schweinen kutan injiziert, virusverdächtiges Fleisch und Knochenmark an gesunde Tiere verfüttert und in vitro die virusvernichtende Eigenschaft des Fleischsaftes untersucht. Die Übertragungsmöglichkeit wurde nur bei einem Schweine deutlich, das an einer Vorderklaue Blasenbildung gezeigt hatte. Von diesem Tiere wurde Fleischsaft zwei Stunden, 24 Stunden und 48 Stunden nach der Schlachtung verimpft. Die Erhaltung der Ansteckungsfähigkeit des Virus im Impfmateriel ließ sich wohl noch für den ersten und zweiten Impftermin, aber nicht mehr für den dritten feststellen. Von demselben Tiere zeigte ein Extrakt aus Knochenmark, 72 Stunden nach der Schlachtung verfüttert und intravenös verimpft, volle Infektiosität, Muskulatur jedoch vermochte nach 24 und 48 Stunden verfüttert keine Infektionsercheinung mehr auszulösen. In vitro kommt das Virus durch Fleischsaft im Laufe von 24 Stunden zur Vernichtung. Schlögel hat Muskulatur infizierter Meerschweinchen verfüttert und den Zeitraum der Ansteckungsfähigkeit auf 18 Stunden nach der Tötung bemessen. Lourens schließt sich auf Grund seiner Beobachtungen denen Schlögels an und erachtet es für gegeben, daß virushaltiges Fleisch durch die Einwirkung der Milchsäure in einem Zeitraum von höchstens 48 Stunden nach der Schlachtung virusfrei wird. Der Verf. ist damit in der Lage, die in dem Titel seiner Arbeit gestellte Frage, verneinend zu beantworten.

H.

Levaditi, C., R. A. Alberta-Lorente et I. Galloway: Histogénese et évolution des vésicopustules

aphteuse chez le cobaye. (Histogenese und Entwicklung der Maul- und Klauenfeuchepusthen beim Meerschweinchen.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. 1926, Bd. 95, S. 387.)

Neurotropismus ist der rein ektodermotischen Maul- und Klauenfeuche (Epitheliose) bislang nicht nachgewiesen. Die pathologischen Gewebsveränderungen auf der Zunge des Meerschweinchens beschränken sich bei allgemeiner Blasenbildung lediglich auf das Epithel. Die histologische Untersuchung ergibt: Karyopyknose, oxychromatophile Degeneration des Kerns, granuläre Entartung des Zytoplasmas, Entstehung von Zwischenräumen zwischen den Zellen des Stratum lucidum unter Zusammenballung der interepithelialen Fibrillen, Koagulationsnekrose der Epithelzellen und Einwanderung polynukleärer Leukozyten. In der Subcutis spielen sich gleichzeitig Entzündungsvorgänge reaktiver Art ab. Man nimmt an, daß das interzelluläre, fibrilläre System von der Lokalisation der Aphthen aus den Schutz gegen Reinfektion über die Hautoberfläche weiterleitet und ausdehnt.

H.

Levaditi, C., S. Nicolau et I. A. Galloway: Les affinités tissulaires du virus aphteux. (Der Organotropismus des Maul- und Klauenfeuche-Virus.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. 1926, Bd. 95, S. 1230.)

In Zwischenräumen von 24 Stunden kamen innerhalb 5 Tagen nach Intizierung mit Aphthendeckenemulsion acht Meerschweinchen zur Sektion, um an ihnen das Vorhandensein des Virus in den Organen auch bezüglich der zeitlichen Verhältnisse zu prüfen. Die Sohlenfläche der Meerschweinchen wurde mit diesen Organen intrakutan infiziert und danach festgestellt, daß das Zungenepithel von der 24. Stunde bis zum fünften Tage p. i., das Sohlenflächenepithel vom 2.—5. Tage p. i., Hirn, Lungen, Leber, Milz und Nierenkapitel 2—3 Tage p. i. virushaltig und ansteckungsfähig waren. Nur in den Nieren selbst und in den Geschlechtsdrüsen (Testikeln und Ovarien) wurde das Maul- und Klauenfeuche-Virus ganz im Gegensatz zum Neurovaccinevirus niemals nachgewiesen. Demnach ist im Stadium der Inkubation die Maul- und Klauenfeuche eine Ecto-Mesodermose und nach Austritt des Virus aus Blut und inneren Organen, was sich stets nach allgemeiner Blasenbildung vollzieht, eine reine Ektodermose.

H.

Lebailly, Ch.: Réapparition des foyers de fièvre aphteuse et conservation du virus dans la nature. (Die Entstehung von Seuchenherden und die Konservierung des Maul- und Klauenfeuche-Virus in der Natur.) (Journ. de méd. vétérin. et de zootechn. 1926, Bd. 72, S. 427.)

Die in großem Umfange von Loeffler durchgeführte Untersuchung über die Dauerauscheidung von Maul- und Klauenfeuche-Virus hat den Verf. zur Nachprüfung angeregt. Auf mehrere Bestände verteilte er insgesamt 62 Rinder, nachdem ihre Durchfeuchtung infolge künstlicher Infektion abgeschlossen war. Auch die Haltbarkeit des Virus im Klauenschuh hält der Verf. nicht für zutreffend, da in keinem der zu den Versuchen herangezogenen Bestände Maul- und Klauenfeuche zum Ausbruch kam.

H.

Cotton, W. E.: Vesicular stomatitis in its relation to the diagnosis of foot-and-mouth disease. (Exp. stat. U. S. bureau of anim. industry, Bethesda Md.) (Journ. of the Americ. vet. med. assoc. 1926, Bd. 69, S. 313.)

Im Staate Indiana kam die Stomatitis vesicularis spontan zum Ausbruch. Diese Gelegenheit verwandte Cotton zur Anstellung experimenteller Arbeiten und Vergleiche mit der Maul- und Klauenfeuche. Es gelang ihm, Pferde und Meerschweinchen mit der Stomatitis vesicularis vom Rinde aus zu infizieren. Da jedoch nach plantarer Cutaninfektion beim Meerschweinchen im weiteren Ablauf der Stomatitis vesicularis und der künstlich hervorgerufenen Maul- und Klauenfeuche volle Übereinstimmung besteht, so wird das Meerschweinchen zur Herbeiführung der Differential-

diagnose keine Verwendung finden können. Dafür kommt vielmehr das Pferd in Frage, das sich fast stets als gegen Maul- und Klauenfeuche geschützt erwiesen hat, andererseits aber nach Zungeninfizierung an Stomatitis vesicularis sicher erkrankt. Kontagiosität der Stomatitis vesicularis wurde nur im Beginn der Erkrankung gefunden. Über den Aufenthalt des Erregers im Tierkörper wird mitgeteilt, daß er 24 Stunden nach der kutanen Infektion im Blute nachzuweisen, nach Bildung der Generalisationsaphthen aber daraus verschwunden ist. Ein schnelles Zugrundegehen des Virus außerhalb des Tierkörpers wird angenommen. Der Schutz gegen Neuerkrankung währt im allgemeinen, abgesehen von individuellen Schwankungen, mehrere Jahre. Eine Passagierung des Erregers über mehr als zwei Generationen konnte im Meerfweinchen nicht erreicht werden, wie auch künstliche Zuchtversuche negativ ausgefallen sind. Filtrierbarkeitsversuche sind noch nicht abgeschlossen. — Die grundlegenden Veröffentlichungen von Waldmann und Pape über die Eignung des Meerfweinchens zur experimentellen Bearbeitung und Erforschung der Maul- und Klauenfeuche werden in vorliegender Arbeit ohne Einschränkung anerkannt. H.

Vallée, H., H. Carré und P. Rinjard: Sur l'immunisation antiaphteuse par le virus formolé. (Immunsifizierung gegen Maul- und Klauenfeuche mit Formol-Virus.) (Rev. gen. de med. vétérin. 1926, Bd. 35, S. 129.)

Zur Immunisierung von 17 undurchseuchten Rindern wurde ein Impfstoff benutzt, der durch Formol abgeschwächtes Maul- und Klauenfeuchevirus enthielt. Zur Erzielung der immunisierenden Wirkung kamen nur größere Mengen des Impfstoffes (10 ccm) zur Anwendung. Damit wurden zwei Rinder gegen den Virusstamm „O“ und fünf Rinder gegen den Stamm „A“ immunisiert. Die Reinfektion wurde jedes Mal mit dem gleichartigen, vollinfektösen Stamm bei der ersten Versuchsgruppe nach 31 Tagen und bei der zweiten Gruppe nach 26 Tagen vorgenommen, ohne jedoch Reaktionsercheinungen auslösen zu können. Diese Immunisierungsexperimente erwiesen sich dadurch als gelungen. Mit den in der angegebenen Weise vorbehandelten Virusstämmen „A“ und „O“ wurden die antigenen Eigenschaften des Impfstoffes an sechs Rindern nach subkutaner und an vier Rindern nach intrakutaner gleichzeitiger Applikation erprobt mit dem Ergebnis, daß von den sechs Tieren eins und von den vier Tieren drei auf die 26 bzw. 38 Tage später allein mit dem Stamm „O“ vorgenommene Reinfektion positiv reagierten und erkrankten. Diese zehn Versuchstiere wurden dann 48 Tage nach der erfolgten Immunisierung mit dem Virus „A“ nachinfiziert und als vollkommen geschützt gegen Stamm „A“ befunden. — Die in derselben Weise am Meerfweinchen angesetzten Immunisierungsversuche gelangen den Verfassern nicht, wonach sie zu dem recht gewagten und unbewiesenen Schluß kommen, das Meerfweinchen als Versuchstier zur Erforschung der Maul- und Klauenfeuche abzulehnen. H.

Lebailly, Ch.: Expériences concernant de virus aphteux. (Unterfuchungen über das Maul- und Klauenfeuche-Virus.) (Cpt. rend. hebdom. des séances l'acad. des sciences. 1926, Bd. 183, S. 578.)

Versuche, die L. in Calvados vornahm, brachten den Nachweis von der Dualität der Maul- und Klauenfeuche-Stämme. Den gegen den Vallée'schen Stamm O nicht immunisierenden Stamm A (nach Vallée) fand L. dort viermal. Die Forschungsergebnisse der Deutschen und Engländer bestehen zu Recht, da auch dem Verf. die Übertragung des Virusstammes A und O auf Meerfweinchen gelang. Abgesehen von einer Erhaltung des Virus auf die Dauer von 3—6 Tagen bei 18—37 Grad, konnte L. das Virus kulturell nicht züchten. Die Frage der Überlebung des Virus im Klauenschuh wird nach negativem Ausfall einer Verimpfung entsprechenden Hornmaterials auf drei Testrinder als un-

wahrscheinlich beantwortet. Bei 15—20 Grad erhält gefrorenes Rinderblut, das das Virus enthält, nach Zitratzusatz 13 Monate und ebenso behandeltes Meerfweinchenblut kaum 1 Monat lang seine Ansteckungsfähigkeit. H.

Kling, C. et A. Höjer: Recherches sur le mode de propagation de la fièvre aphteuse. Géographie et topographie des épizooties en Suède. (Laborat. bactériol. de l'état, Stockholm.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. 1926, Bd. 94, S. 615.)

Durch den Fremdenverkehr der Städte Helsingborg und Malmö wurden 29 bei 33 Seuchenausbrüchen verurlicht. Auf diese Weise soll auch von Helsingborg aus die Maul- und Klauenfeuche auf die Entfernung von 300 km auf je ein Gehöft der Insel Aaland und der Provinz Halland verschleppt sein. Nach den angestellten Beobachtungen und Untersuchungen ist der Mensch der eigentliche Überträger, während der Wind und auch eingeführtes Futter nicht an der Seuchenübertragung beteiligt sind. Überraschend plötzlich hier und da aufflammende Ausbrüche waren durch die Seuchenvermittlung der Molkereien entstanden. Nur drei Seuchenausbrüche kamen auf die Vieheinfuhr. H.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Flückiger, G.: Über das Wesen der Tuberkulinreaktion. (Schweiz. Arch. f. Tierhklde. 1927, Bd. 69, S. 183—198.)

Nach neuerer Ansicht ist das Tuberkulin ein Tbc-Bazillenprotein (aus der Gruppe der Polypeptide). Die verschiedenen Präparate enthalten alle die nämliche Substanz, die nur quantitativ verschieden ist, wobei man bei der Herstellung neuerer immer danach strebt, den wirksamen Teil herauszufächeln. Auch ist die Ansprechbarkeit des Gewebes verschieden. Das Tbc-Toxin ist kein Exotoxin, kann vielleicht auch ein fermentativ entstandenes Produkt der Bazillenmasse sein. Nach v. Waffermann beruht die spezifische Tuberkulinreaktion des kranken Gewebes darauf, daß das Tuberkulin aus dem Blute in das Gewebe durch den im Tuberkel enthaltenen Antikörper hineingezogen wird, mit Leukozyten als Komplementträger. Nach Wolff-Eisner handelt es sich um eine Wirkung, wie sie allgemein bei körperfremdem Einweiß eintritt. Bekannt ist die besondere Empfindlichkeit tuberkulöser Organismen gegen Tuberkulin. Nach Wolff-Eisner ist die Ursache folgendermaßen zu erklären. Das Tuberkulin wird im Organismus abgebaut durch Antikörper, dabei entstehen Zwischenstufen besonders giftiger Art. Der zur Auflösung des Tuberkulinabbaues entstehende Stoff ist der Tuberkulamozeptor, das giftige Zwischenprodukt „lysiertes Tuberkulin“ (Wolff-Eisner), Tuberkulopyrin (Sahli). Dieses ist das eigentliche tuberkulöse Gift. Das zum Abbau zu Tuberkulopyrin notwendige Lylin entsteht nur im tuberkulösen Organismus, nicht im gesunden. Daher kommt die Tuberkulopyrinwirkung und die Reaktion nur am kranken Organismus vor. Das T-Pyrin wird durch spezifisches Antitoxin oder Fermente entgiftet. Die Hautwirkung kommt zustande durch Reizwirkung des T-Pyrins, wobei sich beim Anhalten des Reizes die Symptome der Entzündung entwickeln. Durch Überdösieren werden die Abwehrkräfte des Körpers erschöpft, so daß die nicht entgifteten T-Pyrinmengen ihre Wirkung voll entfalten können. Daher erhält man bei forcierter Tuberkulin-diagnostik Verschlechterung des Allgemeinzustandes auch bei Rindern. — Der negative Ausfall der Tuberkulinprobe läßt nicht auf absolute Tbc-Freiheit schließen, oder aber kann ein positiver Ausschlag kommen, wo klinisch noch keine tuberkulöse Erkrankung vorliegt, drittens sagt der positive Ausfall nichts über den Sitz und Grad der Krankheit aus. Die ersten Punkte hängen ab von dem Grad der Lylin-Mobilisation. Wo daher bereits fest abgekapselte Tbc-Herde vorliegen, soll man der Generalisierungs- und

Reaktivierungsfahr wegen, nicht diagnostisch tuberkulifizieren. — Im übrigen sei auf das Original und das Werk von H. Sahli: Über die Tuberkulinbehandlung. Benno Schwabe, Basel, verwiesen. H. G.

Hodex, F. und K. Suzuki: Vergleichende Untersuchungen natürlich vorkommender und künstlich erzeugter paratyphusähnlicher Stämme. (Zeitschr. für Immunitätsforsch. 1927, Bd. 52, S. 420.)

Zahlreiche Stämme, die man jederzeit aus Wässern, Urinen und dergleichen züchten kann, stehen kulturell und serologisch der Paratyphusgruppe sehr nahe, ohne sich indes vollkommen mit einem oder dem anderen Vertreter der letzteren identifizieren zu lassen. Es handelt sich dabei um Keime, die wohl in der Mehrzahl als apathogen gelten können, aber unter Umständen eine hohe Pathogenität zeigen und mitunter zu schweren Erkrankungen des Darmtrakts, der Blase und anderer Organe führen können. Rezeptorengemeinschaft mit echten Paratyphen ist weitgehend vorhanden. Einzelne Stämme sehen wie mutierte Paratyphen aus, andere stehen deutlich mit Coli in Verbindung.

Ganz ähnliche Keime lassen sich aus Bact. coli commune durch Bakteriophagenwirkung erzeugen. Sie sind weniger stabil als die natürlichen Formen und neigen mehr zu Rückschlägen, sind aber zeitweise von den paratyphusähnlichen Bakterien nicht zu unterscheiden. Verff. konnten in zwei Fällen den Beweis führen, daß die paratyphusähnlichen Bakterien ebenfalls nur Mutationsformen von Coli commune darstellen und zwar das eine Mal bei einem pathogenen Keime, der eine Zystitis erregte und der Paratyphusgruppe sehr nahe stand, das andere Mal bei einem Wasserstamm.

Verff. betonen, daß man mit der Diagnose Paratyphus im Wasser sehr vorsichtig sein soll, denn die zahlreichen Befunde paratyphusähnlicher Bakterien in Wasserproben bedeuten in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht Paratyphus, sondern Coli, und zwar in veränderter Form. Die paratyphusähnlichen Keime, gleichgültig, ob pathogen oder apathogen, werden als Abkömmlinge resp. Mutationsformen des Bact. coli commune angesehen. Viele Keime, für die man neue Paratyphusgruppen schaffen zu müssen glaubte, gehören in diese Kategorie. Meyn.

Nahrungsmittelhygiene.

Tierärztliche Kontrolle des Seefischverkehrs.

An den beiden Haupteinfuhrhäfen für Seefische der Unterweser, Wefermünde und Bremerhaven, ist eine ständige tierärztliche Kontrolle dergestalt eingeführt worden, daß nunmehr alle zur Auktion oder für den Weiterverkauf angebrachten Fische vor dem Verkauf durch beamtete Tierärzte auf ihre Genußtauglichkeit untersucht und die Betriebe der Fischverandgeschäfte sowie der weiterverarbeitenden Fischindustrie mindestens einmal im Monat revidiert werden. Für den größten Hafen (Wefermünde) ist zu diesem Zwecke seitens des preußischen Landwirtschaftsministeriums ein Polizeitierarzt bestellt worden, der in Gemeinschaft mit dem zuständigen Veterinärat und mit Unterstützung von drei eigens zu diesem Zwecke überwiesenen Polizeibeamten die Kontrollen ausübt, während im benachbarten Bremerhaven der bremische Kreistierarzt mit einem Hilfspolizeibeamten in gleicher Weise tätig ist. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn auch an den anderen größeren Fischereihäfen (Altona, Hamburg, Cuxhaven, Emden usw.) in gleicher Weise vorgegangen würde, um auf diesem Wege zu erreichen, daß nur einwandfreie Ware in den Verkehr käme, wodurch fraglos zur Hebung des Fischkonsums im Deutschen Reiche bestens beigetragen würde. gez. Dr. Leyer, Bremerhaven.

Die Maßnahme einer ständigen tierärztlichen Kontrolle der Fischereihäfen ist sehr zu begrüßen und in erster Linie wohl den Anregungen des Veterinärat Dr. Schulze-Wefermünde zu verdanken, der sich schon Jahre lang und mit Erfolg um die Materie bemüht hat und auf dem Gebiete der Fischindustrie über große Erfahrungen verfügt. Dem Wunsche von Dr. Leyer, ähnliche Einrichtungen auch an anderen Fischereihäfen zu schaffen, kann man im Interesse einer ordnungsmäßigen Nahrungsmittelkunde nur beipflichten.

Neukonun, A.: Le contrôle bactériologique du lait par la Méthode de Skar. (Schweiz. Arch. f. Tierhkd. Bd. 69 S. 1—25.)

Zum qualitativen und quantitativen Nachweis unschädlicher und pathogener Mikroben in der Milch gibt es verschiedene Methoden. Die hier in Frage stehende, seit 1911 in den Untersuchungslaboratorien von Oslo gebräuchliche Methode, an die sich diejenige von Breed (in Amerika angewandte) anlehnt, ist folgende. Sie gründet sich auf die im mikroskopischen Gesichtsfelde sichtbare Milchmenge, die Skarsche Apparatur (Zeiß, Jena) gestattet dieselbe zu bestimmen und die darin befindlichen Bakterien zu zählen. Sie besteht in einem Objektträger, auf welchem eine Fläche von 500 mm² eingätzt ist und ein Okular, in welchem zwei ineinanderliegende verschiedene Quadrate (konzentrisch) und ein Kreis um beide sichtbar ist. Objektiv $\frac{1}{12}$ Öl Immersion. Einstellung mikrometrisch auf die Seite des größeren Quadrates = 50 Mikra. Fläche dieses Quadrates somit $\frac{1}{400}$ mm², das innere Quadrat und der Kreis haben die Fläche $\frac{1}{4000}$ bzw. $\frac{1}{40}$ mm². Nach der Einstellung bringt man auf die geätzte Fläche des Objektträgers $\frac{1}{50}$ cm³ Milch. Man berechnet dann die Keimzahl durch Multiplikation (Zahl der Keime = n). Sie ist pro Kubikzentimeter Milch n · 10 000 000. Beim Auftragen muß der Objektträger horizontal gehalten und vor Staub geschützt werden. Die Bakterien werden zweckmäßig gefärbt (Methylenblau-Alkohol 20% + 2% Kalilauge). Die Milch wird um das 25fache verdünnt. Die Quantität der Farblösung sowie die Verdünnung der Milch sind bei der Keimzählung in Rechnung zu setzen. 1 Bakterium im Kreis zeigt auf 1, im großen Quadrat auf 10 und im kleinen auf 100 Millionen pro cem Milch, bei Bruchteilen wird mit dem Nenner multipliziert. Man macht ca. 10—50 Proben. Die Technik ist also zusammengefaßt, z. B. folgende: 5 cem Milch + 0,18 cm³ Methylenblau, schütteln, dann 0,02 cem 30% KOH; von der gefärbten Milch 20 mm³ auf der Objektträgerfläche von 480 mm², läßt staubsicher trocknen. Untersuchung von bis 50 Proben. Glieder der Streptokokken sind zu zählen. Ungleichmäßig verteilte Milch wird nicht berücksichtigt. Berechnung der Keimzahl wie oben angegeben. Direkt bei der Entnahme (am Euter) wurden durchschnittlich 352 000 Keime gefunden. Interessant ist die Zunahme derselben beim Wechsel bis zum Konsum.

Z. B. (Zahlen in Millionen Durchschn. v. 100 Proben) am Euter max. 61, min. 0,9; filtriert: max. 57, min. 6; Ankunft im Kühlraum: max. 58,1; min. 0,9; Abgang aus dem Kühlraum: max.: 73; min. 1,2; Händler: max.: 74; min. 1,4; Konsument: max.: 81; min. 1,6. — Vom Morgen bis zum Mittag kann der Keimgehalt um das 7fache zunehmen. Daraus ergeben sich eine Reihe von Notwendigkeiten zur Gewinnung der Milch: Molkereischulen, Streuwechsel, Zitrenreinigung, Reinigung der Gefäße unter Dampf und Trocknen. Interessanten werden auf die Zahlenwerte des Originals verwiesen. H. Graf.

Schoedel, J.: Art und Umfang regelmäßigen Milchgenusses im Kindesalter. (M. med. W. 1927, S. 1367.)

Der Landesmilchaufsicht in Sachsen hatte beantragt, daß den Schulkindern als Schulfrühstück $\frac{1}{2}$ —1 Liter Frischmilch verabreicht werden solle. Die Schulärzte einer sächsischen

Stadt wehrten sich dagegen und führten ein Gutachten des Verfassers herbei, das in der vorliegenden Veröffentlichung wiedergegeben ist. Am Schlusse der letzteren präzisiert Verfasser den Standpunkt des Arztes gegenüber den neuzeitlichen Bestrebungen zur Hebung des Milchverzehr folgendermaßen:

1. Der Arzt erkennt Milch, im richtigen Ausmaß genossen, als einen gehaltvollen und gleichzeitig billigen Anteil unseres Nahrungsmittelbestandes an. Er unterstützt die Verbreitung der Milch als Volksgetränk.

2. Der Arzt muß, solange Rohmilch nicht hygienisch völlig einwandfrei auf den Markt gebracht werden kann, sich regelmäßiger Verwendung von Rohmilch, besonders im Kindesalter widersetzen.

3. Der Arzt hat darauf zu achten, daß durch übermäßigen Genuß entkeimter Milch, in täglich wiederkehrenden großen Mengen, keine Störung im Gesundheitszustand des Volkes entsteht.

4. Der Arzt hat vor allen Dingen den Säugling, das Kleinkind und das Schulkind vor übermäßigem Milchgenuß zu bewahren. Er hat aber auch im Sinne gesunder Wirtschaftlichkeit, besonders im Kreise Minderbemittelter, auf Verbrauch der zugestandenen Milchmenge zu drängen.

5. Der Arzt hat wärmstens die Milch den schulentlassenen Jugendlichen und Erwachsenen als tägliches Getränk und als Abwehrmittel gegen Alkoholmißbrauch zu empfehlen.

Carl.

Eickmann und Söntgen: Versuche über die Zuverlässigkeit der Dauererhitzung zur Abtötung von Tuberkelbazillen in der Milch. (Aus dem Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz in Bonn.) (T. R. 1927, S. 681.)

Die Versuche der Verfasser ergaben, daß eine 30 Minuten dauernde Erhitzung tuberkelbakterienhaltiger Milchmilch im Bergedorfer Vierzellendauererhitzer „Afra“ und im Ahlbornischen Vierzellendauererhitzer bei 63 Grad bis 65 Grad C ausreichend war, die Tuberkelbakterien abzutöten, sofern die Milch nicht stark durch Flocken, Klümpchen usw. verändert und die Schaumbildung nur sehr gering war. Trafen diese Voraussetzungen nicht zu, so wurde eine restlose Abtötung der Tuberkelbakterien nicht erreicht. Die gleichen Ergebnisse wurden erzielt im Hochzerstörer des Bergedorfer Eisenwerks bei Erhitzung auf 85 Grad C. Beide Methoden sind also einander mindestens gleichwertig. Die Gründe, die der Dauererhitzung bisher die Gleichberechtigung verlagten, sind also als hinfällig zu bezeichnen.

Geiger.

Standesangelegenheiten.

Ein unglaublicher Angriff der Apotheker auf unser Dispensierrecht.

Von Dr. Albién, Schönberg i. Holstein.

Am 28. Januar d. Js. strömten die Bauern Schleswig-Holsteins aus allen Dörfern in den Kreisstädten zusammen, um angesichts der immer katastrophaler werdenden Wirtschaftsnot der Öffentlichkeit in großen Kundgebungen ein wuchtiges, warnendes „Bis hierher und nicht weiter“ zuzurufen. Es wurden Entschlüsse als „Forderungen des Schleswig-Holsteinischen Landvolkes“ veröffentlicht.

Ein großer Teil der Presse brachte zur größten Überraschung der Tierärzte, die sich zum großen Teil auch an den Kundgebungen beteiligt hatten, als zehnte dieser Forderungen folgende: „Ablehnung des unkontrollierbaren, das gesamte Landvolk schädigenden Handels der Tierärzte mit Medikamenten. Der Tierarzt soll Arzt sein und nicht Händler. Wir wollen wie bisher, bewährte Tierarzneimittel, ohne an den Tierarzt gebunden zu sein, aus unseren Landapotheken beziehen können.“

Dieser Punkt 10 der Bauernkundgebung ist, wie es von vornherein zu vermuten war und wie es sich nachträglich auch herausgestellt hat, aus Apothekerkreisen in die Entschlüsse hineinlanziert worden. Er

gehört auch nicht zu den offiziellen Entschlüssen der Provinzleitung, ist vielmehr nachträglich durch Duplicierung einiger Unterführer hineingebracht. Anders wäre dieser Ausfall auf einen Beruf, der so eng mit der Landwirtschaft verbunden ist, daß er fast ein landwirtschaftlicher genannt werden könnte und der von allen Berufen naturgemäß am meisten durch die Not der Landwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen ist, auch unverständlich; unverständlich auch deshalb, weil alle landwirtschaftlichen Organisationen einschließlich der Landwirtschaftskammern bisher daran festgehalten haben, daß das Dispensierrecht der Tierärzte wegen der Eigenart der Tierbehandlung im landwirtschaftlichen Interesse liegt. Daß es sich um einen planvollen Vorstoß der Apotheker handelt, geht mit aller Deutlichkeit daraus hervor, daß unmittelbar nach der Kundgebung Flugblätter durch Apotheker an Landwirte verandt wurden, und zwar Flugblätter, in denen ähnliche Angriffe auf die Tierärzte gemacht werden, wie unter Ziffer 10 der Bauernkundgebung. Die Flugblätter sind anonym. Das macht die Kampart nicht sym pathischer:

Zum drohenden Monopol der Tierärzte!

Der Reichsveterinärrat, die oberste Vertretung der Tierärzte, hat sich im Sommer vorigen Jahres mit der Forderung an die Behörden gewandt, daß jedes Tiermedikament, es sei was es sei, in Zukunft nur von Tierärzten abgegeben werden solle.

Die Tierärzte haben bereits Fabriken aufgekauft und verordnen unsern Tieren fast ausschließlich Patentmittel dieser Fabriken, die rein ausschließlich nur an Tierärzte liefern dürfen. Wir werden also gezwungen, diese Mittel zu unkontrollierbaren Preisen von den Tierärzten zu kaufen.

Gelingt es nun den Tierärzten, das Programm des Reichsveterinär rates durchzusetzen, dann ist das Tierarzt-Monopol auf Kosten der Landbevölkerung fertig.

Der Tierarzt ist dann nicht mehr der Diener, sondern der absolute Herr des Tierhalters.

Die Gründe für dieses Vorgehen sind ebenso dürrig wie durchsichtig.

Denn niemand denkt daran, den Tierärzten die Berechtigung zu verwehren, Medikamente für Notfälle mitzuführen und abzugeben, wie es die Tierärzte in irreführender Weise behaupten in einer Eingabe an den Preussischen Landtag vom 19. Januar d. Js. Davon kann gar keine Rede sein, das ist selbstverständlich! Eine Gefährdung wirtschaftlicher Werte, von der jene Eingabe spricht, ist also absolut ausgeschlossen, und kann überhaupt nicht in Frage kommen!!

Der Tierarzt soll aber, wie in anderen Deutschen Bundesstaaten, so auch in Preußen gehalten sein — genau so wie der Menschen-Arzt — seine Medikamente aus den dafür vom Staate geschaffenen Apotheken seines Bezirkes zu entnehmen und an den Tierhalter abzugeben, zu den amtlichen, von jedermann genau kontrollierbaren Preisen, die weit unter den Friedensätzen liegen, also für den Tierhalter die billigste Bezugsquelle darstellen. Vor allem auch dadurch, daß sie im Wiederholungsfall ohne Mehrkosten — erneute Beratungsgebühr — vom Tierbesitzer dort bezogen werden können.

Unter keinen Umständen können wir es zugeben, daß uns der Bezug seit altersher verwandter und frei erhältlicher Tiermedikamente aus unseren Apotheken gesperrt und zugunsten der Tierärzte verboten wird; daß uns unsere Landapotheken — durch den tierärztlichen Handel ruiniert — zu unser aller Schaden geschlossen werden!!

Bei aller Anerkennung tierärztlicher Tätigkeit fordert daher die beunruhigte Landbevölkerung:

Kein Tierarzt-Monopol auf Kosten der schwer ringenden Landwirtschaft.

Der Tierarzt soll Arzt sein und nichts weiter.

Das hier abgedruckte Flugblatt möge als ein Ehrenmal der Herren Apotheker unserem Archiv für die Geschichte des Dispensierrechts der Tierärzte einverleibt werden. Es ist das gute Recht der Apotheker, ihre Wirtschaftsinteressen zu vertreten; dann soll aber ein offener und ehrlicher Kampf geführt werden. Mit der Bauernbewegung hat dieser Kampf nichts zu tun, ist für diese vielmehr lediglich eine Belastung. Das Unerhörte liegt darin, daß sich hier ein Akademikerstand hinter der Bauernbewegung versteckt und von diesem Versteck aus den Anschein zu erwecken sucht, als ob sich das ganze „beunruhigte“ Landvolk gegen die Tierärzte auflehne. Das ist ein Angriff aus dem Hinterhalt. Auf den fachlich wertlosen, rein demagogischen Inhalt des Flugblattes einzugehen, lehne ich ab. In bezug auf

Punkt 10 der Bauernkundgebung sei nur gefagt: Der Tierarzt gibt seine Medikamente nicht von händlerischen, sondern von wissenschaftlichen Gesichtspunkten ab — mit dem hohen Verantwortlichkeitsgefühl, das für ihn durch wissenschaftliche Schulung und die Rücksicht auf seinen Ruf und seine davon abhängende Existenz geboten ist. Wie anders steht es in dieser Beziehung mit den Apothekern, die sich durch Abgabe von Medikamenten mit der Tierbehandlung befassen? Was nun den „unkontrollierbaren“ Handel der Tierärzte anbetrifft, so vergessen die Herren Apotheker ganz, daß die gesamte Tätigkeit des Tierarztes in dem Vertrauen des Tierhalters ruht, daß sowohl die einzelnen Eingriffe und deren Bewertung für den Laien unkontrollierbar sind. Noch nie in der Geschichte akademischen Lebens und Kämpfens ist wohl in so unerhörter Weise gegen das unge schriebene Gesetz der Ritterlichkeit verstoßen worden. Es wäre deshalb zu erwägen, ob der R.P.T. nicht unverzüglich in einem Aufruf alle Tierärzte mit Dispensierrecht auffordern sollte, solange jeden Arzneimittelbezug von Apothekern einzustellen, bis ihre maßgebende Standesvertretung von ihren Gentleman-Kollegen in Schleswig-Holstein abrukt.

15. Fortbildungskursus des D.V.R. in Oldenburg.

Der Fortbildungskursus in Oldenburg am 21. und 22. Januar nahm bei einer Teilnehmerzahl von 95 Herren einen guten Verlauf.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Dr. Bittner, z. Zt. o. Professor und Direktor des veterinär-anatomischen Instituts der Universität Sofia, hat den Ruf als Nachfolger des ausscheidenden Direktors des anatomischen Instituts der Tierärztlichen Hochschule Berlin, Prof. Dr. Schmaltz, erhalten und angenommen. Prof. Bittner wird sein Amt bereits nach Pfingsten antreten. — Der Assistent am anatomischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Berlin, Dr. Schönberg, ist auf drei Jahre für die neuzuerbauende Hochschule in Angora verpflichtet worden.

Sir Arnold Theiler, ehem. Direktor der tierärztl. Lehr- und Forschungsanstalten der südafrikanischen Union in Pretoria, hat für seine bedeutenden Arbeiten, insbesondere auf dem Gebiete der Blutkrankheiten vom Institut Pasteur-Paris die goldene Laveran-Medaille erhalten.

Zur Kontingentierung des zollfreien Gefrierfleisches.

Im Sommer 1925 wurden durch die kleine Zolltarifnovelle für die seit Kriegsbeginn zollfreien Lebensmittelpositionen Zölle eingeführt, wobei man mit Rücksicht auf die Notwendigkeit der Verforgung der Bevölkerung mit billigem Gefrierfleisch dieses in der Höhe der bisherigen Einfuhr zollfrei hereinließ. Es wurden zuerst im Jahre 1926 Klagen darüber erhoben, daß die Kontingentsinhaber eine übermäßige Preisspanne berechneten und daß auch Handel mit den Kontingentscheinen getrieben würde. Durch die Gefrierfleisch-Enquete ist nunmehr ermittelt, daß diese Vorwürfe z. T. berechtigt waren. Es wird behauptet, daß die Monopolgewinne der Kontingentsinhaber sich jährlich auf etwa 14 Millionen Mark belaufen haben. Die zur zollfreien Einfuhr zugelassenen 120 000 Tonnen Gefrierfleisch hätten bei Verzollung 48 Millionen Zoll erbracht. Es wäre von vornherein richtiger gewesen, dem vielfach gemachten Vorichlag zu folgen und das kontingentierte Gefrierfleisch überhaupt nicht zollfrei hereinzulassen, sondern mit einem niedrigen Zollsatz zu belasten, als durch die Zollfreiheit ungerufen Stellen mühelos enorme Gewinne in den Schoß zu werfen. Der Zweck der Maßnahme, wirklich billiges Gefrierfleisch der Bevölkerung zuzuführen, ist damit vollständig verpufft. Es scheint nunmehr, als wenn diese Tatsache auch im Reichstags-Ausschuß ausgiebig gewürdigt wird. Denn der Haushaltsausschuß des Reichstages hat in den Schlußberatungen des Etats des Reichsernährungsministeriums folgende Entschlieung gefaßt:

„Die Reichsregierung ist zu erfuchen, eine Vorlage einzubringen, welche das zollfreie Kontingent für die Einfuhr von Gefrierfleisch aufhebt.“

Statt des Kontingents wurde eine einheitliche zollpolitische Behandlung der Gefrierfleißeinfuhr verlangt, wobei für das Gefrierfleisch ein Zollsatz von 35 Mark für den Doppelzentner statt bisher 40 Mark vorgeschlagen wurde. Heine.

Die Ergebnisse der Viehzählung vom 1. Dezember 1927.

Gattung	1. Dez. 1927	1. Dez. 1926	Zunahme(+) oder Abnahme(—)	in Prozenten
Kälber bis 3 Monate	1587064	1408262	+ 178802	+ 12,7
Jungvieh 3 Monate bis 2 Jahre	5334116	4937802	+ 396314	+ 8,0
Sonstiges Rindvieh	11061684	10875032	+ 186652	+ 1,7
Rindvieh insgesamt	17982864	17221096	+ 761768	+ 4,3
Schweine	22880318	19423552	+ 3456766	+ 17,8
Schafe	3813374	4080472	— 267098	— 8,5
Ziegen	3217762	3483800	— 266038	— 7,7

Die Zunahme der Rinder erstreckt sich hauptsächlich auf die jüngeren Tiere. Auch die große Zunahme der Zahl der Schweine ist vornehmlich auf die Ferkel und Schweine von acht Wochen bis zu einem halben Jahr zurückzuführen. Von besonderem Interesse ist ein Vergleich mit der Vorkriegszeit, der folgendes Bild ergibt:

Gattung	1. Dez. 1927	1. Dez. 1913	Zunahme(+) oder Abnahme(—) i. St.	in Prozenten
Kälber bis 3 Monate	1587064	1684346	— 97282	— 5,8
Jungvieh 3 Monate bis 2 Jahre	5334116	5448671	— 114555	— 2,1
Sonstiges Rindvieh	11061684	11341360	— 279676	— 2,5
Rindvieh insgesamt	17982864	18474377	— 481513	— 2,6
Schweine	22880318	22533393	+ 346925	+ 1,5
Schafe	3813374	4987828	— 1174454	— 23,5
Ziegen	3217762	3163813	+ 53949	+ 1,7

Die starke Verringerung der Schafhaltung ist wohl in erster Linie auf die hohen Produktionskosten zurückzuführen, auch darauf, daß die Kleintierhaltung in den Familien zweifellos im Rückgang begriffen ist. Wichtig ist, daß die Zahl der Schweine im Jahre 1927 die der Vorkriegszeit nunmehr überschritten hat. Es sind aber die Schlachtviehpreise so niedrig, daß besonders bei den Schweinen recht bald mit einer Reaktion zu rechnen ist, die sich dahin auswirken wird, daß dem jetzigen hohen Schweineangebot mit niedrigen Preisen ein niedriges Angebot mit hohen Preisen zwangsläufig folgt. Verständlich ist, daß nach dem Ergebnis der Viehzählung die deutsche Landwirtschaft den Standpunkt vertritt, daß es nunmehr an der Zeit ist, die Einfuhr von Lebendvieh, von tierischen Fetten, Milch und Milchprodukten zu verbieten und das Gefrierfleisch weiter zu kontingentieren. Heine.

Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte.

Hamburg 1928.

Die Versammlung beginnt nicht, wie ursprünglich in Aussicht genommen, mit dem 23. September, sondern ist in die mit dem 16. September 1928 beginnende Woche verlegt worden.

Tierärztekammer für die Provinz Ostpreußen.

Vollversammlung Sonntag, den 26. Februar 1928, 11½ Uhr im „Grünen Zimmer“ des Stadthallenrestaurants in Königsberg (Pr.), Vorderroßgarten 49. 1. Festsetzung der Umlage für 1928. 2. Antrag, den Mitgliedern der Tierärztekammer wieder die Bahnfahrt II. Klasse zum Versammlungsort zu erstatten. 3. Antrag, einen Beitrag für die Tannenbergs-Nationaldenkmal-Spende zu stiften. 4. Wahl eines ehrenamtlichen Mitgliedes für das Finanzgericht in Königsberg (Pr.). 5. Antrag eines Kollegen auf Zuerkennung des Titels „Fachtierarzt für Sterilitätsbekämpfung der Pferde und Rinder“. 6. Beantragung einer Beihilfe oder eines billigen Kredits für Tierärzte, welche infolge der Notlage der ostpreußischen Landwirtschaft ihre ausstehenden Forderungen nicht eintreiben können. Zu Punkt 6 ist es dringend erforderlich, daß sämtliche Tierärzte ihre Außenstände, soweit dieselben buchmäßig nachzuprüfen sind, anmelden und besonders diejenigen aufführen, welche vermutlich nicht einzutreiben sein werden. Etwaige weitere Anträge sind bis zum 16. Februar d. Js. an den Vorsitzenden zu richten.

I. A.: Dr. Knauer, Vors.

Fortbildungskursus

für die in dem Tuberkulofertilungsverfahren tätigen Vertrauens-tierärzte der Provinz Ostpreußen am Sonntag, den 4. und Montag, den 5. März 1928 in Königsberg im großen Sitzungssaal der Landwirtschaftskammer, Beethovenstr. 24/26.

Vortragsfolge. I. Teil.

10—11 Uhr: Über die Notwendigkeit der Intensivierung des Tuberkulofertilungsverfahrens. Referent: Dr. Knauer. 11—13 Uhr: Diagnostik und Bekämpfung der Geflügeltuberkulose und der weißen Ruhr der Küken mit Demonstrationen. Referent: Dr. Tiedge. 13—14 Uhr: Die Bekämpfung der Streptokokkenmastitis der Rinder mit anschließenden Demonstrationen. Referent: Dr. Knauer. 16—17 Uhr: Diagnostik und Therapie des infektiösen Rinderabortus. Referent: Dr. Krage. 17—18 Uhr: Vorführung eines Films über die Bekämpfung der Geflügeltuberkulose.

Um den von Königsberg weit entfernt wohnenden Kollegen die Teilnahme an dem Kursus zu erleichtern, wird dieser am Sonntag, den 18. März 1928 in Allenstein sowie am 26. März 1928 in Insterburg wiederholt werden.

II. Teil. (Nur für Königsberg.)

Montag, den 5. März 1928, 10 Uhr: Demonstrationen und Übungen in der praktischen Sterilitätsbekämpfung auf dem Schlachthof Königsberg Pr.-Rosenau Dr. Rütter; Dr. Balke. 11 Uhr: Praktische Übungen in der klinischen Untersuchung auf Tuberkulose beim Rinde. Dr. Weisgerber.

Ein geladen sind außer den Vertrauens-tierärzten der Provinz, deren Teilnahme im Interesse der einheitlichen Durchführung des Tuberkulofertilungsverfahrens dringend erwünscht ist, auch sämtliche anderen Tierärzte, welche an der beabsichtigten Organisation zur Bekämpfung der Geflügeltuberkulose und der Streptokokkenmastitis mitarbeiten wollen. Teilnehmergebühren werden nicht erhoben. Dr. Knauer:

Fortbildungskurse in Schleswig-Holstein.

Dr. Kiessig, Direktor des Tierseucheninstituts der Landwirtschaftskammer zu Kiel, hat sich bereit erklärt, die von ihm kostenlos abgehaltenen Fortbildungskurse, die sehr großen Anklang gefunden haben, auch weiterhin durchzuführen. Zahlreiche Anfragen möchte ich hiermit dahin erledigen, daß die Kurse bis auf weiteres nur Sonntags von 11—16 Uhr stattfinden und jeweils nur ein kleiner Kreis von Zuhörern zugelassen ist. Anmeldungen sind umgehend an der Unterzeichneten einzureichen. Dr. Weyl, Kiel, Annenstr. 90.

Bücheranzeigen und Kritiken

Die Lehre von der Vererbung. Von Prof. Dr. R. Goldschmidt. Mit 50 Abbildungen. Verlag Julius Springer, Berlin. 1927. Preis geb. RM. 4,80.

Wem die Zeit mangelt, sich mit den größeren Werken über Vererbungswissenschaft zu befassen, dem sei dieses kleine, aber inhaltreiche, 217 Seiten zählende Buch angelegentlichst empfohlen. Der Verfasser verdient unseren Dank dafür, daß er als vielbeschäftigter Forscher sich bereit finden ließ, für die Sammlung „Verständliche Wissenschaft“, in der die neuesten Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung in leicht verständlicher Form behandelt werden sollen, die Lehre von der Vererbung zu bearbeiten. Vom Einfachen: den erblichen und nicht erblichen Eigenschaften, den Geschlechtszellen und der Befruchtung allmählich zu den verwickeltesten Fragen aufsteigend wird der gesamte Mendelismus durchgesprochen und mit interessanten Beispielen, auch aus der Tierzucht, belegt. Wir lernen kennen: das Mendeln mit einem und mehreren Eigenschaftspaaren, die Chromosomen als Träger der Erbfaktoren, die Lage der Faktoren im Chromosom, den Chromosomenaustausch, die Geschlechtschromosomen und die geschlechtsgebundene Vererbung, das Zusammenarbeiten der Faktoren, die Erzeugung von Neuheiten durch Kreuzung, die Analyse der Rassen, das auch in der Tierzucht wichtige Summieren der Erbfaktoren, die Entstehung neuer Erbschaften durch Mutation und deren Beziehung zum Darwinismus, die Vererbungsgefetze und der Mensch. Die Abbildungen sind fast durchweg vorzüglich. Bei der Abbildung 32 (S. 117) wären vielleicht etwas größere Zellbilder zu empfehlen, damit die verschiedenen Erbfaktoren im Chromosom deutlicher hervortreten würden. Da im Text jeder ablenkende Sperr- und Fettdruck vermieden ist, wird die Aufmerksam-

keit von Anfang bis zu Ende gefesselt. Ob es allerdings richtig war, Forchernamen fast gänzlich zu vermeiden und auch weder ein alphabetisches Sachverzeichnis noch eine Zusammenstellung der wichtigsten Literatur am Schlusse beizufügen, mag fraglich erscheinen. Wissenschaftliche Fachausdrücke werden jeweils erläutert. Einige Fremdwörter wie „Chance“ (u. a. S. 176) und „räsonieren“ (S. 73: „Mendel räsonierte“) wären wohl auch zu vermeiden. Sehr erfreulich ist auch hier die unbedingte Abgabe gegenüber der Irrlehre von der Vererbung erworbener Eigenschaften. Auf diese Wandlung des Verfassers habe ich schon bei der Besprechung der Schrift Goldschmidt's: „Physiologische Theorie der Vererbung“ (vergl. d. Zeitschr. Nr. 30, S. 496) hingewiesen. Das Wesen der Gene, die G. in der letzterwähnten Schrift als Enzyme auffaßte, läßt er hier unentchieden; doch wird S. 186 der Erbfaktor bezeichnet als eine „winzige Masse eines so ziemlich unbekannten chemischen Stoffes, die an einem bestimmten Platz eines bestimmten Chromosoms einer Tier- oder Pflanzenart liegt“. M. E. sind die Gene und Faktoren doch etwas mehr als nur chemische Stoffe. Ein strenger Kritiker wird vielleicht auch beanstanden, daß stets von einer Vererbung von Art-, Rasse- und individuellen „Eigenschaften“ gesprochen wird, während im Grunde doch nur die Anlagen zu Eigenschaften vererbt werden. Bezüglich der Ursachen der Mutationen von denen es S. 191 heißt: „Alle Versuche, durch experimentelle Eingriffe Mutationen zu erzeugen, sind bisher fehlgeschlagen“, sei darauf hingewiesen, daß der bedeutende Forscher H. J. Muller an der Universität Texas, ein früherer Mitarbeiter Morgans, während zehn Jahren mit der Obst- oder Taufliege (*Drosophila*) Versuche gemacht hat zur Aufklärung der Ursache der Mutationen. Unter anderem gelang es ihm, mit Röntgenbestrahlung sehr zahlreiche Mutationen hervorzurufen. (Vergl. den Bericht von Lenz: „Eränderung durch Röntgenstrahlen“. Münch. Mediz. Wochenschr. 1927, Nr. 50, S. 2135).

Zum Schlusse sei noch besonders betont, daß die vorliegende, durch Leichtverständlichkeit ausgezeichnete Schrift auch sehr gut geeignet ist, als Unterlage bei Vorträgen in landwirtschaftlich-züchterischen Kreisen, wo man von der heutigen Vererbungslehre leider noch viel zu wenig weiß, zu dienen. A. Hink.

Train's Veterinär-Taschenbuch 1928. 32. Jahrgang. Verlag Otto Teichgräber, Berlin SW 68, Kochstraße 3.

Das Taschenbuch ist nach fünfjähriger Pause im 32. Jahrgang neu erschienen. Um ihm eine für die Tasche bequeme Form zu geben, hat der Verf. mit Vorteil von einer ausführlichen Wiedergabe der einschlägigen Gesetze abgesehen. Trotzdem enthält aber das Buch neben einem für das ganze Jahr ausreichenden Kalendarium alles für den Praktiker wichtige. Aus dem Inhalt seien folgende Kapitel besonders erwähnt: Zusammenstellung der Behandlung der wichtigsten Krankheiten, Tabellen über die Beurteilung des Fleisches tuberkulöser Tiere und von Rindern mit gesundheitschädlichen Finnen, Auszug aus dem Nahrungsmittelgesetz, Gewährleistung im Viehhandel, Altersbestimmung der Haustiere, Anhaltspunkte für gute Maft und für Feststellung des Gewichtes, Steuererklärungstabellen, Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige, Rechte und Pflichten des Tierarztes u. a. m. Das Taschenbuch wird den praktischen Bedürfnissen des Tierarztes in jeder Weise gerecht und kann daher zur Anschaffung nur bestens empfohlen werden. Baars.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Reg- und Veterinärat Dr. F. A. Litty-Deßau, zum Anhaltischen Landestierarzt und Mitglied der Anhaltischen Regierung, Abt. d. Inn., mit der Amtsbezeichnung „Oberregierungs- und Veterinärat“; Tierarzt Dr. Otto Hager zum Leiter der Auslandsfleischbeschau stelle in Breslau; Tierarzt A. Deubel zum Stadt tierarzt in Sigmaringen (Hohenzollern).

Approbiert: in Hannover: Alfred Bonfert aus Bukarest (Rumänien), Harry Eirck Hvidsten aus Borge-Ostfold (Norwegen), Robert Kohles aus Buderich (Rheinland).

Promoviert: in Hannover: der türkische Oberveterinär Ahmed Newsad aus Stambul (Türkei).

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck: Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10. nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 7.

Ausgegeben am 18. Februar 1928.

36. Jahrgang.

Zur gefl. Beachtung!

Der Bezugspreis für das 1. Vierteljahr 1928 wird für die beim Verlag direkt bestellten Abonnements durch Nachnahme erhoben, wenn derselbe nicht bis zum 26. ds. Mts. in unseren Händen ist. —

Wir bitten ev. für Einlösung der Nachnahme besorgt zu sein.

M. & H. Schaper

Verlag der „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“.

(Aus dem Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover. — Direktor: Prof. Dr. Mießner.)

Strongyliden der Pferde in Deutschland.

Nachtrag.

(Mit 2 Abbildungen.)

Von Oberassistent Dr. R. Wetzel, Hannover.

Im Jahre 1926 berichtete ich an dieser Stelle¹⁾ über zwanzig meistens in Deutschland noch nicht bekannte Strongyliden aus Caecum und dem großen Colon des Pferdes. Mit Rücksicht auf die große Zahl der in außerdeutschen Ländern (England, Holland u. a.) gefundenen Arten war anzunehmen, daß sich auch bei uns ihre Zahl noch erhöhen würde. Im Laufe des vorigen Jahres ist es mir gelungen, zwei weitere Vertreter der Familie Strongylidae Baird, *Oesophagodontus robustus* (Giles, 1892) und *Poteriostomum rátzii* (Kotlán, 1919) beim Pferde festzustellen, die nachstehend kurz beschrieben werden. Hinsichtlich Einzelheiten der Systematik wird auf die oben erwähnte Arbeit verwiesen.

Genus *Oesophagodontus* Railliet et Henry, 1902.

Syn.: *Pseudosclerostomum* Quiel, 1919.

Charakter des Genus: Der gut entwickelte Oesophagealtrichter enthält drei Zähne, die aber nicht bis in die Mundhöhle reichen. Die feingezähnte Bursa ist zweilappig und ventral geschlossen. Die dorsale mediane Hauptrippe fehlt. Die postero-laterale Rippe trägt einen dorsal gerichteten akzessorischen Zweig. Die Vulva liegt weit vor dem in eine Spitze auslaufenden Schwanzende des Weibchens.

Type: *Oesophagodontus robustus* (Giles, 1892).

Die Gattung enthält nur die eine Art:

Oesophagodontus robustus (Giles, 1892).

Syn.: *Sclerostomum robustum* Giles, 1892.

Pseudosclerostomum securiferum, Quiel, 1919.

Abb. 1.

Der Wurm wurde 1892 zuerst von Giles als *Sclerostomum robustum* beschrieben. Railliet und Henry (1902, p. 110) entfernten ihn aus dem Genus *Sclerostomum* und stellten für ihn das

neue Genus *Oesophagodontus* auf. 1919 beschrieb Quiel den Parasiten nochmals als vermeintliche neue Art unter dem Namen *Pseudosclerostomum securiferum*. Der Wurm ist bis jetzt festgestellt in Indien (Giles, 1892, p. 26; Boulenger, 1921, p. 316), in Frankreich (Quiel, 1919, p. 435), in England (Boulenger, 1916, p. 433; Turner, 1920, p. 442 in einem vor 10 Jahren aus Afrika importierten *Equus Chapmani*; Le Roux, 1924, p. 129; Lewis, 1926, p. 182), in Canada (Ransom and Hadwen, 1918, p. 204), in den Vereinigten Staaten von Nordamerika (Riley, 1921, p. 221), in Holland (Ihle, 1922, p. 103), in Südafrika (G. Theiler, 1923, p. 64; 1923, p. 662) und in Rußland (Popow, 1927, p. 141).

Grösse und Gestalt:²⁾ Die Länge der 0,59—1 mm dicken Männchen wird mit 15—16 mm angegeben, während die bis zu 1,5 mm breiten Weibchen 19—22 mm messen sollen (Boulenger; Ihle u. a.). Das vorliegende Weibchen hat eine Länge von 20 mm und 1,1 mm maximalen Breitenmesser. Der Körper erscheint ziemlich gedrungen, oralwärts verjüngt er sich nur mäßig, während er kaudalwärts allmählich in eine stumpfe Spitze ausläuft. Die Farbe der lebenden Würmer wird von Boulenger (1916, p. 434) und von G. Theiler (1923, p. 65) als bräunlich bezw. braun angegeben. Das von mir gefundene Exemplar zeigte eine ausgeprochene blutrote Färbung, so daß es dadurch sofort meine Aufmerksamkeit erregte.

Kopf (Abb. 1 a, b, c): Das Kopfende ist bei dem vorliegenden Weibchen, lateral gesehen, 629 μ breit und wird durch eine nur feichte Einschnürung vom übrigen Körper abgesetzt. Der an feiner Basis deutlich von der übrigen Kutikula abgeschnürte Mundwall erscheint verhältnismäßig flach. Sein oraler Rand zeigt eine unregelmäßig gewellte Kontur, während er sich peripherwärts etwas abflacht und eine ziemlich scharfe Kante bildet. Die sub-

²⁾ Da ich von der Art nur ein einziges Weibchen sammeln konnte, wird die Beschreibung der Männchen nach Boulenger (1916) gegeben.

¹⁾ D. T. W. 1926, S. 619.

medianen Kopfpapillen sind lang und schmal und überragen den Mundwall vorwärts beträchtlich. Sie sitzen proximal einer warzenförmigen Erhebung des Mundwalles auf, von der jede noch einen periphergerichteten mit zwei kleinen Fortsätzen versehenen Anhang trägt. Die lateralen Kopfpapillen erheben sich kaum über den Mundwall. An ihrer breiten Basis tragen sie lateral je einen kleinen hornartigen Fortsatz. Boulenger (1916, p. 434) beschreibt außerdem noch je ein Paar kleine Fortsätze an den distalen Enden der Papillen, die sich aber bei dem mir vorliegenden Exemplar nicht einwandfrei unterscheiden lassen. Der äußere Blätterkranz besteht in Übereinstimmung mit den Angaben der Literatur aus etwa 18 großen Elementen. Sie haben ihren Ursprung nahe dem proximalen Rande der inneren Mundwallfläche und überragen mit ihren meist nach außen umgebogenen distalen Enden den Mundwall leicht.

Die Mundkapfel ist becherförmig. Ihre größte Weite zeigt sie dicht hinter dem oralen Rande mit $408\ \mu$ ($320-470\ \mu$ Boulenger, $355-400\ \mu$ G. Theiler), um sich kaudalwärts zu verjüngen. Die Tiefe der Kapfel wurde mit $289\ \mu$ ermittelt ($220-320\ \mu$ Boulenger). Die Kapfelwand ist verhältnismäßig dünn (etwa $20\ \mu$) und überall gleich stark. An ihrem kaudalen Ende zeigt die Kapfel außen eine kräftige, ringförmige Verdickung. Eine Dorfalrinne (Ausführungsgang der dorfalen Oesophagusdrüse) ist nicht vorhanden. Der innere Blätterkranz besteht aus etwa 34 bis 40 (48 Giles) schmalen, schwer zu zählenden Elementen. Sie entspringen nach G. Theiler dorsal und ventral dichter am vorderen Mundkapfelrand als lateral, so daß die lateralen Blätter kürzer erscheinen. Die Elemente des Blätterkranzes sind annähernd axial gerichtet und haben nach vorwärts umgebogene distale Enden.

Der $1,53\ \text{mm}$ lange, schlanke Oesophagus beginnt mit einem $364\ \mu$ breiten, kranialen Abschnitt, verjüngt sich leicht bis zur Mitte, um dann wieder kaum merklich anzuschwellen. Die maximale Breite des kaudalen Abschnittes

beträgt bei dem vorliegenden Weibchen $306\ \mu$. Der Oesophagealtrichter ist gut entwickelt und zeigt drei zahnartige, von der chitinösen Auskleidung geformte Gebilde, die aber nicht bis in die Mundhöhle hineinragen. Der Exkretionsporus und die sehr kleinen Cervicalpapillen finden sich dicht hinter dem Nervenring, bei dem vorliegenden Weibchen $1,2\ \text{mm}$ von dem vorderen Körperende entfernt.

Hinteres Körperende des Männchens (Abb. 1 d, e): Die ventral geflossene Bursa copulatrix hat keinen Mittellappen; sie ist zweilappig. Ihr freier Rand erscheint fein gezähnt. Eine dorale Hauptrippe ist nicht vorhanden. Die dorfalen Rippen entspringen in zwei Gruppen zu je vier. Die externo-dorale Rippe ist die längste, während die übrigen drei etwa gleich lang sind. Von den lateralen Rippen erscheint die medio-laterale etwas kürzer als die anderen zwei. Die postero-laterale Rippe trägt an ihrer Basis einen etwa dorsal gerichteten stummelförmigen Fortsatz, dessen Gestalt und Größe variieren sollen. Die schlanken, gleich langen ventralen Rippen verlaufen parallel. Der kurze und breite Conus genitalis präsentiert sich meist halbkreisförmig und ist jederseits mit einer kleinen Papille versehen. Dicht ventral von der Kloakenöffnung findet sich ein median gelegener lippenartiger Vor sprung. Der Hautkragen ist nur ventral gut entwickelt. Die Spicula sind lang und schlank, ihre distalen Enden ohne Haken. Sie werden von einer fein gestreiften Scheide umschlossen.

Hinteres Körperende des Weibchens (Abb. 1 f): Der Körper des Weibchens verjüngt sich kaudalwärts allmählich und endet in Form einer langgezogenen stumpfen Spitze, die mit einem knopfartigen Anhang versehen ist. Der Anus ist $357\ \mu$ vom Schwanzende entfernt. Die Vulva liegt $2,4\ \text{mm}$ ($2,3-3\ \text{mm}$ nach Boulenger) vor der Analöffnung und führt in eine sehr kurze Vagina. Auf der Höhe der Vulva ist der Breitendurchmesser des Körpers 646 , auf der Höhe des Anus $289\ \mu$.

Die Eier haben nach Giles (p. 27) regelmäßig elliptische Gestalt und werden im Morula stadium abgelegt. Ihre Größe wird mit $152 \times 82\ \mu$ angegeben. Die dem Uterus der Weibchen entnommenen Eier messen nach Boulenger (1916, p. 435) $100-130 \times 50-60\ \mu$ G. Theiler p. 66) gibt dagegen nur $88-100 \times 40-48\ \mu$ an.

Vorkommen: O. robustus ist als Parasit beim Pferd, Maulefel (Giles), Esel (G. Theiler) und Equus Chapmani (Turner) angetroffen worden. Das vorliegende Exemplar wurde im rechten ventralen Colon eines Pferdes gefunden, wo es sich mit dem Kopfende an die Schleimhaut festgefogen hatte. Die gleiche Beobachtung haben auch Giles und Le Roux gemacht. Der Wurm ist bisher nur äußerst selten und dann auch mit Ausnahme von Giles nur in wenigen Exemplaren gesehen worden. Da ich bei nunmehr 87 untersuchten Pferden bis jetzt nur das eine Weibchen gefunden habe, scheint diese Beobachtung auch für Deutschland zu gelten.

Literatur.

Boulenger, Ch. L.: „Sclerostome Parasites of the Horse in England. I. The Genera Triodontophorus and Oesophagodontus“ Parasitology 1916, 8, p. 433. Boulenger, Ch. L.: „Strongylid Parasites of Horses in the Punjab“ Parasitology 1921, 13, p. 316. Giles, G. M. J.: „On a new Sclerostome from the Large Intestine of Mules“. Sci. Mem. by Med. Officers of the Army of India. Calcutta 1892, VII, p. 25. Ihle, J. E. W.: „De in de dikke darm van het paard levende volwassen Strongyliden (Sclerostomen)“ Rapport der Commissie voor het Sclerostomiasis-onderzoek in Nederland. I. Zoologisch Gedeelte. s'Gravenhage 1922, p. 103. Lewis, E. A.: Helminths collected from Horses in the Aberystwyth Area. Journ. of Helminthology 1926, 4, p. 182. Quiel, G.: „Ein neuer Pferdeparasit, Pseudosclerostomum n. g. (Nematode).“ Sitzungsber. Ges. naturforsch. Freunde, Berlin 1919, p. 435. Railliet, A. et Henry, A.: „Sur les Sclerostomiens des




Abb. 1. Oesophagodontus robustus (Giles, 1892).

a) Kopf eines Weibchens, lateral, ca. $51 \times$; b) Vorderes Körperende desselben Weibchens, dorsal, ca. $22 \times$; c) Submediale Kopfpapille mit feithlichem Fortsatz an der Basis; d) Bursa copulatrix, lateral, ca. $37,5 \times$, nach Boulenger 1916, Tafel XII, Abb. 5; e) Bursa copulatrix ausgebreitet, ca. $15 \times$ nach Giles 1892, Tafel V, Abb. 4; f) Hinteres Körperende des Weibchens, lateral ca. $26,5 \times$.

die sie dicht aneinander parallel laufend zeichnet, leicht gespreizt. Die Praebursalpapillen sind gut entwickelt. Der Conus genitalis ist dorsal und ventral von einem kräftigen Hautkragen umgeben.

Hinteres Körperende des Weibchens (Abb. 2 e): Der Körper des Weibchens verjüngt sich kaudalwärts allmählich und endet in Form einer langgezogenen stumpfen Spitze. Sie ist bei konservierten Exemplaren gewöhnlich leicht dorsal aufgebogen. Die Körperbreite beträgt auf der Höhe der Vulva 476, auf der Höhe des Anus 289 μ . Der Anus befindet sich 697 μ (664 nach Smit, 935 nach Kotlán, 775 nach Ihle) von der Schwanzspitze entfernt. Die Vulva liegt 816 μ vor der Analöffnung und führt in eine verhältnismäßig kurze Vagina.

Vorkommen: *P. rátzii* ist bis jetzt beim Pferd und Maulesel (Yorke und Macfie) gefehen worden, wo sich der Wurm im (ventralen) Colon fand. Le Roux (1924, p. 128) sammelte ihn im rechten dorsalen Colon. Während der Parasit nach Kotlán in Ungarn häufiger angetroffen wurde, scheint er in Deutschland, ebenso wie in England,

Holland und Niederländisch Indien, wo ebenfalls nur vereinzelte Exemplare gefunden wurden, sehr selten zu sein.

Literatur.

Ihle, J. E. W.: „De in de dikken darm van het paard levende volwassen Strongyliden (Sclerostomen)“ Rapport der Commissie voor het Sclerostomasis-onderzoek in Nederland. I. Zoologisch Gedeelte: s'Gravenhage 1922, p. 102. Kotlán, S.: „A hazai lovakban előforduló Sclerostomidák, Különös tekintettel a Cyliostomum-genusra“ Különlenyomat a Közlemények az összehasonlító élet-és Kórtan Köréből 1919, évi XV Kötet, 3.—4. füzetéből p. 13. Kotlán, A.: „Beiträge zur Helminthologie Ungarns. 1. Neue Sclerostomiden aus dem Pferd.“ Zbl. f. Bakt. (Orig.) 1919, 83, p. 558. Le Roux, P. L.: „Helminths collected from Equines in Edinburgh and London.“ Journ. of Helminthology 1924, 2, p. 128. Smit, H. J.: „Parasitologische Studien in Niederländisch Indien.“ D. T. W. 1924, p. 433. Theiler, G.: „The Strongylids and other Nematodes parasitic in the Intestinal Tract of South African Equines.“ Thèse Neuchâtel 1923, p. 67—9th and 10th Reports of the Dir. of Vet. Educ. and Res. 1923, p. 663. Yorke, W. and Macfie, J. W. S.: „Strongylidae in Horses.“ X. On the Genus Poterostomum, Quil — XI. Species found in West-Africa and Jamaica.“ Ann. Trop. Med. and Parasit. 1920, 14, p. 161; p. 166.

Ein 30jähriger Krieg gegen die Rindertuberkulose in Schweden.

Von G. Régner, Regimentsveterinär, Vortragendem Rat in Tuberkuloseangelegenheiten im Königl. Landwirtschaftsamt in Stockholm.

Am 15. Oktober 1897 nahm der Schwedische Staat den Kampf gegen die Rindertuberkulose des Landes auf. Die Grundvoraussetzung hierfür war der freiwillige Anschluß seitens der Tierbesitzer, und das Ziel richtete sich auf die Ausrottung resp. Vorbeuge der Krankheit. Hieraus folgte, daß die Bangsche Kampfesmethode den Maßregeln gegen die Krankheit zugrunde gelegt wurde, die nämlich in der Hauptfache in der Isolierung, Desinfektion und Sterilisierung der für die Kälber bestimmten Milch bestand.

Zwecks Förderung dieser Bestrebung übernahm der Staat folgende Opfer: 1. eine zentrale, zum Königl. Landwirtschaftsamt verlegte Leitung, 2. für den Tierbesitzer entweder völlig oder teilweise kostenlose Untersuchungen mittels unter allen Umständen kostenfrei durch den Tierarzt zu liefernden Tuberkulins, 3. kostenlose Beratung und Aufklärung nebst klinischen Untersuchungen an Ort und Stelle durch einen vom Staat angestellten Tuberkulosekonsulent, 4. Entschädigung an den Tierbesitzer für das mit Tuberkulose behaftete Tier, in der Regel jedoch nur im Falle von Eutertuberkulose, sowie 5. Belohnungen mit Geld, die jedoch bald, im Jahre 1906 nämlich, durch kleinere Geldunterstützungen an die Besitzer kleinerer Rinderbestände für ihren Kampf gegen die genannte Krankheit ersetzt wurden. Der sich durch Freiwilligkeit charakterisierende Tuberkulosekampf verlangte natürlich seitens des Staates zwecks Förderung der Sache eine umfassende Aufklärungsarbeit — Aufrufe, Vorträge, Broschüren, Flugchriften u. a.

Schließlich sei erwähnt, daß 1921 ein Gesetz zur Pasteurisierung der für tierische Nahrung bestimmten Milch eingeführt wurde. Dieses war zunächst fakultativ, wurde aber 1925 durch ein obligatorisches folches, für das ganze Reich mit Ausnahme der sechs nördlichsten Provinzen (Läne) geltendes ersetzt.

Zwecks Herbeiführung eines starken Anschlusses zur Tuberkulosebekämpfung wurde beschlossen, daß der Tierbesitzer den Vorteil der ersten kostenlosen Tuberkulinuntersuchung ohne die Verpflichtung zur Übernahme irgendwelcher Maßnahmen aus Anlaß des Untersuchungsergebnisses genießen sollte. Hierdurch ließ sich eine sehr eingehende Kenntnis über die Verbreitung der Tuberkulose in den verschiedenen Teilen des Landes gewinnen und viele Tausende von Beständen, die nicht von der Tuberkulose heimgefuht waren, entdecken. In den letzten Jahren wurde

die Bewilligung einer kostenfreien Tuberkulinuntersuchung jedoch von Angaben darüber abhängig gemacht, daß die Untersuchung nichts anderes als die Bekämpfung der Tuberkulose bezweckte.

Wünschte der Tierbesitzer dagegen die Vornahme einer zweiten resp. weiterer Tuberkulinuntersuchungen, so hatte er jedesmal eine tierärztliche Bescheinigung darüber beizubringen, daß er gewisse festgesetzte Maßregeln gegen die Tuberkulose innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit nach der nächstvorhergehenden Untersuchung eingeleitet und dann durchgeführt hatte.

Dieses Verfahren wurde 30 Jahre gegen die Rindertuberkulose in Schweden angewandt, und im folgenden sollen die während derselben erzielten Ergebnisse dargelegt werden. Zunächst mögen folgende statistischen Angaben hierzu dienen, und zwar unter Beifügung auch solcher für die Jahre 1920 und 1908, in denen gleiche Berechnungen gemacht wurden.

Rinderbestände, die am 15. Oktober 1927 der staatlichen Tuberkulosebekämpfung angeschlossen waren.

Jahr	Zahl der Bestände	Situation zu Beginn des Kampfes			Situation am 15./10. 1927			Reaktionsfrei am 15./10. 1927	
		Zahl der Tiere	Von diesen reagierten	% reagierende	Zahl der Tiere	Von diesen reagierten	% reagierende	Zahl der Bestände	Zahl der Tiere
1927	3.299	90.746	22.673	25,0	115.772	2.869	2,5	2.320	62.997
1920	2.113	69.256	19.292	27,9	80.513	2.113	2,6	1.411	46.375
1908	1.366	49.112	14.175	28,9	57.734	1.761	3,1	893	27.833

Aus den Angaben geht hervor, daß die Tuberkulosebekämpfung mit den Jahren an Umfang zugenommen hat, so daß sie im Jahre 1927 3299 Bestände mit insgesamt 115 772 Tieren umfaßte. Das Reaktionsprozent unter den Tieren war 25, sank jedoch dank der Maßnahmen gegen die Krankheit auf 2,5, d. h. auf ein Zehntel gegenüber dem früheren Zustande.

Die betreffenden Bestände lassen sich zweckdienlich auf folgende Weise gruppieren:

1. Ursprünglich tuberkulöse Bestände:
 - A) von der Tuberkulose befreit,
 - B) noch nicht völlig von der Tuberkulose frei,
2. Ursprünglich von der Tuberkulose freie Bestände:
 - C) auch weiter von der Tuberkulose frei,
 - D) tuberkulös geworden.

Die Gruppe A umfaßt 1121 Bestände mit insgesamt 39 949, also durchschnittlich 35,6 Tieren pro Bestand. Das Reaktionsprozent unter den Tieren war zu Beginn der Bekämpfung 25,9. Es wurden nicht wenige große und mittelgroße Bestände von der Tuberkulose befreit. Eine Reihe von Beständen dieser Gruppe war ursprünglich in keinem höhern Grade von der Krankheit heimgefuht, weshalb sich der Kampf in den meisten Fällen verhältnismäßig leicht durchführen ließ. Andererseits enthielten 272 Bestände wenigstens 10 bis 179 reagierende Tiere.

Die Gegner des Tuberkulins erheben gern den Einwand, Reaktionsfreiheit bedeute nicht immer Ausschluß einer tuberkulösen Infektion des Tieres, weshalb man nicht sicher zu sein vermag, daß der fragliche Rinderbestand tuberkulosefrei ist. Dieses mag bis zu einem gewissen Grade richtig sein. Ob und in welchem Maße dieses Verhalten jedoch bezüglich der vorliegenden Gruppe von Bedeutung ist, läßt sich nicht sicher entscheiden. Andererseits kann man die Möglichkeit einer Ausrottung der Tuberkulose aus einem Rinderbestande durch geeignete Maßregeln, die hinsichtlich der Wirkung durch die Tuberkulinprobe kontrolliert werden, mit Bestimmtheit behaupten. Im allgemeinen gibt man dieses auch zu, ein völlig zufriedenstellender Beweis läßt sich jedoch nicht leicht erbringen; denn hierzu ist es erforderlich, daß die gemäß des Tuberkulinresultates tuberkulosefreien Bestände in ihrer Gesamtheit auf einmal abgeschlachtet werden. Der Verfasser kennt nur zwei Fälle, in denen eine solche Abchlachtung stattgefunden hat.

In Schweden, wo man die Abchlachtungsmethode bei der Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche anzuwenden pflegt, wurden nämlich zwei von der genannten Seuche ergriffene reaktionsfreie Bestände abgeschlachtet und im Zusammenhang hiermit von einem Schlachthoftierarzt auf das Vorhandensein von Tuberkulose untersucht. In dem einen Falle handelte es sich um einen im Jahre 1920 geschlachteten Bestand von 119 Tieren, der sich als völlig frei von Tuberkulose erwies. Derselbe war 1899 bis zu 75,8 Prozent tuberkulös gewesen. Die Tiere des andern Bestandes in einer Anzahl von 275 wurden im Jahre 1924 geschlachtet. Sämtliche Tiere mit Ausnahme von zwei waren frei von Tuberkulose. Bei einer älteren Kuh sollte nämlich Tuberkulose in einer Bronchialdrüse und bei einem jungen Bullen in den Bronchial- und Mediastinaldrüsen ermittelt worden sein. Der Bestand reagierte im Jahre 1902 mit 72 Prozent. Doch sei hinzugefügt, daß eine bakteriologische Untersuchung der Krankheitsprozesse nicht angeführt wurde. Es muß also als unentschieden dahingestellt werden, ob die beiden Tiere wirklich tuberkulös waren.

Die Gruppe B umfaßt 746 Bestände mit insgesamt 45 378, also durchschnittlich 60,8 Tieren auf den Bestand. Das Reaktionsprozent betrug zu Anfang der Bekämpfung 37,2, wurde jedoch durch die Maßnahmen auf 5,3 herabgedrückt. Die Bestände sind hier überwiegend groß oder mittelgroß und waren in vielen Fällen ursprünglich sehr tuberkulös. Der Kampf war oft genug mühevoll und in einer Reihe von Fällen mit offensichtlichem Widerstand in Form größerer Reaktionsrückfälle unter den gegen die Tuberkulose geschützten Tieren verbunden.

In dem Gedanken daran, eine wie komplizierte Arbeit die Tuberkulosebekämpfung unter den Rindern in der Tat darstellt und wie leicht sich das Übersehen des einen oder andern Details in ihr unangenehm bemerkbar macht, können solche Rückfälle nicht weiter wundernehmen. Das

Gelingen der Bekämpfung setzt ja ein unablässiges Überwachen einer strengen Durchführung der Maßnahmen sowie peinliche Genauigkeit hinsichtlich aller die Arbeit zusammensetzenden Einzelheiten voraus. Mit derartigen Voraussetzungen ist leider nicht überall zu rechnen. So kommt es vor, daß Rinder in den vor der Tuberkulose geschützten Bestand ohne die Beobachtung notwendiger Vorichtsmaßregeln eingestellt werden, daß reagierende Tiere längere Zeit unter den reaktionsfreien zurückbleiben, daß nicht-reagierende Tiere im alten, stark verfeuchten Bestand als Stamm für den neuen, tuberkulosefreien verwandt werden, daß man durch den Bullen sowohl die reagierenden als auch nicht-reagierenden Tiere decken läßt, daß kontrollierende Tuberkulinproben mit zu langen Zeitzwischenräumen vorgenommen werden und dergleichen. Die Erfahrung lehrt jedoch, daß ein größerer Reaktionsrückfall das Augenmerk des Tierbesitzers schärft und seine Energie anspannt. Er rafft sich zu neuem Kampfe auf, dessen Durchführung ihm dann in der Regel gelingt.

Schließlich sei sowohl bezüglich der Gruppe A als auch B hervorgehoben, daß das angegebene Anfangstuberkuloseprozent in Wirklichkeit nicht unwesentlich höher ist, was darauf beruht, daß die Tuberkulosearbeit in verschiedenen Fällen mit der Aufzucht eines ganz neuen Stammes ohne Tuberkulinprüfung des alten offensichtlich tuberkulösen Bestandes begonnen wurde, oder aber es kam eine derartige Prüfung in sehr begrenztem Umfange zur Ausführung. Andererseits läßt sich betreffs eines Teiles der während des Jahres 1927 noch nicht abgeschlossenen Tuberkulosearbeiten der Einwand erheben, daß eine reagierende oder eine als reagierend betrachtete Abteilung des Bestandes auf dem Gehöfte verblieb, wodurch sich das Resultat des Kampfes vorteilhafter gestaltet als bei Mitrechnung dieses Restes. Es bot jedoch gewisse Schwierigkeiten, über diesen Rest Kenntnis zu erhalten, und die Bedeutung des Einwandes verringert sich in erheblichem Maße durch den Umstand, daß die durchschnittliche Anzahl der Tiere in den 746 Beständen zu Anfang 45, aber im Jahre 1927, wie oben erwähnt, 60,8 betrug.

Die Gruppe C umfaßt 1199 Bestände mit insgesamt 23 048, also durchschnittlich 19,2 Tieren pro Bestand. Hier handelt es sich also hauptsächlich um kleinere Rinderbestände. Die Gruppe zeigt die Möglichkeit, die Tuberkulose von einem Bestande fernzuhalten, wenn man sich auch nicht dem verschließen darf, daß der eine oder andere Bestand während der Verteidigung Reaktionsfälle zu verzeichnen hatte. Die allermeisten vermochten sich jedoch trotz ihrer oft genug vorkommenden Lage in einem tuberkulösen Milieu dank der bestmöglichen Vermeidung einer Verbindung mit fremden Beständen oder Teilen derselben, die nicht erwiesenermaßen frei von Tuberkulose waren, während der ganzen Zeit unverfeucht zu erhalten.

Die Gruppe D umfaßt 233 Bestände mit insgesamt 7397 Tieren, die sich bis zu 6,2 Prozent trotz vorbeugender Maßnahmen infizierten. Es ist offenbar, daß diese Maßregeln mangelhaft angewandt wurden. Die durchschnittliche Größe der Bestände betrug bis 31,7 Tiere, sie überstieg somit bei weitem diejenige der Gruppe C. Das verhältnismäßig niedrige Reaktionsprozent schließt jedoch in sich, daß der Schaden leicht zu beseitigen ist. Die Gruppe D zeigt, daß dank dem Tuberkulin die Möglichkeit besteht, eine tuberkulöse Infektion in ihrer Entstehung aufzuspüren und einer Ausbreitung der Krankheit vorzubeugen.

Betreffs der durch unsern Tuberkulosekampf gewonnenen Ergebnisse sei folgendes hervorgehoben.

Im vorhergehenden wurde erwähnt, daß dem Tierbesitzer zwecks Erhaltes der ersten Tuberkulinuntersuchung auf Staatskosten nicht die Verpflichtung auferlegt wird, Maßregeln gegen die Tuberkulose zu ergreifen. Dieses Entgegenkommen seitens des Staates führte zu der

Entdeckung von nicht weniger als 18 368 Beständen, die sich bei der fraglichen Untersuchung als tuberkulosefrei erwiesen. Sie machen 53,1 Prozent sämtlicher während der 30 Jahre mittels Tuberkulin untersuchten Rinderbestände (34 570) aus und gehören hauptsächlich kleineren Landwirten. Die Bedeutung dieser Entdeckung leuchtet ein. Denn wenn auch nicht im entferntesten alle diese Bestände der staatlichen Tuberkulosebekämpfung angeschlossen waren, so dürfte doch die Kenntnis davon, daß die Tuberkulose in dieselben nicht einzudringen vermochte, für viele Tierbesitzer eine Mahnung daran bedeutet haben, hinsichtlich einer direkten oder indirekten Berührung mit fremden Beständen Vorzicht zu beobachten.

Eine erfreuliche Erscheinung während unserer Tuberkulosebekämpfung lag darin, daß die Leiter unserer Tierzucht unseren Bestrebungen von vornherein mit großem Interesse begegneten. Von den der Bekämpfung angeschlossenen Beständen gehören über Tausend unseren vornehmsten Zuchtstämmen verschiedener Zuchtrichtungen an. Selbstredend sind die unter staatlicher Kontrolle stehenden 30 Zuchtzentren frei oder praktisch so gut wie frei von Tuberkulose. In jedem Falle ist man bestrebt, keine anderen als reaktionsfreie Tiere von der Tuberkulosebekämpfung angeschlossenen Zuchtstämmen zu verkaufen. Da die meisten derselben ursprünglich sehr tuberkulös waren und somit früher den Ansteckungsstoff im Lande verbreiteten, leuchtet die Bedeutung der Tuberkulosebekämpfung in diesem Punkte ein. Hinzugefügt sei, daß nur reaktionsfreie Tiere von der staatlichen Tuberkulosebekämpfung angeschlossenen Beständen bei den periodisch wiederkehrenden, allgemeinen schwedischen landwirtschaftlichen Zusammenkünften zwecks Ausstellung zugelassen werden.

Natürlich hat der Tierhandel durch unsere Maßnahmen gegen die Tuberkulose in den Beständen überhaupt einen Einfluß in hygienischer Richtung erfahren. In dieser Hinsicht sind folgende Angaben einleuchtend.

Von der Kampfperiode, von der hier die Rede ist, liegen bestimmte Angaben über 33 465 Rinder in ihrem Verhalten zum Tuberkulin vor, nachdem sie frühestens einen Monat nach ihrer Ankunft beim Käufer mit Tuberkulin untersucht waren. Hinsichtlich einer Anzahl von 14 432 Tieren waren die Bestände, aus denen der Einkauf geschehen war, nicht vorher mit Tuberkulin untersucht. Von diesen Tieren reagierten beim Käufer 15,2 Prozent. Die übrigen 19 033 Tiere kamen von Beständen, die einmal oder mehrere Male mit Tuberkulin geprüft waren. Von diesen reagierten beim Käufer 5,7 Prozent. Selbst wenn man den Umstand berücksichtigt, daß das eine oder andere Tier den Ansteckungsstoff vielleicht beim Käufer aufgenommen hat, legen die Angaben jedoch nahe, daß die Gefahr für den Handel mit tuberkulösen Rindern im Falle auf tuberkulinisierte Bestände weit geringer ist als beim Ankauf von Beständen, die nicht der fraglichen Probe unterworfen sind. Etwas anderes ist ja auch nicht zu erwarten.

Schließlich sei die große Bedeutung der Tuberkulosebekämpfung für die Milchhygiene hervorgehoben. Wenigen Städten und größeren Gemeinden in unserm Lande fehlt der Zugang zu tuberkelbazillenfreier Milch, falls sie sich eine solche zu verschaffen wünschen. Besonders sind zahlreiche, auch Landwirtschaft treibende Industrien zur Aus-

rottung der Tuberkulose aus ihren Beständen bestrebt gewesen, wodurch sie instand gesetzt wurden, ihrem Personal eine bezüglich der Tuberkulose einwandfreie Milch zu liefern.

Die Anzahl der in Schweden unterhaltenen Rinder betrug bei der letzten Zählung (1919) etwas über 2, und $\frac{1}{2}$ Million. Diese Zahl läßt den Umfang der Tuberkulosebekämpfung nicht besonders imponierend erscheinen, da in ihr nicht einmal der zwanzigste Teil der Gesamtzahl der im Reiche vorhandenen Rinder enthalten ist. Allerdings muß wiederholt werden, daß die Bekämpfung auf freiwilliger Teilnahme seitens der Landwirte beruht, und daß die Maßregeln gegen die Krankheit gewisse, wenn auch nicht unüberwindliche Schwierigkeiten bei der Durchführung bieten. Die Erfahrung lehrt, daß es stets auf Schwierigkeiten stößt, das Interesse der Landwirte für große stallhygienische Aufgaben zu erwecken, deren Lösung Geduld, einen gewissen Grad von Sachkenntnis sowie ökonomische Aufopferung erfordert. Hinzugefügt sei, daß unsere Tuberkulosebekämpfung während der letzten Jahre mit unzureichenden Staatsanschlägen zu rechnen hatte.

Bei Berücksichtigung der auseinandergesetzten Verhältnisse kann das Ergebnis kaum anders als zufriedenstellend genannt werden. Der Umstand, daß wir — wie die im vorhergehenden angeführte Tabelle aufweist — in unseren Rinderbeständen die Tuberkulose immer stärker zurückdrücken, trägt natürlich ebenfalls dazu bei, den Eindruck hinsichtlich des Ergebnisses vorteilhaft zu gestalten.

Zum Schluß möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß eine besondere Art der Tuberkulosebekämpfung, nämlich die gegen die ansteckungsgefährlichen Formen der Rindertuberkulose, in Schweden ungefähr auf die gleiche Weise wie in Deutschland ausgeübt wird. Bereits 1910 begann die Landwirtschaftskammer der Provinz (Län) Malmöhus mit einer derartigen Bekämpfung dortselbst, und während der letzten Jahre ist man in einigen anderen Provinzen ihrem Beispiel gefolgt. Der Staat liefert hierzu Beiträge, da eine Beseitigung der Ansteckungsquellen der Krankheit, soweit dieses möglich ist, bei jeder Tuberkulosebekämpfung als unvermeidlich betrachtet werden muß. Außerdem hat es sich bei uns gezeigt, daß sich eine ganze Reihe der der Bekämpfung der ansteckungsgefährlichen Tuberkulose angeschlossenen Bestände allmählich mit den Maßregeln vertraut macht, welche die Ausrottung der Krankheit zur Folge haben.

Betreffs einer unschädlichen Beseitigung solcher Tiere, bei denen ansteckungsgefährliche Tuberkulose konstatiert wurde, ist zwecks Erhaltes eines Staatsbeitrages die Bedingung vorgeschrieben, daß das fragliche Tier innerhalb 14 Tagen nach der Feststellung geschlachtet wird. Nur ausnahmsweise und allein beim Vorliegen besonderer Gründe kann die Landwirtschaftskammer einen Aufschub der Abchlachtung bewilligen, doch nicht längere Zeit als sechs Monate. Die Abchlachtung wird auf die Weise kontrolliert, daß das Ohr des Tieres, welches vom Tierarzt auf eine gewisse Art gezeichnet wurde, der Landwirtschaftskammer eingefandt wird.

Am 15. Oktober 1927 waren dem genannten Bekämpfungsverfahren 295 Bestände mit insgesamt 11 058 Tieren im Alter von über zwei Jahren angeschlossen.

Enteritis bei Kühen durch *Bact. enteritidis breslaviense*.

Von Veterinär Dr. Goedecke-Wanzleben und Dr. F. Grüttner, Direktor des städt. Schlachthofes in Quedlinburg a. H.

Die Krankheitsgeschichte einiger Kühe, die sich bei der weiteren Untersuchung als Paratyphusinfektion herausstellte, wird ihrer Bedeutung wegen mitgeteilt.

Am 26. 9. erkrankte von dem 120 Haupt zählenden Rindviehbestande des Gutsbesitzers D. in S. eine Kuh.

Vorbericht: Die Kuh habe fast plötzlich zu fressen aufgehört und habe dünnflüssigen blutigen Kot abgesetzt. Die Milch, die bisher 18 Liter täglich betrug, sei vollständig verschwunden. Status praesens: (27. 9.) Kuh, schw.-bt., 6 Jahre alt. Die Kuh steht vollständig apathisch im Stalle,

sie befindet sich in sehr gutem Ernährungszustande. Das Tier ist gut gepflegt, das Haarkleid kurz, glatt anliegend und glänzend. Die Temperatur beträgt 41,2 Grad C. Die Temperatur der äußeren Haut ist unregelmäßig verteilt, die Hörner sind bald warm, bald kalt; die ganze Körperoberfläche ist auffallend kalt, der ganze Körper zittert. Der Puls schlägt 98 mal in der Minute, er ist schwirrend und drahtförmig; die Herztöne sind wegen des Zitterns nicht wahrnehmbar. Die Kuh atmet 44 mal in der Minute, die Atmung ist angestrengt, die Nasenlöcher werden beim Einatmen weit geöffnet. Huften ist nicht vorhanden, die Perkussion der Lungen ergibt vollen Schall, die Auskultation verschärftes Bläschenatmen. Futter wird vollständig verweigert. Bis zum Einsetzen der Erkrankung hat die Kuh erhalten: frisches Zuckerrübenblatt nach Belieben, daneben 4 kg Kraftfutter, bestehend aus Erdnußmehl, Palmkernkuchen, Sojabohnenschrot und Weizenkleie zu gleichen Teilen, abends Luzerneheu und Haferstroh. Die Kuh ist sehr begierig nach klarem Wasser. Das Wiederkauen ist vollständig unterdrückt; die Pansengegend ist eingefallen, ebenso die rechte Hungergrube. Kotablatz findet häufig statt, die Kuh drängt, und im Strahle entleert sich dünnflüssiger, schmutzig graugelber, häufig schwarzroter, stinkender Kot. Diagnose: Darmentzündung.

Die Behandlung bestand in Einreiben des Körpers mit erregenden Hautmitteln, Verabreichen von Fieber-, Herzmitteln und Styptica. Das Allgemeinbefinden besserte sich, das Tier wurde lebhaft und aufmerksamer, die Temperatur sank auf 38,9 Grad C, die Temperatur der äußeren Haut wird regelmäßig verteilt. Puls ging auf 60 Schläge in der Minute zurück, er ist gleich- und regelmäßig. Jedoch erwiesen sich alle Styptica gegen den Durchfall als unwirksam. Infolgedessen wollte der Besitzer von weiterer Behandlung Abstand nehmen und veräußerte das Tier zum Schlachten. Eine Zerlegung konnte nicht vorgenommen werden. Da der Besitzer angab, daß sein Kraftfutter einwandfrei sei, wurde die Darmentzündung auf Aufnahme von Nachschatten zurückgeführt, der sich unter den Rübenblättern befand.

Am 5. 10. erkrankte eine zweite Kuh des Bestandes unter den Erscheinungen eines profusen stinkenden Durchfalles.

Status praesens (5. 10.): Kuh, schw.-bt., 5 Jahre alt. Die Kuh ist ziemlich aufmerksam und munter, sie befindet sich in gutem Ernährungszustande. Die Temperatur der äußeren Haut ist unregelmäßig verteilt, die innere Körpertemperatur beträgt 38,7 Grad C (im Gegensatz zum hohen Fieber der ersten Kuh). Der Puls schlägt 84 mal in der Minute, er ist gleich und regelmäßig, die Arterie ist stark gespannt. Die Herztöne sind rein und deutlich wahrnehmbar; der Herzschlag ist pochend. Das Tier atmet 24 mal in der Minute; gleichmäßig unter mäßigem Heben von Rippenkorb und Bauchwand. Huften ist nicht vorhanden. Das Beklopfen der Lungen ergibt vollen Schall, das Aushorchen verschärftes Bläschenatmen. Futter wird verweigert, jedoch werden Leinschleim, Haferfchleim- und Gerstensuspenn in Menge von 2 Litern zweimal täglich aufgenommen. Der Hinterleib ist eingefallen. Der Kot ist dünnflüssig und wird in dickem Strahle entleert. Er ist schmutzig graugelb, stinkend. Diagnose: Darmentzündung. Die Behandlung bestand in Umschlägen, Verabreichung von Herzmitteln und Styptica. Besserung im Befinden trat nicht ein, nach nur zweitägiger Krankheitsdauer verschlechterte sich der Zustand derart, daß die Kuh notgeschlachtet werden mußte.

Fleischbeschaubefund: Leber braunrot, geschwollen, Ränder stumpf, Konsistenz derb, Schnittfläche fettglänzend, Acini hervortretend. Milz um die Hälfte vergrößert, Ränder stumpf. Konsistenz weich. Milzbrei nicht erweicht, Balkensystem deutlich. — Dünndarm bildet im Zwöl-

finger- und Leerdarm daumendicken, festen, fleischigen Strang mit engem Lumen, unter der Serosa finden sich vereinzelte Blutpunkte, ebenso unter den Schleimhautfalten. Die zugehörigen Lymphdrüsen sind kaum merklich geschwollen, in der Rindensubstanz finden sich vereinzelt Blutpunkte. — Das Fleisch des notgeschlachteten Tieres sieht normal aus, die Fleischlymphdrüsen sind makroskopisch ohne Veränderungen.

Der Befund der bakteriologischen Fleischschau: Zur bakteriologischen Untersuchung liegen als Proben die vorgeschriebenen Muskeln, Lymphknoten und sonstigen Organeile vor sowie ein etwa 15 cm langes Stück Dünndarm. Bis auf das Dünndarmstück zeigen die eingefandten Teile keine krankheitsverdächtigen Veränderungen. Der Dünndarm ist diffus mäßig gerötet, die Schleimhaut ist grau-rosarot, geschwollen und stark in Falten gelegt. Auf der Höhe der Falten besteht mäßig starke, teils diffuse, teils ramiforme Rötung. Der aufliegende Darminhalt stellte eine glasige, zähflüssige, nur wenig trübe Flüssigkeit von grauem metallischen Glanz dar. Die mikroskopische Untersuchung des Darminhaltes zeigt, daß die Masse aus dicht angehäuften Epithelzellen besteht. Sowohl im Ausstrich wie im Kulturversuch fällt der geringe Bakteriengehalt auf.

Sämtliche eingefandte Proben sind reichlich, der Darminhalt weniger reichlich, von einer Bakterienart durchsetzt, die folgende Eigenschaften hat: Auf Agar und elektiven Platten und in der bunten Reihe nach Standfuss treten die für die Paratyphusgruppe charakteristischen Merkmale auf; in der Versuchsanordnung nach Lütje wird Traubenzucker, Mannit und Arabinose vergoren. Rhamnosemolke ergibt bei Zusatz von Methylrot eine rote Verfärbung. Wallbildung kommt auf den festen Nährböden nicht zustande. Auf Agar (Strichkultur) erfolgt das Wachstum verschiedentlich in Rosettenform mit allmählich entstehender Faltung der Kolonien.

Agglutination erfolgt in einer Verdünnung bis

1 : 16 000 mit Breslauferum,

1 : 8 000 mit Paratyphus B-Serum,

— mit Gärtnerferum.

Bakteriologische Diagnose demnach: *Bacterium enteritidis breslaviense*.

Die Erkrankung der beiden Tiere muß auf die gleiche Ursache zurückgeführt werden. Es wurde nunmehr, trotz der Versicherung des Besitzers, daß die Kraftfuttermittel einwandfrei seien, eine Besichtigung und Untersuchung des Kraftfutters vorgenommen. Beim Betreten des Kraftfuttermittels fiel ein widerlich ranziger Geruch auf. Während Sojabohnenschrot, Erdnußmehl und Weizenkleie hinsichtlich Aussehen und Geruch keinerlei Veränderungen aufwiesen, zeigen etwa 200 Zentner aufgestapelte Palmkernkuchen vollständiges Verdorbensein. Die Kuchen riechen ranzig und sind mit Schimmel überzogen und durchsetzt. Eine Futtermitteluntersuchung dieser Kuchen in Halle ergab ebenfalls vollständiges Verdorbensein und Ungeeignetheit als Futtermittel.

Am 8. 10. erkrankte noch eine dritte Kuh unter den gleichen Erscheinungen wie die erste Kuh. Temperatur bis 41,8 Grad C. Dieses Tier ist bei gleicher Behandlung wie Nr. 1 genesen. Nach Unterbindung der Verfütterung mit Palmkernkuchen sind weitere Erkrankungen nicht aufgetreten.

Das offensichtliche Zusammentreffen der bei dem einen der erkrankten Tiere nachgewiesenen Paratyphusinfektion mit einer Futtermittelvergiftung findet wohl darin seine Erklärung, daß die Futtermittelvergiftung die Darmwand in ihrer Abwehrkraft geschwächt und dadurch den Eintritt der im Darminhalt enthaltenen Paratyphuskeime in die Körpergewebe vorbereitet hat.

Sonnenlicht und Fensterscheiben.

Von A. Hink, Freiburg i. Br.

Schon 1905 schrieb ich in der ersten Auflage meines Buches: „Einträgliche Rindviehzucht“ Seite 91: „Laßt mehr Sonnenlicht in die Ställe hineinfluten! Es macht die Tiere heiter und leistungsfähiger. Wie traurig stehen die Kühe und namentlich das Jungvieh in den dumpfen, dunkeln Ställen da, wie lichteiche werden sie schließlich und augenschwach! Das Sonnenlicht ist auch ein Feind krankmachender Pilze. In Stallungen, in welche das Sonnenlicht ab und zu kräftig hineindringt, kommen weit weniger Krankheiten vor.“ Leider finden wir noch in sehr vielen bäuerlichen Stallungen viel zu kleine und oft auch zu wenige Fenster, so daß eine Durchsonnung derselben nahezu nie stattfinden kann. Bekanntlich sind es die nicht sichtbar zu machenden ultravioletten Strahlen des Sonnenlichts, die auf die Gesundheit der Tiere einen außerordentlich günstigen Einfluß haben. Nun hat sich herausgestellt, daß gewöhnliches Fensterglas für ultraviolette Strahlen undurchlässig ist. In England wurde dann das sog. Vitaglas erfunden, das ultraviolette Strahlen durchläßt. Versuche mit englischen Schulkindern ergaben, wie Dr. Rich. Herz in Heft 45 der „Umfchau“ d. Js. berichtet, daß solche Kinder, die in mit

Vitaglas erhellten Räumen untergebracht waren, eine auffallende Zunahme an Gewicht, Größe und Hämoglobingehalt des Blutes aufwiesen im Vergleich zu den Versuchskindern in Schulräumen mit Fenstern aus gewöhnlichem Glas. In den Sendlinger Optischen Werken wurde neuerdings ein „Ultraviolettglas“ hergestellt, daß das englische Vitaglas um etwa 50 Prozent an Wirkksamkeit übertreffen soll. Die Ultraviolettstrahlung elektrischer Glühlampen kann man ebenfalls durch Zusammenschmelzen von Ultraviolettglas mit dem gewöhnlichen Glühlampenglas erhöhen. Hoffentlich läßt sich das Ultraviolettglas in Bälde so billig herstellen, daß es auch für Stallfenster verwandt werden kann. Zweifellos kommt Rachitis, namentlich auch bei jungen Schweinen, in solchen Ställen selten vor, die ab und zu bei geöffneten Fenstern kräftig durchsonnt werden. Nach einer Mitteilung von Dr. A. Hartmann in Nr. 25 der Münch. Mediz. Wochenschrift v. Js. erkrankten chinesische Kleinkinder trotz ungünstigster hygienischer Verhältnisse sehr selten an Rachitis, da die Wohnräume keine Glasfenster haben, die das ultraviolette Licht abhalten. Allerdings werden diese Kinder auch sehr lange gestillt.

Innere Medizin und Chirurgie.

Schluep, W.: Studien über Nystagmus bei Tieren speziell beim Rind. (In.-Dissert. Bern 1925.)

Nystagmus kommt bei unseren Haustieren, speziell bei den Rindern, bedeutend häufiger vor als allgemein angenommen wird, d. h. 8 : 1000 bei Rindern aller Altersstufen oder 15 : 1000, wenn man nur Jungrinder und Kühe in die Berechnung zieht, Kälber unter drei Monaten aber ausschaltet. Das Augenzittern tritt auch bei den Tieren in den allermeisten Fällen bilateral auf. Wie beim Menschen kann Nystagmus mit wackelnder Kopfbewegung verbunden sein. Nystagmus ist in vielen Fällen mit Strabismus vergesellschaftet. Die Angabe in der human-medizinischen Literatur, daß Nystagmus erblich sein kann, wird bei den Tieren bestätigt. Als logische Folge davon sollte man Tiere mit Augenzittern von der Zucht ausschließen. Bei Gehirntumoren tritt Nystagmus in einem großen Prozentsatz als Symptom auf. Es gibt auch einen Nystagmus toxicus, wie bei Vergiftung durch Heringslake und Rainfarn, ferner bei der Verabreichung von Chinosol, Kreosot, Lysol und Karbolsäure und bei der Bleivergiftung. Ein Analogon zum Nystagmus der Bergleute findet man bei Tieren, die stets in einem dunklen Stalle gehalten werden. Sehr gute Milchkühe leiden am häufigsten an Nystagmus. Die geringe Größe des Rinderbulbus im Vergleich zur Orbita bildet ein begünstigendes Moment für das Auftreten des Nystagmus. Die Ursache des Nystagmus bei gesunden Rindern ist einer Gehirnanämie zuzuschreiben. A.—

Löhlein, W.: Experimentelle Untersuchungen zur Keratitisfrage. (Archiv für Augenheilkunde 1925, Bd. 96, S. 265.)

Die bei experimenteller Entzündung verschiedenster Ätiologie in der Hornhaut zu beobachtende Zellvermehrung beruht zum mindesten in den ersten Tagen auf einer Einwanderung weißer Blutzellen, die im allgemeinen in der Form eosinophil granulierter, meist polymorphkerniger Zellen auftraten. Eine Vermehrung der bodenständigen Zellen der Hornhaut spielt in diesem Stadium offenbar keine erhebliche Rolle. Eine wesentliche Beteiligung der durch Vitalfärbung gekennzeichneten Histiozyten an der Infiltration der entzündeten Hornhaut konnte in den ersten 40 bis 70 Stunden nicht nachgewiesen werden. Die geschilderten Befunde lassen sich mit der Grawitz'schen Lehre, wonach in die entzündete Hornhaut keine weißen Blutzellen ein-

wandern, sondern die Zellvermehrung ausschließlich auf Ausschmelzung junger Zellen aus der Grundsubstanz beruht, nicht vereinbaren. A.—

Belpel, J.: Über Habronemose der Haut der Pferde (knotige Hautentzündung oder „Sommerwunden“) und einige beobachtete Besonderheiten in Nieder-Languedoc. (In.-Dissert. Toulouse 1924.)

Die Habronemose der Haut der Equiden ist ein juckendes, mit Hypertrophie einhergehendes, periodisch auftretendes, hartnäckiges und rezidivierendes Leiden, welches während der heißen Jahreszeit auftritt und charakterisiert ist durch die Gegenwart von Knoten, zuerst mit käsigen Granulationen, dann fibröser und zuletzt kalkartiger Beschaffenheit im Zentrum, enthaltend eine Larve der Habronema oder seine Reste, oder noch die Höhle, welche sie bewohnte (Synonyma: Sommerwunden, mal d'ane, granulöse Hautentzündung, Psoriasis estivalis, habronemisches Granulom [Australien]). Das Leiden stellt eine häufige und furchtbare Krankheit in Nieder-Languedoc dar. Die Pathognomonische Verletzung, die parasitäre Granulation wird herbeigeführt durch Läsionen, welche diejenigen von der Größe trockener Feigenkerne nicht überschreiten. Diese Knötchen schließen in ihrem Zentrum die Larve einer der drei Habronema-Parasiten ein, welche im Magen der Equiden vorkommen. In Frankreich ist es die Larve von Habronema megastomum. H. megastomum und H. muscae haben als Zwischenwirt die Stubenfliege (Musca domestica), die Stechfliege (Stomoxys calcitrans) der Stallungen ist der Zwischenwirt der Habronema microstomum. Die Fliegen übertragen die Larven auf die bei Equiden vorhandenen Wunden, die Larven dringen in die Tiefe der Wunden und verwandeln die gewöhnlichen Wunden in die sog. „Sommerwunden“. Gefährlich ist nicht dasjenige Pferd oder Maultier für die Übertragung, welches mit Haut-Habronemen behaftet ist, sondern dasjenige, welches die Parasiten in seinem Magen beherbergt. Die Haut-Habronemose ist eine Affektion, die nur an die Jahreszeit gebunden ist (rezidivierend); die Rezidivie wurden während langer Jahre bei demselben Pferde beobachtet. Wahrscheinlich ist das dadurch zu erklären, daß die Entwicklung sich vollzieht nur bei den Equiden, welche mit Habronema im Magen behaftet sind. Merkwürdig ist auch, daß die Sommerwunden in denselben Betrieben nur bei gewissen Pferden vorkommen. Die

Vorbeuge würde bestehen in der Vernichtung der Parasiten durch Anthelmintica bei den beherbergenden Pferden (Magen), Bedecken sämtlicher Wunden durch Verband (Juni, Juli, August in Frankreich) gegen Fliegen, die Vernichtung der Eier, Larven der Fliegen und der Habronemaembryonen (biothermische Methode von Roubaud); indirekt wurden hierdurch die Haut-Habronemose verhindert. Die Behandlung der Haut-Habronemose ist sehr schwierig und trügerisch; ein spezifisches Mittel fehlt. Weitere Versuche müssen zeigen, ob die intravenöse Injektion von Novarsenobenzol sich bewähren wird. Durch die Krankheit werden die Pferde entwertet, auch Komplikationen herbeigeführt.

A.—

Willenberg: Eine ungewöhnliche Ursache einer Schlundverstopfung. (B. T. W. 1927, S. 261.)

Verf. wurde zu einer 2½ Jahre alten Kalbin gerufen mit dem Vorbericht, daß sie nicht fresse und viel Schleim und Wasser ausstoße. Es gelang die Schlundsonde bis kurz vor den Magen einzuführen, wo Widerstand verspürt wurde, der zu heftigen Schmerzáußerungen führte (Schreien). Aufblähen bestand nicht. Da es auch am zweiten und dritten Tage nicht gelang, den Schlund wegsam zu machen, so wurde das Tier geschlachtet. Dabei stellte es sich heraus, daß bei dem Rinde sich ein Backenzahn gelöst hatte, der abgeschluckt worden war und sich mit seinen vier Wurzeln in die Schlundschleimhaut 4 cm vor der Cardia eingespießt hatte. Damit erklären sich die Schmerzen bei Einführung der Schlundsonde.

Carl.

Williams, W. L.: Notes upon the Action of Mercurochrome on Horses. (Bemerkungen über die Wirkung des Mercurochroms bei Pferden.) (Cornell University, Ithaca, New York.) (Sonderabdruck aus The North American Veterinarian. 8 Seiten.)

Der Verfasser stellte mit dem Natriumsalz des Dibromoxymercurfluorescein, dem löslichen Mercurochrom, Versuche bei Pferden an. Zunächst ermittelte er die Dosis und stellte fest, daß das Mittel intravenös injiziert in 1proz. wässriger Lösung in Dosen von 4—5 mgr auf das Kilogramm Körpergewicht (18—22 ccm auf 100 Pfd. Körpergewicht) gut vertragen und nach einigen Minuten mit dem Harn, der sich dunkel färbt, ausgeschieden wird. Bei der Injektion ist darauf zu achten, daß von der Arznei nichts ins Unterhautgewebe gelangt, da sich sonst eine ödematöse Anschwellung bildet. Sie verschwindet allerdings, ohne zu eitern, in einigen Tagen. 5—15 Minuten nach der Injektion werden in kurzen Zwischenräumen in reichlicher Menge Fäzes von weicher Beschaffenheit wiederholt entleert, ohne daß im Gegensatz zu Eserin und Arecolin irgendwelche schmerzhaften Erscheinungen dabei beobachtet werden. Dabei dürfte es sich empfehlen, mit dem Mittel bei Kolik, besonders bei der Windkolik der Pferde Versuche anzustellen. Der Arzneistoff wird zum Teil mit den Fäzes aus dem Körper entfernt, und daher werden diese verfärbt. Hinsichtlich seiner Desinfektionskraft wurde das Mittel bei Endometritis und Endocervicitis der Stute versucht. Es wurden Gelatine-kapseln, von denen jede 47 mgr einer 2proz. Mercurochromlanolinsalbe enthielt, in den Uterus gebracht. Das Mittel wirkte anscheinend bei beiden Leiden günstig. Es bleibt 13 Tage im Uterus und in der Vagina zurück. In wässriger Lösung hat sich das Mittel, innerlich verabreicht, als gutes Desinfektionsmittel des Magendarmkanals erwiesen und kann daher vor allem bei heftigen Diarrhöen junger Fohlen versucht werden, besonders da es örtlich nicht reizend und allgemein nicht giftig wirkt.

Bass.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Domagk: Eine für Kurszwecke sehr geeignete Methode zur Darstellung der Zellen des retikulo-endothelialen Systems. (Centralbl. f. Allgem. Pathologie u. Patholog. Anatomie, Bd. 40, 1927, S. 177.)

Verf. fand, daß sich die Zellen des retikulo-endothelialen Systems, namentlich die Kupfferschen Sternzellen der Leber durch intravenöse Injektionen von grampositiven Kokken darstellen lassen. Man legt zu diesem Zwecke an mit Äther oder Urethan narkotisierten und festgebundenen Ratten die Vena femoralis frei und injiziert sodann langsam eine mit 2 ccm NaCl- oder Ringerlösung abgesehwemmte Kultur von Staphylokokken. Tötung der Tiere 15—30 Minuten nach der Injektion, Fixierung der Organstücke in Formalin, Gefrier- oder Paraffinschnitte. Cresylviolett-färbung gibt gute Präparate. Noch schöner wird das Bild bei Gramfärbung der Schnitte und Gegenfärbung mit Alaunkarmin. In den betr. Präparaten sind die Kupfferschen Sternzellen vollgestopft mit Kokken und bieten ein eindrucksvolles Bild dar. In der Milz erweisen sich die Kokken vorwiegend in der Follikelrandzone phagozytiert. Viele phagozytierende Zellen sind auch in den Lungensepten nachweisbar. Ebenso ist die Phagozytose auch an den Endothelien der Glomeruli zu beobachten.

Carl.

Leon, N.: „Accomplément et fécondation du Fasciola hepatica.“ (Ann. de Parasit. 1927, 5, S. 236.)

Die Art der Kopulation des gemeinen Leberegels war bis jetzt noch nicht einwandfrei geklärt. Verf. hatte Gelegenheit, zwei in der Begattung befindliche Exemplare zu finden, die er abbildet und beschreibt. Die Begattung ist eine wechselseitige. Beide Partner nähern sich mit ihren ventralen Flächen und führen den ausgestülpten Cirrus in die Vagina des anderen ein.

Wetzel.

Tscherwakow, W. F.: „Die parasitischen Cestoden und Nematoden der Hunde in Weißrußland.“ (Arch. für Schiff- u. Tropen-Hygiene. 1927, 31, S. 436.)

In Weißrußland erwießen sich die Hunde in 100 Prozent der Fälle mit Würmern behaftet. 96 Prozent der Tiere enthielten Cestoden, während Nematoden in 62 Prozent der Fälle gefunden wurden. Überhaupt am häufigsten war *Dipylidium canium* (46,8 Prozent), von den Nematoden kamen am meisten *Dochmoides stenocephala* (40,3 Prozent) vor. In der Mehrzahl der Fälle konnte eine Infektion mit zwei Parasitenarten nachgewiesen werden, vorwiegend mit *Dip. canium* und *Toxascaris limbata*, ferner *Dip. canium* und *Taenia hydatigena*. In 7,1 Prozent der Fälle wurden *Echinococcus granulosus* gefunden, der eine schwere Gefahr für die Bevölkerung bedeutet.

Wetzel.

Arndt, H. J.: Zur Frage des Vorkommens von Lipoiden in Rotzknötchen. (Bemerkungen zu der gleichnamigen Arbeit von A. Pius in dieser Zeitschrift.) (Aus dem Pathologischen Institut der Universität Marburg. — Direktor Prof. Dr. Versé.) (Zeitschr. f. Infekt.-Krankheiten der Haust. 1927, 31, H. 3, S. 221.)

Arndt hebt gegenüber den Feststellungen von Pius über das „obligatorische Vorhandensein von Phosphatiden“ hervor, daß eine derartige weitgehende histochemische „Präzisierung“ lediglich auf Grund der mikroskopischen Färbungsmethoden nicht zulässig ist. Mehr als eine Trennung in die drei Hauptgruppen: Glycerinester, Cholesterinester, „Lipoide i. e. S.“ vermag die heutige histologische Methodik schlechterdings nicht zu leisten; und auch diese Gruppentrennung hat oft nur einen sehr beschränkten Wert.

Die Ergebnisse zahlreicher neuerer Forschungen haben gezeigt, daß in den Geweben die Fettstoffe eigentlich immer in mannigfaltigen Mischungen auftreten. Die Feststellungen, daß in bestimmten Organen und Geweben oder bestimmten pathologischen Produkten diese und jene Fettstoffe vorkommen, werden damit auf ihren wirklichen Wert zurückgeführt.

Die maßgebende Rolle der örtlichen Gewebsbedingungen für das Zustandekommen der Fettstoffablagerung tritt am Beispiel der Verfettung in den infektiösen Granulomen in eindrucksvoller Weise hervor. Die

labilen Granulationselemente an der Peripherie des nekrotisierenden Zentrums, beim Rotzknoten „die Polyblasten“, die dem retikuloendothelialen System sehr nahe stehen, sind prädisponiert für die Aufnahme von Stoffwechselprodukten. Man beobachtet die scharfe Lieblingslokalisation der Fettstoff- und der Glykogenablagerung an der „Grenze des Toten“. Pathogenetisch oder „lipogenetisch“ kombinieren sich wohl die besonderen Kreislaufverhältnisse mit der toxischen Wirkung der Erreger. Ziegler.

Kotlán, A.: **Durch Hyostrongylus rubidus erzeugte herdförmige Gastritis beim Schwein.** (Közlemények az ősszehasonlító élet és kórtan köréből. 1927, XX, S. 186.)

Bei der Zerlegung eines notgeschlachteten Schweines fanden sich im Bereiche der Fundusgegend in einer Ausbreitung von zwei Handtellern $\frac{1}{2}$ —1 cm große, halbkugelig 3—5 mm hoch über die Schleimhautfläche erhabene, stellenweise sehr dicht nebeneinander sitzende Knoten, deren abgeflachte Oberfläche nicht selten eine deutliche tellerförmige Vertiefung, bei Lupenvergrößerung ferner in der Mitte feine Unebenheiten und verschieden große Vertiefungen erkennen ließen. Die Knoten bestanden aus grauweißem Bindegewebe, das in seiner Mitte eine etwa halbstechnadelkopfgroße, gelblich gefärbte krümelige Masse einschloß. Die Serosa zeigte im Bereiche der Knoten eine leichte Trübung, die zwischen den Knoten liegende Schleimhaut erschien graurötlich und runzelig. In das Bindegewebe der Knoten eingebettet fand man bei der histologischen Untersuchung in der letzten Entwicklungsstufe befindliche Larven des *Hyostrongylus rubidus*, umgeben von dichter zelliger Infiltration und stark entwickelter Eosinophilie. Es konnte nicht entschieden werden, ob der vorübergehende Aufenthalt der Würmer im Schleimhautgewebe eine Epoche des normalen Entwicklungszyklus oder im Gegenteil eine Zufallerscheinung darstellt. Hiernach kommt zu den bisher bekannten drei Erscheinungsformen der durch *Hyostrongylus rubidus* erzeugten Magenveränderungen, zu denen der akute Magenkatarrh, die kruppöse Gastritis und die chronische Gastritis zu zählen sind, noch eine vierte Form, die herd- oder knotenförmige Gastritis, hinzu. Marek.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Regendanz, P. und C. Tropp: „Das Verhalten des Blutzuckers und des Leberglykogens bei mit Trypanosomen infizierten Ratten.“ (Arch. f. Schiff- u. Trop.-Hygien. 1927, 31, S. 376.)

Bei mit Trypanosomen infizierten Ratten ist der Blutzuckerspiegel erst kurz vor dem Verenden stark herabgesetzt. Die Herabsetzung des Blutzuckerspiegels ist im wesentlichen nicht durch den Zuckerverbrauch der Trypanosomen, sondern durch die Einwirkung ihrer Toxine auf die zuckerbildenden Organe bedingt. Der Glykogengehalt der Leber der infolge Trypanosomiasis verendeten Ratten ist herabgesetzt, jedoch noch in ausreichender Menge vorhanden, um den Zuckerspiegel auf normalem Werte halten zu können. Der Tod der mit Trypanosomen infizierten Ratten ist nicht durch eine glykoprive Intoxikation, sondern durch Einwirkung der Toxine der Trypanosomen bedingt. Wetzel.

Löffler: **Einige Bemerkungen zum Schleimwallbildungsphänomen des *B. paratyphi* B.** (Zeitschr. f. Immunitätsforsch. 1927, Bd. 52, S. 124.)

Das schleimige Wachstum des *Bact. paratyphi* B bei Zimmertemperatur und somit auch das Wallbildungsphänomen wird darauf zurückgeführt, daß dieser Keim bei Zimmertemperatur als Kapselbakterium wächst. Sämtliche auf die Darstellung der Kapsel gerichteten Versuche versagten aber vollkommen. Mithin muß die Schleimkapsel als sehr zart angenommen werden. Der Nachweis ihrer Existenz wird durch die Fällungsreaktion zu führen gesucht.

Bei Zimmertemperatur gewachsene Stämme waren inagglutinabel, wurden aber durch Erhitzung in saurer Lösung agglutinabel, d. h. nach Entkapselung durch Hydrolyse der Proteinhüllen. Die bei 37 Grad und bei 0 Grad gehaltenen Stämme wurden agglutiniert. Bei diesen Temperaturen soll die Entkapselung und damit auch das Verschwinden des Schleimwalles durch Autolyse der Proteinhüllen bewirkt werden. Danach beruht die Inagglutinabilität der Kapselbakterien auf der Behinderung der Ausflockung durch die Kapseln. Auf Grund der Ergebnisse der Agglutination sowie der Ammoniumsulfat- und der Säurefällung glaubt Verf., das bei Zimmertemperatur gewachsene *Bact. paratyphi* B als Kapselbakterium auffassen zu müssen. Das gleiche gilt für *Bact. enteritidis* Gärtner und wahrscheinlich auch für alle anderen wallbildenden Stämme. Meyn.

Nahrungsmittelhygiene.

Csontos, I.: **Die Sporotrichose der Eier.** (Közlemények az ősszehasonlító élet és kórtan köréből. 1927, XX, S. 160.)

Als Ursache des in Ungarn im Laufe eines Winters bei 20 Prozent, in einem anderen Jahre bei 50 Prozent der auf den Markt gebrachten Eier nachgewiesenen Verdorbenseins wurde ein dem von Beurmann, Matruchet und Ramond beschriebenen sehr ähnliches, wenn nicht damit übereinstimmendes Sporotrichum gefunden. Dieser Pilz läßt feine rundlichen Kolonien unmittelbar an der inneren Fläche der unbeschädigten Eischale und später auch an der inneren Fläche der Eihaut entstehen, die beim Durchleuchten des Eies als rundliche, blaßrote, dunkelrote, schwarzrote Flecke in Erscheinung treten, wobei das Auftreten der dunkleren Farbtöne mit dem Alter und dem Dickendurchmesser der Kolonien Hand in Hand geht. Das durch den Pilz zu einer gelatinösen Gerinnung gebrachte Eiweiß bleibt nach dem Aufbrechen des Eies zusammen mit der Pilzkolonie als ein der Eischale anhaftendes knopfartiges Gebilde zurück, nach dessen Ablösung eine schokoladebraune Verfärbung der Eischale sichtbar wird. Außerdem kommen häufig auch frei schwimmende Pilzkolonien vor. Der Pilz scheint auch die unverfärbte Eischale durchdringen zu können und dürfte sich in nassen Jahren besonders stark in der freien Natur vermehren. Beim Befallen des Futters und der Streu in den Brutnestern gelangen Pilzsporen in großer Menge auf die Oberfläche des Eies noch vor dem Eintrocknen der Cuticula, werden beim Eintrocknen der Cuticula auf der Eioberfläche fixiert und keimen dann bei genügender Wärme und Feuchtigkeit aus und dringen dabei vielfach auch in das Innere des Eies ein.

Zur Vorbauung sollte man für das Reinhalten der Hühnerställe und der Brutnester, ferner für deren Desinfektion Sorge tragen, die Schale der Eier durch Abwischen mit Alkohol von anhaftenden Pilzsporen befreien und nach Trocknen zwischen reinem Fließpapier an einem trockenen, luftigen, reinen Orte aufbewahren. Marek.

Trawinski, A.: **Kritische Bemerkungen zur Müllerschen Theorie über die Latenz der Paratyphusinfektionen der Schlachttiere.** (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. Bd. 38, S. 41/42.)

Gegenüber den Ausführungen von Prof. Dr. Müller in Nr. 28, Jg. 78 der M. T. W. betont Trawinski zum letzten Mal, daß, solange Prof. Müller konkrete Untersuchungen nicht zu veröffentlichen vermag, seine These über latenten Mikrobismus in der Muskulatur der Schlachttiere als völlig unbegründet zu erachten ist, und daß er es so lange auch seinerseits für unzweckmäßig und für einen unnötigen Zeitverlust halten muß, auf dieses Thema überhaupt noch einzugehen. Edelmann.

Elsässer, Chr.: **Wird durch die innerliche Verabreichung von Chinofol das Fleisch unserer schlachtbaren Haustiere in Bezug auf Farbe, Geruch oder Geschmack beeinträchtigt?** (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 38. Jg., S. 26—28.)

Zur Entscheidung der vorliegenden Frage hat Elsässer

Fütterungsversuche an Kälbern und Schweinen angestellt mit dem Ergebnis, daß durch die innerliche Verabreichung von Chinofol und zwar in verhältnismäßig großen Mengen das Fleisch weder in Bezug auf Farbe, noch auf Geruch und Geschmack in irgend einer Art und Weise ungünstig beeinflusst wird, und daß durch das Mittel auch die großen Körperparenchyme in keinerlei Weise geschädigt werden.

Edelmann.

Weber, H.: Die wechselseitigen Beziehungen intravitaler Fleischvergifterinfektionen von Großrindern und Kälbern zur Außenwelt. (Aus dem Veterinär-Untersuchungsamt der staatl. Auslandsfleischbeschaustelle zu Stettin-Freihafen.) (B. T. W. 1927, S. 521.)

Verf. hat sich die Mühe genommen, in Fällen von positivem Fleischvergifterbefund bei zur Untersuchung eingeschickten Fleischproben den Herkunftsort, d. h. den Stall, aus dem das betr. Tier stammte, mit seiner Umgebung bakteriologisch zu untersuchen, sowie das Blutserum der in dem betr. Ställe befindlichen Tiere serologisch auf ihr Verhalten gegenüber den Bakterien der Paratyphusgruppe zu prüfen. An der Hand von fünf Einzelfällen zeigt Verf., daß es oft gelingt, bei den Insassen derartiger Ställe, namentlich bei Kälbern, hohe Agglutinationswerte festzustellen, so daß eine überstandene Infektion mit Fleischvergiftern angenommen werden mußte. In einem Falle gelang es, in dem Erdbreich um einen Brunnen sowie in dessen Wasser Gärtnerbazillen nachzuweisen. Verf. faßt das Ergebnis seiner Untersuchungen folgendermaßen zusammen:

Gärtnerinfektionen des Jungviehs sind oft die Ursache ruhrartiger Erkrankungen, die geeignet sind, der Zucht die schwersten Schäden zuzufügen. Aber auch das Großvieh ist derselben Infektion ausgesetzt, wenn prädisponierend Erschöpfung und Krankheit die Widerstandskraft des Körpers lähmen. Außerdem konnte bewiesen werden, daß die bakteriologische Untersuchung von Kot, Jauche, Erde, Trinkwasser, Haaren des Felles usw. unerlässlich ist, daß aber nicht in jedem Falle das Kulturverfahren Aufschluß über das Vorhandensein eines Fleischvergifterherdes gibt, sondern daß lediglich oft nur die Blutuntersuchung, der serologische Befund, neuerdings im Veterinäruntersuchungsamt in Stettin in Erweiterung mit dem Blutbild (Hämogramm Preßler) einzig sichere, schnelle Anhaltspunkte liefert. Es muß deshalb als eine lohnende Aufgabe der Untersuchungsämter bezeichnet werden, gerade die Orte der Infektion in den Untersuchungsbereich einzubeziehen, um die Beziehungen zur Außenwelt klarzustellen. Die Feststellung von Fleischvergifterfunden bei dem eingelieferten Material und die eventuelle Anordnung von Desinfektion reichen für sich allein nicht aus, wirksam die Zahl der Fleischvergifterfälle wenigstens auf ein Minimum herabzudrücken.

Die Bedeutung solcher weitergehenden Untersuchungen ist unverkennbar, denn sie machen die Ergebnisse der bakteriologischen Fleischschau nutzbar:

1. der Erforschung der Infektionsquelle,
2. der Aufdeckung latenter Seuchenherde,
3. der Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten,
4. der Vorbeugung einer Verschleppung der Krankheit durch verseuchte Tiere in andere Gehöfte und Ortschaften, der Inverkehrgabe des Fleisches klinisch noch gesunder, aber bereits infizierter Tiere,
5. der Verhütung postmortalen Infektionen des Fleisches anderer gesunder Tiere durch infektiöses Haar material und durch infizierte Hände gelegentlich der Abhäutung,
6. der Verhütung der Entstehung neuer lokaler Infektionsherde durch infizierte Häute, Haare, Gerätschaften usw.,
7. der Erkennung latent mit Fleischvergiftern infizierter Schlachttiere.

Carl.

Zaribnicky, F.: Die tierärztliche Kontrolle in Vorzugsmilchviehstallungen. (W. t. Mskr. 1927, Jg. XIV, S. 450.)

Die Kontrolle zerfällt in die klinische Untersuchung der Milchtiere einschließlich Tuberkulinreaktion und in die Untersuchung der Milchproben. Es wurde die Leukozytenprobe nach Trommsdorff, der Gehalt an Chlor und Milchzucker ermittelt und daraus die Chlorzuckerzahl berechnet. Zur Bestimmung des Chlorgehaltes wurde das Kaliumpermanganatverfahren nach v. Koranyi angewendet, in der von Zaribnicky angegebenen Weise. Die Milchzuckerbestimmung erfolgte nach dem jodometrischen Verfahren von J. M. Kolthoff in einem aus der Milch hergestellten Serum nach C. Carrez. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind tabellarisch zusammengestellt. Berge.

Geflügelkrankheiten.

Dietrich, A.: Ein Fall von Hauttuberkulose bei einer Pute. (B. T. W. 1927, S. 694.)

Verfasser beobachtete diese beim Geflügel sehr seltene Tuberkuloseform bei einer vier Monate alten stark abgemagerten Pute. Am Kopfe des Tieres finden sich zahlreiche bis haselnußgroße Wucherungen, die ihren Ursprung anscheinend von den natürlichen Körperöffnungen nehmen. Die Neubildungen sind entweder abgespaltet, oder sie zeigen ein kugeliges bzw. kegelförmiges Aussehen. Ihre Farbe ist schmutzig graubraun. Auf dem Durchschnitt bestehen die Wucherungen aus einer gelbroten, bis 1 cm dicken Membran und einem grauweißen Granulationsgewebe im Innern. In letzterem konnten mikroskopisch zahlreiche sehr schlanke, säurefeste Stäbchen nachgewiesen werden. Die inneren Organe der Pute waren ohne tuberkulöse Veränderungen. Der Tod des Tieres erfolgte jedenfalls infolge der hochgradigen Abmagerung und Erschöpfung, die bedingt war durch ungenügende und infolge des Leidens behinderte Futteraufnahme. Die Ansteckung war vermutlich verursacht durch infektiöses Material vom Rinde, da eine Infektion mit Geflügeltuberkelbazillen ausgeschlossen werden konnte.

Carl.

Klimmer, M. und H. Haupt: Ein Beitrag zur Ätiologie und Bekämpfung der Gallinarumbazillose der Küken.

(Aus dem Veterinär-Hygienischen Institut der Universität Leipzig. — Direktor: Obermedizinalrat Prof. Dr. Klimmer.) (B. T. W. 1927, S. 681.)

Unter zwei an einen Geflügelhof gelieferten Sendungen von 507 bzw. 700 Eintagsküken trat sofort bzw. einige Tage nach dem Eintreffen eine feuchenhafte Krankheit auf, die viele Opfer forderte. Durch die Sektion wurden in der Hauptsache die Erscheinungen einer Pneumonie festgestellt. Mikroskopisch waren kleine teilweise kokkenähnliche Stäbchen bei Methylenblaufärbung nachweisbar, deren Mitte sich nur schwach oder gar nicht tingierte. Die kulturelle und biologische Untersuchung ergab, daß es sich um Stämme des *Bac. gallinarum* Klein (1889) handelte. Genauere Angaben über das diesbezügliche Verhalten des Krankheitskeimes im Originale.

Da allgemeine hygienische Maßnahmen die Seuche nicht zum Stillstand brachten, so wurde dem Besitzer die Verabreichung von Ventralse (Kollargollösung mit einem Schutzkolloid) in Trinkwasser, ein Kindereßlöffel voll auf je ½ Liter Flüssigkeit, empfohlen. Schon nach einmaliger Verwendung des Präparats trat sichtliche Heilung bzw. Verminderung der Todesfälle ein. Es gelang, so durch viertägige Gaben von Ventralse das Sterben, dem kurz vorher noch täglich 6—10 und mehr Küken zum Opfer fielen — in 21 Tagen waren von 1207 Küken 800 verendet — vollkommen zum Stillstand zu bringen.

Carl.

Martin, H. M. and J. F. Olney: A more refined method for obtaining blood from fowls for serologic work. (Journal of the American Veterinary Medical Association 1927, 70, S. 652.)

Die gebräuchliche Methode der Blutentnahme wird für grausam gehalten. Daher schlägt man vor, das Blut mit einer kleinen Rekordspitze zu entnehmen. Die Nadel wird in die Vene des zurückgebogenen Flügels eingeführt mit der Spitze dem Blutstrom entgegen. Allerdings betonen die Verfasser, daß bis zur Beherrschung der Technik einige Übung notwendig ist.

Schoop.

Jármái, J.: Todesfälle bei erwachsenen Hühnern infolge von Infektion mit dem *Bacillus pullorum*. (Allatorvosi Lapok. 1927, Nr. 20, S. 245.)

Während die weiße Ruhr bei Küken in Ungarn seit dem Jahre 1921, zu welcher Zeit das Vorkommen der Krankheit in Ungarn zuerst Manning er festgestellt hatte, nur in vereinzelten Seuchenausbrüchen zum Vorschein kam, hat man im Jahre 1927 eine bedeutende Häufung solcher Seuchengänge beobachtet. Besonders interessant zeigten sich die Erkrankungen in einem etwa 120 Hennen zählenden Hühnerbestand, in dem im Vorjahre die weiße Ruhr bei Küken sehr empfindliche Verluste nach sich zog, schließlich aber von selbst aufgehört hatte, während sie im darauffolgenden Frühjahr plötzlich unter den erwachsenen Tieren auftauchte und im Laufe eines Monats fünf Hennen und zwei Hähne hinwegraffte. Die pathologisch-anatomischen Veränderungen zeigten ein chronisches oder subakutes Gepräge ohne jedwede Zeichen einer hämorrhagischen Diathese. Insbesondere fand man bei sämtlichen obduzierten Hennen einen Teil der Eier birnenförmig gestaltet, von trüber und grauer Farbe, die Theca folliculi zusammengeschrumpft. Aus den veränderten Eiern ließ sich der *Bac. pullorum* in Reinkultur herauszüchten. In der Leber wurde entweder nur vermehrte Blutfülle oder das Vorhandensein von hanffamengroßen, gelblichen Nekroseherden beobachtet, die vorwiegend oberflächlich liegend und perivaskulär angeordnet und von einem Wall aus dichtgedrängten Eosinophilen umgeben waren. Daneben fand man auch durch dichtgedrängte Exemplare des *Bac. pullorum* gebildete mikroskopische Herde. Im Herzmuskel kam es zur Entwicklung von gleichmäßig grau gefärbten, scharf abgesetzten, sich derb anführenden Infiltrationsherden mit Bakterienghalt, ähnlich den im Verlaufe der bösartigen Maul- und Klauenseuche vorkommenden Herden. Die Milz zeigte sich durchweg mehr oder weniger, manchmal sogar bedeutend hyperplastisch geschwollen. Der Darm, namentlich das Duodenum, fand sich nur in einem Fall stärker verändert, mit kruppösen Exsudat belegt. In der Lunge konnte man nur mikroskopisch das Vorhandensein von bakterienhaltigen nekrotischen Herdchen nachweisen. Mit Hilfe der Agglutinationsprobe erwiesen sich 60—65 Prozent des Bestandes als infiziert. (Agglutinationswert 1000.)

Marek.

Standesangelegenheiten.

Die Landwirtschaft gegen das Dispensierrecht.¹⁾

Die Apothekerzeitung bringt in der Nr. 10 vom 4. Februar unter Einfendungen aus dem Leserkreise, für die der Einsender die Verantwortung trägt, folgendes Eingefandt:

Ein vernichtendes Urteil über den Tierarzneimittelhandel durch die Tierärzte von Seiten der gesamten schleswig-holsteinischen Bauernschaft.

In 18 Kreisstädten Schleswig-Holsteins fanden am 28. Januar gewaltige Bauernkundgebungen statt. Wie der Apotheker, hat auch der Landwirt um die Rentabilität seines Gewerbes schwer zu ringen. Die Forderungen, die die Bauernschaft gegen die Zugrunderichtung ihrer Betriebe zur restlosen Erfüllung an das zuständige Ministerium richtete, kann der deutsche Apothekerstand alle ohne Ausnahme anerkennen. Es sind im ganzen zehn. Für uns Apotheker und darunter wieder besonders die Kleinstadt- und Landapotheker ist die zehnte For-

derung von eminenter Bedeutung. Sie lautet wörtlich: „Ablehnung des unkontrollierbaren, das gesamte Landvolk schädigenden Handels der Tierärzte mit Medikamenten. Der Tierarzt soll Arzt sein und nicht Händler. Wir wollen, wie bisher, bewährte Tierarzneimittel, ohne an den Tierarzt gebunden zu sein, aus unseren Landapotheken beziehen können.“

Das ist deutlich geredet, bravo! Drucken lassen sollte man sich das, auffällig und groß und in seiner Apotheke aufhängen als Aufklärungs-Werbeplakat!

Die Worte dieser zehnten Forderung sind so klar gefaßt, daß sie auch nicht den geringsten Zweifel lassen, daß der Handel mit Tierarzneimitteln durch die Tierärzte absolut nicht notwendig ist, daß er das Landvolk schädigt, so daß er sich dagegen verwahren muß. „Arzt soll der Tierarzt sein, nicht Händler!“ Unkontrollierbarer Handel heißt es, und damit ist der Nagel auf den Kopf getroffen! Der Handel ist nichts weiter als Profitucht, sacro egoismo! Die ganzen Argumente der Notwendigkeit des Handels und der direkten Abgabe von bezogenen oder unfachgemäß hergestellten Medikamenten durch die Tierärzte brechen in sich zusammen, denn sie sind an den Haaren herbeigezogen! Die schleswig-holsteinische Bauernschaft ist geschlossen für ihre Landapotheken eingetreten! Das sollte die deutsche Apothekerschaft ihr danken! Ich will das als ferner, aber treuer Sohn meiner holsteinischen Heimat hier und an anderer Stelle noch ganz besonders tun. Hier einzuhaken und die Gelegenheit beim Schopf zu fassen, endlich die Abschaffung des Dispensier-„Rechtes“ der Tierärzte durchzusetzen, ist Sache des Vorstandes des Deutschen Apotheker-Vereins. Die gesund denkende Bauernschaft will ja selbst ihre Tierarzneien aus der Apotheke kaufen, aus der Empfindung heraus, daß sie dort fach- und fachgemäßer beziehen kann und vor allen Dingen preiswerter.

Dr. Wilhelm Meyer, Sayda i. Erzgeb., Bez. Dresden.

Wer dies liest, wird sich sagen, die Tierärzte hätten in ihrem Abwehrkampf, den sie gegen die Angriffe der Apotheker auf das Dispensierrecht seit über 100 Jahren führen müssen, falsche Behauptungen aufgestellt, wenn sie die Belange der Landwirte für die Beibehaltung des Dispensierrechts in den Vordergrund gestellt haben und die Behauptungen seien nun zusammengebrochen. Hierzu ist zu bemerken, daß bereits der Erlaß (von Altenstein) vom 23. Juli 1833 die Notwendigkeit des Rechtes für die Landwirtschaft hervorhebt, die Tierärzte also gar nicht Väter dieses Gedankens sind. Liest man den Bericht des „Störboten“ in Kellinghusen vom 30. Januar über die Versammlung in Itzehoe, die scheinbar die bedeutendste von den 18 Kreisversammlungen gewesen ist, denn der Vorsitzende der Landwirtschaftskammer, Graf von Rantzau-Breitenburg wohnte ihr als Ehrengast bei, so hat die Sache doch ein etwas anderes Gesicht. Außer der durch die Bauernvereine vertretenen Landwirtschaft waren sämtliche Organisationen des städtischen Grundbesitzes, der Handwerker, des Handels und Gewerbes, kurz, der gesamte ländliche Mittelstand aufgeboten, die in ihrem Gedeihen in einer rein ländlichen Provinz von dem der Landwirtschaft abhängen. Die traurige Lage der Landwirtschaft betrifft auch jene Kreise und so schlossen sich Landwirtschaft und Mittelstand zusammen, um desto machtvoller auftreten zu können. Der Bericht des „Störboten“ befragt hierüber: „Es mögen schätzungsweise 5000—6000 gewesen sein, die ihren ernststen Willen bekundeten, sich nicht mehr mit Redensarten abspäßen zu lassen, sondern Taten sehen wollen. Gleichzeitig fand eine Kundgebung des gesamten Mittelstandes statt. Die Geschäfte in Itzehoe und auch in einigen andern Orten hatten während dieser Stunden geschlossen. Sämtliche Organisationen des Handels und Gewerbes waren erschienen. Geladen waren ebenfalls die Spitzen der Behörden.“

Daß neben der Landwirtschaft auch die Belange des gesamten Mittelstandes ausgiebig zur Sprache kamen, ergibt sich aus den Rednern, denn neben zwei Amtsvorstehern kamen sechs Landwirte, wenn man den Siedler diesen zählen will, ein Buchhändler, ein Maurermeister und ein Kaufmann zu Worte. Wechselrede gab es nicht, und debattelos wurden die 10 Punkte der vorher vorbereiteten Kundgebung angenommen, von denen jeder Punkt wieder eine ganze Reihe Sonderforderungen umfaßte. Die Teilnehmer werden sich selbst gesagt haben, daß bei dieser Fülle von Forderungen sich nur ein kleiner Teil verwirklichen lassen wird. Vergleicht man die übrigen Punkte des hochpolitischen Programmes: Grundlegende Änderung unserer Handels-

¹⁾ Siehe D. T. W. 1928, Nr. 6, S. 98. Die Schriftl.

politik mit dem Ziel der Nahrungsmittelfreiheit vom Auslande, Unterbindung der Einfuhr von Luxusartikeln, Übernahme der Grundschuldrentenbankzinsen auf das Reich, Realkredit von höchstens 6 Prozent, Beleihungsgrenze bis auf 50 Prozent des Wehrbeitragswertes, Unterbindung der hemmungslosen Ausgabewirtschaft in Reich, Staat und Kommunen, Beseitigung der ungerechten Gewerbesteuer, Anpassung der sozialen Fürsorge an die gegebenen Verhältnisse, strenge Prüfung der Gebührenordnungen der freien Berufe, weitestges Entgegenkommen der politischen Parteien hinsichtlich der Kandidatenliste bei den nächsten Wahlen, planmäßiger Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und Abbau der Wohnungämter, Abbau des Beamtenapparates, Widerruf der Alleinschuld am Weltkriege usw., um nur einige der Forderungen herauszuheben, mit dem Punkte 10: Ablehnung des Arzneimittelhandels der Tierärzte, wir wollen unsere bewährten Tierheilmittel aus unseren Landapotheken beziehen, so sieht dieser letzte Punkt wie bestellte Arbeit aus.

In ihrem Offensivkampf gegen das Dispensierrecht haben die Apotheker in letzter Zeit eine bemerkenswerte Unwahrheit an den Tag gelegt. Die Resolution des deutschen Apothekervereins auf seiner 52. Tagung in Düsseldorf 1926 spricht von einer Zurückverlegung des tierärztlichen Dispensierrechtes in die Apotheken. Eine Unwahrheit, denn diese haben es nie befehlen. Es folgte 1927 am 25. und 26. Juni die Tagung des deutschen Veterinärrates in Leipzig, wo der Leitsatz aufgestellt wurde: Die Beibehaltung des Dispensierrechtes ist eine zwingende Notwendigkeit, welche im Interesse der Landwirtschaft und des tierärztlichen Berufes liegt. Das Recht muß auch für die Länder verlangt werden, in denen es bisher nicht besteht. Dieser Beschluß führte in Nr. 58 der pharmazeutischen Zeitung vom 20. Juli 1927 zu der Drohung, die landwirtschaftlichen Zeitungen mit entsprechenden Artikeln zu versehen (D. T. W. Nr. 31, 1927, S. 511). Die pharmazeutische Zeitung gab dabei an, der Kampf um das Recht sei ein Abwehr- und Existenzkampf für die kleineren, besonders die Landapotheken, vergaß dies aber bereits vier Sätze später und behauptete, es würde sich zeigen, daß die dem Interesse der Allgemeinheit dienenden Gründe auf Seiten der Apotheker lägen.

Der angekündigte Kampf begann mit einem Vorpstengefecht in der rheinischen landwirtschaftlichen Tagespresse: Westdeutsche Tageszeitung vom 20. September, Nr. 216, wo ein Dr. Kunkel sich mit dem Beschluß des deutschen Veterinärrates befaßte. So, wie er wirklich gefaßt war, paßte er allerdings nicht in den Plan der Apotheker. Von Herrn Dr. Kunkel wurde daraus die angeblich gestellte Forderung der Tierärzte gemacht, daß alle Tiermedikamente ausschließlich nur von Tierärzten abgegeben werden dürften. Gegen den angeblich erstrebten Monopolcharakter — eine Windmühle — kämpfte er nun mit allen möglichen Gründen. Der Artikel fand eine durchaus ruhige, sachliche Entgegnung von Dr. Flatten in Köln in Nr. 234 derselben Zeitung vom 11. Oktober. Der gleiche Kunkel'sche Artikel ist in zahlreichen landwirtschaftlichen Blättern veröffentlicht und hat auch von Train in Nr. 49 der tierärztlichen Mitteilungen eine Besprechung erfahren.

Nach diesem Vorpstengefecht trat das Gros des deutschen Apothekervereins auf den Plan. Zu gleicher Zeit wurden Artikel in Nr. 263 der westdeutschen Tageszeitung vom 15. November und in Nr. 269 der Rheinischen Bauernzeitung veröffentlicht. Diese Artikel brachten ungeheure unbewiesene Angriffe auf die Tierärzte und die Art der Ausübung des Dispensierrechtes und behaupteten im vorletzten Schlußsatz nichts mehr und nichts weniger, daß in Seuchenzeiten jeder Landwirt befähigt und berechtigt sei, seine Tiere mit Impfstoffen zu behandeln, die aus den Landapotheken in einwandfreiem Zustande entnommen und ohne Zuhilfenahme des Tierarztes angewendet werden könnten. Es war schwer, hierauf eine Antwort in parlamentarischer Form zu geben. Ich habe das in der Nr. 267 der Westdeutschen Tageszeitung getan. Sie ist in Nr. 50, Jahrgang 35 der D. T. W. abgedruckt. In der Rheinischen Bauernzeitung ist der gleiche Artikel auf Veranlassung der Rheinischen Tierärztekammer am 24. November in Nr. 276 erschienen.

Wir wollen uns gewiß nicht weiß waschen und ohne weiteres zugeben, daß in einzelnen Dispensieranstalten nicht alles so ist, wie es sein soll. Sache der Regierungs- und Veterinärräte wird es sein, hier die säubernde Hand anzulegen. Verfehlungen einzelner aber nun zu verallgemeinern und den ganzen Stand mit ungeheuren Anwürfen zu be-

denken und das von der Spitzenorganisation der Apotheker, die mit diesem auf die Masse der bauerlichen Bevölkerung eingestellten Artikel diese noch zur Kurfürsterei in Seuchenzeiten aufforderte, geht nun doch entschieden zu weit. Es kommt dazu, daß diese Herren doch gewiß im Glashaufe sitzen. Wir haben in Köln in letzter Zeit gleich 2 Prozesse erleben müssen, in denen Apotheker wegen verbotswidriger Abgabe von Morphinum — in einem Falle wurde im Laufe eines Jahres ohne Rezepte ein ganzes Kilo Morphinum abgegeben — bestraft wurden, und bei deren einem laut Kölnischer Zeitung vom 24. Dezember, Nr. 809, festgestellt wurde, daß in der Apotheke die größte Unordnung und Unsauberkeit herrschte. Was würden die Apotheker sagen, wenn unsere Spitzenorganisation nun behaupten würde, in allen Apotheken herrschte Unordnung und Unsauberkeit und die Vorschriften über Morphinumabgabe würden nicht beachtet? Jedenfalls haben wir im Rheinland zur Zeit Ruhe.

Anders scheint es nun in Schleswig-Holstein zu sein. Hier ist die Saat Dr. Kunkels aufgegangen, die außer in Artikeln in der ländlichen Lokalpresse auch mit Flugblättern verbreitet wurde, von denen eins Dr. Albien in Nr. 6 der D. T. W. genügend gekennzeichnet hat und in denen unter Fälschung der Leipziger Beschlüsse des D.V.R. am 25. und 26. Juni behauptet wird, die Tierärzte erstrebten ein Monopol des gesamten Tierarzneimittelhandels und hat zu dem obigen Punkte 10 geführt. Von jeher werden etwa 80 Prozent aller Arzneien für erkrankte Haustiere unter Umgehung des Tierarztes aus den Apotheken bezogen. Der Landwirt, insbesondere der wirtschaftlich schlecht stehende Kleinbesitzer geht zum Tierarzt nur in höchster Not. Bei scheinbar unbedeutenden Erkrankungen geht er zum Apotheker. In fast jeder Landapotheke hängt ein Schild „Tierarzneimittel“. Drufe-, Freß-, Malt-, Milch-, Rotlauf-, Unfruchtbarkeitspulver, Fluid, Euterfarben usw. werden zuerst angewandt, bis zum Schluß, oft wenn es zu spät ist, der Tierarzt noch geholt wird. Der kleine Landwirt liebt es auch, ein wenig mit dem Apotheker zu pfeuschen und hiervon wird ihm keine Belehrung und keine üble Erfahrung abbringen.

Wenn man nun einer durch Not aufs äußerste aufgebrachten ländlichen Bevölkerung, der es schlecht geht infolge der Zeitumstände, hohe Arbeitslöhne, Steuern, die sie früher kaum gekannt haben, einer ins untrüglich gesteigerten sozialen Fürsorge, deren Kosten zum größten Teil auf dem Arbeitgeber ruhen, wenn nun noch infolge ausländischer Konkurrenz der Absatz für Schweine und Kühe stockt, noch vorredet und sie es auf Flugblättern schwarz auf weiß lesen, nun kommen zu alledem auch die Tierärzte noch und wollen, daß Ihr alle Eure Arzneien für Eure kranken Tiere nur mehr von Ihnen kauft, hierbei müßt Ihr bei jeder Arznei noch eine Rezeptgebühr zahlen, wenn man ihnen also das Gespenst eines Arzneimonopols der Tierärzte an die Wand malt, so wäre es verständlich, daß es auf Grund solcher unwahren Behauptungen zu Beschlüssen wie der Punkt 10 kommen könnte.

Bis hierher bin ich dem „Störboten“, einem kleinen, nur für Kellinghufen Bedeutung habenden Lokalblatt gefolgt, und von solchen hat ein Teil die Forderungen der Landwirtschaft und die des Mittelstandes zusammengezwungen, zum Teil unter Dämpfung einiger Unterführer, wie Dr. Albien in Nr. 6 der D. T. W. angibt. Ließt man aber die größere Provinzpresse, z. B. die Itzehoeer Nachrichten, so finden sich in den offiziellen Forderungen der Landwirtschaft nur 7 Punkte, ein Punkt 10 mit Tiermedikamenten findet sich nicht darunter. Diese Forderung ist also gar keine der Landwirtschaft, sondern des Mittelstandes und in den kleinen Landstädtchen spielt der Apotheker eine große Rolle, so daß es an einzelnen Stellen gelang, eine Entschliebung gegen das von den Apothekern den Tierärzten imputierte Arzneimonopol in die Beschlufassung hineinzubekommen. Keineswegs hat diese Entschliebung an allen 18 Kreisorten stattgefunden.

Es ergibt sich für die Kampfweise der Apotheker folgendes traurige Bild. Die Entschliebung des Deutschen Veterinärrates in Leipzig betreffs des Dispensierrechtes, eine Abwehrentschliebung auf die Angriffe der Apotheker, wird von Dr. Kunkel umgefälscht in eine Angriffsentschliebung mit der Forderung eines Monopols für den Tierarzneimittelhandel. Diese gefälschte Entschliebung wird in die landwirtschaftliche Provinzial- und Lokalpresse gebracht und überdies den Landwirten in Flugblättern schwarz auf weiß zu lesen gegeben. Die traurige Veranlassung der aus der Not der Zeit zum Kochen gekommenen Bauernseele benutzen die Apotheker schnell, um auf ihr ihre Suppe zu kochen.

Es gelingt ihnen an einzelnen Orten, keineswegs an allen 18 Kreisorten am 28. Januar, unter die Forderungen des Mittelstandes den Punkt 10 durch Düpierung von Unterführern durchzubekommen. Diese rein örtlichen Forderungen des Punktes 10 nimmt nun Dr. W. Meyer, wohlgerichtet unter dem Strich unter den Einfendungen, für die die Redaktion der Apothekerzeitung nicht verantwortlich ist, zum Anlaß einer Lobeshymne auf die gesund denkende Bauernschaft, die ihre Arzneien aus den Apotheken kaufen wolle, wobei es ihm dann auch nicht darauf ankommt, den Anschein zu erwecken, der vereinzelt reingefummelte Punkt 10 sei in allen 18 Kreisverfammlungen am 28. Januar als Forderung der Landwirtschaft aufgestellt und ihr eine Entschliebung unterzuschoben, die sie gar nicht gefaßt hat. Hier einzuhaken und die Gelegenheit beim Schopf zu fassen, endlich die Abschaffung des Dispensierrechtes der Tierärzte durchzusetzen sei Sache des Vorstandes des Deutschen Apothekervereins, meint er. Es muß schlecht um eine Sache stehen, wenn sie mit solchen Machenschaften gestützt werden muß.

Sache der schleswig-holsteinischen Tierärzte wird es sein, nun in Kleinarbeit die Landwirte über das Flugblatt aufzuklären. Was den Punkt 10 selbst angeht, so können die Tierärzte das Wort für Wort unterschreiben. Auch von tierärztlicher Seite wird ein Handel der Tierärzte mit Tiermedikamenten verurteilt. Er ist den Tierärzten durch den Erlaß vom 30. Juni 1840 (V. Ladenburg) verboten. In der Nachkriegszeit, als es drunter und drüber ging, haben einzelne Tierärzte, die durch die lange Abwesenheit im Felde ihre Praxis verloren hätten, um sich ehrlich durchzuschlagen, sich Arzneidepots angelegt. Von der Mehrzahl der Tierärzte wird dies mißbilligt. Zur Abstellung bieten die bestehenden Gesetze Handhaben genug. Noch im vorigen Jahre hat sich die Rheinische Tierärztekammer in einem Falle, wo ein Tierarzt auf einem Nachbardorf ein Tierarzneidepot angelegt hatte, aus dem ein Gastwirt die Arzneien abgab, auf Anfrage des Gerichtes gegen diesen ausgesprochen, der bestraft ist. Es wird aber Sache der neuen Standesordnung sein, solches Verhalten als standesunwürdig zu bezeichnen und solche Jünger Merkurs in die Arme Askulaps zurückzuführen. „Der Handel ist nichts weiter als Profitucht, sacro egoismo!“ sagt Herr Dr. Meyer. Wir wollen diese Profitucht den Apotheken überlassen und eben nur Ärzte und Tierärzte sein. Zu dieser Tätigkeit gehört das Dispensierrecht im Rahmen unserer Jahrhunderte alten Tradition.

B e h n k e.

Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde.

Wintertagung am 1. Februar 1928 in Berlin.

Nach einer kurzen Begrüßung gab der erste Vorl., Oberamtmann Fick-Tundersleben, den Geschäftsbericht über das Jahr 1927. Trotz der ständigen Verschlechterung der wirtschaftlichen Stellung unserer Landwirtschaft konnte der Mitgliederbestand eine Zunahme aufweisen. Die Gründung eines Ausschusses für Haustierverserbungsforchung ist eine neue Maßnahme im Rahmen des planmäßigen Ausbaues der Gesellschaft. Im Anschluß an den Geschäftsbericht sprach seine Magnifizenz Prof. Dr. Keller, Rektor der Tierärztlichen Hochschule in Wien, über „das Entartungsproblem mit besonderer Berücksichtigung der Sexual-Biologie“. Der Redner behandelte zunächst die Begriffe „Entartung und Verkümmern“ und ging dann zu dem Auftreten von Mißbildungen über, deren Studium für die Züchtungsbiologie wertvoll ist. Insbesondere ist die Erforschung der Genitalmißbildungen und ihrer Entstehung wichtig, weil sich in organischen und psychischen Störungen des Geschlechtslebens das Wesen der Entartung besonders eindrucksvoll zeigt. In der Aufhebung der Fortpflanzungsfähigkeit hat die Natur ein wirksames Mittel zur Ausmerzung entarteter Formen. In einem weiteren Vortrage behandelte Prof. Dr. Walther von der Landwirtschaftlichen Hochschule in Hohenheim das Thema: „Welche für die Tierzucht verwertbaren Fortschritte haben in den letzten Jahren die Forschungen auf dem Gebiete der Konstitution gebracht?“ Die Ausführungen befaßten sich zunächst mit dem Begriff der Konstitution, welcher aus dem Bedürfnis der praktischen Tierzucht entstanden ist und für den eine eindeutige wissenschaftliche Definition nicht vorliegt. Weiter wurde über die in den Forschungen der letzten Jahrzehnte untersuchten einzelnen Komponenten der Konstitution berichtet und auf die Bedeutung erbanalytischer Untersuchungen großer Tierbestände hingewiesen. Zum Schluß wurde die Bedeutung der Konstitution auch für solche Gebiete der praktischen

Züchtung erläutert, wo sie bisher nicht berücksichtigt wurde. In einem letzten großangelegten Vortrage sprach Prof. Dr. Henseler von der Technischen Hochschule in München über: „Die Wolle vom Schaf bis zum Schiff in Australien“. Diese Ausführungen gaben einen Bericht über die im Auftrage des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft durchgeführte Reife des Redners nach Australien und Neu-Seeland. Australien ist das führende Wollproduktionsgebiet, welches ein Drittel der Welterzeugung liefert. Etwa 40 Prozent der Wolle Australiens nimmt Deutschland ab. An Hand hervorragender Lichtbilder zeigte der Redner die Betriebsverhältnisse der australischen Schafzucht und das großzügige Arbeiten der Züchter, Aufkäufer und Händler. Besonders die Angaben über die Wollstandarts fanden lebhaftes Interesse.

Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde. I. A.: Schmidt.

Verschiedene Mitteilungen.

Ministerialrat Dr. med. vet. Friedrich Richter.

Am 1. Januar 1928 ist der bisherige anhaltische Landestierarzt Ministerialrat Dr. Richter auf seinen Wunsch aus dem Staatsdienst ausgeschieden, um sich fortan der Leitung der Anhaltischen Salzwerke in Leopoldshall zu widmen. Hervorgegangen aus der tierärztlichen Praxis, ist Dr. Richter verhältnismäßig spät in den anhaltischen Staatsdienst eingetreten. Gleich wie er als Praktiker sehr geschätzt und gefacht war, hat er auch später als beamteter Tierarzt und als Leiter des anhaltischen Veterinärwesens Hervorragendes geleistet und sich um die Entwicklung und das Ansehen des tierärztlichen Standes weit über die Grenzen Anhalts hinaus große Verdienste erworben. Ausgestattet mit großen Gaben des Geistes, einem seltenen Geschick in Verwaltungsangelegenheiten und einem großen Weitblick in volkswirtschaftlichen Dingen, sowie einem warmen Herzen für die Ernährungsschwierigkeiten des Volkes während des Krieges und für die gegenwärtig noch bestehenden großen wirtschaftlichen Nöte ist Richter gewissermaßen hinausgewachsen über sein ursprüngliches Tätigkeitsfeld und hat seine Kräfte nunmehr ganz dem Wirtschaftsleben und der Industrie zur Verfügung gestellt.

Geboren am 4. April 1872 in Eisleben, besuchte Friedrich Richter in der Lutherstadt das Gymnasium, studierte an den Tierärztlichen Hochschulen in Berlin und Stuttgart und erlangte 1894 in Berlin die Approbation als Tierarzt. Nach der Approbation gründete er eine Praxis in Dessau, die bald einen großen Umfang annahm, so daß mancher junge Tierarzt Gelegenheit gehabt hat, sich als Assistent von Richter eine vorzügliche Grundlage für seine eigene Praxis zu erwerben. Im Jahre 1907 bestand Richter die Prüfung für die Anstellung als beamteter Tierarzt und promovierte 1908 an der Universität Zürich zum Dr. med. vet. Seine vorzügliche Dissertation: „Die Hundestaupe, ihre Vorbeugung und Behandlung durch Impfung“ ist eine der fünf Dissertationschriften gewesen, die dem Reichstage seinerzeit zwecks weiterer Einführung des Dr. med. vet. in Deutschland vorgelegt wurden.

Im Jahre 1913, also nach 19jähriger Tätigkeit in der tierärztlichen Praxis, wurde er zum Hilfsarbeiter des Landestierarztes berufen, kurz darnach zum Kreistierarzt in Dessau und 1916 nach der Pensionierung des Geheimen Veterinärrats Pirl zum Landestierarzt und Mitglied der Regierung, Abteilung des Innern, unter Verleihung des Titels „Regierungs- und Veterinärerrat“ ernannt. Seiner Tätigkeit als Landestierarzt ist es besonders zu verdanken, daß in Anhalt die Vollbefolgung der Kreistierärzte durchgeführt und zur Beratung und Begutachtung besonders wichtiger Angelegenheiten auf dem Gebiete des Veterinärwesens der Landesveterinärausschuß gegründet wurde, der gleichzeitig Anlaß zur Bildung eines Landesmedizinalausschusses gab. Weitere Marksteine auf dem Gebiete seiner landestierärztlichen Tätigkeit sind die Umarbeitung des Tuberkulosebekämpfungsverfahrens und die Übertragung der bakteriologischen Fleischschau sowie der biologischen und bakteriologischen Milchuntersuchungen in den Schlachthofgemeinden auf die Schlachthoflaboratorien. Als einzigartige Schöpfung Richters darf ferner das Bakteriologische (jetzt „Hygienische“) Institut der Anhaltischen Kreise in Dessau genannt werden, das in vorbildlicher Weise eine medizinische, veterinärmedizinische und chemische Abteilung unter einem Dache vereint und einem Tierarzt als Direktor unterstellt ist. Neben dem Hygienischen Institut besteht in Dessau außerdem eine Serumanstalt, deren Einrichtung ebenfalls auf die Initiative und Autorität Richters

zurückzuführen ist. Erwähnt sei weiterhin, daß Richter der Bekämpfung der Jungtierkrankheiten eine große Beachtung geschenkt hat. Er hat ferner bei der Reform des Körwesens in Anhalt entscheidend mitgewirkt und dafür gefordert, daß die beamteten Tierärzte in allen Körkommissionen (für Hengste, Bullen, Eber und Ziegenzuchtböcke) als stimmberechtigte Mitglieder fungieren. Bemerkenswert ist schließlich noch sein Einfluß auf die Gestaltung des Prämierungswesens in Anhalt und seine Autorität auf dem Gebiete der Pferdezucht, die äußerlich u. a. dadurch dokumentiert worden ist, daß er in den letzten Jahren seiner Tätigkeit bei den Hengstprämierungen von den Züchtern regelmäßig zum Obmann der Schiedsrichter gewählt wurde.

Neben seiner erspriesslichen Tätigkeit als Landestierarzt hat Richter außerdem stets den regsten Anteil an der Weiterentwicklung der tierärztlichen Wissenschaft und des tierärztlichen Standes genommen, so daß seine im Jahre 1926 erfolgte Ernennung zum Ehrenbürger der Tierärztlichen Hochschule in Hannover mit besonderer Freude zu begrüßen ist.

Was Richters Tätigkeit auf dem Gebiete der Volksernährung und Volkswirtschaft anbetrifft, so sei hier kurz angeführt, daß er während des Krieges in das Landesernährungs- und Landeswirtschaftsamt berufen wurde und stets ein sehr gern gesehener Mitarbeiter bei den zuständigen Reichsstellen war. Als Leiter des Viehhandelsverbandes, der Landesfleischstelle, der Landesgetreide- und der Landeskartoffelstelle hat er sich große Verdienste erworben und durch Organisation des Viehverkehrs und Fleischverbrauches unter Zuziehung der praktischen Tierärzte des Landes in ungewöhnlicher Weise zur Hebung des Ansehens der Tierärzte auf volkswirtschaftlichem Gebiete und zur Stärkung ihrer Autorität beigetragen. Es ist bekannt, daß v. Oftertag die in Anhalt getroffenen Einrichtungen als muster-gültig bezeichnet hat und diese seinerzeit wiederholt durch Kommissionen besichtigen ließ. Ein besonderes Interesse erregte damals das Gefrierfleisch am Schlachthof in Dessau, das von Richter mit Unterstützung des derzeitigen Schlachthofdirektors Veterinärarzt Ollmann unter Anwendung von nur primitiven Mitteln als eine für die Kriegsverhältnisse sehr zweckmäßige Einrichtung geschaffen worden war. Nach Aufhebung des Landesernährungsamtes wurde Richter unter Verleihung des Titels „Oberregierungsrat“ zum Leiter des Anhaltischen Landeswirtschaftsamtes bestellt. Er hat als solcher neben der landestierärztlichen Tätigkeit alle Ernährungsfachen, die Kleinrentner- und Kriegsbeschädigtenfürsorge, die Landespreisprüfungs-fachen, das Tarif- und Schlichtungswesen, die Landwirtschaftskammer- und Handelskammer-fachen, das Kreditwesen ufw. zu bearbeiten gehabt und war außerdem Demobilisierungskommissar. Im Jahre 1923 wurde Richter zum „Ministerialrat“ und Referent für Wirtschaftsfachen im Anhaltischen Staatsministerium und im Jahre 1924 zum stellvertretenden Vorsitzenden der Anhaltischen Finanzdirektion ernannt und hat als solcher insbesondere die Verwaltung der Domänen und des sonstigen fiskalischen Besitzes, darunter auch der Bergwerke bearbeitet. Trotz dieser ungeheuren Arbeitslast behielt Richter die Landestierarztstelle mit Unterstützung des Regierungs- und Veterinärrats Dr. Littj bei und hat im Jahre 1925 in glänzender Weise die Vorbereitungen zu der in Dessau stattgefundenen Konferenz der Veterinärreferenten der Länder getroffen.

Als sich im Jahre 1926 schwere Differenzen in der seinem Ressort unterstellten Verwaltung des Anhaltischen Salzwerke-Konzerns (Kali, Steinsalz, Kalifabriken, sonstige chemische Fabriken, Sägewerk, Wasserwerk ufw.) zeigten, wurde Richter in Gemeinschaft mit einem Oberbergrat auf einstimmigen Beschluß aller Parteien des Anhaltischen Landtages die Sanierung der Werke unter vorläufiger Beurlaubung aus dem Staatsdienst übertragen. Das in Richter gesetzte Vertrauen hat sich vorzüglich bewährt, so daß es im Interesse der Sache allgemein begrüßt wird, daß Richter sich dazu entschlossen hat, das begonnene Werk zu vollenden und einem hohen Ziele zuzuführen. Mögen die großzügigen Pläne dieses Mannes, den die deutsche Tierärzteschaft mit Stolz als den ihren nennen darf, und der in seinem Herzen stets der unsere bleiben wird, sich in reichstem Maße erfüllen! Li.

Ball der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Am 11. Februar 1928 fand im Parkhaufe der diesjährige Hochschulball unter Leitung des cand. med. vet. Siegert (Cherussia) statt. Die festlich geschmückten Säle vermochten die große Zahl der Teilnehmer

(über 600 Personen) kaum zu fassen. Ein reicher Damenflor im Verein mit dem bunten Farbenbild der Korporationen gab der Veranstaltung die entsprechende Weihe. Der Rektor begrüßte die Erschienenen, dann trat der Tanz in seine Rechte. Ein hervorragendes Klavierpiel von Ruth Gädke, Gefänge und Tanzvorführungen der Schulen Elisabeth Börendt und Edith Tägerer sowie heitere und ernste Vorträge von Ernst Geissler trugen in dankenswerter Weise zur Abwechslung und Erhöhung der Stimmung bei. Um die Vorbereitungen des in jeder Beziehung wohl gelungenen Abends hatte sich Gestütdirektor Simonson besonders verdient gemacht.

Ball der Tierärztlichen Hochschule Berlin.

Die Studierenden der Tierärztlichen Hochschule veranstalteten am Dienstag, den 7. Februar, ihren diesjährigen Hochschulball im Großen Saal des Lehrervereinshauses unter großer Beteiligung der Studentenschaft, des Professorenkollegiums, der Vertreter der anderen Berliner Hochschulen und zahlreicher Ehrengäste von Reichs- und Staatsbehörden, öffentlichen und privaten Verbänden und Vereinigungen mit ihren Damen. Unter anderen bemerkte man Magnifizenz Dr. Stang, ferner Generalstabsveterinär Dr. Pätz, Ministerialdirigent Dr. Müssemeier, sowie Vertreter vom Reichsverband für Zucht und Prüfung des deutschen Warmblutes u. a. Vereinigungen. Das Fest, eine Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten bedürftiger Studierender, nahm unter der Leitung des Vorsitzenden der Studentenschaft, Herrn cand. med. vet. Krüger, Corps Teutonia (RSC.), einen glänzenden Verlauf, wofür bereits die altbewährte und beliebte Tanzkapelle Kermbach bestens sorgte. Zur allgemeinen Erheiterung während der Tanzpausen trug Wilhelm Bendow vom Großen Schauspielhaus durch einige Rezitationen bei, während Opernfänger Gustav Adolf Hübner durch gefangliche Darbietung erfreute. Der Schlager des Abends war die mit wertvollen Gewinnen ausgestattete Tombola, die infolgedessen großen Ansturm aufzuweisen hatte. Das buntbewegte Bild, dem die zahlreich vertretenen Couleuren der farbentragenden Korporationen ein besonderes Gepräge gaben, hielt die tanzfreudige Korona bis zu früher Morgenstunde zusammen.

Jahresveterinärberichte (Leberegelseuche).

MfLDuF. V 838 v. 26. I. 1928.

Unter Bezugnahme auf meinen Erlaß vom 23. XII. 1925 — V 18724 — (LwMBL 1926 S. 3) ordne ich hiermit an, daß die Jahresveterinärberichte für das Jahr 1927 beim Berichte über das Jahr 1928 miterstattet werden. Gleichzeitig bezeichne ich mit Beziehung auf Ziffer 5 meines Erl. vom 13. I. 1902 — I. Ga. 370 — (nicht veröffentl.) die Leberegelseuche als die Krankheit, die bei der nächsten Berichterstattung ausführlicher zu behandeln ist. Die Berichterstattung hat sich besonders auch darauf zu erstrecken, in welchem Umfange die Seuche bei Rindern zu Verlusten geführt hat. Daneben sind über die Erfahrungen mit den verschiedenen Behandlungsmethoden eingehendere Mitteilungen zu machen.

Verein beamteter Tierärzte Preußens.

Anläßlich der Feier der 25. Vollversammlung des Vereins beamteter Tierärzte Preußens am 24. März 1928 in Berlin, findet 11 Uhr eine Festversammlung im anatomischen Hörsaal der Tierärztlichen Hochschule statt, an welche sich um 15 Uhr ein Festessen mit Damen in den Räumen der Gesellschaft der Freunde, Potsdamer Straße 9 anschließt.

Dr. Rust, Vorf.

Öffentlicher Lehrgang

für Milchproduzenten, Milchhändler und sonstige Interessenten im großen Hörsaal der preuß. Landwirtsch. Versuchs- und Forschungsanstalten zu Landsberg (Warthe), Theaterstraße 25—28.

8. Februar 1928, 20 Uhr, a) Dr. Hartwig: „Gesetzliche und polizeiliche Grundlagen der Milchkontrolle“; b) Medizinalrat Dr. Scholz: „Gefundheitschädigungen des Menschen durch schlechte Milch und die Bedeutung der Milch bei der Krankenbehandlung“. 13. Februar 1928, 20 Uhr: Prof. Dr. Fiehe: „Bedeutung der Milch als Nahrungsmittel“. 20. Februar 1928, 20 Uhr, Tierzuchtinspektor Weidmann: „Volkswirtschaftliche Bedeutung der Milchgewinnung“. 27. Februar 1928, 20 Uhr: Prof. Dr. Hilgermann: „Hygiene der Milch“. 5. März 1928, 20 Uhr: Tierzuchtinspektor Weidmann: „Tierzüchterische Grundlagen der Milchgewinnung“. 12. März 1928, 20 Uhr:

Veterinär Dr. Kurtz wig: „Hygienische Grundlagen der Milchgewinnung, insbesondere Aufstallung“. 19. März 1928, 20 Uhr: Prof. Dr. Knuth: „Anatomie und Physiologie der Milchdrüse“. 26. März 1928, 20 Uhr: Prof. Dr. Knuth: „Einfluß der Erkrankungen der Milchtiere auf die Milch“. 2. April 1928, 20 Uhr: Dr. David: „Die veterinär-bakteriologische Untersuchung der Milch“. 16. April 1928, 20 Uhr: Prof. Dr. Fiehe: „Die chemische Kontrolle der Milch“. 23. April 1928, 20 Uhr: Veterinär Dr. Kurtz wig: „Euterkrankungen“.

Prof. Dr. Knuth. Dr. Kurtz wig.

Tierärztlicher Fortbildungsrundfunk.

Auf Anregung der „Deutschen Welle“ und der „Deutschen Zentrale für Berufsberatung der Akademiker“ wird im Februar und März im Rahmen der verschiedenen berufsbildenden Einrichtungen der „Deutschen Welle“ je ein Vortrag über die verschiedenen akademischen Berufe veranstaltet. Freitag, den 24. Februar 1928, 19,20 bis 19,45 Uhr, Dr. Giese-Berlin: „Beruf des Tierarztes“.

Fortbildungskursus für beamtete Tierärzte.

Vom 27. Februar bis 10. März 1928 findet an der Tierärztlichen Hochschule Hannover ein Fortbildungskursus für beamtete Tierärzte statt.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Ellenberger-Schütz Jahresbericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinärmedizin. Unter Mitwirkung von hervorragenden Fachgelehrten herausgegeben von W. Ellenberger, K. Neumann-Kleinpaul und O. Zietzschmann. 46. Jahrg. Berichtsjahr 1926. Verlag von Julius Springer-Berlin, 1927. Preis 98.— Mk.

Der 46. Band des Ellenberger-Schütz'schen Jahresberichtes ist in einem ganz neuen Gewande erschienen. Er besteht aus zwei dicken Bänden von je etwa 800 Seiten. Im Gegenfatze zu den früheren Berichten ist der Satzspiegel wesentlich verbessert. Die Güte der einzelnen Referate ist dadurch gewährleistet, daß die Referate zum ersten Male nicht nach Zeitschriften verteilt worden sind, sondern nach Disziplinen und durch Spezialisten bearbeitet wurden. Hervorragende Mitarbeiter, unter denen nur Trautmann, v. Düring, Richter-Leipzig, Graf, Nieberle, Henkels, Götze, Freund, Zumpe, Bongert, Reinhardt, Heuss, Borchert und andere genannt sein mögen, haben sich weiter der Mühe unterzogen, die Referate in den einzelnen Kapiteln sachgemäß zu ordnen. Vom Kleindruck ist entsprechender Gebrauch gemacht. Die Titel der einzelnen Arbeiten heben sich durch Fettdruck vorteilhaft heraus. Neben der normalen und pathologischen Anatomie, der Embryologie, den Mißbildungen, der Physiologie, Tierpsychologie und den Krankheiten der Haustiere haben die Parasitologie, die Geflügel-, Fisch- und Bienenkrankheiten entsprechende Berücksichtigung gefunden. Mikrobiologie, Immunitätslehre und Chemotherapie sind bei den Infektionskrankheiten, die Endokrinologie teils bei der Physiologie, teils bei den Organerkrankungen untergebracht. Unter letzteren sind auch die Arbeiten über die Krankheiten der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane und der Milchdrüsen referiert. Ebenso wenig fehlen die Fleisch- und Lebensmittelhygiene, die Milchkunde, Hygiene, Tierzucht, Pharmakologie, Militärveterinärwissenschaft, Veterinärpolizei, das Abdeckereiwesen, die Tierversicherung, historische Veterinärmedizin und Standesangelegenheiten. Es ist eine ganz gewaltige Arbeit in kurzer Zeit geleistet worden. Den Herausgebern erwuchs die mühevollste Aufgabe der Verteilung der zahllosen Referate und ihrer definitiven Sichtung. Das Werk ist als vollständig gelungen zu bezeichnen. Es wird ein unentbehrlicher Ratgeber für jeden sein, der eines der oben genannten Kapitel experimentell oder literarisch zu bearbeiten hat; man findet in ihm mühelos die Jahresliteratur, nicht nur des Inlandes, sondern auch des Auslandes gut geordnet und zum Teil in so ausführlichen Referaten, daß sich bei schwer zu beschaffenden Originalarbeiten unter Umständen weitere Nachforschung erübrigt. So steht denn der 46. Band des Ellenberger-Schütz'schen Jahresberichtes unerreichbar da. Es darf daher erwartet werden, daß die unendliche Mühe belohnt wird durch einen guten Absatz. Nur wenn dies der Fall ist, wird es möglich sein, ein derartiges mit großen Unkosten verbundenes

Werk in ähnlichem Umfange weiterzuführen. In keiner Institutsbibliothek auf dem Gebiete der Veterinär- und Humanmedizin, der Landwirtschaft und Tierzucht sollte das Werk fehlen. Auch der wissenschaftliche Praktiker wird mit Behagen im Ellenberger-Schütz nachschlagen beim Studium von felteneren in seiner Praxis vorkommenden Fällen. So kann man den Herausgebern und dem Verlage nur Glück wünschen zu der wertvollen Bereicherung unserer veterinärmedizinischen Literatur. Mießner.

Klein: Sind geschächtete Tiere sofort nach dem Schächtschnitt bewußtlos? Verlag: Berliner Tierschutz-Verein, Berlin SW 11, Tempelhofer Ufer 36.

Zum Beweise des Fortbestehens des Bewußtseins für eine kurze oder längere Zeit nach dem Schächtschnitte hat Verf. den ganzen Schächttakt im Film festgehalten und veröffentlicht aus den Bildfolgen des Films 23 mit erläuterndem Texte versehene Photos, die den Vorgang bei einer jungen Kuh, einem Schafe und einem jungen Ochsen darstellen. Verf. zieht „aus der Betrachtung der 23 Photos erneut die selbstverständliche Folgerung, daß das Schächten ohne vorherige Betäubung der Tiere in unserem Kulturstaate verboten werden muß, weil es eine grausame Tierquälerei ist, die durch die gesetzliche Einführung der modernen, hochentwickelten Betäubungsmethoden für alle Schlachttiere mit Sicherheit vollkommen vermieden werden kann.“ Lund.

Neues vom betäubungslosen Schächten. Verlag: Münchener Tierschutzverein 1927, München 2 NO. 7, Fürstenstraße 19.

Der Münchener Tierschutzverein kritisiert in vorliegender Abhandlung die neuesten wissenschaftlichen Gutachten der Schächthanfänger und berichtet des weiteren über den Darmstädter Verbandstag 1927 der deutschen Tierschutzvereine, den Stand der Betäubungsfrage in Schweden und Norwegen, sowie über die im Münchener Schlachthofe kürzlich mit elektrischer Betäubung angestellten Versuche, womit ein Betäubungsverfahren gefunden sein soll, das die rituellen Vorschriften nicht verletzt. Da die Zeit reif für den gesetzlichen Betäubungszwang ist, wird vor der etwaigen Zulassung der elektrischen Betäubung die einwandfreie Feststellung verlangt, daß hierdurch eine wirkliche Betäubung und nicht etwa eine bloße Lähmung erzielt wird. Lund.

Die Deutschen Tierärzte gegen das betäubungslose Schächten. Dritte vermehrte Auflage 1927. Münch. Tierschutzverein. München 2 NO 7, Fürstenstraße 19.

Auf die Eingabe des Münchener Tierschutzvereins am 11. März 1926, die den Bayerischen Landtag um ein Gesetz erfucht, daß alle Schlachttiere vor Beginn des Blutentzuges zu betäuben sind, wurden dem Verein von Tierärzten aus allen Teilen Deutschlands Erklärungen zugefandt, die den Antrag mit großer Genugtuung begrüßen. Aus den veröffentlichten Gutachten des Preussischen Landesveterinäramtes vom 30. Juli 1913, den Erklärungen von Verbänden (Reichsverband praktischer Tierärzte und Reichsverband der deutschen Gemeindetierärzte), sowie aus Einzelzuschriften geht hervor, daß fast alle deutschen Tierärzte geschlossen hinter dem Verlangen des Münchener Tierschutzvereins stehen. Vom Bayerischen Landtag wurde daraufhin am 8. Juli 1926 auf Grund der Eingabe mit großer Mehrheit beschloffen, die Staatsregierung um baldige Erlassung gesetzlicher Anordnungen zu erfuchen, wonach alle Schlachttiere vor Beginn der Blutentziehung, möglichst unter Verwendung mechanisch wirkender Geräte (Schußbolzen usw.) zu betäuben sind. Lund.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Der wissenschaftl. Assistent Dr. Rudolf Wetzels am hygien. Institut der Tierärztl. Hochschule zu Hannover zum Oberassistenten; dem Veterinärassessor Dr. Becker aus Essen (Ruhr) ist die kommissarische Verwaltung der Veterinärstelle II in Minden übertragen worden.

Versetzt: Oberveterinär Dr. Bogenschneider zum Württembergischen tierärztl. Landesuntersuchungsamt.

Verstorben: Tierarzt Fritz Schüler in Hundsfeld.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck: Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10. nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung fein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 8.

Ausgegeben am 25. Februar 1928.

36. Jahrgang.

Zur gefl. Beachtung!

Der Bezugspreis für das 1. Vierteljahr 1928 wird für die beim Verlag direkt bestellten Abonnements durch Nachnahme erhoben, wenn derselbe nicht bis zum 26. ds. Mts. in unseren Händen ist. —

Wir bitten ev. für Einlösung der Nachnahme besorgt zu sein.

M. & H. Schaper

Verlag der „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“.

(Aus der Klinik für Geburtshilfe und Rinderkrankheiten der Tierärztlichen Hochschule Hannover.)

Fränkelsches Gasödem beim Rinde.

(Mit 1 Abbildung.)

Von R. Götze, Hannover.

Bei Operationen am Rinde, auch kleinsten Eingriffen, wie subkutanen Injektionen, bilden Infektionen mit pathogenen Anärobiern erfahrungsgemäß eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Die entstehenden Gasödeme sind klinisch und prognostisch je nach der Art der eingedrungenen Erreger offenbar recht verschieden. Während die Pararaufchbrandinfektion, wie ich in Nr. 6 dieser Zeitschrift berichtete, in unseren Fällen mit schweren Allgemeinerscheinungen einherging und stets tödlich verlief, konnten wir bei einer Kuh Fränkelsches Gasödem beobachten, das einen günstigen Verlauf und Ausgang nahm.

Eine ca. 10 Jahre alte schwarz-weiße Niederungskuh in mäßig gutem Ernährungszustand bekam zu Versuchszwecken eine subkutane Injektion am Halse von mit 0,5% Trikrezol veretztem Gewebsbrei. Die Injektionsstelle zeigte während der ersten zwei Tage nach der Einspritzung keine Besonderheiten. Vom dritten Tage an entstand ein zunächst etwa zwei faustgroßes heißes schmerzhaftes Ödem, welches sich rasch vergrößerte und schließlich die gesamte rechte Halsseite einnahm, auf den Triel überging, denselben unförmig gestaltend, an der Unterbrust auslief. (Siehe Abb.). Die Kuh war in der Bewegung der Vorhand so gehindert, daß sie nicht ohne Hilfe aufzustehen vermochte und sich nur mühsam mit kleinen Schritten und untergeschobenen Hinterbeinen fortbewegen konnte.

Das Ödem fühlte sich am ersten und zweiten Tage heiß an, war hart und schmerzhaft. Je mehr es sich aber dann trielwärts ausbreitete, um so mehr kühlte es sich ab. Fingereindrücke ließen sich leicht bewerkstelligen. Namentlich an den oberen Grenzen der Geschwulst zeigten sich deutlich fühlbare Gasblasen. Der zunächst aufsteigende Verdacht auf Pararaufchbrand konnte bald wieder fallen gelassen werden, da trotz des fortschreitenden Ödems das Allgemeinbefinden nur wenig gestört war. Appetit, Wiederkauen, Milchleistung blieben fast unverändert. Atmung, Herzstätigkeit und Puls hielten sich nur wenig über der normalen Grenze. Die Temperatur erreichte am Abend der beiden ersten Krank-

heitstage 40 Grad, blieb dann aber während des gesamten Krankheitsverlaufes zwischen 38,9 und 39,5.

Die bakterioskopische Untersuchung der hell-bernsteinfarbenen Ödemflüssigkeit verlief negativ, der Kulturversuch im Hygienischen Institut unserer Hochschule (Professor Dr. Mießner) ergab am fünften Krankheitstage Fränkelsche Gasbazillen.

Da das Ödem immer weitere Neigung zum Wachstum aufwies und sich schließlich doch Störungen des Allgemeinbefindens (Nachlassen des Appetits, Abkühlung der Körperoberfläche) einstellten, wurde am 7. Krankheitstage die Injektionsstelle durch einen langen Schnitt gespalten und auch im Verlauf des Triels mehrere Einschnitte gesetzt. Aus der ersten Schnittwunde entleerte sich faulig-ranzig riechendes Gas und etwas zeretzter Gewebsbrei. Aus den Trielwunden



Fränkelsches Gasödem beim Rinde (Hals, Triel, Unterbrust) am 5. Krankheitstage. Orig.-Aufnahme des Verfassers.

ließen sich Gasbläschen auspressen, außerdem tropfte unaufhörlich hellgelbliche Flüssigkeit ab. Die Wunde wurde mit 2 prozent. Kaliumpermanganatlösung längere Zeit berieft. Schon am folgenden achten Tage der Krankheit machte sich ein Rückgang des Ödems bemerkbar, der ohne weitere Behandlung anhielt, bis die Kuh 14 Tage nach Auftreten des Ödems völlig wiederhergestellt war. Übertragungen auf andere Stallinassen sind nicht vorgekommen, obwohl sich während derselben Zeit zwei Geburten in der Klinik abgespielt hatten und auch sonst Gelegenheit zu Wundinfektionen geboten war.

Wenn es sich hier auch nur um einen klinisch beobachteten Einzelfall von Fränkelschem Gasödem handelt, so scheint er mir doch erwähnenswert, weil scharfe klinische Unterschiede gegenüber dem Pararaufchbrand hervorgetreten sind. Das Wichtigste ist, daß die Gasbildung deutlich klinisch festzustellen war und die Allgemeinerscheinungen: Er-

höhung der Atem- und Pulsfrequenz, Störung der Herzarbeit, Steigerung der Körpertemperatur, Darniederliegenden Appetits, der Rumination und Milchsekretion, wie sie beim Pararaufchbrand mit dem ersten Auftreten des Ödems einsetzen, in dem geschilderten Falle von Fränkelschem Gasödem fehlten bzw. nur in geringerem Ausmaße vorhanden waren. Die Empfänglichkeit des Rindes für den Fränkelschen Bazillus scheint viel geringer zu sein als für Pararaufchbrandbazillen. Das Fränkelsche Gasödem ließ sich im geschilderten Falle, obwohl es große Ausdehnung angenommen hatte, durch chirurgische Behandlung in Verbindung mit Sauerstoff abspaltenden Spülungen leicht zum Abklingen bringen, während die Pararaufchbrandfälle jeder Behandlung trotzten. Die Meinung, daß „malignes Ödem“ in manchen Fällen beim Rinde heilbar sei, dürfte wohl auf den Verschiedenheiten der Erreger beruhen, die Ödeme von malignem Charakter hervorrufen können.

Zur Ätiologie der in Schleswig-Holstein gehäuft auftretenden chronischen Diarrhöe des Weideungviehs.

Von Dr. Hermann Müller, Sulingen.

Die in den weitaus meisten Fällen langsam zur Kachexie und zum sicheren, meist durch Schlachtung abgewendeten Exitus letalis führende chronische Diarrhöe des Weideungviehs spielte in meinem früheren Praxisbereich im Kreise Eiderstedt eine bedeutende Rolle. Nach mündlichen Mitteilungen von Kollegen und Ausführungen in den Preussischen Jahresveterinärberichten ist sie ebenso unliebsam bekannt in den großen Moorbezirken um Rendsburg (1), an der Ostseeküste (2), in Dithmarschen (3), Pinneberg (4) und in den übrigen Gebieten der Schleswig-Holsteinischen Nordseeküste. Meine seit langem gehegte Vermutung, daß auch andere Niederungsgebiete von der Krankheit betroffen werden, bestätigt V o n n a h m e (5), der aus der Bremerförder Gegend unter Hinweis auf Strongyloiden als Krankheitsursache von großen Verlusten durch den unstillbaren Durchfall berichtet. Es ist nicht wahrscheinlich, daß hiermit die Verbreitungsgebiete des chronischen Jungvieh-Magen-darmkatarrhs in Deutschland erschöpft sind.

Seine Verbreitung in den betroffenen Gegenden ist in den einzelnen Jahren verschieden. Da er jedoch Jahr für Jahr seine Opfer fordert, die beispielsweise 1921 in Eiderstedt bei enzootischem Auftreten in einzelnen Jungviehbeständen 80% und mehr ausmachten, übertrifft seine wirtschaftliche Bedeutung zweifellos stellenweise die der Maul- und Klauenfeuche. Daß die Krankheit schon vor mehr als 100 Jahren sehr verlustreich aufgetreten sein muß und ätiologisch teils richtig gedeutet wurde, beweist offenbar die mir zwar nur aus dem Stö d t e r'schen (6) Literaturverzeichnis dem Titel nach bekannte Abhandlung von Falk aus dem Jahre 1782: „Untersuchung der sogenannten Viehfeuche oder Beweisgründe, daß diese Krankheit nicht von pestilenzialischer oder ansteckender Art sei, sondern von einer üblen Verdauung und von Würmern in den Mägen herrühre.“

In einem fast merkwürdigen Mißverhältnis zur Verbreitung und wirtschaftlichen Bedeutung dieser Krankheit steht ihre dürftige Behandlung in der deutschen Literatur und wissenschaftlichen Forschung der letzten Jahrzehnte, so daß, soweit mein Überblick reicht, die schon 1901 erschienene Stö d t e r'sche Arbeit noch heute die beste Zusammenstellung des einschlägigen Schrifttums darstellt, auf die auch noch neuere Lehrbücher bei ihren knappen Ausführungen der Hauptfache nach Bezug nehmen.

Dagegen ist die Krankheit um die Jahrhundertwende in der Schweiz unter dem Namen Kaltbrändigkeit in ätiologischer, klinischer und therapeutischer Hinsicht gewürdigt worden, und auch in der englischen, amerikanischen und

französischen Literatur finden sich aus derselben Zeit nicht wenige gleich eingehende Arbeiten. Daß trotz der Hinweise von D a m m a n n und F r e e s e (7) und O f t e r t a g (8), die dem Praktiker die Klärung der klinischen Verhältnisse der Magenstrongylose des Rindes zuwiefen, die Ätiologie der holsteinischen chronischen Diarrhöe des Weideungviehs fast überall, wie mir scheinen will, unbekannt blieb, ist wohl eine Begleiterscheinung des Zeitalters der absoluten Bakteriologie.

Klinische Erscheinungen.

Jungtiere, die erstmalig aufgeweidet wurden, erkrankten, wenn nicht früher, gegen Ende der Weideperiode, nicht selten, nachdem sie vorher die im übrigen, man möchte fast sagen, ansteckende Neigung gezeigt haben, vom Rande der die Weiden trennenden Gräben aus Wassergräser zu fressen. Es sei vorweg erwähnt, daß die Krankheit sehr häufig vergesellschaftet mit der in Eiderstedt fast unvermeidlichen, in der Regel aber schon in früherer Weideperiode auftretenden Lungenstrongylose verläuft. Daß aber beide Krankheiten, die sich in ihrer schädigenden Wirkung wohl summierend verhalten, im übrigen völlig von einander unabhängig sind, beweist das regelmäßige Fortbestehen der Verdauungsstörungen auch nach der Heilung der Lungenstrongylose. Die Indigestionen, denen ein merkliches Zurückbleiben im Nährzustande vorangeht, setzen mit intermittierenden Durchfällen ein, die sich immer häufiger wiederholend schließlich in wässrig bläulicher Form das Krankheitsbild beherrschen. Unter zunehmender Inappetenz bei unterdrückter Rumination und großer Wassergier magern die Tiere meist im Laufe einiger Monate völlig ab. Eine auffällige Inaktivitätsatrophie der Muskulatur begleitet von starker Höckerbildung auf den Kauflächen der wenig abgenutzten Mahlzähne stellt sich fast regelmäßig ein und schließlich kündigt als Ausdruck der Hydrämie ein Kehlgangsoedem den bevorstehenden Exitus an. Dieser Verlauf protahiert sich vielfach bis weit in den Winter hinein. Nicht ungewöhnlich ist es, daß die kranken Tiere während der winterlichen Stallhaltung lediglich Ernährungs- und leichte Verdauungsstörungen zeigen und erst nach dem Austrieb bei starker Diarrhöe mehr oder weniger schnell, an „Grasfeuche“, so sagt der Volksmund, zu Grunde gehen.

Zu dem desolaten Nährzustand pflegt die auf ein wenig gestörtes subjektives Befinden hindeutende Munterkeit der Patienten, die ebenso wie das lebhaft glänzende Auge bis in späte Krankheitsstadien auffällt, im merkwürdigen Gegensatz zu stehen. Erwähnenswert erscheint, daß von allem an der Krankheit leidenden Tieren nach meinen Beobachtungen

mindestens 80 Prozent Ochsen sind, die regelmäßig innerhalb des ersten Lebenshalbjahres kastriert worden sind. Der mit der Kastration verbundene hormonale Ausfall spielt also fraglos eine bedeutende disponierende Rolle. Mehr als zwei Jahre alte Tiere erkrankten verhältnismäßig selten. Von der sehr geringen Prozentzahl der in diesem Alter mit oder ohne Therapie gefundenden Tiere bleiben nur einzelne dauernd schlechte Futterverwerter. Das kann mit dem Restieren der erwähnten Zahnanomalien zusammenhängen. Aus den wenigen so gearteten Fällen ergibt sich eine gewisse Indikation für das von Laien als Heilversuch gegen den Magen- und Darmkatarrh gern geübte Zähneraspeln.

Anatomischer Befund.

Bei der Neigung der Besitzer, die Tiere im letzten Krankheitsstadium möglichst nach außerhalb zu verschicken, war Sektionsmaterial meistens schwer zu beschaffen, jedoch hat es mir im Laufe der Jahre in einiger Menge vorgelegen.

Abgehen von den je nach Krankheitsdauer und -verlaufs wechselnden Bildern der Unterernährung findet man die Schleimhäute des Abomasus und Duodenum aufgequollen und meist diffus gerötet. Besonders stark pflegt diese oft dunkelbraunrote Verfärbung in der Mucosa Abomasi hervorzutreten, so daß die von Ostertag beschriebenen linsengroßen fleckigen Rötungen meist nur in Fällen, wo sich die Schleimhautalteration weniger hochgradig und weniger generalisiert zeigt, auffällig hervortreten. Häufig findet man mehr oder weniger große Schleimhautpartien fibrinös, gelegentlich auch mit kleinen Blutgerinnseln belegt und das submuköse Bindegewebe mit klarer wässriger Flüssigkeit infiltriert. Trotzdem hatte die Serosafläche des Labmagens immer normales Aussehen. Der Darm zeigt sich im übrigen auffällig blaß und durchscheinend, die Darmwand atrophisch. Die Leber ist scharf gerändert, im Verhältnis zum Tierkörper auffällig klein, tietbraun und sonst ohne Besonderheiten. Die Gallenblase ist meistens vergrößert, nicht selten mehr als doppelt so groß, die Galle dementsprechend mehr oder weniger verändert. Bei bedeutender Blasenvergrößerung läßt sie rötlichen Farbton erkennen, ist trübe, schleimig, in fortgeschrittenen Fällen wässrig dünn und setzt beim Stehen schleimig-flockigen oder mehr körnigen rötlichen Bodensatz ab. Die Schleimhaut der Gallenblase ist dann zuweilen derb, uneben und höckrig. Hinsichtlich der Fleischbeschau ist zu sagen, daß nach diesseitigen Beobachtungen das Fleisch der mit dem chronischen Magen- und Darmkatarrh behafteten Tiere selbst schon zu einer Zeit, wo noch festes Fettgewebe vorhanden ist, mit einem eigenartig faden und bitteren Geruch behaftet ist, der mit dem Erkalten weniger auffällig wird, im Kochtopf aber wieder erscheint und selbst noch im Sauerbraten für Nase und Zunge deutlich vernehmbar ist.

Therapeutische Versuche.

Die zu Beginn meiner Eiderstedter Tätigkeit von vielen Landwirten auf mich gesetzten Hoffnungen, daß ich vielleicht etwas gegen den chronischen Magen- und Darmkatarrh vermöchte, habe ich enttäuschen müssen, und der anfängliche Zulauf hat sich langsam gelegt. In der anfänglichen Auffassung, daß der mir neue Katarrh ätiologisch begründet wäre in der meistens geübten ausschließlichen Heufütterung während der Wintermonate, habe ich außer entsprechenden Diätvorschriften wohl sämtliche angezeigten Möglichkeiten, die in den salinischen Anticatatarrhalica, den Ruminantien, Styptica und Drastica und ihren Kombinationsmöglichkeiten gegeben sind, erschöpft, habe Creolin per os und Panfenspülungen versucht und eine niederstimmernde Reihe von Mißerfolgen erlebt, die auch nicht unterbrochen wurde, als aus hier nicht zu erörternden Erwägungen alle möglichen Plasmatica, Apomorphin, Atropin, Suprarenin und vorallem Ol. Terebenth. und sonstiges zur Anwendung gelangte.

Spezielle Untersuchungen.

Nachdem späterhin einige der oben angedeuteten Gallenbefunde erhoben worden waren, schien dem Gallenausfall eine erhebliche ätiologische Mitbeteiligung zuzusprechen zu sein. Die mikroskopische Untersuchung eines solchen Gallensedimentes ergab das Vorhandensein sehr zahlreicher Eier von *Fasciola hepatica*, das um so überraschender war, als weder die vorherige noch die erneute genaue Durchsichtung der völlig unveränderten Gallengänge auch nur ein einziges Exemplar des Parasiten ergab. Es sei vorweggenommen, daß bei späteren Untersuchungen entsprechend dem nicht häufigen Vorkommen in Eiderstedt auch einige Male einzelne Fasciolenexemplare festgestellt wurden, während in der Mehrzahl der Fälle ihr Fehlen sich auch mikroskopisch ergab. Sonstige Parasiten oder deren Eier wurden in der Galle nicht beobachtet. Der Ductus choledochus war immer wegkam. Wahrscheinlich steht somit der Grad der Gallenstauung im direkten Verhältnis zum jeweiligen Entzündungszustand der Duodenalschleimhaut.

In der Folgezeit wurden in allen erreichbaren klinischen Fällen Kotuntersuchungen zur Ermittlung der Häufigkeit des Leberegelbefundes vorgenommen. Sie führten fast nie zur Auffindung von Fascioleneiern, dafür aber in jedem Falle zur Feststellung von zwar richtig auf Strongylien bezogenen Nematodeneiern, denen jedoch in Berücksichtigung der Tatsache, daß nach Ostertag die Ostertagia in 90 Prozent aller Fälle bei Schlachtrindern vorkommt, zunächst keine Bedeutung beigemessen wurde. Erst die dauernde Wiederholung dieses Befundes und sein fast regelmäßiges Fehlen bei Kontrolluntersuchungen an gut genährten gefunden Jungrindern ließen die durch die nächste kurz nach der Schlachtung vorgenommene Sektion bestätigte Vermutung aufkommen, daß der chronische Magen- und Darmkatarrh der Eiderstedter Jungrinder ätiologisch als Strongylosis Abomasi et Duodeni zu deuten sei.

Aus den Aufzeichnungen über diesen Fall ist folgendes zu entnehmen:

Ochse, rot, ca. 2 Jahre alt des Lehnsmannes St. i. O.

Anamnese: Seit reichlich vier Wochen erheblicher, gelegentlich ausetzender Durchfall, Rückgang im Futterzustand.

Befund vom 30. Dezember 1925: Mäßiger Nährzustand, stark unterdrückte Panfenbewegung, stinkende, wässrige Diarrhoe.

Kotuntersuchung (Kochsalzmethode): In jedem Deckglaspräparat durchschnittlich sechs Nematodeneier. Am 7. Januar 1926 unbehandelt geschlachtet. Noch weißliches festes Fettgewebe vorhanden. Der enthäutete Tierkörper leicht weißlich verfärbt. Der Labmagen enthält wenig braungrünlichen, dünnflüssigen schaumigen Brei. Seine aufgequollene Schleimhaut ist diffus, ziegel- bis braunrot, jedoch sieht man vielfach sich besonders markierende punktförmige, auch kreisförmige Blutungen von Stecknadelkopfdurchmesser. Einzelnen durch besonders dunkle Rötung auffallenden Plicae spirales liegen Fibrin- und Blutgerinnsel auf. An diesen Stellen ist die Submukosa stark wässrig infiltriert, so daß beim Abheben der Mukosa wasserklare Tropfen abfließen. Die Mukosa Duodeni ist leicht diffus gerötet. Unter der Dünndarmschleimhaut werden vereinzelte grauweißliche rundliche Herde von durchweg reichlich Stecknadelkopfgroße gesehen, die sich mikroskopisch als je einen kleinen Nematoden enthaltende Leukozytenansammlungen erweisen (Frühstadium der Helminthiasis nodularis intestinalis? Parasit dem von Ostertag (9) als Erreger dieser Knötchen angegebenen Wurm nicht, eher der Larve von *Synthetocaulus capillaris* nach Fiebiger (10) ähnlich). Leber- und Gallenblase zeigen nichts bemerkenswertes. Die mikroskopische Untersuchung des Labmageninhaltes ergibt in jedem Deckglaspräparat etwa 100 von den bisher in den Fäzes kranker Tiere beobachteten Nematodeneiern, die andererseits in den Ovarialschläuchen der weiblichen Exemplare der in Labmagenschleimhaut und -brei in zahlloser Menge anzutreffenden Strongylien gesehen werden. Die Würmer sind in dem Brei so zahlreich vertreten, daß der eingetauchten Präpariernadelspitze regelmäßig einer, nicht selten auch drei und mehr als für das unbewaffnete Auge eben sichtbare weißliche Fusseln anhaften.

Zum Zwecke der Wurmbestimmung fandte ich einen Teil dieses Materials nicht konserviert an Herrn Prof. Dr. Nöller ein. Infolge inzwischen eingetretener Zersetzung konnten nur noch zahlreiche Eier aufgefunden werden. In einer späteren mit Formalinlösung vorbehandelten Sendung wurden „zahlreiche *Trichostrongyli retortaeformis*, männlich und weiblich, und *Ostertagia Ostertagi* festgestellt“. Herrn Prof. Dr. Nöller spreche ich an dieser Stelle für sein freundliches Bemühen meinen Dank aus.

Nachdem ich die Eier dieser Parasiten in den Fäzes in sämtlichen von mir daraufhin untersuchten 38 klinischen Fällen von chronischem Magen- und Darmkatarrh in erheblicher Menge angetroffen und in acht Sektionsfällen einen quoad vermes gleichen Befund erhoben habe, glaube ich, namentlich unter Berücksichtigung der bisher erschienenen Literatur diesen Magen- und Darmkatarrh ätiologisch mit Strongyliden in Beziehung bringen zu müssen. Daß noch andere als die in dem einen obigen Fall ermittelten Gattungen beteiligt sein können, bleibt nicht unwahrscheinlich.

Jedoch will es scheinen, als ob die verschiedenen Strongylidengattungen auch verschiedene Krankheitsbilder hervorrufen. So berichten aus der Schweiz Beeler-Gams (zit. nach Stöfker) und aus Schleswig-Holstein Schüller bei der Besprechung von Fällen, bei denen *Strongylus ancophorus* und *Strongylus curicei* festgestellt wurden, sehr übereinstimmend von umfangreichen ulzerierenden Prozessen an der Dünndarmflehnhaut, die diesseits nie beobachtet wurden. Ebenso übereinstimmend berichten beide im Gegensatz zu den Eiderstedter Beobachtungen, daß die betroffenen Tiere schon in wenigen Tagen völlig abmagerten. Da allem Anschein nach auch hier wie dort die Heilungsziffer eine bessere als in Eiderstedt gewesen ist, steht der Annahme nichts im Wege, daß verschiedene Strongylusgattungen nicht nur verschiedene anatomisch-pathologische, sondern auch verschiedene klinische Bilder hervorrufen. In diesem Zusammenhange erhebt sich die meines Wissens nicht überall genügend nachgeprüfte Frage, ob nicht ein Teil der unter dem Namen Leckfucht zusammengefaßten Krankheitsercheinungen ätiologisch mit dem Befall durch Strongyliden oder ähnliche Parasiten eine Erklärung findet. Denn einerseits ist Leckfucht auch während des Weideganges aufgetreten (11), und andererseits könnte nach den neueren Erfahrungen mit Leberegeln auch Heu als Überträger in Frage kommen.

Vermifuga.

Nach Ermittlung der Strongyliden als causa morbi wurde das damals gegen Lungenstrongylose viel genannte Kupferleckfals in der vorgeschriebenen Heildosis versucht. Einzelne Patienten reagierten auf diese Dosen mit Unruhererscheinungen und Schüttelfrost, andere vertrugen sie reaktionslos. Heilungen konnten auch nach dreiwöchiger Applikation nicht erzielt werden. Ebenso wenig ergab sich, wie in drei Obduktionsfällen festgestellt wurde, nach dieser Anwendungszeit eine merkbare Minderung der Zahl und der Lebenstätigkeit (Beweglichkeit und Eierproduktion) der Parasiten. Dasselbe ist zu sagen von früher aus anderen Erwägungen angewandtem Cupr. sulf. und Cupr. oxydat. sowie von Ferr. sulf.

Die gegen Lungenstrongylose intratracheal tausendfach bewährte Sol. Kal. picronitric. versagte, auch wenn sie insgesamt literweise per os gegeben wurde. Samen Arecae war wirkungslos. Nach Kamala trat in vier Fällen eine derartige Verschlimmerung des Durchfalls und des Allgemeinbefindens ein, daß die Tiere sich nach wenigen Tagen nicht mehr erheben konnten. Auf Carb. sulf. reagierte ein noch leidlich kräftig erscheinender Patient in 24 Stunden mit Exitus.

Es scheint demnach, daß die Kranken, die meist erst im Zustande schwerer Anämie zur Behandlung kommen, sehr empfindlich gegen wirkfame Vermifuga sind. Der Sitz der Parasiten in der Mukosa wird der Therapie wahrscheinlich immer sehr im Wege stehen.

Sonstiges.

Für die schon von Stödter ausgesprochene Ver-

mutung, daß bei der Magenstrongylose nicht allein die anatomischen Veränderungen die schweren Krankheitsercheinungen bedingen, sondern daß auch hier ähnlich wie bei der Ascaridenanämie von den Parasiten produzierte Toxine eine nicht geringe Rolle spielen, sprechen vielleicht einige Beobachtungen.

Man kann in manchen, wenn auch fortgeschrittenen Fällen, durch orale Applikation von hinreichenden Mengen der stark adsorbierenden Carb. med. schlagartig die Diarrhöe für einige Tage beseitigen und den Appetit heben. Dasselbe ist nach intravenöser Anwendung von Humalcalcäure gesehen worden, die im übrigen in jedem der drei Versuchsfälle schon nach Verabfolgung der halben Dosis zu kollapsartigem Zusammenstürzen mit völliger Erholung nach wenigen Minuten führte.

Entgegen englischen Beobachtungen sind Erkrankungen von Tieren, die mehr als drei Jahre alt waren, nicht bekannt geworden. Wurmkrankheiten sind vorwiegend Jugendkrankheiten. Ob dabei eine in der Jugend fehlende Immunität mitspricht, erscheint fraglich. Die weiter oben erwähnte Beobachtung, daß vorwiegend Ochsen erkranken, spricht dafür, daß außer anderen, nicht zuletzt dem jugendlichen Tiere eigene hormonale Zustände die Disposition bedingen. Jedenfalls ist es verlockend, Toxinbildung, Hormone und evtl. Immunität in den Kreis therapeutischer Erwägungen einzubeziehen, zumal nach allem was die Literatur ergibt, bisher auch anderswo gegen die Magenstrongylose des Rindes noch kein sicher wirkendes Kräutlein gefunden ist.

Vor der Hand würde manches mit prophylaktischen Maßnahmen zu erreichen sein. Es steht fest, daß die Krankheit begünstigt wird durch ausschließliche Heufütterung während des Winters in reinen Weidewirtschaften und daß mehr ackerwirtschaftlich eingestellte Betriebe, die reichhaltige Stallfütterung geben, wenig betroffen werden.

Die Anlage artesischer Brunnen und die Unterbindung des Zutrittes zu den Wassergräben ist für Jungvieh unbedingt angezeigt. Der Zusammenhang des oben erwähnten Grabengrasfressens mit der Magenstrongylose ist in Eiderstedt jedem Landwirt geläufig. Zudem lieferte das trockene Jahr 1920, in dem die besseres Wasser haltenden Tränkkühlen versiegten und die Tiere zum Wassernehmen aus den Gräben gezwungen waren, mit dem feuchtenhaften Auftreten der Magenstrongylose im Frühjahr 1921 den schlagendsten Beweis für die Wichtigkeit guten Tränkwassers.

In prophylaktischer Hinsicht käme weiterhin theoretisch die Aufhebung des schädigenden Einflusses frühzeitiger Kastration durch einseitige Exstirpation der Schilddrüse und weiterhin die Fernhaltung kranker Tiere von den Weiden gesehender in Frage.

Meine wenig erfolgreichen Arbeiten auf dem Gebiete des chronischen Magen- und Darmkatarrhs der Weidejung-rinder wurden durch meinen Fortzug aus Schleswig-Holstein vorzeitig beendet. Wenn ich trotzdem noch jetzt das unvollständig gebliebene Material mitteile, so bietet dazu den direkten Anlaß der Bericht über die Versammlung des Tierärztevereins Schleswig-Holstein vom 17. und 18. September 1927, in der Acid. tannic. mit Brombeerblätterdekot als Therapeutikum gegen den Jungrindermagen- und Darmkatarrh empfohlen worden ist.

Acid. tannic. ist anfänglich sehr viel von mir angewandt und wieder verlassen worden, und das Dekot wird, fürchte ich, wenigstens bei Magenstrongylose auch nicht stand halten. Das Experimentieren in der Praxis habe ich sehr zeitraubend, kostspielig, undankbar und unerfreulich in jeder Hinsicht gefunden und glaube, daß die gründliche Bearbeitung des Magen- und Darmkatarrhs in einem Institut, dem vor allem viel klinisches Material zur Verfügung stehen müßte, am aussichtsreichsten wäre.

Wenn meine Ausführungen dazu beitragen würden, daß auf dem Gebiete dieser peinlichen, in den ständig betroffenen Bezirken mit einem gewissen Fatalismus betrachteten Krankheit mehr als bisher geschähe, und wenn sie von mir gegangene Umwege hier oder da ersparen könnten, wäre ihr Zweck erfüllt.

Literatur.

1. Velmelage: Preuß. Veterinärberichte 1920—1922, S. 17.
2. Schüller: daselbst 1912, S. 24.
3. Warringsholz: daselbst,

- 1920—1922, S. 17.
4. Derselbe: daselbst, 1913, S. 11.
5. Vonnahme: daselbst, 1920—1922, S. 29.
6. Stödter: Die Strongyliden in dem Labmagen der gezähmten Wiederkauer und die Magenwurmsuche. Diff. 1901.
7. Dammann und Freese: Über die durch den Strongylus convolutus f. Ostertagi hervorgerufene Magenwurmsuche. D. T. W. 16. Jahrgang, 1908.
8. Ostertag: Eine neue Strongylusart im Labmagen des Rindes. Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene I, 1890.
9. Derselbe: Handbuch der Fleischbeschau 1913, II, 86.
10. Fiebiger: Die tierischen Parasiten der Haus- und Nutztiere. S. 268.
11. Jahresveterinärbericht 1920—1922, S. 35.

(Aus dem Tierseucheninstitut der Universität Leipzig. — Direktor: Prof. Dr. A. Eber.)

Ein Fall von Hühnertyphus bei jungen Enten.

Von Dr. Ruth Eber, Institutsassistentin.

Aus der Literatur ist bekannt, daß vorwiegend Hühner an Hühnertyphus erkranken. Nach den Beobachtungen verschiedener Autoren können auch Truthühner, Perlhühner, Fasanen und Pfauen von der Seuche ergriffen werden. Bisher ist aber noch keine gleichartige Erkrankung beim Wassergeflügel festgestellt worden (Reinhardt, Gressel). Csontos hat über einen Seuchengang in Ungarn berichtet, bei dem außer jungen und älteren Hühnern, Truthühnern auch Enten erkrankten. Die Krankheit erwies sich identisch mit dem Hühnertyphus. Außer *Bacterium typhi gallinarum alcalifaciens* isolierte er noch eine zweite Bakterienart, die dem *Bacterium coli* sehr ähnelt. Aus seiner Arbeit geht jedoch nicht einwandfrei hervor, ob er die Erreger des Hühnertyphus auch aus erkrankten Enten gezüchtet hat. Die Sektion hat Csontos an 12 Hähnchen, 1 Henne, 1 Truthahn ausgeführt. Sie unterblieb aber bei einem erkrankten Enterich und bei einer notgeschlachteten Gans.

Im August dieses Jahres wurden uns von einer größeren Geflügelfarm 7 Küken, eine junge Ente und später noch ein paar ältere Hühner zur Sektion eingefandt. Bei allen Tieren wurde durch die bakteriologische Untersuchung Hühnertyphus festgestellt.

Der Besitzer hatte die Eier der Hühner und Enten direkt aus Holland von verschiedenen Stellen kommen lassen und sie in dem gleichen Brutapparat erbrütet. Das Schlüpfergebnis der Barnevelderküken war sehr schlecht, auch starben viele Tierchen bald nach dem Schlüpfen. Nachdem das Sterben einige Tage aufgehört hatte, traten wieder unter denselben Küken und auch unter älteren Tieren seines Bestandes Krankheits- und Todesfälle auf. Es erkrankten und starben auch mehrere bis 14 Tage alte Enten. Die jungen Enten wurden in demselben Raum wie die Küken aufgezogen, doch kamen sie nicht direkt mit ihnen in Berührung, da sie von den Küken durch einen Drahtzaun getrennt waren.

Nähere Angaben über die Krankheitsercheinungen der jungen Enten konnte der Besitzer leider nicht mehr machen. Die Tierchen kränkelten nur kurze Zeit.

Der pathologisch-anatomische Befund zeigte wenig charakteristische Veränderungen. Es fanden sich zahlreiche Blutungen am Epikard, leichter Milztumor, katarrhalische Lungenentzündung sowie akute Darmentzündung. Aus dem Herzblut und den inneren Organen wurde der Erreger des Hühnertyphus gezüchtet.

Die Sektion der gleichzeitig eingefandten Küken ergab bei einem Teil dieselben Veränderungen wie bei der Ente, bei einem anderen Teil gelbe Nekroseherde in den Lungen, grauweiße Herde in der Herzmuskulatur sowie Geschwürsbildungen in der Darmschleimhaut. Durch die bakteriologische Untersuchung wurde Hühnertyphus festgestellt.

Die aus den Entchen gezüchteten Bakterien sind mit denen aus den Küken isolierten völlig identisch. Die kurzen

plumpen an den Enden abgerundeten Stäbchen von wechselnder Länge sind unbeweglich und gramnegativ. Ihr kulturelles und biochemisches Verhalten stimmt vollkommen mit den von Gressel beschriebenen und von Mießner als *Bacterium paradysenteriae* bezeichneten Hühnerstämmen überein. Die Bakterien bilden auf Drigalski blaue und auf Agar mittelgroße durchscheinende Kolonien. Der von uns gezüchtete Entenstamm bildet, wie bekanntlich auch eine Anzahl aus Hühnern gezüchtete Hühnertyphusbakterien, keinen Schleimwall. Ebenso verhalten sich auch die aus den Küken gezüchteten Erreger. Der Enten- und Kükenstamm vergären die Zuckerarten und höheren Alkohole nicht und lassen Neutralrot unverändert. Sie bilden in Traubenzucker, Arabinose, Rhamnose, Mannit, Maltose, Dulzit und Dextrin Säure und greifen Laktose, Saccharose und Sorbit nicht an. Lackmusmolke schlägt am 4. Tage von Rot in Blau um. Die Indolprobe ist negativ, dagegen werden deutliche mit Bleipapier nachweisbare Mengen von Schwefelwasserstoff gebildet. Der Entenstamm agglutiniert Hühnertyphus-, Pullorum- und Typhuserum (Kochinstitut) bis zum Endtiter. Schottmüller- und Breslauserum (Kiel) werden nicht nennenswert beeinflusst, dagegen wird derselbe durch Gärtnerferum zu 6,5 Prozent agglutiniert. Auch serologisch zeigt dieser Stamm keinen Unterschied gegenüber den aus Küken gezüchteten Hühnertyphusstämmen.

Aus diesen Feststellungen geht hervor, daß die Ente am echten Hühnertyphus und nicht an bakterieller weißer Ruhr oder an einer Infektion mit Enteritis-Breslaubakterien, die häufig unter Enten schwere Verluste verursachen, erkrankt war.

Wenn auch nur bei einer jungen Ente der Erreger des Hühnertyphus nachgewiesen wurde, so lassen doch der Befund und die im Vorbericht erwähnten Umstände ohne weiteres darauf schließen, daß die anderen gleichzeitig gestorbenen, leider nicht zur bakteriologischen Untersuchung gelangten jungen Enten derselben Seuche zum Opfer gefallen sind.

Es können also auch Enten an Hühnertyphus erkranken. Da schon verschiedentlich festgestellt worden ist, daß außer Hühnern auch anderes Geflügel (Truthühner, Perlhühner, Fasanen und Pfauen) an Hühnertyphus erkranken kann, so erscheint es uns zweckmäßig, anstatt von „Hühnertyphus“ von „Geflügeltyphus“ zu sprechen. Zu dem Vorschlage Mießners, den Hühnertyphus künftig als Paradyseuterie zu bezeichnen, möchten wir zur Zeit noch nicht Stellung nehmen, da hierzu noch weitere vergleichende Untersuchungen notwendig sind.

Literatur.

- Beck und Ruth Eber: Bakterielle weiße Ruhr der Küken. Arch. f. wiss. Tierheilk. 1927, 56, S. 121. Csontos: Der Hühnertyphus und seine Bekämpfung. Zbl. f. Bakt. (Orig.) 1923, 90, S. 264. Gressel: Vergleichende Untersuchungen über das *Bacterium paradysenteriae*. (Bac. gallinarum Klein, Bact. sanguinarium Moore, Bac.

typhi gallinarum alcalifaciens Pfeiler). D. T. W. 1927, S. 267. Mießner: Paratyphus und Paratyphenterie. Bericht über die Verhandlungen auf der 89. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Natur-

forscher und Ärzte in Düsseldorf vom 19.—26. September 1926. Zbl. f. Bakt. (Ref.) 1927, 84, S. 496. D. T. W. 1927, S. 149. Reinhardt: Lehrbuch der Geflügelkrankheiten, 2. Aufl., 1925.

Aus der geburtshilflichen Praxis.

Von Dr. Walch.

Beinahe jeder Praktiker in seinen Anfängerjahren nimmt bei geburtshilflichen Gängen Instrumente mit, die er wohl selten, ja sehr selten benötigt; jedenfalls so erging es mir, als ich jahrelang das Pfanzliche Embryotom mitführte und daselbe nie benötigte. Als alter Praktiker darf man es ja wohl ruhig eingestehen, das besagte Instrument, wozu man sich beinahe einen Dienstmann bestellen mußte, wenn man seine Praxis, wie viele Kollegen vor 25 Jahren es taten und heute noch tun, mit dem Fahrrad besorgten, hätte ich wirklich manchmal denn doch nicht mitgeführt, wenn man sich nicht gefagt hätte, man kann vielleicht damit „Eindruck schinden“. Offen gestanden, ich kam nach Jahren nie in die Lage, das Instrument anzuwenden, obwohl doch allwöchentlich in meiner Praxis mindestens eine Schweregeburt „fällig“ ist. Wie es mir mit diesem Instrument, so mag es wohl an andern Praktikern mit andern Instrumenten ergangen sein. Schon oftmals auf meinen geburtshilflichen Praxisgängen habe ich dann an jene Stunde gedacht, wo mir mein lieber alter Professor Dr. Vogel im Schlußabschnitt der Approbationsprüfung die Frage vorlegte: Herr Kandidat, wenn Sie zu einer Schweregeburt gerufen werden, welche Instrumente nehmen Sie wohl mit? Vor allen Dingen meinen starken kräftigen Arm, war meine prompte Antwort und, so fuhr ich fort, einen guten Hanfstrick. Es ist recht, meinte Professor Vogel und erweiterte die Frage durch das Hinzufügen: und aus dem Instrumentenschrank nehmen Sie noch „einen Augenhaken“, denn was für den Menschenarzt die Geburtszange, das ist für den Tierarzt der Haken, war wieder meine präzise Antwort, ferner ein Fingermesser, wenn möglich noch einen Choanenhaken und, sofern eine solche zur Verfügung ist, eine Geburtsläge. Sie können gehen, Herr Kandidat, und können die geburtshilfliche Praxis aufnehmen, war der kurze, trockene Bescheid und wohl auch ein ebenso trockenes, glattes Prädikat meines unvergeßlichen Examinators. Ob aus diesem kurzen Schlußbescheid die Ansicht herausgelesen werden sollte, daß die andern Instrumente, wie sie in den Handbüchern für Geburtshilfe aufgeführt sind, in den allermeisten Fällen bloß theoretischen Wert haben, und darüber kein Wort mehr verloren werden sollte, vermochte ich damals nicht zu ergründen. Auf Grund meiner langjährigen Erfahrung vermute ich es heute indessen.

In meinen nach vielen hunderten von Fällen von Schweregeburten, deren Zahl vom zweiten Tausend nicht weit entfernt ist, kam ich beinahe stets mit einem winzigen Instrumentarium aus und habe längst mein, wie ein Heiligtum erstlich mitgeführtes Embryotom an einen jüngeren Kollegen abgegeben, damit dieser seinerseits die Gefühle bei den Bauern wachrufen möge, die ich seiner Zeit glaubte hervorzaubern zu können.

Neulich indessen wäre mir eine gute „unfehlbare“ Geburtskrücke doch willkommen gewesen. Die Günther'sche Geburtskrücke verwende ich, nebenbei bemerkt, schon lange nicht mehr, da ich durch Abgleiten einmal einen üblen Zufall hatte. In diesem, dem vorliegenden Falle war eine Geburtskrücke unumgänglich notwendig. Daher mußte man sich etwas ähnliches konstruieren. Eine große, schwere Simmenthaler Kuh, bei der ich eine heftig in das Becken hineingepreßte reine Steißlage mit weit nach vorn verschlagenen Füßen feststellte. Es war direkt unmöglich, zwischen der Beckenwand und dem Kalb mit der Hand hindurch zu kommen, dermaßen war das Junge in den Beckeneingang

geradezu eingekellt. Der Grund hierfür, erstlich unerklärlich, zeigte sich indessen bald in einer bestehenden Zwillingsgeburt von zwei außerordentlich schweren und großen Kälbern, die beide in der Steiß- bzw. Beckenendlage entwickelt werden mußten. Um nun bei dem ersten, dem vorliegenden Kalbe eine Haltungsberichtigung vornehmen zu können oder überhaupt den Versuch zu machen, irgend etwas auszuprobieren, mußte daselbe möglichst tief in die Höhle des Tragsackes zurückgehoben werden. Wie ich dies in ähnlichen Fällen nun regelmäßig tue, so instruierte ich auch hier einen Gelegenheitsgeburtshelfer, der mit seinem rechten Arm meinem linken bereits eingeführten Arm zu folgen hatte, um den Daumen, durch meine Hand geleitet, in den After des Kalbes hineinzudrücken. In dieser Stellung sollte er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften das Junge in die Gebärmutter zurückstoßen. Die „menschliche“ Geburtskrücke jedoch genügte in diesem Falle nicht und man mußte darauf bedacht sein, eine viel größere Kraft als diejenige eines einzelnen Mannes anwenden zu können. Um dies zu erreichen, konstruierte ich mir hurtig eine Geburtskrücke, an die ich drei, ja vier Mann „anhängen“ konnte. Dazu nahm ich einen Karststiel, mancherorts Karsthelm geheißen — der Karst ist ein zweizinkiges Ackergerät und wird speziell beim Abernten der Kartoffeln benützt — der Stiel dieses Gerätes ist etwa 1—1,20 m lang mit einem Durchmesser von 3—4 cm und aus Eschen- oder Buchenholz hergestellt. Infolge des bei der Arbeit ständigen hin- und hergleitens des Stieles in der Hand des landwirtschaftlichen Arbeiters ist das Holz geradezu poliert und eignet sich vorzüglich zu dem geplanten Zweck. Ein Karst oder eine Schaufel — eine Kieschaufel — findet sich übrigens in vielen Gegenden beinahe in jedem Stall. Ein Schaufelstiel mag sich ebenso gut eignen, so daß man schnell und ohne größere Vorbereitungen im Notfalle sich eine Geburtskrücke und zwar eine solide, praktische, und, wenn einigermaßen sorgfältig vorgegangen wird, eine unfehlbar unschädliche herstellen kann.

Franck in seiner „Geburtshilfe“ weist übrigens schon darauf hin, daß einzelne Praktiker ein gabelförmiges Stück Holz als Geburtskrücke benutzt hätten. Ein solches brauchbares Holz ist denn doch nicht ohne weiteres bei der Hand, geschweige denn noch zum Gebrauch fertig hergerichtet, während die aus einem Karsthelm entstandene Krücke im Handumdrehen dem Zweck dienen kann. Mit einer Säge wird der Karst vom Stiel getrennt, man kann auch den Karst mit einem Hammer lösen. Am entgegengesetzten, dem freien Ende des Stieles in einer Entfernung von 12 bis 15 cm vom Ende, weil hier auch die Querfläche poliert ist, wird der Stiel mit einem zusammengerollten Hand- oder Taschentuch umwickelt, so daß ein Wulst von etwa 6 bis 8 cm Durchmesser entsteht, der durch quer durch das Holz hindurch getriebene Drahtnägeln fixiert und in seiner Lage erhalten wird. Die Köpfe der Nägel verlieren sich in den Falten des Wulstes und müssen unbedingt unschädlich sein. Der Zweck dieses Wulstes ist ja leicht zu erraten: während das freie Ende des Stieles in den After und Mastdarm des Kalbes eingeführt wird, findet der Wulst das ihm zugedachte Hindernis am Aftereingang, wo der Angriff stattfinden muß, wenn das Kalb zurückgestoßen werden soll.

Nachdem nun das Ganze gebrauchsfähig war, wurde derjenige Teil des Instrumentes, der in das Muttertier ein-

geführt werden sollte, noch mit einer Schicht Schweinefett überstrichen und, geleitet durch die Hand des Operateurs durch die Scheide des Muttertieres hindurch in die Gebärmutter wurde das freie Ende vor dem Wulst in den After des Kalbes versenkt, bis der Wulst am Aftereingang sich gesperret hat.

Nachdem ich einen guten, längst parat gehaltenen Strick in die Geburtsteile hereingeholt hatte, ließ ich an meiner Geburtskrücke, die ordentlich sitzt, einmal drei Bauern ordentlich schieben und siehe da, der längst ersehnte Augenblick, wo es gelang, einen Strick um den Oberschenkel anzulegen, war gekommen, und durch eine gleiche Prozedur wurde auch der andere Oberschenkel angefeilt und die Geburtskrücke bis auf weiteres entfernt.

Da mir in diesem Falle eine Lageberichtigung unmöglich schien, andererseits die Geburtswege des Muttertieres mir recht weit vorkamen, glaubte ich zum Versuche schreiten zu dürfen, das Junge mit untergeschlagenen Füßen herauszuziehen, was auch tatsächlich mit nicht allzu großer Mühe gelungen ist. Das zweite Kalb, ebenfalls in

reiner Steißlage, konnte ohne weiteres lageberichtigt und entwickelt werden.

Es wird wohl noch interessant sein zu erfahren, daß durch das Einführen meiner improvisierten Geburtskrücke in den Mastdarm des Kalbes keine Perforation, überhaupt keine Verletzung entstanden ist. Wenn diese Methode immerhin als Gewaltmethode in den Augen des Laien so wohl wie in denen des Fachmannes gelten mag, weil eben durch eine Perforation des Darmes das Junge verfallen ist, so ist andererseits zu bedenken, daß man sich keine sonderlich großen Gewissensbisse machen darf, da bei Steißgeburten die intrauterinen Todesfälle so wie so sehr häufig sind, in dem die Atmung bereits einsetzt, in dem Moment, wo die Extraktion noch längst nicht vollzogen ist. So auch bestimmt in unserem Falle, wo das erste Kalb tot geboren wurde, während das zweite, obwohl in Steißlage, samt dem Muttertier heute noch wohlbehalten und gesund die schwere Stunde längst nicht mehr „in Erinnerung haben“ dürften, die sie durchgemacht haben.

Ein Einblick in das Gebiet der Leberegelmittel.

Erwiderung der Chemischen Fabrik Aubing auf den Aufsatz von Herrn Prof. Dr. Wilhelm Nöller in D. T. W. 1928, Nr. 6, S. 84.

Die Chemische Fabrik Aubing ist nicht gewillt, Herrn Prof. Dr. Nöller auf das Niveau seines Artikels zu folgen. — Sie hat die völlig unberechtigten und nicht mehr sachlich zu nennenden Angriffe, die Herr Prof. Dr. Nöller in dem zitierten Aufsatz gegen die Chemische Fabrik Aubing und einige ihrer Mitarbeiter wiederholt, bereits früher zurückgewiesen und seine durchwegs unrichtigen Behauptungen richtiggestellt. Es spricht nicht für Herrn Prof. Dr. Nöller, wenn er trotz der gegebenen Aufklärungen seine alten Behauptungen aufrecht erhält.

Die Chemische Fabrik Aubing beschränkt sich lediglich auf folgende Richtigstellungen:

1. Es ist unrichtig, daß die Deklaration „Carboneum chloratum“ irreführend war. Unter Carboneum chloratum wird nicht Tetrachlorkohlenstoff, sondern die ganze Gruppe der Chlorkohlenstoffe verstanden. Bei Neoserapis wurde außerdem noch im eigenen Interesse der Chemischen Fabrik Aubing der Deklaration der rote Stempelaufdruck: „Frei von Tetrachlorkohlenstoff“ beigefügt.
2. Die Angaben des Herrn Prof. Dr. Nöller über das Verhältnis zwischen Herstellungs- und Verkaufspreis der Aubinger Präparate sind unrichtig. Die behaupteten Spannen haben niemals bestanden. Die Kalkulation der Chemischen Fabrik Aubing hält jeder Nachprüfung stand und sieht lediglich eine normale Gewinnmöglichkeit vor.
3. Es spricht gegen die von Herrn Prof. Dr. Nöller bezeichneten Hersteller von Leberegelmitteln, wenn sie die Einführung eines von ihnen angeblich als

wirksam erkannten Präparates unterließen, weil durch die Nachahmungsmöglichkeit die Rentabilität der Einführung gefährdet war. Es spricht für die Chemische Fabrik Aubing, daß sie trotz dieses Risikos die hohen Kosten der Erprobung und Einführung auf sich genommen hat.

4. Die Behauptung Herrn Prof. Dr. Nöller's, daß Neoserapis hinsichtlich Wirkung und Unschädlichkeit den Filicinpräparaten nachstehe, ist unrichtig. Das Gegenteil ist durch die Literatur, insbesondere durch die amtliche Veröffentlichung der Bayer. Veterinärpolizeilichen Anstalt (Veterinärmedizinalrat Dr. Lang in M. T. W. 1927, Nr. 48) erwiesen und durch die Tatsache erhärtet, daß zahlreiche Behörden und ein sehr bedeutender Prozentsatz der Tierärzte des In- und Auslandes das Neoserapis als Heilmittel gegen die Leberegelseuche der Rinder bevorzugt.

Der Ruf der Chemischen Fabrik Aubing steht durch 25jährige vertrauensvolle Beziehungen mit der Wissenschaft und Praxis des In- und Auslandes fest und kann durch Angriffe von der Art derer des Herrn Prof. Dr. Nöller nicht erschüttert werden. — Die starken freundschaftlichen und geschäftlichen Beziehungen, welche so viele Wissenschaftler und Praktiker mit der Chemischen Fabrik Aubing unterhalten, haben durch die Einführung der Serapispräparate nicht nur eine Ausdehnung erfahren, sondern wachsen stetig.

Aus diesen Gründen schließen wir hiermit für unseren Teil die Polemik mit Herrn Prof. Dr. Nöller endgültig. *)

Bericht über die Fachtierärztetagung zur Bekämpfung der Aufzucht-krankheiten. „Die Ätiologie der sog. Coliruhr der Neugeborenen“ von Dr. Detre und Dr. Rohonyi-Budapest. D. T. W. 1928, Nr. 5, S. 72. Die Autoren bitten um Veröffentlichung folgender Berichtigung: Auf Seite 73 findet sich die Angabe, wonach der von uns entdeckte Bacillus zoodysenteriae Hungaricus auf der Zeißler-Platte einen hämolytischen Hof bildet. Diese Angabe stützte sich auf Beobachtungen, welche wir an unserem Stamm Nr. 87 (aus einem Kalbe gezüchtet) diesbezüglich gemacht haben. Unsere übrigen Stämme zeigten damals keine Hämolyse, was wir seinerzeit so erklärten, daß nicht bloß die Virulenz des neuen Bazillus, sondern auch die biologischen Fähigkeiten allmählich eine Einbuße erfahren, desto eher, als der Stamm Nr. 87 zum Zeitpunkte des Jeneser Kongresses unser frischester Stamm gewesen ist und wir zur Ansicht hinneigten, daß die negative Hämolyse bei den übrigen Stämmen mit dem Alter dieser Stämme zu

erklären sei. Nun stellte es sich feither heraus, daß dieser Stamm Nr. 87 sich auch in gewissen anderen Hinsichten (abweichender Sektionsbefund und an Meerfischweinden sodann Sporenbildung) von unseren anderen Ruhrstämmen abweicht und da andererseits sämtliche feither von uns herausgezüchteten frischen Stämme (fünf an der Zahl) auf der Zeißler-Platte keine Hämolyse zeigten, legen wir Gewicht darauf, zu erklären, daß der Bacillus zoodysenteriae Hungaricus — entgegen unserer früheren Anschauung — auf der Zeißler-Platte keine Hämolyse erzeugt.

„Über den Wert der Mutterschutzimpfung bei der Coliruhr der Kälber und beim Paratyphus der Ferkel.“ Von Dr. Rudolf, Wien. D. T. W. 1928, Nr. 4, S. 60, linke Spalte, Reihe 10 von unten muß es statt 15 Gramm des auf diese Weise . . . heißen: 1 Gramm usw.

*) Auch für die Schriftleitung ist die Polemik erledigt. Mießner.

Innere Medizin und Chirurgie.

v. Düring, W.: Beiträge zur Kenntnis der Erkrankung von Hund, Katze und Frettchen an Otitis externa parasitaria unter besonderer Berücksichtigung der Häufigkeit ihres Vorkommens, der Artbestimmung der Milben sowie Untersuchungen über ihre zweckmäßige Bekämpfung. (In.-Dissert. Berlin 1926.)

Eine rechtzeitig eingeleitete Behandlung des Leidens führt meist in 8—14 Tagen zur Heilung. Als beste Heilmittel haben sich erwiesen: Sol. chloramini 1,0 : 1000,0 in Verbindung mit Oleum Zinci (= Zinci oxydati crudi zu Paraff. liquid. wie 2 : 5) oder 5prozentige Salben mit Oleum Carvi, Anisi, Thymi, Caryophyllorum usw. Vor der medikamentösen Behandlung muß in jedem Falle eine sorgfältige vorsichtige Reinigung des Gehörganges von Cerumen und Epithelschuppen erfolgen. Bei starkem Juckreiz und bei Kratzdefekten erzielt man durch Behandlung mit Oleum und Unguentum Zinci oder Helobromsalbe gute Erfolge. Eine gründliche Desinfektion des Lagers usw. ist in jedem Fall geboten, besonders, wenn sich noch andere Hunde, Katzen oder Frettchen außer dem Patienten in der Wohnung befinden, um eine Übertragung zu verhindern. Bei normal verlaufenden Krankheitsfällen ist die Heilung vollständig. Rezidive oder Pachydermien des äußeren Gehörganges mit schließlicher Taubheit, wie bei nicht parasitären Otitiden, sind dabei nicht beobachtet worden. A.—

Krecke, A.: Die Behandlung des Paronychiums mit grauer Salbe. (Münch. m. W. 1927, S. 74.)

Verf. behandelte früher jedes Paronychium (Nagelgeschwür) mit Entfernung des Nagels, wendet aber jetzt nach dem Vorgange von Denks die graue Salbe in der Form an, daß diese messerrückendick auf ein Mulläppchen gestrichen und der erkrankte Finger damit eingebunden wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine starke Rötung des Nagelfalzes oder schon eine Eiterblase vorhanden ist. Bei dieser Behandlung lassen die Schmerzen schon am zweiten Tage nach und am achten Tage war regelmäßige Heilung eingetreten. Die Hauptsache ist dabei, daß die graue Salbe dick aufgetragen wird und daß der Verband acht Tage liegen bleibt. Carl.

Schießl, M.: Über Erfahrungen bei veralteter Ischias mit Injektionen von Sanarthrit. (Aus dem Krankenhaus der Aachener Knappschaft.) (Münch. m. W. 1927, S. 110.)

Verf. konnte die günstigen Erfahrungen von Fischer und von Oltersdorf mit der vorliegenden Therapie bestätigen. Es werden fünf Ischiasfälle aufgeführt, bei denen nach intramuskulärer bzw. intravenöser Injektion von Sanarthrit-Heilner teils vollständige Wiederherstellung, teils erhebliche, in einem Falle allerdings mäßige Besserung erzielt wurde. Die Injektionen wurden fortgesetzt, bis eine deutliche Reaktion des Körpers (Fieber und Herdschmerz) eintrat. Carl.

Haberlandt, L.: Über hormonale Sterilisierung weiblicher Tiere. (Fütterungsversuche mit Ovarial- und Plazenta-Opton.) (Münch. m. W. 1927, S. 49.)

Verfasser hat früher eine hormonale Sterilisierung weiblicher Tiere dadurch erzielt, daß er Eierstöcke trächtiger Kaninchen und Meerschweinchen auf nicht trächtige Weibchen implantierte. Derselbe Erfolg wurde erreicht bei Kaninchen durch subkutane Injektion von Ovarial- und Plazenta-Opton der Merckschen Fabrik (Hemmung der Ovulation).

In den letzten drei Jahren wurden nun diese Versuche an weißen Mäusen auf dem Wege der Fütterung fortgesetzt. Die Tiere erhielten mit der Milch täglich 1—2 Monate lang teils Ovarial- teils Plazenta-Opton. Nach Beendigung der Behandlung wurden die Tiere mit Männchen zusammengegeben, die öfters ausgewechselt wurden. Dabei ergab sich, daß auch durch innerliche Verabreichung der er-

wähnten Präparate eine hormonale Sterilisierung weiblicher Tiere bewirkt werden konnte, und zwar wurde dabei entweder eine dauernde oder nur eine temporäre Sterilität (von 1—1½ Monaten Dauer) erzielt. In letzterem Falle wies der nächste Wurf eine auffallend kleine Jungenzahl auf (drei normale lebende Junge anstatt 6—10 unter normalen Verhältnissen).

Verf. weist zum Schlusse hin auf die Bedeutung der vorliegenden Untersuchungsergebnisse für die praktische Heilkunde bzw. die Sozial- und Sexualhygiene. Carl.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Christiansen, M.: Muskelfinnen bei Rehen. (Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene 1927, 37, S. 399.)

In der Muskulatur eines Rehkitzes fand Christiansen massenhaft vollentwickelte, klare Finnen (im ganzen wenigstens 500 Stück), die genau mit den von Ransom beschriebenen Cystercercus ovis übereinstimmten. Dies galt für alle Merkmale: Größe und Form der Finnen, Aussehen der Blafenwand, Anzahl, Größe und Form der Haken. Vielleicht war die Form der Finnen selbst häufig etwas langgestreckter als bei C. ovis, und bei einigen Exemplaren war die Blase auffallend klein im Verhältnis zu dem eingestülpten Kopf und Hals; aber diese Erscheinung war keineswegs konstant, und in Wirklichkeit war kein Anhaltspunkt für eine Trennung zwischen diesen Rehfinnen und C. ovis vorhanden. Bei den Übertragungsversuchen auf Hunde wurden zwei junge Hunde mit je 65 Finnen gefüttert. Nach 46 und 71 Tagen wurden Onkosphären in den Fäzes nachgewiesen, und es begannen Proglottiden abzugehen. Der eine Hund wurde 81 Tage nach der Infektion getötet; im Dünndarm fanden sich 18 Bandwurmexemplare. Im zweiten Hund wurden 253 Tage nach der Infektion im Dünndarm 59 Bandwurmexemplare vorgefunden. Mit spontan abgegangenen Proglottiden und onkosphärenhaltigen Fäzes wurden im ganzen 6 Lämmer im Alter von acht Tagen bis drei Monaten gefüttert. Die Tiere wurden 77 bis 84 Tage nach der Fütterung getötet, aber es ließ sich keine Spur von Finnen, speziell Muskelfinnen, nachweisen, obwohl einige der Tiere große Massen von Onkosphären aufgenommen hatten. So wurde ein 1 Monat altes Lamm im Laufe von drei Wochen sechsmal mit im ganzen 97 abgegangenen Proglottiden gefüttert; bei der Untersuchung, 77 Tage nach der letzten Fütterung, fanden sich überhaupt keine pathologischen Veränderungen bei dem Tiere vor. Dasselbe negative Resultat ergaben Fütterungsversuche an zwei etwa ½ Jahr alten Zicklein. Dagegen konnten durch Verfütterung von Proglottiden und onkosphärenhaltigen Fäzes des einen Versuchshundes an ein acht Tage altes Rehkitz in dessen Muskulatur Rehfinnen erzeugt werden. Hiernach ist die unterfuchte Rehfinne weder mit Cystercercus cellulosae noch mit C. ovis identisch, sondern stellt eine von diesen verschiedene Art dar, deren Bandwurm im Dünndarm beim Hunde lebt. Bis auf weiteres ist man jedoch berechtigt, es für sehr wahrscheinlich zu halten, daß die Rehfinne identisch mit der Renntierfinne ist. Die nahe Verwandtschaft zwischen den beiden Wirtstieren macht die Wahrscheinlichkeit um so größer. Edelmann.

Ziegler, M.: Über die Entstehung der multiplen Muskelblutungen beim Schwein. (Vorläufige Mitteilung.) (Zeitschr. f. Fleisch- und Milchhygiene 1927, 37, S. 397.)

Im Anschluß an die Veröffentlichung von Laux nimmt Ziegler zu der obengenannten Frage kurz wie folgt Stellung: Nachdem durch die Untersuchung und experimentellen Feststellungen von Hertha und Burchard der Zusammenhang der multiplen Muskelblutungen mit den durch den Betäubungsschlag bedingten Blutungen im Halsmark und in den davon abgehenden Nerven erwiesen worden ist, hält es Ziegler für unzweifelhaft, daß sich

auch der Zusammenhang zwischen multiplen Muskelblutungen und Betäubung durch die durch den Betäubungsschlag oder -schuß bedingte mechanische Reizung der Gefäßnerven und Gefäßzentren erklären läßt. Ein Kennzeichen für die bei der Betäubung eintretende traumatische Läsion des Nervensystems und damit auch der Gefäßnerven und Gefäßzentren bilden die von Hertha und Burchardt im Bereiche des Halsmarks und der davon abgehenden Nerven nachgewiesenen Blutungen. Die multiplen Muskelblutungen sind Diapedesibildungen neurogenen (vasomotorischen) Ursprungs, die ihre Entstehung der durch den Betäubungsschlag oder -schuß hervorgerufenen mechanischen Reizung der Gefäßnerven und Gefäßzentren verdanken.

Edelmann.

Mollow: Über die Verbreitung der Echinokokkenkrankheit beim Menschen in Bulgarien. (Seuchenbekämpfung 1927, Heft 3, S. 178.)

Statistisch wird nachgewiesen, daß nahezu ein Drittel der Rinder und drei Viertel der Schafe mit Echinokokken behaftet sind. Da die veterinärpolizeiliche Überwachung besonders auf dem Lande recht mangelhaft ist, so gehört Bulgarien zu jenen Ländern, wo die Echinokokkenkrankheit beim Menschen häufig auftritt. Es handelt sich fast stets um den *Echinococcus polymorphus*. Das am häufigsten befallene Organ ist die Leber; an zweiter Stelle steht die Lunge.

Meyn.

Balázs, S.: Experimentelle Untersuchungen betreffend die Biologie und die toxische Wirkung des Körpersekretes der *Ascaris vituli*. (Közlemények az összehasonlító élet és kortán köréből. 1927. XX. S. 194.)

Untersuchungen in mehreren Kälberbeständen Ungarns führten zu dem Ergebnis, daß während von 178 über sechs Monate alten Rindern sich bloß 1,74 Prozent mit Askariden infiziert zeigten, konnten von weniger als 3 Monate alten Kälbern bei 27,49 Prozent der Tiere Spulwürmer in jeweils verschiedener Menge gefunden werden. In den mit dem Kot entleerten Wurmeiern beginnt die Furchung in 2 bis 3 Tagen und der fertige Embryo erscheint durchschnittlich in 3 Wochen; durch niedrige Temperaturen wird die Entwicklung ungünstig beeinflusst. *Ascaris vituli* hat einen spezifischen Geruch, den unter besonderen Umständen auch das Fleisch der Wirtstiere annimmt. Die pathogene Wirkung des Wurmes auf die Darm Schleimhaut kann in deren Schwellung und hämorrhagischen Infiltration zum Ausdruck kommen. Dabei lassen aber Kälber keine so weitgehende Empfindlichkeit gegenüber den Giftstoffen der *Ascaris vituli* erkennen, als z. B. Pferde denen der *Ascaris megalocephala* gegenüber. Die stärkste Wirkung übten Emulsionen von Ascarispulver mit Kochsalzlösung aus, eine schwere Erkrankung rief ferner das Filtrat des frischen Körpersekretes und in einem Falle auch der ätherische Auszug hervor. Das Toxin erwies sich als thermolabil. Die in dieser Weise ausgelösten Reaktionen hatten weder anaphylaktische noch immunbiologische Grundlage, sondern waren als die Folgen von Idiosynkrasie oder von einer toxischen Wirkung aufzufassen.

Marek.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Giese, Cl. und K. Beller: Über den Nachweis von Tuberkelbazillen im Lungenschleim des Rindes. (Arch. für wiss. Tierheilkunde, 1927, 55, S. 333.)

Verfasser prüften das von Scharr und Lentz angegebene Verfahren (Aufschwemmung von Luftröhrenpinfelproben 24 Stunden in 2proz. Glycerinwasser) zum Nachweis der offenen Lungentuberkulose des Rindes nach und konnten feststellen, daß es ebenso wie die von Machens benutzte Methode nicht auf einer Keimvermehrung beruht, sondern nur rein passive Einigung (relative Anreicherung)

auf physikalischen Wege bewirkt. Es ist praktisch brauchbar und im Stande, bis zu 90 Prozent und mehr der positiven Fälle zu erfassen, besitzt auch dem Antiforminverfahren gegenüber größere Zuverlässigkeit, da bovine Tuberkelbazillen gegenüber Antiformin eine geringere Widerstandsfähigkeit besitzen. Durch das Verfahren von Scharr und Lentz wird der Tierversuch auf ein Mindestmaß von etwa 10 Prozent beschränkt, ohne daß er jedoch völlig auszuschalten wäre. Vielfach verfaßt die bakteriologische Diagnose, da die Tuberkelbazillen gelegentlich auch bei gefunden Rindern vorkommen oder auch bei nachweisbar offener Lungentuberkulose vorübergehend fehlen. Ausschlaggebend bleibt deshalb die klinische Untersuchung.

Geiger.

Weichlein: Zur Rotlaufschützimpfung tragender Sauen. (T. R. 1927, S. 550.)

Eine Umfrage bei 195 Tierärzten der Provinz Brandenburg ergab als vorherrschende Ansicht, daß weder die Simultan- noch die Serumimpfung tragender, selbst hochtragender Sauen gefährlich ist. Verworfen wird nur durch die mit dem Impfstoff verbundene Aufregung hervorgerufen, weshalb Zwangsmittel und Beunruhigung der Tiere zu vermeiden sind. Unruhige und böartige Sauen sind von der Impfung auszuschließen. Ebenso ist die Impfung zu unterlassen, wenn der Besitzer Bedenken dagegen äußert und sich nicht richtig aufklären läßt.

Geiger.

Mayer: Selbstinfektion durch Rotlaufkultur mit nachfolgender Serumkrankheit. (T. R. 1927, S. 534.)

Verfasser berichtet in ausführlicher und interessanter Weise über seine Infektion mit Rotlaufkultur am linken Zeigefinger, die mit Jodpinselung, Umschlagen und dann durch intramuskuläre Impfung mit 10 ccm Rotlauffserum behandelt wurde. Im Anschluß an die Impfung traten beim Verfasser, der schon ein Jahr vorher mit Rotlauffserum behandelt worden war, stürmische Erscheinungen von Serumkrankheit auf, die etwa 15 Tage lang anhielten und zeitweise lebensgefährlichen Charakter annahmen. Verfasser kritisiert die bei ihm angewandte Behandlungsmethode und betont als obersten Grundsatz bei Rotlaufinfektion (wie Ref. aus eigener Erfahrung bestätigen kann) die Stilllegung des betr. Gliedes bzw. der Hand oder des Armes durch Schienenverband, damit ein Weitergreifen der Infektion verhütet wird.

Geiger.

Rudolf: Beitrag zur Bekämpfung der Kälberruhr und des Paratyphus der Ferkel durch Impfung. (Aus dem Institut für Bakteriologie und Hygiene der Tierärztlichen Hochschule Wien. — Vorstand: Prof. Dr. J. Schnürer.) (T. R. 1927, S. 529.)

Verfasser berichtet über seine in mehreren verseuchten Beständen ausgeführten Versuche, die genannten Jungtierkrankheiten durch Immunisierung der Muttertiere mit polyvalenten oder besser stallspezifischen Vakzinen zu bekämpfen. Die Impfungen müssen bei Rindern am Ende des zweiten oder zu Beginn des letzten Trächtigkeitsdrittels durchgeführt werden. Um zu starke Reaktionen zu vermeiden, ist fraktionierte Dosierung nötig. Schweine sind gegen die Einverleibung der Vakzine jedoch nicht empfindlich. Bei Paratyphus der Ferkel und sog. Mischinfektionen von „Schweinefeuche“ und Paratyphus hat die Impfung der Muttertiere mit Suidysan „V“ bei nachfolgender Vakzination der Ferkel mit dem gleichen Impfstoff in den ersten Lebenstagen ebenfalls befriedigende Ergebnisse gezeigt.

Geiger.

Bierbaum, K.: Chemotherapeutische Versuche mit Arsenpräparaten an rotzkranken Pferden. (Aus der ehemaligen Tierseuchenforschungsstelle Ost. — Leiter: Generaloberveterinär Prof. Dr. Lührs.) (Zeitschr. f. Infekt.-Krankh. d. Hst. 1927, 31, S. 259.)

Die Versuche Bierbaums haben ergeben, daß durch Behandlung mit Arsenpräparaten verschiedenster Zusammensetzung und mit wechselnder Kombination eine

Heilung rotzkranker Pferde wenig wahrscheinlich ist. Die Fälle, in denen Zerlegungsbefunde mit mehr oder weniger vorgeschrittenen Heilungsvorgängen vorlagen, können auf Grund negativer Ergebnisse bei gleichsinnig behandelten Pferden als Selbstheilungen ausgeschieden werden, die auch ohne Behandlung häufiger, als bisher angenommen, vorkommen. Die von Benewolensky und von Schiemann festgestellte elektive Wirkung des Salvarian in vitro steht zu den Ergebnissen der Versuche des Verfassers in vivo in einem gewissen Gegensatz, so daß es sich verlohnen dürfte, mit einigen Worten auf diese Diskrepanz und die Gründe des Versagens der Salvarianbehandlung bei rotzkranken Pferden einzugehen. Einen Hauptgrund wird man zunächst in der schweren Erreichbarkeit der Rotzbazillen im Organismus erblicken können. In den Gewebszellen oder zwischen ihnen liegend und von einer mehr oder weniger dicken Bindegewebskapfel abgeschlossen, werden sie dem in die Blutbahn injizierten Präparat, anders als in vitro, nur sehr schwer zugänglich sein. Hierzu kommt ferner, daß das Salvarian aus dem Blute verhältnismäßig schnell wieder ausgeschieden wird. Boecker konnte in seinen Versuchen nachweisen, daß die Konzentration des Salvarians im Blute schon zwei Stunden nach der Injektion auf ein Drittel bis ein Achtel herabsinkt, und nach 24 Stunden Salvarian nicht oder nur noch in Spuren nachweisbar ist. Die für eine wirksame Entwicklungshemmung notwendige Konzentration des Salvarians wird also nur für kurze Zeit vorhanden sein, eine Tatsache, die umso bedeutungsvoller ist, als nach den Feststellungen von Schiemann die abtötende Kraft des Salvarians eine relativ langsame ist. So dürfte es sich erklären, daß das in vitro auf die Rotzkulturen gut wirkende Salvarian bei rotzkranken Pferden verlagte. Eine wichtige Rolle für die Schwerheilbarkeit des Rotzes und das Versagen der Arsentherapie spielt schließlich noch die im Verlauf der Rotzkrankheit bei Pferden häufig auftretende sekundäre, katarrhalisch-eitrige bronchogene Pneumonie. Eberbeck berechnet die Häufigkeit des Vorkommens dieser Pneumonie aus dem Gesamtmaterial der Tierseuchenforschungsstelle Ost auf 54,08 Prozent. Nach seiner Ansicht kommt diese Pneumonie unter der Einwirkung mischinfizierender pyogener Mikroorganismen zustande. Infolge der Symbiose von Rotzbazillen und pyogenen Keimen werden die sonst erfahrungsgemäß nicht sehr widerstandsfähigen Rotzbazillen zu einem langdauernden latenten Leben befähigt, so daß sie nach scheinbarer Ausheilung der Rotzkrankheit unter günstigen Umständen wieder zur Vermehrung kommen und unter Virulenzsteigerung zum Aufflackern des Rotzes führen können. Ziegler.

Ruppert, F.: Die Wichtigkeit der Keimzahl in Milzbrandimpfstoffen und die Wirkung der Eiweiße bei der Immunisierung gegen Milzbrand. (Zeitschr. f. Infekt.-Krkh. d. Hst. 1927, 31, S. 249.)

Ruppert hat weitere Untersuchungen über die Wirksamkeit der bei Milzbrand verwendeten spezifischen und unspezifischen Impfstoffe angestellt, die er folgendermaßen zusammenfaßt: Die durch den Zerfall des Milzbrandbazillus in Milzbrandimpfstoffen in Freiheit gesetzten Eiweißsubstanzen rufen bei Injektion im Organismus keine Bildung spezifisch schützender Antikörper hervor. Die Pyozyanase, die aus dem Bacillus pyocyaneus ähnlich dem Tuberkulin aus dem Tuberkelbazillus gewonnen wird, erzeugt keine Immunkörper gegen den Milzbrand. Ebenso wenig gewähren normales Rinder- und Pferde Serum spezifischen Schutz gegen Milzbrand. Die Wirksamkeit solcher Stoffe muß als unspezifisch angesprochen werden. Durch die Reizung der natürlichen

Abwehrkräfte des Organismus werden diese vermehrt. Die Steigerung der natürlichen Abwehrkräfte kann die natürliche Resistenz eines Organismus gegen den Milzbrand erhöhen, in keiner Weise aber die spezifische Behandlung ersetzen. Die Anwendung unspezifischer Heilmittel bei der Behandlung des Milzbrandes unter Verzicht auf spezifische Therapie ist nach Meinung des Verfassers als schwerer Irrtum anzusprechen. Bei der Bildung der spezifischen Antikörper hat die besondere Qualität der Keime einen stärkeren Einfluß als ihre Menge. Ziegler.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Vogel: Geburtshindernis durch Mißgeburt als Gewährsmangel. (T. R. 1927, S. 566.)

Eine Kuh, die unter der Garantie, daß sie völlig fehlerfrei sei und in einigen Tagen kalben würde, verkauft war, stellte sich nach fünf Tagen zum Kalben, brachte aber das Kalb nicht zur Welt, da es eine durch Embryotomie nicht zu entwickelnde Mißgeburt war. Nach dem Wortlaut der Zusicherung ist der Verkäufer nicht dafür haftbar, daß die Kuh nicht kalbte, weil die Geburt, die wohl eingetreten war, infolge höherer Gewalt nicht vollendet werden konnte. Dagegen haftet er für den ersten Teil der Zusicherung, weil das noch ungeborene Kalb ein wesentlicher Bestandteil der Kuh und diese somit nicht völlig fehlerfrei ist. Geiger.

Grubert: Untersuchungen über die Zusammensetzung der Milch während der Brunst der Kühe. (Aus dem Institut für Nahrungsmittelkunde der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin. — Direktor: Prof. Dr. J. Bongert.) (Arch. f. wiss. Tierheilkunde 1926, 55, S. 306.)

Nach den Untersuchungen des Verf. wird die Milchsekretion durch die Brunst nicht einheitlich beeinflusst. Der Fettgehalt steigt gewöhnlich an. Der vereinzelt beobachtete starke Rückgang an Milch und Fett ist sekundärer Natur und auf das Aufziehen der Milch zurückzuführen. Nur der Tierarzt ist im Stande, durch Untersuchung des Tieres und der Milchprobe zu beurteilen, ob eine Milchverfälschung vorliegt, oder ob die Veränderungen durch die Brunst hervorgerufen sind. Bei Tieren, die im Stall gehalten werden, kommt der Brunst keine besondere Bedeutung für die Milchsekretion zu. Die vielfach beobachtete Schädlichkeit der Brunstmilch für die Säuglingsernährung und der Jungviehaufzucht ist besonders auf den hohen Fettgehalt zurückzuführen. Geiger.

Schnyder: Über die Behandlung der Streptokokkenmastitis des Rindes mittels der Ausmelkmethode. (T. R. 1927, S. 613.)

Da die bisher angewandten chemotherapeutischen Methoden bei der Behandlung der Streptokokken-Mastitis verlagten, ging Verf. zu dem schon früher von Brennwald und Leipert empfohlenen Verfahren, das kranke Viertel während mehrerer Tage alle zwei Stunden gründlich ausmelken zu lassen über. Gleichzeitig wird dabei die Euterhaut gerieben und mit 5 Prozent Phenolglyzerin, dem etwas Ol. Hyosiami zugesetzt ist, bestrichen. Durch verschieden lange Anwendung dieser Methode gelang es, 83 Prozent der Fälle zur Heilung zu bringen. Das Verfahren ist niemals schädlich, die Milchsekretion wurde in keinem Falle vermindert, eher gesteigert. Zum Schluß weist Verfasser auf die Wichtigkeit der Geschmacksprobe frisch gemolkener Milch hin. Leicht salziger Geschmack ist oft im Anfangsstadium einer Streptokokkeninfektion festzustellen. Dadurch ist frühzeitige Erkennung, rechtzeitige Behandlung und Aussicht auf Heilung gewährleistet. Geiger.

Mc Collum, E. V., Simonds, Becker u. Shipley: Geht Vitamin D in die Milch über? (Aus Amer. J. of dis. of children 1927, 33, ref. von Rontal, Münch. med. Wochenschr. 1927, Nr. 34, S. 1472.)

Werden weibliche Ratten vor der Begattung, während der Trächtigkeit und in den ersten 14 Tagen der Laktation mit Lebertran gefüttert, so sind ihre Jungen bis zu einem gewissen Grade gegen Rachitis geschützt, wenn sie später eine Rachitis erzeugende Kost erhalten. Das Vitamin D des Lebertrans geht also in die Milch der Muttertiere über. Bei Verabreichung eines Futters, das genügend Eiweiß, Mineralbestände, Vitamin A und B, aber nur wenig Vitamin D enthält, vorzügliches Wachstum und starke Fruchtbarkeit bewirkt; während der oben erwähnten Zeiten sind die Jungen nicht immer gegen Rachitis völlig geschützt, sie erkranken aber bei einer Rachitis erzeugenden Kost weniger schwer an Rachitis. Die Rachitis bei Kindern ist häufig eine Folge mangelhafter Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft und der ersten Laktationsperiode. Bei solchen geschwächten zur Welt gekommenen Kindern vermag auch nicht selten der Schutz des Lebertrans gegen Rachitis.

A. Hink.

Evans, H. M. und G. O. Burr: Vitamin E. (Aus J. of Amer. med. Ass. 1927, 88, 19, ref. von Rontal in München med. Wochenschr. 1927, Nr. 34, S. 1471.)

Weizenkeime sind die größte und konstanteste Quelle für das Vitamin E und erhöhen, in bestimmten Mengen verabreicht, die Fruchtbarkeit der Tiere wesentlich. Werden die Weizenkeime mit größeren Mengen Vitamin-E-armer Fette vermischt und dann verfüttert, so verlieren sie ihre Wirksamkeit. Die durch Vitamin-E-arme Kost erzeugte Sterilität wird oft deshalb hinausgezögert, weil fast jede Kost Spuren von Vitamin E enthält und die jungen Tiere überdies mit Spuren von Vitamin E zur Welt kommen, die ihnen die Muttertiere lieferten („initiale Fruchtbarkeit“).

A. Hink.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Schachsuwally, M.: „Das Verhalten des Serumbilirubins bei Malaria.“ (Arch. f. Schiffs- u. Trop.-Hygien. 1927, 31, S. 399.)

Der akute Malariaanfall führt eine Erhöhung des Serumbilirubins herbei, die nach einigen Tagen wieder abklingt. Bei latenter Malaria und in Fällen ohne Fieber, aber mit spärlichem Parasitenbefund im peripheren Blute bestehen normale Serumbilirubinwerte. Eine diagnostische Verwertung der Bilirubinprobe, insbesondere bei latenter Malaria, dürfte also nicht in Frage kommen. Wetzel.

Warasi, W.: „Das Malariapigment und seine chemische Natur.“ (Arch. f. Schiffs- u. Trop.-Hygien. 1927, 31, S. 428.)

Auf Grund seiner Untersuchungen stellte Verf. eine empirische Formel des Malariapigments auf. Es geht daraus hervor, daß das Malariapigment mit dem Hämatin nicht identisch ist. Es wird vermutet, daß es dem eisenhaltigen Melanin näher steht als dem Hämatin. Wetzel.

Jermoljewa, Z.: Antigeneigenschaften der Destillate gewisser Bakterienkulturen. (Zeitschr. für Immunitätsf. 1927, Bd. 53, S. 101.)

Werden Bakterienkulturen (leuchtende und Cholera-vibrionen) einer Destillation unterworfen, so erhält man im Destillat Produkte, die antigene Eigenschaften besitzen. Die Produkte geben mit den Sera immunisierter Tiere eine positive Komplementablenkungsreaktion und das Pfeiffer'sche Phänomen. Tiere, die intravenös oder per os mit dem Destillat von Vibrionenkulturen immunisiert worden waren, vertrugen die fünffache tödliche Dosis des entsprechenden Stammes. Sera von Menschen, die per os das Destillat erhalten haben, geben positive Komplementablenkung und das Pfeiffer'sche Phänomen sowohl mit dem Antigen als auch mit dem Bakterienstamm. Nach den Untersuchungen können also auch flüchtige Stoffe Antigeneigenschaften besitzen und Immunitätsreaktionen hervorrufen. Meyn.

Berger, E. und H. Roesli: Die übertragbare Lyse als Funktion der Temperatur. (Aus dem Hygienischen Institut der Universität Basel. — Vorsteher: Prof. Dr. R. Doerr.) (Zeitschrift f. Hyg. 1927, 107, Heft 3/4, S. 731.)

Die von Doerr und Grüninger mitgeteilte Beobachtung, daß sich Colibakterien bei 43 Grad in lyfinhaltiger Bouillon vermehren können, ohne daß das Lyfin zunimmt, wurde nachgeprüft und bestätigt; desgleichen die Erscheinung, daß das Lyfin unter solchen Verhältnissen nach Ablauf von mehr als sechs Stunden völlig schwindet bzw. bis unter die Grenze der Nachweisbarkeit reduziert wird. Bei einem zweiten Colistamm und einem zugehörigen Lyfin konnte die Dissoziation von Bakterienvermehrung und Lyfinzunahme ebenfalls zwischen 44 und 47 Grad nachgewiesen werden. Die gegen die Befunde von Doerr und Grüninger erhobenen Einwände von d'Herelle sind daher nicht stichhaltig. Ziegler.

Gohs, W. und J. Jacobssohn: Vermehrung des bakteriophagen Lysins durch abgetötete Bakterien. (Zeitschr. für Immunitätsf. 1927, Bd. 53, S. 12.)

Das bakteriophage Lyfin kann außer durch lebende, auch durch Bakterien neugebildet werden, die mit Glycerin, Fluornatrium und Chloroform abgetötet sind. Durch Zusatz von Lyfinspuren zur Bouillonauflschwemmung der abgetöteten Bakterien stieg der Lyfintiter nach Bebrütung im Laufe von 24 bis 48 Stunden in verschiedener Größe (von 10—100 000fach). Die Lyfinbildung der abgetöteten Bakterien ist aber nicht konstant. So bilden durch Hitze abgetötete Bakterien kein Lyfin. Nachdem nachgewiesen ist, daß auch tote Bakterien Lyfin liefern können, kann die Lyfinbildung nicht mehr als sekretorische Funktion der krankhaft veränderten Bakterien (Bordet, Doerr) angesehen werden, sondern ist auf eine eigenartige „lyfinbildende Autolyse“ zurückzuführen. Meyn.

Gasiorowski: Sachs-Georgi-, Meinicke- (D.M.) und die Wassermann-Reaktion. (Zeitschr. für Immunitätsf. 1927, Bd. 52, S. 138.)

Die Resultate der Brutschrankmethode von Sachs-Georgi und der Methode von Meinicke sind, was die Spezifität anbetrifft, der Wassermann-Reaktion gleichwertig. Am empfindlichsten ist die S.-G.-Reaktion; ihr folgt die Wassermann-Reaktion und dann die Modifikation von Meinicke. Die erzielten Resultate mit den verschiedenen Methoden weisen einen weitgehenden Mangel gegenseitiger Übereinstimmung auf. Das Resultat der Reaktion ist im strengsten Sinne des Wortes von der Wahl des Antigens abhängig. Es muß also zuerst eine größere Anzahl von Antigenextrakten mit denselben Seren vorgeprüft werden, wonach das als gebrauchsfähig bezeichnet wird, das bei erhaltener Spezifität am meisten empfindlich erscheint. Mit den Seren der Syphiliskranken ist die W.-Reaktion in der Lues I Periode empfindlicher als die beiden Ausflockungsreaktionen. Bei Lues III gleichen sich die Differenzen fast vollkommen aus. Bei Lues II übersteigt die Empfindlichkeit der S.-G.-Reaktion um geringes die der Wassermann-Reaktion und bei Lues latens ist sie schon bedeutend höher. Die Empfindlichkeit der M.-Reaktion ist konstant geringer als die der W.-Reaktion. Die Zahl der positiven Resultate nimmt während der Behandlung am raschesten und am deutlichsten bei der M.-Reaktion ab. Wassermann schwindet früher als Sachs-Georgi, nimmt also den Mittelplatz ein.

Da die Reaktionen spezifisch sind, in den Untersuchungsergebnissen derselben Sera aber, was die Intensität anbetrifft, konstant miteinander nicht übereinstimmen, soll man sich nicht auf eine einzige Methode beschränken, sondern jedes Serum gleichzeitig der Untersuchung nach Wassermann und Sachs-Georgi unterziehen. Nur auf diese Weise lassen sich die Fehler ausgleichen und gegenseitig ergänzen. Meyn.

Nahrungsmittelhygiene.

Hoffmann, R.: Tierärztliche Erfahrungen an der Freibank Berlin I. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. Bd. 37, S. 417—420.)

Aus Hoffmanns Erfahrungen an der Berliner Freibank sind insbesondere die über den fischigen oder tranigen Geruch oder Geschmack des Fleisches (§ 40,3 B.B.A.) hervorzuheben. Bei fischigen oder tranigen Schweinen fällt bei Tageslicht vor allem die Verfärbung des Fettes auf. Es ist grau (Leinölfarbe) bis gelb, orange und schmutziggelblich. Im Orangestadium beginnt häufig ein Streifen aufzutreten, der anatomisch die Grenze der tiefsten Kutisschicht und der locker maschigen, vesikulären Subkutis ist. Sobald dunklere Farbenveränderungen vorliegen, ist Fleisch und Fett in der Regel nur technisch zu verwerten. Bei elektrischem Lichte können fischige oder tranige Schweine mit schwachen Verfärbungen des Fettes leicht der Beanstandung entgehen. Die genannten Schweine werden erst nach mehrtägigem Aufenthalt im Kühlhause der Koch- und Bratprobe unterzogen. Letztere wird am besten im Papinschen Topf vorgenommen mit 100 Gramm Fleisch, in 2 bis 3 Stücke zerschnitten. Am besten wird abweichender Geruch beim Öffnen des Topfes wahrgenommen. Die Bratprobe ist nur mit ganz reinem Fett anzustellen. Bei der Geschmacksprobe wird darauf gesehen, daß 20—30 Gramm Fleisch gründlich durchkaut werden. Bei allen Proben sind stets mehrere Personen hinzuzuziehen. Die Entschädigung fischiger oder traniger Schweine durch die Schlachtviehver sicherungen hält Hoffmann nicht für geeignet, das Übel einzudämmen, sondern eher es zu vermehren. Das Beste, was in dieser leidigen Frage geschehen könnte, wäre die Aufnahme der nach § 40,3 B.B.A. zu beanstandenden Schweine in die Reihe der Gewährmängel. Dies würde einen großen Fortschritt bedeuten und zwar in fleischbeschaulicher, volkswirtschaftlicher und sozialer Beziehung.

Edelmann.

Standesangelegenheiten.

3. wissenschaftlicher Abend an der Tierärztl. Hochschule zu Hannover am 6. Februar 1928.

R. Götze, Über den Kaiserschnitt beim Rinde. Mit Demonstrationen. Das Indikationsgebiet für den Kaiserschnitt beim Rinde liegt nach den hier im Autoreferat wiedergegebenen Ausführungen von Prof. Götze wesentlich anders als in der Humanmedizin. Wenn beim Rinde eine Frucht durch die natürlichen Wehenkräfte oder auch durch erlaubte Zugleistung von vier bis sechs Mann nach Berichtigung etwa vorhandener fehlerhafter Lagen, Stellungen und Haltungen nicht zu entwickeln fein wird, so wird zunächst zur Embryotomie geschritten, für die eine große Anzahl von Instrumenten konstruiert worden ist. Sie führt in den meisten Fällen zum Ziele. Sehr oft aber entstehen Verletzungen der Geburtswege und im Anschluß an die Schweregeburt puerperale Nachkrankheiten. Hat die Embryotomie keinen Erfolg, so ist das Schicksal des Muttertieres besiegelt oder es bleibt nur noch der Kaiserschnitt übrig. Als weitere seltene Indikationen für den Kaiserschnitt beim Rinde kommen in Frage: Erhaltung wertvoller Früchte, evtl. unter Aufgabe des Muttertieres; Geburtshindernisse, die durch Embryotomie nicht zu überwinden sind; z. B. Torsio uteri, sofern sie sich nicht berichtigen läßt, Kallusbildungen am Becken, Osteodystrophie, Mißgeburten usw. Das Indikationsgebiet des Kaiserschnittes beim Rinde ist demnach außerordentlich klein und von vornherein auf Fälle beschränkt, die nicht immer einen günstigen Verlauf nehmen können.

Insgesamt sind bisher am Rinde seit dem Jahre 1813 nur 28 bis 29 Kaiserschnitte in der Literatur bekannt geworden. In 12 Fällen konnte das Leben des Muttertieres erhalten werden. Operiert wurde stets an der rechten Seite der Bauchwand (Flankenschnitt), weil die tragende Gebärmutter beim stehenden Rinde ausgesprochen rechts liegt und die linke Hälfte der Bauchhöhle in der Hauptfläche durch den ersten Vormagen ausgefüllt wird.

Der Vortragende hat diese Flankenoperation am liegenden Tier in Chloralhydratnarkose einmal ausgeführt und ist dabei auf große Schwierigkeiten gestoßen, die darin bestanden, daß

1. die ca. 1 Zentner und darüber schwere, trächtige Gebärmutter sich nicht seitwärts aus der Bauchhöhle herausbringen ließ. Die extraperitoneale Eröffnung der Gebärmutter bleibt demnach bei dieser Operationsmethode in Frage gestellt;
2. die außerordentlich beweglichen, sich vordrängenden Schlingen des beim Rinde sehr langen Dünndarmes das Operationsfeld unübersichtlich gestalteten und die Infektionsgefahr erhöhten;
3. die Naht an der rechten seitlichen Bauchwand sich als sehr unsicher erwies, insbesondere in der Gegend der lateralen Rektusgrenze. Es besteht stets die Gefahr der Bruchbildung in der Darminkarzeration.

Das operierte Tier überstand zwar den Eingriff. Es traten aber Bruchbildung und Darmverklebungen auf, so daß die Kuh unwirtschaftlich wurde. Ähnliches ist in der Literatur berichtet.

Es wurden fünf weitere Operationen nach folgender Methode ausgeführt: Epidural- (Sakral) Narkose mit 20—30 ccm 1 prozent. Tuto-cainlösung. Rückenlage des Tieres mit seitlicher Neigung des Körpers nach links. Enthaaren, Reinigen, Desinfizieren, Abdecken des Operationsfeldes mit sterilen Tüchern. 45—50 cm langer Längsschnitt an der ventralen Bauchwand 3—5 cm links von der linken Vena subcutanea abdom. Durchtrennung der Haut, der äußeren Rektusfalte und des Musculus rectus abdom. in seinem Faserverlauf. Durchtrennung der inneren Rektusfalte samt Peritoneum in dorso-ventraler Richtung, also senkrecht zum Hautmuskelschnitt. Die trächtige Gebärmutter tritt bei richtiger Lagerung des Muttertieres und richtiger Schnittführung sofort zu Tage. Darmvorfälle stören die Operation nicht. Das trächtige Horn der Gebärmutter (das Rind besitzt einen Uterus bicornis) wird extraperitoneal gelagert, mit zwei Kugelfaßzangen so erfaßt, daß zwischen diesen beiden Zangen der 35 cm lange Gebärmutterschnitt in der Richtung der Uterus-Längsmuskulatur angelegt werden kann. Die Frucht wird von einer zweiten Person extrahiert. Die Eihäute werden nach Möglichkeit ebenfalls entfernt. Das ist sehr leicht, wenn sie — wie dies bei toten Früchten meist der Fall ist — bereits gelöst sind. Sehr schwer ist es dagegen, wenn eine Kötyle-donitis infolge Infektion der Plazentome beispielsweise mit Bacillus abortus Bang besteht. Das Lösen der einzelnen Plazentome nimmt dann etwa eine Stunde Zeit in Anspruch. Ist die Plazenta bei lebender Frucht noch nicht gelöst, aber völlig gesund, so kann man sich die Mühe des Ablöses sparen. Die Plazenta wird im Laufe der nächsten Stunden spontan ausgestoßen.

Nach Entleerung der Gebärmutter erfolgt die Muskelnnaht der Uteruswand, darüber Lembertnaht mit Catgut. Da die Uteruswunde sich nach Entleerung in der Regel stark zusammenzieht, sind für jede Naht nur 15—20 Knopfstiche erforderlich. Es folgt weiter Naht des Peritoneums samt innerem Blatt der Rektusfalte mit etwa 10—15 Heften in Abständen von 2½—3 cm. Eine dichtere Naht ist nicht erforderlich, weil sich nach der Operation der große flächenhafte erste Vormagen der Wundfläche anlegt. Der Musculus rectus abdom., das äußere Blatt der Rektusfalte, und die äußere Haut werden durch die Moserische Kreuznaht mit dicken Seidenknopfstichen vereinigt. Es genügen 10—15 Hefte. Über die Wundnaht wird ein Spannungsverband gelegt. Die Hefte sind nach 8—14 Tagen entfernt worden. Von den fünf ventral operierten Kühen sind drei im Verlaufe von drei Wochen ohne Komplikationen geheilt. Zwei Tiere, die unglücklicherweise unmittelbar nach einer Pararäufchbrand-Einschleppung in der Klinik operiert werden mußten, sind am Pararäufchbrand am 7. bzw. 9. Tage nach der Operation eingegangen.

Der Operationsgang wurde im Film nach einer Originalaufnahme in der Klinik in den einzelnen Stadien vorgeführt. Drei operierte Rinder konnten vorgestellt werden. Die neue ventrale Methode des Kaiserschnittes beim Rinde ist in ihrer Ausführung einfacher, sicherer und gefahrloser als die bisher immer wieder empfohlene, aber wenig geübte seitliche Methode. Es besteht die Möglichkeit, daß dadurch das Indikationsgebiet des Kaiserschnittes beim Rinde erweitert wird.

Gegen die in der Diskussion vorgebrachte Meinung des Herrn Henkels, man könnte die Operation, um ihr im Rahmen der prak-

tischen Tätigkeit auf dem Lande vielleicht mehr Eingang zu verschaffen, etwas einfacher gestalten, wendet sich der Referent mit Entschiedenheit. Feinlichste Sorgfalt sei gerade gut genug. Das Bauchfell des Rindes besitzt gegenüber gewissen spezifischen Erregern hohe Empfindlichkeit. Darin wird der Referent durch Herrn Hupka unterstützt.

Zietzschmann.

Veterinärmedizinische Fachgruppe der Deutschen Studentenschaft.

Bericht der Würzburger Tagung vom 17. Juli 1927.

Die veterinärmedizinische Fachgruppe der Deutschen Studentenschaft, welche die Vertretung aller Studierenden der Veterinärmedizin an den deutschen Hochschulen einschließlich Deutsch-Österreichs ist, nahm auf ihrer Tagung in Würzburg Stellung zu verschiedenen Punkten ihres Arbeitsgebietes an den Tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten und faßte das Ergebnis ihrer Besprechung in folgenden Richtlinien zusammen:

1. Der Fachgruppentag hält eine enge fachschaftliche und gesellschaftliche Zusammenarbeit mit den Fachschaften der Nachbargebiete (Medizin, Landwirtschaft) analog dem Vorgehen der Fachgruppen für nötig und erstrebenswert.
2. Die Fachschaften werden angehalten, die Studierenden auf das Studium der Grenzgebiete der Tierarzneikunde hinzuweisen (Tierzucht, Geflügelkunde, Fischkunde, Bienenkunde, Landwirtschaft usw.), und das Interesse dafür zu wecken. Weiterhin stellt die Tagung fest, daß es nötig sei, besonders das Studium der Geflügelkrankheiten in erhöhtem Maße zu berücksichtigen. Die Fachschaften sollen wegen der Einführung derartiger Vorlesungen bei den maßgebenden Organen der Hochschulen vorstellig werden.
3. Die Fachgruppen-Tagung hält es im Interesse des tierärztlichen Standes für nötig, daß die Prüfungsbestimmungen in aller Schärfe und ohne ungerechtfertigte Milderung auf solche Kandidaten angewandt werden, die die wissenschaftliche und menschliche Eignung für diesen Beruf nicht aufweisen.
4. Die Fachgruppen-Tagung stellt mit Genugtuung fest, daß das Verhältnis zu den deutschfreundlichen Ausländern an den Fakultäten und Hochschulen ein sehr erfreuliches ist und hofft, daß es im Interesse der deutschen veterinärmedizinischen Wissenschaft in ihren Beziehungen mit dem Auslande so bleibt.
5. Die Fachgruppe hält eine straffe Ausbildung der Studierenden im Reiten für notwendig. An den Fakultäten, wo die Leibesübungen obligatorisch sind, wird die Fachschaft auf eine gleichwertige Anerkennung der Reitstunde als Leibesübungen dringen.
6. Die Fachschaft wird zur regen Mitarbeit an der tierärztlichen Fachpresse verpflichtet. Insbesondere ist mindestens ein Semesterbericht in den Fachzeitschriften zu veröffentlichen.
7. Um wissenschaftliche Assistenten an den Tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten heranzubilden, hält die Fachgruppentagung die Anstellung von Unterassistenten an den verschiedenen Instituten für wünschenswert.
8. Die Fachgruppentagung hält es für notwendig, daß von ihrer Seite die Fühlung mit den Altakademiker-Verbänden, insbesondere des tierärztlichen Standes, aufgenommen und eine enge Zusammenarbeit gepflogen wird.
9. Den Fachschaften, in denen besondere Einführungskollegs nicht bestehen, wird aufgegeben, im Rahmen einer Fachschaftsversammlung, die im Anfange jeden Semesters stattzufinden hat, ein Einführungsreferat tunlichst durch einen Herrn des Lehrkörpers halten zu lassen. Gleichzeitig erscheint hierbei angeraten, daß die Fachschaftsvorsitzer die neu eingetretenen Studierenden auf die Würde und Eigenart unseres akademischen Standes hinweisen.
10. Die Fachgruppe befürchtet eine Überfüllung des tierärztlichen Standes und glaubt daher für eine Verschärfung der bestehenden Prüfungsbestimmungen eintreten zu müssen. Insbesondere erscheint die Einführung des Latinums an der Tierärztlichen Hochschule Wien erforderlich.
11. Den Fachschaften wird aufgetragen, im Laufe des kommenden Semesters durch Rundschreiben die näheren Bestimmungen über Vorexamen, Praktikantenheine, Auskultantensemester und Hauptexamen an die Fachgruppe einzufenden und unter sich auszutauschen.

12. Die Fachgruppenleitung möge gemeinsam mit der Fachschaft Leipzig die Vorarbeiten zu einer Studienfahrt der Fachschaft Wien oder der ganzen vet.-med. Fachgruppe nach Leipzig in Angriff nehmen.

Hannover, im Februar 1928. Nolze, Fachgruppenleiter.

Reorganisation des Veterinärwesens in der Türkei.

Im Auftrage der türkischen Regierung geht Oberregierungsrat Dr. Oldenbourg vom Preuß. Landwirtschaftsministerium auf zwei Jahre nach Angora, um dort das Landwirtschaftswesen nach deutschem Muster einzurichten. Neben sechs Landwirten werden fünf Tierärzte später folgen. Letztere sollen dort an einer neuzugründenden tierärztlichen Hochschule die Einrichtung und Inbetriebnahme der neuen Institute leiten. Zurzeit haben zugesagt: Dr. Schönberg für Anatomie, Dr. Weissgerber für Bakteriologie, Dr. Bederke und Dr. Goeremann für innere und äußere Medizin; noch nicht entschieden: Dr. Spiegel für pathologische Anatomie und Parasitenkunde.

Verein Thüringer Tierärzte.

104. Verammlung 29. Januar 1928 in Erfurt. 1. Dr. Trepel infolge Fortzug ausgetreten. 2. Neu aufgenommen: Dr. Gückel-Erfurt, Hårdlein-Erfurt, Dr. Kanike-Witterda b. Erfurt, Dr. Mäder-Langenfalza i. Thür., Otto, Veterinär in Stotternheim i. Thür., Träger, Oberregierungs- u. Veterinär in Erfurt, Dr. Wagner in Bad-Salungen i. Thür., Dr. Ziegler-Eisenach. 3. Da Generaloberveterinär a. D. Kurze-Erfurt die auf ihn in der letzten Herbstversammlung in absentia gefallene Wahl zum Vorsitzenden nicht angenommen hatte, wurde zum Vorsitzenden Oberregierungs- u. Veterinär Träger-Erfurt gewählt, der die Wahl annahm. Regierungsveterinär Dr. Amelung-Weimar hatte sein Amt ebenfalls niedergelegt und bat, von einer Wiederwahl seiner Person abzusehen. Nach einigem Zögern nahm Dr. Amelung die Wiederwahl erfreulicherweise wieder an. Der Vorstand setzt sich demnach jetzt wie folgt zusammen: Vorf.: Oberregierungs- u. Veterinär Träger-Erfurt. Stellv. Vorf.: Regierungsveterinär Dr. Amelung-Weimar. Schriftf.: Generaloberveterinär a. D. Dr. Loeb-Erfurt. Stellv. Schriftf.: Schlachthof-Direktor Rettig-Nordhausen. Kassierer: Veterinär Ruhs-Weissenfee i. Thür.

Träger, Vorf. Dr. Loeb, Schriftf.

Verein der Tierärzte des Regierungsbezirks Wiesbaden.

74. General-Versammlung 19. November 1927.

Anwesend 18 Mitglieder und 11 Gäste. Der Vorf. Dr. Berdel eröffnet die Sitzung um 10,45 Uhr und heißt alle Anwesenden, insbesondere die Gäste herzlich willkommen. Er verliest die eingegangenen Schreiben. — Die Versammlung bewilligt 50 RM. für die Jubiläumsfeier der Hochschule zu Hannover. Als neue Mitglieder sind aufgenommen: Dr. Sommerfeld-Marienberg, Dr. Petry-Weilburg und Dr. Boese-Frankfurt a. M. Infolge Wegzugs ist Dr. Dedecke ausgeschieden. Dr. Stephan: „Aufzuchtkrankheiten und ihre Bekämpfung“. Betreffs der in letzter Zeit öfters lautgewordenen Mißerfolge bei der Bekämpfung des seuchenhaften Verkaltens betonte der Referent, daß nur durch die gleichzeitige Anwendung streng hygienischer Maßnahmen in Verbindung mit einer planvollen Impfung der Bestände auf Grund einer sicheren Diagnose und sorgfältigen Führung von Listen ein Erfolg erwartet werden könne. Unter diesen Voraussetzungen habe sich auch die Impfung der nichttragenden Tiere mit lebenden Kulturen, und der tragenden Tiere mit einem Impfstoff aus abgetöteten Bang'schen Bazillen im allgemeinen bewährt. Bei Ferkeln sei die Ätiologie einiger Krankheiten noch nicht im gleichen Maße, wie bei Fohlen- und Kälberkrankheiten geklärt. Insbesondere wurde auf die große Schwierigkeit der Differentialdiagnose zwischen Schweinepest, Schweinefeuche, enzootischer Ferkelpneumonie, Schweineparatyphus und Rotlauf hingewiesen und auf die hervorragende Bedeutung der Schweinepest auch für die Ferkel aufmerksam gemacht; sie sei nachgewiesener Weise oftmals die Ursache angeblicher Fehlschläge bei den Rotlaufimpfungen gewesen. In diesem Zusammenhang wurde die Wichtigkeit der Anwendung stets ausgekochter Impfnadeln bei der Rotlaufimpfung hervorgehoben. Für das Entstehen verschiedener Ferkelkrankheiten, insbesondere für die enzootische Pneumonie seien unfachgemäße Fütterung, sofern sie das Alter der Tiere, besonders während

des Abfetzens, nicht berücksichtigt, und Fehler in der Haltung von ausschlaggebender Bedeutung. Hieraus ergebe sich, daß der Prophylaxe eine weitaus größere Bedeutung zuerkannt werden müsse. Eine prophylaktische Impfung könne bei verschiedenen Ferkelkrankheiten mit Erfolg durchgeführt werden, sofern diese auf Grund einer bakteriologisch gesicherten Diagnose mit spezifischen Impfstoffen in Verbindung mit hygienischen Maßnahmen geschehe und durch natürliche Haltung und einwandfreie Fütterung der Tiere unterstützt werde. In der folgenden Wechselrede fragt Dr. Sahnner-Bad-Homburg, ob es zweckmäßig bzw. notwendig ist, in Beständen mit feuchtem Verkalben auch die Bullen einer Blutuntersuchung zu unterziehen und sie bei positivem Ausfall von der Zucht auszuschließen. Dr. Stephan weist darauf hin, daß die Übertragung gewöhnlich per os erfolgt. Indessen sind auch Fälle bekannt geworden, in denen die Übertragung durch den Deckakt erfolgte. Allerdings zeigen derartige Bullen klinische Erscheinungen. So kennt er einen Fall, wo der Bulle nekrotische Herde in den Hoden aufwies, aus denen der Abortus-Bang-Bazillus herausgezüchtet werden konnte. Eine Blutuntersuchung bei Bullen hat nur Wert, wenn feststeht, daß das Tier nicht etwa geimpft worden ist. Wird in solchen Fällen eine Infektion ermittelt, dann empfiehlt sich, den Bullen von der Zucht auszuschließen. Olt-Gießen: Die Aufzuchtkrankheiten der Schweine werden, wenn wir von der Schweinepest absehen, von Keimen erregt, welche normalerweise in den Beständen vorkommen. Der Frage, wie es kommt, daß diese Keime pathogene Eigenschaften annehmen, ist von der Forschung bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Die Schrittmacher der Infektion sind die schlechten hygienischen Verhältnisse. In überaus zahlreichen Fällen konnte Redner den Tod der von ihm untersuchten Ferkel auf die Stallverhältnisse zurückführen. Fast stets handelte es sich um Zementställe, die von den Züchtern bezeichnenderweise als „Erbegräbnisse“ oder „Zementfärge“ bezeichnet werden. In diesen Ställen ist stets viel Feuchtigkeit vorhanden, herrührend von der Ausatemluft, den flüssigen Ausscheidungen der Tiere und verschüttetem Futter. Nachts rieselt in diesen Ställen ein feiner, für das Auge nicht sichtbarer Regen auf die Ferkel herab, welche diese Wassermengen verdunsten müssen. Nicht die Kälte an sich, sondern die erschwerte Abgabe von Feuchtigkeit seitens des Organismus bedingt die herabgesetzte Widerstandsfähigkeit gegen die Bakterien, besonders gegen die Pyogenes-Bazillen, die dann in die Bronchien eindringen und Katarrhe verursachen. Oft findet man nur wenig Keime bei starken Veränderungen, ein Beweis dafür, welcher hohen Grad von Giftigkeit diese Bazillen erreichen können. Unter diesen veränderten Verhältnissen nehmen auch andere Bakterien pathogene Eigenschaften an. Sonst harmlose Colistämme treten nun pathogen auf, werden abgeschluckt und zur Gefahr der übrigen Tiere ausgeschieden. Ähnlich verhalten sich Paratyphusbakterien, welche ebenfalls als avirulente Keime den Schweinedarm bewohnen. Bekannt sind die Verhältnisse beim Rotlauf, dessen Erreger in Tonfäulen und im Darm der Schweine vorhanden sind. Im Sommer vermehren sie sich unter gewissen Umständen im Boden sehr stark, nehmen pathogene Eigenschaften an und werden von den Schweinen mit der Erde, aber auch mit infizierten Mäusen und auf andere Weise aufgenommen. Bei Kälberfeuchen ist es ähnlich. Die Striche der Kuh-euter sind mit Kot beschmutzt. Der Bac. pyogenes und der Nekrosebazillus sind hier regelmäßig zugegen. Sie vegetieren im Pansen des Rindes, wo sie auf dessen oberster Epithelschicht massenhaft festgesetzt werden können. Durch den Darm gelangen sie nach außen. Der Nekrosebazillus siedelt sich in Epitheldefekten an und verursacht Diphtherie. Beim Säugen wird auch die Milch in die Lunge aspiriert, so daß sich die durch den Pyogenesbazillus verursachten Pneumonien erklären. Der Nabel wird ebenfalls durch diese Keime, aber auch durch Staphylo- und Streptokokken sowie durch Colibakterien infiziert. Diese Tatsachen erklären uns den Umstand, daß die Infektionen auf Weiden viel seltener sind. Der Kot kommt auf der Weide nicht so leicht ans Euter und dadurch nicht mit der Nahrung in Berührung. Rehe gehen in Zwingern leicht ein, weil ihre Losung mit der Äfung in Berührung kommt. Auch hier ist die Gefahr durch die Ausscheidungen gegeben. Wo auf großen Gütern die Schweine möglichst im Freien gehalten werden, sind Aufzuchtkrankheiten unbekannt. Dr. Merz hält es für zweckmäßig, die Zuchtbullen vor dem Ankauf auf Abortus-Bang zu untersuchen. Dr. Stephan teilt mit, daß in Schlesien zu den Auk-

tionen nur Tiere zugelassen werden, welche nachweislich frei von Abortus-Banginfektionen sind.

Verschiedenes. Der Vorf. verliest einen Protest der Bauernschaft gegen die Erhöhung der Fleischbeschaugebühren, dessen unächlicher Inhalt sich in anmaßendem Tone gegen die Tierärzteschaft wendet. Dr. Schipp: Derartige Eingaben kommen bei jeder Erhöhung und wurden im vorliegenden Falle besonders erwartet, weil entgegen der früheren Übung private Schlachtungen in bezug auf die Bezahlung den gewerblichen Schlachtungen gleichgestellt wurden. Die Regierung ist auch durchaus gewohnt, daß derartige Eingaben in forderndem Tone gehalten sind. Es ist vorgekommen, daß Laienfleischbeschauer die Gebühr selbständig herabgesetzt haben entgegen den Vorschriften. Der Bezirk Kassel hat die Gebührengleichstellung zwischen Haus- und gewerblichen Schlachtungen nicht durchgeführt, was zu bedauern ist. Denn im Bezirk Wiesbaden klagen die Metzger außerordentlich über die Zunahme der Hauschlachtungen, welche von den Landwirten ausgepfundet werden. Die Regierung hat für diese Klagen weitgehendes Verständnis, ist jedoch nicht in der Lage, den Metzgern zu helfen. Es fehlt sogar an einer Rechtsgrundlage, die Anzeigepflicht für solche Hauschlachtungen einzuführen. Vielleicht ist es aber möglich, auf Grund der Polizei-Verordnung vom 10. Oktober 1926 eine Anmeldepflicht einzuführen, da für das Auspfunden von Hauschlachtungen in bezug auf Räume und Personen dieselben Bestimmungen dem Sinne nach gelten, wie für gewerbliche Schlachtungen. Dr. Schaaf hält die Erhöhung für begründet und weist die Gehässigkeit der Landwirte entschieden zurück, um so mehr, als die Gebührenerhöhung für einen Landwirt, der 1—2 Schweine jährlich schlachtet, eine finanzielle Belastung nicht bedeutet. In seiner Praxis betrachten die Landwirte die auszupfundenden Schlachtungen als gewerbliche und ziehen von vornherein den Tierarzt zur Beschau zu. Dr. Schipp weist auf die Notwendigkeit hin, Fleischbeschaubezirke zusammenzulegen und erwartet von den Praktikern, daß sie jede sich bietende Gelegenheit, einen frei gewordenen Beschaubezirk zu übernehmen, auch dann ausnutzen, wenn der zu erwartende Ertrag wegen der Entfernung gering ist. Dr. Berdel: Der Schlachthof Frankfurt a. M. bildet schon seit acht Jahren keine Laienbeschauer mehr aus, denn solche gründlich auszubilden erfordert viel Mühe und Zeit, und die hierdurch entstehenden Kosten können nicht von einem oder zwei Beschauern getragen werden, und mehr Anwärter finden sich nie zusammen. Wenn ein Beschauer unterbietet, dann ist er unbrauchbar für amtliche Funktionen. Redner empfiehlt, an der Gebührentaxe festzuhalten und nicht etwa in den alten Fehler, der eben erst wieder gutgemacht ist, zurückzufallen. Durch Nachgeben ist weder der Gewerbetreibende noch der Landwirt zufriedenzustellen, wie kürzlich erst der Fall des Polizeitierarztes Utzath bewiesen hat. Übrigens sei in diesem Falle die Beschwerdeliste der Metzger mit insgesamt 13 Punkten in sich zusammengebrochen, und Utzath ist von seiner Behörde die nötige Genugtuung zuteil geworden. Dr. Thoms beantragt an die Tierärztekammer eine Eingabe zu richten, bei dem Regierungs-Präsidenten in Kassel dahin vorstellig zu werden, daß künftig alle Fleischbeschaufragen, insbesondere Gebührenfestsetzungen im Einvernehmen mit dem Regierungs-Präsidenten in Wiesbaden geregelt werden sollen. Antrag wird angenommen. Von mehreren Seiten werden Klagen geäußert über die Geschäftsführung der Landwirtschaftskammer in bezug auf das Tuberkulose-Tilgungsverfahren. Die Kammer verlangt, daß nur Anschlüsse untersucht werden, zu deren Untersuchung sie aufgefordert hat. Diese Aufforderung ergeht aber nur in seltenen Fällen und dann viel zu spät. Die Landwirte würden oft ihr Vieh verlieren, wenn der Vertrauens-tierarzt hier nicht selbständig eingreifen würde. Die Kammer verlangt ferner die Vorlage von Abrechnungen mit den Anschlußnummern der Besitzer, teilt aber diese Anschlußnummern nur in Ausnahmefällen mit. Als großes Unrecht den Landwirten gegenüber empfinden es die Tierärzte, daß einerseits am Ende der Anschlußperiode von 3 Jahren nicht gekündigte Anschlüsse weiter laufen, andererseits aber eine erneute Anmeldegebühr erhoben wird. Derartige Bestimmungen sind der Ausbreitung des Verfahrens durchaus abträglich und auch sehr anfechtbar. Schließlich wird geklagt über die säumige Auszahlung der Untersuchungsgebühren an die Vertrauens-tierärzte. Diese müssen fordern, daß die Gebühren mit Beschleunigung sofort nach Einreichung der Untersuchungslisten gezahlt werden. Bei Einrichtung einer

modernen Buchführung läßt sich das ohne Schwierigkeit durchführen. Der Vorf. wird gebeten, diese Klagen der Landwirtschaftskammer vorzutragen. Dr. Schaaß beantragt, eine Kommission zu wählen, welche die rechtlichen Grundlagen des Dispensierrechtes nachprüfen soll. Gewählt werden die Kollegen Schipp, Schaaß und Müller.

Dr. Berdel, Vorf. Dr. Dörnis, Schriftf.

Verschiedene Mitteilungen.

Zum 70. Geburtstage von Veterinärat Nutt.

Am 27. Februar feiert Herr Veterinärat Nutt-Brakel seinen 70. Geburtstag. Die westfälischen Tierärzte, deren Führer er als Vorsitzender des Provinzialvereins lange Jahre gewesen ist, wollen diesen Tag nicht vorübergehen lassen, ohne ihm die herzlichsten Glückwünsche darzubringen. Möchte das Greifenalter, dessen Schwelle er nunmehr übertreten, frei bleiben von allen kleinlichen Gebrechen und Beschwerden, damit wir noch manches Jahr das Vergnügen haben werden,



unseren verehrten Ehrenpräsidenten auf unseren Versammlungen bei uns zu sehen. Nutt's Tätigkeit hat sich ausschließlich in Westfalen abgepielt. Am 27. Februar 1858 in Dössel, Kreis Warburg, geboren, ist er seiner Heimatprovinz auch nach seiner 1882 erfolgten Approbation treu geblieben. Er hat sich in Brakel, Kreis Höxter, niedergelassen und dort, 1888 zum Kreistierarzt ernannt, seine ganze praktische und amtliche Tätigkeit bis zu seiner 1922 erfolgten Pensionierung ausgeübt. 19 Jahre war er Vorsitzender des Provinzialvereins, 17 Jahre stellvertretender Vorsitzender des V.b.T. Preußens, von dem Beginne der Tierärzte-Kammern bis heute deren Mitglied, 19 Jahre Mitglied des Aufsichtsrats der W.d.T. Er ist Ritter des roten Adlerordens 4. Klasse. Wie sehr diese Vertrauensstellungen Nutt's gerechtfertigt waren, mögen folgende zwei Sätze beweisen, die den Akten des Provinzialvereins entnommen sind: „Du weißt, wie gern ich mein langes Leben Tierarzt gewesen bin“ und „Es war mein eifrigstes Bestreben, die Einigkeit unter den Kollegen zu wahren“. Auf viele Jahre noch, verehrter Herr Veterinärat!

Tierärzte-Verein der Provinz Westfalen.

Veterinärat i. R. Nutt 70 Jahre.

Am 27. Februar d. Js. feiert Veterinärat i. R. Nutt-Brakel in körperlicher und geistiger Frische seinen 70. Geburtstag. Geboren in Dössel b. Warburg, Westfalen, studierte er in Berlin und war bei dem heutigen Corps, früheren Landsmannschaft Teutonia aktiv. Nach seiner Approbation im Jahre 1882 ließ er sich in seinem gegenwärtigen Wohnsitz Brakel, Kreis Höxter, als praktischer Tierarzt nieder und wurde am 30. November 1888 unter Beibehaltung seines Wohnsitzes Brakel zum Kreistierarzt für den Kreis Höxter ernannt, welchen er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1923 verwaltete. Neben seiner sehr umfangreichen Praxis widmete er den Standesangelegenheiten stets ein besonderes Interesse und fehlte wohl kaum bei einer Sitzung des Vereins beamteter Tierärzte Preußens, dessen stellvertretender Vorsitzender er 17 Jahre lang war und der seine Verdienste durch die Ernennung zum Ehrenmitglied besonders anerkannt hat. Wenn auch nicht als erster,

so sicher als einer der Ersten, hat er bereits im Jahre 1890 für die Tierärzte des Paderborner Landes eine Taxe mit Standesatzungen verfaßt und leitete 19 Jahre lang den Provinzialverein Westfalens. Ebenfalls war er Mitglied der Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte und gehörte vom Beginn der Kammern der Westfälischen Tierärztekammer als Vorstandsmitglied an. Staatlicherseits wurden seine Verdienste bereits vor dem Kriege durch den Roten Adlerorden 4. Kl. anerkannt. Wir bringen dem verehrten Jubilar zu seinem heutigen Geburtstage unsere allerherzlichsten Glückwünsche dar und sind fest davon überzeugt, daß diesen Glückwünschen nicht nur seine engeren Standesgenossen, sondern alle westfälischen Kollegen und alle Tierärzte, welche jemals mit ihm in Berührung gekommen sind, von ganzem Herzen zustimmen. Möge dem verehrten Kollegen ein sonniger Lebensabend ad multos annos beschieden sein. Am 24. März hoffen wir unser verehrtes Ehrenmitglied bei der Festtagung unseres Vereins in Berlin wiederzusehen und werden bei dieser Gelegenheit unsere Glückwünsche durch einen kräftigen Trunk noch besonders unterstreichen.

Dr. Ruft, Vorsitzender des Vereins beamteter Tierärzte Preußens.

Hallenturnfest und Reitvorführung an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Am 18. Februar 1928 fand in der Turnhalle das eigentliche Hallenturnfest statt. Pünktlich 10½ h. erfolgte der Einmarsch der Teilnehmer, an den sich die Freiübungen angeschlossen. Darauf hielt cand. med. vet. Steenblock die Begrüßungsansprache, in der er besonders die Bedeutung der Leibesübungen an den Hochschulen und Universitäten betonte. Es schloß sich ein Riegenturnen an, das durch einige frische Medizinballspiele abgelöst wurde. Dann stieg das Tauziehen, zu dem sich fast sämtliche Korporationen gemeldet hatten. Aus dem heißen Ringen ging die K.St.V. Visurgia als Sieger hervor. Neben Fechtvorführungen führten einige Studierende Übungen am Sprungtisch vor, die sehr viel Beifall ernteten. Der Schluß bestand in einem Musterriegenturnen am Barren. — Dieselbe Riege wird auch bei den Niederfächsischen Hochschulwettkämpfen am Sonnabend, den 25. Februar 1928 unsere Hochschule vertreten. Magnifizenz Mießner sprach seine Anerkennung für die Darbietungen und die exakte Art ihrer Ausführung aus. Besonders dankte er dem Hochschulturnlehrer Heuter und dem Sportwart Steenblock für die Mühewaltung bei den Vorbereitungen. Am Nachmittag wurde auf dem Reitplatz der Klinik noch eine Reitabteilung vorgeführt. Trotz des kurzen Bestehens dieser Reitabteilung wurden Leistungen gezeigt, die den Beifall der zahlreichen Zuschauer fanden und die bewiesen, daß die Leitung bei cand. med. vet. Bruhn in guten Händen liegt.

Siegerliste.

Sechskampf: 1. Gosch (Burschenschaft Alt-Germania), 2. Steenblock (Corps Normannia), 3. Buns (Burschenschaft Alt-Germania). Vierkampf: 1. Booss (V.D.St.), 2. Hantow (Alt-Germania), 3. Grünwald (Corps Hannoverania). Sieger am Reck: Gosch (Alt-Germania). Sieger am Barren: Steenblock (Normannia) und Gosch (Alt-Germania). Sieger am Pferd: Bruhn (V.D.St.). Sieger im Pferdsprung: Steenblock (Normannia).

Stud. med. vet. Dierking turnte außer Konkurrenz mit und erhielt einen besonderen Ehrenpreis für seine hervorragenden Leistungen.

Promotionstermine an der Tierärztl. Hochschule Hannover S.-S. 1928.

Für die Einreichung der Arbeiten: 3. Mai und 6. Juli. Für die mündliche Prüfung: 24. Mai und 27. Juli.

4. wissenschaftl. Referierabend an der Tierärztl. Hochschule Hannover.

Montag, den 27. Februar 1928, 20,15 Uhr, im Hörsaal des Anatomischen Institutes. 1. Dr. Freese über: „Die Narkose des Hundes mit besonderer Berücksichtigung des Chloralhydrates und einiger neuerer Narkotika“. 2. Dr. Schröder über: „Der Wert der histologischen Untersuchung von Wurst für den Nachweis von Wurstverfälschungen“.

Zietzschmann.

Keine Nutrose mehr für Paratyphus-Nährböden?

Die I. G. Farbenindustrie-Aktiengesellschaft hat die Herstellung des Präparates „Nutrose“ eingestellt. Die Nutrose ist für die kulturelle Erkennung und Untercheidung der Bakterien der Coli-Typhus-Gruppe

ein unentbehrliches Hilfsmittel. Unterzeichneter ist daher an die I. G. Farbenindustrie-Aktiengesellschaft mit der Bitte um Wiederaufnahme der Nütrose-Herstellung herantreten und bittet alle einschlägigen Institute das gleiche zu tun. Ersatzpräparate können in keiner Weise befriedigen und sind geeignet, neue Schwierigkeiten und Verwirrung in das Gebiet der Paratyphus-Fleischvergifter-Diagnose einzutragen in einem Augenblick, wo gerade durch die Paratyphus-Forschungsgemeinschaft eine Durcharbeitung der Frage unter einheitlichen Gesichtspunkten und mit einheitlichen Hilfsmitteln angestrebt wird.

Dr. Standfuss, Potsdam.

Tierärztlicher Verein der Neumark und Grenzmark.

Fortbildungslehrgang für Tierärzte über Geflügelkrankheiten Sonntag, den 4. März 1928, im großen Hörsaal der Versuchs- und Forschungsanstalten in Landsberg (Warthe), Theaterstraße 25/28. 9—10,30 Uhr: Prof. Dr. Reinhardt-Leipzig: a) Wirtschaftliche Bedeutung der Geflügelzucht, b) Unfruchtbarkeit beim Geflügel. 10,30—11 Uhr: Dr. von Sande-Landsberg (Warthe): Der heutige Stand der Immunisierung gegen die Geflügelcholera. 11—11,20 Uhr: Dr. Kurtz wig-Landsberg (Warthe): Erfahrungen über Geflügelcholeraimpfungen. 11,20—12 Uhr: Dr. David-Landsberg (Warthe): Parasitäre Erkrankungen des Geflügels. 12—12,30 Uhr: Frühstückspause. 12,30—14 Uhr: Prof. Dr. Reinhardt-Leipzig: Aufzucht-krankheiten beim Geflügel. 14 Uhr: Geflügeltuberkulosefilm. Im Anschluß an jeden Vortrag findet eine Aussprache statt. Die Teilnehmergebühr für den Lehrgang beträgt 5,— RM. 15,30 Uhr: Gemeinsames Mittagessen mit Damen im Hotel Vater am Markt.

Prof. Dr. Knuth, Dir. des Inst. f. Tierh. Dr. Kurtz wig, 1. Vorf.

17 Uhr Versammlung im Saale des Hotel Vater am Markt. 1. Geschäftliches, 2. Veterinärrat Dr. Reiche-Nauen: „Zwecke und Ziele der Arbeitsgemeinschaft deutscher tierärztlicher Buchführungs- und Verrechnungsstellen“. Gäste willkommen. Treffpunkt am 3. März abends im Hotel Vater am Markt.

Landsberg (Warthe), den 15. Februar 1928.

Dr. Stickdorn, Schriftf.

Veterinär-medizinische Gesellschaft für Südwest-Deutschland.

Frankfurt a. M., Samstag, den 25. Februar 1928, 14½ Uhr, im Kino-Saal des Zoologischen Gartens. 1. Dr. Albrecht vom Institut für exp. Therapie über: „Immunisierung nach Calmette“. 2. Dr. Eickmann vom bakt. Institut der Landwirtschaftskammer Bonn über: „Das freiwillige Tuberkulose-Tilgungsverfahren“. 3. Vorführung des Werbefilms der Haupt-Landwirtschaftskammer Berlin: „Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung“. — Um 13 Uhr findet gemeinschaftliches Essen im Zoologischen Garten statt. Anmeldungen bis spätestens 23. Februar an Dr. Berdel, Frankfurt a. M. (Schlachthof) erbeten.

Dr. Ohly, Vorf. des hess. Landesvereins.

Dr. Berdel, Vorf. d. Vereins d. Tierärzte d. Reg.-Bez. Wiesbaden.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Dr. A. Moritz: Kommentar zum Futtermittelgesetz. Carl Heymann Verlag.

Der Verlag hat zu dem in D. T. W. 1927, S. 842, besprochenen Kommentar einen Nachtrag herausgegeben, der die Ausführungsbestimmungen zum Futtermittelgesetz und die Verordnung über die Probenahme von Futtermitteln enthält. Zusammen mit diesem Nachtrag bietet das Buch einen vollständigen Überblick über die Gesetzesvorschriften und erweist sich als ein praktisches Hilfsmittel für die Praxis, das jedem, der sich mit dem Gesetz zu befassen hat, nur empfohlen werden kann.

Wulfsberg.

Gatermann's Kalender für Tierzüchter 1928. I. u. II. Teil, herausgegeben von W. Gatermann, Ob.-Reg.- und Landesökonomierat im Preuß. Ministerium f. Landwirtschaft, Domänen u. Forsten. Verlag von M. & H. Schaper, Hannover.

Der in zwei Teilen in Taschenformat erschienene landwirtschaftliche Kalender für Tierzüchter für 1928 enthält im ersten Teil ein Kalendarium (Termin-Notiz-Kalender) für 1928 und 1929 sowie Zucht- und Melkregister. Es folgen Erörterungen über Futtermittel, rationelle Fütterung, Altersbestimmung, Größen und Gewichtsverhältnisse der Haus-

tiere. Im zweiten Teil finden sich Aufsätze namhafter Züchter sowie Tabellen und Textvermerke verschiedenster Art. Anschließend folgt die Zusammenstellung aller für die Tierzüchter interessierenden Adressen (Ministerien, Züchtervereinigungen usw. sowie Tierzuchtbeamten). Die Brandzeichen sind gleichfalls angefügt. Den Schluß bildet ein Verzeichnis empfehlenswerter Bücher für den Landwirt und Tierzüchter.

Berge.

Mayr, J.: Tierärztlicher Taschenkalender 1928. Druck und Verlag von J. Gotteswinter, München.

Der vorliegende 32. Jahrgang des vornehmlich den Belangen der bayerischen Tierärzte Rechnung tragenden Kalenders ist jetzt in vier Bändchen erschienen. Das in Leder gebundene I. Bändchen enthält neben dem auswechselbaren Notiz-Tageskalender unter anderem einen Abschnitt über „Therapeutische Maßnahmen“ und das Arzneimittverzeichnis. Das II. Bändchen umfaßt die Veterinärpolizei mit Terminkalender. Im III. Bändchen sind neben verschiedenen Bestimmungen und Verordnungen über das Veterinärwesen in Bayern solche über die Fleischbeschau, die bakteriologische Fleischuntersuchung, das neue Lebensmittelgesetz, das Beamtenbefolgungsgesetz und a. m. erschienen. Das IV. Bändchen bringt das bayerische Personalverzeichnis.

Baars.

Bakteriologische Fleischbeschau. Von R. Standfuß. Darstellung unserer Kenntnis von den Fleischvergiftungen und prakt. Anleitung zur bakteriologischen Fleischbeschau nebst einem Anhang für Untersuchung und Beurteilung von Fleischkonserven für Tierärzte, Ärzte und Studierende. Zweite neubearbeitete Auflage mit 20 Abbildungen und 4 farbigen Tafeln. Berlin 1928. Verlagsbuchhandlung von R. Schoetz, Wilhelmstr. 10. Preis geb. 10,80 RM.

Die vorliegende zweite Auflage des bekannten Buches hat entsprechend dem heutigen Stande unseres Wissens über die Paratyphus-Fleischvergifter-Frage eine völlige Neubearbeitung erfahren. Der I. Teil bringt eine Darstellung des gegenwärtigen Standes der Paratyphus-Fleischvergifter-Forschung unter Berücksichtigung sowohl der Belange des Tierarztes wie der des Arztes. Im II. Teil ist die Technik der bakteriologischen Fleischuntersuchung eingehend besprochen und durch viele Abbildungen illustriert. Die heutige Bedeutung der bakteriologischen Fleischuntersuchung und der Paratyphus-Enteritis-Erkrankungen empfehlen das Buch zur Anschaffung für jeden Tierarzt sowie auch Arzt.

Baars.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Dem Tierarzt Dr. Wilkens aus Hagen ist die kommissarische Verwaltung der Veterinärstelle in Osterholz (Bez. Stade) übertragen; der wissenschaftl. Assistent Dr. Joh. Haupt zum wissenschaftl. Oberassistenten, Tierarzt Dr. A. Hemmert-Halswick zum wissenschaftl. Assistenten am pathol.-anatom. Institut der Tierärztlichen Hochschule in Berlin; Dr. Hermann Köstlbacher zum Veterinärmedizinalrat bei der bayerischen Versicherungskammer.

Bestanden: Die Prüfung für den tierärztlichen Staatsdienst in Bayern im Jahre 1927 haben bestanden: Bergmann, Alfons, Dr. med. vet., prakt. Tierarzt in Langförden i. Oldenburg; Berngruber, Dr. Richard, Assistent am Institut für Geburtshilfe an der tierärztlichen Fakultät der Universität München; Druckseis, Dr. Fritz, prakt. Tierarzt in München; Gion, Otto, techn. Assistent beim Verband oberpfälzischer Rotviehzüchter, Weiden; Hacker, Dr. Joseph, prakt. Tierarzt in München; Henn, Aug., Dr. med. vet., prakt. Tierarzt in Hassloch (Pfalz); Metzger, Ernst, Dr. med. vet., Assistent am Tierphysiologischen Institut der Universität München; Pfister, Hans, Tierarzt am bayer. Serumwerk in München; Schraml, Dr. Otto, wissenschaftl. Hilfsarbeiter an der Veterinärpolizeilichen Anstalt Oberfleischheim; Sedlmeier, Dr. Hans, o. Assistent am Tierpathologischen Institut der Universität München; Westphal, Dr. Walter, Tierarzt und Dipl. Landwirt in Herda bei Berka (Werra); Wiegand, Rudolf, Dr. med. vet., prakt. Tierarzt in Siegsdorf; Wißmeyer, Dr. Andreas, prakt. Tierarzt in Nürnberg-Schweinau.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck: Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelman, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zulassung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Ausperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 9.

Ausgegeben am 3. März 1928.

36. Jahrgang.

(Aus der Preuß. Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene in Berlin-Dahlem, Biol.-zoolog. Abt.).

Die Kriebelmückenschäden in Preußen während der Jahre 1925 und 1926.

(Zusammengestellt nach den amtlichen Berichten der Kreistierärzte.)

Von Dr. Theodor Saling.

Als Fortsetzung der seit 1920 anfangs von *Wilhelm*, später von mir¹⁾ mit Genehmigung des Herrn Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten veröffentlichten Jahresübersichten über die Kriebelmückenschäden in Preußen gebe ich jetzt eine zusammenfassende Darstellung der gleichen Schäden in den Jahren 1925 und 1926 unter Zugrundelegung der folgenden, mit Bezug auf den Ministerialerlaß vom 24. III. 1920 — I. A. III g 7616 — erstatteten amtlichen Berichte:

1. Bericht des Reg.-Präf. in Allenstein (Berichterft.: Oberreg.- und Vet.-Rat Dr. Marks) vom 8. V. 1925 — I. V. 883 —. 2. Bericht des Reg.-Präf. in Hannover (Berichterft.: Oberreg.- u. Vet.-Rat Matthiesen) vom 21. XII. 1925 — I. B. 3949 — nebst Bericht des Landrats von Neustadt a. Rbg. vom 1. VIII. 1925 — I. D. 320 — betr. Uferentkrautung der Leine. 3. Bericht des Vet.-Rat Dr. Janzen in Neustadt a. Rbg. vom 31. XII. 1925 — Tgb.-Nr. 553. 4. Bericht des Reg.-Präf. in Allenstein (Berichterft.: Oberreg.- u. Vet.-Rat Dr. Marks) vom 7. I. 1926 — I. V. 19 nebst Anlage. 5. Bericht des Institutes für Tierhygiene in Landsberg a. W. vom 16. VII. 1926 — Tgb.-Nr. 3243. 6. Bericht des Vet.-Rat Janzen in Neustadt a. Rbg. vom 31. XII. 1926 — Tgb.-Nr. 1121. 7. Bericht des Reg.-Präf. in Hannover (Berichterft.: Oberreg.- u. Geh. Vet.-Rat Matthiesen) v. 7. I. 1927 — I. B. 4519. Als Ergänzung zu Bericht 1 wurde mit herangezogen 8. Bericht der Preuß. Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene in Berlin-Dahlem vom 16. XI. 1925 — Tgb.-Nr. 9587.²⁾

I. Kasuistik.

Tierschäden durch Simuliidenstiche im Jahre 1925.
Festgestellt in den Provinzen Ostpreußen und Hannover.

1. Provinz Ostpreußen.

In 3 Kreisen:

a) Kreis Johannisburg (nach Bericht 1 und 8).

Erkrankt: 34 Rinder und 9 Pferde, im Verlauf des Sommers noch mehr.

¹⁾ Berl. Tierärztl. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 21, S. 243—246, D. T. W. Jg. 31, Nr. 38/39, S. 425—428, ebenda Jg. 34, Nr. 17, S. 309—312.

²⁾ Auch enthalten in: Saling: Die Kriebelmückenschäden des Jahres 1925 im Kreise Johannisburg (Ostpr.). Berl. Tierärztl. Wochenschr. Jg. 42, S. 134 ff.

Notgeschlachtet: 7 Jungrinder, und zwar

2 Jungrinder in Gregersdorf	am 26. 4. 1925
2 Jungrinder in Pianken	am 29. 4. 1925
1 Jungrind in Gurra	am 4. 5. 1925
1 Jungrind in Pianken	am 5. 5. 1925
1 Jungrind in Gut Braunshof	am 13. 5. 1925

Verendet: 2 Jungrinder, und zwar

1 Jungrind in Gregersdorf	am 26. 4. 1925
1 Jungrind in Pianken	am 29. 4. 1925

Während diese Aufstellung nur alle amtlich festgestellten Fälle umfaßt, hat später (vgl. meine unter Fußnote ²⁾ zitierte Arbeit) eine Umfrage in den Gemeinden des Schadgebietes durch beordnete Landjäger weit höhere Erkrankungs- und Verlustzahlen ergeben, denn es sind danach allein in der Zeit vom 26. 4. bis 14. 5. 1925 durch Kriebelmückenstiche im ganzen 104 Rinder und 13 Pferde erkrankt, wovon 13 Rinder notgeschlachtet, 2 Rinder und 1 Pferd verendet sein sollen. Wenn auch die Zahl der Erkrankungen erfahrungsgemäß eine höhere als die der zur amtlichen Kenntnis gebrachten ist, so ist die Richtigkeit der letzten Verlustziffern jedoch unkontrollierbar, zumal wohl mit der Möglichkeit gerechnet werden muß, daß in Erwartung einer Entschädigung auch anderweitige, aber ungeklärte Tierverluste von seiten der Besitzer nachträglich auf das Schuldkonto der Kriebelmücken gesetzt wurden.

b) Kreis Lötzen (nach Bericht 8).

Verendet: 1 Fohlen in Dannowen.

c) Kreis Lyck nach Bericht 8).

Erkrankt: mehrere Pferde in leichter Form.

2. Provinz Hannover.

Nur in den Kreisen Neustadt und Linden.

a) Kreis Neustadt a. Rbg. (nach Bericht 2 und 3).

Erkrankt: mehrere Pferde (Remonteamt Mariensee) und 10 Rinder, davon

Notgeschlachtet: 1 Jungrind in Garbsen am 2. 5. 1925.

Verendet: 3 Kühe und 4 Jungrinder, und zwar

1 Kuh u. 2 Jungrinder	in Luttmersen	am 22. 4. 1925
1 Jungrind	in Vesbeck	am 22. 4. 1925
1 Kuh	in Otternhagen	am 3. 5. 1925
1 Kuh u. 1 Jungrind	in Neustadt	am 6. 8. 1925

- b) Kreis Linden (nach Bericht 2). Erkrankt: 7 Jung-
rinder, davon notgeschlachtet: 1 Jungrind in Güm-
mer am 4. 5. 1925. Verendet: 1 Jungrind in Lohnde am
25. 5. 1925.

Tierschäden durch Simuliidenstiche im Jahre 1926.
In den Provinzen Brandenburg und Hannover.

1. Provinz Brandenburg.

Nur im Kreise Landsberg a. W. (nach Bericht 5). Er-
krankt: etwa 20 Rinder auf Rittergut Liebenow im Juli, davon
verendet: 5 Jungrinder im Juli.

2. Provinz Hannover.

Nur im Kreise Neustadt a. Rbg. (nach Bericht 6 und 7).

Erkrankt: mehrere Pferde (Remonteamt Mecklenhorft) und etwa
12 Rinder, davon verendet: 4 Kühe und 3 Jungrinder, und zwar

1 Kuh in Esperke	am 23. 4. 1926
2 Jungrinder in Basse	am 27. 4. 1926
1 Kuh in Neustadt	am 6. 7. 1926
1 Jungrind in Basse	am 18. 7. 1926
1 Kuh in Marienwerder	am 14. 8. 1926
1 Kuh in Eilvese	am 22. 9. 1926

Die Gesamtzahl der amtlich bestätigten Verluste durch Kriebelmücken
betrug in Preußen also im Jahre 1925 1 Pferd und 19 Rinder, im
Jahre 1926 nur 12 Rinder. Gegenüber den entsprechenden Einbußen
während der Jahre 1923 und 1924 erscheinen die Verlustzahlen wieder
etwas im Absinken, obwohl diejenigen des Jahres 1922 (1 Pferd und
4 Rinder) noch nicht wieder erreicht sind. Wieviel leichtere Kriebel-
mückenschäden unter dem Bilde bald vorübergehender Erkrankungen
nebenher noch verursacht wurden, entzieht sich natürlich bei dem
Mangel einer Verpflichtung zur Krankheitsanzeige der Beurteilung. Von
andern Haustieren als Rindern und Pferden wurde diesmal kein
Simuliidenbefall gemeldet.

II. Biologie und Ökologie.

Während im Aller-Leine-Gebiet Kriebelmückenschäden
in jedem Frühjahr der letzten Jahrzehnte festgestellt wurden,
war das verderbliche Auftreten von Simuliiden im Kreise
Johannisburg im April und Mai 1925 so überraschend, daß
man — wie auch im Bericht 1 zum Ausdruck kommt —
für Ostpreußen ganz neuartige Erscheinungen zu erkennen
glaubte. Die früheren Kriebelmückennachweise in Ostpreu-
ßen (Kr. Gerdauen 1901, Kr. Osterode 1903, Kr. Königsberg-
Land 1905 und Kr. Rastenburg 1910)³⁾ knüpften sich frei-
lich an recht vereinzelte Verluste, doch kam es schon 1924
in der Weichselniederung bei Marienwerder zu einem stär-
keren Schaden durch Simuliiden, die nach Ansicht des Be-
richterstatters durch den damals herrschenden Südwest aus
Polen der Weichsel entlang herübergeweht sein sollten. Das
gehäufte Auftreten von Kriebelmücken im Johannsburger
Kreise, besonders in der Umgebung von Arys, leitet der Be-
richt 1 auf die erheblichen Niederschlagsmengen und den
dauernd hohen Wasserstand im ganzen Vorjahre zurück. In
der Tat war durch diese klimatischen Verhältnisse eine über-
reiche Gelegenheit zur Eiablage und Brutentwicklung der
Kriebelmücken gegeben, denn die zahlreichen Fließe, die für
das mafurische Seengebiet charakteristisch sind und das mit
Tümpeln und Löchern durchsetzte, teilweise bruchige und
moorige Weideland durchziehen, führten genügend Wasser
mit einer für die Larvenentwicklung ausreichenden Strö-
mungsgewindigkeit, während bei gesunkenem Wasser-
stand, wie ich mich im Juni 1925 überzeugen konnte, das
Vorkommen von Kriebelmücken-Larven und -Puppen auf
die Hauptwasseradern (wie Aryskanal, Pissekfluß u. ähnl.)
beschränkt ist, weil die kleineren Rinnfale allmählich stag-
nieren oder austrocknen. Infolge der außergewöhnlich mil-
den Witterungslage zwischen Dezember 1924 und Februar

1925 konnte die Brut auch ausgezeichnet überwintern.
Durch den späten Kälteeinbruch aber von März bis Mitte
April 1925 wurde ein allmähliches Ausflüpfen der Voll-
kerfe verhindert, so daß sich bei dem Ende April schroff
eintretenden Temperaturanstieg ein gedrängtes Massenaus-
flüpfen von Kriebelmücken ereignen mußte, das zurzeit
des ersten Weideaustriebs immer verhängnisvoll ist, beson-
ders wenn eine unaufgeklärte Bevölkerung dieser Gefahr
nicht durch Zurückhalten des Viehes im Stall während der
Hauptschwärmzeit der Simuliiden zu begegnen weiß. So
befragt auch der Bericht 1: „In allen Fällen sind die Er-
krankungen nach dem Austreiben der Tiere auf die Weide
aufgetreten. Die Krankheitserscheinungen waren in der
Regel am schwersten am ersten Weidetage und wurden dann
schwächer oder hörten ganz auf.“

Larven und Puppenstadien fand ich im Juni 1925 noch
in reichlicher Menge, besonders an dem üppigen Potamogeton-
bewuchs des Aryskanals und Pissekflusses, und es ist auch
im Verlaufe des anschließenden Sommers noch vereinzelt
zu leichten Erkrankungen gekommen, die aber keine tier-
ärztliche Hilfe erheischten. Wenn, wie Bericht 4 hervor-
hebt, südlich von Johannisburg trotz reichlichen Vorkom-
mens von Kriebelmückenbrut im Pissekfluß keine Tierver-
luste entstanden sind, so können das mancherlei Lokalfak-
toren bewirkt haben, wie langames Ausflüpfen der Voll-
kerfe, geringere Giftigkeit der vorkommenden Mücken-
arten, Witterungscharakter und Windrichtung, verzögerter
Weideaustrieb, auch die erworbene Widerstandskraft alter
einheimischer Tierstämme u. a. m. Daß aber auch dort
leichte Erkrankungen vorgekommen sind, habe ich aus
Schilderungen der Anwohner entnehmen können.

Auch in dem hannoverschen Schadgebiet herrschte wäh-
rend des Winters 1924/25 sehr milde Witterung, die einer
starken Kriebelmückenentwicklung, wie sie gelegentlich der
Exkursion der Leineflußkommission am 1. III. 1925 beob-
achtet wurde, günstig war. Erfreulicherweise kam es trotz-
dem zu keinen bedeutenderen Verlusten, was (nach Be-
richt 2) der bis zum 20. Mai polizeilich verordneten Weide-
beschränkung zu verdanken sein soll.

Auch der Witterungsverlauf des Jahres 1925 war durch
einen regenreichen Sommer und milden Herbst charaktéri-
siert, und für die Eiablage der letzten Simuliidengeneration
wohl günstig, doch bildeten sich im Dezember starke Tem-
peraturgegensätze heraus. Um die Mitte des Januars 1926
erfolgte ein scharfer Kälteeinbruch, der aber bereits gegen
Ende desselben Monats allmählicher Erwärmung und später-
hin kaltem und nassem Frühjahrswetter wich, so daß kein
gefährliches Massenausflüpfen von Kriebelmücken statt-
finden konnte. Lediglich im Neustädter Kreis war im Früh-
jahr 1926 vereinzelter Schaden zu verzeichnen, der sich
(wohl auch unter dem Einfluß der Weidegangesbeschrän-
kung) nur auf drei Rinder belief. Eine stärkere Kriebel-
mückenentwicklung setzte aber noch später während der
Sommermonate ein, hauptsächlich im gewitterreichen Juli
1926, so daß sich nicht nur im Kreise Neustadt die Tier-
verluste erneuerten, sondern auch in einem im Frühjahr
verschont gebliebenen Gebiet, der Wartheniederung bei
Landsberg a. W., einzelne Rinder infolge von Simuliiden-
stichen verendeten. Sogar bis Ende Oktober wurde in
Neustadt eine Belästigung von Pferden durch Kriebelmücken
wahrgenommen (Bericht 6).

Leider enthalten die Berichte keine systematischen An-
gaben über die in den einzelnen Schadgebieten beobachteten
Kriebelmückenarten. Lediglich der Bericht 8, der auf meiner
Materialentnahme im ostpreussischen Masurengebiet fußt,
gibt die aufgefundenen Arten an: *Boophthora argyrea*
Meig., *Wilhelmia equina* L. und *Wilhelmia falcata* Enderl.
Es wäre wünschenswert, daß in Zukunft bei Eintritt von
Kriebelmückenschäden auch Fragen der Systematik zur
Klärung der Beteiligung und Verteilung der verschiedenen

³⁾ Vergl. auch die von Wilhelmi bearbeitete topographische
Übersichtskarte über die „Kriebelmückenschäden in Deutschland von 1901
bis 1925“. Verlag der Preuß. Landesanstalt f. Wasser-, Boden- und
Luft hygiene in Berlin-Dahlem, 1927.

Simuliidenarten verfolgt würden durch Bestimmung aller von Weidetieren abgetöteten Exemplare seitens einschlägiger Institute.

III. Klinische und pathologisch-anatomische Merkmale.

Die Berichte über den Zeitabschnitt 1925/26 bringen über den klinischen Verlauf der Kriebelmückenerkrankung von Rindern und Pferden keine neuartigen Feststellungen. In beiden Jahren sind bis auf ein ostpreussisches Fohlen nur Rinder verendet, die erkrankten Pferde genasen. Bei Rindern wurden besonders Kopf und Hals, bei Pferden Unterbauch und Schlauch von den Insekten befallen, und durch die Schmerzhaftigkeit der Stiche wurden die Tiere zumeist in größte Unruhe versetzt und drängten zu den Stallungen zurück. Wegen Verschlechterung des Futterzustandes der Remonten von Mecklenhorst infolge solcher dauernden Belästigungen auf einer am Gehölz gelegenen Weide wurde 1926 vom Reichswehrministerium der Weideauftrieb in der Gefahrzeit verboten (Bericht 6). Erwähnt wird in einigen Berichten das Auftreten von ödematösen Schwellungen an den Stichstellen, die im Bereich des Kehlkopfes, des Halses und der Vorderbrust schwere Atemstörungen und Erstickung zur Folge haben können, bei leichter Erkrankung aber schnell wieder verschwinden. Alle verendeten Tiere starben gleich am Erkrankungstage, darunter zwei Rinder ohne Fiebererscheinungen schon zwei Stunden nach dem Austrieb auf die Weide. Als weitere Krankheits Symptome wurden rasche Abmagerung, Festliegen, Versiegen der Milch und Herzbefwerden erwähnt. Vorwiegend erkrankten Jungtiere und aus kriebelmückenfreier Gegend eingeführte oder dauernd im Stall gehaltene einheimische erwachsene Tiere beim ersten Weidegang, doch bringt der Bericht 6 auch die schwere Erkrankung von zwei Kühen (eine davon verendet!) zur Kenntnis, die nach langem Weidegang seit Frühjahr erst im Juli befallen wurden.

Pathologisch-anatomische Feststellungen ergeben sich aus den Berichten 1 bis 7 nicht. Wohl befindet sich im Bericht 5 die Mitteilung, daß die Zerlegung der fünf Jungtiere den Verdacht auf Tod durch Kriebelmückenstiche bestätigt habe, doch werden keine Befunde angeführt. Dagegen gibt der Bericht 8 die Notchlachtungsbefunde wieder, soweit sie gelegentlich der Fleischschau ermittelt wurden. Danach waren mangelhafte Ausblutung, wäßrige Durch-

tränkung des Fleisches, besonders fulzige Beschaffenheit von Kopf-, Hals- und Brustregion in größerer oder geringerer Ausdehnung stets vorhanden. Obduktionsergebnisse sind in keinem Bericht verzeichnet.

IV. Prophylaxe und Therapie.

Im hannoverschen Schladdegebiet wurde die seit Jahren befolgte Maßnahme einer methodischen Befahrung der Wasserwege des Leine-Weserdistriktes im frühesten Frühjahr und im Hochsommer durch eine Kommission zwecks Beurteilung der Kriebelmückenbrutverhältnisse und Überprüfung der angeordneten Uferentkrautung wiederholt. Dabei hatte sich freilich gezeigt, daß die Entkrautung der Leine durch die Uferanlieger infolge des dauernd hohen Wasserstandes nur ganz unzulänglich und im Bett der kleinen Leine ausgeführt worden war, so daß sich von dieser Seite keinerlei Einfluß auf eine Verminderung der Kriebelmückenbrut ergeben konnte. Dagegen wird in den Berichten 2 und 7 der alljährlich im Leinegebiet bis zum 20. Mai angeordneten Weidebeschränkung und der damit einhergehenden öffentlichen Belehrung und Verwarnung der Tierbesitzer große prophylaktische Bedeutung zugemessen. Unverkennbar bildet dieses schon seit vielen Dezennien in den Niederungen der unteren Donau geübte Verfahren trotz mancher Mängel für den Landwirt einen wirksamen Notbehelf, solange nicht auf bequemem Wege ein Massenaufreten von Kriebelmücken zu unterbinden oder gefahrlos zu gestalten ist. Auch für Ostpreußen wurde (laut Bericht 4) ein Verbot des Weidegangs bis zum 15. Mai und Einführung der Nachtweide bei starkem Kriebelmückenschwärmern in Aussicht genommen, weil sich eine Wiederholung der Flußentkrautungen nach der letzten Eiablage der Kriebelmücken im Spätherbst oder im zeitigen Frühjahr, ebenso eine zeitweise Aufstaung der Gewässer zwecks Abtötung der Simuliidenbrut als teilweise zu kostspielig, teilweise undurchführbar erweisen dürfte.

Einer therapeutischen Behandlung waren anscheinend nur wenige erkrankte Tiere unterstellt. Lediglich im Bericht 6 wird eine schwer erkrankte Kuh geführt, bei der unter Einwirkung von Coffeingaben zur Behebung der starken Herzbefwerden allmählich Wiedergenesung eintrat.

Die polizeitierärztliche Überwachung der Wochenmärkte.

Von Dr. Mathieu, 2. Polizeitierarzt zu Hannover.

Die polizeitierärztliche Revision der Wochenmärkte gestaltet sich schwieriger als die der Läden und zwar aus folgenden Gründen:

Das gesamte Gebiet der Nahrungsmittelkontrolle nebst einigen weiteren Gesichtspunkten tritt uns hier auf engem Raume in wirklich gedrängter Fülle entgegen. Es sind Fleisch-, Wurst-, Fisch-, Geflügelstände und anderes mehr zu beaufsichtigen. Die allgemeinen hygienischen Bedingungen, unter denen ein Markt stattfindet, sind je nach der Lage des Platzes und nach der Jahreszeit sehr verschieden. Es kommt ferner hinzu, daß hier sehr viel billige Ware gehandelt, namentlich auch viel Fleisch von auswärts eingeführt wird. Außerdem muß man immer wieder die Erfahrung machen, daß manche Verkäufer glauben, der großstädtischen Bevölkerung alles mögliche anbieten zu können.

Der eigentliche Zweck des Wochenmarktes ist, den kurz vor der Stadt wohnenden Landwirten und sonstigen Selbstzeugern die Möglichkeit zu geben, ihre Waren an die Stadtbevölkerung direkt abzusetzen und andererseits es dem Städter leicht zu machen, sich mit frischen, ländlichen Erzeugnissen zu versehen. Dieser Grundsatz ist aber heute nicht mehr scharf ausgeprägt, denn die Marktbezieher sind vielfach nicht Selbsterzeuger, sondern Städter, denen der

Großhandel die von ihnen feilgebotene Ware liefert. Ferner betreiben eine Reihe von hiesigen Ladengeschäften auf den Märkten gewissermaßen eine „fliegende Filiale“ und schließlich kommen noch alle diejenigen hinzu, welche einen eigenen Laden entweder nicht bekommen oder aus irgendwelchen Gründen nicht halten können. In der Stadt Hannover ist an allen Wochentagen, ausgenommen Montag, auf mindestens einem Platze Markt, Sonnabends sogar an drei Stellen. Außerdem besitzt Hannover eine Markthalle. Der Betrieb wird durch die vom Magistrat herausgegebene Marktordnung vom 30. I. 1906 nebst Ergänzungsbestimmungen geregelt. Die Abteilung Lebensmittelüberwachung des Polizeipräsidiums entsendet täglich auf die Märkte zwei Spezialbeamte, nebenher sind Beamte des jeweils zuständigen Polizeireviers namentlich für die Regelung des Verkehrs tätig. Städtische Beamte (Marktvögte) erledigen die Standverteilung, die Erhebung des Standgeldes usw. Die in meinem Bezirk liegenden Märkte besuche ich ebenfalls regelmäßig. Des öfteren nehme ich die Revision allein vor, es empfiehlt sich aber in gewissen Fällen, sich mit den Lebensmittelüberwachungsbeamten zu verabreden.

Die Zeit, in der die Revision erfolgt, darf nicht dauernd die gleiche sein. Jede Stunde der Marktdauer ist für den Polizeitierarzt wichtig und gibt ein anderes Bild. Es emp-

fiehlt sich durchaus des öfteren bereits auf dem Markte zu stehen, wenn die ersten Wagen anrollen. Die Inhaber von festen Ständen besitzen vielfach mehrere Budenausstattungen und Geräte und bringen diese jeweils irgendwo in der Nähe der Marktplätze unter. Die Ermittlung und erstmalige Befichtigung dieser Abstellräume liefert oft überraschende Resultate in Bezug auf allgemeine Sauberkeit, Geeignetheit und fachgemäße Lagerung. — Die ankommenden Wagen bedürfen gleichfalls der Beaufsichtigung. Man kann dabei Studien darüber anstellen, was der Einzelne unter fachgemäßem Transport, fauberer Verpackung und pfleglicher Behandlung der Waren versteht. Eine vom Polizeipräsidium unterm 18. VI. 1903 erlassene Verordnung gibt hier die Handhabe zum Einschreiten im Bedarfsfalle. Während des Auspackens werden die Buden und ihre Inneneinrichtung auf Sauberkeit geprüft; besondere Aufmerksamkeit ist dabei den Hackklötzen zuzuwenden. Ich habe es erlebt, daß mehrere davon in der Zeit zwischen den Markttagen mit der Hackfläche nach unten in einem Pferdestalle, in dem die Pferde der Marktbezieher untergestellt werden, standen; ihre Reinigung vor Wiederbenutzung war sehr problematisch. Unsaubere Buden, Bretter und Geräte können bei Anwesenheit während des Aufbaues bereits von der Benutzung in diesem Zustande ausgeschlossen werden.

Es folgt alsdann bei den Fleischerständen die Revision der Fleischwaren hauptsächlich auf Verderbenheit, vorschriftsmäßige Stempelung, Entfernung der Augen- und Ohrausschnitte, sowie von stehengebliebenen Echinokokken in der Leber usw. und auf allgemeine Sauberkeit. Dabei gilt hier neben den Bestimmungen des Reichsfleischbeschaugesetzes noch der Gemeindebeschluss vom 25. III. 1905, der befiehlt, daß alles nicht tierärztlich untersuchte Fleisch der städtischen Fleischschau auf dem Schlachthofe oder in der Markthalle zur Nachuntersuchung vorzulegen ist, wo es alsdann mit einem besonderen Stempel versehen wird, der natürlich in Form und Schriftinhalt von den amtlichen Fleischbeschaustempeln abweicht. Im Betretungsfalle ist solches nicht vorgelegtes Fleisch daher anzuhalten und der städtischen Fleischschau zu überweisen.

Bei den Wurstwaren achtet man auf allgemeine Sauberkeit, Ganzheit, Verderbenheit, Färbung der Hüllen und des Wurstgutes selbst, Zusatz von Mehl, Grütze, roter Gelatine usw. (Einzelheiten hierüber siehe meine Abhandlung in Nr. 24/1927 der D. T. W.) Sehr im Schwunge war hier eine Zeitlang das Feilhalten von sog. Zungenwurst, in der die Zunge durch mageres Schweinefleisch (ich hatte es Faconfilet genannt) in Form des Zungenquerschnittes ersetzt, die Wurst aber ausdrücklich als Zungenwurst bezeichnet und der hierfür angemessene Preis angeschrieben war. Solche Wurst ist als nachgemacht zu bezeichnen und anzuhalten. In jedem von mir zur Anzeige gebrachten Falle ist auch eine Bestrafung erfolgt.

Es wird des öfteren auch versucht, Ziegenfleisch als Hammel zu verkaufen. Der Nachweis des tatsächlich unter dieser Bezeichnung stattgehabten Verkaufes ist in solchen Fällen wichtig und eine längere, unauffällige Beobachtung der diesbezüglichen Stände erforderlich.

Mett darf nach der Regierungspolizeiverordnung vom 13. VII. 1926 auf Märkten nicht mehr feilgeboten werden. (Siehe auch meine diesbezügliche Abhandlung in Nr. 44, 1926, der D. T. W.).

Es kommt gerade in diesem Winter recht oft vor, daß Landleute Wurst vom selbstgeschlachteten Schweine auf den Markt bringen. Am Tiere ist aber lediglich die Trichinenschau ausgeübt worden, da zunächst ein Inverkehrbringen der Waren nicht beabsichtigt war. Neben den Bestimmungen des Reichsfleischbeschaugesetzes (§ 1) kommt der Moment der Gewerbsmäßigkeit hinzu. Als gewerbsmäßig ist nach hiesiger Anschauung bereits anzusehen, wenn eine Abgabe an drei Personen am gleichen Tage erfolgt. Es

braucht also nicht das Beziehen des Marktes mit solcher Ware an verschiedenen Tagen abgewartet zu werden.

In den Fischständen prüft man die Seefische auf Verderbenheit, Kiemenfärbung, Glyzerinaugen und Parasiten, sowie auf evtl. angewendete falsche Bezeichnungen zwecks Erzielung höherer Preise, ferner die Büchsen auf Bombage und den gefärbten Seelachs auf Deklaration. Hinter jedem Fischstande hat ein Eimer für Abfälle zu stehen.

Süßwasserfische aus dem Steinhuder Meere werden in Kiepen z. T. noch lebend angeboten. Ich halte dieses Aufeinanderfächern ohne Wasser für eine Tierquälerei. Auf Verderbenheit, Mindergröße, Schonzeiten wäre zu achten, desgl. festzustellen, ob etwa ein Abschuppen der Tiere im lebenden Zustande stattgefunden hat.

Lebendes Geflügel darf nur in luftigen Behältern ohne Fesselung feilgeboten werden. (Regierungspolizeiverordnung vom 8. I. 1898.) Das Abschlagen auf offenem Markte ist verboten. — Geschlachtetes Geflügel ist hauptsächlich auf wirklich vorgenommene Schlachtung, Nährzustand und Verderbenheit zu untersuchen.

Das Wild ist auf Tötungsart, Verderbenheit, Krankheiten zu untersuchen, nebenbei ist auf Schonzeiten zu achten.

Alle Lebensmittel müssen mindestens durch eine Unterlage vom Erdboden getrennt sein.

Bei allen diesen Untersuchungen wird man gleichzeitig auch noch die Polizeibeamten in einigen diesen besonders obliegenden Überwachungen unterstützen können, so z. B. bei der Revision der Preisverzeichnisse und ihres Inhaltes, bei der Kontrolle der Maße, Waagen und Gewichte; beim Feilbieten nicht marktfähiger oder verbotener Waren; bei der Butterkontrolle und der Revision auf naturgeschützte Pflanzen, Giftpilze usw.

Das Mitbringen von Hunden seitens der Käufer auf den Markt ist verboten. Die Ziehunde der Standinhaber sind alsbald wieder zu entfernen.

Ganz allgemein ist ferner noch darauf zu achten, daß die Käufer das unnötige Anfassen der Waren unterlassen und daß die Waren nicht durch Tabak verunreinigt werden. Eine Unsitte ist ferner das Verabfolgen von Kostproben auf der Messerspitze.

Auch beim Abräumen des Marktes bin ich oft zugegen. Hierbei ist wiederum Gelegenheit, die Fahrzeuge, Verpackung der Waren und den Verbleib der Buden und Geräte zu kontrollieren.

Allgemein ist zu sagen, daß der unter freiem Himmel abgehaltene Markt in hygienischer Hinsicht zu Bedenken Veranlassung gibt. Die feilgebotenen Waren leiden durch den Transport und werden auf dem Markte den Einflüssen der Witterung in überaus starkem Maße ausgesetzt. Liegt nun noch der Markt an einer sehr verkehrsreichen Straße, so bleibt dies nicht ohne Einfluß auf die Reinlichkeit. Der Untergrund des Marktplatzes selbst ist ebenfalls zu beachten. Am besten eignet sich hierzu Asphalt oder gutgefugtes Steinpflaster. Sand ist namentlich bei den Fischständen unbedingt zu vermeiden; die Bewohner nahegelegener Wohnhäuser werden sonst alsbald mit Klagen über Fischgerüche, die sich auf dauernd dem Sandboden mitgeteilt haben, kommen.

Auch die Kehrichtgruben und die öffentlichen Bedürfnisanstalten müssen in geeigneter Entfernung von den Ständen angelegt sein, bzw. umgekehrt muß der Aufbau des Marktes sich nach diesen festen Punkten richten. Waren, die keiner Säuberung vor dem Genuße unterzogen werden können, sollten als nicht marktfähig angesehen werden, z. B. Mett (bereits hier gesehen), Seelachsfilets, Topfzulze, sowie Margarine und Butter in unverpacktem Zustande usw. Es besteht aus hygienischen Gründen keine Berechtigung,

einer Vermehrung der Markttage und Plätze das Wort zu reden. Eine Abschaffung derselben aber, ohne für kleine Markthallen in allen Stadtteilen zu sorgen, ist z. Zt. nicht

angängig, da die Existenzen der Marktbezieher in der augenblicklich schlechten wirtschaftlichen Lage geschützt werden müssen.

Die polizeitarztliche Revision der Geschäfte.

Von Dr. Mathieu, 2. Polizeiarzt zu Hannover.

Die Revision der Betriebe, welche sich mit der Herstellung oder dem Verkaufe animalischer Lebensmittel befassen, ist m. E. leichter als die Überwachung der Wochenmärkte, weil es sich hierbei mindestens um einen festen Laden, vielfach aber um mehr oder weniger ausgedehnte Betriebe handelt. Dem Polizeiarzt ist somit ein geschlossenes Ganzes gegeben, aus dem er seine Eindrücke schöpfen kann, während man auf den Märkten nur auf die der Witterung stark ausgesetzten Stände und ihre Waren angewiesen ist und nie recht weiß, wie es in den Herstellungsräumen aussieht.

In der Stadt Hannover unterliegen der polizeitarztlichen Kontrolle: die Fleischereien und Fleischwarenhandlungen, Pferdeschlächter, Fischhändler, Wild- und Geflügelhändler und die Lebensmittelgeschäfte aller Art, von der großen Delikatessehandlung bis zum kleinsten Hökerlädchen. Leider sind die Gast- und Schankwirtschaften nur im Verdachtsfalle zu revidieren. Die dabei von mir gemachten Erfahrungen haben aber gezeigt, daß es dringend notwendig ist, auch die Betriebe einer regelmäßigen Revision zu unterziehen.

Jede Art der zu überwachenden Betriebe hat ihre Eigentümlichkeiten. Es kann nicht Aufgabe einer einzigen Abhandlung sein, alle überhaupt irgend in Frage kommenden beachtlichen Punkte erschöpfend zu behandeln; ich muß mich vielmehr auf das Hauptsächliche, Wichtigste und Häufigste beschränken.

Eine gründliche Kenntnis der in jedem Falle in Betracht kommenden Gesetzesparagrafen ist selbstverständliche Vorbedingung für eine erfolgreiche Tätigkeit und zudem ein sicherer Schutz gegen Angriffe, welche sich die Gewerbetreibenden bei notwendig werdendem Einschreiten manchmal erlauben. Es kommen ebenso wie auf den Märkten hauptsächlich in Frage: Reichfleischbeschaufesetz, Viehfleischengesetz, Lebensmittelgesetz, Gewerbeordnung, Jagdordnung, Fischereigesetz und eine Anzahl von Reg.-Polizeiverordnungen, Polizeiverordnungen und Gemeindebeschlüssen usw.

Die Revisionen nehme ich gleichfalls meistens allein vor, ich habe jedoch das Recht, im Bedarfsfalle einen Beamten der Lebensmittelüberwachung oder des zuständigen Polizeireviere anzufordern. Es ist leider aus verschiedenen Gründen in Hannover nicht angängig, sich dauernd einen Beamten zuteilen zu lassen. Daher kann es natürlich vorkommen (und namentlich als ich vor Jahren meine Tätigkeit hier begann, ist es mir passiert), daß man in mehr oder wenig schwere Differenzen mit Geschäftsinhabern kommt. In solchen Fällen ist es ratsam, die Revision abbrechen und je nach der Lage der Sache entweder sofort mit einem Revierbeamten oder nach geraumer Zeit erst die Revision erneut vorzunehmen. Daß man den Täter wegen Verweigerung der Revision und evtl. wegen Beleidigung belangen kann, ist selbstverständlich. — Die Zeit der Revision wird sich nach der übrigen dienstlichen Tätigkeit des Polizeiarztes zu richten haben, falls nicht gerade Tag und Stunde durch besondere vermutete oder „verpiffene“ (hinterbrachte) Geschehnisse beeinflusst werden. Ich vermeide es möglichst, in den Hauptgeschäftsstunden zu kontrollieren, da dies evtl. als lästig empfunden werden kann. In den Arbeitervierteln ohne besonderen Grund an Lohntagen Besichtigungen vorzunehmen, ist nicht empfehlenswert, da man dann schlecht vorwärts kommt. Selbstverständlich muß die Revision stets unvermutet geschehen. Ich

habe oft die Beobachtung gemacht, daß namentlich Fleischer, nachdem ich bei ihnen revidiert hatte, in der Nähe wohnende Berufskollegen durch Fernsprecher darauf aufmerksam gemacht haben. In solchen Fällen ist es ratsam, diesen Stadtteil für einige Zeit zu verlassen.

Die Polizeireviere haben f. Zt. Listen anfertigen müssen, in denen alle zu revidierenden Geschäfte aufgeführt sind. Diese Verzeichnisse werden dauernd durch Veränderungsanzeigen auf dem Laufenden gehalten. Hiernach habe ich mir ein Sonderheft hergestellt, das hinter jedem Namen eine Anzahl von Kästen enthält. In diese werden die Tage, an denen eine Revision vorgenommen worden ist, eingetragen, so daß ich stets übersehen kann, wann ich in jedem Geschäft gewesen bin. Hierdurch wird gewährleistet, daß alle Handlungen, auch die in den oft schwer erreichbaren und winkeligen Vororten, fortlaufend kontrolliert werden. Für die Beanstandungen führe ich eine besonderes Buch, in das Tag für Tag die schnell an Ort und Stelle gemachten Notizen eingetragen werden. Von den dem Polizeipräsidenten erstatteten Meldungen bleibt ein Durchschlag in meiner Hand.

Man beginne mit den Kontrollen, von Sonderfällen abgesehen, grundsätzlich niemals früher als 20 Minuten nach der ortsüblichen Ladenöffnungszeit. Bei der Eröffnung soll eigentlich der Inhaber sich bereits von der Verkaufsfähigkeit seiner Waren überzeugt haben, es wird ihm aber aus Billigkeitsgründen 15 Minuten Sonderzeit eingeräumt werden müssen. Beginnt man auf die Minute pünktlich und findet Beanstandenswertes, so kann ein gewiegter Verteidiger auf Grund der Behauptung: „Der Inhaber war ja gerade noch beim Prüfen der Waren und hätte selbstverständlich das Beschlagnahme aus dem Verkehr genommen, wenn er schon bis zu dieser Ware gekommen wäre,“ in einem gerichtlichen Verfahren die Freisprechung durchsetzen. Ist man aber in der Lage, den bereits an diesem Tage vorgenommenen Verkauf solcher Waren nachzuweisen, dann braucht diese Frist natürlich nicht innegehalten zu werden. Die Erfahrung lehrt aber, daß sich freiwillig und auf Befragen so leicht niemand meldet, der in Geschäften gekauft hat, die, wie ich es hier für notwendig befand, wegen größter Mißstände sofort polizeilich geschlossen wurden.

Vor dem Betreten eines jeden Ladens vergewissere ich mich erst, wer der Inhaber ist, denn nur mit diesem habe ich zu verhandeln, mit anderen Personen nur, wenn sie den Inhaber vertreten. Vielfach kommt es vor, daß Arbeiter, kleine Beamte und Handwerker nebenbei noch ein Lebensmittelgeschäft besitzen, das dann aber auf den Namen der Frau geht. In solchen Fällen hat man mit dem Ehemanne daher an sich nichts zu tun, obwohl dieser sich oft als der Besitzer geriert. An der Außenseite oder am Eingang des Ladens hat in deutlich lesbarer Schrift der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen zu stehen. (§ 15a der Gew.Ord.)

Sind Käufer im Laden, die gerade bedient werden, so warte ich, bis diese abgefertigt sind und benutze die Zeit, um mich bereits unauffällig umzusehen. Dann trete ich an den Inhaber heran, nenne Namen und Stand, zeige meine Legitimation vor und erwähne den Zweck meines Kommens. Ich habe es versucht, so lange zu warten, bis alle anwesenden Käufer den Laden verlassen haben, dies nahm aber zu viel Zeit in Anspruch, außerdem kam oft im letzten Moment wieder ein neuer Kunde. Zudem besteht dabei

die Gefahr, daß man erkannt wird und jemand den Laden verläßt, um in den Betriebsräumen die Anwesenheit des Polizeitierarztes anzuzeigen. Ist der Inhaber nicht im Laden, dann frage man nach ihm; ist er außer Hause, halte man sich an seinen Vertreter. Im Laufe der Zeit lernen die Gewerbetreibenden den Polizeitierarzt kennen, so daß man dann nicht mehr zu warten braucht, sondern vielfach zum sofortigen Beginnen der Revision aufgefordert wird. Es ist jedoch ratsam, sich lieber einmal mehr als einmal zu wenig auszuweisen, namentlich bei als schwierig bekannten Geschäftsleuten, da man sonst leicht spitzen Reden ausgesetzt ist.

Fassen wir nunmehr die hauptsächlichsten Punkte, welche bei den einzelnen Arten der Betriebe zu beachten sind, kurz zusammen! Bei den Revisionen der Fleischerien und Fleischwarenfabriken kann man die Besichtigung des Ladens zuerst erledigen und alsdann die der Herstellungs- und Aufbewahrungsräume folgen lassen oder man macht es umgekehrt. Der Meister bzw. Inhaber ist oft nicht im Laden, sondern im Betriebe. Erfährt man dies, so ist es angezeigt, erst den Meister selbst aufzufuchen. Ein kurzer Umblick im Laden während der Wartezeit oder beim Betreten ist ratsam, damit man ein Entfernen von Waren feststellen kann, wenn man nach Besichtigung der Betriebsräume wieder nach vorn kommt. Dieser Punkt ist besonders beachtlich, wenn man die Revision allein ausführt; hat man einen Beamten bei sich, dann kann dieser evtl. im Laden zurückbleiben.

Die Wurstküche wird auf allgemeine Sauberkeit, Beschaffenheit des Anstriches der Decke und Wände und Ganzheit des Fußbodens, auf Wasserversorgung und Abfluß, Licht, Luft, unganze Fenster Scheiben bzw. im Sommer auf reichliche Verwendung von Gazefenstern geprüft, die Tische auf Reinlichkeit und Ganzheit, die Maschinen genau auf Sauberkeit. Ein Prüfstein sind m. E. die Fleischwolf Scheiben. Sind diese sauber ausgeputzt und ordentlich weggehängt, dann kann man sicher sein, daß der Inhaber auch allgemein auf Ordnung hält. — Es besteht vielfach die Unsitte, über die Mollen, Maschinen usw. alte Lappen und Schürzen zu hängen, Transtiesel zum Trocknen unsachgemäß, nämlich über fleischgefüllten Mollen oder über dem Wurstkessel aufzuhängen. In einer ganzen Reihe von Wurstküchen macht sich der typische Geruch der in verdorbener Wurst bei mikroskopischen Untersuchungen stets in gewaltiger Zahl gefundenen, großen, plumpen Kokken bemerkbar, der dem Geruch alter, muffiger Aufwischlappen vergleichbar ist.

Die in der Wurstküche vorgefundenen Waren aller Art werden auf Verdorbenheit, Sauberkeit, zweckmäßige Lagerung, verbotene Zusätze, evtl. Stempelung usw., geprüft. Die Gewürzbretter verdienen eine genaue Beachtung. Die verschiedenen Hackfälsche und sonstigen mehr oder weniger verbotenen Präparate erkennt man schon an den für die unterschiedlichen Mittel typischen Packungen und Flaschen. Es kann aber auch vorkommen, daß diese Dinge in einfache Töpfe und Flaschen oder solche mit unverfänglichen Aufschriften umgeschüttet worden sind.

Salzkeller, Rauch, Trockenboden und sonstige Nebenräume müssen ebenfalls besichtigt, alle dort vorgefundenen Waren durchgeprüft werden.

Im Laden untersucht man die dort hängenden Stücke nach den gleichen Gesichtspunkten, achtet auch auf Deklaration des auswärtigen Geschlachteteten, besichtigt den Wurstvorrat und prüft an den meist in der Mehrzahl vorhandenen Wurstanfchnitten jede Sorte. Bei der Untersuchung des Hackfleisches ist auf die Einzelheiten der Regierungspolizeiverordnung vom 13. VII. 1926 zu achten, ferner auf Verdorbenheit, Hackfälschzusatz mit und ohne Deklaration (s. Nr. 44, 1926, D. T. W.). In einer ganzen Reihe von Fällen wurde versucht, während der Revision der Wurst-

küche das Mett aus dem Laden zu entfernen und somit der Revision zu entziehen. Aus diesem Grunde empfahl ich, bereits beim Betreten des Ladens einen Rundblick zu tun. Ist das Hackfleisch vom Platze bewegt oder angeblich trotz großen Vorrates in der Zwischenzeit restlos verkauft, so kann man sicher sein, daß irgend etwas nicht in Ordnung ist; meist handelt es sich um Zusatz von Präserve- oder sonstigem Hackfälsch. Verstecktes Mett ist unter allen Umständen herbeizubringen, eine Besichtigung desselben und Probeentnahme führt stets zur Feststellung von unerlaubten Zusätzen. Nach dem Lebensmittelgesetz vom 5. VII. 1927, § 7, ist nunmehr bei Entnahme von Proben erforderlich: Bezahlung der Probe, Empfangsbescheinigung und Zurücklassung einer amtlich verschlossenen oder versiegelten Gegenprobe, auf die nur der Besitzer selbst ausdrücklich verzichten kann. Bei den Revisionen hat man daher neben Notizbuch, Kopierstift und Taschenlampe unbedingt noch Siegellack, Siegel und Faden, evtl. etwas Einwickelmaterial mitzuführen. Für die Empfangsbescheinigungen käme die Verwendung vorgedruckter Formulare in Frage, wie sie die mit dem systematischen Probeankauf beauftragten Beamten der Lebensmittelüberwachung benutzen.

Der Eisschrank und sein Inhalt ist ebenfalls zu besichtigen. Hier findet man oft überaltertes Fleisch, unganze Würste und allerhand Dinge für den Haushalt, die den Fleischwaren ihre spezifischen Gerüche mitteilen können. — Es ist auch vielfach beliebt, unter dem Ladentische alle alten Wurstabchnitte, unganze Würste und sonstige Abfälle zu nicht unerheblichen Haufen aufzustapeln und ihre Beseitigung zu „vergessen“; auch hier findet man oft Dinge, die in einen Fleischerladen nicht hineingehören.

Die Läden sind im allgemeinen gleichfalls auf Sauberkeit, ausreichenden Zutritt von Luft und Licht zu prüfen, auch ist auf die Beschaffenheit der Wände, Decke und des Fußbodens zu achten. Die hinter dem Ladentische entlanglaufenden Lattenroste sind manchmal sehr schadhaft.

Ganz allgemein muß gesagt werden, daß die Gewerbetreibenden auf die Instandhaltung und Ausstattung der Läden meist mehr Gewicht legen, als auf die Beschaffenheit der anderen Räume des Betriebes, weil der Laden von der Straße aus einzusehen ist und vom Publikum selbst betreten wird.

Die Transportfahrzeuge und hierzu gehörigen Planen, Tücher usw. wird man ebenfalls — namentlich im Verdachtsfalle — sich zeigen lassen. Es ist ferner dafür zu sorgen, daß Pferdeeställe und Aborte weit genug von den Betriebsräumen entfernt sind.

Die zu den einzelnen Teilen des Betriebes führenden Treppen sind oft zu beanstanden; sie sind entweder zu steil, zu eng oder zu schwach oder die Stufen sind abgeschliffen. In solchen Fällen empfiehlt sich eine entsprechende Meldung, die an das Gewerbeaufsichtsamt weiterzuleiten wäre.

Für die Revision der Pferdeschlächter gelten dieselben Gesichtspunkte. Vielfach finden sich diese Betriebe in alten Häusern, in denen die Forderungen nach Licht und Luft sich nicht gut durchführen lassen. Beliebt ist in diesen Geschäften das Färben der Wurst und auch des Mettes.

Ebenso wie die großen Wurstfabriken in ihren Filialen zeigen die hiesigen Fischhandlungen eine reichhaltige Auswahl in den Schaufenstern und Läden. Diese Vorräte sind nach denselben Gesichtspunkten zu untersuchen, wie auf Seite 136 dieser Nummer für die auf den Markt gebrachten Fische bereits angegeben. Es kommt hier noch die Prüfung der in Bassins lebend feilgehaltenen Fische, ferner der Krebse, Muscheln usw. hinzu. Auf Sauberkeit aller Räume ist gleichfalls zu achten. Die Revision der Fischmarinadenfabriken umfaßt die Untersuchung der Waren, ihrer Lagerung und Verarbeitung, Besichtigung der Räumlichkeiten und der Transportfahrzeuge.

In den Wild- und Geflügelhandlungen ist namentlich im Sommer im Laden selbst nur wenig vorhanden, fast alle Ware befindet sich in Kühlzellen, Eisschränken usw., die nebst Inhalt zu besichtigen sind.

Die Lebensmittelhandlungen verlangen eine gewisse Gruppierung unter sich. Die großen Delikatessengeschäfte führen Wurstwaren meist von hiesigen renommierten Firmen und außerdem Dauerware aus Braunschweig, Westfalen und Holstein. (Besichtigung der ganzen Würste und der Anschnitte.) Getrennt hiervon finden sich die Fische in Dosen und Büchsen, ferner Lachs ganz und geschnitten, evtl. Kaviar usw. Daneben liegen Gänseleberpasteten meist aus Apolda und von der Firma Fischer-Straßburg (oft ausdrücklich mit dem Deklarationsstreifen: Hergestellt in eigener Fabrik in Kehl). In diesen Geschäften geht die Revision in der Regel rasch von statten, da alles übersichtlich geordnet und getrennt ist. Die Räumlichkeiten sind meist von ausgezeichneter Sauberkeit, gut ventiliert und in Glas, Metall und Fliesen gehalten. — Mehr Zeit erfordern schon die sog. Kaufmannsläden, die sich in der Zahl und Menge der Waren oft nicht genug tun können. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkte: Fleisch und Wurst aufzubewahren und zu verkaufen, ist Sache des Fachmannes. Es gibt aber z. Zt. keine gesetzliche Handhabe, diese Waren den Kaufmannsläden zu entziehen. In den großen Geschäften findet man auch noch alles getrennt, sauber auf Tellern die Anschnitte, an Rechen und Haken die ganzen Würste. Fische sind meist nur in Dosen vorhanden, Heringe allerdings in Form von Rollmöpfen und marinierten Heringen usw. in Schüsseln oder in von den herstellenden Firmen gelieferten Behältern, desgleichen gefärbter Seelachs in Öl. Gelegentlich findet sich aber hier mal ein Huhn, eine Taube oder ein Hase. Neben der Prüfung jeder Art der feilgehaltenen Lebensmittel auf die für sie evtl. in Frage kommenden Mängel ist auf allgemeine Sauberkeit des Ladens, der Beleuchtungskörper und der sonstigen Einrichtung besonders zu achten. Das Feilhalten von Mett ist in Kaufmannsläden im Regierungsbezirk Hannover verboten.

Erhebliche Beanstandungen aller Art sind oft in den sog. Krämer- und Hökerläden zu machen. Allein schon der Laden selbst entspricht vielfach nicht den Grundforderungen der Hygiene. Die Lüftung ist durchaus mangelhaft, selbst am Tage kommt in diese Geschäfte durch das Fenster und die Tür nicht genügend Licht, obendrein sind beide dick mit Reklameschildern aller Art verklebt, so daß man oft den Namen des Inhabers nur mit Mühe finden kann. Alle feilgehaltenen Waren sind eng zusammengelegt und oft unsachgemäß gelagert, denn man findet

hier so ungefähr alles, was im Haushalte nur irgend gebraucht wird, wie z. B. Wurst, Käse, Heringe, Scheuerlappen, Petroleum, Butter, Feuerholz, Schmier- und sonstige Seifen, Pflaumenmus, Margarine, Gemüse, Brötchen, Kartoffeln, Schokolade u. a., und das alles ohne besondere Verpackungen, außerdem natürlich Schübe und Wandschränke mit Gewürzen usw. — Die Revision eines solchen, oft sehr engen Ladens macht mehr Mühe und ist undankbarer als die mehrerer großer Betriebe, zumal man sich auf die Psyche des Inhabers erst einstellen muß. Auf sachgemäße, saubere Lagerung der Waren, gute Beschaffenheit der Wände und Decke, Sauberkeit der Beleuchtungskörper usw. ist ganz besonders zu achten, auch wäre der Zustand der evtl. vorhandenen Waschelegenheit und der Handtücher zu prüfen. Die Kaufmannsläden bedürfen noch besonders deswegen der Aufmerksamkeit, weil vielfach nicht hiesige Schlachter die Lieferanten sind, sondern mehr oder weniger bekannte Landfleischlchter; auch „Land-Hausfleischwurf“ wird oft angepriesen. Immer wieder hört man dann bei der Revision die Redensart: „Das ist alles gut, denn das kommt vom Land!“ was mir gerade zum recht genauen Hinsehen Veranlassung gibt.

In sämtlichen zu revidierenden Betrieben ist nebenbei auf die Verwendung unbedruckten Papiers zum Einwickeln der Waren und auf das Fernhalten von Hunden zu achten. Bemerkt man Verstöße, die nicht in das Gebiet des Polizeitierarztes fallen, so wären diese der Lebensmittelüberwachung mitzuteilen.

Aus Vorstehendem geht hervor, daß die Lebensmittelkontrolle ein sehr vielseitiges Gebiet umfaßt, das sehr interessant ist und Spezialkenntnisse erfordert. Der Umgang mit den Gewerbetreibenden ist aber nicht leicht, man setzt sich oft Unannehmlichkeiten aller Art (spitze Reden bis zur Bedrohung) aus, namentlich wenn man zu scharfem Durgreifen Veranlassung findet. Für den Polizeitierarzt ist es von der größten Bedeutung, allen Gewerbetreibenden durchaus unabhängig gegenüberstehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß man bei kleineren Beanstandungen, namentlich Verstößen gegen die allgemeine Sauberkeit durch Aufklärung, Belehrung und Verwarnung schon viel erreichen kann. Nutzt dies aber nichts, dann ist unweigerlich eine Meldung über die trotzdem nicht abgestellten Mängel am Platze, sowie eine wiederholte Revision des Betriebes, zu der man sich dann zweckmäßig einen Beamten des Reviers mitnimmt.

Hat die Händlerchaft erst gesehen, daß man in seinem Fache Bescheid weiß und so leicht nichts durchgehen läßt, dann setzt sie alles daran, den begründeten Ansprüchen gerecht zu werden.

Immunität mittels Antidiphtherin.

(Erwiderung auf den Artikel von Dr. Sachweh, Münster, D. T. W. 1928, S. 74.)

Von Prof. Dr. de Blicq, Utrecht.

In dem Berichte über die Fachtierärztetagung zur Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten in Jena vom 1. bis 4. Oktober 1927 fand ich eine Mitteilung von Dr. Sachweh,* in der er über seine Erfahrungen betreffend „experimentelle Studien mit Antidiphtherin“ berichtet. In dieser Mitteilung sagt er, er habe eine typische Hautreaktion erzielt, welche immer lokal bleibt, während bei intravenöser, intramuskulärer oder intraperitonealer Impfung wenig positives zu sehen ist.

Dies stimmt teilweise mit unseren Befunden im Laboratorium sowie in der Praxis überein: die vielen (schon einige Millionen) präventiv geimpften Tiere zeigten niemals eine Generalisation. Auch andere Untersucher sind zu

diesem Resultat gekommen, nur Doyle (England) nicht. Dieser Forscher hatte ohne Zweifel unter seinen Versuchstieren einige schon infizierte Hühner, die dann nach der Impfung erkrankten. Die Schlußfolgerung von Sachweh, daß die lokale Beschränkung der Reaktion nicht zu einer allgemeinen Immunität führen könne, vermag ich aber nicht zu bestätigen. Man sieht ja bei verschiedenen kutanen Immunisationen (z. B. bei der Kuhpockenimpfung des Menschen) ungeachtet der rein lokalen Reaktion dennoch eine allgemeine Immunität auftreten. So ist es auch bei der Antidiphtherinimpfung. Die nach der Impfung sich einstellende Immunität schützt nach unseren Erfahrungen und denen anderer Untersucher gegen eine natürliche und experimentelle Infektion. Sachweh kommt aber zu einem entgegengesetzten Schluß. Aus seiner kurzen Anweisung ist nicht zu ersehen, wie er seine Experimente an-

* Dr. Sachweh behält sich vor, später auf die Ausführungen zurückzukommen. Die Schriftl.

gestellt hat. Unsere Erfahrung basiert auf vielen Serien experimenteller Infektionen bei mit Antidiphtherin immunisierten Hühnern, lehrt uns, daß es möglich ist mit zu starken Infektionen (z. B. intravenöse oder Hautinfektion mit sehr virulentem Material) die Immunität zu durchbrechen. Man sieht aber in diesem Falle immer bedeutende Unterschiede im Verlauf der Krankheit den Kontrolltieren gegenüber; die Generalisation geht nicht so weit.

Bei der experimentellen Infektion ist eine richtige Dosierung fast unmöglich. Es ist uns aber öfters gelungen, den Kontrolltieren gegenüber ein vollständiges Bild der Immunität zu beobachten, wobei nach der Infektion bei ± 50 Prozent der immunisierten Tiere jede lokale Reaktion sogar völlig fehlte, während bei den anderen Tieren sich keine Generalisation einstellte und der lokale Prozeß sehr schnell zur Abheilung gelangte.

Die Resultate der Immunisation bei spontanen Infektionen sind viel deutlicher und fast immer positiv. Unsere Experimente sowie die Praxis lassen deutlich die Tatsache erkennen, daß Antidiphtherin gegen die spontane Pocken- und Diphtheriekrankheit einen fast absoluten Schutz bringt. Öfters läßt uns die Praxis sehen, wie in einem Hühnerbestand eine Anzahl Tiere, welche besonderer Umstände wegen nicht geimpft sind, erkranken, während die geimpften Tiere, welche doch in sehr innigem Kontakt mit den kranken Hühnern sind, nicht krank werden.

Genau daselbe gilt auch für geimpfte Bestände in einer Gegend, wenn in den Nachbarbeständen Hühnerpocken auftreten, weil die Tiere nicht geimpft worden sind.

Das Ausbleiben der Diphtherie und Pocken nach jährlicher Impfung in tausenden Beständen seit drei und vier Jahren in Holland, Belgien, Deutschland und anderen Län-

dern, wo früher, bevor die Impfung eingeführt war, jeden Winter die Krankheit auftrat, beweist zweifelsohne den großen immunisierenden Wert der Antidiphtherinimpfung für die spontane Infektion.

Wir haben auch beobachtet, daß eine latente Infektion nach Antidiphtherinimpfung aktiv werden kann. Das ist aber selbstverständlich; eine latente Variola beim Menschen kann ja auch von der Vakzination in ungünstigem Sinne beeinflusst werden.

Sachweh erzielte eine größere Immunität nach intravenöser und intraperitonealer Impfung. Wir haben diese Methode nie angewandt, weil sie sich weniger für die Praxis eignet. Wir haben aber eine subkutane Applikation versucht; es zeigte sich aber, daß dabei eine geringere Immunität auftritt als nach kutaner Impfung. Das war auch zu erwarten, denn auch alle Experimente mit Kuhpockenvakzin weisen darauf hin, daß die kutane Applikation besser immunisiert als die subkutane Vakzination.

Sachweh sagt weiter, daß, obgleich er bei seinen Experimenten keine absolute Immunität erhalten hat, er doch die Antidiphtherinschutzimpfung nicht ablehnt, in Ermangelung einer besseren Methode. Ich vertrete aber die Ansicht, daß es sehr schwierig sein wird, eine bessere Methode der Immunisierung zu finden. Die schönsten Erfahrungen haben wir in unserem eigenen Lande, wo wir die Resultate jeden Tag wahrnehmen können. Seit drei Jahren impfen ungefähr die gesamten Tierärzte; es wurde in den Sommermonaten 1925 bis 1927 ± 2 Millionen von Hühnern präventiv geimpft und diese blieben frei von der Diphtheriekrankheit.

Die Mitteilungen über Fehlgehen einer präventiven Antidiphtherinimpfung sind eigentlich gleich null; die Resultate der Antidiphtherinschutzimpfung sind also fast 100 prozentig.

Innere Medizin und Chirurgie.

Slawoff, G.: Versuche mit Magnesiumsalzen zur Tötung von Hunden. (In.-Dissert. Berlin 1927.)

Obwohl die orientierenden Vorversuche mit Magnesiumsulfat auch zum Erfolge führten, so stellte sich doch heraus, daß dem Magnesiumchlorid und Magnesiumnitrat der Vorzug vor dem Magnesiumsulfat zu geben ist. Magnesiumsulfat ist schwerer löslich, daher muß eine größere Menge gegeben werden, es ist nur in warmer Lösung (Auskristallisieren) anwendbar, Wirkung tritt später ein als bei Mgchlorid und Mgnitrat. Nach Jakob bleibt die Wirkung bei 28 Prozent der Tiere aus. Die Wirkungen des Mgnitrat und Mgchlorid sind gleiche und es ist ziemlich gleichgültig, welches von beiden man nimmt. Die intrakardiale Applikationsmethode ist wegen ihrer prompten, zuverlässigen und schmerzlosen Wirkung gegenüber der intrathorakalen vorzuziehen (bei letzterer: Reizung der Nervenendigungen und Schmerzhaftigkeit). Aus den Versuchen ist zu ersehen, daß mit geringen Mengen Flüssigkeit selbst große Hunde in 1—15 Sekunden zu töten sind, es genügen 10 ccm, während Jakob von Magnesiumsulfat für einen Hund von 20 kg Gewicht 25 Gramm in 20 bis 25 Gramm warmen Wassers gelöst empfiehlt. Der Preis ist äußerst gering, die Kosten betragen nur 0,7—1,2 Pfg. Verfasser glaubt den Beweis erbracht zu haben, daß die Methode der Tötung von Hunden mit Magnesiumnitrat und Magnesiumchlorid bei intrakardialer Applikation den zu stellenden Anforderungen entspricht. Sie ist für den ausführenden Tierarzt selbstverständlich ganz ungefährlich und bequem ausführbar. Es dürfte der Methode nach dem Dafürhalten Slawoffs beschieden sein, die Blausäureanwendung aus ihrer jetzt noch führenden Stellung zu verdrängen. Die von Jakob angeregte Tötung von Hunden

mit Mgsalzen verdient daher weitgehendere Berücksichtigung.

Rudolf: Desoform, ein billiges Wundstreupulver. (W. t. Mskr. 1927, XIV. Jahrg., S. 326.)

Desoform ist ein Wundstreupulver, bestehend aus pulverförmiger Kalkverbindung mit schwachem, jodoformähnlichen Geruch. Nach den Untersuchungen vom Verfasser stellt es ein vollwertiges Wundstreupulver dar, das gegenüber anderen Präparaten den großen Vorteil der Billigkeit besitzt. Seine Verwendung zur offenen Wundbehandlung kann nur empfohlen werden.

Mertz: Die richtige Anwendung der Magenfonden beim Pferd. (T. R. 1927, S. 170.)

Verf. beschreibt unter Beigabe einer Abbildung einen Schutzapparat, durch den die Einführung der Krüger'schen Sonde durch das Maul leicht und sicher gelingt. Das von der Firma Hauptner hergestellte Schutzinstrument wird, wie eine Trense, mit dem Rohr nach dem Schlund gerichtet, eingelegt. — Im Anschluß daran spricht sich Verf. gegen die Injektionstherapie bei Kolik aus und empfiehlt orale, rektale und perkutane Behandlung. Als gutes Abführmittel bewährte sich ihm Bäckerhefe, 1 Pfund in Wasser gelöst.

Pertev, H.: Die Blutplättchen beim gesunden und kranken Pferd, Hund und Schwein. (Aus der medizinisch-forensischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin. — Direktor: Geh. Reg.-Rat Dr. E. Fröhner.) (Arch. für wiss. Tierheilkunde, 1926, 55, S. 222.)

Die Blutplättchen, das 3. Formelement des Blutes, werden am besten nach der Methode Fonio (im Original angegeben) untersucht. Zum Studium ihrer morphologischen Eigenschaften ist die panoptische Färbung nach Pappenheim zu empfehlen. Die Blutplättchen des Pferdes sind meist rundliche, ovale, auch stabchenförmige Gebilde von $\frac{1}{4}$ bis

$\frac{1}{2}$ Größe eines roten Blutkörperchens, im Mittel 2—3 μ , hellrotviolett. Die Zahl der Blutplättchen beim gefundenen Pferd beträgt durchschnittlich relativ 51, absolut 350 000 in 1 ccm. Die Zahl der Blutplättchen beim kranken Pferd war erhöht bei: Druse, Bronchialkatarrh, Lungenentzündung, Pleuritis, Darmparasiten, Hämoglobinämie, Melanosarkomatose; vermindert bei infektiöser Anämie, infektiöser Bronchitis, Brustflechte, Pharyngitis und Darmentzündung. Bei zwei Pferden mit Petechialfieber bestand Thrombopenie. Durch Adrenalininjektion konnte die Zahl der Blutplättchen gesteigert werden. Der gefundene Hund hat im Mittel relativ 60, absolut 430 000 Blutplättchen in 1 ccm. In je einem Fall von Tuberkulose und Sarkomatose war ihre Zahl erhöht. Beim Schwein konnten als Durchschnittszahlen der Blutplättchen relativ 51, absolut 400 000 in 1 ccm gefunden werden. Geiger.

Überreiter, O.: **Perforierende Bauchwunden beim Hund; kasuistischer Beitrag.** (W. t. Mschr. 1927, XIV. Jahrg., S. 193.)

Verf. beschreibt sechs Fälle von Bauchverletzungen bei Hunden. Sie zeigen, daß Hunde gegen solche widerstandsfähig sind. Bauchfellentzündungen werden von ihnen verhältnismäßig gut ertragen. Verätzte Rassehunde sind empfindlicher. Berge.

Andres, J.: **Kryptorchismus beim Hunde.** (Schweiz. Arch. f. Tierheilkde. 1926, Bd. 68, S. 445.)

Verf. unterzieht die Literatur über Vorkommen, Ätiologie und Anatomie, Histologie, Sterilität einer kritischen Beprehung und beschreibt die makroskopischen Befunde bei einem Fall von rechtzeitigem Abdominalkryptorchismus eines achtjährigen Pudels. Es wird auf das Original verwiesen. H. Graf.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Nevinny, H.: **Über die Veränderungen der Skelettmuskulatur bei Trichinose.** (Aus dem Pathologisch-anatomischen Institut der Universität Innsbruck.) (Virchows Archiv 1927, 266. Bd., S. 185.)

Die Ergebnisse der umfangreichen Untersuchungen sind folgende:

1. Zum Studium der Veränderungen in der Skelettmuskulatur bei Trichinose stand uns das Material von 5 menschlichen und 18 experimentell erzeugten tierischen Trichinosefällen zur Verfügung. Bei den Versuchstieren gelang es fast immer leicht, Muskeltrichinose zu erzeugen; nur Igel und Ratten erlagen meist schon der Darmtrichinose in den ersten Tagen. Durch die Trichinose wurden in keinem der menschlichen Fälle und unter den tierischen Fällen nur zweimal grob-anatomisch erkennbare Veränderungen der Muskulatur hervorgerufen.

2. In einem der menschlichen Fälle zeigte sich das Zwerchfell bedeutend geringer von Parasiten besiedelt als andere Muskeln. Eine Erklärung dafür steht aus.

3. An den Trichinellen ließ sich der Glykogennachweis leicht erbringen, während sich die Muskulatur in der Umgebung der Würmer verarmt an Glykogen zeigte.

4. Die kontraktile Substanz zeigte feinatomisch besonders basophil-körnige Entartung des Fasernhaltes; daneben trat oft wachsartige Degeneration, hydropische Entartung und einfache Atrophie ein.

5. Die Fehlmetamorphose der Muskulatur stand bei unseren Versuchstieren im Hintergrund, war aber in drei menschlichen Fällen deutlich zu erkennen; davon sind manchmal trichinellenhaltige und trichinellenfreie Fasern gleichzeitig stark ergriffen.

6. Bei der Abkapselung der Trichinellen haben wir zwei Stadien zu unterscheiden. Zuerst kommt es zur sog. „basophilen Hofbildung“, wobei die eingerollte Trichinelle von einem wesentlich aus dem basophil-körnig entarteten In-

halt der Primitivfaser stammenden Mantel umschieden wird. Das chronische Stadium der Trichinose wird durch die Bildung der „hyalinen Dauerkapsel“ eingeleitet; sie ist wohl das Ergebnis einer Antigen-Antikörperreaktion im Sinne L ö s c h k e s zu erklären.

7. Von den als Riefenzellen bezeichneten Bildungen sind allein diejenigen wichtig und ihrem Wesen nach als Riefenzellen anzuerkennen, die um absterbende und der Resorption geweihte Trichinellen gefunden werden; wir fassen sie als Fremdkörperriefenzellen mesenchymaler, nicht aber muskulärer Abkunft auf.

8. Die Zellen der perivaskulären Mesenchymhöhlen des jugendlichen Granulationsgewebes an den Kapselpolen beginnen bald sich mit Fettröpfchen zu füllen und sich so in Fettläppchen-Primitivorgane umzuwandeln.

9. Die klinisch erkennbare geringere oder stärkere Schmerzhaftigkeit der Muskeln bei Muskeltrichinose dürfte ihren morphologischen Ausdruck in geringerer oder stärkerer myotischer Exsudatbildung und Zellinfiltration finden. Wir sehen bei der mit starker Schmerzhaftigkeit und Starre der Muskulatur verbundenen Muskeltrichinose des Menschen durchwegs eine sehr starke entzündliche Infiltration, die das gleiche Bild beim Versuchstier dem Grade nach übertrifft.

10. Trichinellen, um die es nicht zur basophilen Hofbildung oder zur Dauerkapselbildung kam, fallen sehr bald dem Untergang anheim, dabei spielen mäßige Herde von farblosen Blut- und Gewebszellen eine Rolle. Schlechte Färbbarkeit und schließlich scholliger Zerfall dieser Trichinellen sind im feinatomischen Bilde ein deutlich erkennbares Zeichen des Untergangs.

11. Zugrunde gehende Trichinellen sind in Fällen menschlicher Trichinose außerordentlich häufig zu beobachten. Durch diese gegenüber den Versuchstieren beim Menschen ungleich häufigere zellige Trichinellenvernichtung kommt es auch zu stärkerem Freiwerden von Trichinellen- und Trichinosestoffen, die die beim Menschen schwereren Erscheinungen der Trichinose als Allgemeinerkrankung bedingen.

12. Die mitgeteilten Befunde deuten darauf hin, daß der Mensch bedeutend heftiger gegenüber den Trichinellen reagiert als das Meerschweinchen und das Kaninchen, während Ratte und Igel schon der akuten Darmtrichinose äußerst leicht zu erliegen scheinen. Carl.

Fischer, H.: **Die multiplen Blutungen beim Schweine.** (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene, 38. Bd., S. 98—102.)

In seiner Studie über das Auftreten der multiplen Blutungen beim Schweine weist Fischer darauf hin, daß diese Blutungen zum ersten Mal von v. Ostertag im Jahre 1890 beschrieben und auf fibrilläre Muskelzerreißen zurückgeführt worden sind, und daß kein Grund vorliege, die Anschauung v. Ostertag's zu verlassen, nach der als auslösendes Moment für die genannten Blutungen eine außergewöhnliche Anstrengung der Schweine in Betracht kommt. Allerdings hält es F. nicht für unbedingt notwendig, daß durch Überanstrengung Muskelfasern zerreißen müssen; der durch die Überanstrengung bedingte höhere Blutdruck kann wohl eine Berstung der kleinen Blutgefäße herbeiführen, zumal die Blutungen nicht ausschließlich intramuskulär auftreten. Auch eine Diapedese wäre auf diese Weise zu erklären. In beiden Fällen scheint indessen eine Disposition unerlässlich, die mit einer spezifischen Schädigung der Blutgefäße zu erklären ist. Die Vorwürfe, die den neuzeitlichen Betäubungsapparaten in Bezug auf die Veranlassung der genannten Blutungen gemacht worden sind, hält F. für unberechtigt. Ein Literaturverzeichnis von 10 Nummern ist der Arbeit angefügt. Edelmann.

Roots, E.: **Über die Abtötung von Askarideneiern in Pferdeäzern.** (Aus der Lehrkanzel für Bakteriologie und Hygiene der Tierärztlichen Hochschule in Wien. — Vorstand: Professor Dr. J. Schnürer.) (Zeitschr. f. Infekt.-Krankh. 1927, 32, S. 1.) Die Desinfektionsfrage ist bezüglich jener

Krankheiten, deren Erreger bakterieller Natur sind, bis zum heutigen Tage mehr oder weniger zufriedenstellend gelöst. Anders verhält es sich mit den tierisch-parasitären Krankheiten. Beschützt von äußerst resistenten Hüllen, ist die Widerstandsfähigkeit der Parasiten-eier außergewöhnlich groß. Zu den widerstandsfähigsten gehören die Askarideneier. Da sie eine starke, dreischichtige Hülle besitzen, erhalten insbesondere die Eier mit wurmförmigem Embryo eine ausgezeichnete Widerstandskraft gegen Austrocknung, direktes Sonnenlicht, Fäulnis und sonst ungünstige Witterungseinflüsse und können unter solchen Verhältnissen noch mehrere Jahre ihre Lebensfähigkeit bewahren. Die Askarideneier besitzen eine große Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Desinfektionsmitteln; nur Karbol- und Kresolverbindungen können leichter und schneller als andere Chemikalien durch die Eihülle eindringen und das Ei abtöten. Jedoch steht ihrer praktischen Verwendung der hohe Preis im Wege. Temperaturen über 50 Grad C töten die Eier in kurzer Zeit. Zur Erreichung dieser Temperatur kann die beim Löfchen des Kalkes entstehende Wärme verwendet werden. Bei guter Abdichtung des Düngers und entsprechendem Wassergehalt genügt hierzu das Vermischen der frischen Fäzes mit rund 15 Prozent (bei Sommertemperatur) in erbsengroße Stücke zerfallenen ungelöschten Kalkes. Die Desinfektion des nackten Stallbodens, der Stallwände und fämtlicher Gegenstände geschieht durch mehrmaliges Waschen mit kochendem Wasser. Zur Bekämpfung der Askariasis müssen die medikamentelle Behandlung und Desinfektion Hand in Hand gehen. Entsprechend dem eigenartigen Entwicklungsgange und der Biologie der Askariden ist es notwendig, daß die Desinfektion des Kotes mit der ersten Wurmkur angefangen, bis 9 Tage nach der zweiten (diese wird 3 Wochen nach der ersten vorgenommen) täglich fortgesetzt wird. Das Abwaschen des Stallbodens, der Wände und Stallgeräte mit siedendem Wasser wird während der Dauer der Desinfektion jede Woche einmal vorgenommen. Die Materialkosten des Verfahrens sind verhältnismäßig gering. Allerdings sind hierbei noch die Arbeitskosten und die Erzeugung des heißen Wassers sowie die Herabsetzung des Düngerwertes infolge Vermischens mit 15 % Kalk in Betracht zu ziehen. Es dürfte sich daher dieses Verfahren nur in wertvollen Pferdebeständen (z. B. in Gestüten) und bei gefährdender Askariasis wirtschaftlich gestalten. Ziegler.

Peter: Eine wirksame Methode zur Bekämpfung der Dasselfliegenplage. (B. T. W. 1927, S. 769.)

Verf. hat schon früher die Beobachtung veröffentlicht, daß das reine Phenol ein Spezifikum zur Abtötung der Dasselfliegenlarve darstellte. Auf dieser Grundlage wird von der Bazillolfabrik Dr. Bode & Co. in Hamburg unter der Bezeichnung „Larvifug“ eine Salbe hergestellt, die nach den in vorliegender Arbeit bekanntgegebenen umfangreichen Versuchen als ein sehr brauchbares Mittel im Kampfe gegen die Östrus-Larve betrachtet werden muß. Es ergab sich dabei, daß Larvifug die Parasiten in jedem Entwicklungsstadium durch spezifische Giftwirkung auf den Larvenleib innerhalb der Beulen mit Sicherheit tötet. Die absterbende oder tote Larve nimmt eine derartig schlaffe oder welke Konsistenz an, daß sie ohne jedes Hilfsmittel mit den Fingern aus der Beule leicht ausgedrückt werden kann. Dieses Verfahren (Abdasseln) wird noch besonders dadurch erleichtert, daß die Komponenten der Salbe die Hautöffnung nachgiebig und geschmeidig machen. An den kleinen frischen Beulen wird sie häufig so stark erweitert, daß die junge, noch mädenartige Larve allein durch den Druck der Einreibung an die Oberfläche befördert wird. Es empfiehlt sich in Abständen von je drei Tagen je eine Einreibung zu machen. Wenn die zweite und dritte Einreibung bei entdasselten Beulen auch nicht mehr erforderlich sind, so wird doch die Larvifugsalbe

insbesondere die Rückbildung und Heilung der größeren eiternden Beulen zum Vorteil für das Allgemeinbefinden und das Wachstum des infizierten Rindes beschleunigen. Je früher die Behandlung der Beulen beginnt, desto geringer wird der durch die Parasiten verursachte Schaden sein. Larvifug hat für die behandelten Rinder nicht die geringsten Nachteile und kann nach der Gebrauchsanweisung von jedermann, der sich die Mühe gibt, sie aufmerksam durchzulesen, mit bestem Erfolge angewendet werden. Carl.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Krecke, A.: Wann ist bei offenen Verletzungen die prophylaktische Einspritzung von Tetanusserum notwendig? (M. m. W. 1927, S. 1377.)

Auf Grund seiner Erfahrungen im Weltkrieg und den Angaben in der Literatur gelangt Verf. bei Beantwortung der gestellten Frage zu folgenden Leitsätzen:

1. Bei der Häufigkeit der Tetanusbazillen im Erdboden ist bei jeder Wunde, die mit Erde oder Straßenschmutz mittel- oder unmittelbar in Berührung gekommen ist, die Infektion mit Tetanus möglich.
2. Die vorbeugende Tetanusserumeinspritzung vermag mit größter Wahrscheinlichkeit den Ausbruch des Tetanus zu verhüten.
3. Die Unterlassung der vorbeugenden Tetanusserumeinspritzung kann dem Arzte zum mindesten die Anklage wegen Fahrlässigkeit zuziehen.
4. Jedem Kollegen ist in seinem eigenen Belange aufs dringendste zu raten, bei jeder verdächtigen Wunde neben der entsprechenden Wundversorgung (Ausfäulung) eine vorbeugende Tetanusserumeinspritzung vorzunehmen.
5. Jeder Praktiker soll sich stets zwei Fläschchen Tetanusantitoxin mit 20 J.-Einheiten vorrätig halten. Carl.

Ernst, W., F. Guth und M. Hopfengärtner: Gibt es verschiedene Typen von Maul- und Klauenfeuchterregern ohne wechselseitige Immunität? (M. T. W. 1927, S. 433.)

Durch Nachprüfung des immunisatorischen Verhaltens von sechs Virusstämmen gänzlich verschiedener Herkunft kommen die Verfasser zu dem Schluß, daß man nicht von verschiedenen Typen sprechen kann. Die sechs Stämme beeinflussten sich gegenseitig stark, wie aus den zahlreichen Immunisierungsversuchen hervorgeht. Auf Grund der Erfahrungen, die durch weitere Arbeiten ergänzt werden sollen, glaubt man, es mit Varietäten ein und desselben Maul- und Klauenfeuchtevirus zu tun zu haben. Schoop.

Karmann, P.: Kultur- und Immunisierungsversuche bei Raufschbrand. (Aus der Veterinärabteilung des Reichsgesundheitsamtes.) (Zeitschr. f. Infekt.-Krankh. d. Haust. 1927, 31, S. 228.)

Karmann hat die von den französischen Forschern Leclainche und Vallée behauptete Schutzwirkung von Formalinvakzine gegen Raufschbrand an Meerfischweinen nachgeprüft. Dabei hat er gleichzeitig verschiedene bakteriologisch-technische Feststellungen gemacht, über die er ebenfalls berichtet. Seine Ergebnisse sind folgende: Die von Ruppert und Rotgardt angegebene Tarozzimilch hat sich zur Untersuchung von Raufschbrand und Ödembazillen als geeignet erwiesen. Als Abdichtungsmittel des Maassenschen Apparates hat sich bei seinen Versuchen das sog. Vakuumhahnfett am besten bewährt. Weiter wird ein Verfahren (Rollschale und große Öfe von Chromnickeldraht) angegeben, um Blutplatten in rascher und bequemer Weise mit Untersuchungsmaterial zu beschicken. Die von Leclainche und Vallée angegebene Formalin-Vakzine für Raufschbrand-Schutzimpfungen hat bei Meerfischweinen eine hohe immunisierende Kraft entfaltet. Es erscheint angezeigt, diese Schutzimpfung auch bei Schafen und Rindern zu versuchen. Die von den französischen Autoren zur Herstellung der Vak-

zine vorgeschlagene Formalinmenge 2—4 : 1000 hat sich jedoch bei den Versuchen des Verfassers als nicht hinreichend erwiesen, weshalb er empfiehlt, den Formalinzusatz auf 6 : 1000 zu erhöhen. Ziegler.

Lange, B., E. Jochimsen und J. Magat: **Tuberkulose-Immunisierungsversuche an Kaninchen.** Schutzimpfung mit abgetöteten Tuberkelbazillen. Prophylaktische und therapeutische Behandlung mit dem Impfstoff Schroeder und mit Helpin. (Aus der Seuchenabteilung des Institutes „Robert Koch“. — Leiter: Prof. B. Lange.) (Zeitschr. für Hyg. 1927, 107, S. 645.)

Frühere Versuche haben ergeben, daß Meerfischweinchchen durch Vorbehandlung mit abgetöteten Tuberkelbazillen auf parenteralem Wege gegen die Tuberkuloseinfektion mit kleinsten Bazillenmengen eine gewisse, wenn auch sehr beschränkte Resistenzhöhung gewinnen. Da sich schon bei dem sehr empfänglichen Meerfischweinchchen derartige Schutzwirkungen nachweisen ließen, konnte erwartet werden, daß sie in Experimenten an Kaninchen bei geeigneter Versuchsanordnung stärker hervortreten würden. Aus diesem Grunde haben die Verfasser mehrere Immunisierungsversuche an Kaninchen angestellt. Mit diesen Versuchen wurden verbunden solche mit dem Impfstoff Schroeder und andererseits mit Helpin, einer Glycerinemulsion von Lecithin, also einem unspezifischen Impfstoff. Der von Schroeder hergestellte Impfstoff besteht aus einer Aufschwemmung von Tuberkelbazillen in einem Extrakt aus normaler Kälbermilz bzw. Thymus. Durch Vorbehandlung von Kaninchen mit abgetöteten Tuberkelbazillen, durch prophylaktische und therapeutische Behandlung mit dem Impfstoff Schroeder, aber auch mit Helpin ist es gelungen, den Verlauf der experimentellen Kaninchentuberkulose abzuschwächen; es war dagegen niemals möglich, die Infektion ganz zu verhindern. Die bei den Kaninchen erzielte Resistenzsteigerung war nur nachweisbar gegenüber intravenöser Infektion mit abgezwächten virulenten Tuberkelbazillen; die Resistenzsteigerung war ihrem Grade nach meist gering und immer nur bei einem Teil der Tiere vorhanden. Die stärkste Wirkung wurde durch größere Dosen eines im Institut aus abgetöteten Tuberkelbazillen hergestellten Impfstoffes erzielt, und zwar hatte die subkutane und intrakutane Vorbehandlung etwas besseren Erfolg als die intravenöse. Die Erfolge mit Helpin zeigen, daß, ähnlich wie beim Meerfischweinchchen, sich eine gewisse Resistenzsteigerung gegen die Tuberkulose auf unspezifischem Wege erreichen läßt. Eine abschließende Bewertung der von den Verfassern an Meerfischweinchchen und Kaninchen angestellten Immunisierungsversuche kann erst aus weiteren ergänzenden Untersuchungen gewonnen werden. Diese müssen im besonderen auch die Nachprüfung der Calmette'schen Methode der Schutzimpfung mit avirulenten Tuberkelbazillen zum Gegenstand haben. Ziegler.

Jakhuis, B.: **La préimmunisation des nouveau-nés par le BCG.** (Documents de la commission ukrainienne.) (Annales de l'institut Pasteur 1927, T. XLI, S. 1045.)

Die stomachale Immunisierung der Neugeborenen mit BCG-Impfstoff, wie er der ukrainischen Kommission zur Verfügung gestellt wurde, übt keinerlei schädlichen Einfluß auf den Gesundheitszustand, die Temperatur und den Digestionstraktus aus. Während einer Beobachtungsdauer von 19 Monaten wurden keine schädlichen Einwirkungen auf die Entwicklung der Kinder oder auf die Widerstandsfähigkeit gegen andere exo- bzw. endogene Infektionskrankheiten festgestellt. Die Calmette'sche Methode der Immunisierung der Neugeborenen kann somit als eine völlig unschädliche Maßnahme angesehen werden. Bei immunisierten Kindern, die anscheinend nicht mit Tuberkulose in Berührung gekommen sind, trifft man ziemlich häufig positive intradermale Tuberkulinreaktionen von mittlerer Stärke an, während man bei solchen Kindern, die in tuberkulöser Umgebung leben, recht häufig stark positive Reaktionen begegnet. Es scheint demnach, daß sich diese Kinder schon im frühesten Kindesalter mit virulenten Tuberkelbazillen infizieren. Unter Berücksichtigung der auf die Immunisierung mit BCG-Bakterien zurückzuführenden Allergie, der normalen Entwicklung der Kinder, der Wahrscheinlichkeit der frühzeitigen Infektion der Kinder tuberkulöser Familien mit virulenten Tuberkelbazillen sowie ferner der geringen Sterblichkeitsziffer unter diesen letztgenannten Kindern, glaubt Verfasser die Ergebnisse seiner Beobachtungen als recht günstig ansehen zu müssen. Um jedoch ein endgültiges Urteil fällen zu können hält Verfasser es für notwendig, daß möglichst umfassende und methodisch gleichgerichtete Beobachtungen über die Entwicklung, die Morbidität und Mortalität von nicht-geimpften und in tuberkulöser Umgebung lebenden Kindern angestellt werden. Baars.

Agliany, M.: **Deux cas consécutifs de tétanos grave guéris par la promenade forcée, sans aucun traitement médical.** (Revue vétérinaire et journal de médecine vétérinaire T. LXXIX 1927, S. 441.)

Verf. beschreibt zwei Fälle von Tetanus bei Pferden, die ohne medikamentöse Behandlung allein durch mäßige Bewegung im Freien (morgens und abends 20 Minuten lang führen) geheilt sein sollen. Baars.

Nahrungsmittelhygiene.

Seel, E.: **Über die Verwendbarkeit des Trichinoskopes.** (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene, Bd. 38, S. 116/117.)

Nach Anstellung umfangreicher Untersuchungen macht Seel darauf aufmerksam, daß das Trichinoskop außer für die Trichinenschau auch zur Untersuchung von Proben verschiedener Nahrungs- und Genußmittel, die bei der Geschäfts- und Marktkontrolle entnommen werden, verwendet werden kann. Zum Beispiel gelang es, nach einiger Einarbeitung leicht, die verschiedenen Wurstsorten auf erlaubte und unerlaubte Bestandteile (einschl. Schmutz) zu prüfen, die Ab- oder Anwesenheit von Leber in Leberwürsten zu ermitteln und auch deren Gehalt an Leber ziemlich genau quantitativ festzustellen. Auch zur Ermittlung des Gehalts von Würsten an Semmel, Mehl und dergl. erwies sich das Trichinoskop als sehr praktisch, wobei der Zusatz von Jodtinktur zu einigen Präparaten vorteilhaft ist. Nicht minder lassen sich Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft und Arzneimittel in Pulverform leicht mit dem genannten Apparat vorgreifungsweise untersuchen. Ob und inwieweit das Trichinoskop auch für gerichtliche Untersuchungen, z. B. auch an Milch- und Molkeerzeugnissen geeignet ist, unterliegt z. Zt. noch weiterer Prüfung. Edelmann.

Andrjewski, P.: **Praktische Methoden zum Nachweis der Bakterienvermehrung im Fleisch und zur Erkennung vergiftungsgefährlichen Fleisches.** (Zeitschr. f. Infekt.-Krankh. der Haust. 1927, 32, S. 89.)

In seinen einleitenden Bemerkungen über die Ursache der Fleischvergiftungen kommt Andrjewski unter umfangreicher Berücksichtigung der Literatur zu dem Standpunkt, daß Fleischvergiftungen nicht allein durch spezifische Bakterien hervorgerufen werden, sondern auch durch Saprophyten aus Luft, Wasser, also auch durch nichtspezifische Bakterien. Die unumgängliche Voraussetzung jeder Fleischvergiftung ist, daß Bakterien sich im Fleisch vermehren. Die in der Natur sehr stark verbreiteten Paratyphusbakterien vermehren sich im Fleisch stets mit anderen Bakterien (proteus, Coli, perfringens usw.); dabei bilden sich thermostabile Produkte, die schon an sich

die Intoxikation hervorrufen und das nachfolgende Eindringen der verschiedenen Bakterien in die Blutbahn begünstigen können. Demnach erscheint es als das Wichtigste, daß kein Fleisch genossen wird, daß der bakteriellen Zersetzung zu verfallen begonnen hat und mehr thermostabile giftige Stoffe aufweist als Fleisch bei fortgeschrittener Fäulnis. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend hat nun Andrjewski die verschiedensten Methoden geprüft, die es innerhalb kurzer Frist ermöglichen, die beginnende Zersetzung sehr frühzeitig festzustellen, ohne daß zeitraubende kulturelle Untersuchungen notwendig sind. Bei der einfachen bakterioskopischen Untersuchung konnte der Verfasser wiederholt Bakterienkolonien nachweisen zu einer Zeit, zu der sich makroskopisch noch keinerlei Merkmale von Zersetzung im Fleisch zeigten. Die ungleichartige Verteilung dieser Bakterien, namentlich in den oberen Schichten der untersuchten Proben spricht für nachträgliche Einwanderung von außen, die gleichzeitig in allen Schichten verteilte Mikrobenanhäufung für hämatogenen Ursprung. Für die weiteren Untersuchungen stellte Andrjewski einen wässrigen Extrakt aus dem Fleisch her und prüfte denselben mit verschiedenen physikalischen und chemischen Methoden. Er konnte nachweisen, daß die Wasserstoffionenkonzentration des Fleischextraktes gesunder Schlachttiere im allgemeinen nicht unter 6,0 ph sinkt (im Verlauf von 20 Stunden). Wenn innerhalb dieser Zeit ein Ph höher als 6,5 festgestellt wird und sich keine Anzeichen von Zersetzung zeigen, so stammt das Fleisch von durch den Transport erschöpften oder von kranken Tieren. Die Farbe des Fleischextraktes ist bei einwandfreiem Fleisch charakteristisch rosarot. Sieht der Fleischextrakt nach der Filtration durch gutes Filterpapier wie eine feine Emulsion aus, so enthält das Fleisch eine solche Bakterienmenge, daß es zum Genuß nicht geeignet ist. Auch die Filtration selbst wird entsprechend der Bakterienmenge verlangsamt. Selbst bei Extrakten aus gekochtem Fleisch, die durchschnittlich schneller filtrieren als solche aus rohem, lassen sich die gleichen Unterschiede wahrnehmen. Außerdem stellte Andrjewski folgendes fest: Wenn im filtrierten Muskelwasserextrakt nach Beigabe der betreffenden Säuremengen im Wasserbade (75 Grad C) eine Trübung oder ein Niederschlag entsteht, hat das Fleisch soviel Bakterien, daß es für den Konsum unzulässig ist. Die Probe ist sehr empfindlich. Hinsichtlich der Veränderung der chemischen Zusammensetzung der Fleischwasserextrakte ergab sich, daß 20 Stunden aufbewahrtes Fleisch, in dessen entsprechend verdünntem wässrigen Extrakt nach Beigabe der AgNO_3 -Lösung ein deutlicher Niederschlag entstand, der bakteriellen Zersetzung in dem Maße unterlegen hat, daß es zum Konsum nicht zugelassen werden darf. Die weiteren Untersuchungen erstreckten sich auf das Vorhandensein von Peroxydasen in den Fleischextrakten. In einwandfreiem Fleisch gesunder Tiere zeigen sich ausnahmslos starke Peroxydasereaktionen. Zeigen sich im Muskelwasserextrakt keine Peroxydasen, so ist das Fleisch entweder im Zustande der bakteriellen Zersetzung oder es stammt von durch Transport erschöpften Tieren oder von wegen schwerer Krankheit notgeschlachteten Tieren und ist normaler Säuerung nicht fähig. Schließlich hat der Verfasser auch noch verschiedene Anilinfarbstoffe als Indikatoren für die mannigfachen physikalischen und chemischen Reaktionen angewandt, die in dem in bakterieller Zersetzung befindlichen Fleische vor sich gehen. Dabei ergab sich, daß die Farbstoffe Alizarinrot, Malachit- oder Brillantgrün, Gallein, Zyanin und die Kombination zweier Farbstoffe sehr deutliche und auch empfindliche Farbumschläge bei bakteriell zeretztem Fleisch erkennen lassen. In dem zweiten Teil der ausführlichen Arbeit wird eine genaue Anweisung für die Durchführung der oben er-

wähnten Proben gegeben. Andrjewski hat seit drei Jahren Tausende von Versuchen in obiger Richtung vorgenommen und kommt auf Grund seiner Erfahrungen zu dem Ergebnis, daß der Hygieniker mit Hilfe dieser Prüfungen binnen 40 bis 60 Minuten klare und objektive Maßstäbe für die Beurteilung gewinnen kann, ob das Fleisch infolge von Bakterienvermehrung der Zersetzung zu verfallen begann. Ziegler.

Escher, W. E.: Der Wert des Zentrifugierens für die Anreicherung von Tuberkelbazillen in Milch und Sputum.

(Aus der Bakteriologischen Anstalt der Landwirtschaftskammer Braunschweig: — Leiter: Dr. A. Machens.) (Zeitsch. f. Infekt.-Krankh. d. Haust. 1927, 32, H 1, S. 77.)

Die bisher empfohlenen Anreicherungsverfahren für Tuberkelbazillen (Tb) in Milch und Sputum haben noch zu keinem vollbefriedigenden Ergebnis geführt, da es nicht gelingt, die Tb. in ihrer Gesamtheit mittels Zentrifugalkraft im Bodensatz zur Abscheidung zu bringen. Escher nimmt an, daß für das Ergebnis des Zentrifugierens ganz andere, bisher nicht beachtete oder berücksichtigte Kräfte allein ausschlaggebend sind. Er denkt hierbei an das Verhältnis der von der Suspensionsflüssigkeit und den Bakterien ausgehenden Wasserstoffionenwirkung und ihre Konzentration. Die Wasserstoffionenkonzentration beträgt für die Tb. die Zahl $1,1 \cdot 10^{-3}$ bis $2,8 \cdot 10^{-4}$, oder in ph. angegeben 3,0 bis 3,5. Dies besagt, daß eine Ausfällung der Bakterien nur bei saurer Reaktion der Flüssigkeit erfolgen kann. Diese Tatsache hat ja bereits auch in der sog. Säureagglutination der Bakterien praktische Verwendung gefunden. Bei den meisten gebräuchlichen Methoden zur Homogenisierung von Milch und auch Sputum gelangt irgend ein Alkali als homogenisierender Faktor zur Anwendung (Ammoniak, Kalilauge, Neusal, Morsin, Antiformin). Eine so bearbeitete Flüssigkeit zeigt stets alkalische Reaktion, die aus den angegebenen Gründen eine Ausfällung der Tb. durch Zentrifugalkraft verhindert. Um eine Auswertung dieser Tatsachen nach der praktischen Seite zu erreichen, bestehen zwei Möglichkeiten: Den zu untersuchenden Flüssigkeiten eine abgestimmte saure Reaktion zu geben oder die aufgelöste Flüssigkeit durch bakterien-dichte Filter zu schicken und den Filtrerrückstand zu untersuchen. Bei Sputumproben ist die zuletzt genannte Methode der einfachere Weg. Andererseits gelingt es auch leicht, der Flüssigkeit die gewünschte saure Reaktion zu geben. An Stelle der bisher üblichen Verdünnung mit destilliertem Wasser nimmt man diese mit einer auf eine genaue Ionenkonzentration abgestimmten Flüssigkeit (Regulator oder Puffer) vor. Bei Milchproben scheint die Milchsäure als homogenisierender Faktor gute Dienste zu leisten. Zur Filtration der genannten Flüssigkeiten haben sich die Membranfilter nach Zsigmondi als am geeignetsten erwiesen, da diese Art Filter die Bakterien auf der Oberfläche zurückhalten und gleichsam ausfrieren. Nach beendeter Filtration wird der Filtrerrückstand auf einen Objektträger verrieben oder abgeklatscht, das Präparat, wie angegeben, gefärbt und zur mikroskopischen Untersuchung gebracht. Die auf diese Weise erhaltenen Anreicherungen sind so vielversprechend, daß das Zentrifugieren wohl in Zukunft durch die hinsichtlich der Anreicherung sicherer wirkende Filtration ersetzt werden kann. Ziegler.

Glietenberg: Über das Vorkommen von Paratyphus B- und paratyphusähnlichen Stämmen in Organen frisch geschlachteter gesunder Tiere. (Zeitsch. f. Fleisch- u. Milchhygiene, 38, Bd., S. 97/98.)

In einer Entgegnung auf einen Artikel von H. Berman (Zeitsch. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 108, 1927, Heft 1) weist Glietenberg darauf hin, daß die auffäl-

ligen Ergebnisse der Untersuchungen B.s und die daraus gezogenen Schlußfolgerungen lediglich durch fehlerhaftes bakteriologisches Arbeiten zu erklären sind. Edelmann.

Nottbohm, F. E.: Vorwiegendes Auftreten von Sekretionsstörungen im linken Schenkelviertel. (Zeitschr. für Fleisch- u. Milchhygiene, 38, Jahrg., S. 113—116.)

Über die Verteilung des Sitzes der Sekretionsstörungen in den verschiedenen Eutervierteln bei der Kuh hat Nottbohm im hygienischen Staatsinstitut Hamburg Untersuchungen angestellt. Bei 18 Kühen ergab sich, daß in 61,11 Prozent aller Fälle die stärkste Störung der Milchsekretion im linken Schenkelviertel vorlag. Eine ähnliche Feststellung hatte Frank und Sven Wall schon früher bezüglich der Eutertuberkulose gemacht. Als Ursache dieser besonderen Beteiligung des linken Schenkelviertels spricht N. den Umstand an, daß die Schenkelviertel an sich stärker der Verunreinigung ausgesetzt sind als die Bauchviertel, und daß die Kühe vorzugsweise die linke Seite zur Ruhelage wählen und dabei die Durchblutung des linken Schenkelviertels geringer ist. Edelmann.

Standesangelegenheiten.

Berechnung der vom Tierärzte dispensierten Arzneien.

Min. f. L. D. u. F.

Gesch.-Nr. V 1253 vom 17. II. 1928.

Aus landwirtschaftlichen Kreisen ist der Beforgnis Ausdruck gegeben worden, daß die Tierärzte für die in ihrer Praxis abgegebenen Arzneien den Tierbesitzern höhere Preise als die Apotheken in Rechnung stellen. Diese Befürchtung ist mit Tatsachen nicht zu widerlegen, weil die fast allgemein übliche Pauschal-Liquidation für tierärztliche Verrichtungen und abgegebene Arzneien keine Möglichkeit bietet, die in Rechnung gestellten Arzneipreise nachzuprüfen. Nach der Art, in der sich die Tierärzte mit Arzneimitteln versorgen, ist anzunehmen, daß die Arzneien von den Tierärzten durchweg erheblich unter den Preisen der Arzneitaxe abgegeben werden, und daß es sich bei tatsächlichen Überforderungen um einzelne Ausnahmefälle handelt. Jedenfalls würde das tierärztliche Dispensierrecht seinen Zweck verfehlen, wenn es sich nicht im Sinne einer möglichst schnellen und billigen Verforgung der Besitzer erkrankter Tiere mit Arzneien auswirkte.

Damit nach dieser Richtung hin alle Unklarheiten beseitigt werden, erlaube ich ergebenst, bei den das Dispensierrecht ausübenden Tierärzten dahin zu wirken, daß bei der Berechnung der in ihrer Praxis abgegebenen Arzneien nach diesen Grundsätzen verfahren wird. Um dies allgemein sicher zu stellen, werden in den von den Tierärztekammern oder anderen tierärztlichen Körperschaften aufgestellten Gebührenordnungen (Taxen) Bestimmungen darüber zu treffen sein, daß

1. die Arzneien von den Tierärzten zu Preisen abzugeben sind, die die Arzneitaxe nicht überschreiten, sich vielmehr möglichst weit unter den in der Arzneitaxe vorgeschriebenen Preisen halten,
2. die Berechnung der tierärztlichen Verrichtungen und der abgegebenen Arzneien in einer Pauschsumme hinfort als unzulässig anzusehen ist, vielmehr
3. der Tierbesitzer in jedem Falle, spätestens nach erfolgter Bezahlung der ihm zugestellten Rechnung, eine Einzelberechnung der Arzneipreise erhält.

Über das Veranlaßte erlaube ich ergebenst, spätestens bis zum 1. Mai 1928, zu berichten. Dabei sind mir drei Stück der abgeänderten Gebührenordnung einzureichen.

Tierärztlicher Verein der Neumark und Grenzmark im Jahre 1927.)*

a) Ordentliche Mitgliederversammlung am 6. April 1927. Prof. Dr. Nöller-Berlin: „Bekämpfung und Behandlung parasitärer Krankheiten.“ Der Vortragende bespricht zuerst die einzelnen Wurm-mittel. Kamala ist nur bei Bandwürmern, nicht bei Nematoden wirksam. Die Kupferleckfalte ist unwirksam bei Lungenwürmern und Leberegel. Und nur bei Magenwürmern zu empfehlen. Zur Bekämpfung der Distomatose kann bei Schafen Kamala angewendet werden (Dosis 2,5 bis 3 Gramm, 5 Tage hintereinander zu geben). Beim Rind

*) Wegen Raummangels gekürzt wiedergegeben. Die Schriftl.

verfagt Kamala, dagegen wirkt Extr. Filicis mit Öl gemischt oder in Kapseln, ferner Distol, welches Filicin enthält. Von besonderer Wichtigkeit ist das Eingeben, welches nur durch den Tierarzt erfolgen sollte und mit dem vom Vortragenden konstruierten Instrumentarium leicht vorgenommen werden kann. Tödliche Vergiftungsfälle sind bei Distol selten. Filinol Buchner ist mit Distol identisch und ihm gleichwertig. Filex (Merck) hat oft verfagt. Tetrachlorkohlenstoff ist bei Schafen und Rindern recht wirksam, die häufig beobachteten Vergiftungsfälle sind auf Dosierungsfehler zurückzuführen. Serapis II ist für Schafe brauchbar. Nach Anwendung von Neo-Serapis sind zahlreiche Todesfälle vorgekommen. Egelin enthält Filex-Substanzen und Tetrachlor, ferner Benzol und Paraff. liq. Bei Schafen sind gute Erfolge mit dem Präparat erzielt worden.

b) Zweitägiger Lehrgang des Deutschen Veterinärrates am 30. April und 1. Mai 1927. 56 Teilnehmer. Prof. Drahm-Berlin über die Beziehungen der Hodenfunktion zum endokrinen System und über das Wiederkauproblem mit Demonstrationen an einem Ziegenpräparat und Projektionen. Danach trug Prof. Stang-Berlin Neues aus der Fütterungslehre vor. Nachmittags führte Prof. Götze-Hannover in einer Rinderhalle des Schlachthofes die verschiedenen Methoden der Fremdkörperoperationen an drei Rindern vor. Am 1. Mai sprach zunächst Prof. Neumann-Kleinpaul über Koliktherapie mit Vorführung der Nasenfahndsonde und Erklärung der rektalen Untersuchung. Dr. Seelemann behandelte die praktische Durchführung der Milchkontrolle und die Therapie der Euterentzündungen und endlich noch Prof. Götze-Hannover die Magenkrankungen beim Rinde unter Vorführung eines Filmes.

c) Ordentliche Mitglieder-Versammlung am 11. Dezember 1927. 40 Teilnehmer. Veterinär Dr. Glässer-Hannover über Diagnose und Bekämpfung der Krankheiten des Schweinepest- und Schweinefeuchekreises, Dr. David-Landsberg über parasitäre Erkrankungen des Schweines und Dr. Stickdorn-Landsberg über Rotlauf beim Menschen. Nachmittags erörterte Tierzuchtleiter Dr. Hofmann „Tagesfragen über Fütterung und Haltung des Schweines“ und führte danach den Ruhlsdorfer Lehrfilm vor. Schirop weist auf die kläglichen Verhältnisse auf dem Serummarkt hin und beanstandet insbesondere, daß alle möglichen Firmen die Tierärzte mit Angeboten auf Rotlaufferum überschwemmen und dabei eine 10 prozentige Wohlfahrtsrücklage in Aussicht stellen. Es sei dann doch besser, das Serum von vornherein 10 Prozent billiger zu liefern. Stickdorn vertritt den Standpunkt des Landsberger Serum-Institutes und weist darauf hin, daß die Wohlfahrtsrücklage der W. d. T. eine alte satzungsgemäße Einrichtung sei, die sich durchaus bewährt habe. Wiendieck empfiehlt, an die Tierärztekammer heranzutreten, die mit der Vereinigung Deutscher Impfstoffwerke wegen Fallenlassens der Rücklage verhandeln soll. Maak weist auf den Druck des Vereins deutscher Schweinezüchter hin, die die Freigabe der Rotlaufimpfung für Laien fordern oder selbst mit Serum allein impfen wollen. Zur Bekämpfung der Leberegel- und Leberegel-krankheit hat der Minister für den Bezirk Frankfurt 10 000 Mk. bewilligt, wie der Vorsitzende mitteilt. Davon entfallen auf den Kreis Landsberg 1000 Mk. An Stelle des von Nöller empfohlenen Alt-Distols sei jetzt Distol comb. getreten. Filicinäure sei darin nur in kleinen Mengen enthalten, dafür sei Hexachloräthan hinzugefügt. Für Schafe sei das billige Serapis zu empfehlen. Maak weist darauf hin, daß die Großschlächter und Landverbände gegen die Erhöhung der Fleischbeschaugebühren Sturm laufen. Wiendieck empfiehlt gewissenhafte Untersuchung, damit die nachträglichen Beanstandungen in Berlin, die jetzt an der Tagesordnung seien, unterbleiben. Borchmann wünscht, daß dem Fleischbeschau-Tierarzt Gelegenheit gegeben werde, die bei der Nachuntersuchung beanstandeten Organe nochmals zu sehen und sich davon zu überzeugen, daß keine Stempelfälschung oder falsche Diagnose vorliegt. Schirop und Dobberstein verlangen, daß wegen kleiner Verfehen Tierärzte nicht brotlos oder abfichtlich schikaniert werden. Es wird beschlossen, einen entsprechenden Antrag an die Tierärztekammer zu stellen.

2. Ordentliche Mitglieder-Versammlung am 25. Januar 1928 im Tierhygiene-Institut Landsberg a. W. Veterinär Dr. Kurtzweig über „Die Anfänge einer tierärztlichen Milchkontrolle in Landsberg“. Vor allen Dingen ist eine stärkere Tuberkulose-Tilgung und planmäßige Bekämpfung der Euterkrankheiten nötig. In Landsberg bildete die alte Polizeiverordnung von 1894 die Grund-

lage für den Ausbau einer tierärztlichen Milchkontrolle. Danach ist die Milch von Kühen, die mit Euterkrankheiten behaftet sind, vom Verkehr ausgeschlossen. Wer Milch verkaufen will, muß dies der Polizei anzeigen. Den Beamten ist der Zutritt zu den Ställen gestattet. Diese Kontrolle ist nie durchgeführt worden, da sie an der Kostenfrage scheiterte. Die einzige Kontrolle lag in der Hand des Nahrungsmittelchemikers. Zunächst richteten das Versuchsgut Oldenburg und das Stadtgut Neusoest Kindermilchfälle ein, die der Kontrolle des Tierhygiene-Institutes und des Veterinärrates unterstanden. Eine Milchempidemie im Mutterhaus Bethesda gab dem Vortragenden Anlaß, eine Neubearbeitung der alten Polizeiverordnung zu beantragen und einen Entwurf nach Maßgabe des Arnberger Erlasses auszuarbeiten. Danach soll jeder Bestand, der Milch abgibt, vierteljährlich einmal tierärztlich kontrolliert werden. Dabei sollen die Kühe klinisch — besonders auf Tuberkulose — untersucht werden. Jedes Jahr soll eine Gesamtprobe bakteriologisch geprüft werden. Diefem Antrage wurde jedoch nicht Folge gegeben, da der Nahrungsmittelchemiker erklärte, man müsse erst das neue Reichsmilchgesetz abwarten, die alten Polizeiverordnungen seien rechtlich ungültig. Daher wurde versucht, die Milchproduzenten zu einer freiwilligen tierärztlichen Kontrolle zu bewegen. Bis jetzt haben sich dazu vier Produzenten gemeldet. Die entstehenden Kosten der Einführung der polizeilichen Kontrolle — vorläufig 1000 Mk. — haben Aussicht auf Genehmigung der Behörde. Durch Lehrgänge im Tierhygiene-Institut sollen die Produzenten aufgeklärt und zu einer einwandfreien Milchgewinnung erzogen werden. Dem Tierarzt liegt die klinische Untersuchung und die Einfendung der Milchproben ob. Die Gebühr soll je Tier und Untersuchung 1,— RM., bei sechsmaliger Untersuchung 6,— RM. betragen, daneben soll Wegegeld, aber keine Befuchgebühr erhoben werden. Es ist beabsichtigt, die Kontrolle allmählich auf mehr Bestände, andere Gemeinden und die Molkereigenossenschaften auszudehnen. Veterinär Dr. Pressler warnt vor Optimismus. Auch er hält die freiwillige Kontrolle für aussichtsreich. Die Hauptsache sei, nicht Vorzugsmilch zu hohem Preise herzustellen, sondern die Qualität allgemein zu heben. Auch in Stettin werde das freiwillige Verfahren durch die Behörden gefördert. Zwei Mitglieder werden auf einstimmigen Beschluß aus dem Verein ausgeschlossen, da sie seit mehreren Jahren die Zahlung der Beiträge ablehnen. Der Vorsitzende empfiehlt, bei Bedarf Leberegelmittel vom Landratsamt anzufordern.

gez. Dr. Stickdorn, Schriftf. gez. Dr. Kurtzweg, 1. Vorf.

Tierärztekammer für die Rheinprovinz und die Hohenzollernschen Lande.

Voll Sitzung 29. Oktober 1927 in Köln.

1. Geschäftsbericht. Der Schlichtungsausschuß ist einmal in einem Streitfall zwischen einem prakt. und beamteten Tierarzt zusammengetreten. Die Schlichtung der Differenzen ist gelungen. Eine Reihe anderer Streitigkeiten konnte durch Vermittelung des Vorsitzenden beigelegt werden. Die Beschwerde eines prakt. Tierarztes über das bakt. Institut der Landw.-Kammer wird einer Kommission zur weiteren Bearbeitung überwiesen. Auf eine Anfrage aus dem Saargebiet über die Tätigkeit von Spezialisten hat der Vorstand der Kammer geantwortet, daß eine Beschränkung der Praxis auf die spezialistische Tätigkeit stattzufinden hat. Die Kammer tritt dieser Ansicht bei und wünscht, daß eine solche Bestimmung in die neuzuschaffende Standesordnung der neuen Kammer aufgenommen wird. Der Vorsitzende berichtet ausführlich über den Stand eines Strafverfahrens eines Gutsbesitzers in Westfalen wegen Befeiligung von Schönheitsfehlern bei Pferden durch Paraffininjektionen, die durch einen Kollegen erfolgt sein sollen. Da wegen der eingelegten Berufung eine Prüfung des Falles noch nicht möglich ist, kann eine Stellungnahme der Kammer zu dem besonderen Falle noch nicht erfolgen. Die Kammer vertritt jedoch allgemein nach wie vor den gleichen Standpunkt, den der Vorstand schon vorher (Ende 1925) eingenommen hat: Manipulationen oder Einspritzungen bei Tieren, die nicht zu Heilzwecken dienen, sind nicht zulässig. Eine Beschwerde beim Oberlandesgericht D. über einen Richter, der selbst so viele Sachkenntnis besitzen will, um über psychische Eigenschaften eines Pferdes ohne Sachverständigen urteilen zu können, blieb ohne direkten Erfolg, da der Einzelrichter ganz selbständig zu entscheiden hat, ob ein Sachverständiger zu hören ist. Im allgemeinen Milchausschuß des rhein. Bezirks ist Dr. Heine-Duisburg als einziger Tierarzt vertreten. Eine Anfrage, ob das Anbringen von Schildern „Hundebad und

Hundeschranke“ unter dem Schilde des Tierarztes am Haupte im Standesinteresse gebilligt werden könne, wurde verneint.

2. Ersatzwahl des Vorstandes und Schlichtungsausschusses. An Stelle des verstorbenen stellvertretenden Vorstandsmitgliedes Schumann-Trier wurde Weinberg-Aachen und für das ausgeschiedene stellvertretende Vorstandsmitglied Dr. Althof wurde Dr. Schweitzer-Trier gewählt. Für das im Schlichtungsausschuß ausgeschiedene Mitglied Dr. Althof wurde Dr. Johann in Neusserfurth und als sein Vertreter Dr. Herberg-Osterath gewählt.

3. Oberbewertungsausschüsse. Für das Oberfinanzamt Köln werden Dr. Behnke-Köln und als Vertreter Dr. Flatten-Köln, für den Provinz-Ausschuß Wigge-Düsseldorf und als Vertreter Dr. Herberg-Osterath vorgeschlagen.

4. Besprechung eines Falles betr. § 10 der K.O. Der Vorf. erläutert einen Fall, wo eine Raterteilung seinerseits an einen Kollegen anlässlich einer Vereinsversammlung später als Meinungsäußerung der Kammer in Gerichtsakten zu finden war, ohne daß die Formulierung der Fassung durch den betreffenden Kollegen dem Vorsitzenden der Kammer vorgelegen hatte. Auch war für die Kammer keine Möglichkeit vorhanden gewesen, die andere interessierte Seite zu hören. Der Vorf. legt dar, daß so etwas nicht angängig ist. Die Kammer gibt gutachtliche Äußerungen und besondere Ratsschlüsse nur schriftlich ab, wobei beiden Parteien vorher Gelegenheit zur Äußerung gegeben wird. Die Versammlung erklärt sich mit diesem Standpunkt einverstanden.

5. Geflügelimpfungen. Bei der Wichtigkeit der Geflügelimpfungen erwartet die Kammer von allen Tierärzten, daß sie sich mit der Materie beschäftigen und Sorge tragen, daß dieses neue Gebiet restlos tierärztlicher Tätigkeit erhalten bleibt. Auf eine Anfrage der Landw.-Kammer über Gebühren für Diphtherieimpfungen schlägt die Kammer der Landw.-Kammer folgende Sätze vor:

unter 100 Stück 0,25 Mk. je Stück einschl. Impfstoff
unter 250 Stück 0,20 Mk. je Stück einschl. Impfstoff
unter 500 Stück 0,15 Mk. je Stück einschl. Impfstoff
über 500 Stück 0,10 Mk. je Stück einschl. Impfstoff.

Daneben Reisekosten. Genügendes Hilfspersonal ist zur Verfügung zu stellen.

6. Untersuchungszwang für Hauschlachtungen. Die Kammer hat stets den Standpunkt vertreten, daß eine Befreiung der Hauschlachtungen von der Fleischuntersuchung in Widerspruch zu den Auffassungen der Hygiene steht. Die Kammer legt Wert darauf nochmals zu betonen, daß alle Schlachtungen gleichmäßig zu behandeln sind und dem allgemeinen Untersuchungszwang unterworfen werden müssen.

7. Amtliche Sektionen und die Möglichkeit der Beteiligung interessierter Tierärzte. Die Kammer schließt sich dem Wunsche der praktischen Tierärzte an, bei amtlichen Sektionen anwesend sein zu können. Da die Veterinäräräte häufig von der Polizei den Auftrag zur Sektion bekommen, ohne daß diese den Namen des prakt. Tierarztes angibt, der die Seuchenanzeige veranlaßt hat, liegt es außer dem Bereiche der Veterinäräräte, die interessierten Tierärzte von der Sektion zu benachrichtigen. Die Kammer empfiehlt daher den Tierärzten, bei der Seuchenanzeige den Wunsch hinzuzufügen, bei der Sektion anwesend zu sein.

gez. Wigge, Vorf. gez. Herberg, Schriftf.

Verschiedene Mitteilungen.

Dr. phil. h. c. Rudolf Mann,

Vorstandsmitglied der I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, be-
geht am 4. März 1928 den seltenen Tag des 40jährigen Geschäftsjubi-
läums. Seine Persönlichkeit ist wohl auch für den Tierärztestand be-
deutungsvoll, denn als Leiter der pharmazeutischen Abteilung des ge-
samten Konzerns, des größten chemisch-pharmazeutischen Unter-
nehmens Deutschlands, das die früheren führenden Firmen Bayer,
Meister-Lucius, Agfa, Cassella, Kalle umfaßt, macht sich naturgemäß
sein Einfluß auf dem gesamten Arzneimittelmarkt geltend.

Als Rudolf Mann im Jahre 1906 in Elberfeld neben der allge-
meinen kaufmännischen Leitung der Firma, insbesondere des Farben-
geschäftes auch die Leitung der pharmazeutischen Abteilung der che-



maligen Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. übernahm, stand diese erst in den Anfängen ihres Aufbaues. Sie wurde, namentlich im Ausland, noch von den Farbenvertretungen, teilweise im Nebenamt, mit bearbeitet. Mit scharfem Blick erkannte er, daß bei der Verschiedenartigkeit der beiderseitigen Belange eine gedeihliche Entwicklung des pharmazeutischen Geschäftes nur möglich war, wenn es von dem der Farben abgetrennt wurde. Diese Aufgabe, neben vielen anderen, hat er mit diplomatischem Geschick und feiner Einfühlbarkeit in die jeweiligen Verhältnisse im Laufe der Jahre konsequent durchgeführt. Wirksam unterstützt durch die wissenschaftlichen Arbeiten und epochemachenden Erfindungen der Laboratorien hat sein kaufmännischer Weitblick, sein Wagemut und hervorragendes Organisationstalent die pharmazeutische Abteilung zu der gegenwärtigen Höhe emporgeführt und ihre Standartpräparate auf dem ganzen Erdenrund bekannt gemacht. In Ansehung dieses Bemühens, den gediegenen deutschen Leistungen und dem deutschen Namen überall in der Welt Geltung zu verschaffen und in Anerkennung seiner tatkräftigen Hilfe, das Studium der deutschen Sprache und des deutschen Volkstums und die Pflege der deutschen Wissenschaft zu fördern, ist er vor einigen Jahren von der Universität Köln durch die Verleihung des Dr. phil. h. c. ausgezeichnet worden.

So dürfte wohl nicht allein bei seiner Firma der Wunsch bestehen, daß es Herrn Dr. Mann vergönnt sein möge, noch eine Reihe von Jahren wie bisher seine kaufmännische und organisatorische Begabung, sowie die reiche Erfahrung, über die er verfügt, der chemisch-pharmazeutischen Industrie und dem wirtschaftlichen Gedeihen unseres Vaterlandes zu widmen.

Akademische Nachrichten.

Obertierarzt Dr. Spiegl am Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer in Halle a. S. hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Pathologie und Parasitenkunde an der neu zu errichtenden Landwirtschaftlich-tierärztlichen Hochschule in Angora (Türkei) erhalten, mußte jedoch mit Rücksicht auf unüberwindliche Schwierigkeiten die Professur ablehnen. (Siehe D. T. W. 1928, Nr. 8, S. 129.)

Malkmus-Jubiläumstiftung.

Zu Ehren des verstorbenen verdienstvollen Lehrers und Direktors an der medizinisch-forensischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover, des Geheimen Regierungsrats Prof. Dr. Bernard Malkmus, hat das Professoren-Kollegium der Tierärztlichen Hochschule Hannover einstimmig beschlossen, eine

Malkmus-Jubiläumstiftung

zu errichten. Als Grundstock sollen die Spenden dienen, die der Hochschule zur Ausführung wissenschaftlicher Arbeiten anlässlich ihrer 150-Jahrfeier (13. bis 15. Juni 1928) zufließen.

Ärztlicher Verein Hannover.

7. März 1928, 20 Uhr, Ärztehaus, Hannover, Hildesheimer Str. 23/24. „Das Guttadiaphor“, eine neue und einfache Blutuntersuchungsmethode für die tägliche Praxis mit besonderem Wert für die Diagnose der Syphilis. Ref. Dr. Bierost und Dr. Fritz Meyer-Hildesheim. „Der Ausbau der praktischen Blutuntersuchung.“ Ref. Prof. Dr. V. Schilling-Berlin. „Kurze urologische Vorträge.“ Ref. Praetorius. Zu den alle 14 Tage stattfindenden Sitzungen sind die Tierärzte und Studenten der Veterinärmedizin freundlichst eingeladen.



Vortragsraum im Haus der Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte und Apotheker.

Tierärztliche Buchstelle Sachsen-Anhalt E. V., Magdeburg.

Unsere diesjährige General-Verammlung zur Erstattung des Jahresabschlußberichtes findet am Sonntag, den 18. März 1928 in den Räumen der Loge Harpokrates zu Magdeburg, Gr. Münzstraße 10, statt. Tagesordnung und genaue Zeit wird jedem einzelnen Mitglied noch mitgeteilt. Für die Buchstelle sich interessierende Kollegen sind freundlichst eingeladen.

III. Fortbildungskursus für Tierärzte in Rostock v. 10.—12. März 1928. (Gleichzeitig 19. Fortbildungskursus des D.V.R.)

Veranstaltet vom Landestierseuchenamt und vom Deutschen Veterinärarzt.

Sonnabend, den 10. März, 14—16 Uhr auf dem Schlachthof: Dr. Schulz: Demonstrationen zur Sterilität des Rindes; Klinische Tuberkuloseuntersuchungen. 17—19 Uhr im Hörsaal des Landestierseuchenamts: Prof. Dr. Poppe: Differentialdiagnose der Infektionskrankheiten des Schweines mit Demonstrationen; Obertierarzt Dr. Schmidt: Rotlaufimpfung und Rotlaufentschädigung. Sonntag, den 11. März, 10—2 Uhr in der Universität: Prof. Dr. Katz: Probleme der Tierpsychologie; Prof. Dr. Götze: Sporadische und infektiöse Eutererkrankungen des Rindes; Prof. Dr. Reinhardt: Neue Arzneimittel; Landesveterinärarzt Jörn: Veterinärgegesetzgebung und Veterinärverwaltung in Mecklenburg. 15½—18 Uhr im Landestierseuchenamt: Prof. Dr. Götze: Praktische Vorführungen aus der Bujatrik; Dr. Schulz: Operationen am Schwein und Geflügel. Vorführungen verschiedener Untersuchungsmethoden im Laboratorium, Filmvorführung. Montag, den 12. März, 9—11 Uhr im Hörsaal des Landestierseuchenamts: Prof. Dr. Poppe: Differentialdiagnose der In-

fektionskrankheiten des Schweines mit Demonstrationen; Obertierarzt Dr. Schmidt: Rotlaufimpfung und Rotlaufentschädigung. 12 bis 14 Uhr auf dem Schlachthof: Dr. Schulz: Demonstrationen zur Sterilität des Rindes, Klinische Tuberkuloseuntersuchungen. — Der Kurfus wird in zwei Abteilungen abgehalten. Die I. Abteilung beginnt am Sonnabend um 14 Uhr und beschließt am Sonntag Abend, die II. Abteilung beginnt am Sonntag um 10 Uhr und endet am Montag Nachmittag. Die Vorträge und Vorführungen am Sonntag finden für beide Abteilungen gemeinsam statt. Die Gebühr für den Fortbildungskursus beträgt 10 Mark, die mit der möglichst frühen Anmeldung unmittelbar an das Landestierfeuchnamt einzufenden ist. Stang. Poppe.

20. Fortbildungskursus des D.V.R. in Kottbus am 17. und 18. März 1928.

Sonnabend, den 17. März, 10 Uhr: Prof. Dr. Dobberstein-Berlin: „Die Pathologische Anatomie der Schweinefeuchen“. 11 Uhr: Medizinalrat Prof. Dr. Richter-Leipzig: „Euterkrankheiten unter Berücksichtigung der tierärztlichen Tätigkeit bei der Milchkontrolle“. 15 Uhr: Prof. Dr. Goetze-Hanover: „Bujatrische und geburtshilfliche Demonstrationen“. Sonntag, den 18. März: 10 Uhr: Medizinalrat Prof. Dr. Richter-Leipzig: „Sterilitätsbekämpfung“ mit Demonstrationen. 11 Uhr: Prof. Dr. Dahmen-Berlin (Klein-Zieten): „Chemo- und Immunotherapie“. 12 Uhr: Prof. Dr. Lund-Hanover: „Ausgewählte Kapitel aus der Fleischschau“. Anschließend Besprechung. — Die Demonstrationen finden auf dem Schlachthof statt. Der Ort für die Abhaltung der Vorträge wird noch bekannt gegeben. Die Teilnehmergebühr beträgt 10 Mark für beide Tage. Stang.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Dissertationen der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Josef Andree: Ein Fall von generalisierter Tuberkulose bei einem Kamel. Alfred Bonfert: Vergleichende Untersuchung über die Homologie der Darmteile bei Nagetieren unter teilweiser Berücksichtigung der arteriellen Blutversorgung. Walter Dittmar: Zur Frage der aktiven und passiven Immunisierung gegen Pararäudebrand. Werner Karger: Untersuchungen über den Einfluß der intramuskulären, subkutanen und intravenösen Luftapplikationen auf Atmung, Puls, Temperatur, Blutdruck und den Blutzuckergehalt beim Rinde. Karl Kerkmann: Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten des Blutzuckerpiegels bei Vögeln. Hermann Michels: Untersuchungen über die Kükenruhr. Wilhelm Schulze: Vergleichende Untersuchungen über die Zahl der Erythrozyten und den Hämoglobingehalt des Entenblutes. Newsad: Die Verbreitung der Echinokokkenkrankheit bei Tieren und Menschen mit Berücksichtigung der Verhältnisse in der Türkei.

Jahrbuch über neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Weidewirtschaft und des Futterbaues. Herausgegeben von Dr. Friedrich Falke, o. ö. Professor der Landwirtschaft an der Universität Leipzig und Gotthard Petzold, Dipl. Landwirt, Assistent am Institut für Betriebslehre der Universität Leipzig. Lehrwirtschaft Rittergut Cunnersdorf.

Das 306 Seiten starke Werk bringt zunächst 12 Aufsätze: Versuche über die Beziehungen zwischen Düngung, Schnittzeiten, Pflanzenbestand und Ertrag der Dauerfutterflächen. Von Prof. Dr. Raum-Weihenstephan. Aus der Geschichte der Benutzung unserer Futterpflanzen. Von G. Badermann-Niederföhrhaußen. Über den Einfluß des Grundwasserstandes auf Höhe und Eiweißgehalt des Ertrages von Mähwiesen. Von Prof. Freckmann-Landsberg (Warthe). Die Weidewirtschaft in den skandinavischen Ländern. Von K. Schneider-Kleeberg, Niederwalluf. Über vierjährige Düngungsversuche auf den Rhönhuten. Von Dipl. Landwirt Schöppach-Dresden und Weidekommissar Steudel-Eisenach. Die Grünlandwirtschaft in Schweden. Von Staatskonsulent Joh. Borg-Upfala. Baumpflanzungen auf Viehweiden. Von Kreiswiesenbaumeister Heinemann-Siegen. Norwegische Alp- und Weidewirtschaft im Gebirge. Von Konsulent Oedeli-Oslo. Der Befenginfest auf der Weide, ein Zeichen der Unkultur und doch zuweilen eine nützliche Pflanze. Von Kreiswiesenbaumeister Heinemann-Siegen. Kalk-, Phosphorsäure und Stick-

stoffbedarf von Grasland auf altem, schwerem, alluvialen Tonboden in der Provinz Groningen der Niederlande. Von Direktor Heide-ma-Groningen. Die Beurteilung des Phosphorsäurebedarfs von Grasland auf schwerem alluvialen Tonboden. Von Direktor Heide-ma-Groningen. Soll man Dauerweiden und Dauerwiesen von Zeit zu Zeit umbrechen? Von K. Schneider-Kleeberg, Niederwalluf.

In der 3. Abteilung, „Auszüge und Hinweise“, bespricht es die Literatur über Weide-, Wiesen- und Wässerwirtschaft, den Futterbau auf dem Felde, auf Moor und Heide, die Aufbewahrung und Zubereitung des Futters, den Gras- und Kleefamenbau, die Züchtung und Beschaffung des Saatgutes, die Maßnahmen zur Förderung des Futterbaues, die erschienenen einschlägigen Werke und die Literatur aus der Weidewirtschaft anderer Länder. Ein Sach- und Autorenverzeichnis bilden den Schluß des Werkes. Bei der Reichhaltigkeit des Inhaltes verbietet es sich von selbst, auf Einzelheiten näher einzugehen. Allen Landwirten und Züchtern bringt es reiche Belehrung über die wichtigen Fragen der Weidewirtschaft und des Futterbaues. Dr. P. Koch-Weimar.

Dr. Heine's Taschenkalender für Fleischbeschauer und Trichinenschauer für 1928. Verlag von M. & H. Schaper, Hannover. Preis 2,80 RM.

Der handliche Kalender in Taschenformat ist als Nachschlagebuch für den täglichen Gebrauch gedacht. Dem eigentlichen Notizkalendarium folgen für Fleischbeschauer sowie Trichinenschauer wichtige Gesetze und Verordnungen. Wichtige Auszüge aus dem Reichsviehfeuchen-, Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetz nebst Bundesratsausführungsbestimmungen A und D werden angeführt. Aufklärungen über Steuerangelegenheiten, Versicherungs-, Krankenkassenfragen folgen, woran sich besonders interessierende berufliche Mitteilungen anschließen. Am Schluß findet sich noch eine Literaturübersicht empfehlenswerter Werke aus dem Gebiete der Fleischschau, Trichinenschau und des Schlacht- und Viehhofwesens, eine Tabelle für Maße und Gewichte sowie der augenblickliche Posttarif. In allem ist der Kalender 224 Seiten stark. Berge-Hannover.

Deutsch-österreichischer Tierärzte-Kalender 1928. Die „Tewega“ (Wien III, Rolonitzgasse 3a) überreichte in diesen Tagen den von ihr herausgegebenen Tierärztekalendar allen österreichischen Tierärzten kostenlos (im Buchhandel 6,50 S zuzüglich Postgebühr). Bei der vorliegenden Ausgabe hat es sich Dr. J. Hummel zur Aufgabe gemacht, den Inhalt des schmucken und handlichen Bändchens gegenüber dessen Vorgänger zu ergänzen und zu erweitern, soweit es die gebotene Umfangsbeschränkung gestattete. Der Inhalt ist so recht auf die Belange des Praktikers zugeschnitten: Wochenkalender, Gliederung der Organisation der deutschen Tierärzte Österreichs, Satzungen des Reichsvereins, Namensverzeichnis der Dozenten pp. der Tierärztlichen Hochschule in Wien, Anschriften der deutsch-österreichischen Tierärzte, wichtige für den Tierarzt wissenswerte fachliche Gesetze, eine Reihe geschickt zusammengestellter Tabellen, Verzeichnis der hauptsächlich in Österreich gebräuchlichen Tierheilmittel mit Indikation und Maximaldosis, Untersuchungsschemata, Therapeutische Notizen. Dem Taschenbuch liegt ein kleiner Schreibkalender bei. Seiner Handlichkeit wegen ist der Kalender ein praktisch mitzuführender Begleiter und wird so besonders den österreichischen Kollegen, aber auch den Tierärzten der benachbarten Grenzländer ein willkommener Ratgeber sein. Möge dem rührigen Verlag durch die Herausgabe des Taschenkalenders der wirtschaftliche Zusammenschluß der Tierärzte Deutschösterreichs gelingen; vielleicht regt das Bestreben auch in reichsdeutschen Landen zur Nachahmung an. Dr. Ariess-Rottenbuch (Obb.).

Personal-Nachrichten.

Approbirt: in Hannover: Heinrich Altemeier aus Spradow b. Bünde i. W.

Promoviert: Tierarzt Josef Andree aus Obermarsberg; Tierarzt Alfred Bonfert aus Bukarest; Tierarzt Walther Dittmar aus Kassel; Tierarzt Werner Karger aus Hirschberg; Tierarzt Karl Kerkmann aus Sonsbeck; Tierarzt Hermann Michels aus Zellerfeld; Tierarzt Wilhelm Schulze aus Kneitlingen.

In den Ruhestand getreten: Oberveterinärarzt Sebastian Schütz, Bezirkstierarzt in Sulzbach.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck: Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10: nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inserenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 10.

Ausgegeben am 10. März 1928.

36. Jahrgang.

Eugen Fröhner zum 70. Geburtstage.

Geheimer Regierungsrat Professor Dr. med. et med. vet. h. c. Eugen Fröhner vollendet am 11. März sein 70. Lebensjahr. Ein Leben, überreich an Arbeit, aber auch reich an Erfolgen liegt vor uns ausgebreitet. Seine Schüler, die zu seinen Füßen gesessen und zahlreiche deutsche Tierärzte, die aus seinen Werken Anregung und Belehrung empfangen haben, werden deshalb heute gern mit mir einen Rückblick auf dieses für sie und die tierärztliche Wissenschaft so fruchtbringende Leben werfen.

Eugen Fröhner wurde am 11. März 1858 zu Hirsau, O.-A. Calw in Württemberg geboren. Er besuchte zunächst das Gymnasium zu Stuttgart und — ursprünglich zum Theologen bestimmt — später bis zur Maturität das theologische Seminar zu Urach, das nur die geistige Elite der höheren Schulen aufnahm. Von 1878 bis 1879 studierte er Tierheilkunde an der Tierarzneischule in Stuttgart. Am 29. August 1879 erhielt er die Approbation als Tierarzt. Von 1879 bis 1880 bezog er die Universität Göttingen und von 1886 bis 1882 die Universität München. Im Jahre 1881 legte er die Prüfung als Oberamtstierarzt ab. Vom 1. August 1880 bis 1. Oktober 1882 war er als erster klinischer Assistent an der Tierarzneischule in München tätig. Am 1. Oktober 1882 wurde er zum Professor und Lehrer an der Tierarzneischule in Stuttgart ernannt. 1884 promovierte er in Tübingen zum Dr. medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae. Mit Wirkung vom 1. Mai 1886 ist ihm eine Professur an der Tierärztlichen Hochschule in Berlin übertragen worden. Am 1. April 1924 wurde er von seinen amtlichen Verpflichtungen entbunden, übte aber auf Wunsch der Regierung und der Hochschule sein Lehramt weiter aus. Die Notwendigkeit einer Operation zwang ihn mit Beginn des Wintersemesters 1926 von seiner Lehrtätigkeit zurückzutreten. Aus Anlaß des 300jährigen Jubiläums der Universität Gießen im Jahre 1907 verlieh ihm die vereinigte med. Fakultät die Würde eines Dr. med. vet. h. c. König und Staatsregierung würdigten seine Verdienste durch Verleihung des Charakters als Geheimer Regierungsrat und durch Verleihung des Roten Adlerordens 4. Klasse, des Kronenordens 3. Klasse, des Roten Adlerordens 3. Klasse mit der Schleife, der Medaille zur Erinnerung an die Enthüllung des Kaiser Friedrich-Denkmal und des E.K. 2. Klasse am weiß-schwarzen Bande. Auch Schweden und Dänemark zeichneten ihn durch Verleihung des Königl. Schwedischen Wasa-Ordens und des Ritterkreuzes des Dannebrog-Ordens aus.

An diesem Werdegang Fröhners, dem ich seinen amtlichen Nimbus nicht rauben wollte, überrascht sein ungewöhnlich schneller Aufstieg, denn schon drei Jahre nach seiner Approbation kehrte er als Professor nach Stuttgart zurück. Man muß es den maßgebenden Vertretern der Tierarzneischule in Stuttgart hoch anrechnen, daß sie mit richtigem Blick den 24jährigen Tierarzt in den Sattel gesetzt haben. Es zeigte sich sehr bald, daß er reiten konnte. Verfügte er schon vor seiner Berufung nach Stuttgart über einige Veröffentlichungen, so setzte in seiner Stuttgarter Zeit eine sehr lebhaft wissenschaftliche Produktion ein, die sich angesichts seiner Jugend als überraschend reif erwies. Seine Themen berührten das pharmakologische und klinische Gebiet und ließen noch keine bestimmte Richtung erkennen. Aber schon in Stuttgart legte Fröhner den Grund zu seiner bedeutungsvollsten literarischen Tätigkeit, seinen nachmals weltberühmt gewordenen Lehrbüchern. Es erschienen die ersten Lieferungen des Lehrbuchs der speziellen Pathologie und Therapie, das er mit seinem Lehrer Friedberger zusammen herausgab. Sein aufgehender Stern fand die gebührende Beachtung, und so berief ihn die Tierarzneischule in Berlin zu sich und übertrug ihm die Leitung des Tierospitals für kleine Haustiere und das Lehrgebiet der Arzneimittellehre und Toxikologie. Es ist ein Ruhmestitel für die Berliner Tierarzneischule, daß sie die Bedeutung dieses Mannes frühzeitig erkannte und ihn in das leuchtende Sternbild einreichte, das damals der Schule weithin Glanz verlieh und ihren und des ganzen tierärztlichen Standes gewaltigen Aufstieg in reichem Maße förderte. In Berlin, dem größeren Wirkungskreise, fand dieser unermüdlich planende und gestaltende Geist den geeigneten Mutterboden für seinen schier unstillbaren Drang zu wissenschaftlicher Betätigung. Diese fiel zusammen mit einem großartigen allgemeinen literarischen Aufschwung der Veterinärmedizin, und Fröhner marschierte an der Spitze. Immer wieder neue Anregungen gewann er aus dem Wechsel seiner Arbeitsgebiete. Er leitete nämlich acht Jahre die Klinik für kleine Haustiere, 10 Jahre die chirurgische Klinik und 22 Jahre die medizinisch-forensische Klinik. Jedem dieser Institute hat er den Stempel seiner hervorragenden Persönlichkeit aufzudrücken verstanden.

Wenn man die Bedeutung Fröhners erfassen und den Versuch unternehmen will, seinen Einfluß auf viele Generationen von Tierärzten und zum Bewußtsein zu bringen, so muß in erster Linie seiner Lehrtätigkeit gedacht

werden. In den Vorlesungen verstand es Fröhner in seltenem Maße, durch klare und sachliche Darstellung zu fesseln. Er trug stets frei, ohne Anlehnung an ein Manuskript vor, aber darum nicht weniger formvollendet und erschöpfend. Seine Vorträge waren Muster von logischem Aufbau und sprachlicher Gewandtheit, und sein sonores Organ verfehlte selbst auf den verkatertsten Studenten seine Wirkung nicht. Auf rhetorischen Schmuck, mit dem Schütz seine Hörer gefangen nahm, hier und da wohl auch den gediegenen Inhalt verdeckte, leistete Fröhner im allgemeinen bewußt Verzicht, obwohl es ihm, dem Meister des Worts, manchmal schwer gefallen sein mag, dieser Lockung zu widerstehen. Glänzende von Geist und Witz sprühende Reden haben wir öfters auf Kommerfen von ihm gehört und stürmisch bejubelt. Im ersten Hörsaal indessen kam es ihm mehr auf sachliche und erzieherische Wirkung an. Von besonderem Reiz waren seine klinischen Demonstrationen, in denen er die angehenden Tierärzte nach seinem Vorbilde formte. In nimmermüder Arbeit hat er die tierärztliche Jugend zu der ihr im späteren Berufsleben so notwendigen Objektivität erzogen. Systematisch untersuchen nach Fröhners wohlervogenem Untersuchungsschema, die weitere und engere Differentialdiagnose stellen und die Ergebnisse in objektiver Würdigung zur Diagnose verdichten, das konnte jeder lernen; der sein Studium mit Interesse betrieb. Das umfassende Wissen Fröhners, die vollkommene Beherrschung der Literatur, seine weitgehende Erfahrung, sein scharfer kritischer Geist fügte mit den Bausteinen der klinischen Erscheinungen ein buntes Mosaik zusammen, in dem allmählich das deutliche Bild der Krankheit sich abzeichnete. So manche seiner Diagnosen stellte ein kleines Kunstwerk für sich dar. Für seine Schüler war es aber ganz besonders lehrreich, daß sie dieses Kunstwerk nicht nur entstehen sahen, sondern an ihm mitarbeiten und es unter seiner umsichtigen Leitung sogar selbst entstehen lassen durften. Das System der Referate, zu denen alle Studierenden herangezogen wurden, hat sich im Fröhnerschen Geiste glänzend bewährt, und seine Schüler, die diese Zeilen lesen, werden sich des köstlichen Schatzes, den er ihnen freigebig für das ganze Leben geschenkt hat, in größter Dankbarkeit erinnern. Dieselbe Sachlichkeit und unperfönliche Behandlung hat auch Fröhners Prüfungen ausgezeichnet. Zu meiner Zeit drängten sich die Kandidaten zur Prüfung bei Fröhner, nicht etwa weil er leichter prüfte, sondern weil durch klare Fragestellungen die Prüfung leichter erschien. So war es nicht verwunderlich, daß Fröhner trotz seiner zurückhaltenden Natur ein äußerst beliebter Lehrer und Examinator war.

Dankbaren Herzens werden auch seine zahlreichen Assistenten an diesem Tage der vielfachen Anregungen und Förderungen gedenken, die sie von ihrem Chef erfahren haben. Sein den Anforderungen des Unterrichts und der Wissenschaft so völlig geweihtes Leben zwang viele in seinen Bann und begeisterte sie nach ihren Kräften seinem Vorbilde nachzueifern.

Hatte Fröhners Lehrtätigkeit für seine Schüler entscheidende Bedeutung, so muß die Wissenschaft und die Allgemeinheit der Tierärzte seine Forscherarbeit und seine literarische Tätigkeit voranstellen. Und hier offenbart sich Fröhner als ein schöpferischer Geist allergrößten Stils. Es kann in dem Rahmen dieses Aufsatzes nicht entfernt daran gedacht werden, ein auch nur einigermaßen vollständiges Bild dieses Wirkens zu entwerfen, übersteigen doch seine sporadischen Veröffentlichungen die Zahl 350 erheblich — die zahlreichen von ihm beeinflussten Arbeiten seiner Schüler nicht eingerechnet. Diese Zahl erscheint zwar riesenhaft und beleuchtet unter Hinzurechnung seiner 11 Lehrbücher und seiner ausgedehnten redaktionellen und gutachtlichen Tätigkeit strahlend die ungeheure Arbeitskraft dieses Mannes, sie wird aber doch noch übertroffen von dem

gediegenen Inhalt seiner Schriften. Diese lehnen sich eng an sein jeweiliges Arbeitsgebiet sowie an das Material der von ihm geleiteten Kliniken an und sind von einer köstlichen Reife von Anfang bis zu Ende. Das gilt ebenso für Arbeiten aus den Jahren 1880 und 1881 (Experimentelle Untersuchungen über den Chilisalpeter vom physiologischen, therapeutischen und sanitätspolizeilichen Standpunkt aus“, seiner ersten Göttinger Arbeit, und „Über den diagnostischen Wert der Albuminurie und deren therapeutische Beziehungen zur Digitalis“), wie für seine publizistische Tätigkeit der letzten Jahre („Malleinprobe, Beschälseuche und infektiöse Anämie“). Während seiner Tätigkeit im Hundespital und später nahmen einen breiten Raum seine Untersuchungen über die pharmakologischen, toxischen und therapeutischen Wirkungen von Digitalis, Physostigmin, Camala, effigsaure Tonerde, Chlorzinklösung, Monochloressigsäure, Blausäure, Paraldehyd, Creolin, Quecksilber, Sulfonal, Pilocarpin, Filixextrakt, Cumarin, Coffein, Morphinum, Antifebrin, Santonin, Diuretin, Codein und Apocodein, Antipyrin und Arecolin ein. Auch seine Feststellungen über die Unschädlichkeit vergifteten Fleisches gehören hierher. Die Erkenntnis der praktischen Wichtigkeit des Gebietes der Arzneimittel hat ihn noch viele Jahre später veranlaßt, Sammelreferate über neue Arzneimittel zu bringen.

Eine weitere Gruppe von Arbeiten war statistischen Mitteilungen über die Verbreitung der Tuberkulose unter den kleinen Haustieren in Berlin, die Geschwülste bei Hund und Pferd und die wichtigsten chirurgischen und inneren Krankheiten beim Hund gewidmet. Zahlreiche Abhandlungen über aktuelle und aus seinem Arbeitsgebiet sich ergebende Fragen zeugen von der ihm eigenen Meisterung des Stoffes. Ich greife aus der Fülle dieses Materials, zeitlich geordnet, nur seine Arbeiten über das Kastrationsfieber, die Katalapsie, rheumatische Hämoglobinämie, Hornfäule, Lecksucht, Anaemia perniciosa, Konjunktivitis follicularis, Acne und Furunkulosis, diagnostische Bedeutung des Tuberkulins beim Hunde, Zuckerharnruhr beim Hunde, forensische Bedeutung des Alters pathologischer Produkte, akute degenerative Muskelatrophie, Petechialfieber und Rotz als Hauptmangel heraus. Ungemein vielseitig sind seine Publikationen über Fälle kasuistischen Inhalts, jeweils zusammengefaßt in den „Mitteilungen aus der Berliner chirurgischen und medizinischen Klinik“. Es ist zwar an dieser Stelle unmöglich, auf ihren Inhalt einzugehen, ich kann es mir aber nicht versagen, ganz allgemein zu betonen, daß diese kasuistischen Mitteilungen von den vielfach üblichen erheblich abweichen und in vorbildlicher Weise zeigen, wie sie sein müssen. Das gilt nicht nur für die erschöpfende Darstellung des Befundes, sondern auch für die wissenschaftliche Auswertung desselben, denn an die große Mehrzahl knüpft Fröhner aus dem reichen Schatz seiner Erkenntnis und Erfahrungen Erörterungen und Ausblicke wissenschaftlichen Inhalts.

Seit dem Jahre 1890 hat Fröhner zusammen mit Kitt die „Monatshefte für praktische Tierheilkunde“ herausgegeben. Leider sah sich der Verlag aus finanziellen Gründen veranlaßt, die Fortführung der Zeitschrift im Jahre 1924 einzustellen. Sie hat hauptsächlich Originalabhandlungen gebracht und in 34 Jahrgängen dem an den wissenschaftlichen Fortschritten interessierten Praktiker gedient. Vor dem Erscheinen der Monatshefte und auch später benutzte Fröhner für seine Veröffentlichungen das Repertorium, Adams Wochenschrift, Das Berliner Archiv, den Tierarzt, die Zeitschriften für Tiermedizin und Veterinärkunde, sowie die Berliner tierärztliche Wochenschrift, in der Hauptsache aber publizierte er seine Arbeiten in den Monatschriften. Außer zahlreichen namhaften deutschen Autoren haben auch tierärztliche Autoren des Auslandes wichtige, z. T. sogar epochemachende Bei-

träge geliefert, so aus Dänemark, Schweden, Österreich-Ungarn, Frankreich, Rußland, Schweiz, Rumänien, Japan und Südafrika.

Alle bisher berührten Leistungen treten aber zurück gegenüber der staunenswerten Produktivität Fröhners auf dem Gebiete der Lehrbücher. In dieser Beziehung steht Fröhner unerreicht da. Folgt man der Entstehung seiner Werke, so ergibt sich ganz unverkennbar, daß hier ein besonderer Genius gewaltet hat. Kaum hatte Fröhner den Lehrstuhl in Stuttgart bestiegen, so erschienen die ersten Lieferungen des Lehrbuchs der speziellen Pathologie und Therapie, das er zusammen mit seinem Lehrer Friedberger herausgab, eines Werkes, das den Namen seiner Autoren nachmals über den ganzen Erdball getragen hat, neunmal verlegt, in die hauptsächlichsten Kultursprachen übersetzt und zuletzt von ihm als Kompendium bearbeitet worden ist. Dieses große zweibändige Werk, dessen Mitarbeiter in den letzten Auflagen Zwick wurde, füllt für sich allein schon eine Lebensarbeit aus. Aber kaum ist Fröhner in seiner Berliner Professur für Arzneimittellehre und Hundeklinik warm geworden, so folgen seine bahnbrechenden Werke über Arzneimittellehre mit zwölf Auflagen, Toxikologie, Arzneiverordnungslehre und allgemeine Therapie mit je fünf Auflagen, sowie das Lehrbuch der klinischen Untersuchungsmethoden mit sechs Auflagen.

Noch nicht hatte Fröhner die ihm übertragene chirurgische Klinik übernommen, als er aus Wien, wo er den klinischen Betrieb bei Bayer studierte, mit dem Plan zur Herausgabe des großen Handbuchs der Chirurgie und Geburtshilfe zusammen mit Bayer zurückkehrte. In diesem Werke übernahm er die Bearbeitung des II. Bandes „Allgemeine Chirurgie“, der unter Mitwirkung von Theodor Schmidt in Wien in der 5. Auflage vorliegt. Als reife Früchte seiner chirurgischen Tätigkeit folgten sein beliebtes Kompendium der speziellen Chirurgie, das er später mit Eberlein und nach dessen Tode in der 7. Auflage mit Silbersiepe zusammen herausgab, und die chirurgische Diagnostik der Krankheiten des Pferdes in zwei Auflagen. Im Jahre 1904 zog Fröhner in die medizinisch-forensische Klinik ein, und bereits 1905 schenkte er den Tierärzten sein bekanntes Lehrbuch der gerichtlichen Tierheilkunde, von dem bis jetzt fünf Auflagen erschienen sind.

Jedes Wort, das diesen überwältigenden Leistungen hinzugefügt wird, muß klein wirken. Aber, wenn ich auch in Ehrfurcht darüber schweige, so hoffe ich doch, daß dieser kurze Überblick über die Lebensarbeit unseres verehrten Lehrers allen seinen Schülern im engeren und weiteren Sinne an seinem Ehrentage willkommen sein wird. Möge Eugen Fröhner ein gütiges Geschick noch einen langen glücklichen Lebensabend bescheren. Dr. W. Pfeiffer, Gießen.

Die Behandlung der Brustseuche der Pferde mit intravenösen Gaben von Chinisol.

Von Dr. med. vet. Wilhelm Priebe, prakt. Tierarzt in Bremen.

(Mit 1 Kurve.)

Bereits bei früheren Beobachtungen von Maul- und Klauenseucheerkrankungen der Rinder konnte ich auf den Einfluß des Chinols auf die Bakterienflora des Darms hinweisen. Elsässer (1) stellte nach Verfütterung von Chinol an Schweinen fest, daß der Darminhalt des Dickdarms seinen sonst stets vorhandenen penetranten Geruch verloren hatte. Ferner beweisen die Untersuchungen von Liese (2) den deutlich nachweisbaren Einfluß von Chinol auf das Wachstum von pathogenen Erregern, nicht nur im Reagenzglas, sondern auch im Tierkörper bei intravenöser Anwendung.

Diese Laboratoriumsversuche von Liese haben mich veranlaßt, der Frage näher zu treten, zu untersuchen, ob das Chinol bei intravenöser Infusion praktisch den klinischen Verlauf der Brustseuche in einem für den Patienten günstigen Sinne beeinflusst. Die außerordentlich günstige Wirkung von Neosalvarsan auf den klinischen Verlauf der Brustseuche ist allgemein bekannt und anerkannt. Wird das Neosalvarsan gleich am ersten Fiebertage infundiert, so läßt sich nach meinen klinischen Erfahrungen in den meisten Krankheitsfällen die Erkrankung so kupieren, daß die Tiere bereits in 5—8 Tagen nach der Infusion wieder arbeitsfähig sind. Stehen aber die Pferde 3—4 Tage unbehandelt mit hohen Körpertemperaturen von 40—41 Grad C, so wird der Krankheitsverlauf auch bei Anwendung von Neosalvarsan bedeutend in die Länge gezogen. Mit anderen Worten gesagt, läßt sich bei rechtzeitiger Anwendung von Neosalvarsan der Krankheitsverlauf bei Brustseuche um 10 bis 14 Tage abkürzen. Berechnen wir den Arbeitsausfall eines gespannten mit Mk. 15,— pro Tag, so ist die Wirtschaftlichkeit der Neosalvarsankur über jeden Zweifel erhaben. Einige hiesige industrielle Betriebe mit größeren Pferdebeständen haben diesen Umstand sofort aus der praktischen Erfahrung heraus erfaßt. In diesen Pferdebeständen tritt sofort bei verdächtigen Krankheitsercheinungen das Fieberthermometer in Tätigkeit, und die Neosalvarsaninfusion hat bei stark erhöhter Rektaltemperatur niemals verfaßt. Das Neosalvarsan besitzt neben diesen guten auch einige un-

angenehme Eigenschaften. Es ist giftig. Ich persönlich habe unangenehme Zwischenfälle unmittelbar nach der Infusion noch nicht erlebt. Es sind solche aber in der tierärztlichen Literatur mehrfach beschrieben. Die ätzende und nekrotisierende Wirkung des Neosalvarsans ist bekannt, wenn es durch einen unglücklichen Zufall in die Unterhaut gelangt. Wenngleich die intravenöse Infusion weitaus in der Mehrzahl der Fälle leicht und ohne Schwierigkeiten auszuführen ist, so kann es auch dem geschicktesten Operateur bei sehr empfindlichen Pferden geschehen, daß sich durch Muskelkontraktion die Haut über der Einstichstelle der Jugularvene so verschiebt, daß die Kanüle aus der Vene gezogen wird, und daß einige Kubikzentimeter der zu infundierenden Neosalvarsanlösung in die Unterhaut gelangen, und so Veranlassung zu schweren Thrombophlebiten geben. Ich habe selbst derartige Fälle bei eigenen Patienten noch nicht erlebt. Im Felde hatte ich häufig Pferde mit sehr schweren Thrombophlebiten und Halsanschwellungen mit unangenehmen Abzessen — aufgetreten nach der Neosalvarsaninfusion — zu sehen Gelegenheit gehabt. Jeder Kliniker, der das Neosalvarsan anwendet, darf diese Komplikationen nicht außer Acht lassen, wenn sie auch nur selten zu beobachten sind.

Diese klinischen Erfahrungen mit Neosalvarsan bei Behandlung der Brustseuche der Pferde gaben die näheren Richtlinien für die Chinolversuche an Pferden an. Es galt festzustellen:

1. Die Verträglichkeit des Chinols bei intravenöser Infusion in größeren Dosen (Giftwirkung).
2. Die Reizwirkung der Chinollösung in stärkerer Konzentration bei subkutaner und intramuskulärer Injektion.
3. Die Einwirkung auf das Blutbild bei intravenöser Infusion bei gefunden Tieren.
4. Die Einwirkung von intravenösen Gaben des Chinols auf den klinischen Verlauf von brustseuchekranken Pferden.

Unter gütiger Mitwirkung der Schlachthofleitung in Bremen (Direktor Dr. Elsässer) wurde ein 11—12-jähriges Schlachtpferd mit einem Lebendgewicht von 750 Pfund, das sonst gesund, aber wegen einer chronisch unheilbaren Lahmheit geschlachtet werden sollte, auf dem Schlachthof eingestellt.

Dieses Pferd erhielt 1,5 Gramm Chinofol intravenös in die Jugularvene mit dem Salvarfanapparat nach Hauptner infundiert. Die gesamte Flüssigkeitsmenge, die infundiert wurde, zeigte die Skala am Salvarfanapparat mit 115 ccm an. Zur Herstellung der Chinofollösung wurden die im Handel erhältlichen 1 Gramm-Chinofoltabletten verwandt. Als Lösungsmittel wurde abgekochtes Leitungswasser benutzt. Das Bremer Leitungswasser enthält keine Nitrate, kein Eisen, wohl aber Chloride in reichlicher Menge. Die Kalksalze fallen durch Freiwerden der CO_2 beim Abkochen aus. Die zur Anwendung gebrachte Chinofollösung war hellgelb und durchsichtig. Bei kalkhaltigem und eisenhaltigem Wasser tritt eine Trübung bzw. Blaufärbung der Lösung durch Ausfällung von Ortho-oxychinolin auf. Die Lösungen wurden frisch hergestellt und blutwarm infundiert. Das Pferd zeigte unmittelbar nach der Infusion keinerlei Erscheinungen, die auf eine Giftwirkung des Chinofols hinwiesen. Das Tier blieb nach der Infusion ebenso munter und freßlustig, als es vor der Infusion war. Die Blutproben zu dem nachstehenden Blutbild wurden unmittelbar vor der Infusion, dann drei und sechs Stunden nach der Infusion entnommen. Die Blutbilder selbst wurden im path. Institut der Krankenanstalt in Bremen (Leiter: Oberarzt Dr. Moeckel) festgestellt.

Blutbild 1.

	11 h. a. m.	2 h. p. m.	5 h. p. m.
	%	%	%
Stab.	1	5	1
Segm.	61	70	69
Lymph.	35	24	26
Eos.	2	—	1
Mono.	1	1	3

Das Blutbild reagiert deutlich auf die Chinofolinfusion. Die Änderung ist jedoch nicht als erheblich zu beurteilen im Sinne einer Vergiftung. Das Blutbild zeigt, daß die angewandte Dosis von 1,5 Gramm Chinofol noch erheblich steigerungsfähig ist.

Daselbe Pferd erhielt etwa vier Tage später eine subkutane und eine intramuskuläre Injektion von 10 ccm einer 10prozentigen Chinofollösung an der linken bzw. rechten Halsseite. Irgendwelche reaktive Erscheinungen auf diese Einspritzungen sind im Verlaufe der nächsten Tage nicht aufgetreten. Auch nicht die geringsten Anschwellungen machten sich bemerkbar. Sowohl die subkutane als auch die intramuskuläre Injektion wurde vollkommen reaktionslos vertragen.

An einem mir zur Verfügung stehenden Pferdebestande erkrankten in ganz kurzer Zeit kurz aufeinander 4 Pferde unter hochfieberhaften Krankheitsercheinungen. Die erkrankten Pferde sind belgischen Schlages mit einem Lebendgewicht von 16—17 Zentner und 6—7 bzw. 15 Jahre alt. Um Wiederholungen zu vermeiden, sollen die ersten beiden Fälle nur kurz abgehandelt werden.

Fall 1.

Das Pferd „Willibald“ hatte bereits drei Tage mit Körpertemperaturen von 40—40,9 Grad C gestanden, ehe die tierärztliche Behandlung einsetzte. Der Stallmeister hatte die tierärztliche Behandlung nicht nachgesucht, weil er die Erkrankung für eine leichte Erkältungskrankheit hielt. Das Pferd hatte am ersten Behandlungstage eine Rektaltemperatur von 40,9 Grad C. Die hochroten und gelblich verfärbten Lidbindehäute der Augen sprachen für Brustseuche. Das Pferd erhielt sofort eine intravenöse Infusion von

4,5 Gramm Neofalvarfan. Die Körpertemperatur hielt sich in den nächsten vier Tagen noch über 40 Grad C, sank dann von Tag zu Tag allmählich mit geringen Steigerungen des Abends. Am 13. Behandlungstage war das Pferd fieberfrei. Der Kräftezustand des Patienten war jedoch so schlecht, und die Futteraufnahme in den ersten fieberfreien Tagen eine so mangelhafte, daß das Tier erst nach weiteren zehn Tagen arbeitsfähig wurde.

Fall 2.

Noch während der Behandlungsdauer von Pferd „Willibald“ erkrankte das zweite Pferd „Wanda“ desselben Pferdebestandes. Die Behandlung dieses erkrankten Pferdes setzte gleich am ersten Fiebertage ein. Beim erstmaligen Messen der Temperatur zeigte das Thermometer eine Rektaltemperatur von 41,1 Grad C. Dieses Pferd erhielt kein Neofalvarfan, sondern 3 Gramm Chinofol intravenös. Irgendwelche Reaktionsercheinungen unmittelbar nach dieser Chinofolinfusion traten nicht auf. Drei Stunden nach der Chinofolinfusion war ein Temperaturabfall von 0,8 Grad C festzustellen. Die Temperaturkurve verhielt sich in diesem Krankheitsfalle in den nächsten Tagen dauernd abfallend, so daß das Tier am fünften Behandlungstage fieberfrei war und auch fieberfrei blieb. Der Kräftezustand und die Futteraufnahme des Pferdes war nach dieser fünftägigen Fieberattacke so gut, daß es bereits am achten Behandlungstage wieder in Dienst gestellt werden konnte.

Fall 3.

Nach Wiederherstellung des Pferdes „Willibald“ und „Wanda“ erkrankte das Pferd „Zacharias“ desselben Bestandes. Das Pferd hatte bereits seit drei Tagen nicht mehr sein Futter ausgefressen. Am vierten Behandlungstage sistierte die Freßlust vollkommen. Die Körpertemperatur im Rektum gemessen betrug 41,2 Grad C. Die Atmung war beschleunigt, der Puls war klein und kaum fühlbar, und infolgedessen seine Frequenz schwer festzustellen. Die Lidbindehäute waren hochrot und ausgesprochen gelb verfärbt. Die Maulschleimhaut war trocken und zeigte eine leichte Gelbfärbung. Es bestand Husten, Nasenausfluß bestand nicht. Verstärktes vesikuläres Atmen ließ sich nachweisen. Beim Herausführen des Pferdes aus seinem Stand taumelte das Pferd in der Hinterhand. Das Pferd erhielt am ersten Behandlungstage 100 ccm Ol. camph. forte und einen Senfumschlag, beiderseits das Lungendreieck bedeckend, nach folgendem Rezept:


Rp. Sem. sinap. pulv.
Pulv. Rad. Althaeae aa 500,0
Pulv. Gummi arabic. 300,0
m. f. Pulvis.

Ds. Äußerlich. Mit heißem Wasser angerührt als Umschlagpaste zu verwenden.

Gleichzeitig erhielt das Pferd eine intravenöse Infusion von 3 Gramm Chinofol. Auch hier ließ sich drei Stunden nach der Chinofolinfusion ein Temperaturabfall von 0,4 Grad C feststellen. Die Temperaturkurve stieg in den nächsten Tagen wieder an unter geringen Schwankungen der Morgen- und Abendmessungen, wie aus der nachstehenden Temperaturkurve ersichtlich ist. Das Blutbild zeigte drei Stunden nach der Chinofolinfusion nur eine geringe Änderung. Auch dieses Blutbild beweist, daß die Chinofoldosierung bei diesem 16—17 Zentner schwerem Belgier steigerungsfähig ist.

Blutbild 2.

	10,35 h. a. m.	2 h. p. m.	5 h. p. m.
	%	%	%
Stab.	2	2	2
Segm.	70	68	70
Lymph.	25	30	25
Eos.	1	—	1
Mono.	2	—	1



Wie aus der Temperaturkurve ersichtlich ist, hielt dieser Krankheitszustand des Pferdes bis zum sechsten Behandlungstage an. An diesem Tage erfolgte bei einer Körpertemperatur von 40,7 Grad C die zweite Chinofolininfusion von 4 Gramm mittels Salvarfanapparates. Diese 4 Gramm Chinofol waren in 130 ccm abgekochtem Leitungswasser aufgelöst. Auch unmittelbar nach dieser Infusion zeigte das Pferd keinerlei Begleitscheinungen, sowohl von Seiten des Herzens als von Seiten des Nervensystems. Drei Stunden nach dieser Infusion fiel die Temperatur um 0,6 Grad C auf 40,1 Grad C, um am Morgen des nächsten Tages 40 Grad C aufzuweisen. Der weitere abfallende Temperaturverlauf ist aus der Kurve ersichtlich. Die Freßlust besserte sich von Tag zu Tag. Die Gelbfärbung der Schleimhäute wurde geringer. Am elften Behandlungstage konnte die erste fieberfreie Temperatur gemessen werden. Nach weiteren fünf Tagen der Schonung war das Tier wieder arbeitsfähig.

Fall 4.

Am 16. Oktober erkrankte als viertes Pferd in dem Bestande das Pferd „Tell“. Es handelte sich ebenfalls um ein schweres belgisches Pferd mit einem Lebendgewicht von 16—17 Zentner, war aber schon 15 Jahre alt. Das Pferd hatte am ersten Behandlungstage eine Temperatur von 41,1 Grad C. Die Lidbindehäute sind gelbrot verfärbt. Da das Pferd noch einen guten Appetit hat und das regelmäßige Futter noch ziemlich ausfrisst, so wird eine abwartende, konservative Behandlung eingeschlagen. Das Pferd wird warm eingedeckt und erhält dreimal täglich Pyramidon mit Campher per os. Erfahrungsgemäß sind Selbstheilungen bei Brustfleuche häufig. Man darf sich über die Wirkung eines Arzneimittels nicht täuschen lassen bei Anwendung in leichten Fällen. Aus diesem Grunde wurde das Pferd bis zum sechsten Behandlungstage ohne weitere Behandlung beobachtet. Am sechsten Behandlungstage setzte jedoch plötzlich bei einer Temperatur von 40,6 Grad C eine hochgradige Atemnot ein, d. h. angestrengte und beschleunigte Atmung. Die Atemnot war so groß, daß selbst die Nüstern bei jedem Atemzuge stark erweitert wurden. Das Sensorium des Tieres war stark benommen, der Blick sehr trübe. In der Hinterhand taumelte das Pferd derartig, daß es fast über seine eigenen Beine fallen wollte. In diesem Krankheitsstadium bekam das Pferd 4 Gramm Chinofol intravenös infundiert, und gleichzeitig wurden 100 Gramm Oleum Camphoratum forte subkutan injiziert. Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Fällen trat nun nicht ein Temperaturabfall ein, sondern die Körpertemperatur stieg in den nächsten drei Stunden von 40,6 Grad C auf 41,2 Grad C, um dann während der nächsten zwei Tage bis auf 39,2 Grad C herunter zu gehen. In diesen Tagen der fieberarmen Zeit hatte sich das Allgemeinbefinden des Pferdes bedeutend gebessert. Der Appetit war auch rege

geworden und die Futteraufnahme gut. Jedoch stellten sich dann am neunten Behandlungstage leichte Unruheerscheinungen ein, die auf eine Kolikerkrankung schließen ließen. Das Pferd war anfeinend von seinen Pflegern — entgegen der Verordnung — zu reichlich gefüttert. Der Dünger war hart geballt und schleimig, auch gingen Schleimfetzen mit dem Dünger ab. Das Pferd erhielt zehn Gramm Istizin per os. Das Istizin wirkte aber erst nach zwei Tagen, indem sich wässriger Durchfall einstellte. Die Temperatur stieg wieder an von 39 Grad auf 39,8 Grad C am zehnten Behandlungstage. Das Allgemeinbefinden des Tieres wurde schlechter, insbesondere war der Kräftezustand des Tieres besorgniserregend, so daß ich mich entschloß, am zehnten Behandlungstage nochmals 4 Gramm Chinofol intravenös zu applizieren. Auch nach dieser Chinofolininfusion trat kein Temperaturabfall ein, sondern die Temperatur stieg von 39,9 Grad C auf 40,1 Grad C, um in den nächsten Tagen bis auf die normale Temperatur zurückzugehen. Zweifellos handelte es sich in diesem Falle um eine bösartige Infektion. Wäre das Pferd am sechsten Behandlungstage unbehandelt geblieben, so wäre eine beiderseitige Lungenentzündung mit recht zweifelhaftem Ausgang sicher gewesen, und ich hatte mir schon Vorwürfe gemacht, mit der Einspritzung zu lange gewartet zu haben. Die Temperaturerhöhungen nach der Chinofolininfusion in diesem Falle scheinen in der erhöhten Abwehrwirkung des Organismus — die durch die Chinofolininfusion ausgelöst wurde — ihren Grund zu haben.

Einige pharmakologische Angaben über Chinofol dürften für den Kliniker beachtenswert sein. Das Chinofol ist seit etwa 30 Jahren im Verkehr. Das „Chinofol“ ist der gesetzlich geschützte Name für eine Orth-oxychinolinfaure-Verbindung. Fröhner (3) gibt in seinem Lehrbuch der Arzneimittellehre, 7. Auflage, 1906, das Chinofol als ein Oxychinolinpyrosulfat an. Diese chemische Zusammenfassung trifft heute für das Chinofol nicht mehr zu. Das Präparat ist im Laufe der Zeit allmählich verbessert worden. Die Chinofolfabrik stellt heute der chemischen Zusammenfassung nach zwei verschiedene Chinofolpräparate her, und zwar das O. — oxychinolinkaliumbisulfat und ferner das O. — oxychinolinsulfat. Das von mir in dieser Arbeit angegebene und verwandte Chinofol ist das O. — oxychinolinkaliumbisulfat. Die Chinofolfabrik stellt neuerdings eine Chinofoltierarztpackung her, die das O. — oxychinolinkaliumbisulfat enthält. Die Bezeichnung „ad us. vet.“ erregt bei mir stets ein Mißtrauen. Die Tierärzte haben in der inneren Medizin alle Ursache auf die Konstanz der Zusammensetzung und Reinheit eines pharmazeutischen Präparates zu achten, um so mehr, wenn dasselbe unmittelbar in die Blutbahn injiziert werden soll. Ich möchte an dieser Stelle der Herstellerin des Chinofols den Rat geben, für ihre Tierarztpackung eine solche Bezeichnung zu wählen, die eine Verwechslung mit anderen Chinofolpräparaten ausschließt.

Diese intravenösen Chinofolininfusionen bei fieberhaften Allgemeinerkrankungen der Pferde sind außerordentlich billig, ein Umstand, der bei der heutigen schlechten Wirtschaftslage der Landwirtschaft sehr wohl berücksichtigt werden muß. Bei Selbstherstellung der gebrauchsfertigen Lösung belaufen sich die Kosten für eine Infusion von vier Gramm Substanz auf etwa 50 Pfennige. Nach meinen obigen Versuchen ist es für den Praktiker am vorteilhaftesten, wenn er sich eine gebrauchsfertige sterile 4prozent. Lösung in Aqua dest. herstellt. Diese Lösung ist dauernd haltbar. Bei Verwendung einer 4prozentigen O-oxychinolinkaliumbisulfatlösung enthalten 25 ccm der Lösung 1 Gramm der Substanz.

Bei Pferden bis zu 7 Zentner Lebendgewicht genügen zu einmaliger intravenöser Infusion 50 ccm einer 4prozent. Lösung (= 2 Gramm O-oxychinolinkaliumbisulfat). Bei Pferden von 7—12 Zentner Lebendgewicht genügen zu ein-

maliger intravenöser Infusion 75 ccm der gebrauchsfertigen Lösung (= 3 Gramm O-oxychinolinkaliumbisulfat). Bei Pferden von 12—17 Zentner Lebendgewicht verwende ich 100—125 ccm der 4prozentigen Lösung (= 4—5 Gramm O-oxychinolinkaliumbisulfat). In leichteren und mittelschweren Fällen genügt eine einmalige Infusion. Nur in schweren Krankheitsfällen empfiehlt sich 3—4 Tage nach der ersten Infusion eine zweite Infusion folgen zu lassen. Die hier angegebenen Dosen sind keineswegs als Maximaldosen für die Einzeldosis aufzufassen. Es kommt aber nicht darauf an, Gewaltkuren zu machen, sondern eine schonende Behandlung des Organismus muß stets als Axiom bleiben.

Zusammenfassung.

Die intravenöse Anwendung von 3—5 Gramm Chinofol beeinflusst in durchaus günstigem Sinne den Krankheitsverlauf von brustleucke-kranken Pferden. Irgendwelche Ver-

giftungserrscheinungen waren bei den angewandten Chinofolmengen bei den Patienten in keiner Weise zu erkennen. Unangenehme Komplikationen traten nach der Infusion bei keinem Patienten auf. Charakteristisch ist für die intravenöse Chinofolinfusion die Temperaturänderung drei Stunden nach der Infusion. Ob das Chinofol auch dann noch wirkt, wenn bereits eine Pleuropneumonie besteht, müssen weitere klinische Erfahrungen mit diesem Mittel dartun.

Literatur.

1. Dr. Elsässer: Wird durch die innere Verabreichung von Chinofol das Fleisch unserer schlachtbaren Haustiere in Bezug auf Farbe, Geruch oder Geschmack beeinträchtigt? — Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene. 2. Dr. Liese: Der Einfluß von Chinofol auf Bakterien und Protozoen im Reagenzglas und im Tierkörper. — Zentralblatt für Bakteriologie. 1927. 3. Fröhner: Lehrbuch der Arzneimittellehre für Tierärzte, 7. Auflage, 1906.

Etwas vom Kronbeinbeuger des Pferdes.

(Mit 2 Abbildungen.)

Von Generaloberveterinär Dr. Vogt, Heidingsfeld.

Als ich Veterinärmedizin studierte, spielte bei der Untersuchung lahmer Pferde die Schulterlahmheit noch eine größere Rolle als heute. Während man heute nur eine Schulterlahmheit feststellt, wenn positive Symptome vorhanden sind und sich die Angaben des Besitzers mit diesen in Übereinstimmung bringen lassen, erkannte man früher auf diese Lahmheit, wenn an der kranken Gliedmaße keinerlei Befund gemacht wurde und vielleicht der Eigentümer auf eine Erkrankung der Schulter hindeutende Bemerkungen machte.

Daß dies so war, lag vielleicht nicht ganz allein auf der klinischen Seite, sondern die Anatomie trug auch etwas Schuld daran. Im anatomischen Unterricht wurde zu wenig Gewicht auf die Verhältnisse am unteren Gliedmaßenende gelegt — wenigstens an der Stelle, wo ich Anatomie hörte, während die sonstigen, in dieses Bereich gehörenden Themen in einer Weise vorgetragen wurden, die an Gründlichkeit und Plausibilität des Ausdruckes nichts zu wünschen übrig ließen. Bei den Präparierübungen gab man sich zu meist zufrieden, wenn man bis etwas über das Fesselgelenk hinunter, die anatomischen Zusammenhänge so gut als möglich klargelegt hatte. Und ab und zu trug es sich zu, daß einer von den Wissensbesseren den Auftrag erhielt, auch die Verhältnisse innerhalb der Hornkapsel dem forschenden Auge bloßzulegen. Diese tiefgehenden Studien waren bei uns schon deshalb nicht beliebt, weil das Abnehmen der Hornkapsel, ohne die untergelegenen Weichgebilde zu verletzen, immerhin einige Schwierigkeiten bot.

So war also schon durch die mangelnden anatomischen Kenntnisse von dem unteren Gliedmaßenende von vornherein kein besonderes Interesse für die Vorgänge an ihm vorhanden und so kam es, daß man dann, weil eben anderwärts aus Unkenntnis der anatomischen Beziehungen nichts anderes festgestellt werden konnte, den Sitz der Lahmheit in der Schulter suchte.


Erst der Lehrer und spätere Professor für Hufbeschlagkunde Gutenäcker, der aus der Reihe der Militär-Veterinäre hervorgegangen war und sich beim Militär überzeugt hatte, daß die Diagnose: Schulterlahmheit, in den meisten Fällen nur ein Notbehelf ist, betonte bei seinen Vorlesungen und Übungen immer wieder, daß der Sitz einer Lahmheit nur ganz ausnahmsweise oberhalb des Karpal- oder Taralgelenks zu suchen sei. Man müsse in erster Linie eine eingehende, gründliche Untersuchung des Hufes vornehmen und wenn diese ergebnislos verlaufe, sei das übrige distale Gliedmaßenende in jeder Hinsicht einer aufmerksamen Würdigung zu unterwerfen. Und wie oft habe ich mich später in Dankbarkeit der Hinweise Guten-

äcker's erinnert und seine Anschauung, daß eine Schulterlahmheit ein äußerst seltenes Vorkommnis ist, bestätigt gefunden.

Durch die Hinweise G., sowie anderer wurde erst die volle Aufmerksamkeit auf die anatomischen Verhältnisse des distalen Schenkelendes hingelenkt und mancher Ansatzstelle wurde mehr Bedeutung zugemessen, als es bislang geschehen war. Aber trotzdem, daß die makroskopische Anatomie der letzten Zeit sich viel mit dem Verlauf der Sehnen und Bänder und deren Ansatzstellen am distalen Ende der Extremitäten befaßt hat, scheint doch noch bis heute ein Unterschied im Verlaufe des Kronbeinbeugers der vorderen und hinteren Gliedmaßen noch nicht beschrieben worden zu sein. Wenigstens habe ich nichts in der mir zur Verfügung stehenden Literatur darüber gefunden.

Deshalb sei es mir gestattet auf die Verschiedenheit im Nachstehenden hinzuweisen und zwei Abbildungen nach der Natur beizufügen. Die Mitteilung ist das Ergebnis der Zerlegung einer Reihe von Pferden, insbesondere während des Krieges.

Die Abbildung großes A. stammt von der vorderen und die große B. von der hinteren Extremität, ferner bezeichnet kleines a. die Hufbein- und kleines b. die Kronbeinbeuge Sehne. Der Pfeil zeigt hufwärts.



Trennt man im Bereiche des Fesselbeins den Kronen- und Hufbeinbeuger in Verbindung miteinander vom genannten Knochen los und biegt die beiden Sehnen in ihrem natürlichen Zusammenhalt miteinander nach rückwärts, so daß man die Fläche, die sonst gegen das Fesselbein gerichtet ist, überblicken kann, so sehen wir, wie dies die Abbildung A. zeigt, daß von einem Rand des Kronenbeinbeugers zum andern sich eine zarte Haut hinüberbrückt, die durch ein längsrundes Loch eigentlich in zwei Spangen getrennt wird. Die Sehne des Hufbeinbeugers schimmert überall deutlich durch.

Verfahren wir mit der hinteren Gliedmaße in der gleichen Weise, so zeigt sich hier ein anderes Bild. Siehe Abbildung B.!

Vom äußeren Rand des Kronenbeinbeugers verläuft schräg von oben nach unten und innen über die Hufbeinbeuge Sehne hinweg zum entgegengesetzten Rand des Perforatus ein kräftiger, breiter Sehnenzug, der einen Bestandteil des Kronenbeinbeugers bildet. In das distale Drittel dieses Sehnenzuges mündet von der anderen Seite her ein feinerer Sehnenstreifen, der gleichfalls dem Kronenbeinbeuger angehört und ebenfalls von oben nach unten, gegen die Mitte hinzieht. Das runde Loch an der vorderen Gliedmaße ist hier mehr zitronenförmig verzogen und kleiner als dort. Ferner erweisen sich die über die Sehne des Hufbeinbeugers übergreifenden Ränder des Kronenbeinbeugers breiter und kräftiger als an der vorderen Extremität. Man

sieht es dem ganzen Gebilde schon auf den ersten Blick an, daß hier eine größere etwas anders geartete Leistung als vorne verlangt wird.

Da nun die sonstigen anatomischen Verhältnisse an den Vorder- und Hinterfüßen des Pferdes mit Ausnahme der eben geschilderten Abweichung gleich sind, so muß doch mit Rücksicht auf diese die Tätigkeit des Hinterbeines von der der Brustgliedmaße etwas abweichen. Und da dachte ich daran, daß der Hinterhuf sich nicht ganz in der gleichen Weise vom Boden abwickelt wie der Vorderhuf, sondern daß hierbei eine leichte drehende Bewegung von innen nach außen durchgeführt wird. Ahmt man diese Bewegung nach, so sieht man, wie sich zunächst der kräftige Sehnenfesselstraff anspannt. Und erst wenn dieser Sehnenfessel eine gewisse Anspannung erfahren hat, strafft sich der von der medialen Seite des Kronenbeinbeugers kommende, feinere Sehnenstreifen und läßt dadurch keine über ein bestimmtes Maß hinausgehende Anspannung des breiten Sehnenfessels, also keine Überdehnung, zu.

Dadurch aber, daß die beiden Sehnenzüge sich straff spannen, erhält der von ihnen im Verein mit den breiten Rändern des Kronenbeinbeugers umschlossene Hufbeinbeuger einen festen Gegenhalt und kann jetzt erst recht seine Wirkung auf das Hufbein entfalten. Auch wird auf diese Weise verhindert, daß der Hufbeinbeuger eine feine Struktur schädigende Lage einnehmen könnte.

Innere Medizin und Chirurgie.

Hasitschka, L.: Abheilung von Papillomen in der Mundschleimhaut eines Hundes mittels einmaliger subkutaner Injektion von Warzenbrei. (W. t. Mschr. 1927, XIV. Jahrg., S. 16.)

Verf. beschreibt einen Fall von Papillomen an der Mundschleimhaut eines Hundes, die sie z. T. abnahmen, daraus einen Extrakt mit physiol. Kochsalzlösung anfertigten, den sie dem Hund subkutan verabfolgten. Nach 14 Tagen waren sämtliche Warzen bei dem betr. Tier verschwunden. Berge.

Wirth, D.: Adams-Stokes'sche Krankheit bei zwei Pferden, bedingt durch Herzblock. (W. t. Mschr. 1927, XIV. Jhg., S. 1.)

Verfasser beschreibt zwei Fälle bei Pferden, wobei besonders die Herztätigkeit eingehende Berücksichtigung findet. Berge.

Diernhofer, K.: Operation nach Hofmann bei einer Kuh mit traumatischer Gastritis. (W. t. Mschr. 1927, XIV. Jahrg., S. 129.)

Verf. beschreibt einen Fall einer frischen, akuten Erkrankung, wo Anamnese und Symptomé eine völlige Durchwanderung des Fremdkörpers durch die Haubenwand nicht annehmen ließ und hatten mit der Operation nach Hofmann guten Erfolg. Der Fremdkörper bestand aus einem gebogenen Stück Kupferdraht, das mit einem Ende in der Haubenwand steckte. Da die Operation keine besonderen Zwangsmittel erfordert, macht sie außerdem auf den Besitzer einen guten Eindruck. Berge.

Aellig, A.: Diabetes mellitus (Schweiz. Archiv für Tierheilkde. 1926, Bd. 68, S. 415.)

Verf. hat den neueren Stand der Kenntnisse des Diabetes beim Menschen und dessen Behandlung mit Insulin an Hand einer großen Literatur und die in der veterinärmedizinischen publizierten Fälle bei Haustieren eingehend besprochen. Echter D. mellitus ist in 8—9 Fällen beobachtet worden. Seltener kommt er beim Rinde, mehr dagegen beim Hunde vor. — An einem eigenen Fall beim Pferd wird die Klinik des Falles, die Untersuchungsmethodik des Harnes auf Zucker und die Erscheinungen am Harn eingehend geschildert. Ebenfalls werden die Symptome an

einzelnen Organsystemen eingehend mit den Berichten aus der Literatur verglichen. Es wird daher auf das Original verwiesen. H. Graß.

Lehmeyer, B.: Untersuchungen über den Kohlen säure- und Wasserdampfgehalt der Stall-Luft. (Aus dem Tierhygienischen Institut der Universität München und aus der Praxis. — Vorstand: Prof. Dr. Karl Süpfle.) (Zeitschr. f. Infekt.-Krankh. d. Haust. 1927, 31, S. 36.)

Lehmeyer hat die Luft von 220 Stallungen seines Praxisbezirkes genau geprüft und kommt auf Grund seiner eingehenden Untersuchungen, die als Vorläufer nur die Arbeiten von Märker und Vollrath aus den Jahren 1869 und 1872 haben, zu folgendem Ergebnis: In den untersuchten Stallungen war der Kohlen säure- und Wasserdampfgehalt sowie die Temperatur nicht an allen Stellen gleich, sondern stieg im allgemeinen vom Boden zur Decke derart an, daß zumeist in der mittleren Stallhöhe die Luft die mittlere Zusammensetzung zeigte. Bei niedrigeren Außentemperaturen und fehlender künstlicher Lüftung ist der Temperaturunterschied zwischen der Luft am Boden und an der Decke besonders hoch (bis 4 Grad). Wünscht man Durchschnittsproben der Stallluft zu erhalten, so ist das sicherste Verfahren, zunächst für gründliche Mischung der Luft zu sorgen und dann aus der mittleren Stallhöhe Proben zu entnehmen. Bei 58 Untersuchungen der Stallluft ermittelte Verfasser 21mal einen Kohlen säuregehalt bis $2\frac{0}{100}$, 22mal von $2-3\frac{0}{100}$; in 12 Fällen fanden sich Kohlen säuremengen von $3-5\frac{0}{100}$, in 2 Fällen von $5-6\frac{0}{100}$ und in einem Falle $6,58\frac{0}{100}$. Die Temperatur der Ställe schwankte zwischen 11,6 und 28,8 Grad; in den meisten Fällen herrschte eine Stalltemperatur von 15—24 Grad. Die relative Feuchtigkeit betrug nur zweimal unter 70 Prozent, in 12 Fällen 71—80 Prozent, in 35 Fällen 81—90 Prozent, in neun Fällen sogar 91—95 Prozent. Verglichen mit der absoluten Feuchtigkeit der Außenluft erfährt der Wasserdampfgehalt der Luft im Stall stets einen Anstieg, der bis zu einer Vermehrung um das Dreifache führen kann. Sehr häufig überschreitet der Wasserdampfgehalt der Stallluft das gesundheitliche Optimum recht erheblich. Ein Vergleich größerer Beobachtungsreihen ergibt, daß die Beschaffenheit der Stallluft mittels

des Geruchsempfindens im großen und ganzen umso günstiger beurteilt wird, je niedriger der Kohlenäuregehalt ist; es wird jedoch Luft mit dem gleichen — niedrigeren oder höheren — Kohlenäuregehalt umso angenehmer empfunden, je niedriger die Lufttemperatur und der Wasserdampfgehalt ist. Im Einzelfall können objektive Befunde und subjektives Urteil gelegentlich auseinandergehen. Bei dem Material des Verfassers steigt der Kohlenäuregehalt der Stallluft nicht über 3⁰/₁₀₀, wenn den einzelnen Tieren ein größerer Luftkubus als 30 cbm zur Verfügung steht; beträgt der Luftkubus mehr als 40 cbm, so hält sich der Kohlenäuregehalt unter 2⁰/₁₀₀. Aber auch in manchen Stallungen, in denen auf ein Großtier nur 15 cbm fielen, konnte der Kohlenäuregehalt unter 2⁰/₁₀₀ bleiben, wenn nur eine ausreichende Lüftung stattfand. Ziegler.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Jármay, K.: Vorkommen von traumatisch entstandener Nebenmilz beim Hund. (Allatorvosi Lapok 1927, Nr. 12, S. 149.)

Im Anschluß an einen schon früher veröffentlichten Fall wird ein zweiter Fall von traumatisch entstandener Nebenmilz beschrieben bei einem nach Durchbruch eines älteren Leberhämatoms an innerer Verblutung unverhofft umgefallenen 9 Jahre alten Hunde, der vor einem Jahre von Stockhöhe gestürzt war, den Unfall aber anscheinend ohne jeden Schaden ertragen hatte. Neben der durch mehrere narbige Einziehungen stark verunkelteten Milz befanden sich mit dem großen Netz in Verbindung stehende Nebenmilzen in der Zahl von 483 und in der Größe eines Mohnsamens bis einer Linse.

Marek.

Waldenström, H.: Über das Entstehen und Verschwinden des Amyloids beim Menschen. (Klin. Wochenschrift 1927, S. 2235.)

Nach der seitherigen Annahme kann das einmal abgelagerte Amyloid nicht mehr verschwinden und die betr. Patienten gehen an diesem Leiden früher oder später zugrunde. Als klinische Zeichen für Amyloidose werden bei heruntergekommenen Individuen bis jetzt angesehen: vergrößerte Leber und Milz sowie Albumin im Harn, ohne daß unter diesem Gesichtspunkte eine sichere Diagnose möglich war. Letztere läßt sich nur durch Organpunktion mit anschließender mikroskopischer Untersuchung stellen. Zu diesem Zwecke konstruierte Verf. eine besondere Punktionsnadel, mit der man aus der Leber Stückchen von 1,5 mm Dicke und ca. 2 cm Länge herausnehmen kann, und die eine histologische Diagnose gestatten. Auf diese Weise wurde bei zehn an einer mischinfizierten Gelenktuberkulose leidenden Patienten die Krankheit festgestellt. In weiteren drei Fällen von hochgradiger Amyloidose der Leber konnte nach derselben Methode das Verschwinden des Amyloids nachgewiesen werden und die betr. Kranken wurden vollständig gesund. Die Gefundung trat ein, als es gelang, die Fisteln zur Heilung zu bringen. Reichliche Eiterabsonderung ist nach der Auffassung des Autors die Hauptursache der Amyloidbildung. Immerhin bedarf es dazu einer Zeit von 1—2 Jahren nach Beginn des Eiterflusses. Die gangbare Ansicht, daß bei Amyloidose der Niere der Harn eiweißhaltig sei, konnte nicht bestätigt werden.

Carl.

Claussen: Untersuchungen über die Histogenese des Nierentuberkels. (Virchows Archiv Bd. 266, 1927, S. 456.)

Das Material für die vorliegende Arbeit stammt vom Schlachthofe in Hamburg. Es wurden hauptsächlich kleine, oft nur mit der Lupe erkennbare Herde zur Untersuchung herangezogen. Die Ergebnisse der mit 11 Abbildungen ausgestatteten Veröffentlichung sind folgende:

1. Die ersten Veränderungen bei der miliaren Nierentuberkulose beim Schwein und Rind finden sich stets im intertubulären Gewebe der Rindenschicht in Gestalt kleiner zelliger Herde zur Hauptfläche aus Epitheloidzellen be-

stehend, zwischen denen regellos Lymphozyten eingestreut sind. Eine primäre tuberkulöse Erkrankung der Glomeruli, wie sie bei der experimentellen Nierentuberkulose die Regel ist, kommt bei der Infektion auf natürlichem Wege nicht vor; die Nierenkörperchen erkranken stets erst sekundär von ihrer Umgebung aus.

2. An der Bildung der typischen Zellen des Tuberkels, der Epitheloidzellen, beteiligen sich außer den Histiocyten des Zwischengewebes die Endothelien der intertubulären Kapillargefäße. Das Nierenepithel kann nur als mittelbar und unter gewissen Umständen an der Bildung der zelligen Bestandteile des Tuberkels mitbeteiligt gelten. Eine direkte Teilnahme durch primäre Wucherung der Epithelien in irgendeinem Kanalabschnitt läßt sich nirgends feststellen.

3. Die voll entwickelten miliaren Tuberkel zeigen die bekannte Zoneneinteilung: eine ausgedehnte Epitheloidzellenzone im Zentrum, von einem mehr oder weniger schmalen Lymphozytenfaum umgeben. Ein lymphozytäres Stadium des Tuberkels läßt sich nicht nachweisen.

4. In den Epitheloidzelltuberkeln treten regelmäßig regressive Veränderungen ein, welche durch das Erscheinen zahlreicher Leukozyten im Zentrum der Herde eingeleitet werden. Sie beginnen mit Fettablagerung in einzelnen Zellen, und nach und nach kommt es zur Verkäufung mehr oder weniger des ganzen Herdes.

Eine Unterscheidung der Tuberkel in „lockere“ und „feste“ ist unbegründet; die festen Tuberkel Mosers sind lediglich Epitheloidzelltuberkel mit den ersten Anzeichen von Zerfallsercheinungen.

Carl.

Galli-Valerio, B. et M. Bornaud: Sur quelques maladies parasitaires des petits animaux domestiques observées dans le canton de Vaud. (Schweiz. Arch. f. Tierheilkde 1927, 69, S. 519.)

Es handelt sich um eine auf systematischer Grundlage beruhende Zusammenstellung von Mikroben und höheren Parasiten an kleinen Haustieren; wie sie in Lausanne und in der Waadt vorkommen. **Pflanzliche Parasiten:** 1. *Bacteriaceae*: *Sarcina tetragena* (kontagiöse Pneumonie des Meerschweinchens). *Streptoc. lanceolatus* (Lungenempyem der Katze); *B. pseudotub. rodentium* (subkutane Abszesse beim Kaninchen); *B. avicidum* Kitt (von Österreich mit Geflügel eingeschleppt; feuchenhaft). *B. cuniculi pneumonicus* (tödliche Pneumonie des Kaninchens); *B. cholerae suum* (Schweinpest, intestinal und pulmonal); *B. sanguinarium* (beim Geflügeltyphus). — 2. *Actinomyceten*. *Coryneb. diphth. avium* (in den Pseudomembranen beim Huhn); *Coryneb. pyogenes* (in Abszessen bei Schwein und Ziege; *Mycob. tuberculos. Koch. var. bovinum* (bei Katze und Kaninchen). — *avium* (Leber); *Actinomyces caprae* (Lunge Ziege); *Act. bovis* (bei der Katze). 3. *Hyphomyceten*: *Epidermophyton gallinae* (Favus beim Huhn); *Aspergillus fumigatus* (bei Hühnern). 4. *Saccharomyceten*: *S. guttulatus* (bei Kaninchen als pathogenes Darmbakterium). **Tierische Parasiten:** a) *filtrierbare Virus Leukaemie der Hühner*, übertragbares Sarkom beim Huhn; b) *Protozoen*: *Eimeria stiedae* (Kaninchen, Gehirn-Herderkrankungen); *E. avium* (feuchenhaft bei Hühnern und Tauben); *E. rivoltai* (bei Katzen und starkem Durchfall als Kokzidien); *Haemogregarina* (im Blut eines Hahnes mit starker Anämie); *Lambia intestinalis* (var. *cuniculi*: bei Kaninchen mit starker Enteritis); *Trichomonas caviae* (bei Meerschweinchen als Erreger feuchthafter Diarrhoe). — c) *Cestoden*. *Dibotriocephalus latus* (bei Hunden und Katzen mit starken Darmstörungen und Gehirnsymptomen); *Taenia serrata* (bei Hunden und Kaninchen, als Zystizerken in der Bauchhöhle); *T. marginata* (beim Hund selten, mehr bei Kälbern); *T. crassicolis* (häufig bei Katzen, Mäusen). *Multiceps serialis* (selten beim Kaninchen); *M. cerebralis* (selten beim Schaf); *Dypilidium caninum* (mit Askariden häufig vergesellschaftet, bei Hunden

und Katzen; die Larve [*cryptocystis trichodectis* auf *Pulex irritans* und *Ctenocephalus serraticeps*]); *Hymenolepis exilis* (bei Hühnern); *Davainea tetragona* (bei Hühnern und Küken); *Choanotaenia infundibuliformis* (feltener beim Huhn). — d) *Nematoden*: *Strongyloides longus* (gelegentlich beim Schwein); *Trichosoma aërophilum* (einmal in der Luftröhre der Katze); *Tr. tenuissimum* (bei Tauben); *Tr. collare* (beim Huhn); *Trichocephalus unguiculatus* (mitunter häufig beim Kaninchen); *Strongylus apri* (in Lungen des Schweines); *Str. pusillus* (selten in der Lunge bei der Katze); *Ollulanus tricuspis* (einmal bei der Katze); *Mucinaria trigonocephala* (einmal bei der Katze mit Anämie und Epilepsie); *Oxyuris ambigua* (häufig bei Kaninchen); *Heterakis maculosa* (bei Tauben, Enteritis); *H. perspicillum*, *H. papillosa* (bei Enteritis, Typhlitis des Huhnes); in 141 Kotproben des Hundes waren 0,5 Prozent *Asc. canis*, 0,5 Prozent *Mucinaria*, 1 Prozent *Dipylidium canis*, 3 Prozent *Taenia serrata*, 3 Prozent *Dibotr. latus*. e) *Arthropoden*: *Demodex follicul. var. caprae* (einmal bei der Ziege); *Chorioptes auricularum var. cati* (bei Otitis der Katze); *Psoroptes communis var. ovis* (häufig bei Hammeln); *var. cuniculi* (häufig im Ohr des Kaninchens, dadurch schwere Otitis); *Sarcoptes minor var. cati* (häufig bei Katzen, konnte auf Kaninchen übertragen werden, 1 Fall); *S. mutans* (häufig an den Füßen beim Huhn); *S. laevis* (im Gefieder beim Huhn); *Lophoptes patavinus* (sehr selten beim Huhn); *Cheiletiella parasitivorax* (beim Kaninchen); *Argas reflexus* (bei Tauben); *Ixodes hexagonus* (feltener beim Hund); f) *Insekten*: *Menopon pallidum* (häufig bei Küken); *Gyropus gracilis* (besonders bei jungen Meerfischweincheln); *Trichodectus subrostratus* (selten bei der Katze); *Tr. sphaerocephalus* (häufig beim Schaf); *Tr. latus* (häufig beim Hund); *Haematopinus pilifer* (häufig beim Hund); *H. ventricosus* (gelegentlich beim Kaninchen); *H. suis* (ziemlich häufig beim Schwein); *Ceratophyllus fasciatus* (bei Meerfischweincheln, die sich bei Ratten aufhalten); *Melophagus ovinus* (bei Schafen, ist Träger vom *Trypanosoma ovis*). — Die vorliegenden Ergebnisse wurden ausführlicher mitgeteilt, weil es sich um eine planmäßig angelegte statistische Sammlung des Universitätsinstitutes von Laufanne handelte. H. Graf.

Sedlmayr, G.: Über den Nachweis von Parasiteneiern und Parasiten bei Haustieren. (Zeitschr. f. Vet.-Kunde 1927, Jahrg. 39, H. 12, S. 473—493.)

Nach den Versuchen des Verf. haben sich von den zum Nachweis von Parasiteneiern im Kot empfohlenen Anreicherungsflüssigkeiten gefättigte Rohrzuckerlösungen am besten bewährt. Auch mit Glyzerin sind gute Ergebnisse erzielt worden. Dagegen war die Zahl der mit Hilfe von konzentrierter Kochsalzlösung und von Wasserglas-mischungen ermittelten Parasiteneiern wesentlich geringer. Die beiden letztgenannten Anreicherungsflüssigkeiten haben sich auch infolgedessen weniger zweckmäßig erwiesen, als bei der Kochsalzmethode die Proben rasch auskristallisierten und bei der Wasserglas-methode die Glasgefäße angegriffen wurden. Zunehmend war nach 90 Minuten dauernder Anreicherung die Ausbeute an Eiern am größten. Auf die Zuhilfenahme der Zentrifuge neben der physikalischen Anreicherung kann verzichtet werden (ausgenommen beim Nachweis von Leberegeleiern). Es wird ein Flottationszylinder zur Anreicherung von Parasiteneiern angegeben, der sich gut bewährte. Die Äther-Salzäuremethode nach Telemann und die Antiformin-Äthermethode nach Yaoita bieten den Flottationsmethoden gegenüber keine Vorteile. Die Steck-sche Zählplattenmethode leistet besonders bei der quantitativen Feststellung nicht flottabler Parasiteneier gute Dienste. Von 38 Reichwehrrpferden, deren Kot mittels verschiedener Methoden untersucht wurde, erwiesen sich 100 v. H. mit Strongylien behaftet. Von den bei diesen Pferden insgesamt gezählten 10 620 Parasiteneiern stammten

10 592 von Strongylien und 28 von Askariden. Allein auf Grund der Längen- und Breitenmaße lassen sich nach den Erfahrungen des Verf. Parasiteneier nicht mit Sicherheit unterscheiden. Zur Gewinnung von Strongylienlarven-Reinkulturen hat sich die von Usami angegebene Methode als sehr wertvoll erwiesen. In Pferdefäzes enthaltene Strongylien-eier gingen bei Austrocknung der Kotballen ziemlich rasch zugrunde. Die intrakutane Einspritzung alkoholischer Sklerostomum-extrakte rief bei Pferden, die mit Sklerostomen behaftet waren, eine deutliche Hautreaktion hervor. A.—

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Günther, G.: Die Rattenkämpftage Wien 1927. (W. t. Mskr. 1927, XIV. Jahrg., S. 321.)

Verf. berichtet über seine Erfahrungen über Rattenbekämpfung. Als Präparat empfiehlt er Meerzwiebel. Der ausgelegte Köder muß eine gute Witterung haben, z. B. nach Heringslake. Fleischgeruch ist nicht zu empfehlen, da den Ratten gewöhnlich Fleischnahrung zur Verfügung steht. Der Köder darf nicht mit den Händen berührt werden. Ein von den Ratten einmal verschmähter Köder wird nie wieder von ihnen angerührt. Als erprobte Gifte kommen in Frage Virusyl, Ratimors sowie das sogenannte Rattenmus. Berge.

Lässer, P.: Zur Diagnose der Lyssa durch Präzipitation. (Zeitschr. f. Immunitätsforsch. 1927, Bd. 53, S. 1.)

Kaninchen-sera, die nach zerebraler Infektion mit Virus fixe und Straßenvirus durch Ausbluten der Tiere in der Agonie gewonnen wurden, wiesen einen sehr geringen Gehalt an Präzipitin auf. Die durch längere Vorbehandlung von Kaninchen gewonnenen Lyssa-immunsera eigneten sich im allgemeinen gut als präzipitierende Sera, doch wiesen sie in ihrer Wirkungsweise große Unterschiede auf. Zwei gut präzipitierende Seris wurden zu Präzipitationsversuchen mit einer größeren Anzahl Extrakten von Lyssagehirnen verschiedener Herkunft herangezogen. Dabei wurden in fast allen Fällen positive Resultate erzielt. Durch weitere Versuche wurde aber festgestellt, daß Lyssaantigene nicht nur mit Lyssa-immunseris, sondern auch mit Immunseris anderer neurotroper Virusarten (Staupe, Borna, Hühnerpest u. a.) präzipitierten. Es zeigte sich also, daß der Lyssa-Präzipitation keinerlei Spezifität zukommt. Meyn.

Koldajew, B.: Ergebnisse der antirabischen Impfungen nach der Pasteur'schen und der „Verdünnungs“-Methode. (Aus der Pasteur-Abteilung des Bakteriologischen Institutes in Kiew. — Abteilungsvorstand: J. M. Zwikis; Direktor Professor M. P. Neschtschadimenko.) (Zeitschr. f. Hyg. 1927, 107, Heft 3/4, S. 523.)

Auf Grund seines umfangreichen Materials kommt Verfasser zu folgenden Schlußfolgerungen:

Bei der Impfung nach der Pasteur'schen Methode wird der Prozentsatz der Gesamt- und der reduzierten Sterblichkeit durch die Verstärkung der Methode (Einführung von 1 Tag lang getrocknetem Mark in das Impfungsschema) vermindert. Bei dem Ersatz des 1- und 2tägigen Markes durch frisches Mark in der Verdünnung 1:400, 1:600 nimmt die Häufigkeit der Hydrophobiefälle noch weiter ab. Die besten Resultate im Bezug auf die Häufigkeit der Hydrophobie-Erkrankungen ergab aber die Verdünnungsmethode; bei dieser Methode wurden in Kiew keine Fälle reduzierter Sterblichkeit beobachtet. Postvakzinale Komplikationen traten sowohl bei der Pasteur'schen als auch bei der Verdünnungsmethode auf; bei der letzteren sind sie aber viel häufiger und ergeben einen merklich höheren Prozentsatz der Todesfälle.

Bei der Anwendung der kombinierten Pasteur'schen + Verdünnungsmethode wurden unter 10 403 Geimpften keine Komplikationsfälle beobachtet. In der

Ätiologie der postvakzinalen Komplikationen spielt das *Virus fixe* zweifelsohne eine Rolle. Die Häufigkeit der Komplikationen bei der Verdünnungsmethode hängt nicht allein von den biologischen Eigenschaften des Virus, sondern auch von der Methode selbst ab (Verimpfung des „frischen“ Markes). Die Gesamtzahl der Todesfälle bei den Geimpften (Hydrophobie und tödliche Komplikation) ist bei der Verdünnungsmethode bedeutend geringer als bei der Pasteur'schen. Ziegler.

Gravesen: Beitrag zur Beurteilung der Wirkung des Sanocrysin gegen Lungentuberkulose. (Beiträge z. Klinik d. Tub. 1927, Bd. 66, S. 117.)

Die Arbeit liefert einen kafuistischen Beitrag zur Lösung der Frage, ob bei Verwendung von Sanocrysin solche augenfällige Besserungen beobachtet werden, wie sie im gleichen Zeitraum bei irgendeiner anderen zur Verfügung stehenden Behandlungsmethode nicht erwartet werden können, die daher in gleiche Linie mit der chemospezifischen Wirkung bei anderen Krankheiten gestellt werden müssen. Diese Frage beantwortet der Verf. auf Grund des vorgelegten Materials von im ganzen 10 Fällen bejahend. Die mitgeteilten Fälle repräsentieren alle mehr oder weniger schwere Formen von Tuberkulose, bei denen die Sanocrysinbehandlung in augenfälliger Weise eine frische Tuberkulose zum Stillstand gebracht hat, so daß das Leiden bei den acht ersten mitgeteilten Fällen ohne spätere Rezidive zum Stillstand kam, während bei den letzten Patienten mit Hilfe des Sanocrysin Bedingungen für ein positives und anscheinend dauerndes Resultat durch Kombination dieser Behandlung mit der Kollapstherapie geschaffen wurden. Meyn.

Kovářík, K.: Behandlung auf Tuberkulin reagierender Tiere mit dem Friedmann'schen Präparat. (Allatorvosi Lapok, 1927, Nr. 20, S. 249.)

In einem Rinderzuchtbestand mit 1040 Kühen, 918 Kalbinnen und Jungtieren sowie mit 54 Zuchttieren, wo der allgemeinen Erfahrung nach mit der Reaktion eines sehr hohen Prozentsatzes der Tiere zu rechnen war, wurden die nur reagierenden, klinisch jedoch gesund erscheinenden Tiere einer Behandlung mit dem Friedmann'schen Präparat unterzogen, daneben aber zur Hebung der Widerstandsfähigkeit des Gesamtorganismus die Tiere im Freien gehalten und der Einwirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt, ferner die offensichtlich kranken Tiere aus dem Bestande entfernt. Obwohl die insgesamt an 140 Tieren — meist Kühen — ausgeführten Versuche zwar auf die wissenschaftliche Begründung dieses Impfungsverfahrens keine Schlüsse zu ziehen gestatten, in praktischer Beziehung läßt sich aus deren Ergebnis entnehmen, daß mit der Hilfe der Behandlung fast die Hälfte der behandelten Tiere (45 Prozent), und namentlich eben die wertvollsten Zucht- und Milchtiere, als nach Monaten nicht mehr reagierende Tiere, für den wirtschaftlichen Betrieb zu retten waren. Marek.

v. Babarczy und Köpf: Erfahrungen mit dem Friedmann'schen Mittel. (Beitr. z. Klin. d. Tub. 1927, Bd. 66, S. 555.)

Verff. sahen bei Verwendung des Friedmann'schen Mittels weder eine so hochgradige Verbesserung noch Verschlechterung, daß eine Stellungnahme für oder gegen das Mittel ausreichend begründet wäre. Meyn.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Fincher, M. G. und W. L. Williams: Gehemmte Entwicklung der Müllerschen Gänge, verbunden mit Inzucht. Mit 20 Abbildungen. (The Cornell Veterinarian 1926.) (Medizinische Abteilung und ambulatorische Klinik, N. Y. State Veterinary College, Cornell University.)

Die hier verzeichneten Beobachtungen wurden in einer Herde reingezüchteter Holländer Kühe gemacht, die ursprünglich aus annähernd 30 weiblichen Tieren und einem Bullen bestand. Die Herde war erst kürzlich gefammelt

worden, und die Einzeltiere waren nicht verwandt. Über den guten anatomischen Zustand der Geschlechtswerkzeuge der Vorfahren irgend eines der Einzeltiere war kein Bericht zu erlangen. Unter den weiblichen Tieren wurden keine anatomischen Mängel der Geschlechtswerkzeuge entdeckt. Der Bulle war im Alter von ungefähr 7 Monaten gekauft worden. Seine Mutter warf wenigstens noch fünf Kälber nach seiner Geburt. An dem Bullen war klinisch kein anatomischer Mangel zu entdecken. Seziert wurde er nicht.

Die Paarungen des Bullen mit den ursprünglichen weiblichen Tieren hatten Erfolg, die Nachkommenchaft war recht groß, kräftig und hoffnungsvoll. Soweit bekannt ist, hatte die ganze Nachkommenchaft anatomisch gesunde Geschlechtswerkzeuge. Die männlichen Nachkommen wurden zuweilen als Kälber zu Zuchtzwecken verkauft, und keiner wurde als steril zurückgegeben.

Die Färnkälber wurden in der Herde zurückbehalten, bis sie geschlechtsreif wurden, und wurden dann von ihrem Vater trächtig. Das Verfahren erschien dem Besitzer höchst befriedigend. Die Durchschnittszahl der Kälber, die man durch die blutschänderische Zucht erhielt, war völlig befriedigend, und nach der ganzen äußeren Erscheinung war die Nachkommenchaft von ganz besonderer Güte. Die männlichen Kälber aus dieser engen Züchtung wurden zu Zuchtzwecken verkauft. Eins wurde als steril zurückbehalten, die Natur der Sterilität erkannte man aber nicht. Die Resultate erschienen so befriedigend, daß die blutschänderische Zucht fortgesetzt wurde, bis die älteren Färnen das Zeugungsalter erreicht und einige von ihnen allen Anstrengungen, sie trächtig zu bekommen, widerstanden hatten. Eine klinische Prüfung von Fall 1 deckte unüberwindliche anatomische Mängel ihres Zeugungssystems auf. Sie war geschlachtet worden, aber ihre mangelhaften Geschlechtswerkzeuge erweckten nur einzelnes Interesse. Wenige Wochen später wurde Fall 9 aus demselben Grunde geschlachtet. Die beiden so dicht aufeinander aus derselben Herde beobachteten Fälle veranlaßte uns, nachzuforschen, ob zwischen ihnen ein Zusammenhang bestünde. Dadurch bekamen wir Kenntnis von der uns bisher unbekannten blutschänderischen Zucht, und dies bewog uns, die weiblichen Tiere in der Herde, die zu der durch Inzucht erzeugten Gruppe gehörten, allgemein zu prüfen. Alle Färnen mit unüberwindlichen Mängeln der Geschlechtswerkzeuge wurden geschlachtet, und ihre Geschlechtswerkzeuge wurden zur Untersuchung erworben.

Die Ovarien und die Vulva sind in jeder Beziehung normal. Die Abweichungen sind auf diejenigen Teile des Geschlechtssystems beschränkt, welche von den Müllerschen Gängen stammen. Von diesen sind nicht alle betroffen. Die kranial gelegenen oder die Ovarialabschnitte dieser Gebilde haben sich nicht sichtlich an den Abweichungen beteiligt. Hier sind regelmäßig anscheinend normale Ovidukte vorhanden. Die normale Entwicklung ist in allen Fällen kaudal über die Fallopischen Röhren auf wechselnde Entfernungen fortgeschritten. In den Fällen 1—12 einschl. ist die Entwicklung über die Ovidukte hinaus nur auf eine kurze Entfernung fortgeschritten. In diesen ist die Müllersche Bauart auf eine kurze Entfernung in der Uterinfläche in Aushöhlungen oder Röhrenbildung übergegangen und ist dann gehemmt worden.

Daher sind in diesen Fällen funktionelle Ovarien, Ovidukte und uterine Spitzen vorhanden. Infolgedessen traten, sobald die Färnen die Geschlechtsreife erlangt hatten, Brunst, Ovulation und Menstruation auf. Da hier kein Abfluß für die Menstruationsflüssigkeit war, blieb sie in den Uteruspitzen eingesperrt und veranlaßte die auf den Abbildungen erläuterten Retentionszysten.

In den Fällen 1—12 einschließlich, in denen die Röhrenbildung des Müllerschen Organs gehemmt war, nahe der

Uteruspitze, verschwinden alle identifizierbaren Spuren davon auf einige Entfernung. Dort scheinen Bindegewebsbündel vorhanden zu sein, die von einer dicken Schicht des Peritoneums umgeben sind.

Weiter kaudal erscheinen die Müllerischen Organe wieder als sehr harte, dicke, parallele Stränge, die im Durchmesser von kaum erkennbarer Größe bis zu mehr als anderthalb inch¹⁾ wechseln. Sie werden in nächster Nähe durch einen gemeinschaftlichen Peritonealüberzug und durch lockeres alveoläres Gewebe festgehalten. Hier sind ihre Wände nicht verschmolzen. Bei diesen Individuen, bei denen eine Vagina ohne Zervix oder Uterus entwickelt ist, endet der abweichende Strang etwas undeutlich in der vorderen Vaginalwand ungefähr in der Gegend, wo die Zervix sich bilden sollte. In einigen Fällen ist keine Vagina vorhanden. In diesen enden die Müllerischen Gebilde plötzlich in der kranialen Wand der Vulva (proktodeale Grube). Die abweichenden Müllerischen Stränge scheinen auf dem Querschnitt aus äußerst dichtem, fibrösem Gewebe zu bestehen und zeigen im Zentrum, was dem bloßen Auge als ein sehr schwaches Lumen erscheint. Histologisch ist an einigen Stellen ein Lumen zugegen. Die abweichenden Müllerischen Stränge erscheinen abnorm lang und messen 14 inches. Sie stellen den größeren Teil des Uterus, die Zervix und bei einigen die Vagina dar. Mehr oder weniger normale Vaginae haben sich in sieben von den dreizehn sehr abweichenden Einzelweifen entwickelt (Fälle 1, 2, 9—13).

Man muß sich erinnern, daß die Fallopiischen Röhren, der Uterus, die Zervix und die Vagina im Embryo von den Müllerischen Organen abstammen, zwei parallelen Strängen, welche normal röhrenförmig werden. Sie liegen nahe beieinander und in den beiden regelmäßig verschmolzenen kaudalen Segmenten verschwinden ihre Innenwände, und eine gemeinschaftliche Röhre bildet die Zervix und die Vagina. In dem Uterinsegment wechselt der Grad der Verschmelzung der Müllerischen Gänge sehr nach den Arten. Beim Weibe ist die Verschmelzung virtuell vollständig, es bildet sich ein einfacher Uterus. Bei den Solipedes ist die Verschmelzung am kaudalen Ende ausgedehnt, aber eine annähernd gleiche Fläche am kranialen Ende verschmilzt nicht, es bildet sich ein geräumiger Uteruskörper mit Uterushörnern von gleicher Ausdehnung. In der Veterinärliteratur nimmt man bei der Kuh einen Uteruskörper und zwei ausgedehnte Hörner an. Es ist kürzlich bewiesen worden, daß dies eine Täuschung ist. Hier ist kein Uteruskörper. Hier sind zwei Uteri (oder wenn man so sagen will) zwei Hörner, die an ihrer Basis kommunizieren und eine gemeinsame Zervix haben.

Daß die abweichenden Müllerischen Körper in ihren kaudalen Segmenten bei diesen Tieren nicht verschmelzen, scheint von der Natur beabsichtigt zu sein, um sie in ihrer Röhrenbildung zu hemmen. Gerade in jenen Fällen, wo die Röhrenbildung der Müllerischen Körper gut vorgeschritten oder vollständig war, merkte man das Streben, sie in ihrer Verschmelzung zu hindern. So bleiben im Fall 13 die Uteri und die Zervix gänzlich getrennt und bilden den *Uterus didelphys*. Dieselbe Neigung ist in den Fällen 14—15 zu sehen, in denen die Innenwände der beiden Gebilde zum Teil im Zerviko-vaginalsegment bestehen bleiben und am os uteri externum fenkrechte Muskelpfeiler bilden, welche eine doppelte Zervix oder Vagina andeuten.

Unter den 23 weiblichen Tieren, die aus der blutschänderischen Zucht herrühren, waren die Abweichungen in den Fällen 1—13 (56,5 Prozent) so ausgedehnt, daß sie diese technisch oder virtuell (der Wirkungskraft nach) steril machten. Die Fälle 14—15 (13 Prozent) waren fehlerhaft, aber technisch fruchtbar; und die Fälle 17—23 (30,5 Prozent) waren anscheinend normal. Die wirtschaftliche Beständigkeit einer

Herde hängt notwendig von der regelmäßigen Produktion einer überreichen, wirklichen weiblichen Nachkommenschaft ab. Die blutschänderische Zucht in dieser Herde wurde drei Jahre lang fortgesetzt, bevor die Ergebnisse wahrgenommen wurden, und die Herde wurde zu jenem Zeitpunkt als eine Einheit heftig beschädigt. Bei 69,5 Prozent der weiblichen Nachkommenschaft mit höchst mangelhaften Geschlechtsorganen könnten diejenigen, welche anscheinend normal waren, nicht hoch eingeschätzt werden.

Die 23 durch Inzucht gewonnenen Färken waren zwischen Februar 1920 und September 1923 geboren. Im Juli 1925 verblieben fünf (Fälle 15, 16, 17, 18 und 19) in der Herde als Zuchtvieh. Von der ganzen Gruppe von 23 weiblichen Tieren weiß man, daß sie acht Kälber erzeugt und neunmal abortiert hat. Drei (Fälle 14, 22 und 23) wurden verkauft, während sie trächtig waren. Fall 21 wurde im Alter von 2 Jahren verkauft, nachdem die Färse abortiert hatte.

Die 23 weiblichen Tiere aus der blutschänderischen Zucht wurden von 18 Müttern erzeugt. Diese sind in den beige-fügten Krankheitsberichten durch die Buchstaben „A“ bis „R“ bezeichnet worden. Die Mutter A erzeugte drei Färken mit ihrem Vater; B, C und F je zwei.

Krankheitsberichte.

Fall 1, Fig. 1. Nachkömmling von Mutter A. (Siehe auch Fälle 21 und 22.) Die Färse war mehrere Male gedeckt worden. Die Brunst hatte mitunter mehrere Tage gedauert. Geschlachtet im Alter von 32 Monaten.

Vulva V, ist eng und ungewöhnlich verlängert.

Der linke Müllerische Gang, M, ist durch eine dickwandige Röhre, 1 inch im Durchmesser, an der vulvo-müllerischen Naht dargestellt. Sie erstreckt sich nach vorn ungefähr 10 inches und wird ein sehr dünner, derber Strang nahe dem Ovarialende. Hier ist eine mit käsigem Material gefüllte Höhle in der mit M bezeichneten Gegend. Diese Höhle hat einen Durchmesser von $\frac{3}{4}$ inch und ist 5 inches lang. Am ovarialen Ende des Koronalaabschnittes ist der Gang zu einer mit Menstruationsresten gefüllten Zyste C. A. H. erweitert. Sie ist 3 inches lang und 6 inches breit. Der rechte Müllerische Gang ist sehr schwer zu verfolgen, erweitert sich aber am ovarialen Ende und bildet einen Sack, der dem links ähnlich ist.

Beide Ovidukte scheinen normal und hängen, wie in allen diesen Fällen, mit der zystenartigen Spitze des unentwickelten Uterushornes zusammen. Das rechte Ovarium ist $2\frac{1}{2}$ inches lang und $1\frac{1}{2}$ inches breit und blasenähnlich. Das linke Ovarium hat einen Durchmesser von $\frac{3}{4}$ inches und enthält ein Corpus luteum.

Fall 2, Fig. 2. Nachkomme von Mutter B. (Siehe auch Fall 3.) Die Färse trächtig zu bekommen, war einige Male versucht worden. Geschlachtet im Alter von 33 Monaten.

Vulva V, ist eng, konisch und ungefähr 4 inches lang.

Die Müllerischen Gänge werden durch zwei derbe Stränge, die sich vor der vulvo-müllerischen Naht bis zur Ovarialgegend erstrecken und parallel verlaufen, dargestellt. Diese Stränge messen am Vulvaende $\frac{3}{4}$ inches im Durchmesser und sind 11 inches lang. Sie werden schwächer und sind am Ovarialende schwer zu verfolgen. Sie sind dann erweitert und bilden zwei Zysten, welche die Spitzen der Uterushörner darstellen. Die sackähnliche Erweiterung nahe dem rechten Ovarium mißt $2\frac{1}{2}$ inches im Durchmesser und enthält eine bräunliche Flüssigkeit — Menstruationsüberreste. Der rechte Sack mißt $1\frac{1}{4}$ inches im Durchmesser und liegt nahe dem rechten Ovarium. Beide hängen mit den anscheinend normalen Ovidukts zusammen.

Das rechte Ovarium ist $1\frac{1}{2}$ inches lang und 1 inch breit. Es enthält eine Zyste sowie ein Corpus luteum. Das linke Ovarium mißt 1 inch im Durchmesser und ist fibrös.

Fall 3, Fig. 3. Nachkomme von Mutter B. (Siehe auch Fall 2.) Mehrmals gedeckt. Im Alter von 20 Monaten geschlachtet.

Die Vulva ist äußerst eng und 4 inches lang.

Die Müllerischen Gänge werden durch zwei derbe Stränge dargestellt, von denen jeder $\frac{1}{2}$ inch im Durchmesser mißt. Sie verlaufen parallel

¹⁾ inch = 2,54 cm.



kranial von der Vulva auf eine Entfernung von 11 inches, erweitern sich dann und bilden zwei Zysten. Diese stellen die Spitzen der Uterushörner dar und sind mit dunkelrötlicher Flüssigkeit — Menstruationsresten — gefüllt. Der rechte Sack ist 6 inches lang, 4 inches breit und enthält ein Pint²⁾ Flüssigkeit. Der linke ist ungefähr halb so groß.

Die Ovidukte erscheinen normal. Das rechte Ovarium ist 1 inch lang, $\frac{1}{2}$ inch breit und enthält eine Zyste sowie ein kleines Corpus luteum. Das linke Ovarium ist $1\frac{1}{2}$ inches lang, $\frac{3}{4}$ inch breit und besteht fast vollständig aus einem Corpus luteum. (Fortf. folgt.)

Bass.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Isabolinsky und Gitowitsch: Über die antigenen Eigenschaften der Anatoxine. (Zeitschr. für Immunitätsf. 1927, Bd. 52, S. 334.)

Verfasser ziehen aus ihren Beobachtungen an Diphtherie-Anatoxinen folgende Schlüsse:

1. Die Bindungsfähigkeit hat bei der Auswertung des Anatoxins viel größere Bedeutung als seine präzipitierenden Eigenschaften.
2. Das während eines Jahres aufbewahrte Anatoxin verliert seine Immunisierungsfähigkeit nicht.
3. Zur Gewinnung der Anatoxine sind alte Toxine zu benutzen, die einen guten Bindungswert besitzen, was wichtiger ist als die Toxizität derselben.
4. Das Hinzufügen von mit Lauge neutralisierter Formalinlösung zum Toxin vermindert wesentlich die antigenen Eigenschaften der gewonnenen Anatoxine.
5. Das bei Hinzufügung von 5 % Formalinlösung gewonnene Anatoxin kann sogar bei vielfachem Öffnen des Gefäßes ohne Verunreinigung mit fremdartigen Bakterien aufbewahrt werden. Meyn.

Césari, E., L. Cotonni und J. Laval: Recherches sur l'hémolyse streptococcique. (Annales de l'institut Pasteur 1927, Jahrg. XXI, S. 919.)

Gewisse Streptokokkenstämme verschiedenen Ursprungs

produzieren in Kulturen gegen die roten Blutkörperchen des Hammels und mehrerer anderer Tierarten hämolyzierende Substanzen. Diese Substanzen bilden sich gleichermaßen bei den Tieren, denen die Streptokokken eingespritzt wurden. Elektivnährböden zur Darstellung der Hämolyse sind die flüssigen Nährböden unter Zusatz von tierischen eiweißreichen Flüssigkeiten. Traubenzucker begünstigt das Bakterienwachstum, verhindert aber bei erhöhter Zugabe die Hämolyse. Die hämolytische Eigenschaft erscheint in aeroben und anaeroben Kulturen und verschwindet zu einem je nach dem Streptokokkenstamm verschiedenen Zeitpunkt. Bei einigen Stämmen ist die Hämolyse nur für kurze Zeit zu beobachten — zwischen der 7.—16. Stunde — und verschwindet allmählich am Ausgang der 16. Stunde. Die hämolyzierenden Substanzen befinden sich im frühen Entwicklungsstadium in der klaren Flüssigkeit, demgegenüber ist eine beträchtliche Resistenz gegenüber der Autolyse bei den Streptokokken festzustellen. Die geringste Hämolysemenge einer Kultur variiert beträchtlich nach dem jeweilig beobachteten Streptokokkenstamm. Die hämolyzierenden Substanzen verschwinden durch Erhitzen oder durch Zusatz von Antiseptika. Das Temperaturoptimum liegt um 37 Grad C. Kulturfiltrate können bei intravenöser Einspritzung (Kaninchen, Maus) Hämolyse in vivo hervorrufen. Beim Kaninchen werden durch die Einspritzung keine „Antistreptolysine“ im Serum erzeugt, darin stimmen fast alle Autoren überein. Diese fehlende Eigenschaft scheint Verfasser von großer Bedeutung, da man auf diese Weise die Streptokokkenhämolyse von den wahren mikrobiologischen „Hämostoxinen“ trennen könne. Die Streptokokkenhämolyse sind filtrierbar. Ihre Natur bleibt unbekannt. Die hämolyzierende Fähigkeit eines Streptokokkenstammes läßt die notwendigen und konstanten Beziehungen bezüglich der Pathogenität gegenüber der Maus und dem Kaninchen vermischen. Baars.

Friedberger, E. und T. Ikeda: Über das Verhalten pathogener Bakterien bei langamer Injektion und über den Heilwert des Serums bei protrahierter Zufuhr. (Zeitschr. f. Immunitätsf. 1927, Bd. 52, S. 221.)

²⁾ 1 pint = 0,57 l.

Bei Infektionsversuchen am Meerfischweinch (intra-peritoneal, Typhus, El Tor) wirkt die gleiche Dosis bei protrahierter Einführung infektiöser als bei schneller Zufuhr. Bakteriolytisches Antiferum ist im Heilverfuche bei schneller Zufuhr wirksamer als bei protrahierter Einspritzung.

Meyn.

Weichlein: Eine neue Methode zur Herstellung von Impfstoffen zur aktiven Immunisierung. (T. R. 1927, S. 577.)

Da die Immunisierung mit lebenden Erregern niemals ungefährlich ist, versuchte Verf. eine Abtötungsmethode zu finden, durch welche die immunisierende Wirkung nicht beeinträchtigt wird. Nach längeren Versuchen gelang es ihm, verschiedene Bakterien durch Zusatz von Anilinfarbstofflösung und 48stündige Bebrütung bei 37 Grad C abzutöten. Für Rotlaufbakterien eignet sich am besten 5prozentige Fuchsinlösung, für Paratyphus-Bakterien 5—20 prozentige Brillantgrünlösung. In weiteren Versuchen wies Verf. nach, daß es gelingt, mit durch Farbstoff abgetöteten Kulturen den Immunwert bei Rotlaufferumpferden in derselben Weise oder stärker zu steigern als durch Verimpfung virulenter Kulturen. Auch bei Schweinen konnten mit abgetötetem Farbstoff Immunität gegen Rotlauf gebildet werden, die einen ausreichenden Schutz gegen natürliche Infektion gewährleisteten. Die Verimpfung abgetöteter Farbstoffimpfstoffe hat sich in der Praxis bereits bei hämorrhagischer Septikämie der Schafe, Paratyphus der Ferkel und Geflügelcholera bewährt.

Geiger.

Januschke, Über die Leistungsfähigkeit der Ascoli-reaktion mittels der Thermopräzipitine bei der Milzbranddiagnose. (Seuchenbekämpfung 1927, H. 1, S. 58 u. H. 2, S. 123.)

Die Ergebnisse der Arbeit sind in folgenden Schlußsätzen zusammengefaßt:

1. Die Thermoextraktion nach Ascoli befördert rein physikalisch durch die hohe Temperatur und die mechanische Perturbation des Kochprozesses die Diffusion des in der Materie vorhandenen, aus den zerfallenen Milzbrandbazillen stammenden absolut thermostabilen Präzipitinogens in die Extraktionsflüssigkeit. 2. Eine Aufschließung und Auslaugung geformter Milzbrandbazillen, gleichgültig, ob verspor, bekapselt oder kapsellos, findet nicht statt. Nur das Protein bereits früher zerfallener Bazillen ist nachweisbar. 3. Mit dem fortschreitenden Zerfall der Bazillen im faulen Organmaterial steigt die Präzipitationsstärke auf das Mehrfache, erreicht mit dem völligen Verschwinden der Bazillen ihren Gipfel und sinkt dann aus unaufgeklärten Gründen (proteolytische Fermente der Kadaverbazillen?) wieder herab. 4. In flüssigen Nährböden ist mit zunehmender Autolyse der Bakterien der gleiche Anstieg, aber kein Abfall der Kurve nachzuweisen. 5. Die Leistung der Präzipitationsreaktion beim Nachweis des Milzbrandpräzipitinogens kommt jener der Eiweißpräzipitation (1:100000) gleich. 6. Die Reaktionsgrenze, unterhalb welcher eine Reaktion ausbleibt, stellt der Präzipitinogengehalt von etwa 12—88 Millionen zerfallenen Einzelbazillen in 1 cm³ Untersuchungsmaterial dar. 7. Für die Diagnose während des Lebens am Kranken kommt die Ascoli-Reaktion nur bei bereits eingetretener Bakteriämie in Betracht. Meyn.

Sergent, Edm., Donatien, A., Parrot, L., Lestoquard, F. u. Plantureux, Edm.: Etudes expérimentales sur les piroplasmoses bovines d'Algérie. (Annales de l'institut Pasteur 1927, T. XLI S. 721.)

Die durch Theileria dispar verursachte Theileriose verläuft, wie andere nordafrikanische Piroplasmosen in zwei aufeinander folgenden Stadien, und zwar ist das I. Stadium das des akuten Anfalls veranlaßt durch die I. Invasion der Parasiten, das II. Stadium das der chronischen Infektion. Die Inkubationszeit des experimentell erzeugten akuten Anfalls ist äußerst variabel (12 Tage bis wenigstens 13 Monate) und

hängt von der eingespritzten Virusmenge ab. Das im akuten Anfall entnommene Virus stellt ein Virus fixe dar. Es ruft bei Tieren, denen es eingespritzt wird, einen akuten Anfall mit ziemlich regelmäßiger Inkubationszeit im Mittel von 16 bis 17 Tagen hervor. Das während der Inkubation bzw. während des chronischen Stadiums der Infektion entnommene Virus erzeugt einen verzögerten akuten Anfall, der überraschender Weise häufig nach sehr langer Inkubation auftritt (bis 13 Monate). Diese langen Inkubationszeiten erinnern an die beim Sumpffieber und bei der Wut beobachteten. Ausnahmsweise kann auch das während eines akuten Anfalls gewonnene Blutvirus einen akuten Anfall nach langer Inkubation auslösen. Ohne Rücksicht auf die Inkubationszeit ist das klinische und parasitologische Bild des akuten Anfalls der Theileriose immer das gleiche. Tiere, die den akuten Anfall überstanden haben, bleiben latent krank. Der Nachweis der Persistenz des Virus im Körper kann durch Übertragung von Blut eines geheilten Tieres auf ein neues Tier geführt werden. Das postfebrile latente Virus erzeugt niemals Rezidivanfälle. Tiere, die von einem akuten Theilerioseanfall genesen sind, haben eine besondere Widerstandsfähigkeit gegen die Wiedereinspritzung von Virus aus einem akuten Anfall (virus fixe) erlangt; sie besitzen keine wahre Immunität (Sterilisierende Immunität), sondern nur Schutz (préimmunité). Der Schutz erscheint erst mit dem Augenblick, wo die Tiere auf die Infektion mit einem offenen akuten Anfall reagiert haben. Während der ganzen Periode der Inkubation, wo das Virus im Körper latent bleibt, wird der Schutz vermißt. In dieser Zeit bekommen Tiere, die mit „virus fixe“ überinfiziert werden, regelmäßig einen akuten Anfall, in denselben Fristen wie die neuen Kontrollen. In derselben Weise wie beim Schutz gegen die Piroplasmose und die Anaplasmosen verhindert der antitheilerische Schutz in der Mehrzahl der Fälle eine Neuinfektion. Wenn sich trotz des Schutzes ein neuer Anfall zeigt, so ist er im allgemeinen weniger ernst als der durch die erste Invasion veranlaßt. Man kann also gegen die Nordafrikanische Theileriose veranlaßt durch Theileria dispar mit Erfolg schutzvakzinieren.

Berge.

Kirchner: Zur Frage der Differenzierungsmöglichkeit humaner und boviner Tuberkelbazillen durch Komplementablenkung. (Beitr. z. Klin. d. Tub. 1927, Bd. 66, S. 584.)

Humane und bovine Tuberkelbazillen lassen sich mit der Komplementablenkungsmethode unter Verwendung von Bazillenaufschwemmungen als Antigen nicht unterscheiden. Die Untersuchungen wurden an sechs Seren ausgeführt mit einer Reihe verschiedener Antigene. Auch bei Anwendung fallender Antigen- und fallender Serummengen ließen sich keinerlei Unterschiede erkennen.

Meyn.

Schern, K. und Libero Rossi Lema: Sobre Tripanosomas. 3a Comunicacion: Sobre una curva del contenido de glucosa de la sangre respecto de un caballo infectado mal de Caderas, basada en el fenómeno de revivificación de los tripanosomas. (Del Instituto de Bacteriología de la Escuela Veterinaria de Montevideo. — Direktor: Prof. Dr. Kurt Schern.) (Boletín de Bacteriología e Investigación 1927, Nr. 1—4.)

Verfasser setzten die Untersuchungen über das Zuckerphänomen bei Trypanosomen- und Spirochäteninfektionen, über welche Sch. bereits in der D. T. W. 1927, S. 286, zusammenfassend berichtete, fort. Während für die bisherigen Untersuchungen kleine Laboratoriumstiere dienten, infizierten sie dieses Mal ein Pferd mit 0,5 ccm Trypanosoma equinumhaltigem Blut plus 0,5 ccm phys. NaCl-Lösung. In kurzen Zwischenräumen wurden Blutproben des Pferdes auf ihren Blutzuckergehalt nach Epstein untersucht. Temperaturen und Blutzuckergehalt wurden drei Wochen vor der Infektion ermittelt, die ersteren schwankten zwischen 37,2 bis 38 Grad, während der letztere 70 bis

76, im Mittel 74 Zentigramm pro Liter Blut betrug. Die Infektion verlief chronisch. Am 21. Tage trat geringes Ödem der Nachhand auf, das während der nächsten Tage beträchtlich an Umfang zunahm, am 31. Tage wurde leichtes Ödem der Pektoralgegend beobachtet. Gleichzeitig zeigte sich eine leichte Schwellung der Nasenschleimhaut, die in wenigen Tagen verschwand. Die Futteraufnahme war noch ungetrübt. Nach etwa 40 Tagen trat Abmagerung ein, Futteraufnahme ließ nach, das Gehen bereitete dem Tier Beschwerden, bald lag das Tier fast dauernd. Die Fieberkurve verlief typisch mit großen Schwankungen, einem Höchststande von 40,5 Grad und verschiedentlichem Fallen auf die Norm. Der Blutzuckergehalt hielt sich die ersten zwölf Tage nach der Infektion auf 70 Zentigramm, stieg dann über das Mittel 74 und erreichte seinen Höchststand mit 107 Zentigramm am 26. Tage. Das Tier verendete nach der zu Heilzwecken ausgeführten Injektion eines neuen Arzneimittels und konnte daher die Zuckerkurve des Blutes nicht bis zum natürlichen Tode des Tieres beobachtet werden. Es konnte aber gezeigt werden, daß der Blutzuckergehalt im Anfang der Infektion abnimmt, dann mit geringen Schwankungen beständig steigt, wobei Vermehrung des Blutzuckergehaltes und Temperaturanstieg mehr oder weniger parallel verlaufen, wie die leider etwas unklaren Kurven erkennen lassen. Weitere bei einigen Kaninchen vorgenommene Infektionen mit *Trypanosoma equinum* gaben hinsichtlich des Blutzuckergehaltes ähnliche Resultate wie der vorherige Versuch. Die Kurven zeigen einen schnellen Anstieg des Blutzuckergehaltes, welcher dann langsam abnimmt, ein zweites Mal ansteigt, um dann endgültig zu fallen. Gegen Ende der Krankheit sinkt der Blutzuckergehalt bedeutend unter die Norm, so daß die Parasiten absterben. Die Behandlungsversuche mit Insulin haben ein einwandfreies Ergebnis bisher nicht gezeigt, immerhin glauben die Verfasser, daß mit der Insulinbehandlung, namentlich wenn man sie als Adjuvans der gebräuchlichen Therapie benutzt, Erfolge erzielt werden können. Es wird notwendig sein, bei allen Infektionen Untersuchungen auf den Blutzuckergehalt durchzuführen, um so die Mitbeteiligung des Zuckerstoffwechsels bei den sich abspielenden pathologischen Vorgängen und die biologischen Gesetze der infektiösen Ursachen kennen zu lernen, und Rückschlüsse für die anzuwendende Therapie ziehen zu können.

K. H. Meyer.

Nahrungsmittelhygiene.

Retzen: Der neue D.R.-Milchflaschenverschluß. (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 121/22.)

Der D.R.-Milchflaschenverschluß D.R.G.M. Nr. 1006593 wird aus einer eigens für den Zweck angefertigten Masse mit glatter Oberfläche hergestellt. Die ursprünglich gewölbte Form dehnt sich beim Einpassen in die Flasche derartig aus, daß sich der Rand des Verschlusses fest an das Glas anschmiegt, wodurch eine bei Pappscheiben niemals erreichte Festigkeit und Dichtheit des Verschlusses erreicht wird. Zum Einsetzen des Verschlusses in die Flasche können die meisten der vorhandenen Pappscheiben-Verschließmaschinen nach geringer Umänderung Verwendung finden. Der Verschluß kostet nur wenig mehr als die Pappscheibe und ein Vielfaches weniger als Metallverschlüsse. Da er ohne sichtbare Beschädigung aus der Flasche nicht wieder entfernt werden kann, ist eine unbefugte Öffnung der Flasche ausgeschlossen.

Edelmann.

Gröning: Schimmelbildung auf ausländischem Schmalz. (Zeitschr. für Fleisch- u. Milchhyg., 38. Jahrg., S. 1023.)

Hinsichtlich des Verandes von Schmalz aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika, ist nach dem Kriege insofern eine Änderung eingetreten, als es jetzt in vierkantigen Kisten mit 25 kg Inhalt verschickt wird. In diesen liegt das Schmalz in zwei mit Pergamentpapier umhüllten und durch

eine Holzscheidewand getrennten Blöcken. Derartiges Schmalz ist mitunter durch Schimmelpilze verunreinigt, deren vollständige Entfernung von den einzelnen Blöcken unmöglich ist. Infolgedessen ist das Fett bei der Untersuchung als verdorben zurückzuweisen. Veranlassung zur Schimmelbildung gibt in der Regel eine mangelhafte Lagerung der Schmalzkisten in den Räumen des Ursprungslandes. Sie verschimmeln an den Wänden, die Pilze dringen durch das Holz in das Innere der Kiste und gehen darauf auf das Schmalz über. Diese Durchwucherung des Holzes mit dem Schimmelmyzel hat Gr. mikroskopisch festgestellt. An Fässern aus hartem Holze kommt diese Einwanderung des Schimmels in das Faßinnere nicht vor.

Edelmann.

**Schern, K.: Propositiones para la instrucción de tam-
beros, lecheros, etc. sobre la higiene de la leche.** (Boletín de Bacteriología e Investigación 1927, Nr. 1—4.)

Die Belehrung aller, welche mit der Milchgewinnung und ihrer Verarbeitung beschäftigt werden, ist in Uruguay unbedingt erforderlich, denn die elementarsten Begriffe der Milchhygiene sind den in Frage kommenden Personen vollkommen fremd. Der Staat muß dem Milchhandel gewisse Verpflichtungen auferlegen, welche nicht nur den Interessen des Produzenten, sondern vor allem denjenigen der Allgemeinheit Rechnung tragen. Je besser die Qualität der Milch, um so mehr wird man sie trinken. Das Gleiche gilt auch für die aus der Milch hergestellten Erzeugnisse; mit der Zunahme der bei ihrer Herstellung beobachteten hygienischen Forderungen wird die Einfuhr zugunsten der heimischen Wirtschaft abnehmen. Da eine gesunde Milch nur von gefunden Milchkühen gewonnen wird, müssen diese auf ihren Gesundheitszustand durch auf diesem Gebiete besonders ausgebildete Tierärzte periodisch untersucht werden. Über den Zweck dieser Maßnahmen muß das Melkpersonal aufgeklärt werden, damit es den hygienischen Forderungen das nötige Verständnis entgegenbringt. Arzt und Chemiker müssen mit dem Tierarzt zusammen arbeiten. Sch. stellt hier folgende Forderungen auf:

I. Veterinärmedizinische Milchhygiene.

1. Die Milch vom wissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt.
2. Anatomischer Bau des Euters.
3. Physiologie der Milchsekretion. Die Vitamine der Milch.
4. Die hygienische Gewinnung der Milch.
5. Allgemeine biologische Eigenschaften der Milch.
6. Euterkrankheiten und durch diese hervorgerufene Veränderungen; die durch den Genuß kranker Milch bedingten Schäden für die menschliche Gesundheit. Die in Fällen von Seuchenausbrüchen unter dem Milchvieh, wie Maul- und Klauenseuche usw., zu ergreifenden Maßnahmen.
7. Veränderungen der Milch nach ihrer Gewinnung: Keimgehalt, Farbe, Geruch, Geschmack, Konsistenz usw.
8. Die Behandlung der Milch in den Melkstationen, auf dem Transporte und in den Verkaufsstellen.
9. Milchprüfungen.
10. Bearbeitung der Milch mit Bakterien: saure Milch (Kefir, Yoghurt, Mazun) usw.

II. Medizinische Milchhygiene.

1. Die Milch als die Gesundheit erhaltende Nahrung der Kinder, der Erwachsenen und der Menschheit im allgemeinen.
2. Der Wert der Milch in ihrer verschiedenen Beschaffenheit (frische und pasteurisierte Milch, Yoghurt, Kefir, Kindermilch) unter den Gesichtspunkten der menschlichen Gesundheit.
3. Die Gefahren, welche der menschlichen Gesundheit durch den Genuß der Milch kranker Tiere erwachsen (Tuberkulose, Tollwut, Milzbrand, Paratyphusinfektionen, Maltafieber der Ziegen). Die häufige Verunreinigung der Milch mit pathogenen Keimen durch mit der Milchbearbeitung betraute Personen (Tuberkulose, Typhus, Paratyphus, Scharlach, Diphtherie usw.).

III. Chemische Kontrolle.

Für das Melkpersonal fordert Sch. eine allumfassende Berufsausbildung durch Kurse, welche in kleinen Muster-

wirtschaften von geeigneten Fachleuten abgehalten werden. Mit diesen Kursen sind solche über Bankwesen, Buchführung, Steuern und Genossenschaftswesen zu verbinden. Die ganze Angelegenheit bedarf einer gesetzlichen Regelung. Nach einer Abschlußprüfung ist den Teilnehmern eine Bescheinigung auszustellen, von deren Nachweis später der Besitz oder die Leitung von Milchwirtschaften, wie auch Betätigung als Schweizer usw. abhängen muß. Wenn auch nicht sofort eine Änderung der Verhältnisse zu erwarten ist, so wird doch mit der Zeit das Gefühl für Verantwortung in den Kreisen der Milchwirtschaft erstehen und diese das Vertrauen der Konsumenten gewinnen. K. H. Meyer.

Verschiedene Mitteilungen.

Zum 75. Geburtstag von Karl Arnold.

Am 12. März 1928 begeht Geheimrat Dr. Dr. h. c. Karl Arnold in vollkommen geistiger und körperlicher Frische seinen 75. Geburtstag. Arnold war seit dem Jahre 1880 im chemischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover tätig und übernahm im Jahr 1885 die Leitung dieses Instituts. In einer langen Reihe von Jahren hat er sich durch emsige forschende und schriftstellerische Tätigkeit ausgezeichnet, insbesondere ist allen sein geradezu einzig dastehendes Repetitorium der Chemie bekannt, das heute bereits in 16. Auflage vorliegt. Wegen Erreichung der Altersgrenze mußte der Jubilar im Herbst 1921 das Amt des Direktors des Chemischen Instituts niederlegen,*) hat aber trotzdem seine weitere wissenschaftliche Betätigung nicht aufgegeben. Einen großen Teil seiner Kraft widmet Arnold, jetzt noch mehr als vorher, der Weiterentwicklung der Sektion Hannover des deutschen und österreichischen Alpenvereins, die er aus kleinsten Anfängen in nunmehr bald 45jähriger Tätigkeit zu ungeahnter Blüte emporgebracht hat. Die Sektion Hannover steht auf dem Gebiete des Hütten- und Wegebaues obenan. Wir bringen dem Jubilar unsere herzlichsten Glückwünsche dar und knüpfen daran die Hoffnung, daß er diesen Tag noch recht oft an der Seite seiner ebenso rüstigen, hochverehrten Gattin begehen möge. Mi.

Dr. h. c. Rudolf Mann,

Ehrenbürger der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Die Tierärztliche Hochschule Hannover hat den Direktor Dr. h. c. Rudolf Mann an der I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Werke Leverkusen, wegen seiner besonderen Verdienste um die Entwicklung der pharmazeutischen Abteilung und des Interesses, das er den veterinärmedizinischen Arbeiten daselbst entgegenbrachte, zum Ehrenbürger der Tierärztlichen Hochschule Hannover ernannt. Es ist mit der Anregung von Dr. Mann zu verdanken, daß die Zahl der in der I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft beschäftigten Tierärzte (meist aus der Hannoverschen Hochschule) ständig zunimmt. Auch werden Arbeiten zur Erforschung und Bekämpfung der Tierkrankheiten im In- und Auslande dortseits unterstützt. Am 3. März fand im großen Saale des Verwaltungsgebäudes Leverkusen ein Festakt zu Ehren des Jubilars statt. Zahlreiche Vertreter der Industrie des In- und Auslandes überbrachten die Glückwünsche. Die medizinische Fakultät der Universität Köln ernannte ihn zum Ehrendoktor, während die Tierärztliche Hochschule Hannover und die Medizinische Akademie Düsseldorf die Ernennung zum Ehrenbürger überbrachten. Das Tropeninstitut Hamburg verlieh die Nothmedaille. Der Rektor der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Magnifizenz Mießner, würdigte die besonderen Verdienste des Jubilars und hob die guten Beziehungen der I. G. Farbenindustrie A.-G. zur Tierärztlichen Hochschule hervor.

Sir Arnold Theiler,

früher Direktor der tierärztl. Lehr- und Forschungsanstalten der südafrikanischen Union in Pretoria, der sich z. Zt. zwecks wissenschaftlicher Forschungen in Basel aufhält, hat von der Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research den ehrenvollen Auftrag bekommen, eine Organisation für das Studium der Tierkrankheiten in Australien zu schaffen. Sir Arnold Theiler wird sich zu diesem Zwecke Mitte März auf etwa ein Jahr nach Australien begeben.

*) Siehe D. T. W. 1921, S. 395, S. 637.

Akademische Nachrichten.

Geh. Regierungsrat Prof. Dr. med. et med. vet. h. c. Fröhner-Berlin wurde anlässlich seines 70. Geburtstages die Ehrendoktorwürde der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität München verliehen.

* Prof. Dr. R. Demoll, Vorstand des zoologischen Instituts der veterinärmed. Fakultät der Universität München, hat den an ihn ergangenen Ruf nach Wien abgelehnt.

Dr. Fritz Schmidt-Hoensdorf, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen, hat sich an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg für Tierhygiene und Tierfeuchenlehre auf Grund seiner Abhandlung: „Beiträge zur Kenntnis der Geflügeltuberkulose“ und der am 2. März d. Js. gehaltenen Antrittsvorlesung über „Milchhygiene“ habilitiert.

Ellenberger-Stiftung.

Sr. Magnifizenz Herr Geheimer Rat Prof. Dr. Ellenberger, der im Ruhestand in Dresden lebt, begeht am 28. d. Mts. seinen 80. Geburtstag. Zu seiner Ehrung ist von seinen Schülern und Freunden unter Führung der veterinärmedizinischen Fakultät zu Leipzig eine Sammlung eingeleitet worden, deren Ertrag der schon früher errichteten, aber durch die Inflation stark verminderten Ellenberger-Stiftung zugeführt werden soll. Beiträge werden auf Postcheckkonto Leipzig Nr. 52609, Veterinär-physiologisches Institut erbeten. Das Ergebnis der Sammlung soll dem Jubilar am Geburtstage übermittelt werden. Von einer Festfeier muß leider Abstand genommen werden, da bei einer diesbezüglichen Erkundigung der Jubilar gebeten hat, infolge seines seit längerer Zeit ungünstigen Gesundheitszustandes von jeder mündlichen Beglückwünschung abzusehen.

Wanderausstellung in Leipzig.

5. bis 10. Juni 1928.

Für die 34. Wanderausstellung der D.L.G., die vom 5. bis 10. Juni d. Js. in Leipzig stattfindet, haben bereits die baulichen Vorbereitungen begonnen. Das Areal, auf dem der große Ring mit den Tribünen, die Hallen für etwa 600 Pferde, 800 Rinder, 500 Schafe, 300 Ziegen, 500 Schweine usw. stehen sollen, ist in der Umzäunung schon fertig abgegrenzt. Es erstreckt sich von dem Gelände der Technischen Messe, deren Hallen zum Teil der Ausstellung nutzbar gemacht werden (Erzeugnishalle, wissenschaftliche Abteilung usw.) bis unmittelbar an die Institute und Kliniken der Veterinärmedizinischen Fakultät. Von letzterer wird im Hinblick auf diese nächste Nachbarschaft die so reichhaltig besetzte Wanderausstellung dieses Mal in selten günstiger Weise für den Unterricht auf dem Gebiete der Tierzucht ausgewertet werden können. Auch sonst wird die Ausstellung in der zentral gelegenen Stadt Mitteldeutschlands sicherlich viele Besucher auch aus tierärztlichen Kreisen anziehen, die mit dem Besuch der Ausstellung mit ihrem großen und auserlesenen Tiermaterial wohl gern auch den der Institute der Leipziger Veterinärmedizinischen Fakultät verbinden werden.

Ärztlicher Verein Hannover.

21. März 1928, 20 Uhr, Ärztehaus Hannover, Hildesheimer Str. 23. J. Loewenstein: „Homosexualität und Strafrecht.“ Ziegler: „Demonstrationen aus dem Gebiete der Lungenchirurgie.“

Verein der Tierärzte des Regierungsbezirks Hildesheim.

20. Hauptversammlung am Sonnabend, den 17. März 1928, 14½ Uhr, im Kaiserfaal zu Hildesheim. 1. Geschäftsbericht. 2. Kassenbericht und Prüfung. 3. Festsetzung des Jahresbeitrages. 4. 150jährige Jubelfeier der Tierärztlichen Hochschule Hannover. 5. Aufnahme neuer Mitglieder. 6. Die Wohlfahrtseinrichtungen der Tierärztlichen Buchführungsstellen. 7. Vortrag von Prof. Dr. Oppermann: „Einige wichtige Kapitel aus der Viehwirtschaft.“

Dr. Machens; Vorf.

Dr. Heinemann, Schriftf.

Fortbildungslehrgang über bakteriologische Fleischbeschau.

Im Veterinär-Untersuchungsamt in Potsdam soll unmittelbar nach Ostern ein Fortbildungslehrgang über bakteriologische Fleischbeschau be-

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 9, S. 148.

ginnen. Nähere Auskunft erteilt der Leiter des Institutes Dr. Standfuss.

20. Fortbildungskursus des D.V.R. in Kottbus.*)

Die Vorträge am 17. und 18. März finden im Saal des Hotels „Weißes Roß“, Kottbus, Berliner Platz 6, Eingang Berliner Straße statt. Für Unterkunft stellen zur Verfügung: Weißes Roß, Hotel Kaiseradler, Berliner Hof, Hotel Stadt Hamburg, Hotel Anforge. Stang.

Fortbildungskursus für die in dem Tuberkulose-tilgungsverfahren tätigen Vertrauens-tierärzte der Provinz Ostpreußen.

Sonntag, den 18. März 1928 in Allenstein, Hotel Kronprinz, Zepelinstraße. 10—11 Uhr: Dr. Knauer: Über die Notwendigkeit der Intensivierung des Tuberkulose-tilgungsverfahrens. 11—13 Uhr: Dr. Tiedge: Diagnostik und Bekämpfung der Geflügeltuberkulose und der weißen Ruhr der Küken mit Demonstrationen. 13—14 Uhr: Dr. Knauer: Die Bekämpfung der Streptokokken-Mastitis der Rinder mit Demonstrationen. 16—17 Uhr: Dr. Krage: Diagnostik und Therapie des infektiösen Rinderabortus. 17—18 Uhr: Vorführung eines Filmes über die Bekämpfung der Geflügeltuberkulose. — Eingeladen sind außer den Vertrauens-tierärzten der Provinz, deren Teilnahme im Interesse einer einheitlichen Durchführung des Tuberkulose-tilgungsverfahrens dringend erwünscht ist, auch sämtliche anderen Tierärzte, welche an der beabsichtigten Organisation zur Bekämpfung der Geflügeltuberkulose und der Streptokokken-Mastitis mitarbeiten wollen. Teilnehmergebühren werden nicht erhoben. Dr. Knauer.

Tierärztliche Buchstelle Sachsen-Anhalt E. V., Magdeburg.

Generalversammlung in Magdeburg am 18. März 1928, vormittags 1/2 12 Uhr, in der Loge Harpokrates, Große Münzstraße 10. 1. Bericht über die Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaft deutscher Buchstellen. 2. Unfall-, Sterbegeld- und Lebensversicherung. 3. Krankenkassenversicherung. — Die sich für Einrichtung der Tierärztlichen Buchstellen und ihre erstrebten Zwecke interessierenden Kollegen sind freundlichst eingeladen.

Impfung gegen die Hämoglobinurie der Rinder.

Der Impfstoff gegen die Hämoglobinurie der Rinder wird vom Gesundheitsamt der Landwirtschaftskammer in Zülchow-Stettin vom 13. März bis Mitte Mai an jedem Dienstag abgegeben. Die Impflinge sind nach der Impfung mindestens noch 20 Tage im Stalle zu halten. Die Schutzimpfung wird für Rinderbestände empfohlen, in denen die Seuche alljährlich auftritt und in denen im Durchschnitt der Jahre 1 Prozent der Rinder oder mehr an der Seuche stirbt oder schwerer Erkrankungen wegen geschlachtet wird.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Jahrbuch für wissenschaftliche und praktische Tierzucht einschließlich der Züchtungsbiologie. Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde. 19. Jahrgang. Hannover 1927. 2. Teil: Kleintierzucht.

Machens berichtet über die Ziegenzucht sowie über die Tätigkeit und die Ziele des Reichsverbandes Deutscher Ziegenzuchtvereinigungen. Es folgt die Besprechung der Veröffentlichungen über allgemeine züchterische Fragen und besondere Zuchtverhältnisse in einzelnen Ländern, der Veröffentlichungen über Milch- und Milchleistungen und über Ziegenkrankheiten. Die Hundezucht ist von v. Otto-Bensheim bearbeitet. Er bringt zunächst einen kurzen Abriss über Hundesport, die deutsche Rassezucht und das Organisationswesen, bespricht ebenso kurz die einzelnen Verwendungszwecke, die Polizeihundbewegung und die Frage der Verforgung des Auslands mit leistungsfähigen Hunden. Über die Pelztierzucht berichtet Stakemann. Die Kaninchenzucht hat Kosswig bearbeitet. Die z. Zt. im Vordergrund des Interesses stehenden Chinchilla- und Castorexkaninchen werden besprochen. Den weitaus größten Raum beansprucht die fleißige Arbeit von Römer über Geflügelzucht. Er nimmt zu den grundlegenden Fragen der Geflügelhaltung, namentlich der Rentabilität Stellung und bespricht die reichhaltige Literatur nach folgenden Gesichtspunkten:

Allgemeines, Geflügelhaltung in der Landwirtschaft, volkswirtschaftliche und ähnliche Fragen, Rassen, Leistungsprüfungen im In- und Auslande, Zucht, Vererbung, Ernährung, Stalleinrichtungen, Brut, Aufzucht, Eierhandel usw., Krankheiten, Unarten, Tagungen, Ausstellungen, Lehr- und Vortragswesen, Berichte, Gesetze und Bestimmungen, Taubenhaltung. Das Referat Römers ist eine wahre Fundquelle für die Geflügelzüchter. Im Jahrbuch wird sodann erstmalig die Fischzucht behandelt von Dr. Conrad Lehmann in Münster. Einleitend setzt er sich mit dem noch strittigen Begriff der Fischzucht auseinander und betont mit Recht, daß der Begriff nicht zu eng aufgefaßt werden dürfe. Es soll alles aus dem Gesamtgebiete der Fischerei behandelt werden, was in das Gebiet der Zuchtfragen gehört. Über Bienenzüchtung berichtet Armbruster. Es folgen die Berichte über die Tagungen der größeren Züchtervereinigungen. Die Seidenraupenzucht hat Golf bearbeitet, der nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick über die Entwicklung der Seidenraupenzucht sich mit Recht gegen die unsinnige Reklame wendet, die seit einigen Jahren in Deutschland betrieben wird und dem an sich gefunden Gedanken der Wiederbelebung des deutschen Seidenbaues nur Schaden zufügt. Ein Sach- und Autorenverzeichnis vervollständigen das Jahrbuch, mit dessen Herausgabe die Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde sich ein weiteres bleibendes Verdienst erworben hat.

Dr. P. Koch-Weimar.

Die rehfarbige Frankenziege. Von Hans Gutbrod, Tierzuchtinspektor. Ein Beitrag zur Kenntnis ihrer Verbreitung, Entstehung, Gestalt und Leistung, Züchtung und Haltung. Hannover, Verlag von M. & H. Schaper, 1927. Mk. 3,—.

Das Verbreitungs- und Zuchtgebiet der rehfärbigen Frankenziege erstreckt sich vom Fichtelgebirge bis zum Spessart und von der Rhön und dem Frankenwald südlich bis an den Steigerwald und Jura über die bayerischen Regierungsbezirke Ober- und Unterfranken. Bei der Viehzählung im Jahre 1925 waren in Oberfranken 95 503 und in Unterfranken 98 525 Ziegen vorhanden, die einen ungefähren Wert von 5 700 000 Mark repräsentieren, wenn man den durchschnittlichen Preis einer Ziege mit nur 30 Mark veranschlagt. Hierzu kommt noch der Wert der alljährlich erzeugten Ziegenmilch, der bei Annahme einer Durchschnittsleistung von nur 500 Liter pro Tier und einem Preis von nur 20 Pfennig pro Liter mehr als 16 Millionen Mark beträgt. Bei der Besprechung des Werdeganges der rehfärbigen Frankenziegenzucht hebt Verf. die großen Verdienste des damaligen Landestierzuchtinspektors Dr. Vogel und des Bezirkstierarztes Ritzer hervor. In weiteren Kapiteln finden wir Ausführungen über Gestalt und Leistung der Frankenziege, Zuchtbetrieb, Haltung und Pflege und Maßnahmen zur Förderung der Frankenziege. Die Probemelkergebnisse aus einer Anzahl von Vereinen schwankten zwischen 270 und 1562 Liter und sind mit einer Durchschnittsleistung von ca. 700 Liter als gut zu bezeichnen. Die Deckzeit beginnt in der Regel im August und dauert bis Dezember. Haltung, Pflege und Fütterung sind im allgemeinen als gut zu bezeichnen. Die Maßnahmen zur Förderung der Ziegenzucht sind teils staatlicher, teils genossenschaftlicher Art. Die Monographie, mit großer Liebe und Sachkenntnis geschrieben, wird in den interessierten Kreisen sicher die ihr gebührende Aufnahme, Verbreitung und Anerkennung finden. W. Schäper, Hannover.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Oberveterinär Dr. O. Raschke in Magdeburg zum Direktor des städt. Schlacht- und Viehhofes in Chemnitz i. S.; Tierarzt Dr. Mewes in Crossen zum Veterinär Dr. des Kreises Crossen (Bezirk Frankfurt a. Oder); Tierarzt Dr. O. Bischoff aus Suhl zum wissenschaftlichen Hilfsarbeiter am bakteriologischen Institut der Preuß. Versuchsanstalt für Milchwirtschaft in Kiel.

In den Ruhestand getreten: Oberveterinär Dr. Friedrich Voltz, Bezirkstierarzt von Nürnberg-Land.

Gestorben: Oberlandesfallmeister a. D. Hans Stautner in München.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck: Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 11.

Ausgegeben am 17. März 1928.

36. Jahrgang.

Ätiologie, Diagnose und Bekämpfung der Krankheiten es Schweinepest- und Schweineseuchekreises. *)

Von Veterinärat Dr. Glässer, Hannover.

Die Erforschung der Krankheiten des Schweinepest- und Schweineseuchekreises, mit denen wir uns heute einmal näher beschäftigen wollen, ist in der Hauptsache erst in den letzten 25 Jahren, also direkt noch vor unseren Augen, erfolgt. Zwar hatten umfangreiche Untersuchungen in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bereits das Gebiet der Schweinepest — Schweineseuche betreten, sie hatten es aber verlassen, ohne in ihm eine wirkliche Aufklärung geschaffen zu haben. Die Dunkelheit blieb auf dem Gebiete trotz zahlreicher weiterer Erforschungsversuche bis zur Entdeckung des filtrierbaren Virus als Ursache der Schweinepest im Jahre 1903 und den sich daran in den nächsten Jahren anschließenden Untersuchungen erhalten. Die Gründe dafür sind uns rückschauend vollkommen klar. Die Bakteriologie stand in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts noch in ihren Anfängen, hatte aber bereits kurz nacheinander eine Reihe der wichtigsten Infektionserreger wie z. B. den Milzbrand-, den Tuberkel-, den Rotz-, den Rotlauf-, den Geflügelcholerabazillus sicher als Ursache der betr. Krankheiten erkannt, rein gezüchtet und genau beschrieben.

Wer will sich dann darüber wundern, daß in dieser Zeit auch Bakterien — der Bac. suipestifer und der Bac. suisepiticus bzw. bipolaris suis — als Ursache von Schweineseuchen beschrieben wurden, wenn sich bei den untersuchten Tieren eines Seuchenausbruches regelmäßig einer von den beiden Bazillen fand und man bei künstlichen Übertragungsversuchen mit Reinkulturen dieser Bakterien auf Versuchsschweine recht ähnliche Krankheitsbilder wie bei den Ausgangsschweinen erzeugen konnte. Da sich der Bac. suipestifer zunächst in Seuchenausbrüchen fand, bei denen eine Darmentzündung, der Bac. bipolaris suis dagegen bei solchen, bei denen eine Lungenentzündung das Krankheitsbild beherrschte, damit auch die künstlich bei Versuchsschweinen durch den Bac. suipestifer und Bac. bipolaris suis erzeugten Veränderungen durchaus im Einklang standen, sah man als Schweinepest — Suipestiferkrankheit — eine Krankheit mit vorzugsweiser Erkrankung des Darmes unter dem evtl. Hinzutritt oder auch einmal dem Vorherrschenden septikämischer Erscheinungen und als Schweineseuche — Bipolarisbazillose — eine Erkrankung unter vorzugsweiser Beteiligung der Lungen gleichfalls unter dem evtl. Hinzutritt oder auch einmal dem Vorherrschenden septikämischer Erscheinungen an. Damit schien die Ursache zweier Seuchen restlos geklärt zu sein, doch traten dieser Lehre bald Widerstände entgegen.

Die erste Erschütterung ging davon aus, daß man einmal nicht in allen Seuchenausbrüchen, die unter dem auf-

gestellten Bilde der Schweinepest verliefen, den Bac. suipestifer und auch nicht in denen, die unter dem der Schweineseuche verliefen, den Bac. bipolaris suis nachweisen konnte und daß auch alle Versuche, auf den gefundenen Bakterien ein wirksames Bekämpfungsverfahren aufzubauen, fehlschlügen. Über diese Erschütterung kam man zunächst hinweg. Man glaubte an die Möglichkeit, daß die beiden Bakterien unter Umständen durch eine zu geringe Menge oder ihr Zugrundegehen im Tierkörper bis zum Zeitpunkte ihrer bakteriologischen Untersuchung manchmal dem Nachweis entgehen könnten, hielt deshalb auch ihren Nachweis für die Krankheitsdiagnose nicht mehr für erforderlich und stellte die Diagnose nunmehr auch allein auf Grund des klinischen und anatomischen Bildes. Ein Bekämpfungsverfahren hoffte man durch weitere Versuche mit den beiden Bakterien noch zu finden.

Die zweite Erschütterung brachte die epidemiologisch überaus befremdliche Tatsache, daß fast regelmäßig bei einem Schweinepestausbuch einzelne Tiere nicht unter dem aufgestellten Bilde der Schweinepest, sondern dem der Schweineseuche, oft sogar mit einem positiven Befunde des Bac. bipolaris suis zugrunde gingen, daß mithin regelmäßig gleich zwei Seuchen gleichzeitig in einem Bestande auftreten konnten. Notdürftig kam man auch noch über diese zweite Erschütterung hinweg; unter dem Drucke der tatsächlichen Verhältnisse nahm man eine häufige Mischinfektion bei den beiden Seuchen, der Schweinepest und Schweineseuche, an. Aus jener Zeit stammt die nun häufig gestellte Doppel-diagnose Schweineseuche = Schweinepest, die ja auch heute noch etwas nachspukt.

Zur dritten und letzten Erschütterung gab die Entdeckung eines ultramikroskopischen, filtrierbaren Virus als Schweinepestursache Anlaß. Sie führte zum Zusammensturz des aufgerichteten Lehrgebäudes. Jetzt hatte man erst die Möglichkeit, willkürlich jederzeit die Schweinepest zu erzeugen, und von dieser Möglichkeit wurde nun naturgemäß zu Forschungszwecken in allen Ländern, in denen die Schweinepest eine größere Verbreitung hatte, ausgiebig Gebrauch gemacht. Nunmehr trat erst das richtige, so wechselvolle Bild der Schweinepest in seiner ganzen Variationsbreite in Erscheinung. Man sah insbesondere, daß nicht nur bestimmte Darmentzündungen direkt auf das filtrierbare

*) Vortrag beim Fortbildungskursus für die Tierärzte der Neu- und Grenzmark in Landsberg a. W. am 11. Dezember 1927.)

Virus zurückzuführen waren, sondern auch gewisse Lungenentzündungen und daß eine Reihe anderer entzündlicher Veränderungen am Darms und auch an den Lungen der sekundären Einwanderung von Bakterien, die schon im Körper normaler Schweine als harmlose Parasiten auf den Schleimhautoberflächen vorkommen, ihre Entstehung verdanken. Lungenentzündungen bei Schweinepestausbrüchen gehörten damit zum Bilde der Schweinepest, sie hatten jedenfalls mit der Schweinefeuche nichts mehr zu tun.

Zunächst kam sogar nach dieser Entdeckung durchaus folgerichtig die Meinung auf, der bis dahin als Erreger der Schweinepest geltende *Bac. suis* sei nur ein häufig bei der Schweinepest sekundär eindringendes und die Krankheit verschlimmerndes Bakterium und auch für den bis dahin als Erreger der Schweinefeuche geltenden *Bac. bipolaris suis* wurde dieselbe Meinung vertreten. Die weiteren Untersuchungen lehrten jedoch, daß diese Meinung zu weit ging. Es zeigte sich nämlich, daß der *Bac. suis* pestifer, Abarten desselben und einige nahe verwandte Bakterien unabhängig vom filtrierbaren Virus Krankheiten bei Ferkeln hervorriefen, die gewöhnlich unter dem Bilde einer nekrotisierenden Darm-, speziell Dickdarmentzündung verliefen und bis zur Entdeckung des filtrierbaren Virus mit der Schweinepest zusammengefallen waren. Diese Bazillenschweinepest hatte nun aber weder in ihrer Ansteckungskraft und Ausbreitung, noch in der Schwere der Erkrankungsfälle etwas pestartiges an sich, sie wurde deshalb auch als bazilläre, nekrotisierende Darmentzündung (Paratyphus) weitergeführt.

Mit der Schweinefeuche kam man zu einem ähnlichen Ergebnis. Wohl kam es öfter vor, daß aus verseuchten Schweinebeständen Tiere zur Zerlegung kamen, die nur als wesentliche Veränderung eine akute oder chronische Lungenentzündung evtl. auch mit einem positiven Befunde von bipolaren Bakterien aufwiesen, und doch, wie die Übertragungsversuche zeigten, das filtrierbare Virus der Schweinepest in sich hatten. Wenn dann der betreffende Bestand aber weiter sorgfältig geprüft werden konnte, ließ sich an den Erscheinungen und Veränderungen bei anderen Tieren gewöhnlich doch bald feststellen, daß die Schweinepest in dem Bestande herrschte. Demgegenüber wurde nun aber in zahlreichen Fällen von seuchenartigen Krankheitsausbrüchen, die als chronische z. T. auch als akute Lungenentzündungen — vereinzelte Krankheitsfälle wohl auch einmal als Septikämie — verliefen, die Abwesenheit des filtrierbaren Virus festgestellt. Diese von der Schweinepest unabhängige Schweinefeuche erwies sich bei den weiteren Forschungen als eine Krankheitsgruppe, die zum mindesten drei verschiedene Krankheiten enthielt, nämlich 1. die enzootische Bronchitis und Pneumonie d. h. die frühere chronische Schweinefeuche einschließlich der seuchenartigen Ferkellungenentzündungen. 2. Die Schweinefeuche (akute Bipolarisbazillose) und 3. die fibrinöse Serosen- und Gelenkentzündung.

Aus dem bis zum Jahre 1903 vorhandenen Krankheitsgemische Schweinefeuche = Schweinepest, haben sich mithin bislang fünf verschiedene Krankheiten abgeordnet, nämlich 1. die Schweinepest. 2. Die bazilläre, nekrotisierende Darmentzündung. 3. Die enzootische Bronchitis und Pneumonie. 4. Die Schweinefeuche (akute Bipolarisbazillose) und 5. Die fibrinöse Serosen- und Gelenkentzündung.

Wenden wir uns zunächst zu der gefährlichsten der fünf Krankheiten, der Schweinepest.

Diese Seuche hat im Laufe der letzten 50 Jahre mehr Opfer unter den Schweinen der verschiedenen Staaten der Erde gefordert als sämtliche anderen ansteckenden Krankheiten zusammengekommen. Der Verlust durch Tod und Notchlachtung infolge dieser Seuche in diesem Zeitraum ist auf mehr als 100 Millionen Tiere zu schätzen. Die höchsten Verluste haben die Vereinigten Staaten von Nordamerika gehabt, in denen noch 1924 ein Verlust von 2,7 Millionen Schweinen beobachtet wurde, wohl waren in manchen Jahren die Verluste dort erheblich geringer, in andern aber viel höher, so bspw. 1913 6,1 Millionen. Auch in England, Ungarn, den Balkanländern sind in manchen Jahren außerordentlich hohe Verluste vorgekommen. In Deutschland sind ähnlich verheerende Seuchengänge wie in den genannten Ländern bislang zwar nicht zu verzeichnen gewesen, immerhin schwankte die Zahl der betroffenen Tiere in den letzten

Jahren vor dem Kriege zwischen 100 und 200 Tausend im Jahre und lag meist höher als beim Rotlauf. Wenn in diesen Zahlen auch die Schweinepest und Schweinefeuche zusammengefaßt ist, so entfallen seit dem Ausscheiden der chronischen Schweinefeuche aus der veterinärpolizeilichen Bekämpfung im Jahre 1907 diese Seuchenzahlen ganz überwiegend auf das Konto der Schweinepest. Während des Krieges sank in Deutschland die Seuchenziffer bei der Schweinepest außerordentlich ab, viel stärker als es dem Sinken der Schweinepest entsprach, sie verschwand in großen Landesteilen sogar ganz. Nach Kriegsende zeigte jedoch die Seuchenzahl eine stark steigende Tendenz und hat annähernd wieder 40 Tausend Tiere im Jahre erreicht. Es besteht sonach aller Grund dieser gefährlichen Seuche unsere schärfste Aufmerksamkeit zu widmen.

Das Wesen der Schweinepest besteht in einer Septikämie mit einem im allgemeinen etwas schleichenden Verlaufe und hoher Ansteckungskraft. Der schleichende Verlauf dokumentiert sich schon in der Inkubationszeit, die bei künstlicher Ansteckung schon mindestens drei, bei natürlichen Infektionen durchschnittlich 5—8 Tage beträgt und manchmal diesen Zeitraum noch erheblich überschreitet. Die hohe Ansteckungskraft geht gewöhnlich aus ihrem Verhalten in einem verseuchten Bestande klar hervor, wenn hiervon hier und da auch einmal Ausnahmen vorkommen. Aus künstlichen Versuchen sowie aus trüben Erfahrungen bei der Rotlaufimpfung ist auch bekannt, daß das Einstechen einer Impfnadel in die Unterhaut eines pestkranken Schweines genügt, um bei weiteren Impfungen mit derselben undesinfizierten Impfnadel die Pest auf weitere Schweine zu übertragen und daß auch das bloße Eintauchen einer infizierten Nadel in den Impfstoffvorrat ausreicht, um bei mit diesem geimpften Schweinen die Pest zum Ausbruch zu bringen. Geiger hat außerdem nachgewiesen, daß das bloße Durchtreiben einer Anzahl gesunder Schweine durch einen leeren Stall, in dem kurz vorher noch pestkranke Schweine gefressen hatten, genügt, um bei diesen nach der üblichen Inkubation von etwa einer Woche die Pest zum Ausbruch zu bringen.

Die Krankheitsursache, das ultramikroskopische, filtrierbare Virus, kreift schon während der Inkubation und während der ganzen Krankheit d. h. in schleichenden Fällen oft monatelang im Blute. Die ersten Krankheitserscheinungen sind dementsprechend Allgemeinerkrankungen und die ersten anatomischen Veränderungen solche des Blutes und der Gefäße. Die ersten Erscheinungen bestehen in Fieber, Schlaffucht, Mattigkeit, Taumeln und Nachlassen des Appetits, die Veränderungen am Blute, soweit sie makroskopisch erkennbar sind, in einer schlechteren Gerinnungsfähigkeit in manchen akuten Fällen und in einer schweren Anämie in den schleichenden Fällen. Mikroskopisch läßt sich anfangs eine starke Hyperleukozytose, bei der nach einer gewissen Zeit reichlich Jugend- und Kümmerformen der weißen Blutkörperchen auftreten und außerdem die Lymphozyten vorwiegen, feststellen. Gegen Ende der Krankheit schließt sich eine Hypoleukozytose an. Dazu werden das Auftreten zahlreicher Blutplättchen und auch Zerfallerscheinungen an den roten Blutkörperchen beobachtet. Die Veränderungen an den Gefäßen betreffen vorwiegend die Kapillaren und bestehen in Erweiterungen in gewissen Gefäßgebieten und in der Neigung zur Lückenbildung in ihrer Wand. Diagnostisch haben sich speziell diese Blutveränderungen bislang nicht recht verwertbar erwiesen, ausschlaggebend für die Diagnose sind bisher die auf die Blutveränderungen zurückgehenden Erscheinungen und Veränderungen an der Haut, den Schleimhäuten und bestimmten inneren Organen.

Die leichtesten Hautveränderungen bestehen in fleckweisen, diffusen Hautrötungen, die sich vielfach auf einen roten Fleck am Ohrgrunde beschränken, oder doch mit einem solchen beginnen. Die Hautrötungen können durch aus den anfänglichen, beim Rotlauf auftretenden, gleichen, im allgemeinen werden sie aber weniger ausgedehnt und auch weniger intensivrot an Farbe. Häufiger noch als die Hautrötungen kommen Blutungen in der Haut vor, die als einfache Petechien oder größere Durchblutungen von Haut-

stellen auftreten und vielfach wieder zuerst den Grund der Ohren befallen. Im Anschlusse an blutige Durchtränkungen kommt es oft zu brandigen Prozessen mit folgender Eintrocknung wie beispielsweise an Ohrspitzen und am Schwanz oder zum jauchigen Zerfall und Geschwürsbildung an anderen Stellen der Haut. Bei langsamem Verlaufe tritt oft ein Papel- und Quaddellexanthem in der Haut auf, aus dem sich nach grauer bis bräunlicher Verfärbung der Höhe dieser flachen Infiltrationen kleine Schorfe bilden, die dann in ihrer Gesamtheit den sogenannten „pockenartigen Hautausschlag“ darstellen. Die äußerlich nachweisbaren Schleimhauterkrankungen machen sich besonders in einem Lidbindehautkatarre mit oft starker Rötung, Wulstung und reichlicher Absonderung eines serös-schleimigen bis schleimig-eitrigen Exsudates, das die Lidränder verkleben und verkrusten kann, bemerkbar. Ein ähnlicher Katarre kann auch an der Nasenschleimhaut ablaufen, in beiden Fällen kann es auch zu Blutungen in die Schleimhäute kommen und kann Blut dem Ausflusse beigemischt sein. Die Miterkrankung der Schleimhäute des übrigen Atmungsapparates und der Lungen kann sich durch Husten und pumpendes Atmen anzeigen. An den Lippen und im Maule sind Blutungen und brandige Herde besonders an der Zunge häufige Vorkommnisse. Die Erkrankung am Magen und Darne kann sich in Erbrechen und Durchfällen, manchmal blutiger Natur, bemerkbar machen, die des Harnapparates in blutigem Harn und die des Gehirns in Zwangsbewegungen, Schwindel- und Krampfanfällen. Beachtenswert bei diesen Erscheinungen ist, daß beim einzelnen Tiere oft nur eine der angeführten Häute oder eins der genannten Organe Veränderungen der genannten Art erleidet beispielsweise allein die Haut oder auch allein Teile des Verdauungsapparates. Dementsprechend kann auch ein Symptom, auf das früher diagnostisch ein hoher Wert gelegt wurde, Durchfall, des öfteren während des ganzen Krankheitsverlaufes bei einem Tiere fehlen. Treten die geschilderten Symptome bei einem Tiere nur zu einem kleinen Teile auf, dann wird sich an einem solchen Tiere allein die bestimmte Diagnose Schweinepest nicht stellen lassen, oft gelingt dies dann aber durch Kombinierung der Symptome bei den übrigen Tieren des Bestandes zu einem Gesamtbilde. Führt die klinische Untersuchung nicht zum Ziele, so ist dies in der Regel doch durch die Zerlegung einer oder mehrerer verendeter oder notgeschlachteter Tiere bald zu erreichen. Im wesentlichen werden nun an den inneren Organen ganz gleichartige Veränderungen angetroffen, wie an den der äußerlichen Besichtigung zugänglichen, d. h. in den ersten Stadien und den leichteren Fällen Hyperämien und anschließend katarrhalische Zustände an den Schleimhäuten, in den höheren Graden zahlreiche kleine und größere Blutungen und bei langsamem Verlaufe wieder brandige Prozesse an den Schleimhäuten, besonders am Darm. Die katarrhalischen Zustände treten gern am Magen in der Fundusportion und am Darne im Dickdarme zu Tage, wobei beim Dickdarme oft schon äußerlich hellrote bis violette Verfärbungen und leichte Zerreißbarkeit der Darmwand bestehen. Analoge Prozesse können an den Bronchien vorhanden sein, eine vermehrte Schleimabsonderung führt dort oft zur Verstopfung kleiner Bronchien und zur Atelektase der zugehörigen Lungenläppchen. Meist sind dann die Spitzen der Lappen betroffen. Weiter trifft man oft auf hyperämische und serös durchtränkte einzelne Läppchen oder Läppchengruppen. Die in den schweren Erkrankungsgraden auftretenden Blutungen bevorzugen zunächst einmal die schon von den Hyperämien betroffenen Teile, also die Schleimhäute des Verdauungs- und Atmungsapparates. Beim ersteren kommen alle Übergänge von der kleinsten kaum sichtbaren Blutung bis zur diffusen ausgedehnten Durchblutung der gesamten Magen- und Darmwand und bis zum Erguß von Blut in den Magen und Darm hinein bis zur direkten Verblutung vor. Außer den Blutungen in der Schleimhaut und der Submukosa von Magen

und Darm sieht man solche noch oft unter der Serosa. Beim Atmungsapparate sind die Petechien besonders in der Schleimhaut des Kehlkopfes und der Luftröhre und unter dem Lungenfell nachweisbar, aber auch im Lungengewebe treten solche öfter auf und befallen auch gern die erwähnten entzündlich-ödematös durchtränkten Läppchen, Läppchengruppen und die angrenzenden Interstitien. Die gleichen Petechien wie an den Serosen von Magen und Darm und den Lungen beobachtet man weiter oft am Epikard besonders an den Herzohren, am Endokard und manchmal auch an den Hirnhäuten.

Schließlich werden von den Blutungen noch mit besonderer Vorliebe befallen der Harn- und der lymphatische Apparat, besonders die Lymphdrüsen. Im Nierenbecken und der Harnblase schwanken die Blutungen wieder von eben Sichtbarkeit bis zu Haselnußgröße, Blutungen erfolgen oft auch auf die Oberfläche und Blutgerinnsel füllen dann mehr oder weniger stark Nierenbecken, Harnleiter und Harnblase aus. Im Nierengewebe liegen die Verhältnisse analog, von den kleinsten Petechien über das Bild der sogenannten Forellenniere bis zu umfangreichen Blutmänteln unter der fibrösen und serösen Kapself der Niere herum gibt es alle Übergänge. Auffallend ist, daß die Nieren selbst dabei regelmäßig nicht vergrößert und entzündet erscheinen und oft von den Blutungen abgesehen ein blaßes, anämisches Aussehen haben. Bei den Lymphdrüsen geht die Erkrankung von der anfänglichen Hyperämie, die vor allem die Lymphknotenrinde betrifft, und einer markigen Schwellung in der Regel, wenigstens in den nicht ausgesprochen schiechend verlaufenden Fällen, zur blutigen Gewebsdurchtränkung von vielfach großem Ausmaße über, die die Lymphdrüsen oft um das fünf- bis zehnfache anschwellen lassen. Mehr oder weniger können die gesamten Lymphdrüsen des Körpers von dieser hämorrhagischen Schwellung betroffen sein. Gewöhnlich bleibt auf den Lymphdrüsenquerschnitten der Farbe nach eine Marmorierung dergestalt erhalten, daß dunkelkirschrote, hellrote und grauweiße Bezirke durcheinander gelagert erscheinen, manchmal ist auch eine gleichmäßig dunkelrote Beschaffenheit durch diffuse Durchblutung der gesamten Lymphdrüsen vorhanden. Nekrosen fehlen. Die Milz ist weniger, oft überhaupt nicht beteiligt. Geringere hyperämische oder hyperplastische Schwellungen kommen vor, ebenso Hämorrhagien und hämorrhagische Infarkte unter der Milzkapsel manchmal erheblichen Grades. Das Knochenmark zeigt in manchen akuten Fällen eine schwarzrote Verfärbung.

Zu diesen Veränderungen treten bei schiechendem Krankheitsverlaufe noch eigenartige Veränderungen diphtheroider Natur am Magen und Darne. Sie entsprechen im Wesen dem pockenartigen Hautausschlage und den serösen bis serös-hämorrhagischen lobulären Entzündungsherden in der Lunge. Sie gehen mit Vorliebe von Petechien in der Schleimhaut aus, deren Zentrum oft ein etwas geschwollener Solitärfollikel bildet. Charakteristisch für die Veränderungen ist, daß sie über das Niveau der umgebenden Schleimhaut als Knöpfe, Bänder oder Beete hervorragen und eine Schichtung aufweisen, die bei den Knöpfen eine konzentrische, bei den Bändern und Beeten eine parallele und wellige, entlang der Ränder der Herde ist. Diese Schichtungen kommen dadurch zustande, daß in dem gerinnenden Exsudat faseriges Fibrin auftritt und weiter dadurch, daß vielfach unterbrochen, schubweise an den Rändern der Primärherde neue Gerinnungsprozesse ablaufen. Diese geschichteten Schorfe sind als spezifisch für Schweinepest anzusehen, da sie bei anderen Krankheiten des Schweines bislang nicht nachgewiesen sind. Als für die Schweinepest unspezifische Prozesse können an den Lungen ausgedehnte fibrinöse, fibrinös-nekrotisierende und jauchige Lungenentzündungen und am Magen und Darne dieselben Veränderungen vorkommen, wie sie gleich bei der bazillären nekrotisierenden Darmentzündung beschrieben werden. Solche Veränderungen sind dann bei der

Schweinepest durch sekundär eingewanderte Bakterien veranlaßt. Wie für die äußerlich nachweisbaren Veränderungen, so gilt auch für die an den inneren Organen, daß beim einzelnen Tiere nicht gerade selten nur eines der erwähnten Organe erkrankt erscheint, beispielsweise der Dickdarm, oder die Lunge, oder die Niere. Für die Diagnose kann unter Umständen ein bakteriologisch negativer Befund bei einem Tiere aus einem pestverdächtigen Bestande eine gewisse unterstützende Bedeutung erlangen und ein Übertragungsversuch könnte evtl. die Entscheidung bringen.

Es bestehen mithin die diagnostisch wertvollsten Kennzeichen der Schweinepest in hoher Ansteckungskraft, fieberhaftem Allgemeinleiden, Erkrankung von Haut und Schleimhäuten, Lungen, Nieren und Lymphdrüsen zunächst vielfach in Gestalt von fleckweise auftretenden Hyperämien, später Hämorrhagien verschiedensten Grades und schließlich im Auftreten herdförmiger, entzündlicher Infiltration in der Haut in Form des pockenartigen Hautausschlages, in den Lungen in Form der serösen bis serös-hämorrhagischen Entzündungsherde und am Magen und Darms, besonders am Dickdarme, in Form der geschichteten diphtheroiden Schorfe.

Die Diagnose Schweinepest ist in der Regel von dem Tierarzte, der den ganzen Bestand mit den verdächtigen Erkrankungsfällen vor sich hat, und aus Symptomen und dem pathologischen Befunde zerlegter Tiere sich ein Gesamtkrankheitsbild kombinieren kann, leicht zu stellen und zwar viel leichter als von einem tierärztlichen Institut, dem nur die Organe eines Tieres oder ein Tierkadaver zur Untersuchung zugefandt werden. Das Institut, dem die eigene Kenntnis von den aufgetretenen Symptomen fehlt und dem meist nur der Organbefund einzelner Tiere zur Verfügung steht, kann dann naturgemäß einmal zur Diagnose kommen: einfacher Magendarmkatarrh, Paratyphus, enzootische Bronchitis und Pneumonie oder Schweinefeuche, trotzdem sie nach der im Bestande tatsächlich herrschenden Krankheit „Schweinepest z. T. unter Hinzutritt von Sekundärinfektionen“ lauten müßte. Die Schuld an solchen an dem wahren Wesen der in einem Bestande herrschenden Krankheit vorbeigehenden Diagnose liegt gewiß dann nicht an dem betreffenden Institute, sondern an der Eigenart der Schweinepest, an der großen Variationsbreite ihres Bildes, und z. T. auch an dem einsendenden Tierarzt, der in dem Begleitberichte nicht immer ausführlich genug seine eigenen Beobachtungen im Bestande mitteilte. Nun ließen sich solche diagnostische Schwierigkeiten bei den Institutsprüfungen ja z. T. durch Hinzufügung eines Übertragungsversuches auf Versuchsferkel zu der bloßen Beurteilung nach dem pathologischen und bakteriologischen Befunde wohl vermeiden.

Immerhin ist von vornherein von den Versuchsferkeln nicht viel anderes zu erwarten, als was uns die erkrankten Tiere im betreffenden Bestande bei genauer Beobachtung schon selbst zeigen. Solche Übertragungsversuche lassen sich auch ihrer Kostspieligkeit, ihrer Langwierigkeit und Schwierigkeit halber nur selten anstellen. Kostspielig und langwierig sind die Versuche, weil jeder Versuch an mindestens zwei Versuchsferkeln nicht zu jugendlichen Alters anzustellen sein würde, er einer Beobachtungszeit im günstigsten, positiv verlaufenden Falle von mindestens 8 Tagen, anderenfalls eine solche bis 3 Wochen bedarf und während der Versuchsdauer für eine sichere Isolierung, besonderen Wärter und dergleichen gefordert sein muß. Schwierig sind sie, weil bei der kleinen Zahl der Impflinge u. U. lediglich pestverdächtige Erscheinungen auftreten können, die eine sichere Diagnose allein auch noch nicht zulassen. Gleichwohl sind dies doch Umstände, die die Vornahme solcher Übertragungsversuche, die in ausnahmsweise trotz sorgfältigster Bestandsbeobachtung verbleibenden Fällen von Pestverdacht, teils für den betreffenden Bestand, teils auch zum Ausbau unserer Kenntnisse über die Schweinepest dringend erwünscht erscheinen müssen, nicht allzusehr einschränken sollten. Als Institute, in denen solche Übertragungsversuche stattfinden können, kommen im allgemeinen allerdings nur solche in Frage, die sich neben Untersuchungen eingefandener Materials nicht noch mit der Herstellung und dem Vertriebe von Impfstoffen für

Schweinekrankheiten befassen. Ein absichtlich geschaffenes Schweinepestgehöft kann m. E. nicht gleichzeitig Lieferstelle für Serum- und Bakterienpräparate gegen Schweinekrankheiten sein. Zuständig für solche Versuche halte ich staatliche Institute, die Untersuchungs- und Forschungszwecken dienen. Wünschenswert wäre es, wenn seitens des Staates einige solcher Institute bezeichnet würden, an die der beamtete Tierarzt in solchen, durch die Bestandsuntersuchung nicht zu klärenden Pestverdachtsfällen Material zur Untersuchung einsenden kann und in denen dann, falls die einfache Untersuchung nicht zum Ziele führt, die Übertragungsversuche anzustellen sein würden.

Verlassen wir nun die Schweinepest und sehen uns einmal die früher mit ihr zusammengeworfene bazilläre, nekrotisierende Darmentzündung an, so zeigt sich, daß diese Krankheit nur ein Schattenbild der Schweinepest darstellt. Die Krankheit ist verhältnismäßig selten, sie befällt nur die Ferkel eines Bestandes, die Ansteckungskraft und Mortalität ist selbst auch bei den Ferkeln meist nur mäßig und in den meisten Enzootien hat ihr Auftreten noch prädisponierende Umstände wie Haltung in feuchten, schmutzigen, übersetzten Ställen zur Voraussetzung. Klinisch ist die Krankheit durch anhaltenden Durchfall und Abmagerung ausgezeichnet. Hautausschläge können dabei bestehen oder auch fehlen. Nach dem Zerlegungsbefunde kann man zwei Formen, eine schwerere und eine leichtere unterscheiden. Die schwerere Form liefert ein typhöses Bild am Darm, d. h. stark markige Schwellung der follikulären Apparate in der Darm Schleimhaut mit der anschließenden Bildung meist quergestellter Geschwüre mit zerklüfteter Oberfläche ohne Schichtung und von eigenartig käfiger Beschaffenheit des abgestorbenen Materials. Um die Geschwüre bildet sich bald eine wallartige Begrenzung aus Granulations- und Narbengewebe. Die Darmlymphdrüsen zeigen eine starke, markige Schwellung und verfallen ebenfalls einer spezifischen Verkäufung. Dieselben Verkäufungsherde können auch in den Lungen und Lungenlymphdrüsen, manchmal auch noch in anderen Organen auftreten. Die Ursache dieser schwereren Form der bazillären, nekrotisierenden Darmentzündung ist im alten Bac. suispestifer und einer Abart desselben gegeben. Da diese Bakterien als die schweinespezifischen Paratyphusbazillen erkannt worden sind, so ist diese Erkrankung auch als Paratyphus des Schweines weitergeführt worden. Diese schwere Form der bazillären nekrotisierenden Darmentzündung hat am ehesten noch, einmal den Charakter einer echten Infektionskrankheit. Die leichtere Form der bazillären, nekrotisierenden Darmentzündung bietet klinisch ganz analoge Erscheinungen, bei der Zerlegung werden aber am Darm nur uncharakteristische, ungeschichtete, oberflächliche, mürbe Schorfe oder kleine Geschwüre nachgewiesen. Der follikuläre Apparat ist weniger beteiligt. Verkäufungsprozesse fehlen. Die Ursache bilden Paratyphusbazillen, die für das Schwein weniger virulent sind, Colibazillen, Bac. pyocyaneus u. a. Da diese ansteckende, bazilläre, nekrotisierende Darmentzündung Begleitkrankheit der Schweinepest sein kann, so ist zunächst bei ihrer Feststellung in einem Bestande Schweinepestverdacht zu äußern. Erkrankten dann in der üblichen Beobachtungszeit für Schweinepest immer nur die Jungschweine unter demselben Bilde der bazillären, nekrotisierenden Darmentzündung, dann darf Schweinepest als ausgeschlossen gelten. Materialeinsendung an ein geeignetes Institut kann schon mit Rücksicht auf die Behandlung wegen Feststellung des jeweilig beteiligten Bakterienstammes wertvoll sein. Ein Übertragungsversuch mit Blutfiltrat auf Versuchsferkel könnte gelegentlich zur Entscheidung der Diagnose mit herangezogen werden, dürfte aber zumeist keine frühere Entscheidung zulassen als die Bestandsbeobachtung. Differentialdiagnostisch zur Schweinepest und der bazillären nekrotisierenden Darmentzündung kommen abgesehen von den noch zu schildernden Krankheiten des Schweinefeuchekreises in Frage:

1. der Rotlauf, 2. die Blutfleckenkrankheit, 3. die Schweinepocken, 4. parasitäre Ruhrformen und 5. ein all-

gemeines, meist mit Hautauschlägen einhergehendes Kümern der Ferkel.

1. Keine Krankheit kann so leicht mit der Schweinepest einmal verwechselt werden wie der gewöhnliche, akute Rotlauf. Bei den ersten Erkrankungsfällen in einem Bestande können unter Umständen die gleichen Erscheinungen, Fieber und Hautrötung, bei beiden Krankheiten vorliegen. Ein im allgemeinen stürmischerer Krankheitsverlauf, ein meist etwas höheres Fieber, eine ausgedehntere und intensivere Hautrötung sprechen für Rotlauf, sind aber doch nur graduelle Unterschiede. Man wird dann gut tun, aus Jahreszeit, Seuchenstand in der Gegend und Vorbericht alle Umstände noch heranzuziehen, die für die eine oder andere Krankheit sprechen. Die wärmere Jahreszeit spricht mehr für Rotlauf, die kältere für Schweinepest, das Auftreten der Krankheit etwa 5—8 Tage nach einem Ankauf spricht mehr für Pest als für Rotlauf usw. Man wird auch möglichst zunächst die Not schlachtung eines erkrankten Tieres, die ja bei den akuten, schweren Erkrankungsfällen bei beiden Krankheiten an sich zumeist geboten ist, herbeiführen. Unter Heranziehung des Zerlegungsbefundes — beim Rotlauf fällt gewöhnlich neben einem Magendünndarmkatarrhe ein erheblicher, hyperplastischer Milztumor und eine hämorrhagische Glomerulo- oder allgemeine Nephritis auf — und evtl. auch noch eines Ausstrichpräparates ist dann die Diagnose regelmäßig leicht zu stellen. So können Verwechslungen vermieden werden, die schon für manchen Kollegen, der in der Annahme, daß Rotlauf vorlag, in einem frisch schweinepestverseuchten Bestande die kranken Tiere mit Rotlaufferum und die gesunde erscheinenden gleichzeitig simultan impfte, eine recht unliebsame Quittung in Gestalt zahlreicher schwerer Erkrankungs- und rascher Todesfälle teils an Mischinfektionen beider Krankheiten teils an Schweinepest brachte. Mischinfektionen von Pest und Rotlauf können auch sonst einmal vorkommen, im großen und ganzen sind sie aber Seltenheiten, ein Nachweis von geringen Mengen rotlaufbazillenartiger Stäbchen in Schweinepestkadavern kann jedenfalls nicht als eine wirkliche Mischinfektion gedeutet werden.

2. Die Blutfleckenkrankheit kommt nur sporadisch vor, verläuft meist fieberlos oft mit Schwellungen der Beine. Abgesehen von den zahlreichen Blutungen, die an denselben Stellen wie bei der Pest auftreten können, fehlen sonstige Veränderungen, wie sie bei der Pest auftreten können.

3. Die Schweinepocken, wie sie jetzt in Deutschland vorkommen, stellen gegenüber der Schweinepest und auch der bazillären nekrotisierenden Darmentzündung eine viel leichtere, kaum einmal eine tödliche Erkrankung herbeiführende Krankheit dar. Die Schweinepocken zeigen ihre charakteristische Form besonders an den Ohren, wo sie als erbsen- bis haselnußgroße, rote Knoten, die auf der Höhe eindellen und sich mit braunen Krusten bedecken, erscheinen.

4. Ruhrformen tierisch-parasitärer Natur können bei Ferkeln ähnliche Erscheinungen wie chronische Schweinepest oder die bazilläre nekrotisierende Darmentzündung aufweisen. Bei der Zerlegung können auch oberflächliche Verfärbungen und Geschwürchen von uncharakteristischem Aussehen vorkommen. Menge und Art der im Darmabstrichpräparate festgestellten Protozoen-Coccidien, Balantidien — oder auch einmal Würmer — Strongyloiden, Oesophagostomen — und weitere Bestandsbeobachtung wird in der Regel bald zur Diagnose führen.

5. Von einem allgemeinen Ferkelkümern, verbunden meist mit Hautauschlägen, ist neuerdings von verschiedenen Seiten behauptet worden, daß ihm häufig die Schweinepest zugrunde liege. In einigen solcher Fälle ist auch an solchen kümmernden Ferkeln, die keinen für Schweinepest typischen Krankheits- und Organbefund aufgewiesen hatten, durch positiv für Schweinepest ausgefallene Übertragungsversuche auf Versuchsferkel tatsächlich die Schweinepest für den betreffenden Bestand nachgewiesen worden; in anderen Fällen solchen Ferkelkümern hat man lediglich aus der

anscheinend günstigen Wirkung einer Schweinepestserumeinspritzung auf das primäre Vorhandensein der Schweinepest geschlossen. Namentlich soll ein solches bloßes Ferkelkümern ohne charakteristischen Pestbefund in Beständen auftreten, die einige Zeit vorher die Pest einmal durchgemacht haben und in denen eine Anzahl von anscheinend durchseuchten Tieren übrig blieb. Auch ich habe ähnliches beobachtet. In Beständen, in denen nach einem Pestausbruche ein Teil der Sauen übrig blieb, erkrankten mehrere Monate nach Aufhebung der Sperre die inzwischen geworfenen Ferkel und zwar zu einem Zeitpunkte, als sie sich von der Muttermilch in der Hauptlache entwöhnt hatten und schon reichlich andere Nahrungsmittel aufnahmen. Die Erkrankungsfälle unter den Ferkeln verliefen dabei auch besonders schleichend und leicht, immerhin ließ doch einmal die Berücksichtigung des Vorberichtes und die Beobachtung des Gesamtkrankheitsbildes die Diagnose zu. Schon äußerlich zeigten einige der Ferkel einen Lidbindehautkatarrh evtl. in Verbindung mit Husten oder etwas Durchfall, andere einen Hautauschlag besonders an den Ohren in Gestalt kleiner rundlicher roter Flecke mit meist eintretender, grauer Verfärbung im Inneren. An den inneren Organen bestand neben mehr oder weniger ausgeprägter Lungenentzündung bei dem einen oder anderen Tiere auch eine Dickdarmentzündung mit der Bildung geschichteter Schorfe. Immerhin ist es wohl möglich, daß ausnahmsweise einmal in solchen Fällen durch die Bestandsuntersuchung keine völlig sichere Diagnose gestellt werden kann, für solche Fälle wäre dann die Einfendung von Material an ein geeignetes Institut zum Zwecke der endgültigen Aufklärung des Falles durch einen Übertragungsversuch auf Versuchsferkel angezeigt. Zwar kann es nun weiterhin ausnahmsweise vorkommen, daß ein unaufmerksamer Schweinebesitzer eines kleineren Schweinebestandes es nicht merkt oder es nicht anzeigt, daß die Schweinepest seinen Bestand heimgesucht hat und daß sich in einem solchen Bestand später ein Ferkelkümern zeigt, verursacht durch das Schweinepestvirus. Solche Fälle bilden aber an sich Ausnahmen und da sich auch dabei, wie ausgeführt, durch eine genaue Beobachtung des Gesamtbestandes der Ferkel zumeist noch die Schweinepestdiagnose erbringen läßt, so können sie eben so wenig wie die erwähnten anderen Fälle nach erwiesenem, vorangegangenen Pestausbruche dazu dienen, etwa das Schweinepestvirus als Ursache der sonstigen, zahlreich vorkommenden Fälle von Ferkelkümern allgemein oder auch nur oft zu vermuten. Daß zudem das oft vorkommende Ferkelkümern in den Beständen, in denen die Schweinepest bestimmt nicht vorausgegangen ist, nichts mit Schweinepest zu tun hat, habe ich früher und neuerdings Dr. Karsten nachgewiesen. In den Karsten'schen Fällen war in den betreffenden großen Züchtereien in der kälteren Jahreszeit ein Ferkelkümern in Verbindung meist mit multipel herdförmigen, manchmal auch diffusen, krustösen Hautauschlägen aufgetreten, das fast alle Ferkel befiel und die ganze Ferkelaufzucht in Frage stellte. Die angestellten künstlichen Übertragungsversuche auf Versuchsferkel fielen sämtlich negativ aus. Ein einheitlicher bakteriologischer Befund wurde bei den Tieren der befallenen Bestände nicht ermittelt. Als primäre Ursache mußten klimatische Einflüsse, Zucht- und Haltungsfehler gelten, da nach dem Verschwinden und Abstellen der allgemein schädigenden Einflüsse z. T. unter gleichzeitiger Anwendung einer unspezifischen Eiweißtherapie die Krankheit aus den Beständen verschwand. Sekundäre Bakterieneinwanderung seitens der üblichen Halbparasiten hatte zumeist stattgefunden und z. T. auch besondere Krankheitsverschlimmerung durch Hinzutreten eines Darmkatarrhes, einer Lungenentzündung, einer Lippen- und Maulnekrose usw. veranlaßt.

Es besteht sonach gewiß aller Grund besonders bei Ferkelkümern nach einem Pestausbruche in einem Bestande, aber auch in den anderen Fällen sorgfältig bei den erkrank-

ten Ferkeln auf Erscheinungen und Veränderungen der Schweinepest zu achten, andererseits aber doch noch kein Anlaß beim Fehlen derselben immer gleich das Gespenst der Schweinepest hinter der Krankheit zu sehen. Die Hauptmenge der Fälle des Ferkelkümmerns hat sicher mit der Schweinepest zu tun.

Wir kommen nunmehr zu den Erkrankungen des Schweinefeuchekreises. Die wichtigste Krankheit in diesem Kreise ist für uns die frühere chronische Schweinefeuche einschließlich der Ferkellungenentzündungen, unsere heutige enzootische Bronchitis und Pneumonie. Diese Krankheit hatte um die Jahrhundertwende in Deutschland, besonders in Norddeutschland, eine überaus große Verbreitung. Die meisten großen Mästereien und viele Züchtereien hatten unter dieser Krankheit zu leiden und an den großen Schlachthöfen waren an manchen Hauptschlachttagen bis zu 50 Prozent der Schlachtschweine mit den Veränderungen derselben behaftet. Nachdem man über die Ursachen der Krankheit besser unterrichtet war, ging ihre Verbreitung sehr rasch zurück, immerhin gehört sie auch heute noch zu den häufig anzutreffenden Schweinekrankheiten. Ihre Feststellung ist im allgemeinen nicht schwer. Treten wir in einen von ihr befallenen Bestand hinein, dann tönt uns schon beim Durchschreiten aus einzelnen Buchten ein lauter, rauher, heiserer, krächzender Husten, der meist in Anfällen auftritt, entgegen. Werden die Tiere aufgetrieben, dann vermehrt sich die Zahl der Husten beträchtlich. Von dem Husten abgesehen, erscheinen die meisten Tiere des Bestandes gewöhnlich frei von sonstigen Krankheitsercheinungen und entsprechende Fütterung vorausgesetzt, auch gut genährt. Einzelne Tiere fallen jedoch mehr oder weniger ab, sie zeigen durch schlagendes Atmen eine Beteiligung der Lunge an der Krankheit an, die Haut erscheint unrein, oft auch mit einem mehr oder weniger ausgebreiteten, krustigen Ekzem behaftet. Abszesse und rachitische Erscheinungen an den Schenkeln treten hier und da bei einem Falle hinzu. Todesfälle kommen nur selten vor. Bei der Zerlegung fällt zunächst die starke Verdickung der Bronchien und Bronchiolen auf, sie sind zu starren Röhren, gefüllt mit zähem, trübem Schleim, geworden. Die zugehörigen Lungenläppchen, betroffen sind vorwiegend die Läppchen an den Lappen spitzen, sind in den leichteren Fällen zusammengefallen, atelektatisch, von roter, fleischiger Beschaffenheit oder bereits abgeblaßt, bindegewebig entartet und induriert. In etwas schweren Fällen sind die Alveolen nicht ganz zusammengefallen und mit zeligem Exsudat gefüllt, die betroffenen Lungenteile erhalten Ähnlichkeit mit der Bauchspeicheldrüse; in den schwersten Fällen sind die Alveolen ausgedehnt und mit einem flüssigen, trübem oder auch teilweise mit einem geronnenen, fibrinösen Exsudate gefüllt. Nekrotische und jauchige Herde und Abszesse können weiterhin in den pneumonischen Bezirken auftreten. Die sonstigen Organe sind meist frei von besonderen Veränderungen. Der Verlauf der Krankheit ist in der Regel ein schleichender und erstreckt sich oft über mehrere Monate bis zur Schlachtung des Tieres mit nur kleinen Schwankungen im Krankheitsbilde. Bei jüngeren Tieren, Ferkeln und Läufern, kommen manchmal Enzootien vor, in denen die Krankheit einen etwas akuten Charakter und schwereren Verlauf annimmt. Dabei treten dann auch Fieber, Nachlassen des Appetits, schwerere Erscheinungen einer Lungenentzündung und oft auch diffuse oder multipel herdförmige krustöse Hautausschläge zu Tage. Es kommt in solchen Enzootien dann auch naturgemäß zu häufigeren Todesfällen als bei dem gewöhnlichen Verlaufe. Bei der Zerlegung wird dann eine katarrhalische Pneumonie, oft mit Übergängen in eine fibrinöse oder fibrinös-nekrotisierende, festgestellt. Die Ursache der Erkrankung in ihren leichteren Formen ist allein in Haltungsfehlern vor allem in fortgesetzten Erkältungen gegeben, da dabei der bakteriologische Befund negativ oder doch so geringfügig ist, daß aus ihm nichts geschlossen werden kann, und man auch

künstlich allein durch Halten von Versuchsschweinen in kalten, feuchten, dunkeln Ställen dieselben Veränderungen erzeugt hat. Bei den etwas akuter verlaufenden Enzootien wird gewöhnlich ein Bakterium, in Reinkultur oder doch vorherrschend, reichlich in den entzündeten Lungenteilen angetroffen, es handelt sich dann zumeist um bipolare Bakterien, Streptokokkenarten oder auch manchmal Pyogenes- oder Paratyphusbazillen. In solchen Fällen ist außer den Haltungsfehlern den ermittelten Bakterien eine Bedeutung bei der Krankheitsentstehung beizumessen. Diese Krankheitsfälle können in Parallele gesetzt werden dem Schnupfen der Kinder, der gewöhnlich ebenfalls nach Erkältungen auftritt und gern von der Nase auf Kehlkopf und Bronchien übergreift. Solche Katarrhe heilen bei den Kindern nur eher wieder ab, weil man sie nicht fortgesetzt weiter denselben schädigenden, äußeren Einwirkungen aussetzt, wie dies bei den Jungschweinen zumeist geschieht. Auch in der Ansteckungsfähigkeit gleicht dieser Schnupfen den schwereren Fällen der enzootischen Pneumonie. In beiden Fällen ist eine solche gewöhnlich vorhanden, wenn das erkrankte Individuum mit solchen zusammen kommt, die denselben schädigenden Witterungs- oder Haltungsfehlern ausgesetzt waren. Beim Schwein sind diese Haltungsfehler vor allem in einer dauernden Stallhaltung gegeben, besonders dann, wenn die Ställe feucht und kalt sind. Die schwereren Enzootien unter den Jungschweinen treten außerdem gern in der kalten Jahreszeit, oft auch nach Passieren von Märkten auf.

Die seltenste Krankheit des Schweinefeuchekreises stellt gegenwärtig die eigentliche Schweinefeuche, d. h. die akute Bipolarisbazillose dar, immerhin wird sie in Einzelfällen bei erwachsenen Tieren und einzelnen Enzootien bei Tieren aller Altersklassen eines Bestandes hier und da einmal beobachtet, am häufigsten anscheinend noch im Osten des Reiches. Diese Krankheit stellt gleichsam nur den Gipfel, die akuteste Form der enzootischen Bronchitis und Pneumonie dar. Ihre Sonderstellung ist aber gerechtfertigt, weil sie selbständig durch ein Bakterium, den *Bac. bipolaris suis*, hervorgerufen wird, auch die älteren Schweine befällt und damit die Grundeigentümlichkeit einer Seuche behalten hat. Die Hauptform der Erkrankung verläuft als akute Lungenentzündung, seltenere Formen verlaufen als Septikämie meist unter Begleitung eines akuten Rachen- oder Magendünndarmkatarrhes oder auch von gelbsulzigen Ödemen in der Unterhaut und Muskulatur, wie sie besonders in der Nachbarschaft bei einer primären Wundinfektion durch die bipolaren Bakterien oder in der Rachengegend und am Halse, von der primären Rachenentzündung ausgehend, auftreten können. Zu schwerem, fieberhaften Allgemeinleiden gesellen sich bei dieser meist in wenigen Tagen tödlich ausgehenden Erkrankung gewöhnlich auch diffuse Hautrötungen ähnlich wie bei manchen akuten Schweinepestfällen. Die Ansteckungskraft der Krankheit ist meist geringer als die der Schweinepest. Bei der Zerlegung weist bei der Hauptform die Lunge eine starke Ausdehnung, dunkelrote Farbe und leberartige Konsistenz auf. Die Pleura ist regelmäßig fibrinbeschlagen. Auf der verhältnismäßig trockenen, fein granulierten Schnittfläche ist meist in der Farbe eine Felderung zu erkennen, Bezirke in verschiedenen Farbentönen wechseln mit bräunlichgrauen und grauen ab, die Konsistenz in den grauen Bezirken wird eine brüchige, mürbe, die Teile sind der Nekrose verfallen. Die bei den sonstigen Formen auftretenden Katarrhe und Ödeme bieten an sich nichts Charakteristisches. Bei allen Formen können wohl hier und da an Haut und Schleimhäuten und Serosen besonders am Epikard einige Hämorrhagien vorkommen, ein ausgesprochen hämorrhagischer Charakter, wie er die meisten akuten Schweinepestfälle kennzeichnet, ist aber der akuten Bipolarisbazillose nicht eigen. Es fehlt auch, wenn man von den regionären Lymphdrüsen, die zu den jeweils entzündeten Organen gehören, absieht, eine ähnliche

allgemeine, hämorrhagische Schwellung der Lymphdrüsen. Mikroskopisch und kulturell werden in den entzündeten Teilen, den regionären Lymphdrüsen und im Blute regelmäßig reichlich die bipolaren Bakterien nachgewiesen. Treten in einem Bestande einige akute Erkrankungsfälle unter dem hier geschilderten Bilde auf, dann ist zunächst mit der Möglichkeit zu rechnen, daß primär Schweinepest vorliegt und betreffs des Schweinepestverdachtes durch die weitere Bestandsbeobachtung die Entscheidung herbeizuführen. Eine solche wird dann bald gelingen, da gerade bei der Schweinepest die mehr akut verlaufenden Fälle an sich nur ausnahmsweise lediglich das Bild der Schweinefleck aufweisen und bald Fälle dazu kommen werden, die klar das Bild der Schweinepest zur Schau tragen.

Die dritte Krankheit aus dem Schweinefleckkreise, die nicht gerade selten vorkommt, ist die fibrinöse Serofen- und Gelenkentzündung. Sie befällt nur Ferkel und Läufer und zwar vorzugsweise solche, die Transporte durchgemacht haben. Es erkranken ein Teil oder alle Ferkel eines neu eingetroffenen Transportes wenige Tage nach der Ankunft schwer. Die Tiere liegen viel, verschmähen das Futter, fiebern und manche husten etwas. Beim Auftreiben bemerkt man meist Lahmen und beim näheren Zusehen Anschwellung eines oder mehrerer Gelenke. Betroffen sind vor allem die Knie- und Fußwurzelgelenke. Sind die Gelenke mehrerer Schenkel stark betroffen, dann sind die Tiere meist zum Aufstehen nicht mehr zu bewegen, sie liegen dann mit gebeugten Gelenken und angezogenen Beinen und schreien klagend beim Versuch, sie aufzurichten. Beim Anfassen

der Gelenke äußern die Tiere lebhaft Schmerzen. Die geschwollenen Gelenke fühlen sich auch heiß an und die Haut über denselben ist vielfach stark gerötet. Ein großer Teil der Tiere erliegt zumeist der Erkrankung. Die Krankheit greift auf die übrigen Tiere des Bestandes nicht über und bei Rückfragen in den Ursprungsbeständen wird festgestellt, daß auch dort keine derartige Krankheit unter den zurückgebliebenen Tieren herrscht. Bei der Zerlegung findet man fibrinöse Beläge auf dem Bauch- und Brustfell und dem Epikard, auf dem Bauchfelle können sie gering fein oder fehlen, auf dem Brustfelle sind sie regelmäßig vorhanden, manchmal allerdings nur einseitig. Vorzugsweise sind die unteren Abschnitte der Lungenlappen mit Fibrin beschlagen und dementsprechend auch die gegenüber liegenden, tieferen Brustfellabschnitte. Die Lungen können in den tieferen Abschnitten ödematös durchtränkt evtl. auch einmal etwas erheblicher verdichtet sein. In den Gelenken befinden sich Fibrinflocken und Schollen und förmliche Fibrinausgüsse der Gelenkhöhlen neben trüber Synovia. In den Exsudaten wird zumeist reichlich ein gramnegatives, schlankes Stäbchen von etwa der Größe des Tuberkelbazillus nachgewiesen. Dies scheint manchmal rasch zugrunde zu gehen, denn öfter findet man im Exsudate einer Körperhöhle keine Stäbchen mehr, während sie in dem einer anderen vorhanden sind, manchmal fehlen sie auch bei einem Ferkel ganz, während sie bei einem zweiten Ferkel des selben Bestandes wieder vorhanden sind. In manchen Fällen finden sich in den Exsudaten solcher Fälle auch andere Bakterien, meist dann Streptokokken. (Schluß folgt.)



Beitrag zur Morphologie des Erregers der Weideseuche der Rinder in Schleswig-Holstein.

(Mit 2 Abbildungen.)

Von Prof. Dr. S. Plasaj, Zagreb.

Unlängst berichtete Pfeiler über seine Entdeckung des als Erreger der Weideseuche der Rinder in Schleswig-Holstein (böartige Euterentzündung, Jüddersük) angesprochenen Mikroorganismus und über die Verschiedenheit desselben gegen *B. pyogenes*. Einige Autoren wurden dadurch veranlaßt, zu diesen Befunden Zweifel zu erheben.

logischen Eigenschaften und Beweglichkeit des Jüddersükstammes nachzuprüfen, und dabei konnte ich nicht nur die Beweglichkeit dieses Mikroorganismus bestätigen, sondern es gelang mir auch, (Zettinow) eine einwandfreie Darstellung von Geißeln. Der Jüddersükstamm trägt



Seele mann¹⁾ in Übereinstimmung mit Pfeiler ist der Ansicht, daß der von Pfeiler beschriebene Mikroorganismus mit dem *B. pyogenes* nicht identisch ist, und hebt hervor, daß der bei der Jüddersük gefundene Mikroorganismus sich als beweglich erweist, daß ihm aber eine einwandfreie Darstellung von Geißeln noch nicht gelang. Diese Mitteilung Seele mann's hat mich veranlaßt, die morpho-

eine polare Geißel, wie aus den beiliegenden Photographen ersichtlich ist. Die zur Untersuchung benutzte Kultur wurde mir in liebenswürdiger Weise vom Professor Pfeiler selbst überlassen. Sie wurde als Reinkultur gefunden und stimmte in morphologischen und kulturellen Eigenschaften mit den von Pfeiler²⁾ beschriebenen Eigenschaften des Jüddersükstammes überein.

¹⁾ Berl. Tierärztl. Wochenschrift 1927, S. 361.

²⁾ Zentralbl. f. Bakt. I. O. 102, 453.

(Aus der Veterinärabteilung des Reichsgesundheitsamtes.)

Zur Ätiologie der Weideeuterentzündung der Kühe und Färsen in Ostfriesland.

Von P. Karmann.

Als Erreger der Weideeuterentzündung der Kühe und Färsen wurde bis vor kurzem allgemein ein Bakterium angesehen, das Glage (1) näher beschrieben und mit dem Namen *Bacterium pyogenes* belegt hat. Poels (13), Künnemann (4), Ostertag und Weichel (6), Maass (5), in neuester Zeit Klimmer, Haupt und Glöckner (2, 3) u. a. haben bei Fällen von Weideeuterentzündung das *Bact. pyogenes* als Erreger festgestellt.

Da erschien in Heft 1 des Jahrganges 1927 der Tierärztlichen Rundschau eine Arbeit Pfeiler's (7), in der er einen neuen Erreger der Weideeuterentzündung in Schleswig-Holstein beschrieb. Diesen Erreger nannte Pfeiler den „Bazillus der bösartigen Euterentzündung der Rinder“, später auch den „Weidefeuchebazillus“ oder den „Jüdderfückbazillus“. Der erwähnten Arbeit folgten bald noch andere Arbeiten Pfeiler's (8, 9, 10) sowie eine solche von Pfeiler, Schlaak und Thomsen (11). Alle diese Arbeiten bestätigten die in der ersten Arbeit Pfeiler's mitgeteilte Feststellung, daß das Pfeiler'sche Bakterium als der Erreger der Weideeuterentzündung in Schleswig-Holstein anzufprechen sei. Nähere Beschreibungen des Pfeiler'schen Bakteriums liegen außer von Pfeiler noch von Seelemann (14) sowie neuerdings von Plasaj (12) vor. Nach den Angaben der genannten Autoren und nach den Ergebnissen meiner eigenen Untersuchungen, die ich an zwei von Prof. Pfeiler in entgegenkommender Weise überlassenen Stämmen vornehmen konnte, hat das Pfeiler'sche Bakterium, namentlich was Größe und Gestalt betrifft, eine gewisse Ähnlichkeit mit dem *Bact. pyogenes*. Es unterscheidet sich jedoch bei genauer Prüfung so deutlich von diesem, daß eine Verwechslung der beiden Stäbchenarten nicht möglich ist. Am meisten fallen diejenigen Unterschiede auf, die sich ergeben nach Beimpfung der gewöhnlichen Nährmittel (Agar und Bouillon) sowie nach Beimpfung von Schrägferum und Milch. Während das Wachstum des *Bact. pyogenes* auf Agar und in Bouillon schlecht ist und schließlich ganz aufhört, gedeiht der Bazillus der bösartigen Euterentzündung der Rinder auf Agar und in Bouillon von Anfang an wesentlich kräftiger und besser. Außerdem macht sich beim Weidefeuchebazillus nach jeder Überimpfung eine immer stärkere Gewöhnung an diese Nährmedien bemerkbar. Beide Stäbchenarten wachsen auf Schrägferum sehr gut. Dabei ist als wesentlicher Unterschied festzustellen, daß der Jüdderfückbazillus bei seinem Wachstum nicht zur Verflüssigung des Serums führt, während das *Bact. pyogenes* das Serum nach einigen Tagen in deutlich sichtbarer Weise verflüssigt. Milch verändert sich nach Einfaat von Weidefeuchebazillen nicht sinnfällig, während das *Bact. pyogenes* dieses Nährmittel nach einigen Tagen in der Weise zur Gerinnung bringt, daß die Gerinnung vom Boden des Kulturröhrchens aus unter Abcheidung klarer Molke einsetzt. Das Milchgerinnsel befindet sich dabei als feste Masse auf dem Grunde des Reagensröhrchens, ähnlich wie der Blutkuchen im abgeschiedenen Serum liegt. Pfeiler weist noch auf eine Reihe anderer Unterschiede (Beweglichkeit, Verhalten in der „bunten Reihe“ u. a.) hin, die die Verschiedenheit der beiden Bakterienarten noch mehr zum Ausdruck bringen und von mir bestätigt werden können. Plasaj gelang kürzlich bei Anwendung des Färbeverfahrens nach Zettnow die einwandfreie Darstellung einer polaren Geißel.

Ich hatte im Sommer 1927 in Ostfriesland Gelegenheit, insgesamt 74 Fälle von Weideeuterentzündung

eingehend zu untersuchen. Bei diesen 74 Fällen habe ich 70mal Stäbchen, einmal Stäbchen und Staphylokokken in Milchinfektion und dreimal Staphylokokken allein gefunden.

Die Stäbchen erwiesen sich bei genauer Prüfung einwandfrei als *Pyogenesbakterien*. Den Bazillus der bösartigen Euterentzündung (*Weidefeuchebazillus*, *Jüdderfückbazillus*) konnte ich in keinem Falle feststellen. Die bei drei Fällen in Reinkultur und bei einem Fall in Milchinfektion mit *Pyogenesbakterien* gefundenen Staphylokokken erwiesen sich grampositiv. Ihr Wachstum auf Agar und in Gelatine war gut. Auf der Gelatineplatte entwickelten sich kleine, unregelmäßig runde, weiße Kolonien von mittelgrobkörniger Struktur; sie sanken allmählich in den Nährboden ein, wobei sich eine tellerartige, flache Verflüssigungszone bildete. Im Gelatinestich setzte längs des Stichkanals vom zweiten bis dritten Tage ab Verflüssigung ein. Die Verflüssigungszone war konisch. Die Staphylokokkenkolonien auf der Agarplatte waren rundlich, weiß, saftig glänzend, erhaben und glattrandig. Bouillon wies 24 Stunden nach der Beimpfung eine gleichmäßig starke Trübung und einen geringen Bodensatz auf, der sich beim Aufschütteln in kleine Flocken zerteilte. Milch gerann nach 1½ Tagen kompakt. Aus Trauben- und Milchsucker wurde wohl Säure, nicht aber Gas gebildet (Rötung und Trübung von Barsiekow I und II; keine Gasbildung in Trauben- und Milchsuckerbouillon, die mit Gärungsröhrchen beschickt war). Nach allen diesen Eigenschaften handelte es sich bei den von mir isolierten Staphylokokken um den *Micrococcus pyogenes albus* (Rosenbach).

Ich konnte demnach im Sommer 1927 in Ostfriesland bei 74 Fällen von Weideeuterentzündung wohl das *Bact. pyogenes* und ausnahmsweise auch den *Micrococcus pyogenes albus*, nie aber Pfeiler's Bazillus der bösartigen Euterentzündung nachweisen. Ausführlicheres über meinen Studienaufenthalt in Ostfriesland, insbesondere auch über die dort angestellten Versuche, wird in einer demnächst in der „Zeitschrift für Infektionskrankheiten ufw. der Haustiere“ erscheinenden umfangreicheren Arbeit mitgeteilt werden.

Literatur.

1. Glage, F.: Handbuch der pathog. Mikroorganismen von W. Kolle und A. v. Wassermann, 2. Aufl., 1913, 6. Bd., S. 145.
2. Klimmer, M. und Haupt, H.: Tierärztl. Rundschau, 1927, 33. Jahrg., S. 256.
3. Klimmer, M., Haupt, H. und Glöckner, E.: Tierärztl. Rundschau, 1927, 33. Jahrg., S. 150.
4. Künnemann, O.: Arch. f. wissenschaftl. und praktische Tierheilkunde, 29. Bd., 1903, S. 128.
5. Maass, B. T. W. 1927, 43. Jahrg., S. 154.
6. Ostertag, R. und Weichel: Centralbl. f. Bakt., Ref., Bd. 47 (1910), Beiheft, S. 218.
7. Pfeiler, W.: Tierärztl. Rundschau, 1927, 33. Jahrg., S. 6.
8. Derselbe: Tierärztliche Rundschau, 1927, 33. Jahrg., S. 255.
9. Derselbe: B. T. W. 1927, 43. Jahrg., S. 239.
10. Derselbe: Centralbl. f. Bakt., Orig., Bd. 102 (1927), S. 453.
11. Pfeiler, W., Schlaak und Thomsen: Tierärztl. Rundschau, 1927, 33. Jahrg., S. 319.
12. Plasaj: D. T. W. 1928, 36. Jahrg., S. 199.
13. Poels, J.: D. T. W. 1911, 19. Jahrg., S. 644.
14. Seelemann, M.: B. T. W. 1927, 43. Jahrg., S. 361.)

Innere Medizin und Chirurgie.

Bontz, R.: Die Behandlung von Bronchitiden und von sich im Anfangsstadium befindlichen Bronchopneumonien bei Pferden durch intramuskuläre Ätherinjektionen. (B. T. W. 1927, S. 377.)

Veranlaßt durch die Erfolge die Bier und sein Assistent Rieß mit intramuskulären Ätherinjektionen bei der Behandlung von Operations- und Erkältungsbronchitiden erzielten, versuchte Verf. diese Therapie bei der analogen Krankheit der Pferde. Nach dem Vorgange von Bier wurde das Mittel in Mischung mit Ol. olivar. ää injiziert und zwar in der Gesamtmenge von 5—10 ccm täglich. Am Tage nach der ersten Injektion war bei allen so behandelten Pferden ein gehobenes Allgemeinbefinden, Temperaturrückgang und eine deutliche Lösung des Lungenschleimes bemerkbar, außerdem ließ die Schmerzhaftigkeit des Hustens nach. Nach der zweiten oder dritten Einspritzung war meist schon eine Verminderung des bronchitischen Sekretes zu konstatieren. Die Krankheitsdauer wurde beträchtlich herabgesetzt. Behufs Befriedigung der Pferdebesitzer wurde während der ersten Krankheitstage auch die seither übliche Therapie (heiße Packungen, Inhalationen) mit verordnet. Das Gesagte illustriert Verf. durch drei kurze Krankheitsgeschichten. In einem Falle (23jähriges Pferd) trat leichte Herzschwäche ein, was vielleicht mit der Ätherbehandlung im Zusammenhange steht. In einem andern Falle war das Tier (vier Jahre alt) nach der zweiten Injektion (10 ccm) unruhig und zeigte am fünften Tage stark gestörtes Allgemeinbefinden, war jedoch am 7. Tage fieberfrei. Verfasser empfiehlt daher die tägliche Dosis auf 5 ccm Äther + Ol. olivar. ää festzusetzen und die Injektionen so lange vorzunehmen, bis die Temperatur einen ganzen Tag normal bleibt.

Carl.

Eilers, O.: Erfahrungen mit Kupfer-Dermasan bei der Behandlung schlechttheilender Affektionen der Haut. (D. m. W. 1927, S. 918.)

Das von der Rheumasan- und Lenizetfabrik Berlin (Dr. R. Reiß) hergestellte Mittel stellte chemisch einen Salicylsäure-Kupferseifenester dar und wird seit einer Reihe von Jahren in der Chirurgie angewandt. Die Erfahrungen und Beobachtungen des Verf. über das Präparat ergeben sich aus folgender Zusammenfassung:

1. Kupfer-Dermasan verdient, abgesehen von der Haut- und chirurgischen Tuberkulose (perforierte Abszesse, Knochenfisteln u. ä.) auch in der Therapie schmierig belegter Wunden und Geschwüre, speziell Ulcera cruris varicosa sowie chronisch schuppender Ekzeme Berücksichtigung.

2. Die Behandlung ist bei möglichst milder Anwendungsweise des Mittels für den Kranken fast schmerzlos und läßt sich ohne Schwierigkeiten ambulant durchführen.

3. Kupfer-Dermasan ist trotz monatelanger ununterbrochener Anwendung bei einiger Vorsicht ohne schädliche Nebenwirkungen.

Carl.

Claus, L.: Erfahrungen mit Opsonogen in der Praxis. (T. R. 1927, S. 370.)

Opsonogen ist eine polyvalente Staphylokokken-Vakzin, welche in der Humanmedizin bei allen Pyodermien angewandt wird. Opsonogen-Injektionen regen den Körper zu vermehrter Bildung spezifischer Abwehrstoffe an. Ihre Anwendung empfiehlt sich in jenen Fällen äußerer Erkrankung, bei denen Staphylokokken als Erreger oder auch als mitwirkend in Frage kommen, so bei Ekzemen, Akne, pustulöser Dermatitis, Sommerräude, Akarusräude und Wundeiterungen. In der Chirurgie und Wundbehandlung empfehlen sich prophylaktische Opsonogen-Injektionen. Als Dosen wurden für kleine und mittelgroße Tiere 100—1000 Millionen Keime in 1 ccm, für Großvieh 2000—5000 Millionen Keime in 5 ccm gewählt. Wiederholungen der meist subkutanen Injektionen nach 3—5 Tagen in steigender

Dosis. Chronische Fälle erfordern längere Injektionsreihen. Unangenehme Nebenererscheinungen traten nicht auf.

K. H. Meyer.

Breidenbach: Über die Anwendung des Bariomyls bei der Kolikbehandlung. (T. R. 1927, S. 393.)

Das Bariomyl leistete bei Verstopfungs- und Windkolik in 15 von 19 Fällen gute Dienste. Bei drei Tieren war die Prognose zweifelhaft. Ein viertes Tier ging nach 8 Tagen infolge Eingabe einer Flüssigkeit durch einen Laien an Schluckpneumonie ein. Nur in einem Falle wurden Nebenwirkungen des Bariomyls gesehen, die durch Atropingaben allmählich behoben wurden.

K. H. Meyer.

Jakob, H. und Veenendaal, H.: Chylothorax beim tuberkulösen Hunde. (Aus der Klinik für kleine Haustiere der Reichsuniversität Utrecht. — Direktor: Prof. Dr. H. Jakob.) (T. R. 1927, S. 377.)

Ausführliche klinisch und pathologisch-anatomische Beschreibung eines Falles von Chylothorax bei einer dreijährigen deutschen Schäferhündin, der seiner Seltenheit wegen Interesse verdient. Es kann hier nur auf die Arbeit selber verwiesen werden.

K. H. Meyer.

Jansa: Bei welcher Konzentration des Chloralhydrats tritt in der Subkutis des Pferdes Abszeßbildung auf? (Aus der Poliklinik für große Haustiere der tierärztlichen Hochschule zu Berlin. — Direktor: Prof. Dr. Neumann-Kleinpaul.) (Arch. f. wiss. Tierheilkunde, 1927, 55, S. 146.)

Die subkutane Applikation einer 12,5 prozent. Chloralhydrat-Lösung rief nur kurzdauernde Veränderungen hervor, die einer 15prozentigen bedeutend stärkere Erscheinungen. Bei Injektion einer 12prozentigen Lösung in die Vehe und das perivaskuläre Gewebe trat nur eine harmlose Schwellung auf, die nach vier Tagen verschwunden war. Die Verwendung einer 12,5prozentigen Lösung erscheint demnach in Übereinstimmung mit früheren Beobachtungen unbedenklich.

Geiger.

Omiczynski: Versuche mit Scharlachsalbe nach Prof. Dr. Schmieden in der Veterinärmedizin. (B. T. W. 1927, S. 430.)

Verf. erzielte mit dem Präparate sehr gute Heilerfolge bei Ekzemen jeder Art und bei allen Haustieren, bei Krallengeschwüren der Hunde, bei Wunden verschiedenster Art mit oder ohne Substanzverlust, bei Gehirrwunden, Wunderristdrücken usw. Die verstärkte Scharlach-Perufalbe leistete vorzügliche Dienste bei der ekzematösen Form der Mauke. Die Salbe wurde dick aufgetragen und ein Verband angelegt.

Carl.

Ludwig: Beiträge zur Selektantherapie. (B. T. W. 1927, S. 462.)

Im Praxisbereich des Verf. sind die wirtschaftlichen Schädigungen durch die feuchthaft auftretende Streptokokkenmastitis größer wie die durch Maul- und Klauenfeuche. Da andere Mittel ziemlich erfolglos waren, so versuchte Verf. die vorliegende Therapie, wobei die am längsten und stärksten erkrankten Tiere zur Behandlung ausgesucht wurden. Es wurden 20,0 einer 4prozentigen Lösung des Mittels intraparenchymatös eingespritzt. Auf diese Weise wurden von 52 behandelten Eutervierteln 35 geheilt. Bei 17 war eine Heilung bisher nicht möglich, bezw. von 20 behandelten Kühen sind 15 geheilt, 5 nicht geheilt. Im Hinblick auf die Schwierigkeiten und Tücken der Mastitisbehandlung wurden diese Erfolge vom Verf. als hervorragend bezeichnet. Er hält das Selektan für das z. Zt. einzig brauchbare Heilmittel gegen Streptokokkenmastitis.

Carl.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Meersohn: Die Streptokokkensepsis und das retikulo-endotheliale System. (Zeitschr. f. Immunitätsf. 1928, 54, S. 313.)

Nach Splenektomie ist der Prozentsatz der an der Infektion umkommenden Mäuse im Vergleich zu den normalen Tieren doppelt so hoch und erreicht etwa 40,74 Pro-

zent. Wird neben der Splenektomie noch die „Blockierung“ des außerhalb der Milz liegenden Teiles der Retikuloendothelien vorgenommen, so hat das keinen Einfluß auf den Verlauf der Infektion und der Prozentsatz der an Streptokokkensepsis eingegangenen Mäuse bleibt der gleiche.

Der außerordentlich ungünstige Einfluß der Splenektomie und der „Blockierung“ des außerhalb der Milz gelegenen Teiles der Retikuloendothelien auf die Fähigkeit der Mäuse, die Infektion zu überwinden, trat völlig klar zutage. Von den normalen Tieren überstanden 36 Prozent die Streptokokkensepsis und erwiesen sich als steril; von den splenektomierten Mäusen nur 25,93 Prozent und von den splenektomierten und blockierten Mäusen 20 Prozent. Alle diese Tatsachen sprechen dafür, daß bei Streptokokkensepsis außer der Milz noch andere Zellen des retikuloendothelialen Systems oder andere Schutzapparate, die außerhalb der Milz liegen und der Blockierung nicht zugänglich sind, an dem Kampfe mit der Streptokokkeninfektion in hohem Maße beteiligt sind.

Meyn.

Hammer Schmidt: Die Rolle des Gefäßendothels bei septischen Prozessen. (Zschr. f. Immunitätsf. 1928, 54, S. 205.)

Mit einem bisher nicht beschriebenen, als „Corynebakterium murisepticum n. sp.“ bezeichneten Bakterium, das sich nur für die Maus, für diese aber ausnahmslos als hochpathogen erweist, gelingt bei jeder Art von parenteraler Einverleibung die von einer tödlichen Septikämie gefolgte Infektion. Die dabei zu erhebenden Befunde sind insofern von Bedeutung, als sie eine höchstgradige Speicherung der Bakterien seitens der Endothelien der Blutgefäße allein, ohne Beteiligung des retikuloendothelialen Systems im engeren (mit Ausnahme der Kupfferischen Zellen in der Leber) erkennen lassen. Weiterhin geht aus der Untersuchung hervor, daß die derart phagozytierten Bakterien in den Endothelzellen ihren Untergang finden, so daß der ganze Vorgang mit Sicherheit als eine vom Blutgefäßendothel allein durchgeführte Abwehrreaktion angesehen werden kann.

Meyn.

Gruber, G. B.: Über die Trichinose und ihre Bekämpfung. (Wiener klinische Wochenschr. 52, 1927.)

Verf. geht auch in diesem in der Gesellschaft der Ärzte in Wien gehaltenen Vortrage auf die Art der Verbreitung der Trichinen im Tierkörper ein. Er weist mit Nachdruck darauf hin, daß Jungtrichinellen auch abseits der Blutbahn und fern vom Skelettmuskel gesehen werden; so sind Trichinellen in der Peritonealflüssigkeit, im Perikardial-Hydrops, im Herzmuskel, in der Lunge, im Zentralnervensystem, in der Augennetzhaut usw. gesehen worden. Er geht ferner genau darauf ein, wie der eine wandernde Muskelwurm die Muskelfaser verändert und wirft als Hauptfrage für die Trichinosepathologie auf: in wie weit stehen allgemeine Vergiftungserscheinungen mit allgemeinen degenerativen Folgen, wie weit örtliche, teils degenerative, teils entzündliche Veränderungen im Vordergrund? Verf. zeigt, wie sich die Trichinosepathologie durch die einzelnen Entwicklungsstadien der Trichinella selbst erklären läßt, und verlangt, daß in Österreich, insbesondere in Wien, zur Bekämpfung der Trichinellenerkrankung beim Menschen nach dem Muster in Deutschland eine allgemeine, obligatorische Trichinellenbeschau eingeführt wird.

Schmey.

Gamper, E. und G. B. Gruber: Über Gehirnveränderungen bei menschlicher Trichinose. (Virchows Archiv für pathologische Anatomie u. Physiologie, Bd. 266, 3. H., S. 731.)

Über morphologische Veränderungen an Hirnhäuten oder am Gehirn trichinös Kranker berichten bisher nur vereinzelte Forscher; in neuester Zeit hat Pavlica eine kurze Anmerkung über Gehirnveränderungen gemacht. Da aber alle diese Berichte teils recht abgerissen und kurz, teils voll Fragestellungen sind, so hielten es die Verfasser für zweckmäßig, über ein so feltenes Vorkommnis eingehende Feststellungen zu machen und bekannt zu geben. Es handelte

sich um eine 38jährige Frau, welche am Anfang der fünften Woche einer akuten Trichinosis erlegen ist. Die Krankengeschichte bietet das typische Bild einer so schweren und allgemeinen Muskelerkrankung, es fehlen aber alle eindeutigen Hinweise auf Gehirnstörungen. Die Kranke ist allerdings beim Trinken aus dem Zustand großer Schwäche heraus unerwartet gestorben. Die bestehenden Schluckbeschwerden erklären sich aber zwanglos aus der starken Wurmdurchsetzung der Mund- und Schlundmuskeln als aus einer sonst nicht lokalisierten Hirnbeteiligung. Bei der Sektion ließ sich der klassische Befund einer schweren allgemeinen Muskeltrichinose bei noch fortdauernder Darmtrichinose feststellen, ferner eine Herzwandthrombose, eine Perikarditis, broncho-pneumonische Herde mit exsudativer Pleuritis, Stauungsfettleber. Nach Öffnung des Schädels und Durchtrennung der Dura mater floß sehr reichlich klarer Liquor ab, der, ebenso wie das Exsudat im Herzbeutel und im Pleuraraum zahlreiche, wenig weit entwickelte Jungtrichinellen enthielt. Gehirn und Rückenmark wurden einer eingehenden histologischen Untersuchung unterzogen. Es lag, abgesehen von einem Ödem und den Infiltrationsercheinungen der stark hyperämischen Hirnhäute eine Vereinigung von regressiven und progressiven Veränderungen am Gehirn vor. Die progressiven glösen Knötchen mußten der Trichinose zugeschrieben werden, da in ihnen die Fadenzwirmen nachgewiesen werden konnten, dagegen sind die regressiven Erscheinungen (Verödungen des Gehirns, fettige Degeneration der Gehirnrinde, Ausfall einzelner nervöser Elemente, andererseits reichliche Ausbildung von Faserglia usw.) z. T. überhaupt noch nicht bei Trichinosis beobachtet worden; die Autoren unterziehen deshalb ihre eigenen Beobachtungen einer kritischen Besprechung.

Schmey.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Gerlach und Kralicek: Über die Anwendung von Kulturfiltraten (Antivirus nach Besredka) in der Veterinärmedizin. (Seuchenbekämpfung 1927, H. 3, S. 184.)

Eine Aufzählung erfolgreich mit Antivirus behandelter Fälle. Das Hauptanwendungsgebiet für Antivirus in der Veterinärmedizin dürfte nach Ansicht der Verf. der Chirurgie zufallen. Nach den gemachten Erfahrungen besteht eine Indikation zur lokalen Behandlung mit Antivirus bei solchen Prozessen, die primär oder sekundär durch Staphylo- oder Streptokokken oder durch beide gemeinsam verursacht sind. Die mit der Ausführung der Versuche in der Praxis betrauten Tierärzte beurteilten den Effekt der Antivirusbehandlung übereinstimmend dahin, daß die Wirkung des Mittels eine überaus prompte und überraschende sei.

Meyn.

Besredka: Die klinische Anwendung der lokalen Immunisierung mittels Vakzine und Antivirus. (Seuchenbekämpfung 1927, S. 21.)

Die lokale Immunisierung mittels Mikroben oder deren Filtraten (Antivirus) findet immer häufigere Anwendung, so daß B. der Ansicht ist, daß die meisten menschlichen und tierischen Infektionskrankheiten binnen kurzem der örtlichen Vakzinetherapie zugeführt sein werden. Es wird eine Reihe von Fällen aufgeführt, in denen die Besredka'sche Methode der lokalen Immunisierung glänzende Erfolge erzielte, oft selbst dann noch, wenn alle anderen Immunisierungsmethoden versagt hatten. Infolge der außerordentlichen Schnelligkeit mit welcher die lokale Immunität Platz greift, erscheint es dem Verf. angezeigt, u. a. auch jedem chirurgischen Eingriff eine Waschung mit einem polyvalenten Filtrat vorausgehen und folgen zu lassen.

Meyn.

Weinberg: Das antigangränöse Serum und seine Anwendung in der Therapie. (Seuchenbekämpfung 1927, H. 2, S. 79 und H. 3, S. 145.)

Verf. schlägt vor, alle infektiösen Wundkomplikationen

unter der Bezeichnung „Traumatosen“ zusammenzufassen. Diese Bezeichnung soll im Einzelfall durch die Angabe des vorherrschenden klinischen Symptoms und des Erregers ergänzt werden. Es würde demnach geben: ödematöse Traumatosen mit Pararauschbrand- bzw. Novyschem Bazillus; emphysematöse Traumatosen mit Fränkelschem Bazillus usw.

Die Serumtherapie der Traumatosen hat dann die meiste Aussicht auf Erfolg, wenn man ein Gemisch von Antisera gegen die vier bedeutendsten Wundanaerobier (Fränkelscher Baz., Pararauschbrandbaz., Novyscher Baz. und Bac. histolyticus) verwendet. In Friedenszeiten soll das „antigangränöse“ Serum zur Vorbeugung gleichzeitig mit dem Antitetanusserum allen schwerer Verunglückten verabreicht werden, ferner vor operativen Eingriffen besonders am Darm. Die Sera sollen zugleich antitoxisch und antibakteriell sein. Meyn.

Uhlenhuth, Müller, A. und Grethmann:
Schutzimpfungsversuche gegen Rindertuberkulose mit massiven Dosen schwach virulenter Rindertuberkelbazillen.
(Aus dem Hygienischen und Pathologischen Institut der Universität Freiburg i. Br.) (D. m. W. 1927, S. 1807.)

Zu den Versuchen wurde eine Kultur (Tb 18) benutzt, die 1902 von v. Behring aus einer tuberkulösen Mediastinaldrüse eines Rindes über eine Schaf- und Meerfischweinchepassage herausgezüchtet und seither auf festen und flüssigen Nährböden weiterkultiviert worden war. Sie wächst üppig auf Glycerinbouillon (humaner Charakter) und liefert gutes Tuberkulin. Die Virulenz der Kultur (Tb 18) war für Meerfischweinchchen schwach, für Kaninchen wenig und für Rinder kaum noch vorhanden, so daß letztere eine Übertragung von 0,5—1,0 Gramm intraperitoneal anstandslos vertrugen und sich bei der nach einigen Monaten erfolgten Schlachtung als völlig gesund erwiesen.

Die zum Versuche verwendeten ½ Jahr alten Rinder gehörten verschiedenen Rassen an und wurden vorher mittelst der subkutanen Tuberkulinprobe auf ihren Gesundheitszustand geprüft. Einen Monat nachher wurden sechs Rinder in der Weise geimpft, daß sie je eine Aufschwemmung von 1 Gramm Tb 18 in 30 ccm physiologischer Kochsalzlösung intraperitoneal in der rechten Hungergrubengegend injiziert erhielten. Die Tiere reagierten darauf mit keinerlei äußerlichen Krankheitsercheinungen, nur zwei Rinder zeigten Temperatursteigerungen von 0,6 Grad bzw. 1,5 Grad. Drei Monate nach der Impfung wurden diese sechs Versuchstiere zusammen mit fünf nichtgeimpften Kontrollrindern der natürlichen Infektion in der Weise ausgesetzt, daß man sie in einem Stalle Kopf gegen Kopf Kühen gegenüber aufstellte, die für die polizeiliche Tötung wegen offener Lungentuberkulose vorgesehen waren. Durch geeignete Untersuchung wurde festgestellt, daß die Tiere ständig Tuberkelbazillen aushusteten.

Nach 307—327 Tagen wurde je ein geimpftes und ein Kontrollrind gleichzeitig geschlachtet und unter Zuzug von Prof. Schlegel der Befund festgestellt. Es ergab sich dabei, daß nur ein geimpftes Tier frei von Tuberkulose war. Alle andern, auch die Kontrollen, waren gleichmäßig an Tuberkulose der Lungen, Mesenterial- und Bronchialdrüsen erkrankt, Veränderungen, die mit Sicherheit auf die Stallinfektion zurückzuführen sind. Die Nichterkrankung des einen Tieres ist ohne Bedeutung.

Es war also nicht geglückt, selbst durch so kolossale Dosen von 1 Gramm der verwendeten Kultur gegen natürliche Infektion im künstlichen Seuchenstalle einen wirksamen Schutz zu erzielen und zwar mit einer Kultur, die wenigstens für Meerfischweinchchen noch eine beachtenswerte Virulenz besaß und auch nach früheren Versuchen für das Rind in Dosen von 2 Gramm eine ausheilende lokale Bauchfelltuberkulose erzielt hatte. Verff. sprechen am Schlusse der Arbeit sich dahin aus, daß sie durch das Ergebnis der vorliegenden Ver-

suche bezüglich der Immunisierung gegen Tuberkulose ungeheuer skeptisch geworden seien. Carl.

Löwenstädt, H.: Einwirkung von Strahlen auf die experimentelle Meerfischweinchentuberkulose. (Virchows Archiv, Bd. 266, 1927, S. 99.)

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind folgende:

1. Es wurden eine größere Anzahl Meerfischweinchchen unter die Haut mit Tuberkelbazillen geimpft und ihr Verhalten sowie ihre histologischen Befunde nach Einwirkung verschiedener äußerer Einflüsse — fast ausschließlich Lichtbestrahlungen — geprüft.

2. Die Vergleichstiere zeigten im Bezug auf Nekrotisierung und Abkapfelung der Tuberkel ein wechselndes Bild. Demarkation der Tuberkel durch kollagenes Gewebe in der Milz und Vermehrung desselben in den Lymphknoten wurde beobachtet.

2. Weder die Strahlen der Nernstlampe noch der Kohlenbogenlampe, noch der Quecksilberdampflampe, noch der Hochgebirgssonne — die letzteren auch nicht nach Sensibilisierung mit Eosin — vermochten einen Befund hervorzu- bringen, der einen wesentlichen Unterschied gegen die Vergleichstiere bedeutet hätte. Nur Einzelbefunde sind ausgenommen, wie die Gallengangswucherungen in der Leber eines mit dem Lichte des Kohlenbogens, und Rarifizierung der Leberzellen bei einem nach Sensibilisierung mit dem Lichte der Sonne behandelten Tiere.

4. Das Verhalten der Tiere nach den Bestrahlungen und insbesondere nach solchen kurz vor dem Tode, nötigt zu der Annahme, daß die Erwärmung lebender Körper durch eine strahlende Wärmequelle nicht ausschließlich direkt, sondern auf dem Wege über das Wärmezentrum erfolgt.

5. Bei einem mit längere Zeit fortgesetzten Eosinungen subkutan behandelten, in schwachem diffussem Lichte gehaltenen Tiere fand sich eine allgemeine Reaktion des Körpers gegen die Tuberkulose, bestehend in kollagener Abkapfelung fast sämtlicher nekrotischer Herde.

6. Es ergibt sich aus den Versuchen, daß weder die kurzwelligen noch die langwelligen Lichtstrahlen geeignet sind, den Verlauf der inneren Tuberkulose insbesondere in der Richtung auf eine Abheilung wesentlich zu beeinflussen, wobei wir freilich nicht unbedingt berechtigt sind, diese Ergebnisse auf den Menschen ohne weiteres zu übertragen, weil die Haut des Meerfischweinchchens, wie schon Mayer betont hat, nicht wie die des Menschen auf die Bestrahlungen mit einem Erythem reagiert.

7. Die unter 5 angegebenen Befunde werden an einem größeren Material nachgeprüft werden. Carl.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.


Fincher, M. G. und W. L. Williams: Gehemmte Entwicklung der Müllerschen Gänge, verbunden mit Inzucht. Mit 20 Abbildungen. (The Cornell Veterinarian 1926.) (Medizinische Abteilung und ambulatorische Klinik, N. Y. State Veterinary College, Cornell University.)

(Fortsetzung.)

Fall 4, Fig. 4. Nachkomme von Mutter C. (Siehe auch Fall 11.) Die Färse hat sich auf der Weide mit einem 5 Monate alten Bullen aufhalten. Geschlachtet im Alter von 27 Monaten.

Die Vulva ist 4 inches lang und sehr eng.

Die Müllerschen Gänge werden durch zwei derbe Stränge dargestellt, reichen von der Vulva bis zur Ovarialgegend, nehmen einen ziemlich gewundenen Verlauf und verschwinden beinahe, als ihre erweiterten Spitzen dem Ovidukt sich nähern. Die Stränge sind 0,85 inch im Durchmesser am Vulvaende und sind 14 inches lang. Rechts ist die Erweiterung des Müllerschen Ganges, welche die Spitze des Uterushornes darstellt, 4 inches lang und 2½ inches breit und enthält Flüssigkeit — Menstruationsreste. Links ist der auf diese Weise gebildete Sack ½ inch lang und ¼ inch breit. In der Photographie wird er von dem Ovarium und dem Ovidukt bedeckt.



Die Ovidukte sind normal und offen nach den beiden oben beschriebenen Säcken. Das linke Ovarium mißt $1\frac{1}{2}$ inches im Durchmesser und enthält ein großes Corpus luteum. Das rechte Ovarium hat einen Durchmesser von $1\frac{1}{2}$ inches und enthält eine Zyste.

Fall 5, Fig. 5. Nachkomme von Mutter D. Färse zeigte sich in Zwischenräumen von 10 Tagen brünstig und war manchmal gedeckt worden. Im Alter von 17 Monaten gefchlachtet.

Die Vulva ist 4 inches lang und mißt $1\frac{1}{2}$ inches im Durchmesser.

Die Müllerschen Gänge werden durch zwei derbe, 10 inches lange Stränge dargestellt, von denen jeder an der Vulva $\frac{1}{2}$ inch im Durchmesser mißt. Bevor sie den Ovidukt erreichen, werden sie auf eine Strecke zu klein, um ihnen zu folgen. Dann erweitert sich der rechte Gang und bildet einen 3 inches langen, 6 inches breiten, und der linke einen $1\frac{1}{2}$ inches langen und 3 inches breiten Sack.

Die Ovidukte sind normal und hängen mit den beiden Säcken zusammen.

Das rechte Ovarium hat einen Durchmesser von $\frac{1}{4}$ inch und enthält eine kleine Zyste. Das linke Ovarium mißt $1\frac{1}{2}$ inches im Durchmesser und schließt ein zystisches Corpus luteum ein, welches beinahe alles Ovarialgewebe verdrängt hat.

Fall 6, Fig. 6. Nachkomme von Mutter E. Die Färse war mehrmals, zuletzt am 5. Januar 1924 gedeckt. Gefchlachtet am 18. März 1924 im Alter von 30 Monaten.

Der Genitaltraktus ist dadurch beträchtlich verlängert, daß die bedeutend ausgedehnte, zystische Spitze des linken Uterushornes an ihm zerbrach. Die Urethraöffnung ist etwas vorwärts gezogen, sonst normal. Die Vulva, die sich ungefähr 2 inches vorn bis an die Urethra ausdehnt, ist eng und infolge des Gewichtes der Zyste abnorm verlängert. Sie endet vorn in einem sehr kleinen engen Blindfack, gegenüber den hinteren Enden der strangförmigen Müllerschen Gänge. An diesem Punkt befindet sich eine sehr kleine linienförmige Erhöhung, die an eine Narbe denken läßt.

Die vulva-müllersche Naht, hauptsächlich unter und neben diesen Gebilden, wird von einer unregelmäßigen Masse sklerotischen Gewebes, Sc., umgeben, das von vorn nach hinten ungefähr 4 inches und quer fast ebensoviel mißt. Dies war ganz bestimmt die Folge einer Verletzung bei der Begattung, da keine Vagina den Penis aufnahm. Da der Stoß bei der Begattung sehr heftig war, wurde das vordere Ende der Vulva zerrissen, es entstand eine heftige Entzündung. Infolgedessen

bildete sich sklerotisches Gewebe. Ich (Williams) habe eine ähnliche Verletzung beim Coitus bei einem „freemartin“ (einem mit einem Bullenkalb zugleich geborenen, meist unfruchtbaren Kuhkalb) gesehen, aber diese wurde in ihrem frühen Stadium beobachtet, nur wenige Tage nach dem Coitus. Die Entzündung war damals heftig, der Ausfluß war übelriechend und die Gewebe im Becken waren sehr geschwollen und schmerzhaft.


Im Fall 6 hatte die Verletzung durch den Penis eine allgemeine und heftige Infektion des Beckens veranlaßt. Die Folge davon waren ausgedehnte Verwachsungen im Becken, welche die Harnblase, das zystöse Uterushorn, ein Ovarium und den Ovidukt umfaßten.

Die Harnblase B ist mit der kleineren Krümmung des zystösen linken Hornes fest verwachsen. Die Verwachsungen umfassen das Mesometrium so, daß die Spitze des Hornes nach hinten gerichtet ist und mit ihrer inneren oder rechten Seite nach unten zu liegt. Die Blase B, ist sehr ausgedehnt durch das Gewicht der Zyste, so daß sie eine lange, enge, spindelförmige Höhle bildet. Ihre Wände erscheinen gesund. (Zuerst war vermutet worden, daß bei dem verführten Coitus der Penis des Bullen abgewichen und in die Urethra eingedrungen war, wie in anderen Fällen berichtet worden ist, aber die Urethra und ihre Klappe zeigten keine Spur von Verwundung. Die Entzündung war offenbar perivaginal.)

Es erscheint merkwürdig, daß die Verletzungen durch den Penis bei dieser Gruppe von Färsen nicht häufiger und bedenklicher waren. Die Fälle 1, 2, 3, 5 und 6 waren wiederholt gedeckt von ihrem Vater, einem ausgewachsenen Bullen, der ungefähr 2000 pounds³⁾ wog. Die Färsen waren gewöhnlich zuerst im Alter von 15–18 Monaten gedeckt, während sie noch unreif waren. Obgleich die Vagina bei jeder dieser fünf Färsen fehlte, wurde, soweit bekannt geworden ist, nur eine und der Bulle überhaupt nicht verletzt.

Die Müllerschen Gänge werden von der Vulva kranial ungefähr 12 inches weit von zwei fibrösen Strängen dargestellt, die nebeneinander $\frac{3}{4}$ inches im Durchmesser messen und am vorderen Ende der Vulva liegen, nach vorn allmählich spitz zulaufen, bis sie sich virtuell in dem umgebenden Bindegewebe verlieren. Schließlich erscheinen sie, indem sie größtenteils rechtwinklig auseinandergehen, als nicht wahrnehmbare fibröse Stränge wieder. Der rechte Strang ist nach einer

³⁾ 1 pound = 453,59 Gramm.



Strecke von ungefähr 4 inches zystös, die Zyste ist kugelförmig und mißt ungefähr $1\frac{1}{4}$ inches im Durchmesser. Gerade darüber hinaus liegt das rechte Ovarium, das ungefähr $\frac{3}{4}$ inch im Durchmesser mißt, wodurch sie ein reifer Eierstock zu sein scheint.

Der linke Gang erscheint als ein nicht wahrnehmbarer fibröser Strang auf ungefähr 4 inches. Hier geht er plötzlich in eine ungeheure Zyste von der Gestalt eines stumpfen Kegels über, die 22×31 inches an Umfang mißt. Ihr Inhalt ist flüssig, vielleicht eitrig. Die Basis der kegelförmigen Zyste bildet das kaudale oder vulvare Ende, soweit es den Zusammenhang betrifft, aber die Verwachsungen im Becken drehen die Zyste so herum, daß die Basis kranial gerichtet ist.

Der linke Ovidukt ist zystös, mißt ungefähr $0,4$ inch im Durchmesser und ist fest verwachsen mit der inneren (oberen) Seite der zystösen Spitze des Hornes. Er war von den Verwachsungen im Becken bedeckt, die abpräpariert worden sind, um die Tuba bloßzulegen.

Das linke Ovarium mißt ungefähr $\frac{3}{4}$ inch im Durchmesser. Es ist vollständig verwachsen mit der Mucosa fimbriata der Tuba, ist dicht gebunden an die Innenseite der Spitze des zystösen Hornes und von den Verwachsungen im Becken bedeckt.

Fall 7 Fig. 7. Nachkomme der Mutter F. (Siehe auch Fall 23.)

Decken war nicht verfucht. Geschlachtet im Alter von 14 Monaten. Die Vulva ist winzig, 2 inches lang und 4 inches breit.

Die Müllerischen Gänge werden von zwei derben Strängen, die $\frac{1}{2}$ inch im Durchmesser am Vulvaende messen und 14 inches lang sind, dargestellt. Sie erstrecken sich vorwärts bis zur Tubengegend, wo sie auf 3 inches schwer zu verfolgen sind. Darauf erweitern sie sich und bilden zwei kleine Zysten, Gipfel der Uterushörner. Jede der Zysten ist 4 inches lang, $2\frac{1}{2}$ inches breit und enthält eine Flüssigkeit — Menstruationsreste.

Die Ovidukte sind anscheinend normal. Jedes Ovarium mißt $\frac{1}{2}$ inch im Durchmesser und enthält kleine Zysten oder reifende Eierfäcke.

Fall 8, Fig. 8 und 9. Nachkomme von Mutter G. Decken war nicht verfucht worden. Geschlachtet im Alter von 24 Monaten.

Die Vulva ist eng und 3 inches lang.

Die Müllerischen Gänge sind von zwei derben Strängen dargestellt, jeder mißt $\frac{1}{2}$ inch im Durchmesser. Sie erstrecken sich nach vorn von der Vulva auf eine Strecke von 10 inches. Hier sind sie auf 5 inches schwer zu verfolgen, bevor sie sich erweitern und Zysten bilden, die mit jedem Ovidukt in Zusammenhang stehen. Diese erweiterten Teile sind

mit Menstruationsresten gefüllt. Sie fließen beim Schneiden aus und hinterlassen eine Höhle, wie sie bei H. S., Fall 8, Fig. 9, zu sehen ist. Jede zystöse Spitze ist $1\frac{1}{2}$ inches lang und 3 inches breit.

Die Ovidukte erscheinen normal. Das rechte Ovarium ist $1\frac{1}{2}$ inches lang, $\frac{3}{4}$ inch breit und fibrös.

Bass.

(Fortsetzung folgt.)

Thomsen, H.: Zur Alkoholtherapie der puerperalen Sepsis. (Centralbl. f. Gynäkologie 1927, S. 1795.)

Diese ursprünglich von Runge in Dorpat empfohlene Behandlungsmethode hat Verf. in letzter Zeit öfters mit Erfolg angewandt. Sobald eine Wöchnerin Zeichen einer Infektion zeigt (Temperatursteigerung, Pulsbeschleunigung) wird Alkohol in recht großen, allmählich steigenden Mengen in Form von Portwein, Madeira, Massala, Kognak, letzterer mit Eigelb verrührt, verordnet, bis Berausung eintritt. Bei dieser Therapie wurde oft eine Besserung des Allgemeinzustandes und Pulses sowie ein allmähliches Sinken des Fiebers beobachtet. Pyämische Schüttelfröste nahmen unter reichlichem Schweißausbruch nach und nach an Intensität ab und die Krankheit nahm einen günstigen Verlauf. Einen Schaden von dieser Behandlung hat Verf. nie gesehen. Allerdings müssen bei einer so ernsten Krankheit zu gleicher Zeit auch die andern zur Verfügung stehenden Mittel angewendet werden.

Carl.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Köves, J. und G. Hirt: Die Virulenz der Rotlaufbazillen. (Allatorvosi Lapok, 1927, Nr. 16, S. 195.)

Es wurde durch Versuche gezeigt, daß die Rotlaufbazillen am besten und ohne ihre Virulenz zu ändern in einer solchen Fleischbrühe gedeihen, deren H-Jonen-Konzentration vor der Sterilisierung 7,8—8,2 pH entspricht. Die H-Jonen-Konzentration der Fleischbrühe vermindert sich zwar während der Sterilisierung, hat aber keine praktische Bedeutung und dementsprechend erscheint ein Zusatz von Chemikalien (Dinatriumhydrophosphat) zur Wiederherstellung der ursprünglichen Konzentration überflüssig. In einer allzulange

sterilisierten Fleischbrühe entwickeln sich die Rotlaufbazillen weniger gut als sonst. Da Mäuse nach einer Infektion mit Rotlaufbazillen nach einer verschieden langen Zeit tödlich erkranken, sollte man bei Prüfung wenig virulenter Bazillenstämme nicht wie gewöhnlich 1—2 Mäuse, sondern ganze Serien derselben impfen. Schweine lassen sich nur in einem Teile der Fälle künstlich infizieren.

Marek.

Yorke, W. and Adams, A.: „Observations on Entamoeba histolytica. I. Development of Cysts, Excystation and Development of excysted Amoeba in vitro.“ (Ann. of Trop. Med. and Parasitol. 1926, 20, S. 279.)

Verff. züchteten die Entamoeba histolytica auf „Locke-Ei-Serum“. Die Gewinnung und Anreicherung der Zysten aus dem Stuhl geschah nach einer von ihnen ausgearbeiteten Methode. E. histolytica bildet in der künstlichen Kultur Zysten und exzystiert sich auch unter günstigen Verhältnissen. Das Exzystieren ist augenscheinlich von der Temperatur (Optimum etwa 37 Grad C) und der vorhandenen Feuchtigkeit abhängig. Die Zysten von E. histolytica haben je nach ihrem Entwicklungsgrad verschiedenes Aussehen. Die jüngsten Formen verfügen über nur einen Kern und enthalten viel Glykogen. Bei ihrer weiteren Entwicklung treten Chromidialkörper auf, der Kern teilt sich und das Glykogen nimmt ab. Endlich wird die Zyste vierkernig und die Chromidialkörper sind gut entwickelt. Das Glykogen tritt dagegen kaum in Erscheinung oder fehlt ganz. In der völlig reifen, zum Exzystieren fertigen Zyste ballen sich die vier Kerne zusammen und das jetzt glykogenfreie Cytoplasma erscheint homogen. Die Chromidialkörper sind stark zurückgebildet oder verschwunden. Die frisch aus der Zyste geschlüpfte Entamoeba histolytica enthält in ihrem von feinen Alveolen durchsetzten Cytoplasma vier dicht bei einander gelagerte Kerne. Sie bewegt sich schneckenartig, wobei die Kerne sich immer „vorn“ befinden. Die vierkernige Amöbe teilt sich in der Kultur in vier einkernige Individuen. Die Arbeit bringt eine größere Anzahl sehr instruktiver Abbildungen.

Wetzel.

Yorke, W. and Adams, A.: „Observations on Entamoeba histolytica. II. Longevity of the Cystis in vitro and their Resistance to Heat and to various Drugs and Chemicals.“ (Ann. of Trop. Med. and Parasitol. 1926, 20, S. 317.)

Die Versuche der Verfasser lassen erkennen, daß man mit der Eosinprobe nicht immer lebende von toten Histolyticazysten unterscheiden kann. Wohl sind sich färbende Zysten stets abgestorben, dagegen erweisen sich aber nicht alle ungefärbten Zysten als lebend. Als sichere Methode zur Feststellung, ob Histolyticazysten leben oder nicht, wird die künstliche Kultur empfohlen. Die Zysten von E. histolytica sterben schnell ab, wenn der Stuhl drei bis vier Tage bei 16—20 Grad C aufbewahrt wird. Nach zehn Tagen waren alle Zysten abgestorben. Die gleichen Ergebnisse wurden bei Aufbewahrung der Fäzes bei 0 Grad erhalten. In Wasser bleiben die Zysten länger lebensfähig; sind aber auch nach etwa drei Wochen tot. Temperaturen bis zu 45 Grad C werden für 30 Minuten ertragen; bei 50 Grad jedoch werden die Zysten in fünf Minuten getötet. Gegenüber Emetin und Jatron sind die Zysten sehr widerstandsfähig. Es werden weiter die abtötenden Konzentrationen der gebräuchlichsten Desinfektionsmittel angegeben.

Wetzel.

Verschiedene Mitteilungen.

Verlagsbuchhändler Max Schaper zum 60. Geburtstag.

Am 15. März beging der in tierärztlichen und landwirtschaftlichen Kreisen weithin bekannte Verlagsbuchhändler Max Schaper-Hannover seinen 60. Geburtstag. Nach seiner Lehrzeit und weiteren Ausbildung sowie erfolgreichen Tätigkeit in Karlsruhe, Berlin, Aachen und Leipzig gründete er in Gemeinschaft mit seinem Bruder Heinrich Schaper am 1. April 1897 in Hannover ein wissenschaftliches Anti-

quariat. Neben dieser Hauptarbeit entwickelte sich im Laufe der Jahre eine Verlagstätigkeit auf vornehmlich niederländischem Literaturgebiete. Im Jahre 1901 übernahm die Firma den kommissionsweisen Verlag der Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift und damit trat eine wesentliche Wendung in ihrem bisherigen Arbeitsgebiet ein. Die zunehmenden guten Beziehungen zu dem Professorenkollegium und der Studentenschaft der Tierärztlichen Hochschule begründeten die Herausgabe tiermedizinischer Werke und machten den Verkauf des wissenschaftlichen Antiquariats notwendig. Im Jahre 1907 wurden durch Ankauf einer größeren tierzüchterischen Zeitschriftengruppe die ersten Beziehungen zur Landwirtschaft eingeleitet. Seit dem Jahre 1909 ist dann ein planmäßiger Ausbau auf den beiden Gebieten Tiermedizin und Landwirtschaft angestrebt worden, der zur weiteren Entwicklung der Firma wesentlich beitrug. Unter den vier Kriegsjahren hatte auch die Geschäftsentwicklung erheblich zu leiden; die Bücherproduktion sank und die Zeitschriften mußten Umfang und Erscheinungstermine ganz bedeutend einschränken. Durch den im Jahre 1916 erfolgten Tod des Mitinhabers Heinrich Schaper traf die Firma ein besonders harter Schlag. Nach Beendigung des Krieges und Überwindung der unheilvollen Inflation ist es dem unermüdlischen Fleiße und der Umsicht des jetzigen Inhabers Max Schaper, der heute auf eine 44jährige Berufstätigkeit zurückblickt, gelungen, die Firma wieder zur alten Blüte zu bringen. Der Jubilar hat es verstanden, aus kleinsten Anfängen heraus sich eine führende Rolle auf dem Gebiete des tiermedizinischen und landwirtschaftlichen Verlages zu schaffen, trotz zweifellos gewaltiger Konkurrenz gerade auf diesen beiden Gebieten. Die Deutsche Tierärztliche Wochenschrift insbesondere, die sich seit 27 Jahren im Verlage der Firma befindet, hatte in dieser Zeit einen erfreulichen Aufschwung genommen. Max Schaper ermöglichte es, die Wochenschrift nach zangsweiser Beschränkung in den Kriegsjahren durch Umfangsvermehrung und Beigabe von Illustrationen weiter auszubauen. Der Tatkraft und dem Geschick des Verlegers ist es weiterhin zu verdanken, daß die D. T. W. seit Beginn dieses Jahres in einem ganz neuen Gewande erscheint, die abgesehen von der Bilderbeigabe, durch neue Typen und andere Anordnung des Satzes als wesentliche Verbesserung angesehen werden muß. Ich darf dabei als Herausgeber hinzufügen, daß meinen Wünschen bezüglich Umfangsvermehrung und Illustrationen stets in entgegenkommender Weise Rechnung getragen wurde. So hat denn die D. T. W. alle Veranlassung, dem Jubilar für das der Ausgestaltung der Wochenschrift jederzeit entgegengebrachte Interesse sehr dankbar zu sein. In Anerkennung der Schwierigkeit, mit dem ein Verlag vet.-med. Werke, bei dem doch immerhin sehr beschränkter Absatz, zu tun hat, erkennt auch die deutsche Tierärzteschaft die großen Verdienste des Jubilars um die Entwicklung unserer veterinärmedizinischen Literatur voll und ganz an.

So bringen wir denn Herrn Max Schaper zu seinem heutigen Geburtstage unsere herzlichsten Glückwünsche in Dankbarkeit entgegen. Möge es ihm vergönnt sein, diesen Tag noch recht oft in voller geistiger und körperlicher Frische im Kreise seiner Familie zu verleben, an der Spitze seines Verlages zum Nutzen unserer Wissenschaft.

Mießner.

Fröhner-Feier in Berlin am 11. März 1928.*)

Etwa 40 Gratulanten, darunter das gesamte Professorenkollegium der Berliner Tierärztlichen Hochschule versammelten sich um 12 Uhr in der Wohnung des Jubilars, um die Glückwünsche und Ehrungen zu überbringen. Auf Wunsch des Jubilars war von einer öffentlichen Feier und von besonderen Einladungen Abstand genommen worden. Magnifizenz Stang gedachte gleichzeitig auch im Namen des Deutschen Veterinärrats der großen Verdienste um die Berliner Hochschule und überbrachte ihre Ehrenbürgermedaille. Ministerialdirigent Müssemeier verlas ein Handschreiben des Preuß. Landwirtschaftsministers und sprach seine Glückwünsche im Namen der Referenten des Preuß. Ministeriums für Landwirtschaft aus. Generalstabsveterinär Dr. Paetz dankte namens des Reichswehrministers für die dem Reichsheere als Konfulent geleisteten Dienste. Ministerialrat von Ostertag würdigte kurz den Lebenslauf des Jubilars und überreichte eine Festschrift, die Arbeiten von Freunden und Schülern des Gefeierten enthält. Gleichzeitig übergab er dem Jubilar den Restbetrag von 5000 RM., der von den deutschen Tierärzten gesammelt und nach Erstattung der Unkosten für ein

*) Siehe Lebenslauf D. T. W. 1928, Nr. 10, S. 177.

Ölgemälde übrig geblieben war. Prof. Silbersiepe überreichte das von Prof. Zickendraht-Charlottenburg angefertigte Ölgemälde, das ein Brustbild des hervorragenden Gelehrten (i. Titelblatt der D. T. W. Nr. 10) darstellte und wegen seiner Ähnlichkeit und künstlerischen Ausführung die Freude und Bewunderung aller Anwesenden erregte. Prof. Wirth sprach in Gemeinschaft mit Prof. Zaribnicky die Glückwünsche der Wiener Tierärztlichen Hochschule aus und gab die Verleihung der Ehrendoktorwürde bekannt. Im Anschluß daran verlas Ministerialrat von Ostertag die sonstigen vom Auslande eingefandten Ehrungen und verkündete die Ernennung zum Ehrendoktor der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Zürich. Die russische Veterinär-Akademie Novocerassk ernannte ihn zum Ehrenmitgliede, desgleichen der tierärztliche Landesverein in Württemberg. Die Vaterstadt des Gefeierten, Hirsau, hatte die Ehrenbürgerwürde verliehen. Es folgten die Glückwünsche der übrigen veterinärmedizinischen deutschen Bildungsanstalten durch die Professoren Pfeiffer, Mießner, Klimmer und Jodlbauer. Die veterinärmedizinische Fakultät der Universität München verlieh die Würde eines Dr. h. c., während die veterinärmedizinische Fakultät der Universität Gießen und die Tierärztliche Hochschule Hannover kunstvoll ausgeführte Glückwunschadressen aushändigten. Dr. Wittmann sprach im Namen der ehemaligen Assistenten, Oberregierungsrat Rust für den Verein beamteter Tierärzte, zu dessen Ehrenmitgliede der Gefeierte ernannt wurde, stud. med. vet. Robert Nieland für die Studentenschaft der Berliner Tierärztlichen Hochschule. Im Anschluß daran wurde von dem Sohne des Gefeierten, Landgerichtsdirektor Dr. Fröhner, eine große Zahl von Telegrammen des In- und Auslandes verlesen, die von der großen Verehrung, deren sich der Gefeierte in allen Kulturstaaten erfreute, beredtes Zeugnis ablegten. Der Jubilar hat es sich nicht nehmen lassen, jedem Einzelnen in längerer Ausführung und z. T. in launiger Weise zu antworten. Aus seinen Worten ging das Gefühl des Dankes und einer gewissen Befriedigung hervor, diesen Tag erleben und so vielfältige Ehrungen empfangen zu dürfen. Für uns wird dieser Tag, an dem wir noch einmal Gelegenheit hatten, den großen Meister der tierärztlichen Wissenschaft und Lehre in voller körperlicher und geistiger Rüstigkeit vor uns zu sehen, in dauernder Erinnerung bleiben. In gastfreundlicher Weise wurden alle Teilnehmer darauf zur schön gedeckten Tafel geleitet und hatten nun Gelegenheit, noch einige fröhliche Stunden im Fröhner'schen Hause zu verbringen. Eine humorvolle Rede des Jubilars, in der sein Entwicklungsgang geschildert wurde und die Rede des Kollegen Zaribnicky auf die anwesende Schwiegertochter des Gefeierten trugen nicht wenig zur Erhöhung der Feststimmung bei. So endete die selten schöne und intime Feier. Möge es dem hochverdienten Jubilar vergönnt sein, noch recht lange sich in vollster Gesundheit der wohlverdienten Ruhe zu erfreuen.

Mr.

Dank.

An meinem 70. Geburtstage bin ich durch viele freundliche Wünsche, wertvolle Gaben und hohe Ehrungen beglückt worden. Ich spreche auch auf diesem Wege allen verehrten Kollegen und lieben Freunden meinen herzlichsten, tiefgefühlten Dank aus.

Berlin, den 11. März 1928.

Eugen Fröhner.

Akademische Nachrichten.

Auszeichnung: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Edelmann, Ministerialrat i. R. in Dresden, wurde von der Sächsischen Landwirtschaftskammer die Goldene Denkmünze für Verdienste um die Landwirtschaft am grünen Bande verliehen.

Universität Zürich. Dr. med. vet. Hans Heusser, von Zürich (bisher. Oberass. der vet.-chirurg. Klinik) wurde zum außerordentlichen Professor gewählt mit Amtsantritt auf 16. April 1928 für die neu geschaffene außerordentl. Professur für gerichtl. Tierheilkunde, Krankheiten kl. Haustiere, Klinik kl. Haustiere, Huf- und Klauenkunde, Übungen in Huf- und Klauenbefehl an der veterinär-medicinischen Fakultät.

Dr. med. vet. Heinrich Zwicky von Mollis (Kanton Glarus-Schweiz) wurde zum außerordentlichen Professor der veterinär-medicinischen Fakultät für Tierzucht und Rassenlehre, Beurteilungslehre des Pferdes und Rindes, Hygiene und Diätetik mit Amtsantritt auf 16. April 1928 gewählt.

Verein beamteter Tierärzte Preußens.*)

25. Vollversammlung am 24. März in Berlin. Es ist dringend erforderlich, daß die Teilnahme am Festessen rechtzeitig angemeldet wird. Die Anmeldungen müssen bis spätestens den 19. d. Mts. in Händen des Veterinärrats Dr. Liebert, Berlin-Lichtenberg, Rittergutstraße 153 sein! Wegen der Kürze der zwischen Beendigung der Festsetzung und Beginn des Festessens zur Verfügung stehenden Zeit werden die Teilnehmer an der Festsetzung (auch die Damen) gebeten, bereits zur Festsetzung in Gesellschaftskleidung (für Herren Frack oder Überrock) zu erscheinen. Ein Begrüßungsabend findet tags zuvor nicht statt.

Dr. Schmidt, Schneidemühl, Schriftf.

Vorlesungen und Übungen der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Gießen im Sommersemester 1928.

Martin: Vergl. Anatomie der Eingeweide, Gefäße und Nerven der Haustiere einschl. Organogenese, 5-stünd. Gewebelehre II (mikroskopische Anatomie) und Kurfus der Gewebelehre II, 6-stünd. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten. — Süppel, Profektor: Einführung in die Anatomie (Überblick über die Organ Systeme, Bau der Knochen und Muskeln, Allgemeines vom Bewegungsapparat), 2-stünd. Anatomie der Sinnesorgane (einschl. Haut) und des zentralen Nervensystems, 2-stünd. Anatomie und Entwicklung der Eihüllen der Haustiere, 1-stünd. Anatomie für Landwirte. I. Teil, 1-stünd. I. A. des Direktors des vet.-anatom. Inst. — Kapp: Einführung in die Gewebelehre (Zellenlehre und Gewebelehre I) und Kurfus in der Technik der Gewebelehre, 4-stünd. I. A. des Direktors des vet.-anatom. Inst. — Olt: Kurfus der path. Histologie, 4-stünd. Obduktionen und path.-anatom. Demonstrat. Milchkunde und Untersuchungsmethoden animalischer Nahrungsmittel, 2-stünd. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten. — Pfeiffer: Chir. Klinik, 10-stünd. Klin. Propädeutik, 5-stünd. Allg. Chirurgie, 2-stünd. Krankheiten der Hufe und Klauen, 1-stünd. Operationslehre, 1-stünd. Kurfus der Augenkrankheiten, 1-stünd. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten. — Zwick: Spez. Seuchenlehre und Vet.-Polizei II. (mit seuchenklin. Demonstrationen), 2-stünd. Mikrobiol. Kurfus, 3-stünd. Allg. Seuchenlehre und Vet.-Polizei, 2-stünd. Mikrobiologie, 1-stünd. Seuchenlehre und Vet.-Polizei für Landwirte, 1½-stünd. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten. — Nörr: Med. Klinik, 5-stünd. Allg. Therapie, 1-stünd. Gerichtl. Vet.-Medizin, 2-stünd. Klin. Propädeutik, 1-stünd. Kurfus der mikroskopisch-chem. Untersuchungen, 1-stünd. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten. — N. N.: Poliklinik (ambulatorische Klinik). Beurteilungslehre, 1-stünd. Kurs in der prakt.-zücht. Beurteilung der Haustiere. Vet.-poliz. Demonstrationen, in Verbindung mit der ambulatorischen Klinik. Besprechung poliklin. Fälle, 1-stünd. Abdeckereiwesen, 1-stünd. — Modde: Lehrgang in der Fleischschau (Kurs.), 4-stünd. Fleischschau-Vorführungen, 2-stünd. — Westhues: Verbandkurs, 1-stünd. — Seifried: Parasiten als Krankheitserreger, 1-stünd.

Aufhebung des Herrenhäuser Gestüts.

Ende März 1928 wird das dem Herzog von Cumberland gehörige Gestüt zu Herrenhausen zu bestehen aufhören. Hannover wird damit um eine Berühmtheit ärmer. Für die hannoversche Pferdezucht hat das Herrenhäuser Gestüt immer großen Wert gehabt.

Fortbildungskurfus für die in dem Tuberkulose Tilgungsverfahren tätigen Vertrauens-tierärzte der Provinz Ostpreußen.

Am Sonntag, den 25. März 1928 in Insterburg, Hotel „Dessauer Hof“, Am Bahnhof. Vortragsfolge: 10—11 Uhr: Dr. Knauer: Über die Notwendigkeit der Intensivierung des Tuberkulose Tilgungsverfahrens. 11—13 Uhr: Dr. Tiedge: Diagnostik und Bekämpfung der Geflügeltuberkulose und der weißen Ruhr der Küken mit Demonstrationen. 13—14 Uhr: Dr. Knauer: Die Bekämpfung der Streptokokken-Mastitis der Rinder mit Demonstrationen. 16—17 Uhr: Dr. Krage: Diagnostik und Therapie des infektiösen Rinderabortus. 17—18 Uhr: Vorführung eines Films über die Bekämpfung der Geflügeltuberkulose. — Eingeladen sind außer den Vertrauens-tierärzten der Provinz, deren Teilnahme im Interesse einer einheitlichen Durchführung des Tuberkulose-Tilgungsverfahrens dringend erwünscht ist, auch sämtliche anderen Tierärzte, welche an der beabsichtigten Organi-

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 7, S. 115.

sation zur Bekämpfung der Geflügeltuberkulose und der Streptokokken-Mastitis mitarbeiten wollen. Teilnehmergebühren werden nicht erhoben. Dr. Knauer.

Tierärztlicher Fortbildungsrundfunk.

Freitag, den 23. März 1928, 19.20 bis 19.45 Uhr: Tierarzt Dr. O. Schultz-Grebenstein: „Neue Ergebnisse der Vitaminforschung und ihre Bedeutung für die veterinärmedizinische Therapie.“ Dr. Giese.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Einführung in die Wissenschaft vom Leben oder Ascaris von Professor Dr. Richard Goldschmidt, Berlin-Dahlem, 4.—8. Tausend mit 161 Abbildungen. Erster u. zweiter Teil. — Berlin, Verlag von Julius Springer, 1927. Preis gebunden 8,80 Mk.

Der Verfasser bringt in zwei kleinen Bänden einen kurzen Abriss des Baues und der Lebensfunktionen des menschlichen und tierischen Körpers, wobei der Ernährung, der Fortpflanzung, der Geschlechtsbestimmung, der Vererbungslehre und der Entwicklungsgeichte besondere Kapitel gewidmet sind. Durch Heranziehen von drastischen Beispielen hat sich der Autor bemüht, die für den Ungeschulten manchmal etwas schwierige Materie äußerst schmackhaft und leicht verständlich zu machen. Fast könnte man sagen, die Arbeit wäre im Romanstil geschrieben. Zahlreiche, teilweise schematisierte Bilder tragen wesentlich zum Verständnis bei. Es kann daher das kleine Werkchen jedem, der den Naturwissenschaften Interesse entgegenbringt, nur empfohlen werden. Mießner.

Jung: Derzeitiger Stand der Milchversorgung im Freistaate Sachsen. Verlag M. & H. Schaper, Hannover. Preis geheftet Mk. 4,50.

Nach einem umfassenden Überblick über die volkswirtschaftliche Bedeutung der Milch bringt Verf. eine Zusammenstellung der Einfuhrziffern von Milch und Milchprodukten vor und nach dem Kriege mit dem Hinweis, daß die deutsche Milchwirtschaft durch die Konkurrenz wirtschaftlich günstiger gestellter Länder erdrückt zu werden droht. Aus den Zahlen sei nur herausgegriffen, daß 1911/13 im Durchschnitt 549 731 Dpz. Butter, 1925 964 754 Dpz. Butter, 1911/13 im Durchschnitt 256 013 Dpz. Hartkäse, 1925 562 037 Dpz. Hartkäse eingeführt sind. Die Einfuhrmengen haben sich demnach mehr als verdoppelt. Unter Beibringung eines erschöpfenden praktischen Materials bespricht Verf. hierauf den Bedarf der Bevölkerung an Milch und seine Deckung, die Zufuhr der Milch nach den Großstädten und ihre Verteilung, die Organisation der Milchindustrie, ferner die Qualität der Milch und ihre Kontrolle. Nachdem die chemische Untersuchung der Milch eingehend erörtert ist, ist auch die Kontrolle der Vorzugsmilch durch die Milchhygienische Untersuchungsanstalt in Leipzig-Eutritzsch, deren Tätigkeit für die Tierärzte von besonderem Interesse ist, beschrieben. Bei der Erörterung der Behandlung der Milch vertritt Verf. den Standpunkt, daß es fast unmöglich erscheint, eine moderne Großstadt, der Milch oft hunderte von Kilometern weit zugeführt wird, mit einwandfreier Rohmilch zu erträglichen Preisen zu versorgen, wenngleich die sauber von gefunden Kühen ermolkene, entsprechend behandelte nur tiefgekühlte Rohmilch die wertvollste, gefundeste und schmackhafteste Nahrung ist. Als Ersatz wird dauerpasteurisierte Milch empfohlen. Die Erzeugerpreise für Milch sowie die Verdienstoppen der Händler sind ausgiebig besprochen. Zum Schluß werden die gesetzlichen Bestimmungen über Milch und Milchverkehr, die Milchhöfe und die Einstellung der Landwirtschaft zur Milchversorgung der Zukunft behandelt.

Das Buch enthält so viele Anregungen und wertvolles statistisches Material, daß es auch von den nicht nur im Freistaat Sachsen wohnenden Interessenten der deutschen Milchwirtschaft mit Nutzen gelesen wird.

Dr. Heine.

Tierzüchterische Zeitfragen. Zehn Vorträge, gehalten auf dem Vierten Fortbildungslehrgang für Tierzuchtbeamte in Kiel, veranstaltet vom Preussischen Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Preis Mk. 6,—. 1927. Verlag von M. & H. Schaper, Hannover.

In einer Zeit großer wirtschaftlicher Not der Landwirtschaft, in der es nur einem verhältnismäßig kleinen Teil von Tierzuchtsachverständigen möglich war, an dem vom Preuß. Minist. f. Landw. Dom. u. Forsten veranstalteten Fortbildungslehrgang für Tierzuchtbeamte teilzunehmen, ist die Herausgabe der in Kiel gehaltenen Vorträge in Buch-

form besonders zu begrüßen, zumal der größte Teil der Vorträge für einen größeren Interessentenkreis, insbesondere praktische Landwirte und Tierzüchter, von erheblichem Wert ist. Im einzelnen werden folgende Themata behandelt: 1. Tierzuchtdirektor R. Georgs-Kiel: „Die Viehzucht in Schleswig-Holstein.“ 2. Geheimrat Prof. Dr. Franz Lehmann-Göttingen: „Die Fütterung unserer Nutztiere nach dem Stande neuerer Erkenntnis.“ 3. Prof. Dr. Büniger-Kiel: „Die Förderung der Milchwirtschaft und die öffentliche Tierzuchtspflege.“ 4. Ökonomierat Fr. Reiser-Berlin: „Die Zucht und Haltung von Schlachttieren in ihren Beziehungen zu den Verchiebungen des Vieh- und Fleischmarktes.“ 5. Prof. Dr. F. Schmidt-Göttingen: „Leistungsprüfungen und Schweinezucht.“ 6. Tierzuchtdirektor Meyer-Breslau: „Vor welchen Aufgaben steht die deutsche Pferdezucht?“ 7. Direktor Römer-Halle-Cröllwitz: „Wie können rund 300 Millionen RMk. der deutschen Landwirtschaft zufließen?“ 8. Prof. Dr. E. Baur-Berlin: „Neuzeitliche Vererbungserkenntnis.“ 9. Tierzuchtdirektor Dr. Wrede: „Die Bedeutung des Körwelens und der Vattertierhaltungsgefetze für die Landestierzucht.“ 10. Prof. Dr. G. Frölich-Halle (Sale): „Gegenwart und Zukunft der deutschen Schafzucht.“ Es ist nicht möglich, an dieser Stelle auf die verschiedenen Vorträge näher einzugehen. Der billige Preis des Buches (Mk. 6,—) wird jedoch hoffentlich dazu beitragen, den Vorträgen die gebührende Verbreitung zu verschaffen, da ein eingehendes Studium der einzelnen Vortragsgegenstände für die in Frage kommenden Stellen von großem Nutzen ist.

W. Schäper, Hannover.

Dissertationen der Tierärztlichen Hochschule Berlin.

Karl Martin: Beiträge zur Pathologie der Hodenerkrankungen bei Kryptorchiden; Birger Rösiö: Die Bedeutung des Exterieurs und der Konstitution des Pferdes für seine Leistungsfähigkeit; Bruno Loewel: Klinische Beobachtungen über die Abfuhrwirkung von Aloeextrakt, Istizin und Kalomel beim Pferd in verschiedener Reihenfolge und Kombination; Heinrich Mittlaus: Einige Untersuchungen über die Verbreitung der Nofemafeuche der Honigbiene (*Apis mellifera* L.); Robert Röth: Die Pferdeheilkunde des Jordanus Ruffus; Albert Nimtz: Studien zur Adrenalin- und Gynergenwirkung am isolierten trächtigen Uterus des Rindes.

Dissertationen der vet.-med. Fakultät der Universität München.

Karl Döttl: Über den Einfluß der Wasserstoff- bzw. Hydroxylionen auf kernhaltige rote Blutkörperchen. Karl Hofmann: Die Rinderzucht, insbesondere die Zucht des Pinzgauer Rindes, im Chiemgau. Josef Zimmermann: Untersuchung über die Anwendbarkeit der elektrischen Betäubung nach Leduc bei chirurg. Eingriffen an Hunden. Rudolf Legner: Verhalten der Mäusetyphusbazillen im Körper empfänglicher und nicht empfänglicher Tiere.

Personal-Nachrichten.

Approbiert: in Berlin: Kurt Beutner aus Berlin; Karl Neumann aus Tessin (Kr. Stolp); Heinrich Schiek aus Rheinberg; Rudolf Gadeberg aus Brede (Kr. Tondern); Hermann Wunder aus Seeburg; in Leipzig: Hubert Abels aus Linnrich (Rhld.); Walter Kräft aus Stralsund; Bernhard Laine aus Wiborg (Finnland).

Promoviert: in Berlin: Karl Martin in Pläsewitz (Kr. Striegau); Birger Rösiö in Amal (Schweden); Bruno Loewel in Guben; Heinrich Kittlaus in Berlin-Schmargendorf; Robert Roth in Rhein (Ostpr.); Albert Nimtz in Tegel; Karl Köbe aus Liegnitz; Walter Gradal aus Wüstewaltersdorf; Johannes Bischoff in Altona; in München: Karl Döttl aus Herzogenrath i. Bayern; Karl Hofmann, Tierzuchtdirektor in Traunstein; Josef Zimmermann aus Bulkesch in Rumänien; Rudolf Legner aus Kaiserslautern.

Kommandiert: Für die Zeit vom 1. Januar 1928 bis 31. Dezember 1929 Stabsveterinär Dr. Hornung von der 4. Preuß. Fahrabteilung zur Medizinischen Klinik; Stabsveterinär Zemke von der 2. Preuß. Fahrabteilung zur Chirurgischen Klinik der tierärztl. Hochschule in Berlin.

Todesfälle: Ob.-Reg.- und Veterinärarzt Dr. J. Finkenbrink, Veterinärdezernent für das Saargebiet.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck: Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edlmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtnr, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Ausperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 12.

Ausgegeben am 24. März 1928.

36. Jahrgang.

Wilhelm Ellenberger.

Zum 80. Geburtstag.

Am 28. März 1928 ist es dem Nestor der deutschen Veterinärwissenschaften, Herrn Geheimen Rat Prof. Dr. Wilhelm Ellenberger in Dresden vergönnt, das feltene Fest des 80. Geburtstages zu feiern. In allen Landen des Deutschen Reiches und weit über die Grenzen desselben hinaus wird der Tag im Kreise der Tierärzte, der Ärzte und der Biologen überhaupt, einen freudig-dankbaren Widerhall finden. Gilt es doch, einem seltenen Manne zu huldigen, der in eiserner Schaffenskraft und zielsicherem Handeln Großes und Bleibendes gestaltete. Wer möchte in kurzen Worten all die hervorragenden Resultate seines erfolgreichen Wirkens auf wissenschaftlichem Gebiete aufzählen? Als Forscher und Lehrer gleich bedeutend, war es ihm beschieden, Grundlegendes auf so vielen Teilgebieten seiner Spezialfächer zu schaffen. Aber ganz besonders ist es neben der Gesamtspezialwissenschaft in den wahrhaft klassischen Lehr- und Handbüchern der vergleichenden und topographischen Anatomie, der Mikroskopie und der Physiologie der Haustiere der Digestionsapparat gewesen, der den Jubilar sein ganzes Leben lang als Spezialforscher in Bann genommen hat, und dem er zusammen mit einer schier unübersehbaren Zahl von begeisterten Schülern und Mitarbeitern seine ganze warme Forscherseele gewidmet hat, auf anatomischem, auf histologischem und vor allem auf physiologischem Gebiete. Ist doch Ellenberger einer der letzten großen Männer, die im vorigen Jahrhundert noch beide Hauptdisziplinen, Anatomie und Physiologie, in hervorragendem Maße vertreten haben. Ganz besonderes Verdienst hat sich ferner der Jubilar um die Gesamt-Veterinärwissenschaft erworben durch Gründung des alljährlich erscheinenden Berichtes über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinär-Medizin, der in Kürze im 47. Jahrgange vorliegen wird und der mit Unterstützung weiter Kreise alle Fährnisse der Kriegszeit glücklich überwunden hat. Ein ehrendes Denkmal für alle Zeiten, denn der Jahresbericht wird den Namen Ellenbergers und den seines Freundes und Mitarbeiters Schütz für immer tragen, auch nachdem dem periodischen Werke ein neues Gewand geworden ist. Aber nicht minder sind die Taten des verehrten Jubilars auf organisatorischem Gebiete. Was alles

verdankt die Dresdener Hochschule dem bewährten langjährigen und letzten Führer! In welcher umsichtiger Art wurde diese Anstalt, die zuletzt ganz das Gepräge des letzten Rektors trug, in wirklich akademischer Weise ausgebaut! — Rektoratsverfassung, Promotionsrecht, Habilitationsrecht usw. — Bis sie schließlich reif war, im Schoße der altherwürdigen Universitas literarum des Landes zu Leipzig als gleichberechtigte Fakultät aufgenommen zu werden. Diese Tat werden ihrem Meister die sächsischen und die deutschen Tierärzte nie vergessen. Welche große Schwierigkeiten dabei zu überwinden waren, kann der Außenstehende nicht übersehen. Aber zähe wurde ein Jahrzehnt lang und mehr dieses hohe Ziel verfolgt, welches doch als das Ziel aller tierärztlichen Lehranstalten angesehen werden muß. Und die andauernde Arbeit wurde gekrönt. Mit dem Aufgehen der Dresdener tierärztlichen Hochschule in der veterinär-medizinischen Fakultät der Universität Leipzig hatte Ellenberger sein Lebenswerk vollendet. Die wundervollen, nach einheitlichen Gesichtspunkten errichteten Lehr- und Forschungsinstitute und Kliniken werden den Namen ihres großen Schöpfers für lange Zeiten unter den kommenden Generationen ebenso wach halten wie die Großtaten auf wissenschaftlichem Gebiete.

In strenger Zurückgezogenheit lebt heute der hohe Jubilar in seinem schönen Tuskulum zu Dresden. Aber es ist still geworden dort, wo in früheren Jahren ein hoher wissenschaftlicher und künstlerischer Geist seine Pflegetätte hatte. Denn die treue Hausgenossin und Lebensgefährtin, die alle Kämpfe und alle Erfolge der tatenreichen letzten Jahrzehnte mit durchlebte, ist von hinnen gegangen. Ein schwerer Schlag für den hochbejahrten Mann, der selbst auch die Lasten der Zeit zu tragen hat.

So verdichten sich denn zum hohen Tage die Wünsche der deutschen Tierärzte, vor allem aber der großen Zahl der den hohen Jubilar als ihren Meister verehrenden Schüler und Kollegen zu dem einen: Möge es dem Nestor unserer Wissenschaft vergönnt sein, in guter Gesundheit noch lange sich des Werkes zu erfreuen, dessen Gelingen sein ganzes Leben geweiht war.

Otto Zietzschmann.

Fünfzehn Jahre staatliche Tuberkulosebekämpfung.

(Mit 4 Abbildungen.)

Von Ministerialrat Dr. Wiemann, Berlin.*)

Am 1. Mai v. Js. waren 15 Jahre verstrichen, seitdem das Viehseuchengesetz vom 26. Juni 1909 in Kraft getreten ist, durch das das Ostertag'sche Tuberkulosebeseitigungsverfahren in die staatliche Viehseuchenbekämpfung eingefügt worden ist. Die Durchführung des Verfahrens hat durch den Krieg eine fast vollständige Unterbrechung erfahren, so daß es 1919 neu wieder aufgebaut werden mußte. Die Meinungen über den Wert und die Erfolge des Verfahrens sind noch immer geteilt. Trotzdem und deshalb erscheint es angebracht, die Frage zu prüfen, ob wir mit dem Verfahren auf dem richtigen Wege sind.

Das Ostertag'sche Tuberkulosebeseitigungsverfahren ist auf die Vorstellung gegründet, daß die Tuberkulose der Haustiere eine kontagiöse Infektionskrankheit ist, und daß es deswegen bei ihrer Bekämpfung im wesentlichen auf die Verhütung der Übertragung der Seuche von kranken auf gesunde Tiere ankommt. Als krank haben aber nur diejenigen Tiere zu gelten, die mit offener Tuberkulose behaftet sind, also Tuberkelbazillen ausscheiden. Die Tiere mit Reaktions-Tuberkulose sollen unberücksichtigt bleiben. Der Grund für die Beschränkung der Maßnahmen auf die Rinder mit offener Tuberkulose ist in erster Linie ein wirtschaftlicher insofern, als es ausgeschlossen erscheint, eine Ausmerzungen aller Tiere mit Reaktions-Tuberkulose durchzuführen. Man glaubt, diesen Weg unbedenklich gehen zu können, weil im wesentlichen nur Tiere mit offener Tuberkulose Krankheitserreger ausscheiden. Das Ziel ist aber, eine mehr oder weniger restlose Verhütung der Übertragung von Krankheitserregern zu erreichen, also eine Ansteckung der gesund geborenen Rinder möglichst lückenlos zu verhindern.

Hinsichtlich der Bedeutung der Ansteckung beim Zustandekommen einer tuberkulösen Erkrankung haben sich nun die Ansichten in den letzten 15 Jahren erheblich geändert. Die jüngere Wissenschaft — namentlich auf dem Gebiete der Humanmedizin — steht auf dem Standpunkt, daß das Vorhandensein geschlossener Herdtuberkulose — Reaktionstuberkulose — mit dem Zustandekommen einer fortschreitenden Tuberkulose, einer tuberkulösen Erkrankung, wenig oder nichts zu tun habe, und daß es bei der Tuberkulosebekämpfung nicht so sehr auf die Verhütung der Ansteckung als auf das Fernhalten der tuberkulösen Erkrankung ankomme. Eine Tuberkulose-Infektion sei bei der allgemeinen Verbreitung der Seuche auch kaum zu verhindern und müsse als etwas Gegebenes vorausgesetzt werden. Man müsse die Tuberkulose-Bekämpfung von dem Gesichtspunkte betrachten, daß jedermann Infektionsträger sei. Die Humanmedizin hält diesen Zustand, wie die Verhältnisse in Deutschland liegen, nicht einmal für ungünstig, weil man neuerdings der Meinung ist, daß die Tuberkulose-Immunität keine dauernde ist, sondern eine Gewebs-Immunität, die nur solange anhält, als infolge Vorhandenseins eines lokalen Herdes Abwehrstoffe in den Geweben gebildet werden.

Diese grundsätzlichen Ansichten über die Tuberkulosebekämpfung beim Menschen sind neuerdings auf die Tiere übertragen worden. Man geht dabei — wenigstens theoretisch betrachtet — meiner Ansicht nach auch nicht ganz fehl. So ungünstig wie bei den Menschen liegen die Verhältnisse in unseren Rindviehbeständen allerdings nicht. Die Gefahr der Übertragung der Tuberkulose beim Rindvieh

ist nicht so allgemein wie beim Menschen. Auch dürften bei den Rindern die Ursachen für das Aufblühen der Tuberkulose vielfach anderer Art sein als beim Menschen.

Über die Ursachen für das Auftreten der tuberkulösen Erkrankung herrscht, wenigstens in der Tierheilkunde, noch tiefes Dunkel. In der Humanmedizin ist man auf diesem Gebiete in den letzten Jahren, in der Hauptsache infolge Hereinnahme des Röntgenbildes in die klinische Untersuchung, anscheinend ein gutes Stück weiter gekommen. Es muß auffallen, daß die exakte tierärztliche Wissenschaft, der so viel Untersuchungsmaterial auf diesem Gebiete zu Gebote steht, sich mit dieser für die Beurteilung des Wertes unseres staatlichen Tuberkulosebeseitigungsverfahrens ausschlaggebenden Frage so verhältnismäßig wenig befaßt hat. Jedenfalls steht die Menschenheilkunde in neuerer Zeit auf dem Standpunkte, daß die fortschreitende Tuberkulose in den meisten Fällen ohne Rücksicht auf etwaige vorhandene geschlossene Tuberkuloseherde akut einsetzt und zwar in Form entzündlicher Verdichtungen, sog. Frühinfiltrate. Diese ersten Tuberkuloseanfälle sollen häufig mit Grippe verwechselt werden, zumal sie nach einiger Zeit wieder abklingen. Als Ursache für Krankheitsausbrüche spricht man in erster Linie Massen- und Dauerinfektionen an. Dem ersten Anfall folgen Reininfektionen. Infolge der ersten Erkrankung finden die neuen Infektionen einen allergischen Boden. Das Leiden erhält auf diese Weise etwas Schubweises. Neben der Massen- und Dauerübertragung spielen natürlich die Empfänglichkeit des befallenen Individuums (Disposition) und die Virulenz der Erreger eine nicht unbedeutende Rolle. Je nach Lage der Verhältnisse wird die eine oder andere Ursache den Ausschlag geben. Es gibt aber auch weite Kreise in der ärztlichen Wissenschaft, die der Disposition des Körpers allein die ausschlaggebende Rolle zuschieben.

Dem Standpunkt, daß die Entstehung einer tuberkulösen Erkrankung lediglich oder in der Hauptsache auf Disposition, also dem Verfall der Abwehrkräfte des tierischen Organismus beruhe, kann ich mich, soweit es sich um unsere Haustiere handelt, nicht anschließen. Gewiß haben diese Einflüsse auch bei den Tieren eine große Bedeutung. Die Hauptrolle beim Zustandekommen der tuberkulösen Erkrankung der Tiere, namentlich des Rindes, scheinen mir aber die Virulenz des Erregers und die Menge des Ansteckungstoffes sowie die Häufigkeit der Ansteckung zu spielen. Wir wissen aus dem Tierversuch, daß man durch Abstufung der eingespritzten Tuberkelbazillennengen im voraus beinahe genau zu bestimmende Grade der Tuberkulose erzeugen kann, daß es Tuberkelbazillennengen gibt, die lediglich zur Entstehung eines lokalen Herdes führen, oder die überhaupt keine Infektion setzen. Interessant sind in dieser Hinsicht die Versuche von Selters und Knauer, die aus Anlaß von Schutzimpfungsversuchen exakte Tuberkulose-Übertragungen von Tier zu Tier angestellt haben. Sie stellten bei der Prüfung der Tuberkulosefestigkeit ihrer Versuchstiere Kühen mit schwerer offener Lungentuberkulose ihre Schutzgeimpften und ungeimpfte tuberkulosefreie Jungtiere gegenüber, letztere als Kontrollen. Die Versuchsbedingungen waren recht scharf. Die geimpften und die Kontrolltiere fraßen mit den kranken aus einer Krippe und berührten sich mit dem Kopf, so daß die Versuchstiere nicht nur auf dem Wege der Einatmung, sondern auch durch Aufnahme ausgehusteten Sputums mit dem Futter ständig infiziert wurden. Der Versuch dauerte etwa fünf Monate. Es ist dem Versuchsanstallern gelungen, auf diesem Wege bei allen Kontrolltieren beinahe gleichmäßig eine fortschreitende Tuberkulose zu erzeugen. Die Versuche beweisen, daß es nicht so sehr

*) Nach einem Vortrage, gehalten auf der 44. Sitzung des Sonderausschusses für die Bekämpfung der Tierkrankheiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Magdeburg am 27. September 1927 (zu vergl. auch Mitteilungen der D.L.G., Stück Nr. 53/1927, S. 1199).

auf die Empfänglichkeit der Tiere, als auf die Menge der übertragenen Tuberkelbazillen sowie auf die Dauer der Übertragung ankommt. „Steter Tropfen höhlt den Stein.“

Diese wissenschaftlichen Überlegungen und Versuche werden durch die in der Praxis gemachten Erfahrungen durchaus bestätigt. Es wird auch von denen, die dem Verfahren insgesamt den Erfolg absprechen, nicht bestritten werden, daß es einem einigermaßen gewiegten Praktiker in verhältnismäßig kurzer Zeit gelingt, die Entwicklung von tuberkulösen Erkrankungen im Einzelbestande zu verhindern. Stark verseuchte Herden, in denen die Besitzer mit einem regelmäßigen Abgang infolge Tuberkulose von 5 bis 10 Prozent rechnen, lassen sich durch zwei, drei oder höchstens vier genaue Untersuchungen dahin bringen, daß tuberkulöse Tiere nur noch ganz vereinzelt zur Feststellung kommen und zwar nicht nur in den ersten Jahren nach Beendigung der Ausräumung der chronisch kranken Tiere, sondern dauernd. Die Richtigkeit dieser Tatsache ist in den Veröffentlichungen der Bakteriologischen Institute der Preussischen Landwirtschaftskammern sowie von einzelnen Praktikern so häufig erhärtet worden, daß ich es mir versagen kann, zahlenmäßiges Beweismaterial hierfür an dieser Stelle zu erbringen.

Als Ergebnis der wissenschaftlichen Betrachtungen und der Erfahrungen in der Praxis kann ich also zusammenfassend sagen, daß der dem Ostertag'schen Tuberkulosefütterungsverfahren ursprünglich zugrunde liegende Gedanke der reinen Infektionsabwehr verschoben werden muß. Dadurch wird aber die Auswirkung des Verfahrens nicht verkleinert, sondern vergrößert. Wenn es tatsächlich bei der Tuberkulosebekämpfung in der Hauptsache auf die Verhinderung der Massen- und Dauerinfektionen ankommt, dann ist dieses Verfahren bei vorschriftsmäßiger Durchführung durchaus geeignet, sein Ziel zu erreichen und verdient mehr Vertrauen wie zuvor.

Es ist ja auch nicht uninteressant, daß die Bekämpfung der Menschentuberkulose sich immer mehr auf die Erfassung der offen tuberkulösen Kranken einstellt und man neuerdings dazu übergreift, deren Umgebung planmäßig auf Früh tuberkulose zu untersuchen, also in anderer Form das Ostertag'sche Verfahren anwendet.

Daß neben der Verhütung der Ansteckung auch planmäßig Hygiene betrieben werden muß, steht nach dem vorhin Gesagten außer Zweifel, ist auch an anderer Stelle oft und ausführlich dargelegt. Ich kann mich deshalb hier auf den Hinweis beschränken. Aber Hygiene ohne Beseitigung der Seuchenquellen ist aussichtslos.


Die Gegner des Verfahrens haben ausgeführt, daß, wenn das Verfahren wirklich so gut wäre, wie es von seinen Anhängern dargestellt würde, es bei der Viehzucht treibenden Bevölkerung einen ganz anderen Anklang finden müßte. Tatsächlich werde das Verfahren in großem Maßstabe abgelehnt. Es sei nur ein Bruchteil der Viehbestände dem Verfahren angeschlossen.

Diese Ansicht trifft für preussische Verhältnisse nicht zu. In Preußen haben nach dem ersten Ansteigen der Anschlüsse an das Verfahren vor dem Kriege und nach dessen Unterbrechung in der Kriegszeit die Anschlüsse eine nicht nur gleichmäßige, sondern auch eine schnelle Zunahme erfahren (Abb. 1). Die Zahl der angeschlossenen Herden betrug im Jahre 1913: 25 374 und stieg von 2999 im Jahre 1919 auf 63 846 im Jahre 1926. Die Zahl der angeschlossenen Tiere stieg von 176 000 im Jahre 1919 auf 1 125 000 im Jahre 1926, d. i. rund 11 Prozent der überhaupt vorhandenen Rinder, ein durchaus beachtlicher Anteilatz. Das Verfahren muß also schon eine gute werbende Kraft besitzen, wenn es sich so gleichmäßig und in solchem Umfange ausbreiten konnte. Die rund 11 Prozent der angeschlossenen Rinder bekommen noch eine andere Bedeutung, wenn man sich die Anschlüsse geographisch betrachtet. Es gibt in Preußen einzelne Kreise, in denen bereits über 50% aller Rin-

der angeschlossen sind. In 53 Kreisen gehen die Anschlüsse über 20 Prozent. Man muß sich vor Augen halten, daß sich dem Verfahren zunächst die Gebiete anschließen, die seiner bedürfen.

Nun ist es gar keine Frage, daß das letzte Ziel der Tuberkulosebekämpfung sein muß, möglichst sämtliche Bestände in das Verfahren hinein zu bekommen. Im Viehseuchengesetz ist die Möglichkeit für eine solche Entwicklung auch durchaus gegeben. Ich halte aber mit von Ostertag eine zu schnelle Ausbreitung des Verfahrens für unzulässig, weil wir noch mitten in der Entwicklung des Verfahrens stehen, ganz abgesehen davon, daß die Aufbringung der Mittel im Augenblick vollständig unmöglich sein würde. Ich habe berechnet, daß bei einer allgemeinen Anwendung des Verfahrens in Preußen bei Zugrundelegung eines 4prozent. Befalls mit offener Tuberkulose jährlich 299 012 Stück Rindvieh auszumergen sein würden mit einem Kostenaufwande von 67 Millionen Mark. Die Umlage würde allein aus Anlaß der Tuberkulose 4,70 Mark je Rind betragen. Diese rein theoretisch errechnete Zahl würde allerdings im günstigsten Falle kaum zur Hälfte erreicht werden. Aber auch diese Summe würde im Augenblick nicht aufzubringen sein. Eine allgemeine Einführung des Verfahrens kommt somit zunächst nicht in Betracht, ist übrigens von vornherein auch nicht beabsichtigt gewesen. Von diesem Ziele sind wir noch weit entfernt. Am Schlusse des Jahres 1925 waren von den 528 Kreisen Preußens noch 149 = 28,2 Prozent, in denen überhaupt kein Bestand dem Tuberkulosefütterungsverfahren angeschlossen war. Ein großer Teil der übrigen Kreise hat noch sehr wenige Anschlüsse. Wenn man sich aber die Kreise ansieht, in denen gar keine oder wenig Anschlüsse zu verzeichnen sind, so ergibt sich, daß diese in großen Weidegebieten oder in den Gegenden des Kleinbesitzes

Abb. 1.
Zahl der in Preußen angeschlossenen und untersuchten Tiere.



liegen, in denen eine Tuberkulosebekämpfung nicht dringend ist. Ein großer Teil dieser Bezirke ist Einfuhrbezirk für Nutzvieh und hat deswegen, auch wenn er sich selbst an der Tuberkulosebeseitigung nicht beteiligt, ein lebhaftes Interesse an deren Durchführung, da er sonst Gefahr läuft, der Empfänger für das in den Hochzuchtgebieten abgestoßene tuberkulöse Vieh zu sein. Die Bedeutung dieser Frage wird in ein grelles Licht gestellt, wenn ich darauf hinweise, daß in Preußen im Jahre 1926 rd. 27 000 Tiere wegen Tuberkulose unschädlich gemacht und dadurch dem Handel und Verkehr entzogen worden sind. Die Verbindung der Tuberkulose-Bekämpfung mit der organisierten Tierzucht ist das Gegebene. Ich kann mir keine Genossenschaft denken, die Hochzucht ohne Tuberkulosebekämpfung betreiben will.

Ich habe oben bereits darauf hingewiesen, daß das Verfahren sein Ziel nur bei vorschriftsmäßiger Durchführung erreichen kann. Es steht außer Zweifel, daß das Tuberkulosebeseitigungsverfahren, so wie es sich heute auswirkt, in dieser Hinsicht nicht befriedigt. Das liegt aber weniger in den Bestimmungen über die Tuberkulosebekämpfung als in deren Handhabung. Bei der Tuberkulosebekämpfung ist im Gegensatz zu allen anderen Seuchen die Ermittlung der kranken Tiere nicht der Entschließung der Besitzer überlassen, indem die zu ergreifenden Maßnahmen von der Erfüllung der Anzeigepflicht abhängig gemacht werden, sondern man ist von vornherein davon ausgegangen, daß ein solcher Weg nicht zum Ziele führen würde. Man hat deswegen das staatliche Eingreifen und die staatliche Hilfe davon abhängig gemacht, daß die angeschlossenen Herden von besonders geschulten Tierärzten auf tuberkulöse Tiere planmäßig durchsucht werden. Es ist somit dem Willen des Besitzers entzogen, welche Tiere ausgemerzt werden sollen.

Die Grundlage der Mittel, mit denen der Fachmann die Tiere herausfucht, ist die klinische Untersuchung, die durch nachfolgende Laboratoriumsverfuche vervollständigt wird. Es wird vielfach behauptet, das Verfahren müsse schon deshalb versagen, weil die angeschlossenen Besitzer ihm nicht das notwendige Interesse entgegenbrächten. Es ist zweifellos richtig, daß die Mitwirkung und das Verständnis der Tierbesitzer bei der Durchführung des Verfahrens eine sehr große Rolle spielen. Ausschlaggebend ist aber die Mitwirkung der Tierbesitzer nicht. Es kommt vielmehr in erster Linie auf die Fertigkeiten und den guten Willen des untersuchenden Tierarztes an, wenn es sich darum handelt, ob und in welcher Zahl tuberkulöse Tiere in den einzelnen Beständen ermittelt werden. Auf diesem Gebiete ist das Optimum aber m. E. noch lange nicht erreicht. Durch folgende Überlegungen läßt sich das leicht beweisen.

Die offene Tuberkulose äußert sich in der Hauptsache in Form der Lungentuberkulose. Auf 100 Fälle von offener Tuberkulose entfallen in Preußen nach meinen Berechnungen durchschnittlich:

- 95,88 Tiere mit offener Lungentuberkulose,
- 3,2 Tiere mit offener Eutertuberkulose,
- 0,73 Tiere mit offener Gebärmuttertuberkulose,
- 0,09 Tiere mit offener Darmtuberkulose.

Diese Zahlen müßten in den statistischen Nachweisen der einzelnen Provinzen gleich sein, denn sie unterliegen einem Naturgesetze. Tatsächlich weichen aber diese Zahlen sehr erheblich von einander ab. Der Hundertsatz der ermittelten Fälle von Eutertuberkulose schwankt in den einzelnen Nachweisen zwischen 0,65 und 479 (Abb. 2), der Hundertsatz bei der Gebärmuttertuberkulose zwischen 0,06 und 3,63 (Abb. 3). Es ist ganz ausgeschlossen, daß diese großen Schwankungen durch Verschiedenheiten im Auftreten der Tuberkulose in den einzelnen Provinzen zu erklären sind. Sie sind m. E. lediglich ein Beweis dafür, daß das Tuberkulose-Tilgungsverfahren verschieden gehandhabt wird.

Wenn das richtig ist, dann ist in den meisten Provinzen das Möglichste hinsichtlich der Feststellung der Fälle von offener Euter- und Gebärmuttertuberkulose noch nicht erreicht. Tatsächlich sind die Methoden zur Feststellung der Tuberkuloseformen in den einzelnen Provinzen sehr verschieden.

Abb. 2. Euter-Tuberkulose.





Abb. 3. Gebärmutter-Tuberkulose 1926.

Prozentzahlen beziehen sich auf 100 tuberkulöse Rinder.




Es gibt Provinzen, in denen die Gesamtmilchuntersuchungen vollständig vorschriftsmäßig durchgeführt werden. In diesen sind fast durchweg auch die meisten Fälle von Eutertuberkulose ermittelt worden. In anderen Provinzen hat man geglaubt, den Grundsatz aufstellen zu müssen, daß die Euter- und Gebärmuttertuberkulose bei gründlicher Ausmerzung der Tiere mit Lungentuberkulose mit erfaßt würden, und daß die Gesamtmilchuntersuchungen deshalb entbehrlich seien. Über diese Frage schweben noch exakte Erhebungen. Ich kann aber heute schon sagen, daß diese Ansicht irrig ist. Es hat sich vielmehr gezeigt, daß Euter- und Gebärmuttertuberkulose in sehr vielen Fällen vorkommen, in denen Lungentuberkulose nicht vorliegt. Das beweist, wie notwendig es ist, auch auf diese Tuberkuloseformen systematisch zu untersuchen. Die systematische Untersuchung auf Eutertuberkulose erfolgt durch die Gesamt-

milch-Untersuchung. Die Gesamtmilch-Untersuchungen sind deswegen heute ebenso wichtig wie im Anfang der Tuberkulosebekämpfung. Sie gewinnen noch eine erheblich größere Bedeutung, wenn wir uns die Wichtigkeit der Verhütung von Masseninfektionen vor Augen führen. Denn gerade die Eutertuberkulose führt zu Massen- und Dauerinfektionen.

Für die restlose Erfassung der Gebärmuttertuberkulose hat uns Schumann in Breslau den richtigen Weg gezeigt. Er begnügt sich nicht damit, nur diejenigen Tiere, die von dem Besitzer als verdächtig bezeichnet oder auf Grund der Zuchtbücher als unfruchtbar erkannt werden, auf Gebärmuttertuberkulose untersuchen zu lassen, sondern er fordert, daß die angeschlossenen Bestände auch aus Gründen der Bekämpfung der Unfruchtbarkeit gelegentlich der allgemeinen Untersuchung auf offene Tuberkulose planmäßig auf Unfruchtbarkeit und Gebärmuttertuberkulose untersucht werden. Tatsächlich ist in denjenigen Provinzen, in denen nach diesen Vorschlägen verfahren wurde, bei weitem am häufigsten Gebärmuttertuberkulose ermittelt worden.

Ich kann also feststellen, daß eine neuzeitliche Tuberkulosebekämpfung bei der Ermittlung der Euter- und Gebärmuttertuberkulose erhöhte Anforderungen an die klinische Untersuchung der Herden durch den Vertrauens-tierarzt stellt. Wenn wir das Optimum der Untersuchung bei diesen Tuberkuloseformen erreichen wollen, dann müssen wir Mittel und Wege finden, daß die Untersuchungsmethoden, die uns als durchführbar in einzelnen Provinzen gezeigt sind, auch überall vorschriftsmäßig und gewissenhaft zur Durchführung kommen.

Abb. 4.



Genau so wie bei der Ermittlung der Euter- und Gebärmuttertuberkulose liegen die Verhältnisse bei der Lungentuberkulose. Man hat den Beweis, daß das Oftertag'sche Verfahren erfolglos sei, daraus zu führen versucht, daß die Zahl der bei der Untersuchung ermittelten Fälle von offener Lungentuberkulose nicht abnehme. Diese Beweisführung ist von den Praktikern wiederholt einwandfrei widerlegt worden. Man hat darauf hingewiesen, daß infolge der Neuanschlässe immer wieder neue Herden hinzukommen, in denen zunächst ungewöhnlich viel offen tuberkulöse Tiere ausgemerzt werden müssen, und daß deswegen ein Herabsinken der Verhältniszahl der tuberkulösen Tiere nicht erwartet werden könne. Ich bin bei Betrachtung der Statistik zu dem überraschenden Ergebnis gekommen, daß die Zahl der ermittelten Tuberkulosefälle nicht nur nicht ab-, sondern daß sie in ganz unerwartetem Maße zunimmt. Die Hundertsätze der bei den untersuchten Tieren ermittelten Fälle mit offener Tuberkulose sind, auf den Gesamtdurchschnitt für Preußen berechnet, unter kleinen Schwankungen von 0,97 im Jahre 1919 auf nicht weniger als 3,45 im Jahre 1926 gestiegen (Abb. 4). Der Anstieg der ermittelten Tuber-

kulosefälle kann unmöglich durch ein Zunehmen der Tuberkulose bedingt sein. Er ist m. E. einzig und allein auf eine Verfeinerung der Untersuchungsmethoden zurückzuführen. Das beweist, daß wir auch bei der Feststellung der Lungentuberkulose das Optimum noch nicht erreicht haben. M. E. kommen wir ihm aber schon nahe. Knauer gibt den Prozentsatz der offen tuberkulösen Rinder mit etwa 5 Prozent an. Magnusson fand in den Herden Südschwedens in elfjährigem Durchschnitt 4,66 Prozent. Ich möchte den Hundertsatz auf den Durchschnitt des Gesamtviehbestandes in Preußen auf etwa 4 Prozent veranschlagen. Diese Verhältniszahl werden wir also erreichen müssen, wenn das Oftertag'sche Tuberkulosefärbungsverfahren sich so auswirken soll, wie es gedacht ist. Dabei kann man unterstellen, daß das Verfahren sich natürlich auch schon dann zur Verhinderung der Masseninfektion in großem Maßstabe auswirken muß, wenn etwa 75 Prozent der Tiere mit offener Tuberkulose erkannt werden, denn man kann ohne weiteres unterstellen, daß bei diesen 75 Prozent alle Tiere mit schweren Tuberkuloseformen sind, auf deren Erfassung es nach dem vorhin Gefagten ankommt.

Welchen Weg wird man einschlagen müssen, um das von mir gezeigte Optimum bei der Erfassung der Lungentuberkulose zu erreichen?

Man wird zunächst daran denken, das klinische Verfahren durch allgemeine Laboratoriums-Methoden zu vervollständigen. Wir haben bei der Rotzbekämpfung erst durchschlagende Erfolge erzielt, nachdem das Blutuntersuchungsverfahren die klinische Feststellung sicherte. Ebenso liegen die Verhältnisse bei der Bekämpfung der Beschläuche und der Lungenfeuche. Selbst wenn die Laboratoriumsverfuche nicht wie bei der Rotzbekämpfung beinahe 100prozentige Erfolge zeitigten, könnten sie von großem Nutzen sein. Die rein mechanischen Reaktionsverfuche sind leider exakter als die klinischen Methoden, die nun einmal vom menschlichen Willen und Können abhängig sind.

Immer wieder wird die Tuberkulinisierung als Hilfsmittel bei der Tuberkulose-Feststellung verlangt. Deich stellt die Forderung auf, bei der endgültigen Feststellung der offenen Tuberkulose nicht nur den Bazillennachweis, sondern auch die Tuberkulin-Reaktion gelten zu lassen. Deich kann nicht verstehen, daß dieses so einfache Verfahren nicht schon lange aufgenommen worden ist. Die Idee, klinischen Tuberkuloseverdacht durch die Tuberkulinprobe zu erhärten, ist nicht neu. Vor den Versteigerungen der ostpreussischen Herdbuchgesellschaft wurden schon vor 20 Jahren sämtliche Tiere eingehend klinisch untersucht. Es bedeutete für den untersuchenden Tierarzt eine große Verantwortung, wenn er einen hochwertigen Zuchtbullen für tuberkuloseverdächtig erklärte, was gleichbedeutend mit Ausschluß von der Versteigerung und Lieferung an das Schlachtmesser war. Es wurde deswegen eine Zeit lang versucht, derartige hochwertige Tiere zur Stützung des klinischen Befundes (bakteriologisch — bakterioskopische Nachprüfungen gab es damals noch nicht) mit Tuberkulin zu prüfen. Als aber erst ein halbes Dutzend wertvoller Bullen geschlachtet worden war und bei der Schlachtung nur Herdtuberkulose aufwies, hat man dies Verfahren schleunigst wieder verlassen, denn schon damals erkannte man, daß der Wert dieser Tiere durch das Vorhandensein lokaler Herde durchaus nicht beeinträchtigt wurde. Heute sehen wir nach dem eingangs Gefagten noch viel klarer. Auf die Erfassung der Tiere mit Reaktionstuberkulose kommt es, so wie die Dinge liegen, nicht an. Auf die Frage, ob ein Tier mit Erscheinungen offener Tuberkulose tatsächlich an dieser Tuberkuloseform leidet, kann die Tuberkulinprobe aber überhaupt keine Antwort geben, wenn 50—70 Prozent der Tiere an Reaktionstuberkulose leiden. Die Aufnahme der Tuberkulinprobe als gleichbedeutendes Mittel mit der bakteriologischen Feststellung von Tuberkelbazillen in das

Tuberkulosebekämpfungsverfahren muß als ungeeignet abgelehnt werden. Derartige Versuche bringen Verwirrung statt Klarheit.

Anders wäre es schon, wenn man etwa so vorgehe, daß man die zu untersuchenden Herden mit Tuberkulin prüfte und fämlichen Tieren mit Reaktionstuberkulose Sputumproben entnähme. Es würde dann tatsächlich der Ring exakter Laboratoriumsmethoden geschlossen. Leider ist ein solches Verfahren nach meiner Meinung schon aus pekuniären Gründen nicht durchführbar. Aber ganz abgesehen hiervon erscheint mir ein solches Verfahren nicht ungefährlich. Durch die Massenentnahme von Sputumproben könnten nicht nur die Tuberkulose und andere Seuchen von Tier zu Tier übertragen werden, sondern es bestünde vor allen Dingen die Gefahr der allgemeinen Verunreinigung der Instrumente und damit die Gefahr des Aufkommens zahlreicher Fehldiagnosen, die dem Ansehen des ganzen Verfahrens verhängnisvoll werden könnten. Ich muß infolgedessen diesen Weg, wenigstens für die heutigen Verhältnisse, als nicht gangbar bezeichnen.

Günstiger wären vielleicht schon die Aussichten bei Anwendung der Blutuntersuchungsmethoden, namentlich der Komplementablenkung, wie sie K a r s t e n in der Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift 1926 ausführlich geschildert hat. Die Anhänger der Blutuntersuchung sind der Meinung, daß man mit ihrer Hilfe vorwiegend die Tiere mit fortschreitender Tuberkulose erfassen könne. Wenn das tatsächlich der Fall wäre und deshalb die Zahl der mittels dieser Methoden gefundenen Tiere gegenüber der Zahl der auf Tuberkulin reagierenden Tiere erheblich eingeengt würde, so daß nunmehr bei den ermittelten Tieren eine planmäßige Lungenauswurf-Entnahme möglich wäre, so wäre dieses Verfahren vorzuziehen. Ich kann aber auch diese Ergänzung heute leider noch nicht empfehlen, weil nach den Versuchen K a r s t e n s und anderer Wissenschaftler das Blutuntersuchungsverfahren nicht das hält, was man sich von ihm verspricht, nämlich in befriedigendem Umfange die Tiere mit fortschreitender Tuberkulose zu ermitteln, und weil auch bei Durchführung dieses Verfahrens möglicherweise so viele Tiere ermittelt werden würden, daß dieselben Schwierigkeiten wie bei der Tuberkulinprobe entständen.

Ich sehe vorläufig leider keinen Weg, die klinischen Untersuchungsmethoden durch Anwendung neuzeitlicher Laboratoriumsverfahren sicherer zu gestalten. Auf diesem Gebiete wird man aber weiter arbeiten müssen. Vorläufig bleibt nur der Weg, dahin zu wirken, daß das geltende Feststellungsverfahren verbessert, zum wenigsten so durchgeführt wird, wie es von seinen Urhebern gedacht ist.

Wenn die Vertrauens-tierärzte bei ihren Untersuchungen die kranken Tiere nicht restlos erfassen, so liegt das fraglos z. T. daran, daß es vielfach an der nötigen Schulung fehlt. Man beachte einmal, mit welchem Eifer und mit welcher Ausdauer in der Menschenheilkunde die Fachärzte der Tuberkulosekommissionen und der Heilstätten in den Methoden der Tuberkulosefeststellung geschult werden. Bei uns Tierärzten liegen die Verhältnisse besonders ungünstig, weil die Praxis nur mangelhafte Vorbedingungen für eine

einwandfreie Untersuchung bietet und die Probeentnahme ungewöhnliche Schwierigkeiten macht. An die Tuberkuloseuntersuchungen sollte man sich nur heranmachen, wenn man feiner Sache wirklich sicher ist. Vor allen Dingen sollten die ersten Untersuchungen an Ort und Stelle nur unter Anleitung eines geübten Kollegen erfolgen. Nur so können die vielen Kniffligkeiten einer kunstgerechten Bestandsuntersuchung gelernt werden. Dazu muß natürlich eine peinliche Gewissenhaftigkeit treten. Wer keine Zeit für diese ganz zweifellos anstrengenden und zeitraubenden Untersuchungen hat, darf sie im Interesse des Ansehens der tierärztlichen Wissenschaft nicht übernehmen. Nichts hat manchenorts dem Ansehen des Verfahrens so geschadet, wie flüchtige Arbeit, bei der vier Wochen nach der planmäßigen Bestandsuntersuchung bereits wieder schwertuberkulöse Tiere in Erscheinung traten. Von dieser Linie soll man sich auch durch den Unverstand mancher Tierbesitzer nicht abbringen lassen. Geht die Sache schief, so sind es meistens gerade diese Leute, die über den Vertrauens-tierarzt herfallen und ihn haftbar zu machen suchen. Wir stehen m. E. erst am Anfange der Tuberkulosebekämpfung und vor einem Gebiete, daß gerade dem Freiberufstierärzte ein großes Betätigungsfeld bietet. Eine allgemeine Anerkennung wird das Verfahren aber nur erringen, wenn es Erfolge zeitigt. Über den Erfolg entscheidet der Vertrauens-tierarzt.

Weithin sichtbare Erfolge kann das Verfahren allerdings nicht von heute auf morgen zeitigen. Es ist ein Verfahren auf lange Sicht. Ich weise immer darauf hin, daß hier die Verhältnisse ähnlich liegen wie bei der Bekämpfung des Rotzes. In Rußland war man in der Nachkriegszeit stellenweise nicht in der Lage, fämliche Pferde, die Reaktionsrotz zeigten, zu töten. Man hat sich damit begnügt, die Tiere mit offensichtlichem Rotz auszumerzen und ist dabei ein gut Stück weiter gekommen. Heute ist man schon wieder so weit, daß alle Tiere mit Reaktionsrotz ausgemerzt werden. Die Entwicklung der Tuberkulosebekämpfung denke ich mir ähnlich, nur müssen wir, falls unsere Ansicht über das Verfahren richtig ist, mit erheblich größeren Zeitläufen rechnen. Aber selbst wenn wir den Idealzustand der vollständigen Reinigung der deutschen Viehbestände von Tuberkulose nicht erreichen, hat das Verfahren sich bezahlt gemacht, wenn wir dahin kommen, daß eine Weiterverbreitung der Tuberkulose nicht mehr stattfindet, darüber hinaus aber tuberkulöse Erkrankungen bei unserem deutschen Vieh nur noch vereinzelt in Erscheinung treten.

So viel steht jedenfalls fest, ohne eine planmäßige Tuberkulosebekämpfung ist die Aufrechterhaltung unserer hochentwickelten deutschen Tierzucht nicht möglich. Wenn wir Tierärzte uns diese Sache nicht mit vollem Ernste angelegen sein lassen, wird die Landwirtschaft zur Selbsthilfe greifen. Deshalb muß auch die Staatsregierung die Angelegenheit in der Hand behalten. Für eine staatliche Tuberkulosebekämpfung kommt nach dem heutigen Stande der Wissenschaft in Deutschland nur das Ostertag'sche Verfahren in Frage. Sein Erfolg scheint heute gesicherter denn je.

Ätiologie, Diagnose und Bekämpfung der Krankheiten des Schweinepest- und Schweineseuchekreises.

Von Veterinär Dr. Glässer, Hannover.

(Schluß.)

Differentialdiagnostisch kommen zu den Krankheiten des Schweineseuchekreises die des Schweinepestkreises, über die das schon Angeführte genügen möge, weiter in Frage, gegenüber der enzootischen Pneumonie, die Lungenwurmkrankheit und Tuberkulose und gegenüber der akuten Bipolarisbazilliose der Rachenmilzbrand, der gewöhnliche akute Rotlauf und sporadische bazilläre Septikämien. Lungen-

wurmkrankheit und Tuberkulose sind leicht durch die Zerlegung eines der erkrankten Tiere festzustellen. Der Rachenmilzbrand führt zu Nekrosen an den Mandeln und nicht zu bloßer hyperämischer oder hämorrhagischer Schwellung der Lymphdrüsen, sondern zu einer hämorrhagisch-nekrotisierenden Entzündung der regionären Lymphdrüsen. Der Rotlauf zeigt abgesehen von der meist intensiveren, dunkleren

und ausgebreiteten Hautrötung die bereits erwähnten Organveränderungen. Der Nachweis der Milzbrand- oder Rotlaufbazillen sichert dann in beiden Fällen die Diagnose. Die seltenen, sonstigen bazillären Septikämien-, Streptokokken- und Paratyphusbazillenseptikämien kommen am ehesten einmal vor, sind nur durch bakteriologische Untersuchung sicher von der akuten Bipolarisbazillose abzutrennen.

Zur Bekämpfung der besprochenen Krankheiten kurz folgendes: Bei der Schweinepest ist vorbeugend von der Art der Fütterung und Haltung nicht allzuviel zu erwarten. Immerhin hat nach den vorliegenden Beobachtungen die einseitige Fütterung mit starken Gaben von Körnerfrüchten bezw. Schrot und auch ein Aufenthalt in kalten, nassen, dunklen Ställen einen die rasche Ausbreitung und die Schwere der Erkrankungen in verseuchten Beständen fördernden Einfluß gezeigt. Tatsächlich sehen wir ja als Folge anhaltender einseitiger Ernährung, insbesondere dem Fehlen von frischen Vegetabilien in der Kost beim Menschen Skorbut auftreten, d. h. eine Krankheit, die dem Skorbut bezw. der Blutfleckenkrankheit des Schweines entspricht. Da bei der Blutfleckenkrankheit zweifellos ähnliche Blut- und Blutgefäßveränderungen entstehen, wie bei der Schweinepest, so ist, da bei einseitiger Fütterung und Schweinepestinfektion zwei Schädigungen in gleicher Richtung wirken, ein besonders gefährliches Auftreten der Pest in solchen Beständen durchaus wahrscheinlich. Aus allgemein-hygienischen Gründen empfiehlt sich sonach auch mit Rücksicht auf die Schweinepest eine möglichst regelmäßige Zugabe frischer Vegetabilien zum Futter und ein trockener, warmer, heller Stall. Vorbeugend gegen die Schweinepest empfiehlt sich weiter für Schweinebesitzer bei Ankäufen eine strenge, dreiwöchige Quarantäne in besonderem Stall mit besonderem Wärter durchzuführen, wobei zweckmäßigerweise einige Tiere des alten, eigenen Bestandes dem neuangekauften probeweise zugesetzt werden. Es ist auch der Ankauf direkt vom Züchter unter Umgehung der Märkte angezeigt. Große Bedeutung in vorbeugender Hinsicht hat noch die Fleischschau, einmal durch die möglichst restlose Ermittlung der pestinfizierten Schweine und zum anderen durch die Freigabe solcher Tiere zum Freibankverkauf nur nach vorausgegangener Durchkochung. Das Virus der Schweinepest ist bekanntlich nicht selten durch Fleischwaschwasser, Frischfleisch, Pökelfleisch oder Pökellake in gesunde Schweinebestände verschleppt worden und nur durch Kochen der pestinfizierten Schweine kann dies sicher verhütet werden.

Treten in einem Bestande Schweinepestverdächtige Erkrankungsfälle auf, so ist mit aller Beschleunigung die Diagnose möglichst unter Heranziehung von Zerlegungen notgeschlachteter oder verendeter Tiere klarzustellen. Ist die Diagnose Schweinepest gesichert, dann empfiehlt sich die umgehende Abschachtung aller ungefähr schlachtreifen Schweine unter Beobachtung der veterinär-polizeilichen Schutzmaßregeln. Ebenso werden alle klinisch bereits erheblich krank befundenen Tiere am besten alsbald geschlachtet. Der Restbestand wird in zwei Teile durch Temperaturaufnahme getrennt, nämlich in bereits fiebernde und in fieberfreie. Temperaturen über 40 Grad C gelten bei über vier Monate alten Schweinen als Fieber, über 40,5 Grad C als solches bei den jüngeren Tieren. Die fieberfreien Tiere erhalten die einfache Schweinepestserumschutzdosis, die bereits fiebernden mindestens die doppelte Menge. Die bereits fiebernden Tiere werden in einem vor oder sofort nach der Impfung desinfizierten Stall untergebracht. Der Stall ist ständig sorgfältig reinzuhalten und öfter noch zu desinfizieren. Tiere, die doch schwer krank werden, sind aus den Buchten zu entfernen, um nachträglich massige Virusaufnahmen möglichst zu verhüten. Die fieberfreien Tiere werden zweckmäßigerweise erst noch einige Tage in dem undesinfizierten Stalle gelassen, damit sie unter dem Serumschutze möglichst noch Virus aufnehmen und eine aktive

Immunität erwerben. Einige Tage nach der Impfung ist dann aber auch dieser Stall zu desinfizieren und dann genau wie bei den fiebernden Tieren zu verfahren. Bei rechtzeitiger Anwendung der Impfung, d. h. möglichst bald nach einem Pestausbruche, waren die Erfolge mit dieser Serumimpfung in der Mehrzahl der Fälle durchaus befriedigende. In einigen Fällen wurde jedoch beobachtet, daß nach Ablauf des Serumschutzes erneut Erkrankungen unter den gesund geimpften Schweinen an Schweinepest auftraten. Diese werden darauf zurückgeführt, daß eine Anzahl der Impflinge keine Gelegenheit zur aktiven Immunisierung fand und nun, wenn seitens einzelner anderer Tiere noch Virus ausgeschieden wird, an Schweinepest erkrankten. Deshalb ist man auch, nach dem Beispiele von Amerika und Ungarn in Deutschland dazu übergegangen, in verseuchten Beständen die noch gesund erscheinenden, fieberfreien Tiere gleichzeitig mit der Serumeinspritzung mit Virus zu behandeln. Dabei wird das Virus durch Entbluten eines frisch erkrankten Tieres des betreffenden Bestandes gewonnen. Das Blut wird defibriniert und davon jedem Impfling 1 ccm subkutan eingespritzt. Diese Simultanimpfungen sind bislang, wie mir Dr. Geiger, der Leiter der einzigen Schweinepestserumanstalt in Deutschland, in Eysstrup mitteilte, von gutem Erfolge gewesen. Die Serumanstalt in Eysstrup soll nur bis auf weiteres bei den passiv-aktiven Immunisierungen noch selbst beteiligt werden. Eine passiv-aktive Immunisierung gesunder Bestände ist unzulässig, da dabei künstlich neue Seuchengehöfte geschaffen würden, die die Seuche weiter verbreiten können. Die arzneiliche Behandlung der Schweinepest hat bislang keine Erfolge aufzuweisen. Die veterinärpolizeiliche Bekämpfung der Schweinepest in Deutschland hat gute Ergebnisse gehabt, nur ihr ist es zu verdanken, daß Deutschland von ähnlichen, geradezu verheerenden Seuchengängen, wie sie in Amerika und anderen Ländern vorkamen, bislang verschont blieb.

Soll die Veterinärpolizei auch weiter ihre Aufgaben erfüllen, dann ist es notwendig, daß eine sorgfältige Beachtung der Anzeigepflicht in allen akuten und chronischen Schweinepest- auch allen Schweinepestverdachtsfällen stattfindet. Bei stärkerer Verbreitung der Schweinepest in einer Gegend kann neben den bestehenden veterinärpolizeilichen Bestimmungen, wie es schon öfter mit Erfolg geschah, eine Bestandsrevision und eine tierärztliche Fleischschau auch für alle hausgeschlachteten Schweine angeordnet werden. Von Bedeutung könnte vielleicht noch einmal die Keulung verseuchter Bestände unter staatlicher Entschädigung der Tierbesitzer bei der Schweinepest werden. In England sollen damit im allgemeinen befriedigende Ergebnisse erzielt worden sein und die Ähnlichkeit der Schweinepest mit der Rinderpest läßt solche tatsächlich erhoffen. Nur müßte dann streng dafür gesorgt werden, daß aus dem Auslande nur Schweinefleisch und Schweinefleischwaren im gekochten Zustande zur Einfuhr gelangen. Zweifellos ist durch gefroren frisch oder gefalzen eingeführtes Schweinefleisch schon oft die Schweinepest nach Deutschland eingeschleppt worden. In den Ländern, aus denen Schweinefleisch nach Deutschland eingeführt werden kann, ist so gut wie durchweg die Schweinepest stärker verbreitet als in Deutschland. Da im Inkubationsstadium der Pest stehende Schweine von der Fleischschau meist nicht als solche erkannt werden, so kann es nicht ausbleiben, daß dabei manchmal mit den Schweinen Schweinepestvirus zur Einfuhr gelangt. Fast von jedem Fleischstücke und jeder Speckseite gelangen aber kleine Abschnitte in den Küchenabfall und von da meist in den Magen unseres besten Abfallverwerter, des Schweines. Schweinepestausbürche sind die Folge, bei denen naturgemäß kaum einmal der Zusammenhang mit ausländischem Schweinefleisch einwandfrei ermittelt werden wird.

Die Bekämpfung der bazillären, nekrotisierenden Darmentzündung gestaltet sich demgegenüber einfach. Die gesunden Tiere sind von den kranken zu trennen. Schwerer

Kranke sind zu töten. Die Stallverhältnisse sind zu regeln, im Sommer ist viel Auslauf zu gewähren, für gute Ernährung ist zu sorgen. Je nach dem Ausfall der bakteriologischen Untersuchung, die zumeist, um den jeweils in Frage kommenden Bakterienstamm zu ermitteln, notwendig ist, kann dann eine Serumbehandlung der gefunden und leicht erkrankten Tiere gegen den ermittelten Bazillus stattfinden, meist also eine solche mit Paratyphuserum oder Coliserum. Die Serumbehandlung kann unterstützt werden durch Einspritzung eines Vakzins oder Bakterienextraktes, die aus dem rein gezüchteten Bakterienstamme genommen werden können, soweit sie nicht schon vorrätig waren. Fehlt ein Serum für den ermittelten Keim, dann käme allein die Behandlung der gefundenen Ferkel mit einem Bakterienpräparat in Frage, evtl. auch die Behandlung der leichtkranken Tiere mit Blut eines gefundenen Schweines des betreffenden Bestandes. Arzneiliche Behandlung kann mit kleinen Dosen Methylenblau oder Argentum colloidal ver sucht werden.

Die Bekämpfung der enzootischen Bronchitis und Pneumonie ist in erster Linie auf die Beseitigung etwaiger Zucht- und Haltungsfehler gerichtet, gegen übermäßige Verfeinerung der Tiere, dauernden Stallaufenthalt, gegen kalte, feuchte, nasse, lichtarme Ställe sind die nötigen Maßregeln anzuordnen. Bei Enzootien mit schwererem Verlaufe, wie sie besonders unter den Jungschweinen vorkommen, ist auf die Beteiligung bestimmter Bakterien zu schließen und durch Einföndung des entsprechenden Materials an eins unserer Institute feststellen zu lassen, ob und welches Bakterium dabei eine Rolle spielt und dann sinngemäß mit einem gegen das ermittelte Bakterium vorhandenen Serum und mit den entsprechenden Bakterienpräparaten wie bereits bei der bazillären, nekrotisierenden Darmentzündung geschildert zu verfahren. Eine arzneiliche Behandlung mit Methylenblau oder Lebertran soll in manchen Fällen günstig gewirkt haben. Der Diagnose Schweinefeuche (akute Bipolarisbazillose) die in jedem Falle durch den Nachweis der bipolaren Bakterien und durch den durch die Bestandsbeobachtung herbeizuführenden Ausschluß der Schweinepest gesichert sein muß, läßt neben der Trennung der gefunden und kranken Tiere eine Behandlung derselben mit Schweinefeucheserum zweckmäßig erscheinen. Schwer kranke Tiere sind zu töten. Die veterinärpolizeiliche Bekämpfung geschieht nach den bestehenden Bestimmungen. In Zukunft ist die Einreihung der Schweinefeuche (akute Bipolarisbazillose) unter die Wild- und Rinderfeuche angezeigt. Die Zeit ist da, daß unter das Kapitel Schweinefeuche = Schweinepest endgültig ein Strich gezogen wird.

Bei der Behandlung der fibrinösen Serösen- und Gelenkentzündung haben sich neben der Sorge für einen warmen Aufenthaltsraum Salizylpräparate — Acid. salicylic., Natr. salicyl. Aspirin usw. in Dosen von 1 bis 2 Gramm täglich mehrmals öfter von gutem Erfolge gezeigt.

Vergleicht man die eben geschilderten Krankheiten des Schweines mit denen unserer anderen Haustiere, so finden wir nur bei den Wiederkäuern, insbesondere dem Rinde die entsprechenden Parallelkrankheiten. Schwein und Rind müssen danach in ihrem Eiweißaufbau nahe Verwandte sein.

Der Schweinefeuche (akute Bipolarisbazillose) entspricht die Wild- und Rinderfeuche durchaus. Beide Krankheiten sind Septikämien, bei denen die Lungen, Magen- und Dünndarm, Rachen und Unterhaut am Kopf und Hals besondere entzündliche Lokalisationen aufweisen können. Die enzootische Bronchitis und Pneumonie entspricht durchaus wieder den enzootischen Lungenentzündungen der Kälber auch in ihren z. T. ursächlich mitbeteiligten Bakterien, bipolaren Bakterien, Streptokokken, Pyogenes- und Paratyphusbazillen. Die fibrinöse Serösen- und Gelenkentzündung kommt auch bei Kälbern vor, meist allerdings bei ihnen wohl nach Nabelinfektionen. Die bazilläre, nekrotisierende Darmentzündung in ihrer schwereren Form, dem Ferkelpatyphus hat ihr Analogon beim Kalbe im Kälberpatyphus, wobei

naturngemäß der rinderpezifische Paratyphusbazillus, d. h. der Gärtnerbazillus als Ursache in Frage kommt, die leichtere Form findet sich in den entsprechenden Ruhrformen beim Kalbe wieder. Endlich die Schweinepest entspricht wieder durchaus der Rinderpest. Beide Erkrankungen stellen Septikämien mit der Neigung zur Miterkrankung der Schleimhäute und der Haut dar. Der Rinderpest fehlt zwar im allgemeinen ein ausgesprochen hämorrhagischer Charakter wie der Schweinepest, sie gleicht ihr aber wieder in der Neigung zu Nekrosen an der Schleimhaut des Verdauungskanales. Wenn weiter das Schweinepestvirus sicher nicht für das Rind und umgekehrt das Rinderpestvirus auch kaum für das Schwein pathogen ist, so stimmen doch die beiden Erreger in ihren sonstigen Eigenschaften fast völlig überein. Beide Erreger gehören zu einer Gruppe ultramikroskopischer, filtrierbarer Krankheitserreger, deren Einreihung in eine uns bekannte Gruppe von Lebewesen bislang nicht gelungen ist.

Hin und her wogte der Meinungsstreit, ob ihnen als Ursache Protozoen oder Bakterien zugrunde lägen. Der wahren Natur dieser Krankheitserreger hat uns aber, trotzdem diese Theorien bei der Schweinepest schon 2½ Jahrzehnte bestehen, bislang keine derselben auch nur einen Schritt näher gebracht und man kann von ihnen nur sagen, daß sie sich so gut wie totgelaufen haben.

Spricht schon die Winzigkeit dieser Virusarten in allen Lebensformen gegen die Zugehörigkeiten zu den bekannten Krankheitserregergruppen — nach den auf Grund ihrer Passage feinstporiger Filter angestellten Berechnungen ist ihre Größe auf nur ein Hundertstel bis ein Tausendstel der Größe der kleinsten Bakterien geschätzt worden — so schließt sie das Unvermögen bei diesen Krankheiten, ihre Erreger durch eine der üblichen, biologischen Eiweißdifferenzierungsverfahren nachzuweisen so gut wie aus. So war es bekanntlich bei der Schweinepest, mit der wir uns hier allein beschäftigen, nicht möglich, trotzdem das Virus in großen Mengen im Blute vorkommt, mit Hilfe des Präzipitationsverfahrens oder der Komplementbindung einen Nachweis eines fremden Eiweißes zu führen. Dazu waren alle Züchtungsversuche des Virus außerhalb des Tierkörpers des Schweines ohne Erfolg. Entgegengesetzt dem Verhalten speziell von Bakterien bei der Einverleibung an empfindliche Tiere war weiter auch das Verhalten des filtrierbaren Virus der Schweinepest. Reaktionslos verschwinden kleinere und größere Dosen des Schweinepestvirus von der Injektionsstelle, um bald im Blute zu erscheinen, während der Körper sich ganz regelmäßig durch örtliche Entzündung gegen das Eindringen eingespritzter bakterieller Infektionserreger wehrt. Gegen das eingespritzte Schweinepestvirus verhält sich das Schwein zunächst nicht anders, als wenn ihm arteigenes Eiweiß eingespritzt worden wäre. Ein ähnliches Verhalten, wie der Schweinekörper dem Schweinepestvirus gegenüber zeigt, finden wir nur im Verhalten des Tierkörpers den bösartigen Geschwülsten gegenüber. Nun ist es naturgemäß bei der Schweinepest völlig ausgeschlossen, daß Körperzellen selbst wie bei den Geschwülsten aus dem normalen Zellengefüge ausgeschieden, in hemmungslose Wucherung geraten und Krankheitsursache geworden sind. Nach den neueren Zellforschungen baut sich jedoch die Zelle ähnlich wie das Tier aus einem Zellenstaate mit weitgehendster Differenzierung und Arbeitsteilung der einzelnen Zellartgruppen aus zahlreichen differenten, besondere Funktionen erfüllenden Gruppen von Eiweißkörperchen auf, die der Zelle gegenüber ähnlich selbständig sind, wie die Zelle dem Tierkörper gegenüber. Es erscheint danach möglich, daß eine äußere schädigende Einwirkung unbelebter Natur solche Eiweißkörperchen der Zelle aus dem normalen Verbandsverbande ausscheiden, in hemmungslose Wucherungen geraten, d. h. parasitär werden läßt. Diese selbständig gewordenen Aufbausteine der Zelle zerstören dann zunächst ihre Ursprungszelle, um danach die gleiche Zellart weiter anzu-

greifen und unter ständiger Vermehrung auch aufzulösen. Dabei wäre auch ein weiterer Befall genetisch nahestehender Zellen denkbar. Als Eiweißkörpergruppen, in denen eine solche hemmungslose Wucherung eintreten könnte, kämen vor allem die Eiweißkörperchengruppen in Frage, die der Träger der Vererbung des Wachstums und des Zellaufbaues sind, nicht die eigentlich spezifisch funktionellen.

Daß die Annahme, das Schweinepestvirus sei entstanden durch Auscheiden und hemmungslose Wucherung bestimmter Eiweißkörperchen aus dem normalen Verbands der Eiweißaufbausteine der Zelle keine bloße Utopie, sondern eine Wahrscheinlichkeit ist, geht aus den Forschungen über das d'Herelle'sche Phänomen hervor. Bei diesem Phänomen läßt sich bekanntlich eine Seuche, bedingt durch ein filtrierbares Virus in allen ihren Phasen im Reagenzglas studieren. Die von der Seuche befallenen Individuen sind zwar nur Bakterien, im übrigen stimmt aber sonst alles wesentliche mit den durch die ultramikroskopischen, filtrierbaren Virusformen bei unseren Tieren erzeugten Seuchen geradezu wunderbar überein. Das d'Herelle'sche Phänomen besteht bekanntlich darin, daß in einer frischen, im besten Wachstum begriffenen, bereits diffus getrübbten Bouillonkultur evtl. auch einer solchen auf festem Nährboden eines Bakterienstammes auf Zusatz bestimmter Filtrate auf einmal Wachstumsstillstand und Aufhellung durch Auflösung der gewachsenen Bakterien eintritt. Für gewisse Darmbakterien erwiesen sich besonders Filtrate aus Fäzes recht wirksam lösend. Dabei wurden die Filtrate durch Passage feinstporiger Filter gewonnen. Filtrate aus solchen aufgelösten Bouillonkulturen nun in geringen Mengen getrübbten Bouillonkulturen deselben Stammes oder auch anderer Stämme derselben Bakterienart zugesetzt, hatten erneut Aufhellung und Bakterienauflösung zur Folge. Durch viele Generationen ließ sich sodann immer neu durch ein aus einer vorhergehenden Bouillonkultur gewonnenes Filtrat die Seuche auf neue Bouillonkulturen fortpflanzen. Es ließ sich auch durch Behandlung von Tieren mit den Filtraten ein Serum gewinnen, daß beim Hinzufügen zu einer getrübbten Bouillonkultur, der ein wirksames, lösendes Filtrat hinzugesetzt wurde, die Lysis verhinderte. d'Herelle nahm nun, von der alten Ansicht befangen, daß diese ultramikroskopischen, filtrierbaren Krankheitsreger Bakterien oder Protozoen seien, zunächst auch an, daß das filtrierbare Virus, das diese Bakterienkrankheit erzeugte, ein kleinstes Bakterium oder Protozoon sei. Diese Theorie ist aber so gut wie erledigt anzusehen, da dieses Virus (Bakterienfresser = Bakterophagen) auch spontan auftrat in Kulturen, die von vornherein sicher frei von ihm waren oder auch durch Erhitzung ufw. künstlich frei von ihm gemacht worden waren. Es trat insbesondere dann auf, wenn die Bakterien gewissen schädigenden Einwirkungen ausgesetzt wurden. Die herrschend gewordene Ansicht, betreffs dieser Bakteriophagen geht deshalb auch dahin, daß es fermentartige Körper sind, die sich nicht wie die bisher bekannten Fermente unter Aufbruch einer gewissen Menge des Stoffes, zu dem sie Affinität haben, selbst verbrauchen, sondern solche, die aus diesem Stoffe sich selbst außerordentlich vermehren und dabei denselben auflösen. Eine ähnliche Theorie erblickt in den Bakterophagen kleinste Bakterien splitter aus dem generativ tätigen Teile des Bakteriums, die für ihr Fortleben die geeignetsten Nährstoffe in der Bakterienart, von der sie abstammen, finden und durch den Befall des betreffenden Bakteriums dieses auflösen und dabei neue Bakterien splitter mit gleichen Eigenschaften freimachen.

Kehren wir nun von der durch ein ultramikroskopisches, filtrierbares Virus bedingten Bakterienseuche, zur Schweinepest zurück, dann steigt die Frage auf, aus welcher Zellform könnte das filtrierbare Virus der Schweinepest primär wohl entstanden sein. Da würde dann ohne weiteres klar sein, daß dies nur Blutzellen sein könnten, denn im Blute tritt das Virus zuerst auf und das Blut zeigt die primären Ver-

änderungen. Da am meisten von den Blutzellen die weißen Blutkörperchen betroffen erscheinen, so würden auch diese als die primären Erzeuger des filtrierbaren Virus zu gelten haben. Ein sekundärer Befall der roten Blutkörperchen, die genetisch ja den weißen Blutkörperchen nahestehen, wäre denkbar. Aus einem vorzugsweisen Befall der weißen Blutkörperchen und deren Erkrankung würde sich die ganz besondere Neigung zu Sekundärinfektionen bei der Schweinepest, da der Körper von seiner Schutzgarde gegen Infektionen befreit ist, erklären. Diese neue Theorie über die Natur des Schweinepestregers würde auch erklären können, was die bisherigen Theorien nicht konnten, nämlich:

1. warum das Schweinepestvirus so innig an das Schweineeiweiß gebunden erscheint, daß es durch kein biologisches Eiweißdifferenzierungsverfahren von ihm zu trennen ist;

2. warum alle Einwirkungen, die das Schweineeiweiß angreifen und zerstören wie Erhitzung bis zur Eiweißgerinnung, Fäulnis bis zur Eiweißauflösung, Zusatz von Chemikalien bis zur Zertrümmerung des Schweineeiweißes selbst auch das Schweinepestvirus zerstören;

3. warum andererseits alle Einwirkungen, die auch das Schweineeiweiß erhalten bzw. wenig angreifen, wie Eintrocknung, Gefrieren, Konservierung durch Einsalzen, oder andere, das Eiweiß schonende Chemikalien auch das Schweinepestvirus erhalten;

4. warum das Schweinepestvirus im Schweinekörper seine besten Lebensbedingungen findet und nur für das Schwein pathogen ist;

5. warum bislang sämtliche Versuche irgend eine Form des Schweinepestregers mikroskopisch nachzuweisen fehlgeschlugen. Gelingt es schon nicht beispielsweise eine Krebszelle aus einem Gemische entsprechender normaler Epithelzellen sicher herauszufinden, so muß es noch viel schwieriger erscheinen, aus dem Gemische der unendlich zahlreichen, in den Körperzellen und Körperflüssigkeiten vorkommenden, feinsten Eiweißkörperchen des Tierkörpers eine selbständig und parasitär gewordene Sorte herauszufinden;

6. warum alle künstlichen Zuchtversuche des Schweinepestvirus außerhalb des Schweinekörpers bislang ergebnislos ausfielen. Solche Eiweißaufbausteine der Zelle des Tierkörpers sind bislang überhaupt noch nicht künstlich kultiviert worden und

7. warum durch eine medikamentelle Behandlung eine spezifische Beeinflussung der Schweinepest bislang nicht zu erzielen war. Die nahe Verwandtschaft eines solchen Schweinepestregers zu den normalen Eiweißkörperchen des Schweines muß ihn schwer für sich angreifbar erscheinen lassen.

Nach dieser Theorie würde nun allerdings ein spontanes Entstehen der Schweinepest möglich sein. Dabei wäre es aber keineswegs nötig, daß ein solches spontanes Entstehen der Seuche in Deutschland vorgekommen ist oder vorkommt. Wenn es überhaupt vorkommen würde, so wäre dies sicher nur ganz ausnahmsweise einmal der Fall, denn in der Regel läßt sich bei unseren Schweinepestausschüben die Einschleppung durch infizierte Schweine oder Zwischenträger, insbesondere Futter, dem Abfallteile geschlachteter Schweine beigemischt sind, nachweisen und andererseits führen die üblichen allgemeinen Gesundheitschädigungen, denen Schweine bei uns ausgesetzt werden, sicher nicht zu Schweinepestausschüben. Man muß dann schon annehmen, daß solche Eiweißkörperchen erst dann einmal parasitär werden können, wenn sie in den Schnittpunkt verschiedener Schädigungen geraten, wie beispielsweise einer erbten Anlage und klimatischen Einflüssen in Verbindung mit langdauernden Einwirkungen von Ernährungs- und anderen Schädlichkeiten. Klar ist ja auch dabei ohne weiteres, daß im hochstehenden Zellenstaate des Tierkörpers im Laufe einer jahrmillionenlangen Entwicklung ganz andere Sicherungsmaßregeln gegen das Auftreten einer solchen die Existenz der Art gefährdenden Seuche, geboren aus Körperzellen der

betreffenden Tierart selbst, eingebaut sein müssen, als bei den uns bislang bekannten niedrigsten Lebewesen unserer Erde, den Bakterien, bei denen das Auftreten eines solchen Krankheitserregers aus dem Bakterienleibe heraus, anscheinend ein häufiges Vorkommen darstellt.

Die Möglichkeit eines spontanen Entstehens der Schweinepest würde mithin in keiner Weise die Wirksamkeit unserer veterinärpolizeilichen Bekämpfung der Schweinepest in Frage stellen und die Gefahr der fortgesetzten Einschleppung der Schweinepest aus dem Auslande ist jedenfalls sogar weit höher einzuschätzen als die, die von einer bloß möglicherweise und zutreffendenfalls gewiß nur recht selten spontanen Entstehung dieser Seuche droht.

Anatomie und Physiologie.

Baum: Über die „Reißmannsche“ oder „Polizeidrüse“. (Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene, Bd. 38, S. 1.)

Auf eine Anfrage über das Wurzelgebiet der genannten Lymphdrüse, mit der offenbar die Lgl. eparterialis (Fig. 438 in Baums Lymphgefäßsystems des Rindes) gemeint ist, führt der Autor aus, daß sie nur Lymphgefäße von der rechten Lunge und zwar nur vom Spitzenlappen und Herzlappen der rechten Lunge erhält. Rein theoretisch würde deshalb die Befschlagnahme nur des zweigeteilten rechten Spitzenlappens und des rechten Herzlappens bei der Fleischschau genügen. Indessen sollte bei der Geringwertigkeit des Objektes besser die ganze rechte Lunge beanstandet werden. Vgl. übrigens die Vorschrift in § 35,4 Abf. 2 B.B.A. Edelmann.

Bauer, K. H.: Über homoioplastische Transplantation von Epidermis bei eineiigen Zwillingen. (Sitzungsbericht der Mediz. Gesellschaft Göttingen in Münch. Mediz. Wochenschr. 1927, Nr. 50, S. 2203.)

Infolge des Verschiedenseins der Individuen mißlingen homoioplastische Transplantationen von Epidermis beim Menschen ausnahmslos, auch bei solchen gleicher Blutgruppe oder bei Verwandten. Es handelt sich eben hier um eine erbgenetische Verschiedenheit. Offenbar eineiige Zwillinge zeigten Syndaktylie zwischen Klein- und Ringfinger. Bei der operativen Beseitigung des Fehlers wurde der Kleinfingerdefekt mit Haut vom Ringfinger verlorgt. Der Defekt am Ringfinger (fingerlang und 1,2 bis 1,5 cm breit) wurde beim einen Zwilling durch Autoplastik, beim anderen durch homoioplastische Überpflanzung eines Epidermislappens beseitigt. In beiden Fällen beste Heilung. Es handelte sich also um eine erbkonstitutionelle Identität, d. h. um wirklich eineiige Zwillinge; nur deshalb gelang die Homoioplastik. A. Hink.

Innere Medizin und Chirurgie.

Grabherr, A.: Die operative Heilung des Zungen-spielens beim Rinde. (W. t. Mschr. 1927, XIV. Jhg., S. 395.)

Bei dem Zungenspielen handelt es sich lediglich um eine Angewohnheit bzw. Untugend des betr. Tieres. Die Behandlung besteht darin, daß mittels einer besonderen Zange ein Metallring durch das Frenulum der Zunge gezogen wird. Die Durchstichstelle soll etwa 2,5 ccm vom oralen Rand und in der unteren Hälfte des Zungenbändchens liegen. Die Wirkung scheint darin zu bestehen, daß die Tiere beim starken Auschlagen der Zunge Schmerz empfinden und deshalb diese Gewohnheit lieber unterlassen. Heilung erfolgte bis zu 80 Prozent der behandelten Fälle. Berge.

Molnar, A.: Die Behandlung hartnäckiger Obstipationen des Coecums beim Pferde durch Punktion des Coecums, nebst Beiträgen zur Verwendung des Septojod (Sol. Jodi Prege) und des Bariomyls. (W. t. Mschr. 1927, XIV. Jahrg., S. 385.)

Verf. behandelte Fälle von Blinddarmobstipation, die jeglicher Medikation per os und subkutan Widerstand leisteten

Wenn wir damit unseren Ausflug in das Land des filterbaren, ultramikroskopischen Krankheitserregers der Schweinepest beenden wollen, so müssen wir uns dabei vergegenwärtigen, daß wir dabei von einem Neulande erst bloße Umrisse gesehen haben. Die im Gange befindlichen Forschungen auf diesem Gebiete stellen aber schon jetzt umwälzende Ergebnisse über die Natur vieler Krankheitserreger und über erste Formen belebten Eiweißes weit jenseits noch vom niedrigsten Protozoon und dem einfachsten Bakterium überhaupt in Aussicht.

Berichtigung. In Nr. 11, Seite 198, linke Spalte, 4. Reihe von oben muß es heißen: Die Hauptmenge der Fälle des Ferkelkümmerens hat sicher nichts mit der Schweinepest zu tun.

mit direkten Injektionen des Therapeutikums in den Blinddarm. Der Blinddarm wurde mit einer entsprechenden Hohnadel punktiert und durch Infusion das entsprechende Arzneimittel in denselben gebracht. Es wurden auf die Weise im ganzen 9 Pferde behandelt. In sieben Fällen wurde vollkommen Entleerung des Coecums erzielt. Von diesen wurden vier Fälle dauernd geheilt, einmal mußte zur Notchlachtung wegen diffuser Peritonitis infolge der Punktion geschritten werden. In zwei Fällen versagte die Punktion gänzlich. Da es sich bei den behandelten Pferden durchweg um ältere Pferde handelte (12—18 Jahre), glaubt Verfasser das Ergebnis der Punktion als günstig ansehen zu müssen. Berge.

Kißmaier, A.: Über konservative Furunkelbehandlung mittels Ichthyol. (M. m. W. 1927, S. 282.)

Verf. ist Anhänger der konservativen Behandlungsmethode des vorliegenden Leidens. Als sehr wirksames Mittel benutzt er reines Ichthyol wegen seiner günstigen chemischen und physikalischen Eigenschaften. Das Verfahren ist folgendes: Der Furunkel und seine nächste Umgebung wird zunächst mit Alkohol oder Jodtinktur gereinigt. Nach Trocknen der Haut wird das Ichthyol direkt auf den Furunkel und 2 cm um ihn herum aufgepinselt. Man legt sodann eine dünne Watteschicht auf das Ichthyol, das von der Watte schnell angefaßt wird und mit dieser vollkommen eintrocknet. Bei starker Eiterung aus einem perforierten Furunkel wird der Verband zweimal täglich, sonst nur einmal gewechselt, wobei das Ichthyol mit lauwarmem Wasser abgewaschen wird. Dabei entleert man den Eiter durch vorsichtiges seitliches Drücken. Noch nicht „reife“ Furunkel werden bei dieser Behandlung meist vollkommen resorbiert. Die perforierten entleeren sich und trocknen ein. Noch nicht aufgebrochene Furunkel bersten unter dem Einfluß des Mittels schnell und der Eiter entleert sich leicht. Carl.

Grumach, L.: Über Suggestivbehandlung von Warzen. (M. m. W. 1927, S. 1093.)

Die vorliegende Behandlungsmethode wurde von verschiedenen Autoren, u. a. von Krafft-Ebing für ausfallsvoll bezeichnet. In vorliegendem Falle handelte es sich um 18 Patienten verschiedenen Geschlechts und Alters. Es wurde eine larvierte Suggestion ausgeübt in der Weise, daß die Kranken in Abständen von 8—14 Tagen wiederholt je ½—1 ccm physiologische Kochsalzlösung intramuskulär in einen Oberarm injiziert erhielten mit der Angabe, sie bekämen ein neues, vortrefflich wirksames Warzenmittel, das die Warzen ohne Ätzung zum Verschwinden bringe. Die Patienten wurden ferner dahin belehrt, daß schon während der Injektion ein leichtes Brennen oder ein Gefühl der Schwere in dem von Warzen bedeckten Körperteil zu bemerken, und daß dies als Zeichen einer guten Wirkung des Mittels anzufassen sei. Die Warzen würden allmählich abflecken bis zum vollständigen Verschwinden.

Was die Erfolge der vorliegenden Therapie betrifft, so bemerkt Verf., daß mitunter nur eine sehr langsame Wirkung eintrat, daß aber ein eigentlicher Mißerfolg nur zweimal zu verzeichnen war. Die ersten Anzeichen einer Rück-

bildung der Warzen traten meist in der zweiten und dritten Woche, ausnahmsweise auch schon nach 5—8 Tagen auf. Manchmal war schon nach vier Wochen, auch in Fällen von zahlreicher, derber Warzenbildung, der Erfolg ein vollständiger, mitunter konnte aber erst nach vier Monaten die Behandlung als erfolgreich angesehen werden. Verf. weist an mehreren Beispielen nach, daß es sich in den beschriebenen Fällen tatsächlich um eine suggestive Wirkung gehandelt hat.

Carl.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Neseni, R.: Über die Veränderungen der Milch bei Maul- und Klauenfeuche, insbesondere des Fett- und Chlorgehaltes. (Schlachthoflaborat. B. Kamnitz.) (Prag. Arch. f. Tiermed. und vergleich. Pathol. 1927, Jahrg. 7, Tl. A, Heft 1, S. 33—36.)

In den Untersuchungen wurden in der ersten Versuchsreihe fünf gesunde Kühe mit Riemser Hochimmunserum simultan geimpft. In der zweiten Reihe unterzog der Verf. fünf andere Tiere, von denen die einen nur fieberhafte, die anderen klinische Merkmale der Maul- und Klauenfeuche zeigten, einer Parenchymatol-M.-K.-Atarost-Behandlung. Die Unterschiede der auf Fett- und Chlorgehalt untersuchten Milch waren so, daß die Milch der ersten Tiergruppe nur wenig Fett und Chlor enthielt, die Milch der zweiten Gruppe an Fett und Chlor sehr bereichert, wie auch an Fett sehr viel ärmer sein konnte. Der günstige Einfluß des Riemser Hochimmunserums auf den Krankheitsverlauf wird aus der kaum merklichen Abweichung des Fett- und Chlorgehaltes von dem Normalgehalt der Milch ersichtlich. Bei der Parenchymatolbehandlung haben sich erhebliche Schwankungen in dieser Hinsicht gezeigt, so daß die unzulängliche therapeutische Auswirkung dieses Präparates bei der Maul- und Klauenfeuche daraus erkennbar wird.

H.

Alberca-Lorente, R.: Le processus régénératif au niveau des lésions cutanées et linguales provoquées chez le cobaye par le virus aphteux. (Laborat. de M. Lévaditi, inst. Pasteur, Paris.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. 1927, Bd. 97, Nr. 20, S. 131—133.)

Sind Meerfischweinen mit dem Aphthen-Virus durchfeucht, so erneuert sich das Epithel der äußeren Sohlenhaut, an der die künstliche Infektion bzw. die allgemeine Blasenbildung stattgefunden hat, in der gleichen Weise wie das aphthöse Schleimhautepithel der Zunge. Die frische Epithelbildung geht aus dem Stratum germinativum hervor, solange es — wie gewöhnlich — ungeschädigt ist. Fällt aber das Stratum germinativum durch wenn auch selten vorkommende Schädigung für die Epithelregeneration aus, so schiebt sich diese dann vielmehr von der Randzone der Erosion unter lebhafter Teilung der Zellen zischen dichten Strängen von Epithelfibrillen zentralwärts vor, während Leukozytenansammlungen von der Cutis reforbiert werden. Beobachtet ist ferner die häufige Umformung der Fibroblasten in elastische Fasern und auch die Tatsache, daß nach Abstoßung des defekten Epithels neues auf der Zunge schneller als auf der Sohlenhaut zur Entwicklung kommt.

H.

Lévaditi, C., I. Galloway et S. Nicolau: Essais de culture du virus aphteux dans le cerveau de lapin. (Versuche zur Züchtung des Maul- und Klauenfeuche-Virus im Kaninchenhirn.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. 1927, Bd. 96, Nr. 6, S. 395—397.)

Zur Ermittlung neurotroper Eigenschaften des Maul- und Klauenfeuche-Virus gelangte das Erregermaterial bei Meerfischweinen und Kaninchen intracerebral zur Applikation, ohne damit einheitliche Ergebnisse zu erzielen. Gelegentlich soll das Virus im Kaninchenhirn kultiviert werden können. Während alle übrigen Versuche negativ ausfielen, zeigte ein Kaninchen am vierten Tage nach der Infektion Temperaturerhöhung und 14 Tage p. i. Lähmungerscheinungen und Koma. Die Autoren konnten aus dem bak-

terienfreien Hirn dieses Tieres das Virus auf die Sohlenfläche vom Meerfischweinen übertragen und durch zwei Kaninchenpassagen bringen.

H.

Neseni, R.: Die Behandlung der Maul- und Klauenfeuche. (Arch. f. Tiermed. und vergl. Pathol. 1927, 7. Jahrg. Tl. B. H. 7, S. 204/213.)

Impfungen mit Riemser Hochimmunserum hatten außerordentlich feuchtemildernden Erfolg. Durch die Simultanimpfung wurde vielfach die Immunisierung der Tiere nur auf dem Wege leichtfieberhafter Durchfeuchtung ohne auffallende Krankheitserscheinungen erzielt. Parallel zu dieser Bekämpfungsmethode benutzte der Verf. das Aphthoclarin und Pferdenormalserum. Das Aphthoclarin setzt sich aus Acridin, Hefe, Wismut, Menthophenol und Digitalis zusammen. In der vorgeschriebenen Menge nur unilokular verimpft, hatte es lokale Schwellungen und Abszedierungen als sehr nachteilig im Gefolge, während das therapeutische Ergebnis nicht wesentlich zurückstand. Wie in Preußen und Württemberg wird eine planmäßige Bekämpfung mit Hochimmunserum angeraten. Dabei müßten die Impfkosten auf staatliche Fonds übernommen werden.

H.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Müller, Friedr.: Endokrine Funktionen. (Münch. med. Wochenschr. 1927, S. 1500.)

In der psychiatrischen Klinik der Johns Hopkins Universität machte Wang interessante Versuche über endokrine Funktionen bei Mäusen und Ratten. Die Tiere wurden abgefordert in Käfigen gehalten und hinsichtlich der Nahrungsaufnahme genau kontrolliert. Ein Ausgang führte bei jedem Käfig in ein kleines Tretrad, ähnlich wie man es an Eichhörnchenkäfigen findet. Jedes Tier konnte also seinem Bewegungstrieb folgen. Die Umdrehungszahl beim Tretrad wurde durch einen einfachen Apparat ermittelt. Die weiblichen Tiere zeigten nur in bestimmten Perioden während einiger Tage eine vermehrte Nahrungsaufnahme und auffallend starken Bewegungsdrang. Diese zeitweisen Steigerungen der Lebensenergie fielen zusammen mit jenen der ovariellen Tätigkeit (Östrischer Zyklus); sie fehlten vor der geschlechtlichen Reife, während der Trächtigkeit und auch nach der Entfernung der Eierstöcke. Hiernach war erwiesen, daß die periodische Tätigkeit der Ovarien die Lebensenergie der Tiere wesentlich beeinflusst und daß von fraglichen Drüsen aus, wahrscheinlich auf dem Blutwege, die Auslösung eines verstärkten Hungergefühls bewirkt wird.

A. Hink.

Korkhaus, R.: Beitrag zur Ovariectomie der Kuh. (Aus der Ambulatorischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule Berlin. — Direktor: Prof. Dr. F. Schöttler.) (Arch. f. wiss. Tierheilkunde 1926, 55, S. 176.)

Verf. beschreibt eingehend die älteren und neueren Operationsmethoden bei der Ovariectomie der Kuh an Hand von 82 Fällen. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden werden geschildert. Am sichersten geschieht die Eröffnung der Bauchhöhle mittels Scheidenfaltenbildung und Scherenschnitt. Mit Hilfe des vom Verf. modifizierten Ekraseur-Emaskulators Blank werden die Eierstöcke innerhalb der Scheide abgetragen.

Geiger.

Toman, R.: Über den Mechanismus der Euterinsufflation. (Aus dem Veterinär-physiologischen Laboratorium der Universität zu Utrecht (Holland.) (Archiv für wiss. Tierheilkunde 1926, 55, S. 206.)

Bei der Luftinsufflation ergeben sich Blut- und Harnzuckeränderungen, ferner Schwankungen der Alkalireserve im ph. des Blutes. Eine Erhöhung des Blutdruckes konnte nicht nachgewiesen werden, auch keine reflektorischen Veränderungen des Volumens der Leber, Niere und Milz. Beim trächtigen Uterus konnten durch die Insufflation kräftigere Kontraktionen ausgelöst werden. Endlich ergab sich als Folge der Insufflation ein Einfluß auf den

Sauerstoffverbrauch. Über die feineren Vorgänge beim Mechanismus der Luftinsufflation kann man sich jedoch noch keine lückenlose Vorstellung machen. Geiger.

Döhrmann, H.: **Untersuchungen über den Einfluß der Jahreszeit auf das quantitative und qualitative Befruchtungsergebnis der Stuten.** (Zeitschr. f. Tierzüchtung u. Züchtungsbiologie 1927, Bd. IX, S. 455 folg.)

Die günstigste Zeit für die Bedeckung der Stuten liegt zwischen 1. März und Ende Juni. Die weniger lebensfähigen, mangelhaft veranlagten Fohlen entstammen meist der zweiten Deckperiode. Diese sog. „späten“ Fohlen stammen in der Mehrzahl von Stuten mit gestörter Geschlechts- und Fortpflanzungsfunktion, die in der Regel nur mit Mühe zur Empfängnis gebracht wurden. Das Erzwingen der Befruchtung ist hier verwerflich. Um sicher zu sein, daß die Zeugungsorgane wieder in richtigem Zustande sind, sollen die Stuten, besonders wenn Tierärzte nicht regelmäßig behufs Untersuchung zugezogen werden, nicht etwa am neunten Tage, sondern erst 3—4 Wochen nach dem Abfohlen (zweite Rofse) wieder gedeckt werden. Dem erblich bedingten, möglichst tadellosen Fortpflanzungsvermögen soll bei der Zuchtwahl mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. A. Hink.

Melnyk Oleksa: **Das Wildrind Osteuropas und seine Domestikation.** (Zeitschr. f. Tierzüchtung und Züchtungsbiologie 1927, Bd. IX, Heft 3, S. 475 folg.)

Das ukrainische graue Steppenrind ist nach Schädelkunden aus dem Neolithikum der unmittelbare Nachkomme des Ur (flavisch „Tur“), dessen frühere weite Verbreitung in Tälern und Wäldern, aber auch in der Steppe aus zahlreichen ukrainischen und russischen Volksliedern und Sprichwörtern, alten Eigen- und Ortsnamen sich ergibt. Vor 300 Jahren wurde das letzte Urtier (*bos primigenius* Boj.) bei Warfchau erlegt. Die letzte Ur-Kuh wurde nach Wrzesniowski 1627 getötet. In Trypolje bei Kiew gefundene Tierfiguren aus dem Neolithikum beweisen, daß das Ur-Rind damals schon länger gezähmt war, denn die Kultur war in jener Zeit schon ziemlich hoch entwickelt. Der osteuropäische Ur zeigte eine ziemlich große Variabilität in der Schädelbildung. A. Hink.

Geflügelkrankheiten.

Becker: **Was muß der praktische Tierarzt von der Geflügelzucht wissen.** (T. R. 1927, S. 746.)

Der Aufschwung, den unsere Geflügelzucht während der letzten Jahre genommen hat und weiter nehmen muß, um die deutsche Wirtschaft von der Geflügelzucht des Auslandes unabhängig zu machen, stellt auch an den Tierarzt die Forderung, sich eingehender mit all den hierher gehörigen Fragen zu befassen. Hierhin gehören die Kenntnisse der Geflügelrassen, ihre Haltung und Pflege, die künstliche Brut und Aufzucht der Küken, einschl. der wichtigsten Brutmaschinen-Systeme und deren Bedienung mit direkter Sauerstoffzufuhr, Aufzuchtvorrichtungen, künstliche Glucken, Fallennester, die verschiedenen Hühnerställe und ihre hygienischen Einrichtungen. Futterzusammensetzungen für kleine Küken und Legehennen usw. Unbedingt aber muß der in der Praxis stehende Tierarzt mit den wichtigsten Krankheiten des Hausgeflügels vertraut sein. Von größter Bedeutung sind die Infektions- und Invasionskrankheiten und die Kenntnis der mit den verschiedenen Schutz- und Heilimpfungen erzielten neuzeitlichen Erfolge. Auch operative Eingriffe sind sehr häufig erforderlich: erfrorene Kämme, Kehllappen und Zehen, Knochenbrüche der Läufe und Flügel, Gichtknoten an den Zehengelenken, Kropfoperationen. Hautkrankheiten verschiedener Art erfordern wegen ihrer Hartnäckigkeit oft energische Behandlung. Federkrankheiten sind sehr zahlreich. Hautparasiten kommen oft in großer Menge vor, auch Entoparasiten sind nicht selten. K. H. Meyer.

Riedmüller, L. und E. Lutz: **Die Bekämpfung der Kokzidienruhr des Junggeflügels.** (Schweiz. Arch. f. Tierheilkunde 1928, 70, S. 22.)

Die Kreolintherapie ist unzureichend; Verfütterung saurer Milch fördert zwar die Gewichtszunahme, aber die Verschleppung der Seuche durch Dauerausscheidung hebt den Vorteil auf. Somit tut man am besten, die Brut zu befeuchten, wenn man die Küken nicht einzeln aufziehen kann. Nachher werden die Ställe sorgfältig gereinigt und desinfiziert. Wenn man die Tiere isoliert aufziehen kann, so schaltet man zunächst die schwerkranken Tiere aus, hält die übrigen in großen, leicht zu reinigenden, warmen Räumen und reinigt zeitweise das Futtergefäß (heiße Lauge, Kreolin) und den Boden. Auch sollen genügend viele Futternapfen aufgestellt werden. Diätetisch empfehlen sich folgende Maßnahmen: Kein Wasser, viel saure Vollmilch oder Buttermilch, Körner- oder Mischfutter und viel Grünfutter. Nach Beach soll man Trockenmagermilch, mit Weizenkleie, Maismehl und Gerstenhefe als Mischfutter verabreichen. Unter den geschilderten Maßnahmen haben sich die Tiere sehr gut entwickelt und sind chronische Fälle von Kokzidienruhr nicht mehr vorgekommen. H. G.

Andres, J.: **Zwei Eileiter beim Huhn (*Gallus domesticus* Briss).** (Untersuchungen an 9 Fällen.) (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1928, 70, S. 1.)

Bei ca. 2000 Sektionen hat Snyder in neun Fällen Rudimente des rechtsseitigen Genitalapparates gefunden, die von Verf. näher untersucht wurden. Das Rudiment lag rechterseits in der Bauchhöhle, war mit der Kloake verbunden. Es zeigte immer ein flimmertragendes, einschichtiges oder zylindrisches Epithel. Je weniger der Charakter als Rudiment vorhanden war, um so mehr näherte sich der Bau dem normalen linksseitigen Eileiter. In zwei Fällen war der Eileiterrest nach vorne offen, in den übrigen verwachsen, wodurch eine Zystenbildung ausgelöst wurde. Die Lumina des Eileiters und der Kloake standen nie in Verbindung, so daß eine Funktion ausgeschlossen ist. — Demnach kann die Synechia tubae cranialis fehlen, die Atresia tubae caudalis kommt stets vor; im vorliegenden Material waren dadurch sieben der rudimentären Eileiter Zysten. H. G.

Runnels, R. A. and Thorp, F.: **„The Effect of Fowl Typhoid Vaccination upon the macroscopic Agglutination Test for Salmonella pullorum Infection.“** (J. of Am. Vet. Med. Ass. 1927, 72, S. 90.)

Die Stärke der Agglutininbildung nach Injektion von Geflügeltyphusvakzine ist beim Geflügel von individuellen Momenten abhängig. Die gebildeten Agglutinine sind nicht beständig. Nach einmaliger Vakzination kehrt der Titer frühestens nach neun, später nach 36 Tagen zur Norm zurück. Eine zweite Vakzination bedingt eine kräftigere und länger vorhaltende Agglutininbildung. Die Agglutinine verschwinden dann erst frühestens 23, spätestens 65 Tage nach der Vakzination. Es wird auf die Gefahr der Verwechslung solcher vakzinierter Tiere mit Pullorum-krankem Geflügel aufmerksam gemacht. Wetzel.

Engel: **Über die Bedeutung der Hühnerhaltung für Deutschland und über die Notwendigkeit einer größeren Anteilnahme der Tierärzte an derselben.** (Tierärztl. Rundschau 1927, S. 647.)

Deutschland besaß im Jahre 1926 rund 60 Millionen Hennen, deren Eierertrag auf rund 5 Milliarden Stück im Werte von 500 Millionen Mark zu schätzen ist. Der Wert der Schlachttiere betrug 300 Millionen Mark. Dem steht aber noch eine Einfuhr von fast 2½ Milliarden Stück im Werte von 250 Millionen Mark und eine solche der übrigen Geflügelerzeugnisse im gleichen Werte gegenüber. Dieses Minus von 2½ Milliarden können wir nur decken, wenn wir bei gleichem Hennenbestande den Jahresertrag je Henne um 50 Prozent steigern. Dieses ist bei neuzeitlicher Hal-

tung und rationeller Fütterung möglich, aber auch nur dann kann der Landwirt einen Reinertrag erwarten, welchen die bisherige für Deutschland gültige Durchschnittsleistung von 80 Eiern je Henne nicht abwirft. Es gibt heute in Deutschland neben den landwirtschaftlichen Betrieben Zuchthöfe von mehreren Hundert oder Tausend Hennen. Diese Massenansammlung birgt natürlich die Gefahr allmählich einschleichender oder plötzlich auftretender Seuchen in sich, häufig begünstigt durch Unzweckmäßigkeit der Stallungen und Haltung. Und vor allem in der Beratung über die Fragen der allgemeinen Hygiene liegt der Wert der tierärztlichen Hilfe, die der Hühnerzüchter und -halter erwartet. In der Frage der Bekämpfung der Hühnerkrankheiten muß sich der Tierarzt davon frei machen, in seiner Beurteilung von dem Wert des Einzeltieres auszugehen, sondern daran denken, daß ein großer Teil des Bestandes und somit die Existenz des Unternehmers bedroht ist. K. H. Meyer.

Standesangelegenheiten.

Vereinigung der Tierärztl. Hochschulen und Fakultäten Deutschlands.

1. Sitzung am 10. März 1928 in Berlin.

Auf Veranlassung von Zwick-Gießen wurde eine Vereinigung der Tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten Deutschlands gegründet, um die gemeinsamen Interessen der betr. Bildungsanstalten zu besprechen und eventuellen Anträgen auf Grund der Beschlüsse der Vereinigung bei den zuständigen Behörden mehr Nachdruck zu verleihen.

Anwesend: Zwick, Stang, Klimmer, Trautmann, Danckwortt, Neumann, Pfeiffer, Zietzschmann, Lund, Oppermann, Mießner, Jodlbauer.

Es wird folgende Satzung aufgestellt:

Satzung.

Zum Vorort für die Dauer von 5 Jahren wird Gießen und zum Vorsitzenden Prof. Dr. Zwick gewählt. Der stellvertretende Vorsitzende, zugleich auch Verbandschriftleiter, wird gleichfalls vom Vorort gestellt. Der Vorort wechselt in alphabetischer Reihenfolge zwischen den Fakultäten und Hochschulen.

Zur Änderung der Satzung ist $\frac{2}{3}$ Stimmenmehrheit erforderlich; bei einfachen Abstimmungen entscheidet einfache Stimmenmehrheit. Jede Fakultät erhält 2 Stimmen überwiesen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

Anträge sind schriftlich und begründet im Namen der Fakultäten und Hochschulen zu stellen. Der Vorsitzende hat die Anträge innerhalb von 4 Wochen den Fakultäten und Hochschulen mitzuteilen. Die Fakultäten und Hochschulen haben zu den Anträgen innerhalb von vier Wochen Stellung zu nehmen. Für den Fall, daß kein Aufschub in der Stellungnahme erbeten wurde, bleiben Äußerungen zu den Anträgen, die nicht innerhalb von 4 Wochen dem Vorsitzenden überreicht werden, unberücksichtigt.

In der Zeit vom 1. März bis 1. Mai und 1. August bis 1. November finden keine Sitzungen statt. Die Wahl des Tagungsortes bleibt dem Vorsitzenden überlassen. Mindestens alle 2 Jahre einmal hat eine Sitzung stattzufinden.

Zwei Monate vor jeder Tagung sind die Tagesordnung der Sitzung sowie die Anträge nebst Begründungen durch den Vorsitzenden den Fakultäten und Hochschulen bekannt zu geben.

Die Vertreter der Fakultäten und Hochschulen werden für 5 Jahre gewählt; die Namen der Delegierten sind dem Vorsitzenden mitzuteilen. Die Vertreter der Fakultäten und Hochschulen erhalten in Beziehung auf die in der Tagesordnung stehenden Punkte unbedingte Vollmacht. An den Beratungen können andere Vertreter der Fakultäten und Hochschulen teilnehmen, die aber nicht stimmberechtigt sind. Über neue während der Sitzung gestellte Anträge darf nur bei Einstimmigkeit Beschluß gefaßt werden.

Das Protokoll hat die gefaßten Anträge und die Abstimmungsergebnisse zu enthalten. Anträge und Abstimmungsergebnisse sind nach jedem Antrage zu verlesen und zu genehmigen. Die Protokolle sind in der Zahl der Ordinarien aufzustellen.

Die Vereinigung zahlt keine Reisekosten. Jede Fakultät und Hochschule zahlt für jeden stimmberechtigten Angehörigen der engeren Fakul-

tät einen Mindestjahresbeitrag von Mk. 10,— (Zehn Mark) an den Vorsitzenden. Notwendig gewordene außerordentliche Unkosten sind auf die Fakultäten und Hochschulen umzulegen.

Studienordnung.

Zur Beratung der revidierten Studienordnung soll je ein Vertreter für die verschiedenen Fächer aufgestellt werden, der mit den Fachvertretern in Verbindung tritt. Die Wünsche der einzelnen Fachvertreter werden durch die gewählten Vertreter den Fakultäten und Hochschulen mitgeteilt. Die Angelegenheit ist spätestens Ende Sommer zu erledigen.

Zu Fachvertretern werden gewählt: Physiologie: Paechtner-München; Anatomie: Zietzschmann-Hannover; Botanik: Giesenhagen oder sein Vertreter, München; Zoologie: Demoll-München; Physik: Precht-Hannover; Chemie: Danckwortt-Hannover; Innere Medizin und gerichtliche Tierheilkunde: Schmidt-Leipzig; Bakteriologie, Hygiene, Seuchenlehre, Veterinärpolizei: Mießner-Hannover; Chirurgie: Pfeiffer-Gießen; Geburtshilfe und ambulatorische Klinik: Schöttler-Berlin; Tierzucht, Fütterungslehre und Befruchtungslehre: Stang-Berlin; Fleischhygiene und animalische Nahrungsmittelkunde: Eber-Leipzig; Pathologische Anatomie: Olt-Gießen; Arzneimittellehre: Jodlbauer-München.

In die Prüfungsordnung sollen die Leibesübungen einschl. Reiten und Fahren aufgenommen werden (§ 8 der Prüfungsordnung).

Jeder Studierende der Veterinärmedizin hat den Nachweis zu erbringen, daß er sich mindestens 3 Monate in einem landwirtschaftlichen Betriebe praktisch betätigt hat.

Der Vorsitzende wird beauftragt, bei der Notgemeinschaft dahingehend vorstellig zu werden, daß das Fach Veterinärmedizin aus dem Fach Land- und Forstwirtschaft herausgenommen und als Sonderfach behandelt wird.

Der Vorsitzende wird ersucht, sich mit den tierärztlichen Institutsdirektoren an deutschen Hochschulen in Verbindung zu setzen, die aufgefordert werden sollen, einen Verband zwecks Aufnahme in die Vereinigung zu gründen.

Schon die erste Sitzung hat gezeigt, welche große Bedeutung derartig gemeinsame Beratungen in Zukunft haben werden. Man muß daher Kollegen Zwick nur Dank wissen, daß er die Anregung zu der Zusammenkunft gegeben hat. Mr.

Niederfachengruppe des Reichsverbandes prakt. Tierärzte e. V.

22. Hauptversammlung, am 11. Februar 1928, im Ärztehaus zu Hannover. 1. Der Vorf. Dr. Machens erwähnt, daß das Jahr 1927 für den Stand ein Kampfsjahr gewesen ist, denn sowohl der Kampf um die Zusammenfassung des D.V.R. als auch der um das Tierärztekammergesetz haben die Gemüter unseres Standes manchmal sehr heftig bewegt. Er streift die Angriffe der Gewerbetreibenden und des Landbundes gegen die im Herbst erfolgte Erhöhung der Fleischbefaugebühren und die Angriffe der Apotheker gegen das altangestammte tierärztliche Dispensierrecht. Hierauf geht der Vorf. auf die Gruppengeschäftsstelle ein und die Veränderungen im Mitgliederbestande. Mitgliederzahl von 330 am 1. I. 1927 auf 358 am 31. XII. 1927 gestiegen. Ausgeschieden Dr. Arcularius. Einstimmig kommt zum Ausdruck, daß es dem gesamten tierärztlichen Praktikerstande wirtschaftlich noch nie so schlecht ergangen ist, wie in der jetzigen Zeit. Ein großer Teil der praktischen Tierärzte hat ein Einkommen, das nicht ausreicht, um den täglichen Lebensunterhalt zu bestreiten. Es ist daher unbedingt notwendig, vor der Ergreifung des tierärztlichen Studiums zu warnen, um die Überfüllung einzudämmen. Leider ist es dem Vorstande nicht gelungen, einen Rundfunkvortrag auf der deutschen Welle durch einen Praktiker zu erzielen. Aus demselben Grunde fordert die Versammlung die Erhaltung des tierärztlichen Dispensierrechts und die Ablehnung der unberechtigten Forderungen der Apotheker, da es ihnen wirtschaftlich viel besser geht als den meisten Tierärzten. Mit Bedauern nimmt die Versammlung von einer Entschließung des schleswig-holsteinischen Landbundes, die anscheinend aus Unkenntnis gefaßt worden ist, Kenntnis. Nochmals werden alle Kollegen gebeten, in landwirtschaftlichen Kreisen dahin aufklärend zu wirken, daß, wenn den Tierärzten das Dispensierrecht genommen werden sollte, die Landwirtschaft hierunter am meisten zu leiden haben wird. — Im Anschluß hieran warnt der Vorstand die Kollegen von sich aus, über Angelegenheiten, die die Gesamtheit der Praktiker betreffen, mit politischen Parteien zu verhandeln, da hierdurch leicht die Arbeit unserer

Zentral-Geschäftsstelle durchkreuzt werden kann. In diesen wie überhaupt in allen Fällen ist es dringend nötig, sich in allen Fragen an die Zentralstelle, die von Kollegen Friese, Hannover, Sallstraße 95, verwaltet wird, zu wenden und keine Sonderaktionen, seien sie noch so gut gemeint, zu unternehmen. Die Versammlung kann es nicht verstehen, daß nur zwei Gruppen des R.P.T. sich für die Beibehaltung der Rotlauffeststellung für die praktischen Tierärzte ausgesprochen haben, denn die Praktiker geben hierdurch etwas auf, was sie in jahrelanger zäher Arbeit erreicht haben. 2. Der Vorf. erstattet dann den Bericht über die von ihm verwaltete Gruppenkasse. Er muß feststellen, daß eine Reihe Kollegen im letzten Jahre keine Beiträge eingefandt haben, was zum großen Teil wohl auf die Notlage derselben zurückzuführen ist. An Einnahmen und Ausgaben ergeben sich folgende Zahlen:

A) Einnahmen

Vortrag aus dem Vorjahre	Mk. 4,03
Einnahmen aus Beiträgen	Mk. 12 033,75
Zinsen	Mk. 77,62
Gefamteinnahme	Mk. 12 115,40

B) Ausgaben

Ausgaben der Geschäftsstelle (Verw.-Ausg.)	Mk. 5 030,05
Reisekosten der Delegierten usw.	Mk. 1 991,20
Beiträge für R.P.T., Landesgruppe Preußen,	
Tierärztliche Mitteilungen und D.V.R.	Mk. 5 025,50
	Mk. 12 046,75

3. Der Beitrag wird für das Jahr 1928 wie im Vorjahre für die preußischen Mitglieder wiederum auf Mk. 40.—, für die nichtpreußischen Mitglieder auf Mk. 34.— festgesetzt. Dieser Beitrag kann auf Wunsch der einzelnen Mitglieder in vierteljährlichen oder halbjährlichen Raten bezahlt werden. 4. Die Vorstandswahl ergibt einstimmige Wiederwahl: Vorf. Dr. Machens-Elze; stellvertr. Vorf. Hartwig-Gehrden; Schriftf. Dr. Heinemann-Parensen; Beisitzer Dr. Ehlers-Braunschweig und Dr. Wewer-Kloppenburg. Neu aufgenommen werden Dr. Jaritz in Stade, Dr. Vollmer in Steinkirchen und Dr. Äffert in Ebergötzen. 5. Bei der 150jähr. Jubelfeier der Tierärztlichen Hochschule soll die Niederfachengruppe des R.P.T. offiziell vertreten sein. Die Kollegen werden gebeten, sich an der Feier recht zahlreich zu beteiligen und nach ihren Kräften zu der Sammlung des Tierärzteverbandes Niederfachern für die Hochschule beizutragen. 6. Der Vorf. berichtet kurz über die Sitzung des D.V.R. im Dezember und über den in dieser Versammlung erreichten und wiederhergestellten Standesfrieden. Die Versammlung spricht den Vertretern der Gruppe die volle Zustimmung zu ihrem Verhalten während der ganzen Konfliktzeit aus. 7. Der Ehrenvorf. Friese berichtet dann über das Tierärztekammergesetz und seine Behandlung im Landtage und in den Ausschüssen. Er hofft, daß in wenigen Wochen das Gesetz angenommen wird und damit den Tierärzten in Preußen etwas gegeben wird, wie sie es dringend benötigen. 8. Der Vorf. berichtet dann über die von ihm geleitete Buchführungsstelle und über die von ihr jetzt ins Werk gesetzten Wohlfahrts Einrichtungen. Er fordert die Kollegen auf, sich stark zu beteiligen. Verschiedene in der Versammlung anwesende Kollegen, die der Buchführungsstelle angehören, berichten von den guten Erfahrungen, die sie mit der Buchführungsstelle gemacht haben und unterstützen den Vorf. in seiner Werbung. 9. Der Vorf. berichtet zunächst über neue Richtlinien für die Einkommensteuerveranlagung. Hierauf wird aus der Versammlung heraus in eine Besprechung über die amtlich angeordneten Impfungen gegen Maul- und Klauenfeuche eingetreten. Die Versammlung beschließt nach erfolgter Aussprache bei den Regierungen zu beantragen, daß bei den amtlich angeordneten Impfungen gegen Maul- und Klauenfeuche die praktischen Tierärzte berücksichtigt werden, wie dies bereits in dem Regierungsbezirk Hannover geschieht. Es werden dann noch verschiedene Klagen von geringerer Bedeutung vorgebracht, für deren Abstellung der Vorf. sich einzusetzen verspricht.

Elze, Parensen, Anfang März 1928.

Dr. Machens, Vorf. Dr. Heinemann, Schriftf.

Verein der Schlachthof- und Gemeindetierärzte Westfalens.

Generalversammlung am 3. März 1928 zu Dortmund. Anwesend 52 Mitglieder und zwei Gäste. Neu aufgenommen: Dr. Deermann-Coesfeld i. W. Rogge-Bochum erstattete den Kassenbericht. Die Einnahme betrug 1796,25 RM. Die Ausgabe betrug 1571,40 RM., so

daß ein Bestand von 224,85 RM. zu verzeichnen ist. Büscher, Wanne-Eickel, erstattet Bericht über die Tagung des D.V.R. und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß derselbe dank des Entgegenkommens aller Beteiligten, nicht zuletzt auch dank der geschickten Leitung von Prof. Dr. Stang zum Segen unseres Standes bestehen bleibe. Rogge erläutert „Die Befoldungsreform“, insbesondere auch die Richtlinien der Städte und Gemeinden im Rheinisch-Westf. Industriegebiet, soweit sie für uns Tierärzte in Frage kommen. Danach werden die Stadttierärzte gleich den anderen Vollakademikern in Befoldungsgruppe 2b eingereiht. Schlachthofdirektoren mittlerer Städte und Stadtobertierärzte erhalten eine ruhegehaltfähige Zulage von 6—1200 RM. Schlachthofdirektoren größerer Städte kommen nach 2a und die Schlachthofdirektoren der Großstädte je nach Art und Bedeutung ihres Aufgabenkreises in 1d bis 1a. Es wurde sowohl vom Vortragenden als auch aus der Versammlung heraus anerkannt, daß sowohl der Reichsbund der höheren Beamten als auch der Verband der Kommunalbeamten Preußens (Komba) sich für unsere Sache aufs Wärmste eingesetzt haben, so daß der vom Vorstand eingefandte Befoldungsvorschlag im Wesentlichen angenommen sei. „Lebensmittelkontrolle mit Demonstrationen“. Zunächst besprach Stadtobertierarzt G. Meyer-Dortmund, eingehend das neue Lebensmittelgesetz vom 5. Juli 1927 und gab der Hoffnung Ausdruck, daß den Tierärzten, insbesondere auch den Stadttierärzten, auf Grund der zu erwartenden Ausführungsbestimmungen ein ihrer Stellung entsprechendes Arbeitsgebiet nicht vorenthalten würde. Im Anschluß an diesen Vortrag brachte Max Mayer, Leiter des Veterinäruntersuchungsamtes, einige praktische Beispiele über Verfälschungen von Hackfleisch mit Sehnen, Herzmuskulatur und Lunge, Verfälschung von Schweinemett mit Gehirn, Verfälschung von Zungenwurst mit anderweitigem Magerfleisch, ferner Schmutzproben aus Aufschnittmaschinen und erläuterte hierbei den makroskopischen und mikroskopischen Nachweis dieser Verfälschungen anhand von zahlreichen epi- und mikroskopischen Projektionen. „Neuerungen im Schlachthofbetrieb“ besprach Eckardt-Dortmund eine moderne Büro- und Kasseneinrichtung, wie sie im Dortmunder Schlachthof eingerichtet ist, unter Vorführung zahlreicher Lichtbilder. Zum Schluß zeigte der Vortragende noch einige Bilder von neuen Viehwagen (Toledo, Garvens, Alesko, Tacho). Ein Antrag auf Namensänderung des Vereins wurde vorläufig abgelehnt.

Eckardt, Schriftf.

Die Tätigkeit der Kammer der deutschen Studentenschaft der Tierärztlichen Hochschule in Wien.*)

Alle deutschsprachigen Hörer der Hochschule sind Mitglieder der deutschen Studentenschaft. Die Beiträge werden von der Quästur erhoben. Die deutsche Studentenschaft ist gleich anderen Studentenschaften aufgebaut und besitzt für den vom Professorenkollegium anerkannter Vertreterkörper die Kammer mit ihren einzelnen Ämtern. Die Mandatszahl in der Kammer ist auf zwölf festgelegt, davon gehören acht zur deutschvölkischen Gruppe und vier zur deutschkatholischen Gruppe. Eine besondere Tätigkeit hat die Kammer in der Studienangleichung für die Fachschaften des Deutschen Reiches entfaltet. Es ist gelungen, eine Studienangleichung an die veterinärmedizinische Fachschaft der deutschen Studentenschaft in die Wege zu leiten. Zwischen Professorenschaft und Studentenschaft besteht das denkbar günstigste Verhältnis. Seitens der Hochschule ist ein großes Zimmer mit vollkommenem Inventar zur Verfügung gestellt worden. Die Kammer beteiligte sich an allen studentischen Veranstaltungen und hielt am 29. Februar 1928 die ordentliche Vollversammlung ab, an der auch der gesamte Führerausschuß der Akademischen Legion (das ist ein Wehrverband, der im verflossenen Sommersemester die deutsche Studentenschaft aller Wiener Hochschulen in seinen Reihen gesammelt hatte) teilnahm, um den Grundstein zur Aufstellung einer eigenen Hundertschaft an der Tierärztlichen Hochschule zu legen. Nach einem Vortrag von Universitätsprofessor Czermak hat sich die Akademische Legion als notwendig erwiesen, um die Ruhe und den Frieden auf akademischem Boden sicher zu stellen. Es wurde eine Hundertschaft der A.L. an der Tierärztlichen Hochschule aufgestellt. Das Amt der Leibesübungen und das Wirtschaftsamt haben eine besonders rege Tätigkeit entfaltet. Ebenso nahm sich die Kammer der Pflege kranker Studenten an. Am 15. März 1928 fanden die Neuwahlen statt mit 76 Prozent Wahlbeteiligung. Von 282 Stimmberechtigten wurden

*) Wegen Platzmangels im Auszug wiedergegeben. Die Schriftf.

214 gültige Stimmen abgegeben. Auf die deutschvölkische Liste entfielen neun Mandate: Bacher, W. Neubacher, Binlek, Stötzer, A. Neubacher, Miklau, Schuh, Oedelt, Pürschker; auf die deutschkatholische Liste drei Mandate: Batzenhofer, Vogel, Pittermann.

Josef Pittermann m. p.

Sepp Bacher m. p.

Vorl. der deutschen Studentenschaft der Tierärztl. Hochschule.

Fortbildungskursus für Tierärzte in Rostock.

Vom 10. bis 12. März fand in Rostock der III. Fortbildungskursus für Tierärzte statt, der gemeinsam vom Landestierseuchenamt und vom deutschen Veterinärrat veranstaltet worden war und an dem 75 Tierärzte aus Mecklenburg, Pommern und Hannover teilnahmen. Prof. Dr. Katz-Rostock, Direktor des physiologischen Instituts der Universität, behandelte in einem allgemeinen Vortrage die Probleme der Tierpsychologie und erläuterte im besonderen die Versuche mit dem klugen Hans, mit den Elberfelder Pferden, die Versuche Köhlers an anthropoiden Affen (Intelligenzprüfungen) sowie im psychologischen Institut ausgeführten Versuche an Hühnern über Begabungs- und Charakterunterschiede. Manche Tiere sind dem Menschen in gewissen Fähigkeiten überlegen, die Sprache und das begriffliche Denken ist und bleibt das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Tier. Prof. Dr. Götze-Hannover besprach die sporadischen und infektiösen Euterkrankheiten des Rindes. Bei der Bekämpfung der Streptokokkenmastitis müssen die hygienischen Maßnahmen an erster Stelle stehen; Impfungen mit stallspezifischen Erregern versprechen in manchen Fällen Erfolg; für die Chemotherapie ist Infusion von 2prozentiger Yatrenlösung (1—4 Liter je Euterviertel) sehr geeignet, Rivanol wegen der öfters auftretenden Schwellungen jedoch weniger zu empfehlen; bei der akuten Mastitis ist die intraparenchymatöse Behandlung mit Selectan angezeigt. Prof. Dr. Reinhardt-Leipzig besprach die Anwendung einiger neuer Arzneimittel (Baryomyl, Arekolin als Antitankum, Odylen) und behandelte in einem weiteren Vortrag die Aufzuchtkrankheiten des Geflügels (Ernährungsstörungen, Eileitererkrankungen, Kükenruhr). Landesveterinär Jörn-Schwerin sprach über Veterinärgesetzgebung und Veterinärverwaltung unter besonderer Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung in Mecklenburg, Prof. Dr. Poppe-Rostock über die Differentialdiagnose der Infektionskrankheiten des Schweines sowie über die Impfung gegen Schweinepest (Vorführung des Eystruper Schweinepestfilms) und Obertierarzt Dr. Schmidt vom Landestierseuchenamt über Rotlaufimpfung und Rotlaufentschädigung und die hierbei im letzten Jahre in Mecklenburg-Schwerin gemachten Erfahrungen. Prof. Dr. Götze führte verschiedene Operationen am Rinde vor (Fremdkörperoperation, Anlegen einer Panfistel, Epiduralnarkose, Klauenamputation). Mehrere Filme aus der Geburtshilfe und Bujatrik wurden vorgeführt sowie praktische Übungen in der Untersuchung und Behandlung der Sterilität des Rindes von Dr. Schulz vom Landestierseuchenamt abgehalten.

Verschiedene Mitteilungen.

25jährige Jubelfeier des Vereins beamteter Tierärzte Preußens.

Der Verein der beamteten Tierärzte Preußens wurde am 14. Dezember 1900 in Berlin gegründet. Die am 24. März d. Js. stattfindende Vollversammlung ist die 25. — Einmal mit Rücksicht auf die schwierigen Zeitverhältnisse des Jahres 1925, dann aber auch um die Feier mit der 20jährigen Präsidentschaft seines Vorsitzenden verbinden zu können, ist die 25jährige Jubelfeier auf heute verschoben.

Die Ursache zur Gründung des Vereins bildeten die sehr im argen liegenden ranglichen und gehaltlichen Verhältnisse der Kreistierärzte und das Fehlen der Altersversorgung. Das Arbeitsgebiet der Kreistierärzte hatte sich in den vorausgegangenen Jahren ganz erheblich erweitert, die veterinärpolizeilichen Entscheidungen wurden von immer größerer Tragweite und mit ihnen stieg die Verantwortlichkeit. Die dienstliche Inanspruchnahme vermehrte sich und die Privatpraxis, die bis dahin das Hauptarbeitsgebiet gewesen war, trat immer mehr in den Hintergrund. Das Gehalt, das jährlich 600 Mk. betrug, ferner der geradezu vorfindliche Rang und das Fehlen der Altersversorgung standen dazu in gar keinem Verhältnis. Nach dieser Richtung hin grundlegende Verbesserungen zu erreichen war das Hauptziel des jungen Vereins, der von

Anfang an unter der Führung seines 1. Vorl. Thuncke-Calbe eine rege Tätigkeit entfaltete. Die erste Etappe auf diesem Wege bildete die Reform des Kreistierarztgesetzes vom 24. VI. 1904, das eine beachtliche Besserung der Gehälter, ferner die Altersversorgung brachte. Die zweite Etappe bildete die Kabinetsorder vom 25. VI. 1905, die den Kreistierarzt zwischen der fünften und sechsten Rangklasse einordnete. Da kurz vor diesen Aufbesserungen das Reichsfleischbeschaugesetz in Kraft trat (1903), das den Kreistierärzten abermals eine große Erweiterung des Arbeitsgebietes brachte und da ferner 1903 das Abiturienten-Examen als Vorbedingung für das tierärztliche Studium gefordert wurde, so herrschte in einem großen Teil der Kreistierärzte Unzufriedenheit über die Nichtverleihung des Ranges der Vollakademiker und über die Höhe der Gehälter. Die Unzufriedenheit führte schließlich zu einer erheblichen Störung der Harmonie zwischen dem Ministerium und dem Verein, insbesondere dem Vorstand.

Die Neuwahl 1906 brachte für alle Vorstandsämter ganz neue Männer. Erster Vorsitzender wurde Prof. Dr. Peter, damals Kreistierarzt in Angermünde. Unter seiner Führung gelang es, die abgerissenen Fäden mit dem Ministerium wieder aufzunehmen und das Einvernehmen wieder herzustellen. Als Peter 1908 Staatstierarzt von Hamburg wurde, und deshalb sein Amt niederlegen mußte, wurde Veterinär Rat Rust, bisher 2. Vorl., zum 1. Vorl. gewählt. Rust hat



dann bis heute ununterbrochen 20 Jahre lang den V. b. T. geführt und zwar in derselben Richtung, die Peter aufgenommen hatte. Das Jahr 1912 brachte das neue Reichs-Viehseuchengesetz, das den Veterinärbeamten abermals eine starke Vermehrung ihrer amtlichen Tätigkeit brachte. Einen besonders schönen Erfolg konnte der Verein buchen, als durch Königliche Kabinetsorder vom 1. Februar 1913 die Fachdezenten zu Regierungs- und Veterinärärzten mit dem Rang der Räte 4. Klasse ernannt und sämtliche Kreistierärzte Räte der 5. Rangklasse wurden. Das bedeutete die Einreihung der Veterinärbeamten unter die Vollakademiker. Unter braudendem Beifall der Mitglieder verkündigte bei der Generalversammlung des Jahres 1913 Geheimrat Dr. Hesse, Kommissar des Ministers, die betreffende Kabinetsorder; die Sitzung gestaltete sich zu der erhebensten und denkwürdigsten, die der Verein jemals abgehalten hat.

Während des Krieges war mehr als die Hälfte der Kreistierärzte zum Heeresdienst einberufen, die Vereinstätigkeit ruhte infolgedessen fast ganz, bald nach Beendigung des Krieges wurde sie wieder in reger Weise aufgenommen.

Vornehmlich galt es jetzt, den immer schärfer hervortretenden Forderungen der Freiberufstierärzte auf Mitbeteiligung an der Veterinärpolizei, auf Vollbefolgung der Kreistierärzte ohne Rücksicht auf die staatlichen Interessen, entgegen zu treten. Im Jahre 1923 galt es jenem unüberlegten, vom R. p. T. ausgehenden und vom T.K.A. unternommenen Versuch auf Ernennung eines früheren Veterinäroffiziers zum Ministerialdirigenten abzuwehren. Glücklicherweise gelang es, diesen Versuch, der vielleicht manchen seiner Urheber jetzt wie ein böser Traum anmutet, zu vereiteln. Die damaligen heftigen Kämpfe führten zu einem vorübergehenden Austritt der Mitglieder des V. b. T. aus den

Kammern. Das Jahr 1924 brachte uns die eigene Veterinärabteilung im Ministerium mit einem Tierarzt an der Spitze und damit die Krönung aller Erfolge auf dem Gebiete der Entwicklung des Preuß. Veterinärwesens. Im Jahre 1921 trat der V. b. T. in der Erkenntnis, daß der Anschluß an eine Spitzenorganisation im heutigen demokratischen Staate unbedingt erforderlich ist, dem B. h. V. bei, dem er bis jetzt treu geblieben ist.

Zur Hebung der lebendigen Anteilnahme der Mitglieder im Vereinsleben wurde 1924 ein Arbeitsausschuß gebildet, bestehend aus je einem Mitglied jeder Provinz; dieser Arbeitsausschuß hat sich sehr bewährt und bis jetzt segensreich gewirkt. 1922 wurde der Verband der Staatstierärzte gegründet, dem der V. b. T. sich sogleich angeschlossen. Oberregierungsrat Dr. Rust bekleidet seit 1925 das Amt des Vorsitzenden in diesem Verbands.

Größter Anstrengungen bedurfte es, die in dem Gehaltsgesetz von 1921 den nicht voll beforderten Kreistierärzten noch fehlenden Auf-rückungsstellen nach Gruppe 11 zu erringen. In dauerndem Kampfe mit dem Finanzministerium ist es den tatkräftigen Bemühungen unseres Ministerialdirigenten Dr. Müssemer gelungen, bis zum Inkraft-treten der letzten Gehaltsreform eine ganz erhebliche Zahl Auf-rückungsstellen uns zu sichern. 1924 wurde die amtliche Bezeichnung Veterinärarzt statt Kreistierarzt eingeführt.

Trotz aller Kämpfe auf standespolitischem und wirtschaftlichem Ge-biete vernachlässigte der V. b. T. die Pflege der Wissenschaft nicht; in lärmlichen Generalversammlungen wurden die aktuellen Fragen der Veterinär- und Sanitätspolizei, der modernen Seuchenforschung usw. in Vorträgen, für die stets Spezialisten von Ruf gewonnen wurden, be-handelt. Heute an diesem Jubiläumstage steht der V. b. T. geschlossen denn je da; nicht weniger als 97 Prozent aller Preussischen Veterinär-beamten gehören ihm an. Der Veterinärbeamtenstand hat, wenn auch noch eine ganze Reihe berechtigter Wünsche und Forderungen unerfüllt sind, in den letzten 25 Jahren eine ausgezeichnete Fortentwicklung ge-nommen. Das Hauptverdienst hieran haben die leitenden Männer des Landwirtschaftsministeriums, doch auch der V. b. T. darf hieran einen guten Anteil für sich in Anspruch nehmen und von allen Mitgliedern, die dem V. b. T. jemals angehört haben, gebühren Oberregierungsrat Dr. Rust ganz besondere Verdienste; denn er hat in geschicktester und aufopferndster Weise den Verein durch die schwierigen Nachkriegsjahre sicher und erfolgreich hindurchgeführt. Dr. Pante-Lingen.

Prof. Dr. Richard Pfeiffer zum 70. Geburtstag.

Am 28. März 1928 feiert der Prof. der Hygiene und Emeritus der Breslauer Universität, Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. Richard Pfeiffer seinen 70. Geburtstag. Pfeiffer ist noch einer der letzten aus der alten Kochschen Ära. Wir verdanken ihm bahnbrechende Ar-beiten auf dem Gebiete der Bakteriologie und Immunitätsforschung (Pfeiffer'sches Phänomen), die Entdeckung bakteriologischer und bakteriolytischer Serumsubstanzen, vor allem sind seine Untersuchungen bei der Cholera und dem Typhus der Ausgangspunkt für die so be-deutende praktische Serodiagnostik gewesen. Die Einführung der Zwangsimpfung gegen Typhus war sein Werk. Ebenso hat er mit den Grund zur Proteinkörpertherapie dadurch gelegt, daß er zuerst eine er-höhte Resistenz gegen bakterielle Infektionen durch intraabdominale Einspritzung von sterilen Flüssigkeiten feststellen konnte. Allbekannt ist weiterhin die Entdeckung des Influenzabazillus durch Richard Pfeiffer. Neben der experimentellen Arbeit war Pfeiffer sehr stark literarisch tätig und viele wichtige Abhandlungen entstammen seiner Feder. Wir wünschen dem hervorragenden Gelehrten, der das Glück hat, den 70. Geburtstag in voller geistiger und körperlicher Frische zu erleben, daß es ihm vergönnt sei, diesen Tag noch recht oft in gleicher Rüstigkeit zu feiern. Mr.

Akademische Nachrichten.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Fröhner-Berlin wurde anlässlich seines 70. Geburtstages die Ehrendoktorwürde der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität München und Zürich sowie der Tierärztlichen Hochschule in Wien verliehen.

Universitätsprofessor Dr. Hermann Dexler, am Tierseuchen-institut der deutschen Universität in Prag, wurde wegen vieler hervor-ragender Verdienste auf dem Gebiete der Anatomie, Physiologie und Pathologie des Nervensystems und der Physiologie der Haustiere, das

Diplom eines Ehrendoktors der Tierärztlichen Hochschule in Wien über-reicht.

Veterinärarzt Angermann, vorm. Schlachthofdirektor in Dres-den, ist zum Ehrenmitgliede der II. Abt. des Sächs. Landesgesundheits-amtes und sein Nachfolger Dr. Schmidt zum ordentl. Mitgliede dieser Abt. ernannt worden.

Verlagsbuchhändler Max Schaper-Hannover, Ehrenbürger der Tierärztl. Hochschule Hannover.

Die Tierärztliche Hochschule Hannover hat den Verlagsbuchhändler Max Schaper-Hannover, anlässlich seines 60. Geburtstages wegen seiner langjährigen besonderen Verdienste um die Förderung der vete-rinärmedizinischen Literatur zum Ehrenbürger ernannt. Die Urkunde und die Ehrenbürger-Medaille wurden ihm persönlich durch den Rektor der Hochschule, der gleichzeitig die Glückwünsche des Professoren-Kol-legiums überbrachte, ausgehändigt.

10. Ball deutscher Veterinärmediziner in Wien.

Am 17. Februar 1928 fand in Wien der 10. Ball der deutschen Vete-rinärmediziner statt, der sehr gut besucht war und einen glänzenden Verlauf nahm. Unter den Ehrengästen waren erschienen an der Spitze Magnifizenz Keller von der Wiener Tierärztlichen Hochschule sowie die Rektoren der Universität, der Technischen Hochschule, der Kunst-akademie und der Hochschule für Bodenkultur. Ebenso waren Ver-treter der Ministerien und verschiedene Konsuln anwesend. Um das Zustandekommen des wohl gelungenen Festes hatten sich gemeinsam der Verein deutscher Veterinärmediziner und die Kammer der deutschen Studentenschaft, insbesondere Sepp Bacher und Josef Pitter-mann, verdient gemacht. Man hätte gewünscht, daß diesem Repräsen-tationsfeste der Tierärzteschaft seitens der Studenten der Tierärztlichen Hochschule, der Assistenten und praktischen Tierärzte durch regere Teil-nahme ein größeres Interesse entgegengebracht worden wäre.

Reichsverband der deutschen Gemeindetierärzte.

Die Hauptversammlung des Reichsverbandes wird voraussichtlich Mitte Oktober in Karlsruhe stattfinden. Dieser Zeitpunkt mußte in Rücksicht auf die Demonstrationsvorträge im Kältetechnischen In-stitut der Technischen Hochschule gewählt werden. Der vorbereitende Auschuß für die Tagung setzt sich zusammen aus Direktor Dr. Wag-ner-Karlsruhe, Obertierarzt Dr. Carl-Karlsruhe, Stadttierarzt Dr. Mayer-Karlsruhe, Stadttierarzt Dr. Göhler-Ettlingen.

Anmeldungen über Vorträge usw. bitten wir, dem Vorf. baldigst zuzuleiten. Die dem Reichsverband angeschlossenen Landesgruppen usw. werden gebeten, in ihren Frühjahrsversammlungen folgende Gegenstände zur Beratung zu stellen:

1. a) Veterinärpolizei auf den Schlacht- und Viehhöfen; b) Sammlung für eine Ehrengabe an die Tierärztliche Hochschule Hannover anläß-lich der Feier des 150jährigen Bestehens. Die gesammelten Beträge bitten wir an den Kassenwart des Reichs-Verbandes Dr. Brandt, Hannover, Weinstraße 9, abzuführen. c) Laut Statut muß in Karlsruhe die Neuwahl des Vorstandes stattfinden. Es wird um Vorschläge für diese Neuwahl gebeten, insbesondere wird eine Neuwahl des ersten Vorsitzenden in Frage kommen, da der jetzige Vorsitzende dringend um Ablösung ersucht. d) Aus Bedarfsgründen wird um baldmögliche Be-gleichung aller fälligen Beiträge ersucht. Es wird sich in Anbetracht der vielen Ausgaben, die dem R.D.G. erwachsen sind, nicht umgehen lassen, künftig den Jahresbeitrag von 3,— auf 4,— Mk. zu erhöhen.

2. Aus verschiedenen beim Vorsitzenden des R.D.G. eingelaufenen Anfragen ist ersichtlich, daß die Einstufung der Kollegen nicht überall in der gewünschten Weise erfolgt ist. Bezüglich der hierbei an den Vorsitzenden geäußerten Wünsche ist der § 13. der Statuten zu berück-sichtigen, der vorschreibt, daß die Mitglieder einer angeschlossenen Lan-desgruppe bei ihren Wünschen und Anträgen sich in allen Fällen stets zunächst an die Landesgruppe zu wenden haben. Wünscht diese die Regelung durch den R.D.G., dann sind mit einem entsprechenden An-trag auch alle Unterlagen einzufenden. Es wird den Landesgruppen das Beispiel der Gruppe Sachsen und der Provinzial-Gruppe Branden-burg als Muster empfohlen. Der Vorsitzende ist jederzeit gern bereit, nach Erfüllung dieser Bedingungen das Weitere in die Wege zu leiten. Im übrigen kann nur allen Kollegen die Organisation in den großen Beamtenverbänden empfohlen werden, in welcher Organisation, ist nach Ansicht des Vorsitzenden zunächst gleichgültig, Hauptsache ist, daß über-

haupt in einer der beiden (Komba, Bund höherer Beamten) die Mitgliedschaft erworben wird, auch muß Wert auf die Mitgliedschaft in der örtlichen Beamtenorganisation gelegt werden.

3. Dem Reichsverband sind vom D.V.R. 100 Berichte über die 19. und 20. Vollversammlung des D.V.R. zugestellt worden. Den Landesgruppen usw. wird anheim gegeben, die von ihnen gewünschten Exemplare bei Stadtveterinär Dr. Thomas-Meißen, anzufordern, der die Zufendung bewirken wird.

4. Der Reichsverband hat seine Austrittserklärung aus dem D.V.R. zurückgezogen.

5. Die Organisation der deutschen Gemeindetierärzte im R.D.G. ist so gut wie lückenlos bewirkt. Es fehlt nur noch Württemberg gänzlich und in Preußen steht noch die Bildung der Provinzialgruppe Sachsen aus. Der R.D.G. unterstützt warm den Aufruf des Kollegen Dr. Schulze-Afschersleben, und hofft bestimmt, daß die Schlachthofdirektoren der großen Städte mit gutem Beispiel vorangehen, die ihnen unterstellten Kollegen durch ihr persönliches Eintreten mitreißen und auch die anderen provinziellfächl. Gemeindetierärzte für die notwendige Standesorganisation gewinnen werden. Nicht ohne Absicht soll die nächste Hauptversammlung im Süden des Reiches abgehalten werden, wir rechnen da sicher auch auf die Anteilnahme der Württemberger und hoffen, daß wir uns in diesen Erwartungen nicht getäuscht haben.

Der Reichsverband der deutschen Gemeindetierärzte.

Dr. Hafemann, Vorf.

Dr. Thomas, Schriftf.

Tierärzteverein Stade-West (Unterwefer).

Sonnabend, den 31. März 1928, 16 Uhr, im Restaurant des Schlachthofes in Bremen. 1. Kassenbericht und Festsetzung des Beitrages für 1928. 2. Übernahme der Satzung des früheren Bez.-Ver. Stade auf den Tierärztlichen Verein Stade-West (Unterwefer). 3. Arzneimittelpberechnung (T. M. Nr. 9, S. 142). 4. Aussprache über die §§ 5 und 7 des preuß. Ausf.-Gesetzes bezw. seiner Ausf.-Bestimmungen. 6. Aussprache über den preuß. Erlass vom 18. Januar 1928 über Fleischbefchau und Lebensmittelkontrolle (B. T. W. Nr. 6/28). 6. Dr. Machens-Elze über Buchführungs- und Versicherungsstellen. — In Anbetracht der Wichtigkeit der Tagesordnung wird um möglichst vollzähliges Erscheinen aller Mitglieder dringend gebeten. Ferner sind alle Kollegen aus Bremen, Oldenburg und Umgebung als Gäste herzlich willkommen.

I. A.: Dr. Leyer, Schriftf.

Vorlesungen und Übungen bei der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig. S.-S. 1928.

Propädeutische Fächer. J. Richter: Einführung in das Studium der Veterinärmedizin 1-ft.; Debye: Experimentalphysik I (Mechanik, Akustik, Wärme) 5-ft.; Kämpf: Repetitorium der Physik für Veterinärmediziner 2-ft.; Le Blanc: Physikalisch-chem. Einführungskurs für Veterinärmediziner 4 oder 8-ft.; N. N.: Anorgan. Experimentalchemie 5-ft.; Chem. Übungen für Veterinärmediziner 6-ft.; Paal: Organische Experimentalchemie 5-ft.; Chem. Übungen für Veterinärmediziner 6-ft.; Ruhland: Allg. Botanik 5-ft.; Meisenheimer: Allgemeine Zool. 5-ft. Klin. Propädeutik, Latein und Griechisch für Anfänger, Einführung ins Englische, Angewandte Chemie und Pharmazie.

Anatomie. Baum: System. Anatomie d. Hausäugetiere (Harn- und Geschlechtsorgane, Organe mit innerer Sekretion, Gefäß- und Nervenlehre, Haut) 6-ft.; Angewandte Anatomie der Hausäugetiere 2-ft.; Anatomie der Hausvögel 1-ft.; Osteol. Übungen 4-ft.; Arbeiten für Fortgeschrittenere täglich; Schauder: Histologie der Haustiere, I. Teil (Zellen- und Gewebelehre) 2-ft.; Histologie der Haustiere, II. Teil (Mikrosk. Organologie) 2-ft.; Histologischer Kurfus, I. Teil (Mikrosk. Technik, Zellen- u. Gewebelehre) 3-ft.; Histol. Kurfus, II. Teil (Mikrosk. Organologie) 5-ft.; Anatomie der Sinnesorgane 1-ft.; Arbeiten für Fortgeschrittenere täglich.

Physiologie und physiol. Chemie. Scheunert: Physiologie der Hausäugetiere (Muskel- und Nervenphysiologie, Sinne) 5-ft.; Scheunert mit Krzywanek: Kolloquium über angewandte Physiologie 2-ft.; Krzywanek: Gehör, Geruch und Geschmack 1-ft.; Scheunert: Arbeiten für Fortgeschrittene täglich; Schenck: Physiol. Chemie I (Statistischer Teil) 2-ft.; Klin.-chem. Übungen 2-ft.; Arbeiten für Fortgeschrittene täglich.

Pathol. Anatomie. Allg. Path. Nieberle: Allg. Pathologie und allg. pathol. Anatomie 6-ft.; Spez. path. Anat. der Haustiere (II. Teil)

2-ft.; Path.-anat. Kurs. mit Anleitung zu Obduktionen (Sektionskurs) 4-ft.; Path.-anat. Demonstrationskurs. 2-ft.; Arbeiten für Fortgeschrittenere täglich; Cohrs: Ausgewählte Kapitel aus der Mißbildungslehre der Tiere 1-ft.

Pharmakologie und Pharmazie. Reinhardt: Angewandte Pharmakologie u. Toxikologie I 3-ft.; Arzneiverordnungslehre 1-ft.; Rezeptierkursus 1-ft.; Bohrisch: Allg. Pharmakognosie 1-ft.; Manicke: Die synthetischen Arzneimittel 1-ft.; Repetitorium der anorg. Chemie 1-ft.

Innere Medizin. J. Schmidt: Allg. Therapie 1-ft.; Spez. Path. und Therapie der Haustiere 3-ft.; Diagnostik und Propädeutik innerer Krankheiten 1-ft.; Bienenkunde (einschl. Bienenfeuchen) 1-ft.; Med. Tierklinik 6-ft.; Arbeiten für Fortgeschrittenere täglich.

Chirurgie. Röder: Allg. Chirurgie 2-ft.; Operations- und Instrumentenlehre 2-ft.; Huf- und Hufbeschlagskunde 2-ft.; Chirurg. Tierklinik 6-ft.; Übungen am Hufe 4-ft.; Berge: Physik. Diagnostik und Propädeutik chirurg. Krankheiten 1-ft.; Röder: Arbeiten für Fortgeschrittenere täglich.

Sonstige klin. Gebiete. Reinhardt: Poliklinik für kl. Haustiere 6-ft.; Ophthalmosk. Übungen 1-ft.; Arbeiten für Fortgeschrittenere täglich; J. Richter: Geburtshilfe 4-ft.; Geburtshilf. Kursus 1-ft.; Geburtshilf. Klinik 6-ft.; Weber: Buiatrik 1-ft.; Ambulat. Klinik 6-ft.; Arbeiten für Fortgeschrittenere täglich.

Animal. Nahrungsmittelkunde. Eber: Fleischbefchau 3-ft.; Fleischbefchaulergänge auf dem städt. Vieh- und Schlachthofe; Arbeiten für Fortgeschrittenere täglich; Klimmer: Milchhygiene 1-ft.; Milchkunterfuchungskurs. 2-ft.; Haupt: Milchkunde 1-ft.; Klimmer: Arbeiten für Fortgeschrittenere täglich.

Hygiene und Seuchenlehre. Klimmer: Allg. Seuchenlehre 2-ft.; Mikrobiologie 2-ft.; Mikrobiol. Kursus 5-ft.; Arbeiten für Fortgeschrittenere täglich; Haupt: Über pathogene Protozoen, Eumyzeten und ultraviole Virusarten 1-ft.; Strubell-Harkort: Die Tuberkulose als Volkskrankheit (für Studierende aller Fakultäten) 1-ft.; Eber: Arbeiten für Fortgeschrittenere täglich.

Staatsveterinärkunde. Weber: Kursus in der Praxis der polizeil. Tiermedizin täglich; Übungen im Anfertigen von Berichten und Gutachten 1-ft.

Tierzucht und Landwirtschaftslehre. J. Richter: Allg. Tierzucht 5-ft.; Tierzüchterische Lehrausflüge; Arbeiten für Fortgeschrittenere täglich; Müller-Lenhartz: Allg. Landwirtschaftslehre 2-ft.; Arbeiten für Fortgeschrittenere; Lehrausflüge in landwirtschaftl., gewerbl. und industrielle Betriebe; Landwirtschaftl. Produktionslehre (für Studierende aller Fakultäten) 1-ft.

„Ernst Joest-Büste.“

Zum Gedächtnis des so früh verstorbenen großen Forschers und Lehrers Ernst Joest hat die Veterinär-Medizinische Fakultät der Universität Leipzig die Aufstellung seiner Büste beschlossen. Auf den entsprechenden Aufruf sind bisher folgende Beiträge eingegangen: 200,— RM. Rotlaufimpfanstalt Prenzlau; je 100,— RM. v. Oesttag-Stuttgart, Baum-Leipzig, Verlagsbuchhandlung R. Schötz-Berlin, Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte, Hannover; 75,— RM. Reinhardt-Leipzig; je 50,— RM. Bach-Perleberg, Prof. Dr. Richter-Leipzig, Nieberle-Leipzig, Vereinigung wissenschaftl. Assistenten der Vet.-Med. Fakultät Leipzig; je 30,— RM. Scheunert-Leipzig, Obermed. Schmidt-Leipzig, Ellenberger-Dresden, Wolffhügel-Chile; 25,— RM. Casper-Breslau; je 20,— RM. Haupt-Finsterwalde, Schauder-Leipzig, Schmaltz-Berlin, Eber-Leipzig, Mießner-Hannover, Götze-Hannover, Göhre-Großhain, Nörr-Gießen; 15,— RM. Cohrs-Leipzig; je 10,— RM. Würmling-Katzenellenbogen, Schenk-Leipzig, Schach-Döbeln, Emschhoff-Dresden, Ungenannt Oelsnitz (Vogtland), Semmler-Dresden, Müller-Bauerwitz, Liebrecht-Zörbig; Zieger-Strehla, Noack-Leipzig, Gautsch-Großhain, Kreienberg-Marienberg; 6,— RM. Oertel-Geithain; je 5,— RM. Thomas-Meißen, Abels-Leipzig, Ruth Eber-Leipzig, Erich Ay-Crossen, Sandig-Tharandt, May-Krefeld; 40,— RM. Glietenberg-Gelsenkirchen, im Verein mit Dipl.-Ing. Dr. Glietenberg-Leverkusen. Zusammen 1391,— RM. Die Fakultät dankt allen Spendern herzlich und bittet weitere Beiträge zu überweisen unter „Ernst Joest-

Büße“ an das Postcheckkonto Leipzig Nr. 55 934 oder die Commerz- und Privatbank Leipzig Dep.-Kasse B.

Die Veterinär-Medizinische Fakultät der Universität Leipzig.

I. A.: Nieberle, Reinhardt, Schmidt.

Bücheranzeigen und Kritiken.

Greve, L.: Jahresbericht über das Veterinärwesen im Freistaat Oldenburg für die Jahre 1915—1923 mit kurzem Rückblick auf die Entwicklung des Veterinärwesens in Oldenburg und das Auftreten der Seuchen in früheren Jahren. Oldenburg 1928.

Verf. gibt zunächst eine Schilderung der Entwicklung des Veterinärwesens in Oldenburg und den zugehörigen ehemaligen Fürstentümern Lüneburg und Birkenfeld von seinen ersten Anfängen bis zu den Berichtsjahren 1915—1923. Es wird dann über die anzeigepflichtigen Seuchen berichtet. Dabei sind alle früheren Seuchengänge berücksichtigt, soweit die alten Akten Angaben darüber enthalten. Im folgenden Teil werden die nichtanzeigepflichtigen Krankheiten unserer Haustiere abgehandelt. Nach einer kurzen Besprechung der Fleischbeschauverordnung in Oldenburg schildert Verf. den Stand des Abdeckereiwesens, die Organisation der Hufbeschlagsausbildung, das Molkereiwesen und berichtet über hygienische Fragen der Viehhaltung und über die Kurpfuscherei. Schoop.

Der Polizeihund und seine Verwendung. Herausgegeben vom Verein für deutsche Schäferhunde (E. V.). Hauptgeschäftsstelle Augsburg 3. Verkaufspreis 2,50 Mk. einschließlich Postgeld.

Unter dem vorstehenden Titel handelt es sich um eine Mappe, die auf 75 Blättern eine reiche Sammlung von Bildern enthält, die mit zahlreichen Aufnahmen den vollständigen Ausbildungsgang des Gebrauchshundes und seine Gebrauchsverwendung anschaulich zur Darstellung bringt. Eine Anzahl von Blättern enthalten Spurkizzen über Versuchsarbeiten der Suchhunde der Kriminalabteilung des Berliner Polizeipräsidiums. Jedem Bilde ist eine erklärende Fußnote beigegeben und die Spurkizzen enthalten erläuternde Angaben über die Versuchsarbeiten nach ihrem Verlauf und Ergebnis und bieten damit einen anschaulichen und interessanten Einblick in die erreichten Leistungen. Die technische Ausführung des Bildwerkes ist geschmackvoll. Allen, die sich für die Ausbildung und den Gebrauch der Suchhunde interessieren, kann die Bildermappe angelegentlich empfohlen werden. Künne mann.

Allgemeine Tierzucht. Ein Lehr- und Handbuch für Studierende und Züchter. I. Abteilung. Von Dr. und Dr. h. c. Kronacher, o. Professor und Direktor des Instituts für Tierzucht und Züchtungsforschung der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Dritte völlig neubearbeitete Auflage. Mit 366 Textabbildungen. Berlin, Paul Parey, 1928. Gebunden RM. 29.—.

Von dem in III. Auflage erscheinenden Werke liegt jetzt die erste Abteilung vollendet vor. Infolge der starken politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen, durch welche die deutsche Landwirtschaft und mit ihr die Tierzucht in der Gegenwart betroffen wurde, stand der Autor vor der Aufgabe, die verschiedenen Teile des Werkes, namentlich den ersten Abschnitt, völlig um- und neu zu gestalten. Der Autor hat in seinem Werke das Gesamtgebiet der Tierzucht in eingehender Weise von den verschiedensten Gesichtspunkten aus behandelt und beleuchtet, daß der Leser eine Übersicht über den wissenschaftlichen Stand unserer Tierzucht in der Gegenwart erhält. Der Studierende empfängt Hinweise und Anregungen für seine Studien, der landwirtschaftliche Praktiker, sowie der Forscher bekommen wertvolles Material für eigene Arbeiten, Untersuchungen, Beobachtungen und praktische Versuche auf dem Gebiete der Tierzucht. Der deutsche Tierzüchter gewinnt dadurch ein klares Ziel, nach dem er streben muß, um zu wirtschaftlichen Erfolgen zu gelangen und im Interesse unserer Volkswirtschaft die Zukunft unserer Nahrungsmittelversorgung möglichst unabhängig von ausländischer Einfuhr zu gestalten. Wir müssen unsere Viehproduktion, wie Kronacher sagt, auf gesunder, landeseigener Grundlage bis zur Grenze des Möglichen entwickeln.

Von allgemein tierzüchterischem Interesse sind die Erörterungen des Autors über die „Tierproduktions- oder Tiererzeugungslehre“. Sie zerfällt nach dem Autor in die (Zoo) Biologie, in die wissenschaftliche Züchtungslehre und in die angewandte Züchtungslehre, die eigentliche Tier-

erzeugungslehre. Von theoretisch wissenschaftlichem Interesse sind die Ausführungen über die „Stellung der Haustiere im zoologischen System“, ihre Gewinnung, Abstammung, prähistorische und historische Entwicklung. Die Aufzählung der Motive, die Art der Vorgänge, welche die Menschheit in den Besitz der Haustiere brachten (Haustierwerbung) sind von dem Autor in kritisch-übersichtlicher Form zusammengestellt, wobei derselbe in überzeugender Weise eine Auffassung entwickelt, daß es sich bei diesem Vorgang um die Auswirkung eines Naturgesetzes, des Gefelligkeitstriebes handelt. Die durch die Domestikation bewirkten Veränderungen lassen sich nach Kronacher in solche morphologischer, physiologischer und psychologischer Natur einteilen. Der besondere Wert dieser „Allgemeinen Tierzucht“ liegt meines Erachtens darin, daß bei der gesamten Behandlung des umfangreichen und verschiedenartigen Stoffes die biologische Einstellung des Autors unverkennbar ist. Es ist dieses ein Umstand, welcher dem Werke einen besonderen wissenschaftlichen Wert verleiht. Die Schilderung der Abstammung der einzelnen Haustiere von Wildformen zeugt von dem tief eindringenden Verständnis des Autors in diese Vorgänge und gibt einen Einblick in die umfangreiche Forscherarbeit auf diesem Gebiete. Dem Lernenden wird eine Fülle des Wissenswerten, dem Lehrenden eine sehr willkommene Übersicht über den reichhaltigen, zum Teil sonst schwer zugänglichen Stoff und dem Forscher zwecks Orientierung zu eigenen Arbeiten eine Wegleitung durch die Veröffentlichung dieses vortrefflichen Werkes geboten. Der Wert desselben wird noch durch die reiche Illustrierung erhöht, wobei es sich um eine große Fülle der neuesten Abbildungen, in überwiegender Mehrzahl um photographische Aufnahmen von Wildformen und Rassetieren handelt.

Der Besitz dieses vortrefflichen Werkes in III. Auflage ist jedem Tierzuchtinteressenten auf das angelegentlichste zu empfehlen. Die Verlagsanstalt Paul Parey in Berlin hat daselbe in hervorragender Weise ausgestattet. Dr. Alexander Sokolowsky, Hamburg.

Dissertationen der Veterinärmed. Fakultät der Universität Leipzig.

W.-S. 1927/28.

Wortmann, Heinrich: „Versuche über die Wirkung des Antidiphtherins gegenüber künstlicher und spontaner Infektion mit Hünderdiphtherievirus“. Vogel, Wilfried: „Beitrag zur Geschichte der Veterinärhygiene der Deutschen des Mittelalters und der neueren Zeit“. Voß, Hans-Jürgen: „Beitrag zur Ringbildung an den Klauen des Rindes“. Barth, Walter: „Versuche mit kolloidalen Metallgemischen „Cuprocollargol“ bei septischen Erkrankungen in der Veterinärmedizin“.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Geflütsdirektor Groll-Schwaiganger zum Landstallmeister und Vorstände des Geflütamt München mit dem Sitze im Landwirtschaftsministerium; Tierarzt Dr. Wilhelm Gipmann aus Wattencheid i. W. zum wissenschaftl. Assistenten am hygien. Institut der Tierärztl. Hochschule in Hannover; Tierarzt Dr. Alfred Brödnert aus Leipzig zum wissenschaftl. Assistenten an der mediz. Universitätsklinik in Leipzig vom 1. April d. Js.; Veterinärassessor Dr. Reimers in Rathenow zum Veterinärarzt und Übertragung der Veterinärstelle in Rathenow (Bez. Potsdam).

Übertragen: Polizeitierarzt Dr. Engler aus Berlin die kommissarische Verwaltung der Veterinärstelle II in Marienwerder.

Promoviert in Leipzig: Heinrich Worthmann aus Lüneburg; Wilfried Vogel aus Freiberg; Hans-Jürgen Voß aus Hütten i. Holst.; Walter Barth aus Prösitz; in München: Georg Müller aus Marienburg in Rumänien.

Approbiert in Hannover: Heinrich Rottmann aus Talge b. Bersenbrück.

Ausgeschieden: Dr. Georg Elsner als wissenschaftl. Assistent an der mediz. Universitätsklinik in Leipzig am 31. März d. Js.

In den Ruhestand veretzt: Veterinärdirektor Dr. Kosler, Leiter des Schlacht- und Viehhofes in Stuttgart.

Verstorben: Schlachthofdirektor Dr. Klopmeier in Wattencheid i. Westf.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Veterinärhistorische Mitteilungen

Herausgegeben von der

Gesellschaft für Geschichte und Literatur der Veterinärmedizin

Schriftleiter:

Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

zwanglos erscheinende Beilage zur „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“

Verlag von M. & H. Schaper in Hannover

Sonderbezugspreis 150 Goldmark das Jahr, freibleibend

Nr. 3.

1928.

8. Jahrgang.

Nachträgliches zu V.H.M. 1927, Nr. 6.

(Fortsetzung und Schluß.)

Der mit *vel* beginnende Satz (überliefert ist *ut* mit bekanntem Mißverständnis der Abkürzung), steht in der griechischen Vorlage C. H. G. I 166, an erster Stelle, wodurch die Begründung mit *eum* eine bessere Beziehung erhält. Dort wird auch, worauf V.H.M. 1926 Nr. 10 S. 37 hingewiesen ist, dem Satz Homig zugesetzt, so daß die Übereinstimmung mit M. Ch. 418 schlagend ist. Hier mußte ich früher die asyndetische Verbindung *imittito, libidinem faciat* (ohne *ut*) ebenso auffassen wie das häufige *dato, bibat* oder 25³⁰ *permittito aperiatur*. Da nun aber die Nachvergleichung der Handschrift nach *imittito: ne* bietet, muß dies allerdings mit Grevander in der Bedeutung von *si forte* stehen (etwa: in der Erwartung, ob es nicht vielleicht Entleerungsdrang bewirkt).

3. Zu den schwierigsten Abschnitten der Malomedicina gehört für mich nächst dem 6. Kapitel des 6. Buches (*de oculis*), das dritte des siebenten (*si iumentum arnum eiecit aut luxaverit*). Auch an der für einen angeleglichen Sardinianus in Betracht kommenden Stelle ist mir nicht alles klar, doch läßt sich gerade über diesen ein sicheres Urteil gewinnen. Man liest dort: *si recens causa fuerit, alldes eum et arnum ad rotam duces aut ad machinam, si habes, si ad rotam duces, strings eum medium ad columam, si in campo, strophum fige aut palum*. In der Ausgabe ist *alldes* in *alliges* geändert, aber jenes paßt trefflich in den Zusammenhang in der Bedeutung „werfen“, die sich aus Vegetius I 39,3 ergibt: *statim se allidunt (iumenta) et volutant*; dem entspricht M. Ch. 205 *statim prociat iumentum et volutat*. Vom technischen Werten mit der *pellica* gebraucht es Vegetius I 26,2 *alldes iumentum*, wofür sich für M. Ch. 10³⁰ als richtige Lösung *alldes eum* (statt *eum*) ergibt. Dies nebenbei. Mit dem Schlußsatze des oben abgedruckten Textes komme ich nicht ins Reine. Wenn *aut vor palum* richtig ist, so kann *strophus* nicht, wie Oder will, einen Gurt bedeuten, da man zwei so disparate Dinge nicht zur Wahl stellen kann; wie aber *strophus* etwas einem Pfahl Ähnliches bezeichnen könne, das in die Erde gesteckt wird, ist nicht abzusehen. Ist aber ein Gurt gemeint, so kann aus demselben Grunde *aut* nicht richtig sein. Man könnte allenfalls daran denken, *ad palum* zu lesen, indem man etwa als Mittelglied der Verbindung die Schreibung *at* annimmt (Index S. 327); aber *zu fige* paßt *palum* als Objekt ebenso gut, wie *strophum* (Gurt) schlecht; man erwartet *stringe, alligo*, o. ä. Also bleibt *strophum* für mich dunkel — Nach diesem Eingeständnis meines Nichtwissens komme ich zur Sache. Selbst wenn *rota* hier in der im Sardinianus belegten Bedeutung *Tenne stände*, könnte es sich um keine Besonderheit dieses Sprachgebietes handeln, denn der Dalmatiner Palagonius sagt auch so

II

geschlossen, daß *tribulare* irgendwo in der Bedeutung zerreiben vorkommen könnte. Die von mir zitierte Stelle der Medicina Plinii 49, ed. Rose sei nicht beweiskräftig, da die Bedeutung *pressen* besser passe als *zerreiben*. Ich setzte diese Stelle im Wortlaut her: *olivae quam veterinae . . . cum pipere terunt, quibus admiscetur coria mali in aceto decocta; oleum et acerrimum acetum, cum triblas, adicitur*. Indem ich auf den Umstand verweise, daß während des Verfahrens Öl und Essig hinzugegossen werden soll, frage ich, ob sich das besser mit Pressen oder Zerreiben verträgt, und bin wegen der Antwort ganz beunruhigt. Bei Pseudo-Apuleius 131,6 steht, *tollis de corpore ipsius herbae (mandragorae) unicum l. tribulas pulverem minutissimum*; das kann nur durch Zerreiben erreicht werden. In Roses Antidotaria Bruxellensis 145 heißt es *spinæ minutae flores et rosae ana colligito et siccatu atque contribulato*; Pressen wäre bei trockenen Rosenblättern zwecklos. Man vergleiche hiermit im thesaurus glossarum: *contribulo contricilo* (mit diesen griechischen Verb wird anderswo *contouro* erklärt). Schließlich ist Palladius XIV 49,3 (Svennung) *git synchos tribulas duos* Übersetzung von Geoponica XVI 3,4 *melandron novâvous ptoqvarres*. Hiermit ist mein Vorschlag ja wohl als methodisch unanwandsbar erwiesen.

Indessen wenn die Hypothese der Sardinianismen richtig ist, soll jede Änderung „ganz verfehlt“ sein, denn im Sardinianischen sei *criblare* = zerstückeln (*sic*). Möglicherweise bedeutete *criblare* sogar noch an anderen Stellen der Malomedicina *zerreiben* (*sic*) zerstückeln.

Ich sehe davon ab, ob sich die Hypothese in anderen Fällen bewährt. Mir scheint aber, Grevander erliegt hier in seiner ja ganz begreiflichen Entdeckerfreudigkeit einer Selbsttäuschung. Er redet plötzlich von *zerreiben* und hat doch aus dem Sardinianischen höchstens die Möglichkeit der Bedeutung *zerstückeln* erwiesen. Ein Zerstückeln von Fliegen wäre ja auch an und für sich recht wohl möglich, sei es durch Zerschneiden mit einem Haarscharfen Messer, sei es durch Zerpuffen mittels Pinzetten — es wäre aber im vorliegenden Falle zwecklos, da die einzelnen kleinen Stücke doch wieder erst durch Zerreiben in eine innige Verbindung mit der Haut gebracht werden müßten, um (nach antiker Vorstellung) den Haarmohls zu fördern. Daß *criblare* aber zerreiben heiße, müßte erst durch anderweitige einwandfreie Belegstellen bewiesen werden; durch das Sardinianische wird es jedenfalls nicht bewiesen. Fürs erste heißt es noch das, was es bisher immer hieß, nämlich sieben, und da diese Bedeutung an der fraglichen Stelle nicht paßt, wird man wohl oder übel zu einer Vermutung seine Zuflucht nehmen müssen. Es wäre erfreulich, wenn sich alle verderbten Stellen der Malomedicina auf so gelinde Weise heilen ließen wie diese: *passim similibus apribus litterarum deceptus permutat (scriba codicis) c et t* sagt Oder praefatio XX. So spricht alles für die Vermutung *tribulabis*.

Karl Hoppe, Krefeld.

Korrekturzusatz zu 4. Dem lateinischen *pecten* entspricht griechisches *pektis*. Dies bezeichnet in der zu C. H. G. II 122, angeführten Oppianstelle etwa die Weichen des Pfandes.

Nach einer Erklärung der Übertragung suchen, die darin liegen dürfte, daß die bis auf den Boden des Fasses eingetauchte Rührkelle dieselbe Bewegung beschreibt wie die Mörsekuhle, nur daß diese zugleich einen Druck nach unten ausübt. Also schon im ältesten Prosabuchspiel heißt das Verb nicht *pressen*.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Rieck, Berlin-Cöpenick, Kirchstraße 4
Verlag von M & H Schaper Hannover — Druck von Eberlein & Co., Hannover

Allerdings sind seine Worte im c. 44 von ihm in merkwürdiger Weise mißverstanden worden. Er tilgt an zwei Stellen eine Reihe von Worten und erhält als Text *si eiecerit ex more ad rotam, arnum repento*. In seiner Ausgabe fehlt das Komma; daß er die Worte aber so verbindet, beweist sein Index S. 213 mit den Worten *eiecerit arnum ad rotam*. Er muß an eine Beschädigung durch ein Wagenrad, wahrscheinlich beim Circumstrennen, gedacht haben. Aber abgesehen davon, daß dann der Ausdruck *ex more* auffällig wäre, so werden davon doch in den meisten Fällen die Hinterfüße betroffen worden sein, wofür auch das 23. Kapitel des ersten Buches der Malomedicina Zeugnis ablegt; denn die Worte *si tumentum rota insculca* (?) *fuert* stehen dort, wie im ersten Jahrbuche S. 54 u. f. nachgewiesen ist, im Zusammenhang von Erörterungen, die sich auf Leiden der Hinterhand beziehen. Pelagius hat natürlich geschrieben: *et si fuert necesse aut eiecerit, ex more ad rotam arnum repento*. Die im Riccardianus zwischen *rotam* und *arnum* stehenden Worte *et necesse ex more ad rotam* stammen aus der verglichenen anderen Handschrift, in der die Worte *si fuert* und *aut eiecerit* versehentlich ausgelassen waren. Die Stelle ist den von ihm in der Praefatio 27 u. f. aufgezählten hinzuzufügen. M. a. W. *ad rotam repone* war das übliche (*ex more*) Verfahren. Daß man nicht die Tanne als Ort des Einrenkens gemeint ist, ergibt sich einmal aus der Erwähnung der Säule: wie sollte eine solche auf die Tanne kommen, die doch bei den Alten (man denke an die Erzählung von Gideon im Buche Richter 6, 37—40) im Freien lag? Sodann aus der Tatsache, daß zwischen *rota* und *machina* die Wahl gefallen wird, letztere aber sicher das Werkzeug zum Einrenken bezeichnet. Schließlich aus den klaren Worten des Vegetius II 46 *si emoverit ad tormen- tum rote vel machine locis suis eiecta restitues*. Also war die *rota* eine Drehvorrichtung.

4. In der Überschrift des 34. Kapitels des 5. Buches *si quod iumentum dictionem*) *pectinis veranitur* (nach dem Kapitelverzeichnis *defectio pectinis*) soll *pecten* dasselbe bedeuten wie im Sardinischen *pettini*, nämlich Haif. Wie bereits Gunnar Carlsson nach Erscheinen meiner Rezension in der schwedischen

3) Diese beiden Begriffe korrespondieren also. Der Gegensatz *si ad rotam duces . . si in campo*, durch den Albiqust S. 8 seiner äußerst verdienstvollen Studien zur spätlat. Mal. Chir. zu der Annahme verleitet worden ist, *in campo* stehe für *in campum*, ist nur ein scheinbarer. Die Sache liegt vielmehr so. Das betreffende Glied soll mittels eines daran gehenden Seiles solange vorsichtig gereckt werden, bis man das ausgefallene Gelenk knacken hört. Dazu ist es nötig, das Tier anzubinden, damit es einen Gegenhalt habe. Jenes Seil wird mit einer Drehvorrichtung (*tormentum*) langsam angezogen. Ist man im glücklichen Besitz einer *machina* — ob damit wie sonst der Notstand gemeint ist oder eine zu dem besonderen Zwecke des Einrenkens gebaute Einrichtung, kann ich nicht entscheiden — so ergibt sich das Notwendige für die Befestigung des liegenden Pferdes von selbst. Ein solches Geviert hat aber nicht jeder (daher *si habes*). Dagegen nimmt man meist (*ex more*) eine Leinwand zu beschaffende *rota*. Falls sich der Unfall in der Nähe menschlicher Wohnungen abgespielt hat, bindet man dann das Pferd an eine Stange, die es dort überall im Altertum gab. Anders auf freiem Felde: dort schlägt man einen Pfahl oder einen *strophus* genannten Gegenstand in die Erde (*fige*), an dem der Körper einen Halt hat. Zu *si in campo* ist also *arnum duces* hinzuzudenken, nicht *equum*, da *duces* hier nicht *führen*, sondern *ziehen* bedeutet.

Zeitschrift Franos nachgewiesen hat, sind dabei die Anzeichen der Erkrankung (namentlich *quidquid remittit, nimis humidum erit*) und, wie ich hinzutügte, der die Behandlung leitende Grundgedanke (*quo enim magis stipticus uteris, tanto facilius sanabitur*) außer Acht gelassen. Daß es sich tatsächlich um Durchfall handelt, lehrt die von mir im dem *νεγδάλαν νεγδδագοίας* C. H. G. I 192a nachgewiesene Parallele *ῥάυαν ῥάλα ῥάλεν νεγδδάγον ναι ῥαλαὸν νοσῶντα ῥάλαν*, die den Worten Mal. 159, entspricht *folia rami pulentiae triticae immisce simul contrita et offas dare debes*. In diesem Sinne steht *defectio*, wie sonst im Lateinischen, so auch in der Malomedicina 252a. 21 (*ad defectionem alligandum*). Es erhebt sich freilich die Frage, ob sich der Gemetiv *pectinis* mit dieser Auffassung vereinigen läßt. Das erscheint möglich. Celsus nennt VIII 1,23 das menschliche Schambein *pecten*, dies bedeutet dann auch die Schamgegend (*ἐπηβαιοῦ*) und in erweitertem Sinne das Äußere des Unterleibes etwa vom Nabel abwärts und in der Richtung nach unten. Wenn also die Überlieferung richtig ist, woran zu zweifeln kein Grund vorliegt, hat man daraus zu lernen erstens, daß auch die entsprechenden inneren Teile des Unterleibes *pecten* genannt wurden, zweitens, daß der Ausdrucks auf den Pferdekörper übertragen wurde.

5. M. Ch. 793 *Pili albi iumento si nati erunt quoquo loco, in spina alba nascuntur tubercula quasi spongiolae, has conteres bene, ex rosa subiges, deinde pilos albos radicitus educto, tunc eo medicinale locum cottide bene confictio, donec pili renascuntur*. Um die Deutung von *spongiolae* nach dem Sardinischen als *Gespinnst* am Pferdefuß zu ermöglichen, wird die Überlieferung ohne weitere Begründung als unrichtig erklärt: vor *has* sei etwas ausgefallen, der davorstehende Satz sei an falsche Stelle geraten. Tatsächlich ist die Stelle ausnahmsweise (für den Monacensis) einmal ganz in Ordnung. Ihre richtige Deutung ergibt sich aus folgenden Stellen:

Plinius n. h. 25,18 *cyonorrhodi una medicina erat spongiolae, quae in medietate eius nascitur, cinere cum melle acopias capitis expleri*
 Marcellus 26,89 *spongia ex rubo rosario agresti*
 27,46 *spongiam ex quilibet rosa*
 27,108 *spon[d]ojos (?) est lanugo quadam, quae in rosa situata solet nasci*.

Man überzeuge sich davon, daß es sich auch bei Plinius, wie in der Malomedica, um ein Haarmitel handelt. *spina alba* ist, wie V.H.M. 1926 Nr. 10 S. 40 gezeigt wurde, der Rhanumstranch, eine Art des *rubus*.

6. Im ersten Jahrbuche S. 54 hatte ich bemerkt, da man Fliegen nicht eiecen könne, so sei M. Ch. 297a statt *muscum super locum criblatis* mit sicherer Emendation „*muscas . . triblatis*“ zu lesen. Ich muß mir jetzt sagen lassen, daß diese Änderung, methodisch nicht einwandfrei sei, da *tribulare* nach gewesenermaßen nur *pressen*), plägen, drücken bedeute. Allerdings scheint sich der Tadler den Rückzug durch das Zugständnis, es sei ja nicht ausge-

3) Wer die im Lexikon von Georges allerdings mit *pressen* übersetzte Stelle aus Cato de agri 23,4 *ubi indideris defutu maut marmor aut resinum (in mustum), dies XX permisceto crebro, tribulato cottide in Zusanmenhang* liest, wird sich davon überzeugen, daß die Übersetzung unzutreffend ist. Zuerst, wird sich allerdings auch nicht, sondern einzig und allein U m r i h r e n , re i b e n paßt allerdings auch nicht, sondern einzig und allein U m r i h r e n , weswegen der betreffende alte Schneider denn auch mit Berührung auf Columella XII 23 *rutabulato* lesen wollte. Das wird man heute nicht mehr tun, son-

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufriedung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 13.

Ausgegeben am 31. März 1928.

36. Jahrgang.

Zum 25jährigen Bestehen des Reichsfleischbeschaugesetzes.

Von Dr. Heine, Duisburg.

Den Weg für die gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung der Schlachttiere hat in Preußen das Gesetz betr. die Errichtung öffentlicher Schlachthäuser vom Jahre 1868 geebnet. Obwohl vorher schon in einzelnen Städten Deutschlands Schlachthöfe bestanden und auch einzelne Länder Fleischbeschauordnungen erlassen hatten, gab das Gesetz, da es auch den Schlachthöfen die Wirtschaftlichkeit gewährleistete, den preussischen Städten die Anregung, neue Schlachthöfe zu bauen. In den Schlachthäusern machte sich immer mehr das Fehlen von Gesetzen bemerkbar, die eine Untersuchung des Schlachtviehes und des Fleisches anordneten. Erst das Reichsgesetz über den Verkehr mit Nahrungsmitteln vom 14. März 1879 gab eine Handhabe, um eine obligatorische Untersuchung der Nahrungsmittel und damit auch des Fleisches zu begründen. Einzelne Bundesstaaten hatten allerdings die Fleischbeschau schon früher geregelt, so das Großherzogtum Baden durch Gesetz vom 26. November 1827, das Königreich Württemberg durch Ministerialverfügung vom 21. August 1879, das Königreich Bayern durch zahlreiche oberpolizeiliche Vorschriften aus den Jahren 1862—1885, das Herzogtum Koburg-Gotha durch Gesetz vom 22. Dezember 1891, das Herzogtum Schwarzburg-Rudolstadt durch Verordnung vom 3. September 1892, die Reichslande durch Bezirkspolizeiverordnungen aus den Jahren 1883 und 1889, die Hansestädte durch Verordnungen der Senate aus den Jahren 1884, 1889 und 1894. Mustergiltig ging darauf das Königreich Sachsen voran, in dem es die allgemeine Schlachtvieh- und Fleischbeschau durch das Gesetz vom 1. Juni 1898 regelte. Im Königreich Preußen begann man mit Bezirkspolizeiverordnungen die obligatorische Fleischbeschau einzuführen, so in Hessen-Nassau, in den Regierungsbezirken Posen und Bromberg usw.

Eine allgemeine Regelung führte erst das Reichsgesetz betr. die Schlachtvieh- und Fleischbeschau vom 3. Juni 1900 herbei. Führende Männer der tierärztlichen Wissenschaft hatten schon vorher die Grundlagen zur wissenschaftlichen Fleischbeschau gelegt. Gerlach hatte umfangreiche Versuche über die Entwicklung der Trichinen und Finnen sowie Untersuchungen über die Übertragbarkeit der Tuberkulose vom Tier auf den Menschen durch den Fleischgenuß angestellt. 1875 veröffentlichte er das erste wissenschaftliche Werk über Fleischbeschau unter dem Titel: „Die Fleischkost des Menschen vom sanitären und marktpolizeilichen Stand-

punkte“. Bollinger förderte die wissenschaftliche Fleischbeschau durch zahlreiche Arbeiten, auch trat er energisch ein für die Einführung der obligatorischen Fleischbeschau und die Errichtung öffentlicher Schlachthäuser. 1884 erschien das „Handbuch der Fleischkunde“ von Schmidt-Mülheim, der 1886 das „Archiv für animalische Nahrungsmittelkunde“ begründete. Weitere Verdienste um die wissenschaftliche Fleischbeschau erwarb sich Geheimrat Lydtin, der Landestierarzt des Großherzogtums Baden, der namentlich auf dem Internationalen Tierärztlichen Kongress in Baden-Baden die für die Fleischbeschau hauptsächlich in Frage kommenden Richtlinien festlegte. Sehr verdient machte sich auch der Direktor der städtischen Fleischbeschau in Berlin, Dr. Hugo Hertwig, dem es u. a. gelungen war, die Prädilektionssitze der Rinderfinnen und damit auch sichere Untersuchungsmethoden festzulegen.

Die gewaltigste Förderung aber erfuhr die wissenschaftliche Fleischbeschau im letzten Dezennium des vorigen Jahrhunderts, als der damalige Prof. Dr. Robert Ostertag im Jahre 1892 mit seinem groß angelegten Handbuch der Fleischbeschau hervortrat. Es war ein glückliches Zusammentreffen, daß in dieser Zeit auch Kitt's vorzügliche pathologische Anatomie erschien. Das aber wird das dauernde Verdienst Ostertag's bleiben, daß er das weitumher verstreute Material in die richtige Form brachte, vor allem, daß er seine reichen Erfahrungen, die er auf dem Berliner Schlachthöfe und während seiner Tätigkeit als Hochschullehrer gesammelt hatte, der Allgemeinheit zur Verfügung stellte und daß er Forscher blieb und bleiben wird auf dem Gebiete der Fleischbeschau, so lange es sein Wirkungskreis ihm ermöglicht. Nur in der Hand eines Mannes wie Ostertag, dessen schöpferischer Genius und dessen unermüdliche Arbeitskraft alle Schwierigkeiten spielend überwinden ließen, konnte ein solch klassisches Lehrbuch entstehen, dessen zahlreiche, fortwährend ergänzte Neuauflagen und dessen Verbreitung im Auslande besser wie Worte zu sprechen vermögen. Daneben sei erwähnt, daß im Jahre 1902 das ausgezeichnete Lehrbuch der Fleischhygiene von Medizinalrat Dr. Richard Edelmann, Kgl. Sächs. Landestierarzt, erschien.

Eigenartig ist es, daß die Bedeutung der Trichinen- und Finnenschau eher erkannt wurde als die der Fleischbeschau und zahlreiche Regierungspolizeiverordnungen ihre Ein-

führung längst vor dem Inkrafttreten des Reichsfleischbeschaugesetzes veranlaßt hatten.

So war das wissenschaftliche Fundament für das Reichsfleischbeschaugesetz wohl vorbereitet, als am 23. Juli 1897 der Abgeordnete von Mendel-Steinfelds im Preuß. Abgeordnetenhaus den Antrag auf Einführung der obligatorischen Fleischbeschau stellte mit dem Hinzufügen, daß sie nur für gewerbsmäßige Schlachtungen in Frage kommen und nicht durch Tierärzte ausgeführt werden solle; denn es seien „der tierärztlichen Kontrollen wahrlich genug“! Minister von Hammerstein konnte darauf erklären, daß das Königl. Staatsministerium den Beschluß gefaßt habe:

„Die allgemeine Fleischbeschau in Preußen möglichst bald einzuführen und gleichzeitig bei dem Herrn Reichskanzler dahin zu wirken, daß auch diejenigen anderen Bundesstaaten, die noch keine ordentliche Fleischbeschau haben, in gleicher Weise vorgehen.“

Im Reiche wurden die Vorarbeiten für das Reichsfleischbeschaugesetz so rüstig in die Hand genommen, daß es am 3. Juni 1900 verabschiedet werden konnte. Am 7. Oktober desselben Jahres gingen bereits die Ausführungsbestimmungen zum Reichsfleischbeschaugesetz dem Bundesrat zu, der am 3. Juli 1902 beschloß, daß das Gesetz am 1. April 1903 in Kraft treten sollte.

Mitarbeiter und Schöpfer dieses großen Werkes war außer Prof. Ostertag der Geh. und Vortragende Rat im Preuß. Landwirtschaftsministerium Dr. Schroeter, der gemeinsam mit Geh. Regierungsrat Dr. Hellich eine Zusammenstellung der fleischbeschaugesetzlichen Bestimmungen nebst Kommentar herausgab. Daneben sei an dieser Stelle auch der frühere Direktor der städt. Fleischbeschau in Hannover Dr. Ströse genannt, der z. Zt. der Verabschiedung des Gesetzes ins Reichsgesundheitsamt berufen wurde und als Regierungsrat maßgebenden Anteil an der Ausarbeitung der Ausführungsbestimmungen hatte. Mit den Fortschritten der wissenschaftlichen Forschung, die auch auf dem Gebiete der Fleischuntersuchung in ungeahntem Ausmaße einsetzte, mußte das Gesetz ergänzt werden, zuletzt durch die Verordnung des Staatsministers des Innern am 10. August 1926, bei der namentlich die Ergebnisse der bakteriologischen Fleischuntersuchung und der Tuberkuloseforschung verwertet wurden, wobei auch eine Änderung des Verfahrens bei der Beanstandung finniger Rinder und Schweine sowie trichinöser Schweine vorgenommen wurde.

Die Auswirkungen des Gesetzes zeigen sich in mannigfacher Weise. Seine Hauptaufgabe war, durch unschädliche Beseitigung der beim Schlachten zu Tage kommenden Krankheitserreger sowie des zum Genuß nicht geeigneten Fleisches den Menschen vor Erkrankungen zu schützen. Wie diese Aufgabe erfüllt ist, zeigen die statistischen Jahresberichte. Im Jahre 1904 wurden z. B. 53 320 Rinder wegen Tuberkulose als untauglich, bedingt tauglich oder minderwertig erklärt, wegen Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rinderseuche wurden im gleichen Jahre 871 Rinder, 3175 Schweine, 14 Schafe und 3 Ziegen als untauglich bezeichnet. 3999 Rinder waren schwachfinnig, 892 Schweine trichinös. Rechnen wir dazu die gewaltige Menge von Lungen, Lebern usw., die wegen Tuberkulose, Echinokokken und anderer Krankheiten beanstandet wurde, rechnen wir weiter dazu die große Zahl der Schlachttiere, die wegen Septikämie dem Verkehr entzogen wurden (im Jahre 1904 ca 380 Ochsen, 190 Bullen, 8200 Kühe, 550 Jungrinder, 4380 Kälber und 1500 Schweine), dann ersieht man, daß es kaum etwas Notwendigeres gab zum Schutze des Menschen, als die Einführung der Schlachtvieh- und Fleischbeschau, deren Ausdehnung auf die Hauschlachtungen nur eine Frage der Zeit sein kann. Groß ist der Nutzen, den die Fleischbeschau der Landwirtschaft gebracht hat. Um nur einen Zeitabschnitt herauszugreifen, hat sich die Zahl der trichinösen Schweine in Preußen von 43 Stück bei 2 414 950 Schlachtungen im

II. Vierteljahr 1913 geschlachtet auf 16 Stück bei 1 747 792 Schlachtungen im II. Vierteljahr 1926, also fast auf den dritten Teil vermindert, während bei den Finnen die Verhältnisse ähnlich liegen. Die methodische Ausrottung der Finnen und Trichinen, ferner auch der Echinokokken, der Coenurusblafen und des Cysticercus tenuicollis durch die Fleischbeschau wirkte sich jetzt aus. Ja die Trichinen sind dank der unermüdlichen Tätigkeit der Trichinenschauer so selten geworden, daß es Schlachthöfe gibt, in denen man trichinöse Schweine fast gar nicht mehr findet. Auch die unschädliche Beseitigung der feuchekranken Tierkörper und aller Fleishteile und Organe, die die Erreger von Infektionskrankheiten beherbergen, dient der Ausrottung der Tierkrankheiten. Zuletzt ist auch der Landwirtschaft die rechtzeitige Erkennung der Seuchen bei Ausübung der Fleischbeschau von hohem Wert. Man wende nicht ein, daß die Landwirtschaft durch die Fleischbeschau in erheblichem Maße finanziell geschädigt werde. Es schätzte Graf Schöerlin-Löwitz kurz nach Inkrafttreten des Fleischbeschaugesetzes den Wert des jährlich durch die Fleischbeschau vernichteten Fleisches auf etwa 60 Millionen Mark. Diese Zahl kann man vielleicht errechnen, wenn man die beanstandeten Tiere zusammenzählt, für jedes einen bestimmten Wert einsetzt und das Ganze addiert. Bei solch einer Rechnung wird aber gar nicht berücksichtigt, daß ein großer Teil der Schlachttiere in abgemagertem, also beinahe wertlosen Zustande geschlachtet wird, daß ein großer Teil der beanstandeten Tiere wegen schwerer Erkrankung auch ohne die Fleischbeschau gar nicht verwertet würde, durch diese also auch nicht entwertet werden kann und daselbe bei allen Tieren und Organen der Fall ist, die der Fleischer der Erkrankung wegen gar nicht verwerten kann, die also entwertet zur Welt kommen. Ich habe berechnet,^{*)} daß im Jahre 1904 nach Abrechnung der ohnehin wertlosen Tierkörper und Organe die Fleischbeschau einen Verlust von ungefähr 32 Millionen Mark verursacht hat, während die Gesamtheit der Schlachtungen einen Wert von 3 434 228 000 Mark hatte. Es kann demnach mit einem Verlust von rund 1 Prozent gerechnet werden, der zum größten Teil durch Versicherungen gedeckt ist. Diese Verluste sind für Landwirt, Metzger und Verbraucher ebenso tragbar wie die Kosten der Fleischbeschau, die sich ungefähr in gleicher Höhe bewegen. Welcher Einsichtige wird wohl die geringfügige Fleischverteuerung scheuen, wenn er die Gewißheit hat, daß er das wichtigste Nahrungsmittel, das Fleisch genießen kann, ohne eine Benachteiligung seiner Gesundheit befürchten zu müssen!

Andere Länder haben die Wohltaten des Reichsfleischbeschaugesetzes erkannt und die Grundlagen des Gesetzes sich zunutze gemacht. Die Einführung der obligatorischen Fleischbeschau in anderen europäischen und außereuropäischen Staaten hat aber die deutsche Gesetzgebung nicht davon abgehalten, die Forderung der peinlich genauen Untersuchung bei dem vom Ausland eingeführten Fleisch aufrecht zu erhalten. Wie recht sie daran getan hat, geht aus den zahlreichen Beanstandungen hervor, die die Tätigkeit der Auslandsfleischbeschau zu verzeichnen hat.

So können Gesetzgeber und Schöpfer des großen Kulturwerkes und alle diejenigen, die in der Fleischbeschau zu wirken berufen waren, mit hoher Befriedigung auf die 25 Jahre des Bestehens des Reichsfleischbeschaugesetzes zurückschauen. Die in der Fleischbeschau tätigen Tierärzte und auch die Fleischbeschauer haben alle Ursache durch größte Gewissenhaftigkeit und ernstes Streben bei Ausübung ihres Berufes ihre Dankbarkeit den Männern zu bezeugen, die den Grundstein zu dem gewaltigen Bau gelegt und den Bau in wahrhaft glänzender Weise aufgeführt haben, namentlich aber dem Führer auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Fleischbeschau, dem Ministerialrat Prof. Dr. v. Ostertag,

^{*)} D. T. W. Jahrg. 1906, Nr. 52.

der durch die Herausgabe der hochwissenschaftlichen und auch die Ziele der Praxis berücksichtigenden Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene und die sympathische und vornehme Art seines Wirkens in dauernder Fühlung mit den ausübenden Organen, den Tierärzten geblieben ist.

Möge das Gesetz unter ständigem Ausbau im Anschluß

an den Fortschritt der wissenschaftlichen Forschungen und die Bedürfnisse der Praxis und Wirtschaft auch weiter seine segensreichen Ziele verfolgen

im Interesse der menschlichen Gesundheit,
im Interesse der deutschen Landwirtschaft,
zum Ruhme der deutschen Tierärzte!

Die Fleischhygiene in ihren Beziehungen zur öffentlichen Gesundheitspflege. *)

(Mit 3 Kurven.)

Von Obertierarzt Dr. Junack, Berlin.

Unter Fleischhygiene versteht man die Zusammenfassung aller Bestrebungen, die darauf gerichtet sind, den Menschen vor dem Genuß gesundheitschädlichen Fleisches zu bewahren. Die Masse der Bevölkerung und selbst die Gebildeten wissen von diesen Bestrebungen nur sehr wenig, sie kennen höchstens die Fleischbeschau und besonders die Trichinenschau, obgleich die letzte nur einen kleinen Teil dieser Bestrebungen darstellt.

Die Geschichte der Fleischhygiene ist sehr alt. Schon die alten Ägypter, Israeliten, Phönizier, Griechen, Römer und Muhamedaner verbanden mit ihren Tieropferungen eine gewisse Fleischbeschau.

Vor allem beschäftigt sich auch die Kirche damit, den Genuß schädlichen Fleisches zu verhüten. Sehr segensreich wirkte ein Verbot des Papstes Zacharias aus dem 8. Jahrhundert, das den Genuß des Fleisches von kranken Tieren im allgemeinen untersagte und bis zum Ende des 18. Jahrhunderts innegehalten wurde.

In Deutschland waren es zuerst süddeutsche Städte, 1275 Augsburg und 1394 Passau, die Schlachthäuser mit fleischhygienischen Vorschriften, besonders für Finnen errichteten.

In Berlin kam 1311 das Privilegium carnificum heraus, das auch fleischhygienische Vorschriften enthielt und z. B. nur junge Schweine zu schlachten erlaubte. 1343 wurde dann das Schlachten von kranken, stinkenden, zu mageren, alten und jungen Tieren verboten. Der Rat der Stadt Berlin kam dieserhalb oft zu Differenzen mit dem Fleischergewerbe. Strenge und milde Vorschriften wechselten ab, und so ging es die Jahrhunderte hindurch. Nach der Gründung der Berliner Tierarztschule im Jahre 1790 beschäftigte man sich eingehend mit der Perlsucht des Rindes, man hielt sie für identisch mit der Syphilis des Menschen und erließ strenge Bestimmungen; als dann aber der berühmte Heim, Graumann und andere nachwiesen, daß das nicht der Fall sei, verallgemeinerte man diese Erkenntnis und hielt das Fleisch aller kranken Tiere für unschädlich und die Fleischbeschau fiel wieder. Erst durch die in ihrer Ätiologie erkannten Trichinenepidemien in Hettstädt und Hedersleben 1863 und 1865 mit ihren 500 Erkrankungen und 129 Toten und viele andere Trichinenepidemien wurde man wieder auf die Gesundheitschädigungen nach Fleischgenuß aufmerksam. 1868 wurde in Preußen das Schlachthausgesetz erlassen, das den Schlachthofzwang und den Untersuchungszwang aller in den betreffenden Gemeinden geschlachteten Tiere einführte.

Durch das nach Gründung des Reiches geschaffene Reichsstrafgesetzbuch wurde der Verkauf trichinösen Fleisches im § 367 mit Geld- oder Haftstrafe bedroht.

Von neuem beschäftigte man sich mit der Beurteilung des Fleisches tuberkulöser Tiere. Die höchste tierärztliche Standesorganisation, der Deutsche Veterinärrat, hielt 1875 die Ansteckungsgefahr des Menschen von tuberkulösen Tieren her nicht für ausreichend erwiesen. Da hielt in dem-

selben Jahre der berühmte Tierarzt Andreas Christian Gerlach, dessen Standbild vor der Tierärztlichen Hochschule in Berlin steht, in dieser Gesellschaft für Öffentliche Gesundheitspflege einen Vortrag über seine differierende Ansicht und die Gesellschaft stellte sich auf den Standpunkt Gerlachs, daß seine neuen Infektionsversuche mit tuberkulösem Material vom Rinde die Annahme einer Infektionsgefahr für den Menschen rechtfertigen. Im Jahre 1875 erschien dann das berühmte Buch von Gerlach über „Die Fleischkost des Menschen“.

Mit dieser wertvollen Unterstützung durch Ärzte und Hygieniker ging es dann rasch vorwärts. In fast allen Staaten erschienen Ministerialerlässe und Verordnungen über die Beurteilung tuberkulöser Tiere und viele andere fleischhygienische Fragen und alles drängte zu einer reichsgesetzlichen Regelung, die endlich dann am 3. Juni 1900 mit dem Reichsfleischbeschaugesetz ihre gesetzliche Unterlage fand. Aber erst am 1. April 1903 trat das Gesetz voll in Kraft, da erst noch die schwierigen Reichs- und Landes-Ausführungsbestimmungen und Gesetze geschaffen werden mußten, denn den einzelnen Bundesstaaten waren viele Fragen zur Sonderregelung überlassen worden. Auch die Untersuchung des aus dem Auslande eingeführten Fleisches wurde geregelt, leider mehr im agrarpolitischen Sinne, was der Durchführung des Gesetzes im Inlande oft nicht förderlich war.

Das Gesetz, das, wie viele Gesetze, nur ein Kompromiß widerstrebender Interessen darstellte, hatte verschiedene auch hygienisch bedenkliche Fehler.

1. Die Herausnahme der Hauschlachtungen aus der obligatorischen Fleischbeschau.

2. Die nicht reichsgesetzliche Regelung der Trichinenschau, die auch heute noch nicht überall zwingend gefordert wird.

3. Die fehlende hygienische Überwachung von Fleisch und Fleischwaren in den Fleischereibetrieben, Wurst- und Konervenfabriken auf reichsgesetzlicher Grundlage.

Leider fehlte auch die genügende Anzahl von Tierärzten zur allgemeinen Fleischbeschau und es mußten deshalb in großem Umfange nur kurze Zeit ausgebildete Laienelemente, besonders auf dem flachen Lande, mit herangezogen werden, ein Notbehelf, der noch heute besteht.

Insonderheit mußten für die hygienisch bedenklichen Notchlachtungen nur Tierärzte zuständig sein.

Das Gesetz regelt im allgemeinen die amtliche Untersuchung von Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Hunden vor und nach der Schlachtung. Die Hunde sind durch einen sächsischen Arbeitervertreter in das Gesetz gekommen, da italienische Arbeiter den Hundefleischgenuß in Sachsen populär gemacht hatten.

Die Reichsausführungsbestimmungen regeln in ganz bestimmter Weise die Untersuchung der Eingeweide bei den einzelnen Tieren, je nach Wichtigkeit derselben in sanitärer Beziehung. Einzelheiten würden hier viel zu weit führen. Erwähnt seien nur die vier gesetzlichen Beurteilungsarten.

Die Beurteilung der Eingeweide ist sehr streng, was auch berechtigt ist, da sich in diesen die hauptsächlichsten infektiösen Prozesse abspielen, während die gesundheitschädlichen

*) Nach einem Vortrag, gehalten am 24. Januar 1928 vor der Berliner Gesellschaft für Öffentliche Gesundheitspflege und der Berliner Tierärztlichen Gesellschaft.

Parasiten hauptsächlich in der eigentlichen Muskulatur vorkommen.

Wir unterscheiden zuerst die volle Tauglichkeit; die betreffenden Tierkörper und Eingeweide tragen einen runden blauen Stempel.

Die untauglichen Tierkörper und Eingeweide erhalten einen dreieckigen blauen Stempel.

Im Nahrungs- und Genußmittelwert herabgesetztes wässriges, unreifes, vermindert haltbares, mäßig verfärbtes und riechendes Fleisch und das Fleisch stark tuberkulöser Tiere wird als minderwertig auf der Freibank verkauft, es erhält einen viereckigen Stempel mit einem eingeschriebenen Kreis.

Als bedingt tauglich werden diejenigen Tierkörper mit einem viereckigen Stempel versehen, deren Fleisch erst nach einer bestimmten Behandlung wie Kochen, Dämpfen, Pökeln und 21tägiges Kühlen nicht mehr gesundheitschädlich für den Menschen ist; zu diesen Behandlungsarten müßten auch das Gefrieren und die Herstellung von Vollkonserven noch hinzukommen.

Das fragliche Fleisch von Pferden und Hunden erhält einen länglich-rechteckigen Stempel mit der Inschrift Pferd oder Hund.

Das vom Ausland hereinkommende Fleisch wird in besonderen Untersuchungstationen untersucht; natürlich wird nur volltaugliches Fleisch hereingelassen; dieses Fleisch erhält zur leichteren Erkennung einen sechseckigen roten Stempel.

Es liegt im eigensten Interesse des Konsumenten, sich beim Einkauf von Fleisch von Haustieren darum zu kümmern, daß die gekauften Teile oder die dazu gehörigen Tierkörper den blauen, runden Tauglichkeitsstempel der amtlichen Fleischuntersuchung zeigen. Denn ein ziemlich hoher Prozentatz der Fleischvergiftungen entsteht nach dem Genuß des Fleisches von kranken, notgeschlachteten oder sogar gestorbenen Tieren, die schwarz oder kalt geschlachtet waren, d. h. bei denen die amtliche Fleischuntersuchung aus naheliegenden Gründen nicht veranlaßt worden war.

Die vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten faßt man unter dem Begriff Zoonosen zusammen; hat diese Krankheit einen sepsisartigen Charakter, d. h. sind die schädlichen Keime in dem ganzen Körper durch den Blutstrom verbreitet, so kann auch der Genuß des Fleisches und das Manipulieren mit solchem Fleisch von verletzten Hautteilen her die betreffende Krankheit beim Menschen erzeugen. Für alle diese verschiedenen Fälle werden wir ausgezeichnete Beispiele in den nachstehenden Ausführungen vorfinden.

Ich gehe nun, um zur Sache selbst zu kommen, die einzelnen wichtigen Zoonosen durch, die in der amtlichen Reichsfleischschau statistik geführt werden müssen, und deshalb eine einigermaßen fundierte Grundlage haben.

Die Fleischvergiftung ist eine typische mitteleuropäische Krankheit. Nach Neumark sollen z. B. in Nord-Amerika die Fleischvergiftungen so gut wie unbekannt sein. Schon im Mittelalter wird gefordert, daß man mit aller Schärfe gegen Personen vorgehe, die ungewissenhaft genug sind, solche allgemein schädliche Eßwaren zu verkaufen „als wovon so leicht die bössartigen Faulfieber zu entstehen pflegen“. Die ersten gut beobachteten Fleischvergiftungen entstanden wohl meistens nach dem Genuß des Fleisches kranker Tiere und die einzelnen Fleischvergiftungserreger gehören zur Coli-Typhusgruppe, weshalb die Krankheit auch oft Paratyphus genannt wird; auf die einzelnen Erreger kann ich hier nicht näher eingehen, sie erhielten ihren Namen von ihrem Entdecker oder dem Orte der Epidemien. Als die Beobachtungen feiner und kritischer und die amtlichen Untersuchungen immer häufiger wurden, fanden sich aber bald Zweifel an der Ansicht, daß nur von kranken Tieren her Fleischvergiftungen entstünden.

Schon die Verschiedenheit der einzelnen Erreger mußten diese Zweifel erzeugen und noch mehr der Umstand, daß oft nur der Genuß einzelner Teile eines Tieres Fleischvergiftungen im Gefolge hatten, während die übrigen Teile desselben Tieres auch in rohem Zustande ohne Gesundheitschädigungen genossen wurden. Über das Ausmaß dieser nachträglichen oder postmortalen Infektion des Fleisches mit Fleischvergiftungen bestehen die verschiedensten Meinungen. Uhlenhuth nimmt dieselbe bei 90 Prozent aller Fleischvergiftungen an, während Reiner Müller nur für 10 Prozent plädiert. Jetzt werden große Anstrengungen gemacht, um in Sammelforschungen in 14 staatlichen Instituten mehr Klarheit in die Entstehung der oft epidemieartig auftretenden Fleischvergiftungen zu bringen. Das starke Anschwellen von 594 Fleischvergiftungen in 1913 auf 2260 in 1922 hängt sicher mit dem Genuß der vorstehend erwähnten kranken und schwarz geschlachteten Tiere, besonders Pferden, zusammen. Diese schwarzgeschlachteten Tiere werden oft nach entfernten Orten hin verschoben und die nachträgliche Infektion, besonders von bazillenträgenden Menschen her, ist besonders leicht, wie viele einwandfreie Fälle beweisen.

1923 bis 1925 wurden in Deutschland nach Mayer 65, 61 und 70 Epidemien beobachtet mit zusammen 6453 Erkrankungen und 68 d. h. ca. 1 Prozent Todesfällen; die Erkrankungen fielen von 3196 in 1923 auf 1563 in 1925. In den Monaten Mai—Oktober ereigneten sich dreimal so viel Fleischvergiftungen als in den übrigen sechs Monaten. Die in den Vorjahren sehr häufigen Pferdefleischvergiftungen gingen 1923—1925 stark zurück (1925 auf ein Viertel der Fälle von 1923), was sicher mit der jetzt wieder viel exakteren Fleischschau zusammenhängt, die in und nach dem Kriege oft stark vernachlässigt werden mußte. Vielleicht waren diese häufigen Pferdefleischvergiftungen auch in der Mehrzahl Fäulnisvergiftungen, weil in der Not der Zeit auch eingegangene Pferde genossen wurden.

Wegen des größeren Bakteriumreichtums der Eingeweide ereignen sich auch oft Fleischvergiftungen nach dem Genuß von Eingeweidewürsten, im ganzen in 38,9 Prozent aller Fälle.

31 Prozent aller Epidemien, 48 Prozent aller Erkrankungen und 39,7 Prozent aller Todesfälle ereigneten sich nach dem Genuß des Fleisches notgeschlachteter Tiere. Besonders gefährlich ist bekanntlich der Hackfleischgenuß im Sommer; 40 Prozent aller Fleischvergiftungsfälle ereigneten sich nach Hackfleischgenuß.

In 21 Fällen wurde intravitale und in 75 Fällen postmortale Infektion des Fleisches festgestellt. In 13 Fällen wurden die Bazillenträger ermittelt. Bei 162 Fleischvergiftungsfällen wurden bakteriologische Untersuchungen angestellt, die in 12 Fällen negativ verliefen. In 127 Fällen wurden die verschiedenen Fleischvergifter, in 11 Fällen Fäulniskeime und in 5 Fällen der *B. botulinus* ermittelt. In sechs Fällen entstand eine Fleischvergiftung trotz vorhergegangener bakteriologischer Fleischuntersuchung. In allen diesen Fällen einige Tage nach, in einem Fall sogar 11 Tage nach der bakteriologischen Untersuchung. Wegen der Möglichkeit der nachträglichen Infektion oder der Anreicherung spärlicher Keime muß deshalb alles verdächtige Fleisch möglichst bald nach der Schlachtung verzehrt werden, und möglichst gut durchgekocht werden, wie die preussische Regierung in einem Erlasse für die Freibänke empfiehlt. (D. S. Z. 1926, S. 171.)

Die Bazillenträger in den 13 Fällen waren fast immer Schlächter oder deren Angehörige, die zum Teil niemals krank gewesen waren. Einmal wurden bei einer Fleischvergiftung nach Würstgenuß die betr. Schweinedärme als Zwischenträger angegeben. Soweit die Reichsstatistik 1923 bis 1925. Für 1926 liegt bisher nur eine von Klimmekk zusammengestellte Statistik vor. Gegenüber dem Vorjahr haben die Epidemien um 5 auf 69 zugenommen, wobei zu berücksichtigen ist, daß es sich in 17 Fällen um Einzelhaus-

haltungen handelte, die früher kaum in die Statistik gelangten.

In sechs Epidemien wurden Bazillenausseider als Infektionsquelle festgestellt, darunter ein Hund, was Heymann schon vor einer Reihe von Jahren als möglich und wahrscheinlich hinstellte. In zwei Epidemien erfolgten nach Genuß von Gänse- und Fischfleisch (Hecht und Flunder) Vergiftungen. Der Anteil von Pferdefleisch an den Fleischvergiftungen hatte weiter abgenommen. In den positiven bakteriologischen Untersuchungen von 46 Epidemien wurden dreißigmal Fleischvergifter, dreimal Botulinus und dreizehnmal Proteus und ähnliche Keime festgestellt. Rund 77 Prozent aller Erkrankungen erfolgten nach dem Genuß zerkleinerten Fleisches. In zwei Fällen bildete Gefrierfleisch das Ausgangsmaterial der Infektion. In 72,5 Prozent aller Fälle muß eine postmortale Infektion, in 20 Prozent muß eine intravitale Infektion angenommen werden, darunter in drei Fällen nach ordnungsmäßigen Schlachtungen und in elf Fällen nach Notchlachtungen, in drei von den letzten Fällen war eine Fleischbeschau überhaupt nicht vorgenommen worden, drei waren entgegen den Vorschriften nicht von Tierärzten beurteilt worden.

1926 ist die Gefahr der Fleischvergiftungen nach Notchlachtungen nur $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ so groß gewesen als 1924/1925, was durch die häufigere Anwendung der bakteriologischen Fleischuntersuchung zu erklären ist.

Bei den jetzt übereinstimmend zu ca. 70% angenommenen postmortalen Infektionen sieht man, wie schwierig die Entstehung vieler Fleischvergiftungen zu eruieren ist. Bazillenträger bei Menschen und auch Tieren spielen eine große Rolle, vorstehend erwähnte ich einen Hund und einen Schweinedarm als Zwischenträger. Auch Mäuse- und Rattenschädlinge spielen dabei eine Rolle, wie die Veröffentlichungen von Neufeld und mehreren andern beweisen. Im besetzten Belgien haben nach Ickert 1915 einmal spontan erkrankte Ratten ein Rinderviertel infiziert, von 40 Mann erkrankten 20, davon fünf nur leicht, die übrigen drei Viertel des Rindes wurden ohne Gesundheitschädigung verzehrt. (C. f. Bakt. 1915, S. 142 ff.) Rattentyphuskulturen haben auch schon lebende Rinder in ganzen Beständen infiziert. Ein Auslegen von rattenschädlichen Bakterien in Fleischbewahrungsräumen wurde deshalb vielfach verboten. Noch am 10. Dezember 1927 ordnete der Polizeipräsident von Berlin an, daß das „Auslegen von bakterienhaltigen Mäuse- und Rattenvertilgungsmitteln in Betrieben, in denen Fleisch, Fleischwaren, Wild, Geflügel, Fische, Weich- und Krustentiere und Milch aufbewahrt und feilgehalten werden, verboten ist“.

Mit Recht schreibt deshalb Hübner in seinem klassischen Buch über die Fleischvergiftung, daß eine Fleischvergiftung kein einfacher Vorgang, sondern das Produkt einer Reihe komplizierter Prozesse ist.

Die bei Kälbern beobachteten Fleischvergifter und ähnliche bei der Schweinepest vorkommenden Keime sind vom Menschen oft ohne Gesundheitschädigung aufgenommen worden.

Eine korrekte Fleischbeschau, unterstützt durch die bakteriologische Fleischuntersuchung besonders bei verdächtigen Darmerkrankungen der Schlachttiere, vermag aber doch einen großen Teil der Fleischvergiftungen zu verhüten, wobei auch die Nahrungsmittelkontrolle eine große Rolle spielt, die den Genuß zu alten und faulen Fleisches verhindern muß. 1925 wurden in Preußen von 20 189 bakteriologischen Fleischuntersuchungen 827mal Fleischvergifter ermittelt. In schlechten Räumen zu lange aufbewahrtes Fleisch kann leicht postmortal infiziert werden. Fleischer und deren Angehörige und das Küchenpersonal sind oft Bazillenausseider und können leicht das Fleisch in den Aufbewahrungsräumen infizieren.

Entgegen der Anschauung vieler Ärzte kann auch faules Fleisch oft gesundheitschädlich wirken, wie schon die vor-

stehend angegebenen Statistiken über die letzten Jahre beweisen. Meyer hat schon vor etwa 20 Jahren 600 Fälle mit etwa 1 Prozent Mortalität zusammengestellt. Die dagegen immer wieder herangezogenen faulen Eier der Chinesen sind nicht faul, sondern haben einen eigentümlichen Gärungsprozeß durchgemacht, der dem bei der Herstellung vieler Käseforten entspricht.

Der gefährliche Botulismus oder die Wurstvergiftung endlich mit ihrer ca. 40 Prozent Mortalität stellt eine besondere Infektion mit anaeroben Keimen oder deren Toxinen dar, die auch statistisch aus den Fleischvergiftungen herausgenommen werden müßte, da diese Vergiftung mit dem Fleisch zwingend nichts zu tun hat und z. B. in dem klassischen Konservenlande Nord-Amerika oft nach dem Genuß konservierten Spinats und konservierter Bohnen beobachtet wird; solche Fälle sind auch in Deutschland beobachtet worden. Soviel über die Fleischvergiftungen. Der Zwang, alle noch zu genießenden Tiere der Fleischbeschau zuzuführen, hat besonders zur Eindämmung des auch für den Menschen so gefährlichen Milzbrandes beigetragen. Von 1892—1912 sind in Deutschland 1887 Seuchenausbrüche an Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rinderseuche, welche beide letzteren Krankheiten aber nur eine geringe Rolle spielen, durch die Fleischbeschau ermittelt worden. Der lokale Milzbrand des Schweines, der durch Verfütterung von mit Milzbrandsporen verunreinigtem ausländischen Fischmehl entsteht, ist erst durch die Fleischbeschau in Bremen, durch Elsässer und Siebel, ätiologisch aufgeklärt worden. In Hamburg wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 1914 gelegentlich der Fleischbeschau 589 solcher Milzbrandfälle beim Schwein ermittelt. Mit der Drosselung der Einfuhr solchen Mehles nach Kriegsanfang hörten diese Milzbrandfälle sofort auf. Von 1886—1915 erkrankten in Deutschland 3799 Menschen an Hautmilzbrand, darunter 538 tödlich und zwar viele Fleischer, Abdecker, Schäfer und solche Leute, die bei Notchlachtungen geholfen hatten. Durch die Sperre der Einfuhr ausländischer Häute und Haare, die die zweite Infektionsquelle für den Milzbrand des Menschen bilden, ging die durchschnittliche Erkrankungsziffer von 275—280 Milzbrand-erkrankungen 1917 auf 34 erkrankte Menschen zurück. 1924 sind in Deutschland 135 und 1925 im ganzen 173 Menschen an Milzbrand erkrankt, von denen 1925 34 Menschen starben. Von diesen 173 Menschen hatten sich 91 bei Schlachtungen und 62 in Gerbereien und Roßhaarspinnereien infiziert. Die vom Auslande mit Häuten, Haaren, Borsten usw. eingeschleppten Milzbrandsporen haben also jetzt fast dieselbe Bedeutung, wie der noch im Inlande vorhandene Milzbrand. Von 35 400 im Potsdamer Veterinäruntersuchungsamt mittels serologischer Methoden untersuchten ausländischen Trockenhäute wurden 267 Milzbrandhäute ermittelt, bei 6100 untersuchten Salzhäuten keine einzige (T. R. 1926, S. 901).

Die Tollwut besitzt für die Fleischbeschau geringe Bedeutung. Übertragung von Tollwut durch Fleischgenuß ist bisher einwandfrei noch nicht beobachtet worden. Eine Pressenotiz aus der letzten Zeit, daß in Steiermark nach dem Genuß gepökelten Fleisches eines an Tollwut gestorbenen Ochsen eine ganze Familie erkrankt und fünf davon an Tollwut gestorben seien (D. S. Z. 1927, S. 426), verdient wenig Glauben. Immerhin ist die Möglichkeit vorhanden, wie die Versuche von Fermi und Remlinger an Ratten und Mäusen beweisen.

Größer ist die Bedeutung der Fleischbeschau für die Rotzbekämpfung. Von 1892—1912 sind in Deutschland 351 Rotzfälle durch die Fleischbeschau ermittelt worden, 1922/23 waren es 68 Fälle.

Dieser Aufdeckung durch die Fleischbeschau dient die Vorschrift, daß bei jedem Schlachtpferd der Kopf in der Längsrichtung neben der Mittellinie gespalten werden muß, damit die herausgenommene Nasenscheidewand neben der

Luftröhre, Kehlkopf, Nasenhöhlen und Nebenhöhlen genau auf Rotz untersucht werden können. So und mit Hilfe der serologischen Bekämpfung ist der Pferderotz und damit auch der Menschenrotz in Deutschland fast ganz getilgt. Im Februar 1927 bestand nur in einem deutschen Pferdebestand Rotz, augenblicklich ist das wieder bei etwa zehn Beständen der Fall; die wenig beschützte komplizierte Ostgrenze bildet immer wieder die Gefahr der Rotzeinschleppung.

Mit der Verhinderung der Aphthenseuche (Maul- und Klauenseuche) beim Menschen hat die Fleischhygiene wenig zu tun, das muß mehr Aufgabe der Milchhygiene sein, da meistens die Milch solche Ansteckungen vermittelt, die auch zum Tode führen können, wie zwei Fälle in Süddeutschland vor einigen Jahren beweisen.

Auch der Genuß des Fleisches rotlaufkranker Schweine hat nachweislich Gesundheitschädigungen beim Menschen noch nicht erzeugt, jedoch sind bei Kindern mehrfach Rotlaufbazillen im Darminhalt nachgewiesen worden. Nicht so selten sind Hautinfektionen gelegentlich der Fleischbeschau bei Trichinenschauern und beim Schlachten rotlaufkranker Schweine beobachtet worden.

Einen größere aber immer noch stark umstrittene Bedeutung kommt der Tuberkuloseinfektion namentlich der Kinder vom kranken Tiere und auch vom kranken Schlachtvieh her zu. Diese schwierige Frage kann hier natürlich nur ganz kurz gestreift werden. Am Berliner Schlachthofe sind ständig fast die Hälfte aller Kühe tuberkulös befunden worden. Die quoad-Infektion des Menschen, sehr wichtige Eutertuberkulose, die auch oft latent auftritt, wird bei 0,1 bis 0,3 Prozent aller Kühe in Deutschland gefunden, dieselbe ist stets offen, es werden also ständig Tuberkelbazillen mit der Milch ausgeschieden. Die Fleischbeschau hat die große Aufgabe, besonders durch Anzeige der Eutertuberkulosefälle die betreffenden Rinder und Kälberbestände zu sanieren und so die Erzeugung tuberkelbazillenfrierer Milch zu ermöglichen.

Nach Klimmer sind von 637 bis 16 Jahren alten tuberkulösen Kindern 27 Prozent, also über ein Viertel mit dem Typus bovinus infiziert gewesen. Für die Infektiositätigkeit des Typus bovinus als Kontaktinfektion hier nur zwei Beobachtungen der letzten Zeit. Kirchner stellte 1922 im Institut Robert Koch in 12 von 23 Lupusfällen = 52,17 Prozent der Fälle den Typus bovinus fest; bisher waren in Deutschland nur 13,5 Prozent festgestellt worden und der Kirchner'sche Befund überragt den Befund der englischen Kommission noch um 7 Prozent Bovinusfälle.

Einem bei der Berliner Fleischbeschau beschäftigten jungen Tierarzt mußten vor zwei Jahren die ersten beiden Glieder des linken Zeigefingers wegen tuberkulöser Sehnencheidenentzündung amputiert werden; Lydia Rabinowitsch stellte in den tuberkulösen Veränderungen den Typus bovinus fest.

Jedenfalls wird durch die Fleischbeschau eine ungeheure Menge tuberkulöser Materials unschädlich gemacht. Im Jahre 1913 waren das am Berliner Schlachthofe etwa 5½ Millionen kg an Eingeweiden und Tierkörpern.

Bezüglich des bei der Schweinepest als Begleitbakterium und normal im Schweinedarme oft beobachteten *B. suis* pestifer, der biologisch zu den Fleischvergiftungen zu rechnen ist, ist zu sagen, daß Schädigungen nach dem Genuß auch nicht gekochter Eingeweide und Fleishteile bisher nicht beobachtet worden sind. Auch bei den mit den Schweinedärmen hantierenden Personen ist bisher eine Infektion einwandfrei nicht erwiesen worden, was ja oft der Fall sein müßte, wenn dieser Bazillus eine ausgesprochen menschenpathogene Eigenschaft hätte. Dasselbe ist auch bei den oft bei Kälbern gefundenen Gärtnerbazillus der Fall.

Die Aktinomykose oder Strahlenpilzkrankheit kann nach allen Erfahrungen kaum von den häufig kranken

Tieren auf den Menschen übertragen werden und noch weniger erscheint eine Infektion durch den Fleischgenuß möglich. Und doch erscheint die Ausrottung des Erregers, auch durch die Fleischbeschau, sehr erwünscht, denn 1924/25 starben im Reiche 77 Menschen an Aktinomykose, darunter 47 männlichen und 30 weiblichen Geschlechts.

Von größter Bedeutung für die öffentliche Gesundheitspflege sind die nun folgenden parasitären Zoonosen, die fast nur im eigentlichen Fleisch der Schlachtvieh vorkommen, und, bei dem immer mehr steigenden Konsum rohen Fleisches, im Gegensatz zu der früher üblichen Zubereitung der Fleischspeisen, den Menschen leicht infizieren können. Schon aus historischen Gründen ist hier, wie ich schon in der Einleitung erwähnte, die Trichinose zu nennen. Die in Hettstedt und Hedersleben gestorbenen 129 Menschen gaben den Anstoß zur heutigen, aber immer noch nicht in ganz Deutschland, vorgeschriebenen Trichinenschau. Von den damaligen vier Lieblingssitzen wurden 24 mikroskopische Präparate untersucht. Der Prozentsatz der ermittelten Trichinen ging bald stark zurück, in Preußen von 1886 bis 1911 von 0,05 auf 0,005 Prozent, also ein Zehntel, und so ähnlich auch im Reiche. Von 1899—1912 kamen 537 Erkrankungen mit 22 Todesfällen vor. 1913—1919 allein 326 Erkrankungen mit 76 Todesfällen, was durch die Kriegs- und Nachkriegsschwierigkeiten und die häufigen Infektionen bei den Truppen, besonders im Osten, erklärlich erscheint.

Wenn sich immer noch Trichinosen zeigen, so darf man nicht vergessen, daß noch vielfach in Deutschland, besonders auch bei Hauschlachtungen, auf die Trichinenschau verzichtet wird. Württemberg hat dieselbe, und auch noch unter Einschränkungen, erst 1927 eingeführt. Zwei Tage nach der Einführung in Tübingen fand man ein trichinöses Schwein. In Bayern und Hessen ist noch heute die Trichinenschau, außer in einigen Städten, noch nicht obligatorisch. Dazu kommt noch, daß die Trichinose früher häufig mit Typhus, Miliartuberkulose und Fleischvergiftung verwechselt wurde und heute die ärztlichen Untersuchungen genauer sind.

Am Berliner Schlachthof wurden von 1883—1927 zusammen 4411 trichinöse Schweine ermittelt. Die absoluten Zahlen schwankten von 342 in 1888 auf 0 in 1919, in welchen Jahren allerdings nur 20 000 Schweine geschlachtet wurden.

Das prozentig höchste Jahr ist das Nachbarjahr 1918 mit 0,114 Prozent, weil einige serbische Schweine geschlachtet wurden, also 1 : 900, während wir 1927 den Tiefstand mit 0,00063 Prozent erreichten, was einem trichinösen Schwein auf 158 000 untersuchte Schweine entspricht. Die Zahl für 1918 beweist die Gefahr der Trichineneinschleppung vom Auslande her, daselbe werden wir auch bei den Schweinefinnen finden.

Am besten wird nachstehende Kurve die Berliner Verhältnisse illustrieren. Die Technik der Trichinenschau ist jetzt vereinfacht und verbilligt. Von nur einer Probe, dem Zwerchfellteiler, sind 14 Präparate vorgeschrieben, die an größeren Schlachthäusern jetzt meistens mittels der Projektions-Trichinenschau, durch Trichinoskope untersucht werden, am Berliner Schlachthof haben wir augenblicklich 77 Trichinoskope und weitere werden folgen, denn an der Höchstschlacht von 1½ Millionen Schweinen jährlich vor dem Kriege, fehlt augenblicklich noch nicht ¼ Million. Außer beim Schwein und Wildschwein kommen Trichinen auch vor bei Ratten, Hund, Fuchs, Marder, Iltis, Katze, Waschbär, Nilpferd, Bären und dem Dachs. Nach einem der üblichen Dachsfleischessen ereignete sich einmal in Eberswalde eine gefährliche Trichinoseepidemie. Im vorigen Jahre beobachtete ich den Tod von fünf wertvollen Eisbären einer Menagerie an Trichinose, Infektion wahrscheinlich durch Aufnahme von, nach einer Rattenbekämpfung in einem fremden Zirkus tot herumliegenden Ratten.



Vielleicht ist es kein Zufall, wenn sich in zehn bösartigen Geschwülsten des Menschen Trichinen fanden.

Sehr schwache Trichinosen beim Schwein können durch die Trichinenschau übersehen werden, was aber belanglos ist, da nach Rupperecht bei weniger als 1 Million Trichinen im menschlichen Körper Krankheitsercheinungen nicht auftreten. Mir gelang es zwar mit 50 Trichinen Schweine trichinös zu machen, jedoch war die Invasion so schwach, daß sie nur durch stundenlange genaueste Untersuchung vieler Präparate aufgedeckt werden konnte.

Von den gesundheitschädlichen Finnen ist die Schweinefinne der *Cysticercus cellulosae* die gefährlichere, da sie in Finnenform durch Autoinfektion auch Auge und Gehirn des Menschen befällt und deshalb auch tödlich wirken kann. Die Trichinenschau, wo sie allein ohne Fleischschau geübt wird, deckt auch oft Fälle von Schweinefinnen auf. Nach Inkrafttreten des Reichsfleischschaugesetzes hatten auch die Schweinefinnen stark abgenommen, besonders auch durch den Umstand, daß sie meistens in mehreren Exemplaren und oft in Massen in einem Schweine auftreten, so daß sie nicht gut übersehen werden können. In Deutschland hatte die Prozentzahl von 1904–1913 von 0,026 auf 0,008 abgenommen, also auf ein Drittel, 1918 stieg die Prozentzahl infolge der Schweineeinfuhr aus dem Osten und Südosten auf 0,076, also das dreifache der Prozentzahl von 1904.

Die Bandwurmbrot kann viel leichter in das Inland verschleppt werden als z. B. die Trichinen, da ständig Bandwurmeier mit dem Kot abgeschieden werden und die Infektion des Haustieres, besonders auch bei den Rinderfinnen, nur eine Abortfrage ist, denn bei Rindern erfolgt die Infektion oft auf den Weiden. Es ist deshalb wieder mit dem Ansteigen der Zahl der Schweinefinnen zu rechnen, da viele deutsche Soldaten sich im Osten eine *Tania solium* erworben haben, und nun oft die Bandwurmbrot mit ihren Fäzes verbreiten, da sie den Wurm nach Braun jahrelang besitzen können, ohne auch nur eine Ahnung davon zu haben.

Das hat sich schon durch die jetzt häufiger auftretenden

gefährlichen Augen- und Gehirnfinnen bemerkbar gemacht. Die Augenärzte Hirschberg in Berlin und Cohn in Breslau haben seit 1895 und 1890 unter vielen tausend Patienten keine Augenfinnen mehr. Wolfsberg sah seit 1890 nur eine Augenfinne und dieser Patient stammte aus Rußland.

Auch die Gehirnfinne, an dem die Menschen oft sterben, war nach Einführung der Fleischschau in Berlin auf ein Zehntel zurückgegangen. Das hat sich jetzt gründlich, aber hoffentlich nur vorübergehend, geändert.

v. Hippel und Schenk berichteten 1913 über vier Augenfinnen. Schenk berichtete 1920 über einen Todesfall eines 31jährigen Mannes an *Hirncysticercus*. Benda und Rößle beobachteten 1920 und 1921 ebenfalls Gehirnfinnen. John berichtet 1921 über 50–60 Finnen in der Brusthöhle und unter der Haut, und über einen tödlichen Gehirnanfall. Pillat berichtete 1920 über einen glücklich operierten Augenfinnenfall. Nach demselben Bericht hatte in Polen nach Abzug der deutschen Fleischschau Bandwurms- und Finnenkrankheit wieder erheblich zugenommen. Auch Herrenschwand und Uthoff berichteten über Zunahme der Augenfinnen nach dem Kriege.

Ein mir befreundeter Kreistierarzt aus Mitteldeutschland erzählte mir noch in diesem Jahre, daß in seinem Kreise jetzt überraschend oft Schweinefinnen gefunden würden, während das nach den Berichten früherer Jahre so gut wie niemals der Fall war.

Die Häufigkeit der Schweinefinne am Berliner Schlachthofe in den letzten 45 Jahren zeigt folgende graphische Darstellung, die, wie bei den Trichinen, auch für 1918, dem Jahr der Schlachtung von einigen serbischen Schweinen, ein Ansteigen der Schweinefinnen zeigt. In diesen 45 Jahren sind 26 995 finnige Schweine ermittelt worden.

Lieblingssitze der Schweinefinnen sind Herz und Zunge, und in Ost- und Südost-Europa sind die Schweinefinnen so häufig, daß man beim Kauf oft die Zunge des Schweines herauszieht, um durch Durchtaften derselben festzustellen, ob dieselbe keine Finnen enthält. 1923 wurden in Deutschland 0,006 und 1924 nur 0,0045 Proz. Schweinefinnen gefun-



Statt 1883—1932 ist zu setzen: 1883—1927.

den; es ist also zu hoffen, daß durch die jetzt wieder korrektere Fleischbefchau die Schweinefinnen bald wieder so eingedämmt werden, daß Pathologen, wie vor dem Kriege, Prämien für das Abliefern einer *Tania solium* aussetzen müssen.

In zwei Fällen aber scheint die Gefahr des *Cysticercus cellulosa* überhaupt geschwunden. Bis vor wenigen Jahren nahm man an, daß die verhältnismäßig häufigen Schaf- und Rehfinnen *Cysticercus cellulosa* seien, bis amerikanische und dänische Forscher aus diesen, der Schweinefinne sehr ähnlichen Finnen, im Darm des Hundes lebende Bandwürmer züchteten.


Schwieriger zu bekämpfen als die *Tania solium* ist der von der Rinderfinne abstammende häufigste Bandwurm des Menschen die *Tania saginata*. Das liegt daran, daß die Rinderfinne sich sehr spärlich und meistens nur in einem Exemplar bei den Rindern bei der vorgeschriebenen Untersuchung vorfindet; das demonstrierte Kaumuskelfstück eines einfinnigen Rindes und ein Stück Schweinefleisch, das ich 1913 von der galizischen Front erhielt, mögen diese Unterschiede bei der Bekämpfungsmöglichkeit beider Bandwürmer beweisen. Der betr. Hauptmann fragte an, was denn die weißen Perlen in dem Fleische bedeuteten. Lange Jahre war der Lieblingssitz der Rinderfinnen überhaupt unbekannt. Erst 1888 gelang es der Berliner Fleischbefchau, gelegentlich von Rinderpestuntersuchungen, die Kaumuskeln als Lieblingssitze der Rinderfinnen zu ermitteln. Jetzt schnellte die Zahl der gefundenen Finnen plötzlich in die Höhe. In fünf Jahren fand man vier Fälle, nach Anschneiden der Kaumuskeln fand man jährlich hunderte, und in einzelnen Jahren sogar über tausend Fälle allein in Berlin. Die von der Rinderfinne abstammende *Tania saginata* ist auch durchaus kein harmloser Parasit; bei schwächlichen und nervösen Frauen vermag dieser Bandwurm bedenkliche nervöse und Magenerkrankungen auszulösen, wie ich aus mehrfachen persönlichen Beobachtungen weiß. Die *Tania saginata* ist auch verhältnismäßig schwer abzutreiben. Im Jahre 1924

mußte ein Berliner Fleischermeisterföhn kurz vor einer sonst tödlichen Perforativperitonitis operiert werden; in dem erweiterten Wurmfortsatz fand sich eingeklebt ein Bandwurmkopf nebst Hals. Von Pathologen sind ähnliche Fälle berichtet worden.

Nach Braun macht auch die *Tania solium* solche Wurmabszesse. Es lohnt sich also, auch die Rinderfinne energisch zu bekämpfen, wie es auch im Reichsfleischbefchausegesetz erstrebt wird.

Wegen des spärlichen Vorkommens an versteckter Stelle haben aber die Rinderfinnen bei weitem nicht so abgenommen wie die Schweinefinnen. Infolge der aus naheliegenden Gründen mangelhaften Untersuchung während und nach dem Kriege glaubten Nurstatistiker eine starke Abnahme der Rinderfinne annehmen zu können, was aber durchaus nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Die Rinderfinnen hatten im Reiche von 1904—1909 von 0,19—0,25 Prozent zugenommen, dann aber anscheinend bis 1918 wieder bis 0,15 Prozent abgenommen, was aber durch die mangelhafte Kriegsuntersuchung und Statistik leicht erklärlich ist. Bis 1924 hatte die Prozentzahl im Reiche wieder auf 0,18 Prozent zugenommen. Die folgende graphische Darstellung der Rinderfinnen in den letzten 45 Jahren am Berliner Schlachthof beweist, wie stark die Rinderfinnen nach dem Kriege wieder zugenommen haben, oder nach meinen Erfahrungen vielmehr, daß aus durchaus zu entschuldigenden und erklärlichen Gründen die Kriegsnotwendigkeiten eine genaue Untersuchung und eine dementsprechende Statistik nicht zuließen. Im ganzen wurden in diesen 45 Jahren am Berliner Schlachthofe 27.481 finnige Rinder ermittelt.

Nach Beschreibung dieser eigentlichen durch den Fleischgenuß vermittelten Zoonosen will ich noch ganz kurz auf zwei indirekte parasitäre Zoonosen eingehen, bei denen die Schlachttiere nur einen Zwischenwirt darstellen, bei denen aber durch Vernichtung des betreffenden Parasitenstadiums



Statt 1883—1932 ist zu setzen: 1883—1927.

der Mensch vor der entsprechenden Krankheit bewahrt wird.

Das ist erstens die gefährliche Echinokokkenkrankheit bei Menschen und Tieren, die sie sich nur von dem mit der kleinen *Tania echinococcus* behafteten Hund holen können. Der Hund infiziert sich meistens mit den nicht bechlagnahmten mit Hüllwürmern behafteten Eingeweiden des Schafes, die ihm gewohnheitsmäßig bei der Schlachtung von Schafen, besonders auf dem flachen Lande, vorgeworfen werden. Die Rinderechinokokken sind meistens ohne Kopfanlagen, können also den Hund nicht infizieren. Deshalb erkranken besonders Menschen in Ländern mit Schafhaltung und nicht obligatorischer Fleischbeschau bei Hauschlachtungen; in Deutschland vornehmlich in Mecklenburg und Vorpommern. Während und nach dem Kriege mußte die Fleischbeschau vielfach vernachlässigt werden. Nach Schlachthofberichten hatte die Hüllwürmerkrankheit besonders in Schweinelebern sehr stark zugenommen und auch starken Charakter angenommen, so daß vielfach Ganzbeanstandungen wegen vollständiger Abmagerung erfolgen mußten. In Berlin fanden wir einmal eine mit Hüllwürmern behaftete Rinderleber, die 140 Pfund wog. In Stralsund waren 1926 25,6, 12,1 und 16,6 Prozent aller geschlachteten Rinder, Schweine und Schafe mit Echinokokken behaftet.

In Rostock mußten 1919 drei Menschen, 1920 aber zwölf Menschen wegen Echinokokken operiert werden; bei 0,27 Prozent aller Bauchschnitte fanden sich als Nebenbefund Echinokokken.

In Leipzig wurden nach dem Kriege unter hundert untersuchten Hunden dreimal die *Tania echinococcus* gefunden, während früher nur sehr gelegentlich diese Tanie beim Hund gefunden wurde.

Bedenklich für die Erkrankung der Hüllwürmerkrankheit beim Menschen ist der Umstand, daß die Hüllwürmer oft nur sehr langsam wachsen und deshalb erst nach Jahren Krankheitserscheinungen machen können.

Die Prophylaxie gegen diese gefährliche Krankheit ist

gegeben durch eine sorgfältige Fleischbeschau auch bei Hauschlachtungen und wirkliche unschädliche Beseitigung aller mit Hüllwürmern behafteten Eingeweide, und durch Vorsicht im Verkehr mit Hunden, die außerdem auch noch auf Kinder einen Bandwurm übertragen können, wie bisher beobachtete ca. 70 Fälle beweisen.

Endlich will ich noch kurz die nach feuchten Sommern für die Rinder- und Schafzucht sehr gefährliche Leberegelkrankheit erwähnen; noch vor wenigen Tagen mußten von 199 fast ein Jahr alten Schafen am Berliner Schlachthof 100 Schafe wegen Leberegelkachexie für untauglich und 46 für minderwertig erklärt werden. Nach neuesten Erfahrungen kommen auch tödliche Erkrankungen bei Menschen in den an Egeln sehr reichen Leberegeljahren vor. Das Franz-Joseph-Spital in Wien veröffentlichte 1927 zwei Todesfälle bei einem Knaben von vier Jahren und einem 22jährigen Manne und die prompte Heilung eines 14jährigen Zigeuners durch ein in der Veterinärpraxis übliches Filixpräparat (Distol, Filinol). Der Verfasser Fr. Paul empfiehlt, die Landbevölkerung in Leberegeljahren vor dem Genuß von Bachwasser, rohem Gemüse aus Sumpfgenden, und dem Kauen von Grashalmen und Sauerampfer zu warnen und ist der Meinung, daß die jetzt aufmerksam gewordenen Ärzte in Zukunft wohl häufiger Leberegelzeuchenfälle beim Menschen feststellen werden.

Im Vorstehenden habe ich nur einen kurzen Überblick über die dem Menschen direkt und indirekt von Fleischgenuß her drohenden Gefahren geben können. Die Erfolge der Fleisch-Hygiene und Fleischbeschau auf vielen Gebieten sind nicht abzustreiten, sie sind z. T. durch den Weltkrieg und dessen Folgen in Frage gestellt worden und dürfen nicht dazu verleiten, in den allgemeinen fleischhygienischen Bestrebungen nachzulassen.

Auch von diesen Bestrebungen gilt der Spruch des Altmeisters Goethe:

Nur der verdient sich Freiheit und das Leben
Der täglich sie erobern muß.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Gruber, G. B.: Die Pathologie der Trichinose. (Münch. med. Wschr. 1927, 42, S. 1790.)

Unsere Vorstellungen über die Pathologie der Trichinose haben im Lauf der Zeiten Wandlungen durchgemacht. Wichtig ist die Kenntnis des Weges, den der Schädling im Wohntier nimmt. Die pathologischen Erscheinungen der Trichinose teilt man am besten in drei Fristen ein, 1. die der Darmtrichinose, der Trichinellenverbreitung und der Muskeltrichinose; die erste Frist ist ausgezeichnet durch die Wirkung der in den Magen aufgenommenen Trichinellen, welche sehr schnell geschlechtsreif werden und mit der Fortpflanzung beginnen. Nach akuter Trichinose findet man nach 5—6 Wochen nach der Infektion im Darm noch lebende und trüchtige Muttertrichinellen; englische und russische Autoren behaupten auch, daß man im Stuhl akut trichinöser Menschen doch reichlich Darmtrichinellen findet. Die zweite Frist beginnt mit der Ausstoßung der Jungtrichinellen in das Zottengewebe der Darmwand bzw. deren Chylusgefäße; sie führt bei regelmäßigem Verlauf zum Eindringen der Würmchen in die quergestreifte Muskulatur; neben dieser kommt die Einwanderung auch in andere Organe vor, in die Pleura und das Lungengewebe, ins Herz und zwar in alle feine Teile, ins Gehirn, ins Auge; die dritte Frist dehnt sich unbegrenzt mit dem Leben des Kranken aus; es kommt zunächst zur Kapselbildung und dann zur Aufnahme von Kalksalzen. Oftmals findet man, eine Aufspaltung oder Resorption der Trichinenkapsel durch Granulationsgewebe, das nun den Sitz der ehemaligen Trichine ausfüllt und schließlich eine unscheinbare öde Narbe. Man spricht auch von einer „Trichinellenelimination“. Die pathologisch-anatomische Betrachtung der Trichinose in diesen drei Fristen läßt die meisten Krankheitsercheinungen verständlich erscheinen, restlos lassen sie sich aber mit der Annahme von Kapillarverstopfungen nicht erklären. Man mußte deshalb bald eine toxische Wirkung der Trichinellen annehmen. Flury und Groll haben zuerst einen Einblick in das verschiedene Wechselverhältnis zwischen Trichinelle und Wirtstier gewährt. Darnach entstehen zweifellos im trichinösen Muskel stark reizende Substanzen saurer, neutraler und basischer Natur, unter denen flüchtige Fettsäuren, Milchsäure und den Purinbasin verwandte Stoffe in Frage kommen sollen. Extrakte trichinöser Muskeln erwiesen sich als giftig, wenn man sie Hunden, Katzen, Fröschen, intravenös oder subkutan einverleibte. Bewegungsstörungen, Steifigkeit, Schmerzen, auch Koliken, Gastroenteritis mit Blutaustritten, selbst der Tod traten ein.

Mit der Bewältigung der verirrtten Jungtrichinellen und mit der Einkapselung der muskulären basophilen Trichinellenköpfe, welche wie lokale Giftfänger zu wirken scheinen, hört die Reizwirkung des Wirtsorganismus auf und ist die akute Krankheit überwunden. Schmey.

Herrenschwand: Über die Beteiligung des Augapfels an der Trichinellen-Einwanderung bei menschlicher Trichinose. (Archiv von Graefe für Ophthalmologie 1927, Bd. 119, H. 2.)

Aufzeichnungen über pathologisch-anatomische Befunde am Augapfel bei Trichinose finden sich in der pathologischen Literatur nicht vor. Verf. beschreibt den Fall einer 38jähr. Köchin, die an Trichinose gestorben war; es fanden sich vor: Schwere Darm- und Muskeltrichinose, Jungtrichinellen im Herzbeutelliquor, im Liquor cereбрalis und im Pleuraexsudat. Die Verhältnisse an der Augenmuskulatur wurden näher gewürdigt. Es ergab sich, daß in allen Augenmuskeln eine sehr große Anzahl von ausgewachsenen und eingekapselten Trichinen vorhanden war. Im Gegensatz zu ihrem sonstigen Verhalten an der übrigen Skelettmuskulatur, wo sich die Trichinen gerade vor den Sehnen dicht zusammenzudrängen pflegen, ließen sie an den Augenmuskeln ein beträchtliches Stück vor dem Sehnenansatz frei. Die Zahl der Trichinen an den Augenmuskeln war auffallend groß, sie

übertraf die in der anderen Skelettmuskulatur wesentlich. In den peripheren Teilen der Netzhaut, in der Gegend der ora serrata, wurden einige knötchenförmige Herde festgestellt, im ganzen zehn und in sechs von ihnen lag eine Jungtrichinelle. Die Entdeckung der Jungtrichinellen in der Netzhaut kam durchaus unerwartet und überraschend. Bisher hatten weder klinische noch anatomische Anhaltspunkte irgend welcher Art einen Hinweis darauf gegeben. Eine Augenspiegeluntersuchung hatte nicht stattgefunden. Wenn auch im vorliegenden Falle die wandernden Parasiten im strömenden Venenblut nicht nachgewiesen werden konnten, so deuten doch die krankhaften Veränderungen in der Netzhaut eindeutig daraufhin, daß die Trichinellen dorthin auch auf dem Wege der Blutbahn gelangt sind und in den feinen Kapillaren der Netzhaut ihr Endziel erreicht haben. Zwischen den verdeckten hyalinisierten und zum Teil dilatierten Wandungen der wahrscheinlich wohl auch obliterierten Gefäßchen dürften sie dem Untergang geweiht gewesen sein. Irgendein Endstadium im Lumen einer Resorption, einer Vernarbung oder einer Abkapselung konnte nicht gefunden werden, vielleicht weil die Patientin nicht lange genug lebte. Besonders bemerkenswert ist die Lokalisation der Trichinen in der Augenmuskulatur; sie steht im Widerspruch zu dem in der anderen Muskulatur; während sie sich hier an den Sehnenansätzen zusammendrängen, finden sie sich dort entfernt von den Sehnenansätzen, mitten im Muskel. Daraus erklärt es sich vielleicht, daß die irrige Annahme besteht, in den Augenmuskeln kämen Trichinen nicht vor. Schmey.

Schreiner, W. und Apfelbeck, M.: Einiges über Diagnose und Behandlung der Leberegelseuche. (Tierärztl. Rundschau 1927, S. 957.)

Im Bereiche der Überschwemmungsgebiete der Donau und Isar herrschte im letzten Frühjahr die Leberegelseuche in noch nie gekannter Ausdehnung. Zahlreiche Tiere, die bereits im Januar/Februar behandelt worden waren, mußten bei Beginn der Grünfütterung einer abermaligen Kur unterzogen werden. Bei den Kotuntersuchungen fanden sich in diesen Fällen nicht die relativ großen Leberegeleier, sondern Eier mit geringeren Ausmaßen, die offenbar von jüngeren, noch nicht ganz ausgewachsenen Leberegeln stammten, so daß wohl an eine neuerliche Invasion gedacht werden muß. Seit September sind keine weiteren Fälle von akuten Leberegelerkrankungen festgestellt, doch gehört es zu den außergewöhnlichen Seltenheiten, wenn bei der Fleischbeschau einmal eine Leber frei von Distomen gefunden wird. Da Millionen von Leberegeleiern mit dem Stallmist auf Wiesen und Felder gebracht werden, die bei der vorhandenen Wärme und Feuchtigkeit günstige Entwicklungsmöglichkeiten finden, wird auch im Beginn des nächsten Jahres mit einem neuen Seuchengange zu rechnen sein. Neben den bekannten Veränderungen im Haarkleid, Abmagerung, Anämie, Nachlassen der Milchsekretion und Verdauungsstörungen konnten Verf. in den meisten Fällen in der Magengegend beim Palpieren mit dem Fingerballen ein eigenartiges, mehr oder weniger starkes Knistern verspüren. Dasselbe hat nach Ansicht der Verf. seine Ursache in einer geringgradigen Gasentwicklung innerhalb des Peritonealraumes, welche mutmaßlich auf eine peritoneale Reizung im Bereiche der Glissonischen Kapsel zurückgeführt werden muß. Der sicherste Beweis für das Vorliegen der Krankheit bleibt immer der Nachweis der Distomeneier im Kot. Zur Behandlung wurden Distol, Distol kombiniert, Filix neu, Neo-Serapis und Filinol mit meistens guten Erfolgen angewandt. Die mit Neo-Serapis anfänglich gemachten ungünstigen Erfahrungen änderten sich, nachdem der Mehltrank entgegen der Gebrauchsanweisung mit der doppelten Menge Mehl bereitet wurde. Hierauf verliefen die narkotischen Zustände weniger auffallend und erholten sich die behandelten Tiere in den meisten Fällen gut von der Seuche. K. H. Meyer.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Bedson, S. P., H. B. Maitland and Y. M. Burbury: **Further observations on foot-and-mouth disease.** (Weitere Beobachtungen über Maul- und Klauenfeuche.) (Lister inst. London.) (Journ. of comp. pathol. a. therapeut. 1927, Bd. 40, Nr. 1, S. 5—36.)

Wird mit winzigen intrakutan applizierten Virusmengen bei einer Lympheverdünnung von 1 : 100 000 beim Meerfweinchen positiver Infektionsausfall erzielt, so sind 0,5 ccm dieser Lymphe in einer Verdünnung von 1 : 50 auch intramuskulär bestimmt infektiös. Über die Immunitätsverhältnisse beim Meerfweinchen, dessen besondere Eignung zur Erforschung der Maul- und Klauenfeuche anerkannt wird, wird mitgeteilt, daß beim Vorhandensein der absoluten Immunität lokale und generalisierte Erkrankungen nicht erneut hervorzurufen sind. Besitzen die Tiere aber nur teilweisen Schutz, so tritt nach intrakutaner Infektion nur die lokale Erkrankung in Erscheinung. Es bedarf aber eines noch kleineren Immunitätsgrades, um die Auslösung besonderer Krankheitsercheinungen — nach Applikation des infektiösen Materials in die Muskulatur — zu verhindern. Um beim Meerfweinchen den Schutz künstlich hervorzurufen, kommen kleine Virusmengen intramuskulär zur Anwendung, wobei sich lokale oder generalisierte Krankheitsercheinungen nicht entwickeln. Für die Dauer von drei Monaten wird außerdem beim Meerfweinchen mit einem aus virushaltiger Lymphe mit abschwächendem Formolzusatz hergestellten Impfstoff Immunität erzielt. Die weiteren Erfolge dieses Impfstoffes haben sich je nach den Anwendungsformen derart gezeigt, daß mit 0,1—0,5 ccm Schutz gegen Generalisation des intrakutan eingeführten Virus, bei wiederholter Anwendung auch Schutz gegen lokale Erkrankung im Meerfweinchenkörper erreicht wird, während bereits 0,002 ccm einer 50fachen Lympheverdünnung nach Zusatz von 0,1 Prozent Formol gegen intramuskuläre Infektion immunisieren. Der Nachweis der Antikörper aus dem Serum dieser immunisierten Meerfweinchen wurde nicht erbracht. Zur Immunisierung wird außerdem virushaltiges Serum als brauchbarer Impfstoff angesehen und der Virusgehalt des Serums für tausendmal geringer als der der Blasenlymphe befunden. Als weitere Untersuchungsergebnisse sind zu nennen die Konservierung des Impfstoffes im Eisschrank für 197 Tage, die Gleichsetzung in der Wirkung von 0,005 ccm Formollymphe und 0,1 ccm Formolserum, sowie auch die Berechnung der in den Blutkörperchen enthaltenen Virusquantität auf den 6.—8. Teil der Gesamtvirusmenge. — Über die Haltbarkeit des Virus wird mitgeteilt, daß diese feuchte Atmosphäre ungünstig beeinflusst wird. Diese nachteilige Einwirkung wurde auch aus Untersuchungen über die Tenazität des Virus nach Antrocknung an Stroh, Heu, Kleie usw. ersichtlich und ergab eine Lebensfähigkeit des Virus unter Einwirkung 50—70 Prozent Wasserdampfes nur bis zu fünf Tagen. Verdünntes Lymphavirus (1 : 50) wurde bei 37 Grad im Brutschrank schon bis zu 7 Tagen und bei 18 Grad C über Schwefelsäure nach langamer Antrocknung an Glasplatten sogar bis zu 1 Jahr konserviert. — Übertragungsversuche des Maul- und Klauenfeuchevirus — vom Meerfweinchen entnommen — fielen nach Infektion der Zunge bei Kaninchen positiv aus. Zur Generalisation kam es nach der sechsten Passage, wenn auch nicht an den Sohlen, so doch auf der Mundschleimhaut der Kaninchen. Durch Bißwunden, die ein künstlich infiziertes Kaninchen zwei gefunden Tieren beigebracht hatte, wurde Spontaninfektion veranlaßt. Wilde und zahme Ratten wurden ebenfalls mit der Viruslymphe des Meerfweinchens infiziert, doch erkrankten die zahmen Ratten nur lokal, während bei den wilden Ratten der übliche Infektionsablauf zu beobachten war. Durch Rattenpassage wurde für das Meerfweinchen keine Virulenzabschwächung erzielt. H.

Waldmann, O. und K. Reppin: **Die Dauer der Infektiosität der Mundschleimhaut bei der Maul- und Klauenfeuche des Rindes.** (Staatl. Forschungsanst. Infel Riems.) (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilkunde 1927, Heft 4, S. 407—429.)

Die an umfangreichem Material vorgenommenen Versuche führten zu folgendem Ergebnis. Das Virus ist zuerst 9 Stunden nach der künstlichen Infektion der benutzten Ochsen und, falls die Durchfeuchtung wie gewöhnlich vor sich geht, höchstens bis zum sechsten Tage im reinen Speichel durch Übertragung auf Meerfweinchen festzustellen. Dieser letzte Zeitpunkt verschiebt sich auf den elften Tag p. i., wenn Epithel der Mundaphthen dem Speichel ganz nach natürlichen Verhältnissen beigemischt war. Die festgestellte Infektiosität der Gewebsfetzen, die von Epitheldefekten der Mundhöhle stammen, wird an Hand der dazu angestellten Versuche erläutert und mitgeteilt, daß reine Speichelpollen zu 22 Prozent und solche mit gewebigem Inhalt von denselben Tieren zu 89 Prozent ansteckungsfähig sind. Die Mundhöhle wird von den Autoren für virusfrei beurteilt, wenn die pathologisch-anatomischen Veränderungen eine totale Abstoßung der Aphthendecken und beginnende Granulation der Erosionen erkennen lassen, was spätestens am elften Tage p. i. der Fall ist. Die praktische Auswertung dieser Forschungsergebnisse für die Veterinärpolizei ist in einer wesentlichen Verkürzung der bei Maul- und Klauenfeuche vorgeschriebenen und von landwirtschaftlichen Kreisen als sehr drückend empfundenen Sperrfristen zu sehen. H.

Priewe, W.: **Die sero-therapeutische Behandlung der Maul- und Klauenfeuche mit Maul- und Klauenfeuche-Hochimmunserum.** (T. R. 1927, Jahrg. 33, Nr. 8, S. 136—141.)

Im Jahre 1926 sind in Bremen gegen die Maul- und Klauenfeuche unter Leitung von Dr. Schröder, dem Kreistierarzt am Bremischen Medizinalamt, Impfungen amtlich durchgeführt. Die in unverseuchten aber innerhalb der Gefahrenzone liegenden Beständen durch frühzeitige Impfung mit Hochimmunserum erzielte Immunität wurde nicht nur auf 10—14 Tage sondern gelegentlich auch auf mehrere Wochen bemessen. Bei simultan behandelten Tieren traten die Seuchenercheinungen gewöhnlich wesentlich abgeschwächt auf. Nur vereinzelt wurden Simultanimpfungen ohne augenscheinliche Einwirkung wahrgenommen. Die Impfung mit Serum wies bei Tieren mit erheblichen Krankheitsmerkmalen keine ausgesprochenen Heilerfolge auf. Priewe folgert aus den etwas schwankenden Impfergebnissen, die aus den ihm vorliegenden amtlichen Unterlagen ersichtlich werden, auf die Einwirkung erbter und konstitutioneller Eigenschaften. Nach Ansicht des Verf. können Tiere mit schwächlicher Konstitution, einseitiger Milchleistung oder Mangel an „Immunfaktoren“ durch das Serum nicht zur Antigenbildung angeregt werden. Andere Tiere, besonders Jungtiere, sind dagegen hierfür besonders gut veranlagt. — Pyramidon und Chinofol werden als Antipyreticum, Schwefeloxyd zur Panaritium- und eine Novocain-Chinosolsalbe zur Euter-Behandlung empfohlen. H.

Dänemark: **Zeitweilige Bekanntmachung des Landwirtschaftsministeriums, betr. Maßnahmen zur Bekämpfung der Maul- und Klauenfeuche.** Vom 14. März 1927 (Lovtidenden A Nr. 8 vom 25. März 1927). (Reichs-Gesundheitsblatt 1927, Jahrg. 2, Nr. 27, S. 504—505.)

Die dänische Bekanntmachung enthält eine Reihe von Vorschriften, durch die solches Vieh, das Märkten und Auktionen zugeführt oder exportiert werden soll, einer genauen Überwachung unterzogen wird. Viel durchgreifender als in anderen Ländern sind die zur Bekämpfung der Maul- und Klauenfeuche vorgesehenen Anordnungen, durch die den Bewohnern von verseuchten und unter amtlicher Kontrolle stehenden Gehöften sogar der Besuch von Kirchen, Schulen, öffentlichen Luftbarkeiten und Zusammenkünften jeder Art streng untersagt wird. H.

Bartels und Reimers: Über den Erfolg der Schutzimpfung mit Riemser Immunserum auf Viehmärkten, Viehauktionen und Viehauktionen in der Provinz Schleswig-Holstein. (B. T. W. 1927, Jahrg. 43, Nr. 7, S. 105—108.)

In Schleswig-Holstein wurden im Jahre 1925 und 1926 Schutzimpfungen gegen Maul- und Klauenfeuche mit Riemser Hochimmunserum in größerem Umfange durchgeführt. Mit denkbar günstigem Erfolge wurden 3000 Tiere für 20 Ausstellungen und Auktionen dieser Impfung unterzogen. Verschleppungen an Maul- und Klauenfeuche kamen danach in keinem einzigen Fall vor. Das Jahr 1926 brachte für Schleswig-Holstein die Seuche in sehr verheerendem Umfange. Nur durch die restlose, pflichtgemäße Durchführung der Schutzimpfung konnte die Abhaltung freier Märkte in Altona, Bredstedt, Husum, Leck und Niebüll genehmigt und insgesamt 29 000 Rinder zum Auftrieb zugelassen werden. Davon wurden 20 Verschleppungen der Seuche oder 30 Erkrankungsfälle registriert, während in milderer Seuchenzahl bereits von einem einzigen Markte ohne Anwendung der Schutzimpfung etwa 20 Fälle Maul- und Klauenfeuche verschleppt wurden. Durch dieses zufriedenstellende Ergebnis sind die Berichtersteller zu dem Wunsche angeregt, auch weiterhin die Durchführung der Schutzimpfungen zur Pflicht machen zu lassen. H.

Olitsky, P., K. and Frederick, L. Gates: The reaktion of vesicular stomatitis virus to ultra violet light. (Das Verhalten des Virus der Stomatitis vesicularis gegenüber dem ultravioletten Licht.) (Rockefeller inst. f. med. research, New York.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 1927, Bd. 24, Nr. 5, S. 431—432.)

Mit einer Quarzlampe wurden das Virus der Stomatitis vesicularis in Blasenflüssigkeit vom Meerschweinchen und parallel dazu Staphylokokken bestrahlt. Bei λ 2675 waren Virus und Bakterien vollkommen vernichtet, bei λ 3126 diese Strahleneinwirkung nicht eingetreten bzw. fraglich ausgefallen. Da die beiden Erregerarten in gleicher Weise reagierten, so wird darin der Ausdruck einer gewissen Übereinstimmung in der chemischen Protoplasmastruktur erblickt. H.

Zschokke, W.: Untersuchungen über Raufchbrand-Aggressine. (Schweiz. Arch. f. Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 357.)

Keimfreie Filtrate von künstlichen Raufchbrandkulturen oder von Ödemen und Peritoneal-Flüssigkeit von an Raufchbrand umgestandenen Tieren, sind für Versuchstiere, wie Meerschweinchen, Kaninchen, Schafe und Rinder subkutan verimpft, ungiftig. Leichte lokale Reaktionen (Schwellungen) sind vermutlich auf Butterfäure zurückzuführen. Schafe und Rinder ertragen bis 100 ccm praktisch reaktionslos. Raufchbrandfiltrate mit Bazillen zusammen verimpft befördern die Infektion, so daß sicher nicht tödliche Dosen zu akutem Raufchbrand mit meist tödlichem Ausgange führen: 1 ccm Kulturfiltrat die 75fach untertödliche Dosis von Sporen; 3 ccm Kulturfiltrat kann mit $\frac{1}{1000}$ der letalen Minimaldosis Raufchbrandsporen zur tödlichen Infektion führen. Dasselbe gilt für keimfrei filtrierte Ödemflüssigkeit, die mit ein Fünftel der letalen Sporen-Dosis verimpft die Infektion außerordentlich stark fördert. Vorherige einmalige Verimpfung von Raufchbrandfiltrat gibt für Meerschweinchen einen wirksamen Schutz, der auf einer aktiven antiaggressiven Immunisierung beruht. Die Schutzdosis für Meerschweinchen beträgt mindestens 1 ccm Filtrat. Der Impfschutz durch Filtrat gilt auch für Ödemfiltrat + Keime, und umgekehrt schützt Ödemflüssigkeit vor Filtrat + Keimen. Auch das Raufchbrandserum „Braue“ verleiht gegen eine sonst tödliche Infektion von Filtrat-Bazillengemisches, in Dosen von 5—1 ccm beim Meerschweinchen, passiven Impfschutz. Das Serum des Schafes, mit Kulturfiltraten mehrfach unter Steigerung der Dosis in 4 Wochen bis 300 ccm intravenös gespritzt, erwies sich ebenfalls als anti-infektionsbefördernd beim Meerschweinchen. Kleinere

Serumdosen (unter 5 ccm) vermochten nur den letalen Ausgang hinauszufchieben. Derselbe Versuch mit Raufchbrandkulturen immunisiertem Schaf ergab gegen Filtrat-Raufchbrandsporen-Gemisch einen deutlichen Schutz. Die infektionsfördernde Eigenschaft von Kultur- und Ödem-Raufchbrandfiltraten ist streng spezifisch. Sie wirken nur infektionsfördernd, wenn sie mit den Bazillen direkt in Berührung kommen: Gleichzeitige, örtlich verschiedene Impfung von Filtrat und Bazillen geben bei Meerschweinchen keine Krankheits Symptome. Die infektionsfördernde Wirkung erstreckt sich nicht auf verwandte Bazillen, wie Malignes Ödem, B. oedematis, Fränkischer Gasbrandbazillus. Die keimfreien Raufchbrandfiltrate weisen Aggressine auf, ob reine oder mit andern wirksamen Antigenen verbunden, ist noch nicht abgeklärt. Die Raufchbrand-Aggressine verlieren ihre charakteristischen Eigenschaften (Infektionsförderung, aktive Immunisierung) beim Erhitzen über 60°. Die keimfreien Filtrate behalten ihre Aggressine-Eigenschaften bei kühler, lichtgeschützter Aufbewahrung sicher während ca. 8 Monaten. Die mit Raufchbrand latent infizierten Meerschweinchen erkranken tödlich bei der Injektion des Filtrates in die abgekapselten Bakterienherde, bei der Injektion in die Nachbarschaft der Herde tritt eine ausgeprochene Heilwirkung ein, indem die erkrankten Lymphdrüsen wieder normal werden, und die Bakterienherde darin verschwinden. Die Aggressine sind schon in 20 Stundenkulturen nachweisbar, indem die Filtrate schon aggressiven Charakter zeigen. Sie müssen daher als ektogene Ausscheidungsprodukte der Raufchbrandbazillen angesehen werden. H. G.

Gabathuler, A.: Tuberkulose beim Reh. (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 390.)

Tuberkulose beim Wild ist anscheinend recht selten. Die in der Literatur angegebenen wenigen Fälle haben sich nur vereinzelt als Tuberkulose feststellen lassen. — Der von G. beschriebene Fall betrifft eine Lunge eines verendeten Rehes. Sie war mit Knoten verschiedenster Größen durchwachsen, die sich als stark verkäste Tuberkel erwiesen: Sie waren sehr stark mit Tbc-Bazillen durchsetzt. Als bemerkenswert erwähnt Verf. die Farbe der verkästen Herde, die im Gegensatz zum Rinde ockerartig-rötlich sind. Durch den Impfversuch am Meerschweinchen und Kaninchen ergab sich, daß der Typus bovinus vorlag. H. G.

Wirth, D.: Bericht über die Wutschutzimpfungen an Hunden und Pferden (1924/26). (W. t. Mschr. 1927, XIV. Jahrg., S. 654.)


Im Jahre 1925 wurden sechs, 1926 dagegen 238 Hunde der Wutschutzimpfung unterzogen. Von den 1926 geimpften erhielten 199 Hunde je 1,0 Gramm, die andern je 0,5 Gramm Karbolsäure-Virus fixe-Wien und amerikanisches Virus fixe (Lederle), beides avirulent für Kaninchen bei subduraler Injektion. Die Impfung wurde gut vertragen, bei starker Konzentration des Impfstoffs Abszesse an der Impfstelle. Impftollwut trat in keinem Fall ein. Zwei Pferde (1925) und ein Pferd (1926) wegen Ansteckungsverdacht geimpft, blieben gesund. Berge.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Fincher, M. G. und W. L. Williams: Gehemmte Entwicklung der Müllerschen Gänge, verbunden mit Inzucht. Mit 20 Abbildungen. (The Cornell Veterinarian 1926.) (Medizinische Abteilung und ambulatorische Klinik, N. Y. State Veterinary College, Cornell University.)

(Fortsetzung.)

Fall 9, Fig. 10, 11 und 12. Nachkomme von Mutter H. Wiederholt gedeckt über einen Zeitraum von einem Jahr. Am 26. Oktober 1922 preßte die Färse sehr, als ob sie versuchte, einen Fetus auszustoßen. Bei der Untersuchung konnte die Hand nicht über die Vulva hinaus bewegt werden, es wurde aber ein mazerierter, 3 inches



langer Fetus aus der Vagina mit der Zange entfernt. Geschlachtet wurde das Tier im Alter von 33 Monaten.

Die enge, konische Vulva ist 4 inches lang, und am vulvo-vaginalen Rand ist das Lumen 1 inch im Durchmesser.

Kranial zu dieser Konstruktion, welche die vulvo-müllersche Naht auszeichnet, ist eine sackähnliche Höhle, welche 3 inches im Durchmesser mißt und welche die Vagina bildet. Eine enge Zervix tritt in die Vagina links von der Mittellinie ein und dehnt sich kranial aus. Der

Zervikalkanal ist 4 inches lang, verläuft aber sehr gewunden und ist klein. Er wird durch ein annähernd normales linkes Uterushorn verlängert.

Rechts erstreckt sich der durch einen derben Strang dargestellte Müllerische Gang, dessen Durchmesser $\frac{1}{2}$ inch lang ist, nach dem rechten Ovidukt. Hier wird es schwer, ihn auf eine Strecke zu verfolgen. Darauf ist er ausgehöhlt und bildet eine sackähnliche Spitze des unentwickelten rechten Uterushornes. Dieser Sack ist 6 inches lang und



4 inches breit und enthält eine Pinte Menstruationsreste. Die Ovidukte erscheinen normal und stehen mit dem Sack auf der rechten und mit dem Uterushorn auf der linken Seite in Zusammenhang.

Das linke Ovarium ist 1 inch lang und $1\frac{1}{2}$ inches breit und enthält eine Zyste sowie ein Corpus luteum. Das rechte Ovarium mißt $1\frac{1}{2}$ inches im Durchmesser und enthält ein Corpus luteum.

Fall 10, Fig. 13, 14 und 15. Nachkomme von Mutter J. Brunfl war bei dieser Färbung nicht beobachtet worden. Sie lief mit einem Bullen 5 Monate auf der Weide. Geflüchtet im Alter von 30 Monaten.

Vulva und Vagina sind fast normal.

Die Zervix ist rechtwinklig zum Uterus und zur Vagina gebogen (Fig. 14, Ex).

Das os uteri externum öffnet sich gegen die linke Seite der Vagina, und das os uteri internum ist gegen die rechte Uteruswand gerichtet. Beim Zerfchneiden der Zervix kann man beobachten, daß der Zervikalkanal, der mit gelatinösem Material, das einem Schleimpfropf gleich, gefüllt ist, sich mehrere inches nach vorn erstreckt, so daß das linke Uterushorn der Länge nach viel kürzer ist als es außen erscheint.

Das linke Horn, das einen Uterus unicornis bildet, ist anscheinend von normaler Gestalt, mißt 2 inches im Durchmesser und ist an der größeren Kurvatur 10 inches lang. Dieses Horn ist abnorm hart und unnachgiebig, und ein horizontaler Schnitt zeigt, daß es vollständig mit festem, bräunlichem Material, das sich leicht zerreiben läßt — einem ausgetrockneten Blutgerinnsel menstrualen Ursprungs — gefüllt ist.

Auf der rechten Seite erstreckt sich der Müllerische Gang, der durch einen derben Strang dargestellt wird, nach vorn von der Zervix parallel zu der zervikalen Längsachse. Er mißt an der Zervix $\frac{1}{2}$ inch im Durchmesser, ist 10 inches lang und ist wie ein multipares Uterushorn in Wellenbewegungen versetzt. Der Durchmesser nimmt 3 inches von dem rechten Ovarium entfernt ab, und der Strang ist vollständig verschwunden. Er erscheint wieder und hat einen Durchmesser von 0,12 inch, wenn er den rechten Ovidukt erreicht. Dieser enthält nahe dem ostium abdominale eine Zyste, die ungefähr $\frac{1}{4}$ inch im Durchmesser mißt.

Das rechte Ovarium mißt $1\frac{1}{2}$ inches im Durchmesser und besteht aus zwei Zysten, bei denen der Durchmesser $\frac{1}{2}$ inch beträgt, sowie aus einem zystösen Corpus luteum. Linker Ovidukt normal. Linkes Ovarium mißt $\frac{1}{2}$ inch im Durchmesser.

Dieser Uterus unicornis hätte trächtig werden können, hatte aber sehr geringe Möglichkeiten zum Gebären. (Fortf. folgt.)

Standesangelegenheiten.

25jähriges Jubiläum des Vereins beamteter Tierärzte.*)

Etwa 150 Teilnehmer fanden sich im Hörsaal des Anatomischen Instituts der Tierärztlichen Hochschule Berlin zusammen. Hinter dem mit herrlichen frischen Blumen geschmückten Katheder hatte der Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden Rust, sowie Zehl, Pante und Hahn Platz genommen. Unter den Gästen bemerkte man neben Ministerialdirigenten Müssmeier die Ministerialräte Hellich und Wiemann, ferner Geheimrat Fröhner, Generalstabsveterinär Pätz, Geheimrat Wehrle, die Rektoren der beiden Preussischen Hochschulen Stang und Mießner sowie das gesamte Professoren-Kollegium der Berliner Hochschule. Die Feier wurde mit einer zu Herzen gehenden Begrüßungsansprache des Vorsitzenden, Oberregierungs- und Vet.-Rats Dr. Rust eröffnet, in der vor allen Dingen der Dank an das Ministerium sowie seine früheren bereits verstorbenen Mitglieder Küster, Schroeter, Hesse und Nevermann zum Ausdruck kam. Müssmeier erwiderte im Namen des Ministeriums, indem er besonders das kluge und taktische Verhalten des V. b. T. rühmte, der sich stets weite Ziele gesteckt habe, diese aber nur im engsten Einvernehmen mit dem Ministerium und fußend auf den wirklichen Verhältnissen durchzuführen versuchte. Es bleibt noch der weitere innere Ausbau des Veterinärbeamtentums übrig. Bei der volkswirtschaftlich hochbedeutenden Aufgabe, die gerade der Veterinärpolizei zukommt und in erster Linie in der Abwehr der Viehseuchen besteht, wird der Staat selbstverständlich den Veterinärbeamten stets das allergrößte Interesse entgegenbringen.

Magnifizenz Stang übermittelte im Namen der Berliner Hochschule

die Glückwünsche. Als Zeichen der Anerkennung der vorzüglichen Führung des Vereins beamteter Tierärzte überbringt er dem Vorsitzenden die Ernennung zum Ehrenbürger der Berliner Hochschule. Dieselbe Würde wird dem Senior der preussischen Departementstierärzte Oberregierungs- und Veterinär-Rat Steinbach zuteil. Der Oberregierungs- und Veterinär-Rat Dr. Marks-Allenstein, der bereits wegen seiner hervorragenden Verdienste um die Erhaltung des Deutchtums im Osten zum Ehrenbürger der Königsberger Universität ernannt war, wurde zum Ehrendoktor der Berliner Hochschule promoviert. In warmen Worten danken Rust und Marks für die unerwartete Auszeichnung, insbesondere weist Marks darauf hin, daß er sich in seinem Leben zwei Richtlinien gesetzt habe, einmal die Pflichten eines Beamten streng zu erfüllen und zweitens dem Wohle seines Volkes zu dienen. Er hat hierbei aber nie vergessen, seiner alten alma mater treu zu bleiben, um so mehr als durch die jetzige Auszeichnung eine noch engere Verbindung zwischen der Hochschule und ihm geknüpft worden ist. Darauf überbringt Magnifizenz Mießner die Glückwünsche der Hannoverschen Hochschule und weist insbesondere darauf hin, welchen Anteil unsere Hochschulen an der Ausbildung und Fortbildung der Veterinär-Räte haben. Die Förderung des V. b. T. sei nicht zuletzt der 20jährigen unermüdlichen Tätigkeit des Vorsitzenden zu verdanken und in Anerkennung dieser Verdienste hat die Tierärztliche Hochschule beschlossen, den Oberregierungs- und Veterinär-Rat Dr. Rust zum Ehrenbürger der Hannoverschen Hochschule zu ernennen. Rust dankt in beredten Worten und weist insbesondere auf die ausgezeichneten hannoverschen Fortbildungskurse für Veterinär-Räte hin, die ihn bestimmt hätten, beim Ministerium darum zu bitten, den Veterinär-Räten häufiger als bisher den Besuch der Fortbildungskurse zu ermöglichen. Professor Stang überbringt darauf die Glückwünsche des Deutschen Veterinär-Rats. Wiederum dankt Rust und gibt bekannt, daß der V. b. T. beschlossen hat, die beiden Rektoren der Preuss. Tierärztlichen Hochschulen Stang und Mießner sowie Marks-Allenstein, Marks-Hannover, Peter-Hamburg und Pitz-Eltsville zu Ehrenmitgliedern zu machen. Die neuen Ehrenmitglieder danken einzeln für die große Auszeichnung, die ihnen durch diese Ernennung zuteil geworden ist.

Es folgt nun der Vortrag von Veterinär-Rat Dr. Pante-Lingen. „Über die Entwicklung des Vereins beamteter Tierärzte“ (siehe D. T. W. Seite 223). Pante schließt seinen sehr interessanten und inhaltsreichen Vortrag mit einer besonderen Anerkennung für die sichere Führung durch den jetzigen Vorsitzenden, die in ihrer Größe und Schwierigkeit erst nach Jahren erkannt werden wird. Als Anerkennung für seine vielen Bemühungen überreichte er dem Vorsitzenden ein prächtiges Ölgemälde, das ein Segelschiff auf sturmbeugtem Meere darstellt; Pante dankt ferner dem Ministerium für die Fürsorge und besonders den Männern Küster, Schroeter, Nevermann, Hesse, Hellich und Müssmeier, deren Namen mit goldenen Lettern in die Entwicklungsgeschichte des Preussischen Veterinärwesens eingeschrieben seien. Nicht unerwähnt lassen möchte er dabei zum Schlusse die Verdienste von Schmaltz, dessen zielbewußter Arbeit und zähem Streben in erster Linie die Einführung des Abiturienten-examens, die ein Eckstein in der tierärztlichen Standesgeschichte bedeutet, zu danken ist. Pante schließt mit einem Ausblick auf die künftigen Ziele des Vereins, die in der Pflege der Kollegialität, der Wissenschaft und des tierärztlichen Standes bestehen und eine stete Besserung der Lage der beamteten Tierärzte verfolgen solle. Treue zum Verein, berufliches Pflicht- und Verantwortungsgefühl seien die Stützen und Pfeiler des Standes der beamteten Tierärzte.

Rust dankt für das ausgezeichnete Referat und für die ihm zuteil gewordene überraschende Ehrung und wenn ihm manchmal viel Ärger und Kummer bei den Verhandlungen bereitet seien, so habe er heute nur das Gefühl der Freude und Zufriedenheit.

Es folgt der Vortrag von Schmaltz über die Bedeutung des Staatsveterinärwesens für die Entwicklung des tierärztlichen Standes. Mit Recht betont er, daß die Tierseuchenbekämpfung das Rückgrat des ganzen Veterinärwesens sei; daher muß sich der ganze tierärztliche Stand stets bewußt sein, daß er seine Stellung dem Staatsveterinärwesen verdankt. Die Verhältnisse liegen hier anders wie bei den Ärzten, bei denen in erster Linie die Heilkunst das Ansehen und die Bedeutung des ganzen Standes gefördert hätte, das Staatsmedizinwesen aber mehr oder weniger zurücktrat. Die Gründung der tierärztlichen Bildungsanstalten ist aus der Not der Zeit und zwar aus den

*) Siehe D. T. W. 1928, S. 223.

gewaltigen Verheerungen der Rinderpestzüge entstanden, die gebieterisch die Ausbildung von geeigneten Sachverständigen forderten. Erst in zweiter Linie drängten die Krankheiten der Militärpferde zur Bereithaltung von Roßärzten. In der zweiten Periode der Entwicklung der Hochschulen, die bis zur Schaffung des ersten Reichsviehseuchengesetzes im Jahre 1880 reichte, stand das tierärztliche Wesen unter dem Kultusministerium. Es wurden Provinztierärzte geschaffen, Kreistierärzstellen nur in ganz beschränktem Maße eingerichtet, sie waren den Kreisphysikern untergeordnet worden. Der Umchwung in der Entwicklung vollzog sich erst im Jahre 1872 mit der Übergabe des Staatsveterinärwesens an das Landwirtschaftsministerium. Hier war es vor allem Marcard, welcher die hohe Bedeutung des öffentlichen Veterinärwesens erkannte. Seinem Einfluß ist es zuzuschreiben, daß das im Jahre 1875 herausgegebene Preussische Viehseuchengesetz fast unverändert im Jahre 1880 zum Reichsviehseuchengesetz gemacht wurde. Er hat es dabei ausgezeichnet verstanden, insensibel die Veterinärpolizei dem Medizinalbeamten zu entreißen. Die gewaltigen Fortschritte wurden durch Virchow bei der 100-Jahrfeier der Berliner Hochschule anerkannt und zugegeben, daß die medizinische Seuchengesetzgebung noch weit zurück sei. Entsprechend der zunehmenden Bedeutung der Veterinärmedizin wandelte Marcard die bisherigen Tierarztschulen in Hochschulen um. Nun begann der Kampf um das Abiturientenexamen, der fast zwei Jahrzehnte in Anspruch nahm. Aus dem vorstehenden erhellt der entscheidende Einfluß des Staatsveterinärwesens für die Entwicklung des gesamten tierärztlichen Standes; es muß sich daher jeder Versuch, die Stellung des beamteten Tierarztes zu erschüttern, zum Nachteil unserer ganzen Tierärztschaft auswirken. Schmaltz bedauert außerordentlich, daß im neuen Tierärztekammergesetz den beamteten Tierärzten nicht die ihnen gebührende Stellung eingeräumt worden ist. Leider machen sich auch im jungen Nachwuchs Sinken der Arbeitsleistung und gesteigerte Ansprüche geltend. Für die praktischen Tierärzte sei das Lobungswort Vollbefolgung, d. h. mit anderen Worten Praxisverbot. Schmaltz erkennt an, daß die sog. Praxisjagd aus den beamteten Tierärzten heraus muß. Die Seuchenbelange des beamteten Tierarztes erfordern aber unbedingt eine praktische Betätigung unter rücksichtsloser Ausrottung aller hierdurch bedingten Mißstände. Der Vortrag von Schmaltz wurde mit großem Beifall aufgenommen und vom Vorsitzenden der Wunsch ausgesprochen, daß Geheimrat Schmaltz nicht zum letzten Male von dieser Stelle aus zu den beamteten Tierärzten gesprochen haben möge.

Im Anschluß an die ausgezeichnet verlaufene Feier, in der der Vorsitzende wieder Gelegenheit hatte, sein vorzügliches Geschick in der Leitung zeigen zu können, verammelten sich alle Teilnehmer zum Festessen im Hause der Gesellschaft der Freunde. Mießner.

Verein Oberchleflischer Tierärzte.

12. Versammlung in Oppeln am 17. März 1928. Der Vorf. gedachte der verstorbenen Mitglieder Grünig-Pietichen und Sossna-Beuthen. Die Versammlung ehrte ihr Gedächtnis durch Erheben von den Sitzen. Neu eingetreten: Dr. Berger-Grottkau, Vet.-Rat Dr. Wittstock-Grottkau, Dir. Welzel-Oppeln, Vet.-Rat Ratmann-Rosenberg, Bartsch-Neisse und Dr. Müller-Konstedt. Der Kassenbericht wurde vom Kassier erstattet; nach Prüfung der Kasse durch zwei Prüfer wurde ihm Entlastung erteilt. Die Impfpreise für 1928 wurden, einer Anregung der Niederschleflischen Kammer folgend, genau wie dort festgesetzt. Der Vorf. der Oberchl. Kammer referierte über Kammerangelegenheiten. Nach Min.-Verfügung müssen in Zukunft die Medikamente dem Besitzer gefondert berechnet werden. Ein entsprechender Zusatz zur Taxe wird jedem Mitgliede noch zugefandt werden. Die Verpflichtungserklärungen zur Innehaltung der neuen Taxe stehen in sehr vielen Fällen noch aus. Nach erregter Debatte wird ein Antrag Fröhner angenommen, die säumigen Kollegen nochmals zu erinnern, sie evtl. um Angabe von Gründen für Nichtunterzeichnung zu bitten und schließlich eine Liste aufzustellen, aus der ersichtlich ist, wer sich beteiligt und wer abseits steht. Es folgt ein Bericht über die Generalversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Buch- und Verrechnungsstellen in Berlin, auf der die B.-St. Oberchleflien durch ihren Vorf. und ihren Geschäftsführer vertreten war. Die B.-St. Oberchleflien ist der Arbeitsgemeinschaft als Mitglied beigetreten. Ihre Mitglieder sind dadurch in den Genuß der außerordentlich günstigen Versicherungsprämien gelangt, welche die Arbeitsgemeinschaft bei einem großen Versicherungs-

unternehmen erwirkt hat. Da die Prämiensätze teilweise weniger als ein Drittel der sonst üblichen Summen betragen, sind die Vorteile sehr erheblich. Es empfiehlt sich auch, laufende Versicherungen zum nächsten Termin zu kündigen und zu den sehr viel günstigeren Bedingungen bei der B.-St. neu abzuschließen. Auskünfte erteilt bereitwilligst die Geschäftsstelle. Der Vorf. richtet an Vet.-Rat Fröhner, den früheren verdienten Vorsitzenden des Vereins, eine nachträgliche Gratulation zum 60. Geburtstag. Einer Einladung zu den Festlichkeiten in Hannover soll durch Entsendung des Vorf. entsprochen werden. Es werden ihm aus der Vereinskasse 100 Mk. Reisezuschuß gewährt. Ein Vortrag von Dr. Schnauder-Oppeln über die Neueinrichtung des Tuberkulose-Bekämpfungsverfahrens in Oberchleflien entfesselte eine stürmische Diskussion, da zu befürchten steht, daß die Vertrauens-tierärzte vollständig ausgeschaltet werden. Man war sich darüber einig, daß dagegen mit allen Mitteln anzugehen sei, erkannte im Laufe der Diskussion, daß die Haltung des Rindviehzüchterverbandes von erheblicher Bedeutung in der Frage der Zulassung bzw. Beibehaltung der Vertrauens-tierärzte ist und beschloß, den anwesenden Reg.- u. Vet.-Rat zu bitten, die Wünsche der Praktiker beim Regierungs-Präsidenten energisch zu vertreten, was er bereitwilligst zusagte. Ferner soll der Rindviehzüchterverband, an den sich schon die Niederschleflische Kammer in gleichem Sinne gewandt hat, um Änderung seiner Einstellung gegen die Vertrauens-tierärzte erlucht werden.

Dr. Hessler, Vorf.

Dr. Kuske, Schriftf.

4. wissenschaftlicher Referierabend an der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover am 27. Februar 1928.

1. W. Freese: Die Narkose des Hundes mit besonderer Berücksichtigung des Chloralhydrats und einiger neuerer Narkotika (Avertin und Pernocton).

Nach kurzem Hinweis auf die Geschichte der Anästhesie bei Tieren im allgemeinen, wobei besonders die Bedeutung der Einführung des Chloralhydrats durch Liebreich im Jahre 1868 und des Morphiums durch Gerlach im Jahre 1870 als Sedativa hervorgehoben wird, werden die einzelnen beim Hunde bislang geprüften Narkotisierungsmethoden kritisch beleuchtet. Danach hat sich beim Hunde als bestes Verfahren die Schmerzstillung durch Morphinum bei kleineren operativen Eingriffen und die kombinierte Morphinum — Atropin — Chloroform Narkose bei allen größeren Operationen erwiesen. Da aber auch diesen Methoden gewisse Mängel innewohnen, so ist man ständig auf der Suche nach einem noch besseren Verfahren. In dieser Hinsicht wurde das letztthin wieder verschiedentlich besonders empfohlene Chloralhydrat und die neuesten Narkosemittel, das Avertin und Pernocton, untersucht. Die drei genannten Narkotika haben sich als außerordentlich wechselnd bezüglich ihrer Wirkung beim Hunde erwiesen, was auf die individuell ganz verschiedene Empfänglichkeit der Tiere zurückzuführen ist. Im einzelnen bietet das Chloralhydrat, was Art und Dauer der Narkose anbetrifft, kein Äquivalent für die gefährliche Wirkung auf die vitalen Zentren. Von den Applikationsmethoden hat sich keine als einwandfrei erwiesen, noch am ehesten brauchbar ist die Applikation per os. Das Avertin ist sowohl in wässriger als auch in ölgiger Lösung unbrauchbar für die Narkose des Hundes. Mit dem Pernocton wurde in einzelnen Fällen ein frappanter Erfolg erzielt. Andererseits fehlte es nicht an üblen Nebenerscheinungen: Wiederholte heftige Aufregungszustände, wodurch eine Operation z. B. dreimal je etwa 5 Minuten lang unterbrochen werden mußte, ferner heftiges Erbrechen während der Narkose und stundenlanges Muskelzittern und krampfartige Schwimmbewegungen im Stadium des Erwachens. Außerdem ist die therapeutische Breite nur sehr eng. Einem Vergleich mit dem Morphinum halten die untersuchten Narkotika nicht stand.

Die Diskussion wurde lebhaft benutzt u. a. von den Herren Künnemann, Hupka und Götze.

Auch bei der geburtshilflichen Operation am Hund hat sich nach Götze die Morphinumnarkose, die nötigenfalls durch Chloroform zu vervollständigen ist, noch am besten bewährt. Beim Rind vermeidet er, nach vielen Versuchen mit Alkohol, Chloralhydrat, die allgemeinen Narkosen nach Möglichkeit und beschränkt sich auf die lokale Anästhesie. Ausgeführt wurde beispielsweise die Narkose des Achselgeflechtes, der Interkostalnerven, des N. ischiadicus, der Nerven des Fußendes, die Lumbal- und Sakralnarkose. In den Fällen, in denen die Leitungsanästhesie nicht möglich ist, wird die Infiltrationsanästhesie angewandt.

2. E. Schröder: Über den Wert der histologischen Untersuchung von Wurst für den Nachweis von Wurstverfälschungen.

Durch die histologische Untersuchung von Wurst im Schnittpräparat ist es leicht, einen Überblick über die Zusammensetzung der Wurst zu gewinnen und Zusätze von Gewebsteilen festzustellen, deren Verwendung der Wurst eine minderwertige Beschaffenheit gibt oder gar durch Gesetz verboten ist. Derartige Verfälschungen sind, wie aus der Literatur hervorgeht, gar nicht selten. Das Kochen des Wurstgutes vor der Wurfbereitung ist ebenföwenig wie die Zerkleinerung mit der Hackmaschine geeignet, den eigenartigen Aufbau der verschiedenen Gewebe zu zerstören. Die Einbettung der Wurst erfolgt in Gelatine. Diese Methode wird allgemein als die beste empfohlen. In der Mikroprojektion der vorgeführten Wurstschnitte konnten Teile von Uterus, Hoden, Panfen, Auge, Ohrknorpel und Lunge leicht nachgewiesen werden. Der allgemein interessierende Vortrag mit prächtigen Projektionsbildern rief eine lebhaftc Ausprache hervor.

Otto Zietzschmann:

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Prof. Dr. Dr. h. c. Kronacher, Direktor des Instituts für Tierzucht und Vererbungsforschung der Tierärztlichen Hochschule Hannover ist zum korrespondierenden Mitgliede der Tischehoflowakischen Akademie der Landwirtschaft gewählt worden.

Der Direktor des Landesinstituts für Bienenforschung und bienenwirtschaftliche Betriebslehre in Celle, Prof. Dr. Koch, ist vom Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten als Honorar Dozent für Bienenkunde und Bienenkrankheiten an der Tierärztlichen Hochschule Hannover vom S.-S. 1928 ab zugelassen worden.

Dr. Max Hilzheimer, Direktor der naturwissenschaftlichen Abteilung des Märkischen Museums, ist nach Erfüllung der Habilitationsvorschriften als Privatdozent für das Lehrfach „Stammesgeschichte der Haustiere“ an der Tierärztlichen Hochschule Berlin zugelassen.


Anlässlich des 25jährigen Jubiläums des Vereins der beamteten Tierärzte wurden Reg.- und Veterinär rat Dr. Marks-Allenstein zum Ehrendoktor und die Oberregierungs- und Veterinär räte Dr. Rust-Breslau und Steinbach-Trier zu Ehrenbürgern der Tierärztlichen Hochschule Berlin ernannt; Oberregierungs- und Veterinär rat Dr. Rust wurde gleichzeitig Ehrenbürger der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Der Verein beamteter Tierärzte ernannte anlässlich seiner Jubiläumsfeier die Professoren Dr. Stang-Berlin, Mießner-Hannover, Peter-Hamburg, Oberreg.-Rat Dr. Dr. Marks-Allenstein, Direktor Dr. Marks-Hannover und Pitz-Eltville zu Ehrenmitgliedern.

Amtstierarzt Veterinär rat Max Redlich in Dresden
feiert am 30. März 1928 seinen 80. Geburtstag.

Gefund, frisch und lebensfroh steht er noch mitten im tierärztlichen Beruf, dem er nunmehr 53 Jahre lang angehört. Seit dem Jahre 1880, wo er aus seiner Vaterstadt Plauen i. V. nach Dresden übersiedelte, ist Redlich der Landeshauptstadt Sachsens treu geblieben. Sein Name ist stadtbekannt geworden durch den Monumentalbau Redlichhaus am früheren Amalien-, jetzigen Rathenauplatz. Nachdem Redlich mehrere Jahre in der früher freiwilligen Trichinen- und Fleischbeschau der Stadt Dresden aufsichtsführend tätig gewesen war, hat er sich eine umfassende Privatpraxis gegründet, die in den letzten 10 Jahren infolge seiner zunehmenden Verwendung als Bezirkstierarztstellvertreter und gerichtlicher Sachverständiger etwas eingeschränkt werden mußte. Dabei hat er sich der Standesorganisation und dem tierärztlichen Vereinswesen und vor allem auch, so lange noch eine tierärztliche Hochschule in Dresden bestand, der Erziehung der tierärztlichen Jugend in hervorragendem Maße gewidmet. Zahlreiche Tierärzte, die die alma mater Dresdensis besucht haben, werden Redlich dies Dank wissen. Auch noch als Achtzigjähriger fehlte er bei keiner studentischen Veranstaltung und ebenso eifrig ist er im tierärztlichen Vereinsleben noch heute tätig. Seine unbezwingliche Lebensfreudigkeit und sein unerföhplicher Humor haben Redlich über alle Schwierigkeiten des Daseins hinweggeholfen und manchen Pessimisten mit fortgerissen. Möchten unserm lieben, verehrten Redlich auch im hohen Greifenalter diese Wesenseigen-

schaften noch lange erhalten bleiben und er frei von Krankheit und ernsten Sorgen noch zahlreiche Jahre der Alte bleiben wie bisher. In diesem Sinne schließt sich auch die Deutsche Tierärztliche Wochenschrift



gern und freudig den herzlichen Glückwünschen an, die unserm Redlich an seinem 80. Geburtstag von seinen zahlreichen Freunden und Kollegen übermittelt werden.

Ärztlicher Verein Hannover.

Mittwoch, den 4.-April 1928, 20 Uhr: Chirurgisch-internistische Demonstration im Krankenhaus I, Haltenhoffstraße.

150-Jahrfeier der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Die Einladungen zu der in den Tagen vom 13. bis 15. Juni d. Js. stattfindenden Feier des 150jährigen Bestehens der Tierärztlichen Hochschule Hannover sind nunmehr ergangen.

Verschiedene Anschriften von ehemaligen Studierenden, Assistenten, wissenschaftlichen Hilfsarbeitern, aber auch von Herren, die an der hiesigen Hochschule promoviert worden sind oder die an Kursen teilgenommen haben, konnten nicht ermittelt werden. Die Hochschule bittet in solchen Fällen um eine kurze Nachricht, damit die Einladung nachgeholt werden kann. Gleichzeitig wird gebeten, bei Teilnahme an der Feier die mit den Einladungen überfandten Antwortkarten so bald als möglich ausgefüllt zurückzusenden. Je früher der Festausschuß im Besitze der Antworten ist, desto vollkommener kann die Feier gestaltet werden.

Hannover, den 23. März 1928.

Der Rektor der Tierärztlichen Hochschule.
gez. Mießner.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Gefüßtstierarzt Dr. Josef Häusler zum Gefüßtstichtestor des Stammgefüßtst Schwaiganger.

Bestanden die Prüfung für Veterinär räte: Dr. Robert Braem in Hannover, Dr. Franz v. Brandenstein in Berlin, Dr. Friedrich Breul in Usedom, Dr. Fritz Drahn in Berlin, Dr. Paul Killmer in Köln, Dr. Ludwig Laudien in Stade, Dr. Walter Michalk in Crossen a. O., Dr. Ludwig Otten in Bonn, Dr. Emil Ohl in Essen, Dr. Hans Schultz in Berlin, Dr. Gerhard Siedschlag in Gollnow.

Approbiert in Berlin: Rudolf Lucas aus Fulda.

Verfetzt auf Ansuchen: Bezirkstierarzt Michael Steiger von Kusel nach Kaiserslautern; Bezirkstierarzt Oskar Eichinger von Hofheim nach Neustadt a. S.; Bezirkstierarzt August Gullmann von Bayreuth nach Augsburg.

In den Ruhestand verfetzt: Die Veterinär räte Dr. Rösler-Minden; Ehling-Blekedde; Wessendorf-Elberfeld; Plessow-Bergen a. Rügen.

Verstorben: Generaloberveterinär a. D. Prof. Dr. Karl Tröester, Berlin.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edlmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 14.

Ausgegeben am 7. April 1928.

36. Jahrgang.

Seuchenhafter Leber-Gasbrand der Rinder in Chile.

(Mit 6 Abbildungen.)

Von Balbino Sanz, Direktor des Instituts Biológico und Dr. O. Skiba, früh. Cef. des bakt. Laboratoriums der Sociedad Nacional de Agricultura in Santiago de Chile.

Im Nachfolgenden geben wir eine kurze Zusammenfassung der Arbeiten, die wir in den Jahren 1921—1925 über oben genannte Krankheit vorgenommen haben. Einzelheiten und Protokolle sind in den Jahresberichten des Instituts Biológico und im Boletín de la Soc. Nac. de Agricultura Santiago niedergelegt. Wir wollen nicht veräumen, auf die Mitwirkung des Präsidenten genannten Institutes, Don Enrique Matte, hinzuweisen, der durch manchen Fingerzeig das Studium der Krankheit förderte.

Geschichtlich sei über das chilenische Rinder-Blutharnen (Meada de sangre oder Tela aranna) folgendes mitgeteilt: Schon lange hatte man die Beobachtung gemacht, daß auf gewissen Hazienden trotz der Schutzimpfung gegen den Milzbrand ein größerer Prozentsatz der Tiere einer in kurzer Zeit tödlich endenden Krankheit erlag, die von Blutharnen begleitet war und von der Landbevölkerung ebenfalls als Milzbrand angesehen wurde. Andere führten den Tod auf die Tätigkeit einer giftigen Spinne zurück.

Als erster machte 1905 Arsenio Poupin darauf aufmerksam, daß es sich hier um eine ganz andere Krankheit handele, ätiologisch verschieden von Milzbrand, da er weder bakteriologisch noch durch den Tierversuch die Anwesenheit des Milzbrandbazillus nachweisen konnte. Im Jahre 1910 zog die chilenische Regierung die französischen Bakteriologen Lucet und Blier zu Rate, von denen ersterer zwar feststellte, daß es sich nicht um Milzbrand handele, ätiologisch aber keine weitere Aufklärung schaffen konnte. Sowohl sie beide wie auch andere Forscher fahndeten wohl immer nach Protozoen, irregeführt durch das Blutharnen, glaubten teilweise auch solche ursächlich festgestellt zu haben (Blier eine Spirochäte, Monfaller ein Anaplasma, das 1919 auch Kraus gezeigt wurde).

Ende 1921 berichteten Records und Vawter über eine Krankheit im Staate Nevada und Kalifornien, die klinisch mit der in Chile beobachteten übereinstimmte, soweit unsere im selben Jahre im Biologischen Institut begonnenen Studien über genannte Krankheit beurteilen ließen.

Seit dieser Zeit haben wir an reichlichem Material das Wesen der Krankheit eingehend studieren können, und wenn auch noch einige Fragen zu beantworten und zu klären sind, so glauben wir doch mit Sicherheit behaupten zu können, daß man als die Erreger des chilenischen Rinder-

Blutharnens zwei sich in der Leber lokalisierende Anaeroben ansehen muß, von denen der eine bislang nicht vom Fränkischen Gasbrandbazillus (*Clostridium Welchii*, B. perfringens) zu unterscheiden ist, während der andere, ein fakultativer Anaerobier, bislang noch nicht von uns definitiv bestimmt ist.

Das chilenische Rinder-Blutharnen tritt nur in Mittel-Chile auf, im Norden und Süden ist es bisher unbekannt. Auch sind es nur gewisse Güter, die infiziert sind und jedes Jahr wieder von der Seuche heimgesucht werden. Man muß sie dort genau wie den Milzbrand und Raufchbrand als Bodenfeuche ansehen. Bevorzugt werden tiefer gelegene, feuchte Ländereien mit stagnierenden Wässern oder auch trockene mit künstlicher Bewässerung, bei denen das Wasser noch einige Zeit in Pfützen stehen bleibt.

Einfluß auf die Krankheit hat die Jahreszeit. Wenn auch einzelne Fälle während des ganzen Jahres auftreten können, so bemerkt man doch Ausgangs Sommer und im Herbst (Ende Februar, März bis Mai) ein gehäuftes Auftreten, so daß auf einigen Gütern sogar 3—8 Tiere pro Tag sterben.

Das Jungvieh pflegt von der Krankheit verschont zu bleiben. Hauptsächlich werden Milchkühe und Arbeitsochsen ergriffen, doch fallen auch jüngere Mastochsen der Seuche zum Opfer. In der Mehrzahl der Fälle vollzieht sich die Infektion auf der Weide, doch ist auch bei Stallhaltung eine solche beobachtet.

Außer der Impfung, auf die wir weiter unten zurückkommen werden, hat bislang kein Mittel den Verlauf der Krankheit günstig beeinflussen können. In vielleicht 5 Prozent der Fälle tritt spontan Heilung ein, und wahrscheinlich handelt es sich um solche, wenn von angeblichen günstigen Erfolgen irgendwelcher Heilmittel von Landwirten berichtet wird, abgesehen von Fehldiagnosen.

Die klinischen Symptome sind folgende: Die Tiere erkranken meist plötzlich und hochgradig. Sie trennen sich von der Herde und sind böseartig, so daß sie häufig den Menschen angreifen. Im vorgeschrittenen Stadium trifft man die Kranken liegend und laut stöhnend an. Bei der äußeren Inspektion fällt eine Schwellung der Umgebung der Augen auf, so daß die letzteren von einem ringförmigen Wall umgeben sind. Die Konjunktiven sind injiziert und manchmal ikterisch verfärbt, können auch Blutungen aufweisen.

Die Körpertemperatur ist bedeutend erhöht (bis zu 41,8 Grad C) und fällt erst kurz vor dem Tode. Puls und Atmung sind beschleunigt; bei jeder Expiration läßt das Tier einen stöhnenden Laut vernehmen. Aus den Nasenlöchern kann sich Blut in Form von Strahlen oder Schaum entleeren.

Die Futter- und Getränkeaufnahme ist vollständig unterdrückt, ebenso wie jede Pansenstätigkeit. Manchmal tritt deswegen Aufblähen auf. Kot wird am Anfang gar nicht abgesetzt, darauf kann aber Durchfall auftreten, wobei blutiger Kot abgesetzt wird. Zuweilen werden mit Schleim durchsetzte Blutkoagala durch den After ausgestoßen.

Der Harn, der häufig abgesetzt wird, weist am Anfang noch keine Veränderungen auf; bald nimmt er jedoch eine rötliche Farbe an und ist zuletzt dunkelrot, von dem Aussehen alten Rotweins. Er bleibt klar und geht, in einem Gefäß aufbewahrt, selbst nach langer Zeit nicht in Fäulnis über. Selten tritt der Tod so rasch ein, daß es nicht zur Harnfärbung kommt. Die Farbe wird nicht durch Blut, sondern durch Hämoglobinbeimischung verursacht.

Wir konnten im Harn einen hitzebeständigen Körper feststellen, der mit dem filtrierten Toxin der weiter unten beschriebenen isolierten Mikroben an der Berührungsstelle eine Fällung gab.

Die Milchsekretion hört vollständig auf.

Der Verlauf der Krankheit ist akut und endet in der Regel in 2—3 Tagen tödlich; ausnahmsweise ist er kürzer oder länger.

Bei der Vornahme der Sektion kann man mehr oder weniger alle nachfolgend angegebenen Veränderungen beobachten. Meist differieren sie nur durch den Grad ihrer Ausbildung. Einzelne Veränderungen können auch fehlen.

Totenstarre ist vorhanden. Aus Nase und After ist blutiger Ausfluß vorhanden, an der Scham oder am Schlauch sieht man Spuren abgesetzten rot gefärbten Harns.

Nach Abziehen der Haut tritt allgemeiner Ikterus häufig deutlich zutage. Die Schultergegend weist blutig-seröse Infiltration in großer Ausdehnung auf.

In der Bauchhöhle befindet sich blutig-seröse Flüssigkeit in wechselnder Menge. Unter dem Bauchfell, sowohl dem parietalen (Bauchdecke, Zwerchfell) wie viszeralen (Pansen, Darm, Netz, Milz) findet man ein Netz von stark injizierten, bis zu bleistift- und fingerdicken schwarzen Venen sowie zahlreiche Blutungen von kleinsten Petechien an bis zu talergroßen flächenförmigen Blutungen.

Der Labmagen ist teilweise fulzig geschwollen und mit Blutungen durchsetzt. Gleiche Veränderungen zeigt der Dünndarm, hauptsächlich der Zwölffingerdarm. Sein Inhalt ist stark mit Galle und Blut gemischt. Die Schleimhaut ist stellenweise gerötet. Der Blinddarm und Dickdarm ist in schweren Fällen mit blutigem, schwarzrotem, dünnflüssigem Inhalt angefüllt, die Mukosa heftig entzündet. Die Darmlymphknoten sind blutig und fulzig geschwollen.

Die Milz weist meistens außer den Veränderungen der Kapsel weiter nichts besonderes auf; in manchen Fällen jedoch beobachtet man eine hämorrhagische Anschwellung wie beim Milzbrand.

In der Leber, die im ganzen unverändert fein oder die Merkmale einer parenchymatösen Degeneration aufweisen kann, findet man stets einen apfel- bis handflächengroßen, die Oberfläche leicht überragenden Herd von unregelmäßiger Form, der von Fibrin belegt ist.

Die Farbe ist zum Teil olivgrün, zum Teil rötlichgrau und ockerfarben fleckig, an der zackigen Peripherie läuft ein graugelbes Band, das wurzelförmig in das gesunde Lebergewebe vordringt und gegen dieses noch durch eine rote hyperämische Zone getrennt wird.

Die Konsistenz des Herdes ist härter als die des gesunden Lebergewebes.

Beim Einschneiden entströmt dem Krankheitsherd ein eigentümlicher, an Butterfäure erinnernder Geruch, der so

charakteristisch ist, daß ein Erfahrener schon an ihm die Krankheit diagnostizieren kann. Auf dem Querschnitte kann man die wurzelförmig verzweigte Randzone des Herdes noch deutlicher beobachten.

Der Farbenton der Schnittfläche ist mehr ockerfarben, zum Teil auch rötlich-lehmfarben. Im Zentrum des Herdes sieht man kleine mit Gas gefüllte Hohlräume. Von der Schnittfläche läßt sich mit dem Messer reichlich blutig-wässrige Flüssigkeit abstreichen (Fig. 1).




Fig. 1. Querschnitt durch den Krankheitsherd in der Leber, natürliche Größe. a = gesundes Lebergewebe. b = Nekroseherd. c = wurzelförmige Ausläufer an der Peripherie. d = hyperämische Zone. e = mit Gasen gefüllte Hohlräume im Zentrum des Herdes.

Dieser Nekroseherd in der Leber ist ausführlicher beschrieben, weil er pathognomonisch für das chilenische Rinder-Blutharnen ist. Er hat bislang in keinem der von uns untersuchten Fälle dieser Krankheit gefehlt und stellt den eigentlichen Krankheitsfokusz dar.

Die Gallenblase ist stets stark gefüllt mit eingedickter Galle; die Wand kann fulzig-blutig geschwollen sein.

Die Nieren sind blutreich und von zahlreichen punktförmigen Blutungen durchsetzt. Die Harnblase ist mit blutrotem, klarem Harn gefüllt; die Wandung weist kleinste Blutungen auf.

Die Brusthöhle kann blutig-seröse Flüssigkeit enthalten. Die Lungen sind ödematös und mit Blutpunkten durchsetzt. Unter dem Epi- und Endokard befinden sich größere, flächenförmige Blutaustritte.

In einem Falle sahen wir eine rötliche Färbung des Humor aqueus des Auges.

Es möge hier gleich das Ergebnis der histologischen Untersuchung des Leberherdes folgen. Die Schnitte wurden mit Hämatoxylin-Eosin, Thionin oder Methylenblau gefärbt.

Untersucht man bei schwacher Vergrößerung (65fach) Schnitte aus der Grenzzone, so sieht man (Fig. 2) zwischen




Fig. 2. Mikroskopischer Schnitt von der Randzone des Herdes (Vergr. 65fach). a = gesunde Leberzellen. b = interstitielles Gewebe. c = Gallengang. d = hyperämischer Lobulus. e = Nekrose mit Einschmelzung. f = Nekrose mit Koagulation. g = Leukozyteninfiltration mit Karyokinese.

dem gefunden Gewebe und dem schon stark veränderten die hyperämische Zone. Das kranke Gewebe läßt keine Leberstruktur mehr erkennen, enthält dagegen an vielen Stellen rundliche, granulierte Herde. Im Zentrum des Krankheitsherdes sieht man Hohlräume, die den mit bloßem Auge wahrnehmbaren Gasblasen entsprechen.

Mit starker trockener Vergrößerung (372fach) erkennt man die Veränderungen, die die Leberzellen unter dem Einfluß der Krankheitserreger erlitten haben. Es handelt sich um zwei verschiedene Prozesse, erstens um eine Nekrose mit Verflüssigung, bei der die Zelle anschwillt und rundliche Form annimmt, der Inhalt verflüssigt wird und zuletzt der




Fig. 3. Schnitt bei Vergr. 372fach. a = unveränderte Leberzellen. b = Nekrose mit Verflüssigung.

Kern abstirbt (Fig. 3), und zweitens um eine Koagulationsnekrose, wobei die Zellen keine Kernfärbung mehr erkennen lassen (Fig. 4).

Beide Prozesse werden begleitet von reichlicher Leukozyteninfiltration, die stellenweise gehäuft auftritt und zu Karyokinese führt (Fig. 4).




Fig. 4. Schnitt bei Vergr. 372fach. a = gesunde Leberzellen. b = Nekrose und Gerinnung. c = Leukozyteninfiltration. d = Karyokinese.

Schließlich bei Untersuchung mit Ölimmersion (600 bis 800fach) sieht man das Gesichtsfeld überfüllt mit einzeln oder im Verband zu zweien auftretenden Bazillen hauptsächlich im Verlauf der Kapillaren. Fig. 5 ist ein Präparat einer Kuh, die natürlich erkrankte, Fig. 6 eines künstlich infizierten Meerschweinchens.

Zusammenfassend kann man also sagen, daß es sich in dem Leberherd um eine Nekrose mit Einschmelzung des Gewebes und Gasbildung handelt, ein pathologischer Prozeß, der mit dem Gasbrand anderer Gewebe auf eine Stufe zu stellen ist.

Bakteriologische Untersuchung: Die mikroskopische Untersuchung der aus dem Nekroseherd angefertigten Ausstriche ergibt das Vorhandensein zahlreicher, 2—4 μ großer, grampositiver Bazillen mit abgerundeten Enden, einzeln oder zu zweien gelegen, in ganz frischen Fällen ohne Sporen, später mit endständigen Sporen. Bei den Kulturversuchen, die wir zunächst nur an flüssigen Nährböden anstellten, erwiesen sie sich als obligate Anaerobier, die wir als Fränkelsche Gasbrandbazillen (*Clostridium Welchii*, *B. perfringens*) identifizierten. Sie waren unbeweglich, gramfest, Gehirn wird nicht geschwärzt, Gelatine wird verflüssigt, Milch wird in weniger als 24 Stunden koaguliert.




Fig. 5. Schnitt bei Vergr. 600fach. a = veränderte Leberzellen. b = Kapillaren. c = durch Gas gebildeter Hohlraum. Zahlreiche Bazillen. Material von natürlich erkrankter Kuh.

Sie sind pathogen für Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse, Tauben; bei Verimpfung an Meerschweinchen, subkutan oder intramuskulär, entsteht typischer Gasbrand.

Da die Bazillen in dem Nekroseherd der Leber überaus zahlreich sind, in dem anderen Lebergewebe vereinzelt und




Fig. 6. Schnitt bei Vergr. 800fach. a = veränderte Leberzellen. b = Vene. c = Kapillaren voll Bazillen. Material von künstlich infiziertem Meerschweinchen.

aus anderen Organen nur durch Kultur spärlich nachgewiesen werden können, so nehmen wir an, daß ähnlich wie bei der Diphtherie und bei dem Starrkrampf eine Lokalisation der Bazillen in diesem Krankheitsherde stattfindet und von hier aus die Ausscheidung der Giftstoffe stattfindet, die den Tod der Tiere verursacht. Bei den einzeln nachgewiesenen Bazillen handelt es sich wahrscheinlich um Exemplare, die von der Blutbahn passiv mitgeschleppt sind und bald zugrunde gehen.

In der Tat konnten wir in den Kulturen die Produktion stark hämolytisch und paralytisch wirkender Gifte nach-

weisen. Als bester Nährboden erwies sich Leberbouillon mit Leberstückchen. Die Dauer der Bebrütung beeinflusst stark die Produktion der Toxine. Den Grad der Giftigkeit prüften wir an Kaninchen durch intravenöse Einspritzung. Während wir zuerst Gifte erzielten, die in Dosen von 5 ccm ein Kaninchen von 1½ kg in einigen Stunden unter Erscheinung des Blutharnens töteten, erhielten wir zuletzt solche giftige Kulturen, die in Dosen von 0,1 ccm Kaninchen in 30 Minuten töteten.

Bei zu langer Bebrütung wird das Gift zerstört. Spritzt man Kaninchen oder Meerfischweinen die Kultur direkt in die Leber, so bildet sich derselbe Nekroseherd in diesem Organ, begleitet von der Mehrzahl der bei den Rindern beobachteten anatomischen Veränderungen, bei Kaninchen einschließlich des Blutharnens. Bei Meerfischweinen beobachteten wir erst unter vielen Hunderten von infizierten Tieren einmal Blutharnen; in der Regel ist die Harnblase vollständig leer. Bei grauen Mäusen tritt Blutharnen auf.

Bei den kleinen Versuchstieren (Meerfischweinen, Kaninchen, Taube) kann der Leberherd auch bei Einspritzung in die Muskulatur des Schenkels auftreten.

Nachdem wir uns die nötige Literatur und Apparate beschafft hatten, benutzten wir die ganze Reihe nach Zeißler, speziell die Traubenzucker-Blut-Agarplatten, auf denen wir die grünen Kolonien des Fränkelschen Gasbrandbazillus typisch wachsen sahen.

Neben diesen grünen Kolonien mit hämolytischem Ring fanden wir nun aber auch stecknadelkopfgroße bis hirsekorngroße, flache, graue Kolonien ohne hämolytischen Rand, die sich bei weiterer Verbreitung als solche eines fakultativen Anaeroben herausstellten, den wir noch nicht klassifizieren konnten, vielleicht als neue Art ansehen müssen.

In Sauerstoffabwesenheit gezüchtet gleicht er in Größe und Gestalt fast vollständig dem Fränkelschen Gasbrandbazillus, ist vielleicht etwas kürzer und dicker, in Anwesenheit von Sauerstoff dagegen wächst er wohl in großen Kolonien, aber als kümmerliches Bakterium, kaum größer als die bekannten Bipolaren, von denen er sich leicht dadurch unterscheidet, daß er gewöhnliche Bouillon vergärt unter Bildung eines feinblasigen Schaumes.

Wir glaubten zunächst mit unreinen Kulturen zu arbeiten, isolierten dann aber immer und immer wieder auf Platten, züchteten serienweise aerob und anaerob mit denselben Resultaten, so daß wir uns berechtigt glaubten, diesen Bazillus als Arbeitsgenossen des Fränkelschen Gasbrandbazillus betrachten zu dürfen. Zum Unterschied von letzterem verflüssigt er keine Gelatine und läßt Milch erst nach 4—6 Tagen gerinnen. Kulturen der beiden, getrennt in Leberbouillon, unterscheiden sich auch durch den Geruch.

Als Anaerobier bildet er Toxine, die für Rinder und kleine Versuchstiere tödlich sind, ohne hämolytisch, dagegen kark vasodilatatorisch, lymphagog, cholagog und allgemein sekretionsfördernd zu wirken.

Als Aerobier fehlen ihm diese Toxine; auch wirkt er nicht infektiös.

Daß beide urfächlich eine Rolle spielen, ließ uns einerseits der Umstand vermuten, daß der Fränkelsche Gasbrandbazillus doch wohl überall vorkommt, das vorliegende Rinder-Blutharnen aber bislang nur in Chile und Nevada und Kalifornien bekannt ist.

Außerdem konnten wir nachweisen, daß ein Gemisch von beiden Kulturen zu gleichen Teilen Versuchstiere viel schneller tötete als die doppelte Dosis einer einzelnen Kultur.

Sodann beobachteten wir bei einer Reihe von Versuchsrindern, daß nur diejenigen Rinder einer tödlichen Infektion mit Leberherdhaft bei direkter Einspritzung in die Leber widerstanden, die mit einer Mischung beider Kulturen immunisiert waren, während die mit jeder Kultur einzeln vorbehandelten Tiere typisch erkrankten, teilweise Blutharnen zeigten und der Infektion erlagen genau wie die

Kontrolltiere. Gleiche Resultate gaben auch die kleinen Versuchstiere.

Während wir unsere ersten Versuche und Arbeiten, bevor wir nach Zeißler untersuchten und isolierten, ungewollt mit beiden Bazillen gemischt ausgeführt hatten, haben wir später auf Grund unserer Immunisierungsversuche absichtlich stets mit beiden gemeinsam weiter gearbeitet. Es mag das vielleicht wenig wissenschaftlich erscheinen. Die Praxis erheischte es aber.

Wichtig für uns war nun die künstliche Infektion der Rinder mit den Kulturen, um den Ring der ätiologischen Studien zu schließen. Bei der nationalökonomischen Bedeutung der Krankheit wurden uns zahlreiche Rinder zur Verfügung gestellt.

Sämtliche Versuche, durch Einverleiben der Kultur in künstlichen Nährböden per os, subkutan, intravenös, intramuskulär, intraperitoneal und direkt in die Leber unter den verschiedensten Bedingungen die Krankheit hervorzurufen, schlugen fehl.

Darauf gingen wir an, mit einem durch Gaze filtrierten Extrakt des kranken Leberherdes Injektionen direkt in die Leber vorzunehmen, und auf diese Weise gelang es uns bereits in verschiedenen Fällen, die Krankheit mit sämtlichen klinischen Symptomen und anatomischen Veränderungen auch serienweise hervorzurufen.

Einen Schritt weiter kamen wir, indem wir mit einer Reinkultur der Anaeroben ein Meerfischweinen infizierten, mit dessen Leberherdextrakt die Keime auf ein weiteres Meerfischweinen übertrugen; die Passage zum dritten Male wiederholten, worauf wir mit Material aus der Leber des letzten Tieres auch ein Rind durch Einspritzung in die Leber tödlich infizieren konnten unter den typischen Erscheinungen der natürlichen Infektion inklusive Leberherd und Blutharnen. Auf diese Weise gelang es uns auch mit einer Kultur, die wir aus stagnierendem Wasser einer infizierten Weide isoliert hatten, wenn auch auf dem Umwege über drei Meerfischweinen, die Krankheit zu reproduzieren.

Den Einwand, daß wir durch diese Experimente die ätiologische Bedeutung unserer Kultur nicht wissenschaftlich einwandfrei nachgewiesen hätten, können wir durch die gleichzeitige bakteriologische Kontrolle des den drei Meerfischweinen entnommenen Materials entkräften, denn es waren jedesmal in Reinkultur die Erreger zu erzüchten.

Auf Grund der bisherigen Studien gingen wir nun an die Lösung der praktischen Frage, wie die Krankheit zu bekämpfen wäre.

Wir hatten festgestellt, daß einjährige Rinder durch 30 ccm einer kräftigen Kultur bei intravenöser Einspritzung in 4—5 Stunden der Toxinwirkung unter den Erscheinungen des Blutharnens erlagen. Durch subkutane Einspritzung des durch Bakterienfilter getriebenen Toxins bildet sich nun eine Immunität aus, die gegen die darauf folgende intravenöse Einspritzung der übertödlichen Dosis schützt. Die ersten Versuche machten wir an 7 Jungrindern, die zum Teil 10 und 20 ccm Toxin subkutan erhielten; bei der späteren intravenösen Injektion von 60 ccm Kultur blieben sie vollständig gesund, während die beiden Kontrolltiere schwer unter Blutharnen erkrankten, eins nach 3½ Stunden starb, das andere sich nach drei Tagen langsam erholte. Ein anderes Tier, das intravenös geimpft war, erkrankte ebenfalls schwer mit Blutharnen, weswegen uns die subkutane Impfung mehr Erfolg versprach.

Weitere Versuche an Rindern wurden noch im Laboratorium vorgenommen, wovon bei einer Versuchsreihe an sechs Kühen einer Reihe von anwesenden sachverständigen Persönlichkeiten die Möglichkeit gezeigt wurde, Rinder gegen das Blutharnen zu immunisieren.

Ermuntert durch den günstigen Verlauf, warteten wir nicht erst das Ergebnis neuer Laboratoriumsversuche ab, sondern begannen sofort mit Probe-Impfungen im großen in der Praxis, zu welchem Zwecke uns von vielen interessierten,

d. h. von der Seuche lange geschädigten Landwirten die ganzen Viehbestände zur Verfügung gestellt wurden.

Auf Grund der guten Erfahrungen, die wir im Lande bei der Bekämpfung des Rauschbrandes mit dem Kulturfiltrat nach N i t t a gemacht hatten, stellten wir in ähnlicher Weise aus Leberbouillon nach kurzer Bebrütung Filtrate her, die uns als Impfstoffe dienten.

Von Januar bis Juli 1924 hatten wir bereits über 27 000 Tiere nur auf infizierten Gütern geimpft, zum Teil als Schutzimpfung, zum Teil als Notimpfung. Am Anfang haben wir verschiedene Dosen benutzt, um uns ein Urteil über die Wirksamkeit bilden zu können, auch wurden Kontrollen gelassen. Zunächst impften wir mit 10 ccm Toxin subkutan und nach 14 Tagen mit 20 ccm; auf anderen Gütern wandten wir eine einmalige Einspritzung von 10 ccm an. Später verminderten wir die Dosen auf 5 ccm und zuletzt auf 2 ccm. Die Erfolge waren über unser Erwarten günstig. Als die gefährliche Zeit der Krankheit vorüber war, hatten wir bei der großen Zahl der Geimpften nur drei Fälle von Blutharnen mit Sicherheit nachweisen können.

Einige Beispiele wollen wir anführen.

Fundo „El Monte“ verlor im vorigen Jahre 24 Tiere. In diesem Jahre waren zwei gefallen, als geimpft wurde (etwa 500 Tiere). Die Tiere der Gutsarbeiter blieben ungeimpft als Kontrollen; von ihnen starben 8 Prozent, von den geimpften Tieren keins.

Fundo „El Rozal“ hatte im vorigen Jahre 15 Tote. In diesem Jahre waren drei gefallen, als geimpft wurde; 50 Arbeitsochsen blieben ungeimpft. Als zwei von diesen der Krankheit erlagen, verlangte der Besitzer Impfung des Restes. Es starb kein geimpftes Tier, als aber fremde Tiere ungeimpft auf Weide genommen wurden, traten unter diesen bald sechs Todesfälle auf, worauf nach der sofort vorgenommenen Impfung des Restes kein Krankheitsfall mehr vorkam.

Fundo „St. Elena“ hatte im vorigen Jahr 11 Tote. In diesem Jahre waren vier gestorben, als geimpft wurde. Vier Arbeitsochsen, die gerade unterwegs waren, blieben ungeimpft. Zwei davon starben bald darauf, worauf die anderen beiden geimpft wurden. Geimpfte sind nicht gestorben.

Hazienda „Illopol“. Jährlich 40 000 Pesos Verluste (150 Tiere). Es wurden 3000 Tiere geimpft und 1500 als Kontrollen ungeimpft gelassen. Unter den geimpften sollen zwei an Blutharnen gefallen sein, was wir nicht kontrollieren konnten; unter den ungeimpften gab es fast einen um den anderen Tag einen Toten, so daß wir endlich auf Wunsch des Besitzers den Rest auch impften.

Fundo „Los Augustinos“. Es waren schon zwölf Tiere gefallen, als der Rest von 49 geimpft wurde. Es starb keins mehr von den geimpften, dagegen zwei Stück des Leutviehs, das ungeimpft blieb.

Auf einem Gut starben täglich 3—8 Tiere, im ganzen schon etwa 30, als zur Impfung geschritten wurde. Am Tage nach der Impfung starb noch ein Tier, darauf nicht eins mehr; hieraus geht hervor, wie schnell bei Toxinimpfung die Immunität auftritt.

Der Präsident des Instituts verlor auf seinem Gut 1921: 17 Tiere, 1922: 11; 1923: 10 Tiere; im Jahre 1924 wurde vor Auftreten der gefährlichen Periode geimpft mit dem Resultat, daß kein Todesfall auftrat. Bemerkt sei, daß genanntes Jahr besonders gefährlich für das Erscheinen des Blutharnens war, und daß die Krankheit überall schwere Opfer forderte.

Diese Beispiele mögen genügen.

Bis zum Ende des Jahres 1924 wurden rund 44 000 Rinder geimpft, im Jahre 1925 weitere 55 000. Die Resultate waren absolut gute, so daß die Krankheit bei den einsichtigen Landwirten ihre Gefahr verloren hat. Bis dahin war die Impfung unentgeltlich ausgeführt worden. Als sich bei dieser großen Anzahl von Tieren der Impfstoff als wirksam und ungefährlich bewährt hatte, wurde er im Jahre 1926 gegen

Zahlung in den Handel gebracht. In dem Jahre wurden 103 000 Dosen verkauft. Daten über das laufende Jahr stehen noch aus. Im Anschluß an die Schutzimpfung wollen wir kurz auch die Heilimpfung erwähnen. Durch Injektion steigender Dosen (bis zu 2 Liter) von frischen stark tierischen Kulturen konnten wir von Rindern ein Serum gewinnen, das in Dosen von 1 ccm Kaninchen gegen die tödliche Infektion schützte.

In einer Reihe von Fällen konnten wir dieses Serum bei erkrankten Rindern anwenden; war der Krankheitsprozeß noch nicht zu weit vorgeschritten, so gelang es mit großen Dosen (250 ccm) die Tiere zu retten, im vorgeschrittenen Stadium beobachteten wir Verfälscher. Wirksamer erschien das Serum, wenn es mit physiologischer Kochsalzlösung verdünnt infundiert wurde. Es konnten im Durchschnitt 60 bis 65 Prozent der kranken Tiere geheilt werden.

Die Hauptwaffe gegen das Blutharnen wird immer die Präventiv-Impfung sein. Wir haben beobachtet, daß auf den Gütern, die jedes Jahr geimpft haben, die Seuche nicht mehr aufgetreten ist.

Seit 1925 sind von uns keine weiteren umfangreichen Studien über das Blutharnen vorgenommen worden, da der eine von uns (S k i b a) aus dem Dienste des Instituts austrat, um sich der Landwirtschaft zu widmen, der andere (S a n z) vollauf mit anderen Arbeiten überbürdet war. So verzögerte sich auch diese Veröffentlichung.

Der Impfstoff wird nach wie vor im Instituto Biológico hergestellt und mit guten Erfolgen angewandt (Dosis 2 ccm subkutan).

Da sich im vorliegenden Falle durch einen Bruchteil der tödlichen Dosen des Toxins eine gnügende und schnell auftretende Immunität erzielen läßt, so ist vielleicht die kurative Serumbehandlung beim Gasbrand durch präventive Toxinimpfung in solchen Fällen zu ersetzen, in denen die Infektionsgefahr gehäuft ist wie z. B. im Kriege.

Nachtrag.

Im Jahre 1926 veröffentlichten nun Vawter und Records im Journal of the Am. Vet.-Med. Ass. ihre letzten Untersuchungen über genannte Krankheit in Nevada und Kalifornien. Auf Grund ihrer bakteriologischen und serologischen Studien und Tierversuche kommen sie zu der Schlußfolgerung, daß ihre Iktero-Hämoglobinuria hervorgerufen wird durch einen bislang unbekannten Anaeroben, den sie Clostridium haemolyticum bovis nennen. Er unterscheidet sich vom Fränkelschen Gasbrandbazillus durch Beweglichkeit und Nichtvergären von Laktose, Maltose und Saccharose.

Weiteren Untersuchungen muß es deswegen anheimgestellt werden, die Frage zu klären, ob genannter Erreger auch in Chile das Blutharnen verursacht, und von uns als Fränkelscher Gasbrand-Bazillus angesehen worden ist, und welche Rolle dem von uns nur beobachteten fakultativen Anaerobier zukommt, der von V. und R. nicht erwähnt wird.

Interessant ist in dieser Hinsicht die Tatsache, daß die Autoren bei der Obduktion ihrer Versuchsrinder die in natürlichen Fällen stets auffallend in die Augen tretenden hämorrhagischen Veränderungen am parietalen Bauchfell (Blutungen und starke Dilatation der Venen) vermissen, Veränderungen, die gemäß unseren Untersuchungen speziell durch den fakultativen Anaerobier hervorgerufen werden. Auch finden wir die Leberveränderung nicht typisch.

Es ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß ebenso wie beim Gasbrand auch bei diesem ähnlichen Krankheitsprozeß in der Leber mehrere Erreger eine Rolle spielen.

Wir weisen zum Schluß darauf hin, daß in der oben zitierten Arbeit von V. und R. als Autor unserer Veröffentlichungen im Boletín der Soc. N. de Agr. in Chile irrtümlicher Weise M a t t e angegeben ist, es handelt sich aber dabei um die ständigen Bekanntgaben unserer laufenden Arbeiten.

Zusammenfassung.

Das Blutharnen der Rinder in Mittelchile (Meada de sangre) ist eine von hohem Fieber begleitete, akute, fast stets tödlich verlaufende Krankheit, die durch Anaerobier hervorgerufen wird und ebenso wie Milzbrand und Raufschbrand an gewisse Bodenbeschaffenheit gebunden ist.

Pathognomonisch ist der Nekroseherd (Gasbrandherd) in der Leber, der als Ansiedlungsort der Erreger anzusehen ist, und von wo aus die Toxine den Körper überschwemmen.

Als mutmaßliche Erreger wurden von uns zwei isoliert; ein obligater Anaerobier, der von uns als identisch oder wenigstens nicht unterscheidbar vom Fränkel'schen Gasbrandbazillus gefunden wurde, und ein fakultativer Anaerobier, der bislang nicht von uns klassifiziert worden ist und vielleicht eine neue Art ist.

Auf Grund von zahlreichen Tierversuchen nehmen wir an, daß beide ätiologisch eine Rolle spielen. Die Krankheit kann mit den Reinkulturen bei kleinen Versuchstieren direkt, bei Rindern bislang erst nach Meerfischweinchenspassage mit sämtlichen typischen klinischen und anatomischen Veränderungen hervorgerufen werden.

In den verfeuchten Gebieten kann der Krankheit wirksam vorgebeugt werden durch Präventiv-Impfung mit filtrierten Toxinen beider Erreger gemischt, was durch Massenimpfungen im Jahre 1924, 1925 und 1926 an rund 44 000, 55 000 bzw. 103 000 Tieren bewiesen ist.

Heilimpfung mit spezifischem Serum, frühzeitig angewandt, gibt zufriedenstellende Erfolge, verlagert aber, wenn die Krankheit weit vorgeschritten ist.

Die Impfungsergebnisse dürften unsere Aussichten über die Ätiologie der Krankheit bekräftigen.

Brauchen wir einen Notgeschlachtungsstempel?

Von Dr. Hafemann, Dessau.

In den „Tierärztlichen Mitteilungen“ 1928, Nr. 7, S. 101, befürwortet Veterinär Dr. Leyer in Bremerhaven den Deklarationszwang für Fleisch aus Notgeschlachtungen (evtl. grüner Stempel) und in der Schlacht- und Viehhofzeitung 1928, S. 52 „Zur Entstehung und Verhinderung von Fleischvergiftungen“ tritt Prof. Müller, München, ebenfalls für die Einführung eines Notgeschlachtungsstempels ein. Ich vermag nicht der Einführung eines Notgeschlachtungsstempels das Wort zu reden, denn ich sehe keinen Zweck und Nutzen nicht ein. Müller schreibt in seinem Artikel ganz richtig: „das Fleisch notgeschlachteter Tiere gehört auf die Freibank!“ Das ist auch im wesentlichen mein Standpunkt, doch möchte ich diesen aber immer nur mit einer Einschränkung gelten lassen: „mit Ausnahme des Fleisches der Tiere, deren Notgeschlachtungen nur durch Unglücksfall ohne vorherige oder unerhebliche Krankheit bedingt worden ist.“

Als seiner Zeit die Grundlagen für die Durchführung der bakteriologischen Fleischbeschau ausgearbeitet waren, konnte mit Recht für ihre Einführung keine bessere Begründung gefunden werden als die Tatsache, daß es mit ihrer Hilfe gelingt, sehr erhebliche Fleischmengen, die sonst untauglich erklärt worden wären, zu retten und so sie dem menschlichen Genuß zuzuführen. Indem man nun dieses „Retten“ vielfach gleich „Vollwertigerklären“ setzte und dementprechend handelte, kam man zu einer falschen Einstellung der Dinge und zu unerfreulichen Folgewirkungen. Man kann ja Fleischwerte „retten“ nicht bloß, wenn man sie tauglich verhindert, sondern wenn man überhaupt ihre Vernichtung verhindert (minderwertig, bedingt tauglich). So und nicht anders konnte sich nur die Auswirkung der bakteriologischen Untersuchung gestalten und so sollte sie auch nach Meinung aller behördlichen Stellen usw. gehandhabt werden. Wir kommen aber nicht an der Tatsache vorbei, daß dieser Gedankengang immer noch nicht überall Allgemeingut ist, sondern daß vielfach nur allzu einseitig das Ergebnis der bakteriologischen Beschau und das Bestreben Fleischwerte voll zu erhalten, der Begutachtung zugrunde gelegt wird. Ganz ohne Frage werden wir uns bei unseren Entscheidungen zum Grundfatz bekennen müssen, alles Fleisch notgeschlachteter Tiere dem menschlichen Genuß zuzuführen, soweit dies nur nach den Regeln der Wissenschaft möglich ist, dabei aber in fachverständiger und fachgemäßer Weise gemäß des Befundes die allgemeine Wertigkeit des Fleisches abstufen nach Tauglichkeit, Minderwertigkeit usw., wobei wir hinsichtlich der Beurteilung des Fleisches notgeschlachteter Tiere nicht übersehen dürfen, daß das Fleisch kranker Tiere, mag es im Augenblick noch so gut aussehen, infolge mangelhafter Ausblutung usw. schlecht haltbar ist

und leicht dem Verderben anheimfällt. Die Begutachtung der Volltauglichkeit muß neben den Geboten der Fachwissenschaft auch auf dem Urteil von volkswirtschaftlicher Einsicht aufgebaut sein, da wir Tierärzte, die wir die Tauglichkeitserklärung vornehmen, gegenüber dem dies Fleisch kaufenden Publikum die Verantwortung für seine Vollwertigkeit in allen Teilen und in jeder Beziehung übernehmen müssen. Die allgemeine Auffassung im großen Publikum geht nun aber dahin, daß kranke Tiere, die notgeschlacht werden müssen, hinsichtlich der Vollwertigkeit ihres Fleisches in Ausnahmestellung stehen. Wer ist denn auf dem Lande das Fleisch solcher Tiere? Kein Mensch!*) Die Abneigung der Landbevölkerung gegenüber diesem Fleisch ist wohl in erster Linie dem Umstand zuzuschreiben, daß sie das Tier im kranken Zustand, in seinen Leiden und Schmerzen gesehen haben, und von einem solchen Tiere kein Fleisch essen wollen, da sie Widerwillen und Abneigung dagegen empfinden. Der Käufer, der hiervon nichts weiß, vertraut sich dem Urteil des Fachmanns an und seiner auf Treu und Glauben, Recht und Billigkeit aufgebauten Fachentscheidung. Tatsache ist nun, daß es für den mit der Beurteilung des Fleisches solcher Tiere beauftragten Tierarzt oft nicht leicht ist, das rechte Urteil zu fällen. Sogenannte Grenzfälle können ihm oft viel zu schaffen machen, dennoch muß er auch mit ihnen fertig werden, und er wird es können, wenn er alle Momente, die überhaupt bei der allgemeinen Bewertung miteinspielen in der Lage sind, richtig und treffend erwägt und nicht von einer einzigen Erkenntnis allein — etwa dem bakteriologischen Befund der Untersuchungstelle — sein Urteil abhängig macht. Mit Recht weisen alle behördlichen Erlasse usw. darauf hin, daß ein solcher Befund allein nicht genügt, sondern nur unterstützend bewertet werden soll. In allen Fällen muß auf den Befund der Lebend- und Fleischbeschau — beide zusammen genommen und gegen einander abgewogen! — das Hauptaugenmerk gerichtet werden. Dieser wiederum muß Ergänzung erfahren durch den bakteriologischen Befund und letzten Endes auch durch die nicht außeracht zu lassende Rücksichtnahme auf die Interessen der Produzenten und der Konsumenten. Letzteres wird nur allzu häufig vergessen — oder auch übersehen. Und das ist unrichtig. Nur in gerechter und fachgemäßer Abwägung aller dieser Dinge werden wir unser Urteil richtig fällen. Bezüglich der Beurteilung von Notgeschlachtungen usw. werden wir uns wohl am besten mit folgendem Schema zurecht finden:

1. Alle Notgeschlachtungen, die auf Krankheiten zurückzuführen sind, müssen bakteriologisch untersucht werden;

*) Darum kauft der Metzger diese Tiere meist für ein Butterbrot, um ihr Fleisch in der Stadt mit großem Gewinn abzusetzen.

2. Beurteilung der Notchlachtungen

- a) ohne Krankheit, durch Unglücksfälle oder unerhebliche Leiden herbeigeführt, tauglich;
- b) mit Krankheit, zumal wenn diese mehrere Stunden mit Fieber oder erheblicher Störung des Allgemeinbefindens (Kolik) bestanden hat: minderwertig, auch dann, wenn der bakteriologische Befund im allgemeinen ein negatives Ergebnis hat, sofern nicht eine noch schärfere Beurteilung durch besondere Umstände geboten ist.

Bei b) wird man am besten der bakteriologischen Untersuchung nur die Bedeutung zuerkennen, daß sie mitentscheiden hilft nicht über Tauglichkeit, da diese schon von vornherein ausschaltet, sondern über Minderwertigkeit usw. Wir müssen dem Lebendbefund wieder die Bewertung zuerkennen, die er verdient und dürfen bei aller notwendigen Rücksichtnahme auf den Tierbesitzer nie vergessen, daß der Käufer des Fleisches einen berechtigten Anspruch darauf hat, für sein gutes Geld auch gute Ware zu erhalten, wobei feststehen dürfte, daß in der großen Mehrzahl der Fälle — man kann wohl sagen in allen Fällen — dem Fleisch von Tieren, die erheblich krank gewesen und demzufolge notgeschlachtet werden mußten, aus den bekannten Gründen die Eigenschaft der Volltauglichkeit nicht zugesprochen werden kann. In Wahrung der Rechte des Besitzers werden wir aber wiederum uns nicht dazu verleiten lassen dürfen, alle Notchlachtungsfälle mit einem Notchlachtungstempel abzustempeln. Warum wollen wir etwas Neues einführen, wenn es nicht unbedingt nötig ist und sein Vorteil nicht klar auf der Hand liegt? Warum sollen wir z. B. das Fleisch einer sonst gut genährten und ganz gefunden Kuh, die sich durch Unglücksfall das Bein gebrochen, sofort geschlachtet und ausgeweidet ist, mit dem Notchlachtungstempel versehen? Wir würden in diesem Falle doch einen Zustand schaffen, der ob der möglichen und ungeahnten Folgewirkungen aller Art große Bedenken auslösen muß, und auch aus hygienisch sanitären und volkswirtschaftlichen Gründen schwerlich zu rechtfertigen ist. Wir brauchen also den Notchlachtungstempel bei Tieren der eben gekennzeichneten Art (Unglücksfälle ohne Krankheit) nicht, wir brauchen ihn aber auch in allen anderen Fällen nicht, denn für Tiere, die wir nicht tauglich bewerten, haben wir ja laut Gesetz die dort vorgeschriebene Verwertungs- und Abstempelungsmöglichkeit, die im vollen Umfang allen Bedürfnissen Rechnung trägt. Nur einen einzigen Fall könnte ich mir denken, wo man erwägen könnte, ihn einzuführen: in zweifelhaften Fällen, wo wir nicht gut wissen, was wir mit dem Fleisch machen sollen, und wo wir dennoch den Käufer vor Schaden schützen wollen. Mir erscheint es viel richtiger, auch in solchen Fällen (zumal es sich immer um

Beurteilung von Fleisch notgeschlachteter, kranker Tiere handelt!) die Verweisung auf die Freibank zu verfügen, da so am besten jeder unbilligen, unerwünschten und unreellen Verwertungsmöglichkeit der Boden entzogen wird, zumal man es hier bei der Preisfestsetzung immer in der Hand hat, den Verkauf so zu regeln, wie es der Güte und Beschaffenheit des Fleisches entspricht.

Im Zusammenhange hiermit erscheint mir überall die Bildung regionärer Freibankbezirke — ähnlich den amtlichen Schaubezirken — und die Vorschrift oder Möglichkeit der Überführung aller Notchlachtungen in die Kühlhäuser der Schlachthöfe oder ländlicher Freibänke mit Kühleinrichtung bis zur Erledigung der bakteriologischen Untersuchung zwecks besserer und sicherer Verwertung des Fleisches sämtlicher Notchlachtungen, insbesondere während der warmen Jahreszeit, eine dringende Tagesforderung, die je schneller je besser erfüllt werden möchte. Für Anhalt bestimmt der § 7 der Bekanntmachung betr. bakteriologischer Fleischschau folgendes: „Soll das Fleisch von Tieren, bei denen die bakteriologische Untersuchung veranlaßt worden ist, bis zur Erledigung der Untersuchung in das Kühlhaus eines Schlachthofes eingelagert werden, so hat der Beschautierarzt ein Formular nach untenstehendem Muster sorgfältig auszufüllen. Dies Formular muß der Transportführer mit sich führen und bei Einlieferung des Fleisches auf dem Schlachthof abgeben.“ Dies Verfahren hat u. a. den Vorteil, daß die endgültige Beurteilung und Abstempelung des eingeführten Fleisches im Schlachthof erfolgen kann, ohne daß es nötig ist, den ländlichen Kollegen nochmals in Anspruch zu nehmen, was ihm zweifellos aus mancherlei Gründen sehr willkommen sein dürfte.

Ausweis

für den Transport eines geschlachteten Tieres nach dem Schlachthof in zur Einlagerung in das Kühlhaus bis zur Erledigung der bakteriologischen Fleischschau.

1. Name und Wohnort des Besitzers des Tieres
2. Name und Wohnort des Schlächters
3. Name und Wohnort des Einführenden
4. Bezeichnung des Schlachtieres (Gattung, Geschlecht, Alter)
5. Tag und Stunde der Notchlachtung
6. Tag und Stunde der Lebendschau
7. Grund der Notchlachtung:
 - a) Art der Krankheit
 - b) Dauer derselben (Stunden, Tage)
 - c) Festgestellte Krankheitserscheinungen
8. Fleischschaubefund
9. Proben zur bakteriologischen Fleischschau sind eingefandt
 - a) Datum der Einfandung
 - b) Bezeichnung der Untersuchungsstelle

(Ort), den 19

Unterschrift des Beschautierarztes.

Innere Medizin und Chirurgie.

Kolda, J.: Zur Frage der Herzwirkung von Chlorbarium und Bariomyl. (Aus dem Pharmakologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule in Brünn. — Vorstand: Prof. Dr. C. Rybák.) (Arch. für wiss. Tierheilkunde 1926, 55, S. 85.)

Intravenöse Injektionen von Chlorbarium und Bariomyl verursachen eine Blutdrucksteigerung. In kleinen Dosen und bei langsamer Injektion haben sie, ähnlich wie die Glykoside der Digitalisgruppe, einen günstigen Einfluß auf die Herzaktivität, der sich beim Bariomyl bei angewöhnten Tieren auch nach großen Gaben zeigt. Je verdünnter die Lösung ist und je langsamer die Injektion erfolgt, desto besser wird sie vertragen, desto größer ist die letale Dosis. Die Tiere gewöhnen sich rasch an Chlorbarium und besonders Bariomyl, wenn es in gesteigerten Dosen fraktioniert gegeben

wird. Sie vertragen dann auch das Vielfache der Dosis letalis, selbst wenn sie rasch und in hoher Konzentration appliziert wird. Geiger.

Bunge: Milzruptur und Kolik. (B. T. W. 1927, S. 312.)

Vorliegender Fall ist deshalb interessant, weil es möglich war, das betr. Pferd ca. sechs Stunden zu beobachten, und weil schon intra vitam eine zutreffende Diagnose gestellt werden konnte. Patient, älterer Oldenburger Wallach, war als kolikkrank gemeldet, und machte auch den Eindruck eines schwer an Darmkolik leidenden Tieres (Unruheerscheinungen, Schweißausbruch über den ganzen Körper, fast unfühlbare Puls). Ätiologisch war wichtig, daß das fragliche Pferd während der Nacht von dem danebenstehenden mehrmals auf die linke Körperseite geschlagen worden war. Der Schweißausbruch war schon am nächsten Morgen aufge-

treten. Veranlaßt durch eine früher beobachtete, durch ähnliche Umstände hervorgerufene Milzruptur unterfuchte Verf. den Patienten unter diesem Gesichtspunkte genauer und stellte Anämie der Augenschleimhaut und eine etwas erweiterte Pupille fest. Puls nur ab und zu fühlbar, ganz schwach. Herzaktion bei der Auskultation tumultuarisch, unregelmäßig, 100mal in der Minute. Nach diesem Befunde wurde die Diagnose Milzruptur gestellt und die Schlachtung empfohlen. Auf letztere ging der Besitzer nicht ein, und so wurde das Pferd weiter beobachtet. Die Unruhe beschränkte sich auf Scharren mit den Vorderfüßen. Patient legt sich nicht, Bauch nicht aufgetrieben. Peristaltik gering, dann und wann etwas Mist abgesetzt. Wasser und einigemale etwas Heu aufgenommen. Beim Herausführen ging das Tier gut. Da Herz und Puls keine Besserung erkennen ließen, so schritt man zur Schlachtung. Bei der Öffnung der Bauchhöhle ergoß sich blutige Flüssigkeit und geronnenes Blut in einer Menge von etwa 15 Liter. Die Milz hatte eine Länge von 60, eine Breite von 26 und eine Dicke von 6,5 cm. An ihrer Oberfläche waren viele buckelförmige Hervorwölbungen mit blutigem Inhalte sichtbar. Auf der Innenseite des Organs zwei schräg verlaufende Querrisse von 10 und 6 cm Länge, die mit fibrinösem Gerinnsel verklebt sind. Die übrigen Organe ohne Besonderheiten. Vom Unfall bis zur Schlachtung waren etwa 18 Stunden verfloßen.

Cari.

Vollert: Über einen durch Schimmelpilzvergiftung hervorgerufenen Fall von Dummkoller. (Zeitschr. f. Vet.-Kunde 1927, H. 5.)

In einem Bestande von 12 Pferden erkrankten 3 Pferde unter Kolikerscheinungen und auf Grund der gleichzeitigen Erkrankung war mit einer Futtervergiftung zu rechnen. Hafer und Heu waren einwandfrei, es war aber das eingestreute Haferpreßstroh von Schimmelpilzen befallen. Das am leichtesten erkrankte Pferd zeigte am nächsten Tage keine Krankheitserscheinungen mehr, während sich das Befinden der beiden anderen verschlechterte (Fieber, Teilnahmslosigkeit, öfter Manegebewegungen, Schwanken, Lidbindehäute schmutzigrot, Durchfall). Vom dritten Krankheitstage ab besserte sich der Zustand; aber bei dem einen Pferde blieb immer noch eine große Benommenheit des Sensoriums bestehen, und es waren verschiedene Anzeichen des Dummkollers vorhanden (ausdrucksloser Blick, gefenkter Kopf, zuweilen Aussetzen mit Fressen, Stolpern beim Führen über die Stallschwelle, träger und schleppender Gang). Nach den Angaben des Besitzers hatte das Pferd vorher niemals Erscheinungen gezeigt, die auf eine Bewußtseinsstörung schließen ließen, im Gegenteil es war wegen seines Temperamentes auch als Reitpferd verwendet worden. Eine längere Behandlung war ergebnislos; als Reitpferd erwies es sich in der Folge als gänzlich unbrauchbar. Auch in den folgenden zwei Monaten trat keine Besserung ein. In dem beschriebenen Krankheitsfalle hat sich Dummkoller im Anschluß an eine Schimmelpilzvergiftung entwickelt. Wahrscheinlich hatte schon in den ersten Krankheitstagen eine subkutane Gehirnentzündung bestanden, welche mit der Schimmelpilzvergiftung im ursächlichen Zusammenhang gestanden haben kann. Im anderen Falle kann die Futtervergiftung nur als Gelegenheitsursache angesehen werden, zu welcher die warme Jahreszeit und anstrengende Arbeit als solche hinzutrat. Der Ausgang der Gehirnentzündung in Dummkoller, den sog. sekundären oder symptomatischen, ist erklärlich. Auch ist kaum anzunehmen, daß noch später (das Pferd wurde der weiteren Beobachtung entzogen), nachdem die Erkrankung schon über drei Monate bestanden hatte, eine Heilung eingetreten wäre.

A.

Neue Tierarzneimittel. (Referiert nach der „Apotheker-Zeitung“, April bis September 1927.)

Acarisin der Firma Atarost, G. m. b. H., Rostock (Mecklenburg) ist nach Angabe der Firma eine

Lösung von Salizylsäuremethylester, Perubalfam und Nikotin in weingeistigen Lösungsmitteln.

Es handelt sich um ein Tierheilmittel, das gegen Räude bei Pferden, Hunden, Rindern und Schafen verwendet werden soll.

Afuron der Firma „Picosan“ Pink & Co., Pharmazeutische Großhandlung G. m. b. H., Berlin-Charlottenburg 2, ist nach Angabe der Firma ein Schwefelpräparat, „welches eine hochwertige in Wasser lösliche Schwefelverbindung darstellt“. „Der Schwefel dringt infolge seiner Wasserlöslichkeit in die Poren der Haut leicht ein und tötet Bakterien, Kokken und Milben.“

Das Mittel soll bei Furunkulose, Skabies, Akne, Psoriasis und anderen Hautkrankheiten von Menschen und Tieren, besonders bei Hunde- und Pferderäude, angewendet werden.

Es kommt in Flaschen, also flüchtig, und in Tuben „als wasserlösliche Salben-Glyzerin-Verbindung“ in den Verkehr.

Ecobol der J. D. Riedel Aktiengesellschaft, Berlin-Brandenburg, besteht nach Angabe der Firma aus einer Auflösung eines hochkonzentrierten Filix-extraktes in chemisch reinen halogenierten Kohlenwasserstoffen. Das Mittel, das in Leimkapseln mit 3,5 ccm Inhalt in den Verkehr gelangt, soll zur Bekämpfung der Leber-egelfeuche bei Schafen dienen, und zwar soll eine einzige Kapsel die restlose Heilung des erkrankten Tieres herbeiführen.

Scharlach-Schutzserum von Ziegen der Behringwerke Aktiengesellschaft Marburg a. d. Lahn, dient lediglich vorbeugenden Zwecken. Es wird von Ziegen in der herkömmlichen Weise genommen und ist ein antitoxisches Immunserum, das etwa den dreibis fünffachen Antitoxingehalt eines guten Scharlach-Rekonvaleszenten-Serums besitzt.

Zur Prophylaxe genügt die Einspritzung von 5 ccm.

Selectan der Chemischen Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), Berlin N 39, ist ein Tierheilmittel. Nach den Angaben der Firma ist es „das Ergebnis der Forschungen von Prof. Dr. Binz und Privatdozent Dr. Räth im Chemischen Institut der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin. Selectan ist eine heterozyklische Jodverbindung, welche sich bei Zimmertemperatur zu 4 v. H. in Wasser und hellgelber Farbe löst. Bei Abkühlen unter Zimmertemperatur entsteht eine kristallinische Ausfällung, welche jedoch durch leichtes Erwärmen und Schütteln rasch in Lösung gebracht werden kann.“

Das Mittel, das in 4 v. H. starker Lösung (50, 100 und 500 ccm) in den Verkehr gelangt, wird bei den verschiedensten Erkrankungen der Haustiere (Pferde, Rinder, Schweine) subkutan, intramuskulär und intravenös, bei parenchymatösen Erkrankungen auch parenchymatös eingespritzt.

Tusputol der Firma Ufinol G. m. b. H., Herstellung und Vertrieb chemisch-pharmazeutischer Artikel, Mülheim-Ruhr, besteht aus „mit Ölsäuren emulgierten Phenolen“, und zwar enthält es den wirksamen Stoff im Verhältnis 3:1. Es dient zur Desinfektion tuberkulösen Sputums; es soll wirksamer als alle bisher beschriebenen Mittel sein.

Ufinol der Firma Ufinol G. m. b. H., Herstellung und Vertrieb chemisch-pharmazeutischer Artikel, Mülheim-Ruhr, ist nach Angaben der Firma „aus Olanteilen säureähnlichen Charakters eines Spezialteers“ hergestellt. „Dieser Spezialteer wird durch trockene Destillation bituminöser Stoffe bei bestimmter Temperatur gewonnen“. „Die Körper (nicht der Teer? Berichterfasser) werden mit Ölsäuren emulgiert (? Berichterfasser), und zwar derart, daß das Verhältnis von wirksamem Agens zu Emulgierungsmitteln ungefähr 1:1,5 beträgt (genauer 4,1:5,9; das Mittel enthält also 59 Prozent der wirksamen Substanz)“, sagen Dr. Schmidt-Wey-

land und Dr. Költzsch aus dem Institut „Robert Koch“ über Ufinol. „Dem Mittel“, so schreiben die genannten Autoren weiter, „ist ein Parfum zugesetzt, das den dieser Gruppe von Desinfektionsmitteln anhaftenden typischen Geruch verdeckt. Das Parfum ist als nicht unangenehm zu bezeichnen.“

Das Erzeugnis soll zur Allgemeindesinfektion dienen.

Staupe-Tabletten gegen Hundestaupe bestanden aus Trockenhefe, Schwefel und reduzierendem Zucker. (Prof. Griebel, Lebensmittel-Zeitschr. 53, 547, 1927.)

Wurmmittel für Schweine und Ferkel, hergestellt von Apotheker Joh. Meisner in Meissen, waren abgeteilte, je 4 Gramm schwere Pulver von Arekanuß (anal. von Prof. Griebel, ebenda). D.

Oberreiter, O.: Vierzehn Fälle von Laparo-Cystotomie (Blasenschnitt) beim Hund. (W. t. Mschr. 1927, XIV. Jhg., S. 635.)

Die 14 Fälle werden kasuistisch eingehend erläutert und anschließend die Diagnose, Prognose, Therapie und Operation näher besprochen. Der Arbeit sind zur leichteren Übersicht drei Tafeln sowie eine Abbildung im Text beigegeben. Berge.

Carlström, Birger: Experimentelle Untersuchungen und klinische Beobachtungen über Veränderungen der Lage der Bauchorgane im Zusammenhang mit Magenüberfüllung beim Pferd. (Aus der Medizinischen Klinik der Veterinärhochschule zu Stockholm.) (Arch. für wiss. Tierheilkunde 1927, S. 361.)

In der in drei Mitteilungen (Magen, Kolonanlagen, Milz) gegliederten und mit fünf guten Abbildungen ausgestatteten Arbeit werden an Hand von mehreren Fällen die Veränderungen der Lage der Bauchorgane beim Pferd ausführlich beschrieben. Der Magen strebt auf Grund seiner Aufhängung in der Bauchhöhle nach hinten, wobei die Curvatura maior nach hinten und etwas nach links gekehrt wird. Das prägt sich am stärksten aus bei Überfüllung des Magens mit Futter oder Gasen, insbesondere dann, wenn infolge langen Hungerns oder nach Durchfall und bei abgemagerten Pferden ein niedriger intraabdominaler Druck herrscht. Die Lageveränderungen der Milz beruhen im wesentlichen auf denen des Magens, sofern nicht ein erhöhter intraabdominaler Druck eine Lageveränderung des Magens verhindert. Bei niedrigen intraabdominalen Druck kann eine solche Lageveränderung der Milz eintreten, ohne daß eine Magenüberfüllung vorliegt. Geiger.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Nöller, W. und Ullrich, K.: Über den Befallsgrad der Leberegel-schnecken mit Redien und Zerkarien des gemeinen Leberegels in einem Leberegel-schadgebiet. (Aus dem Institut für Parasitenkunde und vet.-med. Zoologie der Tierärztlichen Hochschule Berlin, — Direktor: Prof. Dr. W. Nöller.) (T. R. 1927, S. 798.)

Verff. wiesen nach, daß auf einer Rinderkoppel einer im Schadjahre 1926/27 aufs schwerste in ihren Rinderbeständen betroffenen Ortschaft ein hoher Prozentsatz der Leberegel-schnecken mit Leberegel-formen gefallen waren. Eine Gruppe von 120 Schnecken zeigte eine Befallsziffer von 7,47 Prozent, von dieser wies fast die Hälfte schon reife Zerkarien auf. Weitere Untersuchungen, möglichst in größerem Umfange und in den verschiedensten Monaten des Jahres sind wünschenswert. K. H. Meyer.

Bugge, G.: Vergleichende Untersuchungen über die Distomatose bei Rindern und bei Schafen. (Aus der Städtischen Fleischbeschau des Schlachthofes Berlin. — Direktor: Dr. Schmeyer. Ausgeführt im Laboratorium. — Leiter: Obertierarzt Dr. Junack.) (T. R. 1927, S. 834.)

Verf. untersuchte in den letzten Jahren viele tausende von leberegelkranken Schafen mit schweren Veränderungen,

die seit Monaten und teilweise länger als einem Jahre Faszio- len in großer Zahl beherbergten, konnte aber im Gegen- satz zu einer großen Anzahl älterer Autoren niemals makro- skopisch wahrnehmbare oder fühlbare Inkrustationen, wie sie bei Rindern unter ähnlichen Bedingungen häufig gefun- den werden, nachweisen. Zwar finden sich bisweilen in der Schafleber kürzere oder längere walzenförmige, unebene, feste, massive Kalkkonkremente vor, welche keine Ver- ästelungen aufweisen, kein Lumen besitzen und mit abge- rundetem stumpfem Pole enden oder zuweilen bis an die Oberfläche der Leber reichen und dann graubräunlich durch das Peritonäum schimmern. Eine Verbindung mit einem größeren Gallengange haben sie nie. Es handelt sich in allen diesen Fällen um die verkalkten Bohrgänge der Jugend- stadien von *Cysticercus tenuicollis*. K. H. Meyer.

Nöller, W. und Schmidt, F.: Die Wasserglas-Zentri- fugier-Schwimm-Methode nach Vajda. 1927 in ihrem Wert für parasitologische Untersuchungen. (Aus dem Institut für Parasitenkunde und vet.-med. Zoologie der Tierärztl. Hoch- schule Berlin. — Direktor: Prof. Dr. W. Nöller.) (T. R. 1927, S. 759.)

Verff. halten die Zentrifugier-Schwimmethode nach Vajda für das beste und schnellste Verfahren zur Feststel- lung von Leberegeleiern, insbesondere im Rinderkot. In der Arbeitsweise, für welche eine kurze Anweisung gegeben ist, lehnen sich Verff. eng an Vajda. Das Durchsieben des verdünnten Kotes unterließen die Verff. und an Stelle der von Vajda benutzten aus Natr. sicilic. hergestellten Wasserglaslösung vom spez. Gewicht 1,430 wurde die viel billigere Wasserglaslösung verwendet, deren spez. Gewicht vor Anwendung mit dem Aräometer geprüft wurde, um leichtere Wasserglaslösung auszufalten. Die Methode eig- net sich auch für den Nachweis von *Moniezia*- und *Taenia echinococcus*-Eiern, Lungenwurmlarven, embryonierten und gefurchten Nematodeneiern, Kokzidienoozysten und Balan- tidienzysten. Die Methode verlagert beim Nachweis von Eiern von *Dicrocoelium lanceolatum*; in Schafkotproben, in denen bei der gewöhnlichen Deckglasuntersuchung unschwer Eier aufzufinden waren, waren solche mit der Wasserglas- zentrifugiermethode nicht nachzuweisen. K. H. Meyer.

Becker: Erfolgreiche Wurmtherapie mit Noemin. (T. R. 1927, S. 959.)

Bei etwa 30 Pferden wurde Noemin mit vollem Erfolge angewandt. Dabei zeigte sich, daß daselbe nicht nur gegen Askariden, sondern sämtliche Eingeweidewürmer der Groß- tiere indiziert ist. Schädliche Nebenwirkungen wurden in keinem Falle beobachtet. Die Wiederholung der Behandlung empfiehlt B. erst nach vier Wochen vorzunehmen, um auch eventuelle inzwischen ausgebildete Würmer mit zu ent- fernen. K. H. Meyer.

Cohrs, P.: Primäres Spindelzellensarkom des Harnleiters beim Hund. (Aus dem Vet.-Patholog. Institut der Univ. Leipzig. — Direktor: Prof. Dr. K. Nieberle.) (T. R. 1927, S. 739.)

Pathologisch-anatomische und histologische Beschreibung einer primären Geschwulst von Mannskopfgröße am rechten Harnleiter eines fünfjährigen Foxterriers. K. H. Meyer.

Hager: Fibrosarkome im Herzen eines Rindes. (Zeitschrift f. Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 193/94.)

Anläßlich der staatl. ambulator. Fleischschau in Berlin wurde bei einem achtjährigen Rinde im Myokard des linken Ventrikels eine 1 cm breite und 2 cm lange graue, weiße, glasig durchscheinende Veränderung von elliptischer Form, feuchtglänzender Schnittfläche und derber Konsistenz freigelegt. Beim Anlegen weiterer Schnitte wurden noch zwei ähnliche hirsekor- bis erbsengroße Stellen angetroffen. Die Herzbasis wies mehrere, schwach an der Oberfläche sich ab- zeichnende Knoten von Erbsen- bis Kastaniengröße auf. Histologisch wurden die genannten Veränderungen als Fibro- sarkome festgestellt. Edelmann.

Berger, H.: Zur Kenntnis der diffusen chronischen interstitiellen Nephritis beim Rinde. (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 191/93.) (Mit 2 Abbildungen.)

Berger beschreibt zwei Fälle von diffuser chronischer interstitieller Nephritis beim Rinde, der nach der Literatur zu urteilen bisher noch nicht beobachtet worden zu sein scheint. Makroskopisch waren die Nieren etwas vergrößert, derber, von gleichmäßig grauweißer Farbe, Rindenschicht hochgradig verbreitert und ebenfalls grauweiß verfärbt. Histologisch ist das Interstitialgewebe, zwischen dem sich mehr oder weniger zusammengeschrumpften Malpighischen Körper und Reste von Harnkanälchen befinden, hochgradig verbreitert und starkerzellig infiltriert; die fibrilläre Verdickung der Bowman'schen Kapsel tritt teilweise besonders stark in Erscheinung; die arteriellen Blutgefäße zeigen eine Verbreiterung ihrer Muskulatur (Arteriohypertrophie; an zahlreichen Stellen ist es zur Kompression und Atrophie der Harnkanälchen gekommen. Die Frage nach der Ätiologie dieser Nephritis läßt sich auf Grund des pathologisch-anatomischen Befundes nicht lösen. Die Folgen der chronischen interstitiellen Nephritis sind Retention der festen wie flüssigen harnbildenden Substanzen und Auto-intoxikation, die zur Urämie führt. Ein angefügtes Literaturverzeichnis weist 7 Nummern auf. Edelmann.

Claußen: Ein Fall von Chlorom beim Schwein. (Zeitschr. f. Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 175/78.) (Mit 5 Abbildungen und 1 Tafel.)

Aus dem pathologisch-anatom. Laboratorium des Veterinärwesens in Hamburg beschreibt Claußen einen Fall von Chlorom, jene Wucherungen lymphoiden und myeloiden Gewebes von zuweilen geschwulstartigem Charakter, die sich durch eine grüne Färbung auszeichnen. Bei einem gut genährten, einjährigen Schwein zeigte das Perioft sämtlicher Wirbelkörper eine grüne Verfärbung und die Spongiose der Wirbel grüne Infiltration. In der Leber zahlreiche hirsekor- bis haselnußgroße Knoten von der Farbe gekochter grüner Erbsen, desgleichen in der Nierenrinde; Leber- und Nierenlymphknoten um das doppelte vergrößert und grün gefärbt. Drei linsen- bis erbsengroße dunkelrote Knoten auch in der Milz. Schamlymphknoten vergrößert und in toto grün verfärbt, in je einem Keimfalten- und Kniekehlenlymphknoten ein etwa linsengroßer grüner Herd. In einem Ober- und Unterschenkelknochen sowie einem Oberarmknochen sind die Epiphyphen grünlich verfärbt, das Fettmark sieht grünlich-braun aus. Mikroskopisch wurden in Schnittpräparaten von Herden der Nierenrinde große, rundliche oder polygonale protoplasmareiche Zellen nachgewiesen, die eine sehr deutliche Oxydation geben, wodurch sich ihre Zugehörigkeit zu den Zellen des myeloiden Systems kundgibt. In Schnitten aus den diffus grün gefärbten Lymphknoten ergibt sich daselbe Bild. Das Fettmark der Röhrenknochen ist an den grün gefärbten Stellen in Zellmark umgewandelt. Das Chlorom wird von der Mehrzahl der Autoren den Systemerkrankungen des hämopoetischen Apparates zugerechnet und als eine Form der Leukämie angesprochen. Die Herkunft und Zusammensetzung des grünen Farbstoffes ist noch ungeklärt, neuerdings ist in den Herden auch Eisen als grünes Schwefeleisen nachgewiesen worden (Tendelov). Ein Literaturverzeichnis von sieben Autorenangaben vervollständigt die interessante Mitteilung, deren weitere Einzelheiten im Original nachzulesen sind. Edelmann.

Steinert, K.: Zur Serodagnostik der Echinokokkuskrankheit. (M. m. W. 1928, S. 389.)

Die Veterinärpolizeiliche Anstalt in Oberschleißheim erhält seit dem Jahre 1924 von bayerischen Krankenanstalten Material zur Untersuchung auf das Vorhandensein von Echinokokken beim Menschen. Die dabei angewandte Methode war die von Schütz und Schubert für Rotz angegebene Komplementbindung, abgeändert nach Mieß-

ner. Als Antigen wurde entweder der reine Blaseninhalt von Schafen, Schweinen bzw. Pferden oder ein Extrakt der Cuticula in der Flüssigkeit deselben Echinokokkus verwendet. Dieses Material wurde meist steril in Ampullen abgefüllt und erhielt sich so kühl aufbewahrt lange gebrauchsfähig. Zur Kontrolle diente zuerst vom Schaf, Schwein oder Pferd gewonnenes sicher wirkendes Echinokokkusserum, später erhielt das Institut eine größere Menge derartigen Serums, das von einem wegen Echinokokkus operierten Menschen stammte. Daselbe wurde behufs Haltbarmachung in sterile Ampullen eingeschlossen und an drei aufeinander folgenden Tagen je $\frac{1}{2}$ Stunde bei 56 Grad im Wasserbade erhitzt. Die bei diesen Untersuchungen erzielten Ergebnisse sind folgende: 1. Von den untersuchten 56 Fällen war das Untersuchungsergebnis positiv in 11 Fällen. Bei sechs Fällen wurde ein Echinokokkus festgestellt; bei vier Fällen war eine Operation nicht möglich. Bei einem Falle war ein Cysticercus cellulosae entfernt worden; die nachträgliche Untersuchung des Blutes auf Echinokokkus fiel positiv aus (Gruppenreaktion). Bei 45 negativen Untersuchungen handelte es sich darum, differentialdiagnostisch das Vorliegen einer Echinokokkuskrankheit auszuschalten. Es zeigte sich hier, daß beim Vorliegen von Gewebsgeschwülsten (Sarkom und Karzinom) die hohen Serummengen mit Echinokokk-antigen eine schwache Hemmung der Hämolysen ergaben. 2. Die bei den Untersuchungen verwendeten Antigene, sowohl die Zystenflüssigkeit für sich, als auch die Verarbeitung der letzteren mit der Cuticula haben sich sehr gut brauchbar erwiesen. 3. Da Kontrollsera und Antigene, wenn sie auf die beschriebene Art konserviert werden, nahezu unbeschränkt haltbar sind, kann die Reaktion jederzeit ohne besondere Vorbereitungen angestellt werden. 4. Die Komplementbindungstechnik nach Schütz und Schubert, modifiziert nach Mießner, ist demnach eine zuverlässige Reaktion zur Feststellung der Echinokokkenkrankheit. Über die Dauer der Anwesenheit von spezifischen Antikörpern im Krankenblute kann aus dem der Anstalt vorliegenden Material nur wenig gesagt werden. In einem Falle waren diese 7 Monate nach der Operation nicht mehr nachweisbar.

Carl.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Revisionsentscheidung des Kammergerichts vom 24. Februar 1928

(I. S. 1229/27, 22), betr. Viehseuchenpolizeiliche Anordnungen.

Der Angeklagte ist wegen Übertretung des § 76 Ziffer 1 des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (RGBl. S. 519) in zwei Fällen zu Geldstrafen von je 5 RM. verurteilt. Der Verurteilung liegt die Viehseuchenpoliz. Anordn. des zuständigen Bürgermeisters vom 22. September 1926 zugrunde.

Die Anordnung ist an den Angeklagten selbst gerichtet. Er bestreitet jetzt mit der Revision, sie erhalten zu haben. Aus den Feststellungen des angegriffenen Urteils ist aber als erwiesen zu entnehmen, daß seine jetzige Behauptung unwahr ist. Auch hat er bei seiner polizeilichen Vernehmung am 9. Oktober 1926 ausdrücklich zugegeben, daß er die Vorschriften über das Verhalten bei Ausbruch der Maul- und Klauenseuche vom Bürgermeister erhalten hat. Diesen für die Wirksamkeit der Anordnung wesentlichen Umstand, der eine Rechtsfrage darstellt, hat das Revisionsgericht selbständig zu prüfen und bejaht den Empfang.

Die Rüge der Revision, daß die Anordnung den Vorschriften des Preuß. Ausführungsgesetzes vom 27. Juli (GS. S. 149) § 3 in der Form nicht entspricht, ist verfehlt. Denn die dort enthaltenen Formvorschriften beziehen sich nur auf Anordnungen der im § 3 Abs. 1 gedachten Art, das sind solche Anordnungen, die verbindliche Kraft für eine unbestimmte Zahl von Personen erlangen sollen. Für Anordnungen, die, wie die vorliegende, an eine bestimmte Person gerichtet sind (§ 3 Abs. 2), gelten diese Formvorschriften nicht. Anordnungen der letzteren Art sind besonderen Formvorschriften überhaupt nicht unterworfen; sie können mündlich bekanntgegeben werden; soweit tunlich, ist die Anordnung in schriftlicher Form zu erlassen. Dies gilt namentlich dann, wenn die Anordnung für

längere Zeit Geltung haben soll und nicht sofort durch die Ausführung ihre Erledigung findet (Preuß. Ausführ.-Bestimmungen vom 12. April 1912 und vom 20. Februar 1914, LwMBL. S. 165 und S. 61). Es ist danach unwesentlich, daß, wie die Revision hervorhebt, die Anordnung des Bürgermeisters als Ortspolizeibehörde auf § 18 fg. Vieh-Gef. erwähnt, den § 13 offenbar deshalb, weil hier die Befugnis der Polizeibehörde festgestellt ist, bei Ausbruch einer Seuche oder bei begründetem Verdacht einer solchen die erforderlichen Schutzmaßregeln nach diesem Gesetz und den zu dessen Ausführung erlassenen Vorschriften (§ 79) zu treffen und wirksam durchzuführen.

Auch die von der Revision beanstandeten Einzelvorschriften der Anordnung sind als rechtswirksam anzuerkennen. Vorweg mag bemerkt werden, daß der Angeklagte diese Einzelvorschriften, die der Durchführung der in § 1 verhängten Stall- und Gehöftsperr (§ 22 Gef.) dienten, auch weiter befolgen mußte, nachdem er am 1. Oktober 1926 die Maul- und Klauenfeuche, als in seinem Gehöft erloschen gemeldet hatte; denn § 18 der Anordnung befragt: „Vorstehende Anordnungen behalten so lange Gültigkeit, bis sie von der unterzeichneten Ortspolizeibehörde wieder aufgehoben werden.“

Nach § 11 der Anordnung sind der Platz und der Hofraum des Gehöfts täglich mindestens einmal mit dünner Kalkmilch zu übergießen. Diese Vorschrift findet ihre Grundlage in §§ 27 Abf. 1, 79 Vieh-Gef. in Verbindung mit § 162 Abf. 2 der Ausführ.-Vorschr. des Bundesrats zum Vieh-Gef. vom 7. Dezember 1911 (RGBl. 1912 S. 4), und dem gleichlautenden § 162 Abf. 2 der Preuß. Vieh-Poliz.-Verordn. des LwMin. vom 1. Mai 1912 (R. und St.-Anz., Beil. zu Nr. 105). Der Vorderrichter hat auf Grund der Aussage des Zeugen D. für erwiesen erachtet, daß der Angeklagte in der Zeit vom 1. bis 6. Oktober 1926 das vorgeschriebene Übergießen veräußt hat. Die von der Revision geltend gemachte Anfechtung dieser Zeugenaussage betrifft die Frage der Beweiswürdigung und ist deshalb in diesem Rechtszuge nicht zulässig, weil eine Gesetzesverletzung nicht zu rügen ist (§ 337 StPO). Weshalb, wie die Revision behauptet, die erwiesene Veräußung nicht auf Fahrlässigkeit, beispielsweise auf mangelnder Sorgfalt bei Beaufsichtigung des Dienstpersonals, beruhen sollte, was der Vorderrichter zugunsten des Angeklagten anzunehmen scheint, ist nicht ersichtlich. Die Strafvorschrift im § 76 Ziffer 1 Vieh-Gef. setzt gerade fahrlässig begangene Zuwiderhandlungen voraus (RGStr. 47 S. 143, Begr. des Vieh-Gef. S. 96).

Aber auch die Angriffe gegen die Verurteilung im zweiten Falle sind unbegründet. Die hier in Betracht kommende Vorschrift des § 5 der Anordnung geht dahin, daß am Haupteingange des Seuchengehöfts für die Dauer der Sperre eine Tafel mit der Aufschrift: „Maul- und Klauenfeuche“ anzubringen ist, die nicht beseitigt oder abgeändert werden darf. Die Revision vertritt den Standpunkt, daß die Tafel von der Ortspolizeibehörde anzubringen ist. Aus dem Wortlaut des § 15, der in einer Reihe von Verfahrensvorschriften für den Angeklagten steht, ist das Gegenteil zu entnehmen. Der Angeklagte mußte die Tafel anbringen und für ihren unveränderten Verbleib Sorge tragen. Die Vorschrift gründet sich auf § 158 Abf. 3 der Bundesratsvorschriften und der Vieh-Anordn. des Ministers; auch hieraus ist nicht zu folgern, daß die Polizeibehörde die Tafeln anzubringen hat. Diese Schutzmaßregeln richten sich an die Besitzer der verseuchten Gehöfte, wie es deutlicher z. B. im § 278 zum Ausdruck gebracht ist. Daselbe folgt aus § 22 Abf. 4 Vieh-Gef.; danach ist der Besitzer verpflichtet, die zur wirksamen Durchführung der Sperre des Gehöfts vorgeschriebenen Einrichtungen zu treffen, dazu gehört auch die Anbringung der Tafel (Urt. des KG. vom 28. Januar 1927 — 1 S. 1173, 26). Der Angeklagte hat nach den Urteilsfeststellungen die für ihn bestehende Verpflichtung, die Tafel bis zur Aufhebung der Anordnung zu erhalten, nicht erfüllt; war sie ohne sein Wissen von einem anderen fortgenommen, so mußte er eine neue Tafel mit gleicher Aufschrift anbringen. Das hat er, wie der Vorderrichter zugunsten des Angeklagten annimmt, aus Unaufmerk-

samkeit unterlassen und damit fahrlässig die Anordnung übertreten.

Hat der Angeklagte in rechtsirriger Auffassung der ihm durch die Anordnung auferlegten Verpflichtungen beide Unterlassungen, wegen deren er verurteilt ist, begangen, so handelt es sich dabei um einen unbeachtlichen Strafrechtsirrtum; denn die in Frage kommenden Begriffe gehören nicht nur der polizeilichen Anordnung an, sondern der dem Viehseuchengesetz gleichzuachtenden Ausführungsvorschrift des Bundesrats (RGStr. 47 S. 351) XX.

Nach alledem war die Revision als unbegründet zurückzuweisen.

Jaffe, H. L.: The influence of purulent infection on the development of experimental scuroy. (Journal of Infect. Diseases 1927, 40, S. 502.)

Bei Skorbutdiät zeigten Meerschweinchen mit eitrigen Infektionen erst nach 19—40 Tagen Krankheitsercheinungen, während Kontrolltiere nach 13—18 Tagen skorbutisch waren. Wenn die Krankheit bereits in ihren ersten Anzeichen bemerkbar war, wurde sie durch eine Infektion mit Eitererregern nicht günstig sondern ungünstig beeinflusst. Schöop.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.


Fincher, M. G. und W. L. Williams: Gehemmte Entwicklung der Müllerischen Gänge, verbunden mit Inzucht. Mit 20 Abbildungen. (The Cornell Veterinarian 1926.) (Medizinische Abteilung und ambulatorische Klinik, N. Y. State Veterinary College, Cornell University.) (Fortsetzung.)

Fall 11, Fig. 16, 17 und 18. Nachkomme von Mutter C. (Siehe auch Fall 4.) Die Färle war wiederholt gedeckt über einen Zeitraum von 6 Monaten. Es war bekannt, daß sie trächtig war, sie war aber in der fünften Woche der Trächtigkeit im Alter von 25 Monaten geschlachtet worden.

Vulva und Vagina sind normal.

Die Zervix erscheint äußerlich normal. Sie ist allerdings härter und länger als gewöhnlich.

Das linke Uterushorn bildet einen Uterus unicornis und ist, abgesehen von den Quersepten (Fig. 18, x, x), einem normalen trächtigen Uterushorn sehr ähnlich. Der Fetus und die Membranen sind normal, abgesehen davon, daß ein kleines purulentes Exsudat nahe den Polen der Fetalhäute liegt.



Case 11
DV & HS

Fig 18

Der rechte Müller'sche Gang ist durch eine sehr schwache Spur eines fibrösen Stranges dargestellt, bis er 4 inches vom Ovidukt entfernt ist. Hier erweitert er sich und bildet einen 3 inches langen und $1\frac{1}{2}$ inches breiten Sack, der mit geronnenen Menstruationsresten gefüllt ist.

Die Ovidukte sind normal. Der linke steht in Zusammenhang mit einer Zyste an der Spitze des linken Uterushornes. Die vorhandene Trächtigkeit zeigt, daß der rechte Gang tätig ist.

Das linke Ovarium mißt $2\frac{1}{4}$ inches im Durchmesser und enthält ein großes Trächtigkeits-Corpus luteum. Das rechte Ovarium ist mit dem rechten vorderen Teil der Beckenwand durch ein kurzes breites Band sehr eng verbunden. Das rechte Ovarium ist $1\times\frac{1}{2}$ groß und enthält einige kleine Zysten.

Bass.

(Schluß folgt.)

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Rabinowitsch-Kempner, L.: Übertragung der Tuberkulose durch filtrierbare Erreger. (D. m. W. 1927, S. 1982.)

In letzter Zeit haben verschiedene namentlich französische Forscher behauptet, daß Filtrate von Tuberkelbazillenkulturen und tuberkulösem Material infektiös seien und bei Versuchstieren eine typische Tuberkulose oder Kachexie hervorrufen könnten. In den Lymphdrüsen sollen dabei Bazillen nachgewiesen worden sein. Andere französische Gelehrte haben aus ihren Untersuchungen den Schluß gezogen, daß die transplazentare Infektion häufiger sei, als man bisher annahm, und daß sie durch die filtrierbare Form des Tuberkelbazillus bewirkt werde. Die eigenen Versuche der Verfasser wurden in der Hauptsache an Meerschweinchen angestellt. Von 39 mit Filtraten behandelten derartigen Tieren starben neun nach 1—4 Monaten

unter den Erscheinungen der Kachexie. Es konnten aber an denselben selbst bei der genauesten Untersuchung und bei Prüfung des Materials durch das Impfexperiment keine tuberkulösen Veränderungen nachgewiesen werden. Das gleiche war der Fall bei den übrigen dreißig Meerschweinchen, die meist gesund blieben und nach $2\frac{1}{2}$ —6 Monaten getötet wurden. Diese Tiere zeigten jedoch zum Teil etwa 1 Monat nach der Impfung eine positive Tuberkulinreaktion, die aber nach einiger Zeit verschwand. Die Versuche an trächtigen Meerschweinchen führten zu einem etwas anderen Ergebnis. Von 30 mit Filtraten geimpften Tieren warfen zwei Junge, in deren Lymphdrüsen bei direktem Ausstrich in geringer Zahl säurefeste Stäbchen nachgewiesen werden konnten. Kulturen und Impfversuche ergaben jedoch ein negatives Resultat. In einem weiteren Falle war es bei einem mit Filtrat geimpften trächtigen Meerschweinchen möglich, in den Organen eines Jungen desselben zuerst durch den positiven zweimal fortgesetzten Impfversuch, später auch den direkten Nachweis der Bazillen für die transplazentare Übertragung des Erregers zu erbringen.

Verff. gelangten am Schlusse ihrer Arbeit zu folgender Zusammenfassung: Der Tuberkelbazillus, den wir als säure- und alkoholfestes Stäbchen kennen, hat auch eine unsichtbare filtrierbare Form. Diese vermag, wenn auch nur selten, bei trächtigen Tieren die Plazenta zu passieren und sich bei den jungen Tieren zu säure- und alkoholfreien Stäbchen zu entwickeln. Die Virulenz dieser Stäbchen scheint recht niedrig zu sein. Sie vermögen nur selten eine progrediente Tuberkulose zu erzeugen. Wieweit ihr Verweilen im Organismus des jungen Tieres immunisierend wirkt, werden unsere weiteren noch nicht abgeschlossenen Versuche ergeben.

Carl.

Iwanoff, K.: Aktive Immunisierung mit Formolvakzine gegen Vakzine. (B. T. W. 1927, S. 752.)

In letzter Zeit haben verschiedene Autoren bei Immunisierung gegen Lyssa, Geflügelpest und infektiösen Abortus mit Erfolg versucht, die betreffenden Impfstoffe vorher mit Formol zu behandeln und so „Formol-Vakzine“ herzustellen. Verf. hat diese Methode auf das Vakzine-Virus übertragen und diesbezüglich Untersuchungen in der Pockenabteilung des Instituts „Robert Koch“ (Prof. Dr. Gins) an Kaninchen und Meerschweinchen angestellt unter Verwendung von Kalb-Rohstoff aus der Berliner Staatlichen Impfanstalt. Dieser wurde zunächst im Verhältnis von 1:20 mit physiologischer Kochsalzlösung versetzt. Der Zusatz von Formalin erfolgte in der Menge von 3 bzw. 2 Promille. In ersterem Falle ging das Virus nach zweitägiger, in letzterem Falle nach fünftägiger Einwirkung bei 37 Grad zugrunde, während ein Formalinzusatz von 1 Promille schon nach 3—4stündiger Einwirkung die Begleitbakterien abtötete. Die Versuche selbst hatten folgendes Ergebnis:

1. Die aktive Immunisierung mit einem durch Formalin abgetöteten Vakzinivirus gab bei Meerschweinchen einwandfrei positive Resultate. Bei Kaninchen fielen die Versuche nicht so gleichmäßig positiv aus.

2. Im Blut von Kaninchen, die mit formolifizierter Vakzine vorbehandelt wurden, ließen sich virulizide Stoffe nachweisen, die im Verhältnis zu der gespritzten Menge des Vakzinivirus standen.

3. Die Menge der virulenten Stoffe im Blut der immunisierten Kaninchen stimmte mit der Hautimmunität in der Regel überein.

4. Nach diesen Ergebnissen erscheint eine Immunisierung mit Vakzinevirus, das nach vorstehender Methode abgetötet ist, in der Praxis aussichtsreicher zu sein.

5. Experimentell wäre zu prüfen, ob analog den oben geschilderten Ergebnissen mit Vakzinevirus auch Schafe gegen Schafpocken mit Vakzine- oder Schafpockenvirus, das durch Formalin abgetötet ist, immunisiert werden können.

Carl.

Nahrungsmittelhygiene.

Freigabe paratyphusbakterienhaltigen Fleisches.

Urteil des Reichsgerichts vom 26. März 1928.

Im August 1926 erkrankten in den Ortschaften Spangenberg und Flahmen (Kreis Kottbus) 47 Personen unter den Erscheinungen der Fleischvergiftung. Die Ermittlungen ergaben, daß die geschlachtete Kuh aus einem benachbarten Rittergut stammte. Dort erkrankte das Tier am 31. Juli 1926 an einer Verstopfung, nachdem es kurz vorher gekalbt hatte. Da das von dem prakt. Tierarzt Dr. B. verordnete Abführmittel keinen Erfolg hatte, verschrieb er am nächsten Tage eine stärkere Dosis. Auch diese führte keine Besserung herbei, weshalb sich der Rittergutsverwalter zur Notchlachtung entschloß. Er bestellte dann den Tierarzt zur Untersuchung, der sich lediglich damit begnügte, die inneren Organe zu beanstanden, das übrige Fleisch aber freigab. Tatsächlich ergab jedoch eine eingehende Untersuchung von Fleischproben Paratyphusbakterien in reicher Anzahl. Dr. B. wurde deshalb wegen Zuwiderhandlung gegen das Fleischbeschaugesetz vom Landgericht Kottbus zu 150 RM. Geldstrafe verurteilt. Der Angeklagte sei verpflichtet gewesen, vor Freigabe des Fleisches unbedingt eine bakteriologische Untersuchung vorzunehmen. Die Unterlassung müsse ihm als grobe Fahrlässigkeit angerechnet werden. Er habe gewußt, daß die Kuh vorher an einer fieberhaften Verstopfung gelitten hat und habe sich trotzdem nicht nach den letzten Krankheitsercheinungen erkundigt. Er sei davon unterrichtet gewesen, daß die bisher stets gesunde Kuh notgeschlachtet worden war und habe sich daher fügen müssen, daß das wertvolle Stück nicht ohne Grund vor das Messer des Fleischers gebracht wurde. Er hätte die Freigabe des Fleisches in den öffentlichen Verkehr von dem Ergebnis einer gründlichen Untersuchung abhängig machen müssen, da er bei pflichtmäßiger Überlegung eine ernsthafte Erkrankung der Kuh erkannt haben würde. Schon das, daß er den Magen der Kuh nicht aufschnitt, von der er wußte, daß sie an einer Verstopfung erkrankt war, müsse ihm als Verschulden angerechnet werden.

Gegen dieses Urteil legte der Angeklagte Revision beim Reichsgericht ein, die jedoch verworfen wurde, mit folgenden Entscheidungsgründen:

Der Senat nimmt an, daß eine Bestrafung aus § 8 Abs. 1 des Fleischbeschaugesetzes auch auf den Fleischbeschauer selbst auszudehnen ist und zwar hier deshalb, weil der Angeklagte fahrlässiger Weise die erforderliche bakteriologische Untersuchung nicht vorgenommen hat. Er hat wohl eine Untersuchung vorgenommen, aber nicht so sorgfältig, daß eine Schädigung des Publikums ausgeschlossen wurde. Es fragt sich nur noch, ob der Fleischbeschauer als eine Person angesehen werden kann, die das Fleisch in den Verkehr bringt. Das hat der Senat bejaht, denn der Fleischbeschauer hat die Verfügungsgewalt über das Fleisch. Wenn er die Freigabe anordnet, so gelangt das Fleisch durch ihn in den öffentlichen Verkehr. Deswegen ist die Verurteilung des Angeklagten nicht zu beanstanden.

Henneberg: Zwei Fälle aus der Praxis der Fleischschau. (W. t. Mskr. 1928, XV. Jhg., S. 60.)

Verf. beschreibt 1. ein Plattenepithelkarzinom der Harnblase einer Stute, dessen Längsdurchmesser 30 cm, Querdurchmesser 18—20 cm betrug sowie 2. ein Darmdivertikel bei einem Rinde von etwa Kleinkindskopfgröße. Berge.

Wolf: Kindermilchgewinnung. (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 169—171.)

Wolf weist vor allem darauf hin, daß es nicht im Sinne der Hygiene liegt, wenn die neuzeitlichen Bestrebungen zur Verbesserung der Milchversorgung der Städte sich im wesentlichen darauf richten, daß alle Milch pasteurisiert oder hoch-

erhitzt werde. Wenn mit der Milchgewinnung die Gefahr der Gefundheitschädigung von Menschen durch bakterielle Infektionserreger verbunden sei, so sollte die Hauptaufgabe der Milchhygiene darin bestehen, diese Gefahrenquelle zu verstopfen. Überdies werden der Milch durch die „molkereimäßige Behandlung“ (Zentrifugieren und Erhitzen) lebenswichtige Stoffe entzogen, deren vor allem die Kinder im ersten Lebensjahre bedürfen. Es sind dies nicht allein gewisse Vitamine, sondern ist weiter zu berücksichtigen, daß die Fettkügelchen der Kuhmilch durch Erhitzen in Bezug auf ihre physikalisch und chemische Struktur so verändert werden, daß sie sich weniger für die Resorption durch den Säugling darin eignen. Auch gehen der Milch die bakteriellen Eigenschaften, die sie frisch besitzt, durch Erhitzen verloren, auch wird das Albumin durch Erhitzung über 70 Grad weniger leicht aufnehmbar, ebenso fällt ein Teil des gelösten Kalkes aus, wodurch Nahrungsschäden beim Säugling entstehen. Auch wird durch das Erhitzen der Milch die Labgewinnung verzögert und Antikörper werden zerstört. Deshalb sollten wenigstens bei der Kindermilchgewinnung die hygienischen Bestrebungen darauf gerichtet sein, daß die Milch dem Verbraucher ungekocht übergeben werden kann. Die Untersuchung der Kühe, die Kindermilch liefern, auf Tuberkulose und bakterielle Euterkrankheiten macht heutzutage keine unüberwindlichen Schwierigkeiten mehr, ebensowenig die Fernhaltung von Typhusbazillenträgern von den Milcherzeugungsfällen. Bei all dem gilt es aber insbesondere noch, die Sauberkeit bei der Milchgewinnung zu heben. Denn Kuhkot und anderer Schmutz, der in die Milch gelangt, wird dort gelöst und ist weder durch Zentrifugieren noch durch Erhitzen wieder zu beseitigen. Wolf schlägt schließlich vor, die Kindermilchgewinnung in staatl. oder staatl. Milchhöfen zu zentralisieren, in denen die Milch nicht nur molkereitechnisch behandelt wird, sondern wo die Milchkühe selbst gehalten werden und der ganze Betrieb beständig vom Tierarzt, Arzt und Nahrungsmittelchemiker überwacht wird. Von den Millionen, die für Stadien und Sportplätze im Übermaß ausgegeben werden, sollten einige für die Einrichtung und den Betrieb derartiger Milchhöfe verwendet werden. Dann würde die Säuglingssterblichkeit weiter zurückgehen und Entwicklungsfehler in der frühesten Jugend schon vermieden werden, die später durch Leibesübungen und Sport nicht mehr zu beseitigen sind.

Edelmann.

Gros, W.: Über Erkrankungen und Tod nach Obstgenuß. (M. m. W. 1928, S. 212.)

Nach der Volksmeinung (auch in Afrika und Asien) gilt übermäßiger Genuß von Obst verbunden mit Trinken von größeren Mengen Wasser als gesundheitschädlich. Namentlich werden bestimmte Obstsorten als besonders gefahrbringend angesehen. Um das Wesen dieser Verschiedenheiten aufzuklären stellte Verf. Versuche an, die darin bestanden, daß er grob zerkleinerte Früchte mit Wasser versetzte, das Gemisch in den Brutofen stellte und beobachtete, was darin vorging. Außerdem werden noch Verdauungsversuche mit derartigem Material angestellt. Die Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen:

Erkrankungen durch Obst sind auf mannigfaltige Ursachen zurückzuführen. Abgesehen von der Gefundheitschädigung durch unreifes, verdorbenes, krankes, von Pilzen befallenes oder mit pathogenen Keimen behaftetes und mit chemischen Stoffen behandeltes Obst können auch einwandfreie, reife Früchte Krankheiten und Tod nach sich ziehen. Dies ist der Fall, wenn übergroße Mengen mangelhaft zerkaut dem ungewöhnten Magen einverleibt werden. Besonders gefährlich sind nach den ausgeführten Versuchen Kirschen und Stachelbeeren, die bei reichlicher Zufuhr von Wasser viel stärker aufquellen als andere Obstarten. Die erhöhte Bereitschaft zur Erkrankung ist durch die individuelle Disposition, durch die besondere Empfindlichkeit des kindlichen Darmapparates und durch die heiße Jahreszeit ge-

geben. Unter den in Frage kommenden Erkrankungen bedrohen weniger die Gastritis, Enteritis, Gastroenteritis, akute Gärungsdyspepsie, als vielmehr die akute Magendilatation und der alimentäre paralytische Ileus das Leben.

Carl.

Hirsch: Die künstliche Kälte im Dienste des Seefischhandels. (Zeitschr. f. die gef. Kälteindustrie, Jhg. 34, H. 5.)

Der Fischfang muß seine Fangplätze immer weiter von der heimischen Küste verlegen, der Handel mit Seefischen dringt dagegen immer tiefer in das Innere des Festlandes ein. Um die Fische in voller Güte an die Verkaufsstelle zu bringen, wird der ausziehende Fischdampfer im Heimathafen mit Eis versorgt, in das er den Fang einbettet. In der Zeit vom Löfchen der Ladung bis zur Auktion bleibt der Fisch unbefrostet; mit erneuter Eispackung wird er dem inländischen Verbrauch zugeführt. Schwierigkeiten entstehen bei ungünstigen Fangverhältnissen und längerem Ausbleiben des Fischdampfers durch Schwinden des Eisvorrats. Bestrebungen, der Schwierigkeiten Herr zu werden, sind im Gange. Seit Ende der achtziger Jahre wurden in Astrachan Lachse und andere wertvolle Fische in großen Mengen eingefroren und für Lagerung während längerer Zeit und Beförderung über größere Strecken vorbereitet. Um die Jahrhundertwende wurden Lachse auf dem Amur eingefroren und $3\frac{1}{2}$ Monate nach Fangbeginn einwandfrei nach Hamburg gebracht. In den Vereinigten Staaten und Kanada wird in der reinen freien Luft der unter der Eisdecke hervorgezogene Fisch bei Temperaturen bis zu -50 Grad C herunter rasch und gefahrlos eingefroren. In künstlichen Gefrieranstalten friert man bei etwa -25 Grad C die Fische freihängend ein. An das Einfrieren schließt sich ein Glasieren durch Eintauchen in Süßwasser. Kältemaschinen auf Dampfem beschränken sich beim Fischfang hauptsächlich darauf, das zum Verpacken erforderliche Eis herzustellen. Erfolgreicher ist das **O t t e s e n**-Verfahren, nach dem Fische schnell in stark konzentrierter Sole eingefroren werden. **Hirsch**-Berlin verwendet statt des Solebades einen Soleregen. Die in geeigneter Weise aufgehängten Fische werden durch tief gekühlte Sole mit hoher Fließgeschwindigkeit eingefroren. **Zarotschenzeff** schlug vor, die Sole zu vernebeln und die Fische in der vernebelten Luft einzufrieren. **Petersen** brachte die einzufrierenden Fische gruppenweise in flache Metallzellen, die in das Solebad eingehängt werden, das somit mit dem Fisch nicht in Berührung kommt. **Kolbe** modifizierte das **Petersen'sche** Verfahren dahin, daß er die Fische in flache Schalen faßte und über diese einen mit Rand versehenen Deckel stülpte. Beim Eintauchen wird nach dem Grundsatz der Taucherglocke das Eindringen von Sole verhindert. Eine weitere Neuierung ist in den Vereinigten Staaten eingeführt. Der einzufrierende Fisch wird küchenfertig zubereitet, dann eingefroren und danach in Pergamentpapier eingeschlagen.

Heine.

Standesangelegenheiten.

25 Jahre Fleischbeschaugesetz.

Am 1. April d. Js. sind 25 Jahre vergangen, seit auf Grund des Reichsfleischbeschaugesetzes vom 3. Juni 1900 die in vielen Städten bereits organisiert gewesene Schlachtvieh- und Fleischbeschau einschließlich der Trichinenschau in Stadt und Land in gleicher Weise ausgeführt wird.

In den verfloßenen 25 Jahren hat die Fleischbeschau in erheblichem Maße dazu beigetragen, durch systematische Beanstandung und unschädliche Beseitigung verdorbenen oder gesundheitschädlichen Fleisches die gesundheitlichen Belange der Bevölkerung zu fördern. Ebenso hat die Fleischbeschau durch Ermittlung von ansteckenden Tierkrankheiten deren Bekämpfung und damit der Erhaltung großer volkswirtschaftlicher Werte gedient. Weder die Gesundheits- noch die Veterinärpolizei eines Kulturstaates kann heute eine geordnete Fleischbeschau missen. Die Art ihrer Ausführung ist kennzeichnend für die wissenschaftliche Höhe der Tiermedizin und die Fürsorge der Staatsverwaltung. Es ist deshalb für die deutsche Fleischbeschau eine besondere Genugtuung, daß im Laufe

der Zeit verschiedene Kulturstaaten, dem Beispiele Deutschlands folgend, eine geordnete Fleischbeschau eingeführt und für ihre Ausführung die deutschen Vorschriften zum Muster genommen haben.

In der verfloßenen Zeitspanne von 25 Jahren liegt die schwere Kriegs- und erste Nachkriegszeit, die auch die Fleischbeschau-Ausführung in Deutschland nachteilig beeinflusst hatte. Heute kann jedoch mit Befriedigung festgestellt werden, daß diese schweren Zeiten überwunden sind. Die Fleischbeschau-Ausführung in Deutschland hat heute, nachdem in den letzten Jahren zum Zwecke der Verhütung von Fleischvergiftungen ein besonderes wissenschaftliches Untersuchungsverfahren eingeschaltet worden ist, eine Höhe erreicht, wie sie der Bedeutung Deutschlands als Kulturstaat entspricht. Dies ist sowohl das Verdienst der Verwaltungsbehörden, als auch in besonderem Maße des in der Fleischbeschau tätigen Personals. Ich benutze deshalb gern die Gelegenheit des 25jährigen Bestehens des Fleischbeschaugesetzes, um allen in Preußen in der Inlands- und Auslandsfleischbeschau tätigen Verwaltungsbehörden, Beamten und Sachverständigen, insbesondere den Tierärzten, Fleischbeschauern und Trichinenschauern für die im Interesse des Volkswohls geleistete verantwortungsvolle Arbeit meinen Dank und meine Anerkennung auszusprechen.

gez. Steiger.

Robert von Ostertag. 25 Jahre Fleischbeschaugesetz.

Hochverehrter Herr Geheimrat!

Am 1. April werden 25 Jahre verfloßen sein, daß das Reichsgesetz betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau vom 3. Juni 1900 mit seinen Ausführungsbestimmungen in Kraft getreten ist. Dies gibt mir Anlaß als Präsident des Deutschen Veterinärrates Ihnen zu schreiben und Ihnen den aufrichtigen Dank der ganzen deutschen Tierärzteschaft zu übermitteln, denn sowohl für das Gesetz wie für die Ausführungsbestimmungen waren Sie der spiritus rector, und es darf ohne Übertreibung gesagt werden, daß das Ganze Ihr Werk darstellt. Es ist allgemein bekannt, daß unser Reichsfleischbeschaugesetz ein Mustergesetz erster Ordnung ist. Als Beweis hierfür gilt die Tatsache, daß Ungarn, die Niederlande, Luxemburg, die Schweiz und Bulgarien ihrer Reichsfleischbeschaugesetzgebung unser Gesetz zu Grunde legten. Nicht nur der Schutz der menschlichen Gesundheit durch die Verhütung der übertragbaren Tierkrankheiten zooparasitärer und anderer Natur und die Unterstützung der Durchführung unserer Viehseuchengesetze ist von weittragender Bedeutung, sondern auch die Auswirkung des Gesetzes für die deutschen Tierärzte. Ihrem durch die Liebe zum tierärztlichen Beruf bedingten unermüdblichen Eintreten für die Tierärzte ist es zu verdanken, daß heute 1000 Kollegen im Deutschen Reich durch die Fleischbeschau eine angefehene Stellung haben und daß darüber hinaus die große Schar der praktizierenden Tierärzte bei der Fleischbeschau mitwirkt und dadurch ihrer Existenz eine sichere Grundlage gibt. Dies Ihnen heute zu schreiben und Ihnen dabei den Dank des Deutschen Veterinärrates zu übersenden, ist mir ein Herzensbedürfnis. Empfangen Sie, hochverehrter Herr Geheimrat, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Ihr sehr ergebener

gez. Stang,

Präsident des Deutschen Veterinärrates.

Verschiedene Mitteilungen.

Albert Leistikow †.

Am 29. März ist der Regierungs- und Geheime Veterinär Dr. med. vet. h. c. Leistikow im 80. Lebensjahre gestorben. Aus der Militärlaufbahn hervorgegangen, wurde Leistikow 1879 Kreistierarzt in Heilsberg. Ein Jahr später wurde er als Repetitor an die damalige Tierarzneischule in Berlin berufen, 1882 erhielt er die Kreistierarztstelle Jerichow 2, aus der er 1891 nach Liegnitz versetzt wurde, wo er zugleich die Departementsstelle zu verwalten hatte. Am 1. April 1894 kam Leistikow in gleicher Eigenschaft nach Magdeburg. Hier hat er sein Amt bis zum 1. April 1920 versehen, hat er namentlich in dem erfolgreichen Kampf gegen die Lungenseuche seine Tüchtigkeit erwiesen, deren Würdigung ihn zur Mitwirkung bei Ausarbeitung der Ausführungsvorschriften zum Reichsviehseuchengesetz führte. Seine Verdienste haben vielfache Anerkennungen und Auszeichnungen erfahren; aber die größte Freude hat ihm wohl die 1924 von der Tierärztlichen Hochschule

Berlin verliehene Würde eines doctor med. vet. honoris causa und die Begründung der Verleihung bereitet. Leistikow hat auch nach Ablegung der Amtsbürde in den Fortschritten seiner besonderen und der allgemeinen Wissenschaften weitergelebt und die Verbindung mit uns zu unserer Freude aufrechterhalten. Ein Vorbild alter preußischer Beamtentugenden wird er uns in der Erinnerung bleiben.

Für die beamteten Tierärzte des Regierungsbezirks Magdeburg
Profé.

Veterinärarzt Dr. Finkenbrink †.

Am 9. März starb an Herzschwäche der Veterinärarzt des Kreises Saarbrücken und Dezernent für das Veterinärwesen bei der Regierung des Saargebietes, Oberveterinärarzt Dr. Josef Finkenbrink im 57 Lebensjahre. Mit Finkenbrink ist einer unserer Besten dahingegangen, ein Kollege von ganz außergewöhnlichem Wissen, verbunden mit beispielloser Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue. Er ist in den Sielen gestorben. Obwohl er seit ein paar Monaten an einer Herzneurose erkrankt war, war er nicht zu bewegen, einen längeren Urlaub zu nehmen. Erst zwei Tage vor seinem Tode begab er sich ins Landeskrankenhaus in Homburg, wo er Erholung zu finden hoffte. Am 9. März ist er dort entschlafen, überraschend für uns und seine Familie, die wie der Arzt die Schwere der Erkrankung nicht ahnte. Finkenbrink ist am 4. April 1871 in Münster i. W. geboren, wo er 1891 sein Abitur machte. Seine Fachausbildung erlangte er an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Nach der Approbation studierte er weitere drei Semester an der damaligen Akademie in Münster. Hier wurde er 1897 zum Dr. phil. promoviert. Vorher schon war ihm die Kreistierarztstelle Malmedy mit dem Sitz in St. Vith übertragen worden, die er bis nach Ablegung des Kreistierarztexamens kommissarisch verwaltete. 1901 erhielt er die Kreistierarztstelle in Wittlich und 1905 die des Kreises Saarbrücken. Hier hat er 23 Jahre gewirkt, unermüdlich tätig. Den Krieg hat er von Anfang bis Ende zuerst als Stabsveterinär beim Ref.-Feld-Artl.-Regt. 16, dann als Divisionsveterinär mitgemacht. Der Zusammenbruch unseres Vaterlandes hat ihn mit tiefem Schmerz erfüllt, den er bis zum Ende nicht verwinden konnte. Mit der Bildung der Regierung des Saargebietes wurde ihm nebenamtlich das Dezernat für Landwirtschaft und Veterinärwesen übertragen. Es ist erstaunlich, wie Finkenbrink die Fülle der Arbeit, die ihm hieraus erwuchs, neben seinem in dem großen Kreise sehr umfangreichen Kreistierarztgeschäften leisten konnte. Leider hat er die Anerkennung für seine allgemein anerkannten Leistungen und seine aufopfernde Pflichterfüllung nicht mehr erlebt. Seine Beförderung zum Oberregierungsrat sollte dieser Tage erfolgen. Wie im Dienst von strengster Pflichterfüllung, so war er auch seiner Familie der stets sorgende Gatte und Vater. Mit seiner Frau trauern fünf Kinder, drei Söhne und zwei Töchter, die alle noch in der Ausbildung begriffen sind, um den allzu früh Verstorbenen. Der Tierärztliche Verein des Saargebietes hat mit ihm sein bestes Mitglied und früheren langjährigen Vorsitzenden verloren. Allen Standesangelegenheiten brachte er das größte Interesse entgegen. Seine Hauptforge war immer, die drei Gruppen unseres Standes zu gemeinsamer Arbeit zusammenzuhalten und Differenzen innerhalb dieser Gruppen auszugleichen. Aus Anerkennung für seine Arbeit innerhalb des Standes und Ausdruck einmütiger Hochachtung und Verehrung hat ihn der Verein anlässlich seines 30jährigen Bestehens zum Ehrenmitglied ernannt. Bei uns wird dieser vornehme, bescheidene Mann und stets hilfsbereite Kollege, der neben seinem reichen Fachwissen auch auf fast allen Gebieten menschlichen Wissens tiefe Kenntnisse besaß, nie vergessen werden. Es ist ein Mann mit ihm hingegangen, wie nur wenige in unserer egoistischen Zeitepoche gefunden werden. Fast sämtliche Kollegen des Saargebietes, der Herr Regierungs- und Veterinärarzt von Trier, Vertreter der Regierung des Saargebietes und der Landwirtschaft, seine Regimentskameraden, seine Burfchenschaft Cheruskia und eine große Trauergemeinde gaben ihm am 12. März das letzte Geleite. Hart an der französischen Grenze am Fuße der ruhmreichen Spicherer Höhen haben wir ihn zur ewigen Ruhe gebetet.

Verein der Tierärzte des Saargebietes.

Dr. Trautmann, Völklingen.

Dankagung.

Allen lieben verehrten Freunden und Kollegen spreche ich für die mir zu meinem 80. Geburtstage gütigst dargebrachten Glückwünsche,

Ehrungen und Gaben vorläufig auf diesem Wege meinen verbindlichsten innigsten, tiefst empfundenen Dank aus, bis es mir gesundheitlich vergönnt sein wird, jedem einzeln zu danken.

Wilhelm Ellenberger.

Eugen Fröhner-Stiftung der Berliner Tierärztlichen Hochschule.

Geheimrat Fröhner hat in hochherziger Weise die ihm von den deutschen Tierärzten zu seinem 70. Geburtstag überwiesene Spende in Höhe von 5000 Mark der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin zur Verfügung gestellt. Dieselbe wird den Betrag zu einer Eugen Fröhner-Stiftung zu Gunsten Studierender der Hochschule verwenden.

Tödlicher Unglücksfall.

In der Nacht zum 30. März wurde in Hannover der Tierarzt Dr. Ewald Wilhelm aus Brena, Kr. Bitterfeld, auf dem Nachhausewege in der Nähe des Pferdeturms von einer Autotaxe angefahren, so daß er bewußtlos liegen blieb. Der Verunglückte wurde ins Krankenhaus I geschafft und ein schwerer Schädelbruch bei ihm festgestellt. Er verschied, ohne das Bewußtsein wiedererlangt zu haben, bereits nach kurzer Zeit. Der erst 28jährige Kollege war Studierender der Tierärztlichen Hochschule Hannover und hat erst kürzlich daselbst promoviert. Sein tragischer Heimgang ist daher um so bedauernswerter. Als Student war er allseits beliebt und ein tüchtiger Vertreter seiner Farben (Corps Hannoverania, Hannover und Albingia, Dresden).

Gefrierfleischkontingent, Einfuhrscheine und Hilfsprogramm.

Der Reichstag hat folgende Änderung des Zolltarifes beschlossen: „§ 11 des Zolltarifgesetzes vom 25. Dezember 1902 (RGBl. S. 103) in der Fassung des Gesetzes über Zolländerungen vom 17. August 1925 aus der Verordnung über Einfuhrscheine vom 3. September 1925 sowie des Gesetzes über Zolländerungen vom 15. Juli 1927 (RGBl. 1925, I., S. 261, 1927, I., S. 180) wird wie folgt geändert: 1. Hinter Nr. 3 ist folgende Vorschrift aufzunehmen: 3a. Bei der Ausfuhr von Schweinen sowie von Schweinefleisch der Tarifnummern 108, frisch, gefroren oder einfach zubereitet, sowie ferner bei der Ausfuhr von Schweinefleisch in luftdicht verschlossenen Behältnissen aus dem freien Verkehre des Zollgebietes werden, wenn die ausgeführte Menge wenigstens 1 Doppelzentner beträgt und die Ausfuhr nicht zu Lasten des Reparationskontos erfolgt, auf Antrag des Warenführers Befcheinigungen (Einfuhrscheine) erteilt, die den Inhaber berechtigen, innerhalb der nach Nr. 1, Abs. 1, festgesetzten Frist eine dem Werte des Einfuhrscheins entsprechende Menge der daselbst bezeichneten Waren ohne Zollentrichtung einzuführen. Der Wert des Einfuhrscheins wird in der Weise bestimmt, daß für jeden Doppelzentner der ausgeführten Ware in Rechnung gestellt werden: bei lebenden Schweinen 16 Mk., frischem, gefrorenem oder einfach zubereitetem Schweinefleisch aus der Tarifnummer 108 21 Mk., Schweinefleisch in luftdicht verschlossenen Behältnissen 27 Mk. Abfertigungen zur Ausfuhr mit dem Anspruch auf Erteilung von Einfuhrscheinen finden nur bei den von den Landesfinanzämtern zu bestimmenden Zollstellen statt. Damit wird den schon seit Jahren von der Landwirtschaft erhobenen Wünschen entsprochen. Der Reichstag hat weiter beschlossen: „Artikel 1. § 5 des Gesetzes über Zolländerungen vom 17. August 1925 (RGBl. S. 261) wird aufgehoben. Artikel 2. Zur Verforgung der minder bemittelten Bevölkerung mit Gefrierfleisch sind vom 1. Mai 1928 jährlich 50 000 Tonnen Gefrierfleisch nach unserer Anordnung der Regierung zollfrei zu lassen.“ Die Kürzung des Gefrierfleischkontingents, das bisher auf 120 000 tons festgesetzt war, beginnt am 1. Mai 1928. Der im Hilfsprogramm für die Landwirtschaft vorgesehene Betrag von 30 Millionen Mark soll nach den Richtlinien des Reichsernährungsministers a) der Organisation des Viehauftriebes auf den großen Schlachtviehmärkten, b) der Förderung von Einrichtungen zur Verwertung und Verbreitung von Schlachtvieh, c) der Förderung des direkten Absatzes von Schlachtvieh und Fleisch zwischen Genossenschaften der Erzeuger einerseits und Genossenschaften der Fleischer und Verbraucher andererseits, d) der Entlastung des Inlandsmarktes durch Gewinnung neuer Absatzgebiete für Schlachtschweine sowie für frisches und zubereitetes Schweinefleisch, e) der Rationalisierung von Schweinemast und Schweinezucht dienen. Zur Durchführung der Maßnahmen wird eine G. m. b. H. gebildet, die von einem Reichskommissar beaufsichtigt wird. Ausdrücklich ist vorgesehen, daß die G. m. b. H. Grundstücke und Fleischwarenfabriken in der Regel nicht erwerben soll, daß sie auch

mit Reichsmitteln Schlachtvieh und Fleisch in der Regel nicht im eigenen Namen kaufen oder verkaufen darf. Darlehen sollen vorzugsweise gegeben werden: a) an Viehabplatzorganisationen für die Regelung des Marktauftriebes und des Abatzes für Schlachtvieh und Fleisch, b) an Fleischwarenfabriken und Schlächtereorganisationen für die Verbreitung von Schlachtvieh und Fleisch, c) an genossenschaftliche Einrichtungen, deren Tätigkeit auf den unmittelbaren Absatz von Schlachtvieh und Fleisch zwischen Genossenschaften und Erzeuger einerseits und an Genossenschaften der Fleischer und Verbraucher andererseits gerichtet ist, d) an genossenschaftliche Einrichtungen, die der Rationalisierung von Schweinezucht und Schweinemast dienen.

Heine.

Praktisch-mündliche Prüfung für Veterinärärzte.

Vom 30. April bis 12. Mai 1928 an der Tierärztlichen Hochschule Berlin.

Verein Thüringer Tierärzte.

105. Versammlung des Vereins Thüringer Tierärzte e. V. am Sonnabend, den 5. Mai 1928, 19½ Uhr im Restaurant zum Münchener Bürgerbräu in Erfurt, Anger 19/20. 1. Bericht des Vorstandes über die Tätigkeit des Vereins im verflochtenen Jahre: a) Bericht des Schriftführers, b) Bericht des Kassierers. 2. Auflösung des Vereins zwecks Ausscheidens aus dem Vereins-Register. 3. Ernennung eines Liquidators. 4. Neugründung des Vereins. Vor der Sitzung finden um 19 Uhr kurze Besprechungen der Fachgruppen im selben Lokal statt. Nach der Sitzung, etwa um 20½ Uhr, gefelliges Beisammensein mit Tanz. Die verehrten Damen sind herzlichst eingeladen. Gäste und deren Damen sind ebenfalls sehr willkommen.

gez. Träger, Vorf. gez. Dr. Loeb, Schriftf.

Bücherbesprechungen.

Fröhner, Eugen: Lehrbuch der Gerichtlichen Tierheilkunde. VI. Auflage. Berlin 1928. Verlag von Richard Schoetz. Gebd. 18,— Mk.

Gewissermaßen als Zeichen des Dankes für alle stillen und lauten Wünsche, die ihm zum 70. Geburtstag aus den tierärztlichen Kreisen Deutschlands und darüber hinaus dargebracht worden sind, besichert uns der Verf. die VI. Auflage seines Lehrbuches der gerichtlichen Tierheilkunde. Mit Recht bemerkt der Verf. im Vorwort des gut ausgestatteten Buches, daß in den sieben Jahren, die seit dem Erscheinen der letzten Auflage verstrichen sind, die forensische Tiermedizin eine weitere steigende Bedeutung erlangt hat und daß sie von ihrem Standpunkte aus die neueren wissenschaftlichen Forschungen auf diagnostischem und therapeutischem Gebiete zu würdigen hat. Es wurden daher die wichtigen Kapitel über Rotlaufimpfung und Verbreitung der Schweinepest, vaginale Trächtigkeitsuntersuchung, Ausdrücken der Corpora lutea bei Kühen, die Rektaluntersuchung der Hengstevor, der Kastration, die Hämoglobinurie bei Deckhengsten, die Einführung der Nasenschlundsonde, verschiedene Arzneivergiftungen und die Frage der Abdeckereiprivilegien bedacht und das Kapitel über den Doulos neu bearbeitet. Die Abhandlungen über Schweinepest und Schweinefeuche, Tuberkulose, Dummkoller, Dämpfigkeit und Kehlkopfpeifen wurden überarbeitet, als Vertragsmängel gewürdigt: Myopie, Pferderäude, Sklerostomum edentatum, das Sichnichtanbindenlassen der Pferde, Gewichtsverluste bei Schafen nach Transporten, die Trächtigkeit der Schlachttiere, und vom Standpunkte der Züchter aus der Nachweis der Trächtigkeit und die Verjährung der Trächtigkeitszüficherung. Wertvoll ist eine kurze Kritik der Deutschen Währschaftsgesetzgebung, die Anfügung einiger ausländischer Währschaftsgesetze und der Abschnitt über die tierärztliche Taxe.

Das Neue, um das der Autor den bewährten alten Stoff bereichert hat, trägt den immer dankbar anerkannten Stempel der Fröhner'schen logischen und stilistisch abgefeilten Darstellung. Angefichts mancher Divergenzen im juristischen Lager wird, so lehren uns die Ausführungen, der tierärztliche Sachverständige sich eine vorsichtige Reserve auferlegen müssen. Inwieweit sich die Praxis zu einzelnen Fragen der Haftpflicht zu stellen hat, wird die Zukunft klären müssen.

Der Wunsch, den der geschätzte Verf. für die Zukunftsentwicklung der forensischen Veterinärmedizin hegt und den er in die Worte zusammenfaßt: „Wahrheit und Klarheit“, findet in der vorliegenden Auflage des Buches ein wohlbegründetes Fundament.

Dem unermüdlichen Autor aber gebührt unser Dank dafür, daß er auch am Lebensabend noch Zeit fand, für seine geliebte Wissenschaft in alter Treue und Frische zu wirken.

Oppermann.

„Führer durch das Studium der Landwirtschaft an der Universität Göttingen.“ Das kleine, von der Verwaltung der Landwirtschaftlichen Institute herausgegebene Werbeheft bietet erschöpfende Auskunft über alle das landwirtschaftliche Studium betreffende Fragen. Es enthält außer den einschlägigen Bestimmungen eine ausführliche Darstellung der Göttinger Verhältnisse und zeigt, daß die dem Studium der Landwirtschaft dienenden Einrichtungen der Universität Göttingen besonders reichhaltig sind. Neben den für jeden Landwirt in Frage kommenden allgemein-naturwissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Fächern ist die Landwirtschaftswissenschaft durch 7 Spezialinstitute und 1 Versuchsgut vertreten. Der durch eine Serie schöner Abbildungen geschmückte Führer ist vom Sekretariat der Landwirtschaftlichen Institute zu Göttingen zum Preise von 1,— Mk. zu beziehen. Beginn des S.-S. 1928 am 15. April.

W.

Veterinär-Kalender für das Jahr 1928. Von Vet.-Rat Dr. Johann Sobelsohn, Wien. Verlag von Moritz Perles, Wien, Seilergasse 4. Preis 3,60 RM.

Der österreichische Veterinärkalender hat bei der Neubearbeitung wiederum eine Vermehrung seines Inhaltes erfahren. Besonders der Abschnitt über pharmazeutische Präparate erfuhr größere Ausgestaltung, ein Abschnitt über neuere tierärztliche Instrumente wurde zugefügt, die Personalien revidiert und stattgehabten Veränderungen Sorge getragen. Zum Schluß findet sich ein Namensregister mit Adressenangabe der Kollegen. Im übrigen zerfällt der Kalender in: Kalendariische Vorbemerkungen, Standesangelegenheiten, gesetzliche Vorschriften, wissenschaftlichen Teil und die Personal-Notizen. Das Taschenformat ermöglicht seine Mitführung zum täglichen Gebrauch. Auch für die deutschen Kollegen dürfte er allerhand interessante und wertvolle Angaben enthalten.

Dr. Berge, Hannover.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Die Polizeierärzte Dr. Gressel, Dr. Burchardt, Zacher, Dr. Dormeyer, Dr. Bauschke und Dr. Hoffmann, sämtlich in Berlin zu Polizeiveterinärärzten; Dr. Luy, bisher wissenschaftl. Assistent am physiol. Institut der Tierärztl. Hochschule in Hannover zum Oberassistenten, Tierarzt Dr. Wilhelm Schmitt zum wissenschaftl. Assistenten ebendafelbst.

Verfetzt: Der nach Beendigung eines zweijährigen Urlaubs zur Dienstleistung in der Türkei zurückgekehrte Veterinärarzt Dr. Hoffmeister ist in die Veterinärarztstelle in Bergen a. Rügen (Bezirk Stralsund) verfetzt worden.

Ausgeschieden: Oberassistent Dr. Thur am physiol. Institut der Tierärztl. Hochschule in Hannover.

Die tierärztliche Fachprüfung haben bestanden in Hannover: Johannes Köppe aus Ulzen, Conrad Kraft aus Zierenberg, Matti Pekkarinen aus Nilsä (Finnland), Anders Ose aus Orsta (Norwegen), Karl Röyr aus Stranda (Norwegen), Harald Slaatelid aus Nordfjordeidet (Norwegen), Rudolf Taeger aus Blumenberg (Prov. Sachsen), Ernst Verbücheln aus Heeren (Kr. Rees).

Kommandiert: Oberveterinär Dr. Moll zur medizinischen Klinik der Tierärztl. Hochschule in Hannover.

Verzogen: Tierarzt Dr. Gückel von Erfurt nach Stotternheim b. Erfurt.

In den Ruhestand verfetzt: Veterinärdirektor Dr. Köslér, Direktor des städt. Schlacht- und Viehhofs in München.

Verstorben: Generaloberveterinär a. D. Karl Achterberg in Parchim; Regierungs- und Geh. Veterinärarzt Dr. h. c. Leistikow in Magdeburg; Tierarzt Dr. Ewald Wilhelm aus Brena (Kr. Bitterfeld).

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelman, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Ausperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Beziffer keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 15.

Ausgegeben am 14. April 1928.

36. Jahrgang.

Chronik der VI. Rektoratsperiode 18. Januar 1926/28. *)

Hochansehnliche Festversammlung!

Der Tag des Rektoratswechsels befeuert unserer Hochschule Hochstimmung und Weihestunde; an ihm vereinigen sich mit den Angehörigen der Hochschule, für eine Weile losgelöst von Alltagstun, im festlichen Raume verehrte Gönner, liebevolle Freunde und getreue Commilitonen, um ihr Interesse am Geschick unserer Alma mater kundzutun und mit uns in dieser Stunde Rückchau und Umchau zu halten.

Vorab aber ist es Ehrenpflicht des Rektors, Sie alle im Namen der Hochschule willkommen zu heißen und in Dankbarkeit zu begrüßen. In Sonderheit gilt unser Gruß dem Vertreter des Preuß. Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Herrn Ministerialrat Dr. Wiemann, und dem Kurator unserer Hochschule, Herrn Oberpräsident Noske. Mit herzlicher Freude begrüßen wir die Rektoren der Universität Göttingen, der hiesigen Technischen Hochschule, der Bergakademie zu Clausthal und außerdem Herrn Prof. Dr. Nöller vom Kollegium der Berliner Tierärztl. Hochschule. Es berührt uns sympathisch, daß zahlreiche Vertreter der Reichswehr, an ihrer Spitze der Infanterieführer VI, Her Generalmajor Fritsch, und ebenso des alten ruhmreichen Heeres, darunter Männer mit klangvollem Namen, unter uns weilen und dadurch zum Ausdruck bringen, daß Wehrmacht und akademische Jugend, getragen von der Treue und Liebe zum Vaterlande, zusammengehören. Ich gebe ferner unserer Freude darüber Ausdruck, daß der Veterinärinspekteur, Herr Generalstabsveterinär Dr. Pätz zugegen ist. Ehrerbietige Grüße geziemen sich weiterhin den zahlreichen Vertretern der Behörden, der Stadtverwaltung, der Landwirtschaft, darunter dem Herrn Präsidenten der D.L.G., dem Landesältesten Dr. h. c. Websky, des Handels- und der Industrie und den mit uns eng verbundenen Mitgliedern der Gesellschaft der Freunde unserer Hochschule, den vielen Kollegen aus Nah und Fern, die sich aus alter Anhänglichkeit zu ihrer Alma mater uns heute zugesellt haben.

Da die Deutschen Hochschulen nicht über freiwillige Millionenpenden reicher Gönner verfügen, so müssen sich Entwicklung, Ausbau und Förderung zwangsläufig dem jeweiligen Stande des Wirtschaftslebens anpassen. In der Not der Nachkriegsjahre heißt das, daß auf das früh-

lingshaft anmutende Wohlwollen unseres Ressortministeriums zuweilen ein aus den kühlen Regionen des Finanzministeriums kommender Reif fallen muß. Unter diesem Signum mußte notgedrungen auch die VI. Rektoratsperiode stehen, deren wichtigste Daten der akademischen Geptlogenheit gemäß am heutigen Tage kurz registriert werden sollen.

Personalien: Der Lehrkörper unserer Hochschule hat folgende Neubefetzungen erfahren:

An die Stelle des auf den Lehrstuhl der Physiologie an der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität München berufenen Prof. Dr. Paechtner trat am 1. April 1926 der außerordentliche Professor an der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig, Dr. Alfred Trautmann, der sich mit einer Antrittsvorlesung über „Zirbelforschung“ einführte. Am 1. März 1927 wurde der Privatdozent an unserer Hochschule, Dr. Ludwig Lund, auf den Lehrstuhl für pathologische Anatomie und Nahrungsmittelkunde berufen und hielt seine Antrittsvorlesung „Über den heutigen Stand unserer Kenntnisse von der Entstehung der bösartigen Geschwülste“. Zu a. o. Professoren wurden ernannt: Veterinärat Dr. Edmund Hupka, Leiter der Ambulatorischen Klinik, und der Privatdozent für Chirurgie und Röntgenologie Dr. Paul Henkels.

Dem Städtischen Obertierarzt Dr. Otto Manegold wurde die Leitung der Kurse in der praktischen Fleischschau übertragen.

Im Kreise der Oberassistenten, Assistenten und wissenschaftlichen Hilfsarbeiter vollzogen sich zahlreiche Änderungen; die Nachteile der Hindernisse in der Neueinrichtung von Assistentenstellen konnten teilweise ausgeglichen werden durch die Einstellung von wissenschaftlichen Hilfsarbeitern und Volontärassistenten, und zwar am Anatomischen, Hygienischen und Pathologisch-anatomischen Institut, am Institut für Tierzucht- und Vererbungsforchung, an der Medizinischen Klinik und durch Abkommandierung der Stabsveterinäre Dr. Gressel und Dr. Hilgendorff.

Im Verwaltungspersonal war gleichfalls ein teilweiser Wechsel zu verzeichnen.

Todesfälle: Leider hat der Tod in die Reihe unserer Kollegen zwei schmerzliche Lücken gerissen: Nach langem schwerem Leiden verschied am 15. Dezember 1926 Prof. Dr. phil. et med. vet. Heinrich Rievel, Ordinarius für Pathologische Anatomie und Nahrungsmittelkunde; er gehörte dem Lehrkörper unserer Hochschule seit 1899 an

*) Erstattet anlässlich der Rektoratsübergabe am 17. Januar 1928 von Th. Oppermann.

Siehe D. T. W. 1928, Nr. 3, S. 48.

und verfaß von 1919 bis 1922 die Rektoratsgeschäfte. Begeistert von der Liebe zur Wissenschaft und zum Forchten, hat er sich auf seinen Spezialgebieten allgemein anerkannte große Verdienste erworben. Als Meister des Worts und der Lehre war er ein hochgeachteter Dozent, seine vornehme Gefinnung und seine kollegiale Einstellung verschafften ihm die Sympathie seiner Mitarbeiter und Berufsgenossen. Er hat seinem Stande und unserer Hochschule allzeit Ehre bereitet. Am 2. Juni 1927 starb Prof. Dr. med. vet. h. c. Heinrich Boethner, Direktor des Anatomischen Instituts. Im Jahre 1886 wurde er zum Ordinarius für Anatomie, Embryologie und Zoologie ernannt und verfaß sein arbeitsreiches Amt bis zum Jahre 1924; als ein erfolgreicher Lehrer und warmerherziger väterlicher Freund unserer akademischen Jugend und getragen von lebhaftem Interesse für unseren Stand erfreute er sich in weitesten Kreisen bester Wertschätzung. Die würdige Trauerfeier, die beiden heimgegangenen Kollegen zuteil wurde, mag als ein sprechender Ausdruck für unsere Verehrung und als ein Zeichen dafür gedeutet werden, daß wir beiden Heimgegangenen ein dauerndes, herzliches Gedenken bewahren werden.

Ferner nahm uns ein herbes Geschick unsere Ehrendoktoren Prof. Georg Koch-Berlin und Tierarzt Albert Franzenburg-Altona. Das Interesse, daß Beide unserer Hochschule entgegenbrachten, sichert ihnen ein dankbares Gedenken.

Auszeichnungen: Prof. Dr. Künnemann wurde zum außerordentlichen Mitgliede des Landesveterinär-amts und zum Mitgliede der Prüfungskommission für Veterinärärzte ernannt. Prof. Dr. Kronacher ist zum auswärtigen Mitgliede der königl. schwedischen Landwirtschaftsakademie gewählt worden. Prof. Dr. Mießner wurde zum Mitgliede des Reichs- und Landesgesundheitsrates sowie zum korrespondierenden Mitgliede der Wiener Gesellschaft für Mikrobiologie ernannt und vom Preuß. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten für hervorragende Beteiligung an der Gefolei-Ausstellung in Düsseldorf mit der Silbernen Staatspreismünze für landwirtschaftliche Leistungen ausgezeichnet. Die Professoren Geh. Rat Dr. Frick und Dr. Oppermann wurden vom Tierärztlichen Zentralverein für die Provinz Sachsen, Anhalt und Thüringen zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Ehrendoktoren: Auf einstimmigen Beschluß des Professorenkollegiums verlieh unsere Hochschule die Würde eines Ehrendoktors der Veterinärmedizin:

1. dem Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten in Preußen, Herrn Heinrich Steiger, „in dankbarer Anerkennung der bedeutenden Verdienste, die er sich durch seine verständnisvolle, tatkräftige und erfolgreiche Einwirkung auf die Fortentwicklung der hiesigen Hochschule — insbesondere die glückliche Lösung der lebenswichtigen Erweiterungsfrage — um diese und damit um das tierärztliche Bildungswesen überhaupt erworben hat“;
2. dem Ministerialdirigenten im Preuß. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Herrn Friedrich Müssmeier, „ihrem trefflichen Schüler, der mit dem Rüstzeug der Wissenschaft aufs beste vertraut, in seinem Berufe für die Veterinärmedizin Hervorragendes geleistet, hierdurch sich eine führende Stellung erungen und in dieser auch die hannoversche Hochschule bedeutend gefördert hat“;
3. dem Direktor der Akademischen Kinderklinik in Düsseldorf, Herrn Geh. Medizinalrat Prof. Dr. med., Dr. jur. h. c. Arthur Schlossmann, „dem geistigen Urheber der Düsseldorfer Ausstellung 1926 für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge

und Leibesübungen, dessen hervorragende und schöpferische Verdienste um die Errichtung dieses Kulturwerkes ersten Ranges um so höher zu bewerten sind, als die Durchführung ein Jahr nach beendeteter Befatzung erfolgte und in eine Zeit schwersten wirtschaftlichen Niederganges fiel,“

4. dem Prof. a. D. an der Akademie der bildenden Künste, Herrn Georg Koch-Berlin, „dem Meister in der künstlerischen Darstellung des Pferdes, in Anerkennung der Verdienste, die er sich durch die vollendete, lebenswahre und vielgestaltige künstlerische Wiedergabe des Pferdes erworben hat.“

Ehrenbürger: In dankbarer Anerkennung der Förderung der Belange der Hochschule wurden zu Ehrenbürgern ernannt: Die Herren Prof. Dr. Joh. Paechtner-München, Dr. jur. Arthur Menge, Oberbürgermeister der Stadt Hannover, Generaldirektor Richard Platz, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Hannover, Baron Georg von Reden-Reden, Präsident der Landwirtschaftskammer für die Provinz Hannover, Syndikus Dr. Kurt Finkenwirth-Hannover und Tierarzt Dr. Wilhelm Becker-Bevenfen.

Anlässlich des 50jährigen Bestehens des Reichsgesundheitsamtes wurden zu Ehrenbürgern ernannt, die Herren Dr. h. c. Franz Bumm-Berlin, Präsident des Reichsgesundheitsamtes, und Geh. Rat Dr. h. c. Erwin Wehrle-Berlin, Direktor im Reichsgesundheitsamt.

Am 14. April 1926 hatte der Rektor die Ehre, unserem Ehrendoktor und Ehrenbürger, Herrn Reichspräsidenten, Generalfeldmarschall von Hindenburg, das goldene Ehrenbürgerabzeichen zu überreichen.

Studierende, Kurse, Lehrausflüge: Die Zahl der Studierenden betrug

im W.-S. 1925/26	216 und 6 Gasthörer,
S.-S. 1926	219 und 10 Gasthörer,
W.-S. 1926/27	226 und 4 Gasthörer,
S.-S. 1927	260 und 11 Gasthörer,
W.-S. 1927/28	249 und 5 Gasthörer.

Demnach hat auch in den letzten zwei Jahren unsere Hochschule von allen tierärztlichen Bildungsanstalten Deutschlands die höchste Besucherzahl aufzuweisen. In der genannten Zeit haben die tierärztliche Vorprüfung abgelegt 112 Studierende, die tierärztliche Fachprüfung 98 Kandidaten; die Promotionsprüfung bestanden 76 Tierärzte.

Die Studentenhilfe Hannover, deren Vorstand während der Berichtszeit Prof. Dr. Praechtner und Mießner angehörten, wirkte für unsere Studierenden durch Beschaffung eines preiswerten Mittagessens und durch Gewährung von Darlehen an bedürftige Studierende segensreich. Leider wurde die während der Inflationszeit als Unterkunftsraum für die Mensa geschaffene Baracke Ende des letzten Jahres durch Brand so sehr beschädigt, daß sie nicht mehr benutzbar ist. Es wäre sehr zu wünschen, daß anlässlich der demnächstigen Jubelfeier unserer Hochschule für die Mensa würdige und behagliche Räume geschaffen würden.

Gemäß einem Landtagsbeschluß vom 18. Mai 1926 hatte das Preuß. Staatsministerium die Verordnung vom 19. September 1920 über die Bildung von Studentenschaften außer Kraft gesetzt und unter dem 23. September 1927 eine neue Verordnung erlassen, über deren Annahme die Studentenschaften aller Preuß. Hochschulen in geheimer Abstimmung im November 1927 zu befinden hatten. Mit den Studentenschaften aller Preuß. Hochschulen lehnte auch die hiesige fast einmütig die neue Verordnung ab. Infolgedessen hat die Institution der Studentenschaft an unserer Hochschule aufgehört zu existieren; es verbleibt mithin lediglich die Möglichkeit, daß sich die Studierenden wie in

früheren Zeiten zu einer zwanglosen Vereinigung zusammen-schließen. Es ist lebhaft zu wünschen, daß sich auch unter den neuge schaffenen Verhältnissen ein ersprießliches Zusammenarbeiten zwischen Professorenkollegium und der Vereinigung der Studierenden anbahnt.

Der Fortbildungskursus für prakt. Tierärzte wies 64 Teilnehmer auf, der Kursus für Schlachthoftierärzte 43, derjenige für beamtete Tierärzte 19. Die Vorbereitungskurse für Veterinäratskandidaten wurden von 77 Tierärzten besucht.

Verschiedene Mitglieder unseres Kollegiums beteiligten sich als Referenten an den vom Deutschen Veterinärat veranstalteten Wanderfortbildungskursen für Tierärzte.

Seit Beginn des Wintersemesters wurden wissenschaftliche Vortragsabende des erweiterten Dozentenkollegiums veranstaltet, um die Ergebnisse der vielseitigen Arbeits- und Forschungsmethoden der einzelnen Institute und Kliniken dem Kreise der übrigen Kollegenschaft und den Studierenden bekanntzugeben und das wissenschaftliche Zusammenarbeiten an der Hochschule zu fördern.

Wissenschaftliche Exkursionen für die Studierenden fanden statt unter der Leitung der Professoren Dr. Kronacher und Neubert nach den südwestdeutschen und bayerischen Zuchtgebieten und den Ausstellungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft; unter Leitung von Prof. Mießner nach Düsseldorf zum Besuche der Gefolei, nach der Insel Riems zur Besichtigung der Staatl. Forschungsanstalten und nach Eystrup zur Besichtigung des von Behring'schen Institutes zur Gewinnung von Schweinepestserum.

Für das Jahr 1928 wurden folgende Preisaufgaben gestellt:

1. Für die vorklinischen Semester: „Bei welchen Tierverschickungen kann eine chemische Ausmittelung von Nutzen sein? Eine literarische Studie.“ Referent Prof. Dr. Dankwort.

2. Für die klinischen Semester: „Ursachen der eingeklinkten Lende beim Niederungsrind und ihr besonderer Zusammenhang mit der Horizontallagerung des tafelförmigen Beckens.“ Referent: Prof. Dr. Kronacher.

Dem langgehegten Wunsche der Studierenden nach Einrichtung von Reitkursen konnte vom Sommersemester 1927 ab entsprochen werden. Die Oberleitung der Reitkurse liegt in den Händen von Prof. Dr. Hupka.

Die für das Studienjahr 1926/27 gestellten Preisaufgaben fanden drei Bearbeiter, die sämtlich mit einem Preise bedacht werden konnten. Für das Studienjahr 1927/28 waren folgende Preisaufgaben gestellt worden: für die vorkl. Studierenden: „Unsere Kenntnisse über die Statik und Mechanik des Pferdekörpers“ und die klin. Semester: „Die Ruhr der Küken und ihre Bekämpfung; eine literarische Studie“. Das letztere Thema fand zwei Bearbeiter; die eine Arbeit trug das Stichwort „Studium“, die andere das Motto: „Je früher und zielbewußter die Bekämpfung der bakteriellen weißen Kükenruhr in Deutschland einsetzt, um so leichter und sicherer wird der Erfolg sein.“ Die Arbeit „Studium“, Verfasser: cand. med. vet. Wernery, wurde mit einem Preise von 400 Mk. ausgezeichnet, die andere Arbeit: Verfasser cand. med. vet. Deutsch, wurde mit 100 Mk. belohnt.

Entwicklung der Hochschule: Durch Kaufvertrag vom 21. Juni 1926 ist das der Hochschule südlich angrenzende etwa 2,8 ha umfassende städtische Gelände zum Preise von 1 075 725 Mk. zugewiesen worden. Es soll dazu dienen, in den nächsten Jahren die als notwendig erachteten Neu- und Erweiterungsbauten aufzunehmen. Die erste Bauprate für die Errichtung der Klinik für Geburtshilfe und Rinderkrankheiten und für das Physiologische Institut in Höhe von insgesamt 357 000 Mk. steht bereits zur Ver-

fügung, und nachdem in mehreren Konferenzen mit den Vertretern des Landwirtschafts- und Finanzministeriums ein großzügiger Plan für die bauliche Aufteilung des ganzen Geländes festgelegt worden ist, wird mit den Neubauten in diesem Frühjahr begonnen werden.

Der Ankauf dieses Geländes bedeutet einen wichtigen Meikstein in der zukünftigen Entwicklung unserer Hochschule im speziellen und der veterinärmedizinischen Hochschulen Preußens im allgemeinen.

Wenn die Tierärztlichen Hochschulen Preußens als Fachhochschulen in der Erfüllung ihrer vielseitigen Aufgaben nicht hinter den veterinärmedizinischen Fakultäten zurückbleiben sollen, so müssen jene über best eingerichtete Institute, auch für die rein naturwissenschaftlichen Disziplinen, und über genügend Lehrkräfte verfügen.

Was die Erfüllung dieser aktuellen Belange unter der augenblicklichen schwierigen Lage bedeutet, ist bekannt. Um so erfreulicher ist es, daß der Erwerb des Geländes den weiteren Ausbau ermöglicht. Deshalb fühlen wir uns zu lebhaftem Danke verpflichtet der Fürsorge des Landwirtschaftsministeriums, der vermittelnden Mitwirkung unseres verehrten Herrn Kurators und nicht zuletzt dem Magistrat der Stadt Hannover.

Als weiterer Beweis für die weitstichtige Berücksichtigung unserer Wünsche seitens des Landwirtschaftsministeriums sei angeführt, daß in den letzten beiden Jahren bedeutende Mittel ausgeworfen wurden für die Verlegung und moderne Ausgestaltung der Bibliothek, für die Einrichtung eines Sitzungszimmers, für erhebliche bauliche Umänderungen, für innere Einrichtungen und Beschaffung von Lehrmitteln in fast allen Instituten und Kliniken.

Als besonders erfreulich ist die Beschaffung des Hochschullehrgutes zu bezeichnen. Es hatte sich immer mehr als notwendig erwiesen, unseren Studierenden Gelegenheit zu geben, auf einem eigenen, mustergültig eingerichteten Gutsbetrieb Einblicke in die gesamte Betriebsführung der Landwirtschaft zu ermöglichen, in der richtigen Erkenntnis, daß dadurch den jungen Tierärzten die Erfüllung der an sie in praxi herantretenden Anforderungen um so leichter wird, wenn sie frühzeitig aus eigener Anschauung die Zusammenhänge zwischen Aufzucht, Haltung und Fütterung der Haustiere einerseits und der Entstehung und Verhütung von Krankheiten derselben andererseits kennen lernen. Das für diese Zwecke von der Preuß. Domänenverwaltung gepachtete, am 15. Juli 1926 übernommene, etwa 800 Morgen große, mitten im Lüneburgischen Hochzuchtgebiete gelegene Gut Adendorf muß Dank seiner Boden- und Wirtschaftsverhältnisse als für die gedachten Zwecke besonders geeignet bezeichnet werden. Die Studierenden der klinischen Semester sollen sich abteilungsweise in mehrwöchigen Kursen, die tunlichst in die Ferien fallen, unter Gewährung freier Unterkunft und Verpflegung mit den Grundzügen des landwirtschaftlichen Betriebes vertraut machen und in den Viehbeständen des Lehrgutes ein wertvolles Demonstrationsmaterial zur Verfügung haben. Die Oberleitung des Lehrgutes liegt in den Händen von Prof. Neubert. Da die Berliner Tierärztliche Hochschule schon seit Jahren das Lehrgut Klein Ziethen besitzt, so ergibt sich die erfreuliche Tatsache, daß die Tierärztlichen Hochschulen Preußens in dieser Hinsicht von ihrem Ministerium hervorragend betreut sind. Unser Kollegium ist sich der vielen Hemmnisse, die sich der Übernahme des Lehrgutes Adendorf entgegenstellten, wohl bewußt, um so größer ist daher unser Dank, den wir auch an dieser Stelle aussprechen dem Herrn Staatsminister Dr. Steiger für sein energisches Verfechten unserer Wünsche, der Preuß. Tierseuchenforschungsfür entgegenkommende Hilfe und Herrn Prof. Dr. Neubert für die in vollster Uneigennützigkeit betätigte Leitung und Umstellung der Gutswirtschaft für die geplanten Unterrichtszwecke. Der Hochschule wird es eine

ehrenvolle Pflicht sein, das Lehrgut für den Unterricht in bester Weise zu nützen und in treuer Obhut zu halten.

Gesellschaft der Freunde: Am 1. Mai 1926 fand die Gründungsverammlung der Gesellschaft der Freunde unserer Hochschule statt unter Teilnahme der Herren Minister Dr. Steiger und Ministerialdirigent Dr. Müssmeier sowie zahlreicher Vertreter der Behörden, der Landwirtschaft, des Handels und der Industrie. Der Gesellschaft der Freunde fällt die Aufgabe zu, die Belange der wissenschaftlichen Arbeiten unserer Institute finanziell zu fördern, frühere Angehörige und Studierende unserer Hochschule mit ihrer Alma mater in lebendiger Verbindung zu halten und Freunde und Gönner aus den verschiedensten Zweigen der Wirtschaft zu werben und für unsere Aufgaben zu interessieren. Zum Vorsitzenden wurde Herr Direktor Tgahrt, damaliger Präsident der hiesigen Industrie- und Handelskammer, zum Schatzmeister Herr Bankdirektor Kluge, zum Schriftführer Herr Regierungsrat Dr. Liebernackel gewählt. Der Vorstand umfaßt außer diesen Herren 7 Mitglieder, dem Verwaltungsrat gehören 30 Herren aus den verschiedensten Interessenskreisen an. Auf der Gründungsverammlung erfreuten uns mit Vorträgen Prof. Dr. Kronacher: „Über den Werdegang einer Haustierzucht“, Prof. Dr. Dankwortt: „Über Tierversgiftungen“, Privatdozent Dr. Henkels: „Über die veterinärmedizinische Röntgenologie in ihrer jüngsten Entwicklungsphase“. Im Laufe des letzten Sommers sah sich zu unserem lebhaften Bedauern Herr Präsident Tgahrt wegen Übersiedelung nach Neukirchen i. Saargebiet veranlaßt, den Vorsitz niederzulegen; ihm sei auch an dieser Stelle für seine erfolgreichen Dienste im Interesse unserer Gesellschaft herzlichst gedankt. Zu seinem Nachfolger wählte die letzte Generalversammlung am 18. Juni 1927 den Präsidenten der Hannoverschen Landwirtschaftskammer, Herrn Baron von Reden-Reden; Herr Generaldirektor Platz wurde zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft ernannt. Auf der letzten Versammlung konnten wir u. a. als Gäste begrüßen die Herren Professor Dr. Riecke, als Vertreter der Universität Göttingen, seine Magnifizenz Prof. Dr. Schöttler, Rektor der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin, Geh. Rat Professor Dr. Schlossmann-Düsseldorf, Prof. Dr. Nörr von der Veterinärmedizinischen Fakultät zu Gießen und Geh. Rat Dr. Lothes-Köln. Die Tagesordnung umfaßte einen lichtvollen Vortrag unseres Ehrendoktors Geh. Rat Schlossmann-Düsseldorf über „Die Bedeutung der Beziehungen zwischen Veterinär- und Humanmedizin für beide Wissenschaften und für die Allgemeinheit“ und der Herren Prof. Dr. Götte: „Über Besuch deutscher und außerdeutscher Tierärztlicher Hochschulen und Fakultäten, Eindrücke einer Studienreise“ und Regierungsbaumeister Grabenhorst über „Gesichtspunkte für den Neubau veterinärmedizinischer Institute“.

Die Gesellschaft unserer Hochschulfreunde zählt z. Zt. etwa 600 Mitglieder. Dank zahlreicher, zum Teil namhafter Spenden, ich hebe besonders hervor, daß der Magistrat der Stadt Hannover 3000 Mk., die Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte 2000 Mk. stifteten, konnte eine größere Summe im Interesse der Institute und Kliniken wie des Hochschullehrgutes ausgeworfen werden.

Feierlichkeiten: Beim Rektoratswechsel am 18. Januar 1926 erstattete Prof. Dr. Mießner Bericht über die abgelaufene V. Rektoratsperiode und übergab seinem Nachfolger Prof. Dr. Oppermann die Insignien der Rektoratswürde. Dieser sprach in seinem Festvortrag „Über einige akute Probleme auf dem Gebiete der Veterinärmedizin“. Am gleichen Tage fand im Kuppelsaal der Stadthalle eine gemeinsame Reichsgründungsfeier der beiden

hiesigen Hochschulen statt. Rektor Prof. Dr. Oppermann hielt die Weiherede, Prof. Dr. Erdmannsdorfer die Festrede „Über die Verteilung der Metalle im Erdkörper“. Bei der am 18. Januar 1927 im gleichen Rahmen veranstalteten Reichsgründungsfeier hielt die Weiherede der Rektor der Technischen Hochschule Prof. Dr. Oesterlen, die Festrede Prof. Dr. Dankwortt über „Deutschlands Ernährungsfragen auf Grund der Erfahrungen im Weltkriege“.

Am 28. Juni 1927 veranstalteten die Studentenschaften beider Hochschulen in der Stadthalle eine Kundgebung zur Kriegsschuldfrage.

Am 25. Mai 1927 vereinigten sich Angehörige der Lehrkörper der Universität Göttingen und der beiden hiesigen Hochschulen mit ihrem Kurator und zahlreichen Vertretern der Staatsbehörden, der Stadtverwaltung und der Wirtschaftskreise, um von dem langjährigen, stellvertretenden Hochschulkurator, Herrn Obervizepräsident Dr. med. h. c. Kriege, offiziell Abschied zu nehmen und ihm bei seinem Übertritt in den Ruhestand für die allzeit warmherzige und verständnisvolle Wahrnehmung der Hochschulinteressen zu danken.

Am 9. Juli 1926 und 12. Juli 1927 veranstalteten unsere Studierenden ihr alljährliches Sportfest und am 26. Februar 1927 ein Hallenturnfest. Erfreuliche Leistungen gaben von dem hohen sportlichem Interesse unserer Studentenschaft Zeugnis.

Am 2. Februar 1927 fand in den Räumen des Parkhauses der gut besuchte Hochschulball statt.

Der Rektor der Hochschule nahm am 20. April 1927 an dem von dem Herrn Reichspräsidenten in Kastens Hotel gegebenen Essen teil, wohnte den Jubiläumsfeiern der Universitäten München, Tübingen und Marburg bei, war auf den verschiedenen Rektorenkonferenzen und Hochschultagungen anwesend und vertrat die Hochschule bei zahlreichen Veranstaltungen der verschiedensten Wirtschafts- und Interessenskreise.

Wenn ich somit am Ende meiner Amtsperiode mit Genugtuung konstatieren kann, daß die Weiterentwicklung unserer Hochschule trotz aller Schwierigkeiten erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen hat, so bin ich mir wohl bewußt, daß das in erster Linie der verständnisvollen und weitblickenden Einstellung der Staatsregierung zu verdanken ist. Nicht zuletzt hebe ich gern und mit lebhaftem Danke hervor das einmütige Zusammenarbeiten unseres Kollegiums, die treue Mitwirkung aller Beamten und Angestellten der Hochschule.

Und nun wende ich mich zu Ihnen, verehrter Herr Kollege Mießner. Die neue Rektoratsperiode, unter dem Zeichen des 150jährigen Jubiläums stehend, wird an meinen Amtsnachfolger besonders hohe Ansprüche stellen, denen der neue Rektor um so leichter zu genügen imstande sein wird, wenn er mit den vielseitigen Verwaltungsgeschäften bereits vertraut ist und sich deshalb mit um so größerer Bewegungsfreiheit den Repräsentationspflichten seines Amtes widmen kann. Dies im Verein mit der Tatsache, daß Sie, als mein Amtsvorgänger, unsere Hochschule in ausgezeichnete Weise vertreten haben, gab unserem Kollegium Anlaß, Sie zum Jubiläumsrektor zu wählen. Wir danken Ihnen für die Annahme der Wahl und indem ich Ihnen unter herzlichsten Glückwünschen die Insignien Ihrer Würde überreiche, darf ich versichern, daß Ew. Magnifizenz von dem Vertrauen unseres Kollegiums getragen werden. Wir geben der Hoffnung Raum, daß auch die kommende Rektoratsperiode sich für unsere Alma mater segensreich gestalten möge.

Ziele der Lehre und Forschung an den tierärztlichen Bildungsanstalten. *)

Von Prof. Dr. H. Mießner.

Hochanfehnliche Versammlung,
sehr verehrte Herren Kollegen,
liebe Kommilitonen!

Die Wahl und das dadurch zum Ausdruck gebrachte Vertrauen des Professorenkollegiums haben mir nach einem Biennium zum zweiten Male die Rektorwürde unserer geliebten Alma mater übertragen. Dieser Ruf ist für mich um so ehrenvoller, als mir dadurch die Aufgabe zufällt, am 14. Juni 1928 das Fest des 150jährigen Bestehens unserer Hochschule als Jubiläumsrektor zu leiten. Ich will hoffen, das Vertrauen zu rechtfertigen, möchte aber schon heute und von dieser Stelle aus um Ihrer Aller Mitarbeit bitten, ohne die mir eine erfolgreiche Amtsführung, insbesondere das Gelingen einer unserer Hannoverischen Hochschule würdigen Feier unmöglich erscheint.

Mit Übernahme der erneuten Würde komme ich zunächst nicht nur einer Pflicht, sondern einem inneren Triebe nach, wenn ich meinem verehrten Amtsvorgänger, Ihnen Herr Kollege Oppermann, im Namen der Hochschule, des gesamten Lehrkörpers, der Studierenden, der Beamten und Angestellten den Dank für Ihre mühevollen und manchmal dornenvollen Amtsführung zum Ausdruck bringe. Sie haben es in hervorragender Weise verstanden, die Hochschule nach außen bei vielen Gelegenheiten würdig zu vertreten. Der Entwurf der für das neue Gelände geplanten Neubauten ist nach zahlreichen Verhandlungen erfreulicherweise so weit gediehen, daß in absehbarer Zeit mit dem ersten Spatenstich begonnen werden kann. Die Gesellschaft der Freunde der Tierärztlichen Hochschule hat sich unter Ihrer Führung weiter entwickelt; Dank hierfür auch allen Spendern und Freunden. Ferner sind unsere Beziehungen zu den übrigen Hochschulen Niedersachsens pfleglich behandelt. Ein Werk trägt aber besonders den Stempel Ihrer Rektoratsperiode, das ist die Erwerbung des Lehrgutes Adendorf und seine Etatisierung. Trotz des Wohlwollens der hohen Staatsregierung waren doch mancherlei Hindernisse zu überwinden und sind dank Ihrer zähen Energie beseitigt worden. Die Hochschule schätzt sich glücklich, als eine der ersten Hochschulen der Welt ein Lehrgut zur praktischen Ausbildung der Studierenden zu besitzen und zollt Ihnen dafür besonderen Dank. Ich bitte Sie, als nunmehrigen Prorektor, mich weiterhin mit Rat und Tat zu unterstützen.

Mit dem Antritt einer neuen Rektoratsperiode erscheint es geboten, einen Rückblick auf das bisher Geleistete zu tun und ihn mit einem Ausblick auf die Gebiete, die noch der Bearbeitung harren, zu verbinden. Unsere Hannoverische Hochschule hat während ihres nunmehr bald 150jährigen Bestehens, besonders seit der Überführung auf das jetzige Gelände eine schnelle Entwicklung durchgemacht, die im Rahmen des Möglichen Schritt gehalten hat mit den Errungenschaften der Wissenschaft und den Aufgaben unseres Standes. Der Aufbau der Hochschule und des ganzen tierärztlichen Standes steht weiterhin im unmittelbaren Zusammenhang mit der Einführung der Universitätsreife am 1. April 1903 als Vorbedingung für das tierärztliche Studium, und mit der Einsetzung der Rektoratsverfassung am 16. Juni 1913. Mit der Universitätsreife wurde auch nach außen hin der Hochschule die Anerkennung einer vollwertigen akademischen Anstalt gezollt; das Rektorat gestattete eine ungehemmtere Entwicklung der zurzeit bestehenden zehn Ordinariate. Gleichzeitig war damit eine Ernennung der bisherigen unter dem Direktor

der Hochschule stehenden Institutsleiter zu selbständigen Institutsdirektoren verbunden. Angesichts dieser Errungenschaften gedenken wir dankbar ihrer Vorkämpfer und treuen Helfer, vor allem des unvergeßlichen Ehrendoktors Heinrich Küster.

Dem Ausbau der veterinärmedizinischen Wissenschaft kamen zunächst die gewaltigen Fortschritte zu statten, die in zielbewußter Aufnahme und Auswirkung der klassischen Schöpfungen eines Robert Koch besonders auf dem Gebiete der ätiologischen Erforschungen vieler Tierseuchen gemacht wurden. Die Ermittlung zahlreicher Mikroorganismen als Erreger von Tierseuchen und die Erkenntnis der biologischen Eigenschaften und Krankheitsursachen erschloß auch uns einen bedeutungsvollen Einblick in das Wesen der Infektionskrankheiten. Die Errungenschaften der ätiologischen Forschung liegen aber nicht allein auf theoretischem Gebiete, vielmehr eröffneten sie wertvollste Möglichkeiten für die Erkennung und erfolgreiche Bekämpfung zahlreicher Tierseuchen, die heute schon im gewaltigen Ausmaße verwirklicht sind. Es sei nur an die methodische Ausbildung der Rotlaufbekämpfung durch den im vorigen Jahre verstorbenen deutschen Tierarzt Lorenz in Darmstadt gedacht. Während wir vor der Lorenz'schen Simultanimpfung im Jahre 1892 dem Schweinerotlauf, der unsere Bestände dezimierte, machtlos gegenüberstanden, hat inzwischen die Seuche durch die glänzenden Erfolge der Lorenz'schen Impfmethode ihre Schrecken vollständig verloren. Das bedeutet für die deutsche Landwirtschaft und für das deutsche Volksvermögen alljährlich einen Gewinn von ungezählten Millionen.

Die Milzbrandimpfung nach Pasteur und nach Sobernheim trug zur Eindämmung dieser für Menschen und Tiere gleich gefährlichen Seuche bei.

Die Bekämpfung der Tollwut des Menschen nach Pasteur mit getrockneter Gehirn-Rückenmarksubstanz tollwutkranker Kaninchen führte zur systematischen Bekämpfung dieser Seuche. In neuerer Zeit geht man dazu über, die Hunde, die eigentlichen Träger und Überträger des Tollwutvirus durch vorbeugende Impfungen vor einer Erkrankung zu schützen und damit die Weiterverbreitung der Seuche unter Menschen und Tieren zu verhindern. Aus Amerika und Japan liegen Mitteilungen über hunderttausende derartiger Impfungen vor. Auch in Deutschland sind bereits nach der im hiesigen Hygienischen Institut vorgeschlagenen Methode praktische Impfversuche mit Erfolg ausgeführt worden.

Weiterhin sei erinnert an die erfolgreiche Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche, wie sie durch Löffler und seine Mitarbeiter inauguriert wurde. Welche große wirtschaftliche Bedeutung gerade der Maul- und Klauenseuche zukommt, mag aus den Verlusten, die nach der überschläglichen Schätzung von Müssemeier¹⁾ in den schweren Seuchenjahren 1920/21 eine Höhe von fast ½ Milliarde Mark erreichten, hervorgehen. Zur weiteren Erforschung und Bekämpfung der Seuchen ist auf der Insel Riems eine preussische Maul- und Klauenseuche-Forschungsanstalt errichtet worden, die in der ganzen Welt ihresgleichen sucht.

Auch der Bekämpfung der Schweinepest, die alljährlich, besonders in den Herbstmonaten, unsere wertvollen Schweinebestände dahintrafft, wird man künftig nicht mehr machtlos gegenüberstehen, seitdem in Eystrup durch die Behringwerke mit staatlicher Genehmigung eine Serumanstalt errichtet worden ist. Das dort nach neuesten Methoden hergestellte Serum schützt gesunde Schweine eines verseuchten Bestandes vor der Erkrankung.

*) Rede bei Übernahme des Jubiläumsrektorates am 17. Januar 1928. Siehe D. T. W. 1928, Nr. 3, S. 48.

In ähnlicher Weise versucht man heut die Ursachen der ansteckenden Blutarmut, des Verwerfens unserer Haustiere, vieler Jungtierkrankheiten aufzuklären und moderne Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten.

Einen nicht geringen Einfluß haben die von Schütz und seiner Schule inaugurierten diagnostischen Verfahren ausgeübt. In erster Linie möchte ich hierbei der Serodiagnose des Rotzes gedenken. Durch die Untersuchung des Blutes der Einhufer ist es gelungen, den Rotz der Pferde zu einer Zeit zu erkennen, in der alle bisherigen klinischen diagnostischen Verfahren vollständig versagten. Geradezu vorbildlich wurde diese Methode während des Krieges von der Heeresverwaltung ausgebaut. Sie führte zu dem Erfolge, daß die Rotzkrankheit, die unsere Pferdebestände mit dem Vorrücken der Truppen auf dem östlichen Kriegsschauplatze schwer zu schädigen drohte, in verhältnismäßig kurzer Zeit mit nicht allzu großen Verlusten getilgt wurde. Dies glänzende Resultat wurde trotz der ungünstigen Verhältnisse eines Krieges durch fahrbare Blutuntersuchungsstellen, die den Truppen folgten, ermöglicht. Sie führten jährlich etwa 1 Million Blutuntersuchungen aus und veranlaßten die Tötung der dabei rotzverdächtig erscheinenden Pferde so frühzeitig, daß eine Weiterverfleppung der Seuche auf Nachbartiere verhindert werden konnte. Die ausdrückliche Anerkennung der Obersten Heeresleitung für die Leistungen des Veterinär-Offizierkorps darf demnach als eine wohlverworbene gebucht und in Erinnerung gebracht werden.

Die erzielten Fortschritte sollen in uns keineswegs das Gefühl des Behagens und der Ruhe erwecken. Sie regen vielmehr zu weiterer Arbeit an. Die Wissenschaft — auch die unfrige — kennt keinen Stillstand und der Aufgaben harren genug. Trotz der gewaltigen Errungenschaften auf dem Gebiete der ätiologischen Forschung befinden wir uns bezüglich des Wesens der Erkrankungen eigentlich noch in den Anfangsgründen, ja man kann sogar sagen, daß wir durch das jahrzehntelange und zum Teil erfolgreiche Suchen nach den Erregern das Studium der eigentlichen Entwicklung der Krankheit etwas vernachlässigt haben. Wir wissen, daß Menschen und Tiere in ihrem Körper krankmachende Erreger wie Tetanusbazillen, Tuberkel-, Rotlaufbakterien u. a. beherbergen können, ohne zu erkranken. Die Krankheitsbereitschaft des betroffenen Individuums — die Disposition — spielt hierbei zweifellos eine ausschlaggebende Rolle. Über das Wesen der Disposition bestehen zwar bereits wertvolle Arbeiten und Theorien, dem Kernpunkt der Frage sind wir trotzdem wenig näher gekommen. Aufgabe, auch der veterinärmedizinischen Wissenschaft muß es sein, hier im Verein mit der humanmedizinischen Schwesternwissenschaft weiter zu schürfen.

Der hohe Wert, der in unserem etwa 18 Millionen Stück zählenden Rindviehbestand investiert ist, fordert dringend, der Buiatrik an den tierärztlichen Bildungsanstalten mehr Aufmerksamkeit als bisher zuzuwenden. Man hat diesem Umstande an manchen Hochschulen des In- und Auslandes bereits Rechnung getragen durch Schaffung besonderer Ordinariate sowie Kliniken und Institute zur Erforschung und Bekämpfung der Rinderkrankheiten. Auch wir in Hannover hoffen in nicht allzu ferner Zeit nach Errichtung eines besonderen Ordinariats für Geburtshilfe und Rinderkrankheiten, den Anforderungen in Ausbildung und Forschung auf diesem Gebiete gewachsen zu sein. Im Interesse der Sache wäre zu wünschen, daß die geplanten Baulichkeiten in kürzester Frist ausgeführt würden, da ohne sie eine erspriessliche Forscher- und Lehrtätigkeit nicht möglich ist.

Unter den neuerdings vordringlichen ärztlichen Aufgaben der Veterinärmedizin mag hier zunächst das Studium und die Bekämpfung der Bienenfeuchen genannt sein. Der Wert der Bienenzucht liegt nicht allein in den Erträgen an Wachs und Honig, sondern auch in der

Blütenbefruchtung¹⁾. So kommt eine erfolgreiche Bienenzucht der ganzen Landwirtschaft zugute. Erfreulicherweise ist z. B. in Thüringen nach Schotte²⁾ am 16. April 1926 eine Polizeiverordnung zur Bekämpfung der Bienenfeuchen erlassen. Anzeigepflichtig sind: 1. Die Faulbrut, 2. die Mykosen, 3. Nosemafeuche, 4. Milbenfeuche. Den Regierungsveterinärärzten fällt die Aufgabe der Ermittlung der Seuche und der Bekämpfung zu; letztere in Gemeinschaft mit dem Imkerfachverständigen. — In der Provinz Sachsen hat das Bakteriologische Institut der Landwirtschaftskammer unter seinem rührigen Leiter, Prof. Dr. Raebiger³⁾, die Bekämpfung der Faulbrut und Nosemafeuche in die Hand genommen. Die Landwirtschaftskammer hatte für Durchführung veterinärpolizeilicher Maßnahmen die Kreisveterinärärzte vorgeschlagen. Dies ist abgelehnt worden wegen zu starker Belastung der Staatskasse. An Stelle der Veterinärbeamten sind sachverständige Imker als Seuchenwarte angestellt, eine sachdienliche Einbeziehung der Tierärzte in diese Maßnahmen bleibt weiterhin anzustreben, desgleichen deren reichsgesetzliche Regelung unter angemessener Mitwirkung der Veterinärmedizin. An den tierärztlichen Bildungsanstalten in Berlin und Leipzig ist den Studierenden Gelegenheit gegeben, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Hannover wird seit Errichtung des Bienenzuchtinstitutes in Celle von nun ab auch in der Lage sein, durch den Leiter des Instituts die Bienenkrankheiten im Lehrplan aufzunehmen.

Die Schweiz hat zuerst die Bekämpfung der Bienenkrankheiten staatlich organisiert und zunächst die Faulbrut und die Milbenfeuche anzeige- und entschädigungspflichtig gemacht. Nach Bürgi wird dort die Faulbrut mit dem Erfolg bekämpft, daß die Faulbrutfälle von 17 auf 4 Prozent zurückgegangen sind. Ebenso wie bei den anderen Tierfeuchen ist dort auch die Bekämpfung der Bienenfeuchen den Tierärzten übertragen. Die Ausführung der Bekämpfungsmaßnahmen erfordert Einsicht in das Bienenleben und Vertrautheit mit ihm, die meist nur der Imker besitzt. Deshalb müssen bei der Bekämpfung Tierarzt und Imker zusammen arbeiten.

Nach Fiebig⁴⁾, Wien, wird der Wert der Binnenfischerei in Deutschland auf über 100 Millionen Mark geschätzt. Der Fisch ist ein animalisches Nahrungsmittel und muß der tierärztlichen Kontrolle im gleichen Maße wie die übrigen animalischen Nahrungsmittel unterstehen. Zudem muß der Tierarzt auch über die Krankheiten der Fische Bescheid wissen, weil er ja auf Grund seines Studiums hierfür prädestiniert ist. Es wäre kurzfristig und objektiv unhaltbar, hierin etwa eine Konkurrenz gegenüber den Oberfischmeistern und Fischereibiologen sowie Hydrobiologen zu erblicken. Soweit es sich um die eigentliche Fischzucht und um die Wasserverhältnisse handelt, sind diese natürlich zuständig, ebenso natürlich wären aber die Fischkrankheiten und die hiermit zusammenhängenden Fragen als ureigenstes Gebiet des Tierarztes diesem vorzubehalten sein.

Mit Recht wendet sich darum Raebiger⁵⁾ gegen die Auffassung der Fischerei- und Wasserbiologen, daß die Untersuchungen von Fischkrankheiten ihre ausschließliche Domäne sei. Auch hier wird ähnlich den Bienenkrankheiten ein inniges Zusammenarbeiten zwischen den wissenschaftlichen Landesanstalten für Fischzucht, den Oberfischmeistern und den Tierärzten bezw. veterinär-bakteriologischen Instituten am schnellsten zum Ziele und wesentlich zur Behebung der großen, durch Fischsterben veranlaßten Verluste führen.

¹⁾ Borchert: Die wichtigsten Bienenfeuchen und ihre Bekämpfung. D. T. W. 1927, S. 798.

²⁾ D. T. W. 1926, S. 796.

³⁾ D. T. W. 1926, S. 796.

⁴⁾ Fiebig: Fische und Fischkrankheiten im tierärztlichen Unterricht. D. T. W. 1927, S. 49.

In Österreich sind Fischseuchen (Furunkulose) in das Tierseuchengesetz aufgenommen, ebenso wie die Bienen-seuchen in der Schweiz, zu dessen Durchführung allein die Tierärzte berufen sind. Natürlich ist es hierzu notwendig, daß die Fischkrankheiten an den tierärztlichen Bildungsanstalten gründlicher als bisher bearbeitet und womöglich in der Prüfungsordnung verankert werden. Da viele wirtschaftlich schädigende Fischkrankheiten parasitären Ursprungs sind, so könnte der Parasitologe der Hochschule die Dozentur für Fischkrankheiten mit übernehmen. Wir stimmen darin vollständig mit der schon auf dem internationalen veterinärmedizinischen Haager Kongreß 1909 und auf der Düsseldorfer Naturforscherversammlung 1926 erneut aufgestellten Forderung Fiebigers überein: „Es sind an allen tierärztlichen Hochschulen und vet.-med. Fakultäten Lehrkanzeln und Untersuchungsinstitute für Biologie und Pathologie der Fische zu errichten. Der Gegenstand ist unter die Prüfungsordnung aufzunehmen.“ Ansätze nach dieser Richtung liegen seit geraumer Zeit in Süddeutschland vor. Schon im Jahre 1881 wurde der damaligen Tierarzneischule in München die Untersuchung kranker Fische übertragen. Später bearbeitete die bayr. Versuchsanstalt für Fischerei anfänglich unter Bruno Hofer — dessen bedeutende Verdienste kürzlich durch Benennung eines Bruno Hofer-Platzes besonders geehrt wurden — und nach seinem Tode unter R. Demoll und Marianne Plehn. An der Wiener Tierärztlichen Hochschule ist Fiebiger seit 25 Jahren erfolgreich auf diesem Gebiete tätig; ähnlich liegen die Verhältnisse an den Hochschulen in Budapest und Lemberg. Wir wünschen diesen Anstalten eine weitere gedeihliche Entwicklung und hoffen, daß wir bald in edlem Wettstreit an ihre Seite treten dürfen.

Ein Gebiet, das infolge des großen Aufschwunges der Bakteriologie etwas vernachlässigt wurde, ist die veterinärmedizinische Parasitologie. Auch der Protozoenkunde, d. h. der Lehre von den einzelligen tierischen Parasiten hat man nach Verlust unserer Kolonien leider nicht mehr das gleiche Interesse entgegengebracht, trotzdem auch bei uns in Deutschland einzellige Blut- und Epithelschmarotzer in größerer Menge vorkommen und seuchenhafte Erkrankungen besonders der Jungtiere veranlassen können. Welche große wirtschaftliche Bedeutung aber gerade den tierischen Parasiten unserer Haustiere zukommt, erhellt aus den Schäden, die durch Darm- und Lungenwürmer, Echinokokken, Leberegel, Kokzidien und Piroplasmen veranlaßt werden. Zwar wird dem auch an unserer Hochschule durch Vorlesungen und Kurse über Protozoologie und Parasitologie sowie durch Ausflüge zum Studium der kranken Tiere, Überträger, Zwischenwirte, Rechnung getragen, aber doch nur in beschränktem Maße in Verbindung mit der Bakteriologie und Hygiene. Mit Recht betont Nöller⁶⁾, daß das Ausland uns in dieser Richtung weit voran ist. In Amerika hat man große parasitologische Forschungs- und Untersuchungsinstitute, denen Feldlaboratorien angegliedert sind, um größere praktische Bekämpfungsversuche an Ort und Stelle ausführen zu können. Die unter Theiler in vorbildlicher Weise errichtete südafrikanische veterinärmedizinische Fakultät der Universität Pretoria verfügt über zwei parasitologische Lehrstühle. daneben findet die Protozoenkunde ihre gebührende Bearbeitung durch mehrere Spezialisten auf diesem Gebiete. Zahlreiche Probleme der veterinärmedizinischen Protozoen- und Parasitenkunde von hoher allgemeiner wirtschaftlicher Bedeutung harren der Bearbeitung.

Den heute in Deutschland vielfach gezüchteten Pelztieren ist vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken, zumal deren Ekto- und Entoparasiten manche Gefahren für unsere Haustiere einschließen können.

Die Herstellung und Prüfung parasitizider Mittel zur wirkamen Bekämpfung der parasitären Krankheiten stellen schon für sich allein ein immenses Arbeitsgebiet dar. Das Preuß. Landwirtschaftsministerium hat sich dieser Erkenntnis nicht verschlossen und vor einem Jahr ein besonderes Ordinariat für veterinärmedizinische Parasitenkunde an der Berliner Hochschule errichtet. Da für die Hannoversche Hochschule, für die Ausbildung der Studierenden und mit Rücksicht auf ihre Lage mitten in Hochzuchtgebieten die Parasitenkunde eine gleich hohe Bedeutung hat, so bedarf es wohl nur dieser Anregung, um an höchster Stelle in kurzer Zeit den Plan reifen zu lassen, für die Hannoversche Hochschule ein besonderes Ordinariat mit Institut für veterinärmedizinische Parasitenkunde zu schaffen.

Die Deutsche Geflügelzucht hat seit einigen Jahren einen gewaltigen Aufschwung genommen. Es bleibt zu wünschen, daß ihre Entwicklung weiter fortschreitet, damit wir in Stand gesetzt werden, den Bedarf an Erzeugnissen der Geflügelzucht aus dem eigenen Lande zu decken. Die Zahl der Hennen beträgt in Deutschland gegenwärtig 60 Millionen — etwa der Einwohnerzahl gleich —; rechnet man jährlich im Durchschnitt 80 Eier pro Tier, so werden 4,8 Milliarden Eier im Jahr produziert. Eingeführt wurden 1927 etwa 3 Milliarden Eier, also fast 40 Prozent des Bedarfs, in Geldwert etwa für 300 Millionen Mark. Hiermit verzinsen wir bei 5 Prozent ein ausländisches Betriebskapital von 6 Milliarden Mark!⁷⁾ Es muß also unbedingt dahin gestrebt werden, die inländische Eierproduktion zu steigern. Dies kann einmal geschehen durch rationelle Hühnerhaltung, die es erreicht, den Legedurchschnitt der Hennen von 80 auf 100 Eier zu erhöhen, was durchaus möglich erscheint, des weiteren durch Vermehrung der Hühnerhaltung. Letzterem steht leider z. Zt. die wirtschaftliche Beeinträchtigung durch die Ungunst der Zollverhältnisse entgegen. Der Futterzoll beträgt 1,87 Pfg. pro Ei, während der Einfuhrzoll pro Ei sich auf nur 0,37 Pfg., also etwa ein Fünftel der Lasten des Futterzolles stellt. Dazu kommen noch die hohen Steuern und sozialen Lasten, die 1 Pfg. ausmachen. Wir stehen also mit unseren Erzeugungskosten um 2½ Pfg. über dem konkurrierenden Auslande. Deswegen ist es möglich, Auslandseier billiger einzuführen als im eigenen Lande zu gewinnen. Soll daher unsere Geflügelzucht konkurrenzfähig auf dem deutschen Markt bleiben, so muß ein Einfuhrzoll von 2½ Pfg. pro Ei gefordert werden. Das ist kein Schutzzoll, sondern nichts weiter als ein Ausgleich für die hohen Gestehungskosten.

Mit der Zunahme der Geflügelhaltung und Intensivierung der künstlichen Aufzucht halten natürlich auch Seuchen ihren Einzug, die wir bisher kaum gekannt oder die doch nur in geringem Umfange aufgetreten sind, ohne große wirtschaftliche Schäden nach sich zu ziehen. Hierher ist in erster Linie zu rechnen die immer mehr um sich greifende Tuberkulose des Geflügels. Sie findet einen günstigen Boden dadurch, daß große Massen von Geflügel in einem verhältnismäßig engem Raum zusammengehalten werden. Die Geflügeltuberkulose schädigt schwer den Gesundheitszustand der Tiere. Sie magern bis zum Skelett ab und legen nicht. Außerdem ist aber zu beachten, daß die Geflügeltuberkelbakterien übertragbar sind auf andere Haustiere und auch auf den Menschen. Infolgedessen bildet die Geflügeltuberkulose eine nicht unerhebliche Gefahr für die Allgemeinheit. Es muß daher mit allen Mitteln durch frühzeitige Ausmerzung der tuberkulösen Tiere unter Zuhilfenahme von Geflügeltuberkulin als wertvollem diagnostischem Hilfsmittel die Bekämpfung der Tuberkulose erstrebt werden.

Besonders grassiert unter dem Geflügel heute auch in

⁵⁾ D. T. W. 1926, S. 795.

⁶⁾ B. T. W. 1925, S. 145.

⁷⁾ Nach mündlichen und schriftlichen Mitteilungen von Herrn Engel, Geflügelhof Lohbrüggerhöhe.

Deutschland die Kükenruhr, die bis vor wenigen Jahren hier fast vollständig unbekannt war, während sie in Amerika mit der wesentlich weiter fortgeschrittenen künstlichen Geflügelzucht seit langem sehr stark verbreitet war und die Hühnerbestände dezimierte. Als Erreger der Kükenruhr ist das Bact. pullorum anzusehen. Es findet sich nicht nur in den jungen Küken, die unter ruhrartigen Durchfällen innerhalb weniger Tage zugrunde gehen, vielmehr kann man es auch in den Eiern, ja sogar im Eierstock der Mutterhennen nachweisen. Damit ist erwiesen, daß die Krankheit von der Mutterhenne ausgeht und durch sie auf das Ei übertragen wird. Der Erreger wird ferner in Massen mit dem Kot ausgeschieden und kann so auf gesunde Tiere eines Bestandes leicht übertragen werden. Auch kann der Hahn bei der Weiterverbreitung eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Die Bekämpfung der Seuche hat sich also einmal auf möglichst frühzeitige Ausmerzungen der kranken Küken und kranken Mutterhennen zu erstrecken. Mit Hilfe der Untersuchung des Blutes der Mutterhennen ist man imstande die äußerlich gesund erscheinenden aber infizierten Mutterhennen zu erkennen. Sie sind sofort aus dem Bestand herauszunehmen und abzuschlachten. Daneben fördern ungünstige Haltungs- und Aufzuchtverhältnisse die Verbreitung der Seuche. Die künstliche Brut von Tausenden von Eiern in einem Raume vermindert die Widerstandsfähigkeit der Tiere und erhöht ihre Krankheitsbereitschaft, zumal wenn während der Brut Störungen in der Temperatur, in der ordnungsmäßigen Ventilation u. a. eintreten. Im gleichen Maße wird die Übertragung begünstigt durch das Aufziehen von Hunderten frisch geschlüpfter Küken unter einer künstlichen Glucke. Durch gründlichste Reinigung der Brutkästen, ordnungsmäßige Beobachtung der Temperatur und der Luftverhältnisse, Verminderung der Zahl der unter einer Glucke aufgezogenen Küken kann man dem Übel steuern.

Aufgabe unserer Hochschule muß es sein, künftig mehr als bisher den Seuchen des Geflügels Aufmerksamkeit zu schenken und an ihrer Bekämpfung mitzuarbeiten. Das Hygienische Institut unserer Hochschule hat sich mit Staats- und Reichsmitteln, wofür auch an dieser Stelle der verbindlichste Dank zum Ausdruck gebracht werden soll, einen Versuchs-Geflügelstall errichtet. Leider reicht das Hygienische Institut in seinem jetzigen Ausmaße weder für die Lehr- noch für die Forschungstätigkeit aus und es sei an dieser Stelle nochmals um Bereitstellung von Mitteln zur Erweiterung des Institutes durch Ausbau gebeten. Die Vergrößerung des Institutes hat sich auch als notwendig erwiesen, um darin wichtige Fragen der Stallhygiene und Desinfektion mehr als bisher bearbeiten zu können. Da sich unsere Haustiere in der längsten Zeit ihres Lebens im Stalle aufhalten müssen, so sind ihr Gesundheitszustand und ihre Leistungsfähigkeit erheblich von einer ordnungsmäßigen Stallhygiene abhängig. Leider ist bis vor kurzem die experimentelle Forschung auf diesem Gebiete etwas vernachlässigt worden. Erst in den letzten Jahren sind wieder Ansätze einer methodischen Bearbeitung dieser Fragen gemacht worden, in den beachtenswerten Arbeiten von Schermer, Süpfle und anderen. Alles in allem liegt hier aber noch ein weites Gebiet der Forschung, Belehrung und Organisation offen.

In dem bisher Gesagten habe ich versucht, Ihnen einen knappen Abriss einiger dringlichster Aufgaben zu skizzieren, die unseren Bildungsanstalten und Berufskreisen auf vornehmlich tierärztlichem (d. h. diagnostischem, kurativem oder hygienischem) Gebiete obliegen; gestatten Sie mir nun noch einiges wenige anzufügen, das unter der Mitwirkung der Veterinärmedizin Fragen der Volksgefundheit und wirtschaftlichen Volkswohlfaht betrifft.

Hier möchte ich zunächst die Lebensmittelkunde erörtern, für die leider zurzeit in Hannover weder besondere Räumlichkeiten noch ein Ordinariat zur Ver-

fügung stehen, obwohl sie ohne Zweifel zu den bedeutendsten gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben der tierärztlichen Forschung, Lehre und Tätigkeit gehört. Diese Disziplin ist nebenamtlich der pathologischen Anatomie angegliedert, ein Zustand, der auf die Dauer untragbar wird, da die pathologische Anatomie schon für sich die volle Arbeitskraft eines Institutsdirektors über Gebühr in Anspruch nimmt. Es muß also unbedingt möglichst schnell für den Ausbau der Lebensmittelkunde zu einem besonderen Lehrfach gesorgt werden. Seit Einführung des Reichsfleischbeschaugesetzes ist die Wohltat der obligatorischen Fleischbeschau allgemein anerkannt worden, da hierdurch die Bevölkerung vor dem Ankauf minderwertigen und gesundheitschädlichen Fleisches bewahrt wird. Zu ihrer Vervollkommnung und Unterstützung in neuerer Zeit hat die bakteriologische Fleischbeschau einen zunehmenden Ausbau erfahren, um die durch sogenannte Fleischvergifter verursachten, häufig tödlich verlaufenden Erkrankungen — meist Massenerkrankungen — von Menschen abzuwenden oder doch auf ein Mindestmaß zu beschränken. Hinzu kommt die Kontrolle des Verkehrs mit Wild, Geflügel, Fischen, Weich- und Krustentieren, die durch einen neueren Erlass des Preuß. Landwirtschaftsministeriums vom 3. Mai 1927 besonders wieder in Erinnerung gebracht worden ist.

Mit der Nahrungsmittelkontrolle ist untrennbar auch die Milchkontrolle verbunden, mit deren weiteren Ausbau man zurzeit allseitig beschäftigt ist. Es handelt sich bei der Milchkontrolle nicht so sehr um Verfälschungen und Zusätze, deren Ermittlung Aufgabe des Chemikers ist und bleiben soll. Viel wichtiger sind bei der Beurteilung einer einwandfreien Milch die rein hygienischen und biologischen Fragen. Sie erstrecken sich auf die Sauberkeit des Stalles zur Gewinnung von stallschmutzfreier Milch, auf die genaue Kontrolle der Tiere bezüglich ihres Gesundheitszustandes, damit nur Milch von Kühen ohne tuberkulöse oder eitrige Erkrankungen des Euters in den Handel gebracht wird. Es muß also eine ordnungsmäßige Milchhygiene mit einer dauernden Kontrolle der Ursprungsstätten der Milch und der Milch selbst auf Anwesenheit pathogener Mikroorganismen einhergehen. Diese Aufgaben können natürlich nur von einem Tierarzte gelöst werden, der mit den Krankheiten der Milchtiere, insbesondere mit den pathogenen Bakterien des Euters durch jahrelanges Studium völlig vertraut ist.

Ein Zweig der Nahrungsmittelkontrolle erstreckt sich, wie vorhin schon gestreift, auf die Marktkontrolle zur Ermittlung verdorbener Fleischwaren, konservierter Fleischsorten und anderer animalischer Konserven. Zur Unterweisung der Studierenden und zur Erforschung vieler auf diesem Gebiete noch nicht gelöster Fragen ist eine besondere Lehrstelle für Lebensmittelkunde unbedingtes Erfordernis. Die Berliner Tierärztliche Hochschule ist auf diesem Gebiete durch Errichtung eines Ordinariats für Nahrungsmittelkunde seit Jahren vorbildlich vorangegangen, hoffen wir, daß Hannover bald folgen möge.

Seit dem Erlass des neuen Futtermittelgesetzes (vom 22. Dezember 1926, in Kraft getreten am 1. November 1927) muß sich der Tierarzt mit seinem Inhalte vollständig vertraut machen. Er soll insbesondere den Futterhädlichkeiten und Futterverfälschungen größere Aufmerksamkeit zuwenden. Seitdem der Futtermittelmarkt wieder durch ausländische Waren überschwemmt wird, besteht die Gefahr der Einschleppung minderwertiger und schädlicher Futtermittel. Leider ist ja Deutschland in der Ernährung seiner Viehbestände zu $\frac{1}{3}$ der erforderlichen Futtermengen auf das Ausland angewiesen. Es wurden beispielsweise 1914 43 Millionen Doppelzentner Kraftfutter und 16 Millionen Doppelzentner Ölfrüchte, d. h. 30 Prozent des gesamten Futterbedarfes an Eiweiß und 15 Prozent des Gesamtbedarfes an Stärkewert eingeführt. Verfälschungen mit den für Tiere

so außerordentlich giftigen Rizinusfamen - Preßrückständen gehören zur Tagesordnung. Die Schädigungen nach Verfütterung von Sojabohnenmehl, bedingt durch Benutzung von giftigem Tetrachlorkohlenstoff zur Extraktion des Fettes, sind noch in aller Erinnerung. In manchen Gegenden spielen Bleivergiftungen, die durch den bleihaltigen Pochsand der Abwässer von den Bergwerken bei der Überschwemmung auf die Äcker gelangen, eine große Rolle. Auch andere Schädigungen, wie sie vornehmlich nach Verfütterung von Heu in Mooregenden beobachtet werden (Leckfucht, Rachitis) oder nach sehr trockenen Jahren infolge Salz mangels des Bodens (Bulbärparalyse) auftreten, harren der Aufklärung.

Ein Institut zur systematischen Bearbeitung solcher Futterschädlichkeiten zur Untersuchung der Futtermittel und Unterweisung der Studierenden wäre sehr zu begrüßen.

Mit Rücksicht auf die gewaltige wirtschaftliche Bedeutung unserer Nutztierbestände und des damit verbundenen Fütterungsbetriebes muß darnach gestrebt werden, die Fütterung der Haustiere rationeller zu gestalten und sie im Zusammenhang damit nach Möglichkeit aus heimischen Futtermitteln herzustellen, eine Frage, die insbesondere an unserer Hannoverschen Hochschule seit geraumer Zeit nachträglich vertreten wird. Mit Paechtn⁸⁾ verstehen wir unter Fütterung eine zielbewußte Umwertung von Stoffen in tierische Leistung, gleichgültig, ob die erwartete Leistung stofflicher oder mechanischer Art ist, in Zuwachs oder in Arbeit besteht⁹⁾. Es ist kein Zweifel, daß auf diesem Gebiete durch planmäßige und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis vor allem auch von Tierzucht, Agrikulturchemie und Veterinärmedizin Bedeutendes geleistet werden kann. Leider können sich weite Kreise der Landwirtschaft von der Anschauung nicht frei machen, daß für gewisse Zwecke allein die Halmfrüchte zur Fütterung geeignet seien. So führte man vor dem Kriege russische Gerste aus Rußland zur Schweinemast ein, während die östlichen an Kartoffeln reichen Provinzen ihren Überfluß an Hackfrüchten nicht los werden konnten. Aufgabe der Fütterungstechnik muß es sein, auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnis und praktischer Erfahrung Hand in Hand mit einer planvollen Organisation der Tierzucht, der Pflanzenzüchtung, Düngung, Melioration und gesamten Bodenbewirtschaftung mehr und mehr die eigenen Erzeugnisse unseres Bodens zur Deckung des Futterbedarfs heranzuziehen. Die veterinärmedizinischen Bildungsanstalten haben den angehenden Tierarzt nach dieser Richtung hin zu unterweisen und sich an den experimentellen Untersuchungen über rationelle Fütterung zu beteiligen.

Dank dem hohen Verständnis des Preuß. Landwirtschaftsministeriums für die sachgemäße gründliche Ausbildung unserer Studierenden ist es gelungen, unsere Hochschule durch Erwerbung eines Lehrgutes auf wertvollste zu bereichern. Hier sollen besonders die aus den Städten stammenden Studierenden praktisch in die Verrichtungen und Bedürfnisse des Landwirtschaftsbetriebes eingeführt werden. Die Kenntnis des landwirtschaftlichen Betriebes ist ja für den Tierarzt unbedingtes Erfordernis. In den alljährlich etwa viermal zu verschiedenen Jahreszeiten vorgesehenen jeweils etwa dreiwöchigen Kursen soll der Student mit der praktischen Tierhaltung sowie mit den Grundelementen des Ackerbaues und Weidebetriebes vertraut gemacht werden. Wenn dies, wie ge-

plant, während der Ferien geschieht, so ist damit irgendeine Belastung des Studiums nicht verbunden. Im Interesse der praktischen Ausbildung unserer Studierenden wäre zu wünschen, wenn die mehrmalige Teilnahme an derartigen Lehrkursen obligatorisch gemacht und in der Studienordnung festgelegt würde. Inzwischen ist von der „Vereinigung der Tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten Deutschlands“ folgender Antrag beim Reichsministerium des Innern gestellt (f. D. T. W. 1928, Nr. 12, S. 221): Es wird gebeten in die neue Prüfungsordnung aufzunehmen: „Jeder Studierende der Veterinärmedizin hat den Nachweis zu bringen, daß er sich mindestens 3 Monate in einem landwirtschaftlichen Betriebe praktisch betätigt hat.“

Meine Damen und Herren! Ich bin am Schluß meiner Ausführungen, soweit sie die vordringlichen Aufgaben und Ziele einer weiteren wissenschaftlichen organisatorischen Entwicklung betreffen.

Ich brauche Ihnen kaum zu erwähnen, daß wir daneben der Pflege der kulturellen Güter wie auch der körperlichen Ertüchtigung unserer akademischen Jugend, kurzum ihrer Persönlichkeitserziehung und Ausbildung zu guten Staatsbürgern alle tunliche Förderung angedeihen lassen wollen. Wir sind uns bewußt, daß gerade unser Stand, der — wie kaum ein anderer akademischer Stand in der breiten Bevölkerung siedelnd und wirkend — besondere Möglichkeiten in sich birgt, Möglichkeiten des Vorbildes und der Führung in gesellschaftlichem und kulturellen Sinne, die aber auch Pflichten auflegen. Wir dürfen feststellen, daß manche aus unseren Reihen diese vorbildlich erfüllt haben und erfüllen. Unser Streben ist es, ihre Zahl zu erhalten und zu mehren.

Der Reichsgründungstag, der unser schwer darniederliegendes und um seine Freiheit und Existenz wie um seine sittliche Gefundung ringendes Volk an die Zeiten unseres machtvollen Aufstieges vergangener Jahrzehnte erinnert, soll uns auch heute wieder daran mahnen. Er soll uns anspornen zu dem erneuten Entschluß, Geist und Körper zu stählen im Kampfe um die wertvollen Güter des Deutschen Reiches. Unserer Jugend wird es dermaleinst vorbehalten bleiben, Deutschland einer neuen Blüte zuzuführen; uns Älteren erwächst aber die unerbittliche Pflicht, nichts zu veräumen, um unsere Söhne zu echten deutschen Männern zu erziehen. Dazu gehört auch die körperliche Ausbildung der Studenten. Leider fehlt es an unserer Hochschule hierfür noch an notwendigen Einrichtungen; so ist eine Turnhalle ein dringendes Bedürfnis. Deshalb möchte ich bei dieser Gelegenheit vor der hohen Staatsregierung und ihrem zu unserer Freude unter uns weilenden Vertreter, des Herrn Ministers, Herrn Ministerialrat Dr. Wiemann und an unseren verehrl. Kurator, Herrn Oberpräsidenten Noske, die angelegentliche Bitte wiederholen, der Hochschule als Jubiläumsgabe Mittel für den Bau einer Turnhalle, die zugleich die so notwendigen Unterkunftsräume für unsere Studenten aufnehmen würde, bereitzustellen. Die Ausführung des Planes erscheint um so tunlicher, als Aussicht besteht, daß uns die Stadt Hannover, dank der Initiative ihres von uns hochverehrten Herrn Oberbürgermeisters Dr. Menge, den Bauplatz zur Verfügung stellt.

Wir haben gesehen, welche umfangreichen Aufgaben noch der Lösung harren und den Willen bekundet, nach Kräften an ihrer Lösung zu schaffen. Ja unser aller Bestreben soll es sein, hieran mitzuwirken, zum Nutzen der deutschen Landwirtschaft, der Volksgeundheit und allgemeinen Wohlfahrt und damit an unserem Teil zum Segen unseres geliebten Vaterlandes!

⁸⁾ Paechtn^{er}: Zeitgemäße Fütterungsfragen, D. T. W. 1916, S. 219.

⁹⁾ Mießner: Wiederaufbau und Veterinärmedizin. Illust. Landw. Ztg. 1923, S. 41.

Entföüllung der Dammannbüste *)

durch Prof. Dr. Oppermann.

Hochanfehnliche Festverfammlang!

Von den Wänden dieses Festraumes grüßen uns stumm die Büsten der früheren Leiter unserer Alma mater als markante Zeugen der fast 150jährigen Geschichte unserer Hochschule. In der Reihe dieser Zeugen einer Zeit glückhaften Aufstieges der Veterinärmedizin fehlte bisher das Bildmal des letzten Direktors der Hochschule, unseres Dammanns.

Wohl ist seit jenem still-sonnigem Junitage des Jahres 1914, an dem sich die Hand des Todes lind auf das hochragende Patriarchenhaupt dieses Mannes legte, mehr als ein Dezennium verflossen; man wolle aber über unsere Hochschule nicht zu hart zu Gericht sitzen, wenn sie erst heute an diesem Weihetage sich anschiekt, getreu dem Wahrwort: „Die Hochschule und die Wissenschaft, die ihre großen Männer ehren, ehren sich selbst“, ihre Dankeschuld an ihren letzten Direktor durch die Weihe seiner Büste abzutragen. Des Weltkrieges rauhe Stürme und die von grauen Wirtschaftslagen durchzitterten Nachkriegsjahre brachten auch für uns schwerste Belastungsproben und waren Stunden stiller Einkehr und dankbaren Gedenkens an leuchtende Vorkriegszeiten abhold.

Wenn sich auch inzwischen in dem ehernen Zeitenlauf die Zahl der Mitbereiter und Mitstreiter, der Schüler und Freunde dieser starken Persönlichkeit unseres Standes, wir wollen sie insgesamt mit Dammanns großem Zeitgenossen und Freunde Schütz das Volk Dammanns nennen, arg gelichtet hat, so ist doch in unserem Herzen die Dankeschuld lebendig geblieben, und die heutige Weihestunde soll dazu dienen, der Verdienste Dammanns zu gedenken.

Als Dammann im Jahre 1912 in den Ruhestand trat, konnte er auf 51 arbeits- und erfolgreiche Jahre veterinärmedizinischen Wirkens zurückblicken.

Auf den Gefilden seiner Jugend hatten nicht viel Blumen kindlicher Sorglosigkeit und verflommenen Glücks geblüht, hart und rauh wie die Scholle seines pommerischen Heimatlandes waren seine Jugend- und Lehrjahre, die darum schon so frühzeitig den Stempel zielbewußten und willensstarken Strebens trugen. Mit klugem Blick wußte schon der Abiturient den Wert einer tunlichst vielseitigen Ausbildung für seinen späteren Beruf zu schätzen und studierte neben Veterinärmedizin auch Humanmedizin.

Seine Tätigkeit als vielbeschäftigter beamteter Tierarzt, als Dozent an den landwirtschaftlichen Akademien zu Proskau und Eldena, als Mitglied des Preuß. Abgeordnetenhauses weiteten seinen Blick und lehrten ihn den engen Konnex zwischen Veterinärmedizin und Land- und Volkswirtschaft vollauf erkennen und schätzen. Sein großes rethorisches und diplomatisches Geschick, das von seinen Freunden und Schülern mehr als von seinen Gegnern geschätzt wurde, sicherte ihm, als den ersten Präsidenten des Deutschen Veterinärrates anerkannte Erfolge.

Unter den Männern, die in jener Zeit die Bedeutung

*) Die Dammannbüste (siehe Umschlagblatt D. T. W. 1928, Nr. 2) wurde am 17. Januar 1928 enthüllt.

der Veterinärmedizin für die Volkswirtschaft hervorzuheben verstanden, sicherte sich Dammann einen Ehrenplatz. Seine logisch durchdachte Denkschrift über die Notwendigkeit und die Grundzüge eines einheitlichen Viehseuchengesetzes für das Deutsche Reich wurde für die Entwicklung und den Ausbau der Veterinärpolizei von grundlegender Bedeutung und verschaffte ihm neben seinem autoritativen Wirken als Mitglied der technischen Deputation für das Veterinärwesen rückhaltlose Anerkennung seines Standes und der Landwirtschaft.

Im Jahre 1877 wurde er nach Hannover berufen. Als er das Direktorat unserer Hochschule übernahm, stand sie im Schatten der Berliner Schwesteranstalt. Mit klugem Geschick und großer Beharrlichkeit, aber auch, wenn es notwendig war, mit erfrischender Rücksichtslosigkeit, hat Dammann es erreicht, daß seine Hochschule sich ihren Platz an der Sonne erkämpfte, und dieses sein Wirken fand seine Krönung in dem Neubau der Hochschule in den Jahren 1896 bis 1899, die nach späterer Errichtung des Hygienischen Institutes und des Instituts für Tierzucht und Vererbungsforchung als eine der best eingerichteten tierärztlichen Hochschulen angesprochen werden muß.

Die akademischen Kreise hatten zwar gehofft, daß Dammann mit der Errichtung dieses idealen Zieles auch nach außen hin den Wünschen nach Schaffung des Rektorats Rechnung tragen würde, jedoch verstand sich die Staatsregierung damals noch nicht zu einer Änderung der Hochschulverfassung, und wenn trotz alledem die Feier des 50jährigen Berufsjubiläums Dammanns in imposanter Weise von der Wertschätzung und der Anerkennung des Wirkens des Direktors in allen Kreisen unseres Standes Zeugnis ablegte, so gab das den Worten des Geistlichen, die dieser dem Verbliebenen auf seinem letzten Gange widmete, und die da lauteten: „Um den Abend wird es licht sein“, einen harmonischen, veröhnlichen, inhaltsreichen Klang.

Trotz des Übermaßes von Verwaltungsgeschäften und Repräsentationspflichten fand Dammann Zeit zu vielseitiger wissenschaftlicher Tätigkeit. Seine reichen praktischen Erfahrungen kamen seinen wissenschaftlichen Arbeiten bestens zustatten und verliehen ihnen bleibenden, bedeutamen Wert.

Seine pädagogisch hochstehenden und rethorisch formvollendeten Vorträge zu hören, war für jeden ein Genuß, und wenn jetzt nach dem Fallen der Hülle das lebenswahre, von der Meisterhand seines Sohnes geschaffene Bildnis auf uns niederseht, so wollen wir als seine Getreuen uns in Dankbarkeit vor dem Manne neigen, der in großer Zeit Großes wirkte.

Es gereicht der Hochschule zur besonderen Genugtuung, fast alle Angehörigen der Familie unseres letzten Direktors unter uns zu sehen und allen denjenigen, die jeder nach seinen Kräften ihre Gabe zur Schaffung der Büste und des Kranzschmuckes spendeten, von Herzen zu danken. Im Namen der Spender darf ich Euer Magnifizenz bitten, die Büste unseres letzten Direktors in treue Obhut zu nehmen.

Innere Medizin und Chirurgie.

Scheike: Tödliche Darmentzündung nach Aufnahme von Kalkstickstoff. (Zeitschr. für Vet. Kunde 1927, H. 5.)

Ein Dienstpferd wurde von dem Entleiher vormittags zur Truppe geschickt, mit dem Vorbericht, daß es am Tage vorher auf einem Saatfeld, das frisch mit Kalkstickstoff gedüngt war, geweidet habe, bald darauf unter Unruheerscheinungen erkrankt sei, das Abendfutter verweigert habe und blutigen Kot und Urin absetze. Unter Verschlechterung des Allgemeinzustandes und bei Erfolglosigkeit der sofort

eingeleiteten Behandlung verendete das Pferd vier Stunden nach der Einlieferung. Es war anzunehmen, daß das Pferd von der frisch gedüngten Saat größere Mengen gefressen und der Kalkstickstoff eine blutige Entzündung des Darmes und der Nieren hervorgerufen hatte, wie der Zerlegungsbefund ergab. Möglicherweise ist er noch durch Karbide des Phosphors, Arsens und Schwefels verunreinigt gewesen, wodurch die Giftwirkung noch wesentlich erhöht wurde. Der Tod erfolgte durch Herzlähmung. Der im Grimmdarm vorgefundene Sand war allein geeignet, eine schwere Kolik hervorzurufen. Die Pferde hatten schon während der Arbeits-

pausen unbeaufsichtigt geweidet und mit dem noch sehr kurzen Gras bzw. Saat auch Sand und Erde aufgenommen. Der Entleiher wurde für Schadenersatzpflichtig erklärt. A.

Nickel: Versuche über die styptische Wirkung der Tinctura Opii simplex D.A.B. VI bei subkutaner Applikation an Meerfischweinch. (Aus dem Pharmakologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin. — Direktor: Prof. Dr. W. Hin z.) (T. R. 1927, S. 490.)

Bei subkutanen Applikationen von Tinctura Opii simplex treten weder an der Injektionsstelle anhaltende entzündliche Veränderungen noch wahrnehmbare Veränderungen im Wohlbefinden der Versuchstiere auf. Die subkutane Applikation verursacht eine deutliche, zeitlich begrenzte Verzögerung der Defäkation. Der in der Tinct. Opii simplex enthaltene Alkohol ist daran nicht beteiligt. Weitere Untersuchungen müssen ergeben, ob auch bei größeren Haustieren (z. B. Pferden) die subkutane Applikation angewendet werden kann. Geiger.

Zinsser: Die „gelbe Salbe“. (M. med. W. 1927, S. 982.)

Die mit Hydrarg. oxydat. flav. (via humida paratum) hergestellte Salbe wurde vor längerer Zeit zur Behandlung syphilitischer Geschwüre benutzt, später von P a g e n s t e c h e r als Augenfalbe. Eine sonstige Verwendung scheint das Mittel in der Humanmedizin nicht gefunden zu haben. Veranlaßt durch einen vor 25 Jahren in der Bardenheuer'schen Klinik in Köln auf diese Weise mit Erfolg behandelten Fall von Sehnencheidenphlegmone hat Verf. seither die gelbe Salbe (Hydrarg. oxydat. flav. 3,0; Vas. flav. ad 30,0) regelmäßig zur Behandlung von Pyodermie benutzt. In erster Linie ist diese Therapie beim Furunkel und Karbunkel am Platze. Die Salbe wird dabei ganz dick aufgetragen und mit einem gut sitzenden weichen Verbande fixiert. Selbst große, schmerzhaft Furunkel werden schon nach wenigen Stunden weniger schmerzhaft, das Infiltrat erweicht, der Kern verflüssigt sich. Verf. hat seither keine Furunkel mehr inzidiert. Zum Schutze der gefunden Haut wird z. B. bei Nackenfurunkulose der ganze Nacken zweimal täglich mit Afridolseife gewaschen und sodann auf die betr. Stelle ein mit gelber Salbe bestrichener Mullappen gelegt, Watte aufgelegt und das Ganze mit einer elastischen Kreppbinde befestigt. Heftpflasterverbände sind nicht zu empfehlen, dagegen Mastisolverbände an Stellen, die dem gewöhnlichen Verbande nicht zugänglich sind. Für Paronychien und Panaritien, für phlegmonöse Prozesse der Haut kennt Verf. keine angenehmere und zuverlässigere Therapie als den Verband mit gelber Salbe, evtl. nach Spaltung des Abszesses. Dieselben guten Erfolge wurden erzielt bei der Behandlung nicht aseptischer Schnitt- und Quetschwunden, wobei Hautfetzen und Sehnen nicht abgetragen wurden, sondern lediglich gelbe Salbe und ein Verband Anwendung fand. Bei Quecksilberempfindlichen Patienten muß mit einer Dermatitis gerechnet werden. Die gelbe Salbe wirkt in dieser Beziehung jedoch viel weniger reizend wie die im allgemeinen gut vertragene weiße Präzipitatfalbe. Carl.

Eckert: Die in der Pferdefleischstation Berlin mit Strahlentherapie angestellten Versuche. (Zeitschr. für Vet.-Kunde 1927, H. 2.)

Die Sonnenscheindauer und der Gehalt des Lichtes in unserer Gegend an chemisch oder kalorisch wirksamen Strahlen genügt nicht, um bei Pferden mit unverletzter Decke einen Lichtreiz zu bewirken; wohl wird bei ihnen ein Wohlbefinden hervorgerufen. Nur bei Krankheiten mit verletzter Decke konnte im direkten Sonnenlicht eine Lichtwirkung festgestellt werden. Die Wundsekretion ließ nach und das Wundsekret gerann bald. Der Tonus der Granulation besserte sich (Wirkung des ultravioletten Strahlenanteils). Bei intakter, pigmentierter Pferdehaut ist die Bestrahlung mit künstlicher Höhensonne bei Pferden wirkungslos, sie bleibt daher nur bei Krankheiten mit verletzter äußerer

Decke indiziert. Künstliche Höhensonnebestrahlung kann daher in geeigneten Fällen in der Wundbehandlung vorteilhaft mit medikamentöser Desinfektion verbunden werden, reicht aber allein nicht an die Desinfektionswirkungen mit flüssigen Vehikeln heran. Für chirurgische Stationen wäre die Anschaffung des Hanauer K.H.S. nach B a c h zu empfehlen. Was den Langwellstrahler betrifft, so wirkten am vorteilhaftesten die langwelligen Strahlen auf der behaarten Haut (Hyperämie, ähnlich der Bier'schen Stauung). Auf rasierter Haut sind durch langwellige Strahlen eine ödematöse sowie entzündliche Schwellung, ja sogar Veränderungen wie Verbrennungen zu erzielen (Dosierung und Erfolg jedoch unsicher). Eine antiseptische Wirkung besitzen die Strahlen nicht. Besonderes Anwendungsgebiet für Wärmebehandlung sind: Muskelzerreißen, -quetschungen, -zerrungen, -rheumatismus und -entzündungen, Extravasate, Verstauchungen, akute und subakute Entzündungen, weniger bei Phlegmone. Die Wirkung reicht nicht an die einer Josorptol- oder Kantharideneinreibung heran. Die Solluxlampe wirkt ohne Reflektor ähnlich wie der Langweller, jedoch nicht so stark. Für den Veterinärdienst ist sie weder brauchbar noch rentabel; Wärme ist besser und billiger mit dem Langweller herzustellen. — Der Medicotherm mit Tragvorrichtung ist billig, stabil und zuverlässig. Indiziert ist seine Anwendung zum Umstimmen von Wunden, zur Anregung der Muskeln und Nerven bei Lähmungen, Quetschungen, Atrophie und zum Ätzen. Mit der Elektrode wird über die erkrankte Stelle andauernd hinweggestrichen, bei Unruhe ist aufzuhören, 5 bis 15 Minuten täglich ist ausreichend. Die Strahlentherapie ist zweifellos noch ausbaufähig. A.

Mempel, Siegfried: „Klinisch-experimentelle Untersuchungen über die therapeutische Verwendung der Hochfrequenzströme in der Veterinärmedizin unter Berücksichtigung der Erfahrungen in der Humanmedizin.“ (In.-Diss. Leipzig 1927.)

Nachdem Verf. einen geschichtlichen Überblick über die Einführung der Hochfrequenzströme in die Humanmedizin gegeben hat, schildert er die modernsten therapeutischen Anwendungsarten der Hochfrequenzströme in Gestalt von Hochfrequenzbestrahlung, Diathermie und Kaltkaustik. Verf. selbst wandte nur die Hochfrequenzbestrahlung therapeutisch bei Groß- und Kleintieren an. Dabei konnte er feststellen, daß die Heilwirkung nicht, wie viele humanmedizinische Autoren behauptet haben, auf Suggestion beruht; vielmehr zeigte sich an den Tieren eine objektive, schmerzstillende, juckreizmildernde und zirkulationsfördernde Wirkung. Die Indikationsgebiete, die vom Verf. fernerhin von J ö h r i c k e und E c k e r t für die Veterinärmedizin festgelegt wurden, sind folgende: 1. Nervenkrankheiten, insbesondere Paralyse und Parese der Nachhand, spinale Ataxie, klonische Krämpfe und Nervenquetschung. 2. Hautkrankheiten, namentlich die verschiedenen Arten der Ekzeme, Acanthosis nigricans und Haarausfall. 3. Wundbehandlung (Flächenwunden und Fisteln). 4. Entfernung von Neubildungen, z. B. Fibromen und Warzen. 5. Lahmheiten, hervorgerufen durch Muskelzerrungen und Distorsionen. 6. Phlegmonen. 7. Atrophie der Muskulatur. Besonders hebt Verf. die schnelle Heilwirkung der Hochfrequenzstrahlen bei nässenden Ekzemen hervor. Kontraindiziert sind Hauterkrankungen, die durch Milben hervorgerufen worden sind. Als Apparatur benutzte Verf. u. a. einen von der Firma „Medico“ gelieferten Hochfrequenzapparat: „Citosan Nr. 406“ und den „Medicotherm“ mit Metall-elektroden bzw. Gläselektroden, die mit Wasserstoff oder Neongas gefüllt sind. Verf. glaubt sagen zu dürfen, daß sich die Hochfrequenztherapie als eine beachtenswerte, physikalische Behandlungsmethode in die Veterinärmedizin einführen wird. Henkels.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Goldmann, A.: Über die Bedeutung des Retikulo-endothels für die Generalisierung des Vakzinevirus.

(Aus dem Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten der Universität Bern.) (C. f. B. I. Abteilg. Orig. Bd. 105, S. 333, 1928.)

Durch neuere Arbeiten wurde festgestellt, daß das Vakzinevirus sich nicht nur in der Haut sondern auch im übrigen Körper zu verbreiten vermag. Man fand es nach den verschiedensten Einverleibungsarten in einer Reihe von Organen, wie Hornhaut, Lippen, Zunge, Brustdrüsen, Zentralnervensystem, Lungen, Leber, Nebenniere, Milz, Geschlechtsorgane. Im Blute dagegen wurde das Virus trotz vieler derartiger Versuche bis jetzt fast immer vermißt. Diese Tatsache steht offenbar im Zusammenhange mit der Tätigkeit des Retikulo-Endothels, das als ein funktionell einheitliches Gewebe von besonderer Eigenart anzusehen ist, sich in den meisten Organen des Körpers vorfindet und als die Bildungsstätte der Antikörper betrachtet wird. Es übt gegenüber den verschiedensten, in die Blutbahn eingebrachten Organismen eine absorbierende und vernichtende Tätigkeit aus. Wenn es nun gelänge, dieses Verhalten des Retikulo-Endothels auszuschalten, so würde wahrscheinlich ein Nachweis des Vakzinevirus auch im Blute möglich sein. Derartige Versuche sind tatsächlich schon von zwei Autoren vorgenommen worden und zwar in der Weise, daß das erwähnte spezifische Gewebe durch fünfmalige intravenöse Injektionen von Pelikanfische „blockiert“, d. h. durch die abgelagerte Fische in seiner Funktion gehemmt wurde. Bei derartig behandelten Kaninchen konnte das Vakzinevirus auch im Blute nachgewiesen werden. Diese Versuche wurden seitens des Verf. nachgeprüft, wobei sich folgendes ergab:

1. Bei einem Kaninchen, das vor und nach der Vorimpfung von Vakzine fortlaufend mittels intravenöser Fischeinjektionen blockiert worden war, konnte am vierten Tage nach der Infektion Virus im Blute nachgewiesen werden. Das Blut eines ohne jede sonstige Behandlung nur kutan infizierten Kontrolltieres war bei zehntägiger Untersuchung stets virusfrei.

2. Bei drei Meerfischweinchchen, von denen eines entmilzt und blockiert, zwei andere nur blockiert waren, gelang der Nachweis des Vakzinevirus im Blute am zweiten Tage nach der intrakutanen-subkutanen Impfung, während bei drei nicht blockierten Kontrolltieren der Nachweis trotz regelmäßiger, sieben Tage fortgesetzter Untersuchung niemals gelang.

3. Bei den blockierten Tieren trat die erste Lokalreaktion schon nach 24 Stunden auf, das Inkubationsstadium war deutlich verkürzt. Dagegen blieben die Reaktionsercheinungen schwächer als bei den Kontrolltieren, heilten auch um 5—7 Tage schneller ab.

4. Alle diese Beobachtungen deuten darauf hin, daß das Retikulo-Endothel einen starken Anteil an dem Verlauf der Vakzineinfektion hat und für die Frage der Generalisierung des Vakzinevirus im Tierorganismus von entscheidender Bedeutung ist. Die Meerfischweinchchenversuche sind besonders beweisend, weil bei normalen Tieren bisher noch niemals ein Übergang des kutan infizierten Virus in die Blutbahn beobachtet worden ist. Carl.

Smirnow, G. G.: Untersuchungen über die Wirkung der Helminthen auf ihre Wirte. II. Zur Frage über die pathologischen Veränderungen bei der Migration der Ascaris-Larven im Körper des Wirts. (Aus dem Zoologischen Institut der Militärmedizinischen Akademie Leningrad.) (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 105, S. 426, 1928.)

Durch Stewart und die späteren Arbeiten zahlreicher Forscher wurde festgestellt, daß die aus aufgenommenen Eiern entstandenen Ascaris-Larven vom Darms aus in die einzelnen Organe des Wirtes einwandern. Die vorliegenden experimentellen Untersuchungen beschäftigen sich hauptsächlich mit den durch die Migration der Parasiten entstan-

denen pathologisch-anatomischen Veränderungen. Als Versuchstiere fanden Mäuse und Meerfischweinchchen Verwendung. Ein Teil der letzteren war vor dem Versuch der Vitalfärbung mit Trypanblau unterworfen worden. Die Ergebnisse der mit sechs Abbildungen und einer Tafel ausgestatteten Arbeit sind folgende:

1. Die Migration der Ascaris-Larven im Körper des Wirtes ruft beträchtliche pathologisch-anatomische Veränderungen in den Organen, die die Hauptstufen der Migration sind (Leber, Lungen), hervor und führt häufig zum Tode der Versuchstiere. 2. Die Intensität und der Charakter der pathologischen Erscheinungen hängen von dem Grade der Invasion, ihrer Gleichzeitigkeit und von der histologischen Struktur des Organs ab; die kompakte Leber reagiert schwächer und auf andere Weise als die lockeren und porigen Lungen mit ihrem stark entwickelten Gefäßnetzwerk. 3. Ein Teil der Ascarislarven (*Ascaris suilla* resp. *Ascaris lumbricoides*) können bei der Invasion in die Leber das Blutgefäßsystem verlassen und sich in dem Gewebe der Leber festsetzen. 4. Wenn die Larven im Laufe der nächsten Tage nicht in das Blutgefäßsystem zurückkehren, büßen sie die Fähigkeit zum Durchbohren ein und bleiben im Lebergewebe, das durch die Bildung einer reaktiven Bindegewebskapsel auf den Parasiten (reparative Entzündung) reagiert. 5. Die Imprägnation der fibrösen Kapsel mit Kalksalzen und die wahrscheinliche Bildung von Konkrementen sind vermutlich die weitliegenden Folgen der sich in der Leber abspielenden pathologisch-anatomischen Veränderungen. 6. Das Vorfinden von Ascaris-Larven in den Gallenwegen wird durch das Hineingelangen der Larven in dieselben aus den Blutgefäßen und dem Lebergewebe erklärt. 7. Die Veränderungen in den Lungen kann man als „Ascaris-Extravasation“ mit vorherrschender Mesenchymalreaktion und bedeutender Beteiligung der eosinophilen Elemente charakterisieren. 8. Die Invasion der übrigen inneren Organe durch das System des großen Blutkreislaufs kommt anscheinend selten vor und hat kaum praktischen Wert. 9. Möglicherweise erhöht die vitale Färbung der Tiere die Fähigkeit des Organismus zur Bekämpfung der Ascaris-Invasion. 10. Die Inokulation der Bakterienflora im Zusammenhange mit der Migration der Ascaris-Larven kann angenommen werden, wenn man die positiven Ergebnisse der in dieser Richtung hin an den Larven von *Ankylostoma duodenale* bei perkutaner Infektion angestellten Experimente (Malvose und Lambert 1918) in Betracht zieht. Carl.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Fincher, M. G. und W. L. Williams: Gehemmte Entwicklung der Müller'schen Gänge, verbunden mit Inzucht. Mit 20 Abbildungen. (The Cornell Veterinarian 1926.) (Medizinische Abteilung und ambulatorische Klinik, N. Y. State Veterinary College, Cornell University.)

(Schluß.)

Fall 12, Fig. 19. Nachkomme von Mutter J. Gedeckt an den letzten drei Brunstperioden, bevor die Färse im Alter von 18 Monaten geschlachtet wurde.

Vulva und Vagina waren normal, abgesehen von schwacher Verengung am vulvo-vaginalen Rand.

Der Zervikalkanal ist sehr erweitert; sonst ist die Zervix normal.

Die rechte Uterushöhle steht mit dem Zervikalkanal im Zusammenhang und ist schlaff und atonisch. Sie ist ungefähr doppelt so groß wie die einer gleich alten Färse.

Das linke Müller'sche Organ wird durch einen undeutlichen fibrösen Strang, der mit der Wand der Zervix des rechten Uterus unicornis verschmolzen ist, dargestellt, bis er einen Punkt gegenüber der Basis des letztgenannten erreicht. Hier biegt er scharf nach links, und nach einer Strecke von 2 inches wird das Gebilde ausgehöhlt und bildet eine gipfelständige Zyste. Diese ist ein stumpfer Kegel, dessen größter Durchmesser ungefähr 4 inches mißt.



Die Ovidukte erscheinen normal. Das rechte Ovarium mißt ungefähr $\frac{3}{4}$ inch im Durchmesser und enthält einen reifen Eierstock. Das linke Ovarium ist fibrös, und sein Durchmesser beträgt $\frac{1}{2}$ inch. Dieser Uterus unicornis ist anscheinend zur Reproduktion geeignet, ist aber in seiner Leistungsfähigkeit wegen der atonischen Beschaffenheit der Zervix und des Uterus unsicher.

Fall 13, Fig. 20. Nachkomme von Mutter K. Wiederholt gedeckt und konzipierte anscheinend, war 4 Monate später in der Brunft. Abermals gedeckt und 32 Tage später im Alter von 32 Monaten gefchlachtet ohne Untersuchung auf Trächtigkeit.

Vulva und Vagina sind klein.

Die beiden Müllerischen Gänge bleiben vollständig getrennt, bis sie sich trennen als zwei ora uteri externa zeigen und auf diese Weise einen echten doppelten Uterus (Uterus didelphys) bilden. Diese beiden Uteri sind dadurch getrennt, daß die Innenwände der Müllerischen Gänge weiter bestehen bleiben.

Der rechte Uterus ist $2\frac{1}{2}$ inches lang, 12 inches breit und enthält einen $\frac{1}{4}$ inch langen Embryo. Die Membranen erstrecken sich über den größeren Teil des Uterus. Sie sind an den Enden, besonders an der Zervix, nekrotisch. Es ist hier kein deutlicher Schleimpfropf zugegen.

Der linke Uterus mißt $1\frac{1}{2}$ inches im Durchmesser und ist 10 inches lang.

Die Ovidukte sind anscheinend normal. Das rechte Ovarium mißt $1\frac{1}{2}$ inches im Durchmesser und enthält ein Trächtigkeitscorpus luteum. Das linke Ovarium hat einen Durchmesser von 1 inch und ist zystös.

Die Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Trächtigkeit dieser Färse ist sehr gering, wie die Tatfache beweist, daß sie frühzeitig in ihrer ersten Trächtigkeit abortierte, und es nicht sicher war, ob sie tragend war, als sie getötet wurde.

Fall 14. Nachkomme von Mutter L. Diese Färse war auf der Weide 1922 gedeckt und erregte unsere Aufmerksamkeit 1923 am Ende ihrer ersten Trächtigkeit. Sie litt zu dieser Zeit an Schweregeburt, die durch einen Fetus und die Eihäute veranlaßt wurden, welche an einem fenkrechten Muskelbände in der Vagina gerade hinter dem os uteri externum hängen blieben. Nachdem dieses Band, das $1\frac{1}{2}$ inches im Durchmesser und 4 inches dorsoventral maß, zerföhren worden war, wurde der

Fetus tatsächlich ohne Unterstützung ausgetrieben. Metritis entwickelte sich, aber nach wiederholtem Decken wurde das Tier zum zweiten Male trüchtig und wurde als gutes Zuchtvieh verkauft.

Fall 15. Nachkomme von Mutter M. Sie war wiederholt gedeckt, und zuletzt hatte sie im Alter von zwei Jahren aufgenommen. Sie abortierte zur Zeit, und es entwickelten sich eine heftige Metritis und Zervizitis. Nachdem die Metritis geheilt war, wurde das unten beschriebene Band zerföhren, und die Zervizitis wurde behandelt. Die Färse nahm beim ersten Sprunge auf und abortierte mit $7\frac{1}{2}$ Monaten. Sie ist wieder gedeckt worden.

Die Vagina ist eng. Es war ein fenkrechtes Muskelband im Zervikalkanal, dessen hintere Fläche sich mit den Bändern des Zervikalmundes in einer Linie befand. Das Band reichte nach vorn $1\frac{1}{2}$ inches in den Zervikalkanal und maß 2 inches horizontal und 3 inches dorsoventral an feiner Vaginalfläche. Kranial-kaudal war es keilförmig, die Basis des Keiles war gegen die Vulva gerichtet. Das Band bestand aus den bleibenden Innenwänden der Müllerischen Organe und verursachte eine unvollständige doppelte Zervix.

Fall 16. Nachkomme von Mutter N. Sie nahm als Jährling beim ersten Sprunge auf, abortierte aber mit $7\frac{1}{2}$ Monaten. Sie ist wieder gedeckt worden.

Die Vagina ist sehr eng. Am vulvo-vaginalen Rand hat kaum ein Finger Zugang. Das rechte Ovarium ist sehr dicht und unbeweglich an der Beckengegend durch ein sehr kurzes breites Band befestigt. Bei einigen der anderen Färsen war eine ähnliche Abweichung des Mesometrium zugegen.

Fall 17. Nachkomme von Mutter O. 1922 und 1923 wurde diese Färse wiederholt gedeckt über einen Zeitraum von 8 Monaten und nahm zuletzt auf, nachdem sie wegen Sterilität behandelt worden war. Sie kalbte 1923 normal

im Alter von 31 Monaten. Leichte Metritis entwickelte sich. Die Färse wurde schnell hinterher trüchtig und kalbte normal (Zwillinge). Sie ist ständig als gutes Zuchttier benutzt worden.

Die Geschlechtswege dieser Tiere erscheinen normal, nur die Vagina ist eng.

Fall 18. Nachkomme von Mutter P. Bei ihrer ersten Trächtigkeit abortierte die Färse z. Zt., als sie zwei Jahre alt war. Das nächste Jahr kalbte sie normal, bekam aber eine heftige Metritis. Sie wurde zum dritten Mal trüchtig und verwarf mit $8\frac{1}{2}$ Monaten. Sie ist als gutes Zuchttier beibehalten worden.

Die Geschlechtswerkzeuge sind anscheinend normal.

Fall 19. Nachkomme von Mutter Q. 1923 im Alter von 26 Monaten anscheinend normal gekalbt, mußte dann drei Mal gedeckt werden, bevor sie trüchtig wurde. 1924 normal gekalbt und später beim ersten Sprunge aufgenommen. 1925 mit 7 Monaten abortiert. Secundinae blieben zurück.

Die Geschlechtswerkzeuge sind anscheinend normal.

Fall 20. Nachkomme von Mutter R. Ihre Größe und ihrem Bau nach die schwächste in der Herde. Zum Teil ist dies der Septicaemia puerperalis zuzuschreiben, von der sie kaum wieder genesen war. 1923 kalbte sie im Alter von 2 Jahren und bekam eine heftige Metritis. Sie wurde wiederholt im folgenden Jahre gedeckt und wurde dann wegen Sterilität gefchlachtet.

Die Geschlechtswerkzeuge dieser Färse waren anscheinend normal.

Fall 21. Nachkomme von Mutter A. (Siehe auch die Fälle 1 u. 22.) Sie verwarf einen toten Fetus fast zur Zeit im Alter von 2 Jahren, nachdem sie auf der Weide trüchtig geworden war. Sie wurde dann aus dieser Herde entfernt.

Die Geschlechtswerkzeuge dieser Färse wurden nicht geprüft.

Fall 22. Nachkomme von Mutter A. (Siehe auch die Fälle 1 und 21.)

Eine Untersuchung im Alter von 15 Monaten ergab anscheinend normale Geschlechtswerkzeuge. Die Färse ist nach einem Sprunge jetzt (März 1925) trüchtig.

Fall 23. Nachkomme von Mutter F. (Siehe auch Fall 7.) Die Ge-

schlechtswerkzeuge wurden nicht geprüft. Im Alter von 2 Jahren bei vorgeschrittener Trächtigkeit verkauft.

Was verurlichte diese Sexualmängel?

Es ist höchst wichtig, daß, soweit bekannt, keins der beteiligten männlichen Tiere einen Sexualmangel zeigte. Nichtsdestoweniger erscheint es unmöglich, die Schlußfolgerung zu vermeiden, daß der Herdbulle für die Hemmung in der Entwicklung der Geschlechtswerkzeuge verantwortlich war. Selbst frei von einem Mangel der Geschlechtswerkzeuge übertrug er keinen auf seine männlichen Nachkommen. Die angeführten Tatfachen lassen daran denken, daß der Bulle von irgend einem weiblichen Ahnen her einen fehlerhaften Zustand besaß, der keine Neigung hatte, sich in den männlichen Geschlechtswerkzeugen geltend zu machen. Ferner war der fehlerhafte Zustand anscheinend zu schwach, sich selbst zu äußern, wenn mit anderen etwas abweichenden Blutlinien (dem Original nicht verwandte Gruppe von weiblichen Tieren) gekreuzt wurde, jedoch wenn blutschänderische Paarung vorkam, bekam die ererbte Neigung plötzlich verstärkte Macht und arbeitete darauf hin, die weibliche Linie dadurch, daß die Entwicklung der Müller'schen Gänge gehemmt wurde, aussterben zu lassen. Die Tatsache, daß bei dem männlichen Tiere die Müller'schen Gänge nur durch rudimentäre Überbleibsel dargestellt werden, ist wahrscheinlich der Grund dafür, daß Defekte in den Geschlechtswerkzeugen bei den beteiligten männlichen Tieren fehlen. Wäre statt dessen das Ovarium beteiligt, so würde es viel schwieriger gewesen sein, zu verstehen, warum der Hoden des männlichen Tieres nicht an der abweichenden Neigung sich beteiligt, weil sie doch beide aus denselben embryologischen Gebilden hervorgehen.

Vererben sich anatomische Defekte?

Die Übertragbarkeit anatomischer Defekte bietet stets ein fruchtbares Feld für Streitigkeiten, und die Grundgedanken können verschieden ausgelegt werden. In diesem Falle kann nicht bewiesen werden, daß eine Anomalie in den Geschlechtswerkzeugen bei irgend einem weiblichen Vorfahren bestand; dies läßt sich nur vermuten. Andererseits ist häufig berichtet worden, daß ein Vater oder eine Mutter mit einem anatomischen Defekt ihn nicht auf ihre Nachkommen überträgt. Einige sehr hervorragende Züchter, auf die der Stammbaum und die allgemeine Vortrefflichkeit einen Eindruck gemacht haben, benutzen einen monorchiden Bullen als Vater in einer kostbaren Vollblutherde. Sie glauben und versichern, daß der Defekt unwesentlich oder zufällig und nicht auf die Nachkommenschaft übertragbar ist. Sie führen zur Bekräftigung einer solchen Behauptung Tatfachen an. Widersprechende Beobachtungen sind hin und wieder gemacht worden. In den Kliniken des New York State Veterinary College wurde eine Beobachtung hinsichtlich der Benutzung eines monorchiden Widders gemacht. 75 Prozent seiner männlichen Nachkommenschaft wurden Cryptorchiden. In einem anderen Fall warf eine Familie von Säuen Ferkel, darunter einige mit einer Hernia des Cerebrums durch die Fontanelle. Trotz Auskreuzungen in der männlichen Linie, nahm der anatomische Defekt oft und heftig schnell zu, in einer Generation nach der anderen, bis der Züchter gezwungen war, die Linie zu beseitigen. Die als Stellvertreter eingeführte neue Linie derselben Zucht wurde dadurch, daß bei den männlichen Ferkeln dauernd eine Scrotalhernia auftrat, zu Grunde gerichtet.

Zu wenig scheint über die genetischen Gesetze der anatomischen Abweichungen bekannt zu sein. Zuweilen scheinen sie nicht die geringste Bedeutung zu besitzen und dann wieder vernichten sie die begründeten Erwartungen des Züchters. Anscheinend ist kein Schlüssel bekannt, den Züchter zu leiten, welches anatomisch fehlerhafte Tier zu behalten und welches abzufassen sei, es sei denn, daß er den strengen Grundsatz annimmt, alle abzufassen. Der Tierarzt wird wiederholt konsultiert, ob es ratsam ist, reingezüchtete Tiere mit anatomischen Defekten zur Zucht zu benutzen. Die bei dieser Gruppe von Färfen beschriebenen Defekte der weiblichen Geschlechtsorgane sind wiederholt in einzelnen Fällen durch Tierärzte, welche mit Krankheiten der Geschlechtswerkzeuge zu tun haben, getroffen worden. Man trifft nicht selten den fibromuskulösen, senkrechten Pfeiler an dem äußeren Muttermund, wie es in den

Fällen 14 und 15 geschildert worden ist. Im Falle 14, als die Wehen sich einstellten, begannen der Fetus und seine Häute schnell, zum Teil an jeder Seite des Pfeilers, hinauszudringen. Dabei war die Schweregeburtsunvermeidlich. Sie wurde durch die Teilung des Pfeilers beseitigt. Häufiger hindert der Pfeiler anscheinend die Konzeption, vielleicht dadurch, daß er auf die zerviko-uterine Drainage störend einwirkte und auf diese Weise die Infektion steigerte. Gelegentlich begegnet dem Kliniker eine Obliteration eines Uterushornes an seiner Basis und Mitte mit nachfolgender Retentionszyste an seiner Spitze, wie in einzelnen der hier beschriebenen Fälle gezeigt wurde. Wenn eine solche Menstruationszyste in einem Horn besteht und das andere ist normal, so kann die Konzeption leicht erfolgen, und die Trächtigkeit kann ihren physiologischen Verlauf nehmen. Dies kann sich wiederholen, aber zuletzt werden die Menstruationsreste, welche den Inhalt der Zyste bilden, infiziert, und es bildet sich ein Abszeß. Dann ist anscheinend die Brunst behindert, und Sterilität folgt. Einer von uns (W.) entfernte bei der Konsultation wegen einer hochwertigen Färse das in einen Abszeß umgewandelte Horn mit dem Ovarium, und die Patientin kalbte. Aber wie steht es mit ihren Nachkommen? Sie war von außergewöhnlicher Herkunft und ausgezeichnete Individualität. Von unserem Standpunkt war die Operation eine Angelegenheit von beruflichem Selbstvertrauen, und der Züchter betrachtete sie ohne Zweifel als ein wirtschaftliches Geheimnis. Es ist keineswegs unmöglich, daß nicht weit zurück in der weiblichen Linie, der Herdbulle, den wir beschrieben haben, einen sehr ähnlichen Makel von den Ahnen her erworben hat.

Eine Frage in beruflicher Ethik.

Soll ein Kliniker eine chirurgische Operation einen angeborenen Defekt der Geschlechtswerkzeuge zu beseitigen, welcher die Reproduktion hemmt, ausführen? Oder soll ein Tierarzt einem Züchter empfehlen, ein hinsichtlich der Geschlechtswerkzeuge fehlerhaftes Tier zu Zuchtzwecken zu benutzen? Der Kliniker ist nicht der Hüter der Ethik des Züchters, hat aber in ethischer Beziehung eine Verantwortung seinen Kunden gegenüber. Hätten wir oder einer von uns das Unglück vorausgesehen, das dem Eigentümer der betreffenden Herde drohte, würde es mehr ethisch gewesen sein, nicht gegen die blutschänderische Zucht Einspruch erhoben zu haben, als verläumd zu haben, dagegen Einspruch zu erheben, ein Tier in die Herde mit Tuberkulose einzuführen? Die Schädigung wäre fast ebenso groß als das mittlere Verhältnis von Tuberkulose.

Die ethischen Verpflichtungen des Tierarztes der Gemeinde und dem Staat gegenüber sind nicht genau bestimmt. Wir wissen, daß alle männlichen und etliche von den weiblichen, die aus dieser blutschänderischen Zucht hervorgingen, zu Zuchtzwecken verkauft und verbreitet worden sind. Vermutlich wäre, wenn mit Linien, die von den Ahnen her keinen Makel besaßen, gekreuzt wurde, alles gut gegangen. Was würde aber die Wirkung sein, wenn zwei Zweige des Blutstromes von dieser Herde nach zwei oder drei Generationen zusammentreffen und sich wieder vereinigen? Oder was würde geschehen, wenn der in dieser Herde erzeugte Blutstrom mit einem Strom aus einer anderen Quelle, der auf eine ähnliche Weise verdorben ist, sich vermischt? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Ein Grundsatz ist klar: es ist so viel die Pflicht des Tierarztes gegen die Gemeinde und gegen den Staat, den Einfluß und die Macht, soviel er besitzt, zu benutzen, um die Erzeugung anatomisch fehlerhafter Tiere zu verhindern, wie es seine Pflicht ist, der Vertreibung infektiöser Krankheiten vorzubeugen. Jeder führt eventuell zu gleicher Pforte. Es scheint den Verfassern, daß der Tierarzt, wenn er ersucht wird, an Tieren zu operieren, um angeborene Defekte zu entfernen in der Absicht, die Reproduktionskraft oder den Marktwert als Zuchttiere zu steigern, die Angelegenheit ernsthaft überlegen soll. Er soll gleich vorsichtig sein, wenn er einem Kunden wegen der Benutzung anatomisch fehlerhafter Tiere zu Zuchtzwecken einen Rat erteilt.

Die Frage betreffs der Inzucht ist vornehmlich für Landwirte als Tierbesitzer zu beantworten, so weit wir aber in ihrer Literatur finden konnten, haben sie sie nicht bereits klar beantwortet. Harper (1) sagt über Inzucht: „Wenn auch dieses System im Stande ist die größte Veredelung zu erzeugen, so ist es doch nicht ohne Nachteile. . . . Bleibt man dabei, so besteht die Aussicht, daß die Fruchtbarkeit ebenso wie die Lebenskraft des Körpers verloren geht, was rasch zum Aussterben der Rasse führen kann. Wenn daher Inzucht angewendet wird, so kann

nicht Wert genug auf die Auswahl von Tieren in Bezug auf hohe Fruchtbarkeit und große Lebenskraft des Körpers gelegt werden.“

Mumford sagt „In-breeding“ (Inzucht) „ist verschieden bezeichnet als „closebreeding“ (enge Inzucht) „consanguineous breeding“ (Verwandtschaftszucht) „in-and-inbreeding“, „inter-breeding and incestuous breeding“ (Inzucht, Inzestzucht, blutschänderische Zucht).

„Der Ausdruck wird benutzt, um die Paarung von Tieren anzudeuten, welche nahe verwandt oder verwandt oder innig verwandt sind . . .“ „Die Ausübung der Inzucht ist mit einer starken Arznei verglichen worden, welche in der Hand eines erfahrenen Arztes über den Ausgang des Lebens entscheiden kann, in der Hand des Anfängers aber ein gefährliches und oft todbringendes Werkzeug wird. Inzucht kann mit Erfolg angewendet werden, aber nur von denjenigen, die mit den verwickelten biologischen Grundfätzen und mit den Folgen vertraut sind, welche mit der Paarung nahe verwandter Tiere verbunden sind, und, was mindestens ebenso wichtig ist, welche die Geschichte der Vorfahren ihres Zuchtstammes kennen.“

Schriftsteller auf diesem Gebiete glauben unzweifelhaft, daß Inzucht, wenn sie korrekt ausgeführt wird, äußerst wertvoll und in anderen Fällen ebenso unheilvoll ist. Harper hebt im obigen Zitat „hohe Fruchtbarkeit und Lebenskraft des Körpers“ hervor. Die hier berücksichtigten Tiere besaßen diese, und das Unglück folgte. Mumford betont den Vorschlag, daß der Züchter „die Geschichte der Vorfahren seines Zuchtstammes kennen“ soll. Hier wieder erfüllt, im gewöhnlichen Sinne, der Züchter Mumfords Vorschrift, aber sie wandte nicht den Zusammenbruch ab. Es scheint uns, daß es vollkommen klar ist, daß Inzucht unter gewissen Bedingungen einen entscheidenden Wert besitzt, und daß es ebenso klar ist, daß sie unter anderen Bedingungen verderblich ist. Die Schwierigkeit liegt anscheinend in der Unfähigkeit des Landwirtes als Tierbesitzer, gegenwärtig die Hauptgrundlagen der Sicherheit genau zu bestimmen.

„Freemartins“, d. s. mit einem Bullenkalb ungleich geborene Kuhkälber und Hemmung in der Entwicklung der Geschlechtswerkzeuge.

Die Abweichungen in den Geschlechtswerkzeugen der hier beschriebenen Gruppe von Tieren sind wichtig in Bezug auf die Theorien hinsichtlich der Genese von „freemartins“. Einer von uns (4) hat an einer anderen Stelle die „Freemartins“ besprochen und hat anscheinend zwei von Grund aus verschiedene Bedingungen durcheinander geworfen. Die Fälle, die wir hier beschrieben haben, erscheinen vollständig verschieden von „freemartins“. Es ist wichtig, zu bemerken, daß die Hemmungen in der Entwicklung hier auf das weibliche Tier beschränkt waren. Die Zahl der Fälle ist zu groß, um zu vermuten, daß es Zwillinge zu männlichen Tieren gewesen sind, die untergingen und reforbiert wurden. Es sind unzweifelhaft einzelne gewesen. Eine der Theorien über die Genese der „freemartins“ ist die, daß es ein abweichendes, weibliches Tier ist, in dem die Entwicklung des Individuums gehemmt worden ist, weil ein vorhandener männlicher Embryo die wesentlichen Nährstoffe, ohne welche die Entwicklung der weiblichen Geschlechtswerkzeuge nicht erfolgen kann, an sich zieht. In unserem Falle kann die Hemmung in der Entwicklung nicht der Anwesenheit männlicher Embryos zugeschrieben werden. Während die hier betrachteten Fälle wichtige Hemmungen in der geschlechtlichen Entwicklung darstellen, unterscheiden sie sich von typischen „freemartins“. Alle die beschriebenen Tiere waren Färken, also nicht geschlechtslos. Alle unsere Fälle hatten bestimmte funktionierende Ovarien, die Tiere entwickelten alle typische Gestalt, Wuchs und Benehmen von Färken. Der typische „freemartin“ entwickelt keine Ovarien, und das Tier ist in Typus, Gestalt und Benehmen ungeschlechtlich.

Bibliographie.

1. Williams, W. L.: A Technic for the Study of Genital Diseases by Means of the Fetal Membranes, Cornell Veterinarian, 1925, XV, 225.
2. Harper: Breeding of Farm Animals, 1920, pag. 182.
3. Mumford, F. B.: The Breeding of Animals, 1921, pages 217 and 239.
4. Williams, W. L.: The Diseases of the Genital Organs of Domestic Animals, 1921, page 151.

Erklärung der Figuren.

In der Mehrzahl der Photographien sind die Geschlechtswege von der Doralfalte aus gesehen (D.V.). Einige sind von der Ventralseite (V.V.) gesehen. Die Vulva und Vagina, wenn sie vorhanden ist, sind offen gelegt. Die Aufschrift ist bei allen Abbildungen gleichmäßig wie folgt:

Ad., Verwachsungen, linkes Ovarium an die zystische Spitze des Uterushornes, Fall 6. Add., Verwachsungen, Blase mit zystischer Spitze des Uterushornes, Fall 6. A.H., Spitze des Uterushornes. B., Harnblase. C., Zervix. C.A.H., zystische Spitze des Uterushornes. C.A., Fig. 19, zystische Spitze des Uterushornes. C.L., Corpus luteum. C.L.P., Corpus luteum der Trächtigkeit. CofVa., Einschnürung des Vulvo-vaginalrandes, Fall 9. Cy., Zyste im rechten Ovidukt, Fall 10. D.V., dorale Ansicht. E., Embryonalfack. Em., Embryo. Ex., os uteri externum. H.S., Horizontalschnitt. L.O., linkes Ovarium. L.U., linker Uterus. M., Müllerfcher Gang. Ov., Ovidukt. P., persistierende Innenwand des rechten Ovidukts. R.O., rechtes Ovarium. R.U., rechter Uterus. Sc., Sclerosis und Verwachsungen der Beckenteile. U., Uterus. Ur., Urethra. V., Vulva. Va., Vagina. V.V., Ventralansicht. X., Quersepta in den Uterushörnern, Fall 10—11.

Bass.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Dold: Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Reinfektion bei geheilter Tuberkulose. (Beitr. zur Klinik der Tuberkulose 1927, 67, S. 524.)

Bei Meerfischweinen, die nach intrakutaner Infektion mit schwachvirulenten Tuberkelbakterien spontan ausheilten oder operativ von der tuberkulösen Infektion befreit wurden, hatte eine zweite Infektion sechs Monate später den gleichen positiven Erfolg wie bei Kontrollinfektionen an unvorbehandelten Tieren. Daraus ergibt sich, daß eine vollkommen ausgeheilte Tuberkulose keinen Schutz gegenüber einer neuen Infektion verleiht.

Meyn.

Chlumsky, V.: Trockenkost zur Behandlung von Knochentuberkulose. (Zentralbl. f. Chirurgie 1928, S. 334.)

Die vorliegende Behandlungsmethode wird vom Verf. seit mehr als zwei Jahren systematisch bei allen Patienten mit chirurgischer Tuberkulose durchgeführt. Die Kranken gewöhnten sich meist schnell an die Beschränkung der Flüssigkeitszufuhr (durchschnittlich 400 ccm im Tag) und hielten diese Diät oft später von sich aus ein. Streng angewandt wurde die Trockenkost gewöhnlich während 3 bis 4 Wochen. Auf diese Weise trat bei vielen Patienten schneller Heilung ein und sie nahmen auch an Gewicht mehr zu wie diejenigen, die Flüssigkeit ad libitum zuführten. Dieser gute Erfolg war jedoch nicht allgemein. Bei nicht wenigen Kranken hörte zwar die Sekretion auf, die Abszesse verschwanden, aber die Gewichtszunahme blieb aus. Fiebernde Patienten zeigten nur minimalen Erfolg. Als unterstützende Maßregel verbietet Verf. den Genuß von Milch in jeglicher Form, und zwar, weil nach seinen Erfahrungen die chirurgische Tuberkulose unter der Landbevölkerung (Gegend von Preßburg), die mit Vorliebe kuhwarme Milch trinkt, am meisten wütet. Eine Übertragung der Krankheit von tuberkulösen Kühen auf den Menschen konnte Verf. durch die Feststellung des Typus bovinus in den von ihm behandelten Fällen nachweisen. Durch diese Therapie wurde manchmal eine frappante Besserung des Allgemeinbefindens erzielt.

Carl.

Melfert: Tetanusbehandlung durch subdurale Injektion von Tetanusserum. (Zentralbl. f. Chirurgie 1928, S. 12.)

Bei einem sehr heftigen Tetanusfall trepanierte Verf. das Scheitelbein etwa in der Höhe des Schnittpunktes von Pfeil- und Kreuznaht in Form eines Kreises von 2 cm Durchmesser und injizierte sodann in fächerförmiger Anordnung 100 A.-E. Tetanussporen unter die freigelegte Dura. Daraufhin trat langsam in die Erscheinung tretende Besserung ein, so daß nach acht Tagen der Patient als gerettet angesehen werden konnte. Vollständige Heilung nach sechs Wochen. Verf. nimmt an, daß in solchen Fällen die vorliegende Methode gegenüber der intralumbalen bzw. intravenösen Injektion den Vorzug verdiene.

Carl.

Noether, P.: Über Staupe. (Aus dem pharmakologischen Institut der Universität Freiburg i. Breisgau. — Direktor. Prof. Dr. Paul Treudelenburg.) (T. R. 1928, S. 45.)

Verf. hatte Gelegenheit, während des Krieges bei einer

Meldestaffel und später in der Blindenschule des Deutschen Vereins für Sanitätshunde in Freiburg i. Br. zahlreiche Fälle der Staupe zu beobachten. Bei der Meldestaffel erwiesen sich die meisten Maßnahmen als gänzlich unzulänglich, erst als alle neuen Transporte 14 Tage lang in Quarantäne gehalten wurden, konnte man in zwei Monaten der Seuche Herr werden. Die Behandlung war stets symptomatisch. Als gänzlich untauglich erwiesen sich die während des Krieges gebräuchlichen Sera. Methylenblau und die Mittel, die auf Proteinkörperwirkung beruhen, haben keine günstigen Resultate gezeigt. Jodincarbon wie auch Cajosol zeigten wiederholt günstige Beeinflussung. Ein spezifisches Mittel fehlt bisher. Von Wichtigkeit für den Heilerfolg ist ein frühzeitiges Einsetzen der Behandlung. K. H. Meyer.

Fränkel u. Schulz: Versuche zur Frage der peroralen Immunisierung. Perorale Immunisierung bei der Maus gegen Paratyphus B. (Zeitsch. für Immunitätsf. 1927, Bd. 53, S. 478.)

Durch die perorale Immunisierung von Mäusen mit abgetöteten Paratyphus-B- und Breslau-Bakterien nach vorhergegangener Sensibilisierung der Darmschleimhaut mit Natr. benzoicum konnte eine Resistenzhöhung gegenüber subkutaner und peroraler Infektion mit dem homologen Stamm erzielt werden. Der Schutz war besser wenn das sensibilisierende 3prozentige Natr. benz. vor der Behandlung zweimal gegeben wurde. Die perorale Verabreichung von Bakterienextrakten und Filtraten erwies sich ebenso wirksam als die der Vollvakzine. Meyn.

Stresow: Methylenblau und Schweinefeuche. (Tierärztl. Rundschau 1928, S. 23.)

Mit gutem Erfolge hat St. seit etwa zehn Jahren bei Schweinefeuchen, namentlich Rotlauf, durch Beigabe von Methylenblau ins Futter neben dem Serum gute Erfolge erzielt. Da aber schwerkranke Tiere nicht mehr fressen, so löste Verf. zwei bis drei Gramm Methylenblau in 100 ccm Rotlaufferum, wodurch die Wirksamkeit des Serums erheblich unterstützt werden soll. Der Einwand, daß durch die Blaufärbung das Fleisch untauglich würde, ist nur zum Teil berechtigt, da in sehr schweren Erkrankungsfällen das Fleisch an sich minderwertig oder untauglich ist. K. H. Meyer.

Verschiedene Mitteilungen.

August Gärtner zum 80. Geburtstage.

Am 18. April 1928 begeht der Nestor unter den deutschen Hygienikern, Geheimer Rat Prof. Dr. August Gärtner, früher Direktor des Hygienischen Instituts der Universität Jena, seinen 80. Geburtstag in voller Rüstigkeit und Frische.

Gärtner, gebürtiger Westfale, stammt ebenfalls aus der Kochschen Schule und hatte unter Kochs Leitung in den Jahren 1884 bis 1886 gemeinsam mit Löffler, Gaffky u. a. dafelbst gearbeitet. Im Jahre 1886 bekam er einen Ruf als Professor der Hygiene nach Jena (es gab damals nur fünf: Pettenkofer-München, Hoffmann-Leipzig, Flügge-Göttingen, Koch-Berlin, Wolffhügel-Gießen). Wie Gärtner selbst humoristisch zum Ausdruck bringt, bestand das Hygienische Institut aus einem kleinen Küchenschrank, das wenige Utensilien für die Vorlesungen enthielt. Der zielbewußten und erfolgreichen Arbeit Gärtners ist es gelungen, allmählich das Hygienische Institut zu erweitern. 1903 wurde dann aus den Mitteln der Carl Zeiß-Stiftung das heute noch bestehende Hygienische Institut der Universität erbaut. Ein großer Teil der Gärtnerschen Arbeiten beschäftigte sich mit der Biologie und Hygiene des Wassers. Der Jubilar war Autorität ersten Ranges auf diesem Gebiete und wurde in diesen Fragen als Sachverständiger fast nach allen Teilen der Erde berufen. Auch in der Krankenhaushygiene leistete Gärtner hervorragendes. Bekannt sind seine zahlreichen Arbeiten auf dem Gebiete der Wasserbiologie, ferner sein bedeutendes Lehrbuch der Hygiene, das inzwischen die 8. Auflage erreicht hat. Viele andere Arbeiten sind seiner Feder entsprungen. Der Ruf Gärtners wurde begründet durch die Entdeckung der bakteriellen Erreger von Fleischvergiftungen; es war ihm im Mai 1888

gelingen, gelegentlich einer Fleischvergiftung in Frankenhausen am Kyffhäuser im Darminhalte und in der Milz eines Mannes einen Erreger zu finden, den er gleichzeitig in der Milz einer notgeschlachteten Kuh nachwies. Der betr. Mensch war 12 Stunden nach dem Genuß von 800 Gramm des Fleisches von dem notgeschlachteten Tiere gestorben; außerdem waren noch 58 Personen erkrankt, die kleinere Mengen des verdächtigen Fleisches genossen hatten. Gärtner bezeichnete den Erreger als Bact. enteritidis und hielt ihn für die Ursache der Fleischvergiftung. Die Bedeutung des Gärtnerbakteriums als Erreger der meisten Fleischvergiftungen fand bald allgemeine Anerkennung. Ebenso hat sich seine vor nunmehr 40 Jahren ausgesprochene Ansicht über die Notwendigkeit und Bedeutung der bakteriologischen Fleischschau als richtig erwiesen: „Daher ist das Fleisch frischgeschlachteter (s. c. notgeschlachteter) Tiere zu verwerfen, wenn es an den Stellen, die bislang mit der Luft nicht in Berührung waren, Bakterien enthält, es sei denn bestimmt nachgewiesen, dass den aufgefundenen Bakterien eine Schädigung der menschlichen Gesundheit nicht zukommt.“ (Aus der Breslauer ärztlichen Zeitschrift 1888, Nr. 21 bis 24.) Gärtner verbindet mit seinen genialen Forschungsergebnissen eine glückselige Natur, die von Humor begleitet wird. Er erfreut sich unter seinen speziellen Fachkollegen einer seltenen Wertschätzung und Hochachtung. Leider war ihm der Schmerz nicht erspart geblieben, seinen Sohn, den Privatdozenten für Hygiene, Dr. Wolfgang Gärtner, der zu den größten Hoffnungen berechnete, in Rußland als Mitglied einer deutschen Hilfsexpedition an Fleckfieber zu verlieren.

Wir wünschen dem greifen Gelehrten, der sich durch eifrige Arbeit immer noch frisch erhält, daß die Sonne noch recht lange seinen Lebensabend freundlich bescheinen möge. Mießner.

Landesgruppe Sachsen des Reichsverbandes Deutscher Gemeindetierärzte.

Sonnabend, den 21. April 1928, 1 Uhr s. t., im Hotel Kästner, Zwickau i. Sa. (gegenüber dem Hauptbahnhof) Mitglieder-Versammlung. 1. Die Auswirkung der beiden Verordnungen über die bakteriologische Fleischuntersuchung vom 19. und 22. Dezember 1927 in der praktischen Fleischschau. — Referent: Amtstierarzt Stadtveterinär Dr. Pomper-Plauen i. V. 2. Die Beförderungsregelung in den sächsischen Gemeinden. — Referent: Dr. Thomas-Meißen. Dr. Thomas, I. Vorf. Dr. Schneiderheinze, I. Schriftf.

Verein der Tierärzte des Regierungsbezirkes Düsseldorf.

Frühjahrs-Versammlung am Sonntag, den 22. April 1928 in Düsseldorf, städt. Tonhalle, Ecke Shadow- und Tonhallenstraße, Anfang pünktlich 11 Uhr. 1. Geschäftliche Mitteilungen (Dispensierrecht, Taxe, Bericht über den Stand der Eintragung des Vereins als juristische Person, Besprechung über den geplanten 10ten Verband der rheinischen Vereine, Jubelfeier der Hochschule in Hannover). 2. Aufnahme neuer Mitglieder. 3. Neuwahl des Vorsitzenden. 4. Prof. Dr. Zietzschmann-Hannover: „Überzyklische Veränderungen an den weiblichen Genitalien bei Säugetieren und Mensch, ein Vergleich von Brunst und Menstruation“. Punkte, welche zur Besprechung kommen sollen, sind dem Schriftführer spätestens bis zum 17. April schriftlich mitzuteilen. Nach der Versammlung etwa 2 Uhr gemeinsames Mittagessen. Zahlreiche Teilnahme der Damen höflichst erbeten.

Duisburg-Krefeld, den 1. April 1928.

Bettelhäuser, Vors. Dr. May, Schriftf.

Personal-Nachrichten.

Übertragen: Oberassistent Dr. Meyer an der Klinik für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule Hannover die kommissarische Verwaltung der Veterinärstelle in Bleckede (Bezirk Lüneburg).

Versetzt: Veterinär Dr. Neuhaus in Lennep (Bez. Düsseldorf) in die Veterinärstelle in Elferfeld (Bez. Düsseldorf).

Verstorben: Oberveterinär Dr. Kränzle, Bezirkstierarzt in Passau; Oberveterinär Dr. Stephan Albert, Bezirkstierarzt a. D. in Bamberg.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zusendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 16,

Ausgegeben am 21. April 1928.

36. Jahrgang.

Die Bedeutung der in Rückbildung begriffenen (der rudimentären) Organe für das biologische Geschehen.*)

Von Prof. Dr. O. Zietzschmann.

Der lebende Organismus ist nichts beständiges. Er ist einem dauernden Wechsel unterworfen, der durch unablässigen Aufbau und entsprechenden Abbau gekennzeichnet ist. Dadurch unterscheidet sich das lebende Ding vom toten, rein materiellen Substrat.

Es sind vier oder fünf Eigenschaften, die den lebenden Organismus über das tote Material hinausheben:

1. Ein ganz spezifischer Feinbau.
2. Die Eigenschaft selbsttätiger Bewegung.
3. Das Attribut des Stoffwechsels, der in der Ernährung und Atmung seinen Ausdruck findet, in einem ständigen Aufnehmen, Umsetzen, Assimilieren und Abgeben von Stoffen zunächst fremder Herkunft.
4. Die Reizbarkeit, das ist die Fähigkeit des Lebenden auf von außen her kommende Reize in spezifischer Weise zu antworten. Und diese Aktivierung läßt sich beliebige Male wiederholen, solange die Reizstärke innerhalb der das Leben nicht schädigenden Grenzen bleibt.

Und endlich

5. Die Fähigkeit, sich fortzupflanzen, sich zu vermehren; eine unter höchst komplizierten Vorgängen ablaufende Tätigkeit, die bis in alle Einzelheiten bei allen Pflanzen und Tieren, von den Einzellern bis hinauf zu den höchsten Säugetieren mit dem Menschen, in den Hauptzügen eine übereinstimmende ist.

Eine Gruppe von Naturwissenschaftlern sieht nun diese Eigenheiten der Organismen für nicht prinzipiell, sondern nur für graduell verschieden von Eigenschaften der toten Materie an, eine andere glaubt dagegen, grundsätzliche Differenzen zwingend darin erblicken zu müssen. Wir können hier zu diesen wohl wichtigen Fragen nicht Stellung nehmen.

Ein jeder höhere Organismus setzt sich aus vielen Einzelheiten zusammen, die einmal vom gestaltlichen, vom morphologischen Standpunkte aus unser Interesse erwecken, und die andererseits funktionelle Einheiten repräsentieren, d. h. eine bestimmte Aufgabe im Gesamtkörper des gedachten Lebewesens zu erfüllen haben. Diese physiologisch genau zu umschreibenden morphologischen Einzelteile oder Organe

ordnen sich zu größeren Systemen zusammen, indem sie zu hinter- und nebeneinander geschalteten Bildungen sich vereinigen, die ihrerseits wieder einer gemeinsamen höheren Funktion dienen. So entstehen die großen Apparatsysteme der höheren Lebewesen, beispielsweise der Verdauungsapparat, der Geschlechtsapparat, die Einzelsysteme der mehr oder weniger komplizierten Sinnesorgane, das Gesamtnervensystem und so fort. Jeder dieser Komplexe hat also eine umrissene Gestalt, setzt sich demnach von anderen Apparaten deutlich genug ab und dient ganz bestimmten, spezifischen Funktionen, die, von allen Systemen addiert, die Gesamtlebenserscheinungen eines Organismus ausmachen.

Schauen wir uns in der Welt der Organismen um, dann fällt uns deren überaus große Mannigfaltigkeit, deren trotz weitestgehender gemeinsamer Organisation doch recht große Verschiedenartigkeit auf. Wir entdecken Formen — und das gilt nicht nur für die Tiere, das gilt ebenso für die Pflanzen — die von anderen sich sehr wesentlich entfernen, dagegen aber auch solche, die einander bedeutend näher stehen. Und so bilden sich ungezwungen Gruppen verwandter Typen, die in sich mehr oder weniger geschlossen sind, innerhalb deren aber weiterhin eine Reihung ganz bestimmter Art sich leicht durchführen läßt. So kommen wir zur Erkenntnis, daß in der überaus großen Mannigfaltigkeit der Organismen Systemkräfte in Wirksamkeit waren, daß geringere oder größere Verwandtschaftsverhältnisse bei den einzelnen Gruppen und innerhalb dieser wieder bei den einzelnen Formen (Arten) bestehen. Durch die Methode der Vergleichung kommen wir auf diese Zusammenhänge, und diese Methode lehrt uns die vergleichende Anatomie:

Derlei Gedankengänge sind schon alt. Dennoch haben sie erst im Anfang des vorigen Jahrhunderts, vor etwa 120 Jahren, greifbare Gestalt angenommen und nutzbare Resultate gezeitigt. Kein geringerer als Jean Lamarck hat 1809 in seinem berühmten Werk „Philosophie zoologique“ als erster gezeigt, daß jene verschiedenen Formen, bei denen man bis dahin in der Gefolgschaft eines Karl Linne immer nur die Verschiedenheiten hervorhob, in einem Verwandtschaftsverhältnis stehen. Und Jean Lamarck ist der erste gewesen, der in ausführlicherer und wissenschaftlich durchdachter Form von einer Abstammung der einzelnen Typen voneinander spricht. Er ist der Vater der

*) Vortrag gehalten bei der akademischen Reichsgründungsfeier der Technischen und Tierärztlichen Hochschule in Hannover am 18. Januar 1928.

Deszendenztheorie, nicht wie fälschlicherweise auch heute noch oft gemeint wird, Charles Darwin, der 50 Jahre später nur neue Tatsachen zur Stützung dieses Theorems beigebracht hat und den Gedanken der natürlichen Zuchtwahl, der Auswahl der Organismen im Kampfe ums Dasein, aussprach, über dessen Wert oder Unwert hier nicht geurteilt werden soll.

Und Jean Lamarck verfocht die Idee: Die höheren Tier- und Pflanzenformen einschließlich des Menschen stammen ausnahmslos von niederen und diese von der einfachsten Form eines Lebewesens ab.

Dieser Gedanke einer allmählich aufsteigenden natürlichen Entwicklung ist außerordentlich fruchtbar gewesen und beherrscht heute noch das gesamte naturwissenschaftliche Denken, mit verschwindenden Ausnahmen, die jeder dogmatisch nicht gebundene Forscher übergehen darf. Auf ganz anderer Linie steht die heute ernstlich umstrittene Anschauung, ob bei diesem postulierten Entwicklungsgang, der als eines der gewaltigsten und großartigsten Gedankengebäude zu bewerten ist, es sich nur um rein materielle, allein der Chemie und Physik zuzuweisende gesetzmäßige Vorgänge handelt. Wenn wir ehrlich sind, so ist das eine Frage der Weltanschauung, und diese steht jenseits der Reichweite der Methoden exakter Naturforschung. Naturwissenschaft und Religion aber haben beide volle Existenzberechtigung nebeneinander.

Ist nun die Annahme richtig, daß eine höhere Form aus einer niederen sich herleiten läßt, dann geht die erste Frage nach der Ursache zu dieser erstaunlichen Erscheinung im Naturgeschehen. Die Erklärung, die Lösung der Frage ist in der Grundeigenschaft alles Organischen: in der Veränderlichkeit, der Variabilität der lebenden Masse (der Organismen als Ganzes sowohl, wie ihrer gröberen und feineren Einzelteile) zu suchen. Allerdings ist der Weg, auf dem der Aufstieg vor sich ging, nicht ein einheitlicher; auf verschiedene Weise kann die Spezialisierung erfolgen.

Anpassung an veränderte äußere Lebensbedingungen ruft am Organismus Abänderungen in dieser oder jener Richtung hervor, und diese können, wenn die neuen Lebensbedingungen nur tief und lange genug einer Tierform sich aufdrücken, zur Vererbung gelangen (Lamarck's Anschauung).

Oder: Der Kampf ums Dasein läßt nur die jeweils stärksten und geeignetsten Individuen, die sich der einen oder anderen für das Leben vorteilhaften Eigenschaft erfreuen, zur Fortpflanzung kommen; diese Auswahl länger fortgesetzt ergibt neue Formen (Darwins heute stark angefochtene Lehre der Selektion).

Oder: Es treten sprunghaft, ohne uns erkennbare Ursache, neue Merkmale an einer Tierform auf, die sich vererben (die praktisch erprobte Mutationslehre des Holländers de Vries).

Oder: Durch Paarung nicht zu fern stehender Arten mit differenten Eigenschaften entstehen neue Formen (die durch tausendfältige Experimente belegte Kreuzung von Pflanzen und Tieren). Hierher gehören auch die klassischen Versuche eines Gregor Mendel, Abtes zu Brunn, der in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit Kreuzungen besonders an Erbsen bahnbrechende Resultate erzielte, aus denen er ein Vererbungsgesetz ableitete; wohl die größte biologische Tat des 19. Jahrhunderts.

Es steht außer jeder Frage, daß die große Idee der Entwicklung der Organismen aus niederen zu höheren Formen uns eine Unmenge der wertvollsten Tatsachen in der Natur zwanglos erklärt, und daß durch sie die bedeutendsten Errungenschaften modernen Wissens um die Natur gezeitigt wurden.

Und nun möchte ich Ihnen, m. D. u. H., an einem überaus reizvollen Beispiel den Wert und auch die Richtigkeit jenes großen Gedankenganges der Naturentwicklung, der

Deszendenztheorie, der Abstammungslehre, zeigen, und zwar am Beispiel der sogenannten rudimentären Organe. Rudimente in dem hier gebrauchten Sinne sind in Rückbildung begriffene Organe, Überbleibsel einst voll ausgebildet gewesener, einst voll funktionierender Körperteile in hoch entwickelten Tierformen, ebensowohl bei Wirbellosen wie auch bei Vertretern aller Klassen der Wirbeltiere, von den Fischen und Amphibien über die Reptilien und Vögel bis zu den Säugetieren mit dem Menschen hinauf. Denn alle jetzt lebenden Formen haben eine Jahrhunderttausende umfassende Entwicklung mit weniger oder mehr an Progression durchgemacht. Auch bei den höheren Pflanzen kann man von solchen Rudimentbildungen sprechen, wenn diese auch eine viel geringere Mannigfaltigkeit zeigen.

Also: Die höheren Organismen bergen in sich sich zurückbildende Organe.

Ein jedes Organ, das seine volle, oft recht vielseitige Funktion ausübt, bleibt im Laufe des individuellen Lebens auf der Höhe seiner Ausbildung mehr oder weniger gleichmäßig erhalten. Aus dem praktischen Leben ist Ihnen, verehrte Anwesende, wohl bekannt, daß eine maßvoll getätigte Mehrbeanspruchung eines Organes eine Vergrößerung desselben, eine Hypertrophie erwirkt, die als absolut physiologisch zu bezeichnen ist. Ich erinnere an das vergrößerte Herz eines Nürmi oder Peltzer oder an das eines edlen Rennpferdes; ich erinnere an die mächtigen Armmuskeln eines mit ganzer Seele dem edlen Boxsport sich hingebenden modernen Menschen. Ich erinnere an die hornigen Handschwienen eines Schwerarbeiters usw. Demnach: Hyperfunktion führt zu Hypertrophie.

Auf der anderen Seite die Minderbeanspruchung. Ein Organ, in seiner Funktion herabgesetzt, verfällt der Rückbildung. Der nach Knochenbruch gegipfte und geschiente Arm verliert an Muskelfülle, da seine Muskeln zwangsweise außer Betrieb gesetzt wurden und nun an Umfang abnehmen.

Minderbeanspruchung ruft Abbau an einem Organ hervor. Die Hypofunktion führt zu Atrophie.

Eine solche Unterfunktion kann aber auch von einer individuellen zu einer Arteigenschaft werden, wenn alle Vertreter der betreffenden Tierart den gleichen besonderen Lebensbedingungen unterworfen sind. Und dann wird der Rückbildungszustand zur Dauerform, wie nun an einigen einfachen Beispielen kurz auseinandergesetzt werden soll.

Da der Maulwurf in der Hauptfäche in den Gängen lebt, die er sich unter der Oberfläche im Erdreich gräbt, und nur wenig ans Tageslicht vorstößt, so ist sein Auge entbehrlicher geworden und deshalb in einem Zustand verminderter Differenzierung.

Der bekannte Grottenolm, der in den Höhlen des Karstgebirges um Adelsberg ausschließlich im Dunkeln lebt, bildet seine Augen sogar soweit zurück, daß er als vollkommen blind bezeichnet werden muß.

Der Mensch, der zum Auffangen der Schallwellen für Richtungsbestimmungen nicht die Ohrmuschel, sondern seinen Kopf dreht, hat die bei Tieren so außerordentlich weit gegliederten Ohrmuskeln bis auf kleine Rudimente zurückgebildet, und es bedarf besonderer Übung, wohl auch besonderer Neigungen, um diese Muskeln aus ihrem Schlummerzustand wieder zu frohem Spiel zu erwecken!

Der aufrechte Gang, den der Mensch in seiner stammesgeschichtlichen Entwicklung sich erwarb, führt zur Bedeutungslosigkeit, zur Außerfunktionssetzung und damit zur Rückbildung eines feinen Vorfahren mit zwingender Notwendigkeit noch zukommenden freien Schwanzanhangs. Eines Anhangs, den der heutige Mensch am Ende des ersten Monates seiner Entwicklung im Mutterleib in einer Länge noch trägt, die fast einem Viertel der Gesamtlänge des embryonalen Körpers entspricht. Rasch bleibt dann aber mit Aus-

bildung des definitiven unteren Körperendes der Fortsatz in seiner Weiterentwicklung zurück, und er wird überwuchert und gelangt unter eigener Schrumpfung infolge mächtiger Ausbildung der beim Menschen für die Aufrechterhaltung seines Rumpfes besonders beanspruchten Gefäßmuskulatur als kümmerliches Steißbein ganz in die Tiefe der Nachbarorgane, so daß er von der Körperoberfläche verschwindet.

Die Schlangen, wie im übrigen auch einige Eidechsen (ich erinnere an die Blindschleiche), haben infolge Streckung ihres drehrunden Körpers und der damit zusammenhängenden wellenförmigen Bewegungen desselben ihre Gliedmaßen, die ursprünglich vorhanden waren und über die Oberfläche des Körpers vorstanden, zurückgebildet. Aber unter dem Hautschlauch finden sich bei einigen Formen für die Hinterextremitäten mehr oder weniger große Reste, unverkennbare Rudimente jener Gliedmaßenknochen, die bei allen vierfüßigen Wirbeltieren sonst auch unter dem Hautschlauch des Rumpfes verborgen liegen: Rudimente der Beckenknochen. Und bei Riesenschlangen sind überdies vorragende kleine Stummel auch der freien Gliedmaßen-teile vorhanden.

Und so könnte man die Reihe solcher rudimentärer Organe beliebig weit vergrößern.

Außerfunktionssetzung, Inaktivierung von Organen schafft also deren Schwund. Und dieser wird entweder ein mehr oder weniger vollständiger oder aber nur ein partieller sein können. Das hängt von der Zeit des Stammesgeschichtlichen Auftretens der Außerfunktionssetzung des betreffenden Organes oder auch von anderen hier nebenfächlicheren Ursachen ab.

Und nun lassen Sie uns, sehr verehrte Anwesende, schließlich auf ein spezielles Beispiel, das etwas tiefer in die Bedeutung der rudimentären Organe hineinschauen läßt, noch eingehen.

Sie alle, m. D. u. H., wissen aus eigener Erfahrung, das edelste unserer Haustiere, das Pferd, hat an seinen Gliedmaßen je nur eine Zehe. Die vergleichende Wissenschaft sagt, dieser Zustand ist etwas gewordenes, nicht etwas von Anfang vorhanden gewesenes, nicht der *Primitivzustand*. Sie lehrt, daß die primitive Zehenzahl die Fünfzahl ist. Das Urfäugetier, wie auch jedes landlebende primitive Wirbeltier hat demnach typischerweise fünf Zehen an allen vier Gliedmaßen ausgebildet gehabt. Eine Zahl, die alle in dieser Richtung primitiv gebliebenen Formen — auch der Mensch — bis auf den heutigen Tag sich erhalten haben. Dementsprechend muß auch das jetzt einzeilige Pferd schließlich von fünfzehigen Vorfahren abstammen.

Wir zählen vergleichend-anatomisch die Strahlen des Fußes von innen nach außen, von der menschlichen Hand gesprochen vom Daumen als dem ersten Finger, gegen den kleinen als den fünften Finger hin. Der beim Pferde übrig gebliebene entspricht unserem Mittelfinger, stellt also den dritten Strahl, die dritte Zehe des Fußes dar.

Sie wissen, m. D. u. H., daß wir in den in älteren Erdschichten z. T. so wundervoll bewahrten Knochenresten, die uns die Paläontologie, die Wissenschaft von den sogenannten Versteinerungen, kennen gelehrt hat, die wertvollsten Zeugen der Existenz älterer, heute längst ausgestorbener Vorfahren erblicken dürfen. Und nun sind wir in der überaus glücklichen Lage, daß in den unermesslichen Schätzen paläontologischer Funde besonders Nordamerikas durch die Untersuchungen bedeutendster Forscher (Schlosser, Osborn, Marsh u. a.) eine, wir können sagen, lückenlose Serie von Vorfahren des Pferdes bekannt geworden ist. Das Pferd ist so zum Standardbeispiel für eine phyletische Ahnenreihe geworden.

Sehen wir nun zu, ob wir an den heute lebenden Pferden, den Equiden (Pferd, Esel, Zebra) Hinweise auf die theoretisch vorausgesetzte Mehrzahl an Zehen noch finden

können. Der Fuß eines jeden Säugetieres besteht aus der Fußwurzel (an der menschlichen Hand der Handwurzel), aus dem Mittelfuß (der Mittelhand) und den drei Zehen- oder Fingergliedern. Als Grundlage hat die Fußwurzel zahlreiche neben- und voreinander gelagerte Einzelknochen, der Mittelfuß für jeden ausgebildeten Fußstrahl einen Knochen und jedes der drei Zehenglieder an jedem ausgebildeten Strahl auch nur einen Knochen. Da das Pferd äußerlich gesehen einen nur einzehigen Fuß an jeder Gliedmaße fein Eigen nennt, so wäre zu folgern, daß auch den zahlreichen Kleinknochen der Fußwurzel nur ein Mittelfußknochen folge, dem dann die drei bekannten Zehenglieder als strahlzugehörig sich ansetzen, das letzte vom Hornhuf umgeben. Dem ist nun aber nicht so. Vielmehr läßt das Fußskelett des Pferdes an dem großen, eine kräftige Röhre bildenden Mittelfußknochen hinten-seitlich je einen schwachen griffelartigen Nebenmittelfußknochen erkennen, der überdies auch wesentlich verkürzt erscheint und, da er keine Zehenglieder mehr trägt, für den Unkundigen in dem die Zehe umkleidenden Hautschlauch vollkommen untergeht. Das einzeilige Pferd hat also drei Mittelfußknochen; vergleichend gesprochen: 1. einen rudimentär geworden des zweiten Fußstrahles ohne Zehenglieder,

2. den mächtig ausgebildeten und zehentragenden Hauptknochen des dritten Fußstrahles, und

3. einen ebenfalls rudimentär gewordenen des vierten Fußstrahles, abermals ohne Zehenglieder an seiner Spitze. Die dem menschlichen Daumen und dem kleinen Finger entsprechenden Strahlen Nr. 1 und 5 dagegen hat das heutige Pferd in seinem Knochenystem vollkommen verloren. Das entspricht einem gut fundierten Gesetz, nach dem in der großen Reihe der Säugetiere die Rückbildung in bestimmter Reihenfolge die einzelnen Zehen betrifft. Zuerst wird die erste Zehe, die innere, ergriffen, eine Reduktion, die an der Hand des Menschen durch Ausfall eines der Fingerglieder am Daumen vielleicht schon erblickt werden darf, und die am Vorderfuß von Hund und Katze in noch deutlicherer Weise markiert ist. Dann folgt der äußere Strahl Nr. 5, darauf der Nr. 2 und endlich der Nr. 4.

Die hochwichtigen Funde an ausgestorbenen Formen der Pferdevorfahren lehren uns aber, daß der für unseren Gedankengang in Betracht kommende nächststehende Verwandte der Equiden wohl auch noch eine der Mächtigkeit nach stark vorspringende Hauptzehe besaß, daß aber die seitlichen Mittelfußknochen je drei Zehenglieder trugen, die (entsprechend der schwächeren Gesamtentwicklung dieser Seitenzehen) am Ende mit kleinen Hufchen bewehrt waren, aber durch Verkürzung aller Elemente beim Gehen den Boden nicht berührten. Es handelt sich um die also drei-zehige Form des *Merichippus* aus dem oberen Miozän Nordamerikas. Weiter fort schreitend in den älteren Ablagerungen unserer Erdrinde stieß man im oberen Eozän auf die Form des tapirähnlichen *Orohippus* mit vier Zehen an der vorderen und drei Zehen an der hinteren Extremität, und endlich im unteren Eozän auf den ältesten Stammvater, den fuchsgrößen *Phenacodus* mit fünf Zehen vorn und vier Zehen hinten, die alle beim Gehen den Boden berührten.

So ist vor unserem geistigen Auge in ganz großen Zügen nach einem einzelnen, hier willkürlich herausgegriffenen Merkmal, zu dem in Wirklichkeit eine große Menge anderer uns hier nicht berührender hinzukommt, eine Stufenreihe von uralten, längst ausgestorbenen Formen erstanden. Deren verwandtschaftliche Zusammengehörigkeit steht für die Naturwissenschaft außer allem Zweifel, da unter Berücksichtigung aller der verschiedenen Merkmale, trotz gelegentlicher Lücken, ein fließender Übergang von den ältesten bis zu den jüngsten Formen nachgewiesen werden kann. Die heute hier besprochenen zwei kleinen, in ihrer Funktion schon fast ausgeschalteten Griffelbeinknochen des Pferdes sind also Zeichen längst verwehten Zeiten, die sich nicht mit Maß-

fläßen der menschlichen Kulturgeschichte messen lassen. Denn in ihrer heutigen Form bestehen sie nach geologischer Berechnung selbst schon viele Jahrtausende. Und gerade solche unscheinbare rudimentäre Organe der heutigen höheren

Formen der Organismen, das Objekt unserer Ausführungen, reden eine eherne Sprache, die dem, der sie zu deuten weiß, in die Geheimnisse des wundervollen Waltens des Naturgeschehens tief hineinschauen lassen.

(Aus dem Staatlichen Veterinär-Untersuchungsamt Potsdam. — Leiter: Veterinär rat Dr. R. Standfuss.)

Zum Vorkommen von Erregern aus der Paratyphus-Enteritis-Gruppe bei Kälbern und erwachsenen Rindern.

Von Dr. E. Lehr.

In den Schlußsätzen seiner in dieser Zeitschrift vom 26. November 1927, Seite 781, erschienenen Arbeit „Zur Ätiologie der Paratyphuserkrankungen unserer Haustiere auf Grund der im Tierleicheninstitut zu Hannover festgestellten Paratyphusbefunde“ stellt Karsten unter 2 die Behauptung auf: „Werden anlässlich von Fleischvergiftungsfällen durch Kalbfleisch Bakterien der Paratyphusgruppe ermittelt, die nicht zum Gärtnertyp gehören, so spricht dies gegen eine intravitale Infektion des Fleisches mit den Fleischvergiftungskeimen; das gleiche dürfte beim erwachsenen Rinde zutreffen“. Zu dieser Schlußfolgerung führen ihn neben einigen Angaben aus dem Schrifttum die Ergebnisse der im Tierleicheninstitut zu Hannover ausgeführten bakteriologischen Untersuchungen von Notchlachtungen und Kadavern. Karsten stellte im Verlaufe mehrerer Jahre bei im ganzen 18 Fleischvergiftungen anlässlich der bakteriologischen Fleischschau siebenmal beim Kalbe und achtmal beim Rinde den Bac. ent. Gärtner fest. In den übrigen Fällen handelte es sich zweimal um nicht näher bestimmbare Erreger, die aus Rindern gezüchtet waren, und einmal um einen Erreger, der von einem Pferde stammte. Verbreitert und ergänzt wird die Grundlage der Folgerungen um sieben Funde des Bac. ent. Gärtner bei Rindern anlässlich von Untersuchungen von Kadaverteilen zur Feststellung der Krankheits- und Todesursache. Insgesamt wird also die Behauptung von Karsten durch 22 Funde des Bac. ent. Gärtner und durch verschiedene Anführungen aus dem Schrifttum gestützt.

Es erscheint bedenklich, diese zahlenmäßig nicht sehr bedeutenden Ergebnisse einer einzelnen Untersuchungsstelle ohne weiteres zu verallgemeinern, besonders mit Rücksicht auf die Tragweite der Entscheidungen, die bei der Beurteilung von Fleischvergiftungsfällen in Anlehnung an die Behauptung von Karsten gefällt werden könnten. Seine Ergebnisse können nur als ein kafuistischer Beitrag gewertet werden; an anderer Stelle sind andere Beobachtungen gemacht worden.

Schon der erste fest umrissene Teil seiner Behauptung, daß bei Kälbern ausschließlich der Bac. ent. Gärtner vorkäme, trifft nicht das Richtige. Noch viel weniger ist das bei dem allerdings bereits von ihm selbst schon eingeschränkten zweiten Teil seiner Behauptung über das Vorkommen von Paratyphus-Enteritis-Keimen bei erwachsenen Rindern der Fall. An Hand der mir im Veterinär-Untersuchungsamt Potsdam zugänglichen Niederschriften über Untersuchungen anlässlich der bakteriologischen Fleischschau und über Untersuchungen zur Feststellung der Krankheits- und Todesursache habe ich die Funde von Keimen aus der Paratyphus-Enteritis-Gruppe bei Kälbern und erwachsenen Rindern zusammengestellt. Zum großen Teile sind diese Befunde schon von Standfuss in den einzelnen Jahresberichten über die Ergebnisse der bakteriologischen Fleischschau im Veterinär-Untersuchungsamt Potsdam (Zeitschr. für Fleisch- und Milchhyg.) veröffentlicht worden. Wie bei Karsten verteilen sich diese Befunde über mehrere Jahre, 1922 bis 1927. Während dieser Zeit wurde bei Kälbern 30mal und bei erwachsenen Rindern 23mal der Bac. ent. Gärtner ermittelt. Der Bac. ent. Breslau wurde in der gleichen Zeit bei Kälbern achtmal und bei erwachsenen Rindern 23mal festgestellt. In allen Fällen

dürfte die Möglichkeit einer nach der Schlachtung eingetretenen Verunreinigung des Tierkörpers mit den Fleischvergiftungserregern sehr entfernt liegen. Im Rahmen der zur Zeit und zwar seit dem 1. Juni 1927 laufenden Paratyphus-Sammelforschung, an der das hiesige Untersuchungsamt für ein bestimmtes Arbeitsgebiet beteiligt ist, hatte ich weiterhin Gelegenheit, Erfahrungen über das Vorkommen von Erregern der Paratyphus-Enteritis-Gruppe bei Kälbern und erwachsenen Rindern zu sammeln. Zur Nachprüfung gelangten seit dieser Zeit bis zum 1. Januar 1928 unter anderem: Vom bakteriologischen Laboratorium des Schlachthofes zu Leipzig zwei Breslau-Stämme, die von Kühen stammten, und neun Gärtner-Stämme, die aus Kälbern gezüchtet waren. Vom Veterinär-Untersuchungsamt Oppeln ein Breslau-Stamm von einem Kalbe und ein Breslau-Stamm von einem erwachsenen Rinde. Von der veterinärpolizeilichen Untersuchungsanstalt am Schlachthofe zu Dresden ein Breslau-Stamm aus einer Kuh und ein Gärtner-Stamm aus einem Kalbe. Vom bakteriologischen Laboratorium des Schlachthofes zu Zwickau ein Gärtner-Stamm von einem Kalbe. Vom veterinär-medizinischen Laboratorium des bakteriologischen Institutes der Anhaltischen Kreise in Dessau zwei Breslau-Stämme, die aus Kühen gezüchtet waren. Vom veterinär-bakteriologischen Laboratorium in Merseburg ein Gärtner-Stamm von einem Kalbe und vom bakteriologischen Laboratorium des Schlachthofes zu Chemnitz und von der Tierleichenstelle Jena ebenfalls je ein Gärtner-Stamm von einem Kalbe. Alle diese letztgenannten Stämme wurden bei der Ausübung der bakteriologischen Fleischschau gefunden, betreffen also Fälle (Notchlachtungen, pathologisch-anatomische Veränderungen), bei denen man eine Ansteckung zu Lebzeiten und keinen nachträglichen Befall annehmen darf.

Diesen eigenen Beobachtungen im Veterinär-Untersuchungsamt Potsdam lassen sich folgende Mitteilungen anderer Beobachter anreihen. In seinem auf der Tagung der Deutschen Vereinigung für Mikrobiologie im Jahre 1925 gehaltenen Vortrage über die Paratyphus-Enteritis-Frage kommt Mießner nach Würdigung des Schrifttums zu dem Schluß, daß in der Mehrzahl der Fälle beim Kalbe der Gärtnertypus angetroffen wird; in beschränktem Maße werden Bakterienstämme gefunden, die sich bei geeigneter Untersuchungstechnik aber wohl restlos als Breslautyp zu erkennen geben. Seine Auffassung faßt er zum Schluß noch einmal dahingehend zusammen, daß beim Kalbe sowohl Gärtner- wie Breslau-Bakterien vorkommen. Mießner und Baars fanden bei ihren Untersuchungen und Nachprüfungen ebenfalls im Rahmen der Paratyphus-Sammelforschung, aber für ein anderes Arbeitsgebiet, den Bac. ent. Gärtner dreimal beim erwachsenen Rinde und zehnmal beim Kalbe, den Bac. ent. Breslau zweimal beim erwachsenen Rinde und zweimal beim Kalbe. Neuerdings berichten Goedecke und Grüttner über gehäufte Erkrankungen von erwachsenen Rindern, die in Verbindung mit verdorbenem Futter durch den Bac. ent. Breslau verursacht waren.

Werden alle diese Ergebnisse zusammengefaßt, so wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine zu Lebzeiten des Tieres stattgehabte Ansteckung und Erkrankung durch den Bac. ent. Gärtner bei Kälbern in 54 Fällen

und bei erwachsenen Rindern in 26 Fällen festgestellt. Bei den durch den Bac. ent. Breslau hervorgerufenen Erkrankungen könnte man beinahe von einer Umkehrung der Verhältnisse sprechen. Der Bac. ent. Breslau wurde gefunden 11mal bei Kälbern und 31mal bei erwachsenen Rindern bei insgesamt 122 Fleischvergiftungen bei Kälbern und Rindern. Zum Hundertsatz umgerechnet ergeben sich folgende Zahlen: Bac. ent. Gärtner beim Kalbe 44,26 Prozent, beim erwachsenen Rinde 21,31 Prozent; Bac. ent. Breslau beim Kalbe 9,01 Prozent, beim erwachsenen Rinde 25,41 Prozent.

Die eingangs angezogene Behauptung von Karsten besteht also nur insoweit zu Recht, als bei Kälbern der Bac. ent. Gärtner weit häufiger anzutreffen ist als der Bac. ent. Breslau, etwa im Verhältnis von 5 : 1. Die Auffassung, daß ein Breslau-Fund bei einer durch Kalbfleisch hervorgerufenen Fleischvergiftung unbedingt gegen eine intravitale Infektion des Fleisches spricht, ist daher keinesfalls wissenschaftlich berechtigt. Noch weniger gilt diese Annahme für erwachsene Rinder.

Etwas anderes ist es, ob vielleicht in bestimmten Gegenden bei Kälbern und erwachsenen Rindern nur oder vorwiegend Gärtner-Bakterien gefunden werden. In dieser Beziehung ist allerdings auffällig, daß auch Lütje, dessen Tätigkeitsfeld hauptsächlich wohl im Gebiet der Unterelbe zu suchen ist, während mehrerer Jahre bei annähernd 200 Gärtner-Funden nicht über einen einzigen Breslau-Fund bei Kälbern und erwachsenen Rindern berichtet. Lütje teilt einmal für den Zeitraum mehrerer Jahre 111 Gärtnerfunde beim Kalbe und 30 Gärtner-Funde beim Rinde, an anderer Stelle 27 Gärtner-Funde und mehrere durch den Bac. ent. Gärtner verursachte Massenerkrankungen bei Rindern mit. Auch die von Karsten angeführten Veröffentlichungen von Mohler und Buckley, Mießner und Kohlstock, Bugge und Dierks, Karsten und Ehrlich usw. sprechen nur von Gärtner-Funden, haben aber auf der anderen Seite nur einzelne Erkrankungsfälle oder Enzootien zum Gegenstand ihrer Erörterungen gemacht.

Im übrigen sei hinsichtlich des Vorkommens von Breslau-Bakterien bei erwachsenen Rindern und Kälbern noch auf folgendes hingewiesen: Im Schrifttum sind zahlreiche Angaben über Funde von angeblichen oder damals so bezeichneten Paratyphus B-Keimen im Gegensatz zu Gärtner-Keimen bei Kälbern und erwachsenen Rindern festgelegt. Berücksichtigt man, daß früher die Breslau-Keime häufig von den Paratyphus B-Schottmüller-Keimen nicht unterschieden wurden — und selbst heute geschieht dies ja leider noch nicht überall — und berücksichtigt man ferner, daß nach den neueren Erkenntnissen echte Paratyphus B-Schottmüller-Keime nur sehr selten bei Tieren gefunden werden, so darf man den nachweislich bei Kälbern und Rindern festgestellten Breslau-Stämmen noch eine stattliche Anzahl zuzufügen, bei denen dies im hohen Grade wahrscheinlich ist.

Auf Grund eigener Erfahrungen im Veterinär-Untersuchungsamt Potsdam und auf Grund der im Schrifttum niedergelegten Beobachtungen anderer ist daher erwiesen, daß beim Kalbe und besonders beim erwachsenen Rinde durchaus nicht nur Erkrankungen durch Gärtner-Bakterien, sondern auch durch Breslau-Bakterien vorkommen. Es ist mithin keinesfalls angängig, aus dem bloßen Nachweis von Breslau-Bakterien bei einer Fleischvergiftung, die mit dem Genuß des Fleisches von Kälbern oder Rindern und gar notgeschlachteten zusammenzuhängen scheint, ohne Berücksichtigung anderer Umstände auf eine sogenannte postmortale Infektion zu schließen.

Schrifttum.

Bugge und Dierks: Zeitsch. für Fleisch- und Milchhyg. Jahrg. 32, S. 3. Goedecke und Grüttner: D. T. W. 1928, S. 196. Karsten: D. T. W. 1927, S. 781. Karsten und Ehrlich: T. R. 1924. Lütje: D. T. W. 1925, S. 327. Derselbe: D. T. W. 1926, S. 437. Mießner: Zentralblatt für Bakt. und Parasiten-Kunde Abt. I, Orig. 1926, Bd. 97, Beiheft S. 242. Mießner und Baars: D. T. W. 1927, S. 639. Mießner und Kohlstock: Zentralbl. für Bakt. und Parasiten-Kunde Abt. I, Orig. Bd. 65.

Zur jüngsten Geschichte der Leberegelbekämpfung.

Zugleich Erwiderung auf die Ausführungen des Herrn Dr. W. Nöller in D. T. W. 1928, Nr. 6, Seite 84.

Von Dr. Opel, München.*)

Wer die Veröffentlichungen der letzten Jahre über dieses Thema sine ira et studio verfolgt hat und damit die Geiztheit vergleicht, die Herrn Prof. Dr. Nöller bei seinen Auslassungen in Nr. 6 dieser Zeitschrift die Feder geführt hat, wird kaum zu der Überzeugung gekommen sein, daß Nöller bei Abfassung derselben unter einem guten Stern gestanden hat. Damit Urfachen und Wirkungen nicht so ineinanderschwimmen wie in dieser Arbeit, damit auch der Grundsatz: audiotur et altera pars zur Geltung kommt, seien auch mir einige Entgegnungen gestattet.

Die schwere Leberegelepidemie 1924/1925 besonders in Bayern ist noch in aller Erinnerung. Tausende von Rindern und Schafen sind gefallen oder notgeschachtet worden. Das den Markt beherrschende Heilmittel war das Distol, ein Auslandsprodukt. Mehrere Millionen Goldmark sind aus Deutschland dafür nach Ungarn geflossen; aus Bayern allein über eine Million. Dazu war auch dieses Mittel in der Wirkung nicht immer befriedigend, es war nur das Beste der vorhandenen. In dieser Lage entschloß sich die Münchener Tierschädlingbekämpfungsgesellschaft Serapis (bestehend aus den Dr. Dr. † Schmid, Wolfrathshausen, † Assel, Opel und Thienel als Tierärzten, Bloch als Chemiker) den Kampf gegen die Leberegel in ihr Programm aufzunehmen. Unser Ziel, in der ersten unserer Veröffentlichungen (Thienel) bekanntgegebenen

und bisher unverrückbar festgehalten, war: Die als unzuverlässig und zuweilen gefährlich in der Wirkung erkannten Farnwurzelpreparate und andere Pflanzendrogen durch chemisch darstellbare Körper zu ersetzen und dadurch zu verbilligen mit dem Nebenzweck, die deutsche Wirtschaft auf diesem Gebiete vom Ausland unabhängig zu machen.

Im Juli 1925 wurde als neues Heilmittel Serapis SB 444 auf den Markt gebracht, nachdem es in gründlichen eigenen Versuchen ausprobiert und dessen ausgezeichnete Heilwirkung von der vet.-pol. Anstalt in Schleißheim bestätigt worden war. Die Zusammenfassung des Präparats, welches Tetrachlorkohlenstoff in resorptionshemmenden Mitteln enthielt, wurde der Öffentlichkeit vorher nicht preisgegeben. Die darauf bezüglichen Angriffe Nöllers sind zu entkräften durch den Hinweis auf das Verhalten und die eigenen Erklärungen von Marek bezüglich der ursprünglichen Lösungsmittel seines Distols und später bezüglich der Zusammenfassung seines modifizierten Distols, sowie durch die Erklärungen der Distolfabriken in Nr. 47 und 48 der M. T. W., Jahrg. 1927, und die Gepflogenheiten der chemischen Industrie überhaupt.

Das Serapis SB 444 hat sich bei Schafen ausgezeichnet bewährt, nicht hingegen bei Rindern. Nachdem trotz der vorausgegangenen einwandfreien Versuche auch an Rindern, welche gleichfalls in Schleißheim bestätigt wurden, plötzlich Todesfälle bei Rindern auftraten, wurde es als Rindermittel vom Markt zurückgezogen. Das „Massensterben in Bayern“, von dem Nöller in Wiederholung spricht, erstreckte sich bei Rindern auf 16 Todesfälle und Notgeschachtungen vor

*) Ich sehe mich veranlaßt, gerechterweise Herrn Kollegen Opel das Schlußwort in der Leberegelpolemik zu gewähren; damit ist aber die Angelegenheit für die Schriftleitung definitiv erledigt. Mießner.

Zurückziehung des Mittels und weitere 16 Fälle nach Zurückziehung desselben, weil einzelne Tierärzte und Tierbesitzer im Hinblick auf die beobachtete ausgezeichnete Wirkung trotz erfolgter Warnung auf eigene Verantwortung das Mittel weiter verwendeten. Daß nicht Überdosierungen diesen Mißerfolg verschuldeten, wie Nöller immer wieder behauptet, beweisen unsere in der Literatur niedergelegten Feststellungen, nach denen zahlreiche Rinder bis zu 180 und 200 g Tetrachlorkohlenstoff und darüber schadlos vertrugen, andere aber schon nach Dosen von 40, selbst 32 und 14 g verendeten. Die individuelle Überempfindlichkeit gegen Tetrachlorkohlenstoff, die beim Rind viel stärker ausgeprägt ist als beim Schaf, und die neuerdings auch Marek (D. T. W. 1927, Nr. 53) als launenhafte Unberechenbarkeit bezeichnet, beruht auf Verhältnissen, die wir heute noch nicht kennen, geschweige denn damals kannten. Montgomerie berichtet (1927) die interessante Tatsache, daß bei den gegen Tetrachl. relativ widerstandsfähigen Schafen selbst auf der Weide plötzlich Todesfälle schon nach 1 ccm Tetrachl. vorgekommen sind, wenn sie künstliches Futter erhalten hatten oder auf Plätzen weideten, wo bestimmte Getreidearten wuchsen. Den von uns und laut privater Mitteilung auch von Hall vermuteten Zusammenhang zwischen dem Kalkstoffwechsel und der Giftigkeit des Tetrachl. stellen ja auch neuere Arbeiten von Minot (1927) bei Hunden, (B. T. W. 1928, Nr. 4) und Norris (T. R. 1928, Nr. 4) bei Schaf und Rind fest. Hier gibt es noch manche Probleme für ernste Forschungen zu lösen.

Trotz dieser jetzt allgemein bekannten, unberechenbaren Zwischenfälle enthalten fast sämtliche, heute in Verwendung befindlichen Leberegelheilmittel für Schafe den Tetrachlorkohlenstoff als wirksamen Bestandteil; selbst die noch den klassischen Namen Distol führenden Kombinationen von Filixprodukten mit anderen chemischen Mitteln enthalten in dem Distol-neu für Schafe eine Tetrachlorkohlenstoffhaltige Form. Die unübertroffene Wirkung des Tetrachlorkohlenstoffes veranlaßt dann Zunker, Bach und Jordan zu ihren Versuchen mit intraperitonealer Einverleibung des Tetrachlorkohlenstoffes bei Rindern, denen allerdings der Erfolg verfehlt blieb aus den gleichen Gründen wie bei Serapis. Als Vorläufer der parentalen Anwendung darf Dr. Ottmar Schmitt-Frontenhafen gelten, der nachweislich schon Anfang 1926 Tetrachlorkohlenstoff Rindern subkutan mit Erfolg injizierte und nach ihnen hat dann auch Nöller (T. R. 1927, Nr. 46) die parenterale Einverleibung des Tetrachlorkohlenstoffes u. a. bei Schafen methodisch geprüft.

Den Anspruch auf die Priorität der Einführung des Tetrachlorkohlenstoffes in die Therapie der L. E. S. haben nun Thienel und ich für die Forschungsgemeinschaft Serapis erhoben. Wir hielten uns dazu für berechtigt, nachdem bis zur Ausgabe unseres Serapis noch keine einzige Tatsache bekannt war, daß Tetrachlorkohlenstoff vorher als Leberegelheilmittel Anwendung gefunden hatte. Auch Nöller konnte trotz erschöpfender Anführung der in- und ausländischen Literatur den Beweis dafür nicht erbringen. Nun wird nachträglich (D. T. W. 1927, Nr. 53) bekannt, daß Marek schon im Jahre 1916 das Carboneum tetrachloratum als Lösungsmittel angewandt hat und die später veröffentlichten Todesfälle auf diesen zurückzuführen waren. Ich würdige die Schadenfreude Nöllers durchaus, und überlasse die Priorität neidlos Marek als den Größeren. Ich stelle hierzu aber fest, daß Marek den Tetrachlorkohlenstoff nur als Lösungsmittel für Filicin-Produkte benützt, an dessen leberegeltötender Wirkung also gewissermaßen vorübergegangen ist, und den Tetrachlorkohlenstoff wieder verlassen hat, als die ersten größeren Schadensfälle dessen Unberechenbarkeit ergeben hatten.

Nun zu unserem zweiten Produkt, dem Neoserapis. Nachdem uns der Tetrachlorkohlenstoff seine gefährliche Wirkung beim Rind ziemlich unfaßt zu erkennen gegeben,

haben wir die Suche nach anderen geeigneten Mitteln unter den Chlorkohlenstoffen um so eifriger fortgesetzt. Das Ergebnis dieser Arbeiten aus dem Jahre 1926 war das noch Ende 1926 (Thienel, M. T. W. 1926, Nr. 51) auf den Markt gebrachte Neoserapis, das als wirksamsten Bestandteil Hexachloraethan, kombiniert mit anderen vermiziden Körpern enthielt. Wie sehr sich Neoserapis den Markt erobert und welche Anerkennung es gefunden hat, darf als bekannt vorausgesetzt werden. Selbst Marek hat sein Filix-Präparat modifiziert mit Hexachloraethan. Die Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte bringt ein hexachloraethanhaltiges Leberegelmittel in den Handel und — last not least — läßt Nöller ein hexhaltiges Heilmittel herstellen. So ist das zum ersten Mal im Neoserapis der Allgemeinheit zugänglich gemachte Hexachloraethan heute zum bedeutendsten Faktor in der Therapie der Leberegelseuche geworden.

Auch hierfür hat die Forschungsgemeinschaft Serapis durch Thienel und mich die Priorität erhoben.

Nun behauptet Nöller (T. R. 1927, Nr. 46), daß Dr. Sprehn in Versuchen für die Firma Merck bereits im Jahre 1925 Hexachloraethan mit gutem Erfolg gegen Leberegel zur Anwendung gebracht hat. An den mit dieser Bestimmtheit gemachten Angaben soll nicht gezweifelt werden. Tatsache ist aber, daß die Firma Merck über diese Versuche, wie Nöller ja selbst mitteilt, nicht hat berichten lassen und daher der Öffentlichkeit von diesen Vorgängen nichts bekannt geworden ist. Tatsache ist ferner, daß Merck diese Versuche nicht zum Abschluß gebracht oder nicht ausgewertet hat. Darüber, warum dies nicht geschehen ist, ergeht sich Nöller nur in Vermutungen. Ob diese letzteren im Interesse der Firma Merck nicht besser unterblieben wären, lasse ich dahingestellt. Ihre Richtigkeit vorausgesetzt, würden sie der Firma Aubing das sehr ehrende von Nöller sicher nicht beabsichtigte Zeugnis ausstellen, daß sie ohne Rücksicht auf kaufmännische Bedenken das Hexachloraethan zur Einführung gebracht hat. Ich kann hierzu auch im Namen meiner sämtlichen Mitarbeiter erklären, daß uns weder bei Beginn noch im weiteren Verlauf unserer Arbeiten mit dem Hexachloraethan von den Vorgängen bei Merck irgend etwas bekannt war und wir davon erst durch die Veröffentlichung Nöllers im November 1927 Kenntnis erhielten. Es liegt also die Tatsache vor, daß unabhängig von früheren Versuchen mit Hexachloraethan durch Dr. Sprehn-Merck die Forschungsgemeinschaft Serapis mit der chemischen Fabrik Aubing durch eigene, selbständige Arbeiten die egel-tötenden Eigenschaften des Hexachloraethans erkannt, aber als erste dieses Mittel in dem Neoserapis der allgemeinen Anwendung zugeführt hat. Wem sonach das größere Verdienst zukommt, werde ich als Beteiligter so wenig entscheiden wie Nöller, sondern wir werden es dem objektiveren durch eigene Mitarbeit oder durch Gewinnanteile und sonstige Bezüge nicht beeinflussen Urteil anderer überlassen müssen.

Nachdem so Nöller das Verdienst der ersten Benützung des Hexachloraethans gegen Leberegel in Deutschland Sprehn-Merck zuerkannt hat und Thienel die „Nachentdeckung“, bleibt zur Schließung des Ringes nur mehr die „Nachahmung“ übrig. So wird gemäß Rundschreibens eines preuß. Kreis Ausschusses vom 14. Februar 1928 an Tierärzte und Gemeindevorsteher zur Behandlung der leberegelkranken Tiere ein „von Herrn Prof. Dr. Nöller in Berlin hergestelltes neues Medikament, nämlich Hexachloraethan“ gegen die Hälfte der Kosten zur Verfügung gestellt. Jetzt wird mir auch die Heiterkeit verständlich, womit Nöller diese Vorgänge ankündigt und seine Schadenfreude über die vermeintlich hierdurch Geschädigten. Ich muß in diesen überschäumenden Freudenbecher etwas Wasser gießen. Sie irren, Herr Professor, wenn Sie glauben, mir dadurch etwas Unangenehmes gesagt zu haben. Ich stelle vielmehr Ihrer Schadenfreude meine reine Freude

entgegen darüber, daß das, was mir in allerdings wenig zeitgemäßem Idealismus als Ziel seinerzeit vorgeschwebt hat, nun doch noch verwirklicht wird, — wenn auch durch einen Andern und nicht durch dessen eigene, selbstschöpferische Tätigkeit, sondern durch Nachahmung der geistigen Arbeit Anderer. Wo hier die Tragik und wo die Komik liegt, mag der Leser entscheiden.

Auf die übrigen Anwürfe Nöllers einzugehen, muß ich verzichten. Die meisten finden ihre Widerlegung in der Veröffentlichung Kögels und der nachfolgenden Erklärungen der Distolfabriken in Nr. 46 bis 48 der M. T. W. 1927. Ich müßte mich hierbei auch auf Wortklaubereien und sophistische Auseinandersetzungen einlassen, die ich lieber jenen überlasse, die am Spiel der Worte mehr Freude haben. Meine Tätigkeit ist mehr auf produktive Arbeit eingestellt und schon winken wieder andere Aufgaben. Zuvor aber noch etwas persönliches, wohlgemeintes! Die wiederholt in den Ausführungen Nöllers hervortretende Resignation über vermeintlich ungenügende Anerkennung geleisteter Arbeit konnte Nöller selbst vermeiden, wenn er in „gerechter Wertung fremder Leistungen“ und von dem Gipfel eigener Größe herab die „Leute um Aubing“ und so viele andere nicht unterschätzt hätte. Ich kann ihm versichern, daß unter diesen sich Köpfe und Eigenschaften befinden, die Achtung abnötigen und ihm vielleicht früher und leichter zu dem verholfen hätten, was Nöller heute

noch vermißt. Ich darf ihn diesbezüglich noch an das eine erinnern. Als die ersten Mißhelligkeiten zwischen Nöller und der chemischen Fabrik Aubing entstanden, habe ich mich in der entgegenkommendsten Form und in bester Absicht im August 1926 persönlich brieflich an Nöller gewandt, um die in Nöller steckenden Kräfte und Kenntnisse in eine andere Richtung zu leiten. Nöller hat mir auf diesen Brief nicht geantwortet. Ich will heute nicht mehr mit ihm rechten, daß er hierdurch die Formen kollegialer Höflichkeit mir gegenüber verletzt hat, auch nicht darüber, daß er diesen Brief in einem Zivilstreit der gegnerischen Partei zugänglich gemacht hat, weil dieser eine Stelle jenes Briefes möglicherweise von Vorteil sein konnte. Wäre es nicht besser gewesen, wenn Nöller seine übrigens ja begreifliche, persönliche Verärgerung überwunden und die ihm dargebotene Hand ergriffen hätte, wenn wir die aus der Chlorkohlenstofftherapie zwangsläufig sich ergebenden Lehren gemeinsam gezogen und das Ziel zu erreichen gesucht hätten, das uns ja schließlich doch gemeinsam ist. Bei den zweifellos vorhandenen großen Fähigkeiten Nöllers wäre der Wissenschaft und der Volkswirtschaft hierdurch mehr gedient gewesen als durch den unproduktiven, kräftezer splitternden, jeden Fortschritt hemmenden gegenseitigen Kampf im geheimen und in der Öffentlichkeit. Wer zu lange um verlorene Posten kämpft, stärkt niemals seine Position.

Innere Medizin und Chirurgie.

Völker: Morbus Basedowii (sog. Forme furste) bei einem

Hunde. (Aus der Universitäts-Tierpoliklinik Leipzig. — Direktor: Prof. Dr. Reinhardt.) (Arch. für wiss. Tierheilkunde 1926, 55, S. 108.)

Ein Hund zeigte neben zartem Knochenbau und schlechtem Nährzustand Struma pulsans, Tachycardie und Herzpalpitation; Exophthalmus fehlte. Es handelte sich also um eine sog. Forme furste des Morbus Basedowii. Bei der klinischen Untersuchung wurde außerdem festgestellt: Polyurie, alimentäre Glykosurie, herabgesetzte Toleranzgrenze für Traubenzucker, gesteigerten Wassertransport, relative Lymphozytose und erhöhte Stickstoffausscheidung infolge eines thyreotoxischen Eiweißzerfalles. Nach einseitiger Kropfoperation Tod durch Herzinsuffizierung. Die Sektion ergab eine Struma hyperplastica vasculosa et follicularis basedowiana und Hypertrophie und Dilatation beider Ventrikel. Geiger.

Mally, M.: Veterinäre Betrachtungen im Bundesgestüte Wieselburg an der Erlauf. (W. t. Mschr. 1927, Jahrgang XIV, S. 507.)

Verf. gibt seine mehrjährigen Beobachtungen wieder, die er bei einer größeren Anzahl Stuten des schweren englischen Halbblutgestütes in Perwarth während des Brunstzyklus und der Brunstperioden gemacht hat. Sie erstrecken sich auf 1. die Brunst der Stute oder Rosse, 2. die Brunstdauer 3. Wiederkehr der Brunst, 4. das Probieren der Stute, 5. die Belegzeit oder Deckperiode. Zum Schluß gibt Verf. noch eine tabellarische Zusammenstellung über die errechneten Trächtigkeitsprozentfätze, woraus die verschiedenartige Fruchtbarkeit und schwerere oder leichtere Konzeption der einzelnen Pferderassen hervorgeht. Berge.

Hirt, E.: Splitterfraktur des Oberarmbeines beim Pferde. (Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1927, 69, S. 615.)

Es wird ein feltener Fall mitgeteilt, wo die Fraktur nicht durch eine äußere Einwirkung entstand, sondern durch eine rauhe Abdrehung des Körpers bei voller Belastung. Der Humerus war längs (von der oberen Epiphyse im sulc. intertubercularis gegen die Mitte zu) gespalten und an der schwächsten Stelle der Diaphyse ein Querbruch hinzutreten. Seitlich waren zwei Knochenstücke abgesprengt und nur noch durch das Periost an der Umgebung befestigt.

Klinisch war örtliche Schwellung der Trizeps-Gegend, Verlagerung des Ellenbogen-Höckers, Steifstellung des Schulterblattes, sehr starke Schmerzäußerung bei Palpation und bei der klinischen Bewegung starke Krepitation vorhanden, naturgemäße volle Entlastung der Gliedmaße durch Vorführen. H. G.

Pribram, E.: Wasserretention und Wasserbedürfnis im fiebernden Organismus. (Ein kolloidchemisches Problem.) (Serotherap. Institut in Wien.) (Medizinische Klinik 1925, Nr. 49.)

Der fiebernde Organismus befindet sich in einem Zustand erhöhten Wasserbedürfnisses („Durstzustandes“). Dieser Zustand ist verursacht durch eine erhöhte Quellfähigkeit der Zellen des Körpers, insbes. der parenchymatösen Organe. Diese erhöhte Quellfähigkeit ist durch folgende Faktoren bedingt: Die Temperaturerhöhung bewirkt unmittelbar eine erhöhte Quellfähigkeit der Zellkolloide, erhöht auch, oder beschleunigt wenigstens die übrigen quellungsfördernden Faktoren. Die durch die Temperaturerhöhung bewirkte Alkaleszenzänderung (erhöhter OH-Gehalt bei wenig verändertem H-Gehalt nach Henderson) des Blutes vielleicht auch der Gewebe führt ebenfalls zu einer erhöhten Quellfähigkeit der Körperzellen (Quellung im alkalischen Medium). Der durch die Temperaturerhöhung bewirkte Zerfall hoher Molekularkomplexe in kleinere, Entstehung von wasserlöslichen Kristalloiden aus Kolloiden begünstigt ebenfalls die Wasseraufnahme durch die Gewebszellen. Mit dem Quellungswasser wird auch NaCl retiniert, das dem Blutplasma entzogen wird, was zu einer Verminderung des absoluten NaCl-Gehaltes des Harnes führt. Die insbesondere von Sahli und Valentini vertretene Therapie der reichlichen Flüssigkeitszufuhr (Darreichung von Milch, Wasser, Verabfolgung von Einläufen, Kochsalzinfusionen) erfährt so ihre theoretische Begründung, weil auf diese Weise dem „Durstzustande“, d. h. dem erhöhten Quellbedürfnisse des Organismus Rechnung getragen wird, weil ferner die bei jedem gesteigerten Wasserbedürfnis einsetzende Kaliabgabe seitens der Muskeln teils hintangehalten wird, teils das bereits ins Blut abgegebene Kali rascher durch die Nieren ausgeschieden wird. A.

Köhle, E.: Toxikologische Versuche mit Yatren. (In.-Diss. Leipzig 1925.)

Die Versuche mit Yatren haben ergeben, daß die einzelnen Tierarten verschieden große Dosen vertragen, während

Tiere der gleichen Art verhältnismäßig geringe Schwankungen aufweisen. Von den Versuchstieren: Ratte, Meerfischweinen, Kaninchen, Taube, Katze, Hund, scheint die Katze am empfindlichsten zu sein (Todesdosis 0,258 Gramm auf ein Kilogramm Körpergewicht); auch trat bei noch stark subletalen Dosen schon eine Schädigung des Organismus ein. (Grund: Verankerung mit Phenol, gegen welches Katzen sehr empfindlich sind, Nierenschädigungen). Tauben vertragen weit höhere Dosen (Todesdosis 0,5 pro Kilogramm Körpergewicht), die Anwendung erfolgte stomachikal, während sie sonst, abgesehen vom Kaninchen (intraabdominal) subkutan erfolgte. Auf Grund der Untersuchungen ist das Yatren als ein relativ ungiftiges und ungefährliches Mittel zu bezeichnen. Bei kleinen und mittleren Gaben werden, auch wenn sie längere Zeit fortgesetzt werden, abgesehen von geringen örtlichen Reizercheinungen, keine erheblichen Schädigungen des Körpers hervorgerufen. Solche treten erst ein nach Einverleibung von sehr hohen toxischen Dosen, wie sie nie zu therapeutischen Zwecken Verwendung finden. Der Abstand zwischen der Dosis letalis und der in der Literatur empfohlenen Dosis therapeutica ist sehr groß, wodurch das Yatren ebenfalls zu einem unschädlichen Mittel gestempelt wird. A.

Hahn, Th.: **Verfuche mit „Cardiazol“, einem neuen Analeptikum.** (In.-Diss. Hannover 1926.)

Schon länger beschäftigen sich die Pharmakologen damit, ein Ersatzpräparat für den Kampher zu schaffen, welches hinsichtlich der Löslichkeitsverhältnisse diesem alten Analeptikum überlegen ist. Hildebrandt führte nun ein Präparat der Firma F. J. Knoll, Ludwigshafen a. Rh., das unter der vorläufigen Bezeichnung „Camphenin“ pharmakologisch und klinisch geprüft wurde, in den Arzneischatz ein. Das Cardiazol stellt ein Tetrazolderivat dar, und zwar ist es ein Pentamethylentetrazol. Verf. schließt aus seinen Untersuchungen, daß das Cardiazol als Analeptikum bei narkotisierten Pferden nicht den Erwartungen entsprach, daher ist das Cardiazol aus diesen Gründen für veterinärmedizinische Zwecke nicht zu empfehlen (Haller-München, hatte günstige Erfolge bei Drusebronchitis, chronischem Lungenemphysem und Staupepneumonie bezw. Herzinsuffizienz; auch in der Humanmedizin wird über gute Wirkungen berichtet. Eine weitere Prüfung wäre daher angebracht. D. Ref.). A.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Fekete, L.: **Über bemerkenswerte, unter lyssaähnlichen Symptomen verlaufende Fälle von akuter Schweinepest.** (Zeitschr. für Infekt.-Krankh. der Haustiere 1927, 32, H. 1, S. 63.)

Fekete hatte Gelegenheit, drei in kurzen Intervallen aufeinanderfolgende Erkrankungsfälle bei Schweinen zu beobachten, die einerseits mit der septikämischen Form der Schweinepest, andererseits mit Lyssa große Ähnlichkeit aufwiesen, ohne sich jedoch in den Symptomenkomplex und im pathologisch-anatomischen Bilde mit diesen Krankheiten vollkommen zu decken. Klinisch zeigten die Tiere Appetitlosigkeit, hohes Fieber, Aufregungserscheinungen, welche sich zu einem lyssaähnlichen Exzitationsstadium mit aggressivem Verhalten und Wutausbrüchen steigert. Die Krankheit endete in allen drei Fällen in 24 bis 48 Stunden tödlich. Bei der Sektion ergab sich: Blutungen in den verschiedensten Organen, insbesondere in den Herzohren, Nieren, in den Randsinus der Lymphknoten, Entzündungen an Schleim- und serösen Häuten, follikuläre Geschwüre an der Dickdarmschleimhaut. Negrische Körperchen konnten in keinem Falle festgestellt werden. Auch gelang der Nachweis eines Krankheitserregers weder mit den gebräuchlichen aeroben noch anaeroben Züchtungsverfahren. Deshalb glaubt Verfasser, ein filtrierbares Virus anzunehmen zu müssen. Das Virus war außer für Schweine

auch für Kaninchen, Meerfischweinen und weiße Mäuse pathogen. Die Behandlung der Tiere durch subkutane Einverleibung großer Dosen von Schweinepestimmunserum (100 ccm) erwies sich als ergebnislos. Um die Weiterverbreitung der Krankheit zu verhindern, wurde der ganze Schweinebestand mit Schweinepestserum geimpft sowie eine gründliche Desinfektion mit Lauge und Kalkmilch durchgeführt. Die beschriebenen drei Schweineerkrankungsfälle faßt Fekete mit Rücksicht auf deren Verlauf als akute Schweinepest auf, die sich von der bis jetzt bekannten septikämischen Form der Schweinepest durch ihre Affinität zum Zentralnervensystem und durch ihre Pathogenität für kleine Versuchstiere unterscheidet. Ziegler.

Kudrjawzew, G. und D. Romanow: **Zur Frage der Serodiagnostik bei Milzbrand.** (Aus d. Milzbrandabteilung des Institutes für wissenschaftliche und praktische Veterinärkunde der Ukraine in Charkow. — Direktor: Prof. N. Agalli.) (Zschr. für Infekt.-Krankh. der Haustiere 1927, 32, H. 1, S. 57.)

Für die Serodiagnose des Milzbrandes mittels der Präzipitinreaktion nach Ascoli ist ein besonders hochaktives Serum unbedingt notwendig. Es gelingt aber nicht immer, ein solches Serum zu bekommen, erstens, weil nicht alle Tierarten imstande sind, ein solches zu produzieren, zweitens weil dabei auch die Individualität der einzelnen Tiere oft eine Rolle spielt. Von der Tatsache ausgehend, daß die Präzipitinreaktion dem Wesen nach eine Eiweißreaktion darstellt, verwendeten die Autoren für die Immunisierung von zwei Hammeln und zwei Fohlen ausschließlich Bakterieneiweiß, welches sie aus dem Protoplasma der Milzbrandbakterien gewannen. Sie konnten dabei in jedem Falle ein hochwertiges Präzipitinserum bekommen. Das Steigen der Präzipitine im Serum von Tieren, die mit diesem Bakterienplasmaeiweiß immunisiert wurden, ging proportional mit der Zahl der Injektionen und der Menge des einverleibten Eiweißes. Diese Immunisierungsmethode ermöglicht, ein mehr aktives und mehr spezifisches Serum von allen Tierarten und dabei in kurzer Zeit zu bekommen. Auch scheint dabei der individuelle Faktor eine kleinere Rolle zu spielen als bei der alten Methode. Ziegler.

Standfuß, R. und G. Pohl: **Desinfektionsversuche an ausländischen Milzbrandhäuten.** (Aus dem Staatlichen Veterinär-Untersuchungsamt zu Potsdam. — Leiter: Veterinärarzt Dr. R. Standfuß.) (Zeitschr. für Infekt.-Krankh. der Haustiere 1927, 32, H. 1, S. 23.)

Auf die große Bedeutung, die der Einfuhr ausländischer Trockenhäute hinsichtlich der Verbreitung des Milzbrandes in Deutschland zukommt, ist in letzter Zeit wiederholt hingewiesen worden. Als Abwehrmaßnahme kommt in erster Linie die Desinfektion der Häute in Betracht. Nun lassen sich aber die allgemeinen Erfahrungen über Desinfektion nicht ohne weiteres auf Milzbrandhäute übertragen, weil einerseits Häute ihrer Beschaffenheit nach an sich schwer zu desinfizieren sind, andererseits aber auch bei der Desinfektion von Häuten die Frage entscheidend mitpricht, ob und wie weit etwa das Leder durch die Desinfektion unbrauchbar gemacht oder entwertet wird. Die bisher bekannten Verfahren haben weder bakteriologisch noch technisch befriedigt.

Aus diesem Grunde haben Standfuß und Pohl mit verschiedenen Mitteln an mit Milzbrand behafteten ausländischen Trockenhäuten Desinfektionsversuche ausgeführt. Es wurde versucht, die schwer zerstörbaren Milzbrandsporen zunächst zum Auskeimen zu bringen, um sie dann in Form der Milzbrandbazillen abzutöten. Doch zeigte sich, daß es mit ein- und mehrmaligem Auskeimen der Milzbrandsporen und jedes Mal darauf folgendem zweistündigem Erhitzen auf 60 Grad nicht möglich war, die Milzbrandkeime abzutöten. Der Grund dafür dürfte darin zu suchen sein, daß es nicht gelingt, die Sporenbildung oder die Beibehaltung der Sporenform gänzlich auszuschalten. Auch der

Verfuch der Abtötung der Milzbrandkeime durch Einwirkung von *Bac. pyocyaneus* zeigte ein so ungünstiges Ergebnis, daß von der Anwendung von *Pyocyaneus*kulturen ein praktischer Erfolg nicht zu erwarten ist. Bei den chemischen Mitteln Sinalbinöl und Glawelin, die gegenüber Milzbrandsporen starke keimtötende Eigenschaften haben sollen, trat, soweit sie überhaupt eine nennenswerte milzbrandkeimtötende Wirkung entfalteten, gleichzeitig meist eine Schädigung des Leders ein, die das Verfahren unbrauchbar oder unwirtschaftlich macht. Dagegen entfaltete das Schwefelnatrium, als chemisch reines Schwefelnatrium angewendet, eine hohe desinfizierende Wirkung, die bei einem Teil der Häuteversuche sogar eine vollständige war, und das besonders deswegen empfehlenswert wäre, weil es von den Gerbereien selbst empfohlen wurde und demnach das Leder nicht zu schädigen scheint. Inwieweit das Verfahren unter Verwendung guten technischen Schwefelnatriums praktisch anwendbar ist, bleibt weiteren Versuchen vorbehalten.

Ziegler.

Glage, Fr.: Über die Entstehung und den Verlauf der nordwestdeutschen Milzbrandepidemie beim Schweine.

(Abhandlungen aus dem Gebiete der Auslandskunde, Hamburgische Universität, Bd. 26, Reihe D. Medizin Bd. 2 [Festschrift Nocht], S. 146.)

Während man früher beim Schwein wenig Milzbrandfälle beobachtet hatte und diese Tierart für fast unempfindlich hielt, erregte der häufige Milzbrandbefund in den letzten Vorkriegsjahren an den nordwestdeutschen Schlachthöfen großes Aufsehen. Da durch die Erfahrung erwiesen war, daß diese meist lokalen Erkrankungen zur Verbreitung des Milzbrandes nicht wesentlich beitragen und Übertragungen auf den Menschen bei einiger Vorsicht nicht zu befürchten war, erfüllte man 1914 eine wirtschaftliche Notwendigkeit in der Milderung der Fleischbefaubestimmungen.

Auf der Suche nach der Ursache der Epidemie fand man russische Futtermittel selten, ostindisches Knochenmehl häufig mit Milzbrandsporen verunreinigt. Der Krieg bestätigte die Annahme, in der Einfuhr genannter Futtermittel die Ursache der Erkrankungen suchen zu müssen, indem mit der Absperrung vom Ausland die Milzbrandfälle auf ein Minimum sanken. Mit dem wieder zunehmenden Verbrauch ausländischer Futtermittel steigt auch seit 1923 die Zahl der Milzbrandfälle, ohne jedoch vorläufig bedrohlichen Umfang anzunehmen.

Schoop.

Palawandow und Weinberg: Zur Frage der Dezentralisation der Wutschutzimpfungen. (Impfungen mittels der nach Fermi hergestellten karbolisierten Vakzine.)

(Seuchenbekämpfung 1927, S. 197.)

In Rußland, wo nach dem Kriege die Tollwut besonders stark herrschte, ist in den letzten Jahren die Frage der Versendung von Impfmateriel aktuell geworden. Verff. berichten über ihre Erfolge mit einer im Odeßer Bakteriologischen Institut nach den Angaben Fermi's hergestellten, karbolisierten Vakzine, die in zehn verschiedenen Ortschaften 1½ Jahre zur antirabischen Behandlung verwendet wurde. Die Vakzine wurde aus einem Virus fixe hergestellt, das bereits 1640 Passagen durchgemacht hatte. Hirn und Rückenmark wurden zu einer 5prozent. Emulsion mit einer entsprechenden Menge phys. Kochsalzlösung, der 1prozent. Karbol zugefügt war, verrieben. Die Vakzine wurde durch sterile Gaze filtriert und bis zur Absendung im Eisschrank aufbewahrt. In Versuchen konnte festgestellt werden, daß sich das Virus fixe in der karbolisierten Vakzine bis zum 30. Tage virulent erhalten kann, die Quantität aber mit dem Altern der Vakzine geringer wird. Es wird außerdem betont, daß ein und dieselbe Konzentration Phenol (1prozent.) in verschiedenen Vakzineserien, die Vakzine

ungleichmäßig schwächt. Verff. schließen hieraus, daß bei Benutzung der Vakzine nach Fermi sehr oft frisches Virus in manchmal bedeutenden Quantitäten eingeführt wurde. Um die antigenen Eigenschaften der karbolisierten Vakzine zu prüfen, wurden eine Reihe Immunisierungsversuche mit nachfolgender Infektion durchgeführt. Kaninchen und Meerfchweinchen wurden 20—21 Tage hindurch zweimal täglich, Ratten einmal täglich immunisiert. 15 bis 17 Tage nach Abschluß der Immunisierung wurden die Tiere s. d. mit Virus fixe infiziert. Das Resultat war sehr günstig (66—100 Prozent Erfolge). Die Behandlung wurde bei insgesamt 2362 gebissenen Menschen durchgeführt. Davon starb ein Knabe. Es wurde kein einziger Fall von Paralyse, Abszesse oder anderen Komplikationen beobachtet. Von den nichtbehandelten gebissenen Personen starben im Beobachtungsgebiet in der Berichtszeit 21 an Tollwut. — Durch die Dezentralisierung der Wutschutzimpfung konnten, trotz vermehrten Kaninchenverbrauchs, erhebliche Mittel gespart werden.

Meyn.

Glusmann u. Solowjowa: Über den diagnostischen Wert der Komplementbindungsreaktion bei Lyssa.

(Zeitschr. für Immunitätsf. 1927, 54, S. 199.)

Die Resultate der Untersuchungen, in denen das Gehirn als Antigen diente, sprechen nicht für einen spezifischen Charakter der Komplementbindungsreaktion bei der Tollwut.

Meyn.

Beller: Fortschritte auf dem Gebiete der Lungenfeucheforschung. (Seuchenbekämpfung 1927, S. 259.)

Nach Schilderung der pathologisch-anatomischen Veränderungen kommt Verf. auf den Erreger der Lungenfeuche zu sprechen und betont, daß dieser bereits sieben Tage nach der subkutanen Infektion nicht nur im Blute, sondern auch in den Organen enthalten sei. Die Ausscheidung des Virus erfolgt deshalb nicht nur mit dem Bronchialsekret, sondern auch mit dem Harn, mit der Milch und unter Umständen mit dem Fruchtwasser. Dagegen ist der Nachweis des Erregers in der Gallenflüssigkeit in keinem Falle gelungen. Diese neueren Erfahrungen zeigen, daß der Name „Lungenfeuche“ nur einen Teil des Krankheitsbildes umfaßt. Pathogenetisch steht eine Allgemeinerkrankung im Vordergrund, die erfahrungsgemäß zwar häufig zu einer Lokalisation in den Lungen führt, aber auch ohne eine solche verlaufen kann. Es ist daher nicht gerechtfertigt, die Bestätigung der serologischen Diagnose von dem pathologisch-anatomischen Befund abhängig zu machen. — Als Eintrittspforten des Virus kommen nicht nur die Bronchien in Frage. Beller und Tahssin-Bey ist es gelungen, durch gleichzeitige Verfütterung von Glascherben und Lungenfeuchekultur eine Infektion beim Rind zu erzielen.

Entgegen der bisherigen Auffassung, daß das Lungenfeuchevirus spezifisch virulent für Bovide sei, konnte Verfasser nachweisen, daß auch Schafe und Ziegen für das Virus der Lungenfeuche empfänglich sind. Allerdings verliefen die Infektionen, abgesehen von einer örtlichen Impfgeschwulst in der Regel latent. Gravide Tiere abortierten. Aus Herzblut und Peritonealflüssigkeit der Föten ließ sich das Virus züchten. Auch Kaninchen können experimentell mit Lungenfeuchevirus infiziert werden. — Zur Diagnose der Lungenfeuche bedient man sich zweckmäßig der Komplementbindungsmethode und der Züchtung. Als fester Nährboden hat sich gewöhnlicher Agar mit Zusatz von 10 Prozent Rinder Serum und 0,5 Prozent Glykose gut bewährt.

Meyn.

Rudolf, J. und Braun, E: Untersuchungen über den therapeutischen Wert einer aus modifizierten Tuberkelbazillen hergestellten Vakzine „Tebecin“ zur Heilung der Rindertuberkulose. (W. t. Mschr. 1927, XIV. Jhg., S. 519.)

Das Tebecin wird nach Dostal durch Mazeration von Tb.-Bakterienkulturen in physiologischer Kochsalzlösung ge-

wonnen, wobei die Tb.-Bakterien ihre Säurefestigkeit einbüßen sollen, sowie auch für Meerschweinchen apathogen werden. Die in größerem Maße von Verff. bei Rindern angestellten Versuche ergaben, daß das Tebecin als angeblich spezifischer Heilimpfstoff nicht die Erwartungen erfüllte, wie sie nach den günstigen Urteilen in der Humanmedizin zu erwarten waren. Nach Versuchen Goldbergs bei Kälbern ist es möglich, mit einer ganz heterogenen Vakzine die Tuberkulose therapeutisch wohl günstig zu beeinflussen, jedoch nicht zu heilen. Verff. glauben, daß in Rinderbeständen, die eine systematische Tuberkulosebekämpfung durchführen, Heilimpfungen mit unspezifischen Impfstoffen nebst den sonstigen Maßnahmen den Erfolg unterstützen helfen. Eine sechsmalige Impfung, wie sie jedoch für das Tebecin vorgeschrieben ist, dürfte jedoch praktisch auf große Schwierigkeiten stoßen. Berge.

Saxl: Über die Beziehungen des retikulo-endothelialen Systems zur Antikörperbildung und zu den Heilungsvorgängen bei Sepsis. (Seuchenbekämpfung 1927, S. 159 und 230.)

Das retikulo-endotheliale System besitzt einen hervorragenden Anteil an den Immunitätsvorgängen. Das Abfangvermögen dieses Systems gegenüber Bakterien, die lokal eingedrungen sind oder im Blute kreisen, ist von großer Bedeutung für das Abwehrvermögen des Organismus. Lokal eingedrungene Keime werden durch die Histiozyten des Gewebes, im Blute kreisende durch Kupffer-Zellen aufgenommen, so daß das Blut selbst von großen Bakterienmengen, die in die Blutbahn injiziert werden, sehr rasch gereinigt wird. Aber nicht nur die Bakterien, auch gelöste Antigene, wie die Toxine, werden von dem r. e. System aufgenommen. Die in das System eingedrungenen Bakterien oder Toxine werden zum größten Teil vernichtet, solange das System intakt ist. Hat dieses gelitten, so kommt es zum neuerlichen Austritt der Bakterien und oft zur Sepsis bzw. Septikämie. Die rein makrophage Tätigkeit des r. e. Systems ist nicht nur ein unspezifischer Vorgang, sondern hat auch an den spezifischen Vorgängen der Immunität Anteil. So ist z. B. die durch gewisse Pneumokokken erzeugte aktive Immunität keine humorale, sondern eine rein zelluläre, die sich durch Tuscheinjektion aufheben läßt. Auch konnte bei direkter Infektion des Knochenmarks die Aufnahme der Pneumokokken durch Histiozyten verfolgt werden. Ähnliches konnte für Milzbrand- und Streptokokkeninfektionen gezeigt werden. Die von Haus aus unspezifische Phagozytose kann sich also zu einem spezifischen Vorgang gestalten. Bei der aktiven Immunisierung kommt es insofern zu einer Änderung der Phagozytose, als die Bakterien rascher aufgenommen werden und die Bakterizidie eine wesentlich intensivere wird. Hinsichtlich der Beziehungen des r. e. Systems zur Antikörperbildung wird festgestellt, daß die Versuche, die Bildung der Antikörper zu beeinflussen, nicht eindeutig sind. Verff. ist mit Neufeld und Meyer u. a. der Ansicht, daß das r. e. System als Produktionsort der Antikörper anzusehen ist. Verschiedenartige Beeinflussung des r. e. Systems kann zu einer verminderten oder vermehrten Antikörperproduktion führen. So beruht auch die Bedeutung chemo-therapeutischer Präparate (z. B. des Trypaflavins) bei Septikämien nicht auf ihrer antiseptischen Wirkung, sondern auf der Beeinflussung des r. e. Systems, die in vermehrter Antikörperbildung zum Ausdruck kommt. Meyn.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Rüegg, J.: Aus der geburtshilflichen Praxis. (Schweiz. Arch. f. Tierheilkunde 1927, 69, S. 330.)

Torsio uteri. Kuh von ca. 400 kg Gewicht hat rechtsläufige T. u. Vorderfüße entwickelt, Kopf nicht auf-

findbar, keine Bewegungen des Kalbes. Die Reposition im Stehen ist nicht möglich, dagegen auffallend leicht durch Wälzen nach rechts bei Fixation des Kalbes. Kopf des toten Kalbes in linker Seitenlage; nach Berichtigung ergibt sich, daß der Fötus zu groß zur Entwicklung ist. Schlachtung. ca. 20 Liter Bauchhöhlenexsudat. Verff. erklärt die Leichtigkeit der Reposition durch das Schwimmen des Uterus in der Bauchhöhlenflüssigkeit, wodurch er den Drehungen des Muttertieres leichter folgte. Vielleicht kann man die Torsionen leichter wenden, wenn man intraperitoneale sterilisierte blutwarme physiologische Kochsalzlösung infundiert, um die Bewegung des Uterus zu erleichtern.

Reposition des prolabierte Uterus. Im Anschluß an Ludwig (S. H. T. H. 3, 1927) schildert Verfasser die Lagerung der Kuh bei der R., die er schon lange anwendet (nach Strebel-Freiburg). Die Arbeit ist leichter, wenn die Nachhand höher gestellt wird als die Vorhand; sie wird folgendermaßen ausgeführt: notwendig sind ein Bock (wie von den Zimmerleuten verwendet), Tragbalken polstern, ein ca. 2 m langes, 40—50 cm langes, sauberes Brett und ein reines Leintuch. Hilfspersonal 5 Mann. Kuh aufgejagt, Kopf hochgebunden, Bock vor den Hinterextremitäten unter den Leib geschoben, hoch gehoben und an die Schenkel angeedrückt. Tiefbinden des Kopfes, Tier zum Knien bringen; dann den Bock auf den Boden stellen und festhalten lassen. Zwei Mann ziehen die Hintergliedmaßen nach hinten und schieben die Nachhand über den Bock nach vorn, bis die Kniegelenke oder der obere Teil der Unterhaken auf den Tragbalken liegen. Das Tier ist fast wehrlos bei Festhalten des Bockes. Das Brett wird unter den Uterus geschoben und in die Höhe des untern Winkels des Wurfes gehoben, dabei fest an die Oberschenkel angeedrückt. Die Verteilung des Personals ist: 1 Mann am Kopf, zwei halten den Bock und 2 das mit dem Leintuch bedeckte Brett. Diese Vorbereitungen gestatten eine leichte Reposition. H. G.

Zawadowsky, M. M.: Die Operation nach Steinach am wilden Ziegenbocke der Art *Capra cylindricornis* Blyth.

(Aus Transactions of the Laboratory of experimental Biology of the Zoopark of Moscow Bd. I., Ref. von Chomkovic, Brunn.) (Zeitschr. f. Tierzüchtung und Züchtungsbiologie 1927, Bd. 9, H. 2, S. 304.)

Ein 14 Jahre alter Bock der aus 15 Tieren bestehenden Herde wilder Ziegen im Moskauer Tierpark zeigte alle Anzeichen von Altersschwäche und baldigen Todes: Magerkeit, Husten, Gefenckthalten des Kopfes, ungeschickte Bewegungen, Abseitsbleiben von der Herde. Am 14. November 1924 wurde an dem Tiere die Verjüngungsoperation nach Steinach durch Unterbinden und Durchschneiden des linken Samenleiters vorgenommen. Schon einige Tage nach der Abheilung zeigte der Bock größere Lebhaftigkeit und auch wieder geschlechtliche Erregung. In der Brunstzeit desselben Jahres und dann im Herbst 1925 beunruhigte er die Ziegen und schien auch zum Decken bereit zu sein. Die Fresslust und der Ernährungszustand waren gut. Ende 1925 ging der Bock an einer Darmentzündung ein. Sektionsbefund: Der unterbundene linke Hoden ebenso beschaffen wie der rechte; an dem am Hoden verbliebenen Teil des Samenstranges eine blasige Anschwellung infolge Ansammlung von Sperma. Histologisch im unterbundenen Hoden die gleiche Spermatogenese wie im normalen, was im Widerspruch stand mit anderen Berichten über die Wirkung der Steinachschen Operation. Auch ein üppiges Wachstum des interstitiellen Gewebes war nicht zu beobachten. A. Hink.

Ludwig, H.: Über die Reposition des Prolapsus uteri beim Rind. (Schweiz. Arch. f. Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 147.)

Alle ältern Autoren empfehlen die Reposition am stehenden Tiere. Methoden, das Tier durch quere Stützen hinten hochzunehmen, können von Fall zu Fall in Frage kommen,

befonders wenn es nicht gelingt, die liegenden Tiere hochzubringen. Verf. gibt folgende Methode an: Die Nachgeburt soll erst abgenommen werden, wenn alles zur Reposition bereit ist; da sie ein wirkfames Deckmittel ist. Bei Prolapsus nach normaler Geburt sollen Desinfektionsmittel nicht angewendet werden, welche irgendwie reizen könnten. Um eine Abnahme der starken Blutfülle zu erzielen, schlägt man den Uterus in ein sackartiges Tuch und dreht dessen Enden zu, um so den Uterus gleichsam auszuwinden. Die Kuh soll bis zur Operation liegen, da eine traumatische Schädigung des Uterus so am wenigsten zu befürchten ist, anderseits eine Ermüdung des Tieres nicht eintritt, wie sie am stehenden Tiere während der Vorbereitungen eintreten kann. Zum Aufstehen empfiehlt Verf. Reiben des Schwanzes zwischen zwei Hölzern, worauf auch die widerstrebendsten Tiere aufstehen. Bei Verlagen dieses einfachen Zwangsmittels ist am liegenden Tiere zu arbeiten. Das aufgestandene Tier soll hochgebunden, nicht gestützt werden. Der Rücken ist freizulassen. Der Uterus wird während des Aufstehens durch zwei Gehilfen in einem reinen Tuche gestützt.

Reposition: Operateur soll möglichst hoch stehen, damit er leichter arbeiten kann. Zuerst Einschieben des unträchtigen Hornes, hernach des trächtigen Teiles unter sorgfältigem Schieben. Vagina und Vulva sollen nicht gequetscht werden, weil dann sofort Drängen des Tieres ausgelöst wird. Das letztere geht kaum von der Schleimhaut aus, die anscheinend wenig empfindlich ist. Sollte aber trotzdem starkes Drängen vorliegen, so wartet man dessen Pausen ab und reponiert erst dann weiter. Nach der Reposition wird das Tier zweckmäßig etwas geführt. Von Spülungen sieht man ab, kann nach 2—3 Tagen evtl. eine solche vornehmen. Wenn es also gelingt, das Tier zum Stehen zu bringen, so besteht viel eher die Möglichkeit der Reposition. Die Prognose hängt somit von diesem Punkte wesentlich ab. Rund drei Viertel der von Verf. behandelten Fälle waren erfolgreich behandelt.

H. G.

Lodemann, G.: Das Pferdehaar. Untersuchungen über Struktur und Pigment des Pferdehaares, sowie das Pferdehaar als Rassemersmal. (Aus dem Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung der Tierärztl. Hochschule Hannover. — Direktor: Prof. Dr. Kronacher.) (Zeitschr. f. Tierzüchtung und Züchtungsbiologie 1927, Bd. 9, S. 349 folg.).

Diese fleißige, mit dem reichen Literaturverzeichnis über 100 Seiten umfassende Arbeit behandelt im allgemeinen Teil die Struktur (Kutikula, Rinde, Mark), dann das Pigment und die Dehnbarkeit des Pferdehaares und im besonderen Teil das Pferdehaar als Rassemersmal. Aus der Zusammenfassung des letzteren Teiles sei folgendes hervorgehoben: Die Länge des Haares an der Vorderfußwurzel ist Rassekennzeichen; sie ist beim schweren Schrittpferd erheblich größer als beim Voll- und Halbblut. Auch die Dicke der Haare fraglicher Stelle ist, wenn auch nicht ganz so typisch, als Rasse- und Geschlechtsmerkmal zu verwerten. Der Ränderabstand der Kutikulaschuppen ist zwar bei den einzelnen Rassen etwas verschieden, aber doch nicht unbedingt rassecharakteristisch. Die Form des Querschnittes aus der Haarmitte ist Geschlechtsmerkmal; die Hengste hatten fast immer einen runderen Querschnitt als die Stuten. Ein fast kreisrunder Querschnitt kennzeichnet das Vollblut. Das Verhältnis von mittlerer Haardicke zum mittleren Markdurchmesser zeigt bei den Haaren am Widerrist gewisse Rasseeigentümlichkeiten (Markstrang beim Schrittpferd verhältnismäßig am kleinsten, beim Vollblut am größten und beim Halbblut die Mitte zwischen beiden einhaltend). Hier 100 000 Messungen an etwa 30 000 Querschnitten! Die Dicke der Haare erwies sich, abgesehen von der Vorderfußwurzel (s. oben) nicht als Rassemersmal; in den meisten Fällen hatte aber der Hengst stärkeres Haar als die Stute.

A. Hink.

Kronacher, C., Th. Böttger und W. Schäper:
Die Grollischen Agglutinationsbilder, ihr Wert und ihre

Brauchbarkeit für die Zuchtwahl in der Pferdezucht.

(Aus dem Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung der Tierärztlichen Hochschule Hannover. — Direktor: Prof. Dr. Kronacher.) (Zeitschr. für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie 1927, Bd. IX, S. 323 folg.).

Nach Groll (Zucht und Sport, Jahrg. 7, Heft 16 und Jahrg. 9, Heft 5 u. 13; Berl. Tierärztl. Wchr. 1925, Nr. 8; Züchtungskunde 1927, Bd. 2, Heft 2) sollte die Isohämagglutination geeignet sein zur Bestimmung selbst feinerer Verwandtschaftsgrade innerhalb der Rasse. Dabei wird 1 ccm Blutkörperchenaufschwemmung in physiologischer Kochsalzlösung verschiedener Konzentration mit 1 ccm einer konstant gehaltenen Mischung von Kochsalzlösung und Serum eines anderen Tieres der gleichen Rasse zusammengebracht. Bei Individuen verschiedener Rassen sollte eine „Agglutination“ schon bei geringen Verdünnungen auftreten (Heterogenität des Bluteiweißes), bei hinsichtlich Rasse-Abstammung und Äußerem übereinstimmenden Tieren aber erst bei starker Verdünnung (Homogenität des Bluteiweißes). Tiere, deren Bluteiweiß sich am homogensten erwies, sollten sich auch am besten zur Paarung behufs Erlangung brauchbarster Nachkommen eignen. Die Agglutination sollte sich durch eine bestimmte Gestaltung des Erythrozytenfiediments auf dem Boden der Agglutinationsröhrchen kennzeichnen. Das Ergebnis wird in einer bestimmten Zahl ausgedrückt, z. B. „Agglutination bei 0,1“ = Agglutination bei 0,1 Erythrozytenaufschwemmung + 0,9 ccm Kochsalzlösung in 1 ccm Serummischung. Die äußerst genaue Nachprüfung des Verfahrens durch die oben erwähnten Forscher, wobei es sich zunächst zeigte, daß die „Agglutination“ nach Groll keine echte Agglutination im Sinne der Agglutination der Blutgruppenforscher ist, führte nach Anwendung des Verfahrens bei Pferden ganz verschiedener Rassen und dann bei Pferden gleicher Rasse und bestem Zuchtmaterial zu folgender Schlußfolgerung: Ein gesetzmäßiges Auftreten der Groll'schen sog. Agglutinationsbilder beim Pferde überhaupt und besonders in Abhängigkeit von Rasse, Typ und Verwandtschaft, sowie ihre Verwendbarkeit für die Zuchtwahl zum Zwecke der Ermittlung und dadurch möglich werdenden Zusammenpaarung inöglichst erbanlagegleicher Individuen in dem von Groll gedachten Sinne ließ sich nicht bestätigen. A. Hink.

Darré, R. W.: Kühe kleinster Rassen mit hervorragender Milchleistung. (Deutsche Landw. Tierzucht 1927, Nr. 43 u. 44.)

Verfasser macht interessante Mitteilungen über die einheimischen Rinderschläge Finnlands und über die Landestierchau in Lahtis (mit Abbildungen). In Finnland sind drei hornlose Rinderschläge heimisch: das westfinnische, das ostfinnische und das nordfinnische Rind. Das westfinnische Rind ist fahlbraun mit helleren Abzeichen und hat eine durchschnittliche Widerristhöhe von 112 cm bei einem Körpergewicht von durchschnittlich etwa 335 kg. Das braunrückenscheckige ostfinnische und das weiße nordfinnische Rind sind noch um etwa 1—2 cm kleiner. Die zierlichen Tiere haben einen außerordentlich lebhaften, elastischen Gang. In Westfinnland ist die Zucht auf Leistung besonders vorgeschritten. Hier wurde schon seit 1906 eine strenge Herdbucharbeit geleistet und namentlich auf allerbeste Abstammung der Bullen väterlicher- und mütterlicherseits geachtet. Man war eifrig bestrebt, die gesicherten Ergebnisse der Vererbungsforschung zielbewußt zu verwerten. In Deutschland könnte man sich noch mancherorts daran ein Beispiel nehmen. Die 402 kg schwere Kuh Omena 7241, geboren 1917, gab 1926, also neunjährig 9031 kg Milch = 22,5 mal ihr eigenes Körpergewicht (bei 4,1 Prozent Fettgehalt der Milch 383,1 kg Butterfett, also fast soviel als ihr eigenes Körpergewicht betrug). Im vierjährigen Durchschnitt hatte diese Kuh 6499 kg Milch jährlich geliefert. Eine 1909 geborene Kuh Omena 715 gab 1926, also 17 Jahre alt, noch 5050 kg Milch und 215,5 kg Butterfett. Auf der Ausstellung in Lahtis waren 30 beste

Herdbuchkühe vorgeführt, die im Durchschnitt der besten Jahresleistungen 5648 kg Milch geliefert hatten. Bei acht Monate währender Stallfütterung und nur vier Monate Weide ist die Ernährung der Kühe keineswegs übermäßig. Von den verbrauchten Futtereinheiten sind nur 18,4 Prozent ausländisches Kraftfutter (Erdnuß-, Palmkern- und Leinfamenskuchen, Sojafchrot), 21 Prozent Hafer- und Erbsenmehl eigener Erzeugung, 21,6 Prozent Heu, 5,5 Prozent Stroh, 12,1 Prozent Futterrüben, 1,2 Prozent Grünfutter und 20 Prozent Weide. Eine Kuh Vaula 7082, die vom 13. Juni bis 21. September auf kärglicher Waldweide war, gab 1926 doch 6141 kg Milch mit 264,4 kg Butterfett.

Das finnische Rind, insbesondere das ostfinnische (hier auch Jahreshöchstleistungen von über 6000 kg Milch), erinnert mich, abgesehen von der Hornlosigkeit, in seinem Körperbau an unser kleinstes deutsches Rind, das Hinterwälderrind. Hinterwälderkühe, die im Durchschnitt 115 cm hoch sind — es gibt auch solche von nur 110 und 112 cm Höhe —, liefern bei durchschnittlich 335 kg Körpergewicht nicht selten über 4000 kg Milch mit einem Fettgehalt von oft 5 Prozent und darüber, so daß man aus nur 10 Liter bei Zentrifugenentrahmung ein Pfund Butter gewinnen kann. Ich bin überzeugt, daß die Hinterwälder Kuh, die ebenso lebhaft und flinkschrittig ist wie die finnische, bei fortgesetzt strengster Zuchtwahl ohne Schädigung der Gesundheit auch auf die Leistungshöhe der westfinnischen Kuh gebracht werden kann. Die oben mitgeteilten Leistungen der letzteren sind in Anbetracht der Kleinheit und des geringen Lebendgewichts der Tiere sehr erstaunlich. Welche außerordentliche Tätigkeit muß da das Euter entfalten, das einen Großteil der Milch ja erst während des Melkens bildet, welche dem besonderen Zweck dienliche Futtermittelverwertung muß da vor sich gehen und wieviele Erbfaktoren müssen da zusammenwirken, um eine solche Leistung zustandezubringen! Es gilt keineswegs der Satz: Je größer die Rasse, desto höher die Milchleistung. Man könnte u. a. verfuht sein zu meinen, daß die Hornlosigkeit der finnischen Kuh mit ein Grund der sehr hohen Milchleistung wäre. Aber es liegen dafür keine bestimmten Beweise vor, und es gibt tatsächlich Kühe kleiner gehörnter Rassen, deren Milchleistung eine recht hohe ist. Ich nenne neben den Hinterwäldern die Jersey, Angler u. a. m.

A. Hink.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Friedberger, E. und S. Seidenberg: Weitere Versuche zur Theorie der Antikörperbildung. (Zeitschr. für Immunitätsforschung 1927, Bd. 52, S. 202.)

Bei intravenöser Zufuhr kleiner Mengen von abgetöteten Typhusbakterien am Kaninchen ist die Agglutininbildung bei schneller Einspritzung bedeutend intensiver als bei protrahierter (unter Verwendung der gleichen Dosen). Bei Verwendung sehr großer Dosen macht sich dieser Unterschied nicht geltend.

Es wird versucht, diese Erscheinung auf Grund der Pfeiffer'schen Reiztheorie zu erklären.

Der Typus der Agglutination ist von der Dauer der Antigenezufuhr innerhalb der von den Verff. gewählten Versuchsbedingungen abhängig. Bei schneller Injektion tritt grobe Agglutination ein, bei langsamer feine. Meyn.

Dietl, G. und Grete Muhry: Über Bakterienzucht auf künstlichen Nährböden. (Zeitschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 172—175.)

In der aus dem fleischhygienischen Laboratorium des Schlachthofes in Graz hervorgegangenen Arbeit beschäftigen sich die Verff. mit den zahlreichen Faktoren, die bei der Bakterienzucht auf künstlichen Nährböden in Betracht kommen. Ausgehend von dem Chemismus der lebenden Zelle und seiner künstlichen Beeinflussung werden die

Eigenschaften der verschiedenen Nährböden, von dem durch Robert Koch 1881 zuerst eingeführten durchsichtigen, festen Nährboden angefangen, besprochen. Sämtliche Nährböden sind wässrige Lösungen von Nährstoffen. Die im alkalischen Gebiete vorherrschende Hydroxylionkonzentration sowie die neutrale, bei der Wasserstoff- und Hydroxylion in gleicher Konzentration vorhanden sind, und endlich die in saurer Lösung überwiegende Wasserstoffionkonzentration werden einheitlich durch den Wasserstoffexponent pH ausgedrückt. Das Intervall von $pH = 6,2$ bis $pH = 8,4$ umfaßt das Wachstumsgebiet der pathogenen Keime. Wegen Ermittlung des pH muß auf das Original verwiesen werden. Für die Herstellung eines gut wachsenden Nährbodens ist die Kenntnis des optimalen pH das erste Erfordernis. Weiter werden besprochen der Wasserergehalt der Nährböden, ihr Mineralstoffbedarf, die Stickstoffspender, die Zugabe von Giften (Koffein, Phenol, Malachitgrün usw.), die Eiweißlösungen und die Bedeutung der Trockennährböden. Schließlich wird hervorgehoben, daß bakteriologische Untersuchungsstationen, fleischhygienische Laboratorien und ähnliche Institute nicht nur mit Nährböden arbeiten sollten, die gleiche Namen tragen, sondern mit wirklich gleich zusammengesetzten, also streng genormten bakteriologischen Nährböden, die von zuverlässigen größeren Zentrallaboratorien hergestellt werden müßten.

Edelmann.

Kauffmann, F.: Zur Typ-Spezifität in der Paratyphusgruppe. (Zeitschr. f. Hygiene und Infektionskrankheiten, Bd. 108, Heft 2, S. 415.)

Andrewes wies nach, daß im Laboratorium fortgezüchtete Paratyphusstämmen in der Regel kein in sich einheitliches Gebilde darstellen, vielmehr aus zwei nach ihrem agglutinatorischen Verhalten verschiedene Formen von Bazillen zusammengesetzt sind: aus einem „spezifischen“ und einem „unspezifischen“ (oder „Gruppen“) Anteil. Verfasser hat die Versuche von Andrewes nachgeprüft und seine Angaben im Prinzip bestätigt gefunden. Es existieren in Paratyphusstämmen zwei Formen, die man mit Rücksicht auf ihre Agglutinabilität und ihr antigenes Verhalten als „spezifisch“ und „unspezifisch“ bezeichnen kann. Beide Formen waren im Wachstum, im Aussehen, in der Koloniform, in der Beweglichkeit, in der Zuckervergärung usw. vollständig gleich. Die Zweiteilung in spez. und unspez. soll sich nach Bruce White nur auf das thermolabile H-Antigen erstrecken, während es sich bei der R-Form (rough-Formen) um eine Umwandlung der thermostabilen O-Antigene handelt. Das Auftreten von R-Formen ist wiederholt beobachtet worden. Wodurch der Unterschied zwischen der spez. und der unsp. Form letzten Endes beruht, wie es zu ihrer Trennung kommt und weshalb von manchen Stämmen beide Formen gebildet werden, muß vorläufig offen bleiben.

Verf. gibt folgende Zusammenfassung:

1. Die Feststellungen von F. W. Andrewes, daß in Paratyphus-Reinkulturen nebeneinander zwei agglutinatorisch verschiedene Formen, „spezifisch“ und „unspezifisch“ genannt, vorkommen können, wurden bestätigt. Es ist möglich, mit diesen beiden Formen zwei verschiedene Immunseren beim Kaninchen zu gewinnen, von denen das eine in hohem Grade typen-spezifisch ist, das andere auf fremde Typen weit übergreift.

2. Bei der Fortzüchtung der isolierten spezifischen und unspezifischen Formen blieben diese, bisher bis zu 20 Generationen verfolgt, in einem Reinheitsgrade von ca. 95 Prozent spezifisch bzw. unspezifisch. Der ca. 5 Prozent betragende unspezifische bzw. spezifische Rest spaltete sich bei feiner Fortzüchtung nach dem gleichen Verhältnis (95 : 5) auf.

3. Diese Ergebnisse blieben dieselben beim Arbeiten mit Einzelkulturen.

4. Neben Kulturen, die aus spezifischen und unspezifischen Elementen bestehen, kommen Stämme vor, die, wenigstens zeitweise, rein spezifisch oder rein unspezifisch sein können.

5. Die keimfreie und nach der Biuret- und Sulfosalizylsäureprobe eiweißfreie Waschflüssigkeit (NaCl-Lösung nach 24stündigem Schütteln mit Paratyphusbazillen) erwies sich nach Filtration durch eine Silberschmidt-Kerze als stark spezifisch antigen im Kaninchen, indem sie hochwertige agglutinierende Seren lieferte.

6. Die Berücksichtigung der spezifischen und unspezifischen Formen der Paratyphus-(Typhus)Stämme ist bei allen praktischen und wissenschaftlichen Arbeiten notwendig. Schmey.

Schnürer, J.: Weitere Untersuchungen über die Rotlaufkultur von Sabella. (Aus dem Bakteriologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule in Wien. — Vorstand: Prof. Dr. Schnürer.) Zweite Mitteilung. (Zeitschr. f. Infekt.-Krankheiten d. Haustiere 1927, 32, H. 1, S. 69.)

Der Widerspruch, den die Beobachtungen von Sabella und Schnürers Nachprüfungen mit dem von Sabella gewonnenen avirulenten, aber immunisierenden Rotlaufstamm erfahren haben, war für Schnürer der Anlaß, die Frage der Virulenz und der immunisierenden Fähigkeit dieses Stammes neuerlich an weißen Mäusen zu prüfen, wobei er zu folgendem Ergebnis kam: Weiße Mäuse können durch Einspritzung lebender, aber virulenter Rotlaufbakterien (Sabellakultur, Eryvaccine genannt) aktiv immunisiert werden. Diese Immunität ist aber nur gegen bestimmte Rotlaufstämme gerichtet, sie versagt vollständig bei der Prüfung mittels eines anderen Rotlaufstammes. Unterschiede in der Virulenz der infizierenden Prüfungstämme und der Keimzahl der verwendeten Bouillonkulturen können nicht die Ursache des ungleichen Verhaltens der immunisierten Mäuse abgeben; viel mehr scheint bei Rotlaufstämmen trotz gleicher Virulenz und Keimzahl eine Polyvalenz hinsichtlich der antigenen und infizierenden Fähigkeit zu bestehen, wie sie bei Coli- und Schweinefeuchebakterien schon lange Zeit bekannt ist. Die Gewinnung und Verwendung von lebenden avirulenten Zustandsformen der Infektionserreger stellt einen neuen aussichtsreichen Weg zur Erzeugung von Bakterienfestigkeit auch gegen Rotlauf dar, wie er bereits erfolgreich bei der Geflügelcholera von Manning beschritten worden ist. Die in Österreich in den Jahren 1925 und 1926 an rund 2500 Schweinen durchgeführten Impfungen mit Sabellakultur sprechen dafür, daß die bei Mäusen hinsichtlich der immunisierenden Tätigkeit des Sabellastammes erhobenen Befunde auch für Schweine Geltung haben. Eine Polyvalenz der Rotlaufstämme ist bei diesen Impfungen in der Praxis nicht in Erscheinung getreten, möglicherweise aber nur darum, weil die Zahl der Impflinge verhältnismäßig klein ist, und die Impfungen nur in dem beschränkten Gebiet von Wien und Niederösterreich vorgenommen worden sind.

Ziegler.

Nahrungsmittelhygiene.

Sitzung der Milkkommission der Tierärztekammer für die Rheinprovinz und die Hohenzollern'schen Lande.

25. Februar 1928 in Düsseldorf.

Streptokokkenmastitis.

Die von der letzten Vollversammlung der Tierärztekammer am 25. November 1927 bestimmte Kommission, bestehend aus Behnke, Bützler, Heine, van Straten, die die Frage der Milchüberwachung, insbesondere die Streptokokkenmastitis behandeln sollte, trat am 25. Februar 1928 in Düsseldorf zusammen. Erschienen waren alle vier genannten Herren. Bezüglich des Wesens der Streptokokkenmastitis ist zu bemerken, daß es sich um eine Erkrankung eines oder mehrerer Euterviertel handelt, die schleichend verläuft, in ihren Anfängen ohne

sinnfällige Veränderungen des Euters und feines Sekretes, der Milch verlaufen kann, so daß sie lange von dem Besitzer und dessen Melkpersonal übersehen wird, dann zu einer Eiterbeimischung der Milch führt, die in späteren Stadien fast aus reinem Eiter besteht und schließlich zur Verödung eines oder mehrerer Euterviertel führt. Die für die Erkrankung charakteristischen Erreger sind die Mastitisstreptokokken, die in zwei Formen, eine longus- und brevis-Form auftreten. Streptokokken allein sind für den gelben Galt nicht beweisend, da in der Milch stets auch andere, nicht pathogene Streptokokken sich befinden. So tritt eines der Milchsäurebakterien, der Streptococcus-Lacticus, in Streptokokkenform auf. Zu dem Streptokokkenbefunde muß der Zellgehalt hinzukommen, nicht die Streptokokken, sondern die Zellen sind das Charakteristische für den gelben Galt. Es genügt daher nicht, in Ausstrichen Streptokokken zu färben und festzustellen, sondern das beweisende sind die Zellformen, und zwar treten neben den mannigfachen Formen der Drüsenepithelien Zellen der Auskleidung der Sammelröhrchen, der Milchzisterne, des Strichkanals, aus dem Blut stammende Leukozyten und Lymphozyten mit den mannigfachen Kernformen, runde, nierenförmige, glatte, mit neutrophilen und azidophilen Granula auf. Erst dieser Zellbefund, der in seiner Bedeutung nur von Tierärzten gewürdigt und beurteilt werden kann, ist für das Bestehen einer Mastitis beweisend. Streptokokken färben kann jeder Chemiker und jeder sogenannte Milchbakteriologe, wie sie neuerdings von den Molkereilehrschulen ausgebildet werden. Es ist daher zu fordern, daß die mikroskopische und bakteriologische Untersuchung nur in tierärztlichen Laboratorien vorgenommen wird. Sie setzt veterinärmedizinische Kenntnisse voraus, die zur Erkennung einer tierischen Krankheit erforderlich sind. Hierzu sind in erster Linie neben den sonstigen tierärztlichen Laboratorien die Schlachthoflaboratorien die gegebenen Untersuchungsstätten. Es ist dies um so mehr zu verlangen, als nach kürzlich in der Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene veröffentlichten Untersuchungen Bongerts auch die Frühdiagnose der Eutertuberkulose durch die dabei auftretenden besonderen Zellformen vielleicht möglich ist.

Bei dem gelben Galt hat man drei Stadien zu unterscheiden:

1. Streptokokken finden sich ohne Veränderungen der Milch.
2. Streptokokken mit einem Bodensatz der Milch, der nicht nur aus Milchschnitz besteht.
3. Sinnfällige Veränderungen der Milch.

Im Falle 1 ist die Milch zu pasteurisieren und als Haushaltsmilch freizugeben. Im Falle 2 ist die Milch nach Abkochung als Schweine- oder Kälberfutter verwendbar. Im Falle 3 ist die Milch als untauglich zu vernichten.

Es wurde die Frage geprüft, wie die Milch aus Vorzugsbeständen, in denen einzelne Kühe mit Galt gefunden werden, behandelt werden soll. Man ist der Ansicht, daß es eine wirtschaftlich nicht tragbare Forderung sei, den ganzen Bestand bei dem Funde von Galt bei einer oder wenigen Kühen von der Vorzugslieferung auszuschalten. Durch öftere Untersuchungen sind hier die verdächtigen Kühe möglichst schnell zu ermitteln. Diese sind aus dem Vorzugsstall zu bringen, isoliert aufzustellen und von besonderen Melkern zu melken. Ihre Milch darf nur in pasteurisiertem Zustande abgegeben werden.

Es muß verlangt werden, daß auch die Probeentnahme in tierärztlicher Hand bleiben muß. Bei der Zahl der heute vorhandenen Tierärzte wird es unschwer gelingen, diese für die Probeentnahme zu gewinnen. Hierdurch wird am besten eine enge Verbindung mit den tierärztlich geleiteten Laboratorien erreicht werden. Den von einer Seite geltend gemachten Bestrebungen, diese Probeentnahme den landwirtschaftlichen Kontrollassistenten zu übertragen, muß entgegen getreten werden; denn die Probeentnahme muß steril geschehen. Dies setzt wieder eine tierärztlich bakteriologische Schulung voraus, die den landwirtschaftlich ausgebildeten Kontrollassistenten fehlt. Dann aber werden bei der Probeentnahme zugleich Euterleiden zu ermitteln und differentialdiagnostisch zu werten sein, was in zweckentsprechender Weise nur der Tierarzt kann. Es ist anzustreben, den Schlachthof-Laboratorien den Charakter als öffentlich rechtliche Anstalten beizulegen. Auf einen entsprechenden Antrag des Kölner Schlachthoflaboratoriums hat der Regierungspräsident in Köln geantwortet (Verfüg. an den Oberbürgermeister in Köln vom 3. Februar 1927 I. G. 37/28): Wenn Gemeinden solche Laboratorien errichtet hätten, so hätten diese einen öffentlich-rechtlichen Charakter im Sinne des § 21 des Lebensmittelgesetzes vom 5. Mai 1927. Dies trifft zu für das Provinziallaboratorium Köln, das bakteriologische

Institut der Landwirtschaftskammer in Bonn und die veterinär-hygienischen Untersuchungsämter der Schlachthöfe in Bonn und Köln, die die Befugnis haben, bakteriologische Fleischuntersuchungen vorzunehmen. Es ist anzustreben, daß die Kammer für die übrigen tierärztlich geleiteten Laboratorien des Kammerbezirkes ein gleiches durch entsprechenden Antrag an die zuständigen Regierungspräsidenten bewirkt unter Bezugnahme auf den ab schriftlich beigelegten Bescheid des Regierungspräsidenten in Köln.

Es ist neuerdings von Ärzten aus dem Kreise Bergheim die Beobachtung gemacht worden, daß auf Streptokokken-Infektion zurückzuführende eitrige Mandelentzündungen bei Kindern gehäuft aufgetreten sind. Bei dem gleichzeitigen starken Herrschen des gelben Galt im Kreise Bergheim ist der Verdacht aufgetaucht, diese beiden Krankheiten hätten Beziehungen zueinander. Diese Frage, ob Galtstreptokokken auch menschenpathogen auftreten können ist von amerikanischen Ärzten bejahend entschieden. Sie ist vom Regierungspräsidenten in Köln aufgegriffen worden und unterliegt zur Zeit der Nachprüfung in den hygienischen Instituten der Universität Bonn und Köln.

Irgend welche Änderungen in den Polizeiverordnungen über Milch werden vor in Kraft treten des Milchgesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen nicht zu erreichen sein. Es wird empfohlen, daß die Kammer beim Kammerauschuß einen beschleunigten Antrag stellt, darauf zu dringen, daß bei den bevorstehenden Beratungen des Entwurfs des Milchgesetzes tierärztliche Sachverständige zu Worte kommen.

Aus denselben Gründen wird eine Untersuchung der Molkereien durch tierärztliche Probeentnehmer nicht zu erreichen sein.

Um in die Untersuchung der Marktmilch hineinzukommen, wird empfohlen, Proben zu untersuchen, woher sie auch erlangt werden können, nötigenfalls auch Proben, die die Chemiker, die sie zur chemischen Untersuchung haben entnehmen lassen, abgeben.

Betreffs der Behandlung des gelben Galt wird vorläufig ein abwartender Standpunkt einzunehmen sein. Die Frage, ob überhaupt eine Behandlung einzuleiten sei, gegebenen Falls mit welchen Mitteln, oder ob die erkrankten Tiere auszumerzen seien, bedarf noch der Klärung.

Zur Aufnahme ins Viehseuchengesetz eignet sich der gelbe Galt nicht, noch weniger zu einer Entschädigung. So hartnäckig der Galt als Stallseuche sein kann, so hat es der Landwirt doch in seiner Hand, durch zweckentsprechende Maßnahmen die Seuche aus eigener Kraft zu verhüten und zu bekämpfen, wenn er nur bei der Einstellung neuer Kühe achtam ist, dreistrichige Kühe nicht einstellt und die zugekauften bis zur Feststellung isoliert aufstallt und sofort nach dem Kauf, bezw. acht Tage nach erfolgtem Abkalben durch eine mit geringen Unkosten vorzunehmende bakteriologische Untersuchung der Milch die Abwesenheit der Erreger feststellen läßt. Durch zweckentsprechende Sauberkeit kann die Seuche vermieden werden. Veterinärpolizeiliche Maßnahmen kommen aber nur bei denjenigen Krankheiten in Frage, die durch ihre Weiterverbreitung auf andere Tiere auch das Eigentum anderer gefährden können. Denn jeder Staatsbürger kann den Schutz seines Eigentums gegen äußere, fremde Gefahren fordern, die er nicht selbst abwenden kann. Zu diesen Krankheiten ist der gelbe Galt nicht zu rechnen. Eine Entschädigung ist noch weniger gerechtfertigt und würde sich nur als Prämie für Nachlässigkeit auswirken, ganz abgesehen davon, daß es sehr schwierig sein würde, den Zeitpunkt festzusetzen, wann sie einzutreten hätte, im Früh- oder Spätstadium und daß es sich nie um den Verlust eines ganzen Tieres handeln würde, sondern nur um den Differenzbetrag zwischen dem Werte als Milchtier und Schlachtvieh. Es muß daher unbedingt an dem Selbstschutz des Besitzers festgehalten werden, der in der bakteriologischen Untersuchung der Milch jeder neu eingestellten Kuh vor Einstellung in den Bestand besteht, wie ja für Vorzugsmilchbestände heute schon durch die Milchpolizeiverordnung verlangt wird, daß jedes neue Tier erst eingestallt werden darf, wenn es von dem zuständigen Tierarzt untersucht und gesund befunden ist. Zu dieser Untersuchung gehört die bakteriologische Untersuchung der Milch. In diesem Zusammenhang wurde betont, daß die Klagen der Tierärzte sich mehrten, daß die in die Rheinprovinz eingeführten Milchkühe sehr häufig vom gelben Galt betroffen seien. Es wurde der Vorschlag gemacht, die Kammer möge bei der Landwirtschaftskammer anregen, ihrerseits Maßnahmen zur Verhütung der Einschleppung des gelben Galt in die Rheinprovinz zu treffen.

gez. Behnke, Bützler, Heine, van Straten.

Standesangelegenheiten.

Verein der Tierärzte des Reg.-Bezirks Hildesheim.

20. Hauptversammlung am 17. März 1928 im Kaiserhof in Hildesheim. Anwesend 29 Mitglieder, 4 Gäste. Der Vors. berührt die Annahme des Tierärztekammergesetzes durch den Landtag. Die Freude hierüber ist um so größer, als der Schöpfer und Verfechter desselben unser hochverehrter Ehrenvorsitzende Friese ist. Die Wahlen für die hiernach zu wählenden Kammern werden kaum vor Herbst stattfinden können. Das tierärztliche Dispensierrecht wird immer noch heftig von Seiten der Apotheker umstritten, die selbst mit Mitteln arbeiten, die eines akademischen Standes unwürdig sind. Durch Vorpietung falscher Tatsachen suchen sie jetzt die Landwirtschaft für sich zu gewinnen. Deshalb wird jedem Kollegen dringend empfohlen, in landwirtschaftlichen Kreisen aufklärend zu wirken. Ferner müssen die tierärztlichen Hausapotheken in vorschriftsmäßiger Ordnung gehalten werden. Laut ministerieller Verfügung sind in Zukunft abgegebene Arzneien auf den Liquidationen gefondert in Rechnung zu stellen. Das Unterhalten von tierärztlichen Arzneidepots außerhalb des Hauses ist verboten. Die Kollegen werden gebeten, begründete Ausführungen an den Vorsitzenden einzureichen, weshalb sie in der Praxis auf die Betäubungsmittel Opium, Morphinum usw. und deren Präparate nicht verzichten können. Auf der nächsten Tagung soll eine Aussprache über §§ 5 und 7 des Fleischbeschgesetzes stattfinden. Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, daß für Tiere, die in einem gewerblichen Raume notgeschlachtet werden, der § 7 nicht in Anwendung kommt. Die Kollegen werden gebeten, alles Material über Puscherei dem Kollegen Dr. Heinemann in Pahrens b. Nörten einzufenden, damit dieses an die Zentralstelle zur Bekämpfung des Kurpfuschertums weitergeleitet werden kann. Im Jahre 1927 belaufen sich die Einnahmen auf RM. 627,25, die Ausgaben auf 571,65 RM., so daß für 1928 der Betrag von RM. 55,60 vorzutragen ist. Als Beitrag werden für 1928 RM. 8,50 vorgeschlagen und beschloffen. Außerdem wird eine Sonderzulage von Mk. 3,— beschloffen, die der Tierärztlichen Hochschule zum 150jährigen Bestehen überwiesen werden soll. Ausgetreten ist Dr. Köppsbischofen. Machens berichtet über den Stand der Buchführungsstelle, insbesondere über die neugeschaffenen Wohlfahrtsinstitutionen. Im Anschluß hieran sprechen sich die beigetretenen Kollegen sehr lobend über die Wirkung derselben aus und betonen ausdrücklich, daß ihnen irgendwelche Nachteile durch ihren Beitritt nicht entstanden und bekannt geworden seien. Es folgt der Vortrag von Prof. Dr. Oppermann über: „Einige wichtige Kapitel aus der Viehwirtschaft“. Seine interessanten Ausführungen erstrecken sich auf Fälle bei Dämpfung, Kehlkopfpeifen, Zuchtfähigkeit und Trächtigkeit. Großer Beifall und der Dank des Vorsitzenden belohnt den Vortragenden für seine Ausführungen. Es wird die Wirkung und Erfolge verschiedener neuer Arzneimittel besprochen, auch von Selektan. Alle Kollegen, die dieses Mittel gebraucht haben, erklären es bei Behandlung von Euterkrankheiten für unzuverlässig.

Dr. Machens, Vors. Dr. Heinemann, Schriftf.

Gruppe Schleswig-Holstein im R. p. T., E. V.

Sonntag, den 4. März 1928 in Neumünster. Anwesend 42 Mitglieder. Der Vors. Gottbrecht widmet dem verstorbenen Kollegen Dr. med. vet. h. c. Franzenburg herzliche Nachrufsworte. Besonders hob er die vorbildliche Treue und unermüdliche Arbeitskraft des Verstorbenen hervor, der bis zum letzten Atemzuge für die Hebung seines Standes gearbeitet hat. Anlässlich von Bestrafungen von Tierärzten bei Verfehlungen in der Fleischschau wurde der jetzt von dem Regierungspräsidenten angewandte Veröffentlichungsmodus bekannt gegeben. Der Wunsch der nicht beamteten Tierärzte, bei der Anwendung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen die Erfahrungen bewährter Praktiker mitzuverwenden, ist von dem Minister grundsätzlich abgelehnt worden. Ferner berichtet der Vors. eingehend über die standespolitischen Kämpfe zwischen der Leipziger und der Berliner Tagung des D.V.R. und macht darauf aufmerksam, daß die Gruppe Schleswig-Holstein in dem Kampf um den D.V.R. mit in vorderster Linie stand und dieser Kampf nicht umsonst gekämpft wurde. Aus der Versammlung heraus wurde festgestellt, daß es besonders der Kollege Albin-Schönberg war, der vom Anfang bis zum Ende zielbewußt die Stimmung vorbereitet hat, die in Berlin zum Frieden führte und daß die deutsche Tierärzteschaft ihm zu

großem Dank verpflichtet sei. 2. Einnahmen 8040,57 RM., Ausgaben 8023,24 RM., Bestand 17,33 RM. Sterbekasse 2058,60 RM., Ausgaben 1001,20 RM., Bestand 1057,40 RM. 3. **Anschluß der Gruppe Hamburg und Aufnahme neuer Mitglieder.** Einstimmig werden folgende Kollegen aufgenommen: Dr. Kruse jun., Barmstedt; Dr. Schönfeld-Schlammersdorf, Alberts-Hamburg, Dokter-Hamburg, Dr. Ferber-Hamburg, Dr. Gerhardt-Hamburg, Dr. Lampe-Hamburg, Dr. Holert-Geesthacht bei Hamburg, Dr. Johannsen-Hamburg, Dr. Lindberg-Hamburg, Dr. Lieske-Hamburg, Dr. Neuburg-Bergedorf, Dr. Wiegmann-Hamburg, Dr. Wolff-Hamburg, Dr. Weber-Hamburg, Schmidt-Hamburg, Dr. Kasch-Bad Segeberg, Stoltenberg-Altona, Naumann-Schiffbek. 4. **Abwehrmaßnahmen gegen die anonymen Angriffe seitens der Apotheker in Schleswig-Holstein.** Die maßlosen anonymen Angriffe seitens der Apotheker in Schleswig-Holstein gegen das Dispensierrecht der Tierärzte anlässlich der Schleswig-Holsteinischen Bauernkundgebung im Januar 1928 wurden durch den Vorstand auf das schärfste zurückgewiesen. Die Landwirtschaftskammer, als offizielle Vertreterin der Landwirtschaft und der Bauernverein in Schleswig-Holstein, erklärte sich ausdrücklich für Beibehaltung des vollen Dispensierrechtes der Tierärzte. Die Verfälschung stellte fest, daß die ganze Kampart der Apotheker eines akademischen Standes unwürdig sei. Es wurden ferner energische Maßnahmen beschloffen, um dieses dunkle Treiben restlos aufzudecken. 5. **Fleischbeschaufragen.** Die neue ministerielle Verordnung betr. die tierärztliche Nahrungsmittelkontrolle wird einer eingehenden Besprechung unterzogen. Von allen Seiten wird mit tiefem Ernste auf die möglichen unheilvollen Auswirkungen dieser Verordnung hingewiesen und in banger Sorge die immer weiter um sich greifende Unterminierung und Zersetzung des tierärztlichen Gesamtstandes erörtert. 7. **Befprechung des Vertrags mit der Schweinegilde für Elmshorn und Umgegend.** Es wird den Tierärzten der Kreise Pinneberg und Steinburg anheimgegeben, die Verhandlungen mit dem Versicherungsverband betr. Rotlaufschutz- und Heilimpfungen nach bestem Wissen und Gewissen zu führen, um sich und damit die ganze schleswig-holsteinische Kollegen-schaft vor Schaden zu bewahren. 8. **Stellungnahme zur Gründung einer veterinär-medizinischen Gesellschaft.** Durch den Kollegen Weyl wird die Gründung einer veterinär-medizinischen Gesellschaft angeregt. Er führt aus, daß in der Weiterbildung der Tierärzte, abgesehen von den Fortbildungskursen des D.V.R., die bisher in ihrer Art Vorbildliches geleistet haben, nichts geschehen sei. Überall rege sich das Bedürfnis nach Weiterbildung und Vertiefung in den verschiedenen Disziplinen unserer Wissenschaft. Es sei jetzt mehr als je notwendig, daß unser Stand wissenschaftlich auf der Höhe bleibe und auch in die Errungenschaften verwandter Gebiete einzudringen suche, wolle er als akademischer Stand weiter bestehen und den ihm im Rahmen des Volksganzen zugewiesenen Aufgaben gerecht werden. Er schlägt u. a. vor, die beifällig aufgenommenen Kurse in dem Tierseucheninstitut und den Schlachthöfen der Provinz zu dauernden Einrichtungen auszubauen und zu spezialisieren; weiterhin einen Arbeitsausschuß ins Leben zu rufen, der das Fortbildungswesen in der Provinz nach bestimmten näher angegebenen Richtlinien, auch in Form von Wander- und Diskussionsvorträgen, regelt und durchführt. Diese Gedanken werden mit großer Freude begrüßt. Um nun aber eine Überorganisation zu vermeiden, wird ein Antrag angenommen, diese Aufgaben dem Tierärzteverein zu übertragen. Letzter soll gebeten werden, Kollegen Weyl und die von ihm für den Arbeitsausschuß vorgeschlagenen Kollegen zu der nächsten Vorstandssitzung zuzuziehen, damit der Tierärzteverein in diesem Jahre anlässlich seines 60jährigen Stiftungsfestes diesen Vorschlägen und Gedanken die Tat folgen lassen könnte. 7. **Fortbildungskurse im Tierseucheninstitut in Kiel.** Die Fortbildungskurse haben Dank der instruktiven Ausgestaltung durch den Direktor Dr. Kiessig und der vollen Hingabe seiner Mitarbeiter allgemeinen Beifall gefunden. Der Kollegen-schaft wird die Beteiligung an weiteren Kursen dringend empfohlen. Kollege Weyl in Kiel ist jeder Zeit zur Auskunft bereit. 8. **Gründung einer Gesellschaft zur Bekämpfung von Euterkrankheiten.** Bei Besprechung dieses Punktes wurden die Erfahrungen, die die Kollegen mit verschiedenen Mitteln gesammelt hatten, eingehend besprochen. Es wurde entschieden zum Ausdruck gebracht, daß es z. Z. ein Spezialpräparat gegen alle Mastitiden nicht gäbe. Besonders wird das Präparat Selektan von Kollegen, die damit Versuche angestellt haben, durchaus ablehnend beurteilt. Der obige Arbeitsausschuß soll auch in eine Prüfung der Richtlinien für die

Bekämpfung von Euterkrankheiten in Schleswig-Holstein eintreten, unter besonderer Berücksichtigung der demnächst erscheinenden diesbezüglichen Vorschläge der in Berlin neu gegründeten „Gesellschaft zur Erforschung und Bekämpfung der Euterkrankheiten des Rindes“. 9. **Verschiedenes.** Der Vorstand wird beauftragt, dem Landestierarzt in Hamburg die Wünsche der Schleswig-Holsteinischen Tierärzte hinsichtlich der Beschlagnahme von eingeführtem Fleisch vorzutragen und vor allen Dingen, eine sofortige Benachrichtigung der in Frage kommenden Kollegen herbeizuführen, um diesen die Identifizierung der Schlachttiere und die persönliche Feststellung der Art der „Verfehlungen“ zu ermöglichen.

Dr. Gottbrecht, Vors. Dr. Schlaak, Schriftf.

Verschiedene Mitteilungen.

Oberamtstierarzt Vet.-Rat Model zum 80. Geburtstag.

In körperlicher und bewundernswerter geistiger Frische beging der älteste württembergische Oberamtstierarzt Vet.-Rat Model in Gerabronn am 28. März 1928 seinen 80. Geburtstag. Die große Zahl derer, die sich zu der Feier des seltenen Festes eingefunden hatten, ist ein Beweis für die Verehrung und hohe Wertschätzung, die der Jubelgreis in allen Kreisen genießt, die mit ihm dienstlich und außerdienstlich in den vergangenen Jahrzehnten in Beziehung getreten sind; dies kam auch in den vielen Glückwunscheden und Gaben beredt zum Ausdruck. Ministerialrat Dr. von Ostertag als Vertreter des Innenministeriums hob unter Überreichung eines Handschreibens des Ministers Bolz die Verdienste hervor, die sich der Jubilar als Beamter in jahrzehntelanger gewissenhafter Arbeit um Tierheilkunde und Tierzucht erworben hat, was auch seitens der Regierung jederzeit anerkannt worden sei. Anschließend überbrachte der Präsident der Zentralstelle für die Landwirtschaft von Sting die Glückwünsche des Wirtschaftsministeriums und feierte Model als Begründer und eifrigen Förderer des Hohenloher Fleckviehzuchtverbandes, dessen derzeitige Blüte er zu einem großen Teil als eigenes Verdienst in Anspruch nehmen könne. Der Tierärztliche Landesverein hat Model zum Ehrenmitglied ernannt und durch seinen Vorstand Schlachthofdirektor Dr. Feeser-Heilbronn eine künstlerisch ausgeführte Urkunde überreichen lassen. In gleicher Weise ehrte der Verein der Oberamtstierärzte sein langjähriges Mitglied. Unter Überreichung eines Ehrengeschenkes sprach Vet.-Rat Dr. Lamparter-Böblingen dem eifrigen Mitarbeiter in der Entwicklung der Stellung des beamteten Tierarztes vom Körperchaftsbeamten zum Staatsbeamten die Glückwünsche des Vereins aus. Im Namen des Hohenloher Fleckviehzuchtverbandes, des landw. Bezirksvereins und der Viehzuchtgenossenschaft Gerabronn beglückwünschte Gutsbesitzer Krauss-Riedbach Vet.-Rat Model. Er unterstrich besonders dessen Verdienste als Gründer des Fleckviehzuchtverbandes und der Zuchtgenossenschaft und schilderte, wie es Model in seltener Weise verstanden habe, sich das Vertrauen der Landwirte zu erwerben und wie er stets für die Entwicklung der Landwirtschaft und Förderung ihrer Interessen eingetreten sei. Weitere Glückwünsche übermittelten Oberamtman Wöhrle für den Bezirk, Stadtschultheiß Wiedmann für die Stadt Gerabronn, Schultheiß Staigmüller für die Heimatgemeinde Lensiedel; die beiden genannten Gemeinden ernannten Model zum Ehrenbürger. Der Gefeierte erwiderte auf jede Rede in frischen, teilweise humorvollen Worten und sprach für die nach seiner Ansicht unverdienten Ehren seinen herzlichsten Dank aus. Im Anschluß an die Feier fand ein gemeinsames Mittagessen im Hotel Post statt, an dem sich noch zahlreiche weitere Gratulanten beteiligten.

Dr. Fraas.

Deutsche Vereinigung für Mikrobiologie.

13. Tagung vom 30. August bis 1. September 1928 in Bern.

Donnerstag, den 30. August 1928: Friedemann-Berlin: Latente Infektionen in ihrer Bedeutung für die Epidemiologie. Lewinthal-Berlin: Neuere Forschungen über die Struktur der bakteriellen Antigene. Freitag, den 31. August 1928: Sobernheim-Bern: Variola und Alastrim. Gildemeister-Berlin (Dahlem): Encephalitis postvaccinalis. Sonnabend, den 1. September 1928: Bieling-Bad Soden a. T.: Reticulo-Endothel und Immunität. Schlossberger-Frankfurt am Main: Reticulo-Endothel und Chemotherapie. Die Anmeldung sonstiger Vorträge und Demonstrationen wird spätestens bis zum 1. August 1928

an den Schriftführer erbeten. Nähere Mitteilungen werden später erfolgen.
Neufeld, Vors. R. Otto, Schriftf.

3. nordischer Veterinärkongress in Oslo.

Vom 9. bis 11. Juli 1928 findet an der Universität in Oslo (Norwegen) der 3. nordische Veterinärkongress statt. In der Vollversammlung der drei Tage werden abgehandelt: Maul- und Klauenfeuche, Verwerfen und Unfruchtbarkeit, Tuberkulose. In den Sektionen: Schweinekrankheiten, Piroplasmose, nichtinfektiöse Hämoglobinurie, Vitamineforschung, Fütterungsverfuche, Chirurgie und Geburtshilfe, Transport kranker und verendeter Pferde im Felde und die Transportmittel, neuere therapeutische Methoden, Futtervergiftungen, Hygiene der Haustiere, Schaffkrankheiten.

Conférence internationale du rat.

Paris-Le Havre, 16. bis 22. Mai 1928.

In Paris und Le Havre findet im Mai d. Js. eine internationale Konferenz statt, um auf Grund gemeinsamer Befprechungen die sichersten Methoden zur Bekämpfung der Ratten festzusetzen und evtl. gesetzliche Maßnahmen für diese Zwecke vorzuschlagen. Die bisherige internationale Vereinigung zur rationellen Bekämpfung der Ratten — Lique — in Kopenhagen, soll von neuem ins Leben gerufen und Ort und Zeit für den nächsten internationalen Rattenkongress besprochen werden.

Prof. Gabriel Petit, Schriftf. Prof. A. Calmette, Vors.

Anschreiben zu richten an den Schriftführer, 84 bis, Rue de Picpus, Paris (12e).

Tierärztekammer für die Provinz Ostpreußen.

Vollversammlung am Sonntag, den 29. April 1928, 11,30 Uhr im „Grünen Zimmer“ des Stadthallenrestaurants in Königsberg i. Preußen, Vorderroßgarten 49. 1. Änderung der Gebührenordnung insbesondere Aufnahme von Bestimmungen entsprechend dem Ministerialerlaß vom 17. Februar d. Js. 2. Antrag auf Wiederaufnahme eines Verfahrens. 3. Verschiedenes. I. A.: Dr. Knauer, Vors.

Verein Schlesischer Tierärzte.

Sonntag, den 29. April 1928, in Breslau, Hanfastraße 25 (Landwirtschaftliche Institute), Gruppensitzung der beamteten Tierärzte, 10 Uhr (Hörsaal II), Gruppensitzung des Reichsverbandes prakt. Tierärzte 9,30 Uhr pünktlich (Hörsaal I), Gruppensitzung der Schlachthoftierärzte Sonnabend, 28. April, 19 Uhr in der Fürstendiele des Hauptbahnhofes und am 29. April 9,30 Uhr (Hörsaal V). Hauptversammlung 11,15 Uhr pünktlich (Hörsaal I). 1. Vereinsangelegenheiten: a) Eingänge und Mitteilungen; b) Abgang und Aufnahme von Mitgliedern; c) Kassenbericht; d) Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden. 2. Dr. Schebitz-Dyhernfurth: „Die Leberegelteuche in ihrer Bedeutung für den behandelnden Tierarzt.“ 2. Dr. Florschütz-Breslau: „Einiges aus der Kleintier-Praxis.“ Gegen 14 Uhr gemeinsames Mittagessen mit Damen im Festsaal des Hauptbahnhofes (Westflügel, besonderer Eingang) nachher Tanz. Vorherige schriftliche Anmeldung bis zum 25. April dringend erbeten, zahlreiche Beteiligung erwünscht. Es wird dringend gebeten, den Vereinsbeitrag für 1928 (8 RM.) an die Kommunalbank Liegnitz, Bankkonto 174, Postcheckkonto Breslau 52 321, baldigst zu überweisen oder spätestens während der Sitzung an den Herrn Kassierer zu zahlen.

Der Vorstand: I. A.: Prof. Dr. M. Casper.

Tierärztl. Zentralverein für die Provinz Sachsen, Thüringen u. Anhalt.

93. Generalversammlung Sonntag, den 29. April 1928, 11 Uhr vorm. im Bakteriologischen Institut der Landw.-Kammer Halle a. S., Freimfelderstraße 67/68. (Ab Bahnhof: Straßenbahnlinien 2 und 6.) 1. Prof. Dr. Götze-Hannover führt von 11 Uhr vorm. bis gegen 2 Uhr nachm. an lebenden Rindern Fremdkörperoperationen, das Anlegen einer Pansenfistel, Klauenamputationen und die Epiduralnarkose vor. Ferner zeigt er ein neues geburtshilfliches Instrument. Fortsetzung der Sitzung 2,15 Uhr nachm. im Engelhardt-Bräu, Ecke Mühlweg und Bernburger Straße. 2. Vereinsangelegenheiten. Neuwahl des Schriftführers und Kassenbericht. 3. Veterinärrat Gundlach-Magdeburg: Leben und Wirken unseres verstorbenen Ehrenvorsitzenden, Geheimrats Dr. h. c. Leistikow. 4. Fragen aus der Praxis. Die Sitzung findet gemeinsam mit dem Verein Anhaltischer Tierärzte statt. Alle an dem Operationsvortrag interessierten Herren Kollegen sind willkommen. Nach Schluß der Versammlung gemeinsames Essen mit Damen. An-

meldungen zur Teilnahme an dem Essen an den Unterzeichneten bis zum 26. d. Mts. erbeten. Der Vors.: H. Raebiger.

Tierärztliche Buchführungsstelle Pommern e. V.

Hauptversammlung Sonntag, den 22. April 1928, 9,30 Uhr in Stettin, Konzerthaus. 1. Jahres- und Geschäftsbericht; 2. Kassenprüfung und Entlastung des Geschäftsführers; 3. Neuwahl des Vorstandes; 4. Satzungsänderung; 5. Bericht über die Hauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Tierärztlicher Buchführungs- und Verrechnungsstellen am 18. Februar 1928 in Berlin; 6. Antrag betreffend Erweiterung des bestehenden Kollektiv-Unfallvertrages durch Aufnahme eines Zusatzvertrages über ein Tagegeld von RM. 10,—, RM. 15,—, RM. 20,—. gez. Dr. Auerbach; gez. Dr. Eggebrecht.

Tierärztlicher Fortbildungsrundfunk.

Freitag, den 27. April 1928, 19,20 bis 19,45 Uhr: Prof. Dr. Bongert-Berlin: „Über die Bedeutung der Fleischbeschau.“ Dr. Giese.

21. Fortbildungskursus des D.V.R. in Stuttgart

am 28. und 29. April 1928.

Sonnabend, den 28. April 1928, 10 Uhr: Geheimrat Prof. Dr. von Ostertag: „Fragen aus dem Gebiete der Fleischbeschau.“ 11 Uhr: Dr. Kübitz-Willstätt: „Fremdkörperoperation beim Rinde.“ Anschließend Befprechung. 15 Uhr: Medizinalrat Prof. Dr. Pfeiffer-Gießen: „Neues auf dem Gebiete der Chirurgie.“ Mit Demonstrationen. Anschließend: Dr. Kübitz-Willstätt: „Fremdkörperoperation beim Rinde.“ (Demonstration.) Sonntag, den 29. April 1928, 9 Uhr: Regierungsrat Dr. Gminder-Stuttgart: „Aufzuchtkrankheiten.“ 10 Uhr: Prof. Dr. Stang-Berlin: „Tierzucht.“ 11 Uhr: Prof. Dr. Stoß-München: „Neuere Geburtshilfe und Sterilitätsbekämpfung. (Mit Demonstrationen.)“ Anschließend Befprechung. Die Vorträge finden im Tierärztlichen Landesuntersuchungsamt Herbergstraße 14a statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 10 Mk. für beide Tage. Stang.

Bücherbesprechungen.

Der Weltkrieg, seine Ursachen und Folgen. Ein Beitrag zur Kriegsschuldfrage. Von Dr. C. Nörner, Barfinghausen. Verlag von Philipp Aug. Weinang, Barfinghausen. Preis brosch. 1,20 RM.

Der in tierärztlichen Kreisen wohlbekannte Verfasser behandelt in der kleinen Schrift in kurzer, klarer, übersichtlicher Weise die Frage der Kriegsschuldfrage und widerlegt die Beschuldigung Deutschlands als den Urheber des Weltkriegs. Die Broschüre hat bereits großen Anklang gefunden, so daß die erste Auflage fast vergriffen und eine zweite, verstärkte, mit vier Textabbildungen versehene, in Vorbereitung ist.

Dr. Berge, Hannover.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Dr. Felix Schmidt, wissenschaftl. Assistent zum Oberassistenten, Dr. Rolf Korkhaus zum wissenschaftl. Assistenten am Institut für Parasitenkunde der Tierärztl. Hochschule in Berlin; Tierarzt Kurt Beutner zum Bibliotheksassistenten der Tierärztl. Hochschule in Berlin.

Ausgeschieden: Privatdozent Prof. Dr. Curt Krause als Oberassistent am Institut für Parasitenkunde und veterinärmedizinische Zoologie der Tierärztl. Hochschule in Berlin.

Approbiert in Gießen: Walter Eggers aus Neuengamme, Fritz Knopp aus Kronstadt.

Promoviert in Gießen: Tierarzt Wilhelm Albrecht aus Darmstadt, Wilhelm Egner aus Darmstadt, Ernst Fleischhauer aus Rödgen, Ferdinand Schwan aus Großenbaum, Wilhelm Sibbe aus Merklinde, Johannes Thomsen aus Iperntedt.

Verstorben: Tierarzt Jantelat in Lappinen, Generaloberveterinär a. D. William Werrmann in Ohrdruf; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Karl Giesenhagen, Direktor des tierbotan. Instituts der Universität München.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edlmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10: nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung fein.

Postcheckkonto: Hannover. 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 17.

Ausgegeben am 28. April 1928.

36. Jahrgang.

(Aus dem Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover. — Direktor: Prof. Dr. Mießner.)

Zur Differenzierung des *Bact. pullorum* (Rettger) vom *Bact. paratyphosae*. (*Bac. gallinarum* Klein, *Bact. sanguinarium* Moore, *Bac. typhi gallinarum alcalifaciens* Pfeiler.)

Von Stabsveterinär Dr. Gressel, z. Zt. Insterburg.

Eine der wichtigsten Kükenkrankheiten ist die bakterielle weiße Ruhr, die zuerst von Rettger im Jahre 1900 näher beschrieben wurde. Als Erreger der Krankheit ermittelte Rettger ein gramnegatives Kurzstäbchen mit abgerundeten Enden, das er anfangs für beweglich hielt. Spätere Untersuchungen führten ihn jedoch zu der Überzeugung, daß der gefundene Erreger, den er „*Bacterium pullorum*“ benannte, keine Eigenbewegung besitzt. Rettger reihte den Erreger wegen seiner morphologischen und kulturellen Eigenschaften in die Coli-Typhusgruppe ein.

In Europa ist die weiße Ruhr der Küken ebenfalls beobachtet worden und zwar in Ungarn (Manninger), England (Dalling und Allen, Doyle), Irland (Rice), Holland (de Blicke) und Belgien (Leynen). Über das Vorkommen der Seuche in Deutschland haben kürzlich Beller, Beck und Eber sowie Spiegl und Schmidt-Hoensdorf berichtet.

Bei der weißen Ruhr, so benannt wegen der weißlichen Kotausscheidungen, handelt es sich hauptsächlich um eine Erkrankung der Küken, doch können ausnahmsweise auch erwachsene Hühner einem akuten Ausbruch zum Opfer fallen (Jones, Hadley, Caldwell, Elkins und Lambert, Rice, Spiegl und Schmidt-Hoensdorf). Küken sind im allgemeinen nur während der ersten Lebenswochen für eine akute Infektion empfänglich und zwar ist die Empfänglichkeit in den ersten 48 Stunden nach dem Auschlüpfen am größten (Rettger, Kirkpatrick und Stoneburn). Die Krankheit verläuft meist akut und führt plötzlich oder in wenigen Tagen zum Tode. Bei subakutem Krankheitsverlauf tritt der Tod erst nach mehreren Wochen ein. Diese Form scheint nach den Beobachtungen von de Blicke bei einigen Epizootien im Vordergrund zu stehen. Die durchschnittliche Verlustziffer wird von den meisten Autoren mit 50 bis 80 Prozent angegeben, doch kann die Mortalität zuweilen bis zu 100 Prozent betragen.

Rettger und Stoneburn haben schon im Jahre 1909 den Beweis erbracht, daß die Henne die hauptsächlichste Quelle der Infektion ist. Beide Autoren konnten gelegentlich eines Seuchenganges den Erreger in pathologisch veränderten Ovarien der Mutterhennen sowie in einigen Fällen im Eidotter feststellen und den Nachweis führen, daß Küken aus solchen Eiern von der Krankheit befallen werden. Später haben Jones, Gage, Rice u. a. diese Befunde bestätigt. Auch

Beller gelang die Züchtung des Erregers aus degenerierten Follikeln von Hennen sowie aus Küken, die im Ei abgestorben waren; er schließt sich der Auffassung, daß eine Übertragung des Krankheitskeimes von der Henne auf das Küken stattfindet, an. Diese aus infizierten Eiern schlüpfenden Küken verursachen eine Infektion des ganzen Bestandes, da sie mit ihren Fäzes den Erreger dauernd ausscheiden. Überstehen die Küken die Krankheit, so lokalisiert sich der Erreger häufig in ihren Ovarien. Beim späteren Eierlegen werden dann wieder infizierte Eier abgesetzt. (Jones, Rettger, Kirkpatrick und Jones, Rice, Doyle.) Der Prozentsatz der überlebenden Küken, die Bakterienträger werden, wird von den einzelnen Autoren verschieden angegeben. Rettger und seine Mitarbeiter fanden 23 Prozent, Rice 12—37 Prozent, Doyle 57 Prozent der Überlebenden mit *Bact. pullorum* infiziert. Solche Bakterienträger können die Krankheit auch durch Kontakt auf gesunde Küken sowie gesunde alte Hühner übertragen (Rettger, Kirkpatrick und Stoneburn, Doyle, Leynen), doch ist das erwachsene Huhn einer natürlichen Infektion gegenüber im allgemeinen wenig empfänglich. Bei Hähnen wird der Erreger nur verhältnismäßig selten angetroffen (Rettger, Kirkpatrick und Jones, Rice). Alle Autoren geben übereinstimmend an, daß der Hahn in der Verbreitung der Krankheit nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Der Einfluß des *Bacterium pullorum* auf die Schlüpfähigkeit der Eier ist zuerst von Jones untersucht worden. Er konnte zeigen, daß in künstlich infizierten Eiern der Embryo nach 15 Tagen abstarb. Beaudette, Bushnell und Payne sowie Leynen sind auf Grund ihrer Beobachtungen ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen, daß die Zahl der schlüpfenden Küken aus befruchteten Eiern, die von Bakterienträgern stammen, viel kleiner ist als die aus Eiern gesunder Hühner. Der Tod des Embryo kann jederzeit eintreten, doch ist im allgemeinen die Sterblichkeit am 19. Bruttage am größten. Ob allerdings in diesem Falle immer das *Bact. pullorum* als alleinige Ursache anzusehen ist, bleibt dahingestellt. Aus Eiern, deren Schale künstlich mit *Bact. pullorum* infiziert wurde, entwickelten sich gesunde Küken (Jones).

Zwischen der weißen Ruhr der Küken und der Paratyphose der Hühner bestehen bezüglich der Erreger sehr nahe Beziehungen, die zu klären schon von verschiedenen Seiten versucht wurde. Fast alle Autoren, die sich mit der Differenzierung befaßt haben, geben an, daß die beiden Erreger zwar in vieler Hinsicht einander ähneln, daß sich aber das *Bact. pullorum* durch zwei Merkmale wesentlich vom *Bact. paratyphosae*

teriae unterscheidet: Durch das Gasbildungsvermögen in verschiedenen Kohlehydraten und durch die fehlende bzw. schwächere Säurebildung in einzelnen Zuckerarten und Alkoholen (Smith und Ten Broeck, Rettger, und Koser, Goldberg, Mulsow, Gage Truche, Rice, Rebrassier, May und Goodner, Hendrickson, Beck und Eber.) Demgegenüber vertreten St. John-Brooks und Rhodes den Standpunkt, daß eine scharfe Trennung des Bact. pullorum vom Bact. paratyphosenteriae unzweckmäßig ist, da die Gasbildung des ersteren erheblich schwankt. Auch Beller kommt auf Grund seiner Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß eine sichere Unterscheidung der Kükenruhrbakterien vom Bact. paratyphosenteriae nicht möglich ist.

Die wissenschaftlich interessante Frage der Differenzierung zwischen beiden Erregern hat heute, nachdem die bakterielle weiße Kükenruhr in Deutschland festgestellt ist, zugleich große praktische Bedeutung für unsere heimischen Geflügelzüchter. Erst dann, wenn über das Vorliegen der einen oder anderen Infektion völlige Klarheit herrscht, kann eine zielbewußte Bekämpfung der Krankheit einsetzen. Die Erfahrungen der Amerikaner haben gelehrt, daß die weiße Ruhr, wenn sie erst einmal in einem Bestande herrscht, weit schwerer zu tilgen ist als die Paratyphosenterie.

Eigene Untersuchungen.

Um eine möglichst große Zahl von Pullorum- und Paratyphosenteriestämmen in die Untersuchung einzubeziehen, wurden mehrere Institute des In- und Auslandes um Überlassung solcher Stämme gebeten. Im ganzen wurden 29 Stämme des Bact. pullorum und 28 Stämme des Bact. paratyphosenteriae einer vergleichenden Prüfung unterzogen. Die im Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover vorhandenen Paratyphosenteriestämme, deren Eigenschaften bereits in einer früheren Arbeit (s. D. T. W. 1927, S. 267) beschrieben sind, wurden nochmals eingehend untersucht.

Die geprüften Bakterienstämme entstammen folgenden Instituten:

A. Dem Reichsgesundheitsamt:

1. Bact. pullorum Stamm Ovar I
2. Bact. pullorum Stamm Ovar III
3. Bact. pullorum Stamm Küken III

B. Dem Tierfeucheninstitut der Landwirtschaftskammer Hannover:

1. Bact. paratyphosenteriae Stamm 349
2. Bact. paratyphosenteriae Stamm 485
3. Bact. paratyphosenteriae Stamm 493
4. Bact. paratyphosenteriae Stamm 505
5. Bact. paratyphosenteriae Stamm 522
6. Bact. paratyphosenteriae Stamm 917
7. Bact. paratyphosenteriae Stamm 919
8. Bact. paratyphosenteriae Stamm 920

C. Dem Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer Breslau:

1. Bact. pullorum Stamm 1464
2. Bact. pullorum Stamm Winslow
3. Bact. paratyphosenteriae Stamm 178
4. Bact. paratyphosenteriae Stamm 368
5. Bact. paratyphosenteriae Stamm 463
6. Bact. paratyphosenteriae Stamm 1083
7. Bact. paratyphosenteriae Stamm 1951

D. Dem Laboratoire de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat in Curghem-Bruxelles:

1. Bact. pullorum Stamm I
2. Bact. pullorum Stamm II
3. Bact. pullorum Stamm III
4. Bact. pullorum Stamm IV
5. Bact. pullorum Stamm V

E. Der Tierärztlichen Hochschule Budapest:

1. Bact. pullorum Stamm M₅ (B-Stamm)
2. Bact. pullorum Stamm M₆ (A-Stamm)
3. Bact. pullorum Stamm M₇ (B-Stamm)
4. Bact. pullorum Stamm III (A-Stamm)
5. Bact. paratyphosenteriae Stamm Sang I

F. Dem Institut für Parasitäre- und Infektionskrankheiten in Utrecht:

1. Bact. pullorum Stamm 1
2. Bact. pullorum Stamm 2
3. Bact. pullorum Stamm 3
4. Bact. pullorum Stamm AA (A-Stamm)
5. Bact. pullorum Stamm F (A-Stamm)
6. Bact. pullorum Stamm A (B-Stamm)
7. Bact. pullorum Stamm T (B-Stamm)
8. Bact. paratyphosenteriae Stamm 1
9. Bact. paratyphosenteriae Stamm 2
10. Bact. paratyphosenteriae Stamm 3
11. Bact. paratyphosenteriae Stamm 4

G. Dem Reichseruminstitut Rotterdam:

1. Bact. pullorum Stamm Jlp
2. Bact. pullorum Stamm Ogd
3. Bact. pullorum Stamm Rod
4. Bact. pullorum Stamm Kw
5. Bact. pullorum Stamm Dr
6. Bact. paratyphosenteriae Stamm L
7. Bact. paratyphosenteriae Stamm M
8. Bact. paratyphosenteriae Stamm N
9. Bact. paratyphosenteriae Stamm W

H. Der Agricultural experiment Station in New Jersey U.S.A.:

1. Bact. pullorum Stamm L 268
2. Bact. pullorum Stamm L 436/3
3. Bact. pullorum Stamm L 601
4. Bact. paratyphosenteriae Stamm L 295
5. Bact. paratyphosenteriae Stamm L 403
6. Bact. paratyphosenteriae Stamm L 452
7. Bact. paratyphosenteriae Stamm 866/3

Dazu kommen zwei Paratyphosenteriestämme Leber und Milz 1931, die im Hygienischen Institut selbst isoliert wurden.

Die Untersuchung der aufgeführten Stämme erstreckte sich auf die Morphologie, Färbbarkeit, Beweglichkeit sowie das kulturelle, biochemische und agglutinatorische Verhalten. Außerdem wurden sämtliche Stämme im Mäusefütterungsversuch auf ihre Pathogenität geprüft.

Die zur Agglutinationsprüfung verwendeten Typhussera, Shiga-Kruseferum und ein Pullorumserum stammten vom Reichsgesundheitsamt dem Institut für Infektionskrankheiten „Robert Koch“, dem Hygienischen Institut der Universität Kiel und dem Veterinär-Laboratorium in Brüssel:

1. Typhusserum, Kan., Tit. 3000 R.G.A.,
2. Typhusserum, Pferd, Tit. 10 000 Inf. Rob. Koch,
3. Typhusserum, Kan., Tit. 50 000 Hyg. Inst. Univ. Kiel,
4. Shiga-Kruseferum, Kan., Tit. 1600 R.G.A.,
5. Pullorumserum, Tit. 10 000, Brüssel.

Für Überlassung der vorstehend aufgeführten Bakterienstämme und agglutinierenden Sera sei an dieser Stelle den genannten Instituten der verbindlichste Dank zum Ausdruck gebracht.

Außer den erwähnten Seris wurden noch drei selbsthergestellte monovalente Pullorumsera und ein polyvalentes Paratyphosenterieserum zur Agglutinationsprüfung mit verwendet:

1. Monovalentes Pullorumserum, Titer 20 000 [Schaf, intravenös mit dem Stamm Jlp Rotterdam (+ Gas, — Maltose) vorbehandelt],
2. Monovalentes Pullorumserum, Titer 20 000 [Schaf, intravenös mit dem Stamm I Brüssel (— Gas, — Maltose) vorbehandelt],
3. Monovalentes Pullorumserum, Titer 20 000 [Schaf, mit dem Stamm M₅ Budapest (— Gas, + Maltose) vorbehandelt],
4. Polyvalentes Paratyphosenterieserum, Titer 20 000. [Schaf, intravenös mit den Stämmen 368, 485, 493, 919, 920 und Leber 1931 vorbehandelt].

Die zur Agglutinationsprüfung benutzten Paratyphus-Enteritissera sind ebenfalls im Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule hergestellt.

I. Morphologische Untersuchungen.

Beide Bakterientypen stellen morphologisch kurze, plumpe, an den Enden abgerundete Stäbchen dar, die in ihrer Größe nicht unbeträchtliche Schwankungen auf-

weisen. Neben längeren Stäbchen werden häufig kürzere Formen und zuweilen fast kugelige Gebilde gefunden. Bei einigen Kükenruhrstämmen scheint die Stäbchenform vorherrschend zu sein, doch konnten konstante Unterschiede, wie sie Beller hinsichtlich der Länge der Erreger ermittelt hat, nicht festgestellt werden. Beide Bakterienarten neigen in gleichem Maße zur Fadenbildung.

Auch im färberischen Verhalten bestehen keine Differenzen zwischen beiden Erregern. Die Bakterien färben sich leicht mit den gewöhnlichen Anilinfarbstoffen, nehmen bei Verwendung von Methylenblau den Farbstoff nicht gleichmäßig gut an, so daß neben intensiv gefärbten Stäbchen schwächer tingierte zu erkennen sind. Der Gramfärbung gegenüber verhalten sich beide Typen negativ.

Bei der Untersuchung im Dunkelfeld und im hängenden Tropfen zeigen sowohl die Erreger der Kükenruhr wie die Bakterien der Paratyphenterie lebhaftes Molekularbewegung. Eigenbewegung ist bei keinem der geprüften Stämme nachzuweisen.

In Übereinstimmung hiermit stehen die Ergebnisse der Geißelfärbung nach Zettnow, mittels welcher sich keine Geißeln nachweisen ließen. Im Gegensatz zu den Befunden von Spiegl und Schmidt-Hoensdorf war selbst eine polare Geißel bei den Kükenruhrstämmen nicht zu ermitteln.

Zusammenfassung.

Morphologische und tinktorielle Unterschiede zwischen dem *Bact. pullorum* und *Bact. paratyphenteriae* sind nicht festzustellen.

II. Kulturelle Untersuchungen.

Das Wachstum der Kükenruhrstämmen auf Schrägagar ist nicht einheitlich. Zwölf Stämme zeigen nach 24stündigem Aufenthalt im Brutschrank einen äußerst zarten, hauchartigen, weißlich durchscheinenden Belag, der sich von dem kräftigen Wachstum der Paratyphenteriestämme ohne weiteres unterscheidet. Die übrigen Pullorumstämmen wachsen auf Schrägagar jedoch verhältnismäßig üppig, so daß keine Wachstumsunterschiede gegenüber den Paratyphenteriebakterien zu erkennen sind. Nach Goldberg, Rice, Doyle, May und Goodner, de Blicke, Hendrickson, Beller, Beck und Eber u. a. soll sich das *Bact. pullorum* durch zarteres Wachstum auf Agar vom *Bact. paratyphenteriae* unterscheiden. Diese Beobachtung traf nur für einen Teil der geprüften Kükenruhrstämmen zu.

Auf der Conradi-Drigalski-Platte zeigen die meisten Pullorum-Stämme, ausgenommen die auf Agar üppig wachsenden, sehr zartes blaues Wachstum gegenüber dem üppigen blauen Impfrasen der Paratyphenteriebakterien. Einzelkolonien des *Bact. pullorum* sind nach 24stündiger Bebrütung äußerst fein, makroskopisch kaum erkennbar, kreisrund, bläulich durchscheinend; sie nehmen auch in den nächsten Tagen nur wenig an Umfang zu und erreichen durchschnittlich nur die Größe einer Stecknadelspitze. Die Kolonien des *Bact. paratyphenteriae* sind bereits nach 24stündigem Aufenthalt im Brutschrank deutlich sichtbar und haben nach einigen Tagen häufig die Größe eines Stecknadelkopfes.

Die auf der Gassnerplatte gewachsenen Einzelkolonien des *Bact. pullorum* weisen keine besonderen Merkmale auf. Nach 24stündiger Bebrütung bei 37 Grad C sind hirsekorn- bis kleinlinsengroße, an der Oberfläche glänzende, durchsichtige Kolonien mit glatter Umrandung erkennbar, die die Farbe des Nährbodens angenommen haben. Im Gegensatz hierzu zeigen 13 Stämme des *Bact. paratyphenteriae* (178, 349, 368, 463, 485, 493, 505, 917, 919, 920, 1083, Leber und Milz 1931) nach 48 Stunden deutlich Schleimwalle bzw. Schleimwallreste, während die anderen 15 Paratyphenteriestämme Schleimwalle oder Reste vermissen

lassen. Bei *Bact. pullorum* kam Schleimwallbildung niemals zur Beobachtung.

Gelatine wird von beiden Bakterienarten nicht verflüssigt, Indol von keinem der untersuchten Stämme gebildet.

Zusammenfassung.

Die Erreger der Kükenruhr unterscheiden sich im allgemeinen durch zarteres Koloniewachstum auf Agar und auf Conradi-Drigalskiplatten vom *Bact. paratyphenteriae*, häufig werden jedoch auch üppig wachsende Pullorumstämmen getroffen. Die Schleimwallbildung der Paratyphenteriebakterien auf der Gassnerplatte ist ebenfalls inkonstant, bei einem Teil der Paratyphenteriestämme fehlt sie.

III. Biochemische Untersuchungen.

Pullorumstämmen vergären Milchsüßzuckerbouillon nicht und lassen Barsiekow-Milchsüßzuckerlösung unverändert. In Traubenzuckerbouillon zeigen sie ein unterschiedliches Verhalten. 15 Stämme bilden in diesem Medium Gas, die übrigen 14 Stämme vergären Traubenzucker nicht. Man muß demnach zwischen gasbildenden und nicht gasbildenden Stämmen das *Bact. pullorum* unterscheiden. Nach Rettger und Koser, Goldberg und Hadley verlieren gasbildende Stämme auch nach jahrelanger Fortzucht auf künstlichen Nährböden diese Eigenschaft nicht. Hadley teilte deshalb das *Bact. pullorum* in zwei Gruppen, A und B, ein; der gaslose Typus B soll in seinen sonstigen Eigenschaften vollkommen dem gasbildenden Typus A gleichen. De Blicke und Hendrickson wollen ebenfalls eine Unterscheidung zwischen den beiden Typen durchgeführt wissen. Die Mehrzahl der Autoren, Smith und Ten Broeck, Edington, de Blicke, Rice, Doyle, Hendrickson sowie Beck und Eber stimmen jedoch überein, daß die gasbildende Fähigkeit des Erregers außerordentlich schwankt und Stämme das Gasbildungsvermögen durch Zucht verlieren oder gewinnen können. Aus diesem Grunde halten Rice und Doyle eine Unterscheidung in zwei Typen für unzweckmäßig, zumal gasbildende und gaslose Stämme des *Bact. pullorum* für Küken und erwachsene Hühner gleich pathogen sind (Doyle).

Barsiekow-Traubenzuckerlösung wird von sämmtlichen Pullorumstämmen innerhalb 24 Stunden gerötet und spätestens nach fünf Tagen zur Gerinnung gebracht. In Lackmusmolke tritt nach 24 Stunden Rötung ein, doch schlägt die Farbe bei den meisten Stämmen innerhalb drei Wochen in Blau um. Drei Stämme (Ovar III R.G.A., Küken 2 und Stamm F) lassen die Molke jedoch dauernd gerötet. Neutralrotagar bleibt im allgemeinen unverändert, nur die beiden stark gasbildenden Stämme (Küken IIp und Dr) bewirken Gasbildung und Fluoreszenz.

Die Paratyphenteriestämme bilden in Traubenzuckerbouillon niemals Gas und unterscheiden sich durch diese Eigenschaft wesentlich von den gasbildenden Typen des *Bact. pullorum*. Diese Befunde stehen in Übereinstimmung mit denen von Smith und Ten Broeck, Rettger und Koser, Goldberg, Mulsow, Gage, Truche, Rebrassier, Doyle, May und Goodner, Hendrickson, Beck und Eber, die eine Differenzierung zwischen den beiden Bakterienarten auf Grund der Gasbildung vorgenommen haben. Das Verhalten der Paratyphenteriestämme in den übrigen Nährböden der „bunten Reihe“ unterscheidet sich nur in geringem Grade von den Pullorumstämmen. Lackmusmolke wird innerhalb 24 Stunden gerötet, der Umschlag in Blau tritt spätestens nach zehn Tagen ein. Dauernde Rötung der Lackmusmolke wird bei keinem Stamm beobachtet. Neutralrotagar bleibt stets unverändert.

Ferner wurden die Stämme auf das Säure- und Gasbildungsvermögen gegenüber verschiedenen Zuckerarten und höheren Alkoholen geprüft. Die Feststellung der Säurebil-

derung erfolgte in Lachmusnutrofelösung unter 1 Prozent Zusatz der Zucker bzw. höheren Alkohole. Die Gasbildung wurde in Liebigbouillon, der die Zucker und Alkohole ebenfalls in 1prozentiger Konzentration zugesetzt waren, ermittelt.

Eine Differenzierung der Pullorum- und Paratyphusstämmen auf Grund der Gasbildung ergibt sich lediglich in ihrem Verhalten gegenüber Arabinose. Während die Paratyphusstämmen in Arabinosebouillon niemals Gas bilden, lassen die Pullorumstämmen in diesem Nährboden zum Teil Gasbildung erkennen. Die Gasbildung ist aber, abgesehen von den beiden starken Gasbildnern (Stämme Ilp und Dr) keineswegs deutlich ausgeprägt und einheitlich, da drei Stämme (Küken Winslow, M 6, AA), die sich durch ihr Verhalten in Traubenzuckerbouillon als Gasbildner zu erkennen gegeben hatten, diese Fähigkeit in Arabinose vermissen lassen. Es scheint demnach bei diesen Stämmen die Eigenschaft der Gasbildung im Laufe der Züchtung verloren gegangen zu sein. In den übrigen Zuckern und Alkoholen bilden beide Bakterienarten kein Gas, so daß eine Differenzierung zwischen den Erregern der Kükenruhr und Paratyphus nicht möglich ist. Im Gegensatz zu den diesseitigen Ergebnissen haben Rettger und Koser, Goldberg, Rebrassier, Hendrickson, Beck und Eber u. a. auch in Mannitbouillon Gasbildung der Pullorumstämmen nachgewiesen.

Die Pullorumstämmen bilden in Arabinose bis auf einen Stamm, in Mannit jedoch ausnahmslos Säure. Saccharose, Raffinose und Sorbit werden von sämtlichen Kükenruhrstämmen unverändert gelassen. Maltose wird nur von den vier aus Budapest und Utrecht erhaltenen B-Stämmen und dem Stamm Küken 3 unter Säurebildung gespalten. Alle übrigen Stämme des Bact. pullorum lassen diesen Zucker unbeeinflusst. In Dulcitol bilden elf Stämme Säure, während 18 Stämme diesen Alkohol nicht verändern.

Die Paratyphusstämmen bilden in Arabinose, abgesehen von den Stämmen 463 und Sang I, ebenfalls Säure. Auch in Saccharose, Raffinose, Mannit und Sorbit zeigen sie das gleiche Verhalten wie die Pullorumstämmen. Dagegen bilden in Maltose die Erreger der Paratyphus bis auf zwei Stämme (Huhn 2 und Küken N) und in Dulcitol bis auf den Stamm L 866/3 regelmäßig Säure.

Nach Smith und Ten Broeck, Rettger und Koser, Goldberg, Krumwiede und Kohn, Gage, Rebrassier, Rice, May und Goodner, Hendrickson, Beller, Beck und Eber soll sich das Bact. pullorum durch seine geringere Aktivität in Maltose, Dextrin und Dulcitol vom Bact. paratyphus unterscheiden. Mulsow, Edington und Rice haben jedoch bei einigen Stämmen des Bact. pullorum in Maltose geringe Säurebildung nach 14 Tagen beobachtet, so daß der Wert dieses Zuckers als Differenzierungsmittel erheblich eingeschränkt wird. May und Goodner messen dem Dulcitol besondere Bedeutung zur Unterscheidung beider Bakterienarten zu.

Auf Grund der vorliegenden Untersuchungen ist eine Differenzierung sämtlicher Pullorumstämmen von den Erregern der Paratyphus nicht möglich. Lediglich die 15 gasbildenden Stämme und der gaslose Stamm Küken 2, die Maltose und Dulcitol unverändert lassen, unterscheiden sich in ihren biochemischen Eigenschaften einwandfrei von dem Paratyphusbakterium. Von den übrigen 13 Kükenruhrstämmen greifen dagegen 10 Stämme Maltose bzw. Dulcitol und drei Stämme sowohl Maltose wie Dulcitol unter Säurebildung an. Dabei ist die Säurebildung keineswegs gering oder erst nach mehreren Tagen erkennbar; sie tritt vielmehr wie bei den Paratyphusstämmen meistens nach 24 Stunden und nur ausnahmsweise nach 2—3 Tagen erst hervor. Aus diesem Grunde können die zehn in Maltose oder in Dulcitol säurebildenden Pullorumstämmen nicht mit Sicherheit als solche identifiziert werden, will man nicht die Entschei-

dung von dem Verhalten der Stämme in Maltose oder Dulcitol allein abhängig machen. Abgesehen davon, daß eine solche Maßnahme in Widerspruch stände zu den Angaben in der Literatur, erscheint es auch nicht zweckmäßig, eine Differenzierung lediglich von dem Gesichtspunkte aus vorzunehmen, zumal auch Maltose- bzw. Dulcitol-negative Paratyphusstämmen, wie aus den Untersuchungen hervorgeht, gefunden werden. Die drei Maltose und Dulcitol verändernden Stämme (Küken 3, A, T) gleichen biochemisch vollkommen dem Erreger der Paratyphus.

Zur Unterscheidung des Bact. pullorum vom Bact. paratyphus bedienten sich Rettger und Koser ferner mit Erfolg des Methylrots. 4—5 Tropfen Methylrotlösung werden einer fünf Tage alten Maltose-Bouillonkultur zugesetzt. Bei Beimpfung der Röhren mit Bact. paratyphus soll Rotfärbung (Methylrot-positiv) eintreten, während Kulturen des Bact. pullorum einen gelben Farbton (Methylrot-negativ) annehmen.

Die Pullorumstämmen verhalten sich bei Anwendung dieser Probe ungleichmäßig. 16 Stämme, die biochemisch bereits als typische Pullorumstämmen erkennbar waren, nahmen den charakteristischen gelben Farbton an. Die übrigen 13 Kükenruhrstämmen, die in Maltose oder Dulcitol bzw. in beiden Medien Säure gebildet hatten, zeigten jedoch deutliche Rotfärbung. Sie verhalten sich demnach wie die Paratyphusstämmen, bei denen im allgemeinen Rötung zu beobachten ist. Nur die beiden Stämme Huhn 2 und Küken N, die Maltose nicht verändert hatten, machen hierin eine Ausnahme, indem sie Gelbfärbung des Nährbodens erkennen lassen. Sie nähern sich damit in ihren biochemischen Eigenschaften den Pullorumstämmen, ohne daß es möglich wäre, sie einwandfrei als solche anzusprechen, da sie Dulcitol unter Säurebildung angreifen.

Zusammenfassung.

In der bunten Reihe unterscheiden sich die gasbildenden Pullorumstämmen (A-Typen) durch das Gasbildungsvermögen in Traubenzuckerbouillon von den Paratyphusbakterien; gaslose Kükenruhrstämmen (B-Typen) sind dadurch nicht vom Bact. paratyphus zu trennen.

In dem Verhalten gegenüber höheren Zuckerarten und Alkoholen differenzieren sich die meisten A-Stämme des Bact. pullorum ebenfalls durch ihre Gasbildung in Arabinosebouillon von den Paratyphusbakterien, doch kann diese Eigenschaft bei einzelnen A-Stämmen fehlen. Durch die Säureinaktivität in Maltose und Dulcitol sowie den negativen Ausfall der Methylrotprobe in Maltosebouillon unterscheiden sich sowohl gasbildende wie nicht gasbildende Pullorumtypen einwandfrei von dem Erreger der Paratyphus. Dagegen sind Bakterienstämmen von Küken oder Hühnern, die entweder in Maltose oder in Dulcitol Säure bilden, nicht mit Sicherheit als Pullorumstämmen anzusprechen, wenn sie gleichzeitig Methylrot-positiv sind. Solche Stämme scheinen in der Gesamtheit ihrer Eigenschaften dem Paratyphusbakterium näher zu stehen als dem Erreger der Kükenruhr. Bakterienstämmen, die sowohl Maltose als auch Dulcitol unter Säurebildung angreifen, müssen ohne weiteres dem Paratyphusbakterium zugerechnet werden, da sie auch Methylrot-positiv sind.

IV. Agglutinatorische Untersuchungen.

Die Pullorumstämmen und zwar sowohl die gasbildenden wie die nichtgasbildenden werden von den vier homologen Seris durchschnittlich in 25 bis 75 Prozent der Titerhöhe beeinflusst. Nur einige Stämme werden bis zum Titer agglutiniert. Paratyphuserum hatte fast die gleiche Wirkung auf die Pullorumstämmen, teilweise agglutinierte es diese Stämme sogar noch etwas höher als die homologen Sera. Sämtliche Typhusera beeinflussten die Kükenruhrstämmen geringgradig, das vom R.G.A. bezogene Serum jedoch teilweise bis 33 Prozent des Titers. Auf acht

Stämme hatte das Typhuserum keine Wirkung. Gärtner-Serum agglutinierte die Pullorumstämme regelmäßig stark, so daß irgendwelche agglutinatorischen Unterschiede gegenüber den homologen Seris und dem Paratyphuserum kaum erkennbar waren. Durch Abortus equi-Serum und Breslau-Serum wurden die Pullorum-Stämme regelmäßig geringgradig, durch Para-B-(Schottmüller)-Serum jedoch nur ausnahmsweise schwach beeinflusst. Supestifer-Serum und Shiga-Kruse-Serum hatten keinen Einfluß.

Die Paratyphuseriestämme wurden durch die Kükenruhr-Sera und das homologe Serum ebenfalls hoch agglutiniert (25—100 Prozent des Titers); eine stärkere Beeinflussung durch das homologe Serum ist auch bei diesen Stämmen, von geringen Schwankungen abgesehen, nicht festzustellen. Drei Typhus-Sera hatten auf die Paratyphuseriestämme ähnliche Wirkung wie auf die Pullorumstämme. Weitgehende Übereinstimmung beider Bakterienarten äußert sich fernerhin in hoher Agglutination der Paratyphuseriebakterien durch Gärtner-Serum (25—75 Prozent des Titers). Abortus equi-Serum und Breslau-Serum hatten auf Paratyphuseriestämme regelmäßig geringgradige Wirkung, während Para-B-Serum nur einige Stämme schwach agglutinierte. Supestifer-Serum und Shiga-Kruse-Serum verhielten sich Paratyphuseriestämmen gegenüber vollkommen negativ.

Die Verläufe zeigen, daß enge serologische Beziehungen zwischen Bact. pullorum und Bact. paratyphuseriae bestehen. Das Bact. pullorum wird sowohl vom homologen Serum wie vom Paratyphuser-Serum fast immer gleich hoch agglutiniert. Ebenso wird auch Bact. paratyphuseriae vom spezifischen Serum und vom Kükenruhr-Serum gleich stark beeinflusst. Beide Erreger lassen nahe verwandtschaftliche Beziehungen zum Bact. enteritidis Gärtner, in geringem Grade auch zum Bact. typhi hominis erkennen, während sie von Breslau- und Abortus equi-Serum nur wenig beeinflusst werden. Schottmüller-Serum hat auf beide Typen nur ausnahmsweise geringe Wirkung.

Diese Agglutinationsergebnisse stimmen mit denen von Smith und Ten Broeck, Rettger und Koser, Krumwiede und Kohn, Mulsow, Edington, May und Goodner, Hendrickson, Beck und Eber u. a. überein, die ebenfalls weitgehende serologische Ähnlichkeiten beider Erreger feststellten und daraus folgerten, daß eine Unterscheidung des Bact. pullorum vom Bact. paratyphuseriae durch die Agglutination nicht möglich ist. Auch im Castellianischen Abfärbungsversuch konnten Hendrickson sowie Beck und Eber einen Unterschied zwischen beiden Erregern nicht ermitteln. Nach Matthews besteht jedoch die Möglichkeit, das Bact. pullorum vom Bact. paratyphuseriae mittels der Agglutination zu trennen, wenn frisch isolierte Stämme der beiden Erreger (nicht älter als 30 Tage) zur Prüfung benutzt werden. Längere Fortzüchtung auf künstlichen Nährböden beeinflusst nach Matthews sowohl die Agglutination wie die antigenen Eigenschaften der Erreger.

Während bei diesseitigen Agglutinationsprüfungen regelmäßige starke Beeinflussung beider Erreger durch Gärtner-Serum festgestellt wurde, (25—75 Prozent des Titers), fand Beller nur in zwei Fällen geringe serologische Beziehungen seiner Kükenruhr-Stämme zum Bact. enteritidis Gärtner (2 Prozent des Titers). Die meisten der von Beller geprüften Pullorumstämme sowie die drei vergleichsweise untersuchten Paratyphuseriestämme agglutinierten aber mit Gärtner-Serum überhaupt nicht. Auffällig ist, daß die vom R.G.A. erhaltenen Stämme Ovar I, Ovar III und Küken III mit dem diesseits benutzten Gärtner-Serum ebenfalls in 75—100 Prozent der Titerhöhe agglutinierten.

Zusammenfassung.

Beide Bakterienarten agglutinieren sowohl mit homologem wie mit heterologem Serum gleich hoch, so daß eine

Differenzierung des Bact. pullorum vom Bact. paratyphuseriae mittels der Agglutination nicht möglich ist. Zum Bact. enteritidis Gärtner zeigen sie außerordentlich nahe, zum Bact. typhi hominis geringe serologische Beziehungen. Von Paratyphus abortus equi- und Breslauserum werden sie regelmäßig geringgradig, von Para-B-Serum nur in Ausnahmefällen schwach agglutiniert.

V. Mäufefütterungsversuch.

Im Mäufefütterungsversuch erwies sich nur der Stamm Bact. pullorum IV (Brüssel) pathogen. Zweit mit diesem Stamm gefütterte Mäuse starben nach elf Tagen; in der Leber wurden kleinste nekrotische Herde nachgewiesen, die Milz war geschwollen. Aus dem Herzblut konnte der Erreger rein gezüchtet werden.

Schlußbetrachtung.

1. Morphologische Unterschiede zwischen Bact. pullorum und Bact. paratyphuseriae bestanden nicht.

2. Auf Agar und auf der Conradi-Drigalski-Platte unterschied sich ein Teil der Kükenruhrstämme (etwa 50 Prozent) durch das zartere Koloniewachstum von den Erregern der Paratyphuserie. Die übrigen Pullorum-Stämme zeigten auf den genannten Nährböden das gleiche üppige Wachstum wie die Paratyphuseriestämme.

Das Schleimwallbildungsvermögen auf der Gassnerplatte konnte evtl. zur Differenzierung verwendet werden.

3. In der „bunten Reihe“ unterschieden sich nur die A-Typen des Bact. pullorum durch Gasbildung in Traubenzuckerbouillon vom Bact. paratyphuseriae.

4. Biochemisch zeigte etwa die Hälfte der Pullorum-Stämme (16 Stämme) Säureinaktivität in Maltose und Dulcitol sowie negativen Ausfall der Methylrotprobe. Die übrigen Kükenruhrstämme konnten von den Paratyphuseriestämmen nicht mit Sicherheit getrennt werden, da sie teils in Maltose, teils in Dulcitol (10 Stämme) oder sogar in beiden Medien (3 Stämme) Säure bildeten sowie gleichzeitig methylrotpositiv waren.

5. Eine Unterscheidung beider Erregertypen mittels Agglutination war nicht möglich.

Aus den Untersuchungen ergab sich also, daß von den 29 geprüften Pullorumstämmen 16 Stämme hinsichtlich ihres biochemischen Verhaltens vollkommen mit dem Bact. pullorum und drei Stämme mit dem Bact. paratyphuseriae übereinstimmten. Die übrigen 10 Kükenruhrstämme schienen zwischen beiden Typen zu stehen, da sie teils Maltose, teils Dulcitol unter Säurebildung angriffen. Ihre verhältnismäßig große Zahl, etwa 35 Prozent der untersuchten Stämme, deutet darauf hin, daß solche Zwischenstufen ziemlich häufig vorkommen.

Auf Grund der Angaben in der Literatur sowie meiner eigenen Untersuchungen wäre die Definition des Bact. pullorum und des Bact. paratyphuseriae folgendermaßen zu fassen:

1. Das Bact. pullorum ist ein gramnegatives, unbewegliches Kurzstäbchen von meist zartem Kolonietypus, das fast immer Traubenzucker vergärt, Maltose und Dulcitol unverändert läßt, in der Methylrotprobe nach Rettger und Koser ein gewöhnlich negatives Verhalten zeigt und agglutinatorisch außerordentlich nahe Beziehungen zum Bact. paratyphuseriae und zum Bact. enteritidis Gärtner aufweist.

2. Das Bact. paratyphuseriae ist ein gramnegatives, unbewegliches Kurzstäbchen mit meist üppigem Koloniewachstum und häufiger Schleimwallbildung, das Traubenzucker niemals vergärt, Maltose und Dulcitol fast immer unter Säurebildung angreift, in der Methylrotprobe ein positives Verhalten zeigt und agglutinatorisch außerordentlich nahe Beziehungen zum Bact. pullorum und zum Bact. enteritidis Gärtner aufweist.

Kuturales und biochemisches Verhalten.

Stamm	Milch-zucker-bouillon	Trauben-zucker-bouillon	Lackmus-molke (Kahlbaum)	Neutralrot-agar	Gassner-platte	Methylrot-probe nach Rettger und Koser	Stamm	Milch-zucker-bouillon	Trauben-zucker-bouillon	Lackmus-molke (Kahlbaum)	Neutralrot-agar	Gassner-platte	Methylrot-probe nach Rettger und Koser
A. Bacterium pullorum:	Trübung						B. Bact. paradysenteriae:	Trübung					
	Gas	Gas	Rötg., spät Umschlag in Blau	unverändert	Dunkel-grüne un-differenz-Kolonien	+		Gas	Gas	Rötung, v. 4. Tag ab Umschlag in Blau	unverändert	Schleim-wall	+
Ovar I	—	—	Rötung	"	"	+	Huhn 349	—	—	"	"	"	+
Ovar III	—	—	Rötg., spät Umschlag in Blau	"	"	+	Huhn 485	—	—	"	"	"	+
Küken III	—	—	"	"	"	+	Huhn 493	—	—	"	"	"	+
Küken 1464	—	+	"	"	"	—	Huhn 505	—	—	"	"	"	+
Küken Winslow	—	+	"	"	"	—	Küken 522	—	—	"	"	Dunkel-grüne un-differenz-Kolonien	+
Küken I	—	—	"	"	"	+	Huhn 917	—	—	"	"	Schleim-wall	+
Küken II	—	—	"	"	"	+	Huhn 919	—	—	"	"	"	+
Küken III	—	—	"	"	"	+	Huhn 920	—	—	"	"	"	+
Embryo IV	—	—	"	"	"	+	Huhn Leber 1931	—	—	"	"	Schleim-wallreste	+
Ovar V	—	—	"	"	"	+	Huhn Milz 1931	—	—	"	"	"	+
Küken M ₆ (A-St.)	—	+	"	"	"	—	Huhn 178	—	—	"	"	Schleim-wall	+
Küken III (A-St.)	—	+	"	"	"	+	Huhn 368	—	—	"	"	"	+
Küken M ₆ (B-St.)	—	—	"	"	"	+	Huhn 463	—	—	"	"	"	+
Huhn M ₇ (B-St.)	—	—	"	"	"	—	Huhn 1083	—	—	"	"	"	+
Küken 1	—	—	"	"	"	—	Küken 1951	—	—	"	"	Dunkel-grüne un-differenz-Kolonien	+
Küken 2	—	—	Rötung	"	"	+	Huhn Sang I	—	—	"	"	"	+
Küken 3	—	—	Rötg., spät Umschlag in Blau	"	"	+	Huhn 1	—	—	"	"	"	+
Küken AA (A-St.)	—	+	"	"	"	—	Huhn 2	—	—	"	"	"	+
Küken F (A-St.)	—	+	Rötung	"	"	—	Huhn 3	—	—	"	"	"	+
Küken A (B-St.)	—	—	Rötg., spät Umschlag in Blau	"	"	+	Huhn 4	—	—	"	"	"	+
Küken T (B-St.)	—	—	"	"	"	+	Küken L	—	—	"	"	"	+
Küken Jip	—	+	"	+ Gas Fluoreszenz	"	—	Küken M	—	—	"	"	"	+
Küken Odg	—	+	"	unverändert	"	—	Küken N	—	—	"	"	"	+
Küken Rod	—	+	"	"	"	—	Huhn W	—	—	"	"	"	+
Küken Kw	—	+	"	"	"	—	Huhn L 295	—	—	"	"	"	+
Küken Dr	—	+	"	+ Gas Fluoreszenz	"	—	Huhn L 403	—	—	"	"	"	+
Küken L 268	—	+	"	unverändert	"	—	Huhn L 452	—	—	"	"	"	+
Huhn L 436/3	—	+	"	"	"	—	Huhn L 866/3	—	—	"	"	"	+
Huhn L 601	—	+	"	"	"	—							

Barsiekow — Milhzucker stets unverändert; Barsiekow Traubenzucker Rötung; + Gerinnung; Gelatine nicht verflüssigt.

Hiernach die unterfuchten Pullorumstämme einzugruppieren, gelingt nur bei den vorher bezeichneten 16 Stämmen. Von den übrigen 13 Stämmen gleichen drei dem Bact. paradysenteriae, 10 Stämme stehen zwischen beiden Erregertypen. Um eine Eingruppierung dieser Zwischenstufen zu ermöglichen, wären sie am besten dem Bakterium zuzurechnen, mit dem sie die meiste biochemische Übereinstimmung zeigen. Es wären also Bakterienstämme, die Maltose angreifen und Dulcit unverändert lassen (oder umgekehrt), wenn sie Methylrot-positiv sind, dem Bact. paradysenteriae, sofern sie Methylrot-negativ sind, dem Bact. pullorum zuzurechnen. Ob die Art der Unterscheidung durchführbar ist, muß noch weiteren Untersuchungen überlassen werden.

Literatur.

Beaudette, F. R.: Bacillary white diarrhea. Poultry science 1925, IV, S. 205. Beaudette, F. R., Bushnell, L. D. and Payne, L. F.: Relation of bacterium pullorum to hatchability of eggs. Journ. of infect. diseases. 1923, 33, S. 331. Beck und Eber: Bakterielle weiße Ruhr der Küken. Arch. für wiss. und prakt. Tierheilkunde 1927, 56, S. 121. Beller: Bakterielle Kükenruhr (fog. weiße Ruhr) und ihre Beziehungen zum Hühnertyphus. Arb. a. d. R.G.A. 1926, 57, S. 462. De Blieck: Diskussionsbemerkung zu Rice: The more important bacterial and protozoal diseases of poultry. S. 57. Dalling, Th. and Allen, H. R.: Bacillary white diarrhoea

of chicks. The Vet. Journ. 1924, 80, S. 442. Doyle, T. M.: Bacillary white diarrhoea of chicks. Journ. of comp. path. and therapeutics 1925, 38, S. 266. Edington, J. W.: The bacteriological study of fowl typhoid and allied infections with special reference to three epidemics. Journ. of Path. and Bact. 1924, 27, S. 427. Gage, G. E.: Notes on ovarian infection with bacterium pullorum (Rettger) in the domestic fowl. Journ. of med. research. 1911, 24, S. 491. Derselbe: Concerning the diagnosis of bacterium pullorum infection in the domestic fowl. Mass. Agr. Exp. Stat. Tech. Bul. 5, 1922, S. 88. Zit. nach May and Godoner. Goldberg, S. A.: A study of the fermenting properties of bact. pullorum (Rettger) and bact. sanguinarium (Moore). Journ. of the American Vet. Med. Ass. 1917, 51, S. 203. Gressel: Vergleichende Untersuchungen über das Bacterium paradysenteriae (Bact. gallinarum Klein, Bact. sanguinarium Moore, Bact. typhi gallinarum, alcalifaciens Pfeiler). D. T. W. 1927, S. 267. Hadley, P. B., Caldwell, D. W., Elkins, M. W. and Lambert, D. J.: Infections caused by bacterium pullorum in adult fowls. Agric. experim. Stat. of the Rhode Island State College. Bul. 172, 1917, S. 40. Zit. nach Beaudette, Poultry science 1925, IV, S. 205. Hadley, P. B., Elkins, M. W. and Caldwell, D. W.: The colon-typhoid intermediates as causative agents of disease in birds. I. The paratyphoid bacteria. Agric. experim. stat. of the Rhode Island State College. Bul. 174, 1918, S. 216. Zit. nach May and Goodner. Hendrickson, J. M.: The differentiation of bact. pullorum (Rettger) and bact. sanguinarium (Moore). Journ. of the Americ. Vet. Med. Ass. 1927, 70, S. 629.

Referat D. T. W. 1927, 26, S. 425. Jones, F. S.: Fatal septicemia or bacillary white diarrhea in young chickens. Report of the New York State Vet. College 1910, S. 111. Derselbe: Further studies on bacillary white diarrhea in young chickens. Report of the New York State Vet. College, 1911, S. 69. Derselbe: An outbreak of an acute disease in adult fowls, due to bact. pullorum. Journ. of med. research. 1913, 27, S. 471. Klein, E.: Über eine epidemische Krankheit der Hühner, verursacht durch einen Bazillus — *Bacillus gallinarum* —. Zbl. für Bakt. (Orig.) 1889, 5, S. 689. Derselbe: Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der infektiösen Hühnerenteritis. Zbl. f. Bakt. (Orig.) 1889, 6, S. 257. Krumwiede, C. Jr. and Kohn, L. A.: Studies on the paratyphoid-enteritis group. IV. The differentiation of the members of the paratyphoid-enteritis group from bact. typhosus with special reference to the anaerogenic strains and observations on the fermentative characteristics of the avian types. Journ. of Med. Research. 1917, 36, S. 509. Leynen: La diarrhée blanche bacillaire en Belgique. Ann. de Méd. Vét. 1927. Manninger: Bakterielle weiße Ruhr der Küken. Allatorvosi Lapok. 1921, S. 111. Referat: D. T. W. 1922, S. 657. Matthews, F. P.: The agglutinative and antigenic properties of salmonella pullora and eberthella sanguinaria. Journ. of the American Vet. Med. Ass. 1926, 69, S. 370. May, H. G. and Goodner, K.: Comparative studies on salmonella gallinarum and salmonella pullorum. Agric. experim. Stat. of the Rhode Island State College, Bul. 204, 1926. Moore, V. A.: Infectious Leukaemia in fowls — a bacterial disease frequently mistaken for fowl-cholera. Ann. Rep. of the Bureau of Anim. Industry 1895/96. Washington 1897, S. 185. Zit. nach Baumgarten, Jahresber. über pathogene Mikroorganismen, 1897, S. 702. Mulrow, F. W.: The differentiation and distribution of the paratyphoid-enteritis group. VI. Avian paratyphoid bacilli: A comparative study of bact. pullorum and bact. sanguinarum. Journ. of infect. Diseases. 1919, 25, S. 135. Pfeiler, W. und Rehse, A.: *Bacillus typhi gallinarum* alcalifaciens und die durch ihn verursachte Hühnerseuche. Mitt. des Kais. Wilh.-Inst. für Landw. in Bromberg, 1913, 5, S. 306.

Rebrassier, R. E.: Studies of salmonella pullora. Journ. of the American Vet. Med. Ass. 1926, 68, S. 603. Rettger, L. F.: Septicaemia among young chickens. The New York Med. Journ. 1900, 71, S. 803. Derselbe: Septicaemia in young chickens. The New York Med. Journ. 1901, 73, S. 267. Rettger, L. F. and Harvey, S. C.: Fatal septicemia in young chickens, or „white diarrhea“. Journ. of Med. Research, 1908, 18, S. 277. Rettger, L. F.: Further studies on fatal septicemia in young chickens or „white diarrhea“. Journ. of Med. Research. 1909, 21, S. 115. Rettger, L. F. and Stoneburn, F. H.: Bacillary white diarrhea of young chicks. Storrs agric. experim. Station Bul. 60. 1909, S. 24. Derselben: Bacillary white diarrhea of young chicks. Storrs agric. experim. Station Bul. 68. 1911, S. 22. Rettger, L. F., Kirkpatrick, W. F. and Stoneburn, F. H.: Bacillary white diarrhea of young chicks. Storrs agric. experim. Station. Bul. 74, 1912, S. 32. Rettger, L. F., Kirkpatrick, W. F. and Jones, R. E.: Bacillary white diarrhea of young chicks. Storrs agric. experim. Station. Bul. 77, 1914, S. 46. Derselben: Bacillary white diarrhea of young chicks. Storrs agric. experim. Stat. Bul. 85, 1915, S. 16. Derselben: Bacillary white diarrhea of young chicks. Storrs agric. experim. Stat. Bul. 88, 1916, S. 7. Rettger, F. L. and Koser, S. A.: A comparative study of bacterium pullorum (Rettger) and bacterium sanguinarum (Moore). Journ. of Med. Research, 1916/17, 35, S. 443. Rice, J. P.: The more important bacterial and protozoal diseases of poultry. Verlag Hudson and Son, Birmingham and London. Smith, Th. and Ten Broeck, C.: A note on the relation between b. pullorum (Rettger) and the fowl typhoid bacillus (Moore). Journ. of Med. Research. 1915, 31, S. 547. Spiegl und Schmidt-Hoensdorf: Die bakterielle Kükenruhr und ihre Bekämpfung. Arch. für wissl. und prakt. Tierheilkunde 1927, 56, S. 314. St. John-Brooks, R. and Rhodes, M.: The organism of the fowl typhoid group. Journ. of Path. and Bact. 1923, 26, S. 433. Truche, G.: De la typhose aviaire. Rev. vét. 1924, S. 164. (Ann. Inst. Pasteur. 37, S. 478.)

Aus der geburtschilflichen Praxis.

Von Dr. Becker, prakt. Tierarzt, Bevensen (Hannover).

Unter dieser Überschrift gibt Kollege Walch*) seine Ansicht und Erfahrungen über Hilfeleistungen bei erschwerter Geburt bekannt und meint, daß Instrumente weniger Wert haben als ein starker, kräftiger, und ich will hinzufügen, langer Arm des Geburtshelfers. Gewiß sind diese körperlichen Eigenschaften für den tierärztlichen Geburtshelfer von großer Bedeutung, wie mir vor mehr als vierzig Jahren auch mein hochgeschätzter Lehrer, Geheimrat Kaiser, bei der Fachprüfung mit den Worten zugefand, als ich ihm antwortete, daß ich mit der Hand die fragliche Stellungsberichtigung ausführen würde: „Ja, Sie mit Ihren langen Armen bringen es wohl fertig, aber wie soll es ein kleiner Kollege mit kurzen Armen anfangen?“ Ich weiß nicht, ob in dem Wirkungskreise des Kollegen Walch es auch Kälber gibt, die bei der Geburt 75–85 kg schwer sind. Solche großen Kälber kann niemand, selbst wenn er noch so kräftige und starke, lange Arme hat, in toto extrahieren, und zur Extraktion solcher Kälber werden im norddeutschen Niederungsgebiet hauptsächlich Tierärzte verlangt, und meist erst dann, wenn mit Herkulesapparat, Hebebaum usw. eine Extraktion nicht möglich war. Infolgedessen wird auch der praktizierende Tierarzt selbst bei größerer Praxis im Jahre kaum mehr als 50 Embryotomien auszuführen Gelegenheit

haben. Er wird froh sein, wenn er auch einmal eine Haltings-, Stellungs- oder Lageberichtigung des Fötus vornehmen kann und würde sie gerne öfter ausführen, da sie dem erfahrenen Tierarzt keine erheblichen Schwierigkeiten zu bereiten pflegen. Leider sind aber diese leichten Fälle von Geburtshilfe, die ohne Instrumente mit dem langen, kräftigen Arm erledigt werden können, höchst selten, da sie von einem in fast jedem Dorfe zu findenden, in der Hilfeleistung bei der Geburt bewanderten Manne ausgeführt werden.

Ohne Geburtskrücke bin ich immer fertig geworden, und es dürfte wenig Kollegen geben, die sie noch anwenden. Ich halte sie auch nicht für praktisch, sondern für überflüssig. Mit einem Schauffelstiel oder dergl. an Stelle der Krücke, wie Kollege Walch vorschlägt, möchte ich keine Hilfeleistung vor den Augen von Landwirten in hiesiger Gegend versuchen.

Gerne würde ich und sicher mit mir zahlreiche Kollegen vom Kollegen Walch hören, auf welche Weise er einen mit größter Zugkraft in dem Geburtskanal festgekeilten zu großen Fötus in normaler Vorderendlage, der sich trotz aller Kraftaufwendung seitens des Geburtshelfers nicht in den Uterus zurückschieben läßt, ohne Benutzung von Instrumenten extrahiert.

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 8, S. 122.

Beurteilung von Notgeschlachtungen.

Ergänzung zum Artikel von Hafemann: „Brauchen wir einen Notgeschlachtungsstempel?“

Von Direktor Dr. May, Krefeld.

Im großen und ganzen wird wohl jeder Kollege den Ausführungen von Hafemann zustimmen. Ein besonderer Stempel ist nicht nötig, wenn nur die Beurteilung den

Vorschlägen gemäß eine strengere wird. Ich stelle mit besonderer Genugtuung fest, daß Hafemann der Ansicht beitrifft: Das Fleisch notgeschlachteter Tiere gehört auf die Freibank, wie noch Prof. Müller verlangt. Selbstverständ-

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 14, S. 248.

lich sind hiervon auszunehmen die Notchlachtungen, welche durch Unglücksfälle oder unerhebliche Leiden herbeigeführt werden, wenn nicht besondere Umstände auch hier eine andere Beurteilung verlangen. Ich habe bereits in der B. T. W. vom 19. August 1927 ähnliche Ausführungen gemacht. Der Standpunkt muß allmählich auch bei den Tierärzten durchdringen, welche die Fleischbeschau unter allerdings oft schwierigen Verhältnissen ambulatorisch vornehmen. Jede Rücksichtnahme auf den Besitzer muß im Interesse der Volksgesundheit und des tierärztlichen Ansehens schwinden. Es erscheint m. E. angebracht, daß in allen tierärztlichen Versammlungen der Punkt zur Sprache gebracht wird und Beschlüsse in obigem Sinne gefaßt werden, die natürlich dann auch von allen Kollegen streng durchgeführt werden müssen. Die Kollegen, welche bakteriologische Fleischuntersuchungen ausführen, werden aus den eingefandten Berichten und telefonischen Rücksprachen mit den Kollegen, welche die Proben geschickt haben, manches Interessante bezüglich

der Beurteilung berichten können. Vielfach könnte m. E. bei Notchlachtungen besonders bei Pferden eine bakteriologische Untersuchung unterbleiben und damit Zeit, Geld und Arbeit gespart werden, wenn die Ansicht der strengeren Beurteilung Allgemeingut der Tierärzte würde. Koliker gehören doch wohl fast immer auf die Freibank (mangelnde Haltbarkeit). Warum läßt man z. B. bei brandiger Lungenentzündung eines Pferdes noch bakteriologisch untersuchen? Auf der Freibank würden solche minderwertig gemachte Pferde nicht abgesetzt, da besseres und auch billiges Gefrier- und Schweinefleisch vorhanden ist. Das wissen auch die Besitzer und sie werden sich einverstanden erklären müssen, daß der Tierarzt das notgeschlachtete Tier ohne weiteres untauglich abstempelt oder vielleicht in manchen Städten dem zoologischen Garten zuführen läßt. Bei einer etwaigen Nachprüfung der Ausführungsbestimmungen des Reichsfleischbeschaugesetzes dürfte wohl dem Punkte Beurteilung der Notchlachtungen besondere Beachtung zu widmen sein.

Innere Medizin und Chirurgie.

Zeller, H. und Wedemann, W.: **Verfuche über die Einwirkung mit Salvinol verletzten Trinkwassers auf Säugetiere.** (Aus der Veterinärabteilung des Reichsgesundheitsamtes). (B. T. W. 1927, S. 489.)

Das vorliegende Mittel wird zur Bekämpfung der Stechmückenbrut empfohlen und wird zu diesem Zwecke auf das betr. Wasser aufgetropft. Es entstand nun die Frage, ob Salvinol für Haustiere, insbesondere Rinder, schädlich wirken könnte, wenn Viehtränken damit besprengt würden. Verf. berichten in vorliegender Arbeit über die nach dieser Richtung hin angestellten Verfuche. Salvinol wird von der Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung m. b. H. in Frankfurt a. M. hergestellt und kostet 1,50 Mk. das Liter. Nach der Gebrauchsanweisung sollen zum Versprühen auf 1 qm Wasserfläche 15—20 ccm, auf 50 qm also etwa 1 Liter Salvinol verwendet werden. Letzteres ist eine neutral reagierende, braune, klare, nach Naphthalin und Teer sowie schwach nach Petroleum riechende Flüssigkeit vom spezifischen Gewicht 0,833, die an einem Glasstab entzündet mit rußend leuchtender Flamme ruhig abbrennt, in einer Glaschale jedoch nicht ohne weiteres entzündbar ist. Auf Wasser bildet Salvinol, wenn es mit einer Blumenspritze versprüht wird, eine feine, die Wasserfläche gleichmäßig und lückenlos überziehende Schicht. Das überschichtete Wasser ist nach 24 Stunden deutlich getrübt und gibt ganz schwache Phenolreaktion. Es gehen also Anteile des Präparats in das Wasser über. Salvinol verdunstet an freier Luft auf dem Wasser teilweise, jedoch nicht so stark, daß die damit bezweckte Abtötung der Mückenlarven vereitelt würde. Die Verfuche wurden mit einer Kuh, drei Rindern, drei Schafen, zwei Ziegen, zwei Schweinen, einem Pferd, acht Meerschweinchen und sechs Kaninchen vorgenommen und zeigten, daß das Mittel für die Versuchstiere in den zur Mückenbekämpfung verwendeten Mengen unschädlich ist. Selbst wenn dem Wasser das Doppelte und Mehrfache dieser Menge wochenlang zugesetzt wurde, haben Gesundheitschädigungen bei den Versuchstieren nicht festgestellt werden können. Bei einer Milchkuh ließ sich ein Übergang des Mittels in die Milch nicht nachweisen. Ebenso wiesen Fleisch und innere Organe von zahlreichen nach Versuchsabschluß geschlachteten Tieren weder Salvinolgeruch noch Salvinolgeschmack auf. Wochenlang fortgesetzte Verabreichung von unverdünntem Rohsalvinol an Kaninchen hat keinerlei Vergiftungserscheinungen im Gefolge gehabt. Es sind sonach gegen die Verwendung von Salvinol als Mittel zur Übersichtung von Tümpeln und Wasserstellen zum Zwecke der Mückenvertilgung begründete Bedenken hinsichtlich des Gesundheitszustandes der Haustiere nicht zu erheben. Carl.

Kolbe, G.: **Zur Anwendung des Yatren-Vakzin E. 104 in der Praxis.** (In.-Diss. Leipzig 1925.)

Die beschriebenen 18 Fälle umfassen achtmal Phlegmonen, fünfmal Geschwülste, 1 Sprunggelenkentzündung, 1 Mastitis, 1 Gonitis, 1 subkoronäre Induration, 1 Bugbeule. Unter diesen Fällen sind nur zwei leichte zu nennen. Aus der Zusammenstellung sind folgende Schlüsse bezüglich der Wirkung des Yatren-Vakzin (E. 104) zu ziehen: 1. Die Wirkung des Yatren-Vakzin (E. 104) ist keine gleichmäßige, vielmehr unregelmäßig und unsicher. 2. Eine resorbierende, sekretionsbeschränkende Wirkung kann ihm nicht ganz abgesprochen, aber nicht in vollem Umfange zugesprochen werden. 3. Seine bindegewebsrückbildende und einschmelzende Wirkung ist nicht in allen Fällen gewährleistet. 4. Auf die Dauer des Heilungsprozesses hat es keinen Einfluß. Eine Abkürzung des Heilungsvorganges findet nicht statt. 5. Neben der Anwendung von Yatren-Vakzin muß die bei dem einzelnen Fall gebotene Therapie bestehen bleiben. Die Wirkungsweise ist bei den einzelnen Erkrankungen individuell und seine Anwendung im Rahmen der Reiztherapie vorsichtig zu bemessen. A.

Gürber, A.: **Der indische Nierentee Koemis Koetjing.** (Aus dem Pharmakologischen Institut Marburg.) (D. m. W. 1927, S. 1299.)

Verf. erhielt aus Niederländisch-Indien die vorliegende Droge zugefandt, die dort in der Volksmedizin wie bei den europäischen Ärzten sich großer Wertschätzung erfreut.

Die Verfuche, die Verf. an sich selbst, an Tieren und in einem schweren Fall von Nephrose bei einer Frau anstellte, ergaben, daß hier ein sehr beachtenswertes Heilmittel vorliegt. Einzelheiten ergeben sich aus nachstehender Zusammenfassung:

1. Der indische Nierentee Koemis Koetjing ist eine einheitliche Droge, die von Orthosiphon stamineus, einer Labiate Holländisch-Indiens, gewonnen wird. Die Pflanze wird in ausgedehntem Plantagenbau auf Sumatra gezogen, und die Droge kann daher in größter Reinheit und Zuverlässigkeit in den Handel gebracht werden.

2. Nach den Berichten indischer und europäischer Ärzte ist die Bezeichnung für die Droge „Nierentee“ voll berechtigt, was auch durch die Heilung einer schwer nierenkranken Frau unter meiner Beobachtung bestätigt wird.

3. Die Droge enthält das Glykosid Orthosiphonin und viele Kalisalze.

4. Die experimentelle Untersuchung im Tierversuch hat die volle Ungiftigkeit der Droge erwiesen.

5. Verfuche an mir selbst und an Medizinalpraktikanten haben einerseits die absolute Harmlosigkeit des Mittels dargetan, andererseits gezeigt, daß Koemis Koetjing ein exquisites Diuretikum ist mit einer Wirkung, die insofern über

die unserer sonstigen Diuretika hinausgeht, als durch den Nierentee die Harnmenge weit über das Angebot an harnbarem Wassergetrieben und mit der Steigerung der Harnflut auch die Kochsalzausscheidung gefördert wird. **Carl.**

Kirschner, M.: Zur Theorie und Praxis der Maftdarmbetäubung mit E 107. (M. m. W. 1927, S. 917.)

Verf. fühlt sich verpflichtet, gegenüber den meist günstig lautenden Berichten über die Anwendung des Präparates auf Grund eigener ungünstiger Erfahrungen seine warnende Stimme zu erheben. Grundbedingung für die Unschädlichkeit eines Narkoseverfahrens ist die, daß das benutzte Narkotikum dauernd dosierbar ist und dessen Zufuhr jederzeit eingestellt werden kann. Die trifft z. B. zu bei der Inhalationsnarkose. Bei der Rektalnarkose wird dagegen die errechnete, abgewogene Menge des Narkosemittels dem Darm auf einmal einverleibt und wirkt demgemäß in den nächsten Stunden in unabänderlicher Weise. Der Vorschlag, mit geringer Dosis anzufangen und bei ungenügender Wirkung mit der Verabreichung fortzufahren, kann nur als ein roher Versuch zur Abhilfe angesehen werden. Tritt bei einer Operation ein unerwartetes Ereignis, z. B. ein starker Blutverlust ein, so kann bei der Inhalationsnarkose die Zufuhr des die Lebenskraft beeinträchtigenden Narkotikums sofort unterbrochen werden. Das neue Mittel dagegen wirkt auf Stunden hinaus weiter und kann auch durch Darmspülungen einigermaßen vollständig nicht entfernt werden. Dazu kommt noch die Unregelmäßigkeit und völlige Unberechenbarkeit der aus dem Darm in der Zeiteinheit resorbierten Menge. Dementsprechend ist die betäubende Wirkung gleich dosierter E 107-Klysmen außerordentlich verschieden. Bei vorsichtshalber verabreichter geringer Dosis wirkt das Mittel oft zu schwach, so daß noch ein anderes Narkotikum gegeben werden muß, bei starker Dosis und schnell vor sich gehender Resorption kommt es oft zu Vergiftungserscheinungen, ja zum Tode. Verf. hat mehrfach Kollapse und vier Todesfälle erlebt, von denen mindestens zwei allein auf das Narkosemittel zurückgeführt werden müssen. Er schließt mit dem Ausspruch, daß, wenn als Ersatz der Rektalnarkose uns morgen die Inhalationsnarkose geschenkt würde, dies als eine Großtat der Chirurgie angesehen werden müßte. **Carl.**

Hilgendorff: Kehlkopfpeifen als Hauptmangel. (Zeitschrift für Vet.-Kunde 1927, H. 5.)

Verf. schlägt vor, das Kehlkopfpeifen als Hauptmangel fallen zu lassen und nur den Pferdeinteressenten, die unwissenschaftlich hochgradige Kehlkopfpeifer kaufen, einen gesetzlichen Schutz zu gewähren, der dahin geht, daß Kehlkopfpeifen, welches nur zur Dyspnoe führt und die Arbeitsleistung eines Tieres herabmindert, wieder wie früher nach dem Preuß. Allgemeinen Landrecht eine Unterabteilung der Dämpfigkeit wird. Für Körungskommissionen könnten, um wertvolle Zuchttiere nicht der Zucht zu entziehen, besondere Bestimmungen getroffen werden. Die Gründe für diese Auffassung sind folgende: Oft unerheblicher Mangel, Möglichkeit der Entstehung in kürzerer Zeit als in der Gewährsfrist, Heilbarkeit mancher Fälle. Durch eine bestimmte Kopfhaltung kann Kehlkopfpeifen hörbar werden, ohne daß das Pferd ein Rohrer ist. Die Befundangaben der Sachverständigen widersprechen sich häufig. Durch akute und chronisch heilbare Stenosengeräusche ist eine einwandfreie Feststellung des Hauptmangels Kehlkopfpeifen oft monatelang nicht möglich. Durch eine unrichtige Diagnose, für die ein Sachverständiger nicht immer verantwortlich gemacht werden kann, können wirtschaftliche Schäden entstehen. Die Schwierigkeiten liegen bei der Unzuverlässigkeit der Untersuchung u. a. durch Palpation — vor allem bei der Feststellung: 1. Ist der Zustand chronisch und heilbar? 2. Kommt der Ton aus dem Kehlkopf oder der Luftröhre? 3. Ist es ein Spielgeräusch aus dem Kehlkopf oder der Luftröhre? 3. Ist es ein Spielgeräusch oder ein anderer physiologischer Laut? 4. Habe ich die Möglichkeit, das Pferd sach-

gemäß zu untersuchen und im Zweifelsfalle zu beobachten. Die Bedeutung des Kehlkopfpeifens ist in vielen Fällen außerordentlich gering. **A.**

Clauss, K.: Betrachtungen über die Hämoglobinämie der Pferde und ihre wirtschaftliche Bedeutung. Kommt evtl. eine Haftpflicht des Militärfiskus im Manöver in Betracht? (In.-Diss. Leipzig 1925.)

Die vom Verf. beobachteten Krankheitserscheinungen stimmen im Bilde vollständig überein mit den von Fröhner-Zwick und Hutyrá-Marek in ihren Lehrbüchern der speziellen Pathologie und Therapie der Haustiere als myogene rheumatische Hämoglobinurie bzw. paralytische Hämoglobinämie geschilderten Krankheitsfällen bei Pferden. Vorwiegend tritt die Krankheit bei Kaltblütern (Belgiern, Rheinisch-belgischen und Normännerpferden) auf; denn neben 90 Hämoglobinuriefällen bei schweren Pferden beobachtete Verf. nur zwei Fälle bei „Warmblütern“. Krankheitsursachen sind: Übermäßige verständnislose Fütterung mit Körnerfutter und Luzernklee, verbunden mit mehrtägiger Stallruhe, Erkältung durch Zugluft, Verweichlichung der Tiere in niederen, schlecht ventilierten Ställen, größere Muskelanstrengungen nach längerer Ruhe besonders bei jungen, nicht trainierten Pferden, Selbstüberhetzen der Pferde durch Hängenbleiben im Halfterstrick usw. Eine vererbte Anlage bzw. eine in der Anlage vererbte Stoffwechselstörung wäre nicht ausgeschlossen. — Ein Bedürfnis für eine Aufnahme in die Gewährsmängelliste liegt aber vorerst bei dem seltenen Auftreten der Krankheit in Deutschland nicht vor. Forensische Bedeutung kann dagegen unter Umständen die Hämoglobinurie als Vertragsmangel haben. Der Sachverständige hat bei Begutachtung eines solchen Falles alle vorausgegangenen Umstände und Verhältnisse zu berücksichtigen, welche mit der eingetretenen Krankheit in Verbindung gebracht werden können. Wenn die Haemoglobinuria rheumatica schon innerhalb der ersten Viertelstunde nach der Übernahme auftreten kann, so kann doch der „Keim“, d. h. die bedingte Ursache der Krankheit, längere Zeit (vor die Übernahme) zurückdatiert werden. Der Beweis ist erbracht, wenn nachgewiesen werden kann, daß durch die Schuld des Verkäufers das Pferd mehrere Tage zuvor bei guter Fütterung im Stall gestanden hat und nicht bewegt worden ist. Weniger Schwierigkeiten bietet wohl die Beurteilung der Fälle von infektiöser Hämoglobinurie (Pferdepiroplasmose), da hier die Inkubationszeit von vierzehn Tagen maßgebend ist und außerdem der Nachweis der Erreger durch mikroskopische Untersuchungen gelingt. **A.**

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Richters: Vergleichende Untersuchungen chemischer Desinfektionsmittel in ihrer Bedeutung für Rotz, Druse, Milzbrand und ansteckende Blutarmut der Pferde. (Zeitschr. für Vet.-Kunde 1927, Jahrg. 39, H. 10, S. 401.)

In neuerer Zeit tritt immer mehr das Bestreben nach einer „Normalisierung“ oder „Standardisierung“, d. h. nach einem einfachen zahlenmäßigen Ausdruck für den Wert eines Desinfektionsmittels, zutage. Es hängt die Brauchbarkeit und der Wert eines Desinfektionsmittels nicht nur von der keimtötenden Wirkung, sondern auch von einer großen Anzahl anderer Faktoren ab (hohe Desinfektion für Spaltpilze, Sporen, Ungiftigkeit, Geruchlosigkeit, Billigkeit usw.). Die Desinfektionskraft selbst läßt sich nach Hailer zahlenmäßig in einer Indexziffer nicht festlegen. Die Engländer und Amerikaner haben schon seit längerer Zeit drei Methoden der Normalisierung im Gebrauch (Rideal-Walkersche, die Lancet- und die Phenolkoeffizient-Methode). Im Prinzip sind alle drei einander ähnlich und beruhen darauf, daß das zu prüfende Mittel und Phenol je in mehreren gleichmäßig abgestuften Konzentrationen auf suspendierte Keime einwirken (einfache Suspensionsverfahren; Wirkungswert = Karbolsäurekoeffizient). Nach den Ergebnissen Richters

ergibt die Suspensionsmethode mit geringen Keimzahlen — 5—6 Millionen Keime auf je 2 ccm Desinfektionsflüssigkeit — ungleichmäßige, nicht verwertbare Resultate. Dagegen dürfte nach vorliegenden Versuchen eine mittlere Dichte von 500—600 Millionen Keimen besonders geeignet sein. Der Suspensionsmethode haften jedoch zwei Nachteile an, die Nichtanwendbarkeit größerer Keimmengen und die Mitverimpfung entwicklungshemmender Stoffe. Beim Keimträger-Batistverfahren nach Hailer lassen sich beide Nachteile vermeiden, auch entspricht die Methode den natürlichen bei der Desinfektion vorliegenden Verhältnissen (bei vergleichenden Untersuchungen am besten Anwendung beider Methoden). Die Abtötungszeiten der Keime liegen bei der Suspensionsmethode im allgemeinen wesentlich niedriger als beim Batistverfahren mit anschließender Entgiftung. Das Ergebnis der wirklichen praktischen Verhältnisse — Holzstäbchen mit Kot, Serum, Blut, Eiter, Bakterien — angepaßten Versuche ist dahin zu bewerten, daß die Einwirkung der Desinfizienzien sich über viele Stunden erstrecken muß. Die 3prozentige heiße Sodalösung besitzt außer ihrer stark erweichenden und quellenden Eigenschaft eine nicht unerhebliche Desinfektionskraft (vor eigentlicher Desinfektion Anwendung reichlicher Mengen). Die stärkste gleichmäßige, bakterizide und sporizide Kraft entfaltet in den Versuchen das Formaldehyd (2 v. H.), hinter dessen Wirkung z. B. die der Kresolschwefelsäure weit zurücktrat. Außer Chlorkalk und Sublimat, die aus hinlänglich bekannten Gründen für Großdesinfektion heute weniger in Frage kommen, scheint denjenigen neueren Präparaten, deren wirksames Prinzip die freie unterchlorige Säure ist oder deren Wirkung auf der Abspaltung von aktivem Sauerstoff sowie auf der Entwicklung von aktivem Chlor beruht, eine besondere Bedeutung zuzukommen (Multisept Heyden u. a.); die sporizide Wirkung dieser Mittel befriedigt allerdings nicht. Sulfoliquid D. S. kommt als Keimabtötungsmittel nicht in Frage (keine Abtötung des Anämievirus in 5prozentiger Lösung nach einer Stunde). Die Hitze-resistenz des Anämievirus scheint keine sehr erhebliche zu sein. Multisept 1prozent, und Formaldehyd 2prozent, zeichnen sich dagegen durch eine hohe virulizide Kraft aus (5 Minuteneinwirkung genügt zum Verlust der Infektionstüchtigkeit). Der Harn eines anämiekranken Patienten erwies sich bei subkutaner Einverleibung als hochvirulent. Bei einem an Harn-Virus erkrankten Versuchsohnen gelangte zum ersten Male eine Iritis exsudativa haemorrhagica symptomatica zur Beobachtung. Anämievirus-haltiger, am Huf angetrockneter und der Fäulnis ausgesetzter Harn ist noch nach 14 Tagen infektionstüchtig. Daher ist mit einer erfolgreichen Infektion per os (infiziertes Futter, Streutroh, Trinkwasser) vielleicht in höherem Maße zu rechnen als dies bisher angenommen wurde. Die Desinfektionsmaßnahmen dürften sich daher nicht nur auf Ställe, Gegenstände, Streu, Dünger zu erstrecken haben, sondern vor allem auf die Hufe und mindestens auf diejenigen Körperteile, die beim Liegen der Tiere dauernd mit der Streu in Berührung kommen, wenn nicht auf den ganzen Körper aller kranken, der Seuche verdächtigen und der Ansteckung verdächtigen Tiere, ausgedehnt werden. Als Desinfektionsmittel hat sich das Multisept 1prozent, beim Harnvirus in demselben Maße als hervorragend virulizid bewiesen wie in den Versuchen mit reinem Serum. Das Sulfoliquid D. S. hat dagegen auch beim Harnvirus verfaßt.

Zwick, W., O. Seifried und J. Witte: Weitere Untersuchungen über die feuchenhafte Gehirn-Rückenmarksentzündung der Pferde (Bornasche Krankheit).

(Aus dem Veterinärhygienischen und Tierseuchen-Institut der Landes-Universität Gießen. — Direktor: Prof. Dr. W. Zwick.) (Zeitschr. für Infekt.-Krankh. der Haustiere 1927, 32, H. 2, S. 150.)

Das Ergebnis der von den Verff. durchgeführten weiteren Untersuchungen über die feuchenhafte Gehirn-Rückenmarksentzündung der Pferde (Bor-

nasche Krankheit) ist folgendes: Der in zwei weiteren Fällen gelungene Nachweis des Borna-Virus in der Nasenmuschel von mit Bornascher Krankheit infizierten Kaninchen ist ein erneuter Beweis dafür, daß das Virus nicht nur durch die Nasenschleimhaut eindringen, sondern auch auf diesem Wege ausge-schieden werden kann. In diesem Sinne spricht weiterhin der Virusgehalt des Nasenschleimes eines experimentell infizierten Pferdes. In Übereinstimmung damit zeigt endlich die histologische Untersuchung des Gehirnes eines intrazerebral mit Borna-Virus infizierten Pferdes, daß die Lokalisation der entzündlichen Veränderungen (hauptsächlich Betroffenheit des Riechkolben und der Riechwirkung) nicht einseitig im Sinne einer rhinogenen Infektion zu deuten ist (Joest), sondern auch in dem Sinne, daß die Ausbreitung des Virus vom Zentralnervensystem aus in zentrifugaler Richtung erfolgen kann. Die experimentell bei Kaninchen einwandfrei gelungenen Infektionsversuche von der Nasenhöhle aus, sowie auf dem Wege der Fütterung stehen in einem auffallenden Gegensatz zu den mißlungenen Versuchen, die Krankheit durch Kohabitation von kranken Tieren auf gesunde zu übertragen (Kaninchen, Ratten, Affen, Pferde). Das Zustandekommen der Infektion unter natürlichen Verhältnissen scheint von bestimmten Bedingungen noch unbekannter Art abhängig zu sein. Das Borna-Virus besitzt nach sechsmonatigem Aufenthalt in 50prozentigem Glycerin noch seine volle Virulenz; nach zwölfmonatigem Aufenthalt (in 50prozentigem Glycerin) dagegen nicht mehr. In einer Gehirnemulsion 1:25 büßt er nach 24stündiger Trocknung im Faust-Heimischen Apparat seine Virulenz mit Sicherheit ein. Trocknung über Ätzkali bei Zimmertemperatur vermag es dagegen erst nach vier, fünf und zehn Tagen zu zerstören. Borna-Virus in vierprozentiger Gehirnemulsion wird durch Einwirkung von 1prozentiger Karbolsäure nach vier Wochen, nicht aber nach acht und vierzehn Tagen abgetötet. Durch Fäulnis wird das Borna-Virus bereits nach fünf und zehn Tagen zerstört. Die Resistenz gegen Hitze entspricht nach wiederholten Versuchen den bereits früher gemachten Angaben (s. Bd. 30, Zeitschr. für Infekt.-Krankh. der Haustiere). Ein von den Verff. angestellter Versuch zeigt, daß das Serum eines mit Borna-Virus immunisierten Pferdes das Virus in vitro zu neutralisieren vermag (Möglichkeit des Nachweises von Immunkörpern im Serum während des Lebens). Durch subkutane Behandlung mit virulentem Gehirnmaterial läßt sich bei Kaninchen eine sichere Immunität erzielen, die sich mindestens auf die Dauer von einem Jahre beläuft. Desgleichen können auch Pferde durch subkutane Vorbehandlung mit virulentem Borna-Virus gegenüber einer sonst sicher tödlichen intrazerebralen Nachimpfung immunisiert werden. Die Immunität erstreckt sich nach den bisherigen Versuchen der Verff. auf die Dauer von mindestens ½ Jahr. Sämtliche Versuche, mit einem abgeschwächten Virus zu immunisieren, das nicht die Gefahr der Weiterverbreitung der Krankheit in sich schließt, sind bis jetzt fehlgeschlagen. Durch Einwirkung von Karbolsäure, von Glycerin, durch Erwärmung auf 50 Grad C, durch Trocknung über Ätzkali gelingt es zwar, das Virus bis zur Unschädlichkeit abzuschwächen; es verliert indessen durch eine solche Behandlung auch sein Immunisierungsvermögen (bei Kaninchen) völlig. Postinfektionelle Immunisierungsversuche an Kaninchen mit virulentem und abgeschwächtem Virus haben im Gegensatz zu denjenigen von Ernst und Hahn zu brauchbaren Ergebnissen nicht geführt. Durch die gelungenen kreuzweisen Immunisierungsversuche mit dem Virus der Bornaschen Krankheit und demjenigen der enzootischen Schafenzephalitis ist die Identität der beiden Virusarten einwandfrei erwiesen worden. Versuche, die Bornasche Krankheit durch intrazerebrale Impfung mit virulenter Gehirnemulsion auf

Affen (*Macacus rhesus*) zu übertragen, haben in vier Fällen bis jetzt einmal zu einem positiven Ergebnis geführt. Im Gegensatz zu *Moussu*, der die in Frankreich bei Pferden beobachtete *Encéphalite enzootique* neuerdings wieder als eine bestimmte Form der Bornaschen Krankheit betrachtet wissen will, wird auf Grund wesentlicher Verschiedenheiten und des abweichenden biologischen Verhaltens des Virus im Tierversuch die Identität der beiden Krankheiten nach wie vor in Abrede gestellt. Ziegler.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

v. Müller, Fr.: Über die Bedeutung des Kolostrums. (Münch. med. Wochenschrift 1927, S. 1458.)

In dem sehr interessanten Berichte: „Amerikanische Reifeindrücke“ macht Verf. u. a. auch eine Mitteilung über die Arbeiten von Theobald Smith, eines Forschers „von großer wissenschaftlicher Bedeutung“, der sich an einem von Rockefeller gestifteten Institut mit dem Studium der Tierleichen beschäftigt, den Erreger des Texasfiebers feststellte und auch das nach ihm benannte Phänomen der Überempfindlichkeitsreaktion entdeckte, welche nach Einspritzung von Antigenen, z. B. von fremdem Tierserum, eintritt. In neuester Zeit untersucht Smith die Bedeutung des Kolostrums für die Ernährung neugeborener Kälber. Erhalten diese nach der Geburt nicht das Kolostrum, also die erste Milch der Mutterkuh, sondern werden sie mit gewöhnlicher Milch ernährt, so pflegen sie rasch unter dem Bilde einer schweren Allgemeininfektion durch Colibazillen zugrunde zu gehen. Die Darmwand des neugeborenen Kalbes läßt also den Colibazillus ohne weiteres durch. Wird den Kälbern aber sofort nach der Geburt das Kolostrum verabreicht, so kommt es nicht zur Colibazillensepsis und die Kälber bleiben gesund. Erhalten die Tiere zunächst fertige Milch und einige Tage später Kolostrum, so tritt nur ein unvollkommener Schutz ein, es entwickelt sich eine Kolisepsis in milderer Form, die sich vorwiegend in Entzündung und selbst Vereiterung der Gelenke äußert. Im Kolostrum müssen also Stoffe vorhanden sein, die das neugeborene Tier vor der Infektion mit Colibazillen schützen und entweder die Darmwand undurchgängig machen oder die Bazillen etwa in der Art des d'Herelle'schen Phänomens beeinflussen. Die Schutzwirkung des Kolostrums ist nur bei Kälbern, nicht aber bei Schweinen und beim Menschen nur in zweifelhafter Weise nachweisbar. Bei manchen Tierarten und auch beim Menschen werden die Schutzstoffe offenbar von der Mutter intrauterin auf die Frucht übertragen.

Anmerkung. Diese Ergebnisse scheinen mir einer Nachprüfung dringend zu bedürfen. Namentlich wären die Fälle von infektiöser Nabelentzündung streng abzusondern. A. Hink.

Honcamp: Über den Bedarf der Milchkuh an Futtereiweiß. (Deutsche Landw. Tierzucht 1927, Nr. 38, S. 745 folg.)

Zum Lebensunterhalt einer 500 kg schweren Kuh sind täglich 0,2 bis 0,3 kg verdauliches Eiweiß erforderlich (Erhaltungsfutter). Dabei sind auch individuelle Eigenschaften, Trächtigkeit, Aufbau des Fötus zu berücksichtigen. Zur Milcherzeugung ist ein eiweißreiches Produktionsfutter nötig, also eine Eiweißzulage. Da von letzterer nur etwa 75 Prozent sich in der Milch finden, muß das Produktionsfutter 25 Prozent mehr verdauliches Eiweiß enthalten als im Milcheiweiß zutage tritt. Bei einem Gehalt der Milch an Eiweiß von etwa 3,5 Prozent wären für eine 500 kg schwere Kuh mit einer täglichen Milchleistung von 10 kg rund 0,45 kg = 45 Gramm je Liter Milch verdauliches Eiweiß als Zulage erforderlich. Milchreichere Kühe erfordern natürlich mehr. Bei reichlicher Stärkewertfütterung (Hackfrüchte) kann an Eiweiß gespart werden. Sogar auf der Weide kann eine Beifütterung stickstofffreier Nährstoffe sich

verlohnen. Kurz vor dem Kalben stehende Kühe erhalten in den Monaten, wo gutes Grünfutter in reichlicher Menge nicht mehr vorhanden und das Heu nicht besonders nährstoffreich ist (kein Kleeheu) zweckmäßig ein eiweißreicheres Futter, damit das Euter nach dem Kalben kräftig und andauernd angeregt wird. (Behufs Verhütung der Geburtslähme darf nach meiner Erfahrung doch nicht des guten zuviel getan werden. Der Ref.). Eiweißbausteine und deshalb auch Eiweißparer sind bekanntlich auch die in allen Futtergemischen vorhandenen Amide. Eine 500 kg schwere Kuh, die 13 bis 15 kg Milch täglich gibt, braucht 0,9 bis 1 kg verdauliches Eiweiß im täglichen Futter, davon ein Drittel zur Lebenserhaltung und zwei Drittel zur Milchbildung. An Stärkewert muß die Ration 6,5 kg enthalten. Die organischen Nährstoffe müssen in richtigem Verhältnis stehen. Beispiel:

Grundfutter	Verdaul. Eiweiß	Stärkewert
5 kg sehr gutes Wiesenheu	0,32 kg	2,3 kg
40 kg Runkeln	0,05 kg	3,0 kg
Zuf. 0,37 kg		5,3 kg

Dazu nun ein Kraftfuttergemisch, z. B. von 40 Teilen Erdnußmehl, 40 Teilen Sojabohnenmehl, 20 Teile Weizenkleie. In 2 kg dieses Gemisches sind enthalten 0,70 kg verdauliches Eiweiß und 1,4 kg Stärkewert; diese Mengen zu den obigen Zahlen addiert, ergibt 1,07 kg verdauliches Eiweiß und 6,7 kg Stärkewert, also einen ausreichenden Nährstoffgehalt. Eine andere Kraftfuttermischung ist: Leinkuchenmehl und Malzkeime (je 30 Teile), Sonnenblumen- und Rapskuchen (je 10 Teile), Weizenkleie (20 Teile). Davon wären 3 kg dem obigen Grundfutter hinzuzufügen, um einen ausreichenden Gehalt an verdaulichem Eiweiß und Stärkewert zu bekommen. Handelt es sich um Erhöhung des Fettgehalts der Milch, dann empfiehlt sich eine Beifütterung von Kokos- und Palmkernkuchen. Diese Ölrückstände haben aber nach den Feststellungen von J. Hansen, Nils Hanson und Honcamp nur dann einen Einfluß auf den Fettgehalt der Milch, wenn mindestens 1,5 kg davon je Kuh und Tag verabfolgt werden. Der Kosten wegen würde es sich empfehlen, zum Grundfutter 1 kg des oben zuerst erwähnten Kraftfuttergemisches und dazu noch 1,5 kg Kokos-Palmkernkuchen beizugeben.

Die gegebenen Beispiele dienen nur zur Anleitung. Die Wirtschaftsverhältnisse sind so verschieden, daß mannigfaltige Änderungen der Futterzusammensetzung notwendig werden. Maßgebend ist in der Hauptsache der Gesamtgehalt an verdaulichem Eiweiß und Stärkewert. (Es gibt Wirtschaften genug, wo bedeutend mehr Heu nebst Stroh verfüttert werden kann und muß, als oben angegeben, und wo 40 kg Runkeln je Kuh und Tag nicht zur Verfütterung stehen.) Auch hindert der hohe Preis der Ölkuchen usw. vielfach an deren reichlicher Verwendung. Immerhin kommt es stets auf eine richtige Berechnung der Ausgaben und Einnahmen heraus. Bezahlt die Mehreinnahme für Milch infolge der Steigerung der Erzeugung durch die bessere Fütterung die Ausgaben für Kraftfutter in kaufmännisch richtiger Weise, dann ist eine übertriebene Sparsamkeit zu vermeiden. Leider fehlt es eben in kleineren Wirtschaften zu häufig an flüssigem Geld. (Deshalb geben da mindestens 75 Prozent der Kühe nicht die Milchmenge, die man von ihnen bei besserer Fütterung erwarten dürfte. D. Ref.). Ein naturgemäßes Futter enthält neben den nötigen Nährstoffen meist auch die unentbehrlichen Mineralstoffe und Vitamine. (Neuerdings ist man bestrebt, den Nährstoff-, insbesondere den Eiweißgehalt des Wiesen- und Ackerfutters durch gehörige Düngung wesentlich zu erhöhen. D. Ref.). In Wirtschaften, wo Abfälle technischer Nebengewerbe verfüttert werden müssen, bedarf die Futterzusammensetzung einer besonderen Sorgfalt. Mit Recht betont Honcamp am Schluß, daß die Leistung der Milchdrüse zwar von der Fütterung, insbesondere von der Eiweißzufuhr abhängt, aber in der Hauptsache auf einer

erblichen Anlage beruhe (eine von Natur schlechte Milchkuh kann auch durch die beste Fütterung zu keiner guten gemacht werden. D. Ref.). A. Hink.

Rohrbacher, H.: Untersuchungen über die Größe der Zellen in ihren Beziehungen zu Körpergröße, Alter, Rasse und Geschlecht. (Zeitschr. f. Tierzüchtung und Züchtungsbiologie 1927, Bd. IX, S. 163 folg.)

Es muß als recht verdienstlich bezeichnet werden, daß Rohrbacher die Frage der Zellgröße nochmals einer peinlich genauen Prüfung unterzog (1925/1926). Untersucht wurden Embryonen und Larven der verschiedenen Metamorphosestadien und entwickelte Individuen von Amphibien (Fröschen) und Fischen hinsichtlich der Größe der Erythrozyten, dann der Zellen der Leber, der Epithelien der Epidermis und der Maulschleimhaut, der Konjunktivalschicht der Kornea, des Stratum pigmenti und der Stäbchen der Retina und schließlich die Hornzellen an Kopf- und Klauenhorn bei 14 Rinderassen. Das Ergebnis der Untersuchungen ist kurz folgendes: Es bestehen Beziehungen zwischen der Zellgröße, die sich im allgemeinen nur innerhalb enger Grenzen als veränderlich erwies, und der Körpergröße der Rasse, dem Geschlecht und dem Alter. Das Körperwachstum bewirkt eine bei den einzelnen Zellarten verschiedene Volumzunahme. Bei den erwachsenen Individuen bestehen geschlechtliche Unterschiede in der Zellgröße, während diese bei jugendlichen Individuen nicht eindeutig nachzuweisen sind. Innere physiologische Faktoren scheinen die Zellgröße zu beeinflussen. Auch äußere Faktoren, z. B. Hungerernährung, bewirken eine mäßige Änderung der Zellgröße. Die Zellgröße ist typisch für die Rasse, der Variationskoeffizient typisch für die Art. Ob die Zellgröße eine Grundlage bietet für die Bewertung der Leistung, ist noch durch weitere eingehende Untersuchungen zu klären. A. Hink.

Standesangelegenheiten.

Preußisches Tierärztekammergesetz.

Gesetz über die tierärztliche Berufsvertretung und die tierärztlichen Standesgerichte (Tierärztekammergesetz). Vom 13. April 1928.

I. Berufsvertretung.

1. Allgemeine Vorschriften.

§ 1. (1) Zur Förderung des tierärztlichen Berufsstandes werden Tierärztekammern und ein Tierärztekammerausschuß errichtet.

(2) Die Kammern und der Tierärztekammerausschuß sind Körperschaften des öffentlichen Rechtes. Sie führen als Siegel den preußischen Adler mit der Umschrift

„Tierärztekammer für“ bzw. „Preußischer Tierärztekammerausschuß“.

§ 2. (1) Jede Tierärztekammer umfaßt das Gebiet einer Provinz. Die Tierärztekammer für die Rheinprovinz umfaßt auch die Hohenzollernschen Lande. Die Stadt Berlin ist mit der Provinz Brandenburg zu einem Tierärztekammerbezirk vereinigt; sie bildet einen eigenen Tierärztekammerbezirk, wenn die Vereinigung nach Abf. 2 aufgehoben wird.

(2) Tierärztekammern benachbarter Bezirke können auf ihren Antrag auf Verordnung des Ministers zu einer Tierärztekammer vereinigt werden. Ebenso kann der Minister die Vereinigung nach Anhören der Kammer wieder aufheben. Er trifft für diesen Fall die für die Auseinanderfetzung nötigen Anordnungen.

(3) Durch Verordnung des Staatsministers können benachbarte Gebiete außerpreussischer Länder einer Tierärztekammer auf deren Antrag angegeschlossen werden, wenn und solange die Tierärzte dieser Gebiete durch landesrechtliche Vorschriften diesem Gesetz unterworfen werden. Der Anschluß kann sich auf die Mitbenutzung bestimmter Einrichtungen beschränken.

(4) Der Tierärztekammerausschuß umfaßt das Gebiet des Preussischen Staates, einschließlich der nach Abf. 3 angeschlossenen Gebiete.

(5) Der Minister bestimmt den Sitz jeder Tierärztekammer und des Tierärztekammerausschusses.

2. Tierärztekammern.

§ 3. (1) Zu den Aufgaben der Tierärztekammer nach § 1 gehören namentlich:

a) die Förderung der tierärztlichen Standesinteressen; b) die Erörterung aller Fragen, die den tierärztlichen Beruf oder das öffentliche Veterinärwesen, einschließlich der Fleischschau und der tierärztlichen Nahrungsmittelkontrolle, angehen; c) die Erstattung von Gutachten auf Veranlassung der zuständigen Behörden; d) die Förderung von Fürsorgeeinrichtungen für Tierärzte und deren Hinterbliebene.

(2) Die Tierärztekammer ist befugt, innerhalb ihrer Zuständigkeit Vorstellungen und Anträge an die Staatsbehörden zu richten. Eingaben, die in allgemeinen Berufsangelegenheiten an eine Zentralbehörde gerichtet werden, sind in der Regel dem Tierärztekammerausschuß zur Weitergabe vorzulegen, soweit die Behörde nicht unmittelbare Berichtserstattung verlangt hat. Die Staatsbehörden sollen der Tierärztekammer Gelegenheit geben, sich über geeignete Fragen gutachtlich zu äußern.

(3) Die Tierärztekammer kann zur Erstattung von Gutachten in Angelegenheiten des tierärztlichen Standes sowie der tierärztlichen Berufstätigkeit Sachverständige benennen.

§ 4. (1) Die Mitglieder der Tierärztekammer und ihre Stellvertreter werden nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durch geheime und schriftliche Abstimmung gewählt.

(2) Wahlbezirk ist der Tierärztekammerbezirk. Durch die Wahlordnung (§ 9 Abf. 1) kann die Bildung mehrerer Wahlbezirke vorgeschrieben werden.

§ 5. (1) Wahlberechtigt sind alle in Deutschland approbierten Tierärzte, die im Wahlbezirk ihren Wohnsitz haben, deutsche Reichsangehörige sind und sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.

(2) Zu den wahlberechtigten Tierärzten rechnen hiernach neben den im freien Berufe stehenden Tierärzten insbesondere auch Tierärzte, die ein tierärztliches Reichs- oder Staatsamt bekleiden oder im Dienste von Gemeinden oder sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechtes stehen, oder die den tierärztlichen Beruf zwar nicht mehr ausüben, aber entweder in einer tierärztlichen Berufsorganisation tätig sind oder einen anderen Beruf nicht ergriffen haben.

(3) Das Wahlrecht eines Tierarztes ruht:

a) solange er geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist; b) solange eine gerichtliche Untersuchung gegen ihn schwebt, wenn diese wegen Verbrechen oder solcher Vergehen gegen ihn eingeleitet ist, die den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen oder nach sich ziehen können; c) solange er sich in Untersuchungshaft oder Strafhaft befindet; d) solange er von der Beitragspflicht zur Tierärztekammer befreit ist (§ 5 Abf. 2).

(4) Eine Wahlberechtigung besteht nicht für diejenigen außerpreussischen Tierärzte, die nach § 2 Abf. 3 Satz 2 lediglich zur Mitbenutzung bestimmter Einrichtungen einer Tierärztekammer angeschlossen sind.

§ 6. Wählbar sind die nach § 5 wahlberechtigten Tierärzte.

§ 7. (1) Die Mitglieder der Tierärztekammer werden auf vier Jahre gewählt. Die Wahlen finden im November für den mit dem 1. Januar des folgenden Jahres beginnenden vierjährigen Zeitraum statt.

(2) Bei der ersten Wahl bestimmt der Minister den Zeitpunkt der Wahl sowie Beginn und Dauer der Wahlzeit.

(3) Scheidet ein Mitglied während der Wahlzeit aus, so tritt an dessen Stelle für den Rest der Wahlzeit ohne Vornahme einer Ersatzwahl der Anwärter, der demselben Wahlvorschlag oder, wenn dieser erschöpft ist, einem mit ihm verbundenen Wahlvorschlag angehört. Die Reihenfolge wird durch die Wahlordnung (§ 9 Abf. 1) bestimmt. Ist ein Anwärter nicht vorhanden, so bleibt die Mitgliedstelle unbesetzt.

(4) Nach Ablauf der Wahlzeit bleiben die Mitglieder in Tätigkeit, bis eine Neuwahl stattgefunden hat.

§ 8. (1) Die Zahl der Mitglieder der Tierärztekammer und der Stellvertreter wird, vorbehaltlich der Vorschrift im Abf. 2, in der Weise bestimmt, daß auf je dreißig in die Wählerlisten (Wahlkarteien) des Tierärztekammerbezirks eingetragene Wähler ein Mitglied und ein Stellvertreter zu wählen sind. Verbleibt bei der Teilung der Wählerzahl durch 30 eine Restzahl von 15 oder mehr, so sind auch für diese Restzahl ein Mitglied und ein Stellvertreter zu wählen. Ist die Restzahl kleiner als 15, so bleibt sie unberücksichtigt.

(2) In jedem Tierärztekammerbezirk sind mindestens sechs Mitglieder

und sechs Stellvertreter zu wählen. Die Hohenzollernschen Lande haben Anspruch auf mindestens ein Mitglied und einen Stellvertreter.

(3) Der Vorsitzende der Tierärztekammer macht auf Grund der abgeschlossenen Wählerlisten (Wahlkarteien) vor jeder Wahl bekannt, wieviel Mitglieder und Stellvertreter zu wählen sind. Einsprüche gegen diese Feststellung sind binnen acht Tagen nach der Bekanntgabe bei der Aufsichtsbehörde anzubringen, die endgültig entscheidet.

(4) Wahlleiter ist der Vorsitzende der Tierärztekammer oder sein Vertreter.

(5) Das Ergebnis der Wahl ist öffentlich bekanntzugeben.

§ 9. (1) Im übrigen wird das Wahlverfahren, einschließlich des Verfahrens bei Einsprüchen gegen eine Wahl durch die vom Minister zu erlassende Wahlordnung geregelt.

(2) Die Kosten des Wahlverfahrens, einschließlich der Kosten der erforderlichen Bekanntmachungen trägt die Tierärztekammer.

§ 10. (1) Die Mitgliedschaft zur Tierärztekammer erlischt:

a) wenn die Voraussetzungen für die Wählbarkeit fortfallen, in den Fällen des § 5 Abs. 3 zu b bis d jedoch nur auf ausdrücklichen Beschluß der Tierärztekammer; b) wenn dem Gewählten die Wählbarkeit im standesgerichtlichen Verfahren (§ 40 Abs. 1 zu d) entzogen wird.

(2) Der Beschluß zu a) kann nur mit Zweidrittelmehrheit der Kammermitglieder gefaßt werden. Gegen den Beschluß ist binnen zwei Wochen nach Zustellung die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde zulässig, die endgültig entscheidet. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 11. Die Mitglieder der Tierärztekammer verwalten ihr Amt als Ehrenamt. Durch Beschluß der Tierärztekammer können ihnen für die Teilnahme an den Sitzungen der Kammer, des Vorstandes oder von Ausschüssen sowie für die Erledigung besonderer Aufgaben Entschädigungen gewährt werden.

§ 12. (1) Die Tierärztekammer wählt aus ihrer Mitte bei ihrem ersten Zusammentritt für die Dauer ihrer Wahlzeit einen Vorstand, der aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und mindestens einem Mitglied besteht. Soweit eine Tierärztekammer sich über mehrere Provinzen erstreckt, muß jede Provinz im Vorstande vertreten sein. Darüber hinaus soll bei Verteilung der Vorstandssitze das Verhältnis berücksichtigt werden, in dem die einzelnen Provinzen der Tierärztekammer durch Mitglieder vertreten sind. Die Hohenzollernschen Lande gelten nicht als Provinz im Sinne dieser Vorschrift. Im übrigen beschließt über die Zahl der Vorstandsmitglieder die Tierärztekammer. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen, der derselben Provinz angehören muß wie das Mitglied. Die Reihenfolge der Einberufung wird durch die Geschäftsordnung (§ 16 Abs. 1) geregelt.

(2) Die Wahlen (Abs. 1) erfolgen durch Stimmzettel mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los. Wahlen durch Zuruf sind zulässig, wenn kein Kammermitglied widerspricht.

(3) Lehnt ein Gewählter die Wahl ab oder scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter während der Wahlzeit aus, so findet eine Ersatzwahl statt.

(4) Der Vorstand führt nach Ablauf der Wahlzeit die Geschäfte weiter, bis der neue Vorstand die Geschäftsführung übernommen hat.

§ 13. (1) Der Vorsitzende oder sein Vertreter leitet die Geschäfte der Tierärztekammer und des Vorstandes, er beruft die Sitzungen der Kammer und des Vorstandes. Er muß eine Sitzung berufen, wenn es von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Kammer oder des Vorstandes unter Angabe der Verhandlungsgegenstände, oder wenn es von der Aufsichtsbehörde verlangt wird.

(2) Die Tierärztekammer wird nach außen vertreten durch ihren Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter. Urkunden, die die Tierärztekammer vermögensrechtlich verpflichten sollen, müssen von dem Vorsitzenden oder seinem Vertreter und einem zweiten Vorstandsmitgliede vollzogen werden.

(3) Die Bekanntmachungen der Tierärztekammer werden unter deren Namen erlassen und von dem Vorsitzenden oder dessen Vertreter unterzeichnet. Die Tierärztekammer bestimmt das Blatt, in dem die Bekanntmachungen zu veröffentlichen sind. Die Bekanntmachungen sollen allen in Preußen erscheinenden tierärztlichen Fachblättern mit dem Anheften unentgeltlicher Aufnahme mitgeteilt werden.

§ 14. (1) Neben den in diesem Gesetz, in der Geschäftsordnung und in den Ausführungsbestimmungen besonders bezeichneten Fällen beschließt die Tierärztekammer über:

a) die Wahl und die Befugnisse eines Geschäftsführers; b) die Gewährung von Entschädigungen an die Mitglieder sowie die Vergütung an Mitglieder, die in der Geschäftsführung tätig sind (§ 11); c) die Feststellung des Haushaltsplanes; d) die Feststellung der Jahresrechnung und die Entlastung des Rechnungsführers; e) die Einrichtung des Kassen- und Rechnungswesens; f) die Bildung von Ausschüssen und die Regelung ihrer Zuständigkeit; g) Maßnahmen, die die Tierärztekammer vermögensrechtlich verpflichtet, soweit es sich nicht lediglich um einmalige Zahlungen im Rahmen des Haushalts handelt.

(2) Im übrigen führt der Vorstand der Tierärztekammer die Geschäfte selbständig, soweit die Kammer die Beschlußfassung nicht ausdrücklich vorbehält.

(3) Die Beschlüsse zu Abs. 1g bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn es sich um Maßnahmen von finanziell wesentlicher Bedeutung handelt. Welche Maßnahmen dazu rechnen, wird durch Ausführungsbestimmung geregelt.

§ 15. (1) Beschlüsse der Tierärztekammer, die die Befugnisse der Kammer überschreiten oder das bestehende Recht verletzen, hat der Vorstand der Kammer mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden.

(2) Die gleiche Verpflichtung liegt dem Vorsitzenden der Kammer oder seinem Vertreter unter der Voraussetzung des Abs. 1 gegenüber Beschlüssen des Vorstandes ob.

(3) Daneben ist die Aufsichtsbehörde befugt, Beschlüsse nach Abs. 1, 2 mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden.

(4) Gegen die Beanstandungen nach Abs. 1 bis 3 steht der Kammer oder dem Vorstande binnen zwei Wochen die Klage im Verwaltungsstreitverfahren (§ 87) zu.

§ 16. (1) Den Geschäftsgang der Tierärztekammer regelt die von ihr zu erlassende Geschäftsordnung nach Grundsätzen, die der Minister aufstellt.

(2) Die Tierärztekammer kann nach Bedarf Ausschüsse für besondere Aufgaben bilden. Die Ausschüsse werden von der Kammer ohne Beschränkung auf ihre Mitglieder gewählt. Die Zuständigkeit der Ausschüsse regelt die Kammer.

(3) Die Sitzungen der Tierärztekammer sind für die im Kammerbezirk wohnenden Tierärzte öffentlich. Die Tierärztekammer kann die Öffentlichkeit für die Beratung einzelner Gegenstände ausschließen und muß sie ausschließen für die Beratung von Gegenständen, deren Geheimhaltung die Aufsichtsbehörde als notwendig bezeichnet. Im ersteren Falle bedarf der Beschluß einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder.

(4) Die Aufsichtsbehörde bestimmt, inwieweit ihr und anderen Stellen von Sitzungen der Tierärztekammer oder des Vorstandes Anzeige zu erstatten ist und Niederschriften einzureichen sind. Der Minister und die Aufsichtsbehörde können zu allen Sitzungen Beauftragte entsenden, die jederzeit zu hören sind.

(5) Alle Berichte und Eingaben an die Zentralbehörden des Reichs und der Länder sind durch die Aufsichtsbehörde vorzulegen.

3. Tierärztekammerausschuß.

§ 17. (1) Der Tierärztekammerausschuß hat, abgesehen von der Mitwirkung in den ausdrücklich vorgesehenen Fällen, allgemein für das Staatsgebiet die Aufgaben zu erfüllen, die den Tierärztekammern im § 3 für ihre Bezirke zugewiesen sind. Daneben liegt ihm ob, die gemeinsamen Angelegenheiten der Tierärztekammern zu führen sowie in solchen zu vermitteln und Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen Kammern auszugleichen.

(2) Der Tierärztekammerausschuß kann besondere Fürsorgeeinrichtungen mit Zwangsbeiträgen der Mitglieder auf Grund von Satzungen mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller Ausschußmitglieder beschließen. Die Satzung bedarf der Genehmigung des Ministers. Sie muß Bestimmungen enthalten über:

a) den Zweck und die Organisation der Einrichtung; b) die Mitgliedschaft; c) die Aufbringung der Beiträge; d) die Leistungen aus der Einrichtung; e) die Verwaltung der Mittel; f) die Rechnungslegung und Entlastung.

§ 18. (1) Die Mitglieder des Tierärztekammerausschusses werden von den Tierärztekammern gewählt.

(2) Jede Tierärztekammer wählt ein Mitglied; für jedes Mitglied ist gleichzeitig ein Stellvertreter zu wählen. Tierärztekammern, die sich über zwei oder mehrere Provinzen erstrecken, wählen zwei oder meh-

rere Mitglieder und zwei oder mehrere Stellvertreter. Jeder Provinz muß ein Mitglied und ein Stellvertreter angehören.

(3) Die Wahlen (Abf. 1) erfolgen durch Stimmzettel mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmgleichheit entscheidet das Los. Wahlen durch Zurufe sind zulässig, wenn niemand widerspricht.

§ 19. (1) Die Wahlen erfolgen für die Dauer der Amtszeit der Tierärztekammern.

(2) Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter während der Wahlzeit aus, so findet für den Rest der Wahlzeit eine Ersatzwahl statt.

Die §§ 10, 11 gelten entsprechend.

§ 20. Der Tierärztekammerauschuß wählt aus seiner Mitte bei seinem ersten Zusammentritt einen Vorstand. Der § 12 gilt entsprechend.

§ 21. (1) Den Geschäftsgang des Tierärztekammerauschusses regelt die von ihm zu erlassende Geschäftsordnung, die der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf.

(2) Die Sitzungen des Tierärztekammerauschusses sind nicht öffentlich. Der Tierärztekammerauschuß kann die Veröffentlichung seiner Sitzungsberichte in geeigneter Form beschließen.

(3) Die §§ 13 bis 15 und der § 16 Abf. 2, 4, 5 gelten entsprechend.

II. Standesgerichtsbarkeit.

1. Allgemeine Vorschriften.

Zur Standesgerichtsbarkeit im Sinne dieses Gesetzes gehören: a) ein Vermittlungsverfahren (§§ 30, 31) und b) ein standesgerichtliches Verfahren (§§ 32 bis 73).

Bei Streitigkeiten zwischen Tierärzten soll dem Verfahren zu a) in der Regel ein Schlichtungsverfahren (§ 29) vorausgehen.

§ 23. Für jeden Tierärztekammerbezirk wird ein tierärztliches Standesgericht, für den Geltungsbereich dieses Gesetzes ein tierärztlicher Standesgerichtshof gebildet.

§ 24. (1) Die Standesgerichtsbarkeit erstreckt sich auf alle approbierten Tierärzte mit Ausnahme derjenigen, die einem reichsrechtlich oder landesrechtlich geordneten Dienstverfahren unterliegen oder die keinerlei tierärztliche Tätigkeit praktischer oder wissenschaftlicher Art mehr ausüben. Der Vertrieb von Tierarzneimitteln ist der Ausübung tierärztlicher Tätigkeit gleichzuachten.

(2) Kommen über einen der im Abf. 1 von der Standesgerichtsbarkeit ausgenommenen Tierärzte Tatsachen zur Kenntnis des Standesgerichts, die bei einem anderen Tierarzt ein standesgerichtliches Verfahren nach sich ziehen würden, so hat das Standesgericht hiervon der vorgesetzten Dienstbehörde des Tierarztes Mitteilung zu machen. Die vorgesetzte Dienstbehörde des Tierarztes hat, sofern nicht dienstliche Interessen entgegenstehen, das Standesgericht von dem Veranlaßten zu benachrichtigen.

(3) Die der Standesgerichtsbarkeit nicht unterworfenen Tierärzte sind bei den Wahlen zum Standesgericht (§ 32) und zum Standesgerichtshof (§ 36) weder wahlberechtigt noch wählbar.

§ 25. (1) Zuständig ist das Standesgericht, in dessen Bezirke der Tierarzt, gegen den eine Standesstreitigkeit anhängig wird, zu diesem Zeitpunkt seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen Aufenthalt hat. Wird eine Standesstreitigkeit anhängig wegen einer gemeinsamen Handlung mehrerer Tierärzte, die in verschiedenen Standesgerichtsbezirken ihren Wohnsitz oder Aufenthalt haben, so bestimmt der Standesgerichtshof das zuständige Standesgericht.

(2) Streitigkeiten über die Zuständigkeit werden von dem Standesgerichtshof endgültig entschieden.

(3) In Fällen, in denen der Standesgerichtshof ein Standesgericht für befähigt hält, bestimmt er ein anderes Standesgericht als zuständig.

§ 26. (1) Der Tierarzt ist verpflichtet, seine Berufstätigkeit gewissenhaft auszuüben und durch sein Verhalten innerhalb und außerhalb dieser Tätigkeit sich der Achtung würdig zu zeigen, die sein Beruf erfordert.

(2) Ein Tierarzt, der die Pflichten nach Abf. 1 verletzt, hat die standesgerichtliche Verurteilung zu erwarten.

(3) Ein Tierarzt kann die standesgerichtliche Entscheidung über sein Verhalten beantragen. Das Standesgericht kann die Entscheidung mit Zweidrittelmehrheit ablehnen. Gegen den ablehnenden Beschluß ist Beschwerde (§ 68) an den Standesgerichtshof zulässig.

(4) Politische, wissenschaftliche oder religiöse Ansichten oder Handlungen als solche dürfen nicht Anlaß zu einem standesgerichtlichen Einschreiten sein.

(5) Taten, die länger als fünf Jahre seit ihrer Begehung zurückliegen, dürfen nicht mehr standesgerichtlich verfolgt werden. Verstößt die Tat auch gegen ein Strafgesetz, so treten die strafgesetzlichen Verjährungsfristen ein, soweit diese über fünf Jahre hinausgehen. § 68 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß die Verjährung sowohl durch jede Handlung des ordentlichen Richters im strafgerichtlichen Verfahren wegen der gleichen Tat als auch durch jede Handlung des Standesgerichts im förmlichen standesgerichtlichen Verfahren unterbrochen wird.

§ 27. (1) Gerichts-, Verwaltungs- und andere Behörden sind, soweit nicht dienstliche Gründe entgegenstehen, verpflichtet, auf Erfuchen des Standesgerichts, des Standesgerichtshofs oder deren beauftragter Mitglieder sachdienliche Auskunft zu geben. Die Ortspolizeibehörde kann um protokollarische Vernehmung von Personen ersucht werden.

(2) Eine eidliche Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen findet nur im förmlichen standesgerichtlichen Verfahren statt. Gerichte dürfen nur im förmlichen standesgerichtlichen Verfahren um Vernehmung des Angeklagten sowie von Zeugen oder Sachverständigen ersucht werden.

(3) Die Verhandlungen und der Schriftverkehr des Standesgerichts, des Standesgerichtshofs und deren beauftragter Mitglieder sind, soweit es sich nicht um die Beurkundung von Rechtsgeschäften handelt, gebühren- und stempelfrei.

§ 28. (1) Die nach diesem Gesetz erfolgenden Zustellungen und Vorladungen sind gültig und bewirken den Lauf der Fristen, wenn sie unter den für gerichtliche Zustellungen durch die Post vorgeschriebenen Formen — §§ 193 bis 195 der Zivilprozeßordnung — bewirkt werden. Der Beauftragung eines Gerichtsvollziehers bedarf es nicht.

(2) Wegen Berechnung der Fristen und wegen einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gelten §§ 42 bis 47 der Strafprozeßordnung entsprechend.

2. Schlichtungsverfahren.

§ 29. (1) Streitigkeiten zwischen Angehörigen des tierärztlichen Standes sind vor Einleitung eines Vermittlungsverfahrens tunlichst auf gutlichem Wege zu schlichten. Die Richtlinien für das Schlichtungsverfahren erläßt der Minister nach Benehmen mit dem Tierärztekammerauschuß.

(2) Das Schlichtungsverfahren findet auch Anwendung bei Streitigkeiten, an denen nicht der Standesgerichtsbarkeit unterworfenen Tierärzte (§ 24 Abf. 1) aus Anlaß ihrer freien Berufstätigkeit beteiligt sind.

3. Vermittlungsverfahren.

§ 30. (1) Zur Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus dem tierärztlichen Berufsverhältnis zwischen Tierärzten oder zwischen einem Tierarzt und einer anderen Person ergeben, hat das Standesgericht ein Vermittlungsverfahren einzuleiten, soweit nicht nach § 29 eine Einigung erfolgt.

(2) Bei Streitigkeiten zwischen einem Tierarzt und einer anderen Person tritt das Verfahren nur auf Antrag der letzteren ein.

(3) Der Vorsitzende des Standesgerichts kann die Vermittlung einem Mitgliede übertragen.

§ 31. (1) Jeder der Standesgerichtsbarkeit unterworfenen Tierarzt ist verpflichtet, im Vermittlungsverfahren zweckdienliche Auskunft zu geben, soweit er nicht die Aussage verweigern kann. Wegen des Rechts der Aussageverweigerung gelten die Vorschriften der Strafprozeßordnung entsprechend.

(2) Schwebt das Verfahren zwischen Tierärzten, so muß der Tierarzt den Vorladungen des Standesgerichts oder eines beauftragten Mitgliedes Folge leisten.

(3) Über einen Tierarzt, der eine Auskunft ohne gesetzlichen Grund verweigert oder einer Vorladung nicht Folge leistet, kann das Standesgericht oder das beauftragte Mitglied eine Ordnungsstrafe bis zu einhundertfünfzig Reichsmark verhängen. Wiederholte Ordnungsstrafen sind bis zum Gesamtbetrage von eintausend Reichsmark zulässig. Der Festsetzung der Strafe muß die schriftliche Androhung vorausgehen.

(4) Ist die Vernehmung eines Tierarztes aus einem anderen Standesgerichtsbezirk erforderlich, so hat dieses Standesgericht oder ein beauftragtes Mitglied auf Erfuchen des in der Sache zuständigen Standesgerichts oder seines beauftragten Mitglieds die Vernehmung zu bewirken.

(5) Soweit die Maßnahmen nach Abf. 1 bis 4 von einem beauftragten Mitgliede des Standesgerichts getroffen werden, ist dagegen binnen

einer Woche nach ihrer Anordnung der Einspruch beim Standesgerichte zulässig, das darüber beschließt. Gegen den Beschluß des Standesgerichts steht die Beschwerde an den Standesgerichtshof (§ 68) offen.

(6) Soll ein der Standesgerichtsbarkeit nicht unterworfenen Tierarzt um eine Auskunft erlucht werden, so ist ein entsprechender Antrag an die vorgesetzte Dienstbehörde zu richten, die die Auskunft erteilt, soweit nicht dienstliche Gründe entgegenstehen. Eine unmittelbare Auskunftserteilung durch den Tierarzt findet nicht statt.

4. Standesgerichtliches Verfahren.

a) Standesgericht.

§ 32. (1) Das Standesgericht bilden:

a) vier Mitglieder aus den der Tierärztekammer angehörenden Tierärzten, darunter der Vorsitzende der Tierärztekammer, sowie b) ein Mitglied mit Befähigung zum Richteramt.

(2) Für jedes dieser Mitglieder wird ein Stellvertreter bestimmt.

(3) Die tierärztlichen Mitglieder und Stellvertreter — abgesehen von dem Vorsitzenden der Tierärztekammer — werden von den wahlberechtigten Mitgliedern der Tierärztekammer für die Dauer ihrer Amtszeit (§ 7) gewählt. Dabei wird auch die Reihenfolge bestimmt, in der die Stellvertreter zu berufen sind. Gehört der Vorsitzende der Tierärztekammer zu den von der Standesgerichtsbarkeit ausgenommenen Tierärzten, so ist an seiner Stelle ein anderes Mitglied der Tierärztekammer in das Standesgericht zu wählen.

(4) Die Wahlen (Abf. 3) erfolgen durch Stimmzettel mit unbedingter Stimmenmehrheit. Wird im ersten Wahlgang eine unbedingte Stimmenmehrheit nicht erreicht, so findet Stichwahl zwischen den beiden Anwärtern statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(5) Das rechtskundige Mitglied und dessen Stellvertreter, der die gleiche Vorbildung wie das Mitglied haben muß, werden vom Vorstände der Tierärztekammer für die Dauer der Amtszeit der Tierärztekammer gewählt.

(6) Das Standesgericht führt nach Ablauf seiner Amtszeit die Geschäfte weiter, bis das neue Standesgericht gebildet ist.

§ 33. (1) Auf die Tätigkeit der tierärztlichen Mitglieder findet § 11 entsprechende Anwendung.

(2) Das rechtskundige Mitglied und dessen Stellvertreter erhalten angemessene Vergütungen nach den mit ihnen zu treffenden Vereinbarungen.

§ 34. (1) Den Vorsitz des Standesgerichts führt der Vorsitzende der Tierärztekammer oder, wenn dieser nicht Mitglied des Standesgerichts ist (§ 32 Abf. 3 Satz 3) oder den Vorsitz ablehnt oder sonst dauernd behindert ist, ein von den tierärztlichen Mitgliedern des Standesgerichts aus ihrer Mitte für die Dauer ihrer Amtszeit zu wählender Vorsitzender.

(2) Bei zeitweiliger Behinderung wird der Vorsitzende durch den stellvertretenden Vorsitzenden vertreten, der von den tierärztlichen Mitgliedern des Standesgerichts aus ihrer Mitte für die Dauer ihrer Amtszeit gewählt wird.

(3) Die Wahlen nach Abf. 1, 2 erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen und führt die Beschlüsse und Entscheidungen des Standesgerichts aus. Er vertritt das Standesgericht nach außen und vollzieht in dessen Namen die von ihm ausgehenden Schriftstücke und Urkunden.

(5) Im übrigen wird der Geschäftsgang des Standesgerichts durch eine Geschäftsordnung geregelt, die der Minister erläßt.

(6) Die Aufsichtsbehörde bestellt für das standesgerichtliche Verfahren allgemein oder für den einzelnen Fall einen Vertreter, der befugt ist, die formelle Durchführung der Vorschriften zu überwachen.

(7) Der Vorsitzende des Standesgerichts hat der Aufsichtsbehörde alljährlich Bericht über die Tätigkeit des Standesgerichts zu erstatten.

§ 35. (1) Das Standesgericht beschließt und entscheidet in der Besetzung von fünf Mitgliedern nach Stimmenmehrheit, soweit nicht in diesem Gesetz ausdrücklich etwas anderes vorgeschrieben ist. Die §§ 195 bis 198 des Gerichtsverfassungsgesetzes gelten entsprechend.

(2) Entscheidungen in der Schuldfrage, die dem Angeklagten nachteilig sind, erfordern eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen. Zur Schuldfrage gehört nicht die Entscheidung darüber, ob Verjährung eingetreten ist.

(3) Beschlüsse, die das Verfahren leiten, können durch schriftliche Abstimmung gefaßt werden, sofern nicht ein Mitglied mündliche Beratung verlangt.

(4) Die bei einer Angelegenheit beteiligten oder als befangen erklärten Mitglieder des Standesgerichts dürfen an Beschlüssen und Entscheidungen über diese Angelegenheit nicht teilnehmen und werden durch Stellvertreter ersetzt. §§ 22, 24 bis 26, 28 bis 30 der Strafprozeßordnung gelten entsprechend. Die Ersetzung erfolgt durch Beschluß des Standesgerichts, wenn sich das Mitglied nicht selbst als beteiligt oder befangen erklärt. An der Beschlußfassung nimmt an Stelle des abgelehnten Mitglieds der Stellvertreter teil. Schriftliche Abstimmung ist zulässig, sofern nicht ein Mitglied mündliche Beratung verlangt. Auf Beschwerde (§ 68) entscheidet der Standesgerichtshof endgültig. Wird ein Standesgericht durch Ausschluß von Mitgliedern und Stellvertretern beschlußunfähig, so überweist der Standesgerichtshof die Sache an ein anderes Standesgericht.

b) Standesgerichtshof.

§ 36. (1) Den Standesgerichtshof bilden:

a) der Leiter der Veterinärabteilung des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten oder in dessen Behinderung ein von dem Minister bestellter tierärztlicher Vertreter als Vorsitzender; b) zwei Mitglieder mit Befähigung zum Richteramt; c) vier der Standesgerichtsbarkeit unterworfenen Tierärzte.

(2) Für jedes der Mitglieder zu b und c wird ein Stellvertreter bestellt.

(3) Die rechtskundigen Mitglieder und ihre Stellvertreter wählt der Tierärztekammerausschuß.

(4) Ebenso wählt der Tierärztekammerausschuß die vier tierärztlichen Mitglieder und deren Stellvertreter für die Dauer seiner Amtszeit. § 32 Abf. 3 Satz 2, Abf. 4 gilt entsprechend.

(5) Die Wahlen (Abf. 3, 4) erfolgen auf die Dauer der Amtszeit des Tierärztekammerausschusses. § 32 Abf. 6 gilt entsprechend.

(6) § 33, § 34 Abf. 4 bis 7 gelten entsprechend.

§ 37. (1) Der Standesgerichtshof beschließt und entscheidet in der Besetzung von sieben Mitgliedern nach Stimmenmehrheit, soweit nicht in diesem Gesetz ausdrücklich etwas anderes vorgeschrieben ist.

(2) Ein Mitglied, das bei einer Entscheidung oder einem Beschlusse vor dem Standesgerichte mitgewirkt hat, ist von der Teilnahme an der Entscheidung oder dem Beschlusse vor dem Standesgerichtshof ausgeschlossen.

(3) Der § 35 Abf. 1 Satz 2, Abf. 2 bis 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß eine Beschwerde im Falle des § 35 Abf. 4 nicht stattfindet.

c) Verfahrensvorschriften.

§ 38. (1) Das standesgerichtliche Verfahren wird eingeleitet:

a) wenn ein der Standesgerichtsbarkeit unterstehender Tierarzt die standesgerichtliche Entscheidung beantragt, vorbehaltlich § 26 Abf. 3 Satz 2, 3; b) wenn gegen einen Tierarzt eine Anschuldigung wegen Verletzung der Standespflicht (§ 26) bei dem Standesgericht erhoben wird; die Anzeige muß unterschrieben sein und diejenigen Tatsachen und Beweismittel genau bezeichnen, die sie veranlassen; c) auf Antrag der Aufsichtsbehörde.

(2) Vor Einleitung des förmlichen standesgerichtlichen Verfahrens (§§ 43 flg.) kann das Standesgericht ihm geeignet erscheinende Ermittlungen über die der Anschuldigung zugrunde liegenden Tatsachen anstellen. In den Fällen des Abf. 1 zu b und c soll der Angeklagte vorher gehört werden.

(3) Das Standesgericht kann die Einleitung des standesgerichtlichen Verfahrens sowohl aus rechtlichen als auch aus tatsächlichen Gründen ablehnen.

(4) Von einer Ablehnung der Verfolgung sind der Angeklagte, der Anzeigende (Abf. 1 zu b) und die Aufsichtsbehörde zu benachrichtigen.

(5) Gegen den ablehnenden Beschluß steht dem Beauftragten der Aufsichtsbehörde die Beschwerde (§ 68) an den Standesgerichtshof zu.

(6) Der Angeklagte kann sich in jeder Lage eines standesgerichtlichen Verfahrens des Beistandes eines Rechtsanwalts oder eines Tierarztes oder beider bedienen. Der Beistand darf Beweisanträge nicht gegen den Willen des Angeklagten stellen und Rechtsmittel nur auf dessen ausdrückliche Ermächtigung einlegen oder zurücknehmen.

(7) Der Vorsitzende des Standesgerichts kann dem Angeeschuldigten auf Antrag für die Hauptverhandlung einen Beistand bestellen, wenn der Angeeschuldigte mittellos ist und die Sachlage eine Verteidigung geboten erscheinen läßt. Dem bestellten Beistand sind für die geführte Verteidigung die Gebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung für Rechtsanwälte in Strafsachen zu bezahlen. Der Rückgriff auf den in die Kosten verurteilten Angeeschuldigten bleibt vorbehalten.

§ 39. (1) Ist gegen einen Tierarzt wegen einer strafbaren Handlung ein gerichtliches Untersuchungsverfahren oder das Verfahren auf Zurücknahme der tierärztlichen Approbation eingeleitet, so darf während der Dauer eines solchen Verfahrens wegen der gleichen Handlung ein standesgerichtliches Verfahren nicht eröffnet werden. Ist es bereits eingeleitet, so ruht es. Dies gilt nicht, wenn im gerichtlichen Strafverfahren eine Hauptverhandlung gemäß § 277 der Strafprozeßordnung wegen Abwesenheit des Angeklagten nicht stattfinden kann. In solchen Fällen darf das standesgerichtliche Verfahren trotz Abwesenheit des Angeeschuldigten durchgeführt werden.

(2) Ist im gerichtlichen Strafverfahren auf Freisprechung oder auf Einstellung des Verfahrens erkannt oder ist das Verfahren auf Zurücknahme der Approbation eingestellt, so findet wegen derjenigen Tatsachen, die dem vorangegangenen Verfahren zugrunde liegen, ein standesgerichtliches Verfahren nur insoweit statt, als diese Tatsachen an sich und unabhängig davon, ob sie unter ein Strafgesetz fallen oder die Voraussetzungen des § 53 der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich erfüllen, eine standesgerichtliche Bestrafung begründen. Die tatsächlichen Feststellungen des ordentlichen Gerichts sind für das Standesgericht nicht bindend, das Standesgericht braucht jedoch ihre Richtigkeit nicht nachzuprüfen, soweit es sie seiner Entscheidung zugrunde legt.

(3) Ist im gerichtlichen Strafverfahren eine Verurteilung erfolgt, auf Grund deren die Verwaltungsbehörde die Approbation nicht oder nur auf Zeit zurücknehmen kann (§ 53 der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich), so beschließt das Standesgericht, ob außerdem das standesgerichtliche Verfahren zu eröffnen oder fortzusetzen ist.

(4) Das standesgerichtliche Verfahren ist einzustellen, sobald die Approbation des Angeeschuldigten dauernd zurückgenommen wird. Veröffentlichung des Einstellungsbefchlusses nach § 40 Abs. 3 ist zulässig.

§ 40. (1) Die standesgerichtlichen Strafen sind:

a) Warnung; b) Verweis; c) Geldstrafe bis zu eintausend Reichsmark; d) auf Zeit beschränkte oder dauernde Entziehung des aktiven und passiven Wahlrechts zur Tierärztekammer.

(2) Verweis oder Geldstrafe kann gleichzeitig mit Entziehung des Wahlrechts als Strafe ausgesprochen werden.

(3) In besonderen Fällen kann auf Veröffentlichung der standesgerichtlichen Entscheidung erkannt werden.

(4) Das Standesgericht bestimmt allgemein oder für den einzelnen Fall die Blätter, in denen eine Veröffentlichung zu erfolgen hat. Die Kosten der Veröffentlichung gehören zu den Kosten des standesgerichtlichen Verfahrens.

(5) Bei der Verhängung von Geldstrafen können Teilzahlungen bewilligt werden. Die Vergünstigung kann durch Beschluß des Standesgerichts auch nachträglich bewilligt, nachträglich geändert und auch zurückgenommen werden.

§ 41. (1) Warnung, Verweis und Geldstrafen bis zu einhundertfünfzig Reichsmark können nach Anhörung des Beauftragten der Aufsichtsbehörde (§ 34 Abs. 6) ohne förmliches standesgerichtliches Verfahren durch Beschluß des Standesgerichts verhängt werden. Der Angeeschuldigte ist in jedem Falle vorher über die ihm zur Last gelegte Verfehlung und das Ergebnis der etwa angestellten Ermittlungen (§ 38 Abs. 2) zu hören.

(2) Dem Angeeschuldigten und dem Beauftragten der Aufsichtsbehörde steht das Recht zu, vor der Beschlußfassung die Eröffnung des förmlichen standesgerichtlichen Verfahrens zu beantragen. Die Ablehnung des Antrags ist nur bei gleichzeitiger Einstellung des nicht förmlichen standesgerichtlichen Verfahrens zulässig.

§ 42. (1) Ausfertigung des nach § 41 Abs. 1 gefaßten Beschlusses nebst Begründung wird dem Angeeschuldigten und dem Beauftragten der Aufsichtsbehörde zugestellt.

(2) Beiden Teilen steht die Beschwerde (§ 68) an den Standesgerichtshof zu.

(3) Der Beschluß, gegen den nicht rechtzeitig Beschwerde erhoben wird, erlangt die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung.

§ 43. Das förmliche standesgerichtliche Verfahren besteht in Voruntersuchung und Hauptverhandlung.

Voruntersuchung.

§ 44. (1) Die Voruntersuchung wird durch einen Beschluß des Standesgerichts eröffnet, in dem die dem Angeeschuldigten zur Last gelegten Verfehlungen aufzuführen sind.

(2) In dem Beschlusse sind der Untersuchungsführer und der Vertreter der Anklage zu benennen.

(3) Gegen den Beschluß steht dem Angeeschuldigten die Beschwerde (§ 68) an den Standesgerichtshof nur wegen Unzuständigkeit oder Befangenheit des Standesgerichts zu.

§ 45. (1) Als Untersuchungsführer soll in der Regel das rechtskundige Mitglied des Standesgerichts bestellt werden.

(2) Der Untersuchungsführer kann nicht abgelehnt werden. Über Einwendungen gegen seine Person entscheidet die Aufsichtsbehörde endgültig.

§ 46. Die Anklage vertritt der Beauftragte der Aufsichtsbehörde.

§ 47. (1) In der Voruntersuchung wird der Angeeschuldigte unter Mitteilung des Eröffnungsbefchlusses vorgeladen und, wenn er erscheint, gehört.

(2) Die Zeugen und Sachverständigen werden vernommen und die zur Aufklärung der Sache dienenden sonstigen Beweise erhoben. Bei der Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen darf in der Regel der Angeeschuldigte nicht zugegen sein, doch kann ihm aus besonderen Gründen der Untersuchungsführer die Anwesenheit gestatten, auch kann eine Gegenüberstellung der Zeugen und Sachverständigen mit dem Angeeschuldigten erfolgen.

(3) Die Zeugen und Sachverständigen sind zu vereidigen, wenn ihre Aussagen für die Beurteilung der Sache erheblich erscheinen. Die Vereidigung erfolgt nach der Vernehmung. Im übrigen finden auf die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen sowie wegen des Rechtes zur Verweigerung des Zeugnisses oder des Gutachtens und wegen der Zeugen- und Sachverständigengebühren die Vorschriften der Strafprozeßordnung und der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige entsprechende Anwendung. Zwangs- und Strafmaßnahmen gegen Zeugen und Sachverständige stehen dem Untersuchungsführer nicht zu.

(4) Erscheint ein ordnungsmäßig geladener Zeuge oder Sachverständiger nicht oder verweigert er ohne gesetzlichen Grund seine Aussage, so ist der Untersuchungsführer berechtigt, das zuständige Amtsgericht um eidliche Vernehmung zu erfuchen.

(5) Auf das Erfuchen finden die Vorschriften der §§ 157 bis 159, 165 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.

(6) Die Vorschriften der Abs. 4, 5 finden auch Anwendung, wenn der Untersuchungsführer wegen weiter Entfernung des Wohn- oder Aufenthaltsortes des Angeeschuldigten, des Zeugen oder des Sachverständigen das zuständige Amtsgericht um Vernehmung erfucht. Eine Vorführung des Angeeschuldigten zur Vernehmung darf nicht erfolgen.

§ 48. (1) Über jede Untersuchungshandlung ist eine Niederschrift aufzunehmen.

(2) Als Schriftführer ist eine geeignete Person zuzuziehen. Der Schriftführer ist vor der Amtshandlung mittels Handschlags an Eides Statt zu verpflichten. Im übrigen gilt § 188 der Strafprozeßordnung entsprechend.

§ 49. (1) Der Vertreter der Anklage ist berechtigt, von dem Stande der Voruntersuchung durch Einsicht der Akten jederzeit Kenntnis zu nehmen und die ihm geeignet erscheinenden Anträge zu stellen.

(2) Lehnt der Untersuchungsführer einen Antrag auf Ergänzung der Voruntersuchung ab, so entscheidet das Standesgericht.

(3) Die Voruntersuchung ist auf die in dem Eröffnungsbefschluß angeführten Anschuldigungen nicht beschränkt, sie kann auf standeswidrige Handlungen (§ 26), die im Laufe der Untersuchung zutage treten, ausgedehnt werden. Der Angeeschuldigte ist von jeder Ausdehnung der Untersuchung in Kenntnis zu setzen.

§ 50. (1) Erachtet der Untersuchungsführer den Zweck der Voruntersuchung als erreicht, so übersendet er die Verhandlungen dem Standesgericht, das sie, wenn es die Voruntersuchung für abgeschlossen hält, dem Vertreter der Anklage zur Stellung seiner Anträge vorlegt.

(2) Der Angeeschuldigte ist hiervon zu benachrichtigen, auch ist ihm oder seinem Beistand (§ 38 Abs. 6) die Einsicht in die Untersuchungsakten freizustellen. Die Akteneinsicht ist schon vorher zu gestatten, soweit dies ohne Gefährdung des Untersuchungszweckes geschehen kann.

(3) Der Vertreter der Anklage und der Angeeschuldigte oder dessen Beistand können eine Ergänzung der Voruntersuchung beantragen. Dem Angeeschuldigten ist hierfür eine Frist von mindestens einer Woche zu gewähren. § 49 Abf. 2 gilt entsprechend.

(4) Nach dem Abschluß der Voruntersuchung ist ein Mangel der örtlichen Zuständigkeit des Standesgerichts nicht mehr beachtlich.

§ 51. (1) Der Vertreter der Anklage hat bei dem Standesgericht entweder die Einstellung des Verfahrens oder unter Einreichung einer Anklageschrift die Anberaumung einer Hauptverhandlung zu beantragen.

(2) Lehnt das Standesgericht die Einstellung des Verfahrens ab, so muß Anklage erhoben werden.

(3) Die Anklageschrift hat die dem Angeeschuldigten zur Last gelegten Verfehlungen durch Angabe der sie begründenden Tatsachen zu bezeichnen und, soweit in der Hauptverhandlung Beweise erhoben werden sollen, die Beweismittel anzugeben.

§ 52. (1) Die Einstellung des standesgerichtlichen Verfahrens erfolgt durch Beschluß des Standesgerichts.

(2) Ausfertigung des mit Gründen zu verfehenden Einstellungsbeschlusses ist dem Angeeschuldigten zuzustellen.

(3) Das standesgerichtliche Verfahren ist vorläufig einzustellen:

a) wenn der Angeeschuldigte in Geisteskrankheit verfällt; b) wenn sein Aufenthalt unbekannt ist oder c) wenn seine Approbation auf Zeit zurückgenommen ist.

Es kann wiederaufgenommen werden, wenn der Grund der vorläufigen Einstellung weggefallen ist.

(4) Das standesgerichtliche Verfahren kann eingestellt werden, wenn der Verstoß gegen die Standespflichten so geringfügig ist oder so lange zurückliegt, daß eine Verurteilung nach dem Gesamtverhalten des Angeeschuldigten nicht gerechtfertigt erscheint.

(5) Gegen den Einstellungsbeschluß ist die Beschwerde (§ 68) an den Standesgerichtshof zulässig.

(6) Ist das standesgerichtliche Verfahren ohne Hauptverhandlung eingestellt, so kann es wegen derselben Anschuldigung nur während eines Zeitraumes von drei Jahren vom Tage des Einstellungsbeschlusses ab und nur auf Grund neuer Tatsachen oder Beweismittel im Wege des förmlichen Wiederaufnahmeverfahrens wiederaufgenommen werden.

(Schluß folgt.)

Tierärztekammer für die Provinz Hessen-Nassau und den Freistaat Schaumburg-Lippe.

31. März 1928 in Marburg.

Anwesend 10 Mitglieder. Vor Eintritt in die Tagesordnung widmet der Vors. dem verstorbenen Vors. des T.K.A. Dr. h. c. Franzenburg, den die Verammlung durch Erheben von den Sitzen ehrt, einen Nachruf. 1. Hierauf berichtet der Vors. über einige vom Vorstande erledigte Angelegenheiten: a) Eine Beschwerde des Landwirts J. in N. über die Höhe einer Liquidation des Herrn Dr. L. in N. wurde vom Vorstande als unberechtigt zurückgewiesen. b) Auf die Eingabe des Herrn Dr. R. in L. betr. Übertragung der Fleischbeschau in benachbarten, aber außerhalb der Provinzgrenzen gelegenen Orten, ist dem Kollegen geantwortet worden, zunächst den Dienstweg zu erschöpfen. c) Die von dem Regierungspräsidenten in K. eingeforderte Stellungnahme zu einer Eingabe des Tierarztes V. in F. betr. Übertragung der ordentlichen Fleischbeschau ist dahin beantwortet worden, daß seitens der Kammer keine Einwendungen gegen eine Ablehnung des Gefuches erhoben werden würden, weil die Existenz zweier Familien durch die Übertragung der Fleischbeschau auf Herrn V. gefährdet würde. d) Im Kampfe um das Dispensierrecht sind vom Vorstande Propagandaschriften beschafft und verandt worden. 2. Zu der Eingabe des Kreistierarztes a. D. O. in A., welche vom Vors. bereits beantwortet, deren Beratung von O. jedoch ausdrücklich beantragt worden war, beschließt die Kammer, daß das Antwortschreiben des Vors., nach welchem der Antragsteller an den Minister verwiesen wird, gebilligt wird. 3. Auf Antrag des Vereins der Tierärzte im Reg.-Bez. W. beschließt die Kammer eine Eingabe an den T.K.A., die sich gegen die Form des Ministerialerlasses vom 18. Januar 1928 insbesondere gegen seine öffentliche Bekanntgabe richtet. Der T.K.A. soll gebeten werden, sich der Eingabe anzuschließen und das Weitere zu veranlassen. 4. Wegen der in verschiedener Höhe festgesetzten Fleischbeschaugebühren in den beiden Reg.-Bezirken Kassel und Wiesbaden wird der Vors. beauftragt, mit dem Dezernenten bei der

Regierung in K. persönlich Rücksprache zu nehmen. 5. Infolge der Ministerialverfügung vom 17. Februar 1928 betr. Verrechnung von verabreichten Arzneien und entsprechende Änderungen der Taxe wird beschlossen, da eine einheitliche Taxe in Hessen-Nassau nicht besteht, eine für den ganzen Kammerbezirk gültige Taxe einzuführen, welche entsprechend dem Erlasse des Ministers die Bestimmung enthalten soll, daß die Preise für Behandlung und Arzneien getrennt aufzuführen sind. Zur Vorbereitung wird eine Kommission, bestehend aus Dr. Lüders, Dr. Lucas und Dr. Schaaf, gewählt. 6. Zur Frage der Beteiligung der Kammer an den Hochschulfestlichkeiten in Hannover wird die Entsendung einer offiziellen Delegation abgelehnt. Der stellvertretende Vors. Dr. Menck erklärt sich jedoch mit Zustimmung der Kammer bereit, diese bei der Feier zu vertreten. gez. Bärtling, Vors.

Tierärztliche Gesellschaft in Königsberg (Pr.).

Gründungsitzung am 28. Januar 1928 in Königsberg (Pr.). Der Einladung durch Reg.-Rat Dr. Müller und Dr. Zimmermann waren von 52 der ortsansässigen Kollegen 33 gefolgt. Drei Herren hatten ihre Abwesenheit entschuldigt. Folgende Herren waren erschienen: Dr. Zimmermann, Dr. Krack, Dr. Weber, Dr. Jonske, Schmidt, Dr. Giffey, Dr. Pitt, Dr. Simon, Dr. Twoge, Dr. Heuer, Dr. Krill, Dr. Koher, Dr. Arnsdorff, Dr. Kahnert, Dr. Pretsch, Dr. Tauchert, Dr. Ilgner, Dr. Strubelt, Dr. Zeinert, Prof. Dr. Hieronymi, Krage, E. Schulz, Dr. Kunze, Wendt, Paul Müller, Dr. Friedrich Müller, Flemming, Dr. Grossien, Dr. Hollandt, Dr. Sauvan, Veterinärat Zimmermann, Wiesner, Dr. Weisgerber. Zum einstweiligen Vorstand wurden als I. Vors. Dr. Müller, als stellvertr. Vors. Prof. Dr. Hieronymi, als Sekretär Dr. Zimmermann gewählt.

Anschließend hieran referierte der Direktor des städtischen Schlacht- und Viehhofes Dr. Ilgner über das Thema: „Grundsätzliches in der Vererbungslehre und Rassenhygiene“ und führte dabei ungefähr folgendes aus: Die große Bedeutung, die die Tierzucht gerade für die Landwirtschaft unserer Heimatprovinz hat, beansprucht das rege Interesse der Tierärzte für dieses Gebiet der Tierkunde. Ein großer Teil aller Tierärzte steht durch die Ausübung der Fleischschau und der Nahrungsmittelkontrolle in mehr oder weniger hohem Maße im direkten Dienst der menschlichen Hygiene. Ein besonders wichtiges Gebiet der Hygiene, das der Rassenhygiene im Anschluß an die Vererbungslehre, die Grundlage jeder zielbewußten Tierzucht zu besprechen, wird daher in diesem Kreise willkommen sein. Nach einem kurzen Rückblick auf die Geschichte der Vererbungslehre wird auf die hervorragende Bedeutung des Prinzips der „Auslese“ für die Erfolge der modernen Tierzucht hingewiesen. Es folgt die Besprechung der Mendelischen Regeln, der Frage der Vererbung erworbener Eigenschaften und der Vererbung von Krankheitsanlagen. Abgesehen von ihrer praktischen Bedeutung für die Tier- bzw. Pflanzenzucht ist die ganze zoologische und botanische Erbschaftsforschung letzten Endes eine Vorbereitung für die Erbschaftsforschung beim Menschen. Diese ergibt eine Bestätigung der in Tier- und Pflanzenreich gewonnenen Erkenntnisse. Für die Rassenhygiene sind sie praktisch besonders dahin zu werten, das für die Zukunft jeder Rasse ausschlaggebend ist, inwieweit es ihr gelingt, ihre besten Erbstämme in ausreichender Fortpflanzung zu erhalten. Der Referent schließt mit dem Wunsche, daß hinreichende rassenbiologische Kenntnisse recht bald allgemeinste Verbreitung finden möchten, um das Unheil abzuwenden, das durch ihre Nichtbeachtung unserer Kulturbevölkerung droht. Die weiteren Sitzungen werden in den Zeitschriften bekannt gegeben. Auswärtige Kollegen, die dieselben besuchen wollen, werden gebeten, sich an Dr. Zimmermann, Königsberg (Pr.), Tiergartenstraße 53a, zu wenden.

Verschiedene Mitteilungen.

Ellenbergers 80. Geburtstag.

Einem Wunsche des Jubilars entsprechend wurde der 80. Geburtstag in aller Stille begangen. Doch gestattete es der Gesundheitszustand, daß wenigstens die veterinärmedizinische Fakultät und einige wenige Freunde und Schüler Ellenbergers als Deputation im engsten Kreise dem Jubilar Glückwünsche überbringen konnten. Der Dekan der veterinärmedizinischen Fakultät, Obermedizinalrat Prof. Dr. Klimmer schil-

derte in kurzen herzlichen Worten die Bedeutung Ellenbergers für die Wissenschaft und für die ehemalige Tierärztliche Hochschule Dresden, deren Eingliederung als veterinärmedizinische Fakultät wohl die Krönung des Lebenswerkes Ellenbergers darstellt. Es konnte die etwa 500 Namen umfassende Liste der Ellenberger-Spende, die die stattliche Summe von R.M. 9000 erreicht hatte, dem Jubilar überreicht werden. Im Anschluß daran überreichte Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. Baum, Ellenbergers ältester Mitarbeiter, sein neuestes, dem Jubilar gewidmetes Werk (Das Lymphgefäßsystem des Pferdes) und gedachte der in der wissenschaftlichen Welt wohl einzig dastehenden engen Zusammenarbeit, die sich über mehr als ein Menschenalter (43 Jahre) erstreckt. Als Mitglied der Deputation überbrachte dann noch Prof. Trautmann die Glückwünsche der Tierärztlichen Hochschule in Hannover in Form einer künstlerischen Adresse. Ellenberger dankte jedem Gratulanten einzeln mit bewegten Worten. Persönlich überreichte noch der finnländische Konsul eine Adresse des Finnländischen tierärztlichen Vereins, dessen Ehrenmitglied Ellenberger ist, und Regierungsveterinär Dr. Otto die Glückwünsche des Vereins sächsischer Staatstierärzte mit einer prachtvollen Blumenpende. Zahlreiche ebenfalls Spenden gelangten im Laufe des Tages von den verschiedensten Seiten an den Jubilar, darunter die von den drei Corps und einer Landsmannschaft, denen der Jubilar als Ehrenmitglied angehört. Das Corps Saxo-Borussia überreichte außerdem eine Adresse. Weiterhin traf eine Adresse der Vertreter der biologischen Fächer in Kazan ein. Von den eingegangenen zahlreichen Glückwünschen seien erwähnt: Sächsisches Ministerium für Volksbildung, Universität Leipzig, Sächsische Akademie der Wissenschaften, Landesgesundheitsamt, der Rat zu Dresden, deutscher Veterinär, Veterinärinspektion der Reichswehr im Reichswehrministerium, Veterinärinspektion der 4. Division, der Rudolstädter S.C., Deutscher Offizierbund, neun ausländische und zahlreiche inländische Hochschulen und Fakultäten, sowie zahlreiche Vereine, darunter auch schwedische und dänische Vereine, denen Ellenberger z. T. auch als Ehrenmitglied angehört. Trotz des engen Rahmens, in dem sich die eigentliche Beglückwünschung halten mußte, verlief der ganze Tag als eine erhebende Kundgebung herzlicher Zuneigung und Dankbarkeit für den allseits hochverehrten Jubilar.

Giesenhausen †.

Am 7. April 1928 verschied im 68. Lebensjahr der Botaniker der tierärztlichen Fakultät München, Herr Geh. Reg.-Rat Dr. Karl Giesenhausen. Er wurde 1907 als ord. Prof. der Botanik und Pharmakognosie an die damalige Tierärztl. Hochschule berufen und gehörte zu den Männern, die sich für die Angliederung der Hochschule an die Universität einsetzten. Noch im vorigen Sommersemester wanderte er im Vollbesitz geistiger und körperlicher Kraft jeden Samstag Nachmittag mit den Studierenden hinaus in die Natur und war bestrebt, die Studierenden nicht nur mit der Pflanzenwelt vertraut zu machen, sondern ihnen Sinn und Liebe zur Natur ins Herz zu pflanzen — sich wohl bewußt, daß die Liebe zur Natur das beste Fundament für die Erziehung und Erziehung der Jugend ist. Giesenhausen hat sich fast auf allen Gebieten der Botanik betätigt; besonders aber widmete er sich dem Studium der Farne, die er wie kein anderer kannte. Außerdem beschäftigte er sich mit den Arznei- und Nutzpflanzen und den Inhalt seiner Schrift über die Nutzpflanzen (Natur und Kultur XIV Heft 1—3) verwob er in seine Vorlesungen über die Botanik. Weite Reisen in die Tropen — besonders nach Java und Sumatra — weiteten seinen Forschergeist (Forschungsreisen im Lande der Maleien. Leipzig 1902; Teubner). Besonderer Beliebtheit erfreute sich sein „Lehrbuch der Botanik“, das 1894 zum ersten Mal erschien und dessen Erscheinen in 10. Auflage einige Tage vor seinem Tode ihn nochmals erfreuen konnte. Seine Liebe zur Jugend, sein klares Wort, sein offenes Wesen waren die Schlüssel zum Herzen seiner Studierenden. Jodlbauer.

Leistikow †.

Der Beste und der Nestor unseres Vereins ist am 29. März d. Js. heimgegangen. Der Grabeshügel hat sich am 2. d. Mts. über die irdische Hülle unseres allverehrten und hochgeachteten Ehrenvorsitzenden, des Regierungs- und Geheimen Veterinärrats Dr. h. c. Albert Leistikow, auf dem Westfriedhofe in Magdeburg geschlossen. Beendet ist hiermit sein Lebenslauf, aber sein Name bleibt in den Annalen unseres Vereins unauslöschlich fortbestehen. Ja, sicherlich wird die Erinnerung

an diesen seltenen, hervorragenden Mann, der in unserem Verein nicht seinesgleichen gehabt hat, fortbestehen, bestimmt unvergessen bleibt sein Wirken in unserem Verein, uns und den Generationen nach uns ein nachzuahmendes Vorbild und ideales Muster. Leistikow wurde im



Jahre 1882 — damals Kreistierarzt in Genthin — Mitglied unseres Vereins. Im Jahre 1898 wurde er zum II. Vorsitzenden gewählt und leitete von da ab alle Versammlungen, da der I. Vorsitzende, Departementstierarzt Oemler in Merseburg, wegen dauernder Kränklichkeit den Vereinsitzungen fern blieb. Nach Oemler's Tode im Jahre 1902 wurde Leistikow I. Vorsitzender und gehörte dem Vorstände bis zum Jahre 1920 an, wo er den Vorsitz wegen seiner Pensionierung trotz aller Gegenvorstellungen meinerseits mit der Begründung niederlegte, daß der Vorsitzende eines tierärztlichen Vereins noch im Amte oder in der Praxis tätig sein müsse. In seinen Vereinsämtern zeichnete er sich durch strengste Pflichterfüllung, unermüdlichen Eifer und Fleiß, unbedingte Zuverlässigkeit und durch fast zu peinliche Sorgfalt aus. In gerechter Würdigung seiner hervorragenden Verdienste um unseren Verein und als Ausdruck der Sympathien, die er bei allen Mitgliedern besaß, wurde er bei seiner Amtsniederlegung einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt, nachdem ihm schon einige Jahre zuvor in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die tierärztliche Wissenschaft und die tierärztlichen Standesinteressen die Ehrenmitgliedschaft unseres Vereins verliehen war. Leistikow bezeichnete den Gründer unseres Vereins, Professor Pütz in Halle, in seinem Festvortrag zur Feier unseres 50jährigen Bestehens als „Rückgrat und Seele“ des Vereins. Nach dem Tode von Pütz war Leistikow Rückgrat und Seele des Vereins und blieb es auch nach seiner Amtsniederlegung bis zu seinem Heimgange. Noch vor sechs Monaten hielt er — in seinem 79. Lebensjahre stehend — die vorhin erwähnte Festrede und verfaßte die Vereinschronik der letzten 25 Jahre, die als Festschrift herausgegeben wurde. Er hatte schon im Jahre 1902 aus Anlaß des 25jährigen Bestehens die Geschichte der ersten 25 Jahre des Vereins mit der ihm eigenen Gründlichkeit bearbeitet und diese in seinem Festvortrage über „Gründung, Vergangenheit und Wirksamkeit des Vereins“ in gekürzter Form gebracht. Aber diese von ihm verfaßten Vereinschroniken geben uns kein richtiges Bild von der Vielfältigkeit und dem großen Umfange seiner Vereinstätigkeit, denn seine Uneigennützigkeit sowie die Bescheidenheit, die ihm eigen war, veranlaßte ihn, seine Person hierin in den Hintergrund zu stellen und seinen Namen nur selten zu erwähnen, obwohl er in fast allen Sitzungen zugegen war und sich stets durch Vorträge oder Diskussionsreden lebhaft beteiligte, was ihm auf Grund seines großen Wissens, seiner Vertrautheit mit unseren Standesinteressen, und seiner Fühlung mit den drei Gruppen unseres Standes ein leichtes war. Leistikow war kein fließender, blendender Redner, seine Stimme ohne Wohlklang, und er sprach ohne Modulation, manchmal stockend und etwas heiser, aber dennoch packten alle seine Reden die Zuhörer durch den tiefen Gedankengang, verblüffend geradezu durch die Fülle unwiderlegbarer Be-

weismittel und wirkten durch logische Schlußfolgerung überzeugend. Seine Vorträge — meist Themen über z. Zt. herrschende Viehseuchen — zeichneten sich durch wundervolle Klarheit, Objektivität, Genauigkeit und Abrundung, seine Diskussionsreden durch Schlagfertigkeit, Knappheit und strenge Sachlichkeit aus. Daraus erklärt sich, daß, sobald und solange Leistikow sprach, in unseren Versammlungen ein erwartungsvolles und gespanntes Schweigen herrschte. Vielen Mitgliedern war er ein wahrhafter Freund, allen ein treuer Ratgeber, manchen ein Helfer, auch in pekuniärer Beziehung, obwohl er keineswegs mit Glücksgütern gesegnet war. Dabei sah er nicht nach links und nicht nach rechts, nicht nach unten, am wenigsten nach oben. So übte er immer Treu und Redlichkeit bis an sein kühles Grab. Auf Leistikow passen die Worte, die Shakespeare in Julius Caesar dem Antonius beim Tode des Brutus in den Mund legte:

— — — und so mischten sich
 'Die Element' in ihm, daß die Natur
 Aufstehen durfte und der Welt verkünden:
 Dies war ein Mann!

Und wir können, anlehnend an die Worte des wackeren Matthias Claudius, des Wandsbecker Boten, von ihm sagen:

Ach, sie haben
 Einen guten Mann begraben
 Und uns war er mehr.

Tierärztlicher Zentralverein für die Provinz Sachsen, Thüringen
 und Anhalt. Gundelach.

Dr. h. c. Albert Leistikow †.

Ende März d. Js. starb uns allen unerwartet der Regierungs- und Geheime Veterinärarzt Dr. med. vet. h. c. Leistikow. Neben seiner starken Arbeitslast, die er bis zu seiner Pensionierung 1923, also besonders noch während des Krieges, zu bewältigen hatte, unterzog er sich gern den Arbeiten der Tierärztekammer und des Vorstandes derselben mit einem vorbildlichen Pflichter und mit anerkannter Treue, bis er nach dem Kriege freiwillig ausschied. Durch seine Liebe zum tierärztlichen Stande, durch seine reichen Kenntnisse des tierärztlichen Wissens und der Gesetze, durch seine reichen Erfahrungen, durch seine Wahrhaftigkeit und seinen gerechten Sinn hat er in der Zeit seiner Wirksamkeit in der Kammer (von 1912—1919) besonders in der konstituierenden Versammlung 1912 wertvolle und höchst nützliche Hilfe geleistet, so auch in der Übernahme von schwierigen Referaten, wie z. B. über Vollbefolgung der Kreistierärzte (Dezember 1913) und anderer, deren Ausführungen sich durch Knappheit und Klarheit im Wort besonders auszeichneten. Die Tierärztekammer für die Provinz Sachsen wird dieses aufrechten deutschen Mannes gern bis über das Grab hinaus mit Hochachtung und Verehrung gedenken.

I. A.: Naumann, Vors.

Ausschuß der Preussischen Tierärztekammern.

XIV. Tagung in Berlin am 8. und 9. Mai 1928.

1. Geschäftsbericht.
2. Rechnungslegung, Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Kassensführers.
3. Festsetzung der Tagegelder und Reisekosten.
4. Beratung des Haushaltsplanes für 1928.
5. Beschlußfassung über die von den Tierärztekammern für den T.K.A. bereizustellenden Mittel.
6. Ersatzwahl für den Vorsitzenden.
7. Vertretung des Tierärztekammerausschusses: a) im Landesveterinäramt, b) im Landesgesundheitsrat.
8. Gesetz über die tierärztliche Berufsvertretung und die tierärztlichen Standesgerichte (Tierärztekammer-Gesetz). Beratung und Beschlußfassung über die sich aus dem Gesetz ergebenden Maßnahmen.
9. Tierärztliches Dispensierrecht.
10. Beteiligung der Tierärzte an der Nahrungsmittelkontrolle. Gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln und anderen Bedarfsgegenständen (Lebensmittelgesetz). Milchkontrolle.
11. Rotlaufbekämpfung durch Freiberufstierärzte. Min.-Erl. vom 15. Mai 1924 — V 10473 —, vom 18. Februar 1925 — V 10595 —, vom 26. Oktober 1927 — V 9730 —. Formulare für amtliche Meldungen; Portofreiheit.
12. Bekämpfung der Geflügelseuchen.

13. Bekämpfung des Kurpfuschertums. Tiergeheimmittelliste.
14. Tierkrankenkassen.
15. Stellungnahme zu der Überfüllung im tierärztlichen Berufe.
16. Stellungnahme zu den Fürsorgebestrebungen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher tierärztlicher Buchführungs- und Verrechnungsstellen.
17. Angelegenheiten der Staatstierärzte: a) Eingruppierung. Amtsbezeichnungen, b) Vollbefolgung und Praxisverbot.
18. Angelegenheiten der Gemeindetierärzte: a) Eingruppierung und Anstellungsverhältnisse, b) Amtsbezeichnungen mit Ratscharakter, c) Praxisverbot für vollbefordete Gemeindetierärzte.
19. Schlachtvieh- und Fleischbeschau: a) Gebühren und Reisekosten. Min.-Erl. vom 17. September 1927 — V 8861 —. b) Beaufsichtigung der Fleischbeschau, Durchführung der tierärztlichen Lebensmittelkontrolle, Berichterstattung über Verfehlungen in der Fleischbeschau. Min.-Erl. vom 18. Januar 1928 — V 11723 —. c) Verteilung der ordentlichen und Ergänzungsfleischbeschau, d) Entlassung von nichttierärztlichen Beschauern zugunsten von Tierärzten „im Allgemeininteresse“ gemäß § 3 (2) der abgeänd. Ausf.-Best. Rflg. vom 10. August 1922, e) Ausdehnung der Schlachtvieh- und Fleischbeschau einschl. Trichinenfäule und Hausfischlachten, f) Angestelltenversicherung für die in der amtlichen Schlachtvieh- und Fleischbeschau nebenberuflich tätigen Tierärzte.
20. Gebührentarife: a) Kammertaxen. Min.-Erl. vom 17. Februar 1928 — V 1253 —, b) Gebühren in gerichtlichen Angelegenheiten, c) Gebühren für nebenamtlichen Unterricht an landwirtschaftlichen Fach- und Fortbildungsschulen, d) Gebühren für klinische Untersuchungen beim Tuberkulose-Tilgungsverfahren, e) Impfgeldern für Schweinerotlauf, Maul- und Klauenseuche und Geflügelseuchen.
21. Steuerfragen.
22. Anfragen und Auskünfte. Friese, stellvertr. Vors.

Landesgruppe Nordwestdeutschland im Reichsverband der Deutschen Gemeindetierärzte.

Generalversammlung 12. und 13. Mai 1928 in Lüneburg. Sonntag, den 12. Mai 1928: 17 Uhr: Führung durch die Stadt Lüneburg. Treffpunkt: Hotel „Deutsches Haus“. 20 Uhr: Vorversammlung. Hotel „Deutsches Haus“. 1. Geschäftsbericht des Vorsitzenden. 2. Rechnungsablage. 3. Vorstandswahl. 4. Referat des Herrn Stadtveterinär Brinkop-Lüneburg: Aufhebung oder Abänderung des § 5 des preuß. Gesetzes betr. Ausführung des Schlachtvieh- und Fleischbeschau-Gesetzes und § 7 der preuß. Ausführungsbestimmungen betr. die Schlachtvieh- und Fleischbeschau im Inlande. 5. Verschiedenes. Sonntag, den 13. Mai 1928: 9 Uhr: Besichtigung des Rathauses. 10 Uhr: Hauptversammlung im Traubensaal des Rathauses. 1. Eröffnung durch den Vors. 2. Vortrag: Die Verwendung des Trichinoskops in der Nahrungsmittelkontrolle mit besonderer Berücksichtigung der histologischen Wurstuntersuchung. (Dr. Schröder, Oberassistent am pathol.-anatomischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover.) 3. Vortrag: Frische und zubereitete Seefische und ihre Kontrolle. (Kreistierarzt Dr. Leyer, Direktor der Auslandsfleischbeschau in Bremerhaven.) 4. Anträge. 5. Verschiedenes. 14 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im Hotel „Deutsches Haus“. Anschließend kleiner Ausflug in die herrliche Umgebung Lüneburgs, oder Besichtigung des Lehrgutes der Tierärztlichen Hochschule Hannover in Adendorf.

Der Ortsausschuß: Brinkop. Der Vorstand: Kormann.

Verein der Tierärzte des Reg.-Bez. Aachen.

Frühjahrsversammlung Sonntag, den 29. April 1928, 11 Uhr, im Hotel „Großer Monarch“, Aachen, Büchel 51. 1. Vereinsangelegenheiten; Eingänge und Mitteilungen. 2. Weinberg-Aachen: Die Streptokokkenmastitis (gelber Galt) und Richtlinien für ihre Behandlung. 3. Dr. Bennewitz-Dövern: Die operative Behandlung des Kehlkopfpeifens. 4. Mitteilungen aus der Praxis. Nach der Versammlung gemeinsames Essen im Hotel „Großer Monarch“.

I. A.: Dr. W. Bolle, Schriftf.

Tierärztlicher Zentralverein für die Provinz Sachsen, Thüringen und Anhalt.

Die 93. Generalversammlung des Tierärztlichen Zentralvereins für die Provinz Sachsen, Thüringen und Anhalt findet am 29. April 1928,

11 Uhr vorm., in der Universitäts-tierklinik in Halle a. S., Wilhelmstraße 27/28 (nicht Bakteriologisches Institut) statt. Ab Bahnhof Straßenbahnlinie 5 bis Haltestelle Landwirtschaftliches Institut. Es wird nochmals auf die Operationen des Prof. Dr. Götze-Hannover an lebenden Rindern und auf die Demonstration eines neuen geburts-hilflichen Instrumentes aufmerksam gemacht. Der Vorstand.

Tierärztliche Gesellschaft in Königsberg (Pr.).

II. Sitzung der Tierärztlichen Gesellschaft Königsbergs und Umge-
bung, Freitag, den 27. April 1928, 20 Uhr im Hörsaal des Milch-
wirtschaftlichen Institutes der Universität Königsberg, Tragheimer
Kirchenstraße (hinter dem Tierärztlichen Institut 2 Treppen). 1. An-
nahme der Satzung. 2. Wahl des Vorstandes. 3. Festsetzung einer Um-
lage zur Bestreitung der Unkosten. A. Univers.-Professor Dr. Hie-
ronymus: „Neue Ergebnisse der Inkretionsforschung“. B. Dr. Kunze,
Assistent am Tierärztl. Inst. der Universität: Demonstration über „Kalk-
gicht beim Hunde“. Im Anschluß an die Sitzung gefelliges Beisammen-
sein in den oberen Räumen von „Kücken“. Gäste willkommen.

Reg.- und Vet.-Rat Dr. Müller. Dr. Zimmermann.

Ausbildungslehrgang für Ärzte und Tierärzte.

Im Institut für Infektionskrankheiten Robert Koch findet vom
16. Oktober bis 15. Dezember 1928 ein das Gebiet der Mikrobiologie
sowie die wichtigsten Gebiete der Hygiene umfassender Ausbildungs-
lehrgang für approbierte Ärzte und Tierärzte statt. Täglich von
10—3 Uhr Vorträge und Übungen. Außerdem Ausflüge zur Besichtigung
hygienisch wichtiger Einrichtungen. Am Unterricht beteiligen sich:
E. Boecker, H. A. Gins, F. K. Kleine, J. Koch, B. Lange,
G. Lockemann, R. Otto, O. Schiemann, Cl. Schilling.
Die Teilnahme an dem Lehrgang wird für die Kreisarzt- und Kreis-
tierarztprüfung angerechnet. Anmeldefrist bis 15. Septbr. 1928. Nähere
Auskunft erteilt die Geschäftsstelle des Instituts für Infektionskrank-
heiten Robert Koch in Berlin N 65, Führerstraße 2.

Ärztlicher Verein Hannover.

2. Mai 1928, 20 Uhr, Ärztehaus, Hannover, Hildesheimer Str. 23.
1. Steinitz: „Dauerfolge der modernen Diabetestherapie“. 2. Zahn-
arzt Dr. Welke: „Chirurgische Gesichtsprothesen“. (Mit Demon-
strationen). 3. Vogt-Bad Pyrmont: „Zur Frage der Wirkungsweise
der natürlichen Heilbäder“.

Seefischerei.

Vielfach geäußerten Wünschen aus Tierärztekreisen nachkommend
gebe ich nachstehend die Titel von Werken und Zeitschriften aus dem
Gebiete der Seefischerei bekannt. 1. Schäfer: Fischhandel und Fisch-
industrie, 2. Auflage, Preis 29,50 RM., erschienen bei Ferd. Enke-Stutt-
gart. Das Buch kann für sein Gebiet als Standardwerk bezeichnet und
allen in der Nahrungsmittelkontrolle tätigen Tierärzten wärmstens emp-
fohlen werden. 2. Plehn: Die Fische des Meeres und der Binnen-
gewässer. Preis 20,— RM., erschienen bei J. F. Schreiber in Esslingen
und München. Ein zoologisches Werk mit prächtigen, farbigen Tafeln,
das insbesondere die Rundfische umfaßt. Das Buch kann allen Kreisen
empfohlen werden, welche sich mit der Fischzucht beschäftigen und
darüber hinaus solchen Lesern, die mit der Systematik sich vertraut
machen wollen. 3. Plehn: Praktikum der Fischkrankheiten, Preis
25,— RM., erschienen bei Schweizerbart-Stuttgart. Das reich illustrierte
Buch ist nach dem Vorwort vor allem für Tierärzte bestimmt, deren
Mitarbeit die Verfasserin für dringend erwünscht hält. Der Fisch, Bd. I
und II, herausgegeben vom Forschungsinstitut für die Fischindustrie in
Altona und nur durch dieses zu beziehen. Es handelt sich um eine
Sammlung der Mitteilungen für die Fischindustrie, welche in der Haupt-
sache Beiträge zur Herstellung von Fischkonserven liefert, daneben aber
zahlreiche Gutachten bringt, welche dem Nahrungsmittelhygieniker
besten Aufschluß über die Entstehung und Vermeidung von Fehlern bei
Fischprodukten geben können. 5. Mitteilungen des Deutschen See-
fischereivereins, monatlich, Bezugspreis jährlich 5,— RM., erhältlich durch
den Buchhandel. 6. Der Fischerbote. Erscheint monatlich zweimal,
Preis jährlich 6,— RM., erhältlich durch den Buchhandel. Beide Zeit-
schriften bringen viel Wissenswertes aus dem gesamten Gebiet des See-
fischereiwesens und können wegen des niedrigen Bezugspreises sehr emp-
fohlen werden. 7. Die wichtigsten Seefische in Bildern, Prof. Ehren-
baum, herausgegeben und gratis zu beziehen durch die Fischereihafen-

betriebsgenossenschaft in Wefermünde-G. 8. Seefischbilderbuch. Her-
ausgegeben und zu beziehen durch den Deutschen Seefischereiverein in
Berlin W 9, Potsdamer Straße 22a. Preis 50 Pfg. Das Werkchen ist
sehr instruktiv und besser als das knapp gehaltene Büchlein Nr. 7.
Es wäre zu wünschen, wenn möglichst weite Kreise, insbesondere unter
den beamteten und Gemeindetierärzten, sich bereit finden würden, auf
dem Gebiete der Erforschung der Fischkrankheiten sich zu betätigen.

Dr. Leyer, Kreistierarzt in Bremerhaven.

Archiv der Bücherei der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Es befinden sich zweifellos in den Händen ehemaliger Studierender
oder Angehöriger der hiesigen Hochschule Erinnerungsstücke aus
früheren Zeiten der Hochschule. Derartige Stücke wie: Bücher, Ab-
bildungen, Festprogramme usw. können unter Umständen für die Ge-
schichte der Hochschule großen Wert haben, während sie in der Hand
des Einzelnen bald der Vergessenheit anheimfallen. Da die Hochschule
beabsichtigt, derartige geschichtliche Andenken zu sammeln, wäre sie
dankbar, wenn ihr solche überwiesen würden oder wenn ihr mitgeteilt
würde, wo sie sich befinden. Mießner

Bücherbesprechungen.

Klieneberger, Carl: Die Blutmorphologie der Laboratoriums-
tiere. Neue morphologische und anatomische Untersuchungen und
Anhangs-Untersuchungen normaler Physiologie. Zweite Aufl. Verlag
Joh. Ambros. Barth, Leipzig 1927. Geb. 18,80 Mk., brosch. 17,— Mk.

Das Werkchen enthält in übersichtlichen kurzen Zusammenstellungen
alle Angaben über Blutbefunde, die für Laboratoriumsarbeiten von Be-
deutung sind, mit sehr schönen erläuternden Abbildungen in Buntdruck.
In der durch Klieneberger bearbeiteten 2. Auflage ist die frühere Dar-
stellung auf Grund neuer Untersuchungen in mancher Hinsicht erweitert
und ergänzt. Für alle Untersuchungsstellen, die sich mit hämatologischen
Arbeiten befassen, wird die Neuauflage eine wertvolle Errungenschaft
sein. Schoop.

Mond und Wetter im Jahre 1928. Von E. Friedrich Hinsel-
mann. 17. erweiterte und verbesserte Ausgabe. Verlag M. & H.
Schaper, Hannover. Preis 1,60 RM.

Die Brochüre enthält eine Übersicht über die weiterwirkamen
Mondstellungen und den dadurch bedingten mutmaßlichen Verlauf der
Witterung unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung für die
Landwirtschaft. Der Wetterkalender wurde bereits vor 16 Jahren von
dem Vater des Verf. begründet zum Nutzen aller Naturfreunde und
Landwirte. Dr. Berge, Hannover.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Prof. Dr. Heinrich Bittner in Sofia zum ordentlichen
Professor für Anatomie und Gewebelehre an der Tierärztlichen Hoch-
schule in Berlin; Dr. med. vet. Albrecht zum planmäßigen wissen-
schaftlichen Mitglied und Leiter der Veterinärabteilung am Institut für
experimentelle Therapie in Frankfurt a. M.; Dr. Adelstein-Sens-
burg i. Ostpr. zum Schlachthofdirektor in Neuwied a. Rh.; Tierarzt
Dr. Rathmann in Rosenberg (Oberschles.) zum Veterinärarzt unter
Übertragung der dortigen Veterinärarztstelle; Dr. Richard Bern-
gruber, bisher Assistent am geburts-hilflichen Institut der tierärztl.
Fakultät München zum Schlachthoftierarzt und Leiter der Untersuchungs-
stelle für bakteriolog. Fleischbefchau am städt. Schlachthof in Hof.

Übertragen: Dem wissensch. Hilfsarbeiter, Tierarzt Dr. Braem,
an der medicin. forensischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule in
Hannover, die Veterinärassessorstelle in Essen (Ruhr) (Bez. Düsseldorf).

Veretzt: Veterinärarzt Dr. Goedecke in Wanzleben (Bez. Magde-
burg) in die Veterinärarztstelle in Freystadt (Bez. Liegnitz).

Verstorben: Oberstabsveterinär a. D. Carl Beschörner in
Schwedt a. O.

Zu unserm Bilde. Die Abbildung auf der Umschlagseite verdanken
wir der Liebenswürdigkeit des Herrn Landgestüttierarztes Schütt-
Redefin.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 18.

Ausgegeben am 5. Mai 1928.

36. Jahrgang.

(Aus dem Staatlichen Veterinär-Untersuchungsamt Hannover-Linden. — Leiter: Prof. Dr. Oppermann.)

Der weitere Ausbau der Diagnostik der infektiösen Anämie des Pferdes mit Hilfe der Serologie und des Kleinterversuchs.

Von Prof. Dr. Oppermann und Dr. Lauterbach.

Unsere Kenntnisse über die Infektionskrankheiten befragen, daß für die Epidemiologie, den Verlauf, die Schwere dieser Krankheiten Schwankungen in der Virulenz der Erreger und in der Resistenz des befallenen Organismus wesentlich bestimmend sind. Welchen von jenen beiden Faktoren jeweils die größere Bedeutung zukommt, ist nicht immer zu entscheiden.

Hinsichtlich der infektiösen Anämie des Pferdes lehren uns die während der Kriegs- und Nachkriegszeit gemachten Erfahrungen, daß in erster Linie die Resistenz des Körpers richtunggebend im Vordergrund steht. Weil diese durch Strapazen, schlechte Unterkunfts- und Ernährungsverhältnisse — das letztere Moment galt auch für Zivilpferde — stark herabgesetzt war, konnte sich das aufgenommene Virus in optima forma auswirken und führte zu gehäuftem und verluftreichen Ausbrüchen der akuten und subakuten Form.

Wenn diese Fälle in den letzten Jahren abgeklungen sind, und die Seuche heute vorwiegend in der chronischen und latenten Form uns begegnet, so mag gewiß das verständnisvolle Eingreifen der Veterinärpolizei dabei mitgewirkt haben durch Ausmerzungen der schwerkranken Tiere; in erster Linie dürfte aber der Anlaß zur Abschwächung des Seuchencharakters in der mit der Rückkehr zu normalen Haltungs- und Fütterungsverhältnissen gefestigten Resistenz der Tiere zu suchen sein.

Damit ist die infektiöse Anämie keineswegs vom Repertoire abgesetzt, sondern sie tritt uns nicht minder häufig und zwar in der chronischen Form entgegen, und daß das sehr häufig geschieht, lehren die täglich in stattlicher Zahl den zuständigen Untersuchungsstellen zugehenden Blutproben aus der Praxis. Aus den Begleitberichten geht hervor, daß die beobachteten klinischen Erscheinungen nach gründlicher Beachtung aller differentialdiagnostischen Momente schließlich den Verdacht auf infektiöse Anämie erwecken; und in der Tat pflegt in der überwiegenden Zahl der Fälle die Blutuntersuchung den Verdacht zu bestätigen.

Angeichts der großen Schwierigkeiten, die sich dem Kliniker bei der Fixierung der Diagnose der chronischen Form entgegenstellen, hat man seit einigen Jahren die Serologie und den Kleinterversuch auf den Plan gerufen.

Wir haben uns seit einer Reihe von Jahren auf diesem Gebiete betätigt und halten es nunmehr für geboten, unsere Forschungsergebnisse zu veröffentlichen.

Es folgen in verschiedenen Aufsätzen gewürdigt werden: 1. die Lipoidbindungsreaktion; 2. die Hämagglutination; 3. der Hühnerversuch; 4. der Taubenversuch.

I. Die Diagnose der infektiösen Anämie des Pferdes mit Hilfe einer Lipoidbindungsreaktion.

Schon vor einer Reihe von Jahren haben verschiedene Forscher diese Reaktion für die Diagnose herangezogen, in Sonderheit geschah das von Lührs, Zeller, Otto, jedoch mit dem Ergebnis, daß diese Methode keine brauchbaren Resultate lieferte. Das uns verfügbare reichhaltige Patientenmaterial veranlaßte uns zu umfangreichen Versuchen und zur Ausarbeitung der Technik.

Die vor Jahren von uns ausgearbeitete Hämagglutination hat sowohl in ihrer praktischen Durchführung an eingefangenen Seren als auch in zahlreichen Infektionsversuchen an Versuchspferden dargetan, daß der Keim der ansteckenden Blutarmut eine Antikörperbildung anregt, die in vitro zu erfassen ist. Da der Verlauf der Erkrankung jedoch im Laufe der Zeit immer mehr in ein chronisches Stadium überging, wurde die Erfassung kranker Pferde mittels dieser Methode immer unsicherer, so daß sich unsere Bemühungen darauf richteten, ein empfindlicheres serologisches Verfahren auszuarbeiten.

Diese Bemühungen richteten sich gleichzeitig auf die Komplementablenkung und Lipoidbindungsmethode. Für beide Verfahren wurden die später beschriebenen Extrakte verwandt. Die Komplementablenkung wurde sowohl in der üblichen Form mit inaktiviertem Serum, hämolysierten Ambozeptor und Meerfischweinkomplement als auch in der in der modernen Syphilisdiagnose von verschiedener Seite empfohlenen und als besonders empfindlich betrachteten Arbeitsweise mit aktivem Serum, eigenhämolysierten Ambozeptor und Eigenkomplement durchgeführt. Es gelang wohl, besonders mit der letztgenannten Versuchsanordnung, mit tadellosem Untersuchungsmaterial, das frisch entnommen zur Verarbeitung gelangte, beachtenswerte Erfolge zu erzielen. An eingefangendem Untersuchungsmaterial

gelang die praktische Durchführung indes nicht. Gleichzeitig wurden Versuche mit einer Lipoidbindungsmethode eingeleitet und, da sich deren Brauchbarkeit ergab, ständig am eingehenden Untersuchungsmaterial durchgeführt. So haben wir seit etwa drei Jahren Erfahrungen an ungefähr 14 000 Proben sammeln können.

Zur Ausführung der Reaktion verwenden wir einen alkoholischen Extrakt aus den roten Blutkörperchen des Pferdes, einen alkoholischen Auszug aus Pferdeherz und zur Kontrolle verdorbener Proben einen Auszug aus Hunde- oder Kaninchenleber.

Der Blutextrakt wird in der Weise hergestellt, daß von einem tunlichst anämiekranken Pferde einige Liter Blut entnommen und durch Durchschütteln mit Glasperlen oder Schlagen mit einem Stabe defibriniert werden. Die Blutkörperchen werden dann in der üblichen Weise durch Waschen mit Tyrodelösung von den anhaftenden Serumteilen befreit. Sodann werden sie im Verhältnis 1 : 4 mit absolutem Alkohol versetzt, nachdem sie durch energisches Zentrifugieren so weit wie möglich von der Spülflüssigkeit befreit sind. Die Extraktion geschieht in der Weise, daß das Blut-Alkoholgemisch zunächst 24 Stunden im Brutschrank bei 37 Grad C gehalten, sodann drei Tage im Schüttelapparat geschüttelt wird. Darauf wird der Extrakt durch doppeltes Fließpapier abfiltriert, der in den geronnenen Blutteilen enthaltene Alkohol durch ein sauberes Leinentuch ausgepreßt und ebenfalls in der angegebenen Weise geklärt.

Der zur Reaktion angewandte Pferdeherzauszug wird in der von Meinicke und Dahmen angegebenen Weise hergestellt. Das Herz eines möglichst frisch geschlachteten Pferdes wird sorgfältig von Fett, von den Gefäßen und den sehnigen und serösen Teilen befreit. Sodann wird es fein zerkleinert, bei einer Temperatur von 50—55 Grad C getrocknet, der fein pulverisierte Muskel mit der neunfachen Menge Äther versetzt und zwei Tage bei Zimmertemperatur aufbewahrt. Sodann wird durch ein doppeltes nicht gehärtetes Filter der Äther entfernt. Ist das so vorbereitete Herzmuskelpulver vollständig trocken, wird es mit absolutem Alkohol in einem Mengenverhältnis von 1 : 5 versetzt. Zur Extraktion wird auch dieses Gemisch 24 Stunden in den Brutschrank gebracht und danach 2—3 Tage im Schüttelapparat geschüttelt. Das alkoholische Filtrat wird 14 Tage bis drei Wochen im Eischrank aufbewahrt. In der Kälte bilden sich dann Flocken, die erneut abfiltriert werden müssen.

Der Auszug aus Hunde- oder Kaninchenlebern wird ebenso wie der Pferdeherzextrakt gewonnen. Eine eingehende Beschreibung erübrigt sich daher.

Da es bei der Lipoidbindungsreaktion auf ein sorgfältiges quantitatives Arbeiten ankommt, ist selbstverständlich eine Einstellung der so gewonnenen Extrakte erforderlich. Für den Hauptversuch stellen wir eine Mischung des Blut- und Pferdeherzauszuges her, für den Kontrollversuch verwenden wir allein den Leberauszug. Die Einstellung erfolgt an einigen bekannt negativen, an einigen positiven Seren von verschiedener Reaktionsstärke und an nachweislich verdorbenen Seren. Für die Einstellung zum Hauptversuch müssen Blutauszug und Pferdeherzauszug gegeneinander verschoben werden. Es geschieht das etwa in folgender Weise:

0,5 ccm Blutextrakt + 0,5 ccm Pferdeherzextrakt
 0,4 ccm Blutextrakt + 0,5 ccm Pferdeherzextrakt
 0,3 ccm Blutextrakt + 0,5 ccm Pferdeherzextrakt usw.
 0,5 ccm Blutextrakt + 0,4 ccm Pferdeherzextrakt
 0,4 ccm Blutextrakt + 0,4 ccm Pferdeherzextrakt
 0,3 ccm Blutextrakt + 0,3 ccm Pferdeherzextrakt
 und weiter wie erforderlich. Die fehlenden Anteile an einem Kubikzentimeter Extraktgemisch werden jeweils mit ab-

solutem Alkohol aufgefüllt. Der Kontrollextrakt wird sinn- gemäß ohne Blutauszug eingestellt.

Der Aufschluß der Extrakte wird so vorgenommen, daß zunächst 0,5 ccm destillierten Wassers auf je 1 ccm alkoholischen Extraktgemisches gefüllt werden. In einem gut verkorkten Glase läßt man dieses Extrakt-Wassergemisch eine Stunde bei Zimmertemperatur stehen und pipettiert sodann die siebenfache Menge destillierten Wassers schnell hinzu. Von besonderer Bedeutung beim Aufschließen der Extrakte ist der erste Wasserzusatz. Arbeitet ein Extrakt nicht in der gewünschten Weise, so kann man ihn durch Verschiebung dieses ersten Wasserzusatzes unter Umständen dennoch zu einem brauchbaren Reagens machen. In diesem Falle muß von 0,5 auf 0,55, 0,6 ccm usw. der Versuch ausgedehnt werden. Zu empfehlen ist es, sämtliche Versuche mit mindestens 3 ccm Extraktgemisch anzusetzen, da beim Pipettieren zu kleiner Mengen die erforderliche Genauigkeit nur schwer zu erzielen ist.

Zur Durchführung der Meinicke-Reaktion verwenden wir nur Glasgeräte aus Jenenser Glas. Die Untersuchungsröhrchen haben die Form der üblichen A-Röhrchen, zur Extraktbereitung dienen Erlenmeyer-Kölbchen von 50 ccm Fassungsvermögen. Das destillierte Wasser wird vor dem Ansetzen der Reaktion jeweils frisch redestilliert in Glas- kolben und Kühlfchlange aus Jenenser Glas. Daß sämtliche Geräte aufs peinlichste gereinigt sein müssen, bedarf keiner Erwähnung.

Das zu untersuchende Serum wird durch Zentrifugieren von sämtlichen korpuskulären Bestandteilen befreit. Das so erhaltene vollständig klare Untersuchungsmaterial wird 20 Minuten bei 56,5—56,8 Grad C im Wasserbade inaktiviert. Es ist peinlichst darauf zu achten, daß Zeitdauer und Erhitzungsgrad eingehalten werden. Zweckmäßig kontrolliert man dabei die Temperatur des Wasserbades ständig mit demselben Thermometer. Nach dem Inaktivieren werden von jedem Serum drei A-Röhrchen mit je 0,2 ccm beschickt. Auf Röhrchen 1 wird 1 ccm Extrakt 1, auf Röhrchen 2 1 ccm eines zweiten Blut-Pferdeherzauszuges gefüllt. Das zweite Röhrchen dient zur Kontrolle des Hauptversuches. Das Röhrchen 3 wird mit 1 ccm Extrakt aus Hunde- oder Kaninchenleber zur Kontrolle eines evtl. Verdorbenseins beschickt. Die Röhrchen kommen sodann 16—24 Stunden in einen Brutschrank, dessen Temperatur 37—38 Grad C beträgt. Sodann wird auf jedes Röhrchen 1 ccm einer aus einer 10prozentigen NaCl-Lösung frisch bereiteten 3prozentigen Salzlösung gefüllt. Nachdem die Röhrchen dann abermals eine halbe bis eine Stunde im Brutschrank gestanden haben, wird das Resultat mit Hilfe eines Agglutinoskopes bei sechsfacher Vergrößerung abgelesen. Negative Proben müssen vollständig klar und durchsichtig sein. Im positiven Falle finden wir eine durchgehende Flockung, deren Grad mit +, ++ bis ++++ bezeichnet wird. In den beiden verwandten Extrakten kann die Stärke der Reaktion wohl etwas schwanken, jedoch müssen beide Röhrchen eine eindeutige durchgehende Flockung aufweisen. Das Kontrollröhrchen 3 muß bei positiven und negativen Proben ebenfalls ein negatives Resultat aufweisen. Ist auch hier eine durchgehende Flockung zu erkennen, so kann das Resultat vorzüglich bei positivem Ausfall des Hauptversuches nicht gewertet werden.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß wir nach dem Brutschrankaufenthalt der Proben nicht generell mit einer Flockung rechnen können. In der Regel flocken nur die positiven Sera.

Mit der Meinicke-Trübungsreaktion, auch unter Zusatz von Tolubalsam, konnten ebenfalls Erfolge erzielt werden, die jedoch nicht die Zuverlässigkeit der Flockungsreaktion aufwiesen. Soweit die Technik.

Ein Beitrag zur Kenntnis der „BCG“-Eigenschaften.

Von M. Rolle, Tierarzt aus Riga (Lettland).

Calmette hat durch viele Passagen einen virulenten Tuberkelbakterienstamm auf Gallenährböden gezüchtet und danach bemerkt, daß nach ungefähr 230 Passagen diese Bakterien für Meerfischweinen und andere Tiere nicht mehr pathogen waren. Nach der subkutanen Einverleibung bei Meerfischweinen in Dosen von 3—10 mg hat er manchmal an der Infektionsstelle ödematöse Schwellung beobachtet. Die Schwellung entstand auch bei anderen Tieren, es kam nicht zur Eiterbildung und sie verschwand bald. Die Lymphknoten in der Nähe der Infektionsstelle vergrößerten sich nicht und es entwickelte sich kein Tuberkel. Auch in anderen Organen hatte er keine Tuberkeln gefunden. Die Tiere, welche mit diesen Bakterien behandelt wurden, zeigten gegen Tuberkulin Empfindlichkeit. Diese Eigenschaften sind bei allen Säugetieren, auch beim Menschen gefunden worden.

Auf diese Weise, sagte Calmette, erhalten wir einen Tuberkelbakterienstamm, mit welchem man wohl Empfindlichkeit gegen das Tuberkulin, aber nicht Tuberkel hervorrufen kann. Die Bakterien hat er einfach „BCG“ genannt (Bakterien-Calmette-Guérin).

Weiter kam Calmette zu dem Ergebnis, daß nach der Impfung mit diesen Bakterien die Tiere gegen tödliche Tuberkelbakteriendosen immun sind.

Nach diesen Veröffentlichungen hat man die „BCG“ als Impfstoff in allen Weltteilen an Tieren und Menschen (Kindern) angewandt.

Die Immunisierungseigenschaft erklärte Calmette dadurch, daß die Bakterien im Organismus an einzelne Zellen gebunden bleiben. Von diesen Zellen werden dann Immunkörper gebildet und auch andere Zellen stimuliert.

Er nimmt an, daß dieses Bakterium den Körperzellen nicht schadet, daß beide Zellen (Bakterien- und Körperzellen) symbiotisch mit einander leben. Dies vergleicht er mit der Symbiose der Algen und der Pilze bei Flechten.

Werden die BCG aus dem Organismus ausgeschieden, so hört auch die Immunität auf.

Boquet und Nègre haben nun gefunden, daß Tiere, welchen Hühnertuberkel- und Paratuberkelbakterien und abgetötete Rinder- und Menschentuberkelbakterien eingespritzt worden waren, auch gegen Tuberkulin empfindlich sind, daß aber Immunität bei diesen Tieren nicht besteht.

Selter hat Immunisierungsversuche mit virulenten Tuberkelbakterien angestellt. Diese Bakterien wurden in minimalster Dosis (eine bestimmte Zahl) in den Organismus eingespritzt, mit dem Ziel, einen örtlichen Infektionsherd zu schaffen. Nahm er zu kleine Dosen, entstanden also keine örtlichen Erkrankungen, Gewebsveränderungen, dann blieb die Immunität aus. Wurde die Dosis zu groß gewählt, so blieb die Infektion nicht mehr örtlich, breitete sich aus und schädigte den Organismus auf diese Weise mehr oder weniger.

Wenn nun das „BCG“ so stark abgeschwächt wäre, daß nur Empfindlichkeit gegen Tuberkulin hervorgerufen würde, dann wäre seine immunisierende Fähigkeit unverständlich; und umgekehrt, wenn es die Fähigkeit besäße, Immunität zu erzeugen, so wäre nach Selters Versuchen anzunehmen, daß der Stamm auch mehr oder weniger virulent sein müßte.

Dieser Widerspruch veranlaßte mich, die Frage nachzuprüfen.

In meiner Arbeit habe ich folgende Fragen zu beantworten gesucht:

1. Sind die BCG-Kulturen völlig avirulent oder haben sie die Fähigkeit, im Organismus tuberkuloseähnliche Veränderungen hervorzurufen?

2. Welchen Einfluß hat das Alter der Kulturen?

3. Wie verhalten sich die Bakterien, wenn sie nach einiger Zeit von einem Organismus auf einen anderen übertragen werden?

4. Ist es möglich, mit dem „BCG“ Tiere zu immunisieren und von welchen Faktoren ist die Immunität abhängig?

Die Bakterieneinverleibung bei Meerfischweinen und Kaninchen habe ich subkutan hinter der Skapula vorge-

nommen und zwar „BCG“ an der rechten Seite und Infektion mit virulenten Tuberkelbakterien an der anderen Seite. Diese Injektionsstelle halte ich für besser, als die allgemein gewählte Kniefaltengegend aus folgenden Gründen:

1. An dieser Stelle sind mehr Lymphknoten.

2. Der Prozeß geht nicht so leicht auf die andere Seite über, was bei Immunisierungsversuchen sehr wichtig ist. Die geimpfte Seite wird nicht so schnell nach der Infektion mit den virulenten Bakterien der anderen Seite überschwemmt.

Von Lymphknoten und Organen habe ich Gefrierschnitte angefertigt und diese mit Hämotoxylin-Eosin und nach Ziehl-Neelsen gefärbt. Die „BCG“-Kultur züchtete ich auf Glyzerin-Kartoffel.

Meine Arbeitsergebnisse sind gemäß den vier Fragen in vier Tabellen zusammengefaßt.

Tabelle I.

Infektion verschiedener Tiere mit „BCG“-Kulturen.

Nr.	Art des Tieres	Tag der Infektion	Dosis in mg	Alter des Tieres	Nach wieviel Tagen getötet?
1	Meer-schweinchen	27. X. 1925	20 subk.	erwachsen	100
2	"	6. III. 1926	5 subk.	2 Monate	85
3	Kaninchen	29. XII. 1925	40 subk.	erwachsen	241
4	Hund	20. XI. 1925	200 intra-musk.	4 Monate	210
5	Meer-schweinchen	20. I. 1926	50 subk.	erwachsen	360
6	Ochse	Sept. 1925	1000 intra-musk.	1 Jahr alt	180
7	Kontroll-Meer-schweinchen	27. X. 1925	ungefähr 1 Öse	erwachsen	† 44

Zu Nr. 1. An der Impfstelle unter der Haut kleiner Abszeß. Der Eiter besteht aus abgestorbenen Zellteilen, Leukozyten, Lymphozyten und „BCG“. Die Lymphknoten in der Mitte sind etwas vergrößert. Makroskopisch kann man auf der Schnittfläche keine Veränderungen sehen; nur bei sehr aufmerksamer Betrachtung erkennt man kleine weiße Pünktchen.

Histologisch: Kleine Herde von Epitheloid- und Riesenzellen. Im Zentrum der größeren Herde ist schon ein Zerfall der Zellen eingetreten. In anderen Organen keine Veränderungen.

Zu Nr. 2. An der Impfstelle unter der Haut ein bohnen-großer Abszeß mit Leukozyten und Lymphozyten. An Mikroorganismen sind nur „BCG“ anzutreffen. Die axillären Lymphknoten sind etwas vergrößert.

Histologisch: In den axillären und bronchialen Lymphknoten sind Epitheloid- und Riesenzellenherde anzutreffen. In anderen Organen sind keine Veränderungen. Mit dem Abszeßinhalt habe ich zwei Meerfischweinen infiziert (Tabelle III Nr. 2).

Zu Nr. 3. An der Impfstelle unter der Haut befinden sich linken- bis bohnen-große harte Knötchen. In dem Zentrum der größeren Knötchen ist Eiter. Die Eiterbestandteile sind Leukozyten, Lymphozyten, abgestorbene Zellteile und „BCG“.

Histologisch: In der Mitte der kleinen Herde sind BCG-Klümpchen. Um diese Bakterienklümpchen ist ein Leukozytenwall, dann folgt eine Epitheloid- und Riesen-zellenschicht und zuletzt eine fibrinöse Kapsel. In anderen Organen sind keine Veränderungen.

Zu Nr. 4. Nach ungefähr sechs Wochen hat sich an der Impfstelle (Muskulatur) ein großer Abszeß gebildet. Mit

einer Rekordspritze wurden 200 ccm Eiter entnommen. Die Eiterbestandteile waren Leukozyten, Lymphozyten und „BCG“. Mit diesem Material habe ich zwei Meerschweinchen infiziert (Tabelle III Nr. 6). Nach dem Tode des Hundes waren keine makroskopischen und histologischen Veränderungen zu finden.

Zu Nr. 5. Nach einer Woche entstand an der Impfstelle ein taubeneigroßer Abszeß, welcher sich bald öffnete. Die Eiterbestandteile waren Leukozyten, Lymphozyten und „BCG“. Mit dem Eiter habe ich zwei Meerschweinchen infiziert (Tabelle III Nr. 3) und auch Kulturen auf Glycerin-Kartoffeln angelegt (Tabelle III a). Nach drei bis vier Wochen begann Heilung einzutreten. Nach sieben Wochen war die Stelle völlig abgeheilt. Lymphknoten-Vergrößerungen konnte man nicht feststellen. Nach dem Tode waren keine Veränderungen zu finden.

Zu Nr. 6. An der Impfstelle sind keine merkbaren Erscheinungen vorhanden.

Histologisch: In den Inguinal-Lymphknoten sind kleine Epitheloidzellenherde.

Zu Nr. 7. Miliare Tuberkulose.

Tabelle II.

Infektion von Meerschweinchen mit „BCG“-Kulturen verschiedenen Alters in Dosen von 0,5 bis 50 mg.

Nr.	Tag der Infektion	Dosis in mg.	Mit wie alten Kulturen?	Nach wieviel Tagen getötet?	Körpergewicht vor der Impfung	Körpergewicht vor dem Tode
1	20. IX. 1926	10	4 W.	29	340 g.	480 g.
2	29. IX. 1926	10	4 W.	128	710	750
3	29. IX. 1926	5	4 W.	36	550	560
4	29. IX. 1926	1	4 W.	36	550	550
5	29. IX. 1926	0,2	4 W.	36	230	370
6	22. IX. 1926	10	8 W.	36	550	550
7	22. IX. 1926	1	8 W.	36	450	480
8	22. IX. 1926	0,5	8 W.	45	300	350
9	31. I. 1927	1	16 W.	40	400	420
10	31. I. 1927	1	16 W.	40	350	400
11	7. II. 1927	50	16 W.	50	380	400

Zu Nr. 1. An der Impfstelle unter der Haut befindet sich ein taubeneigroßer Abszeß, gefüllt mit Leukozyten, Lymphozyten und „BCG“. Die axillaren Lymphknoten in der Nähe des Abszesses sind etwas vergrößert.

Histologisch: In den oben genannten Lymphknoten sind Epitheloidzellenherde. Auch in der Abszeßwand und außerhalb derselben sind kleine Herde. In der Mitte des Herdes sind schon zerfallene Zellteile und um dieselben herum Epitheloid- und Riefenzellen. In den anderen Organen keine Veränderungen.

Zu Nr. 2. An der Impfstelle unter der Haut ist ein bohngroßer Abszeß. Der Eiter im Abszeß besteht aus abgestorbenen Zellteilen, Leukozyten, Lymphozyten und BCG. Die Nachbarlymphknoten sind nicht vergrößert.

Histologisch: Die Abszeßwand ist scharf von der Umgebung abgegrenzt. In den Lymphknoten und Organen sind keine Veränderungen. Mit dem Eiter habe ich zwei Meerschweinchen geimpft (Tabelle III Nr. 5). Auf Glycerin-Kartoffeln sah ich kein Wachstum.

Zu Nr. 3. An der Impfstelle unter der Haut ist ein bohngroßer Abszeß, gefüllt mit Leukozyten, Lymphozyten, zerfallenen Zellen und „BCG“. Außerhalb der Abszeßwand befinden sich kleine erbsengroße Knötchen. Von dem Abszeß geht ein verdickter Strang in Richtung auf die axillaren Lymphknoten zu. Auf diesem Strang kann

man kleine Knötchen sehen. Die axillaren und bronchialen Lymphknoten sind etwas vergrößert.

Histologisch: Um den Abszeß herum und in den axillaren und bronchialen Lymphknoten liegen Epitheloid- und Riefenzellenherde. In der Mitte der größeren Herde ist schon Nekrose eingetreten. In den anderen Organen sind keine Veränderungen wahrzunehmen. Mit Eiter aus dem Abszeß habe ich zwei Meerschweinchen (Tabelle III Nr. 7) infiziert und auf Glycerin-Kartoffeln „BCG“ in Reinkultur kultiviert.

Zu Nr. 4. An der Impfstelle unter der Haut ein bohngroßer Abszeß, angefüllt mit Eiter (Leukozyten, Lymphozyten und „BCG“). Von dem Abszeß in der Richtung auf die axillaren Lymphknoten sind einige erbsengroße Knötchen reihenförmig angeordnet. Der letzte Knoten ist der axillare Lymphknoten. Dieser ist etwas vergrößert.

Histologisch: In der Abszeßwand und außerhalb derselben liegen kleine Epitheloid- und Riefenzellenherde. Ebenfalls auch in den axillaren Lymphknoten. In den anderen Organen keine Veränderungen.

Zu Nr. 5. An der Impfstelle unter der Haut ein taubeneigroßer Abszeß, gefüllt mit Eiter (Leukozyten, Lymphozyten und „BCG“). Neben dem Abszeß sind noch zwei erbsengroße Knötchen anzutreffen. Die axillaren Lymphknoten sind etwas vergrößert.

Histologisch: In der Abszeßwand, außerhalb derselben und in den axillaren Lymphknoten befinden sich kleine Epitheloid- und Riefenzellenherde. Mit dem Eiter wurden zwei Meerschweinchen infiziert (Tabelle III Nr. 6).

Zu Nr. 6. In der Nähe der Impfstelle ist ein Lymphknoten etwas vergrößert.

Histologisch: In dem Lymphknoten sind größere und kleinere Epitheloid- und Riefenzellenherde.

Zu Nr. 7—10. Keine Veränderungen.

Zu Nr. 11. An der Impfstelle befindet sich ein kleiner scharf abgegrenzter Abszeß.

Zusammenfassung der Ergebnisse der ersten zwei Tabellen.

Die oben beschriebenen Abszesse entstanden ungefähr eine Woche nach der Einspritzung der Bakterien. Der Organismus sucht nun die eingespritzten Bakterien möglichst schnell durch Kapselbildung unichädlich zu machen. Gelingt ihm dies, so bleiben alle Bakterien eingeschlossen und außerhalb des Abszesses treten keine Veränderungen in den Lymphknoten auf, wie z. B. in den Fällen II und XI der Tabelle II.

Durchbrechen die Bakterien die Kapsel, dann werden sie durch den Lymphstrom in die Lymphknoten gebracht. In der Mehrzahl der Fälle passieren sie den ersten Lymphknoten nicht. Sehr selten gelangen sie in die übrigen Lymphknoten. In zwei Fällen habe ich feststellen können, daß der Prozeß bis zu den bronchialen Lymphknoten fortgeschritten war (Tabelle I, Fall 2 und Tabelle II, Fall 3).

In vielen Fällen kann man makroskopisch keine Veränderungen wahrnehmen. Nur bei sehr aufmerksamer Betrachtung sieht man kleine weiße Pünktchen.

Histologisch sind drei verschiedene Veränderungen zu unterscheiden.

I. Liegen die Bakterien in Klümpchen in dem Gewebe, so sehen wir in der Mitte des Herdes die zusammengeballten Bakterien. Um dieselben herum ein Leukozytenwall, auf diesen folgt eine Epitheloid- und Riefenzellschicht.

II. Sind die Bakterien nur vereinzelt in dem Gewebe vorhanden, dann sehen wir in der Mitte des Herdes schon in Zerfall übergegangene Zellen und um dieselben eine epitheloide Zellschicht mit einzelnen Riefenzellen.

III. Wenn sehr wenig Bakterien vorhanden sind, wie dieses in den Lymphknoten in der Mehrzahl der Fälle zu beobachten war, findet man nur Epitheloidzellenwucherung mit einzelnen Riefenzellen.

Alte Kulturen können nur in größerer Dosis kleine örtliche Veränderungen hervorrufen.

Obige Ausführungen ergeben, daß die jungen „BCG“-Kulturen doch schwach virulent sind und im Organismus tuberkuloseähnliche Veränderungen hervorrufen können.

Tabelle III.

Infektion von Meerschweinchen mit durch „BCG“, erzeugtem Abszeßeiter und Emulsion veränderter Organe.

Nr.	Zahl der Meer-schw.	Mit BCG haltigem Eiter bzw. Organ-Emulsion von Tieren	Nach wieviel Tagen getötet?	Bemerkungen
1	1	Abszeßeiter des Meer-schweinchens Nr. 1 Tab. I	60	Nach der Impfung keine Schwellung und Krankheitserscheinungen. Keine Veränderungen
2	2	Abszeßeiter des Meer-schweinchens Nr. 2 Tab. I	55	"
3	2	Abszeßeiter des Meer-schweinchens Nr. 5 Tab. I	60	"
4	2	veränderten Inguinal-lymphknoten Nr. 6 Tab. I	65	"
5	2	Abszeßeiter des Meer-schweinchens Nr. 2 Tab. II	55	"
6	1	Abszeßeiter des Meer-schweinchens Nr. 5 Tab. II	60	"
7	2	Abszeßeiter des Meer-schweinchens Nr. 3 Tab. II	56	"
8	2	Abszeßeiter des Hundes Nr. 4 Tab. I	65	"
9	2	Lymphknoteneiter von der Seite, wo „BCG.“ geimpft wurde. Nr. 11 Tab. IV	60	"
10	2	Lymphknoteneiter von der Seite, wo Tbc. geimpft wurde. Nr. 11 Tab. IV.	† 50	Miliare Tuberkulose

Tabelle IIIa.

Diese Meerschweinchen wurden infiziert mit der „BCG“-Kultur, gezüchtet aus Eiter des Meerschweinchens Nr. 5, Tab. I.

Nr	Impf-zeit	Dosis in mg	Mit wie alten Kultu-ren	Nach wieviel Tagen getötet	Körper-gewicht vor der Imp-fung	Körper-gewicht vor dem Tode	Bemerkungen
1	7. II. 1927	2	3 W.	50	370 g	400 g	An der Impfstelle keinerlei Schwellung und Abszeßbildung. In den Lymphknoten in der Nähe der Impfstelle epitheloide Tuberkeln.
2	2. III.	2	3 W.	9	350 g	360 g	"
3	2. III.	2	3 W.	17	350 g	350 g	"
4	2. III.	2	3 W.	17	—	—	"

Zusammenfassung der Ergebnisse von Tabelle III und IIIa.

Mit dem „BCG“-haltigen Eiter ist es mir nicht gelungen, Meerschweinchen zu infizieren bzw. tuberkuloseähnliche Veränderungen im Gewebe hervorzurufen.

Mit jungen Reinkulturen gezüchtet aus „BCG“-haltigem Eiter konnte ich bei Meerschweinchen in den Lymphknoten tuberkuloseähnliche Veränderungen hervorrufen.

Erklärung zu Tabelle IV.

Zu Nr. 1. An der Impfstelle entwickelt sich nach einer Woche ein taubeneigroßer Abszeß. Von der Impfzeit mit „BCG“ bis zur Infizierung mit Tbc.-Kulturen hat das Meerschweinchen 110 Gramm an Körpergewicht zugenommen. Im Verlauf eines Monats nach der Infizierung mit Tbc. nahm das Tier noch 150 Gramm zu, so daß es ein Körpergewicht von 350 Gramm erreichte. Die drei folgenden Monate blieb das Körpergewicht des Meerschweinchens das gleiche.

Ungefähr drei Wochen vor dem Tode begann es leichter zu werden, und der „BCG“-Impfabstszeß wurde allmählich kleiner, so daß ich nach dem Tode nur einen erbsengroßen Abszeß an der „BCG“-Impfstelle finden konnte. Von diesem Abszeß auf Glycerin-Kartoffel angelegte Kulturen wuchsen nicht.

In den anderen Organen wurde miliare Tuberkulose festgestellt.

Zu Nr. 2. Eine Woche nach der „BCG“-Impfung entwickelte sich an der „BCG“-Impfstelle ein taubeneigroßer Abszeß. Nach einer Tbc.-Infizierung entwickelte sich an dieser Stelle ebenfalls ein Abszeß von gleicher Größe. Der an der „BCG“-Impfstelle ursprünglich vorhanden gewesene Abszeß wurde nach der Infizierung mit Tbc. allmählich kleiner, und kurz vor dem Tode war er ganz verschwunden.

Obduktion: In allen Organen miliare Tuberkulose.

Zu Nr. 3. Eine Woche nach der „BCG“-Impfung entwickelte sich an der Impfstelle ein bohnen großer Abszeß. Der Abszeß behielt die ganze Zeit über denselben Umfang. An der Tbc.-Infektionsstelle entwickelte sich ein taubeneigroßer Abszeß.

Obduktion: Nach dem Tode war der „BCG“-Impfabstszeß scharf mit einer bindegewebigen Kapself von dem umgebenden Gewebe abgegrenzt. Außerhalb des Abszesses war kein Knoten. Die axillaren Lymphknoten neben dem „BCG“-Impfabstszeß waren unverändert; ebenfalls waren in demselben keine Tuberkelbakterien (Tierversuch) nachzuweisen. Auf Glycerinkartoffel angelegte Kulturen wuchsen nicht. In den anderen Organen bestand miliare Tuberkulose.

Zu Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. An der „BCG“-Impfstelle habe ich keine bemerkbaren Veränderungen beobachtet. An der Tbc.-Infektionsstelle entwickelte sich stets ein bohnen- bis taubeneigroßer Abszeß.

Obduktion: In allen Organen miliare Tuberkulose.

Zu Nr. 11. An der „BCG“-Impfstelle entwickelten sich mehrere erbsengroße Knoten. An der Tbc.-Infektionsstelle entwickelte sich ein taubeneigroßer Abszeß. Das Kaninchen war die ganze Zeit über munter und zeigte keine Körpergewichtsabnahme. Nach der Tötung konnte ich an der „BCG“-Impfstelle kleine erbsengroße Knoten wahrnehmen. In diesen Knoten fanden sich nur „BCG“-Bakterien. Histologische Veränderungen wie in Tabelle II beschrieben.

An der Tbc.-Infektionsstelle bestand ein taubeneigroßer Abszeß. Die benachbarten Lymphknoten waren vergrößert. In den Lungen befanden sich vereinzelte Tuberkel, welche Tbc.-Bakterien enthielten.

Zusammenfassung der Ergebnisse von Tabelle IV.

Die jungen „BCG“-Kulturen, welche eine lokale Erkrankung hervorrufen können, sind auch imstande, ziemlich starke Widerstandsfähigkeit im Organismus gegen die künstliche Infektion mit Tuberkelbakterien zu erzeugen. Ältere Kulturen, welche keine örtliche Erkrankung hervorrufen, besitzen auch keine immunisatorischen Eigenschaften. Mit anderen Worten: Immunisatorisch wirken nur mit einer gewissen Virulenz behaftete Kulturen. Avirulente Kulturen erzeugen keine Immunität.

In Fall 1 sahen wir, daß der „BCG“-Impfabstszeß drei Wochen vor dem Tode allmählich kleiner wurde, nach dem

Tabelle IV. Immunifizierungsversuche mit „BCG“-Kulturen verschiedenen Alters.

Nr.	Impfzeit mit BCG	BCG Dosis in mg	Mit wie alter Kultur	Infektion mit Tbc.	Tbc. Dosis in mg	Nach wieviel Tagen verendet	Körper- gewicht vor der Immunis.	Körpergewicht vor der Infizierung	Körper- gewicht nach dem Tode
1	29. IX. 26	5	4 W.	3. XI. 26	0,5	† 155	290,0	400,0	450,0
2	29. IX. 26	1	4 W.	3. XI. 26	0,5	† 125	250,0	360,0	450,0
3	29. IX. 26	0,5	4 W.	3. XI. 26	0,5	† 131	550,0	760,0 Trächtig	550,0
4	22. IX. 26	1	8 W.	3. XI. 26	0,5	† 69	520,0	550,0	400,0
5	22. IX. 26	0,5	8 W.	3. XI. 26	0,5	† 58	300,0	410,0	430,0
6	22. IX. 26	0,5	8 W.	3. XI. 26	0,5	† 57	600,0 Trächtig	480,0 nach der Geburt	450,0
7	22. IX. 26	10	8 W.	25. II. 27	0,5	† 40	570,0	450,0 Trächtig	400,0
8	22. IX. 26	5	8 W.	25. II. 27	0,5	† 40	560,0	510,0	450,0
9	22. IX. 26	5	8 W.	4. III. 27	0,5	† 56	640,0	700,0	600,0
10	3. II. 27	Eiter v. Abszess Meersch. Tab. II Nr. 3	—	25. II. 27	0,5	† 40	—	—	—
11	20. XI. 25.	20	4–6 W.	25. I. 26	20	Nach 216 Tagen getötet			
12	31. I. 27	1	16 W.	2. III. 27	0,5	† 51	—	—	—
13	31. I. 27	1	16 W.	4. III. 27	0,5	† 50	—	—	—
14	31. I. 27	1	16 W.	4. III. 27	0,5	† 50	—	—	—
Kontrolle:									
1	—	—	—	4. III. 27	0,5	† 52	—	—	—
2	—	—	—	4. III. 27	0,5	† 50	—	—	—
3	—	—	—	3. XI. 26	0,5	† 60	—	400,0	350,0
4	—	—	—	3. XI. 26	0,5	† 61	—	400,0	350,0
5	—	—	—	25. I. 26	20	† 80	—	—	—
Kaninchen									

Tode konnte ich nur noch ein erbsengroßes Knötchen an der „BCG“-Injektionsstelle vorfinden. Mikroskopisch fand ich in diesem Knoten „BCG“. Diese zeigten auf Glyzerinkartoffel kein Wachstum.

Im Fall 2 verschwand der „BCG“-Impfabzess kurz vor dem Tode völlig.

Im Fall 3 war der „BCG“-Impfabzess beim Tode des Tieres noch vorhanden, jedoch von der Umgebung durch eine bindegewebige Kapsel streng abgegrenzt.

Abszeßinhalt: Leukozyten, Lymphozyten und „BCG“. Züchtung auf Glyzerin-Kartoffel wurde nicht vorgenommen.

In Fall 11 waren an der „BCG“-Impfstelle mehrere kleine Knoten zu sehen. Diese Knoten enthielten nur „BCG“, mikroskopisch nachweisbar.

Meerschweinchenversuche (2) ergaben Avirulenz der „BCG“. Züchtung wurde nicht vorgenommen.

Nach vorliegenden Fällen scheint es, als ob die Dauer der Immunität vom Vorhandensein von lebenden „BCG“ im Organismus abhängig ist. Da ich die Anlegung von Kulturen aus den Abszessen und veränderten Lymphknoten (verursacht durch Injektion von „BCG“) nicht systematisch vorgenommen hatte, war es mir leider nicht möglich, durch weitere Fälle meine Beobachtungen nachzuprüfen. Die Lebensdauer der aus den Abszessen (siehe Fälle der Tabelle 1 und 2) gezüchteten „BCG“ läßt vermuten, daß diese sich nicht lange Zeit in veränderten Teilen lebensfähig erhalten.

In der Fortsetzung meiner Arbeit werde ich auf diese Fragen eingehend zurückkommen.

Schlußbetrachtung.

In meinen Versuchen habe ich demnach feststellen müssen, daß junge „BCG“-Kulturen schwach virulent sind und auch Bildung von Tuberkeln hervorrufen können. Die Virulenz ist jedoch derart abgeschwächt, daß sie auch bei so überaus gegen Tuberkulose empfindlichen Tieren wie Meerschweinchen nicht zu einer generalisierten Tuberkulose führt. In der Regel verbleiben die Bakterien an der Impfstelle und in den benachbarten Lymphknoten. Hierdurch wird die Calmette'sche Anschauung bestätigt, daß die „BCG“ im allgemeinen für den Organismus unschädlich sind. Gegen seine Ansicht von der völligen Avirulenz sprechen meine Ergebnisse, daß junge Kulturen lokale tuberkulöse Veränderungen zu erzeugen imstande waren. Diese schwache Virulenz ist jedoch zur Erzeugung einer Immunität gerade wünschenswert.

Zu der Tabelle IV haben wir gesehen, daß avirulente Kulturen keine immunisatorische Eigenschaften besitzen. Das wird auch bestätigt durch Selters Ansicht, daß eine Immunität nur mit virulenten Kulturen erzeugt werden kann.

Auf Grund des oben Gefagten stehe ich auf dem Standpunkt, daß man „BCG“-Kulturen als Impfstoff in der Veterinärpraxis ruhig anwenden kann, insbesondere in solchen tuberkulös verseuchten Beständen, in denen eine tuberkulosefreie Aufzucht unmöglich ist.

Literatur.

1. Calmette et Guérin: Annales de l'institut Pasteur, T. 38, 1924.
2. Calmette, Guérin, Nègre et Boquet: Annales

de l'institut Pasteur, T. 40, 1926. 3. Calmette: Annales de l'institut Pasteur, T. 40, 1926. 4. Young: The Veterinary Journal 1926 (ref. T. R., Nr. 34, 1926). 5. Calmette: Annales de l'institut Pasteur, T. 42, 1928. 6. Tschelnowitzer: Annales de l'institut Pasteur, T. 41, 1927. Boquet et Nègre: Annales de l'institut Pasteur 1926. 8. Kraus: Centralblatt für Bakteriologie, Orig., Bd. 104, 1927.

9. Derfelbe: Zeitschrift für Immunitätsforschung, Bd. 51, 1927. 10. Sörgo: Centralblatt für Bakteriologie, Orig., Bd. 104, 1927. 11. Selter: Zeitschrift für Infektionskrankheiten und Hygiene, Bd. 24, 1923. 12. Derfelbe: Münch. Med. Wochenschrift 1923, Nr. 51. 13. Derfelbe: Zeitschrift für Hygiene, Bd. 95, S. 159. 14. Derfelbe: dafelbst, Bd. 95, S. 233. 15. Derfelbe: D. T. W. 1926, Nr. 37.

Zum Vorkommen von Erregern aus der Paratyphus-Enteritis-Gruppe bei Kälbern und erwachsenen Rindern.

Erwiderung auf den Artikel in Nr. 16 dieser Zeitschrift.

Von Dr. Karsten, Hannover.

Ziffer 2 meiner Schlußsätze auf Seite 790 in Nr. 48 dieser Zeitschrift vom 26. Oktober 1927 bezog sich naturgemäß auf die im Tierfeucheninstitut zu Hannover gemachten Feststellungen und Erfahrungen und galt für die Gegenden, in welchen diese Erfahrungen gesammelt wurden, also für Nordwestdeutschland. Diese Tatsache, die aus meiner Arbeit hervorgeht, sei besonders hervorgehoben.

Im übrigen sei bemerkt, daß sich mein Material nicht, wie L e h r annimmt, auf lediglich „22 Funde des Bact. ent. Gärtner“ stützt, da, ganz abgesehen von meinen früher berichteten Funden, die gewöhnlichen Fälle des sog. Kälberparatyphus, also die Gärtnerinfektionen bei etwa zwei bis acht Wochen alten Kälbern, unberücksichtigt geblieben sind. Diese „Gärtnerkälber“ werden ja alljährlich in mehr oder weniger stattlicher Zahl in alle Institute, welche in der Nähe der Nord- und Ostsee liegen, zwecks Feststellung der Todesursache eingefandt und stellen etwas alltägliches dar.

Hervorheben möchte ich, daß ich in Ziffer 2 lediglich die Worte „spricht für“ gewählt, einen mehrbefragenden Ausdruck aber absichtlich vermieden habe. In L e h r s Ausführungen heißt es nun u. a.:

1. „Schon der erste fest umrissene Teil seiner Behauptung, daß bei Kälbern ausschließlich der Bac. ent. Gärtner vorkäme, trifft nicht das Richtige.“

2. „Die Auffassung, daß ein Breslau-Fund bei einer durch Kalbfleisch hervorgerufenen Fleischvergiftung u n b e d i n g t gegen eine intravitale Infektion des Fleisches spricht, ist daher keineswegs wissenschaftlich berechtigt.“

Hier liegen nicht nur Übertreibungen meiner Ausführungen vor, sondern es wird mir direkt eine Behauptung unterföhoben, die gar nicht von mir gemacht ist. Das muß ich natürlich zurückweisen.

Außerdem ist das Vorkommen von Breslaubakterien beim Kalbe eine altbekannte Tatsache. Gibt es doch Länder, wie z. B. Dänemark, wo eine durch Breslaubakterien hervorgerufene Kälberfeuche vorkommt, wie uns die bereits 1914 herausgegebene Schrift von C h r i s t i a n s e n (Paratyfusinfektion hos Kalve og Fol) zeigt. Aber selbst in Dänemark sind diese Breslauintektionen bei Kälbern verhältnismäßig selten. Sie wurden nach C h r i s t i a n s e n in den Jahren von 1906—1921 in 35 Beständen festgestellt, gegenüber 1500 Beständen, in denen andere Kälberfeuchen

nachgewiesen wurden, und gegenüber 399 Beständen, in denen die Gärtnerinfektion (unser sogenannter Kälberparatyphus) ermittelt wurde.

Ich selbst bin auf die Breslauintektion beim Kalbe in meiner Monographie (Der Paratyphus der Kälber, Berlin 1921) auf den Seiten 103—106 näher eingegangen, desgleichen auf den Seiten 10—12. Auf Seite 11 meiner Monographie heißt es: „Daß Paratyphusbazillen vom Schottmüllertyp (was heute natürlich Breslauertyp heißen muß) bei Kälbern vorkommen, ist nicht zu bestreiten, und weiteren Untersuchungen bleibt die Feststellung vorbehalten, ob tatsächlich diese Keime nur gelegentlich einmal Kälber krank machen und töten, wofür meine Erfahrungen sprechen, oder aber gleichfalls als die Erreger einer Kälberfeuche anzuspochen sind.“

Diese weiteren Feststellungen haben nun für Nordwestdeutschland, wo ich seit 1922 die Paratyphusbefunde bei unseren Haustieren neben L ü t j e in Stade verfolge, ergeben, daß den Breslauintektionen bei Kälbern so gut wie keine Bedeutung zukommt. L ü t j e (schriftliche Mitteilung) hat beispielsweise innerhalb von acht Jahren „in mindestens 600 verschiedenen Beständen“ den sogenannten Kälberparatyphus, also die Gärtnerinfektion, festgestellt und nur in zwei Beständen eine Breslauintektion. Diese Seltenheit der Breslaubefunde bei Kälbern ist um so bemerkenswerter, als, wie L ü t j e mit Recht hervorhebt, Breslaubakterien bei Schweinen, insbesondere Ferkeln, und bei Abfatzföhlen ein besonders häufiger Befund in der dortigen Gegend sind. Über Breslauintektionen beim erwachsenen Rinde ist bisher in Nordwestdeutschland überhaupt noch nichts bekannt geworden.

Aus diesen Tatsachen müssen natürlich auch die Folgen gezogen werden. Es läßt sich also mit Fug und Recht behaupten: Da andere als Gärtnerinfektionen in Nordwestdeutschland beim Kalbe so gut wie nicht vorkommen, ist in dieser Gegend beim Auftreten von Fleischvergiftungen infolge des Genusses von Kalbfleisch von vornherein zunächst an eine postmortale Infektion des Fleisches zu denken, wenn die Erreger der Fleischvergiftung einem andern als dem Gärtnerart angehören. Dabei bleibt es natürlich den Ermittlungen im Einzelfall überlassen, diese Vermutung zu erhärten oder ihr Nichtzutreffen nachzuweisen.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Pröscholdt: Über das derzeitige Auftreten der Schweinepest. (Aus d. Gesundheitsamt d. Landwirtschaftskammer für Pommern. — Direktor: Dr. Pröscholdt.) (Arch. für wiss. Tierheilkunde 1928, 57, S. 113.)

An Hand von neun Fällen aus der Praxis in Pommern, die ausführlich beschrieben werden, zeigt Pröscholdt, daß die Virus Schweinepest chronisch bzw. latent oft weiterbesteht in Beständen, in denen früher akute Seuchengänge vorgekommen sind. Die Erkrankungen beschränken sich dann vorwiegend auf junge Ferkel, die kümmern und erst akut erkranken, wenn sie durch Witterungsunbilden, falsche Fütterung und schlechte Stallverhältnisse in ihrer natürlichen

Widerstandskraft geschädigt werden. Die Diagnose ist in solchen Fällen sehr schwierig, da der Bestand zeitweise völlig gesund erscheint und nur hier und da ein akuter Krankheitsfall auftritt. Die Ursache für diese Form der Pest sieht Verf. in den von früheren Seuchengängen zurückbleibenden Virusträgern bzw. Virusauscheidern, die sich hauptsächlich unter den Kümmernern finden. Der Grund des milden Verlaufes beruht in erworbener Immunität und in Virulenzabschwächung des Virus. Spontanheilungen kommen in solchen Fällen häufiger vor, andererseits aber auch Neuerkrankungen, die sehr verlustreich werden können. Besonderer Wert ist auf die Beseitigung der Kümmernern zu legen. Viele Haltekrankheiten sind auf chronische Pest zurückzuführen. Die Diagnose wird weiterhin dadurch erschwert, daß

auch durch Paratyphusbakterien ähnliche Krankheitsbilder verursacht werden. Endgültigen Aufschluß gewährt nur der Übertragungsversuch. Sekundärinfektionen mit anderen Keimen (Streptokokken, bipolare Bakterien, Coli, Pyogenes) werden anscheinend durch Vakzinbehandlung günstig beeinflusst. Wünschenswert sind Feststellungen, wie oft Pestausbrüche auf eingestellte Tiere aus Beständen mit chronischer bzw. latenter Pest zurückzuführen sind. Danach richtet sich die veterinärpolizeiliche Behandlung, die sich bisher vorwiegend auf die akuten Fälle erstreckt. Geiger.

Doyle, Mathews and Whiting: Anemia in young pigs. (Anämie bei Ferkeln.) (J. of the Am. Vet. Med. Assoc. 1928, 72, S. 491.)

Bei Saugferkeln beobachteten die Verff. eine als Anämie bezeichnete Krankheit, die sich klinisch in Teilnahmslosigkeit, Schwäche, Blässe der Haut und Schleimhäute äußerte. Der Tod der oft gut genährten Tiere erfolgte entweder plötzlich oder nach längerem Kranksein und Kümern. Pathologisch-anatomisch fanden sich: Schwellung der Leber, die infolge verschiedener Färbung der Läppchen gefleckt ausfiel, Aszites, Milztumor, Herzerweiterung, Hydrothorax, Lungenödem. Bei wieder genesenen konnte Zirrhose der mit Fibrinbelägen versehenen Leber festgestellt werden. Die histologische Untersuchung ergab fettige Degeneration der Leber und Erythroblastenansammlung in Leber, Milz und Knochenmark. Änderung der Fütterung (Beigabe von Vitaminen, Eisen) war ohne Einfluß. Dagegen trat die Anämie bei Saugferkeln, die bei günstigem Wetter täglich 1 bis 2 Stunden auf Weideplätze gelassen wurden, viel seltener auf. Der Prozentsatz der Erkrankungen und Sterblichkeit unter den ständig im Stall gehaltenen Tieren war viermal höher. Geiger.

Cohen, F.: Zur Epidemiologie des Rotlaufs. (Aus der Poliklinik für große Haustiere. — Direktor: Prof. Dr. Neumann-Kleinpaul.) (Arch. für wiss. Tierheilkunde 1927, 56, S. 1.)

In der mit 22 Tabellen, 11 Diagrammen, 12 Kurven und einem reichhaltigen Zahlenmaterial ausgestatteten Arbeit geht Verf. ausführlich auf die Epidemiologie des Rotlaufs ein. Die Zahl der Rotlaferkrankungen schwankte in den Jahren 1898—1924 sehr, hat aber 0,99 Prozent des Schweinebestandes nie überschritten. Dementsprechend betrug die Zahl der infolge Rotlauf gefallenen und getöteten Schweine höchstens 0,8 Prozent. Nach der Zahl der Erkrankungen steht an erster Stelle stets das dritte Vierteljahr, es folgen das vierte, zweite und erste Vierteljahr. Die Verluste allein durch Tod betragen jährlich mindestens 1 Million RM. Dazu kommt noch der Schaden durch Erkrankungen, ungünstiger Beeinflussung der Zucht usw. Die Verbreitung des Rotlaufs hängt in erster Linie von der geographischen Lage des Landesteils, der Anzahl des Schweinebestandes, vom Handel und Verkehr und von den Bodenverhältnissen ab. Besonders stark war der Rotlauf während des Krieges in den Jahren 1916 und 1917 verbreitet. Veterinärpolizeiliche Bekämpfung allein genügt nicht. Das brauchbarste Verfahren ist die Simultanimpfung nach Lorenz, selbst auf die Gefahr hin, daß dadurch Rotlaufkeime künstlich verbreitet und von den Impflingen ausgehoben werden. Geiger.

Aoki, K., S. Kondo und J. Tazawa: Über eine neue Krankheit, welche vom Hafen auf Menschen übertragbar ist. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 105, S. 255, 1928.)

Verff. haben die vorliegende Krankheit aufs genaueste erforscht, wobei sich folgendes ergab:

1. Eine neue Krankheit bei Menschen wurde beobachtet, die von Wildhafen auf Menschen übertragbar ist. 2. Als kardinales Symptom dieser Krankheit tritt bei Menschen Fieber mit darauffolgender Lymphdrüsenanschwellung auf. Diese Symptome kann man bei Meerfischweinchchen auch erzeugen. Doch konnten wir diese Drüsenanschwellung bei zahmen Kaninchen und Mäusen nicht beobachten. Bei

Meerfischweinchchen war besonders hervorzuheben, daß die Drüsen- und Knötchenbildung im Peritoneum sehr deutlich auftrat, falls das Virus ihnen intraperitoneal eingespritzt wurde. In diesem Falle ist die Erscheinung leicht mit tuberkulösen Affektionen zu verwechseln. 3. Das Virus dieser Krankheit scheint zu dem filtrierbaren Virus zu gehören. 4. Dieses Virus ist auf Kaninchen, Meerfischweinchchen und Mäuse leicht übertragbar. Dabei traten die typischen Symptome, Fieber, Drüsenanschwellung und Knotenbildung, bei Meerfischweinchchen am deutlichsten auf. Bei Kaninchen und Mäusen konnten wir keine deutliche Lymphdrüsenanschwellung und sonstige anatomische makroskopisch wahrnehmbare Veränderungen erzeugen. Gegen Meerfischweinchchen war das Virus so virulent, daß die Tiere ohne Ausnahme an dieser Infektion zugrunde gingen. Kaninchen scheinen dagegen viel resistenter zu sein, weil, trotz ausnahmslos auftretendem hohen Fieber, viele Tiere sich erholten und am Leben blieben. Mäuse gingen ohne Ausnahme zugrunde. Doch waren dabei anatomische Veränderungen nicht deutlich nachzuweisen. 5. Bei der Infektion mit diesem Virus scheint es sich im ganzen Körper zu verbreiten. 6. Das Virus scheint gegen Hitze nicht sehr resistent zu sein. Wenn es bei 37 Grad C über vier Tage gehalten wurde, so blieb es nicht mehr infektiös. Diese Erscheinung ist bei Bakterien nicht zu beobachten. Aber es kann in der Kälte sehr lange aufbewahrt werden. Wir konnten es über ein Jahr lang im Eischrank virulent aufbewahren. Trockenheit kann es gut ertragen, so daß es im Exsikator über ein Jahr virulent aufbewahrt wurde. 7. Wenn Kaninchen einmal diese Infektion überstanden hatten, so blieb ein Immunitätszustand ausgebildet, so daß sie die Infektion mit einer großen Menge von Virus gut vertragen konnten. Ebenso konnten wir sowohl Kaninchen als auch Meerfischweinchchen mit bei 60 Grad C 15 Minuten lang abgetöteten Virus künstlich aktiv immunisieren. Dabei werden Kaninchen immer so immun, daß sie starke Dosen Virus vertragen können. Dagegen kann man Meerfischweinchchen durch Vorbehandlung nur in beschränktem Maße immun machen. Sie konnten nur eine Infektion bis zu der Verdünnung von 1 : 100 von einer bestimmten Virusaufschwemmung vertragen. Diese die Infektion überlebenden Tiere lassen sich sehr schwer noch stärker immunisieren. 8. Nach allen diesen Ergebnissen können wir wohl annehmen, daß eine Krankheit in Japan vorhanden ist, die von Hafen auf Menschen übertragbar werden kann, falls das Virus direkt mit dem Menschen in Berührung kommt. Dieses Virus scheint direkt von der Haut in den Körper einzudringen und allgemeine Infektion hervorrufen zu können. Von der Natur dieses Virus muß nach unserer Untersuchung angenommen werden, daß es zu den Mikroorganismen gehört, die filtrierbar sind. Nach unseren bisherigen Erfahrungen scheint das Virus dem filtrierbaren Virus der Encephalitis lethargica ganz ähnlich zu sein. 9. Diese Krankheit scheint nur in den nördlichen Provinzen der Insel Hondo, dagegen nicht in den mittleren oder südlichen Provinzen von Japan zu existieren. Carl.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Bleyer, B. und K. Mayer: Zur Frage der Ursachen der Dürerer Rinderkrankheit. (Fortschritte d. Landwirtschaft. 1927, S. 173.)

Ausgehend von der Arbeit Profés und Grüttners, die die Ursache der genannten Krankheit in einem Fabrikationsumstand vermuten, wurde vom chemischen Standpunkt nur der Einfluß der verschiedenen Extraktionsverfahren auf die Sojabohnen geprüft. Auf Grund ihrer Untersuchungen und Fütterungsversuche kommen die Verff. zu dem Schluß, daß das Sojabohnenschrot tatsächlich durch zu starke Fettextraktion zum großen Teil seine Vitamine verliert und daß darin die pathogene Wirkung des Sojabohnen-

schrotes begründet ist. Es wird angenommen, daß die schädigenden Eigenschaften nicht vorhanden wären, wenn die Technik sich mit einer Fettextraktion bis auf 2 Prozent begnügen würde. Schoop.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Borchard: Die Blaufäureresistenz des d'Hérélleschen Bakteriophagen. (Zeitschr. für Immunitätsf. 1928, 54, S. 403.)

Es wird eine Blaufäureresistenzbestimmung geschildert, mit der es gelingt, mehr oder weniger resistente Mikroben abzutöten, aber nicht die proteolytischen Fermente. Der d'Héréllesche Bakteriophage verhält sich in diesen Resistenzversuchen ebenso wie unorganisierte HCN-resistente Fermente und ist darnach in ihre Gruppe zu stellen. Meyn.

Dack, G. M., Starin, W. A. and Werner, M.: Growth of Cl. Botulinum and C. Sporogenes in veal infusion both under reduced pressure. (Journal of Infekt. Diseases, 1927, 40, S. 525.)

Verff. stellten fest, daß bei einem Luftdruck von mehr als 16 ccm nie mehr Wachstum der genannten anaeroben Bazillen eintrat, während es bei 50 ccm Kohlendioxidruck nicht behindert war. Die Toxinbildung von Bacillus botulinus wurde durch die Höhe des Druckes nicht beeinflusst. Schoop.

Haim und Kemal: Studien über Pseudotuberkulosebakterien (B. pseudotuberculosis rodentium), die aus Krankheitsherden des Menschen gezüchtet wurden. (Beitr. z. Klinik der Tuberkulose 1928, 68, S. 128.)

Mit drei Stämmen des Bacterium pseudotuberculosis rodentium, die aus Krankheitsherden beim Menschen gezüchtet wurden, ist eine Reihe von biologischen Versuchen angestellt worden. Die Bakterien wuchsen auf organhaltigen Nährböden sehr viel besser als auf gewöhnlichem Agar. I. a. infizierte Meerfischweinen, Kaninchen und Mäuse verwendeten meist nach wenigen Tagen. Der bakteriologische Befund der Peritonealflüssigkeit und des Blutes war stets positiv. Wurden ausgewachsene Tiere verwendet, so fehlten makroskopische Veränderungen. Bei jungen, wenige Tage alten Tieren hatten sich aber bereits in wenigen Tagen Pseudotuberkel in der Leber gebildet. Durch Vorbehandlung von Meerfischweinen mit Pseudotuberkelbakterien, Lipoid und Galle — zusammen oder mit einzelnen von diesen Stoffen — konnte in einigen Fällen ein Schutz gegen die künstliche Infektion erzielt werden. Bindende Schlüsse gestatten die Versuche aber nicht. Meyn.

Nahrungsmittelhygiene.

Milchpolizeigesetzgebung.

Gesetz über Änderung des Gesetzes zur Regelung des Verkehrs mit Milch vom 24. März 1928.

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird:

Artikel 1. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung des Verkehrs mit Milch vom 23. Dezember 1926 (R.G.Bl. I S. 528) erhält folgende Fassung: „Am 1. April 1929 tritt dieses Gesetz außer Kraft.“

Artikel 2. Dieses Gesetz tritt mit dem auf die Verkündung folgenden Tage in Kraft.

Berlin, den 24. März 1928.

Der Reichspräsident.
von Hindenburg.

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft.
Schiele.

Vorstehendes Gesetz verlängert die Gültigkeit des Gesetzes vom 23. Dezember 1926 um ein weiteres Jahr, da das

Reichsmilchgesetz voraussichtlich erst in Jahresfrist erscheinen wird und ohne die Verlängerung der Übergangsbestimmungen ein Vakuum entstanden wäre, das nicht im Interesse eines geregelten Milchverkehrs gelegen hätte. Die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Dezember 1926 sind folgende:

§ 1. Die Gemeinden können anordnen, daß der Handel mit Vollmilch, Magermilch und Sahne in ihrem Bezirk von einer besonderen Erlaubnis abhängig ist. Gemeinden mit weniger als 50 000 Einwohnern bedürfen zu solchen Anordnungen der Zustimmung der obersten Landesbehörde.

Für Anordnungen nach § 1 gelten die nachfolgenden Vorschriften.

Die Erlaubnis kann verlagert werden:

1. wenn der Antragsteller die für den Handel mit Milch erforderliche Sachkenntnis oder Zuverlässigkeit nicht besitzt,
2. wenn die zum Milchhandel bestimmten Räumlichkeiten und Einrichtungen polizeilichen Vorschriften nicht entsprechen,
3. wenn anzunehmen ist, daß Antragsteller nicht eine von der Gemeinde in der nach Abs. 1 zu erlassenden Anordnung nach dem örtlichen Bedürfnis festzusetzende Mindestmenge an Vollmilch, Magermilch oder Sahne in den Verkehr bringt.

Die Erlaubnis kann zurückgenommen werden, wenn sich nachträglich Umstände ergeben, die die Verlagung der Erlaubnis rechtfertigen würden.

Vor der Entscheidung über die Erteilung und Zurücknahme der Erlaubnis sind Sachverständige des Milchhandels zu hören, wenn solche nicht bei der Entscheidung mitwirken.

Die Stadtgemeinden haben Richtlinien festgelegt oder festzulegen, wie der Antragsteller die erforderliche Sachkenntnis nachzuweisen hat. Es ist der Regel nach eine mehrjährige Beschäftigung im Milchhandel oder der Besuch einer Molkereifachschule und das Bestehen einer Abgangsprüfung als genügend angesehen. Zweck der Maßnahme ist, ungeeignete Elemente vom Milchhandel fernzuhalten, auch sollte Gewähr gegeben werden, daß der Milchhändler durch seine Fachkenntnisse und seine Persönlichkeit Sicherheit bietet, daß er die Milch fachgemäß zu behandeln versteht.

Ebenso wichtig ist die Bestimmung, daß die zum Milchhandel bestimmten Räumlichkeiten und Einrichtungen polizeilichen Vorschriften entsprechen müssen. Derartige Vorschriften sind erlassen auf Grund des Preuß. Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850.

Das Preußische Gesetz über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 sieht u. a. vor, daß die mit der örtlichen Polizeiverwaltung beauftragte Behörde die Einrichtungen zur Verabreichung von Speisen und sonstige Einrichtungen, die auf Leben und Gesundheit Bezug haben, endlich alles andere, was im besonderen Interesse der Gemeinden und ihrer Angehörigen polizeilich angeordnet werden muß, durch Polizeiverordnung regeln kann. Dieses Gesetz gestattet aber ein Eingreifen nur, wenn es sich um die Abwendung konkreter Gefahren von der Bevölkerung handelt, nicht aber dann, wenn Maßnahmen rein prophylaktischer Natur in Frage kommen. So wird auf Grund dieses Gesetzes z. B. Bestimmung getroffen werden können, wie die Milchaufbewahrungsräume und die Milchverkaufsräume beschaffen sein müssen, welche hygienischen Maßnahmen beim Milchausschank zu beachten sind; es wird aber z. B. nicht angeordnet werden können, daß nur pasteurisierte Milch oder nur Milch in Flaschen verkauft werden darf, weil es sich hierbei um Maßnahmen handelt, deren Durchführung vielleicht wünschenswert ist, die aber im Interesse der Abwendung etwaiger Gefahren von der Bevölkerung sich als nicht unbedingt notwendig erweisen.

Es läßt sich somit der Verkehr mit Milch durch das Reichsgefeß vom 23. Dezember 1926 und das Ergänzungsgefeß vom 24. März 1928 und auf Grund des Polizeiverwaltungsgefeßes regeln; für die Kontrolle der Milch geben der Preußische Erlaß vom 26. Juli 1912 und das Lebensmittelgefeß die Unterlagen. Der Preußische Erlaß erkannte den großen Fehler der bis dahin den Milchverkehr ordnenden polizeilichen Bestimmungen, die zu einseitig den Hauptwert auf einen angemessenen Fettgehalt der Milch gelegt haben. Neben dem Fettgehalt der Milch sind aber nach dem Erlaß die reinliche Gewinnung der Milch und die Erhaltung ihrer Frische bis zum Verbrauch von ganz besonderer Wichtigkeit. Der Erlaß sah davon ab, Anweisungen für die Ausübung der Milchkontrolle im einzelnen zu geben, da fast im ganzen Staatsgebiet Nahrungsmitteluntersuchungsanstalten für Beurteilung der hygienischen und veterinären Fragen Ärzte und Tierärzte zur Verfügung ständen. In den dem Erlaß angefügten Grundfätzen für die Regelung des Verkehrs mit Kuhmilch als Nahrungsmittel für Menschen sind unter III die allgemeinen Anforderungen an die Beschaffenheit der Milch genau präzisiert.

In dem Erlaß, der dem Oberpräsidenten zugeleitet ist, wurde am Schluß gesagt: „Euere Durchlaucht (Exzellenz) wollen die Regierungspräsidenten bei Mitteilung der Grundfätze über deren Anwendung dem Vorstehenden gemäß anweisen und selbst gefälligst in Erwägung ziehen, ob der Erlaß einer einheitlichen Polizeiverordnung für die dortige Provinz in Frage kommen kann.“

Solche Polizeiverordnungen sind erlassen z. B. für den Regierungsbezirk Arnsberg und den Regierungsbezirk Düsseldorf. Sie haben sich in den für die Untersuchung der Milch wesentlichen Punkten möglichst an den Wortlaut des Erlasses gehalten. In dem Arnsberger Erlaß heißt es in § 3, daß die von der Polizei beauftragten Sachverständigen (Tierärzte, Ärzte, Chemiker) befugt sind, in Räume einzutreten, in denen Milch gewerbsmäßig gewonnen, zubereitet, aufbewahrt, feilgehalten oder sonst in den Verkehr gebracht wird, daß sie Proben zum Zweck der Untersuchung entnehmen können. Eine ähnliche Fassung hat die Düsseldorfer Verordnung.

Die Vorteile dieses Erlasses haben sich für die tierärztliche Milchuntersuchung noch wenig oder gar nicht ausgewirkt. Einwandfrei steht fest, daß Tierärzte als Sachverständige der Polizeiverwaltung ernannt werden können und daß sie das Recht haben, zum Zweck der Untersuchung Proben zu entnehmen. Die Ernennung solcher Sachverständigen ist also der erste Schritt, den die Stadtverwaltungen tun müssen, sofern sie sich die tierärztlichen Kenntnisse auf dem Gebiet der Milchuntersuchung im Interesse der Gefunderhaltung der Bevölkerung zunutze machen wollen. Das Arbeitsgebiet der Tierärzte braucht und soll auch nicht das Arbeitsgebiet des Nahrungsmittelchemikers tangieren; beide Berufsstände werden bei einigermaßen gutem Willen un schwer zu einer Abgrenzung ihrer Befugnisse kommen können. Der zweite Schritt ist der, daß die Stadtverwaltungen Veterinäruntersuchungsämter errichten, gegebenenfalls der Kostenersparnis wegen in Anschluß an die Schlachthoflaboratorien und daß sie diese Ämter als öffentliche Untersuchungsstellen erklären lassen. Das dritte ist, daß sie diesen Ämtern einen Probeentnehmer zur Verfügung stellen. Damit ist dann die tierärztliche Milchuntersuchung in die Wege geleitet. Bei der Beurteilung der Milch haben auch die §§ 3 und 4 des Lebensmittelgefeßes vom 5. Juli 1927 als Unterlage zu dienen.

Aufgabe des Reichsmilchgefeßes wird es sein, eine Einheitlichkeit der verschiedenen Bestimmungen herbeizuführen und die erforderlichen Ergänzungen vorzunehmen. Viel wertvolles Material ist in den bisherigen Gefetzesbestimmungen enthalten. Erweitert werden müssen aber zunächst die Bestimmungen über die Milchgewinnung. Der

Tierarzt wird seine Forderungen auf diesem Gebiete weiter zu stellen haben wie der Milchwirtschaftler. Er wird fordern müssen, daß nur gesunde Kühe in gut gehaltenen Stallungen zur Milchgewinnung benutzt werden dürfen und aus diesem Grunde eine Stallkontrolle unerlässlich wird. Er wird weiter fordern müssen, daß er bei der Milchkontrolle in den Städten nach Maßgabe seiner Berufskenntnisse beteiligt wird. Die Städte haben Interesse an der Zufuhr einer gefunden Milch und an der Regelung des Verkehrs mit Milch. Sie wollen Einfluß auf die Art des Milchhandels haben. Nur einwandfreie Personen sollen den Milchhandel übernehmen, die gesund sind und neben der selbstverständlichen Zuverlässigkeit auch über genügende Fachkenntnisse verfügen. Die Städte wollen weiter, daß keine Zwergexistenzen groß gezogen werden, die nichts für ihr Geschäft aufwenden können und bei geringem Umsatz das einzelne Liter Milch mit einer zu hohen Verdienstspanne belasten. Sie wollen weiter, daß Bestimmungen über die Arbeitsweise und Kontrolle der Molkereien getroffen werden, daß der Milchverhand auf der Bahn durch Gestellung von Kühlwagen gebessert wird und daß ihnen überlassen wird, zu bestimmen, ob die Milch in pasteurisiertem Zustande oder in Flaschen oder in sonst einer den Forderungen der Hygiene entsprechenden Weise vertrieben werden soll. Sie haben auch noch dazu den Wunsch, daß die Milchkontrolle in den Städten sich nicht allein auf gelegentliche Stichproben beschränkt, sondern daß die gesamte in die Städte gelieferte Milch zunächst eine Kontrollstelle zu passieren hat, in der sie auf ihren Frischzustand, gegebenenfalls auch auf ihren Gefundheitszustand geprüft wird, in der auch zugleich Anordnungen über die Verwendung nicht marktfähiger Milch getroffen werden. Solche Kontrollstellen sind deshalb auch mit den zur Verarbeitung der Milch erforderlichen Einrichtungen zu versehen.

Dr. Heine, Duisburg.

Standesangelegenheiten.

Tierärzterverein Stade-Weß (Unterweßer).

31. März 1928 in Bremen.

1. Als neue Mitglieder werden aufgenommen: Polizei-Tierarzt Dr. Meinhold-Weßermünde und prakt. Tierarzt Dr. Postel-Hagen, Kr. Geestemünde. Verstorben Vet.-Rat Dr. Stock-Osterholz.
2. Dr. Hayen erstattet den Kassenbericht. Als Beitrag für 1928 werden wie 1927 wiederum 12,— RM. erhoben, in dem die Beiträge für den Tierärzterverband Niedersachsen, dessen Witwenkasse, die Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurfußschertums und die Gesellschaft für Freunde der Hochschule Hannover enthalten sind. Außerdem werden aus der Kasse 75,— RM. für die Jubiläumsspende der Hochschule Hannover bewilligt.
3. Die rege Aussprache über Abänderungsvorschläge zu den §§ 5 des Preuß. Ausf.-Ges. und 7 der Preuß. Ausf.-Best. zum Reichsfleischbeschaugefeß führt zu folgenden Beschlüssen, welche an den Tierärzterverband Niedersachsen weitergeleitet werden: a) Der § 5 des Preuß. Ausf.-Ges. ist dahin zu erweitern, daß alles Fleisch aus Notfchlachtungen dem Deklarationszwang durch besondere Stempelung zu unterliegen hat. Notfchlachtungen sind auch alle Schlachtungen, die wegen einer inneren Erkrankung vorgenommen werden einschl. derjenigen der in den bisherigen Bestimmungen aufgeführten Krankheiten. b) Einer Abänderung des § 7 der Preuß. Ausf.-Best. bedarf es nicht. c) Die Staatsregierung wird gebeten, die nachgeordneten Verwaltungsbehörden anzuweisen, daß bei etwaigem Vorkommen von Fleischvergiftungen dem Tierarzt, der das Fleisch untersucht hat, erst dann die Fleischschau entzogen bzw. eine andere Bestrafung zuteil werden darf, wenn keinerlei Zweifel bestehen, daß er infolge vorschriftswidrigen Verhaltens die Fleischvergiftung verschuldet hat.
4. Dr. Machens-Elze hält einen Vortrag über „Buchführungs- und Verrechnungstellen“. Referent klärte die Verfaßlung über Zweck und Ziele dieser Inkassobetriebe auf und überzeugte alle Anwesenden, daß es insbesondere für die Freiberufstierärzte sehr zu empfehlen wäre, sich einer Buchführungsstelle anzuschließen, zumal die sozialen Einrichtungen als mustergültig anerkannt werden müssen. Es wird allen Mitgliedern im eigenen Interesse empfohlen, mit Herrn

Machens Föhlung zwecks Anschluß zu nehmen. 5. Als Ersatzmann für Vet.-Rat Dr. Stock wird Vet.-Rat Dr. Kantorowicz, Wefermünde-Lehe, der Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums als Vertrauensmann des Vereins Unterwefer namhaft gemacht.

Achim, Bremerhaven, den 11. April 1928.

Behrens, Vors. Dr. Leyer, Schriftf.

Preußisches Tierärztekammergesetz.

Gefetz über die tierärztliche Berufsvertretung und die tierärztlichen Standesgerichte (Tierärztekammergesetz). Vom 13. April 1928.

(Schluß.)

Hauptverhandlung.

§ 53. (1) Wird das Verfahren nicht eingestellt, so sind der Angeeschuldigte und sein Beistand unter abschriftlicher Mitteilung der Anklageschrift von dem Vorsitzenden des Standesgerichts zur Hauptverhandlung vorzuladen.

(2) Zwischen der Zustellung der Ladung und der Hauptverhandlung muß eine Frist von mindestens zwei Wochen liegen. Ist die Frist nicht gewahrt, so muß die Hauptverhandlung ausgesetzt werden, wenn von dem Angeeschuldigten oder seinem Beistand im Falle des Erscheinens vor der Verlesung der Anklageschrift (§ 58 Abs. 1) die Aussetzung beantragt wird oder im Falle des Nichterscheinens auf die Innehaltung der Frist nicht ausdrücklich verzichtet worden ist.

(3) Soweit dieses Gefetz nichts anderes vorschreibt, gelten für die Hauptverhandlung die Vorschriften in §§ 226 bis 229, 237 bis 267, 271 bis 274 der Strafprozeßordnung entsprechend.

§ 54. (1) Die Mitglieder des Standesgerichts, die bei der Voruntersuchung mitgewirkt haben, sind von der Teilnahme an dem weiteren Verfahren, insbesondere der Hauptverhandlung, nicht ausgeschlossen.

(2) Der Untersuchungsführer darf an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen, wenn spätestens drei Tage vor der Hauptverhandlung ein Widerspruch des Angeeschuldigten gegen seine Teilnahme beim Standesgericht eingeht.

§ 55. Das Standesgericht kann nach freiem Ermessen die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen durch einen beauftragten Richter oder in der Hauptverhandlung anordnen. Der § 47 Abs. 3 bis 6 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß das Amtsgericht um die Vernehmung eines nicht am Sitze des Standesgerichts wohnenden Zeugen oder Sachverständigen auch dann erfucht werden kann, wenn dieser wegen Krankheit, Gebrechlichkeit oder anderer triftiger Gründe in der Hauptverhandlung nicht erscheinen kann.

§ 56. (1) Die Hauptverhandlung kann auch stattfinden, wenn der Angeeschuldigte trotz ordnungsmäßiger Vorladung nicht erschienen ist. Etwaige Auslagen des Angeeschuldigten sind in diesem Falle zu verlesen, sofern dies beantragt oder vom Standesgerichte beschloffen wird.

(2) Eine öffentliche Ladung oder Vorführung des Angeeschuldigten ist unzulässig.

(3) Unbeschadet des Rechtes des Angeeschuldigten, sich durch einen Beistand (§ 38 Abs. 6) vertreten zu lassen, kann das Standesgericht jederzeit das persönliche Erscheinen des Angeeschuldigten unter der Verwarnung anordnen, daß bei seinem nicht genügend entschuligten Ausbleiben ein Vertreter nicht werde zugelassen werden.

§ 57. (1) Die Hauptverhandlung ist nicht öffentlich. Den Mitgliedern der Tierärztekammer und ihren Stellvertretern ist der Zutritt zu gestatten, anderen Personen nur nach dem Ermessen des Vorsitzenden.

(2) Der Vorsitzende kann die Anwesenden zur Verschwiegenheit verpflichten.

(3) Zu der Hauptverhandlung ist ein Schriftführer zuzuziehen, der durch Handschlag an Eides Statt zu verpflichten ist.

(4) Der Vorsitzende kann für einzelne Teile der Hauptverhandlung die Leitung einem anderen Mitgliede des Standesgerichts übertragen.

§ 58. (1) In der Hauptverhandlung gibt nach Verlesung der Anklage ein von dem Vorsitzenden des Standesgerichtes aus der Zahl der Mitglieder ernannter Berichtstatter in Abwesenheit der Zeugen eine Darstellung der Sache nach den bisherigen Verhandlungen. Der Berichtstatter darf in der Sache nicht als Untersuchungsführer tätig gewesen sein.

(2) Hierauf erfolgt die Vernehmung des Angeeschuldigten. Gesteht er glaubwürdig die Tatsachen ein, die den Gegenstand der Anschuldigung bilden, so kann auf Beschluß des Standesgerichtes von einer Beweis-

aufnahme abgesehen werden. Andernfalls wird in die Beweisaufnahme eingetreten.

(3) Die Auslagen der nicht geladenen, bereits in der Voruntersuchung, durch einen erfuchten Richter, in einem Rechtsstreit, in einem strafgerichtlichen Verfahren oder in einem Verfahren auf Entziehung der Approbation vernommenen Zeugen und Sachverständigen, ferner etwaige Auskünfte öffentlicher Behörden und ärztliche Zeugnisse werden verlesen, sofern die Verlesung von dem Vertreter der Anklage, dem Angeeschuldigten oder seinem Beistand beantragt oder von dem Standesgericht beschloffen wird.

(4) Sodann werden der Vertreter der Anklage sowie der Angeeschuldigte und sein Verteidiger mit ihren Ausführungen und Anträgen gehört.

(5) Dem Angeeschuligten gebührt das letzte Wort.

§ 59. (1) Das Standesgericht kann zur weiteren Aufklärung der Sache sowie beim Hervortreten neuer Tatumstände oder rechtlicher Gesichtspunkte jederzeit die Aussetzung der Hauptverhandlung beschließen; es kann auch eine Ergänzung der Voruntersuchung anordnen.

(2) Eine Hauptverhandlung, die ausgesetzt wurde, muß in vollem Umfange nur dann wiederholt werden, wenn an der Fortsetzung der Hauptverhandlung nicht dieselben Mitglieder des Standesgerichts teilnehmen, die ihm bei der ersten Verhandlung angehört.

(3) Das Verfahren ist durch Beschluß vorläufig einzustellen, wenn der Angeeschuldigte in Geisteskrankheit verfällt. Die Hauptverhandlung kann wiederholt werden, sobald die Krankheit behoben ist. § 52 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 60. (1) Die Hauptverhandlung schließt mit der Verkündung der Entscheidung. Die Verkündung kann vertagt werden. Die Entscheidung darf nur auf Einstellung des Verfahrens, Freisprechung oder Verurteilung lauten.

(2) Auf Einstellung des Verfahrens ist zu erkennen, wenn es unzulässig war oder das Standesgericht nach § 24 nicht zuständig ist oder der Verstoß gegen die Standespflichten (§ 26) so geringfügig ist, daß eine Verurteilung unter Berücksichtigung des gesamten Verhaltens des Angeeschuldigten nicht gerechtfertigt erscheint.

(3) Auf Freisprechung ist zu erkennen, wenn kein Verstoß gegen die Standespflichten vorliegt.

(4) Das Standesgericht urteilt nach seiner freien Überzeugung.

(5) Eine Ausfertigung der mit Gründen versehenen Entscheidung ist dem Angeeschuligten zuzustellen.

§ 61. Über die Hauptverhandlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer (§ 57 Abs. 3) zu vollziehen ist.

d) Berufung.

§ 62. (1) Gegen die Entscheidung des Standesgerichtes steht sowohl dem Vertreter der Anklage als auch dem Angeeschuligten die Berufung an den Staatsgerichtshof zu. Der Vertreter der Anklage kann auch zugunsten des Angeeschuldigten Berufung einlegen; sie kann in diesem Falle nur mit Zustimmung des Angeeschuldigten zurückgenommen werden.

(2) Die Berufung ist unzulässig, wenn sie sich nur gegen die Kostenentscheidung richtet.

(3) Die Berufung ist bei dem Standesgerichte, das die angegriffene Entscheidung erlassen hat, schriftlich einzulegen; zur Wahrung der Berufungsfrist genügt auch die Einlegung bei dem Standesgerichtshof. Ein Irrtum in der Bezeichnung der Berufung ist unschädlich. § 318 der Strafprozeßordnung gilt entsprechend.

(4) Die Berufungsfrist beträgt einen Monat und beginnt mit dem Ablaufe des Tages, an dem die Ausfertigung der Entscheidung dem Angeeschuligten zugestellt ist.

(5) Durch rechtzeitige Einlegung der Berufung wird die Rechtskraft der Entscheidung, soweit sie angefochten ist, gehemmt.

§ 63. (1) Ist die Berufung verspätet eingelegt oder richtet sie sich nur gegen die Kostenentscheidung, so hat der Vorsitzende des Standesgerichtes das Rechtsmittel als unzulässig zu verwerfen.

(2) Dem Vertreter der Anklage und dem Angeeschuligten steht gegen den abweisenden Bescheid binnen zwei Wochen nach seiner Zustellung der Einspruch an das Standesgericht und gegen dessen Beschluß binnen einer gleichen Frist die Beschwerde (§ 68) an den Standesgerichtshof zu.

§ 64. (1) Eine schriftliche Rechtfertigung der Berufung ist binnen zwei Wochen nach Ablauf der im § 62 Abs. 4 bezeichneten Frist bei dem Standesgericht einzureichen.

(2) Die Berufungs- und die Rechtfertigungsschriftsätze sind dem Angeklagten in Abschrift zuzustellen, wenn der Vertreter der Anklage die Berufung eingelegt hat. Hat der Angeklagte die Berufung eingelegt, so sind die Schriftsätze dem Vertreter der Anklage in Urchrift vorzulegen.

(3) Innerhalb zweier Wochen nach Zustellung oder Vorlegung der Rechtfertigungsschrift kann der andere Teil eine Gegenschrift einreichen.

(4) Die Fristen nach Abf. 1, 3 können von dem Vorsitzenden des Standesgerichts auf Antrag verlängert werden.

(5) Neue Tatsachen, die die Grundlage einer anderen Beschuldigung bilden, dürfen in dem Berufungsverfahren nur mit Zustimmung des Angeklagten vorgebracht werden.

§ 65. Nach Ablauf der in § 64 bestimmten Fristen werden die Akten an den Staatsgerichtshof eingefandt.

§ 66. (1) Auf das Verfahren vor dem Staatsgerichtshof finden die Vorschriften über das Verfahren vor dem Standesgericht entsprechende Anwendung.

(2) Nach Beginn der Hauptverhandlung kann eine Berufung nur mit Zustimmung des Gegners zurückgenommen werden.

(3) Soweit der Standesgerichtshof die Berufung für unbegründet hält, hat er das Urteil des Standesgerichts aufzuheben und selbst zu entscheiden.

(4) Der Standesgerichtshof hat das Urteil des Standesgerichts aufzuheben und die Sache zur nochmaligen Verhandlung und Entscheidung an dasselbe oder ein anderes Standesgericht zu verweisen a) in den Fällen des § 338 der Strafprozeßordnung, der im standesgerichtlichen Verfahren entsprechend für die Berufung gilt, b) wenn es erforderlich ist, den Beschuldigten nochmals zu hören oder weitere Tatsachen zu ermitteln. Das Standesgericht, an das die Sache verwiesen wird, ist an die der Aufhebung zugrunde liegende rechtliche Beurteilung gebunden.

§ 67. Hat der Angeklagte die Berufung allein eingelegt, so darf die Entscheidung des Standesgerichts im Berufungsverfahren nicht zu Ungunsten des Angeklagten abgeändert werden.

e) Beschwerde.

§ 68. (1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes vorschreibt, gelten für die Beschwerde die Vorschriften in §§ 304 bis 310 der Strafprozeßordnung entsprechend mit der Maßgabe, daß die Weitergabe der Beschwerde nach § 306 Abf. 2 an keine Frist gebunden ist.

(2) Zuständig zur Entscheidung ist, falls der Beschwerde von der angefochtenen Stelle nicht abgeholfen wird, a) das Standesgericht, wenn sich die Beschwerde gegen Anordnungen des Vorsitzenden, eines beauftragten Mitgliedes oder des Untersuchungsführers richtet, b) der Standesgerichtshof, wenn sich die Beschwerde gegen Beschlüsse des Standesgerichts richtet.

(3) Die Beschwerdefrist beträgt im Falle des Abf. 2 zu a eine Woche, im Falle des Abf. 2 zu b zwei Wochen und beginnt mit der Bekanntgabe der angefochtenen Maßnahme.

(4) Der § 62 Abf. 1, 3 gilt entsprechend.

(5) Gegen Beschlüsse des Standesgerichtshofs ist kein Rechtsmittel gegeben. Gegen Anordnungen seines Vorsitzenden ist der Antrag auf Beschlüßfassung des Standesgerichtshofes zulässig.

f) Wiederaufnahmeverfahren.

§ 69. (1) Ein durch rechtskräftige Entscheidung abgeschlossenes standesgerichtliches Verfahren kann zugunsten oder zuungunsten des Verurteilten unter sinnemäßer Anwendung der Bestimmungen der Strafprozeßordnung wiederaufgenommen werden.

(2) Ein dahingehender Antrag, der auf die Behauptung einer strafbaren Handlung gegründet werden soll, ist nur dann zulässig, wenn wegen dieser Handlung eine rechtskräftige Verurteilung ergangen ist oder die Durchführung eines Strafverfahrens aus anderen Gründen als wegen Mangels an Beweisen nicht erfolgen kann.

(3) Eine Wiederaufnahme des Verfahrens ist ausgeschlossen, wenn sich der Antrag nur auf eine Änderung des Strafmaßes oder der Kostenentscheidung richtet.

(4) § 359 Nr. 4 der Strafprozeßordnung gilt mit der Maßgabe, daß die Vorschrift allgemein auf gerichtliche Urteile Anwendung findet, und daß eine Wiederaufnahme auch dann zulässig ist, wenn das gerichtliche Urteil zwar nicht aufgehoben, aber eine der übrigen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme vorliegt.

§ 70. (1) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ist schrift-

lich bei dem Standesgericht zu stellen. Hierbei sind der gesetzliche Grund der Wiederaufnahme sowie die Beweismittel anzugeben.

(2) Über die Zulassung des Antrages beschließt — soweit erforderlich, nach Erhebung der angebotenen Beweise — das Standesgericht, dessen Urteil angefochten werden soll oder das im ersten Rechtszuge entschieden hat, wenn ein Urteil des Standesgerichtshofes vorliegt. An die Stelle des Standesgerichts tritt der Standesgerichtshof, wenn dessen Urteil auf Grund des § 359 Nr. 3 oder des § 362 Nr. 3 der Strafprozeßordnung angefochten wird. Gegen den Beschluß des Standesgerichts ist Beschwerde (§ 68) an den Standesgerichtshof zulässig.

(3) Der Antrag ist nach Anhörung des Vertreters der Anklage als unbegründet zu verwerfen, wenn die darin aufgestellten Behauptungen keine genügende Bestätigung gefunden haben oder wenn in den Fällen des § 359 Nr. 1, 2 oder des § 362 Nr. 1, 2 der Strafprozeßordnung die Annahme ausgeschlossen ist, daß die in diesen Vorschriften bezeichnete Handlung auf die Entscheidung Einfluß gehabt hat. Abf. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Andernfalls ordnet das Standesgericht oder der Standesgerichtshof die Wiederaufnahme des Verfahrens und die Wiederholung der Hauptverhandlung an.

(5) Gegen die im Wiederaufnahmeverfahren ergehende Entscheidung ist die Berufung an den Standesgerichtshof nach den Vorschriften für das erste Verfahren zulässig.

5. Kosten.

§ 71. (1) Für das Vermittlungsverfahren und das standesgerichtliche Verfahren werden, abgesehen von der Gebühr nach Abf. 7, nur bare Auslagen in Ansatz gebracht.

(2) Die Auslagen werden von dem Vorsitzenden des Standesgerichts nach Abschluß des Vermittlungsverfahrens oder nach Rechtskraft der Entscheidung festgesetzt. Die Festsetzung ist vollstreckbar.

(3) Im Vermittlungsverfahren bestimmt das Standesgericht oder das beauftragte Mitglied endgültig, wie die Auslagen von den Beteiligten aufzubringen sind. Schließt sich dem Vermittlungsverfahren ein standesgerichtliches Verfahren an, so rechnen die Kosten des Vermittlungsverfahrens zu den Kosten des standesgerichtlichen Verfahrens.

(4) Im standesgerichtlichen Verfahren hat der Angeklagte die Auslagen zu tragen, wenn er zu Strafe verurteilt wird. Mehrere in einem Verfahren gleichzeitig Verurteilte haften als Gesamtschuldner.

(5) Über die Pflicht, die Auslagen zu tragen, wird gleichzeitig mit der Entscheidung in der Hauptsache erkannt.

(6) Wird ein Angeklagter nur in Ansehung eines Teiles der ihm zur Last gelegten standeswidrigen Handlungen verurteilt, so dürfen ihm besondere Auslagen, die durch die Untersuchung der übrigen Angeklagten entstehen, nicht auferlegt werden, es sei denn, daß er sie schuldhaft verursacht hat.

(7) Für das Berufungsverfahren kann dem Angeklagten neben den Auslagen eine Gebühr auferlegt werden, wenn er die Berufung eingelegt und sie keinen oder nur teilweise einen Erfolg gehabt hat. Die Höhe der Gebühr wird nach der Bedeutung des Falles vom Standesgerichtshof mit der Entscheidung in der Hauptsache festgesetzt. Sie darf dreihundert Reichsmark nicht übersteigen. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung für den Standesgerichtshof (§ 34 Abf. 5, § 36 Abf. 6).

(8) Im Wiederaufnahmeverfahren hat der Angeklagte die Auslagen zu tragen, wenn er die Wiederaufnahme beantragt hat und die erste Entscheidung nicht zu seinen Gunsten abgeändert wird. Hat der Vertreter der Anklage die Wiederaufnahme beantragt, so hat der Angeklagte die Auslagen nur dann zu tragen, wenn die erste Entscheidung zu seinen Ungunsten abgeändert wird.

(9) Ist ein standesgerichtliches Verfahren durch eine wider besseres Wissen gemachte oder auf grober Fahrlässigkeit beruhende Anzeige veranlaßt worden, so kann das Standesgericht dem Anzeigenden, nachdem er gehört worden ist, die im Verfahren erwachsenden Auslagen auferlegen. Gegen den Beschluß des Standesgerichts hierüber findet die Beschwerde (§ 68) an den Standesgerichtshof statt.

(10) Stirbt der Angeklagte oder im Falle des Abf. 9 der Anzeigende vor eingetretener Rechtskraft der Entscheidung, so haftet sein Nachlaß nicht für die Auslagen.

(11) Soweit hiernach die Auslagen nicht eingezogen werden können, fallen sie für das Standesgericht der Tierärztekammer, für den Standesgerichtshof dem Tierärztekammerausschuß zur Last. Diese haften den Zeugen und Sachverständigen für die ihnen zukommende Entschädigung

in gleichem Umfange wie in Straffachen die Staatskasse; der geladenen Person ist bei weiter Entfernung ihres Aufenthaltsortes auf Verlangen ein Vorschuß von der Tierärztekammer oder dem Tierärztekammerausschuß auf Anweisung des Vorsitzenden des Standesgerichts oder des Standesgerichtshofes zu zahlen.

(12) Wird der Beschuldigte freigesprochen oder das Verfahren eingestellt, so können die dem Beschuldigten erwachsenen notwendigen Auslagen der Tierärztekammer auferlegt werden. Hierüber und über den Umfang der Erstattungspflicht entscheidet das Standesgericht, im Berufungsverfahren der Standesgerichtshof endgültig.

6. Vollstreckung und Begnadigung.

§ 72. (1) Die Entscheidungen im standesgerichtlichen Verfahren sind erst nach erlangter Rechtskraft vollstreckbar.

(2) Warnungen, Verweise und Entziehung des Wahlrechts gelten mit der Rechtskraft der Entscheidung als vollstreckt, durch die sie ausgesprochen sind.

(3) Die Beitreibung der im standesgerichtlichen Verfahren rechtskräftig erkannten Geldstrafen sowie der nach § 71 festgesetzten Auslagen und Gebühren erfolgt auf Grund beglaubigter Abschriften der Entscheidungsformel und der Kostenfestsetzungsverfügung, die von dem Vorsitzenden des Standesgerichts mit der Bescheinigung der Vollstreckbarkeit zu versehen sind. Strafen, Auslagen und Gebühren fließen in die Kasse der Tierärztekammer.

§ 73. Das Staatsministerium kann rechtskräftig verhängte Strafen im Gnadenwege mildern oder erlassen.

III. Aufbringung der Mittel.

1. Tierärztekammern.

§ 74. (1) Die Kosten der Tierärztekammer, einschließlich der Kosten des Standesgerichts, werden, soweit sie nicht durch andere Einnahmen Deckung finden, durch Beiträge der Tierärzte aufgebracht, die nach § 5 wahlberechtigt sind. Durch die standesgerichtliche Entziehung des Wahlrechts nach § 4 Abs. 1 zu d wird die Beitragspflicht nicht berührt. Der Kostenanteil der außerpreussischen Tierärzte im Falle des § 2 Abs. 3 Satz 2. wird nach Vereinbarung festgesetzt; er kann in einer Pauschsumme bestehen.

(2) Befreit von der Beitragspflicht sind Tierärzte, die weder eine tierärztliche Praxis noch eine andere auf der tierärztlichen Wissenschaft beruhende gewinnbringende Tätigkeit ausüben, sofern sie der Tierärztekammer eine entsprechende schriftliche Erklärung abgeben. Die Befreiung tritt mit Ablauf des Monats ein, in dem die Erklärung bei der Tierärztekammer eingeht. Die bis dahin fällig gewordenen Beiträge sind in voller Höhe zu entrichten.

(3) Wird die Erklärung vom Vorstande der Tierärztekammer beanstandet, so sind dem Tierarzt die Gründe schriftlich mitzuteilen.

(4) Tierärzte, die der abgegebenen Erklärung zuwiderhandeln oder es unterlassen, die Wiederaufnahme einer die Beitragspflicht begründenden Beschäftigung der Tierärztekammer binnen vier Wochen anzuzeigen, haben die hinterzogenen Beiträge nachzuzahlen, auf Beschluß des Vorstandes der Tierärztekammer auch eine Strafe bis zum Zehnfachen des hinterzogenen Betrages zu entrichten. Der Vorstand kann in solchem Falle außerdem einem Tierarzt den Anspruch auf Befreiung von der Beitragspflicht für die Zukunft vorübergehend oder dauernd entziehen.

(5) Auf Beschwerde in den Fällen von Abs. 3, 4 entscheidet die Aufsichtsbehörde endgültig.

(6) Vor der Beschlußfassung und der Entscheidung nach Abs. 3 bis 5 ist der Tierarzt zu hören.

(7) Als Tätigkeit, die einer Befreiung nach Abs. 2 entgegensteht, gilt nicht tierärztliche Hilfeleistung in Notfällen oder gelegentliche schriftstellerische Beschäftigung.

(8) Die Aufsichtsbehörde kann zur Feststellung der Ab- und Zugänge unter den Tierärzten eine Meldepflicht vorschreiben und deren Verletzung mit Ordnungsstrafen bis zu 150 RM. ahnden.

§ 75. (1) Die Beiträge zu den Kosten a) der Verwaltung, einschließlich der Beiträge zu den allgemeinen Kosten des Tierärztekammerausschusses, b) der Standesgerichtsbarkeit sind getrennt festzusetzen, zu b) unter Berücksichtigung der nach § 71 aufkommenden Einnahmen.

(2) Zu den Kosten unter a, zu denen auch Unterstützungen für Tierärzte und deren Hinterbliebene in besonderen Fällen aus den dafür im Haushalte vorgesehenen Mitteln rechnen, tragen alle beitragspflichtigen Tierärzte (§ 74 Abs. 1) gleichmäßig bei. Die Tierärztekammer kann beim Vorliegen besonderer Verhältnisse für einen Teil der Tierärzte

Ermäßigungen nach gleichmäßig abgestuften Sätzen beschließen. Die Aufsichtsbehörde kann die Mittel zu Unterstützungen auf einen bestimmten Hundertsatz der Beiträge begrenzen.

(3) Von der Beitragsleistung zu den Kosten unter b) sind die der Standesgerichtsbarkeit nicht unterworfenen Tierärzte befreit. Im übrigen gilt Abs. 2 sinngemäß.

§ 76. (1) Die Tierärztekammer beschließt alljährlich über die Höhe der Beiträge nach §§ 74, 75.

(2) Der Beschluß bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§ 77. (1) Gegen die Veranlagung zu den Beiträgen ist innerhalb zweier Wochen nach der Zahlungsaufforderung Einspruch bei dem Vorstande der Tierärztekammer zulässig, der darüber beschließt. Gegen den Beschluß findet innerhalb zweier Wochen nach der Zustellung Beschwerde an die Aufsichtsbehörde statt, die endgültig entscheidet.

(2) Über die Niederichlagung von Beiträgen beschließt der Vorstand der Tierärztekammer.

§ 78. (1) Die Einziehung der Beiträge erfolgt durch die Kasse der Tierärztekammer.

(2) Ihr Kassen- und Rechnungswesen ordnet die Tierärztekammer selbständig nach Grundfätzen, die der Minister aufstellt.

(3) Die Aufsichtsbehörde ist befugt, Kassenprüfungen vorzunehmen und die Beseitigung vorgefundener Mängel anzuordnen.

§ 79. Für die Benutzung besonderer Einrichtungen kann die Tierärztekammer Gebühren erheben.

§ 80. (1) Rückständige Beiträge und Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren. Dasselbe gilt von den Geldstrafen und Kosten nach § 71, § 74 Abs. 4.

(2) Als Vollstreckungsbehörde im Sinne der Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren gilt die Ortspolizeibehörde, die auf Erfuchen der Kasse der Tierärztekammer die Vollstreckung zu bewirken hat.

2. Tierärztekammerausschuß.

§ 81. (1) Die Kosten des Tierärztekammerausschusses werden, soweit sie nicht durch andere Einnahmen Deckung finden, auf die Tierärztekammern nach dem Verhältnis der Gesamtzahl der zu jeder Kammer beitragspflichtigen Tierärzte umgelegt.

(2) Die Kosten des Standesgerichtshofes sind besonders nach dem Verhältnis der Gesamtzahl derjenigen Tierärzte umzulegen, die in den einzelnen Kammerbezirken der Standesgerichtsbarkeit unterworfen sind.

(3) Die Erhebung von Beiträgen zu besonderen Fürorgeeinrichtungen (§ 17 Abs. 2) regelt sich nach der Satzung. Dabei sind Tierärzte, die nach Vorschriften des Reichs, der Länder, Gemeinden oder sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts einen Anspruch oder eine Anwartschaft auf eine Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgung haben, auf Antrag von der Beitragsleistung zu befreien. Der Tierärztekammerausschuß soll auch andere Tierärzte, die nachweisen, daß ihre Versorgung gesichert ist, von der Beitragsleistung befreien. Auf Beschwerde gegen die Ablehnung einer Befreiung entscheidet die Aufsichtsbehörde endgültig. Die befreiten Tierärzte nehmen an den Fürorgeeinrichtungen nicht teil. Eine Erstattung gezahlter Beiträge findet nicht statt.

(4) Für die Verteilung nach Abs. 1, 2 sind die Hebelisten der Tierärztekammern für das vorangegangene Rechnungsjahr maßgebend. Die Tierärztekammern haben die Zahlen nach Abs. 1, 2 alljährlich bis zum 31. Oktober dem Tierärztekammerausschuß mitzuteilen, der sie an der Hand der Hebelisten nachprüfen lassen kann.

§ 82. (1) Der Tierärztekammerausschuß setzt die Höhe der Umlage und deren Verteilung auf die einzelnen Tierärztekammern alljährlich fest. Gegen den Beschluß steht jeder Tierärztekammer die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde offen, die endgültig entscheidet. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

(2) Die Tierärztekammern haben die ausgeschriebenen Beträge binnen vier Wochen nach der Aufforderung an den Tierärztekammerausschuß abzuführen.

(3) § 76 Abs. 2, §§ 78 bis 80 gelten entsprechend.

3. Haushaltsplan.

§ 83. (1) Die Tierärztekammer stellt jährlich über die Einnahmen und Ausgaben einen Haushaltsplan auf, der der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist. Alle Einnahmen und Ausgaben sind auf den Haushaltsplan zu bringen. Überschreitungen der Ausgabenansätze sowie außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der nachträglichen Genehmigung der Kammer.

(2) Das gleiche gilt für den Tierärztekammerauschuß.

§ 84. (1) Wird von einer Kammer die Ausführung gültiger Anordnungen oder die Erfüllung rechtsgültig festgestellter Leistungen unterlassen oder werden Beschlüsse, deren Unzulässigkeit rechtsgültig festgestellt ist, ausgeführt, so kann die Aufsichtsbehörde an Stelle der Kammer die erforderlichen Maßnahmen auf deren Kosten treffen, insbesondere die nötigen Ausgaben in den Haushaltsplan einstellen.

(2) Gegen die rechtliche Zulässigkeit der Maßnahmen steht der Kammer die Klage im Verwaltungsstreitverfahren (§ 87) zu. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung.

IV. Schluß- und Übergangsvorschriften.

§ 85. Bestehen in der Verwaltung einer Kammer so erhebliche Mängel, daß der ordnungsmäßige Geschäftsgang dadurch gefährdet erscheint, so kann die Aufsichtsbehörde, wenn ihren Anordnungen zur Abstellung der Mängel nicht entsprochen wird, die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten der Kammer treffen. Gegen die Anordnungen und die getroffenen Maßnahmen steht der Kammer binnen zweier Wochen die Klage im Verwaltungsstreitverfahren (§ 87) zu. Die Klage kann nur darauf gestützt werden, daß die Anordnungen das bestehende Recht verletzen oder daß die tatsächlichen Voraussetzungen, die zu den Anordnungen berechtigen würden, nicht vorhanden sind.

§ 86. (1) Aufsichtsbehörde im Sinne dieses Gesetzes ist für die Tierärztekammer und das Landesgericht der Oberpräsident, in dessen Bezirk die Tierärztekammer ihren Sitz hat, für den Tierärztekammerauschuß und den Landesgerichtshof der Minister.

(2) Minister im Sinne dieses Gesetzes ist der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

§ 87. Für das Verwaltungsstreitverfahren ist der Bezirksauschuß desjenigen Bezirks, in dem die Kammer ihren Sitz hat, zuständig.

§ 88. Die Rechte und Verbindlichkeiten der bisherigen Tierärztekammern gehen auf die neuen Tierärztekammern, die Rechte und Verbindlichkeiten des bisherigen Tierärztekammerauschusses gehen auf den Tierärztekammerauschuß über.

§ 89. Auf die Veterinäroffiziere, Unterveterinäre und Veterinär-offizieranwärter der Wehrmacht findet dieses Gesetz keine Anwendung.

§ 90. (1) Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft. Zu demselben Zeitpunkt tritt die Verordnung über die Errichtung einer Landesvertretung der Tierärzte vom 2. April 1911 (Gesetzsamml. S. 61) außer Kraft.

(2) Bis zum Zusammentritt der neuen Tierärztekammern und des Tierärztekammerauschusses führen die bisherigen Tierärztekammern und der bisherige Tierärztekammerauschuß die Geschäfte in dem bisherigen Umfange weiter. Die Vorstände dieser Kammern und des Ausschusses oder deren Vorsitzende nehmen auch bei den ersten Wahlen und bei der Einberufung der neuen Kammern die Obliegenheiten wahr, die in diesem Gesetz, der Wahlordnung und den Ausführungsbestimmungen den Kammervorständen oder deren Vorsitzenden übertragen werden.

(3) Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen erläßt der Minister.

Das vorstehende, vom Landtag beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet. Die verfassungsmäßigen Rechte des Staatsrats sind gewahrt.

Berlin, den 13. April 1928.

(Siegel.) **Das Preussische Staatsministerium.**
Braun. Steiger.

Tierärztliche Sterbeunterstützungskasse im Freistaat Sachsen.

Sitz: Dresden-Weißer Hirsch, Luboldtstraße 24.

23. April 1928 in Dresden.

Von der Einführung einer Karenzzeit wird Abstand genommen. Dagegen soll erwogen werden, das Eintrittsgeld für diejenigen Herren zu erhöhen, welche erst in einem höheren Lebensalter den Beitritt vollziehen, obwohl sie mehrmals zum Beitritt aufgefordert worden sind. 9 Abgängen durch Tod, 3 durch freiwilligen Austritt und einem Ausfluß standen 19 Neuaufnahmen gegenüber, so daß der Mitgliederbestand am 22. April 1928 sich auf 224 beläuft. Einnahmen: Bestand am 4. April 1927: 3 169,29 Mk., Einnahmen vom 4. April 1927 bis 22. April 1928 an Beiträgen durch Umlagen, Zinsen, Rückständen und Portoersatz: 14 052,42 Mk., Überweisung durch Landständische Bank: 58,25 Mk. Summa 17 279,96 Mk. Ausgaben: in der Zeit vom 4. April 1927 bis 22. April 1928. Sterbegelder in 9 Fällen: 9 000,— Mk., Unkosten für Kassenbuch, Druckfachen, Papier, Porto

und Mitgliederwerbung: 227,41 Mk. Summa 9 227,41 Mk. Gesamteinnahmen: 17 279,96 Mk., Gesamtausgaben: 9 227,41 Mk. Beftand am 22. April 1928: 8 052,55 Mk. Dieser Beftand verteilt sich mit: 3 047,— Mk. auf Girokonto, 5,55 Mk. auf Postcheckkonto, 5 000,— Mk. auf Sparkassenbuch lt. § 3 der Satzung als Reservefonds. Summa 8 052,55 Mk. In den auf Girokonto befindlichen 3 047,— Mk. find die lt. § 3 bereit zu haltenden Mittel für zwei Sterbefälle mit zusammen 2 000,— Mk. einbegriffen. Sämtliche Überflüsse werden dem Reservefonds satzungsgemäß zugeführt, desgleichen Zinsen und Eintrittsgelder. Die Generalversammlung wählte auf Vorschlag des Vors. die Generaloberveterinäre a. D. Dr. Fischer in Dresden und Rehm ebendort zu Rechnungsprüfern für die nächsten zwei Jahre. Zur Deckung der vermehrten Verwaltungskosten wird die Erhebung einer Umlage von 1,50 Mk. für jedes Mitglied bei der ersten Umlage des Geschäftsjahres beschlossen. Es wurde eine rege Werbetätigkeit im Interesse der Vermehrung des Mitgliederbestandes durchgeführt und ca. 150 sächsischen Tierärzten eine Werbeschrift zugestellt. Diese Werbung wird wiederholt werden.

Dr. Jänicke, Vors. Kuhlisch, Schrift- u. Kassenwart.

Verschiedene Mitteilungen.

Auschuß für internationale tierärztliche Kongresse.

Am 14. Mai wird in Paris nach 15jähriger Pause der Ständige Auschuß für tierärztliche Kongresse tagen. Zur Teilnahme an den Sitzungen ist als deutscher Vertreter Prof. Dr. Stang-Berlin eingeladen. Der Auschuß wird sich zunächst durch Zuwahl verschiedener Mitglieder ergänzen, danach über Ort und Zeit des nächsten Kongresses schlüssig werden. Bekanntlich sollte der letzte internationale tierärztliche Kongreß im August 1914 in London stattfinden. Er mußte durch den Ausbruch des Krieges im letzten Moment abgefragt werden. D.V.R.

Gebühr für die bakteriologische Fleischuntersuchung.

Nr. V 3336 M. f. L., Nr. I. M. II. 1498 M. f. V.

Den bei der bakteriologischen Fleischuntersuchung entstehenden tatsächlichen Aufwendungen Rechnung tragend, genehmigen wir unter Aufhebung der in Ziffer 9 des Erlasses vom 24. Dezember 1926 — V 12023 M. f. L. und I. M. II. 4296/26 M. f. V. — getroffenen Bestimmung, daß für die gemäß dem o. a. Erlass auszuführende bakteriologische Fleischuntersuchung eine Gebühr bis zu 7,50 RM. erhoben wird.

Prüfungsordnung für Tierzuchtbeamte in Thüringen.

Das Thüringische Volksbildungsministerium hat eine neue Prüfungsordnung für Tierzuchtbeamte erlassen, die in enger Anlehnung an die preußischen Bestimmungen die Ablegung einer staatlichen Prüfung an der Universität Jena vorschreibt. Zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses wurde der Regierungs- und Vortragende Rat Dr. Koch ernannt.

5. wissenschaftlicher Referierabend an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Montag, den 7. Mai 1928, 20,15 Uhr, im Hörsaal des Pathol. Institutes. Prof. Dr. Lund: „Über Leukämie und verwandte Zustände bei Haustieren.“

Personal-Nachrichten.

Ernannt: die Tierzuchtassessoren Dr. G. Hofmann in Gunzenhausen, Dr. A. Christl in Traunstein, Dr. J. Reuß in Coburg, Dr. J. Weiß in Passau und die Pferdezuchtinspektoren Dr. G. Dürschinger in Landshut, Dr. G. Schott in Kempten, Dr. Fr. Hetzel in Würzburg zu Landwirtschaftsräten; Tierarzt Heinrich Rottmann zum städt. Hilfstierarzt am Schlachthof in Breslau; Tierarzt Schmidt in Stuhl (Bez. Westpr.) zum Veterinärat unter Übertragung der dortigen Veterinärstelle; Dr. Otto Frühwald zum Schlachthofdirektor in Stolp i. Pommern.

Verstorben: Tierarzt Fritz Randhahn aus Swarzedz.

Schriftleiter: Professor Dr. Miesner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.


Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Dem gouch die pfin besehen.

So nun ein gouch kein gouch will sin

So seht man im pns mul hnen

Die man bricht die pfin dem schwen.



Aus Thomas Murner, Gauchmatt 1419.

mit onkosphärenhaltiger Jauche begossen waren, durch verunreinigtes Trinkwasser, durch Nahrungsmittel, die durch Fliegen mit Onkosphären besät worden sind. Häufig infizieren sich die Träger der T. solium selbst durch Unsauberkeit bei der Defäkation. Selten ist die Selbstinfektion durch Rücktritt reifer Proglottiden aus dem Darm in den Magen beim Brechakt. — Der Cysticercus beim Menschen ist seit 1558 bekannt (Rumler, Obs. med. LIII S. 32). Am häufigsten ist er beobachtet worden im Hirn, dann im Auge, in der quergestreiften Muskulatur, im Herzen, im Unterhautzellgewebe, in der Leber, in der Lunge, in der Abdominalhöhle, im Rückenmark, in der Zunge, und in der Brustdrüse. Zu Rudolphs Zeiten fand man in Berlin bei 2 Prozent der zerlegten Leichen Zysticerken, in den 60er Jahren (nach Virchow) etwa ebensoviel, 1875 sank die Zahl auf 1,6 Prozent, 1881 auf 0,5 Prozent, 1882 auf 0,26 Prozent, 1898 auf 0,2 Prozent, 1900 auf 1,15 Prozent. Im Kriege und in der Nachkriegszeit hat die Zystizerkose etwas zugenommen. Über Finnenfunde im Auge siehe Hirschberg, Berliner Klin. Wochenschr., XLI, S. 661, v. Herrenschwand, Wiener Klin. Wochenschr. XXIX, S. 1332, Uthoff, Klin. Wochenschr. für Augenheilk. LXIV, S. 180. (Fortsetzung folgt.) Reinhard Froehner.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Rieck, Berlin-Cöpenick, Kirchstraße 4. Verlag von M. & H. Schaper Hannover. — Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Veterinärhistorische Mitteilungen

Herausgegeben von der

Gesellschaft für Geschichte und Literatur der Veterinärmedizin

Schriftleiter:

Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

Zwanglos erscheinende Beilage zur Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift

Verlag von M. & H. Schaper in Hannover

Sonderbezugspreis 1,50 Goldmark das Jahr, freibleibend

Nr. 4.

1928.

8. Jahrgang.

Bücherbesprechungen.

Die Finnigkeit des Schweinefleisches in historischer Beleuchtung. Von G. A. Gach (Inaug.-Diss. Leipzig, vet.-med. Fak. 1925).

Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Geschichte der Schweinefinne und der Taenia solium, Sprachliches über Finne und Taenia solium, die vermeintlichen Ursachen der Finnigkeit, die Erkennung der Finnigkeit, Untersuchung und Beurteilung des finnigen Schweinefleisches, therapeutische Versuche, hygienische Bedeutung, wirtschaftliche Bedeutung, Zusammenfassung, Literaturangaben.

Anstatt den Inhalt der einzelnen Kapitel zu exzerpieren, verweise ich auf das Original und bringe einiges neue Material, das ich bei meinen fleischbeschau-geschichtlichen Studien gesammelt habe.

Sprachliches. Außer den von Gach aufgeführten Formen des Wortes Finne und finnig kommen noch folgende vor: pfynnig und pfynig, der pfynig bandk: Schlietstädter Fleischerid von 1498, Oberthein. Stadtrechte III, Heft 1, S. 561. Die ältesten Statuten der Stad Regensburg von 1320 in v. Freyberg, Samml. histor. Schriften u. Urkunden, V. (1836) S. 9. pfynnyg: Egerer Zunftordnung v. ca. 1440 in Siegl, Egerer Zunftordn., Prag 1909, S. 94. phinig: Gerechtigkeit und Bannaiting des Stiftes Heiligenkreuz zu Pfaffstetten a. d. 17. Jahrh. in Niederösterreich. Weistümer I. (1886), S. 536. pfinig: Bann- und Bergaiting zu Percholdsdorf a. d. 18. Jahrh. Dasselbst I. S. 602. fynnyg: Altestes Landbuch von Obwalden v. 1382, Zeitschr. für Schweizerisches Recht VIII. (1860), Rechtsquellen S. 85. phinneth: Würzburg 14. Jahrh. in Jakob Morgenroth, die Entw. d. Metzgerhandw. in Würzb. 1925, S. 8. vynnich: Knochenhauerordnung v. Lübeck v. 1385 in C. Wehrmann, die ältesten Lübschen Zunftrollen, Lübeck 1872, S. 263. Danziger Willkühr a. d. 15. Jahrh. in P. Gehrke, Das Danziger Fleischer-gewerk in seiner geschichtl. Entwicklung, Danzig 1895, S. 19. findig und findt, findbandk: Metzgerordnung f. Eppingen v. 1566 Ziffer 4, in Ober-rhein. Stadtrechte I, Heft 6, S. 827. finnecht: Heingerecht der metzler zu Miltenberg v. 1379, daselbst I, Heft 4, S. 368. phening(s fleisch): Rechte Veits v. Ebersdorf f. Nußdorf u. Heiligenstadt a. d. 15. Jahrh. in Niederösterreich. I. (1886), S. 922. phinnacht: Rechte zu Mistelbach v. 1414, daselbst IV. (1913), S. 224. pfing(s fleisch): Rügung der drei freien Eigen zu Neu-markt, Engsbach und Karlsbad v. 1569, daselbst III. S. 647. phinneis (fleisch): Bannaiting des Klosters Lilienfeld a. d. 15. Jahrh., daselbst III. S. 301. hairnik (op der tungen): Wesel, Plebiszitbuch v. 1454 in Hubert Foerster,

die Lebensmittelpolitik der Stadt Wesel im Mittelalter, Heft 3 d. Studien und Quellen z. Gesch. v. Wesel, Wesel 1912, S. 44. *Pfinde* (pfindenfleisch): Ordnung des Bischofs Ludwig von Speier v. 1500 für die Metzler in Bruchsal, in Ober-rheinische Stadtrechte I, Heft 7, S. 885. *phinn*: Der gemeinschaft zu kaltarstatut und recht, Jahr unbekannt, in Tirolische Weistümer 4. Teil (1891), S. 301. *fynte, finte*: Metzgerordnung f. Frankfurt a. M. v. 1355 in Veröffentlichungen der Histor. Kommission f. d. Stadt Frankfurt a. M., Frankfurt a. M. 1914, S. 349, 369, 378. *granze, gränze*, verstümmelt aus *grandines*, schlesisch-mundartlich in Kaspar Scherckfeld, *Striptum et fossilium Silesiae catalogus*, Leipzig 1600; *Popowitsch*, Versuch einer Vereinigung der Mundarten in Deutschland, Wien 1780. — Die *Taenia solium* Linné 1767 führt noch folgende andere Bezeichnungen *T. cucurbitina* Pallas 1771, *T. pellucida* Goetze 1782, *T. vulgaris* Werner 1782, *T. dentata* Gmelin 1790, *Halysis solium* Zeder 1800, *T. humana armata* Brea 1802, *T. oder Cystotaenia solium* Leuckart 1862. *Solium* bedeutet nach Arnoldus de Villanova soviel wie *cingulum* = Gürtel, Kette. *N. Antry* 1700 leitet *solium* von *solus* allein ab. *Leuckart* und *Krehl* führen *solium* auf syrisch *schusl* = Kette zurück. In der *Mulomedicina Chironis* (71, 21) heißen die *Taeniae tunalei*.

Ursachen der Finnickigkeit: Petrus de Crescentiis sagt in *New Felder- und Ackerbau* . . . XV Bücher, Straßburg 1602, S. 120: Die Säw werden gern finnick . . . darum, daß sie zuviel frässig sein und wüste und unfrächtig fressen. Nach v. Hochberg, *Georgica curiosa* oder Adliches Land- und Feldleben, Nürnberg 1682, S. 312, sind Ursache der Finnickigkeit: natürliche Unsauberkeit, feuchte, faule Streu. Eine interessante Vorahnung des biologischen Zusammenhangs zwischen menschlichen faeces und Schweinefinnen bietet folgende Stelle in: *Haushaltung in Vorwerken*, ein landw. Lehrbuch aus der Zeit des *Curfürsten August v. Sachsen*, herausg. von *Ermisch und Wutke*, Leipzig 1910, S. 86: Worvon die schweine finnickt werden. Wenn die fährmütter werfen, soll man sie und die ferkeln neun tage, nachdem sie geworfen im stalle innehalen: Denn wo das nicht gethicht und die ferkeln außlaufen und uber einen menschenkoch kommen und daruf die mutter saugen, so werden sie alsbald finnickt.

Vorbeuge: de Crescentiis a. a. O. empfiehlt, alle Tage den Stall zu reinigen, Vermeidung ausschließlicher Stallhaltung, öfteren Weidegang, Baden in See- oder Salzwasser, Lorbeeren gestoßen im Futter zu geben, Weintrausen mit Kleie und Sauerteig. v. Hochberg a. a. O. verordnet Purgieren mit Antimonium, Schwalbenwurz, Engelwurz, Schießpulver in Käsesuppe, Harn von einem Kraben, Lorbeer mit Seife, den Spiegel einer Pfäusenschwanzfeder, das Futter mit einem angekohlten Eichenknüppel umrühren, Eisen- und Bleistücke in den Trog legen.

Symptome: de Crescentiis a. a. O. nennt schwarze bletterlin auf der zungen; sie (die Schweine) mögen nicht auf die hintersten füße treten, die ausgeroßten borsten sind blutig an dem ende; knirschen mit den zähnen. v. Hochberg a. a. O.: allenthalben in dem Fleisch weiße, runde Körnlein, wie ein Coriander in der Größen; heisere, rauhe Stimme, Schwarze Blätterlein auf der Zunge. Der Rumpf ist vorn dick, hinten spitz. Knirschen mit den Zähnen, Borsten am Grunde gelbrotlich, blutig. Die Tiere können nicht auf die Hinterfüße treten.

Untersuchung, Erkennung. Colerus behauptet, wenn die

Händler die Schweine bei der Untersuchung auf den Schwanz treten, ziehen die Schweine die Finnen in sich hinein, so daß sie unsichtbar sind. Küchenmeister beschreibt in: *Quellenstudien über die Geschichte der Zerstoden in Deutsches Archiv für Gesch. d. Medizin und medizinischen Geographie* II (1879), S. 314 den Hergang bei der Untersuchung der Schweine auf Finnen, wie er sie selber 1879 gesehen hat. Die Fleischer nehmen einen etwa 50 cm langen, dem Vorarm am Handgelenk etwa an Dicke gleichenden Knüttel irgend welcher Art, wie er eben in der Nähe liegt, und lassen, indem sie das Schwein mit dem Hinterteil in die Ecke treiben, in der es sich nicht rühren und vor allem nicht retieren kann, dasselbe in den Knüttel beißen. Dabei wuchsen sie alsdann mit dem Knüttel (schräg) von unten nach oben und suchten, den Oberkiefer vom Unterkiefer abdrängend, dem Tiere den Mund zu öffnen, es gleichzeitig durch den zwischenliegenden Knüttel am Beißen hindernd. Dabei wird der offene Rachen sichtbar und besichtigungsfähig. Sie ziehen dann dem Schweine die Zunge aus dem Maule mit einem Tuche, besehen sich die Zunge von oben und, sie umdrehend, von unten, befühlen sie auch wohl schauen dem Tier, wenn sie wollen, etwas in den Rachen usw. de Crescentiis sagt, man pflege „in allen wohlbestellten staetten (Sträßen) ire (der Schweine) zungen zuvor besichtigen lassen und sie hinter den ohren beschawen, ehe man sie offentlich in die Mäztig oder sonsten auf dem Marktplätzen feil hat“. Bei Aelian, *Tiergeschichte*, IX. Buch, Kap. 28, liest man, daß das Fleisch des finnickigen Schweines süß sei, als anderes Fleisch, glaube man seit langer Zeit. — Besondere Schweinebeschauer gab es um die Mitte des 15. Jahrh. in Wesel. Sie hießen „der gemeyne vynnckeler“. Entdeckte ein Finnenbeschauer ein finnickes Schwein, so schnitt er ihm das halbe Ohr ab. War das Schwein hochgradig finnick, so mußte der Beschauer es auf Kosten der Stadt aufkaufen und vernichten. Hubert Foerster, die Lebensmittelpolitik der Stadt Wesel im Mittelalter, a. a. O. S. 14. In Schlettstadt ist der underkoffer der swin zugleich bescheer der swine. Er muß schwören, die swin uff das aller genowesse zu besehen und nyemans darin zu schonen . . . und was er pyrnig finder, den luten, die das berurt, zu sagen . . . Eidbuch I. 64, II. 135, III. 283, Schlettstädter Fleischereid v. 1498, Oberrheinische Stadtrechte Abt. 3, Heft 1, S. 561. In krokenhouwere ampte (sol) gesat werden, (daß sie) sollen alle jar ten hillingen sweren, dat se besenen unde vorwaren, dat in der scharnen to Osenbrugke nyn vlesch verkoft werde, dat wandelbar unde nicht geve en sy. Ratsordn. von Osnabrück v. 1472, Fr. Philipp, die ältesten Osnabrückschen Gildenkunden bis 1500. Osnabrück 1890, S. 49. In Dissenhofen gab es einen besonderen Aufseher, der „vber daz pfinnige fleisch gesetzet ist“. Bodolt hatte im 15. Jahrh. vynnckelkеры, die auf dem Viehmarkte amtierten. Alte Privilegien und Statuten der Stadt Bodolt aus einem Codex des 15. Jahrh. in Archiv für Gesch. und Altertumsk. Westphalens III. (1828), S. 21, Anm. Eine Abbildung von der Finnenchau beim Schwein aus alter Zeit habe ich nicht gefunden. Ich bringe aber hier das Bild aus Thomas Murners *gäudmat*, Basel 1419, von dem bei Gach S. 6, 7 die Rede ist, das zweifellos den Hergang beim Schwein nachahmt.

Über die Infektion des Menschen mit Zystizykerken gilt in der Humannmedizin abweichend von Gachs Angabe, daß die Onkosphären der *T. solium* hauptsächlich in dem Magen gelangen durch Gemüse, Salat usw., die

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zusendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Ausperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 19.

Ausgegeben am 12. Mai 1928.

36. Jahrgang.



Fünzig Jahre Veterinärinstitut (jetzt Tierseucheninstitut) der Universität Leipzig.

Von Prof. Dr. A. Eber, Institutsdirektor.

Am 1. April 1878 wurde vor dem Hospitaltore, an der jetzigen Johannis-Allee, in Leipzig die nach den Angaben Professor Zürn's, meines Amtsvorgängers, erbaute Veterinärklinik eröffnet, die neben für die Klinik bestimmten Räumlichkeiten, dem Hörfaale und den Sammlungsräumen auch einen Sektionsraum und ein größeres Arbeitszimmer für wissenschaftliche Untersuchungen enthielt. Aus diesen einfachen Anfängen hat sich das Veterinär-

institut der Universität Leipzig entwickelt, das heute auf ein 50jähriges Bestehen zurückblicken kann.

Zürn war nicht der erste Lehrer der Veterinärwissenschaft an der Leipziger Universität. Sein Vorgänger war der emeritierte Professor der Tierheilkunde und russische Staatsrat Brauell, berühmt als einer der ersten Entdecker der Milzbrandstäbchen im Blute milzbrandkranker Tiere, ohne allerdings ihre Bedeutung als Erreger dieser Krankheit zu

erkennen, der im Wintersemester 1869/70 an die Universität Leipzig übersiedelte, um für die Studierenden des unter Blohmeyer's Leitung im Sommersemester 1869 gegründeten Landwirtschaftlichen Instituts Vorlesungen über topographische Anatomie des Pferdes, Physiologie und Hygiene der Haustiere zu halten. Der Tod setzte bereits im Wintersemester 1870/71 dem Wirken Brauells ein Ziel. Sein Nachfolger wurde der damals 37jährige außerordentliche Professor für Veterinärwissenschaft an der Universität Jena, Anton Zürn, der am 1. April 1872 dem an ihn ergangenen Rufe als planmäßiger außerordentlicher Professor in der philosophischen Fakultät der Universität Leipzig Folge leistete und bereits im Sommersemester desselben Jahres Vorlesungen über innere und äußere Krankheiten der Hausfaugetiere, über tierärztliche Geburtshilfe und über die


ift. Seinem Lieblingsfache, der Parasitenkunde blieb Zürn auch bis ans Ende seiner Laufbahn treu und entfaltete auf diesem Gebiete eine ungemein rege Forschertätigkeit, die seinen Namen in ganz Deutschland bekannt machten. Durch seine klassischen Untersuchungen auf parasitologischem Gebiete hat sich Zürn für alle Zeiten einen Ehrenplatz unter den Männern jener großen Forschungsperiode errungen, die in der Mitte der 50er Jahre mit den Untersuchungen Küchenmeister's und Leukart's einsetzte. Sein Lebenswerk auf diesem Gebiete war das 1872 zum ersten Male herausgegebene Buch „Die Schmarotzer in und auf dem Körper der Haustiere“, welches in seiner 1882 erschienenen zweiten Auflage das wichtigste Spezialwerk über Haustierparasiten in deutscher Sprache fast ein Menschenalter hindurch geblieben ist.

Im Anfang seiner Leipziger Tätigkeit standen Zürn nur die dürftig ausgestatteten Räume der zootomischen Sammlung des Prof. Carus im Paulinum, später im Landwirtschaftlichen Institute als Arbeitsräume zur



Prof. Anton Zürn

Direktor des Veterinärinstituts (jetzt Tierfeucheninstitut) der Universität Leipzig von 1872—1899.



Prof. Dr. A. Eber

Direktor des Tierfeucheninstituts der Universität Leipzig, seit 1899.

Entozoen der Haustiere hielt, an die sich weitere Vorlesungen über Anatomie und Physiologie der Haustiere, Gesundheitspflege und Beurteilungslehre des Pferdes angeschlossen. Zürn hat im Laufe der Jahre über die verschiedensten Fächer aus dem Gebiete der Veterinärmedizin, für die er Interesse bei seinen Hörern voraussetzen konnte, vorgetragen und zahlreiche populäre Schriften zur Einführung in die vorgetragenen Wissensgebiete veröffentlicht. Er war ein Meister der populären, anschaulichen und lebendigen, der Wissenschaft wie der Praxis in gleicher Weise gerecht werdender Darstellungsweise. Deshalb erfreute sich Zürn auch bei der großen Zahl seiner Hörer einer außerordentlichen Beliebtheit und dankbaren Verehrung.

Geboren 1835 zu Rudolstadt, studierte Zürn unter mancherlei Entbehrungen Tierarztwissenschaft in Dresden, praktizierte nach erlangter Approbation 12 Jahre lang als Tierarzt in Schlotheim in Thüringen und erhielt 1867 einen Ruf an die Universität Jena als Dozent für Tierheilkunde, Leiter der Tierklinik und Referent für tierärztliche Angelegenheiten im Großherzoglich Sächsischen Staatsministerium mit der Dienstbezeichnung eines Großherzoglich Sächsischen Medizinalassessors. Im Jahre 1871 wurde Zürn daselbst zum außerordentlichen Professor ernannt, nachdem ihn bereits zwei Jahre vorher die medizinische Fakultät der Universität Jena das Diplom eines Ehrendoktors überreicht hatte. Schon als praktischer Tierarzt in Schlotheim und späterhin als Dozent in Jena hatte er sich dem Studium der Parasiten des Menschen und der Tiere zugewandt. Aus der Schlotheimer Zeit stammt u. a. auch eine „Anleitung zur rationellen Fleischbeschau“, die im Jahre 1864 erschienen

Verfügung, bis endlich in der am 1. April 1878 eröffneten neuen Veterinärklinik zugleich auch eine bleibende Arbeitsstätte für wissenschaftliche Untersuchungen das „Veterinärinstitut“ entstand. Leider nötigte ihn ein schweres inneres Leiden, dessen Anfänge schon in die 80er Jahre zurückreichten, seine Forschungstätigkeit allmählich mehr und mehr zu Gunsten seiner Lehrtätigkeit einzuschränken, bis er im Frühjahr 1899 auch diese völlig einstellen und vom Lehramte zurücktreten mußte. 27 Jahre hat Zürn dem Lehrkörper der Universität Leipzig angehört. Nur 1½ Jahre der Ruhe und Erholung waren ihm vergönnt. Am 11. September 1900 starb er in Stadtsulza i. Th., ein aufrechter, gerader Mann, ein bedeutender Forscher, ein warmherziger Freund und Kollege. Was Zürn in der Vollkraft seiner Jahre für die tierärztliche Wissenschaft und für das Veterinärinstitut der Universität Leipzig geleistet hat wird ewig unvergessen sein!

Nach dem Abgange Zürns im Frühjahr 1899 wurde die Frage eines Neubaus und einer Neuorganisation des Veterinärinstituts und der Veterinärklinik dringend. Die alte Veterinärklinik mit den äußerst bescheidenen Arbeitsräumen des Veterinärinstituts war zu einer Zeit erbaut worden, als die Veterinärmedizin noch im Anfangsstadium ihrer neuzeitlichen Entwicklung stand und niemand die ungeheure Bedeutung voraussehen konnte, die einzelne Zweige für die Landwirtschaft gewinnen sollten. An die Stelle der einst im Vordergrund des Interesses stehenden, mit den einfachsten Hilfsmitteln arbeitenden Parasitenforschung war die mit subtilen Untersuchungsmethoden und z. T. recht komplizierten Apparaten arbeitende Bakterien-

und Serumforschung getreten. Sollte das Veterinärinstitut, wie einst in der parasitologischen Zeit, nunmehr, entsprechend den neuen Aufgaben, auch an der Lösung der schwierigen Probleme der Seuchenforschung erfolgreich mitzuwirken in der Lage sein, dann durfte man nicht zögern, den Institutsräumen im Rahmen des geplanten Neubaus die Ausdehnung und Ausstattung zu geben, die der hohe Stand der Seuchenforschung für ein solches Institut erforderte. Dank der verständnisvollen, nie erlahmenden Unterstützung und Förderung, die der Neubauplan bei dem damals an der Spitze des Kultusministerium stehenden Herrn Staatsminister Dr. v. Seydewitz fand, der wiederholt persönlich bei den Verhandlungen der Ständeverammlung das Wort ergriff, gelang es, in zähem Kampfe allmählich alle Hindernisse zu überwinden, die der Errichtung des Neubaus in dem gewünschten, für die Beteiligung an der Tierseuchenforschung unerläßlichen Ausmaße entgegenstanden. Im Frühjahr 1901 wurde der Neubau an der Linnéstraße begonnen und am 17. Januar 1903 der Benutzung übergeben. 25 Jahre hat dieses Gebäude der Tierseuchenforschung eine würdige Arbeitsstätte gewährt, und es zeugt von dem Weitblick und dem Verständnis, mit denen die Pläne von dem verantwortlichen Leiter des Neubaus Herrn Baurat Kösser entworfen und in Gemeinschaft mit Herrn Universitäts-Bauinspektor Mosch durchgeführt worden sind, daß auch heute noch die Arbeitsräume des Instituts den Vergleich mit den modernsten bakteriologischen Arbeitsstätten nicht zu scheuen brauchen.



Ehemaliges Veterinärinstitut der Univ. Leipzig an der Johannis-Allee.

Die mit dem Institutsneubau Hand in Hand gehende Neuorganisation gegenüber dem alten Institut an der Johannis-Allee ergab sich aus der dominierenden Stellung, die dem Veterinärinstitut als Tierseuchenforschungsinstitut den übrigen Teilen des Neubaus, insbesondere der Veterinärklinik gegenüber eingeräumt werden mußte. Für die Klinik wurden daher in dem Neubau nur so viel Stallräume vorgezogen, als zur Bereitstellung des für den Unterricht in der Beurteilungslehre und in der allgemeinen Krankheitslehre erforderlichen Demonstrationsmaterials, unbedingt notwendig war. Alle übrigen Räume des Neubaus aber — soweit sie nicht wie der Hörsaal und die Sammlungsräume dem Unterrichte dienten — standen der Tierseuchenforschung zur Verfügung und wurden, entsprechend der Bedeutung, welche die Erforschung tierischer Seuchen künftig im Arbeitsplane des Instituts einnehmen sollte, mit Mobiliar, Apparaten und Instrumenten auf das Beste ausgestattet.

Ein glücklicher Zufall hat es gefügt, daß das Veterinärinstitut sich sofort nach Fertigstellung des Neubaus aktiv an der Lösung zweier wichtiger Probleme aus dem Gebiete der Tuberkuloseforschung, die damals die medizinische wissenschaftliche Welt bewegten, beteiligen konnte, nämlich 1. an der Nachprüfung der bekannten Behauptung Robert Kochs, daß die menschliche Tuberkulose von der Rindertuberkulose verschieden sei und auf das Rind nicht übertragen werden könne und 2. an der Prüfung des v. Behring'schen Tuberkulose-Immunisierungsverfahrens und zahlreicher von andern Forschern empfohlener Tuberkulose-Schutzimpfverfahren zur Bekämpfung der Rindertuberkulose. Länger als

ein Jahrzehnt haben diese beiden Probleme im Mittelpunkt der Institutsarbeit gestanden. Die von Zeit zu Zeit veröffentlichten Ergebnisse haben zur Klärung dieser wichtigen Streitfragen das ihrige beigetragen.

Die Frage der Beziehungen zwischen Menschen und Rindertuberkulose, an deren Lösung sich Gelehrte aller Kulturstaaen beteiligt haben, ist heute so weit geklärt, daß die nahe Verwandtschaft zwischen Menschen- und Rindertuberkelbazillen von den meisten Forschern anerkannt, die Gefährlichkeit der Rindertuberkulose für den Menschen von niemanden mehr geleugnet wird. Strittig ist nur noch der Grad der Verwandtschaft der einzelnen Tuberkelbazillentypen, eine Streitfrage, deren restlose Klarstellung zwar nach wie vor ein hohes theoretisches, aber nur ein geringes praktisches Interesse besitzt. Das Veterinärinstitut ist auf Grund seiner eigenen Untersuchungen stets für die nahe Verwandtschaft beider Tuberkelbazil-

lontypen und für die Möglichkeit der Umwandlung des einen Typus in den andern eingetreten und hält auch heute noch an diesem Standpunkt fest. Es ist für den Institutsleiter eine besondere Genugtuung, daß in dem im Jahre 1923 veröffentlichten abschließenden Berichte¹⁾ über die letzte seit 1913 gemeinsam mit dem Reichsgesundheitsamte durchgeführte Versuchsreihe als Endergebnis der leider durch den Krieg vorzeitig abge-

brochenen Versuche die experimentelle Beeinflussung der bisher zur Trennung der Menschen- und Rindertuberkelbazillen benutzten biologischen Unterscheidungsmerkmale im Sinne einer allmählichen Näherung der beiden Säugetiertuberkelbazillontypen auch von dem Vertreter der Gegenseite, des Reichsgesundheitsamtes, anerkannt worden ist.

Im engen Zusammenhange mit der Frage der Gefährlichkeit der Rindertuberkulose für den Menschen stehen Untersuchungen, die seit Frühjahr 1905 im Veterinärinstitut unternommen worden sind, um ein Urteil darüber zu gewinnen, wie oft in der Milch und den Molkeerzeugnissen, die in einer Großstadt wie Leipzig zum Verkauf gelangen, virulente Tuberkelbazillen anzutreffen sind. Sie hatten das immerhin beachtliche Ergebnis,²⁾ daß von 210 in drei Rundgängen in halbjährigen Zwischenräumen von 70 Milchwählern entnommenen Milchproben 22 = 10,5 Prozent virulente Tuberkelbazillen enthielten. Von 150 Butterproben erwiesen sich 18 = 12 Prozent und von je 50 Proben Sahne und Quark 3 = 6 Prozent, bzw. 2 = 4 Prozent tuberkelbazillenhaltig. Im Gegensatz hierzu ergaben die gleichen in einer kleinen Stadt mit ländlichen Verhältnissen durchgeführten Untersuchungen,³⁾ daß sich die im eigenen kleinen Wirtschaftsbetriebe erzeugte Milch überhaupt nur ein einziges Mal während der fast zwei-

¹⁾ Beitr. zur Klinik der Tuberkulose 1923, Bd. 54, S. 1.

²⁾ Zeitschrift für Fleisch-Hyg. 1908, 18. Jahrg., S. 309.

³⁾ Zeitschrift für Fleisch-Hyg. 1912, 22. Jahrg., S. 243 und 277.

jährigen Kontrolle tuberkelbazillenhaltig erwies, während in der aus der Molkerei stammenden Milch ebenso wie in der Molkereibutter wiederholt Tuberkelbazillen gefunden wurden. Auch diese Untersuchungen lehren, daß die segensreiche Wirkung, die den Genossenschaftsmolkereien als Milchverwertungszentralen zweifellos zukommt, unter Umständen dadurch wieder ausgeglichen wird, daß die Produkte infolge der in der Molkerei stattfindenden Mischung und gemeinsamen Verarbeitung der gesamten Milch eines größeren Bezirks der Gefahr einer Verunreinigung mit Tuberkelbazillen in erhöhtem Maße ausgesetzt sind.

Das zweite wichtige Problem, mit dem sich das Veterinärinstitut sofort nach Fertigstellung des Neubaus und länger als ein Jahrzehnt belächelt hat, ist die Bekämpfung der Rindertuberkulose durch Schutzimpfung. Über das Ergebnis der überaus zahlreichen, unter den verschiedenartigsten Verhältnissen in der Praxis durchgeführten Schutzimpfungen (mit Bovovakzin, Tauruman, Antiphymatol und Heyman's Schilfläckchen), ist zuletzt abschließend im Januar 1916⁴⁾ berichtet. Leider war der Erfolg in der Praxis im wesentlichen negativ und das Gesamturteil über die praktische Bedeutung der bisher zur Bekämpfung der Rindertuberkulose empfohlenen Schutzimpfungen lautete, daß keins dieser Impfverfahren imstande ist, Rinderneinens ausreichenden Schutz gegen die natürliche Tuberkuloseansteckung zu verleihen. Es sind auch bis heute keine Tatsachen bekannt geworden, die unsere Auffassung erschüttern können, daß das Problem der Bekämpfung der Rindertuberkulose nicht auf dem Wege der Schutzimpfung gelöst werden kann.

Als dann mit Inkrafttreten des Reichsviehseuchengesetzes im Frühjahr 1912 durch Einführung des sog. freiwilligen Tuberkulosestillungsverfahrens nach Ostertag die Bestrebungen, die Rindertuberkulose durch prophylaktisch-hygienische Maßnahmen zu bekämpfen, eine weitgehende staatliche Unterstützung erfuhren, hat das Veterinärinstitut sich sofort auch in den Dienst dieses an sich zwar nicht neuen, aber doch in einem den praktischen Verhältnissen in Deutschland mehr angepassten Gewande auftretenden Tuberkulosebekämpfungsverfahrens gestellt. Der Krieg hat diesen Versuchen zwar ein vorzeitiges Ende bereitet, doch war es möglich, die in mehrjähriger Kleinarbeit gesammelten Erfahrungen⁵⁾ für die Neubearbeitung des Verfahrens bei der Wiedereinführung in Sachien nach Kriegsende nutzbar zu machen. Wir haben es hierbei, gestützt auf eine mehr als 30jährige Erfahrung in der praktischen Rindertuberkulosebekämpfung, für unsere Pflicht gehalten, die allzu großen Erwartungen, welche vor allem auch durch den dem genannten Verfahren beigelegten, leider im Viehseuchengesetz selbst verankerten Namen „Tuberkulosestillungsverfahren“ erweckt werden könnten, etwas herabzustimmen und der von uns schon seit mehr als 15 Jahren vertretenen Auffassung Geltung zu verschaffen, daß die Rindertuberkulose ihre Schrecken nur in dem Maße verlieren kann, in dem es gelingt, die gesamten Lebensbedingungen des Rindes gesundheitlich günstiger zu gestalten, was sich leider nicht immer mit der von dem Tierbesitzer erstrebten Höchstleistung und bestmöglichen wirtschaftlichen Ausnutzung verträgt. Je mehr man sich aber von übertriebenen Hoffnungen frei hält, um so zäher wird man dem Erreichbaren nachstreben.

Neben diesen durchweg über viele Jahre ausgedehnten, der Tuberkuloseforschung dienenden Untersuchungen liefen naturgemäß zahlreiche kleinere Untersuchungsreihen, die sich mit anderen Tierseuchen beschäftigten. Material hierfür lieferten die täglich im Institut

einlaufenden Einfendungen von Organen und Tierkadavern durch Tierärzte und Landwirte, die das Institut zur Aufklärung rätselhafter, meist gehäuft auftretender Todesfälle aller Arten landwirtschaftlicher Nutztiere in Anspruch nehmen. Besonders hervorgehoben sei an dieser Stelle die dem Veterinärinstitut im Jahre 1905 gleichzeitig mit dem Hygienischen Institut der Berliner Tierärztlichen Hochschule geglückte Aufklärung einer äußerst verheerend in verschiedenen Teilen Deutschlands und auch in der Umgebung Leipzigs auftretenden rätselhaften Schafkrankheit, die durch gelungene Übertragungsversuche auf Ziegen als echte Schafpocken erkannt werden konnte, die infolge des jahrzehntelangen Verichontbleibens der deutschen Schafbestände von dieser Seuche bei ihrer zufälligen Einschleppung aus Rußland bei uns einen besonders bösartigen Charakter angenommen hatten und ein klinisches Bild zeigten, das von den in den Lehrbüchern beschriebenen erheblich abwich. Weiterhin sei der zahlreichen Untersuchungen und Versuche gedacht, die zu Anfang dieses Jahrhunderts zur Bekämpfung des ansteckenden Scheidenkatarrhs und seit 20 Jahren fast ohne Unterbrechung zur Bekämpfung des seuchenhaften Verkälbens ausgeführt worden sind. Es hat sich bei diesen Versuchen immer aufs neue gezeigt, welche hervorragende Bedeutung der Durchführung hygienischer Maßnahmen neben der Schutzimpfung zur Bekämpfung dieses Leidens zukommt.

Seit dem Wintersemester 1922/23 hat sich das Veterinär-Institut auch an den Arbeiten zur Erforschung der Maul- und Klauenseuche beteiligt. Als erste Frucht dieser Arbeiten ist eine Abhandlung von Dr. Beck⁶⁾ anzusehen über die Wirkung von Kupferleckfalz, dem bekannten von der Gräfin von Linden gegen Wurmbefall der Haustiere und des Wildes empfohlenen Präparate, und anderer Kupferpräparate bei Maul- und Klauenseuche. Die Wirkung war völlig negativ.

Unter den Einfendungen, die im Institut täglich verarbeitet werden, haben die Geflügelkadaver schon unter meinem Vorgänger einen breiten Raum eingenommen. So konnten auch wir auf dem Gebiete der Geflügelkrankheiten schon vor dem Kriege reiche Erfahrungen sammeln und zu zahlreichen kleineren und größeren Veröffentlichungen über sporadische und seuchenhafte Geflügelkrankheiten verarbeiten. Wir hoffen noch einmal Zeit und Ruhe zu finden, das reiche Material des Instituts zu einer vorwiegend auf eigener Beobachtung fußenden umfassenden Bearbeitung der wichtigsten beim Hausgeflügel vorkommenden Krankheiten ausnützen zu können. Eine zusammenfassende Bearbeitung der Geflügel tuberkulose, gestützt auf mehr als 5000 Geflügelsektionen, ist 1923 in der Zeitschrift für Infektionskrankheiten der Haustiere (Bd. 25 u. 27) veröffentlicht. Daß ein so reiches Untersuchungsmaterial zahlreichen Tierärzten, die teils als Assistenten, teils als freiwillige Mitarbeiter am Veterinärinstitut tätig waren, Gelegenheit geboten hat, sich die Sporen wissenschaftlicher Arbeit zu verdienen, ist selbstverständlich. Dem entspricht auch die große Zahl von Einzelabhandlungen und Dissertationen, die aus dem Veterinärinstitut hervorgegangen sind.

Seit 1909 hat das Veterinärinstitut mit Klinik und Poliklinik bei der Universität Leipzig zweijährige Berichte bei Richard Schötz-Berlin erscheinen lassen, in denen u. a. auch über die wissenschaftlichen Arbeiten sowie über die Ergebnisse der im Institut ausgeführten diagnostischen Untersuchungen fortlaufend berichtet worden ist. Der erste Bericht umfaßt den 10jährigen Zeitraum vom Sommersemester 1899 bis Wintersemester 1908/09, der zweite die Jahre 1909 und 1910, der dritte die Jahre 1911 und 1912, der letzte die Jahre 1913 bis 1915. Die Berichte enthalten ein genaues Verzeichnis der bis Ende 1915 aus dem Veterinärinstitut hervorgegangenen Dissertationen und sonstigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Der Krieg hat das Weitererscheinen der Berichte unmöglich gemacht.

Im Oktober 1923 ist das Veterinärinstitut nach Aufhebung der Veterinärklinik als Tierseucheninstitut in die neugegründete veterinärmedizinische

⁴⁾ Zentralblatt für Bakt. I. Abt. (Orig.) 1916, Bd. 78, S. 321.

⁵⁾ D. T. W. 1918, 26. Jahrg., S. 387 und 395.

⁶⁾ Archiv für wissensch. Tierheilkunde 1924, Bd. 51, S. 294.

Fakultät eingegliedert und durch Errichtung eines Instituts für animalische Nahrungsmittelkunde (in den Räumen der ehemaligen Veterinärklinik, deren Stallungen dem Tierseucheninstitut überwiesen wurden) und einer Abteilung für Fischkrankheiten noch bedeutend erweitert. Hierdurch hat nicht nur das Forschungsgebiet des Instituts sondern auch die Lehrtätigkeit des Institutsdirektors eine wesentliche Erweiterung erfahren, indem zu dem ursprünglichen Lehrauftrage für landwirtschaftliche Tiermedizin noch ein solcher für polizeiliche Tiermedizin und Seuchenlehre und ein weiterer für Fleischhygiene und animalische Nahrungsmittelkunde hinzugetreten sind. Daß es trotzdem möglich war, alsbald nach Eingliederung in die neue veterinärmedizinische Fakultät eine Reihe von Fragen, die das Institut bereits früher beschäftigt hatten, erneut in Angriff zu nehmen und überdies noch an der Erforschung neuer Seuchen erfolgreich mitzuwirken, verdankt das Institut dem glücklichen Umstande, daß es die durch Auflösung der Veterinärklinik freiwerdenden wissenschaftlichen Arbeitskräfte behalten und für die Arbeiten des erweiterten Instituts mit verwenden durfte.

Als Frucht einer solchen Arbeit der ersten Gruppe ist eine abschließende Abhandlung des Institutsleiters über die Bekämpfung des seuchenhaften Verkaltens mit Hilfe virulenter Impfstoffe⁷⁾ zu nennen, ergänzt durch Untersuchungen über den mikroskopischen Nachweis des Bang'schen Abortusbazillus in den Eihäuten und im Lochialschleim verkaltender Rinder,⁸⁾ und über Antikörperbildung durch parenterale Einverleibung lebender und abgetöteter Abortusbazillen.⁹⁾ Weiter gehören hierher Untersuchungen über die Empfänglichkeit der Hühner, Tauben und Kanarienvögel für Säugetiertuberkulose (Typus humanus und bovinus), die Ruth Eber in Anlehnung an frühere Versuche von Zschernitz¹⁰⁾ seit Frühjahr 1925 mit Reinkulturen durchgeführt und im Wintersemester 1927/28 zum Abschluß gebracht hat. Die Versuche haben erneut gezeigt, wie schwierig es ist, Hühner und Tauben mit Säugetiertuberkelbazillen beider Typen per os oder subkutan zu infizieren, während bei Kanarienvögeln eine künstliche Infektion mit Säugetiertuberkelbazillen offenbar leichter gelingt. Die Veröffentlichung der Versuchsergebnisse in der Zeitschrift für Infektionskrankheiten steht unmittelbar bevor.

Zu den Arbeiten der zweiten Gruppe — früher noch nicht bearbeitete Tierseuchen — gehören in erster Linie die umfassenden experimentellen Untersuchungen von Beck über die enzootische Enzephalitis der Schafe¹¹⁾ sowie von Beck und Frohböse über die seuchenhafte Gehirnrückenmarksentzündung der Pferde und Schafe,¹²⁾ die noch durch Übertragungsversuche bei kleinen Versuchstieren (Kaninchen und Meerschweinchen) ergänzt worden sind.¹³⁾

Die Feststellung einer besonders bei Truthühnern und auch bei Kanarienvögeln vorkommenden,

durch Bakterien aus der Gruppe der hämorrhagischen Septikämie verursachten enzootischen Erkrankung (Paracholera) durch Beck und Huck¹⁴⁾ gab Frohböse¹⁵⁾ Veranlassung, das biochemische Verhalten der bipolaren Bakterien der hämorrhagischen Septikämie eingehend zu studieren. Als es dann Beck und Ruth Eber im Frühjahr 1926 im Tierseucheninstitut¹⁶⁾ gelang, bei zahlreichen Küken und einer Henne aus zwölf verschiedenen Beständen eine Krankheit festzustellen, die pathologisch-anatomisch, bakteriologisch und serologisch mit der in Amerika und anderen Ländern herrschenden bakteriellen Kükenruhr übereinstimmt, wurde auch der Erreger dieser gefährlichen Geflügelseuche, das Bakterium pullorum, eingehend studiert und mit anderen Erregern von Geflügelseuchen, insbesondere dem Hühnertyphusbazillus der von Ruth Eber¹⁷⁾ auch bei einer Ente festgestellt worden ist, verglichen. Weitere interessante Beobachtungen über Geflügelkrankheiten sind veröffentlicht von Völcker¹⁸⁾ über Ententuberkulose und über Pneumomykosis aspergillina bei jungen Gänsen. Endlich lieferte noch Ay¹⁹⁾ einen experimentellen Beitrag zur Frage der Kochsalzvergiftung bei Hühnern.

Bereits in den Jahren 1910 und 1911 hat sich das Veterinärinstitut eingehend mit den bei den Haustieren, insbesondere beim Pferde und Rinde, vorkommenden paratyphusähnlichen Bakterien beschäftigt und interessante Feststellungen über die Verbreitung dieser Bakterien durch Fliegen gemacht. Entsprechend den erweiterten Aufgaben des Tierseucheninstituts und des mit ihm seit Wintersemester 1923/24 verbundenen Instituts für animalische Nahrungsmittelkunde haben wir uns seit Frühjahr 1924 erneut mit den bei den Haustieren vorkommenden, zur Gruppe der Coli-Typhus-Bakterien gehörenden Krankheitserregern und ihrer Klassifizierung beschäftigt. So lieferten Beck und Huck²⁰⁾ einen Beitrag zu den Coli-Typhus-Erkrankungen der Haustiere und nahmen zur Typenfrage der Paratyphus-Enteritisgruppe Stellung. Zu weiteren vergleichenden Untersuchungen gab eine von Beck und Meyer²¹⁾ untersuchte enzootische Erkrankung der Tauben Veranlassung, als deren Erreger ebenfalls Bakterien der Paratyphus-Enteritisgruppe festgestellt werden konnten. Sehr eingehend nahm endlich noch Beck²²⁾ in seiner Habilitationsschrift zur Frage der serologischen Differenzierung der Bakterien der Paratyphus-Enteritisgruppe Stellung. Seit Juli 1927 beteiligt sich das Tierseucheninstitut auch an der vom Reichsgesundheitsamt eingeleiteten Sammelforschung über die bei der Fleischvergiftung vorkommenden Paratyphusbakterien.

Mit der wichtigen Frage der Unterscheidung der intravitalen und der postmortalen Infektion des Fleisches beschäftigt sich eine von J. Bernhard im Institut für animalische

⁷⁾ D. T. W. 1927, S. 707.

⁸⁾ Dissertation von Werner Fischer, Leipzig 1925.

⁹⁾ Dissertation von Scheibe und Tapio, Leipzig 1925.

¹⁰⁾ Fütterungsversuche mit vom Menschen und vom Rinde stammenden tuberkulösen Materiale an Hühnern und Tauben. Dissertation Leipzig 1923.

¹¹⁾ Zeitschrift für Inf.-Krankheiten der Haustiere Bd. 28, 1925, S. 99.

¹²⁾ Archiv für wissensch. Tierheilkunde 1926, Bd. 54, S. 84.

¹³⁾ Diss. von Berger und von Nordberg, Leipzig 1926 u. 1927.

¹⁴⁾ Zentralblatt für Bakt. I. Abt. (Orig.) 1925, Bd. 95, S. 330.

¹⁵⁾ Zentralblatt für Bakt. I. Abt. (Orig.) 1926, Bd. 100, S. 213.

¹⁶⁾ Archiv für wissensch. Tierheilkunde 1927, Bd. 56, S. 121.

¹⁷⁾ D. T. W. 1928, S. 121.

¹⁸⁾ D. T. W. 1924, S. 580 und 594.

¹⁹⁾ Dissertation Leipzig 1925.

²⁰⁾ Zentralblatt für Bakt. I. Abt. (Orig.) 1924, Bd. 92, S. 397; T. R. 1924, S. 543.

²¹⁾ Zeitschrift für Inf.-Krankheiten der Haustiere 1926, Bd. 30, S. 15.

²²⁾ Zeitschrift für Immunit.-Forschung 1926, Bd. 46, S. 295.

Nahrungsmittelkunde angefertigte Arbeit,²³⁾ welche die verschiedenartige, im histologischen Bilde erkennbare Lagerung der Paratyphusbakterien in der Muskulatur bei der intravitalen und bei der postmortalen Infektion als Unterscheidungsmerkmale zu verwerten sucht. In das Gebiet der praktischen Fleischkunde endlich gehört eine im Laboratorium des Schlacht- und Viehhofes der Stadt Magdeburg durchgeführte Arbeit von Linnenkohl,²⁴⁾ Beitrag zur Feststellung der Gewichtsverhältnisse beim veredelten deutschen Landfischwein, die es ermöglicht, für die untersuchte Tierart eine geeignete Grundlage für die Beurteilung der Preisbildung zu gewinnen.

In der Einleitung zu dieser historischen Übersicht wurde bei der Würdigung Zürn's ausführlich dargelegt, welche bedeutende Rolle die Parasitenkunde bis in die achtziger Jahre im Arbeitsplane des Veterinärinstituts gespielt hat, und wie sie dann allmählich von der Bakteriologie bei Seite geschoben wurde. Ganz verdrängt aber wurde sie im Veterinärinstitut niemals, denn die Zürn'sche Tradition brachte es mit sich, daß namentlich bei den Geflügelinfektionen den Schmarotzern, insbesondere den Eingeweidewürmern, auch später noch dauernd Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Heute erleben wir es, daß die Parasiten wieder in den Vordergrund des Interesses getreten sind. Der Krieg war auch hier der Lehrmeister aller Dinge, indem er zeigte, in welchem hohem Maße eine Zunahme des Parasitenbefalls infolge schlechter hygienischer Verhältnisse, Unterernährung, mangelnder Reinlichkeit usw. den Gesundheitszustand des Menschen und der Tiere beeinträchtigt, und wie leicht in den durch Parasitenbefall geschwächten Körper auch Bakterien aller Art als Krankheitserreger eindringen können. Auch das Tierseucheninstitut hat in jüngster Zeit dieser zunehmenden Bedeutung der Parasitenforschung durch Einrichtung einer besonderen parasitologischen Abteilung Rechnung getragen, die zu-

nächst von Dr. Emil Meyer mit betreut wurde und seit Frühjahr 1927 Dr. Curt Sprehn, dem ehemaligen Leiter der helminthologischen Abteilung der chemischen Fabrik E. Merck-Darmstadt, unterstellt ist, der sich in diesem Frühjahr für Parasitologie und angewandte Zoologie bei der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig habilitiert hat. Von E. Meyer liegen parasitologische Veröffentlichungen vor über den starken Bandwurmbefall bei den Hunden in den letzten Kriegs- und Nachkriegsjahren²⁵⁾ und über eine Strongyloides-Infektion beim Schwein mit gleichzeitiger Pyocyaneus-Bakteriämie.²⁶⁾ C. Sprehn hat seit seiner Zugehörigkeit zum Institut folgende parasitologische Abhandlungen veröffentlicht: Einige Bemerkungen über die Trichocephalen der Wiederkäuer;²⁷⁾ Nematoden in Säugetieren;²⁸⁾ Echinostomiden bei Tauben;²⁹⁾ Sektionen von Pelztieren;³⁰⁾ Biologie der Trematoden, zusammen mit Bittner;³¹⁾ die wichtigsten Endoparasiten der Pelztiere;³²⁾ Pentastomida, in: Die Tierwelt Deutschlands. Die Habilitationsschrift Dr. Sprehn's stellt einen Auschnitt aus seinem demnächst erscheinenden Werke „Helminthen der deutschen Säugetiere und Vögel“ dar.

Dr. Sprehn hat auch die am Institut bestehende Abteilung für Fischkrankheiten und die Abhaltung der damit verbundenen Vorlesung über „Fischkunde einschließlich Fischkrankheiten“ übernommen.

²⁵⁾ Zeitschrift für Fleischhyg. 1921, Bd. 32, S. 43.

²⁶⁾ D. T. W. 1925, S. 661.

²⁷⁾ Zoolog. Anz. Bd. 70, S. 83.

²⁸⁾ Zeitschrift für Säugetierkunde Bd. 2, S. 38.

²⁹⁾ D. T. W. 1927, S. 541.

³⁰⁾ Pelztierzucht, Jahrg. 4, S. 18.

³¹⁾ Lieferung 27 der Biologie der Tiere Deutschlands.

³²⁾ Vorträge der Reichszentrale für Pelztiere und Rauchwarenverwertung Nr. 2.

²³⁾ Dissertation Leipzig 1924.

²⁴⁾ Dissertation Leipzig 1927.

Ist es möglich, die Rindertuberkulose durch Schutzimpfung wirksam zu bekämpfen?

Von Prof. Dr. A. Eber, Leipzig.

Das Verdienst, die Schutzimpfung gegen Tuberkulose neubelebt und durch exakte Versuche, insbesondere auch an großen Tieren, wesentlich gefördert zu haben, gebührt von Behring. Wenn auch schon lange vor ihm das Problem, empfängliche Versuchstiere durch Einimpfung verschiedener mit Hilfe von Tuberkelbazillen erzeugter oder aus tuberkulösem Materiale gewonnener Präparate gegen spätere Infektionen zu schützen, zahlreiche Forscher interessiert und zu Versuchen angeregt hat, so hat v. Behring, doch als erster einen gangbaren Weg zur Erzeugung einer erhöhten Widerstandsfähigkeit gegenüber einer künstlichen Tuberkuloseinfektion beim Rinde gewiesen und einen Impfstoff für die Schutzimpfung der Rinder in der Praxis zur Verfügung gestellt.

Die Untersuchungen v. Behrings über die Schutzimpfung junger Rinder durch Vorbehandlung mit Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft und Virulenz sind von zahlreichen Forschern nachgeprüft und, soweit sie sich auf eine erhöhte Widerstandskraft gegenüber einer alsbald nach Abschluß der Schutzimpfung erfolgenden künstlichen Tuberkuloseinfektion beziehen, durchweg bestätigt und in Bezug auf die zur Schutzimpfung verwendbaren Impfstoffe noch erheblich erweitert. Als Ergebnis dieser von Forschern aller Nationen in die Wege geleiteten Versuche sind die nachfolgenden Feststellungen von grundsätzlicher Bedeutung¹⁾:

1. Die Widerstandsfähigkeit der für Tuberkulose empfäng-

lichen Versuchstiere, insbesondere der jungen Rinder, gegenüber einer künstlichen Infektion mit virulenten Tuberkelbazillen kann durch Vorbehandlung mit Tuberkelbazillen der verschiedensten Herkunft und Virulenz, ja sogar mit völlig avirulenten Tuberkelbazillen vorübergehend erhöht werden.

2. Stärke und Dauer dieses künstlichen Impfschutzes sind außer von der individuellen Disposition der Impflinge auch von der Beschaffenheit der Impfstoffe (vollvirulente, abgeschwächte bzw. avirulente Menschentuberkelbazillen, Rinder-, Vogel- oder Kaltblütertuberkelbazillen, andere säurefeste Bazillen, durch physikalische oder chemische Einwirkungen abgetötete oder in ihrer Zusammenfassung veränderte Tuberkelbazillen) und von der Art ihrer Anwendung (subkutane, intravenöse oder stomachale Einverleibung) abhängig.

3. Bei der Verwendung lebender Tuberkelbazillen bleiben die Schutzgeimpften Tiere eine mehr oder minder lange Zeit Träger der eingeeimpften Tuberkelbazillen.

4. Über den Wert eines Schutzimpfverfahrens für die Bekämpfung der Rindertuberkulose kann nur eine Prüfung in der Praxis entscheiden, da es keine Methode der künstlichen Infektion gibt, die einen sicheren Rückschluß auf das Verhalten der Impflinge gegenüber der natürlichen enzootischen Tuberkuloseansteckung (Stallinfektion) gestattet.

Eine solche Prüfung in der Praxis aber bereitet erhebliche Schwierigkeiten, denn während die Prüfung Schutzgeimpfter Rinder durch eine künstliche, in der Regel subkutan, intravenös, oder durch Fütterung erfolgende Infektion mit relativ einfachen Mitteln und in

¹⁾ Eber, Zeitschrift für Tub. Bd. 27, S. 306.

verhältnismäßig kurzer Zeit an jedem Orte durchführbar ist, muß die Prüfung der Schutzkraft gegenüber der natürlichen Stallinfektion unter genau den gleichen Verhältnissen erfolgen, unter denen die Rinder nach erlangter Geschlechtsreife als Kühe ihren „Beruf als Milch- und Kälbererzeuger“ zu erfüllen gezwungen sind. Es ist daher notwendig, daß die in der Jugend vorschriftsmäßig schutzgeimpften Rinder nach einer gewissen Zeit, in der sie vor stärkerer Tuberkuloseansteckung etwa so, wie das bei der tuberkulosefreien Jungviehaufzucht üblich ist, geschützt sind, in Rinderbestände von verschiedener starker Tuberkuloseverfäuchung eingestellt und wirtschaftlich in der gleichen Weise wie die übrigen gleichaltrigen Tiere des Bestandes ausgenutzt werden. Da die Rinder schon als Kälber geimpft werden müssen und erst gegen Ende des dritten Lebensjahres das erste Kalb zur Welt bringen, so kann für ein einzelnes Rind nicht vor Ablauf von 5—6 Jahren ein Urteil darüber abgegeben werden, ob sich die Schutzimpfung bei ihm tatsächlich bewährt hat. Berücksichtigen wir aber weiterhin, daß die kritische Würdigung eines Schutzimpfverfahrens im ganzen erst dann möglich ist, wenn eine größere Zahl von Sektions- bzw. Schlachtbefunden schutzgeimpfter Rinder und Kontrollrinder vorliegt, so ergibt sich von selbst, daß für die abschließende kritische Beurteilung eines für die Bekämpfung der Rindertuberkulose angegebenen Schutzimpfverfahrens mindestens ein Zeitraum von 6—8 Jahren erforderlich ist. Nur von einem in dieser Weise in der Praxis geprüften und bewährt befundenen Schutzimpfverfahren würde man mit Recht einen Erfolg bei der Bekämpfung der Rindertuberkulose erwarten dürfen.

Es sind bis zum Kriegsausbruch folgende Schutzimpfverfahren, bei denen die Prüfung im künstlichen oder verstärkten natürlichen Infektionsversuche die Einführung in die Praxis zu rechtfertigen schien, eine mehr oder minder lange Zeit zur Bekämpfung der Rindertuberkulose benutzt worden: 1. die Rinderschutzimpfung mit v. Behrings Bovovakzin (intravenöse Injektion einer Aufschwemmung abgeschwächter Menschen-tuberkelbazillen); 2. die Rinderschutzimpfung mit Tauruman nach R. Koch, Schütz, Neufeld und Mießner (intravenöse Injektion einer Aufschwemmung vollvirulenter Menschen-tuberkelbazillen); 3. die Rinderschutzimpfung mit Antiphymatol nach Klimmer (subkutane Injektion einer Aufschwemmung durch Molchpassage bzw. chemische Einwirkung avirulent gewordener Menschentuberkelbazillen); 4. die Tuberkulose-schutz- und Heilimpfung der Rinder nach Heymans (Einverleibung virulenter, in eine natürliche Pflanzenmembran (Schilf-fäckchen) eingeschlossener Tuberkelbazillen unter die Haut der zu impfenden Rinder mittels eines Trokars an den Seitenteilen der Brustwand).

Mit keinem der genannten Schutzimpfverfahren ist es gelungen, Rindern einen im obigen Sinne ausreichenden Schutz gegen die natürliche Stallinfektion zu verleihen. Die Diskussion über Wert oder Unwert der geprüften Impfverfahren hat seit 1904 einen breiten Raum in der Fachpresse eingenommen und ist erst nach Kriegsausbruch allmählich verstummt.

Wiewohl es zunächst den Anschein hatte, als ob nach dem Vergehen dieser gerade von den bedeutendsten Tuberkuloseforschern erdachten Schutzimpfverfahren die Hoffnung, die Rindertuberkulose durch Schutzimpfung zu bekämpfen, endgültig zu Grabe getragen sei, sind doch bereits wenige Jahre nach Kriegsende zwei weitere Schutzimpfungen bekannt gegeben, die den Anspruch erheben, als Rindertuberkulosebekämpfungsverfahren in die Praxis eingeführt zu werden, nämlich: 1. die Rinderschutzimpfung nach der Methode von Calmette (in Gemeinschaft mit Gué-

rin²⁾, bestehend in der alljährlich zu wiederholenden subkutanen Einspritzung lebender, völlig avirulenter boviner Tuberkelbazillen und 2. die Rinderschutzimpfung nach der Methode von Selter (in Gemeinschaft mit Knauer und Blumenberg³⁾), bestehend in der einmaligen in frühester Jugend vorzunehmenden subkutanen Einspritzung eines lebende, in ihrer Virulenz abgeschwächte bovine Tuberkelbazillen enthaltenden Impfstoffes. Beide Erfinder arbeiten mit lebenden Rindertuberkelbazillen, die bei der Methode Calmette-Guérin durch jahrelange Züchtung auf gallehaltigen Nährböden (insbesondere Kartoffeln) völlig avirulent für Rinder geworden sind (Impfstoff BCG) und bei der Methode Selter-Knauer-Blumenberg durch siebenwöchigen Aufenthalt im Brutschrank, wiederholte Überimpfung auf neue Nährböden und teilweise mechanische Zertrümmerung durch Verreiben im Achatmörser soweit abgeschwächt sind, daß sie nur noch in den der Impfstelle zunächst gelegenen Lymphknoten einen lokalen tuberkulösen Herd hervorzurufen vermögen, der während des ganzen Lebens bestehen bleiben und dem Impfling eine lebenslängliche Immunität verbürgen soll. Im Gegensatz zu Selter vermeidet Calmette durch Verwendung eines für Rinder avirulenten Impfstoffes makroskopisch erkennbare tuberkulöse Veränderungen und nimmt an, daß auch ohne solche lediglich durch eine Art Symbiose der avirulenten lebenden Tuberkelbazillen mit den zelligen Elementen des Körpers (l. c. S. 78) eine erhöhte Widerstandskraft gegen eine spätere tuberkulöse Infektion erzeugt werden kann, die solange bestehen bleibt, wie lebende Tuberkelbazillen im lymphoiden Gewebe des Körpers vorhanden sind. Da die Immunität in dem Augenblicke aufhört, in dem die zur Immunisierung benutzten Bazillen durch die natürlichen Ausscheidungswege aus dem Körper wieder ausgeschieden sind, so verlangt Calmette eine alljährliche Wiederholung der Schutzimpfung, die er für absolut ungefährlich hält.

Ist es nun möglich, durch eine erstmalig in frühester Jugend auszuführende, alljährlich zu wiederholende subkutane Einspritzung avirulenter Rindertuberkelbazillen Rindern eine erhöhte Widerstandskraft auch gegenüber der späteren enzootischen Stallinfektion zu verleihen und ist eine solche Schutzimpfung auch für die älteren, in voller Milchleistung stehenden Rinder harmlos? Mit der Bejahung oder Verneinung dieser Frage steht oder fällt die Calmette'sche Rinderschutzimpfung.

Was zunächst den ersten Teil der Frage anbelangt, so ist durch exakte Versuche Calmette's und seiner Mitarbeiter bewiesen, daß die in frühester Jugend subkutan mit dem Impfstoff BCG geimpften Rinder eine etwa ein Jahr anhaltende erhöhte Resistenz gegen eine künstliche oder verstärkte natürliche Tuberkuloseinfektion besitzen. In diesem Punkte leistet also der Calmette'sche Impfstoff daselbe, was vor ihm bereits der Behring'sche Impfstoff (Bovovakzin) und das Tauruman von R. Koch, Schütz, Neufeld und Mießner geleistet haben, mit welchen Impfstoffen der Calmette'sche zunächst auch noch die Art der Einverleibung durch intravenöse Injektion gemeinsam hatte. Erst später ist Calmette zur einfacheren, subkutanen Einspritzung übergegangen,

²⁾ Calmette, La vaccination préventive contre la tuberculose par le „BCG“ Paris 1927.

³⁾ Selter, Knauer u. Blumenberg, D. T. W. 1926, S. 653; Jbid. 1927, S. 744.

da sich der Impfstoff auch bei dieser Einverleibungsart ungefährlich und im künstlichen Infektionsversuch hinreichend wirksam erwies.

Bekanntlich hat Klimmer schon vor Calmette einen ebenfalls avirulenten, subkutan einzuspritzenden Impfstoff (Antiphy-matol) zur Rinderschutzimpfung empfohlen, der aus Menschen-tuberkelbazillen bestand, die zunächst durch Molch-Passage, später aber auf chemischem Wege völlig avirulent, insbesondere auch für das Meerschweinchen, gemacht worden waren. Wenn somit auch beide Schutzimpfungen sowohl in der Technik als auch in der Verwendung avirulenter Impfstoffe übereinstimmen, so weicht die Calmette'sche Impfung insofern von der Klimmer'schen etwas ab, als sie Rindertuberkelbazillen verwendet und sich einer äußerst schonenden Methode der Abschwächung, nämlich der Züchtung auf gallehaltigen Nährböden, bedient. Hieraus erklärt es sich wohl auch, daß die Virulenz des Impfstoffes BCG, wie Kraus⁴⁾ und Gerlach⁵⁾ zuerst nachgewiesen haben, nicht so völlig abgeschwächt ist, daß er nicht im Stande wäre, nach Einspritzung in die Bauchhöhle eines Meerschweinchens ausgebreitete tuberkulöse Veränderungen zu erzeugen, die aber nach einer gewissen Zeit völlig wieder verschwinden und nur im Ausnahmefalle erfolgreich weiter verimpft werden können. Auf der Erhaltung dieser schwer nachweisbaren Virulenz beruht nach der Auffassung von Kraus und Gerlach überhaupt die Fähigkeit des Calmette'schen Impfstoffes, eine vorübergehende Resistenzerhöhung bei den Impfungen hervorzurufen. Vielleicht erklärt sich hieraus auch die etwas kräftigere Schutzwirkung, die dem Calmette'schen Impfstoff im Vergleich zu dem für Meerschweinchen völlig avirulenten Antiphy-matol nach dem Ausfall der Prüfung im künstlichen bzw. verstärkten natürlichen Infektionsversuche zweifellos innewohnt. Ob aber eine gleiche Überlegenheit des Calmette'schen Impfstoffes im Vergleich zu dem Klimmer'schen Antiphy-matol auch bei der späteren Nachprüfung in der Praxis gegenüber den Einwirkungen der enzootischen Stallinfektion hervortritt, ist mindestens zweifelhaft.

Es liegen bisher keinerlei Veröffentlichungen vor, die über eine nach den in der Einleitung dargelegten Gesichtspunkten hinreichend lange durchgeführte Nachprüfung der mit dem Calmette'schen Impfstoff Schutzgeimpften Rinder nach erlangter Geschlechtsreife unter den vielgestaltigen Verhältnissen der Praxis berichten, durch die allein ein objektives Urteil über die Brauchbarkeit einer Schutzimpfung im Kampfe gegen die Rindertuberkulose abgegeben werden kann. Für denjenigen aber, der sich ernstlich mit der Frage der Rinderschutzimpfung beschäftigt hat und die mit dem Alter und der zunehmenden wirtschaftlichen Ausnutzung ständig steigende Anfälligkeit, namentlich der weiblichen Rinder, für die Tuberkulose kennt, unterliegt es nicht dem geringsten Zweifel, daß auch der Calmette'sche Impfstoff das nicht leisten kann, was die in ihrer Wirkung auf den Rinderkörper weit aggressiveren Impfstoffe Bovovakzin und Taurumann nicht zu leisten vermochten. Auch die Annahme Calmette's, daß die durch eine einmalige subkutane Einspritzung des Impfstoffes BCG in der frühesten Jugend erzeugte erhöhte Tuberkulose-resistenz durch eine alljährliche Wiederholung der Schutzimpfung beliebig verlängert oder gar gesteigert werden kann, harret erst noch der Bestätigung durch die Praxis.

Genau so in der Luft schwebt die weitere Behauptung Calmette's, daß die jährliche Einspritzung lebender, wenn auch in ihrer Virulenz stark abgeschwächter Tuberkelbazillen bei erwachsenen, in der Milchnutzung stehenden Rindern harmlos sei. Harmlos ist sie höchstens in dem

Sinne des Ausbleibens einer unmittelbaren Schädigung der Impflinge. Wir dürfen aber daraus, daß Kälber und Jungrinder die Impfung lebender Tuberkelbazillen ohne sichtbare Gefundheits-schädigungen ertragen, nicht den Schluß ziehen, daß das Gleiche auch bei älteren, bereits in der Milchnutzung stehenden Rindern der Fall ist. Wissen wir doch durch exakte Beobachtungen anderer Forscher (v. Behring, Weber und Titze⁶⁾), daß es äußerst bedenklich ist, Milchkühe mit lebenden Tuberkelbazillen zu behandeln, weil die Gefahr besteht, daß diese in die Blutbahn gelangen und in die Milch übergehen können. Auch mahnt die bei den umfassenden Immunisierungsversuchen des Veterinärinstituts der Universität Leipzig wiederholt gemachte Erfahrung,⁷⁾ daß gerade bei immunisierten, klinisch völlig gesund erscheinenden Rindern äußerst schleichende Formen der Eutertuberkulose auftreten können, die zu einer oft lange verborgen bleibenden Ausscheidung von Tuberkelbazillen in der Milch führen, zu ganz besonderer Vorsicht.

Wir müssen somit die Frage: „Ist es möglich, durch die Calmette-Guérin'sche Schutzimpfung mit dem Impfstoff BCG Rindern einen erhöhten Schutz auch gegenüber der späteren enzootischen Stallinfektion zu verleihen und ist eine solche Schutzimpfung auch für die älteren, in voller Milchleistung stehenden Rinder harmlos?“ dahin beantworten, daß keine ausreichenden Beobachtungen vorliegen, die uns berechtigen, diese Frage zu bejahen; daß es aber auf Grund der bisherigen, mit zum Teil wesentlich virulenteren Impfstoffen in der Praxis gesammelten Erfahrungen über Rinderschutzimpfung nicht zu erwarten ist, daß der Impfstoff BCG in Zukunft eine Rolle bei der Bekämpfung der Rindertuberkulose zu spielen berufen ist. Hierbei ist ganz außer Betracht gelassen, daß eine jährlich zu wiederholende Schutzimpfung aller in der Ausnutzung befindlichen tuberkulosegefährdeten Rinder praktisch und durchführbar und wirtschaftlich untragbar ist.

Wie steht es nun mit dem Tuberkulose-schutzimpfverfahren von Selter, Knauer und Blumenberg?

Von allen bisher veröffentlichten Rinderschutzimpfverfahren trägt das Selter'sche den in der Praxis gewonnenen Erfahrungen über das Zustandekommen und die Dauer einer erworbenen Tuberkulose-resistenz zweifellos am besten Rechnung, in dem es mit relativ einfachen Mitteln das künstlich hervorzurufen sucht, was unter natürlichen Verhältnissen bei dauerndem Aufenthalt in einer infizierten Umgebung von selbst entsteht, nämlich einen kleinen tuberkulösen Herd an einer relativ harmlosen Stelle. Wir wissen seit Bang's grundlegenden Tuberkulosearbeiten, daß es in allen tuberkuloseverseuchten Beständen zahlreiche Rinder gibt, die nur durch die Tuberkulinreaktion ihre tuberkulöse Infektion anzeigen, im übrigen aber klinisch völlig gesund sind, gesunde Nachkommen erzeugen und eine lange Zeit hindurch wirtschaftlich voll ausgenutzt werden können. Das sind Rinder mit kleinsten tuberkulösen Herden, die entweder völlig zur Ruhe gekommen sind oder doch so langsam fortgeschreiten, daß der Gesundheitszustand der Tiere nicht erkennbar beeinflusst wird. In einer tuberkuloseverseuchten Umgebung sind solche Rinder unter Umständen wertvoller als völlig gesunde, weil sie nicht schutzlos wie diese gelegentlichen massiven Infektionen, die in tuberkulösen Beständen jederzeit vorkommen können, preisgegeben sind. Wir wissen ja auch vom Menschen, daß in der Jugend erworbene kleine tuberkulöse Herde ein wertvoller Besitz sind für diejenigen, die in großen Städten gezwungen sind, mit tuberkulösen Menschen auf engem Raume zusammenzuleben. Die künstliche Erzeugung derartiger kleiner tuberkulöser Herde, die erfahrungsgemäß befähigt sind, die Abwehrkräfte des Körpers bei späteren Infektionen mobil zu machen, ist das Ziel der Selter'schen Tuberkulose-schutzimpfung bei den Kälbern.

⁴⁾ Zeitschrift für Immunitätsforsch. Bd. 51, S. 230.

⁵⁾ Jbid. Bd. 51, S. 256.

⁷⁾ Zeitschrift für Infektionskrankheiten der Haustiere Bd. 17, S. 135.

Es entsteht nun die Frage: Besteht eine Gewähr dafür, daß die durch künstliche Erzeugung kleinster tuberkulöser Herde in der Jugend geschaffene erhöhte Tuberkulose-resistenz auch nach Eintritt der Geschlechtsreife und der damit verbundenen verstärkten wirtschaftlichen Ausnutzung gegenüber der enzootischen Stallinfektion ausreicht, und daß diese tuberkulösen Herde für die Impflinge auch im späteren Leben stets harmlos bleiben? Die Beantwortung dieser Frage ist entscheidend für den Wert des Selter-Knauer-Blumenberg'schen Rinderschutzimpfverfahrens.

Das Selter'sche Schutzimpfverfahren hat einen Vorläufer in der Tuberkulose-schutz- und Heilimpfung der Rinder nach Heymans.

Auch Heymans hatte die Absicht, im Körper der Rinder, die in einer infizierten Umgebung zu leben gezwungen sind, durch Einverleibung virulenter, in eine durchlässige Pflanzenmembran (Schilffläckchen) eingeschlossener Tuberkelbazillen unter die Haut mit Hilfe eines Trokars unschädliche tuberkulöse Herde zu schaffen, welche die Abwehrkräfte des Körpers gegen eine spätere Tuberkuloseinfektion mobil machen sollten. Um sein Verfahren wirksamer zu gestalten, hat Heymans statt der anfangs ausschließlich benutzten Menschentuberkelbazillen eine Zeitlang auch Rindertuberkelbazillen zur Füllung der Schilffläckchen verwandt, kam hiervon aber wieder ab, als er feststellen konnte, daß die Tuberkelbazillen unter Umständen die Wand der Schilffläckchen durchwandern und in den Kreislauf eindringen können.

Die Tuberkulose-schutz- und Heilimpfung nach Heymans hat sich, wie bekannt, in der Praxis nicht bewährt und ist inzwischen wieder fallengelassen, da sich bei der Nachprüfung in der Praxis ergab, daß die durch den künstlich erzeugten lokalen tuberkulösen Herd bewirkte Erhöhung der Abwehrkräfte des Körpers nicht ausreichte, Neuinfektionen sicher zu verhindern. Wenn auch in stärker verseuchten Beständen eine gewisse heilende Wirkung auf bereits vorhandene tuberkulöse Herde (Heymans impfte neben den Kälbern auch ältere Rinder) bisweilen vorhanden zu sein schien, so reichte diese doch ebensowenig wie die durch die Schutzimpfung erzielte Erhöhung der Schutzkräfte zur Bekämpfung der Rindertuberkulose aus. Erlebt man es dann noch von Zeit zu Zeit, wie wir es bei den vom Veterinärinstitut der Universität Leipzig durchgeführten Schutzimpfungen einige Male erlebt haben, daß in fast tuberkulosefreien Beständen, in denen lediglich zur Vorbeuge Schutzimpfungen nach Heymans ausgeführt wurden, schwer feststellbare, schleichende Formen der Eutertuberkulose mit dauernder Ausschcheidung von Tuberkelbazillen in der Milch auftreten,⁸⁾ so kann man nicht an die Harmlosigkeit eines Impfverfahrens glauben, welches auf der Erzeugung echter tuberkulöser Herde durch Einspritzung virulenter Rindertuberkelbazillen beruht.

Berücksichtigt man weiter, daß exakte Beobachtungen darüber, wie lange der künstlich erzeugte tuberkulöse Herd wirksam bleibt (eine vorzeitige Abheilung wäre gleichbedeutend mit dem Aufhören des Impfschutzes!), nicht vorliegen, und daß die Kardinalfrage, ob der in frühester Jugend erzeugte tuberkulöse Herd auch im späteren Alter, wenn das Rind durch dauernde Stallhaltung, durch eine lediglich auf hohen Milchertrag hinzielende Fütterung und andere die Widerstandskraft ungünstig beeinflussende Momente geschwächt ist, seinen gutartigen Charakter beibehält und nicht etwa ebenfalls bösartig wird, völlig ungeklärt ist, so muß man zugeben, daß eine Gewähr dafür, daß das Selter-Knauer-

Blumenberg'sche Impfschutzverfahren mehr leistet als die Heymans'sche Schutz- und Heilimpfung, nicht besteht.

Wir müssen somit die Frage: „Besteht eine Gewähr dafür, daß die durch künstliche Erzeugung kleinster tuberkulöser Herde in der Jugend geschaffene erhöhte Tuberkulose-resistenz auch nach Eintritt der Geschlechtsreife und der damit verbundenen verstärkten wirtschaftlichen Ausnutzung gegenüber der enzootischen Stallinfektion ausreicht, und daß diese tuberkulösen Herde auch im späteren Leben stets harmlos bleiben?“ auch für die Selter-Knauer-Blumenberg'sche Schutzimpfung dahin beantworten, daß keine ausreichenden Beobachtungen vorliegen, die uns berechtigen, diese Frage zu bejahen; daß aber die bei der Prüfung anderer Tuberkulose-schutzimpfverfahren, insbesondere der Tuberkulose-schutz- und Heilimpfung nach Heymans, gesammelten Erfahrungen nicht dafür sprechen, daß von der Selter'schen Schutzimpfung ein Erfolg in der Bekämpfung der Rindertuberkulose zu erwarten ist. Hierbei ist ganz außer Betracht gelassen die in ihrer praktischen Auswirkung nicht zu unterschätzende Schwierigkeit einer richtigen Dosierung des Impfstoffes.

Selter bemüht sich einen Impfstoff zu liefern, der in 5 ccm 0,1 mg aufgeschlossenes Bakterienprotoplasma und 0,0005 mg Bazillen, d. h. etwa 500 000 lebende Rindertuberkelbazillen enthält.⁹⁾ Da nach Selter's eigenen Untersuchungen eine wesentliche Unterschreitung dieser Menge (etwa bis auf 100 000 lebende Bazillen) keinen ausreichenden Impfschutz mehr gewährt, eine wesentliche Überschreitung aber die Gefahr einer aktiven Tuberkulose heraufbeschwört, so wird es wesentlich von der gewissenhaften Herstellung und Lieferung des Impfstoffes abhängen, ob der gewünschte Effekt, die Erzeugung eines für den Impfling unschädlichen, für die Immunisierung ausreichenden tuberkulösen Herdes, erzielt wird. Ob diese unerläßliche Voraussetzung für das technische Gelingen auch noch erfüllt werden kann, wenn die Herstellung des Impfstoffes, dessen Preis sich naturgemäß in bescheidenen Grenzen halten muß, fabrikmäßig erfolgt, muß die Zukunft lehren.

Unter diesen Umständen dürfte es von vornherein einfacher und wirksamer sein, wenn man die allmähliche Durchseuchung der Jungrinder, d. h. die Erzeugung gutartiger tuberkulöser Herde, welche die Abwehrkräfte des Körpers gegen eine spätere Tuberkuloseinfektion mobil machen können, der Natur überläßt und die für die Schutzimpfung gesparten Mittel dazu verwendet, in den gefährdeten Rinderställen Verhältnisse zu schaffen, unter denen die Kälber und Jungrinder, geschützt vor massiven Infektionen, so heranwachsen können, daß sie infolge wiederholter Aufnahme kleinster Bazillenmengen in der Jugend beim Eintritt in das zeugungsfähige Alter den Grad von Tuberkulosefestigkeit besitzen, der sie befähigt, auch in einer infizierten Umgebung ohne schwere Gefundheitschädigung weiter zu leben. Im übrigen wird es wesentlich von der weiteren Haltung und wirtschaftlichen Nutzung des zur Ergänzung in den allgemeinen Kuhstall aufgenommenen Nachwuchses sowie von der hygienischen Überwachung des gesamten Bestandes (regelmäßige klinische Untersuchung, Ausmerzungen der mit offenen Formen der Tuberkulose behafteten Rinder usw.) abhängen, ob es gelingt, die Mehrzahl der Jungrinder auch im späteren Leben in einem Gefundheits- und Kräftezustand zu erhalten, der eine angemessene wirtschaftliche Ausnutzung ermöglicht.

Eine auf solchen Grundsätzen fußende Bekämpfung der Rindertuberkulose erstrebt bekanntlich das Ostertagsche Tuberkulosebekämpfungsverfahren, welches als sog. freiwilliges Tuberkulose-tilgungsverfahren in den meisten Bundesstaaten Eingang gefunden und sich als wichtiges Hilfsmittel

⁸⁾ Zeitschrift für Infektionskrankheiten der Haustiere Bd. 17, S. 135.

⁹⁾ Selter, Knauer u. Blumenberg, D. T. W. 1926, S. 655.

zur Eindämmung der Rindertuberkulose in stark verseuchten Rinderbeständen bewährt hat.

Schlußbetrachtung.

Wir können somit die Frage, ob es möglich ist, die Rindertuberkulose durch Schutzimpfung zu bekämpfen, nur dahin beantworten, daß weder von den älteren, schon

vor dem Kriege in die Praxis eingeführten, noch von den neueren Tuberkuloseeschutzimpfverfahren, insbesondere dem Calmette-Guérin-schen und dem Selter-Knauer-Blumenberg-schen Verfahren, eine wirkliche Hilfe im Kampfe gegen die Rindertuberkulose zu erwarten ist.

(Aus dem Tierseucheninstitut der Universität Leipzig. — Direktor: Prof. Dr. Eber.)

Vergleichende Untersuchungen über Schweine- und Geflügel-rotlaufbakterien.

Von Dr. A. Meyn.

Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte ist wiederholt als Erreger von Geflügelseuchen ein Bakterium nachgewiesen, das wahrscheinlich mit dem Erreger des Rotlaufs der Schweine identisch ist, auf jeden Fall aber dem echten Rotlaufbakterium sehr nahe steht. Bei fast allen Arten unseres Hausgeflügels sind durch derartige rotlaufähnliche Bakterien verursachte Erkrankungen teils sporadischer, teils seuchenhafter Natur beobachtet.

Als erster züchtete Jarosch 1904 aus dem Blute eines nach eintägiger Krankheit verendeten Truthahns feine grampositive Stäbchen, die sich morphologisch und kulturell wie Schweinerotlaufbakterien verhielten. Die Bakterien waren bei subkutaner Applikation pathogen für Mäuse, Kaninchen, Tauben und Truthühner. Dagegen wurden drei Hühner und eine Ente erfolglos infiziert.

Natürliche Erkrankungen seuchenhaften Charakters unter Hühnern sind von Schipp, Broll und Pfaff beobachtet. In dem von Schipp beschriebenen Falle ist eine große Zahl von Hühnern in kurzer Zeit eingegangen. Broll sah in einem Bestande im Laufe von mehreren Wochen fast alle Tiere unter wenig charakteristischen Erscheinungen verenden: sie ließen die Flügel hängen, fraßen nichts und starben nach einer Krankheitsdauer von 2—30 Stunden. Die pathologisch-anatomischen Erscheinungen erweckten den Verdacht auf Geflügelcholera, jedoch wurden mikroskopisch im Blut und in den Organen ausstrichen feine, grampositive Stäbchen gefunden, die morphologisch und kulturell mit echten Rotlaufbakterien übereinstimmten. Auch die serologischen Prüfungen sprachen für eine Identität mit Schweinerotlaufbakterien. — Pfaff berichtet über eine chronische Hühnerseuche in einem Meierhofe, die trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, peinlicher Reinigung und Desinfektion, guter Fütterung und Behandlung nicht ausgerottet werden konnte. Die kranken Hühner standen herum, ließen die Flügel hängen, fraßen wenig, bekamen vorübergehend Durchfall und blieben im Wachstum zurück. Die Tiere, von denen keines gefunden wurde, verendeten teils nach einigen Tagen, teils erst nach Wochen. Vorwiegend wurden junge, 1—3 Wochen alte Hühner befallen. Bei älteren Tieren grifferte die Krankheit weniger. Kulturell konnten rotlaufähnliche Stäbchen nachgewiesen werden, die sich im Agglutinationsversuch genau wie echte Rotlaufbakterien verhielten.

Bei Tauben hat Poels 1917 in zwei Fällen rotlaufähnliche Bakterien als Krankheitserreger ermittelt. Derselbe Autor hat außerdem erstmalig Rotlaufbakterien als Erreger einer seuchenartig auftretenden Erkrankung bei Enten nachgewiesen. In dem betreffenden Bestande waren innerhalb weniger Tage 70 Tiere eingegangen. Die aus dem Blute der verendeten Tiere isolierten grampositiven Stäbchen stimmten auch hier morphologisch und kulturell mit Schweinerotlaufbakterien überein, ließen bei weiterer eingehender Untersuchung aber doch einige Besonderheiten erkennen. In Gelatine-Stichkulturen war der büstchenförmige Wuchs nicht so ausgesprochen wie bei echtem Rotlauf, die Agglutination ging langsamer vor sich und außerdem besaßen die Erreger gegenüber Mäusen und Tauben eine höhere Virulenz als Schweinerotlaufbakterien. Poels faßt die aus den Geflügelkadavern gezüchteten Keime daher als besondere Rotlaufstämme auf, die den saprophytisch in der Natur vorkommenden Arten nahe stehen. Eber hat 1921 über zwei weitere Fälle von gehäuft aufgetretenen, meist tödlich verlaufenen Erkrankungen unter Enten, bei denen Rotlaufbakterien als Erreger nachgewiesen werden konnten, ausführlich berichtet. Die Erreger waren kulturell und serologisch nicht von echten Rotlaufbakterien zu unter-

scheiden, entfalteten aber im Mäuseinfektionsversuch eine etwas höhere Virulenz.

Hinsichtlich der Ätiologie des Entenrotlaufs ist von Interesse, daß sowohl in dem von Poels beschriebenen Seuchenausbruch als auch in den beiden von Eber mitgeteilten Fällen den Tieren reichlich Gelegenheit gegeben war, faulende organische Substanzen mit der Nahrung aufzunehmen. Da in derartigen Substanzen sowohl Rotlaufbakterien als auch die ihnen nahe verwandten Mäuseptikämiebakterien günstige Lebensbedingungen finden, sind die Erkrankungen, wie vor allem Poels vermutet, mit der Aufnahme des faulen organischen Materiales in ursächliche Beziehung zu bringen.

Eber hat weiterhin noch über einen Fall von Rotlauf bei einer Schneepute berichtet. Das Tier war ohne erkennbare Krankheitserscheinungen plötzlich verendet. Jarmai konnte Rotlaufbakterien aus dem Blute und den Organen eines Teichhuhns, einer Wachtel, einer Drossel und eines Papageies des Budapester Zoologischen Gartens isolieren.

Im Tierseucheninstitut der Universität Leipzig sind in den letzten Jahren wiederholt Rotlaufbakterien als Erreger von Geflügelkrankheiten nachgewiesen worden. Ingesamt enthält die Sammlung des Instituts acht Geflügelrotlaufstämme. Um ein Urteil über das Verwandtschaftsverhältnis dieser Stämme untereinander und zu den echten Schweinerotlaufbakterien zu gewinnen, wurde eine Reihe von vergleichenden Untersuchungen ausgeführt. Zur Untersuchung gelangten folgende Stämme:

Geflügelrotlaufbakterien:

1. Stamm Huhn 65 isoliert 1927
2. Stamm Perlhuhn 1122 isoliert 1927
3. Stamm Pute 1213 isoliert 1926
4. Stamm Pute 756 isoliert 1925
5. Stamm Taube 722 isoliert 1924
6. Stamm Taube 1025 isoliert 1927
7. Stamm Taube 1227 isoliert 1927
8. Stamm Ente 1139 isoliert 1919

Schweinerotlaufbakterien:

1. Stamm Schwein 14 isoliert 1917
2. Stamm Schwein 710 isoliert 1925
3. Stamm Schwein 1355 isoliert 1926
4. Stamm Schwein 1185 isoliert 1927
5. Stamm Schwein 1372 isoliert 1927
6. Stamm Schwein Fr. isoliert 1924

I. Morphologische Untersuchungen.

Bei den aus den verschiedenen Geflügelarten gezüchteten Bakterien handelt es sich um zarte, 0,8 bis 1,5 μ lange Stäbchen. Die Keime sind nicht begeißelt und bilden keine Sporen. In Übereinstimmung mit den Schweinerotlaufbakterien verhalten sie sich tinktoriell grampositiv. Wiederholt konnten in mikroskopischen Ausstrichpräparaten geringe, meist inkonstante Differenzen festgestellt werden. Sie äußerten sich darin, daß außer geraden dünnen Stäbchen auch kokkenartige Kurzstäbchen und spirillenförmig gewundene Fäden auftraten. Derartige Abweichungen waren aber durchaus nicht typisch für bestimmte Stämme. Vielmehr fanden sich die verschiedenen Formen meist bei den Bak-

terien ein und deselben Stammes und kamen sowohl bei den Geflügel- als auch bei den Schweinrotlaufstämmen vor. Das Auftreten der verschiedenen Formen ist z. T. auch durch das Alter der betreffenden Kultur bedingt. Untersucht man eine Bouillonkultur, wenn sie anfängt sich zu trüben, also nach einer Bebrütung von 9—10 Stunden, so zeigt das mikroskopische Bild vorwiegend dünne, zarte, sehr schlanke Stäbchen. Das gilt für beide Typen. Im schleimigen Bodensatz älterer Kulturen dagegen findet man sowohl bei Schweine-, als auch bei Geflügelrotlaufbakterien häufig, wenn auch durchaus nicht immer, längere Fäden, an denen die Zellgrenzen zwischen den einzelnen Bakterien nicht immer deutlich zu erkennen sind. Die Fäden verlaufen vielfach gewunden und können sich wie ein Netzwerk durchkreuzen. In älteren Kulturen tritt auch die zuerst von Rosenbach beschriebene Bildung von „Körnchen“ und hellen, ungefärbten Lücken innerhalb des Zelleibes („Ohren“) in die Erscheinung. Die Körnchen häufen sich um so mehr, je älter die Kultur ist und je mehr das Wachstum zum Stillstand kommt. Rosenbach ist der Ansicht, daß von diesen Körnchen die Bildung junger Stäbchen ausgehen kann. Er erblickt in ihnen daher eine Art Dauerform und bezeichnet sie im Sinne Fedorowitsch als „Proto-sporen“. Derartige Körnchen- und Ohrenformen konnten sowohl in alten Kulturen von Schweine- als auch von Geflügelrotlaufbakterien beobachtet werden.

Objektträgerausstriche aus Agarkultur boten ebenfalls keine konstanten morphologischen Unterschiede. Wenn auch die Bakterien der einzelnen Stämme sich weder in ihrer Länge noch in ihrer Dicke immer gleich verhielten, so reichten doch die geringen Unterschiede weder zu einer Differenzierung der einzelnen Stämme noch zu einer Unterscheidung zwischen den beiden Typen aus. Ähnlich wie in alten Bouillonkulturen traten auch in Agarkulturen nach durchschnittlich zwei Wochen sowohl bei den Schweine- als auch bei den Geflügelrotlaufstämmen die erwähnten Körnchen und Ohren auf.

Zusammenfassung: Morphologische und tinktorielle Unterschiede zwischen Schweine- und Geflügelrotlaufbakterien bestehen nicht.

II. Kulturelle Untersuchungen.

Als flüßiges Nährmedium diente vorwiegend Pferdefleischbouillon ohne Peptonzusatz mit einem pH -Gehalt von 7,6. Bouillonröhrchen wurden mit je einer Öse einer 48stündigen Bouillonkultur des betreffenden Stammes beimpft, drei Tage bebrütet und dann bei Zimmertemperatur aufbewahrt und beobachtet. Übereinstimmend begann sich bei allen Stämmen die Nährflüssigkeit nach etwa 9—12 Stunden Brutfrankaufenthalt leicht zu trüben. Die Trübung nahm im weiteren Verlauf der Bebrütung zu und erreichte ihr Maximum nach durchschnittlich 48 Stunden. Nennenswerte und demonstrierbare Unterschiede in der Intensität der Trübung konnten weder zwischen den einzelnen Stämmen noch zwischen den Kulturen der beiden Rotlauf-typen beobachtet werden. Nach 48 Stunden begann die Trübung allmählich an Stärke abzunehmen. Die Bakterien senken sich dann zu Boden und bilden einen schleimigen Bodensatz, der beim Schütteln der Röhrchen zopfartig aufwirbelt. Vollständige Klarheit der Bouillon wurde nur in einzelnen Fällen beobachtet und auch dann erst nach mehrwöchentlichem Aufenthalt der Kulturen bei Zimmertemperatur. Der Bodensatz war bei fast allen Kulturen in annähernd gleicher Menge vorhanden. Das Auftreten von hellen, fagoähnlichen Schleimkügelchen in alten Bouillonkulturen, die von Kitt und von Ziebert als „Streptotrix-form“ beschrieben sind, konnte nicht beobachtet werden. Durch Pepton- und Serumzusatz konnte das Wachstum beider Typen quantitativ ziemlich gleichmäßig gefördert werden. Das ist in der stärkeren Trübung der Serum- bzw.

Peptonbouillon im Vergleich mit den gewöhnlichen Bouillonkulturen deutlich zu erkennen.

Die Beimpfung von Gelatineplatten geschah in der Weise, daß ein Tropfen Bouillonkultur mit Hilfe eines leichten Drigalskipatels auf zwei im Eischrank gut gekühlte 12prozentige Gelatineplatten ausgestrichen wurde. Auf der ersten Platte entwickelt sich dann meistens ein sehr dichter, für die Untersuchung der Einzelkolonie unvorteilhafter Bakterienrasen; während auf der zweiten Platte Einzelkolonien sehr schön in die Erscheinung treten.

Sowohl die Schweine- als auch die Geflügelrotlaufstämme entwickeln auf der Gelatineplatte bei Zimmertemperatur von etwa 18—20 Grad nach 4—5 Tagen kleine, flockchen- oder schleierartige, zarte blaugraue und durchsichtige Kolonien, wie sie von Löffler, Lorenz, Preiß u. a. für das Schweinerotlaufbakterium beschrieben sind. Die Kolonien haben eine durchschnittliche Größe von 1—2 mm. Die Untersuchung der Kolonien mit schwachem Trockensystem läßt ein unregelmäßig granuliertes Zentrum erkennen, das sich nach der Peripherie zu in ein wirres, unregelmäßiges Fadengeflecht auflöst. Es wurden aber auch Wuchsformen beobachtet, die undeutliche Umrisse und ein außerordentlich zartes, flaches Wachstum zeigten. Wyszchelessky bezeichnet diese Form als die „nebelfleckartige“ im Gegensatz zu dem erstbeschriebenen „schnörkelförmigen“ Typus. Beide Kolonietypen sind sowohl bei den Schweine- als auch bei den Geflügelrotlaufstämmen beobachtet.

In Gelatinestickkulturen kann auch das Geflügelrotlaufbakterium, ähnlich wie das vom Schweinerotlaufbakterium bekannt ist (Preiß), in verschiedenen Formen wachsen. Meistens entwickeln sich am Stichkanal entlang in wenigen Tagen zunächst kleine, flockige oder runde, stecknadelkopfgroße, weiße Kolonien. Von hier aus beginnt nach etwa 5—7 Tagen das Seitenwachstum entweder in Form wagerechter büschelförmiger Ausläufer, die der Kultur das bekannte Aussehen einer Gläserbürste geben, oder in Form wolkiger Trübungen, die strukturlos sind und ohne sichtbare Grenzen im Nährboden ausklingen. Eine differenzialdiagnostische Bedeutung haben diese beiden Wuchsformen nicht. Die Beobachtung Poëls, daß Geflügelrotlaufbakterien im Gelatinestick einen weniger ausgesprochenen büstenförmigen Wuchs zeigen als Schweinerotlaufbakterien, konnte generell nicht bestätigt werden. Darin stimmen die Untersuchungen mit den Befunden von Eber und von Schipp überein. Verflüssigung der Gelatine wurde nicht beobachtet.

Auf Agar wachsen alle Stämme in Form der bekannten kleinen tautropfenähnlichen und durchsichtigen Kolonien. Durchgreifende Unterschiede konnten an ihnen weder makroskopisch noch mikroskopisch festgestellt werden. In Agarstickkulturen blieb die Entwicklung in allen Fällen auf den Stichkanal beschränkt. Ein sehr üppiges Wachstum entfalten die Stämme auf der Traubenzuckerblutagarplatte. Unterschiede zwischen den Wuchsformen der einzelnen Typen sind auch auf diesem Nährboden nicht beobachtet worden.

Zusammenfassung: Durchgreifende kulturelle Unterschiede zwischen Geflügel- und Schweinerotlaufbakterien konnten nicht festgestellt werden.

III. Biochemische Untersuchungen.

Ähnlich wie zur Differenzierung der Erreger der Coli-Typhusgruppe sind insbesondere von Ziebert verschiedene Zuckerarten und mehrwertige Alkohole zur Unterscheidung von Schweinerotlaufstämmen verschiedener Herkunft herangezogen. Dabei hat sich ergeben, daß das Rotlaufbakterium als schwacher Säurebildner anzusehen ist, der aus den verwendeten Pentosen, Hexosen und Disacchariden bei Anwesenheit von genügend Eiweiß Säure abzuspalten vermag. Unter den einzelnen Schweinerotlauf-

stämmen haben sich Unterschiede dabei nicht feststellen lassen. Wir konnten diese Befunde bestätigen und weiterhin feststellen, daß sich auch in dieser Beziehung Geflügelrotlaufbakterien genau wie Schweinestämme verhalten. Geprüft wurden die Stämme in ihrem Verhalten gegenüber Laktose, Maltose, Dextrose, Saccharose, Arabinose, Rhamnose, Mannit und Dulzit. Diese verschiedenen Zuckerarten und höheren Alkohole waren in 1prozentiger Konzentration zu einer als Nährflüssigkeit dienenden Serumbouillon hinzugesetzt, die als Indikator Lackmuslösung enthielt. Durchschnittlich trat nach 2—3 Tagen eine mehr oder minder starke Rotfärbung der Lackmuslösung ein, die am stärksten bei Laktose, am schwächsten bei Mannit und Dulzit in die Erscheinung trat.

In 5prozentiger Peptonbouillon bilden beide Rotlaufstypen Schwefelwasserstoff. Zum Nachweis des Schwefelwasserstoffs bedient man sich zweckmäßig des Bleizuckerpapierstreifens, den man zwischen den Wattestopfen einklemmt und frei ins Röhrchen hineinhängen läßt. Die infolge Bildung von Schwefelblei eintretende Bräunung des Streifens ist meist nach 24 Stunden deutlich zu erkennen.

Indolbildung konnte in Trypsinbouillon mit Hilfe von p-Dimethylamidobenzaldehyd in der Modifikation von Pringsheim in keinem Falle nachgewiesen werden.

Zusammenfassung: Geflügelrotlaufbakterien vermögen ebenso wie die Schweinerotlaufbakterien aus verschiedenen Zuckerarten und höheren Alkoholen Säure abzuspalten. Unterschiede in Bezug auf die Menge der produzierten Säure sind zwischen den beiden Typen nicht beobachtet. Die Eigenschaft, in peptonhaltigen Nährboden Schwefelwasserstoff zu bilden ist beiden Typen gemeinsam.

IV. Infektionsversuche.

Es ist bekannt, daß Rotlaufbakterien bei Züchtung außerhalb des Tierkörpers sehr bald an Pathogenität einbüßen. Trotzdem verwendeten Mäuse, die mit 0,01 ccm Bouillonkultur der verschiedenen, z. T. mehrere Jahre alten Stämme i. a. infiziert wurden, nach spätestens sechs Tagen an Rotlauf. Die mit den Geflügelstämmen Huhn 65, Pute 756, Taube 722 und Taube 1025 infizierten Mäuse verendeten bereits am dritten Tage post inf., die mit den Stämmen Perlhuhn 1122, Taube 1227 und Ente 1139 am vierten Tage nach der Infektion an septikämischem Rotlauf. Schweinerotlaufstämme töteten die Mäuse durchschnittlich etwas später, nämlich nach 4—6 Tagen. Daraus ergibt sich in Übereinstimmung mit den Befunden von Poels und Eber eine etwas höhere Virulenz der Geflügelrotlaufstämme gegenüber weißen Mäusen.

Meerschweinchen erwiesen sich als unempfindlich für beide Typen.

Kaninchen verendeten bei intravenöser Applikation von 1/100—1/200 Schrägagarkultur nach 3—4 Tagen an septikämischem Rotlauf. Entsprechend den Mäuseinfektionsversuchen erwiesen sich die Schweinerotlaufstämme auch gegenüber Kaninchen weniger virulent als die Geflügelrotlaufstämme. Sie töteten noch in einer Dosis von 1/50 Schrägagarkultur, aber nicht mehr in einer Dosis von 1/100 Kultur. Die Tiere verendeten 3—5 Tage post infektionem.

Zwei acht Wochen alte Schweine konnten subkutan weder durch die Geflügel- noch durch die Schweinerotlaufbakterien rotlaufkrank gemacht werden.

Tauben erwiesen sich als gleichmäßig empfänglich für beide Rotlaufstypen. Sie verendeten am dritten Tage nach der subkutanen Infektion mit 0,02 ccm Bouillonkultur. Eingehende vergleichende Virulenzprüfungen konnten aus Mangel an Versuchstieren leider nicht ausgeführt werden.

Es wurden des weiteren nur noch Infektionsversuche an Hühnern vorgenommen, die aber, obgleich den Tieren große Dosen (je 5 ccm Bouillonkultur s. k.) eingespritzt wurden, sowohl bei Verwendung von Geflügel-, als auch

von Schweinerotlaufstämmen ergebnislos verliefen. Gefunde Hühner sind also außerordentlich resistent gegenüber künstlichen Infektionen mit Rotlaufbakterien. Diese natürliche Widerstandsfähigkeit der Hühner kann, wie Schipp gezeigt hat, nur durch sehr eingreifende Schädigungen des Gesamtorganismus gebrochen werden. Schipp konnte derart künstlich schwer geschädigte Hühner bei Verwendung hoher Dosen tödlich mit Rotlauf infizieren. Die Tiere verendeten bei Infektionen mit Schweinerotlaufbakterien nach 14 Tagen.

Das Sektionsbild der infolge der Infektion verendeten Tiere wies bei den beiden Rotlaufstypen weitgehende Übereinstimmung auf. Bei Mäusen imponierte vor allen Dingen der meist stark ausgeprägte Milztumor, bei Kaninchen außerdem die zahlreichen subserösen Blutungen. Bei dem an Rotlauf verendeten Geflügel sind hauptsächlich Blutungen am Herzen, Darmentzündung und Schwellung der Leber beobachtet.

Zusammenfassung: Geflügelrotlaufbakterien zeigten im Infektionsversuch gegenüber weißen Mäusen und Kaninchen eine etwas höhere Virulenz als Schweinerotlaufbakterien.

V. Vergleichende Untersuchungen über die Antigennatur von Geflügel- und Schweinerotlaufbakterien.

a) Agglutinationsversuche.

Die Agglutinationsmethode, die in der Paratyphusforschung am sichersten die Trennung zwischen zwei Typen ermöglicht, ist auch zum Nachweis von Unterschieden zwischen Schweinerotlaufstämmen verschiedener Herkunft wiederholt herangezogen (Teichmann, Bruynoghe und Leynen). Dabei hat sich stets ergeben, daß sich Schweinerotlaufstämme agglutinatorisch gleichartig verhalten. Ebenfalls hat sich auf Grund der bisher angestellten Agglutinationsversuche ein Unterschied zwischen Schweine- und Geflügelrotlaufstämmen nicht ermitteln lassen (Schipp, Broll, Pfaff). Poels konnte allerdings bei seinen aus Enten gezüchteten Stämmen eine geringe Abweichung bemerken. Sie wurden durch Schweinerotlaufantiserum noch in starker Verdünnung agglutiniert, jedoch trat die Agglutination später ein als bei echten Schweinerotlaufstämmen. Eber konnte diese Beobachtung bestätigen. In allen Untersuchungen wurde aber mit verhältnismäßig niedrig titrierten Seren gearbeitet.

Zur Herstellung hochwertiger, agglutinierender Sera wurden Kaninchen mit Abschwemmungen von Schrägagarkulturen in physiologischer Kochsalzlösung intravenös vorbehandelt. Die Tiere bekamen als erste Dosen 1/200 Kultur lebend und erhielten dann in Zwischenräumen von 1 Woche jeweils die doppelte Kulturmenge wie bei der vorhergehenden Behandlung. Die Vorbehandlung der Kaninchen wurde solange fortgesetzt, bis sie das 100fache tödliche Dosis reaktionslos vertrugen. Das war nach 7—8maliger Vorbehandlung mit steigenden Dosen der Fall. Auf diese Weise wurde, nach vielen Mißerfolgen, ein Geflügelrotlauffserum K 13 und ein Schweinerotlauffserum K 31 gewonnen. Außer diesen beiden Seren wurde noch ein aus dem freien Handel bezogenes Schweinerotlauffserum „Br“ verwendet. Als Testflüssigkeit diente 24stündige Bouillonkultur, der 0,5 Prozent Karbolsäure zugesetzt war. Agarkulturbeschwemmungen erwiesen sich dazu als unbrauchbar. Entweder gelang es damit überhaupt nicht, eine gleichmäßige Suspension zu bekommen, oder aber es trat nach einigen Stunden Spontanagglutination ein. Aber auch bei Verwendung von Bouillonkulturen als Testflüssigkeit trat bei einer Anzahl von Stämmen trotz Umzüchtung und Tierpassagen immer wieder Spontanagglutination ein (Pute 1213, Pute 756, Taube 722, Taube 1227, Schwein 710). Für die Beurteilung der Agglutination waren diese Stämme somit wertlos. Das Ergebnis der Agglutination der übrigen Stämme ist aus Tabelle 1 zu ersehen.

Die Agglutinationsprüfung ist in jedem Falle zweimal durchgeführt worden.

Tabelle 1.

Rotlaufstamm	Agglutiniert mit:		
	G. R. K 13	S. R. K 31	S. R. Br.
Huhn 65	25 600	25 600	25 600
Perlhuhn 1122	25 600	6 400	12 800
Taube 1025	800	1 600	—
Ente 1139	12 800	12 800	6 400
Schwein H 14	6 400	3 200	3 200
" 1355	12 800	12 800	12 800
" 1185	6 400	12 800	3 200
" 1372	3 200	3 200	3 200
" Fr	25 600	3 200	25 600

(G.R. = Geflügelrotlaufferum; S.R. = Schweinerotlaufferum).

Irgendwelche differentialdiagnostisch verwertbaren Schlüsse sind aus den Agglutinationsversuchen nicht zu ziehen. Geflügelrotlaufstämme können durch Schweinerotlaufantiseren genau so hoch agglutiniert werden wie Schweinerotlaufstämme und umgekehrt. Auffallend ist die teilweise außerordentlich starke Unregelmäßigkeit in der Höhe der Agglutination der einzelnen Stämme mit den verschiedenen Seren.

b) Immunisierungsversuche.

Als Antiseren dienten die zu den Agglutinationsversuchen verwendeten Sera, deren Herstellung beschrieben ist. Die Sera wurden sowohl auf ihre Schutzkraft gegenüber gleichartigen als auch gegenüber ungleichartigen Rotlaufstämmen geprüft. Mäuse erhielten subkutan fallende Verdünnungen des betreffenden Serums und wurden nach 24 Stunden mit 0,01 ccm Bouillonkultur i. a. infiziert (Tabelle 2—4).

Tabelle 2.

Vorbehandlung von Mäusen mit Geflügelrotlaufferum K 13.

Infektion 24 Stunden nach der Vorbehandlung.

Vorbehandelt mit	Infiziert mit 0,01 ccm einer 24 Stunden alten Bouillonkultur von:					
	S. R. Fr	S. R. H 14	S. R. 1185	G. R. Huhn 65	G. R. Pute 756	G. R. Taube 1025
0,02 ccm Serum K 13 sk.	607 0	613 0	619 0	625 0	631 0	637 0
0,015 "	608 0	614 0	620 0	626 0	632 0	638 0
0,01 "	609 0	615 0	621 † n. 7 Tag.	627 0	633 0	639 † n. 5 Tag.
0,0075 "	610 † n. 5 Tag.	616 0	622 † n. 5 Tag.	628 † n. 6 Tag.	634 0	640 † n. 5 Tag.
0,005 "	611 † n. 4 Tag.	617 † n. 5 Tag.	623 † n. 5 Tag.	629 † n. 5 Tag.	635 † n. 5 Tag.	641 † n. 4 Tag.
Kontrolle	612 † n. 4 Tag.	618 † n. 4 Tag.	624 † n. 4 Tag.	630 † n. 3 Tag.	636 † n. 3 Tag.	642 † n. 3 Tag.

Zeichen: S.R. = Schweinerotlauf; G.R. = Geflügelrotlauf; 0 = Tiere bleiben am Leben; † = Tiere verenden am Rotlauf; 607 ufw. = Nr. der Mäuse.

Ergebnis: Das Geflügelrotlaufferum K 13 schützte weiße Mäuse gegen die tödliche Infektion mit dem Rotlaufstamm

Schwein H 14 u. Pute 756 in einer Dosis von 0,0075 ccm (= 150fach),

Schwein Fr und Huhn 65 in einer Dosis von 0,01 ccm (= 100fach),

Schwein 1185 und Taube 1025 in einer Dosis von 0,015 ccm (= 75fach).

Tabelle 3.

Vorbehandlung von Mäusen mit Schweinerotlaufferum K. 31.

Infektion 24 Stunden nach der Vorbehandlung.

Vorbehandelt mit	Infiziert mit 0,01 ccm einer 24 Stunden alten Bouillonkultur von:					
	S. R. Fr	S. R. H 14	S. R. 1185	G. R. Huhn 65	G. R. Pute 756	G. R. Taube 1025
0,02 ccm Serum K 31 sk.	656 0	662 0	668 0	674 0	680 0	686 0
0,015 "	657 0	663 0	669 0	675 0	681 0	687 0
0,01 "	658 0	664 0	670 0	676 0	682 0	688 0
0,0075 "	659 0	665 0	671 † n. 7 Tag.	677 † n. 7 Tag.	683 0	689 † n. 7 Tag.
0,005 "	660 0	666 0	672 † n. 6 Tag.	678 † n. 6 Tag.	684 0	690 † n. 5 Tag.
Kontrolle	661 † n. 4 Tag.	667 † n. 4 Tag.	673 † n. 4 Tag.	679 † n. 3 Tag.	685 † n. 3 Tag.	691 † n. 6 Tag.

Ergebnis: Das Geflügelrotlaufferum K 31 schützte weiße Mäuse gegen die tödliche Infektion mit dem Rotlaufstamm

Schwein Fr, Schwein H 14 und Pute 756 in einer Dosis von 0,05 ccm (= 200fach),

Schwein 1185, Huhn 65 und Taube 1025 in einer Dosis von 0,0075 ccm (= 150fach).

Tabelle 4.

Vorbehandlung von Mäusen mit dem Handelsrotlaufferum „Br“.

Infektion 24 Stunden nach der Vorbehandlung.

Vorbehandelt mit	Infiziert mit 0,01 ccm einer 24 Stunden alten Bouillonkultur von:					
	S. R. Fr	S. R. H 14	S. R. 1185	G. R. Huhn 65	G. R. Pute 756	G. R. Taube 1025
0,02 ccm Serum Br sk.	571 0	577 0	583 0	589 † n. 6 Tag.	595 0	601 0
0,015 "	572 0	578 0	584 † n. 6 Tag.	590 † n. 6 Tag.	596 † n. 6 Tag.	602 0
0,01 "	573 † n. 6 Tag.	579 0	585 † n. 6 Tag.	591 † n. 5 Tag.	597 † n. 6 Tag.	603 † n. 7 Tag.

Vor- behandelt mit	Infiziert mit 0,01 ccm einer 24 Stunden alten Bouillonkultur von:					
	S. R. Fr	S. R. H 14	S. R. 1185	G. R. Huhn 65	G. R. Pute 756	G. R. Taube 1025
0,0075 "	574 † n. 6 Tag.	580 0	586 † n. 5 Tag.	592 † n. 5 Tag.	598 † n. 5 Tag.	604 † n. 6 Tag.
0,005 "	575 † n. 5 Tag.	581 † n. 5 Tag.	587 † n. 4 Tag.	593 † n. 4 Tag.	599 † n. 4 Tag.	605 † n. 5 Tag.
Kontrolle	576 † n. 4 Tag.	582 † n. 4 Tag.	588 † n. 4 Tag.	594 † n. 3 Tag.	600 † n. 3 Tag.	606 † n. 3 Tag.

Ergebnis: Das Handelsrotlauffserum „Br“ schützte weiße Mäuse gegen die tödliche Infektion mit dem Rotlaufstamm

Schwein H 14 in einer Dosis von 0,0075 ccm (= 150fach),
Schwein Fr und Taube 1025 in einer Dosis von 0,015
(= 75 fach),

Schwein 1185 und Pute 756 in einer Dosis von 0,02
(= 50fach),

Huhn 65 nicht in einer Dosis von 0,02 ccm.

Die Versuche zeigen zunächst, daß die Schutzkraft eines Serums verschieden groß ist gegenüber den einzelnen Rotlaufstämmen ungeachtet deren Typenzugehörigkeit. Im übrigen haben aber auch diese Versuche keine Unterschiede zwischen Geflügel- und Schweinerotlaufbakterien erkennen lassen. Die verwendeten Sera vermochten Infektionen mit beiden Rotlaufstypen zu paralisieren.

Zusammenfassung: Vergleichende Agglutinations- und Immunisierungsversuche haben Unterschiede in der Antigenatur von Geflügel- und Schweinerotlaufbakterien nicht erkennen lassen.

VI. Versuche mit dem Rotlauflysät 1383.

Im Jahre 1924 ist es Mießner und Baars gelungen, durch Filtration des Darminhalts eines an Rotlauf erkrankten Schweines einen spezifischen Rotlaufbakteriophagen zu gewinnen. Die bakteriolytische Wirkung des Filtrates erstreckte sich außer auf den aus dem gleichen Tierkörper isolierten Rotlaufstamm 1383, auf dem es seine höchste Wirksamkeit entfaltete, auch auf andere Schweinerotlaufstämme. Paratyphusbakterien, Streptokokken und Staphylokokken wurden von dem Lysat nicht angegriffen. Die Wirkung dieses artspezifischen Rotlauflysates auf Geflügelrotlaufbakterien wurde geprüft, um aus dem Verhalten gegenüber den beiden Rotlaufstypen Rückschlüsse auf die Verwandtschaftsverhältnisse beider Erreger ziehen zu können. Das Rotlauflysät 1383 wurde vom Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover in liebenswürdiger Weise bereitwilligst zur Verfügung gestellt.

Zum Nachweis der lytischen Fähigkeit des Filtrates wurde sowohl der Bouillonkulturversuch als auch das Plattenkulturverfahren (Aufropfmethode) herangezogen.

In den Bouillonkulturversuchen wurden frisch mit Rotlaufbakterien beimpfte Bouillonröhrchen mit je einem Tropfen Lysat versetzt. Zur Kontrolle dienten Bouillonkulturrohre ohne Filtrat-zufuhr. Nach einem 24-stündigen Brutfrankaufenthalt waren die mit Filtrat versetzten Röhrchen vollständig klar, die Kontrollröhrchen stark getrübt. In den meisten Fällen blieben die Röhrchen auch bei längerem Brutfrankaufenthalt (bis zehn Tage) klar, einige Stämme begannen aber die Bouillon nach drei bis vier Tagen leicht zu trüben (Pute 756, Taube 722, Ente

1139, Schwein H 14, 1355, 1185, Fr). Es gelang durch Passagezüchtungen die Wirkung des Lysates gegenüber zwei Geflügelrotlaufstämmen (Huhn 65, Pute 756) so zu steigern, daß die Bouillonröhrchen dauernd klar blieben. In den übrigen Fällen konnte auch nach mehreren Passagezüchtungen eine nennenswerte Steigerung der lytischen Wirkung nicht beobachtet werden.

In den Plattenkulturversuchen wurde als Nährsubstrat die Traubenzuckerblutagarplatte verwendet. Die Platten wurden mit Hilfe eines Drigalskipatels gleichmäßig mit 24stündiger Rotlaufbouillonkultur beimpft und gleich danach mit einem Tropfen Lysat beschriftet. Nach 24 Stunden war die Tropfenspur in allen Fällen frei von Rotlaufkolonien.

Zusammenfassung: Die bakteriolytische Wirkung des Rotlauflysates 1383 erstreckt sich gleichmäßig auf Schweine- und Geflügelrotlaufbakterien.

Schlußbetrachtung.

Durch morphologische, kulturelle und biochemische Untersuchungen konnten Unterschiede zwischen Schweine- und Geflügelrotlaufbakterien nicht festgestellt werden. Lediglich Pathogenitätsprüfungen an weißen Mäusen und Kaninchen haben eine etwas höhere Virulenz der Geflügelrotlaufbakterien erkennen lassen. Zu einer Trennung der beiden Typen reichen diese geringen Unterschiede aber nicht aus. Da sich Schweine- und Geflügelrotlaufbakterien weiterhin auch agglutinatorisch, immunisatorisch und gegenüber einem spezifischen Rotlauflysät gleichartig verhielten, müssen sie als identisch betrachtet werden.

Literatur.

Broll, Über das Vorkommen von rotlaufähnlichen Bakterien beim Rinde und Huhne. B. T. W. 1911, S. 41. Bruynoghe und Leynen, Recherches bactériologiques exécutées au sujet d'une épidémie porcine. Rf. Zbl. f. Bakt. Ref. Bd. 73, S. 408. Eber, Geflügelrotlauf (Rotlauffebris der Vögel) D. T. W. 1921, S. 295. Fedorowitsch, Über die Körnigkeit der Bakterien. Zbl. f. Bakt. II. Abt. 1902, S. 489. Jarmai, Das Vorkommen der Rotlaufbakterien bei Vögeln (Allatorvosi Lapok 1919 Nr. 8). Ref. B. T. W. 1920, S. 17. Jarosch, Über Septikämie der Truthühner. Ostr. Monatschrift für Tierheilkunde 1905, Bd. 29, S. 197. Kitt, Die Streptotrixform des Rotlaufbazillus. Zbl. f. Bakt. O. 1897, Bd. 22, S. 726. Loeffler, Experimentelle Untersuchungen über Schweinerotlauf. A. a. d. K. G. A. 1886, Bd. 1, S. 46. Lorenz, Beobachtungen über die Mikroorganismen des Schweinerotlaufs und verwandter Krankheiten. Arch. für wiss. und prakt. Tierheilkunde 1892, Bd. 18, S. 39. Mießner u. Baars, Das d'Hérèllesche Phänomen an Rotlaufbakterien. Zbl. für Bakt. I. O. 1924, Bd. 93, S. 131. Pfaff, Schweinerotlaufbakterien als Erreger einer chronischen Hühnerfeuche. Z. f. Infekt. der Haust. 1921, 22, S. 293. Poels, Rotlauf bei Tauben und Enten und Stammesunterschiede bei Rotlaufbazillen. Fol. Microb. Bd. 5, 1917, S. 1. Ref. D. T. W. 1919, S. 6. Preiß, Rotlauf der Schweine i. Kolle-Wassermann Hdb. d. pathog. Mikroorg. 1913, Bd. 6, S. 1. Pringsheim, s. Kraus-Uhlenhuth, Hdb. d. mikrob. Techn. 1923, Bd. II, S. 1253. Rosenbach, Experimentelle, morphologische und klinische Studien über die Krankheitserregenden Mikroorganismen des Schweinerotlaufs, des Erysipels und der Mäufepfeis. Z. f. Hyg. 1909, 63, S. 343. Schipp, Zur Biologie des Schweinerotlaufbazillus und zweier, morphologisch gleicher Septikämieerreger. D. T. W. 1910, S. 97. Teichmann, Über die antigenen Eigenschaften des Schweinerotlaufbazillus. W. T. M. 1922, S. 433. Wschelessky, Bemerkenswerte Befunde bezüglich des Wachstums des Bazillus des Schweinerotlaufs. Z. f. Infekt. der Haust. 1912, S. 43. Zibert, Morphologisch-biologische Studien über den Schweinerotlaufbazillus. W. T. M. 1922, S. 396. Zosel, Über den mikroskopischen Aufbau der Oberflächen- und Tiefenkolonien des Schweinerotlaufbazillus auf Agar und Gelatine. W. T. M. 1922, S. 408.

(Aus dem Tierfeucheninstitut der Universität Leipzig. — Direktor: Prof. Dr. Eber.)

Über die Magenrichstrongylose der Schafe.

(Mit 7 Abbildungen.)

Von Dr. C. Sprehn.

Unter den im Labmagen der Schafe schmarotzenden Trichostongyliden ist nach der vorliegenden einschlägigen Literatur in erster Linie *Haemonchus contortus* (Rudolphi, 1803) als Erreger der Magenwurmfeuche der Schafe gefürchtet. Im Gegensatz hierzu konnte ich erstmalig im Frühling und Sommer 1925, als ich Gelegenheit hatte, viele Schafherden daraufhin zu untersuchen und sehr viele Sektionen auszuführen, die Beobachtung machen, daß, wenigstens in Süd- und Mitteldeutschland, viel kleinere Trichostongyliden aus dem Genus *Ostertagia* als Erreger einer schweren Magenwurmfeuche in Frage kommen. Seit jener Zeit habe ich diese Beobachtungen sehr oft bestätigt gefunden. In Süd- und Westdeutschland wurde allein im Jahre 1925 in 15 Herden mit Magenwurmfeuche nur einmal als Erreger *Haemonchus contortus*, 14 mal dagegen *Ostertagia*-Arten festgestellt.

Die in dem angegebenen Jahre in derselben Gegend ausgeführten Sektionen von nicht an Magenwurmkrankheit leidenden Schafen ergaben, daß *Ostertagia*-Arten die häufigsten Magennematoden bei Schafen sind. Bei 47 Sektionen in den Monaten März und April wurden zum Beispiel zum Genus *Ostertagia* gehörige Nematoden 42 mal, das heißt bei 89,4 Prozent der seziierten Tiere, gefunden. *Haemonchus contortus* wurde nur 17 mal, das heißt in 36,2 Prozent der Fälle, nachgewiesen. Dabei war die Zahl der in jedem Fall gefundenen *Ostertagia* (immer mehr als 100) stets erheblich größer als die der *Haemonchus* (stets unter 100). Beide Parasiten vergesellschaftet wurden in 16 Fällen, das heißt also in 34 Prozent, gefunden.

Interessant ist ein Fund aus dem Jahre 1927, bei dem ich in Tieren aus einer Schafherde aus Sachsen dieselben Trichostongyliden im Dickdarm der Tiere fand. Auch in diesem Fall hatten sie eine feuchenartig auftretende Darmtrichostongylose verursacht.


Der Erreger der von mir beobachteten Magenwurmfeuche der Schafe wurde stets in sehr großer Zahl (viele Hundert, ja Tausend Würmer) auf der Schleimhaut des Labmagens gefunden. Bei den kurz nach dem Tode zur Sektion gekommenen Tieren, sah man in der Regel die ganze Schleimhaut mit einer rötlich gefärbten, in ständiger Bewegung befindlichen, schleimigen Masse bedeckt, die sich bei näherer Untersuchung als eine zusammenhängende Schicht des fraglichen Parasiten erwies. Auch der in schweren Fällen ebenfalls rötlich gefärbte Mageninhalt enthielt dieselben aus Nematoden bestehenden Massen.

Der Wurm selbst ist fadenförmig dünn, nach vorne zugespitzt, mit kleiner rudimentärer Mundkapfel versehen und zeigt eine doppelte weibliche Genitalanlage. Diese Charaktere lassen ihn als zur Familie Trichostongylidae Leiper, 1912 und zur Unterfamilie Trichostongylinae Leiper, 1908 gehörig erkennen.



Der fymmetrisch gelegene dorsale Bursallappen der Bursa copulatrix des Männchens und das Vorhandensein einer akzefforischen Bursalmembran beweisen seine Zugehörigkeit zum Genus *Ostertagia* Ransom, 1907.

Der Kopf des Wurmes hat einen mittleren Durchmesser von 0,015 mm, der Mund ist anscheinend von sechs kleinen Papillen umgeben (s. Fig. 1). Etwas hinter der Mitte des im Durchschnitt 0,5 mm langen und leicht flaschenförmigen Oesophagus liegt ca. 0,28 mm hinter dem Vorderende jederseits lateral je eine deutliche Zervikalpapille (s. Fig. 1). Der Oesophagus hat in seinem Vorderende einen Durchmesser von ca. 0,01 mm, der nach hinten zu bis auf etwa 0,05 mm zunimmt. Unmittelbar vor seiner Mitte liegt der Nervenring und in derselben Ebene, ventral gelegen, der Exkretionsporus.

Das Männchen ist 8–11 mm lang und ca. 0,1 mm breit. Das Hinterende trägt eine verhältnismäßig große Bursa copulatrix (s. Fig. 2), die aus zwei großen lateralen und einem kleinen, nur wenig von diesen abgesetztem, dorsalen Lappen mit kleinem mittlerem Einschnitt besteht.

Fig. 1. *Ostertagia circumcincta*, Weibchen, Vorderende.Fig. 2. *Ostertagia circumcincta*, Männchen, Hinterende.

Die ventro-ventralen und latero-ventralen Rippen liegen dicht zusammen und parallel. Ebenso verhalten sich die folgenden externo-laterale und medio-laterale Rippen, deren Spitzen aber divergieren. Die posterior-laterale Rippen liegen von den übrigen lateralen Rippen getrennt. Auch die ziemlich stark entwickelten externo-dorsalen Rippen entspringen nicht aus dem gemeinsamen Stamm der dorsalen Rippen, zu dem diese in ihrer proximalen Hälfte vereinigt sind. Die distalen freien Hälften der dorsalen Rippen geben im letzten Drittel je einen kurzen lateralen Zweig ab und spalten sich distal von dieser Verzweigungsstelle nochmals in zwei kurze Endäste.

Fig. 3. *Ostertagia circumcincta*, Weibchen, Hinterende.Fig. 4. *Ostertagia circumcincta*, Weibchen, Vulvagegend.

Die an der dorsalen Wurzel der Bursa gelegene akzefforische Bursalmembran wird von zwei kurzen divergierenden Rippen gestützt.

Kranial von der Bursa befinden sich lateral je eine Präbursalpapille. Die verhältnismäßig langen und gleichen Spikula messen ca. 0,3 mm und laufen distal in zwei Fortsätze aus, von denen der eine median gelegen und spitz, der andere lateral und verhältnismäßig dick ausgebildet ist. Er trägt an seinem distalen Ende eine schuhförmige, chitinige Kappe. Zwischen den beiden Spikula liegt das ca. 0,09 mm lange und 0,03 mm breite Gubernakulum, das distal ziemlich spitz ausläuft.

Das Weibchen ist 10—13 mm lang und ca. 0,14 mm dick. Das konische Hinterende zeigt kurz vor der Spitze eine Verdickung mit 3—5 deutlichen Kutikularringen (s. Fig. 3). Der Anus liegt ca. 0,15 mm, die Vulva, die in der Regel von einer häutigen Vorderlippe kappenartig überdeckt wird, meist 2 mm vor dem Hinterende (s. Fig. 4). Die Vagina führt in den durch zwei deutliche Schließmuskel von den Uteri abgesetzten Ovijector (s. Fig. 6).

Die Eier, die auf dem Stadium beginnender Furchung abgelegt werden, sind dünnförmig und messen 0,075—0,1 : 0,035—0,05 mm.

Auf Grund dieses Befundes besteht kein Zweifel, daß der gefundene Wurm mit *Ostertagia circumcincta* (Stadelmann, 1894) Ransom, 1907 identisch ist.*)

In der Literatur ist dieser Nematode auch unter den folgenden Namen bekannt: *Strongylus vicarius* Stadelmann, 1893; *Strongylus circumcinctus* Stadelmann, 1894, *Strongylus cervicornis* McFadyean, 1897; *Strongylus instabilis* Raillet, 1893 part. (z. B. Julien, 1897).

Als Wirtstiere des Parasiten sind außer dem Schaf noch die Ziege und einige Antilopenarten festgestellt worden.

Sein Vorkommen ist bekannt aus Nord- und Südamerika, Neuseeland, Australien und Europa.

Mit der eben beschriebenen *Ostertagia circumcincta* war immer, wenn auch in der Regel nur in geringer Menge, eine andere *Ostertagia*-Art vergesellschaftet, die ich als *Ostertagia trifurcata* Ransom, 1907 bestimmen konnte.

Dieser dem eben beschriebenen Wurm sehr ähnliche *Trichostrongylus* weicht vor allem im Bau seiner Bursa und seiner Spikula erheblich von der gegebenen Beschreibung ab.

Die distalen freien Enden der dorsalen Rippen laufen hier in eine langausgezogene Spitze aus, die einen dünnen Spitzen, häufig fehlenden

medianen und etwas proximal davon einen größeren lateralen Fortsatz abgibt (s. Fig. 5). Die Rippen der akzessorischen Bursalmembran sind bedeutend länger als bei *Ostertagia circumcincta* und leicht lyraförmig gebogen. Am ausgeprägtesten ist der Unterschied im Bau der Spikula. Diese sind bei der vorliegenden Art viel gedrungener als bei der oben beschriebenen und nur ca. 0,16 mm lang. Sie laufen distal in drei Fortsätze aus, von denen zwei kurze und spitze medianwärts sich im letzten Drittel etwa abzweigen. Die dritten langen und dicken Fortsätze, die in der Hauptachse der Spikula liegen, tragen an ihrem distalen Ende ebenfalls eine schuhförmige chitinige Kappe. Das Weibchen hat in der Regel keine lippenartige Bedeckung der Vulva (s. Fig. 6) und ihm fehlen auch die Querringe kurz vor dem Hinterende (s. Fig. 7).

Als Wirt dieses Parasiten ist neben dem Schaf ebenfalls die Ziege bekannt. Sein Vorkommen ist außer aus Europa (in Deutschland ist er bisher nicht gemeldet) auch aus Nord- und Südamerika bekannt.

Über die Entwicklung der beiden eben beschriebenen *Ostertagia*-Arten ist im Speziellen noch wenig bekannt. Unter günstigen Feuchtigkeits-, Sauerstoff- und Temperaturbedingungen entwickeln sich in den mit dem Kot der Schafe abgehenden Eiern sehr schnell die Embryonen. Diese vollenden nach meinen bisher leider nur in zwei Fällen möglich gewesen Ver suchen noch in der Eihülle ihre erste Häutung. Ein ganz ähnliches Verhalten fand Seurat (1907) für *Ostertagia marshalli* Ransom, 1907. In den auf 25 Grad C Brutfranktemperatur gehaltenen Kulturschalen schlüpften die Larven auf diesem Stadium aus, traten nach 3—4 Tagen in das Stadium der zweiten Häutung. Die alte Larvenhaut wurde hierbei in der Regel nicht abgeworfen, sondern blieb als Schutzhülle gewissermaßen um die Larve auf dem dritten Stadium bestehen. Die nach dieser Häutung nunmehr invasionsstüchtigen Larven werden hierdurch recht widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Über das Eindringen der Larven in den Wirt und ihre Weiterentwicklung in diesem liegen auf exakten Versuchen basierende Angaben bisher nicht vor, wenigstens nicht bei dem richtigen Wirt.

Zum Zustandekommen des typischen Bildes der **Magenwurmkrankheit** ist stets die Gegenwart einer großen Anzahl (viele Hundert) der beschriebenen Würmer im Labmagen Vorbedingung. Ist diese gegeben, so dürfte die krankmachende Wirkung der Parasiten auf zwei Umstände in der Hauptsache zurückzuführen sein. Einmal schädigen sie das Wirtstier direkt durch Blutentziehung, da sie als richtige Blutfänger anzusehen sind. Sie setzen bei dieser Gelegenheit außerdem viele kleine Wunden auf der Labmagenschleimhaut, die ihrerseits wieder die Entstehung sekundärer bakterieller Infektionen begünstigen. Sodann aber schädigen sie ihren Wirt in erster Linie durch Ausscheidung gewisser Giftstoffe, wie das bei Eingeweidewürmern ja recht häufig der Fall ist.

Die pathologisch anatomischen Veränderungen an der Labmagenschleimhaut selbst sind in der Regel nicht sehr hochgradig. Es besteht im allgemeinen lediglich eine akute oder chronische katarrhalische Entzündung. Nicht selten sind punktförmige kleine Blutungen über die ganze Schleimhautoberfläche verteilt. Knötchenbildung, wie sie bei *Ostertagia ostertagi* Invasion des Rindes beobachtet wird, konnte ich bei Schafen nie feststellen.

Die klinischen Erscheinungen (Ernährungsstörungen, Fraßunlust, Mattigkeit, Durchfall, Anämie usw.) sind so unbestimmt, daß sie allein nicht die Diagnose „Magenwurmkrankheit“ gestatten.

Zur Diagnose ist stets der Nachweis der Würmer im Labmagen durch die Sektion oder aber ihrer Eier durch die Kotuntersuchung unerlässlich.

Beim Vorliegen der Krankheit findet man die oben beschriebenen Eier des Parasiten in großer Menge im Kot der befallenen Tiere. Um magenwurmkrank Tiere als solche zu erkennen, genügt in der Regel die einfache Untersuchung eines minimalen Kottelchens mit etwas Wasser auf einem Objektträger zerrieben bei mittleren mikroskopischen Ver-




Fig. 5.
Ostertagia trifurcata,
Männchen, Hinterende.

Fig. 7.
Ostertagia trifurcata,
Weibchen, Hinterende.

Fig. 6. *Ostertagia trifurcata*, Weibchen, Vulvagegend.

*) Da in der einschlägigen deutschen Literatur bisher eine moderne und genauere Beschreibung dieses wichtigen Wurmes fehlt, habe ich ihn eingehend abgehandelt. Dasselbe gilt auch für den folgenden Nematoden, der bisher aus deutschen Wirtstieren überhaupt noch nicht beschrieben ist.

größerungen. Nur wenn es darauf ankommt festzustellen, ob ein Tier ganz frei von Parasiten ist, muß zur Untersuchung mit Anreicherungsverfahren (am besten dem bewährten Kochsalzverfahren) geschritten werden.

Differentialdiagnostisch ist die Unterscheidung der im Kot auftretenden Eier von denen des anderen wichtigen Schafmagenmagnetoden *Haemonchus contortus* von Bedeutung, da die Therapie in beiden Fällen, wie ich gleich zeigen werde, nicht dieselbe ist. Im allgemeinen sind die *Ostertagia*-Eier im Kot etwas schlanker, noch „dünn-schaliger“ und meist in weiter vorgeschrittenen Furchungsstadien als die *Haemonchus*-Eier.

Bezüglich der Therapie weist die von mir beobachtete Magentrichostrongylose der Schafe, die durch *Ostertagia circumcincta* bedingt wird, gegenüber der durch *Haemonchus contortus* verurachten beachtenswerte Unterschiede auf.

Von den vielen gegen die Magenwurmkrankheit empfohlenen Mitteln hat sich am besten Kupfersulfat bzw. ein Gemisch von Kupfersulfat und Natrium arsenicosum 4:1 bewährt. [Veglia (1918) u. a.]. Auch Tabak ist vielfach mit gutem Erfolg angewandt worden. Leider verlagen, wie mir eigene helminthologisch-therapeutische Versuche gezeigt haben, diese, sowie auch alle anderen in der einschlägigen Literatur empfohlenen Mittel vollständig bei der durch *Ostertagia circumcincta* verurachten Magentrichostrongylose. Bisher ist mir kein Mittel bekannt, daß diese Würmer in nennenswertem Maße abzutreiben imstande ist.

Literatur.

- Boulenger, C. L. (1914): A list of nematode parasites observed in the alimentary canal of sheep in England. *Parasitology*, Bd. 7, S. 240 bis 249, Taf. 19. Derselbe (1915): The life history of *Nematodirus filicollis* Rud., a nematode parasite of the sheep's intestine. *Parasitology*, Bd. 8, S. 133. Cameron, T. W. M. (1923): Studies on two new genera and some little known species of the nematode family Trichostrongylidae Leiper. *Journ. helminthology*, Bd. 1, S. 71—96. Derselbe (1923): On the intestinal parasites of sheep and other ruminants in Scotland. *Journ. helminthology*, Bd. 1, S. 53—60. Derselbe (1927): On *Microstrongylus genettæ* gen. and sp. nov., a trichostrongyle parasite of *Genetta senegalensis*. *Journ. helminthology*, Bd. 5, S. 81 bis 88, Fig. 1—6. Cave, S. (1914): A note on the presence of *Ostertagia trifurcata* in the abomasum of a sheep in England. *Parasitology*, Bd. 7, S. 201—203, 3 Fig. Fiebiger, I. (1923): Die tierischen Parasiten der Haus- und Nutztiere sowie des Menschen. 2. Aufl., Wien. Besonders S. 280. Gardener (1911): *Journ. of the South Eastern agricultural College*, Wye, S. 484. Green, H. H. (1918): Fate of ingested and injected arsenic in sheep with special reference to treatment of *Haemonchosis*. 5. und 6. reports of the Director of veter. res. Guberlet, J. E. (1921): Studies on the sheep stomach worm *Haemonchus contortus* Rud. *Journ. amer. vet. med. assoc.*, 1—6. Hutyrá, F. v. und Marek, J. (1922): Spezielle Pathologie und Therapie der

- Haustiere. 6. Auflage, 3 Bände, Jena. Besonders: Bd. 2, S. 304—310. Joest, E. (1919): Spezielle pathologische Anatomie der Haustiere. Bd. 1, S. 419—422. Berlin. Jones, W. N. (1926): A preliminary survey of the nematode and cestode parasites of sheep in North Wales, October 1923 to September 1924. *Journ. helminth.*, Bd. 4, S. 31—35. Derselbe (1926): A further survey of the nematode and cestode parasites of sheep, pigs and cattle in North Wales, October 1924 to September 1925. *Journ. helminth.*, Bd. 4, S. 36—42. Julien (1898): (Die Magenwurmfleuche der Schafe). *Bull. soc. med. vet.*, S. 82. Mc Fadyean, J. (1897): Parasitic gastroenteritis in sheep and lambs. *Journ. comp. path. and therap.*, Bd. 10, S. 48—63. Morgan, D. O. (1924): A survey of helminthic parasites of domestic animals in the Aberystwyth area of Wales. *Journ. helminth.*, Bd. 2, S. 89—94. Derselbe (1925): Notes on the helminth parasites of domestic animals in the Aberystwyth area of Wales. *Journ. helminth.*, Bd. 3, S. 107—172. Railliet, A. (1893): *Traité de zoologie médicale et agricole*. 2. Aufl., Paris. Besonders: S. 439—444. Railliet, A. und Henry, A. (1909): Sur la classification des Strongylidae: 1. Metastrongylinae. *Compt. rend. soc. biol.*, Paris, Bd. 66, S. 85—88. Ransom, B. H. (1906): The life history of the twisted wireworm (*Haemonchus contortus*) of sheep and other ruminants. *Circulaire* Nr. 93, Bur. of animal industry. Derselbe (1907): Stomach worms (*Haemonchus contortus*) in sheep. *Circulaire* Nr. 102, Bur. of animal industry. Derselbe (1907): Notes on parasitic nematodes, including descriptions of new genera and species and observations on life history. *Circulaire* Nr. 116, S. 1—7, Bur. of animal industry. Ransom, B. H. (1908): The prevention of losses among sheep from stomach worms (*Haemonchus contortus*). *Circulaire* Nr. 157, Bur. of animal industry. Derselbe (1911): The nematodes parasitic in the alimentary canal of cattle, sheep and other ruminants. *Circulaire* Nr. 127, Bur. of animal industry. Sjöberg, A. (1926): Die bei Rindern im Verdauungstraktus vorkommenden Nematoden. *W. T. M.*, Jahrg. 15, S. 1—57, Taf. 1 bis 20. Sprehin, C. (1928): Systematik und Bestimmungsschlüssel der Nematoden des Schafes. *Zeitschr. für Infektionskrankh., pars. Kr. und Hyg. der Haustiere*, Bd. 32. Stadelmann, H. (1896): Über *Strongylus circumcinctus*, einen neuen Parasiten aus dem Labmagen des Schafes. Bericht der Gefellsch. naturf. Freunde, Berlin, N. 5. Stoeder, W. (1901): Die Strongyliden in dem Labmagen der gezähmten Wiederkäuer und die Magenwurmfleuche. *Inaug.-Diss.*, Berlin. Theiler, A. (1912): Experiments to determine the safe dose of white Arsenic, Cooper's Dip and Bluestone for sheep. *South African agric. journ.*, März. Theiler, A. und Robertson, W. (1915): Investigations into the life history of the wireworm in ostriches. 3. und 4. reports of the director of veter. res., S. 293—366, 6 Taf. Travassos, L. (1918): *Trichostrongylidae brasileiros*. *Soc. Braz. de sc.*, Bd. 3, S. 191. Derselbe (1921): Contributions à l'étude de la faune helminthologique du Brésil. 13. Essai monographique sur la famille des Trichostrongylidae Leiper. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*, Bd. 13, S. (5—135, portugiesisch) u. 3—82. 56 Taf. Veglia, F. (1915): The anatomy and life history of *Haemonchus (Strongylus) contortus* (Rud.) 3. und 4. reports of the director of veter. res., S. 347—500. Derselbe (1918): Chemotherapy of *Haemonchus contortus* in sheep. 5. und 6. reports of the director of veter. res.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Lehr: Ein Beitrag zur Frage der Selbstheilung der Tollwut bei Tieren. (Aus dem staatlichen Veterinär-Untersuchungsamt, Potsdam. — Leiter: Vet.-Rat Dr. Standfuß.) (*Arch. für wiss. Tierheilkunde* 1927, 56, S. 372.)

Ein künstlich mit dem Gehirn eines wegen Tollwutverdachts getöteten Hundes infiziertes Kaninchen erkrankte nach zehn Tagen unter Lähmungserscheinungen schwer, so daß am 13. Tage vormittags mit dem stündlich erfolgenden Tode des Tieres gerechnet wurde. Überraschenderweise genas das Tier innerhalb sechs Stunden vollständig. Negri'sche Körperchen konnten nach der am nächsten Tage erfolgten Tötung mikroskopisch nicht nachgewiesen werden. Dagegen gelang es, mit dem Gehirn des genesenen Kanin-

chens ein Kaninchen zu infizieren, bei dem nach dem natürlichen Tode Negri'sche Körperchen gefunden wurden, ohne daß das Tier vorher nachweisbar erkrankt war. Ein zweites gleichzeitig mit demselben Material infiziertes Kaninchen erkrankte typisch und verendete. Bei der Gewebsuntersuchung wurden in Schnitten aus dem Ammonshorn Negri'sche Körperchen gefunden. Geiger.

Brosch, J.: Über das Verhalten der Muriden nach Lyssa-Infektion unter besonderer Berücksichtigung der Brauchbarkeit dieser Tierarten für den diagnostischen Tierversuch. (Aus der Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung in Mödling bei Wien.) (*C. f. B. I. Abt. Orig.* Bd. 105, S. 192, 1928.)

Verf. untersuchte das Verhalten der weißen Mäuse und Ratten bei verschiedenem Infektionsmodus mit Straßen-

virus, auf Inkubations- und Krankheitsdauer, wobei er das klinische Bild möglichst genau festzuhalten suchte. Schließlich beschäftigte er sich noch mit dem Nachweis der für die Diagnostik so wichtigen Negrifchen Körperchen. Es ergab sich dabei folgendes:

1. Mäuse und Ratten sind für die künstliche Infektion mit Lyssa in hohem Grade empfänglich.

2. Die Inkubationsdauer beträgt durchschnittlich 15 Tage (bei Ratten etwas mehr) und wird im allgemeinen von der Art der Einverleibung des Virus und auch vom Alter der Tiere beeinflusst. Auch die Verlässlichkeit des Tierversuches ist von dem Infektionsmodus abhängig.

3. Die größte Sicherheit (bis 100 Prozent) bietet die Doppelimpfung (intrazerebral und intramuskulär) bzw. die intrazerebrale Impfung allein; doch sind dieselben nur mit möglichst frischen Impfmateriale durchführbar. Bei faulem Ausgangsmateriale ist die intramuskuläre Infektion bei Muriden bedeutend verlässlicher für das Angehen der Infektion als bei Meerschweinchen und Kaninchen, zumal erstere auch bedeutend widerstandsfähiger gegen Sepsis sind als die letzteren.

4. Nach einer Krankheitsdauer von 1—2 Tagen zeigen die Tiere gewöhnlich die Erscheinungen der stillen Wut. Nur in vereinzelt Fällen und nur bei weißen Mäusen treten Symptome von rasender Wut auf.

5. Die histologische Untersuchung der Ammonshörner liefert das gleiche Bild wie bei anderen Tieren und ist leicht zu bewerkstelligen.

6. Trotz der allgemeinen günstigen Ergebnisse dieser Untersuchungen ergaben sich einige Fehlergebnisse, die im Vergleich mit den Impfergebnissen bei Kaninchen und Meerschweinchen nicht unerheblich ins Gewicht fallen. Der Grund dieser Fehlergebnisse war sicherlich nicht immer in der individuellen Beschaffenheit der Tiere, sondern hauptsächlich wohl auch in der Art der Durchführung der Impfung gelegen. Eine Vervollkommenung der Impftechnik würde daher vermutlich die Resultate besser gestalten können und diese Tierart den Kaninchen und Meerschweinchen hinsichtlich der Brauchbarkeit für die Lyssa-Diagnose gleichstellen. Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge können die Muriden die Kaninchen und Meerschweinchen für diese Zwecke zwar nicht vollkommen ersetzen, doch spricht manches dafür, daß sie zu den diagnostischen Lyssaimpfungen mit herangezogen werden könnten. Wenn man z. B. 3—4 Mäuse intramuskulär oder zwei Ratten intrazerebral geimpft, an Stelle eines Kaninchens oder Meerschweinchens verwenden würde, dürfte die Verlässlichkeit des Tierversuchs meines Erachtens wesentlich gesteigert werden. In besonders wichtigen Fällen dürfte es sich sogar empfehlen, Muriden zur Lyssa-Diagnostik neben Kaninchen und Meerschweinchen regelmäßig mit zu verwenden.

Carl.

Standesangelegenheiten.

Verein der Tierärzte des Reg.-Bezirks Düsseldorf.

Frühjahrsversammlung am 22. April 1928 in Düsseldorf. 50 Teilnehmer. May berichtet über eine Besprechung der Vertreter aller Vereine Rheinlands in Köln unter Vorsitz von Geheimrat Lothes. Dort wurde beschlossen: Beitrag für die Hochschulpfende Hannover mindestens 3,— RM. je Mitglied; Gründung eines losen Verbandes der Vereine im Rheinland, der der Repräsentation und den Fortbildungskursen dienen soll, keine Umlage und keine Statuten. Die Versammlung stimmt zu. Heyden empfiehlt nach Erläuterungen den Anschluß an die Ortsgruppe Düsseldorf des „Bidam“ (Bund in Deutschland approbierter Medizinalpersonen) einstimmig angenommen. Heyden und May als ständige Vertreter gewählt. Zur Jubelfeier der Hochschule Hannover wird der Vorsitzende als Vertreter entsandt, nachdem Zietzschmann nochmals herzlichst eingeladen hatte.

Es folgen kurze Ausführungen von Herberg über den Erlaß des

Ministers bezüglich des Dispensierrechtes, der als eine Unterstützung im Kampfe um das Dispensierrecht anzusehen ist. Herberg teilt weiter mit, daß eine Kammertaxe in Aussicht stehe, also sei eine Durchberatung der Taxe und die geplante Eintragung des Vereins als juristische Person überflüssig. Wigge ergänzt die Ausführungen und macht Bemerkungen zu den Neuwahlen der Kammer. Auf 30 Tierärzte kommt ein Kammermitglied; voraussichtlich erhalten dann die beamteten Tierärzte einen, die Stadttierärzte zwei und die Praktiker vier bis fünf Vertreter. Nunmehr erklärt Bettelhäuser, daß er wegen Alters und anderer Gründe den Vorsitz niederlegen möchte. Das Gleiche tut van Straaten als Stellvertreter. Es wurden dafür einstimmig neu gewählt Heyden und Jonen.

Darauf hält Prof. Zietzschmann einen außerordentlich interessanten Vortrag über: „Zyklische Veränderungen an den weiblichen Genitalien bei Säugetieren und Mensch, ein Vergleich von Brunst und Menstruation“. Zunächst schildert Z. die Vorgänge am Ovarium, welche bei Mensch und Tier völlig übereinstimmen. Beim Rind dauert der Zyklus 21 Tage, er steht also dem Menschen nahe; beim Hund ein halbes Jahr. Die zyklischen Veränderungen am Uterus laufen in derselben Zeit in gewisser Parallelität ab. Vom Ruhestadium aus langsame oder rasche Anbildung zu einem Gipfelpunkt des geweblichen Besitzstandes, dem bei Nichtbefruchtung Abschwellung und Zerfall der gewucherten Schleimhautteile folgt, bei Befruchtung dagegen Weiterwucherung und Entstehung der Schwangerschaftsplazenta. Der uterine Zyklus beim Menschen in vier Phasen eingeteilt: Intervall, prämenstruelle Schwellung, Menstruation und postmenstrum; tiefgreifende Veränderung der Schleimhaut, die sich selbst zur Plazenta umbildet. Wenn keine Befruchtung, dann rapider Abbau der inneren sieben Achtel der Schleimhaut mit Blutungen ins Lumen. Beim Tiere Brunstercheinungen, welche beim Weibe fehlen. Brunst und Menstruationsblutung zwei ganz verschiedene Erscheinungen im Verlaufe des sexuellen Zyklus beim Menschen. Zum Schluß behandelte Z. die hormonale Steuerung der Vorgänge und streifte dabei die Theorie von Steinach. Ausgezeichnete, farbige Zeichnungen erleichterten das Verständnis des Vorgetragenen. Lebhafter Beifall wurde dem Redner gezollt, dem der Vorsitzende nochmals herzlich dankte.

Anschließend regte May eine strengere Beurteilung von Notfchlachtungen an. Fieberhaft krank gewesene Tiere gehören auf die Freibank. Herberg spricht noch zur Lage der ambulatorisch Fleischschau ausübenden Tierärzte, deren Gemeinde in eine Nachbarstadt eingemeindet werden soll. Es wird empfohlen, daß die Betreffenden sich an ihren Regierungsveterinärat wenden sollen. Die Herbstversammlung soll trotz des rheinischen Tierärztetages, der am 7. und 8. Juli in Köln stattfindet, nicht ausfallen. Dr. May, Schriftf.

Landesgruppe „Sachsen“ des Reichsverbandes der Deutschen Gemeinde-tierärzte.

Frühjahrsversammlung am 21. April 1928, 13 Uhr, im Hotel „Kästner“ in Zwickau i. Sa. 1. Anwesend 34 Teilnehmer. Die Rückständigkeit in der Behandlung unseres Studiums im Handbuch des sächsl. Verwaltungsrechtes von Günther v. d. Mosel, Ausgabe 1926, hat den Vors. veranlaßt, sich wegen dieser Angelegenheit mit der vet.-med. Fakultät der Universität in Verbindung zu setzen, die eine Abstellung dieser unglaublichen Verhältnisse in die Hand genommen hat. Bericht erstattet wird über die Sitzung des Vorstandes, die am 25. Februar a. cr. in Dresden mit Vertretern des Tierärztlichen Landesverbandes des Tierärztlichen Kreisvereins Dresden und des Landesverbandes der praktischen Tierärzte stattgefunden hat und die als besonders wichtigen Punkt das Sächsische Tierärzte-Kammergesetz zur Sprache brachte. Großes Befremden erregte es, daß die Landesgruppe trotz diesbezüglichen Bittgesuches einen Entwurf zum Tierärzte-Kammergesetz bisher nicht erhalten hatte. Als Vertreter der Landesgruppe Sachsen beim 50jähr. Jubiläum des Tierfeuchen-Institutes der Universität Leipzig am 12. Mai a. cr. wird Kollege Winter beauftragt. Auf den Besuch der Versammlung des R.D.G. im Oktober in Karlsruhe wird besonders aufmerksam gemacht. Eventuelle Spenden anlässlich des 150jährigen Jubiläums der Hochschule in Hannover soll jedes Mitglied der Sachsegruppe direkt an Dr. Brandt in Hannover senden. Bestand der Sachsegruppe 2 Ehrenmitglieder und 94 Mitglieder. Neu aufgenommen Raschke-Chemnitz; ausgeschieden Mai wegen Übersiedlung nach Gera. Infolge Erhöhung des Jahresbeitrages an den R.D.G. wird der Jahresbeitrag der

Sachfengruppe einstimmig auf RM. 17.— jährlich mit Rückwirkung ab 1. Januar 1928 festgesetzt. Im Interesse der Kasse und wegen der Schwierigkeiten, geeignete Referenten für die Versammlungen zu erhalten, wird einstimmig beschlossen, den § 7 der Satzung dahin zu ändern, daß jährlich statt zwei nur eine Vollversammlung abgehalten wird, im Bedarfsfalle mit verlängerter Dauer von zwei Tagen (Sonntags nachmittags bis Sonntag vormittags). Im übrigen beschließt man wenn nötig, fog. erweiterte Vorstandssitzungen in den einzelnen Kreishauptmannschaften einzuberufen. Auf Grund einer Eingabe der Kollegen Totzeck und Meidenbauer wird dem Vorstände der Landesgruppe Sachsen das Vertrauen der Versammlung ausgesprochen. Anlässlich der Ausschreibung der Magdeburger Obertierarztstelle wird angeregt, bei den zuständigen Stellen durch den R.D.G. zu beantragen, daß im Deutschen Reiche alle amtstierärztlichen Examina bei Bewerbungen um Schlachthofdirektorstellen gleich bewertet werden. 2. Pomper-Plauen: „Die Auswirkung der beiden Verordnungen über die bakteriologische Fleischuntersuchung vom 19. und 22. Dezember in der praktischen Fleischbeschau“. In der sich anschließenden fünfviertelstündigen Aussprache wird besonders vom Koll. Fröhlich so viel interessantes Material geboten, daß ihm nahe gelegt wird, seine jahrelangen Erfahrungen auf diesem Gebiete zu veröffentlichen und so allen Kollegen zugänglich zu machen. Als unbedingt notwendig erkannt wird der Ausbau der pathologischen Anatomie, wie bei den Human-Medizinern, mehr Klarheit über Kälber-Paratyphus, eine bakteriologische Untersuchungsfeld für Ostfachsen, Versand der Proben durch Boten, keine Benachrichtigung durch Depeschen und Fernruf bei notwendiger genauer Verständigung, peinliche Schlachtfleisch-Desinfektion, Schaffung von Kühlräumen für einwandfreie Aufbewahrung des Fleisches, mehr Tierärzte für Laboratoriumszwecke, Vorträge an größeren Schlachthöfen mit Demonstrationen, schnellste Verwertung des in Frage kommenden Fleisches, Verbot der Verarbeitung des Notchlachtungsfleisches zu Hackfleisch und Wurst usw. Als wünschenswert wird erachtet, daß das Landesgesundheitsamt um nähere Auslegung des § 3 „Schnellste Verwertung des Fleisches“ gebeten wird. 3. Der Vors. berichtet über die Nichtgewährung der im Gesetz vorgesehenen Stellenzulage an selbstständige Schlachthofleiter. Es wird bedauert, daß sich die Bezirkstierärzte und Kollegen im Landesgesundheitsamt mit ihrer Eingruppierung begnügen. Gebeten wird, daß jeder Kollege der Sachfengruppe seine derzeitige Eingruppierung dem Vorsitzenden mitteilt. Abzug für Privatpraxis muß jeder Gemeinde überlassen bleiben. Von der Pension Abzüge zu machen für während der Dienstjahre ausgeübte Praxis müsse durch Bemerkungen im Dienstvertrag verhindert werden. Im übrigen sei es ratsam, bei Gehaltsfestsetzung selbstständiger Schlachthofleiter den Behörden gegenüber außer Betonung der wissenschaftlichen Tätigkeit des Tierarztes ganz besonderen Wert auch auf die kaufmännische und technische Tätigkeit zu legen. 4. Es wird gewünscht, stets auf die Tagesordnung auch wissenschaftliche und technische Punkte zu setzen, damit die Kollegen Urlaub für die Versammlungen erhalten. Die Kosten für solche Dienstreifen sind im Haushaltsplan mit einzusetzen. An Stelle von Schlachthoflaboratorium wird die Bezeichnung „Nahrungsmittelamt“ und an Stelle von Schauamt „Stadtveternäramt“ vorgeschlagen. Man begrüßte den Erlaß des preuß. Ministers für Landwirtschaft anlässlich der 25-Jahrfeier der Reichsfleischbeschau und bedauert, daß Sachsen, das doch bahnbrechend in der Fleischbeschau gewirkt hat, es bisher noch nicht für nötig befunden hat, seinem Fleischbeschaupersonal anlässlich des 25jährigen Bestehens der Reichsfleischbeschau, die Anerkennung auszusprechen. Die nächste Hauptversammlung wird anlässlich der 1000-Jahrfeier Meißens im September in dieser Stadt abgehalten.

gez. Dr. Schneiderheinze, 1. Schriftf.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Auf Grund der Habilitationschrift: „Die Ascarida der Säugetiere und Vögel Deutschlands“ erteilte die Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig dem Assistenten am Tierfeuchen-Institut, Dr. med. vet. Curt E. W. Sprehn, die Venia legendi für das Fach „Parasitologie und angewandte Zoologie“. Dr. Sprehn wurde am 30. August 1892 in Pr. Stargard in Westpreußen geboren. Er erlangte an der Leibniz-Oberrealschule zu Charlottenburg 1912 das Reifezeugnis und studierte an der Tierärztlichen Hochschule und an der Universität in Berlin

Tiermedizin und Naturwissenschaften. Nach seiner Rückkehr aus dem Felde nahm er sein Studium in Berlin wieder auf und erhielt Ende 1921 die tierärztliche Approbation. Im Jahre 1923 promovierte er zum Dr. med. vet. auf Grund der Arbeit „Über die Rüsselinfektion mit Trypanosomen bei Schafausfliegen unter natürlichen Verhältnissen“. Nach mehrjähriger Tätigkeit in der Praxis und in verschiedenen wissenschaftlichen Instituten Deutschlands übernahm er im Januar 1927 eine Assistentenstelle im Tierfeuchen-Institut der Universität Leipzig. Seine bisher veröffentlichten Arbeiten behandeln hauptsächlich die Parasitologie und Zoologie.

Landesökonomierat Krewel zum 70. Geburtstage.

Am 10. Mai feiert der Ehrenbürger der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Landesökonomierat Krewel-Burg Zievel i. Rhld. seinen 70. Geburtstag. Krewel hat von jeher allergrößtes Interesse für die tierärztliche Wissenschaft gezeigt. Seiner Anregung ist es in erster Linie mit zu verdanken, daß im Jahre 1922 das Interesse der Landwirtschaft für die Krankheiten der Jungtiere geweckt und die hohe



Bedeutung der Erforschung der Aufzuchtkrankheiten in der Öffentlichkeit verbreitet wurde. Erst nach diesen Vorbereitungen war es möglich, einige Jahre später die Reichszentrale für die Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten zu gründen. Selbst ein großer Pferdekennner und vorzüglicher Reiter ist er seit Jahren einer der hervorragendsten Führer des Reichsverbandes rheinischer Kaltblutzüchter. Wir senden dem hochverehrten Jubilar und Freunde der Tierärztlichen Hochschule Hannover zu seinem Geburtstage die allerherzlichsten Glückwünsche. Möge er, der sich noch heute voller Rüstigkeit erfreut und einen starken Einfluß auf die nationale Erziehung unserer Jugend in seiner engeren Heimat hat, diesen Tag noch recht oft in voller Rüstigkeit und Gesundheit im Kreise seiner Familie begehen.

Mr.

Veterinärdirektor Dr. Köster.

Dr. Köster, der Leiter des städtischen Vieh- und Schlachthofs, tritt am 1. Mai in den Ruhestand. Der sehr verdiente Beamte war Mitbegründer des Landeszentralviehhofs und kann auf ein 27jähr. Wirken im Dienste der Stadt Stuttgart zurückblicken. Als Anerkennung für seine erfolgreiche Tätigkeit wurde Dr. Köster am 30. August 1909 die Direktion des städtischen Vieh- und Schlachthofs und zugleich die Funktionen eines beamteten Tierarztes für den Bereich des städtischen Vieh- und Schlachthofs übertragen. In den Zeiten der Rationierung und während der Inflation verstand es Dr. Köster durch seine übersichtliche Organisation manche Schwierigkeit zu überwinden. Der Stuttgarter Schlachtviehmarkt wurde unter seiner Leitung aus einem Lokalmarkt zu einem Viehumschlagplatz für das ganze Land und zugleich zu einem Exportmarkt. Wenn wir heute in Stuttgart

neben Dresden den am modernsten eingerichteten Vieh- und Schlachthof besitzen, so ist das vor allem der umsichtigen und tatkräftigen Leitung des Veterinärdirektors Dr. Köster zu verdanken. (Stuttgarter Neues Tagblatt Nr. 200 vom 30. April 1928.)

Veterinär Dr. Seiler †.

Am 17. April 1928 verstarb plötzlich Veterinär Dr. med. vet. Franz Seiler in Lübben im 52. Lebensjahre an einem Schlaganfall. Obwohl seit Jahren herzleidend, hat er bis zum letzten Augenblick sein Amt versehen. Nach einem arbeitsreichen Tage wurde er abends von einem Unwohlsein befallen, das sich schnell verschlimmerte und schon nach wenigen Stunden zum Tode führte. Nachdem Seiler in seiner Vaterstadt Raftatt i. Baden die Schule befucht hatte, lag er dem tierärztlichen Studium in Stuttgart, Hannover und Berlin ob und wurde 1899 approbiert. Zur Erfüllung seiner Militärpflicht kehrte er noch einmal in seine Heimat zurück, um dann in preußische Dienste überzutreten. Zunächst war er drei Jahre lang als Assistent und Repetitor am pathologisch-anatomischen Institut in Hannover beschäftigt. 1903 kam er nach einem kurzen Kommisforium in Fiehehne als Kreistierarzt nach Oppeln. 1911 siedelte er in gleicher Eigenschaft nach Lübben über. Den Krieg erlebte er als Stabsveterinär bei einem Feld-Artillerie-Regiment. 1915 wurde er vom Landwirtschaftsministerium angefordert und der Regierung in Königsberg überwiesen. Dort war er bis 1917 sowohl als Vertreter des Regierungs- und Veterinärats wie auch einiger im Felde stehender Kreistierärzte tätig. Befeuelt von wirklicher Arbeitsfreude und von Anfang an bemüht, seinem Kreise von besonderem Nutzen zu sein, hatte er sich in Lübben das Studium und die Bekämpfung der Knochenweiche zur Aufgabe gemacht, die die Viehbestände des Spreewaldes in hohem Maße heimfuchte. Daneben organisierte er in den letzten Jahren eine planmäßige Tilgung des dort weit verbreiteten und bösartig auftretenden Scheidenkatarrhs. Im Dienst treu und gewissenhaft und gegen jedermann hilfsbereit erfreute er sich allgemeiner Wertschätzung. Jetzt weint um ihn Frau und Tochter und mit ihnen trauern alle, die diesen lebenswürdigen und zuverlässigen Menschen näher kannten. Unter den Trauerklängen der Lübbener Reichwehrkapelle, gefolgt von dem Banner seines geliebten Korps und unter großer Beteiligung aus allen Bevölkerungsschichten seines Wirkungskreises wurde er zur letzten Ruhe bestattet. Sein Andenken werden wir jederzeit in Ehren halten.

Für die beamteten Tierärzte des Reg.-Bez. Frankfurt (Oder).
Dr. Wiendieck.

150-Jahrfeier der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

In entgegenkommender Weise hat der Hannoverische Rennverein das für den 12. Mai vorgesehene Pferderennen auf der großen Bult verlegt auf Mittwoch nachmittag, den 13. Juni. Damit ist den Jubiläumsgästen die Möglichkeit gegeben, zwischen der Sitzung der Gesellschaft der Freunde und dem Begrüßungsabend das Rennen zu besuchen. Als Hauptereignis kommt das „Rennen der Tierärztlichen Hochschule“ zur Entscheidung, wofür der Rennverein aus Anlaß des 150jährigen Jubiläums der Tierärztlichen Hochschule Hannover einen Ehrenpreis und 4000,— Mk. gestiftet hat.

Zur weiteren Vorbereitung der Jubiläumsfeier, insbesondere wegen der Verteilung der Plätze beim akademischen Festakt, der Festvorstellung usw. wird mit Rücksicht auf die große Beteiligung gebeten, die noch ausstehenden Zuzagen so bald als möglich zu geben und dabei die Vordruckkarten ausgefüllt und mit genauer Anschrift versehen zurückzusenden. Es sind einige Anmeldekarten eingelaufen, bei denen verfehentlich die Unterschrift fortgelassen ist. Diejenigen Festteilnehmer, die das Festprogramm und die Teilnehmerkarten inzwischen nicht zugestellt erhalten haben, werden gebeten, dieses sogleich hierher anzugeben.

Die Unterbringung der Autos von Festteilnehmern wird in den Autohallen der Stadt nur zum Teil möglich sein. Die Hochschule stellt deshalb ihre Reitbahn zur Verfügung. Rechtzeitige Anmeldung hierfür wird erbeten.

Beitritt des Deutschen Reiches zu dem internationalen Übereinkommen für die Schaffung eines Internationalen Tierseuchenamts in Paris.

Die deutsche Regierung hat durch Schreiben vom 14. Februar 1927 an die französische Regierung den Beitritt des deutschen Reiches zu

dem am 25. Januar 1924 in Paris abgeschlossenen internationalen Übereinkommen für die Schaffung eines Internationalen Tierseuchenamts in Paris erklärt und durch Schreiben vom 16. Februar 1928 an die französische Regierung den Beitritt ratifiziert. Der Beitritt ist am 16. Februar 1928 wirksam geworden.

Conférence internationale du rat.*)

Zu dem vom 16. bis 22. Mai 1928 in Paris stattfindenden internationalen Rattenbekämpfungskongreß sind vom Reichsgesundheitsamt Berlin Prof. Dr. Haendel und Geheimrat Dr. Wehrle abgeordnet worden. Ferner werden teilnehmen Ministerialdirigent Dr. Müssemeier, Ministerialrat Dr. v. Ostertag, Prof. Dr. Raebiger, Dr. Neumark und Prof. Dr. Seligmann.

Niederfachengruppe des Reichsverbandes praktischer Tierärzte e. V.

23. Hauptversammlung am Sonnabend, den 19. Mai 1928, 14.30 Uhr im Gildezimmer des Bräuer-Gildehauses zu Hannover, Große Agidienstraße 34. 1. Geschäftsbericht. 2. Wahl der Delegierten zur Hauptversammlung des R.P.T. und der Landesgruppe Preußen in München. 3. Aufnahme neuer Mitglieder. 4. Stellungnahme zur Tagesordnung der Hauptversammlung des R.P.T. und zur Landesgruppe Preußen in München. 5. 150jährige Jubelfeier der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Elze und Parnsen, den 4. Mai 1928.

Dr. Machens, Vors. Dr. Heinemann, Schriftf.

Tierärztekammer für Westfalen und Lippe.

Samstag, den 19. Mai, findet kurz nach Mittag in Hamm eine Vollversammlung statt. Wünsche für die Tagesordnung an Dr. Wulff in Oelde i. W., Vors.

Deutsche Studentenschaft der Tierärztlichen Hochschule in Wien.

Laut Kammerbeschluß vom 25. April 1928 wurden gewählt zum Vorsitzenden: Sepp Bacher; Stellvertreter: Franz Latzenhöfer; Schriftf.: Josef Pittermann; Stellvertreter: Arthur Purschka; Säckelwart: Willi Niklau; Leiter des Leibesübungsamtes: Alfred Neubacher; Leiter des Wirtschaftsamt: Willi Neubacher; Stellvertreter: Alfred Ordelt; Leiter des Kulturamtes: Franz Vogel; Leiter des Amtes für Grenz- und Auslandsdeutsche: Peter Stötzer; Leiter des Krankenvereines: Viktor Bialek; Leiter des Presseamtes: Fritz Schuh.

Fortbildungskursus für praktische Tierärzte an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

In der Woche vom 30. Juli bis 4. August findet ein Fortbildungskursus für praktische Tierärzte mit Demonstrationen an der Tierärztlichen Hochschule Hannover statt. Näheres wird noch bekanntgegeben. Der Rektor.

Fortbildungskursus des D.V.R.

Der 21. Fortbildungskursus des Deutschen Veterinärates in Stuttgart war von 170 Personen besucht und nahm einen sehr guten Verlauf. Im kommenden Winter werden dem Plan entsprechend wieder vier Kurse an Orten diesseits und vier an Orten jenseits der Elbe sowie drei in Süddeutschland stattfinden. D.V.R.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Tierarzt Dr. Ohlsen aus Stickhausen zum ersten wissenschaftl. Oberassistenten, Tierarzt Dr. W. Grassnickel aus Bernau zum zweiten wissenschaftl. Oberassistenten an der medizin.-forensischen Klinik der Tierärztl. Hochschule in Berlin.

Übertragen: Tierarzt Dr. Schlote aus Gieboldehausen a. Harz die kommissarische Verwaltung der Veterinärstelle in Hünfeld (Bez. Kassel).

Approbiert in Berlin: Karl Hagen aus Berlin.

Promoviert in Gießen: Tierarzt Karl Großmann aus Thaya (Nd.-Österreich); in München: Tierärztin Silvia v. Bornstedt aus Karmine (Schlesien).

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 16, S. 290.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inserenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 20.

Ausgegeben am 19. Mai 1928.

36. Jahrgang.

Zur gefl. Beachtung! Der Bezugspreis für das 2. Vierteljahr 1928 wird für die beim Verlag direkt bestellten Abonnements durch Nachnahme erhoben, wenn derselbe nicht bis zum 26. ds. Mts. in unseren Händen ist. — Wir bitten ev. für Einlösung der Nachnahme besorgt zu sein.

M. & H. Schaper, Verlag der „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“.

(Lehrkanzel für Biologie und Pathologie der Fische. — Vorstand: Prof. Dr. Josef Fiebiger und Lehrkanzel für Bakteriologie. — Vorstand: Prof. Dr. Josef Schnürer der Tierärztlichen Hochschule in Wien.)

Über die Vibrionenseuche der Karpfen.

Von Prof. Dr. Josef Fiebiger und Dozenten Dr. H. David.

Im Winter 1925/26 trat in verschiedenen Teichen in der Nähe von Wien ein verheerendes Sterben unter Karpfen und Hechten auf, als dessen Ursache ein *Vibrio* gefunden werden konnte. Diese Seuche, von uns als „Vibrionenseuche“ bezeichnet, forderte namentlich unter den Karpfen eines Fischbestandes derart zahlreiche Opfer (ca. 3500 Stück ein- bis zweiförmige Karpfen), so daß bis auf weiteres von einem Neubefatz des Teiches mit Karpfen abgesehen wurde.

Als wesentlichste, klinische Symptome wurden die auffallende Mattigkeit der Fische und die punktförmigen, selbst flächenhaften Blutungen auf der Hautoberfläche angegeben. Mitunter waren die Schuppen an einzelnen Stellen des Körpers gestäubt, ohne daß es zu Beulen- oder Abszeßbildungen jemals gekommen wäre. In wiederholten Fällen entleerte sich aus dem After der erkrankten Fische eine schleimig-blutige Flüssigkeit, manchmal kam es sogar zu einer Ausstoßung von zusammenhängenden Epithelmassen in Form von Darmabgüssen. Pathologisch-anatomisch konnte häufig ein auf „Septikämie“ deutender Befund erhoben werden, oftmals war auch eine Entzündung der hinteren Darmabschnitte und eine exsudative Peritonitis zu beobachten. In vereinzelt Fällen dagegen waren pathologisch-anatomische Veränderungen kaum wahrnehmbar gewesen. Insbesondere zeigten die Hechte wenig Veränderungen, abgesehen von vereinzelt kleinen Blutungen in der Haut, einer leichten und inkonstanten Darmentzündung und Defekten der Haut und Schuppen, von denen es zweifelhaft war, ob sie nicht traumatischer Natur waren. Häufig beobachtete Defekte der Haut am Kopf würden mit den Angaben Aasers (siehe unten) übereinstimmen.

Durch die bakteriologische Untersuchung von zahlreichen Kadavern wurde als Erreger dieses Fischsterbens, wie oben erwähnt, ein *Vibrio* festgestellt, der sich in den inneren Organen und fast stets in der Galle vorfand. Auf die genaueren morphologischen Eigenschaften dieses Vibrios, der von uns den Namen *Vibrio piscium* erhalten hat, sei

auf die erste Publikation im Zentralblatt f. Bakt. Orig. I. Abt., Bd. 102, 1927, verwiesen, hier sollen nur die wichtigsten Merkmale dieses Krankheitserregers angeführt werden.

Morphologische Eigenschaften: 2 bis 2,5 μ lang, 0,3 bis 0,5 μ breite, mehr oder weniger plumpe Mikroorganismen, mit deutlicher kommaförmiger Krümmung. Lebhaft beweglich, stets monotrich begeißelt.

Biologische Eigenschaften: Psychrophiler *Vibrio*, bei 37 Grad nicht fortzuchtbar, sondern Bildung von immens vergrößerten Formen. (Involutionen.) Temperatur der üppigen Vermehrung auf künstlichen Nährböden: um 20 Grad C.

Agarplatte: Kulturen coliähnlich, aber hell und durchsichtig, 3 bis 7 mm groß, rund, glattrandig. Aus den Fischen direkt isoliert, nach ca. vier Tagen bei Zimmertemperatur erscheinend.

Agartrich: flach, durchsichtig, alternd: honigähnliche Farbe. Im Nährboden häufig Kristallbildungen (Tripelphosphat).

Gelatinefisch: (sehr charakteristisch) nach 48 Stunden hirsekorngroße Delle, später lochförmige Einlenkung, darunter eine ca. 1/2 cm große Luftblase. Unterhalb der Luftblase spitztrichterförmige Verflüssigung. Die verflüssigte Gelatine bleibt klar; in der Trichterspitze krümelige, gelblich-weiße Massen.

Blutagar: 10 Prozent Hammelblutagar, innerhalb drei bis vier Tagen keine Hämolyse.

Nährboden nach Dieudonné: Wachstum üppig.

Kartoffelkultur: üppig, leicht fleischfarben; alternd: zinnroter bis schokoladebraun.

In flüssigen Nährboden (Bouillon, Peptonwasser): Wachstum schlecht. Mitunter Bildung eines sehr dünnen Häutchens.

Nitrosoindolreaktion (Cholera-rotreaktion, d. i. nach alleinigem Zusatz von Schwefelsäure) bei an nicht höhere Temperaturen angepaßten Stämme, negativ; **Indol** (nachgewiesen mit H_2SO_4 plus Kaliumnitrit) stets positiv.

Schwefelwasserstoff: oftmals, aber nicht immer nachweisbar.

Phosphoreszenz und Fluoreszenz: niemals zu beobachten.

Pathogen (unter natürlichen Verhältnissen) für: Karpfen, Hechte, Karauschen, Zwergwelse, Schleien und vermutlich für Frösche; experimentell gelang die Infektion unter dem gleichen Krankheitsbilde bei Karpfen, Hechten, Karauschen, Zwergwelsen und Fröschen; nicht pathogen für: Rotaugen, Rotfedern, Barfische, Forellen, Bitterlinge.

Sehr häufiges Vorkommen von Bazillenträgern unter den anscheinend gesund gebliebenen oder gesund gewordenen Fischen. Fundort der Vibrionen bei „Bazillenträgern“: Gallenblase. Serologisches Verhalten: in unseren Fällen hohe Mitagglutination in spez. Cholera-vibrionen-serum.

Während nun im Sommer 1926 keine Nachrichten einliefen, daß in irgend einem Teile Österreichs ein größeres Karpfensterben beobachtet worden wäre, trat im Winter 1926/27 in einem Teile Niederösterreichs (Waldviertel) in den Karpfenteichen einer Gutsherrschaft ein Fischsterben unter folgenden Begleitumständen auf:

In einem 30 Joch großen Fischteich wurden zugleich mit Abwachskarpfen die Befatzkarpfen gezogen. Bei der Abfischung im Herbst 1926 wurden ungefähr 7000 Stück Befatzfische in einen kleinen Teich überfetzt. Dort stellte sich in kürzester Zeit ein größeres Fischsterben ein. Äußerlich zeigten die verendeten Jungfische angeblich keine Veränderungen. Als Ursache wurden Fehler beim Transport, ferner Eindringen von Abfallwasser aus einer Spiritusbrennerei vermutet. Die Jungfische wurden daher abermals und zwar in einen kleinen Mühlteich mit gutem Wasserzufluß überfetzt. Das Sterben hielt jedoch an. Die Jungfische begannen scharenweise träge herumzuschwimmen, waren angeblich mit Schlamm und Schleim überzogen und zeigten Blutungen und Verletzungen. Mitte Januar kam eine größere Anzahl von toten und lebenden Karpfen, sowie einige Schleien zur Untersuchung.

Befund: Die Haut, besonders in der Bauchgegend vielfach rötlich gefärbt durch Ausdehnung der Kapillargefäße und zahlreiche feine, oder auch stärkere Blutungen. Die Schuppen sind entweder nur an einzelnen Stellen gestäubt, oder der ganze Körper zeigt Schuppensträubung und sieht deshalb wie gedunsen aus. Beim Abichuppen benetzt die in den Schuppentaschen enthaltene, klebrige Exsudatflüssigkeit die ganze Oberfläche. Herdweise ist Verpilzung vorhanden. Die Kiemen meist hyperämisch, auch längs der Gräte in den Kiemenblättern verlaufende Blutungen zeigend. In der Körpermuskulatur mitunter zahlreiche bis linsengroße Blutungen. Sie erscheint von ihnen ganz durchsetzt, wie getigert. Bei Eröffnung der Bauchhöhle ergießt sich eine mitunter reichliche Menge blutiger flüssiger Flüssigkeit, welche mit Fibrin durchsetzt ist, nach außen. Auch im Herzbeutel findet sich Flüssigkeit mit Fibrin. Darm stark diffus gerötet, mit serös schleimiger Flüssigkeit gefüllt, in anderen Fällen stärkere Injektion der Darmgefäße. Bei starkem hämorrhagischen Exsudat in der Bauchhöhle eine auffallende Blässe des Darmes und der übrigen Eingeweide. Milz bald mehr, bald weniger geschwollen. Gallenblase klein oder auch stark vergrößert. Vielfach starke Anschwellung und Rötung der Niere. Die Schwimmblase mit feinen, punktförmigen, aber auch größeren Blutungen in der Wand der hinteren Schwimmblase. Bei einem Karpfen Blutungen in der Iris, leichter Exophthalmus.

Die Schleien zeigen ein ähnliches Bild: zahlreiche feine Blutungen über den Körper verstreut, in dichter Menge an der Schwanzflossenwurzel und am Kiemenhauptdeckel. After mit blutrotem Saum. In der Bauchhöhle reich-

lich dunkelrote Flüssigkeit, der Darm anämisch oder Darm-entzündung.

Verfuchsweise wurden zu zwei noch lebend eingelangten Fischen mehrere Karpfen, eine Rotfeder und ein Schlammpeitzger hinzugefügt. Nach einer Woche standen die kranken Fische um. Die Versuchsfische blieben gesund.

Als Nebenbefund konnten noch konstatiert werden: Pockenauflagerung, Zyklochaete, sowie Myxosporidienknötchen auf den Kiemen.

Die Symptome waren nicht immer in gleichem Maße ausgeprägt. Als besonders hervorstechend sind die Schuppensträubung, die Blutungen in der Muskulatur, sowie das serös-hämorrhagische Exsudat in der Bauchhöhle hervorzuheben.

Es war geplant, die Untersuchungen an Ort und Stelle fortzusetzen; inzwischen waren die Teiche im rauen Waldviertel auf lange Zeit zugefroren. Wir erhielten keine Nachricht mehr und auf eine nach Monaten gestellte Anfrage wurden wir verständigt, die Fische seien sämtlich zugrunde gegangen und der Besitzer habe, verstimmt durch das Mißgeschick, die Fischzucht aufgegeben und die Teiche dem Anbau zugeführt.

Aus den Organen sämtlicher untersuchter Kadaver konnte ein *Vibrio* isoliert werden, der genau dieselben Eigenschaften besaß, wie sie vorher für den feinerzeit gefundenen *Vibrio piscium* angegeben worden sind; auch eine hohe Mitagglutination in Cholera-serum (Titer 1 : 3000, erhaltener Wert: 1 : 500) wurde beobachtet. Agglutinationsproben, angestellt mit Vibrionen der neuen Fälle und mit feinerzeit hergestelltem Serum von *Vibrio piscium* ergaben ein positives Resultat. (Titer des Serums von 1 : 10 000 auf 1 : 2000 gesunken, erhaltener Wert: 1 : 800 positiv, 1 : 1000 zweifelhaft). Durch Abfättigung des *Vibrio piscium*-Serum mit den Vibrionen der neuen Fälle, konnte aus der völligen Absorption der Agglutinine der Schluß auf die Identität beider Stämme gezogen werden, was sich schon vorher aus den vollkommen gleichen morphologischen und biologischen Eigenschaften ergibt. Nebenbei erwähnt dürfen aber aus einem etwaigen negativen Ausfall von Agglutinationsproben zur Differenzierung von fischpathogenen Bakterien keine weitgehenden Schlüsse gezogen werden. Die Feststellung nämlich, daß bei Bakterien sich vollkommen gleich verhaltende Stämme (kulturell und biologisch) von demselben Serum nicht einheitlich agglutiniert werden, dürfte nach unseren vorläufigen Beobachtungen bei den psychrophilen Bakterien häufiger zu beobachten sein, als bei den mesophilen.

In den ausgeprägten Fällen können sowohl die klinischen als auch die pathologisch-anatomischen Erscheinungen als identisch angesehen werden. (Mattigkeit, Blutung auf der Hautoberfläche und in den inneren Organen, Enteritis, Peritonitis). Unterschiede ergaben sich aber insofern im Verlaufe der Seuche, als der zweite Seuchengang bedeutend rascher verlief als der erste und außerdem in den neuen Fällen verschiedene Symptome, wie ausgeprägte Schuppensträubung, starke Blutungen in der Muskulatur an einzelnen Exemplaren, die den verendeten Fischen des ersten Seuchenganges fehlten.

Ob zwischen den beiden Seuchenorten eine Verbindung bestand, so daß der neuerliche Ausbruch der „Vibrionenseuche“ eine Erklärung finden würde, konnte leider nicht in Erfahrung gebracht werden. Zur Zeit müssen wir daher annehmen, daß in der Natur Vibrionen vorkommen, welche, falls eine Infektion von anderen verseuchten Orten nicht in Frage kommt, unter Umständen virulent werden können. Immerhin wäre es aber auffallend, daß in zwei verschiedenen Orten eine Seuche mit gleichen Symptomen und den gleichen Erregern spontan zur Entstehung kommt.

In der Literatur finden sich folgende Angaben über Vibrionen als Krankheitserreger bei Fischen:

Bergmann fand Vibrionen als Ursache der roten Beulenkrankheit des Aales (*Vibrio anguillarum*), der nach späteren Untersuchungen Bergmanns mit dem Erreger einer ansteckenden Keratomalazie bei Dorschen identisch ist. Weiter fand Bergmann bei einem Hechte mit einer Zahnfleischentzündung und Erscheinungen einer Septikämie einen *Vibrio*, den er ebenfalls mit dem *Vibrio anguillarum* identifiziert. In letzter Zeit befaßte sich Schäperclaus mit der Untersuchung der Rotfeuche des Aales im Bezirk von Rügen und fand als Ursache dieser Erkrankungen einen *Vibrio*, den er mit dem *Vibrio anguillarum* Bergmann für gleich hält. Über eine verlustreiche Hechtepidemie in Norwegen berichtet in neuerer Zeit Aaser, welche ebenfalls durch einen *Vibrio* hervorgerufen wurde. Soweit dem uns zugänglichen Referate zu entnehmen ist, zeigten die an der „Hechtepest“ verendeten Hechte u. a. Nekrosen der Haut und des Bindegewebes, so daß es zu einer Freilegung der Knochen des Oberkiefers gekommen sein soll, ein Befund, den Schäperclaus bei einem künstlich infizierten Aale ebenfalls erhalten hat. Ebenso stellten beide Autoren Augenveränderungen bei den erkrankten Fischen fest. Die Angabe Aasers über die Erkrankung der Kiefer der Hechte, die zu einem Ausfalle der Zähne führen kann, dürfte deshalb erwähnenswert sein, weil Bergmann, wie vorerwähnt, aus einem Hechte, der infolge einer Zahnfleischentzündung an Septikämie verendet war, einen dem *Vibrio anguillarum* identischen *Vibrio* züchten konnte. Ob diese Erkrankungen der verschiedenen Fischarten irgendwie zusammenhängen und von demselben *Vibrio* hervorgerufen werden, kann um so weniger entschieden werden, als Aaser angibt, daß der Erreger der Hechtepest nur für Hechte und für keine andere Fischart pathogen wäre. Immerhin erschien uns erwähnenswert, auf die verschiedenen ähnlich lautenden Befunde hinzuweisen.

Während in klinischer und pathologisch-anatomischer Beziehung zwischen der roten Beulenkrankheit und der Rotfeuche des Aales einerseits und der von uns bei Karpfen und Hechten beobachteten „Vibrionenfeuche“ andererseits mit Ausnahme der septikämischen Erscheinungen wenig Vergleichspunkte bestehen, sind die bei diesen Krankheiten erhobenen bakteriologischen Befunde in vieler Beziehung identisch. In folgender Tabelle sollen daher die von Bergmann und Schäperclaus angeführten Eigenschaften des *Vibrio anguillarum* mit den Eigenschaften des von uns isolierten *Vibrio piscium* in ihren wesentlichsten Punkten verglichen werden.

Fassen wir die Eigenschaften dieser drei Vibrionen zusammen, so handelt es sich in allen Fällen um einen bei 37 Grad schlecht oder nicht gedeihenden *Vibrio*, der leicht „Involutionsformen“ annimmt, keine Cholerarotreaktion¹⁾ gibt und die für Choleravibrionen typische Gelatineverflüssigung²⁾ zeigen kann. Die Vibrionen sind für Kaltblüter pathogen, für Warmblüter apathogen.

Von wesentlichem Interesse wäre es, nun die Art der Beißelung dieser Vibrionen zu ermitteln. Bei Bergmann ist nicht mit Sicherheit zu entnehmen, ob er monotrich oder lophotrich begeißelte Vibrionen vor sich hatte, ebenso wie Schäperclaus diese uns sehr wichtig erscheinende Eigenschaft der Vibrionen offen läßt. Sollte es

¹⁾ Bergmann gibt in seiner 1. Publikation an, daß der *V. ang.* eine positive Chlorarotreaktion gibt, während in seiner 2. Veröffentlichung sowohl für die Dorschvib., als auch für den *V. anguill.* eine negative Nitrosoindolreaktion angegeben wird.

²⁾ Schäperclaus gibt für den *V. ang.* Bergmann eine choleraähnliche Gelatinestickkultur an; Bergmann selbst spricht von einer trichterförmigen Gelatineverflüssigung und erwähnt die Bildung einer Luftblase nicht.

	V. anguillar. Bergmann	V. ang. Schäperclaus	V. piscium David
Gestalt:	variabel, bildet leicht „Involutionsformen“		
Geißel	„die Bewegungsfähigkeit verdanken dieselben endständigen Geißeln“. Zit. nach Bergmann	„nicht zu entscheiden, ob es sich um eine einzige o. mehrere zus. geklebte Geißeln handelt“. Zit. n. Schäperclaus	monotrich begeißelt
Gelatinstich	trichterförmig	choleraähnlich (Luftblase)	choleraähnlich (Luftblase)
Gasbildung aus Traubenzucker	negativ	negativ	negativ
Kartoffel	gelb-braun gelb	gelbbraun	gelb (fleischfarben bis dunkelbraun)
Phosphoreszenz	Ø		Ø
Temperaturs Serum	bei Zpt. bei 37° schlecht wachsd.	psychrophil	psychrophil
Cholerarotreaktion	1. Publ. positiv 2. „ negativ	negativ „Nitrosoindolreaktion fiel positiv aus, wenn . . . Kaliumnitrit zugesetzt wurde“	negativ bei an höhere Temp. (34°) angepaßte Stämme positiv
Lebensfähigkeit in Salzwasser	positiv	positiv	nicht untersucht
Lebensfähigkeit in Süßwasser	negativ	negativ	positiv
Pathog. für Kaltblüter	positiv	negativ	positiv
Pathog. für Warmblüter	negativ	negativ	negativ

sich erweisen, daß die Vibrionen aller drei Autoren monotrich wären, so hätten wir unseres Erachtens einen bedeutend wichtigeren Anhaltspunkt zur Entscheidung der Identität der drei Vibrionen, als es z. B. das Fehlen oder Vorhandensein einer oder der anderen chemischen Leistungen oder sonstiger häufig recht variabler Eigenschaften sein können. Leider liegt uns nur ein kurzes Referat über die Untersuchungen Aasers über die Hechtepest vor, so daß der uns besonders interessierende Befund über einen für Süßwasserfische pathogenen *Vibrio* nicht zum Vergleiche mit den oben angeführten Vibrionen herangezogen werden kann. Es erübrigt sich weiter über die vermutliche Identität der verschiedenen Vibrionen zu sprechen, was sich doch nur auf Theorien beschränken könnte. Notwendig wäre es jedoch, sämtliche verchiedenerorts als fischpathogen erkrankte Vibrionen einheitlich bakteriologisch und auch serologisch zu untersuchen, weil dadurch Anhaltspunkte gewonnen werden könnten, ob bei verschiedenen Fischarten ein bestimmter *Vibrio* septikämische Erkrankungen unter verschiedenen klinischen Bildern erzeugen kann oder ob dies durch verschiedene Vibrionenarten geschieht.

Literatur.

1. Aaser: Gjeddepesten 1923 ref. Ellenberger-Schütz Jahresbericht, XLV. Jahrg., 1925, S. 335.
2. Bergmann: Berichte aus der königl. bayer. Biolog. Versuchstation in München II, S. 10.
3. Derfelbe: Zentralblatt für Bakt. ufw. I. Abt. Orig. Bd. 62, 1912.
4. David: daselbst Bd. 102, 1927.
5. Schäperclaus: Z. für Fischerei ufw. Bd. XXV, 1927, S. 99.

Einiges über Mißbildungen.

Von Geh. Vet.-Rat Dr. phil. et. med. vet. h. c. L. Greve, Landesobertierarzt a. D. in Oldenburg.

(Mit 4 Abbildungen.)

In meiner Sammlung befinden sich einige Präparate von Mißbildungen, die nachstehend näher beschrieben werden sollen.

A. Präparate von Polydaktylie bei Pferden und Schweinen.

1. Von der hiesigen Kadaver-Vernichtungsanstalt wurden mir die Vorderbeine eines neugeborenen Fohlens zugesandt. Beide Füße, welche noch von der Haut bedeckt waren, endeten am Fesselgelenk in zwei Zehen, die sich kreuzweise übereinanderlegten. Die Hornschuhe hatten nicht die runde normale Form, sondern ähnelten der Klaue des Rindes. Die innere Hornwand war flach, die äußere gewölbt.

Nach Entfernung der Haut zeigten sich an beiden Füßen die Streck- und Beugesehnen des Fußes von der Vorderfußwurzel an geteilt. Bei dem weiteren Präparieren traten die Knochen in Form und Lagerung, wie es aus den Abbildungen (Präparat I, Bild 1 und 2) zu ersehen ist, hervor.

Dicke und am unteren Gelenkende 3,5 cm breit und 2,4 cm dick. Eine dreigliedrige Zehe, die etwas schwächer ist, als die an das Schienbein sich anschließende, ist durch ein normales Gelenk mit dem Griffelbein verbunden. Die Form und die Größenverhältnisse der Knochen der beiden Zehen sind ziemlich dieselben, wie beim rechten Fuß.

Interessant ist bei diesen Präparaten, daß bei demselben Tiere die Ausbildung der überzähligen Zehen an den Vorderfüßen so verschieden ist. Die Frage, ob diese Mißbildungen am rechten Fuß auch als „entwicklungsmäßige Polydaktylie“ nach Schmalz aufzufassen oder auf Spaltung zurückzuführen ist, lasse ich offen.

2. Linker Vorderfuß eines Fohlens.

(Präparat II auf Bild 1 und 2.)

Über den Verlauf der Sehnen kann nichts angegeben werden. Das Schienbein ist der Länge nach in zwei Teile



Das rechte Schienbein ist am oberen Ende von normaler Form. 5,5 cm breit und 3 cm dick, in der Mitte 3,5 cm breit und 2 cm dick, dann flacht sich der Knochen bis zu einer Dicke von 1 cm ab, wird breiter und geht seitwärts in einen zweiten runden Gelenkkopf über. Hier ist das Schienbein 9,5 cm breit. Die Länge der ganzen Röhre 22,5 cm. Die beiden Griffelbeine sind normal, das mediale reicht bis fast an die Epiphyse des Gelenkkopfes und ist 17 cm lang, das laterale 13,5 cm. Das an das Hauptgelenk des Schienbeins anschließende Fesselbein ist 7 cm lang, am oberen Ende 3,2 cm, am unteren 2,5 cm breit, das Kronbein oben 3,1 und 3,5 cm breit. Das Hufbein fällt nach außen flach ab und besitzt hier keinen Hufbeinast, im übrigen ist es normal. Das andere Fesselbein ist 6 cm lang, oben 3 und unten 2,5 cm breit, das Kronbein ist 2,1 cm lang und 3 cm breit. Die laterale Seitenfläche des Hufbeins ist normal, die mediale fällt fast senkrecht ab. Sesambeine sind an den Fesselbeinen vorhanden. Die laterale Zehe ist nach innen so um ihre Längsachse gedreht, daß die Sohlenfläche von vorn zu sehen ist.

Das linke Schienbein ist 22 cm lang, oben 5,5 cm, in der Mitte 2,9 cm und am unteren Gelenkende 5,6 cm breit. Das mediale Griffelbein ist normal ausgebildet und reicht etwa bis zur Mitte des Schienbeins, das laterale ist überentwickelt und trägt am unteren Ende eine Gelenkfläche. Es ist oben 2,5 cm breit, in der Mitte 1,8 cm bei gleicher

geteilt, die am oberen Ende fest verwachsen sind, sich aber am unteren trennen. Die laterale Schienbeinhälfte ist halb so dick wie die mediale und um 2 cm kürzer. Beide Schienbeinhälften besitzen ein normal ausgebildetes Griffelbein, die Zehen sind normal ausgebildet, doch ist die äußere schwächer. Die Hornschuhe haben eine normale Form.

3. Linker Vorderfuß eines Fohlens.

(Präparat III auf Bild 1 und 2.)

Das Schienbein ist normal ausgebildet. Das sich in normaler Weise anschließende Fesselbein teilt sich im unteren Drittel in zwei Äste, die mit je einer runden, seitlich zusammengedrückten Gelenkfläche enden. Kron-, Huf- und Strahlbein sind ebenfalls gespalten, sie sind seitlich zusammengedrückt, die Gelenkflächen sind gut ausgebildet. Der Durchmesser des Kronbeins beträgt von vorn nach hinten gemessen 3,5 cm, von innen nach außen 1,9 cm. Die Hufbeine sind mit der Sohlenfläche einander zugekehrt, der Hornschuh hat die Form des Rinderklauenschuhs.

4. Eine überzählige Zehe eines Fohlens.

(Präparat IV auf Bild 1 und 2.)

Diese befand sich in einer Fleischgeschwulst am Fesselbein eines Vorderfußes. Das Fesselbein war durch ein fehniges Band mit dem Schienbein verbunden. Die ganze Länge der Zehe beträgt 8,5 cm.

5. Hyperdaktylie bei Schweinen.

(Präparat V auf Bild 3.)

Bei den in meiner Sammlung vorhandenen sechs Präparaten geht die überzählige Zehe viermal von dem Vorderfußwurzelknochen und zwar dreimal von dem medialen und einmal von dem lateral gelegenen aus. Im Präparat V ist der lateral gelegene Mittelfußknochen, an dessen unterem Gelenkende sich drei kräftig ausgebildete Zehen anschließen, fast so stark, wie die mittleren. Bei einem anderen Präparat von einem neugeborenen Ferkel sind vier Mittelfußknochen vorhanden, von denen der lateral gelegene, welcher eine schwächere und eine stärkere Zehe trägt, am stärksten ausgebildet ist. Die zu diesem Wurf gehörenden acht Ferkel hatten entweder an beiden oder an einem Vorderfuße fünf Zehen.

Bei einem Schweinefötus fand ich am rechten Vorderfuß fünf Zehen, und zugleich lag bei demselben Zyklopie vor.

B. Präparate von Tieren mit überzähligen Beinen.

1. Skelett eines zwei Tage alten Hühnchens.

(Präparat VI auf Bild 3.)

Das Knochengerüst ist vollständig ausgebildet. Die Darm-, Scham- und Sitzbeine sind normal, von den Schwanzwirbeln fehlen nur die letzten Glieder. An die Schwanzwirbel schließen zwei, nebeneinander liegende, nach unten und hinten verlaufende 1,5 cm lange feine flache Oberschenkelknochen an, mit denen links ein 9 mm und rechts

in senkrechter Richtung die dicht aneinander liegenden, 16 cm langen Oberschenkelknochen und an diese die nach außen verlaufenden, 7 cm langen Unterschenkel mit je einem feinen Wadenbein an. Dann folgen die wieder nach innen verlaufenden, 5 cm langen Mittelfußknochen, an welche vier vollständig ausgebildete Zehen angegliedert sind.

An den normalen Schenkeln beträgt die Länge des Oberschenkelknochens 6,9 cm, die des Unterschenkels 8 cm, die des Mittelfußknochens 6 cm.

3. Präparat eines überzähligen Beinchen, welches sich am Bauche eines drei Tage alten Hühnchens befunden hat.

An dem Präparat befindet sich ein 3 cm breiter und 7 mm langer flacher Beckenknochen, dem sich seitlich je ein feiner fadenförmiger 1 cm langer Knochen (Schambein) anschließt. Mit dem Beckenknochen verbunden ist ein ziemlich kräftiger, 1,4 cm langer Oberschenkel und mit diesem ein gleich kräftiger, 2 cm langer Unterschenkel, welchem sich ein zarter, feiner 1,2 cm langer Mittelfußknochen angliedert. An Zehen sind nur I und III vorhanden, die übrigen fehlen.

4. Spirituspräparat von einem Teichfrosch mit drei überzähligen Beinen.

(Präparat IX auf Bild 3.)

Das von einem Landwirt in Spiritus gelegte Präparat ist etwas geschrumpft. Die beiden Hinterbeine sowie das rechte Vorderbein sind normal ausgebildet. In Höhe des rechten Vorderchenkels befindet sich linksseits ein etwas schwächerer und unmittelbar dahinter ein etwa halb so starker Schenkel. Weiter kaudalwärts befindet sich ein dem rechten Vorderschenkel gleich kräftiger Schenkel und unmittelbar hinter diesem ein vierter, dem vordersten gleich kräftiger Schenkel. An diesen überzähligen Schenkeln der linken Seite sind Ober- und Unterarm sowie die Zehen normal ausgebildet.

C. Skelette von Doppelbildungen.

1. Doppelmißbildung (Diprosopus) eines Kalbes.

(Präparat X auf Bild 4.)

Die Mißbildung war ein Hindernis bei der Geburt. Der Kopf wurde mit der Kettenfäße abgesetzt. Ein Hinterhauptsbein mit Hinterhauptsloch und ein Scheitelbein sind gemeinschaftlich, im übrigen sind die Kopfknochen doppelt vorhanden.

2. Doppelmißbildung bei einem Hasen.

(Cephalothoracopagus).

(Präparat VIII auf Bild 3.)

Zu dieser Mißbildung gibt mein Vater, Dr. Ed. Greve, folgende Beschreibung: Ein Landmann brachte mir eines Tages eine Mißbildung, welche er an demselben Tage, morgens im Lager eines Hasen gefunden hatte. Es handelt sich um eine Doppelmißgeburt eines Häschens. Dieselbe zeigte einen einfachen Kopf und zwei zu einem Ganzen verbundene Vorderkörper mit vier Gliedmaßen. Der Nabel war doppelt vorhanden. Unterhalb des Nabels bestand eine vollständige Trennung des Körpers in zwei Körper mit je zwei Hintergliedmaßen.

Bei dem Sezieren und der Anfertigung des Skeletts zeigten sich die Gesichtsknochen und das Scheitelbein einfach. An den letzteren, in die Breite gezogenen Knochen schließen sich zwei Hinterhauptsbeine an, deren großes Hinterhauptsloch und Gelenkfortsätze seitlich gestellt sind. In der Schädelhöhle liegen Teile von zwei Gehirnen. An die Gelenkfortsätze der Hinterhauptsbeine gliedert sich je eine Wirbelsäule an, die auseinander treten und oben etwas gebogen sind. Sämtliche acht Gliedmaßen sind normal ausgebildet. Beide Körper sind mit der Brust einander zugekehrt und die Rippen derselben jederseits durch ein vollständiges Brustbein verschmolzen, so daß nur eine Brusthöhle besteht. In dieser Brusthöhle befanden sich zwei getrennte Herzen. Die Baucheingeweide waren in beiden Körpern vollständig vorhanden und normal ausgebildet.



ein 1,9 cm langer, nach unten verlaufender Unterschenkelknochen verbunden ist. Hieran gliedert sich je ein 1,8 cm langer, nach oben verlaufender Mittelfußknochen, an welche sich die vier normal gebildeten Zehen anschließen, die links bis zur Höhe des Beckens und rechts mehr nach außen und weniger hoch reichen.

2. Skelett von einem ausgewachsenen Huhn.

(Präparat VII auf Bild 3.)

Die Rückenhöhe beträgt 18 cm. Außer den zwei normal ausgebildeten Schenkeln hängen an der Unterseite des Bauches noch zwei, fast gleich starke vollständige Schenkel, die mit dem Skelett keine Verbindung haben. Diese beiden Schenkel besitzen am oberen Ende zwei wagerecht liegende miteinander verwachsene, auf der Oberfläche abgerundete, 12 mm lange Knochen, die nach hinten in dünne, 13 mm lange und 5 mm breite, scharfkantige, mit der breiten Fläche einander zugewandte Knochenplatten übergehen. Die ersten Knochen sind als Darmbeine, die letzteren als die Sitzbeine anzusehen. An die Darmbeine schließen sich

Die Mißbildung beim Hafen und beim Frosch dürften von besonderem Interesse sein, da Mißbildungen bei freilebenden Tieren, wenn sie vielleicht auch nicht seltener vorkommen wie bei den Haustieren, besonders Schafe, Ziegen, Schweinen, so doch seltener und nur durch Zufall uns zur Beobachtung kommen.

3. Doppelmißbildung eines totgeborenen Ziegenlammes (Dicephalus).

(Präparat XI auf Bild 4.)

Das Lamm besaß zwei Köpfe und Hälfte, die vor der Brust in den Körper übergingen. Das Skelett desselben zeigt zwei normal ausgebildete Schädel, an welche je eine Halswirbelsäule anschließt, die am ersten Rückenwirbel zusammenstoßen. Die Wirbelsäule ist oben offen. An den ersten Rückenwirbeln stehen an beiden Seiten 1,7 cm von einander entfernt einige kräftige Dornfortsätze. Weiter nach hinten erscheint die Wirbelsäule flach und ist an den Lenden 2,9 cm breit. In der Mitte ist die Wirbelsäule stark nach oben gebogen. Die Rippen liegen den Rückenwirbeln dicht aneinandergedrängt an und treten nach unten breiter werdend auseinander. Die Gliedmaßen sind normal ausgebildet.



4. Doppelmißbildung eines Schaflammes.

(Cephalothoracopagus).

(Präparat XII auf Bild 4.)

Das Skelett des Lammes besitzt einen Kopf, in welchem alle Knochen einfach gebildet sind. Das Hinterhauptbein ist in die Breite gezogen und hat zwei nahe aneinanderliegende Hinterhauptslöcher mit Gelenkfortsätzen. An diese setzt sich je eine Halswirbelsäule an, die leicht ge-

bogen auseinander laufen. Die Rückenwirbel bilden dann einen stärkeren Bogen und nähern sich dem Becken zu wieder. An die Rückenwirbel setzen sich jederseits dreizehn Rippen an, die nach außen laufen und mit den Rippen derselben Seite der anderen Körperhälfte durch ein Brustbein verbunden sind, so eine große gemeinschaftliche Brusthöhle bildend. Am Brustkorb hängen jederseits zwei mit den Buggelenken einander zugekehrte Vordersehenkel. An die nahe einander gegenüberliegenden Becken schließen sich die Hintersehenkel an, welche sich miteinander kreuzen. Sämtliche Schenkel sind normal ausgebildet.

Außer den beschriebenen Mißbildungen enthält meine Sammlung noch ein Skelett von einem Ziegen- und Schaflamm. Bei dem ersteren sind von den Vordersehenkeln nur die Schulterblätter ausgebildet, an deren Spitze zulaufendem Buggelenk sich ein kleines, gut hanfkorngroßes Knöchelchen anschließt. Bei dem Schaflamm ist die Rückenwirbelsäule S-förmig verbogen und der Brustkorb stark von hinten nach vorn zusammengedrückt. Die Lenden und Kreuzwirbel liegen in gerader Richtung.

Zum Vorkommen von Keimen aus der Paratyphus-Enteritis-Gruppe bei Kälbern und erwachsenen Rindern.

Von Dr. E. Lehr, Potsdam.

Nachdem Karsten in einer Entgegnung (D. T. W. 1928, S. 317) auf meine Ausführungen (D. T. W. 1928, S. 278) mir Übertreibung und Unterstellung einer unwahren Behauptung vorgeworfen hat, bin ich gezwungen, hierzu Stellung zu nehmen. Wie in dem Originalaufsatz (D. T. W. 1927, S. 781) jeder Unbefangene nachlesen und vergleichen kann, habe ich mich bei meinen Ausführungen durchaus sachlich an die Angaben von Karsten gehalten. Im besonderen möchte ich folgendes hervorheben:

Neben einigen Angaben aus dem Schrifttum gründet Karsten in seinem Originalaufsatz entgegen den Ausführungen in seiner Erwiderung seine dortigen Schlußfolgerungen, soweit sie das Vorkommen von Keimen aus der Paratyphus-Enteritis-Gruppe bei Kälbern und Rindern betreffen, nur auf die von mir bereits angezogenen 22 Fälle eigener Beobachtung. Wenn ihn noch andere Fälle und Erfahrungen aus eigener und fremder Tätigkeit, auch in früherer Zeit bereits veröffentlichte, zu seinen Ausführungen veranlaßt haben, so ist kein Grund einzusehen, warum er dies nicht in irgend einer Form zur Kenntnis der Leser gebracht hat. Jedenfalls konnte bei einer Stellungnahme nichts anderes zu Grunde gelegt werden als das, was Karsten selbst angegeben hatte. Mit der neuen Mitteilung gewinnt die Frage allerdings ein etwas anderes Gesicht, was naturgemäß auch eine andere Stellungnahme bedingen würde.

In der Originalarbeit von Karsten ist an keiner Stelle

die von ihm in der Entgegnung als „altbekannt“ hingestellte Tatsache der intravitale Breslauinfektion beim Kalbe erwähnt. Da sich Karsten in seiner Originalarbeit doch grundsätzlich und ziemlich einschneidend mit der postmortalen Paratyphus-Enteritis-Infektion bei Kälbern und Rindern und ihrer Bedeutung für die Entstehung von Fleischvergiftungen befaßt, wäre es doch sehr naheliegend und nur gerecht gewesen, wenn er gleichzeitig auch die ihm wenigstens bei Kälbern bekannte intravitale Breslauinfektion gestreift und auf ihre Bedeutung für dieses so wichtige, aber noch recht unvollkommen geklärte Gebiet hingewiesen hätte.

In seiner Originalarbeit hat Karsten nicht mit dem Nachdruck, wie er es nunmehr in seiner Entgegnung tut, zum Ausdruck gebracht, daß er seinen Feststellungen nur örtliche Bedeutung beimißt; insbesondere sind seine Schlußfolgerungen vollkommen allgemein gehalten. Im übrigen stellt die Entgegnung eine wesentliche Einschränkung der ersten Schlußfolgerungen und eine Anerkennung meiner Einwände dar, da Karsten ja das wenn auch weniger häufige Vorkommen von intravitale Breslauinfektionen bei Kälbern auch in Nordwestdeutschland nunmehr zugibt. Wenn das aber der Fall ist, so war es wissenschaftlich nicht gerechtfertigt, den Satz aufzustellen, daß Breslaufunde bei Fleischvergiftungen durch Kalbfleisch „gegen eine intravitale Infektion sprechen“.

In meiner Arbeit ist von einer durch Breslau-Keime verursachten Kälberseuche, welchen neuen Begriff Karsten in seiner Entgegnung in die Erörterung wirft, nicht die Rede gewesen, sondern nur vom Vorkommen von Keimen aus der Paratyphus-Enteritis-Gruppe bei Kälbern und Rindern und dessen Bedeutung für die Entstehung von Fleischvergiftungen. Unter diesen allgemeinen Begriff fallen aber meines Erachtens Einzelfälle ebenso wie Seuchen-erkrankungen. Die Bedeutung der Breslau-Einzelerkrankungen für die Entstehung von Fleischvergiftungen ist nicht geringer als die seuchenhaft auftretender Erkrankungen, eher größer, da sie unauffälliger sind. Mit Rücksicht auf die anerkannte geringere Gefährlichkeit des echten Kälberparatyphus in Bezug auf Fleischvergiftungen muß man den Breslau-Erkrankungen im Verhältnis stärkere Beachtung entgegenbringen.

Die erheblich und grundlegend eingeschränkte Schlußfolgerung, die Karsten in seiner Entgegnung bringt, ist etwas ganz anderes, als das, was er in seiner Originalarbeit gesagt hat. Diese abgeänderte Schlußfolgerung deckt sich dem Sinne nach vollkommen mit dem Grundgedanken meiner

Ausführungen, daß nämlich bei der Beurteilung der ursächlichen Zusammenhänge einer Fleischvergiftung die eingehende Würdigung aller Umstände eine fachlich unbedingt zu fordernde Notwendigkeit ist, daß man sich nicht von vornherein mit vorgefaßter Meinung auf einen bakteriologischen Befund stützen und diesen als mehr oder minder abschließend betrachten kann, wie das in gewissem Sinne in der Originalarbeit der Fall war: „Werden anlässlich von Fleischvergiftungsfällen durch Kalbfleisch Bakterien der Paratyphus-Gruppe ermittelt, die nicht zum Gärtnerotyp gehören, so spricht dies gegen eine intravitale Infektion des Fleisches mit den Fleischvergiftungskeimen; das gleiche dürfte beim erwachsenen Rinde zutreffen“. Örtliche Eigenarten im Auftreten bestimmter Paratyphus-Enteritis-Keime habe ich ebenso unumwunden zugegeben, wie ich die Verallgemeinerung örtlicher Eigenheiten abgelehnt habe. Hätte Karsten die abgeänderte Schlußfolgerung seiner Entgegnung bereits in der Originalarbeit gebracht, so wäre jede Gegenrede gegenstandslos geworden, da wir ja nunmehr den gleichen Standpunkt einnehmen.

Anatomie und Physiologie.

Baum, H.: Die Lymphgefäße des Kehlkopfes der Haustiere (Pferd, Rind, Schwein und Hund). (Aus der Festschrift für Eugen Fröhner; Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart, 1928.)

Baum beschreibt eingehend das systematische Verhalten der Lymphgefäße der einzelnen Teile des Kehlkopfes vom Pferd, Schwein, Rind und Hund und stellt vergleichende Betrachtungen an. Man kann im allgemeinen zwei Abflußwege unterscheiden, einen für den oralen (vorderen) Teil des Kehlkopfes und einen für den kaudalen (hinteren) Teil des Kehlkopfes. Beide Wege sind aber nicht scharf und nicht ausnahmslos voneinander getrennt, insofern, als manche Teile des Kehlkopfes ihre Lymphgefäße zu beiden Abflußwegen schicken oder insofern, als Lymphgefäße eines Teiles, die in der Regel zu einem der beiden Abflußwege sich gesellen, ausnahmsweise auch zum anderen Abflußwege sich gesellen können. Beide Abflußgebiete haben auch nicht bei allen Tierarten dieselbe Ausdehnung. Der *M. arytaenoideus dorsalis* z. B. schickt seine Lymphgefäße beim Schwein und Rind zu beiden Abflußwegen, beim Hund nur zum oralen, beim Pferde nur zum kaudalen Abflußweg, oder der Aryknorpel beim Schwein und Pferd zu beiden Abflußwegen, beim Hund nur zum kaudalen, beim Rind zum oralen. — Die beiden Abflußwege suchen bei den einzelnen Tierarten verschiedene Lymphknoten und Lymphknotengruppen auf: beim Schwein die Lymphgefäße des oralen Abflußweges die Lnn. retropharyngei mediales und laterales und die Lnn. mandibulares und die Lymphgefäße des kaudalen Abflußweges die Lnn. cervicales craniales, medii und caudales, beim Pferd die Lymphgefäße des oralen Weges die Lnn. retropharyngei einschließlich Luftacklymphknoten, die des kaudalen Weges die Lnn. cervicales craniales; beim Hund die Lymphgefäße des oralen Weges den Lnn. retropharyngeus medialis, die Lymphgefäße des kaudalen Weges den Ln. cervicalis cranialis, ausnahmsweise auch den Ln. cervicalis medius, öfter aber auch den Ln. retropharyngeus medialis, beim Rinde die Lymphgefäße des oralen Weges den Ln. retropharyngeus medialis, bisweilen aber auch eines der Lymphgefäße die Lnn. cervicalis craniales und die Lymphgefäße des kaudalen Weges die Lnn. cervicales craniales und medii, nicht selten aber auch den Ln. retropharyngeus medialis. Dadurch, daß bei manchen Tierarten (z. B. beim Hunde) beide Abflußwege denselben Lymphknoten oder dieselbe Lymphknotengruppe auffuchen, wird die Bedeutung des allgemeinen Befundes von den beiden Abflußwegen in vergleichender Beziehung erheblich abgeschwächt, sie hat mehr Bedeutung nur für einzelne Tierarten. Sie wird auch abge-

schwächt durch den weiteren Befund, daß ausnahmsweise einzelne Lymphgefäße eines Abflußweges in andere Lymphknoten, als die Regel angibt, einmünden können (vergleiche oben).

Die Angabe von Sappéy, daß beim Schafe die Lymphgefäße des Kehlkopfes oben (wohl oral!) sehr gut, unten (wohl kaudal!) gar nicht entwickelt sind, konnte Baum nicht bestätigen. Die Lymphgefäße sind am Kehlkopf des Schafes in der gleichen Weise wie bei den anderen untersuchten Tierarten entwickelt und lassen sich auch beim Schaf von allen Teilen des Kehlkopfes aus injizieren, wenn auch die Lymphgefäßnetze der dem Ringknorpel anliegenden Schleimhaut auffallend wenig entwickelt sind. Im allgemeinen treten bei allen Tierarten die Lymphgefäßnetze in der dem Ringknorpel anliegenden Schleimhaut weniger deutlich und weniger reichhaltig hervor als in der Schleimhaut des übrigen Kehlkopfes, besonders deutlich ist der Unterschied beim Schafe. Autoreferat.

Duill, H.: Vergleichende makroskopische und mikroskopische Untersuchungen der Haare von Rind und Ziege. (In.-Diss. Berlin 1924.)

Es scheint, als ob bei gut genährten Tieren die Unregelmäßigkeiten im Verlaufe des Markzylinders in der basalen Hälfte liegen, während schlecht genährte Rinder diese Unterbrechungen mehr in der distalen Hälfte zeigen. Alter und Geschlecht lassen Unterschiede hierin nicht erkennen. Bei der Ziege ergeben die Befunde zunächst einen Geschlechtsunterschied. Der Markstrang bei der Ziege ist erheblich dicker als beim Bock. Die Unterbrechungen, wie Verfasser sie beim Rinde gesehen hat, zeigt er nicht so regelmäßig. Die Unregelmäßigkeiten in seinem Bau betreffen hauptsächlich die Spitzen. Bei den gutgenährten Böcken finden sich wurzelwärts und in dem Mittelteil Auflockerungen und Unterbrechungen, während die Markstränge der schlechtgenährten außer der ausgefaserten Spitze keine Unregelmäßigkeiten zeigten. Unter den Ziegen wiesen die gutgenährten Tiere nur Veränderungen an der Markstrangspitze auf, während die schlecht genährten Tiere diese Erscheinungen auch im Mittel- und Wurzelteil des Markstrangs zeigten. Mithin ließ sich am Ziegenhaar auch eine Einwirkung der Ernährung feststellen. Die Unterscheidung von Rinder- und Ziegenhaar ist leicht möglich durch die Unterschiede im Verlauf der Kutikulazeichnung und das Bild des Markzylinders. Die Dicke des grobscholligen Markzylinders bei der Ziege erreicht bis vier Fünftel der Dicke des Gesamthaares, während beim Rinde höchstens zwei Drittel der Gesamtdicke herauskommen. A.

Innere Medizin und Chirurgie.

Kasahara, M.: Experimentelle Studien über die intrakutane Resorption. (Zeitschr. für die gesamte experimentelle Medizin Bd. 44, 1925, S. 294.)

Wir verstehen unter intrakutaner Resorption den Vorgang der Überführung von in das eigentliche Kutisgewebe eingebrachten Substanzen in die zirkulierenden Gewebssäfte, speziell in das Blut. Die Technik der intrakutanen Injektion macht keine Schwierigkeiten, vorausgesetzt, daß man dabei einige Vorsichtsmaßregeln innehält. Die Resorptionsverhältnisse bei intrakutaner Injektion verhalten sich ganz anders als die Subkutanen. Die Resorptionskraft der Intrakutis ist im allgemeinen kleiner als die der Subkutis. Sie ist erheblich verzögert und langsam. Die intrakutan eingeführten Substanzen werden ziemlich lange in der Injektionsstelle zurückgehalten und allmählich resorbiert. Der Beginn und der Höhepunkt der Ausscheidung tritt bei intrakutaner Injektion später ein, und ihre Menge ist geringer als bei der subkutanen. Die intrakutan eingeführten korpuskulären Elemente und Bakterien werden frühzeitig nach den regionalen oberflächlichen Lymphdrüsen geführt oder verschleppt. Das anatomische Verhalten der Gefäßverteilung, besonders die geringe Gefäßverästelung und das Fehlen der Kapillaren in der eigentlichen Kutis spielt als die Ursache der Verzögerung der intrakutanen Resorption eine wichtige Rolle. Außerdem beteiligt sich noch daran das feste, straffe Bindegewebe in der eigentlichen Kutis. Bei intrakutaner Resorption von korpuskulären Elementen und Bakterien spielen die oberflächlichen Lymphnetze des Koriums eine große Rolle.

A.

Strebel, W.: Über einen Fall von Tetanus nach aseptischer Fußoperation. (Aus der Universitätsklinik für orthopädische Chirurgie in Frankfurt a. M.) (M. m. W. 1927, S. 1591.)

Bei einem 17jährigen Kranken wurde eine eingreifende Fußoperation vorgenommen, die mit einer offenen Durchtrennung der Fußsohlenmuskulatur und der Plantarfaszie verbunden war. Der Heilungsverlauf war ein guter, keine Sekretion, kein Dekubitus. Am fünften Tage nach der Operation klagte Patient plötzlich über Kopfschmerzen, kurz nachher deutlicher Trismus und Opisthotonus. Trotz aller Maßnahmen tödlicher Ausgang nach ca. 14 Stunden. Die post mortem erfolgte Untersuchung der Wunde ergab tadellose Wundheilung ohne Entzündungsherde.

Verf. erklärt das Auftreten des Tetanus im Anschluß an eine unter strengster Asepsis ausgeführte Operation damit, daß es sich in vorliegendem Falle um den Sohn eines Landwirtes handelte, der sich in der Ackerwirtschaft seines Vaters beteiligte und bei dieser Gelegenheit jedenfalls öfters barfuß ging. Bei dieser Gelegenheit haben sich offenbar Tetanussporen in die tiefe Fußsohlenhaut eingenistet. Auf Grund der gemachten Erfahrung empfiehlt Verf. eine mehrtägige gründliche reinigende Vorbehandlung des betr. Fußes und die Verabreichung einer prophylaktischen Antitoxindosis.

Carl.

Dietrich, A. und G. Fleischhauer: Neue Desinfektionsversuche mit Rein- und Rohchloramin-Heyden unter besonderer Berücksichtigung anaerober Sporenbildner. (Aus dem Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg und für Berlin. — Direktor: Dr. Scharr.) (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 104, S. 429, 1927.)

Die beiden vorliegenden Präparate weisen eine Reihe nicht zu unterschätzender Vorteile auf. Sie zeichnen sich durch einen konstanten Chlorgehalt (25—30 Prozent) und durch lange Haltbarkeit aus. Durch ihre geringe Giftigkeit, verhältnismäßige Billigkeit und leichte Handhabung eignen sich die Chloraminpräparate zu brauchbaren Desinfektionsmitteln, wobei der bei ihrer Anwendung entstehende Sauerstoff eine Rolle spielt. Rohchloramin enthält ca. 80 Prozent Reinchloramin. Die Versuche, die Verff. mit beiden Präparaten bezüglich ihrer Desinfektionskraft unter Verwen-

dung von 13 Tierleuchenerregern anstellten, ergaben zunächst, daß vegetative Wuchsformen derselben durch 1proz. Konzentrationen in einer für die praktische Desinfektion brauchbaren Zeit (1—10 Minuten) sicher abgetötet werden. Im allgemeinen konnte stets eine geringe Überlegenheit des Reinchloramins gegenüber dem Rohprodukt festgestellt werden, was besonders in den 0,1prozentigen Verdünnungen deutlich hervortrat. Sporenbildner sowohl aerobe wie anaerobe, werden erst in 5—10prozentigen Lösungen angegriffen. Ihre Abtötung unterliegt wegen der bei dieser Gruppe vorhandenen Resistenzunterschiede sehr großen Schwankungen. Für eine schnelle Desinfektion sind noch höhere wie 10prozentige Konzentrationen erforderlich. Die Chloraminpräparate sind der Karbolsäure in der Abtötung von Bazillenmaterial um ein Vielfaches überlegen; bei der Abtötung von Rauchbrandsporen Foth (Schaf) zeigen sich keine nennenswerten Unterschiede.

Carl.

Rudolf, J.: Über das Vorkommen einer infektiösen Bronchitis- und Bronchopneumonie beim Rind in Österreich. (W. t. Mschr. 1928, Jhg. XV, S. 193.)

Verf. beobachtete eine feuchtenhaft verlaufende Erkrankung der Respirationsorgane bei Rindern, die sich in der leichten Form als Katarrh der oberen Luftwege zeigte. In schweren Fällen trat eine fieberhafte akute Bronchitis bzw. Bronchopneumonie auf. Die Krankheit wurde stets durch frisch zugekaufte Rinder eingeschleppt. Der Verlauf der Seuche war im allgemeinen gutartig. Die Ätiologie der Krankheit konnte nicht geklärt werden. Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit durch Kälte, Hunger und Überanstrengung war ein prädisponierendes Moment für den Ausbruch. Für diese Krankheit schlägt Verf. den Namen „Infektiöse Bronchitis und Bronchopneumonie“ vor.

Berge.

Peschke, R.: Ein neues Thermometer für Haustiere. (W. t. Mschr. 1928, Jhg. XV, S. 206.)

Das Thermometer ist 13 cm lang, besitzt einen ziemlich kurzen und kegelförmigen Quecksilberbehälter. Die Gefahr des Durchstoßens der Darmwand ist dadurch wesentlich verringert, da der Kegel den Afterschließmuskel langsam und gleichmäßig dehnt und beim weiteren Eindringen die Darmschleimhaut auseinanderdrängt. Das Thermometer hat zwei Einschnürungen und zwei kugelförmige Erweiterungen am oberen Ende. Ein Weitergleiten wird durch die am oberen Ende liegende größere Kugel verhindert.

Berge.

Slawoff, G.: Versuche mit Magnesiumsalzen zur Tötung von Hunden. (In.-Diss. Berlin 1926.)

Obwohl die orientierenden Versuche mit Magnesiumsulfat auch zum Erfolge führten, so hat sich doch herausgestellt, daß dem Magnesiumchlorid und Magnesiumnitrat der Vorzug zu geben ist. Dem Magnesiumsulfat haften folgende Mängel an: Infolge schwererer Löslichkeit muß eine größere Menge injiziert, und müssen daher auch warme Lösungen angewendet werden; die Wirkung tritt später ein als bei den beiden anderen Mitteln; nach Jakob bleibt die Wirkung bei 28 Prozent der Tiere aus. Die Wirkung des Magnesiumchlorids ist nach den Untersuchungen des Verfassers die gleiche wie die des Magnesiumnitrats. Die intrakardiale ist die beste und zuverlässigste Applikationsmethode und der intrathorakalen vorzuziehen. Mit geringen Mengen Flüssigkeit sind selbst große Hunde in 1—15 Sekunden zu töten. Jakob empfiehlt zur Tötung für einen Hund von 20 kg Gewicht 25 Gramm Magnesiumsulfat in 20—25 Gramm warmen Wassers gelöst, das gibt 36—40 ccm Lösung. Bei Magnesiumchlorid bzw. Magnesiumnitrat beträgt die Lösung nur 10 ccm. Der Preis für die zu einer Vergiftung benötigten Menge eines der beiden Salze ist sehr gering (bei Magnesiumsulfat 1,1 Pfg., bei Magnesiumchlorid 0,7, bei Magnesiumnitrat 1,2 Pfg. zur Vergiftung eines 20 kg schweren Hundes). Die Methode ist schmerzlos (abgesehen vom Kanüleneinstich, der ohne Abwehr ertragen wird),

schnell wirkend, ganz ungefährlich für den Tierarzt, billig, so daß sie geeignet ist, die Blaufäureanwendung aus ihrer jetzt führenden Stellung unter den Vergiftungsmethoden zu verdrängen. Die durch Jakob angeregte Tötung von Hunden mit Magnesiumsalzen verdient daher weitgehendste Berücksichtigung. A.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Schiske, F.: Ein weiterer Fortschritt in der Leberegeltherapie. (Die Zusammenfassung des modifizierten Distols.) (W. t. Mschr. 1928, Jahrg. XV. S. 100.)

Das Distol-Marek (für Rinder) stellt jetzt eine Kombination von 1 Gramm der von Ballaststoffen befreiten, nach einem besonderen Verfahren hergestellten Inhaltsstoffe von Radix Filicis maris (Aspidinolfilixsäure) mit 10 Gramm des lipidlöslichen und die leberegeltötende Wirkung fördernden Hexachloräthan (Perchloräthan puriss.) dar. Dadurch wurde dem Präparat die letzte Möglichkeit genommen, bei Rindern Nebenerscheinungen hervorzurufen, und gleichzeitig seine leberegelvernichtende Wirkung verstärkt. Berge.

Hueber, S.: Beiträge zur Kenntnis der Strongyliden der Schaf- und Ziegenlunge. (Aus der medizinischen Tierklinik der Universität München.) (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 105, S. 216, 1928.)

Die vorliegende Arbeit, deren Einzelheiten sich im Auszuge nicht wiedergeben lassen, sucht die noch immer bei den in Betracht kommenden Lungenstrongyliden bestehenden Unklarheiten in morphologischer und biologischer Beziehung zu berichtigen und andererseits zu erforschen, ob und wieweit die Diagnosestellung der einzelnen Arten nicht nur auf Grund der makroskopischen und mikroskopischen Unterscheidungsmerkmale der geschlechtsreifen Strongyliden selbst, sondern auch insbesondere auf Grund der morphologischen und biologischen Verhältnisse der Eier und Larven im mikroskopischen Bilde und evtl. mit Hilfe der künstlichen Zuchtversuche möglich ist. Verf. hat dabei von der makroskopischen und der mikroskopischen Messung der Parasiten und ihrer Eier unter Niederlegung der Ergebnisse in 18 Tabellen umfangreichen Gebrauch gemacht. Außerdem werden die Artmerkmale in einer übersichtlichen tabellarischen Zusammenstellung aufgeführt. Die auf diese Weise behandelten Strongyliden sind folgende:

1. Strongylus (Synthetocaulus nach Fiebiger) filaria mit Ei und Larven.
2. Strongylus (Synthetocaulus nach Fiebiger) rufescens mit Eiern und Larven.
3. Strongylus (Synthetocaulus nach Fiebiger) capillaris mit Eiern und Larven.
4. Den nur in den subpleuralen dunklen Knötchen beobachteten, bisher nur von Lydtin erwähnten Strongylus von besonderer, den übrigen Arten gegenüber mehr oder weniger abweichender Körpergestaltung ohne Larven und ausgereifte Eier.

Kollegen, die auf parasitologischem Gebiete tätig sind, seien auf die besprochene tiefgründige Veröffentlichung hingewiesen. Carl.

Händel, L.: Krebszüchtung im Tier. Vortrag gelegentlich der 12. Tagung der Deutschen Vereinigung für Mikrobiologie in Wien 1927. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 104, S. 2.)

Auf Grund einer kritischen Würdigung der einschlägigen Literatur gelangt Verf. zu dem Ergebnis, daß sehr wahrscheinlich die Entstehung und Entwicklung von Tumoren endogenen Ursprungs ist und auf einer Änderung der endogenen Eigenschaften der Zellen des Organismus beruht, wobei vielleicht den dem retikulo-endothelialen System entstammenden Makrophagen noch eine besondere Rolle zufällt. Es spricht danach auch vieles dafür, die Krebsentstehung als Stoffwechselproblem aufzufassen, wobei unter

Umständen die Art der Ernährung, namentlich besondere Störungen im Vitaminausgleich, eine die Entstehung der Tumoren begünstigende Wirkung ausübt. Es können aber nach allen Erfahrungen und nach den durch das Tierexperiment begründeten Feststellungen auch exogene Reize verschiedenster — mechanischer, physikalischer und chemischer — Art den Anlaß dafür geben, daß jene endogenen Momente ausgelöst werden, die dann eine Änderung der normalen Eigenschaften der Zellen und deren Entwicklung zu Tumorzellen zur Folge haben. Carl.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Gildemeister, E. und G. Heuer: Über den Nachweis des Vakzinevirus im Blute nach kutaner Impfung. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 105, S. 86, 1928.)

Verff. haben unabhängig von Goldmann (C. f. B. Bd. 105, S. 333) die Frage des Nachweises von Vakzinevirus im Blute geprüft, wobei sie sich der von jenem Autor angewandten Blockierungsmethode des Retikulo-Endothels, mittels intravenöser Einspritzung von Tusche bedienten, andererseits aber auch eine größere Anzahl von Kontrollversuchen an nicht gespritzten Kaninchen anstellten. Die Versuche führten im Gegensatz zu Goldmann zu folgenden Ergebnissen:

1. Das Variolakzinevirus tritt nach kutaner Impfung regelmäßig in den Blutkreislauf über.
2. Die Blockierung des Retikulo-Endothels zeigte in unseren Versuchen keinen Einfluß auf den Nachweis des Virus im Blute. Carl.

Hinz und Schröder: Beiträge zur klinischen Kenntnis der Tuberkulose von Hund und Katze und Bewertung der für die Diagnose intra vitam heranzuziehenden Untersuchungsmethoden. 1. Mitteilung. (Aus der Klinik für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin. — Direktor: Prof. Dr. Hinz.) (T. R. 1928, S. 99.)

Verff. geben zunächst eine geschichtliche und statistische Übersicht. Die eigenen Beobachtungen umfassen die Jahre 1923 bis 1925. Die Mitteilungen erstrecken sich auf Häufigkeit der befallenen Organe, auf Ätiologie, Infektionsquellen und Infektionsversuche. Letztere zur Klärung der Frage der Pathogenität der einzelnen Typen zur Beobachtung der Genese der Krankheit und zur Feststellung von wann an nach der Infektion und auf welche Weise die Krankheit am besten klinisch nachweisbar wird. Näheres muß aus der mit zahlreichen Kurven, graphischen Darstellungen und Tabellen versehenen Arbeit entnommen werden. K. H. Meyer.

Traupe, H.: Über die Alkoholresistenz des Virus der infektiösen Anämie der Pferde, wie über die Spezifität des Kaninchen-Impfversuches. (In-Diss. Berlin 1926.)

Das Virus der infektiösen Anämie wird durch Alkohol nicht abgetötet. Eine sichere Entscheidung darüber, ob das Virus mit den Eiweißkörpern des Serums durch Alkohol ausgefüllt wird, oder ob es in der überstehenden Flüssigkeit verbleibt, ließ sich durch den Kaninchenimpfversuch nicht erbringen. Normalrinder Serum, in derselben Dosis wie zum Zwecke der Anämiediagnose subkutan beim Kaninchen injiziert, ruft bei diesem Schwankungen im Blutbilde hervor, die denen bei Injektion mit Anämieserum nahekommen. Auch durch Aderlässe lassen sich beim Kaninchen positive Blutkurven im Sinne der infektiösen Anämie nach Oppermann erzeugen. Das Serum von an Tuberkulose erkrankten Pferden kann, in der üblichen Dosis an Kaninchen verimpft, typische Anämiekurven im Sinne Oppermanns hervorrufen. Durch wiederholte parenterale Gaben von Serum bzw. defibriniertem Blut vom Schwein läßt sich beim Pferde eine klinisch im Blutbild feststellbare Anämie erzeugen. Das Serum eines solchen Pferdes kann auf Kaninchen verimpft an dessen Blutbild dieselben Veränderungen

erzeugen, die von Oppermann als typisch für infektiöse Anämie bezeichnet werden. Daselbe Material, das bei dem einen Kaninchen positive Blutkurven im Sinne Oppermanns hervorruft, kann bei einem anderen Kaninchen jede Beeinflussung des Blutbildes vermissen lassen. Das Kaninchen kann infolge dieser variablen Reaktionsfähigkeit daher als ideales Impftier für Anämieversuche nicht bezeichnet werden.

A.

Ermonskij: Bekämpfung der Rinderpest in dem Transkaukasus. (Westnik Sowremenoj Weterinarij 1927, Nr. 7, S. 185.)

Die Bevölkerung in dem Transkaukasus ist sehr bunt. Neben wandernden Völkern leben dort auch auf ziemlich hoher Kulturstufe stehende Völkerschaften. Man findet dort auch deutsche Kolonien. So bunt wie hier die Bevölkerung ist, ebenso verschiedenartig sind auch die Rinderassen. Unter diesen befinden sich gegen die Rinderpest immune Rassen, wie z. B. Karajasische Rinder. Bei natürlicher Infektion erkranken sie nur selten. Die Todesfälle betragen nur ungefähr ein Zehntel Prozent. Andererseits erkranken die Kulturassen (deutsche braune, Schwyzer, Taurische), falls die Seuche ausbricht, zu 100 Prozent mit 90—98 Prozent Todesfällen. Zwischen diesen Extremen liegen mittelmäßig empfindliche Rassen, wie Imertinische mit einer Erkrankungsziffer von 100 Prozent und 60 Prozent Todesfällen; grusische Rinder erkranken zu 60—70 Prozent, der Prozentatz der Todesfälle beträgt 20—30 Prozent. Verfasser beschreibt dann die Bekämpfungsmethoden, welche gegen die Rinderpest im Transkaukasus angewandt werden.

I. Ausmerzungen aller erkrankten Tiere.

Die Erfahrung zeigte, daß man diese Methode in Gegenständen anwenden kann:

1. wo die Rinderpest frisch eingeschleppt worden ist,
2. wo die Rinderpest sehr selten vorkommt,
3. wo die Bevölkerung keine Furcht vor Quarantänen hat.

II. Versuche mit der Serumimpfung gegen die Rinderpest im Transkaukasus.

Diese Methode ist aus folgenden Gründen nicht anwendbar:

1. Verpätete Feststellungen der Krankheit.
2. Der Weidegang der Tiere.
3. Die Undurchführbarkeit einer Isolierung der infizierten Bestände.

III. Nach Ansicht des Verf. ist als die beste einer Rinderpest-Bekämpfungsmethode die Simultanimpfung anzusehen. In den simultan geimpften Beständen sind alle Tiere nach 7—10 Tagen schon gesund. Nach einmonatlicher Quarantäne kann man die Bestände als rinderpestfrei betrachten. Bei 9000 Impfungen hatte Verf. nur 0,9 Prozent Todesfälle nach der Impfung zu verzeichnen.

Manchmal wird mit der Impfung gegen die Rinderpest eine andere Seuche, nämlich die Wild- und Rinderseuche oder Piroplasmose verbreitet. Darum darf man bei den Massenimpfungen nicht als Virustiere gelegentlich mit der Rinderpest erkrankte Tiere benutzen, vielmehr verwendet man hierzu nur speziell mit dem Virus geimpfte Kälber.

Bezüglich der Impfung rät Verf. die Impfbezirke möglichst groß zu wählen, damit durch die Quarantäne das Wirtschaftsleben in dem betreffenden Bezirke nicht so empfindlich gestört wird. Nach dieser Bekämpfungsmethode kann man die Quarantäne nur an der Grenze des Bezirkes beschränken.

Damit die Impfung erfolgreich sei, legt Verf. großen Wert darauf, daß Virus und Antiserum im richtigen Verhältnis zueinander appliziert werden. Wird zuviel Virus und zu wenig Serum genommen, dann reagieren die Tiere zu stark, und die Todesfälle vermehren sich.

Vorläufig braucht man im Transkaukasus bei der Simultanimpfung folgende Serumdosis: Auf je 16,36 kg (1 Pud) Körpergewicht bei den tatarischen Rindern 3 bis

4 Gramm, bei den grusischen Rindern 6 bis 8 Gramm, bei Kulturassen 16 bis 18 Gramm, die trächtigen Rinder und Kälber erhalten die zwei- bis dreifache Dosis. Rolle.

Karmann: Immunisierungsversuche mit Gasödemem. Vortrag gelegentlich der 12. Tagung der Deutschen Vereinigung für Mikrobiologie in Wien 1927. (Centralbl. für Bakt. I. Abt. Orig. Bd. 104, S. 170, 1927.)

Leclainche und Vallée haben neuerdings ein aktives Immunisierungsverfahren gegen Raufschbrand angegeben, das auf der Behandlung von Raufschbrandkulturen mit Formalin besteht. Zu einem Gemisch mehrerer derartiger Stämme wurde Formalin im Verhältnis 2—4 : 1000 hinzugegeben und die Mischung sodann 24 Stunden bei 38 Grad gehalten. Die damit in einer Dosis von 0,5 bis 5,0 ccm geimpften Tiere (Meerschweinchen und Rinder) erwiesen sich gegenüber einer Infektion mit dem Raufschbrandbazillus geschützt. Diese Angaben wurden von Karmann in fünf Versuchen an 70 Meerschweinchen und 18 Kontrolltieren nachgeprüft. Die zur Immunisierung verwendeten Vakzine erhielten einen Formalinzusatz von 4—12 : 1000, wobei sich ergab, daß die erstgenannte Formalinmenge sich als zu gering erwies. Eine größere Anzahl von Meerschweinchen (5 von 17) starb bei einem Formalinzusatz von 4 : 1000 an Impfraufschbrand. Die Dosis 12 : 1000 führte bei einem Teil der Versuchstiere den Tod unter Krämpfen herbei. Dagegen bewährte sich ein Formalinzusatz von 6 : 1000 und eine Impfdosis von 1,5 ccm. Sämtliche 20 derartig vorbehandelten Meerschweinchen erwiesen sich gegenüber einer Nachimpfung mit Raufschbrandbazillen immun, während die vier Kontrollen starben. Es ist damit bewiesen, daß die von Leclainche und Vallée angegebene Formalin-Vakzine eine hohe immunisierende Kraft entfaltet. Es ist angezeigt, die Immunisierungsversuche auch auf Schafe und Rinder auszudehnen. Carl.

Nahrungsmittelhygiene.

Ausstellung „Die Ernährung“.

Von Dr. Schmey, Berlin.

Am 4. Mai fand eine Vorbesichtigung der Ausstellung durch die Presse statt. Eine große Anzahl in- und ausländischer Pressevertreter fanden sich in dem Vortragsaal der Ausstellung zusammen, wo zunächst der Direktor des Ausstellungs- und Presseamtes der Stadt Berlin Dr. Schick den Werdegang dieser Ausstellung schilderte. Die Anmeldungen zur Ausstellung „Die Ernährung“ waren so zahlreich, daß es notwendig war, um ein möglichst geschlossenes Bild der einschlägigen Materie zu geben, eine neue 4. Ausstellungshalle zu bauen, die mit allen Nebenräumen 4500 qm faßt und in einigen 30 Bautagen fertig gestellt werden konnte. Auf im ganzen 45 000 qm Fläche ist nunmehr die Ausstellung „Die Ernährung“ aufgebaut. Es wäre niemals möglich gewesen, die Ausstellung überhaupt in der vorliegenden Weise zur Durchführung zu bringen, wenn nicht die zuständigen Organe des Reiches, der Staat und der Stadt, die Vertreter der Wissenschaft und der Wirtschaft und die großen Verbraucherorganisationen im Präsidium und im Arbeitsausschuß tätig gewesen wären; daneben ist in hervorragender Weise das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden an der Ausstellung beteiligt. Der Stadtmedizinalrat Prof. Dr. v. Drigalski gibt einen kurzen Abriss von der Ausstellung. Sie zerfällt in einen wissenschaftlichen und einen technischen Teil. v. Drigalski als Vorsitzender des wissenschaftlichen Ausschusses weist auf das Wesen der Ernährung, die Grundlagen der Ernährungswissenschaft, auf die Entstehung der Nahrung, auf Nahrungsmitteluntersuchung, auf die Ernährung von Mutter und Kind, auf die Geschichte der Ernährung, die Wünsche der Hausfrau usw. hin, Materien, die neben vielen anderen z. B. Wassernahrung in erschöpfendster und übersichtlicher Weise zur Darstellung

gelangt sind. „Sie kommen“, so führte er aus, „nicht etwa nur zu einer Schau von Nahrungsmitteln, obwohl Sie auch von diesen Ausreichendes zu sehen bekommen, sondern zu einer gewaltigen Darstellung, aus der auch der Laie, und ich glaube auf recht unterhaltende Art, ein Bild davon gewinnen kann, was es heißt, sich an den Tisch des Lebens zu setzen, den Körper als Träger der geistigen und seelischen Funktion und Gefäß einer irdischen Unsterblichkeit zu erhalten. Die Ausstellung soll allen Teilen des Volkes dienen und auch dem Forscher noch etwas zu fagen und bestgeordnetes Material zu bieten haben.“ Der dritte Redner des Tages, der Leiter der Ausstellung, Herr Wischek, geht spezieller auf den industriellen Teil der Ausstellung ein. Zwei Getreidemöhlen zeigen zwei verschiedene Systeme der Mahlherstellung, eine Großbäckerei (die 15 000 Brote täglich herstellt) und eine Konditorei, eine Ölmüllerei, eine Margarinefabrik, die Zuckererzeugungsanlagen sind zu sehen. Die Schokoladenindustrie ist sehr interessant vertreten, wir sehen eine Großräucherei für Fleischkonservierung, die Bedeutung der Fische als Nahrungsmittel wird durch die Vorführung von lebenden und konservierten Fischen dargetan. Eine Eisfabrik ist im Betrieb, es wird auf die Wärmewirtschaft hingewiesen, auf die Bedeutung der Früchte als Nährmittel, die alkoholfreien Getränke kommen zur Vorführung; es werden die maschinellen Hilfsmittel für die Küche praktisch vorgeführt, wir sehen die Speisewagenküche, die Schiffsküche usw. usw. Die Ausstellung gibt auf allen Gebieten reichlich Belehrung, Aufklärung und Anregung.

Bei dem nachfolgenden Rundgang war vieles von dem, was die Redner geschildert hatten, tatsächlich schon fertig und zu sehen, an sehr vielen Stellen aber wurde noch gearbeitet, um für die eigentliche Eröffnungsfeier am nächsten Tage ein geschlossenes, einheitliches Bild geben zu können. Bei der Eröffnung, die am 5. Mai in einem neu geschaffenen, stimmungsvollen Raum in der Halle I, geschmückt mit dem Standbild des Goldstattfand, sprachen der Oberbürgermeister von Berlin, Böss, der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, Schiele, der preußische Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Steiger, der österreichische Staatsminister Thaler, der Oberbürgermeister von Dresden, Bleiher. Alle Redner hoben gleichmäßig die Bedeutung der Ausstellung für das gesamte deutsche Volk und insbesondere für die deutsche Hausfrau hervor, die in erster Reihe dazu berufen ist, die gewonnenen und ihr überlieferten Nahrungsmittel in sorgfältigster, sparsamster und bekömmlichster Weise nicht nur zuzubereiten, sondern auch auszunützen. Ein großer Teil des Volksvermögens wird nach dieser Richtung der Hausfrau zu treuen Händen übergeben. Der österreichische Staatsminister hob ganz besonders die brüderlichen Gefühle hervor, die das kleine Österreich dem großen Mutterlande Deutschland entgegenbringt und gab der Hoffnung Ausdruck, daß ein Aufgehen beider Länder sich in absehbarer Zeit trotz aller Widerstände ermöglichen lassen wird. An die Eröffnungsfeier, die von Musikvorträgen umrahmt war, schloß sich ein Rundgang durch die Ausstellung. Für den Abend hatte der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung einen Empfang in den Festsälen des Rathauses vorgesehen. An der Festtafel sprachen der Oberbürgermeister Dr. Böss, Frau Jaekel, die Vorsitzende der Deutschen Hausfrauenvereine und Geheimrat M. Hahn von der Universität Berlin. Auf die Ausstellung selbst wird näher einzugehen sein.

Das neue Melkgerät.


(Mit Abbildung.)

Mit dem nachfolgend beschriebenen Handmelk-Gerät wird der Zweck verfolgt, die Milch während der Gewinnung in der Reinheit, in der Güte und mit dem Geschmack zu erhalten, wie sie die Euterzitzen verläßt. Das Gerät ist entstanden als eine Folge des schärferen Wettbewerbes und der

steigenden Güte-Anforderungen an die Milch und deren Erzeugnisse. Es ist im Laufe der letzten Jahre im Kurmilchfall auf dem Gut Hörnig, Großröhrsdorf (Sachsen) von dem Ingenieur Alfred Hörnig entwickelt und unter den verschiedensten Verhältnissen erprobt worden.

Seit annähernd 1½ Jahren befindet es sich im Dauerbetrieb und wird von der Stadt Dresden, unter deren Kontrolle die Milchwirtschaft steht, niemals Beanstandungen erfolgt.

Es handelt sich hierbei um einen bedeutenden Fortschritt in der hygienischen und zugleich praktischen Milchgewinnung unter Berücksichtigung der Unkosten und des Zuverlässigkeitsgrades.



D. R. P. a.

D. R. G. M.

Das Gerät vermag Vorzugsmilch- und Vollmilchbetrieben wesentliche Vorteile zu bieten. Es besteht aus einer mit abnehmbaren Deckel verschlossenen Kanne, an welcher seitlich zwei Sondergummischläuche angeschlossen, die an ihrem anderen Ende je mit einem Becher, mit eingehobenen Siebchen versehen sind. Der bequemen Handhabung wegen ist das Gerät mit festem Bügel, großer Standfläche und für die Entleerung geeigneter Form ausgebildet worden. Die Handgriffe an den Bechern sind so gestaltet, daß sie beim Melken nicht hinderlich und bequem und schnell anzulegen bzw. abzunehmen sind. Die Milch wird wie üblich unter Kontrolle des menschlichen Gefühles, welches auch den Zustand des Euters erkennt von Hand ermolken.

Sie ist fast schmutzfrei auch von auflösbaren Stoffen, wie Exkremente, Urin, Regenwasser und dergleichen und sie ist sehr bakterienarm. Die Rohmilch behält ihren natürlichen süßlichen, milden Geschmack, da sie beim Melken weder Stallgerüche, Silofuttergeruch oder andere nachteilige Gerüche annehmen kann, außerdem hat die mit dem Gerät gewonnene Milch eine außergewöhnliche gute Haltbarkeit. Der Verbraucher von Trinkmilch und Butter weiß die Eigenschaften zu schätzen und entscheidet beim Kauf in der Regel nach der Güte. Für die Milchlieferungen zur Som-

merszeit ist die größere Haltbarkeit nicht zu unterschätzen, da dadurch mancher Verdruss vermieden werden kann.

Es sei bemerkt, daß Wattefilter und Sehtücher die Milch lediglich reinigen von festen Stoffen, jedoch nicht von den für die Milch viel nachteiligeren aufgelösten Stoffen. Es gibt noch Landwirte, welche glauben, wenn eine verschmutzte Milch durch Seihvorrichtungen gelaufen ist, dann hat sie den ursprünglichen, natürlichen Gütegrad wieder erreicht, dies ist ein Irrtum.

Während des Melkens mittels des Gerätes ist der Milchstrahl sichtbar und kontrollierbar, was z. B. von schlechter Milch teils am Strahl, teils auf dem Siebchen erkenntlich ist. Die Euterzitzen berühren in der Regel die Becher nicht, weshalb die Übertragung durch das Gerät, von ansteckenden Krankheiten nicht zu befürchten ist. Die Kanne steht während des Melkens rechts vor oder rechts neben dem Melker und braucht nicht mit den Beinen gestützt zu werden. Es besteht daher nicht die Gefahr, daß die Kuh mit den Hinterbeinen die Kanne umstößt oder hineintritt, wie dies bei Verwendung offener Eimer, vorwiegend z. Zt. der Fliegenplage vorkommen kann. Der Milchstrahl kommt praktisch nicht mit nachteiliger Außenluft in Berührung, auch wird keine Außenluft durch den Milchstrahl in die gesammelte Milch (Schaumbildung) gefogen, wie dies bei Verwendung offener Eimer insbesondere bei guten Melkern eintritt.

Das Gerät ist verwendbar im Stall und auf der Weide, zum Faustmelken und zum Knebelmelken. Es ist durch die Sächs. Landw.-Kammer geprüft und zwar beim Institut für Tierzucht und Molkereiwesen an der Universität Leipzig. Im Prüfungsbericht vom vorgenannten Institut wird gesagt, „daß die mit dem Gerät ermolkenen Milch, im Gegensatz zu der in offenen Eimern ermolkenen, doch viel bakterienärmer und haltbarer ist. Im offenen Eimer gewonnen, bei 37° C im Brutschrank aufbewahrt ergab eine Haltbarkeit von 36 Stunden, mittels des Gerätes gewonnen und unter denselben Bedingungen aufbewahrt, ergab eine Haltbarkeit von vier Tagen“. Das vorstehende gute Ergebnis wurde nach längerem Betriebe nochmals von derselben Stelle bestätigt.

Das Gerät erfordert etwas mehr Reinigungsarbeit als der offene Eimer. Das Melkpersonal gewöhnt sich schon nach ein paar Tagen an die Melk-Methode, die jüngeren oft schneller als die älteren, vorausgesetzt, daß der Betriebsführer selbst ein Interesse für einwandfreie Milchgewinnung hat.

Hörnig.

Standesangelegenheiten.

Ausschuß der preussischen Tierärztekammer.

Der Tierärztekammerausschuß hat in seiner 14. Tagung in Berlin am 8./9. Mai 1928 für den am 5. Dezember 1927 verstorbenen Dr. med. vet. h. c. Franzenburg-Altona den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Tierarzt Friesse-Hannover zum Vorsitzenden und an dessen Stelle Veterinärat Maak-Berlin zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

5. wissenschaftlicher Referierabend an der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover am 7. Mai 1928.

L. Lund: „Über Leukämien und verwandte Zustände bei Haustieren.“ Nach einigen kurzen normal-histologischen Vorbemerkungen über die Blutbildung wird darauf hingewiesen, daß einwandfreie Fälle von Leukämien sowohl bei einer Reihe von Säugetieren, wie auch beim Geflügel beschrieben worden sind. Unter den Säugetieren scheint die Erkrankung am häufigsten beim Schweine vorzukommen; es folgen sodann das Pferd, Rind, der Hund und die Katze. Aus den zahlreichen Veröffentlichungen, welche sich mit der Säugetierleukämie befassen, geht hervor, daß die Klinik und pathologische Anatomie in vielen Arbeiten im Vordergrund des Interesses stehen. Vielfach hat man sich bei der Bezeichnung der verschiedenen Leukämieformen in erster Linie nach den grobanatomischen Verhältnissen gerichtet, die für die Art einer Leukämie durchaus nicht charakteristisch sind. Die sichere Klassifizierung einer Leukämie ist aber nur durch sorgfältigste kritische Berücksichtigung der

Histologie des Blutes und der blutbildenden Organe möglich. In differentialdiagnostischer Beziehung kommen vor allem die Lymphosarkomatose, die Lymphozytomatose und Rundzellensarkomatose in Betracht, die sich bei einwandfreier Untersuchung leicht von der Leukämie abgrenzen lassen. Der Vortragende hat eine verhältnismäßig große Anzahl von Säugetierleukämien untersuchen können, wobei den pathologischen Blut- und Organbefunden besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die hohe differentialdiagnostische Bedeutung der Oxydasereaktion beim Studium der Leukämie wird besonders hervorgehoben. Auf Grund der Untersuchungsergebnisse erscheint der Schluß gerechtfertigt, daß bei den Säugetieren unter den Leukämien die leukämischen Lymphadenosen eine führende Rolle spielen. Myelosen wurden nur ganz vereinzelt vorgefunden. Aus den Untersuchungen hat sich in eindeutiger Weise ergeben, daß es auch beim Huhne echte Leukämieformen gibt, und zwar sind auch hier die weitaus meisten Fälle als leukämische Lymphadenosen anzufprechen. Die hauptsächlichsten Veränderungen konnten an Hand zahlreicher makroskopischer Präparate, histologischer Schnitte und Diapositive demonstriert werden. In der Diskussion weist Prof. Kappis auf die verwandten Zustände beim Menschen hin, während Prof. Stümpke sich im speziellen über leukämische Hautaffektionen des Menschen verbreitet.

Otto Zietzschmann.

Betrachtungen über die Neubefoldung der Amtstierärzte in den Remonteämtern.

Wohl selten ist ein Kampf so schwer gewesen, und wohl selten ist er gegen einen solchen Wulst von gewollter Unkenntnis und Intrigen geführt worden. Doch jetzt ist es nun gelungen, uns auch hier endlich in die Reihe der Akademiker zu bringen, in die wir längst hineingehören. Die Veterinär-Inspektion, der D.V.O.B., die neugegründete Gruppe der Amtstierärzte in den Remonteämtern, sie alle haben sich nach Kräften bemüht, ungekannt und ungenannt. In zäher Kleinarbeit ist auch manches geleistet worden, was dem Parlament in vielen Sachen die Augen recht weit geöffnet hat. Nun ist der erste Freudenrausch vorbei, und ganz nüchtern müssen wir uns die Frage vorlegen, ist der Sieg ein ganzer? Die Antwort lautet leider: nein. Die Amtstierärzte in den Remonteämtern sollen allmählich ganz fortfallen nach einem extra hierfür geschaffenen Gesetz, aber nur sie selber, nicht etwa ihre Stellen. Die werden nämlich mit landwirtschaftlichen Beamten besetzt, angeblich um die Remonteämter landwirtschaftlich rentabler zu machen. Wie es in einem Remonteamt zu Zeiten, in denen nicht besichtigt wird, zugeht, kann leider nur der wissen, der jahrelang darin gelebt hat. Bei Besichtigungen schwebt nämlich alles in künstlicher Wonne, und Landwirt und Tierarzt scheinen nach außen hin inniglich befreundet. Weshalb sind nun eigentlich die Remonteämter landwirtschaftlich so unrentabel? Jetzt lasse ich bedeutende Landwirte der Umgegend von Remonteämtern sprechen, die ich teilweise bei meiner kommissarischen Vernehmung ja auch dem Reichswehrministerium genannt habe. Diese Landwirte sagen: damit sich die Remonteämter rentieren, müßte mindestens ein Drittel der landwirtschaftlichen Arbeiter und Beamten entlassen werden. Aber was macht man? Man stellt noch mehr landwirtschaftliche Beamte ein und zwar auf unsere Kosten. Gehen geht letzten Endes alles, fragt mich nur nicht wie? Es geht auch mit Vertragslandwirten. Genau so gut ginge es aber auch mit Vertragslandwirten. Weshalb sollen gerade wir Tierärzte unsere Beamtenstellung verlieren? Und die Landwirte nicht nur nicht, sondern diese nehmen dazu noch unsern Besitz. Es ginge eben auch, wenn der Fachmann eines Remonteamts (Amtstierarzt) die ganze Oberaufsicht hätte und die landwirtschaftlichen Beamten nur nach Bedarf und rentabler Stellung auf Vertrag angestellt werden würden. Ein junger befähigter Vertragslandwirt oder Tierarzt kann und wird sicher oft mehr leisten als ein überalterter festangestellter Beamter, denn ersterer muß sich seinen Posten immer von neuem erkämpfen, während der andere in der beischaulichen Ruhe des sicheren Hafens vielleicht notgedrungen im Alter etwas zu beischaulich wird. Hinter einer großen Aufmachung ist es leicht, Beruf und Taten in einem hellen Glanz erstrahlen zu lassen. Und diese Aufmachung wurde und wird eben nur für den Landwirt in den Remonteämtern gemacht und gefordert. Es wird künstlich so hingestellt, als ob es ganz unmöglich wäre, die Landwirtschaft von der Frage der Remonten zu trennen. Und wie einfach wäre dieses zu bewerkstelligen! Aber man weiß nur genau, daß man bei einer strikten Trennung die Remonten

nicht so zum Wohl der Landwirtschaft ausnutzen kann wie jetzt. Wie schon angedeutet sind die Grenzen zwischen Remonte-Verwaltung und Landwirtschaft spielend leicht zu stecken. Sie werden eben aus egoistischen Gründen für einfach unmöglich zu ziehen hingestellt. Genau so wie es früher bei den Lehrschmieden und Lazaretten auch unmöglich war, daß wir sie selbständig unter eigener Verantwortung leiten durften. In den Gehaltsstufen sind wir nun auch bedeutend höher als die Landwirte, bleiben aber Untergebene derselben. Dieses ist ein auf die Dauer unmöglicher Zustand, der unbedingt abgeändert werden muß. Gewiß der Chef des Stabes als Oberstleutnant z. B. bezieht auch weniger Gehalt als ein General und gibt für diesen trotzdem Befehle heraus, aber erstens doch nur im Auftrage seines Chefs, und zweitens sind die Stabschefs doch extra ausgesuchte und befähigte Leute. Ob jeder Depotlandwirt Stabschef-Qualifikation hat, wage ich dann doch sehr zu bezweifeln. Weshalb soll denn ein besonders befähigter Tierarzt nicht auch Vorgesetzter eines Landwirts werden können? Weshalb ist selbst der einfachste Landwirt eo ipso dazu qualifiziert, Vorgesetzter eines Tierarztes zu werden, wenn er das Glück hat, in einem Remonteamt als Landwirt angestellt zu werden? Dieses ist ein Unrecht, gegen das wir nicht nachlassen dürfen, anzukämpfen. Gewiß wird die Seuchentilgung auch bei Vertragstierärzten nicht gleich zusammenbrechen. Außerdem ist die „vis naturae medicatrix“ eine sehr launische Dame. Sie braucht nur ein paar Jährchen den Vertragstierärzten zu lächeln, und gleich ist der schlagendste Beweis von der andern Seite dafür erbracht, daß sich mit Vertragstierärzten viel besser und billiger arbeiten läßt als mit festangestellten Amtstierärzten. Bei Landwirten ließe sich mit Leichtigkeit daselbe beweisen. Als Fachleute müssen wir verlangen, auch nur Fachleuten mit selbständiger Berufstätigkeit verantwortlich zu sein, auch in Verwaltungs- und Personalangelegenheiten. Und die Beibehaltung der amtlichen Stellen in den Remonteamtern ist genau so notwendig wie die der Veterinäroffiziere bei der Truppe. Nicht nachlassen dürfen wir, hierum weiter zu kämpfen. Ich hege das feste Vertrauen zu der Veterinärinspektion, daß sie sich unserer weiter so tatkräftig annehmen wird wie bisher und auch hier einen Ausweg finden wird. Von den andern Verbänden muß aber auch nach Kräften in dieser Frage weiter aufklärend gearbeitet werden. Dr. Melzer.

Tierärztekammer für die Provinz Ostpreußen.

26. Februar 1928 in Königsberg.

Anwesend 15 Mitglieder. Der Vors., Dr. Knauer, gedenkt zunächst des verstorbenen Tierarztes D. h. c. A. Franzenburg. Sodann erstattet der Vors. einen eingehenden Geschäftsbericht. Zwei Kollegen, welche gegen § 9 der Standesordnung verstoßen haben, wird eine Verwarnung bzw. ein Verweis erteilt. Hinsichtlich der Bildung von Ausgleichskassen für die Ergänzungsbeschau bei den einzelnen Regierungen haben die bisherigen Informationen ergeben, daß diese Frage z. Zt. noch nicht spruchreif ist, aber zur gegebenen Zeit wieder aufgerollt werden soll. Ein Antrag des westpreussischen Tierärztevereins, daß in der Prüfungskommission für Stallschweizer ein Tierarzt mitwirken soll, ist vom Vorstand befürwortend an den Tierärztekammer-Ausschuß weitergegeben worden. Da in Bezug auf die Tierkrankenkassen noch Unklarheiten bestehen, so wird für zweckmäßig gehalten, daß eine Kommission in Verbindung mit dem R. p. T. sich eingehend mit der Materie befaßt, vor allem ernsthaft prüft, ob die „Tierag“ zu empfehlen ist. Kollege Dr. Janz erhält einen diesbezüglichen Auftrag. Kassenbestand 3603,— Mk. Beitrag für 1928 10,— Mk. Ferner wird mit 8 : 5 Stimmen beschlossen, den Kammermitgliedern wieder die wirklichen Kosten der Fahrkarte II. Klasse zu erstatten. Der Tannenbergspende wird ein Betrag von 100,— Mk. überwiesen. Als ehrenamtliches Mitglied für das Finanzgericht Königsberg wird Vet.-Rat Dr. Hollandt-Königsberg gewählt. Dem Kollegen Dr. Gumbert-Königsberg wird der Titel „Fachtierarzt für Sterilitätsbekämpfung bei Pferden und Rindern“ zugesprochen. Die Beschaffung von Unterlagen über die Höhe der außenstehenden Forderungen der Tierärzte wird der Gruppe Ostpreußen des R. p. T. anheimgestellt, um entsprechende Anträge für Kreditgewährung aus der Ostpreußenhilfe zu stellen. Die Gebührenordnung betreffend wird folgende Änderung des § 2 beschlossen: „Die Aufnahmeuntersuchungen von Rindvieh insbesondere auf Tuberkulose bei Gelegenheitsbefuchen oder Vorführung kosten je 2,— Mk.; bei Massenuntersuchungen von 30—50 Stück wird ein Nachlaß von 10 Prozent, bei über 50 Stück von 20 Prozent gewährt. Bei Aufnahme-

untersuchungen von Pferden wird eine Gebühr von je 3,— Mk. erhoben, wenn das Pferd dem Tierarzt vorgeführt wird. In diesen Kosten ist die Ausstellung einer kurzen Gefundheitsbescheinigung einbegriffen. Diese Gebührenfestsetzung bezieht sich nur auf Mitglieder von Versicherungsvereinen, welche dem Verbands der Tierversicherungsvereine der Landwirtschaftskammer angeschlossen sind. Eine lebhafte Debatte entstand anlässlich der Besprechung der Ministerialerlasse betr. Beaufsichtigung der Fleischbeschau, welche sich in Königsberg für das Ansehen des tierärztlichen Standes ungünstig auswirkte und in Berlin bereits zu einer Resolution des R. p. T. geführt hat. gez. Dr. Gohr, Schriftf.

Tierärztekammer für die Provinz Ostpreußen.

29. April 1928 in der Stadthalle in Königsberg (Pr.).

Die Stellungnahme zu dem Erlaß des Landwirtschaftsministers vom 17. Februar 1928 bezüglich des tierärztlichen Dispensierrechtes entfesselte eine umfangreiche Debatte. Der Vors. hebt das von großem Verständnis für die tierärztlichen Belange zeugende Wohlwollen hervor, welches der Minister in diesem Erlaß für die Tierärzte bekundet habe. Es wird beschlossen, dem Erlaß des Ministers zu entsprechen und Bestimmungen in die Gebührenordnung aufzunehmen, welche die Tierärzte verpflichten, dementsprechend zu liquidieren. Es folgt eine Besprechung über den Vertrag, welchen der Verein Ostpreussischer Tierärzte mit dem Tierversicherungsverband der Landwirtschaftskammer abgeschlossen hat. Als wichtigste Änderung der Gebührenberechnung für die Mitglieder der Tierversicherungsvereine wird bestimmt, daß, solange der Vertrag besteht, auf die Mindestsätze der Taxe mit gewissen Ausnahmen 25 Prozent Nachlaß gewährt werden solle. Auch den Vereinbarungen, welche der Tierärztekammerauschuß und der R.P.T. mit dem Verband der Schweinezüchter abgeschlossen haben bezüglich eines Rabatts bei Massimpfungen wird zugestimmt. Das Bakteriologische Institut der Landwirtschaftskammer wird gebeten, in seinen Werbeschriften anzuführen, daß die Tierärztekammer 6,75 Mk. für die klinische Untersuchung eines Rindes auf Tuberkulose für angemessen hält. Schließlich wird ein Neudruck der Gebührenordnung beschlossen, welche sämtlichen Tierärzten zugestellt werden soll. Das ehrengerichtliche Verfahren gegen einen Kollegen wird ausgesetzt, da das Gerichtsurteil, auf Grund dessen die Tierärztekammer in einer früheren Sitzung zu einer Verurteilung des betreffenden Kollegen kam, nicht rechtskräftig geworden ist. Dr. Janz und Dr. Führer erhalten den Auftrag, das gerichtliche Material zu sichten und weiter zu verfolgen, so daß in einer späteren Sitzung dazu Stellung genommen werden kann.

gez. Dr. Pitt, Schriftf. i. V.

Verein ostpreussischer Tierärzte.

Frühjahrsversammlung 12. Februar 1928 in Königsberg (Pr.).

Vor Eintritt in die Tagesordnung der von 120 Tierärzten besuchten Versammlung gab Dr. Janz-Tilsit folgende Erklärung ab: „Meine Herren, wie Sie wissen, habe ich vor einiger Zeit in den tierärztlichen Mitteilungen einen Artikel über die Stimmung unter den praktischen Tierärzten veröffentlicht. Ich habe heute und schon vorher erfahren, daß die beamteten Tierärzte sich durch diesen Artikel beleidigt fühlen. Ich erkläre hiermit im Namen unseres Vereins (des Vereins der praktischen Tierärzte Ostpreußens E. V.) und für meine Person, daß mir und uns jede beleidigende Absicht fernegelegen hat. Die Gruppe Schleswig-Holstein hatte die anderen Gruppen aufgefordert, rücksichtslos die Gründe, die nach ihrer Meinung die Unstimmigkeiten im tierärztlichen Lager — kraß hervorgetreten im D.V.R. — hervorriefen, aufzudecken. Aus diesem Grunde ist der Artikel veröffentlicht worden, denn nur wenn man die Grundursachen des Konfliktes kennt, ist eine Besserung möglich.“

Vortrag Dr. Nußhag: „Über Schweineflecken mit Lichtbildern“.

N. besprach das Problem vom Werden und Vergehen der Seuchen. Er wies darauf hin, wie wenig alle bisherigen Erklärungsversuche dem Naturgeschehnis großer Epidemien gerecht zu werden vermögen. Nur zum allergeringsten Teile ist in der Tat vorläufig das Wesen der „Seuche“ erfaßt. Der Verlauf zahlreicher näher erforschter Infektionskrankheiten weist eine unverkennbare Wellenbewegung auf. Die Erkenntnis vom Wesen der Infektionskrankheiten wurde oft gefördert durch Beobachtungen, die am Schwein gemacht wurden. So hat namentlich die Tatsache, daß das Rotlaufbakterium ein gewöhnlicher Darmparasit ist, eine Reihe dringlicher Fragestellungen eröffnet und der Forchung neue

Bahnen gewiesen. Auch das Studium der Ferkelkrankheiten hat wertvolle allgemein-bakteriologische Erkenntnisse vermittelt, die letzten Endes alle darauf hinauslaufen, daß für das Zustandekommen schon einer einzelnen Infektion, noch viel mehr aber für das einer Seuche der „Bazillus“ nicht ausschlaggebend ist. Er ist ein wichtiger Faktor, aber nur in Verbindung mit einer Reihe von Umständen, die erst seine zerstörende Wirkung ermöglichen. Eine Seuchenbekämpfung, die diese grundlegende Tatsache nicht berücksichtigt, wird nie eine „gründliche“ in des Wortes Bedeutung sein. Der Vortragende behandelte dann die Geschichte der Schweinefeuchen, ihr Wesen und ihren Nachweis.

Hiernach wurde die Abschließung eines Vertrages mit dem Verbands der Tierversicherungsvereine in Ostpreußen von der Versammlung einstimmig angenommen. Der Vertrag sieht als Bezahlung drei Viertel der Mindestgebühren der Gebührenordnung für die Provinz Ostpreußen vor. In den Schlichtungsausschuß für Streitfragen betr. diesen Vertrag wurden Dr. Jacobsen und Dr. Wendt gewählt, Obmann ist der Direktor des Bakteriolog. Instituts der Landwirtschaftskammer, Dr. Knauer. Zur Frage der Tuberkulosebekämpfung wurde die Änderung besprochen, daß in Zukunft die beschleunigte Ausmerzung auch durch den Privatierarzt und den beamteten Tierarzt möglich ist, wodurch die Benutzung des beschleunigten Ausmerzungsverfahrens weiterhin erleichtert wird. Der Jahresbeitrag für 1928 wird auf 5,— Mk. festgesetzt. Die Versammlung beschließt, 100,— Mk. für die Tierärztliche Hochschule Hannover zu ihrem 150jährigen Jubiläum zu stiften. Dr. Stange-Insterburg wird als Mitglied aufgenommen.

Der Vorstand wurde durch Zuruf wieder gewählt: 1. Vors. Dr. Jacobsen, 2. Vors. Dr. Janz, Schriftf. Dr. Rosencrantz, Kassenf. Dr. Pitt.

Dr. Rosencrantz, Schriftf. Dr. Jacobsen, Vors.

Zwischen dem Verein ostpreußischer Tierärzte und dem Verbands der Tierversicherungsvereine in Ostpreußen wird folgender Vertrag abgeschlossen:

§ 1. Zur Behandlung der bei den Tierversicherungsvereinen versicherten Tiere sind alle Tierärzte in Ostpreußen zugelassen, sofern sie diesen Vertrag anerkennen.

§ 2. Der Verein ostpreußischer Tierärzte macht dem Tierversicherungsverbände die Tierärzte namhaft, die sich auf den Vertrag verpflichten, den Verband verpflichtet sich, nur die namhaft gemachten Tierärzte zur Behandlung zuzuziehen.

§ 3. Die Bezahlung der Behandlung erfolgt nach den Mindestsätzen der von der Tierärztekammer festgesetzten Gebührenordnung mit 25% Nachlaß. Die Rechnungen sollen den Vereinen vierteljährlich zugestellt und von diesen binnen 14 Tagen bezahlt werden.

§ 4. Den Tierärzten ist es unterlagt, unter diesen Sätzen zu liquidieren, die Vereine verpflichten sich, mit den Tierärzten keine Vereinbarungen unter diesen Sätzen zu treffen.

§ 5. Die Tierversicherungsvereine verpflichten sich, zur Behandlung der versicherten Tiere keine Kurpfuscher hinzuzuziehen, auch den Vorstandsmitgliedern ist die Behandlung zu verbieten. Die Tiere dürfen erst nach tierärztlicher Untersuchung aufgenommen werden in die Vereine.

§ 6. Besonders hervortretenden Einzelwünschen von Versicherten bei Hinzuziehung des Tierarztes ist möglichst Rechnung zu tragen.

§ 7. Bei Unstimmigkeiten zwischen Tierversicherungsvereinen und Tierärzten soll ein Schlichtungsausschuß entscheiden, bestehend aus zwei Vertretern des Tierversicherungsverbandes, zwei Vertretern des Vereins ostpreußischer Tierärzte und als Obmann dem Direktor des Bakteriologischen Instituts der Landwirtschaftskammer.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Bei der 50-Jahrfeier des Veterinärinstituts der Universität Leipzig wurde der Direktor des Instituts, Prof. Dr. Eber, wegen seiner großen Verdienste um die Wissenschaft, insbesondere um die Erkenntnis der Tuberkulose zum Ehrendoktor der medizinischen Fakultät der Universität Leipzig ernannt. Gleichzeitig wurde Prof. Dr. Eber wegen seiner ausgezeichneten, zum Teil führenden Arbeiten über die Typendifferenzierung der Tuberkelbakterien und die Bekämpfung der Tuber-

kulose die Würde eines Ehrendoktors der Tierärztlichen Hochschule Hannover verliehen.

Der Honorarprofessor für Bienenkunde und Bienenkrankheiten an der Tierärztlichen Hochschule Hannover und Direktor des Landesinstituts für Bienenforschung und bienenwirtschaftliche Betriebslehre in Celle, Prof. Dr. Koch, hält am Montag, den 21. Mai d. Js., 18 Uhr, in der Aula der Tierärztlichen Hochschule, am Misburger Damm 16, seine öffentliche Antrittsvorlesung über das Thema: „Zweck und Ziel der deutschen bienenwirtschaftlichen Forschungsanstalten (mit Lichtbildern)“.

50-Jahrfeier des Veterinärinstituts der Universität Leipzig am 12. Mai 1928.

Etwa 180 Teilnehmer hatten sich um 3 Uhr im Hörsaal des Tierseucheninstituts in der Linnéstraße zusammen gefunden, um gemeinsam das 50-jährige Bestehen des Instituts zu feiern. Unter den Gästen bemerkte man: Ministerialrat v. Seydewitz-Dresden, Magnifizenz Bethé, Universität Leipzig, Prof. Dr. Hueck, Dekan der med. Fak., Prof. Dr. Klimmer, Dekan der vet.-med. Fak. sowie das Professorenkollegium der vet.-med. Fakultät, Prof. Dr. Moll, Dekan der phil. Fak., Prof. Dr. Zade, Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung, Prof. Dr. Golf, geschäftsführender Direktor des landwirtschaftlichen Instituts der Universität, Magnifizenz Mießner-Hannover, Prof. Dr. Schöttler-Berlin, Prof. Dr. C. O. Jensen-Kopenhagen, Prof. Dr. Zwick-Gießen, Ministerialrat v. Ostertag-Stuttgart, Geheimrat Hobstetter-Jena, Geheimrat Wehrle-Berlin, Prof. Dr. v. Wendt-Helsingfors, Generaloberveterinär Dr. Emschhoff, Wehrkommando IV Dresden, der Präsident der sächs. Landwirtschaftskammer Vogelsang, der Vizepräsident und Vorstand der Kreisdirektion Leipzig Friedrich, Reg.-Vet.-Rat Dr. Heidrich-Oschatz, Ökonomierat Fröbel-Leipzig, Prof. Dr. Knuth-Landsberg, Geheimrat Nitschke-Merseburg, Vet.-Rat Dr. Zürn-Wetzlar u. a.

Die Feier wurde eröffnet mit dem von der Sängerschaft „Arion“ zu Leipzig vorgetragenen Festgefang von Gluck „Füllt mit Schalle jubelnd die Halle“. Dann trat der Direktor des Instituts, Professor Dr. Eber hinter das mit Blumen und frischem Grün geschmückte Katheder und legte nach herzlichen Begrüßungsworten in seinem Festvortrag Rechenschaft ab über das, was in den letzten 50 Jahren im Veterinär- bzw. Tierseucheninstitut gearbeitet und erreicht ist (siehe D. T. W. 1928, Nr. 19, S. 325). Aus dem Kreis der Gratulanten brachte als erster der Vertreter des Ministeriums für Volksbildung, Herr Ministerialrat v. Seydewitz die Glückwünsche seiner Behörde dar. Er betonte das Verdienst Eber's an dem Zustandekommen des vor 25 Jahren eingeweihten Neubaus des Veterinärinstituts, das, dank der zielbewußten Leitung und unermüdlichen Arbeit seines Leiters, Prof. Eber's, in vielen seiner Arbeitsgebiete, besonders in der Tuberkuloseforschung führend geworden sei. Ein besonderes Verdienst des Instituts bestehe auch in der Anbahnung engerer Beziehungen zur Humanmedizin. Hierdurch ist der Leiter des Veterinärinstituts zugleich auch Wegbereiter geworden für die spätere Errichtung der veterinärmedizinischen Fakultät an der Universität Leipzig. Darauf überbrachte Magnifizenz Bethé in launiger Rede die Glückwünsche der Universität, die in einem Alter von 520 Jahren mit großmütterlicher Freundlichkeit auf das junge Institut herabsehen könne. Er feierte das Institut als eine Stätte schöpferischer Arbeit, einer Arbeit, die ins Leben greift, aus dem Leben schafft und sich nicht verlieren kann in grauer Theorie. Prof. Dr. Klimmer überbrachte die Glückwünsche der vet.-med. Fakultät. Prof. Dr. Hueck wies in seiner Rede auf die Bedeutung der durch vorbildliche Gründlichkeit ausgezeichneten Arbeiten Prof. Eber's über die Tuberkulose für die Erkenntnis dieser Volksseuche hin und überreichte die Ernennung zum Ehrendoktor der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Prof. Dr. Moll gratulierte als Vorsitzender Dekan der philosophischen Fakultät, Prof. Dr. Golf überbrachte die Wünsche des landwirtschaftlichen Instituts der Universität. Magnifizenz Dr. Mießner sprach im Namen der Tierärztlichen Hochschulen Berlin und Hannover und der Vet.-hyg. Institute der Fakultäten und Tierärztlichen Hochschulen. Er betonte die große wissenschaftliche Bedeutung insbesondere der Tuberkulosearbeiten Eber's, die sich durch seltene Klarheit auszeichnen und erst die Basis für richtige Fragestellungen und weitere zielbewußte Arbeiten abgeben hätten. In Anerkennung der hohen Verdienste von Prof. Eber um die vet.-med. Wissenschaft, habe die

Tierärztliche Hochschule Hannover beschlossen, ihn zu ihrem Ehren-doktor zu ernennen. Magnifizenz Mießner überreichte die Urkunde mit dem Wunsche, daß die schon bestehenden engen Beziehungen Prof. Eber's zur Hannoverschen Hochschule sich nun noch enger gestalten möchten. Im Anschluß hieran überreichte Mießner die anläßlich der Institutsfeier in glänzendem Gewande erschienene Festnummer der D. T. W., von der der rührige Verlag Schaper in liebenswürdigerweise eine größere Anzahl von Exemplaren zur Verteilung an die Festteilnehmer zur Verfügung gestellt hatte. Ministerialrat v. Oster-tag gratulierte in herzlichen Worten namens der Tierärztlichen Landesuntersuchungsanstalt Stuttgart, Prof. Dr. Jensen für die Landwirtschaftliche und Tierärztliche Hochschule in Kopenhagen und Prof. Dr. v. Wendt für die Universität Helsingfors. Ihre Wünsche sprachen weiter aus: der Präsident der sächsischen Landwirtschaftskammer, Rittergutsbesitzer Vogelsang, der Vorstand der Kreisdirektion Leipzig der Landwirtschaftskammer Gutsbesitzer Friedrich, der den Direktor des Instituts durch Verleihung der tragbaren silbernen Medaille und Überreichung einer Dankadresse ehrte; Prof. Dr. Knuth als Vertreter der ehemaligen Doktoranden des Veterinärinstitutes, Veterinär-rat Dr. Beck-Freiburg als Vertreter der ehemaligen Assistenten, Privatdozent Dr. Sprehn als Vertreter der jetzigen Assistenten. Dr. Beck überreichte auch ein Prachtexemplar einer umfangreichen, Prof. Eber gewidmeten Festnummer der im Verlag von R. Schoetz-Berlin erscheinenden Zeitschrift für Infektionskrankheiten usw. der Haustiere. Reg.-Veterinär-rat Dr. Heiderich gratulierte als Vertreter der beamteten Tierärzte Sachsens, der Landesgruppe Sachsen des Reichsverbandes der deutschen Gemeindetierärzte sowie der Landesgruppe Sachsen des Reichsverbandes praktischer Tierärzte, Ökonomierat Froebel als Vertreter der Leipziger Ökonomischen Sozietät und des Eutritzfcher landwirtschaftlichen Vereins. Veterinär-rat Dr. Lange überbrachte Prof. Eber die Ehrenmitgliedschaft des Tierärztlichen Vereins der Kreishauptmannschaft Leipzig. Es sprachen weiterhin der Vorsitzende der vet.-med. Fachschaft, cand. med. vet. Lorrman sowie der Vorsitzende der landwirtschaftlichen Fachschaft der Universität Leipzig, Diplomlandwirt Lötze.

Zum Schluß dankte Prof. Eber mit bewegten Worten für alle ihm zuteil gewordenen Ehrungen. Das von den Arionen gesungene Bundeslied von Mozart „Brüder reicht die Hand . . .“ beschloß die würdevoll verlaufene Festszung. Abends versammelten sich die Teilnehmer nochmals an der festlich gedeckten Tafel im „Sachsenhof“, wo sie noch ein paar Stunden fröhlichen Beisammenseins verlebten. Meyn.

Nachklänge zum 70. Geburtstag von Prof. Fröhner.

Nun hat unser großer verehrter Lehrer auch die Siebzig überschritten, und mir als feinem ehemaligen Schüler steigen wehmütige, mit Humor verbrämte Erinnerungen an die schöne Studentenzeit auf. Voraus schicken möchte ich, daß wir, seine alten Schüler, es noch sehr bedauern haben, daß wir nicht mit ihm in Form eines großen Festkommerfes, ähnlich auch wie damals bei Schütz, seinen 70. Geburtstag haben mit feiern dürfen. Wir wären gekommen in hellen Scharen. Aber, Herr Geheimrat Fröhner, wir bitten Sie, daß wir dieses an ihrem 75. Geburtstag nachholen dürfen und hoffen dann auch, eine kleine Vorlesung von ihnen zu hören. Was zu sagen war, ist unserm Jubilar ja von berühmter Seite in treffendster Weise gesagt worden. Ich will noch einige Erinnerungen aus meiner Studentenzeit auffrischen. Was für einen packenden Eindruck hinterließen doch Fröhners Vorlesungen! Selbst das verkatterte Studentenhirn horchte auf und lauschte mit Interesse den wunderbar klaren Gedankengängen. Dabei riß seine Persönlichkeit uns direkt hoch zum Selbst- und Standesbewußtsein, was damals ja noch sehr nötig war. Bei jeder Operation höre ich heute Fröhner noch immer sagen: „Lange Schnitte, meine Herren!“ Auch ganz hochgestellte Persönlichkeiten mußten es sich gefallen lassen, daß Schloßnitz i. A. Fröhners sie darauf aufmerksam machte, daß man in einem geschlossenen Raume die Kopfbedeckung abnähme. — Dann sahen wir lange Zeit unsern verehrten Lehrer krank einhergehen, und alles fürchtete einen bösen Ausgang. Da starb Dieckerhoff, von dessen Größe wir nur den Ausklang erlebten, und Fröhner wurde zu seinem Nachfolger ernannt. Außerdem wurde er noch zum Rektor gewählt. Fröhner, Rektor und innere Klinik, alles bekam allerhöchsten Respekt vor diesem geflügelten Schlagwort, und unsere Inpizienten dachten mit Grauen an unsern kommenden Staatsexamen. Fröhner

war von seiner Badereise kerngesund wiedergekommen, und voll Spannung erfolgte die erste klinische Demonstration in der inneren Klinik. Nach der gemeinsamen Untersuchung des Patienten mit anschließender Belehrung wurde demselben wegen einer leichten Gastro-Enteritis Karlsbader Salz verordnet, und Fröhner schloß mit den Worten: „Sehen Sie, meine Herren, ich war so krank, daß ich dachte, es geht zu Ende, und jetzt bin ich wieder so weit hergestellt, daß ich hüpfen und springen kann (dabei machte Fröhner einen kleinen Hupfer).“ All das verdanke ich nur meiner Kur in Karlsbad, und aus Dankbarkeit soll das erste Rezept in meiner Klinik sein Sal. Carolin. fact., Karlsbader Salz. Wie wurde uns die Fröhner'sche klinische Untersuchungsmethode eingehämmert! Nenne man sie nur pedantisch, aber vor hält sie fürs ganze Leben! Bei jeder klinischen Untersuchung ist mir noch heute so, als wenn mein großer Lehrer hinter mir steht und fragt: „Anamnese, Signalement, Temperatur, Puls, Atmung usw.“ Wie dankbar sind wir ihm dafür draußen in der Praxis! Welch erhebende Feier war Fröhners Rektoratskommers! Ich sehe ihn noch vor mir stehen, jugendlich-schlank, und wie hingen wir bei seiner Rede an seinen Lippen! Noch heute weiß ich fast jedes Wort. Ernste Ermahnungen wie: „Treiben Sie Politik, meine Herren, damit Sie hinausgehen ins Leben als ganzer Mann!“ wechselten mit launischen Seitenprüngen auf andere Gebiete. Auch über den Alkohol erhielten wir Studenten eine kleine Vorlesung. Dauernde Übertreibungen im Genuß von Alkohol wurden natürlich scharf gegeißelt, sonst aber dem Studenten ein kräftiger Schluck von Herzen zugebilligt, und donnerndes Beifallsgetrappel setzte ein, als Fröhner erklärte: „Meine Herren, hätten Sie mich zu meinem heutigen Rektoratskommers zu Selter oder Sodawasser eingeladen, keine zehn Pferde hätten mich herbekommen.“ Als der Jubilar aber noch schalkhaft lächelnd hinzufügte: „Meine Herren, ich kann mir einen Studenten ohne Bier nicht vorstellen“, da verdoppelte sich der Beifall, und als gar noch der Schlußsatz angefügt wurde: „und einen Professor auch nicht!“ da erzitterte die Germaniafeeel. Noch gar viel wäre zu berichten, nur noch eine kleine Episode. Als aus einem kaltblütigen finnischen Studenten trotz aller ermunternden Anfragen am Patienten aber auch gar nichts herauszubekommen war, da bezwang Fröhner seinen aufsteigenden Ärger und sagte launisch: „Sehen Sie, meine Herren, ich bin das Temperament, und der hier ist die verkörperte Ruhe selbst, ein Mittelding, das wäre das richtige wie immer im Leben“. Er hat uns unbehaute Steine abgeschliffen und uns gelehrt, den Weg des Erfolges zu gehen. Zu seinem unbeugamen Gerechtigkeitsfinn, gerade in gerichtlichen Gutachten, hatten wir stets ein unbegrenztes Vertrauen. Und nun schreitet Fröhner einher, wie ich zu meiner großen Freude kürzlich sah, noch genau so wie vor 30 Jahren, als ich ihn zum ersten Mal erblickte. Zwar der Bart ist weiß geworden, aber jung ist sicher das Herz geblieben. Und Herr Geheimrat, wir wünschen Ihnen noch viele Jahre ruhiger Schaffenskraft und bitten Sie aber noch um die erbetene Vorlesung, die sollen Sie uns halten auf einem großen Festkommers an Ihrem 75. Geburtstag. Sie würden uns viel mit einer Zusage geben, Herr Geheimrat, und wenn wir es jetzt schon wüßten, daß Sie es täten, wir fingen schon heute an, uns auf diesen Festtag zu freuen.

Dr. Melzer.

Veterinär-rat Carl Hepke †.

Am 18. April d. Js. verstarb im Alter von nahezu 77 Jahren der Großherz. Bezirkstierarzt Veterinär-rat Hepke-Weimar.

Bald nach seiner Approbation an der Hochschule Hannover im Jahre 1872 ließ er sich in Burhave in Oldenburg als Tierarzt nieder. Im Dezember 1880 erwarb er in Berlin das Fähigkeitszeugnis zur Anstellung als Beamter Tierarzt. Unmittelbar darauf wurde er zum Großherz. Bezirkstierarzt in Apolda und im Jahre 1887 zum Bezirkstierarzt in Weimar ernannt. Am 1. Juli 1920 trat er in den Ruhestand. Der Heimgegangene erfreute sich wegen seiner großen Sachkenntnis und seiner vorbildlichen Gewissenhaftigkeit und Treue des vollsten Vertrauens seiner vorgesetzten Dienstbehörde, deren technischer Berater er bis zur Ernennung zum Landestierarzt war. In Anerkennung seiner Verdienste um die Förderung des Veterinärwesens im früheren Großherzogtum Sachsen-Weimar verlieh ihm der Großherzog im Jahre 1908 den Titel „Veterinär-rat“ und später das Ritterkreuz 2. Klasse des Großherz. S. Hausordens der Wachsamkeit und vom weißen Falken.

An der Förderung des tierärztlichen Standes und des tierärztlichen Vereinslebens hat der Verstorbene regsten Anteil genommen. Der Ver-

ein Thüringer Tierärzte ernannte ihn deshalb zum Ehrenmitglied. Im öffentlichen Leben genoß der Verchiedene wegen seines vornehmen Wesens, gepaart mit Ernst und Wahrhaftigkeit, großes Ansehen. Das zeigte der große Trauerzug, der dem Verstorbenen bei seiner Beisetzung am 21. April folgte. Durch die eindrucksvolle Gedächtnisrede des Hofpredigers, der der Lieblingspruch des Verbliebenen „Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt“ zugrunde lag, gestaltete sich die Beisetzung zu einer überaus würdigen Feier. Drei Chargierte des Corps Hannoverania hielten mit umflorter Fahne am Sarge die Ehrenwache. Nach dem Gefang von Beethovens „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“ wurde der Sarg zu Grabe getragen. Der erste Chargierte des Corps Hannoveriana widmete dem Verstorbenen herzliche Abschiedsworte und gab ihm die Mütze und das blaurot-goldene Band als letzten Scheidegruß mit in die Gruft. So schied ein hochverdienter, lieber und treuer Kollege aus unserer Mitte. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten. S.

Dr. Josef Klopmeier †.

Plötzlich, wenn auch nicht ganz unerwartet, verschied nach längerem Leiden der Schlachthofdirektor Dr. phil. Josef Klopmeier in Wattenfeld. Er war geboren am 28. März 1868 zu Herbern i. W. und bezog 1889—1903 nach Erreichung der Primareife die tierärztliche Hochschule in Hannover. Nach der daselbst am 20. Mai 1893 erfolgten Approbation studierte K. sodann 1893—1894 an den Universitäten Gießen und Tübingen, um dort 1894 zum Dr. phil. zu promovieren. Bereits gegen Ende des Jahres 1894 wurde K. nach kürzeren Vertretungen an den Schlachthöfen zu Hagen und Münster die Leitung des neubauten Schlachthofs zu Wattenfeld übertragen. K. brachte den Angelegenheiten seines Standes stets ein reges Interesse entgegen, ganz besonders natürlich den Fragen, die seinem Spezialberuf galten; daher fehlte er auch selten an den Tagungen des unterzeichneten Vereins. Ein auf langjährige Erfahrung beruhendes Wissen und Können war ihm eigen. Ausgezeichnet mit einem erfreulichen Humor, war er wegen seines offenen und biederer Charakters, verbunden mit einem lebenswürdigen und bescheidenen Wesen, allgemein beliebt und geachtet. Von dieser allgemeinen Wertschätzung, der sich der Verstorbene erfreute, zeugte das große Trauergefolge, das ihm die letzte Ehre erwies. Ein von Herzen kommender und warm empfundener Nachruf des Sprechers der Chargierten, der C.V.-Verbindung „Saxo-Silesia“ Hannover, pries am Grabe die Verdienste, Liebe und Anhänglichkeit des Verstorbenen an den Bund und gab ihm als letzten Abschiedsgruß Band und Mütze mit in das kühle Grab. Mit der Witwe und drei unmündigen Kindern betrauern wir den Tod eines aufrechten Mannes und geachteten Kollegen. Wir werden seiner ehrend gedenken!

Verein der Schlachthof- und Gemeindetierärzte Westfalens.

I. A.: Dr. R o g g e.

Promotionstermine an der Tierärztlichen Hochschule in Berlin Sommer-Semester 1928:

Donnerstag, den 24. Mai d. Js. und Donnerstag, den 26. Juli d. Js.

Tierärztlicher Fortbildungsrundfunk.

Tagesordnung für Freitag, den 25. Mai 1928, 19,20 Uhr:
Dr. Raschke-Chemnitz: „Die volkswirtschaftliche Bedeutung der deutschen Schlacht- und Viehhöfe“. Dr. Giese.

Bücherbesprechungen.

Neuere Erfahrungen und Bestrebungen auf dem Gebiete der Geflügelzucht und -haltung. Ein Wegweiser durch die deutsche Geflügelzucht. Von Rich. Römer, Direktor der Lehr- und Versuchsanstalt für Geflügelzucht Halle a. S.-Cröllwitz. III. vollkommen neu bearbeitete Auflage. Berlin 1928. Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft. Preis für Mitglieder bei Bezug durch die Hauptstelle RM. 3,20, für Nichtmitglieder RM. 4,60.

Eine ursprüngliche Niederschrift von Vorträgen gelegentlich eines Lehrganges in Weimar hat einer der besten Sachverständigen nun in der 3. Auflage zu einem 288 Seiten umfassenden Auskunftsbuch über mehr als 80 Einzelfragen der deutschen Nutzgeflügelzucht ausgearbeitet, das als Heft 22 der Flugschriften der D. L. G. erschien und als eine dankenswerte Ergänzung der vorhandenen größeren und kleineren Lehrbücher

zu bezeichnen ist. In den letzten sechs Jahren hat eine erfreuliche Klärung hinsichtlich der Aufgaben und Ziele unserer Geflügelzucht stattgefunden. Gerade auch für den Tierarzt, der ja sehr oft Rat und Belehrung zu erteilen hat, ist es von Nutzen, das Neueste kennen zu lernen in Betreff der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Geflügelzucht, der amtlichen Förderungsrichtlinien, der Lehrgänge, Lehranstalten, Prüfungen und Amtsstellen (Geflügelzuchtinspektoren), des Ausstellungswesens, der Rassen, Leistungsprüfung und Prämiiierung, der Einrichtung von größeren und kleineren Geflügelzuchten und deren kaufmännisch zu berechnenden Einträglichkeit, der Stallungen, Zuchtregeln, Natur- und Kunstbrut, Zentralbrütereien, der Fütterungsfragen, Forschungsergebnisse, Vererbungslehre, der Geflügelleiden und -Krankheiten, der Literatur usw. Als Referent freue ich mich besonders darüber, daß der Verf. S. 186, wenn auch noch etwas zaghaft, Bedenken gegen die kunterbunte Rassen- und Milchmaischzucht äußert, wie sie leider—auch auf dem Lande—noch vielfach zu finden ist, und klar herausragt: „Die Rassengleichheit hat in einer Ortschaft im Hinblick auf den Absatz einer gleichmäßigen Qualität viel für sich und alle derartigen Bestrebungen sind lebhaft zu begrüßen.“ (Hinweis auf die zweckmäßigen Bekanntmachungen des Landrats in Genthin.) Nach den über 30jährigen Erfahrungen des Ref., dessen Buch „Neuzeitliche Nutzgeflügelzucht“ (III. Auflage, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart) der Verfasser auch erwähnt, kann die ländliche Nutzgeflügelzucht, auf die es bei der Deckung des inländischen Eierbedarfs doch vor allem ankommt, nur durch die gemeinde- und bezirksweise Einheitszucht von erprobten, angepaßten und auf Leistung durchgezüchteten Rassen vorwärts gebracht werden. Warum soll es bei der Geflügelzucht anders sein als bei allen anderen Zweigen der Haustierzucht? Das jetzt zum Modehuhn erhobene, ursprünglich aus Italien eingeführte weiße amerikanische Leghornhuhn [Leghorn (sprich legg) = Livorno!], zweifellos ein hochgezüchtetes Leghuhn, kann aber doch nicht allein und überall in Betracht kommen, da weiße Hühner für viele Gegenden der Raubvögel wegen ungeeignet sind und sich dort ein Huhn mit Schutzfarbe, d. i. das rebhuhnfarbige „Edelhuhn“ (fälschlich immer noch „Italiener“ genannt), vor allem empfiehlt. Gerade Römer hat in Cröllwitz die rebhuhnfarbigen Edelhühner zu einer erstaunlich hohen Legeleistung, die hinter jener der Leghorn zurücksteht, gebracht. Die Größe (Gewicht) der Eier, die bei den Leghorn (Einkreuzung von weißen Minorka?) sehr befriedigt, kann durch strenge Zuchtwahl auch bei der rebhuhnfarbigen Rasse wesentlich erhöht werden.

Möge das inhaltreiche Buch Römer's, das auch mit recht brauchbaren Abbildungen (u. a. von Ställen und Gerätschaften) und einem Sachwörterverzeichnis versehen ist, einen ausgedehnten Leserkreis finden!

A. Hink.

Personal-Nachrichten.

Verliehen: dem ordentlichen Professor Dr. Bittner in Sofia der Alexander-Orden.

Ernannt: Prof. Dr. Drahn von der Tierärztlichen Hochschule Berlin zum kommissarischen Veterinärarzt des Stadt- und Landkreises Görlitz; Polizeitierarzt Dr. Winkel aus Berlin zum kommissarischen Veterinärarzt des Landkreises Liegnitz; Tierarzt Dr. Bulling zum Veterinärarzt unter Verleihung der Veterinärattstelle in Marienburg (Westpr.).

Approbiert in Berlin: Ulrich Lockau aus Rehden.

Verstorben: Veterinärarzt Dr. Seiler in Lübben; Veterinärarzt Carl Hepke in Weimar.

Veränderungen im Veterinäroffizierkorps.

Befördert: Die Veterinäre Dr. Janssen im 2. Pionier-Bataillon, Dr. Pollner im 17. Reiter-Regiment und Dr. Schustereit im 14. Reiter-Regiment zu Oberveterinären; die Unterveterinäre Flachs im 1. Artillerie-Regiment, Freyberger im 1. Reiter-Regiment und Berner im 13. Reiter-Regiment zu Veterinären.

Verfetzt: Stabsveterinär Dr. Hilgenhorff in der 6. Fahrabteilung zur 2. Nachrichten-Abteilung; die Oberveterinäre Dr. Storr im 6. Reiter-Regiment zum 5. Reiter-Regiment und Dr. Hillmer in der 2. Nachrichten-Abteilung zum 3. Artillerie-Regiment.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelman, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrijabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Erstattungsansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 21.

Ausgegeben am 26. Mai 1928.

36. Jahrgang.

Zur gefl. Beachtung! Der Bezugspreis für das 2. Vierteljahr 1928 wird für die beim Verlag direkt bestellten Abonnements durch Nachnahme erhoben, wenn derselbe nicht bis zum 26. ds. Mts. in unseren Händen ist. — Wir bitten ev. für Einlösung der Nachnahme besorgt zu sein.

M. & H. Schaper, Verlag der „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“.

Betrachtungen zur Streptokokkenmastitis.

Von Dr. Heine, Duisburg.

Die Streptokokkenmastitis hat unter den deutschen Milchkuhbeständen sich weit ausgebreitet. Nachdem erwiesen zu sein scheint, daß die Galtstreptokokken bei der üblichen Milchpasteurisierung in den Molkereien nicht restlos abgetötet werden und vermutet werden muß, daß sie auch menschenpathogen sein können, ist der Erkrankung erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Die Fälle, in denen bei der Milchkuntersuchung die Erreger des gelben Galts gefunden werden, lassen sich scheiden in

1. Funde, bei denen die Milch nicht grobsinnlich wahrnehmbar verändert ist und auch beim Zentrifugieren ein Sediment nicht auffällt,
2. Funde, bei denen die Milch ebenfalls nicht grobsinnlich wahrnehmbar verändert ist, aber beim Zentrifugieren reichlich Sediment auftritt,
3. Funde, bei denen die Milch grobsinnlich wahrnehmbar verändert ist.

Wenn bei der Milchkontrolle Galtstreptokokken gefunden werden, dann ist der milchliefende Landwirt zunächst überrascht. Denn er hat nicht selten weder an seinen Kühen noch an seiner Milch irgend etwas auffälliges bemerkt. Und nun erheben sich die Fragen, wer soll beim Untersuchen der Milch auf Galtstreptokokken die Diagnose stellen, was hat der Landwirt beim Funde von Galtstreptokokken zu unternehmen und wie ist die Milch zu behandeln.

Vor einigen Wochen kam triumphierend ein Guts-pächter, in dessen Milch einwandfrei Streptokokken von mir nachgewiesen waren, zu mir mit dem Attest einer anderen Untersuchungsfälle, nach dem die Milch frei von Krankheitskeimen wäre. Erst nach Entnahme von Einzelproben wurden auch durch diese Stelle Galtstreptokokken nachgewiesen. Vor einigen Wochen hatte ich Gelegenheit, ein dem staatlichen Veterinärbeamten vom Nahrungsmittelchemiker eingefandenes Schreiben zu lesen, in dem er mitteilte, daß bei einer Kuh des Landwirts K. Streptokokkenmastitis festgestellt sei und die Milch nicht mehr als Nahrungsmittel für Menschen verwendet werden dürfe. Das ließ bei mir die Frage auftauchen, was wird denn von Nichttierärzten unter Streptokokkenmastitis eigentlich verstanden? Genügt etwa

der Fund von Galtstreptokokken in der Milch, um daraufhin die Diagnose Streptokokkenmastitis stellen zu können? Prof. Ernst schreibt in den Flugblättern der D.L.G., Nr. 83, Januar 1927, daß nach W. Steck und anderen die Befiedelung der Schleimhäute mit Streptokokken noch keine Erkrankung des Euters zur Folge haben müsse und vielfach eine wirkliche Entzündung erst dann zu erwarten sei, wenn Milchstaunungen oder andere Reize dazu Anlaß gäben. Kühe, in deren Milch Streptokokken gefunden werden, ohne daß die Milch weiter irgendwie verändert ist, leiden nicht an einer Mastitis, sie sind lediglich Ausscheider von Galtstreptokokken. Um diese Fälle beurteilen zu können, müssen zunächst die Milchproben vom Tierarzt oder in Gegenwart des Tierarztes entnommen werden. Denn es ist darauf zu achten, daß der Probeentnehmer sich vor Entnahme einer neuen Probe gründlich die Hände reinigt und auch mit den beim Probeentnehmen gebrauchten Gefäßen so vorsichtig wie möglich ist. Es ist recht wohl denkbar, daß bei ungereinigten Händen oder beim Gebrauch ein- und deselben, nicht jedesmal gründlich gereinigten Trichters von der Milch schwer infizierter Kühe Galtstreptokokken auf die Milch gefunder Kühe übertragen werden und nachher im Sediment zum Vorschein kommen. Die Diagnose im Gesichtsfeld des Mikroskops darf sich nicht allein auf die Galtstreptokokken stützen, auch die verschiedenen Formen der Leukozyten und der Alveolarepithelien sind zu berücksichtigen. Außerdem ist in differentialdiagnostischer Beziehung auch auf Bac. pyogenes und Staphylokokken zu fahnden. Eine Schematisierung der Untersuchung und ihre Vornahme durch Nicht-tierärzte dürfte daher leicht zu einer bedenklichen Unsicherheit führen.

Was hat der Landwirt zu unternehmen, wenn er von dem Funde von Galtstreptokokken in der von ihm abgelieferten Milch in Kenntnis gesetzt wird und wie soll die Milch behandelt werden, in der Streptokokken nachgewiesen sind? Meist ist der Gang, wenn man von den Untersuchungsergebnissen des Milchlaboratoriums ausgeht, so, daß sobald in dem Sammelgemelk des Landwirts Galtstreptokokken nachgewiesen sind, dieser sich veranlaßt sieht oder veranlaßt wird, einen Tierarzt zuzuziehen, der zunächst die Entnahme

von Einzelproben in die Wege leitet. Der Landwirt sowohl wie die Polizeiverwaltung am Verbraucherort müssen aber nun eine Direktive haben, wie die Milch verwertet werden soll. Sofern eine Polizeiverordnung vorliegt, die auf Grund der Preussischen Grundsätze über den Verkehr mit Milch (Dreiministererlaß vom 26. Juli 1912) erlassen ist, kann die Milch auf Grund der Bestimmungen A III e beanstandet werden, wenn eine Euterentzündung vorliegt. Milch, die nur Galtstreptokokken enthält, ohne daß sich in ihr Entzündungsprodukte finden, wird also von den eben genannten Bestimmungen nicht getroffen, nur die Milch, die diese Produkte enthält oder in wahrnehmbarer Weise verändert ist. Ist eine solche Milch nun ein gesundheitschädliches oder verdorbenes Nahrungsmittel? Nach den Erläuterungen zum Text des Lebensmittelgesetzes v. 5. Juli 1927 (Holthöfer-Juckenack, Ernst Heymann's Verlag, Berlin, S. 59) muß eine Gesundheitschädlichkeit eines Nahrungsmittels, wenn hierauf erkannt werden soll, objektiv vorliegen in dem Sinne, daß der Genuß regelmäßig bei Menschen von normaler Gesundheit ohne Rücksicht auf besondere individuelle Eigentümlichkeiten eine gesundheitschädliche Wirkung hat. Eine nur bei Kranken, Rekonvaleszenten, Kindern eintretende Wirkung bleibt außer Betracht, wenn nicht der Gegenstand durch eine vom Verkäufer hinzugefügte Bezeichnung ausschließlich oder vornehmlich für derartige Personenkreise bestimmt ist. Solange nicht weiteres konkretes Material über die Übertragbarkeit der Galtstreptokokken beigebracht wird, wird man die Bezeichnung „gesundheitschädlich“ nicht anwenden können, vielleicht nur in dem Falle, in dem die Milch als Kindermilch in den Handel gebracht wird.

Beim Verderben eines Nahrungsmittels handelt es sich darum (Holthöfer-Juckenack, S. 76), daß ein Lebensmittel schon bei der Entstehung oder Herstellung oder späterhin durch natürliche oder willkürliche Einflüsse nachteilige Veränderungen erleidet, die seine Brauchbarkeit wesentlich beeinträchtigen oder ausschließen. Gegenüber dem „verdorbenen“ Nahrungsmittel ist das „normale“ das unverdorbene, die Ware, die als Lebensmittel so brauchbar ist, wie das Publikum es erwarten kann. Eine Milch, die grob sinnlich wahrnehmbare abnorme Beimengungen enthält,

wie z. B. Eiterflöckchen, ist zweifellos nicht die eben skizzierte Ware und daher ein verdorbenes Nahrungsmittel. Ich möchte nun nicht so weit gehen, und auch alle Milch, die Galtstreptokokken enthält, als verdorbenes Nahrungsmittel bezeichnen. Dazu dürfte gehören, daß die Galtstreptokokken in erheblicher Menge auftreten oder als Zeichen der Mastitis eine Veränderung des Zellbildes im Milchsediment eintreten ist. Die strafrechtliche Beurteilung dürfte folgende sein: Werden Galtstreptokokken in der Milch gefunden und wird der Lieferant darauf hingewiesen, dann hat er in seinem eigenen Interesse eine Untersuchung der Einzelgemelke bei der von Landwirten direkt eingeführten Milch oder der Sammelmilch der einzelnen Landwirte bei Molkereimilch vornehmen zu lassen, falls er sich nicht der Gefahr aussetzen will, daß er sich des wissentlichen Inverkehrbringens eines verdorbenen Genußmittels schuldig macht, da die Funde der Galtstreptokokken in Sammelmilch mit größter Wahrscheinlichkeit darauf hindeuten pflegen, daß Milch erkrankter Kühe darunter ist.

Wie ist nun die Galtstreptokokken enthaltende Milch zu behandeln? In den preussischen Grundätzen heißt es, daß Milch von Kühen, die an Euterentzündungen leiden, vom Verkehr auszuschließen ist. Sie würde danach, wenn sie Galtstreptokokken und Entzündungsprodukte enthält, als Nahrungsmittel für Menschen nicht mehr in Frage kommen. Im Lebensmittelgesetz § 4, 2 heißt es, daß es verboten ist, verdorbene Nahrungsmittel ohne ausreichende Kenntlichmachung anzubieten. Da der Verkauf verdorbener Milch unter Deklaration ein Unding ist, wird auch nach dem Lebensmittelgesetz das Ausschließen solcher Milch vom Verkauf als Nahrungsmittel für Menschen gerechtfertigt sein. Milch, die nur Galtstreptokokken enthält, aber frei ist von sonstigen krankhaften Beimengungen, kann meines Erachtens als Haushaltsmilch in pasteurisiertem Zustande in den Verkehr gebracht werden. Als Kindermilch ist sie dagegen in keinem Falle zu verwenden.

Vorstehende Überlegungen zeigen aber die ganze Schwierigkeit der Situation. Es fehlt an genügenden gesetzlichen Unterlagen und an der Festlegung der Kompetenzen bei der Untersuchung. Es ist dringend zu wünschen, daß durch das Reichsmilchgesetz diese Mängel beseitigt werden.

Blasensteinbildung beim Pferd.

Von Dr. E. Oehl, Bidingen (Oberh.).

Am 16. August 1924 wurde ich zu einem Pferd gerufen und mir folgender Vorbericht mitgeteilt: „Das Pferd setzte immer nach der Bewegung, insbesondere nach dem Trabfahren blutigen Harn ab. Bei Stallruhe sei das Aussehen des Harns unverändert. Der Harnablatz sei nicht gestört und äußere das Pferd beim Harnlassen keine Schmerzen.“

Der Patient, eine mittelschwere Holländer-Stute, fünf Jahre alt, war in gutem Nährzustand. Bei der Palpation der Harnblase vom Rektum aus konnten in derselben zwei rundliche harte Gebilde von etwa Hühnereigröße festgestellt werden. Beim Eingehen mit dem Finger durch die Harnröhre in die Blase fühlte ich einen rauhen mit scharfen Spitzen versehenen festen Körper. Es handelte sich demnach um Blasensteine. Am 18. August sollten sie unblutig entfernt werden. Da bei der Größe ein Ausziehen der ganzen Steine nicht möglich erschien, sollten sie zertrümmert und in Stücken entfernt werden. Die Steine waren jedoch so fest, daß weder ein Abbrechen von Stücken noch ein Zertrümmern möglich war.

Auf folgende Weise gelang die unblutige Operation: Nach Kokainisierung wurde in die Urethra eine eingeweichte Kalbsblase eingeführt, in die ein Fahrradventil fest eingebunden war. Durch Aufpumpen der Kalbsblase wurde die

Urethra erweitert. Nach genügender Dehnung gelang es die großen Steine mittels einer langen und starken Kornzange zu entfernen. Ein Stein hing mit einem dünnen Strang an der Blasenwand fest. Neben den Steinen war eine große Menge Gries in der Blase vorhanden, der durch Spülungen entfernt wurde. Nach der Operation war die Blase frei von Steinbildungen.

Das Gesamtgewicht der entfernten trockenen Steine, die eine rauhe körnige Oberfläche hatten, betrug 130 Gramm. Die Länge des größten Steines 6 cm, die Breite 4 cm, das Gewicht 75 Gramm.

Mitte Dezember setzte das Pferd wieder blutigen Harn nach der Bewegung ab. Die Vermutung, daß sich ein neuer Stein gebildet habe, wurde bei der Untersuchung bestätigt. Durch die sofort vorgenommene Operation wurde der Stein im Gewicht von 45 Gramm entfernt.

Im vorliegenden Falle hat sich in der Zeit vom 18. August bis 23. Dezember = 127 Tagen der Stein gebildet.

Nach dieser Operation wurde das Pferd verkauft. Bei dem neuen Besitzer sollen Krankheitserscheinungen nicht mehr aufgetreten sein.

Sind Trypanosomen filterpassierbar?

Von W. A. Collier.

Novy und Mc Neal hatten in Kulturen von Trypan. lewisi verschiedene morphologische Änderungen beobachtet. So sahen sie beispielsweise sehr kleine Formen von nur 2–5 μ Länge. Dieses Material verdünnten sie mit physiologischer Kochsalzlösung und schickten es durch einen Berkefeldfilter. Die völlig klare Lösung wurde Ratten injiziert. Von neun Versuchen waren drei positiv, fünf negativ, und einer fiel als unklar aus.

Analoge Versuche mit Kulturen von Trypan. brucei und mit Blut und Organen von Tieren, die mit dieser Trypanosomenart infiziert waren, verliefen negativ.

Leider ist die Technik sehr mangelhaft angegeben, und man wird diesen Versuchen eine gewisse Skepsis entgegenbringen müssen.

Plimmer gibt an, daß er Naganablut nach Filtration noch infektionstüchtig fand. Auch hier fehlt leider jede Angabe der Technik, wie bei den Versuchen von Moore und Breinl. Diese Autoren berichten, daß sie Blut von Tieren, die mit Trypan. gambiense infiziert waren und keine Parasiten im zirkulierenden Blute erkennen ließen, gut filterten. Das filtrierte Blut erwies sich als infektiös.

Bruce und Bateman infizierten fünf Kaninchen mit Trypan. brucei. Die Tiere wurden getötet. Aus Herz, Lunge, Leber, Milz und Knochenmark wurden Emulsionen hergestellt. Das Berkefeldfiltrat hiervon wurde je zwei Ratten injiziert. Diese blieben dauernd frei von Parasiten. Zur Kontrolle diente Microc. melitensis.

In gleicher Weise erwies sich das Blut von elf mit Trypan. brucei infizierten Ratten als nichtinfektiös nach Filtration. Die Tiere waren auf der Höhe der Infektion entblutet worden. Auch durch therapeutische Beeinflussung konnten Bruce und Bateman keine filterpassierenden Formen erzielen. Sie behandelten fünf mit Trypan. brucei und Trypan. evansi infizierte Ratten mit Antimon und erhielten bei der Verimpfung des Filtrates negative Ergebnisse.

Endlich stellten sie vier weitere Versuche an, ob Trypan. lewisi in der Kultur filterbar wäre. Das Berkefeldfiltrat war nichtinfektiös, während das unfiltrierte Material sich als virulent erwies und zwei Ratten infizierte.

Bruce und seine Mitarbeiter filterten auch den Inhalt des Intestinaltraktes von mit Trypanosoma gambiense infizierten Tsetsefliegen mit negativem Erfolg.

Wolbach, Chapman und Stevens arbeiteten mit Trypan. brucei. Sie stellten sechs Versuche an, um in dem Blut und den Organtrituraten infizierter Tiere filterpassierende Formen nachzuweisen. Herz, Leber, Milz, Lunge und Knochenmark wurden mit Seefand verrieben. Diesem Brei wurde Blut und physiologische Kochsalzlösung zugefetzt. Die Verreibung wurde zunächst einige Male durch Büchnerfilter geschickt, um die festen Partikelchen zurückzuhalten. Sodann wurde durch Berkefeldkerzen V filtriert, wobei Staph. pyog. aureus oder B. prodigiosus als Kontrollen dienten.

Drei Versuche mit Meerschweinchen verliefen ebenso negativ wie drei Versuche mit weißen Ratten.

Zur Kontrolle wurde Trypan. gambiense geprüft. Auch hier zeigte ein Meerschweinchen und eine weiße Ratte keine filterpassierenden Formen.

Das gleiche negative Ergebnis wurde auch bei zwei Versuchen mit weißen Ratten erhalten, die mit Trypan. lewisi infiziert waren.

Bemerkenswert sind ferner 14 Filtrierversuche mit Kulturen von Trypan. lewisi, die im Gegensatz zu Novy und Mc Neal alle negativ verliefen.

In letzter Zeit infizierten Reich und Beckwith weiße Ratten und Meerschweinchen mit Trypan. brucei. Von den sterbenden oder bereits verendeten Tieren wurde das Herz in toto nebst Teilen von Lunge, Leber, Milz, Nieren, Knochenmark und inguinalen Lymphdrüsen in 30–40 ccm physiologischer Kochsalzlösung verrieben. Zu dem Gemisch kam eine Öse von Bac. prodigiosus.

Das durch Gaze gegebene Triturat wurde hierauf durch Mandlerfilter aus Diatomeenerde geschickt und zwar 25–45 Minuten lang bei einem Druck von 20–25 Pfund.

Von diesem Filtrat wurden 1,5–2,0 ccm einem oder zwei Meerschweinchen injiziert. Kontrollen wurden mit unfiltriertem Material angesetzt.

Bei 19 einwandfreien Versuchen zeigten zehn mit dem Filtrat infizierte Tiere eine Infektion mit Trypan. brucei.

Reich und Beckwith geben zu, daß andere Autoren leicht abweichende Ergebnisse erzielen konnten. Dies liegt zunächst an einer Verschiedenheit der Technik und der benutzten Stämme der Parasiten. Dann aber sind die Filtrationen nur in dem Falle positiv, wenn in dem Material spezifische Formen vorhanden sind.

Hierunter verstehen die beiden Autoren eigenartige Transformationen der Trypanosomen und zwar:

1. Granulärer Kerndetritus.
2. Kleine ovoide oder runde leishmaniaähnliche Formen.
3. „Cycle-shaped“ Herpetomonaden- und Leishmania-Formen mit und ohne Geißeln.

Diese Formen sind ihrer Ansicht nach nicht identisch mit den von Laveran und Mesnil beschriebenen Degenerationsformen (Serum- und Kochsalzeinfluß), ebensowenig mit den „latent bodies“ von Moore und Breinl oder den „schizogenous forms“ von Walker bei Trypan. evansi.

In einer etwas später erscheinenden Arbeit berichtet Reich über weitere Filtrationsversuche. Das Herzblut infizierter Meerschweinchen erwies sich nach dem Passieren durch den Filter als nicht mehr infektiös. In einer weiteren Serie von 72 Versuchen ergab das Filtrat innerer Organe in 20 Fällen ein positives Ergebnis. Reich schließt aus seinen Protokollen, daß die Filterbarkeit im Zusammenhange mit den von ihm und Beckwith geschilderten charakteristischen Formen steht. Diese finden sich vorwiegend in Leber und Milz infizierter Meerschweinchen.

Die Filterbarkeit kann nach Reich beruhen auf:

1. Plastizität der Trypanosomen.
2. Ausbildung dünner, durch schnelle Teilung entstandener Formen.
3. Vorhandensein von intrazellulären oder extrazellulären Formen verschiedener Größe.

Ohne direkte Filtrationsversuche schlossen Kraus, Dios und Oyarzabal auf das Vorhandensein filterbarer Formen bei Trypanosomen. Sie infizierten Schafe mit Trypan. gambiense, Trypan. equinum und Trypan. evansi. Im Blute fanden sie keine Parasiten, was bei der oberflächlichen Technik der direkten mikroskopischen Untersuchung verständlich ist. Bei der Verimpfung auf Meerschweinchen ließen sich demgegenüber Trypanosomen nachweisen.

Der hieraus gezogenen Folgerung, die Trypanosomen seien im Blute der Schafe in ultravisibler Form vorhanden, trat Kleine entgegen. Nur an der mangelhaften Technik liegt es, wenn man im Schaf keine Parasiten findet. Dies ist bei Verimpfung auf hochempfindliche Tiere aber fast stets möglich. Das Vorhandensein ultravisibler Formen ist hierdurch noch nicht bewiesen, nicht einmal wahrscheinlich gemacht.

Es war von Interesse, mit neuer Filtriermethode die beiden Fragen zu untersuchen, ob einerseits in den Organen infizierter Tiere filterpassierende Formen der Trypanosomen vorhanden seien, und ob andererseits im Blute der infizierten Schafe nicht doch filterbare Formen nachweisbar seien.

Für die Filtration wurden bei diesen Versuchen die Seitzfilter benutzt. Das Arbeiten mit ihnen ist verhältnismäßig einfach, und man ist vor Versuchsfehlern relativ sicher.

Als Kontrolle wurde der zu filternden Emulsion oder dem Blute stets eine Öse eines sehr kleinen aus der Luft gewonnenen Kokkus zugefetzt. Im Anschluß an die Verimpfung wurde dann auf Sterilität geprüft.

Zunächst wurden zwei Schafe mit Trypan. equinum infiziert, und drei Monate lang jede Woche wurde ihnen 20 ccm Blut abgenommen.

10 ccm Blut wurde ohne weitere Vorbehandlung direkt je zwei Meerschweinchen intraperitoneal injiziert. Die restlichen 10 ccm wurden mit der gleichen Menge physiologischer Kochsalzlösung verfetzt und durch den Seitzfilter geschickt. Der Druck dabei war ein sehr gelinder, da in Buenos Aires der Wasserdruck im Institut sehr gering war. Das Blut passierte in hämolytischer Form den Filter, da durch das Filtrieren die Stromata der Erythrozyten zurück-

gehalten werden. Es wurden jedesmal etwa 15 ccm einer tiefweinroten Flüssigkeit erhalten. Diese wurde wieder je zwei Meerfchweinchen intraperitoneal injiziert.

Um gleiche Versuchsbedingungen zu erhalten, wurde die Injektion des unfiltrierten Blutes zum gleichen Zeitpunkt vorgenommen wie die des filtrierten. Somit ist nicht mit der Möglichkeit zu rechnen, daß durch die Zeitspanne, die zwischen 20—30 Minuten betrug, eine schädliche Beeinflussung der Trypanosomen eintreten konnte.

Die beiden Schafe wurden drei Monate lang untersucht, die Fortsetzung der Versuche wurde mir leider von der vorgesetzten Behörde in unvornehmster Weise unterlagt. Trotzdem ist das Ergebnis ziemlich eindeutig.

Die Meerfchweinchen, die mit dem unfiltrierten Vollblut infiziert waren, ergaben bei negativem mikroskopischen Befund alle ausnahmslos für jeden Abimpfungstermin eine positive Infektion. Das heißt, die Trypanosomen fanden sich in dem Blute der Schafe in vermehrungsfähigem Zustande.

Demgegenüber erwiesen sich alle Filtrate des Blutes als steril. Keines der damit infizierten Meerfchweinchen zeigte ein Anzeichen der Infektion. Die Tiere blieben dauernd negativ.

Hiermit ist also gezeigt, daß bei der Trypanosomeninfektion des Schafes im strömenden Blute wohl Trypanosomen vorhanden sind, die Meerfchweinchen infizieren können, daß diese Trypanosomen aber jedenfalls in der typischen Form vorhanden sind, denn eine Filtrierbarkeit besitzen sie nicht. Hierdurch dürften die Angaben von Kraus, Dios und Oyarzabal experimentell widerlegt sein.

Ferner handelte es sich darum, das Vorhandensein filtrierbarer Formen in den Organen infizierter Tiere festzustellen. Untersucht wurden mit der gleichen Technik (Seitzfilter, Sterilitätsprobe mit Luftpokkus) die Milz, Leber, Niere, Herz, Lunge und Knochenmark von Kaninchen und Meerfchweinchen. Die Organe wurden mit Seefand zerrieben und mit 30 ccm Kochsalzlösung verdünnt. Nach Gaze-filtration wurden die Triturate durch Seitzfilter geschickt. Geprüft wurden die Organe von einem Kaninchen am dritten Tage der Infektion und die Organe eines Kaninchens, das auf der Höhe der Infektion stand (20. Tag nach der Infektion mit Trypan. equinum).

Das Filtrat wurde auf je fünf junge Meerfchweinchen vom Gewicht von ca. 200 Gramm verimpft. Bei diesen Tieren wurden dauernd das Gewicht und die Temperatur kontrolliert. Eine vierwöchentliche Beobachtung ergab eine gute Gewichtserhöhung und niemals eine Temperaturkurve, die auf eine latente Infektion hindeutete. Mikroskopisch wurden die Tiere noch vier Wochen länger untersucht, erwiesen sich aber als dauernd frei von Trypanosomen. Ferner wurden die Organe von fünf infizierten Meerfchweinchen filtriert und auf je zwei Meerfchweinchen verimpft. Auch hier ergab die zwei Monate lang dauernde Untersuchung in keinem Fall eine positive Infektion. Erwähnt sei, daß die Injektion des unfiltrierten Materials stets eine positive Infektion des Kontrolltieres ergab.

Es geht aus diesen Versuchen hervor, daß bei der Infektion mit Trypan. equinum weder im Kaninchen noch im Meerfchweinchen filtrierbare Formen nachzuweisen waren.

Die Resultate waren also ebenso negativ, wie die Ergebnisse von Bruce und seinen Mitarbeitern und die von Wolbach, Chapman und Stevens. Die gegen- teiligen Befunde von Reich und Beckwith und von Reich lassen sich nicht leicht erklären. An der Technik allein kann es nicht liegen. Auch der Einwand, daß sich die verschiedenen Trypanosomenstämme verschieden verhalten, dürfte nicht stichhaltig sein, denn das Vorkommen filtrierbarer Formen im Gegensatz zu dem Nichtvorhandensein

solcher dürfte ein so wichtiges, schwerwiegendes Unterscheidungsmerkmal darstellen, daß man es innerhalb der gleichen Gattung oder gar Spezies unbedingt ablehnen muß.

Wenn schließlich Reich und Beckwith verlangen, daß bei einem positiven Filtrationsergebnis stets die von ihnen angegebenen typischen Formen vorhanden sein müssen, so ist auch hier eine gewisse Skepsis am Platze. Wie aus den Arbeiten dieser Autoren hervorgeht, benutzten sie moribunde oder bereits verendete Tiere. Die Trypanosomen sind nun überaus empfindliche Organismen und degenerieren bei der geringsten Änderung der Wasserstoffionenkonzentration und dem Vorhandensein von Eiweißspaltprodukten (Peptone usw.) außerordentlich schnell. Ja sogar Änderungen in der Salzkonzentration bedingen Degenerationsformen, ebenso wie Nichtvorhandensein von Glukose.

Ferner darf nicht unerwähnt bleiben, daß es außerordentlich schwierig ist, aus verendeten Tieren Trypanosomen herauszuzüchten. Wenn schon die normalen Blutformen in diesem Falle selten oder gar nicht eine Infektion ergeben, so erscheint es eigenartig, daß im Gegensatz dazu filterpassierende Formen noch positive Impferfolge geben. Leider geht aus den Protokollen der beiden Autoren nicht hervor, wie lange Zeit nach dem Tode der Versuchstiere verstrich.

Auf alle Fälle ist positiven Filtrationsversuchen bei Trypanosomen eine gewisse Skepsis gegenüber geboten. Nur bei einer einheitlichen Technik der Filtration kann man gleichmäßig verwertbare Resultate erhalten. Es dürfte zweckmäßig sein, für diese Versuche die Seitz'schen Filter zu benutzen. Dann ist anzunehmen, daß bei der Verwendung dieser einheitlich negative Resultate erzielt werden.

Zusammenfassung.

1. Bei der Infektion des Schafes mit *Trypanosoma equinum* finden sich zwar im peripheren Blute keine direkt mikroskopisch nachweisbaren Parasiten, doch sind sie in infektionstüchtiger Form vorhanden und infizieren leicht empfängliche Tiere. Die Parasiten dürften in der gewöhnlichen Trypanosomenform vorhanden sein, denn es gelingt nicht, nach Filtration mit Seitzfiltern noch eine Infektion leichtempfindlicher Tiere zu erzielen. Die Trypanosomen sind im Schaf also nicht in filterpassierbarer Form vorhanden.

2. Es gelingt nicht, mit Organtrituraten von Kaninchen und Meerfchweinchen, die mit *Trypanosoma equinum* infiziert sind, nach Filtration durch Seitzfilter eine positive Infektion zu erhalten. In den Organen sind die Trypanosomen nicht in filterpassierbarer Form vorhanden.

Literatur.

Bruce und Mitarbeiter: 11th rep. of the Sleeping Sickness Commission of the Roy. Soc. of London 3, 437, 1911. Bruce, D. und Bateman, H. R.: Have trypanosomes an ultra-microscopical stage in their life-history? Proceed. Roy. Soc. of London, Ser. B. 80, 394, 1908. Novy, F. G. und Mc Neal, W. J.: On the filtration of Trypanosomes. Transact. Michigan Acad. Sci. 6, 1, 1904. Kleine, F. K.: Über ein unsichtbares Stadium bei pathogenen Protozoen (Piroplasma, Anaplasma und Trypanosomen). Münch. med. Wochenschrift 68, 1085, 1921. Kraus, R., Dios, R. und Oyarzabal, J.: Über ein unsichtbares Stadium bei pathogenen Protozoen (Piroplasma, Anaplasma und Trypanosomen). Münch. med. Wochenschrift 68, 867, 1921. Moore und Breinl, zit. bei Bruce und Bateman. Plimmer, zit. bei Bruce und Bateman. Reich, W. W.: Trypanosoma brucei as a filterable virus. The Journ. of Parasitology 10, 171, 1924. Reich, W. W. und Beckwith, T. D.: Trypanosoma brucei as a filterable virus. A preliminary note. The Journ. of Parasitology 9, 93, 1923. Wolbach, S. B., Chapman, W. H. und Stevens, H. W.: Concerning the filterability of trypanosomes. Journ. of med. res. 33, 107, 1915/16.

(Aus dem Tuberkulose-Heilinstitut von Univ.-Prof. Dr. med. F. F. Friedmann-Berlin.)

Der derzeitige Stand der Bekämpfung der Tuberkulose des Hausgeflügels.

Von Friedrich Franz Friedmann.

In einem unter obigem Titel in Nr. 48 dieser Zeitschrift von 1927 erschienenen Artikel erklärt Herr Prof. Raebiger, es sei ihm „wichtig erschienen, Ermittlungen über den Wert der Schutzimpfung nach der Friedmann-Methode anzustellen“. Tatsächlich hat Raebiger zu den von ihm an Hühnern vorgenommenen Untersuchungen das gegen menschliche und tierische Tuberkulose für Deutschland bekanntlich nur vom Tuberkulose-Heilstoffwerk Leipzig N. 22 hergestellte und abgegebene Friedmannsche Mittel überhaupt nicht angewandt. Er hat vielmehr nach seiner eigenen, auf Anfrage gegebenen Auskunft „die für seine Untersuchungen benötigten Kaltblütertuberkelbakterien-Präparate“ anderweitig erhalten. Alle seine in oben genanntem Aufsatz gemachten Angaben und Schlüsse betreffen also nicht das Friedmannsche Mittel, und er hat demzufolge seine Verimpfungen nicht, wie er angibt, „nach der Friedmann-Methode“ angestellt.

Desgleichen hat Prof. Knuth, auf den sich Raebiger ebenfalls beruft, nach seinen eigenen ausdrücklichen Ausführungen („Landwirtschaftliche Jahrbücher“, Bd. 64, 1926, Seite 158, Zeilen 15/16) das Leipziger Original-Friedmannmittel überhaupt nicht verwandt. Auch hier kann also von der Friedmann-Methode gar keine Rede sein.

Was nun das Friedmannsche Mittel gegen die Tuberkulose der Haustiere betrifft, so dürfte hier von zahl-

reichen tierärztlichen Praktikern, auch hinsichtlich der Geflügeltuberkulose, längst das Urteil gesprochen sein. Nachdem darüber bereits in den Jahren 1918 bis 1921 günstige Einzelpublikationen erschienen waren (z.B. Dr. med. et med. vet. Gutknecht B. T. W., Altmann B. T. W. und B. Kl. W., Sustmann T. R., Max T. R. ufw.), lauteten die auf eine Rundfrage von 76 Tierärzten zwecks Publikation eingegangenen Bescheide fast ausnahmslos so günstig, daß bereits 1922 der Hauptschriftleiter der T. R., Kreistierarzt Dr. Schaefer, zu dem „Endurteil“ gelangte, „daß der Friedmannsche Impfstoff ein hervorragendes Mittel zur Tilgung bezw. Besserung der Rinder- und Geflügeltuberkulose ist“. Das Mittel wurde auch in der von der Deutschen Landwirtschaftlichen Presse herausgegebenen Zeitschrift „Land und Frau“ speziell für Hühnertuberkulose nicht nur von Schaefer, sondern auch von dem hervorragenden Tierkliniker Geheimrat Prof. Dr. Regenbogen empfohlen. Über das immer wieder von tierärztlicher Seite berichtete schnelle Aufhören des Tuberkulose-Sterbens in verseuchten Geflügelbeständen nach Durchimpfung mit dem Friedmann-Mittel gibt Holz in seiner oben (T. R. Nr. 17, 1928) aus dem Hagenbeck'schen Tierpark erschienenen Arbeit über die Tuberkulose exotischer Tiere eine eingehende Literaturübersicht und Besprechung.

Der derzeitige Stand der Bekämpfung der Tuberkulose des Hausgeflügels.

(Eine Erwiderung.)

Von Privatdozent Dr. Fritz Schmidt-Hoensdorf.

Bei den Schwierigkeiten, die eine gründliche Desinfektion des Stalles und noch mehr des Auslaufes unter ländlichen Verhältnissen darbieten, wäre es außerordentlich begrüßenswert, wenn ein Schutzimpfstoff, der einen, wenn auch zeitlich begrenzten, Schutz zu verleihen imstande wäre, gefunden würde.

Schon sehr frühzeitig sind Versuche an Warmblütern mit den für letztere unschädlichen Kaltblütertuberkelbakterien zum Zwecke der Immunisierung gemacht worden. Terre dürfte der erste gewesen sein, der diesen Weg beschritten hat. Bekannt sind auch die dahingehenden Versuche von Küster.

Besonders hat aber der nach Friedmann sogenannte „Friedmannimpfstoff“, ein aus einem Spontanfall von Schildkrötentuberkulose hergestellter Kaltblütertuberkelbakterien-Impfstoff, Aufsehen erregt, der nach der ursprünglichen Auffassung von Friedmann einen „echten, nur wunderbar mitigierten Tuberkelbazillus“ darstellen sollte, welcher es vermochte, „Meerschweinchen so hoch zu immunisieren, daß sie eine Dosis menschlicher Kultur, die nicht vorbehandelte Tiere in drei Wochen an Tuberkulose tötet, ohne tuberkulös zu werden, überleben“. Diese Ansicht von Friedmann ist nicht ohne Widerspruch geblieben, Libbertz und Ruppel haben schon 1907 scharfe Kritik an diesen Friedmann'schen Angaben geübt, besonders aber sind es die Untersuchungen von Orth und dessen Mitarbeiterin Lydia Rabinowitsch gewesen, welche ergaben, daß zwar in einigen Fällen eine lebensverlängernde Wirkung bei Meerschweinchen festzustellen war, in einer Serie starben aber die von Friedmann persönlich mit seinem Mittel vorbehandelten Meerschweinchen früher als die unbehandelten Kontrollen.

Der Streit der Meinungen besteht noch heute, wenn

auch die Zahl der Anhänger von Friedmann wohl ständig geringer wird.

In der Veterinärmedizin hat das Friedmann'sche Mittel erst spät Eingang gefunden. Erst von 1918 ab begannen Versuche, die allerdings zum größten Teil so angestellt worden sind, daß sie einer wissenschaftlichen Nachprüfung kaum standhalten. Das gilt von der Arbeit von Gutknecht ebenso wie von der von Altmann.

Auch Sustmann's Veröffentlichung gibt keine ernsthaften Beweise an.

Die Antworten auf die Rundfrage, die von Seiten der Tierärztlichen Rundschau unter einer großen Zahl von praktischen Tierärzten veranstaltet worden ist, beruhen ebenfalls überwiegend auf subjektiven Eindrücken, so daß sich ein „Endurteil“ daraus nicht ziehen läßt. Wie Friedmann als Bakteriologe die Arbeit von Holz als Stütze seiner Behauptung heranziehen kann, ist mir unverständlich.

Weder Laboratoriumsuntersuchungen noch Rundfragen sichern einem Impfstoff einen dauernden Platz in der Therapie. Ausschlaggebend sind die tatsächlichen Erfolge. Und da scheint es nicht so, als ob diese von Dauer gewesen wären, denn sonst wäre es unverständlich, weshalb das Mittel so wenig Anwendung findet.

Unbestrittenermaßen handelt es sich bei dem Friedmann-Mittel um Kaltblütertuberkelbakterien. Solche sind auch von Raebiger und Knuth und auch von anderen verwendet worden. Um das Friedmannmittel handelt es sich bei ihren Versuchen allerdings nicht, sondern um Versuche, die nach der Friedmannmethode, nämlich eben mit Kaltblütertuberkelbakterien angestellt worden sind. Alles weitere ist ein Spiel mit Worten.

In meiner Habilitationsschrift „Beiträge zur Kenntnis

der Geflügeltuberkulose“ finden sich eingehende Angaben über den Wert der Impfung auf Grund von Untersuchungen an einer großen Zahl von Hühnern. Trotz vorhergehender Ausmerzungen der Tiere mit positiver Tuberkulinreaktion war

ein Erfolg nicht festzustellen. Ähnliche Erfahrungen hatte *T r a m s* schon in Ostpreußen gemacht.

Wir raten von der Verwendung von Kaltblütertuberkelbakterienimpfstoffen ab.

Notchlachtungen und Freibank.

Von Dr. Wulff, Schlachthofdirektor, Bernburg a. S.

Die trefflichen Ausführungen der beiden Kollegen *H a f e m a n n*¹⁾ und *M a y*²⁾ haben mich gefreut, sind diese Worte doch wieder ein Bekenntnis zu einer Forderung, die längst geistiges Besitztum aller Tierärzte sein sollte. Wie viele Jahre vertreten wir Schlachthoftierärzte schon diesen Gedanken, ohne daß er bisher gebührend beachtet wurde.

Wo liegen nun die Schwierigkeiten für seine restlose Durchführung? In der Theorie und selbstredend auch in der Schlachthofpraxis ist die Lösung durchsetzbar, aber für den Untersuchungstierarzt auf dem Lande türmen sich die Hindernisse, wenn er die Forderung erfüllen will.

Schon vor allem, wo fangen Notchlachtungen an und wo hören sie auf. Dann, was fällt alles unter den Begriff? Und nicht zuletzt, wie sollen solche Tiere draußen verwertet werden.

Wenn auch der letzte Satz erst in zweiter Linie in Betracht kommt, wenn hygienische Notwendigkeiten durchgeführt werden sollen, aber es spielt die Verwertung eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wir haben auf dem Lande keine Möglichkeit, diese großen Mengen so ohne weiteres zu verarbeiten, wenn sie unter Deklaration dem Konsum zugeführt werden müssen.

Und in den Schlachthöfen, wenigstens bei uns, bringen wir kaum unseren Anfall an beschlagnahmtem Fleisch auf der Freibank zum Verkauf, weil die Nachfrage zu gering ist. Es käme nur noch Konservenherstellung in Betracht, aber auch dies ist nicht ideal und birgt manche Gefahr. Doch auf all das will ich nicht weiter eingehen.

Wenn wir unseren auf reiche Erfahrung gestützten Satz, daß die sämtlichen Schlachtungen, die nicht als ordentliche Beschaulachtungen gewertet werden können, der Freibank zugewiesen werden müssen, zur Diskussion stellen, und ihm volle Geltung verschaffen wollen, brauchen wir gesetzlich bindende Unterlagen, was alles unter den Begriff der Notchlachtung rechnen soll.

Wohl hat unser Meister und Führer v. Ostertag seinerzeit mit gesunder Klarheit Richtlinien für den Begriff Notchlachtung festgelegt, werden sie aber genügen, um aller Beschwerden Herr zu werden?

Es tauchen da soviel Zweifelsfragen auf, daß es dringend geboten scheint, erst einmal den ganzen Gedankenkomplex in den einzelnen Fachgruppen gründlich zu besprechen. Ich denke dabei immer zuerst an die Landbeschau, nur ein kleines Beispiel. Als ich seinerzeit als Beschautierarzt Kühe, die wegen Geburtshindernissen irgendwelcher Art notgeschlachtet werden mußten, minderwertig erklärte, kam ich in den bitteren Ruf eines Feindes der Wirtschaft, und Boykott in versteckter und offener Form war die Folge. Und im weiteren bekam ich eben derartige Tiere nicht mehr zur Beurteilung, sie wurden soweit möglich noch fortgeschafft und günstigerer Kritik zugeführt.

Auf Umwegen sind solche Tiere dann bestimmt wieder der Stadt zugeflossen. Und der Enderfolg? Ich brauche ihn nicht zu nennen, jeder, der schon in ähnlicher Lage war, weiß Bescheid.

Und wie wirkt sich nun unter den heutigen Verhältnissen unsere Forderung praktisch im Schlachthof aus? Wenn wir sämtliche Notchlachtungen mit wenigen Ausnahmen restlos unter Deklaration und Zwangsverkauf setzen, werden wir meist ganz eigenartige Zustände bekommen.

Die Notchlachtungen, die uns bisher zur Beurteilung und weiteren Behandlung zugeführt wurden, bleiben auf einmal aus, oder fließen ganz spärlich zu. Es ist wie ein stilles, aber beredtes Übereinkommen, nichts mehr an diese Stätten zu bringen, wo so strenge vorgegangen wird, man hat ja noch andere Wege. Man schlachtet, falls die Gelegenheit günstig ist, draußen auf dem Lande an Ort und Stelle, wo man sich sicher fühlt, daß der Stempel nach Wunsch ausfällt, oder man schickt die Todeskandidaten, wenn irgend noch angängig, an größere Städte, wo sie doch zuweilen trotz aller Vorkehrungen noch geschickt untergeschoben werden können.

Es kann der Einwand kommen, froh zu sein, wenn man die beschaulich und dankbaren Notchlachtungen nicht zu beurteilen braucht.

Wir reißen uns natürlich nicht darum, diese Schlachtungen zu beurteilen, wir haben aber das lebhafteste Interesse daran, weil wir damit überblicken können, wohin derartiges Fleisch wandert, und wo es verarbeitet wird.

Und damit komme ich zu dem Punkte, der uns beschäftigt.

Werden die Notchlachtungen also nicht mehr uns zugeführt, sondern auf dem Lande geschlachtet und je nach Einstellung beurteilt, dann liegt es auf der Hand, daß derartige, nach unseren Begriffen minderwertiges Fleisch, doch auf dem Umwege übers Land als bankwürdiges Nahrungsmittel dem Konsumenten vorgelegt wird.

Und neben dem materiellen Schaden, den der Verbraucher durch dieses nicht voll einwandfreie Fleisch erleidet, das natürlich mit bester Ware im Preise gleicht, besteht vor allem die nicht noch genug einzuschätzende Gefahr für die menschliche Gesundheit, daß irgendwie verdächtigtes Fleisch in den Verkehr gelangt.

Es brauchen noch lange nicht Fleischvergifter zu sein, es genügt da schon Fäulnis, die ja bei Notchlachtungen viel rascher eintritt, und sonstige Zersetzungs Vorgänge und geringere Haltbarkeit.

Und neben diesen Gefahren für den Menschen ist die finanzielle Auswirkung für den Schlachthof nicht zu unterschätzen, weil eben die Gebühren verloren gehen.

Es braucht also noch eifrige Aufklärung und Besprechung in unseren Versammlungen, um den richtigen Weg zu finden. Viele Steine machen einen Bau erst fertig.

Vor allem sind auch straffe gesetzliche Richtlinien vonnöten, was alles zu Notchlachtungen gerechnet werden muß, über Grenzfälle kann dann immer noch von Fall zu Fall gesprochen werden.

So lange noch die jetzigen Verhältnisse bestehen, halte ich die Anschaffung eines eigenen Notchlachtungsstempels nicht für geboten, in der Mehrzahl werden die Tiere doch schon unter Deklaration verkauft, es würde wohl viel Verwirrung anrichten, wenn noch ein weiterer Stempel eingeführt würde. Aber könnten wir uns nicht anders helfen?

Wir sind gewohnt, das tauglich erklärte Fleisch blau zu stempeln, könnten wir uns da nicht einigen, das taugliche Notchlachtungsfleisch mit unserem normalen runden Stempel aber in anderer Farbe zu zeichnen? Vielleicht rot oder sonst eine auffällige Farbe; das würde einen Ausweg vorstellen.

Bei genügender Aufklärung wüßte dann jeder, um was für Fleisch es sich handelt, und wie er sich zu verhalten hat.

Man könnte sogar noch weiter gehen und vorschreiben,

¹⁾ D. T. W. 1928, Nr. 14, S. 248.

²⁾ D. T. W. 1928, Nr. 17, S. 297.

daß im Verkaufsladen ein Aushang — ähnlich den Vorschriften bei von auswärts eingeführtem Fleische — den Käufer darüber aufklärt, daß hier Notchlachtungsfleisch ausgebaut ist, das den bestehenden hygienischen Vorschriften genügt, aber geringere Haltbarkeit besitzt und dadurch leichter der Zersetzung anheim gegeben ist.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch den Gedanken

zur Diskussion stellen, auch das Fleisch von bakteriologisch geprüften Tieren, das tauglich freigegeben wird, in gleicher Weise zu kennzeichnen. Der Allgemeinheit und dem realen Fleischergerber würde mit solchen Maßnahmen nur geholfen, und nicht zuletzt uns Untersuchungstierärzten auch, fänden wir doch damit Unterstützung in unseren Bestrebungen.

Schwefelung von Rindervierteln zwecks Erhaltung der roten Farbe beim hieraus hergestellten Hackfleisch.

Von Dr. Walther Mathieu, 2. Polizeitierarzt zu Hannover.

In einer hiesigen Schlachtereier fiel mir das dort feilgehaltene Mett vor längerer Zeit durch seine eigenartige, leuchtend rote Farbe auf. Es erregte den Verdacht auf Verwendung eines Hackfalzes; ein Deklarationschild war nicht vorhanden. Ich entnahm daher eine Probe. Das chemische Untersuchungsamt der Stadt Hannover, dem hier alle wegen Beanstandungen chemischer Art entnommenen Proben einzuliefern sind, stellte sofort in meiner Gegenwart schweflige Säure qualitativ fest. Die Lebensmittelüberwachung des Polizeipräsidiums kaufte daraufhin auf meine Veranlassung aus mehreren Herstellungszeiten in verschiedenen Filialen dieser Firma Hackfleisch an; jede Probe ergab denselben Befund. Bei Verwendung von Präservelfalz ist ein Zusatz von 0,5 Gramm pro Kilogramm Fleisch das Gewöhnliche; ich habe jedoch auch schon Mett mit bis zu 4,8 Gramm auf 1 kg Fleisch vorgefunden. In diesem Falle wurde aber nur ein Gehalt von 0,008 bis höchstens 0,04 Gramm pro Kilogramm Fleisch ermittelt. Das chemische Untersuchungsamt folgerte hieraus, daß evtl. eine intensive Schwefelung der Räume, in denen das Hackfleisch hergestellt oder aufbewahrt worden war, stattgefunden habe und das Fleisch vielleicht etwas zu früh in so behandelte Räume hineingebracht worden sei. Das Polizeipräsidium verwarnete den Hersteller daraufhin.

Nach einiger Zeit beobachtete ich bei weiteren polizeitierärztlichen Revisionen des gleichen Betriebes wiederum dieselben Erscheinungen an dem Mett und stellte gleichzeitig fest, daß das Hackfleisch geflissentlich im Eisfranke in dünner Schicht auf großen, flachen Schalen aufbewahrt wurde. Ich entnahm daher aus verschiedenen Herstellungszeiten in verschiedenen Filialen Proben. Sie waren sämtlich außen schön rot, innen dunkler; teilte man das Quantum durch, dann röteten sich die Schnittflächen durch Hinzutreten der Luft ebenfalls wieder. Das flache Verteilen des Vorratsmettes im Eisfranke hatte also in der Tat den von mir vermuteten Zweck, eine möglichst große Berührungsfläche mit der Luft zu schaffen. Es machte sich auch hier

ein schwacher Geschmack nach Schwefel bemerkbar. Bei der chemischen Untersuchung wurde wiederum schweflige Säure nachgewiesen und zwar in Mengen von 0,0022 bis 0,0055 Gramm pro Kilogramm Fleisch.

Es fiel auch diesmal wieder auf, daß der Prozentsatz so überaus gering war. Da ich wußte, daß verschiedentlich seitens hiesiger Schlachter Versuche angestellt waren, das Mett durch Begasen mit SO_2 rot zu erhalten, nahm ich am folgenden Tage eine polizeitierärztliche Revision des Betriebes vor und befragte eingehend den dabei anwesenden Inhaber. Es stellte sich schließlich heraus, daß Präservelfalz nicht verwendet wird, daß aber die zum Mett vorgeesehenen Rinderviertel in einen Raum gehängt werden, der nachts geschwefelt wird. Die schweflige Säure teilt sich auf diese Weise dem Fleische mit. Wenn das Mettgut also zum Wolf gebracht wird, dann ist es bereits mit der verbotenen und gesundheitschädlichen schwefligen Säure versetzt. — Ich entnahm daraufhin von dem Mettfleisch, das gerade durch die Maschine gehen sollte, Proben; in ihnen wurden 0,033 Gramm schweflige Säure pro Kilogramm Fleisch nachgewiesen. Der Unterschied zwischen dem Gehalt des Fleisches und des Mettes erklärt sich durch die große Oberfläche des Fleischstückes. Aus Vorstehendem geht hervor, daß schon allergeringste Mengen schwefliger Säure eine ganz außerordentliche Färbkraft besitzen und das Mett bei Luftzutritt lange „schön rot“ erhalten.

Das Begasen des Fleisches ist dem Versetzen mit Präservelfalz gleichzuachten. Der Hersteller wurde aus § 10 N.M.G. (das Verfahren lief vor dem 1. Oktober 1927) und § 21 Reichsfleischbeschaugesetz verurteilt.

Nachdem diese Art der Färbung unterbunden war, wird in dem Betriebe Tho Seeths neues Hackfalz unter Deklaration verwendet. Aus einer z. Zt. von mir angestellten, größeren Versuchsreihe kann ich vorgreifend mitteilen, daß bezüglich der Farberhaltung trotz bakterieller Zersetzung dieses Mittel dem Präservelfalz und dem Begasen mindestens gleichzuachten ist.

Innere Medizin und Chirurgie.

Dürbaum, E.: Über das Verhältnis der Resorptions- und Ausscheidungsgeschwindigkeit verschiedener Substanzen bei intraperitonealer Injektion im Vergleich zur subkutanen und intravenösen Applikation beim Hunde. (In.-Diss. Berlin 1926.)

Die Resorptionszeit bestimmter Stoffe von verschiedenen parenteralen Applikationsorten aus ist zeitlich äußerst verschieden. Sie ist abhängig von der Geschwindigkeit der von dem Applikationsort abführenden Strombahn. Es ergab sich, daß die Zeiten direkt proportional sind der resorbierenden Fläche bzw. der Strömungsgeschwindigkeit des abführenden Blut- oder Lymphstromes. Nach den gewählten Indikatoren (Yatren, Kaliumferrozyanid, Indigokarmin) verhielten sich die Ausscheidungsgeschwindigkeiten im Mittel wie: subkutan = 1 : 0,46, intraperitoneal : 0,39 intravenös; oder intravenös = 1 : 1,44 intraperitoneal : 4,16 subkutan. In Bezug auf den Eintritt einer Wirkung (Apomorphin, Morphin) im

Mittel: subkutan = 1 : 0,55 intraperitoneal : 0,38 intravenös; oder intravenös = 1 : 1,35 intraperitoneal : 3,07 subkutan. Es verhielten sich in Bezug auf die Ausscheidung die intravenöse Injektion zur intraperitonealen bei den gewählten Indikatoren wie 1 : 1,44, in Bezug auf den Eintritt der Wirkung die intravenöse zur intraperitonealen Applikation wie 1 : 1,45. Komplikationen wurden bei den angewandten Mitteln in keinem Fall beobachtet. Da die für die intravenösen und intraperitonealen Injektionen gültigen Resorptionszeiten einander praktisch gleichen, so ließe sich beim Hunde die in der Praxis weniger geübte intravenöse Injektion durch die leichter auszuführende intraperitoneale ersetzen. Ob diese als Gesetz für den praktischen Tierarzt wertvolle Beobachtung auch auf andere Arzneistoffe, besonders solche, die zwar intravenös, nicht aber subkutan vertragen werden, ausgedehnt werden kann, muß weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben. Jedenfalls hält Verf. bei der Behandlung dieses Problems die Beachtung einheitlicher physiologischer Vorbedingungen für entscheidend,

unter welchen allein ein direkt vergleichbares Ergebnis erzielt werden kann. A.

Müller, J.: Kymographische Untersuchungen über die Adsorption wurmaktiver Substanzen aus *Oleum Chenopodii* (Askaridol und Paracymol) durch Kohle aus Öl-emulsion. (In-Diss. Berlin 1927.)

Kymographisch läßt sich zeigen, daß *Oleum Chenopodii* und seine Bestandteile Askaridol und Paracymol an *Carbo medicinalis* neu Merck adsorbiert werden. *Oleum Chenopodii* wird im Verhältnis 1 (Ol. Chen.) : 2 (Kohle) von dieser Kohle adsorbiert, Askaridol im Verhältnis 1 : 1½ und Paracymol im Verhältnis 1 : 3½. Versuche, die angegebenen Gemische durch Filtrieren, Abflitzenlassen oder Schütteln und Wärme zu trennen, verliefen negativ. Die Wirkung des so adsorbierten *Oleum Chenopodii*, Askaridol und Paracymol war in Emulsion gemäß dem Verhältnis der gewählten Kontrollen negativ. Sollten die wurmwidrigen und wirtschädigenden Eigenschaften des *Chenopodium*öles auch auf denselben adsorbierbaren Substanzen beruhen, was durch weitere klinische Versuche festzustellen ist, so berechtigen die vorliegenden Untersuchungen zur Annahme, daß beim Auftreten von Vergiftungsercheinungen infolge der Applikation eines dieser Wurmmittel durch sofortige Eingabe von Kohle eine therapeutische Wirkung erzielt werden kann; denn die sich noch im Darm befindlichen Giftmengen können durch Adsorption am Übertritt gehindert werden. Mechanische Bewegung, etwa durch Friktion der Kohleteilchen aneinander, vermögen jedenfalls nicht, bedeutende Mengen wieder freizumachen. Die Frage nach der Wirkung und Adsorbierbarkeit von sekundären, etwa fermentativ entstandenen Derivaten wird hierdurch nicht berührt. A.

Stiasny: Über Narkose mit Avertin (E. 107) und ihren Einfluß auf den Serumkalziumspiegel beim Hunde.

(Aus der Klinik für kleine Haustiere und dem Pharmakologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule, Berlin. — Direktor: Prof. Dr. W. Hinz.) (T. R. 1927, S. 871.)

Avertin ist ein neues von der I. G. Farbenindustrie hergestelltes Narkotikum (Tribromäthylalkohol), über das in der Humanmedizin schon vielfach berichtet wurde. Beim Hund ist die rektale und intraabdominale Applikation in Wasser und die intraabdominale in Öl ungeeignet. Dagegen ergaben 25 Versuche an zehn Hunden, daß das Avertin in Olivenöl gelöst in fraktionierter Dosis bei der Anfangsdosis 0,8 Gramm pro Kilogramm als Klysma gegeben gut vertragen wird und gut wirkt und in dieser Form für die chirurgische Praxis in Frage kommt. Wie andere Narkotika der Fettreihe bewirkt das Avertin eine starke Senkung des Kalziumspiegels im Blutplasma. Geiger.

Dahmen, H.: Therapeutische Erfahrungen und Versuche mit Präparaten der Pyridinreihe. (T. R. 1927, S. 294.)

Die Arsenäure B.R. 1 ist bei Großtieren weniger toxisch als die Arsenverbindungen B. R. 34 und B.R. 68, bleibt aber in ihrer Heilwirkung bei künstlicher Naganainfektion weit hinter den Arsenverbindungen zurück, die, ohne eine toxische Wirkung beim Pferde auszulösen, künstliche Naganainfektionen durch eine einzige Gabe rezidivfrei heilen können. Von den Halogenpräparaten hat das Selectan schon ausgezeichnete Ergebnisse in der Praxis gezeigt. Bei Streptokokken-Mastitis konnten 90 Prozent geheilt werden. Gut wirkte es auch bei Druse, Sepsis, Metritis, Phlegmone und infektiöser Bronchitis der Pferde. Geiger.

v. Düring, W.: Die röntgenologische Darstellung der Gallenblase beim Hund und die Wirkung der dabei verwendeten Kontrastmittel auf Askariden und Leberegel. (T. R. 1927, S. 877.)

Wie beim Menschen, so ist auch beim Hund eine röntgenologische Darstellung der Gallenblase durch sk. Injektion von Tetrabrom- (— jod — chlor —) -phenolphthalein-Natrium möglich. Selbst 20—30prozentige Lösungen werden gut vertragen. Die Schattenbildung tritt etwas früher auf und

dauert etwas länger als beim Menschen. Hinsichtlich des evtl. Nachweises pathologischer Zustände und Veränderungen sind weitere Versuche nötig. Eine vermifuge oder -zide Wirkung konnte weder bei Askariden noch bei Leberegeln beobachtet werden. Geiger.

Boardman, D. A.: Scours in suckling pigs. (Durchfall bei Saugferkeln.) (The Cornell Veterinarian. Volume XVIII, Nr. 1, S. 76 und 77.)

Verfasser verwendet mit gutem Erfolg als Vorbeugungs- und als Heilmittel Formaldehyd solut, das ihm auch bei der Streptokokkenmastitis und beim Durchfall des Rindviehs gute Dienste geleistet hat. Er läßt einer Sau im Durchschnittsgewicht von 250 Pfund dreimal täglich 30 Gramm mit dem Futter verabreichen. Bass.

Läwen, A.: Avertin zur Behandlung des Tetanus. (Aus der chirurgischen Universitätsklinik Marburg a. L.) (Zentralbl. für Chirurg. 1927, S. 2370.)

Das in Form der Rektalnarkose angewandte Avertin (E 107) bildet nach den Erfahrungen des Autors eine wertvolle Bereicherung unserer Mittel zur symptomatischen Behandlung des Tetanus. Wegen seiner bequemen nicht mit Injektionschmerz verbundenen Darreichung sowie wegen des Fehlens gastrischer Nachwirkungen ist das Mittel für die Behandlung des Starrkrampfes besonders geeignet. Der vom Verf. beschriebene Tetanusfall wurde mit Tetanusantitoxin und gleichzeitig mit Avertin behandelt. Patient erhielt innerhalb 13 Tagen die Gesamtdosis von 154,4 Gramm Avertin in 20 Einzelgaben als Klysma. Dabei wurden weder örtliche noch allgemeine Schädigungen beobachtet. Die Einzeldosis muß anfangs klein sein und darf später gesteigert werden. Um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden, ging Verf. nicht so weit, daß infolge hoher Dosierung alle Tetanusercheinungen verschwunden wären. Bei Anwendung der mäßigen Avertinmenge verringerte sich jedoch der Trismus sehr rasch, so daß der Patient, ohne Schluckkrämpfe zu bekommen, Nahrung aufnehmen konnte. Der durch das Mittel regelmäßig hervorgerufene Schlaf war von großer therapeutischer Wirkung. Nach vierwöchentlicher Behandlung konnte der Patient geheilt entlassen werden. Verfasser äußert sich am Schluß seiner Veröffentlichung dahin, daß wir in dem Avertin bei vorsichtiger Dosierung für die Behandlung des Tetanus ein narkotisches Symptomatikum besitzen, das längere Zeit wiederholt gegeben werden kann und an Wirksamkeit und Bequemlichkeit der Anwendungsform alle anderen bekannten übertrifft. Carl.

Haaß, W.: Die Rektalnarkose mit E 107. (Aus der chirurg. Universitätsklinik Erlangen.) (D. m. W. 1927, S. 1375.)

Verf. berichtet in ausführlicher Weise über die Beobachtungen, die er an 100 Patienten machen konnte. Nach Erfolg oder Mißerfolg konnten vier Gruppen unterschieden werden:

1. Voller Erfolg, d. h. Schlaftiefe bzw. Toleranz entspricht dem Effekt einer guten Inhalationsnarkose (23 Prozent).

2. Genügender Erfolg, d. h. der Patient ist nicht tief in der Narkose, seine Reaktionen auf die Operationsreize stören aber nicht (29 Prozent).

3. Ätherzugabe nötig, entweder in Rücksicht auf die Operation oder auf den Patienten selbst (42 Prozent). Verbrauchte Äthermenge 5—150 Gramm. Manchmal Äthergaben von 5—30 Gramm während einiger Minuten zum Ziele führend.

4. Mißerfolg, d. h. es muß schon von Anfang an Äther gegeben werden in einer Menge, die einer gewöhnlichen Inhalationsnarkose gleichen Umfanges nicht oder kaum nachsteht (6 Prozent). Verbrauchte Äthermenge 100 bis 320 Gramm.

Sobald die Wirkung eintritt, macht sich eine erhebliche Senkung des Blutdruckes bemerkbar, infolge eingetretener Vasomotorenlähmung. Das Herz erhält verhältnismäßig

wenig Blut, weil in den gelähmten Gefäßbezirken des Körpers viel angeammelt ist. Dies kann bei Schwäche der Herzkraft zu Kollaps führen. Auf die gleiche Ursache ist es zurückzuführen, daß die Venen des Unterhautbindegewebes strotzend mit Blut gefüllt sind und beim Einschneiden stark bluten und daß in fünf Fällen nach der Operation Nachblutungen eintraten. In etwa 10 Prozent der Fälle kam es am Schlusse der Narkose zu einer motorischen Unruhe, die sich bei einem Patienten zu einer derartigen Exzitation steigerte, daß er eine Stunde lang im Bett festgehalten werden mußte. In zwei Fällen von Tetanus konnten durch E 107 (Avertin) die Krämpfe während der Bewußlosigkeit zum Verschwinden gebracht werden.

Zusammenfassend gibt Verf. sein Urteil über das neue Mittel dahin ab, daß das nach dieser Methode anzuwendende Betäubungsverfahren für aussichtsreich anzusehen ist. Andererseits ist daselbe aber noch nicht so weit geklärt und durchgebildet, als daß es heute schon Allgemeingut der Chirurgie sein könnte. Die weitere pharmakologische, tierexperimentelle und klinische Prüfung, die bei der Gefährlichkeit des Präparates E 107 zunächst noch in der Hand der Kliniken und großen Krankenanstalten verbleiben sollte, hat jedenfalls noch viel aufzuklären, insbesondere die Ursachen der individuell so verschiedenen Wirkung. Verf. will nicht behaupten, daß unsere bisherigen bewährten Schmerzbetäubungsverfahren durch die Rektalnarkose verdrängt werden können, sondern nur, daß bei genügender Fundierung sich die neue Narkose noch ihr eigenes Indikationsgebiet wird erobern können.

Interessant sind die Angaben des Verf. über drei an Hunden ausgeführte Rektalnarkosen. Nach seinen Erfahrungen darf bei diesen Tieren bis zu 0,3 Gramm Avertin auf das Kilogramm Körpergewicht gegeben werden. Die beim Menschen beobachtete Verschiedenheit in der Wirkung trifft auch für den Hund zu. Zwei Hunde waren verhältnismäßig resistent gegen das Mittel, der dritte außerordentlich hinfällig. Die Avertinnarkose dauert beim Hunde, auch wenn sie vollkommen tief geworden ist, nur kurze Zeit, wobei auch ein Nachschlaf fehlt. Die Tiere benahmen sich wenige Minuten nach dem Erwachen schon ganz sicher und nahmen Nahrung zu sich. Die Narkose tritt beim Hunde in der Weise ein, daß das frei herumlaufende Tier nach wenigen Minuten Unsicherheit im Gange zeigt, ähnlich wie ein Betrunkener. Die Lähmung begann zuerst in der Nachhand und schritt dann weiter nasalwärts fort, eine Erscheinung, die auch bei Vergiftungen mit anderen Bromverbindungen beobachtet wurde. Carl.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Stähelin, A.: Studien über den Mechanismus der Trichinellen-Infektion. I. Mitteilung. (Aus dem Hygienischen Institut der Universität Basel.) (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 105, S. 114, 1927.)

Die vorliegenden, teilweise von ganz neuen Gesichtspunkten ausgehenden Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen:

1. Die bisherigen Forschungen über den Mechanismus der Trichinelleninvasion in quergestreiften Muskeln rechtfertigen den Schluß, daß sich der Vorgang aus zwei Phasen zusammensetzt: der elektiven Einwanderung in dieses Gewebe (Organotaxis) und der elektiven Entwicklungsfähigkeit (Wachstumsfähigkeit) in demselben (elektive Organocolie). 2. Eine Einwanderung in transplantierte (in das Peritoneum, in die Subkutis oder in die Masse anderer quergestreifter Muskeln verpflanzte) Muskelfragmente konnte nicht nachgewiesen werden. 3. In gelähmte Muskeln dringen die Trichinellen von der Blutbahn aus ein und beenden in denselben ihre Entwicklung bis zum enzystierten Stadium. 4. In die Carotis normaler Meerschweinchen herzwärts injizierte Trichinellen, die durch Auspressen aus frisch infizierten Mus-

keln gewonnen werden können, wandern aus den Gefäßen aus, siedeln sich in quergestreiften Muskeln an und beenden dortselbst ihre Entwicklung bis zum eingekapselten Stadium. 5. Intramuskulär injizierte Trichinellen der sub 4. bezeichneten Art vermögen sich in die Muskelfasern, die der Injektionsstelle benachbart sind, einzubohren und selbst ihre Entwicklung ungestört fortzusetzen. Die beiden Formen der parenteralen trichinigen Muskelinfektion sind nicht nur als Beweise für die Richtigkeit der herrschenden Ansichten über den Trichinellenkreislauf zu bewerten, sondern eröffnen versuchstechnische Möglichkeiten zum Studium der Organotropie dieser Parasiten. 6. Transplantiert man Muskeln, die enzystierte Trichinellen enthalten, so sterben die letzteren am neuen Standort allmählich ab. Erfolgt die Transplantation homolog (vom Meerschweinchen auf das Meerschweinchen), so bewahrt ein gewisser Prozentsatz der Trichinellen die Lebens- und Infektionsfähigkeit mehr als 40 Tage. In einer Versuchsreihe, bei welcher die Transplantation heterolog (vom Kaninchen auf das Meerschweinchen) vorgenommen wurde, waren schon nach 15 Tagen keine infektionstüchtigen Trichinellen nachzuweisen; die Verfütterung der Transplantate an normale Meerschweinchen blieb resultatlos. 7. Nicht enzystierte, noch im Wachstum begriffene Jungtrichinellen starben auch im homologen Transplantat sehr rasch ab. Aus einem zweitägigen Transplantat konnten noch reichliche Trichinellen verschiedener Größe ausgepresst werden, aus einem fünftägigen kein einziges Exemplar. 8. Für Abwanderungen von Jungtrichinellen aus trichinellenhaltigen Transplantaten in entfernte Muskeln konnte kein Beweis erbracht werden. 9. Beim Meerschweinchen läßt sich konform den Angaben von Stäubli u. a. durch Verfütterung von Darmtrichinellen keine Infektion herbeiführen. Ebenso blieb die Verfütterung von nicht ausgewachsenen Muskeltrichinellen ohne Resultat. Carl.

Kojucharoff, P.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Dermanyssus-Anämie unter bes. Berücksichtigung der Blutveränderungen. (In.-Diss. Berlin 1925.)

Die Dermanyssus-Anämie ist eine sehr gefährliche parasitäre Erkrankung der Hühner, die oft sehr große Verluste verursacht. Ein Bestand verlor innerhalb von drei Tagen ein Drittel seiner Insassen. Besonders in den Großstädten spielt, wie die Verhältnisse in Berlin zeigen, die Dermanyssus-Anämie in den Hühnerhaltungen eine sehr große Rolle. Die oft provisorisch gebauten Ställe stellen die besten Brutstätten der Milben dar. Die Sektion der an Dermanyssus-Anämie gestorbenen Tiere ergibt nur eine starke Blutarmut, jedoch keine wesentliche pathologisch-anatomische Organveränderung. Die histologische Untersuchung der Organe fällt meistens negativ aus. In zwei Fällen wurde nur Hämosiderosis der Leber und Milz nachgewiesen. Die Diagnose Dermanyssus-Anämie ist nur dann mit Sicherheit zu stellen, wenn die Milben als Ursache der Anämie beschuldigt werden können. Im Zweifelsfalle hat eine Befichtigung des Stalles stattzufinden. Bei mit Dermanyssus avium befallenen Tieren kann ein Rückgang der Gesamtzahl der roten Blutkörperchen um zwei Drittel eintreten. Die Regenerationsfähigkeit des Hühnerblutes ist sehr groß. Die Tiere sind bei guter Fütterung in der Lage, innerhalb 3 Wochen sich vollkommen zu erholen. Im Blute der anämischen Tiere treten oft jugendliche, unreife Formen von roten Blutkörperchen auf. In den Dermanyssusmilben sind Rickettsien in 61 Prozent zu finden. Ob ein Zusammenhang zwischen diesen und der Anämie besteht, bedarf weiteren Untersuchungen. Im Hühnerblute konnten die Rickettsien mikroskopisch mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden. Kulturelle Untersuchungen waren mit Rücksicht auf die Einsprüche der Besitzer nicht möglich. Die Maßnahmen gegen die Dermanyssus-Anämie haben sich gegen die Dermanyssusmilben zu richten und bestehen in gründlicher Reinigung und Desinfektion der befallenen Hühnerställe und in sachgemäßem

Bau der letzteren; die Erkrankung läßt sich auf diese Weise mit gutem Erfolge bekämpfen. A.

Horneck, K.: Experimentelle Untersuchungen mit modernen in die Haut eindringenden Mitteln als Vehikel für die Therapie der Akarusräude. (In.-Diss. Berlin 1926.)

Die modernen Salbengrundlagen Cereps-anhydr., Eucerin anhydr., Lovan, Mitin dringen ohne Vorbereitung der Haut durch Aufnahme von Seiten der Haut bis in die Tiefe des Coriums der akaruskranken Hundehaut ein, soweit sich das aus dem Eindringen des Nilblau schließen läßt. Die neueren, in die Haut eindringenden Mittel: Rheumasan, Ester-Dermasan, Ester-Dermasan für Tiere, Resorcin-Perkutol, Salicyl-Perkutol dringen infolge der ihnen inkorporierten keratolytischen bezw. hautreizenden Zusätze unter der Benutzung des Nilblau als Indikator besser ein als Salbengrundlagen ohne solche Zusätze. Ein Zusatz von Tetralin bewirkt, wie die dunklere Nilblaufärbung in den Hautschnitten hier gegenüber der bei den Mitteln ohne Tetralin-Zusatz auftretenden Färbung vergleichend zu schließen gestattet, daß die Farbträger von der Epidermis und den Haarbalgmündungen ausgehend, entlang dem Haarfchaft bis zur Haarpapille in reichlicherem Maße eingedrungen sind, und damit wohl auch das Arzneimittel in ergiebigeren Mengen an den Sitz der Milben in diesem Falle herangebracht ist. A.

Christiansen, M.: Die Muskelfinne des Rehes. (Aus dem hygienisch-bakteriologischen Laboratorium der Kgl. tierärztlichen und landwirtschaftlichen Hochschule zu Kopenhagen.) (Maanedskrift for Dyrlaeger, 39. Bd., 18. H., S. 481—497.)

Bei einem geteilten, gut genährten Reh, von dem die beiden Schultern, der Kopf und sämtliche innere Organe fehlten, fanden sich an beiden Seiten der Pars costalis des Diaphragmas, in den Interkostalmuskeln unter der Pleura, an der Innen- und Außenseite der Bauchmuskeln, an der Oberfläche der Rücken- und Oberschenkelmuskeln usw. zahlreiche Finnen. Sie waren sämtlich vollständig entwickelt, mit vollständig durchsichtiger, mit Flüssigkeit gefüllter Blase und mit eingezogenem Skolex. Sie waren in der Muskulatur gleichmäßig verteilt. Die Gesamtzahl betrug über 500 Stück. Nur in der Muskulatur des Unterarms und Unterschenkels fanden sich nur wenig. Im ganzen wurden über 300 Finnen aus der Muskulatur genommen. Jede Finne war von einer deutlichen Kapsel umgeben, die sich aus dem umgebenden Gewebe leicht herauspräparieren ließ. Auch der Cysticercus ließ sich, wenn auch schwerer, bei etwa 50 Stück aus der Kapsel entfernen, ohne die Blasenwand zu beschädigen. Die Finnen waren oval, einige ziemlich lang, nur einzelne mehr rundlich. Die Blasenwand war dünn, durchscheinend, der Inhalt der Blase ganz klar, ungefärbt. Auf der einen Seite der Blase, in der Regel gerade mitten auf, fand sich der eingestülpte Skolex. Er war verhältnismäßig groß, 2—2,5 mm im Durchmesser. Nur bei einem Exemplar befand sich der Skolex in dem einen Ende der Blase. Von 35 gemessenen Exemplaren maß die Mehrzahl 6—6,5×3,5—4,5 mm. Der größte maß 9×4,5 mm, der kleinste 4×2,5 mm. Bei den kleineren Exemplaren war die Blase auffallend klein im Verhältnis zum Skolex und enthielt nur wenig Flüssigkeit. Die Oberfläche der Blase war dicht mit kleinen Hervorragungen, „Papillen“, ungefähr 50 μ im Durchmesser, besetzt. Der eingestülpte Hals war stark querverunzelt und spiralig gewunden. Der Kopf maß 550—700 μ im Durchmesser, besaß vier ovale Saugnäpfe und ein hervorragendes Rostellum mit doppeltem Hakenkranz. Unter zehn untersuchten Exemplaren betrug die Zahl der Haken bei zweien 26, bei vierten 28, bei dreien 30 und bei einem 32. Sie waren schlank und ziemlich stark gekrümmt. Im Kopf und besonders im Halse der Finnen fanden sich zahlreiche Kalkkörperchen.

Die Finne stimmt vollständig überein mit dem von Ransom beschriebenen Cysticercus ovis, unterscheidet sich aber von dem Cysticercus cellulosa. Sie war kleiner und

gefälliger gebaut, mehr langgestreckt, die Haken waren kleiner und schlanker, und ihre Zahl war größer.

Es wurden nun Fütterungsversuche an zwei Hunden mit dem finnigen Rehfleisch angestellt. Jeder Hund erhielt im Laufe von vier Tagen im ganzen 65 Finnen in kleinen Fleischstücken. Nach 46 bezw. 71 Tagen wurden in den Fäzes Onkosphären nachgewiesen, und es gingen Proglottiden ab. Der eine Hund wurde 81 Tage nach der Infektion getötet. Bei der Sektion fanden sich im Dünndarm 18 Bandwürmer. Sie waren 14—212 cm lang, vier waren über 1 m lang. Bei den größten waren die hintersten Proglottiden geschlechtsreif. Der andere Hund entleerte ständig mit den Fäzes Proglottiden. Etwa acht Monate nach der Fütterung erkrankte er an einem pyämischen Leiden (Streptokokkeninfektion). Er wurde 253 Tage nach der Aufnahme der Finnen getötet. Bei der Sektion fand sich eine heftige, diffuse Darmentzündung. Der Darm war fast leer. Bereits 50 cm hinter dem Pylorus saßen auf einer kurzen Strecke des Duodenum 59 Scolices fest, die Mehrzahl mit nur ganz kurzen Kettenstücken (1—1½ cm). Der größte Teil der Kette war während der Krankheit des Hundes abgegangen. Nur zwei längere (58 und 109 cm lange) Bandwürmer, beide mit reifen Proglottiden, fanden sich.

Der Skolex des Bandwurmes entsprach ganz demjenigen der Finne des Rehes und dem des Cysticercus der Taenia ovis. Die Genitalpapillen waren sehr groß und traten mit einem großen und tiefen Sinus vor, er unterschied sich aber von der Taenia ovis durch die Ausbreitung der Testikel und der reifen Proglottiden sowie durch die Verästelung des graviden Uterus. Die Testikel erstrecken sich weiter rückwärts als bei der Taenia ovis und der Uterus besitzt bei diesem Bandwurm nur 10—12, ganz ausnahmsweise 20 Seitenäste im Gegensatz zu der Taenia ovis, wo an jeder Seite 20 bis 30 Seitenäste vom mittleren Stamm abgehen. Es handelt sich also um zwei verschiedene Arten von Bandwürmern, und die Finne des Rehes ist demnach nicht identisch mit dem Cysticercus ovis. Dies beweisen auch Infektionsversuche mit Onkosphären des Bandwurmes bei sechs Schaflämmern im Alter von acht Tagen bis drei Monaten, vier Ziegenlämmern im Alter von zwei Monaten bis 1½ Jahr und zwei Rehlämmern. Sie wurden mit den spontan von den Versuchshunden abgehenden Proglottiden oder Fäzesportionen, die große Mengen freier Onkosphären enthielten, gefüttert. Die Schaflämmer wurden 77—84 Tage nach der Fütterung getötet, es konnte bei ihnen keine Spur von Finnen, speziell von Muskelfinnen nachgewiesen werden. Dasselbe war der Fall bei den Ziegenlämmern. Dagegen fanden sich bei dem einen der beiden Rehlämmer, das elf Tage nach der Fütterung schlechten Appetit und Muskelfestigkeit und eine Woche später plötzlich Erscheinungen eines Gehirnleidens (heftige Krampfanfälle, Zwangsbewegungen, Zähneknirschen) zeigte, überall in der Skelettmuskulatur zahlreiche bis hanfkorngroße rundliche oder ovale Blutungen oder längliche, gelblichgraue Streifen. Beim Einschneiden fanden sich junge, verschieden große Cysticerken. Die größten waren kugelförmig, ca. 3 mm im Durchmesser. An der größten waren deutlich Anlage zum Skolex zu erkennen, es waren aber noch kleine Haken vorhanden. Auch im Bindegewebe zwischen den Muskelfasern befanden sich Finnen. Die meisten saßen in der Muskulatur des Rückens, des Oberschenkels, der Schulter, nur sehr wenige im Zwerchfell und Kaumuskeln. Auch das Myokardium enthielt größere Mengen Cysticerken. In den Lungen fanden sich zehn hanfkorngroße Blutungen und jede enthielt einen Cysticercus. Unter der Leberkapsel wurden ein Paar lange, spiralförmige, mit Blut gefüllte Bohrgänge bemerkt, mit einem kleinen Cysticercus an dem einen Ende. Im Gehirn in der einen Hemisphäre saßen zwei recht große Finnen.

Das zweite Rehlämm wurde, als es drei Wochen alt war, mit einer Aufschwemmung von etwa 500 Onkosphären von einem Gliede, das spontan von dem einen Ver-

fuchshunde abgegangen war, gefüttert. Das Tier wurde 92 Tage nach Aufnahme der Onkosphären getötet. Im ganzen fanden sich 14 Finnen, von denen nur zwei lebten, die übrigen degeneriert waren, ausschließlich im Bindegewebe und in der Skelettmuskulatur, und zwar vier in den Halsmuskeln, drei in den Schultermuskeln, zwei in den Interkostalmuskeln, eine im dorsalen Rückenmuskel, drei in der Oberschenkelmuskulatur und eine im Diaphragma, dagegen waren die Kaumuskeln, das Herz und sämtliche innere Organe frei von Finnen. Die zwei lebenden Exemplare waren voll entwickelt mit einer hellen, mit Flüssigkeit gefüllten, von einer sehr dicken, gelblichen Kapself umgebenen Blase. An den degenerierten, ebenso großen Exemplaren waren, wie mikroskopisch nachgewiesen wurde, der Kopf und der Hals gut erhalten und die Haken und Kalkkörperchen voll entwickelt.

Die untersuchten Finnen des Rehes sind also weder mit *Cysticercus cellulosae* noch mit *C. ovis* identisch, sondern eine besondere Art, deren Bandwurm sich im Dünndarm des Hundes entwickelt. Diese Finnen und ihr Bandwurm dürften identisch sein mit einer beim Renntier gefundenen Muskelfinne und ihrem Bandwurm (*Taenia Krabbei Moniez*), als dessen Wirtstier außer dem Hunde auch der Fuchs dienen könnte.

Bass.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Richters: Vergleichende Untersuchungen chemischer Desinfektionsmittel in ihrer Bedeutung für Rotz, Druse, Milzbrand und ansteckende Blutarmut der Pferde.

Das in dem Referat (D. T. W. 1928, S. 299) erwähnte Präparat Multisept wird von der chemischen Fabrik Marienfelde, G. m. b. H., Berlin-Marienfelde, hergestellt.

Hilding G. Magnusson: Svinpestens väsen och dess bekämpande.¹⁾ Svinpestutbrott i Norrland och amerikansk flask. (Das Wesen der Schweinepest und ihre Bekämpfung. Der Ausbruch der Schweinepest in Norrland und amerikanischer Speck.) (Sonderabdruck Stockholm 1927. 12 Seiten.)

Holth, H.: Utbrud av svinepest efter foring med skyllet. (Ausbruch der Schweinepest nach Fütterung mit Spülicht.) (Norsk Veterinær Tidsskrift 1927, S. 1—12.)

Die Schweinepest ist eine Infektion des Blutes mit hohem Fieber und erheblicher Mortalität (70 Prozent), wird von einem ultravisiblen Ansteckungsstoff verursacht, die Schweinefeuche ist eine durch den Schweinefeuchebazillus verursachte Lungenentzündung. Bei ihr ist die Mortalität nicht so hoch, und sie veranlaßt sehr häufig chronische Krankheitszustände. Schweinepest und Schweinefeuche treten sehr häufig gleichzeitig auf und können deswegen leicht verwechselt werden. Die Schweinepest wird in der Regel von einer diphtherischen Entzündung im Dickdarm begleitet, kann aber in so vielen Formen auftreten und so schleichend beginnen, daß nur durch Infektionsversuche an Schweinen die Diagnose gestellt werden kann. Ohne Zweifel ist sie die gefährlichste Krankheit des Schweines, schwerer zu bekämpfen als die Maul- und Klauenfeuche und tritt in allen Ländern mit größeren Schweinebeständen auf. Vor dem Kriege wurde der jährliche Verlust durch diese Krankheit in Deutschland auf 3—6 Millionen Mark, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika mit ihren 52½ Millionen Schweinen trotz der scharfen Bekämpfung auf 30—50 Millionen Dollar²⁾, in Spanien, dessen Schweinebestand 4 724 914 Schweine aus-

machte, von denen es jährlich 2 Millionen verlor, auf 300 Millionen Pesetas³⁾ angegeben.

Unter natürlichen Verhältnissen entsteht die Schweinepest sehr oft durch Aufnahme des Ansteckungsstoffes mit dem Futter, und zwar gewöhnlich in der Nachbarschaft größerer Importhäfen und Ausladeplätze, wo große Mengen Schweine mit allerhand Abfällen aufgezogen werden, selten in Gegenden, die vom Verkehr weit abgelegen sind und wo ausschließlich Getreide gefüttert wird. Außerhalb des Körpers des lebenden Schweines kann der Ansteckungsstoff sich nicht vermehren. Bricht die Krankheit an einer Stelle aus, so muß auf irgendeine Weise eine Verbindung mit einem verseuchten Ort bestehen.

Das Schweinepestvirus ist sehr resistent. Nach Uhlenhuth und Händel bewahrt es seine Infektionskraft bei Aufbewahrung im Eisschrank 4—6 Monate und ebenso lange mitunter bei gewöhnlicher Zimmertemperatur. Zweistündiges Erhitzen auf 58 Grad C tötet es nicht, wohl aber 24stündiges auf 55 Grad C und zehnstündiges auf 60 Grad C. Auch mehrtägiges Austrocknen verträgt es, ebenso eine dreitägige Einwirkung von 10/100iger Sublimatlösung, eine achttägige von 3prozentigem Karbolwasser (in Blut), eine einständige von 2½prozentiger Formalinlösung bzw. 2½prozentiger Antiforminlösung, eine zweistündige einer 3prozentigen Sodalösung und eine einständige von Kalkmilch (1:1 Serumfiltrat). Vernichtet wurde es dagegen im Serumfiltrat nach 15 Tagen von 2½prozentiger Formalinlösung (im Eisschrank), nach zwei Stunden (bei Zimmertemperatur) von 5prozentiger Formalinlösung, von 5prozentiger Antiforminlösung nach einer Stunde und von Chlorkalklösung (1:5 und 1:20) gemischt mit kleinen Teilen Serumfiltrat nach 15 Minuten bzw. einer Stunde. In 3- und 6prozentigen Mischungen von Kresol, saponat. und Serumfiltraten war das Virus regelmäßig nach einer Stunde vernichtet.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist die Schweinepest stark verbreitet. Daher werden dort in ausgedehntem Maße Serovakzinationen ausgeführt. Damit ist die Möglichkeit gegeben, daß zahlreiche Virusträger geschlachtet werden, die beim Schlachten ganz normal aussehen. Da nun sogar starke Salzlösungen eine Reihe von Bakterienformen nicht töten, so war auch anzunehmen, daß auch das Schweinepestvirus dazu gehören würde. Dies ist auch der Fall. So berichteten auf der Jahresversammlung der American veterinary association 1912 C. D. McCilroy bzw. Dunbar bzw. Stevenson von Ausbrüchen in den Jahren 1910 und 1911 bzw. 1886 bzw. 1899 in Distrikten in der Nähe von Städten, wo Abfälle von animalischen Produkten in ungekochtem Zustand verfüttert wurden. Niemals gelang es hier, nachzuweisen, daß der Ankauf lebender Schweine Veranlassung gab zum Ausbruch der Seuche. Dasselbe Ergebnis hatten die Untersuchungen über die Ausbrüche der Schweinepest im Jahre 1912 in Bezirken Kanadas, bei Städten im westlichen Teil von Ontario, bei Fort Frances und Rainy River. Es wurden im ganzen 82 Besitzungen untersucht. Auf 59 davon wurden 345 Ferkel befragt, die nicht mit Spülicht oder mit Küchenabfällen gefüttert wurden. Sie erschienen gesund. Auf zwei ebenfolgenden war die Krankheit durch Ankauf von Schweinen aus infizierten Gehöften eingeschleppt. Von 21 Besitzungen, auf denen Spülicht und Küchenabfälle aus Hotels und Restaurants in ungekochtem Zustand verfüttert wurden, waren die Ferkel auf zehn Stellen an Schweinepest erkrankt, und zwar waren 58 krank und 60 waren kurz vorher gestorben. Auf den übrigen elf Besitzungen mit zusammen 77 Ferkeln waren die Tiere gesund. Wie die nähere Untersuchung der Abfallprodukte ergab, enthielten sie stets Mengen von Produkten vom Schwein. Die Küchenabfälle stammten aus Hotels und Restaurationen, die ihre Speckwaren von einer Firma bezogen, die amerikanischen Speck-

¹⁾ Promemoria aus Anlaß der Schweinepestgefahr Herbst 1926 im Auftrage des Verwaltungsausschusses der Landwirtschaftsgesellschaft der Provinz Malmöhus.

²⁾ 1 Dollar = 4,20 Mark.

³⁾ 1 Peseta = 0,71 Mark.

in großen Mengen importierte. Weiter konnte auch nachgewiesen werden, daß an verschiedenen Stellen die Schweinepest ausgebrochen war, nachdem diese Firma kurze Zeit vorher große Mengen solcher Waren eingeführt und diese weiter abgesetzt hatte. Um den sicheren Beweis zu liefern, daß die Fütterung von Küchenabfällen, die Erzeugnisse vom Speck enthalten, die Ursache für den Ausbruch von Schweinepest sein kann, stellte R. R. Birch Fütterungsversuche mit frischem, gekühltem und mit gepökeltem Schweinefleisch an. Es stammte teils von Ferkeln, die so zeitig getötet waren, daß abgesehen von erhöhter Temperatur kein Krankheitszeichen und bei der Sektion auch keine Veränderungen sich zeigten, die bei der gewöhnlichen Fleischbeschau zur Kassation geführt hätten, teils von Tieren, die so spät geschlachtet waren, daß die für Schweinepest charakteristischen Veränderungen zeigten und demnach bei jeder Beschauktion beschlagnahmt worden wären. In der Regel wurde der oberste Teil des Oberschenkels mit daranhängenden Weichteilen verwendet. Wie bei der gewöhnlichen schlachtmäßigen Behandlung wurden die Schinken vor Entnahme der Proben gebrüht und geschabt. Mit einer Ausnahme stammten die Schinken von Ferkeln unter 100 Pfund. Die mit solchen Fleischwaren gefütterten Ferkel wurden sorgfältig isoliert. Die ersten Versuche wurden vorgenommen in fliegendichten Hürden, die auf einer mehrere 100 m von anderen Tierhürden entfernten Höhe lagen. Zeigte sich, daß die erwähnten Tiere an Schweinepest erkrankten, so wurde das Haus verbrannt und in der Nähe ein neues errichtet. Später wurden die Versuchstiere in kleinen, feuer sicheren Häusern aus Stein untergebracht. Hier konnten die Wärter mit den Tieren nicht in Berührung kommen, und das Futter und das Wasser konnte von außen zugeführt werden. Nach beendetem Versuch wurde der Inhalt entfernt und die Stelle ausgebrannt. In der Mehrzahl der Fälle wurden die Versuchstiere isoliert, wenigstens eine Woche vor der Fütterung mit Schweinefleisch, und es wurden möglichst Schweine aus durchaus gefunden Beständen verwendet. Das benutzte Virus wurde dauernd geprüft und erwies sich als sehr virulent. Die Ferkel erhielten 2 ccm virulentes Blut injiziert. In Zwischenräumen von 24 Stunden wurde die Temperatur gemessen. Stieg diese deutlich, so wurde das betreffende Tier getötet und obduziert, der linke Oberschenkel wurde entfernt, gebrüht und geschabt, dann wurden die Schinken zur Fütterung herausgenommen. Das Virus wurde stets in den rechten Oberschenkel injiziert, dem linken wurde das Material für die Fütterungsversuche entnommen. Wurden gepökelte Waren zu den Versuchen verwendet, so wurde der Schinken fünf Wochen in Zuckerlake gelegt, dann 7 bis 10 Tage geräuchert (grün Hickory) und lagerte 80 Tage. Die Lake bestand aus gewöhnlichem Salz 8 pund, gebräuntem Zucker 2 pund, Salpeter 2 Unzen, Soda $\frac{1}{2}$ Unze, Wasser 4 Gallonen (etwa 18 Liter). Die Stoffe wurden im Wasser gelöst, dieses eine Stunde gekocht, abgeschäumt und die Lösung vor dem Gebrauch abgekühlt. Die Versuche ergaben, daß das Schweinepestvirus in Schinken von infizierten Ferkeln, die getötet werden, bevor sich andere Krankheitserscheinungen als Temperatursteigerung zeigen und die bei der Obduktion keine pathologisch-anatomischen, für Schweinepest charakteristischen Veränderungen aufweisen, in genügender Menge zugegen ist, um Ferkel durch Fütterung zu infizieren. Gepökeltes und gekühltes Material von Schweinepestkranken Ferkeln, die bei der Sektion charakteristische Veränderungen zeigten, ergab in 43 und 88 Prozent der Versuche positive Resultate. Pökelung tötete also den Ansteckungsstoff nur bei zwölf der vorgenommenen Versuche. In zwei Versuchen mit gepökeltem oder gekühltem Material von Ferkeln, die nur Temperatursteigerung gezeigt hatten, wurde ebenfalls durch Fütterung Schweinepest herbeigeführt. Die Einwirkungszeit der Lake spielt also anscheinend keine Rolle. Dr. Birch macht aber darauf aufmerksam, daß die Farmer ihre Ferkel schleunigst

abstoßen, sobald Schweinepest in ihren Beständen ausbricht und daß daher viele infizierte Tiere geschlachtet und für genußtauglich befunden werden, da ja bei der Beschau keine Erscheinungen nachgewiesen zu werden brauchen, welche die Kassation bedingen. Es gelangt also von Zeit zu Zeit stark virushaltiger Speck in den Konsum, und da der Ansteckungsstoff das Pökeln überlebt, so kann die Seuche durch solche Waren weit verbreitet werden. Dies geschieht durch die Küchenabfälle. In ihrer Gestalt gelangt mit dem Speck der Ansteckungsstoff in andere Gehöfte und steckt die dortigen Schweinebestände an. So leiteten sich im Staate Maryland in den Jahren 1920, 1921 und 1922 80 Prozent aller Ausbrüche von Schweinepest von der Fütterung infizierter Speckabfälle her.

In Schweden trat die erste größere Schweinepestepidemie gleichzeitig mit der in Dänemark im Jahre 1887 in Schonen auf. Sie verbreitete sich im Lande, wurde aber durch Keulung nach und nach ausgerottet. 1891 war das Land frei. 1904 bis 1905 wurde eine kleinere Epidemie im Bezirk Stockholm und 1907 eine in Hallandslän beobachtet. 1908 und 1913 wurde von Magnusson am Veterinärinstitut bzw. in der veterinärbakteriologischen Anstalt je ein Fall aus dem Kirchspiel Bjärtraa in Västernorrlands Län festgestellt. Später trat, ebenfalls in Norrland, die Schweinepest, ohne als solche erkannt zu sein, in schwerer Form auf. Der stellvertretende Länsveterinar E. Ankarklös beobachtete anfangs März 1924 in einem Bestande von 100 Tieren die Krankheit. Es starben jeden Tag zehn Schweine. Die veterinärbakteriologische Anstalt wies in einem Kadaver Schweinepestbakterien nach. Die Stallungen wurden sorgfältig desinfiziert, und erst nach zwei Monaten wurde eine größere Zahl Schweine wieder eingeführt. Aber bereits nach acht Tagen brach die Krankheit von neuem aus. Während der Zeit hatte sie sich auf sämtliche Gehöfte im Dorf, sogar auf die weit drinnen in den Wäldern gelegenen, wo kaum eine Personalberührung mit den Einödsbütern stattfindet, sowie auf die ganze Östersundsgegend verbreitet. Im ganzen starben 300—400 Tiere, die übrigen wurden von den Besitzern geschlachtet. Das Schweinepestserum, das prophylaktisch angewendet wurde, wirkte nicht. Bei der Sektion wurden hämorrhagische Lymphdrüsen, Schwellung der Milz, Atelektasen in den Lungen, multiple hämorrhagische Herde in den Nieren und diffuse Rötung oder punktförmige Blutungen in der Haut, hauptsächlich an den Ohren und am Bauche, nachgewiesen.

Zum Unterschied von der Schweinepest befällt die Schweinepest zuerst die älteren Tiere und dann die allerkleinsten. Mitunter ist der Verlauf besonders bei den kleinen schlagartig. Oft beträgt die Dauer auch 3—8 Tage. Die Mortalität ist sehr groß. Es bestehen Fieber und Verstopfung, die in hellgrüne, übelriechende Diarrhöe übergeht. Blutige Ausleerungen werden nicht beobachtet. Am zweiten oder dritten Tage schwellen die Augenlider an und verkleben dann. Die Ohren werden rot, sogar fast blaurot, und sehr dick. Unter den Ferkeln tritt am zweiten und dritten Tag heftiges Nasenbluten auf, und dann ist der Verlauf mehr perakut. Husten besteht selten. Die Tiere liegen, und vorm Tode treten oft krampfartige Zuckungen auf. In der Zeit zeigen sich am Bauche multiple Blutungen.

Erst im Juli 1924 wurde am bakteriologischen Laboratorium der Landwirtschaftsgesellschaft in Malmö durch Tierversuche festgestellt, daß es sich um eine äußerst infektiöse Krankheit der Schweine handelte, die auch durch bakterienfreies Filtrat sich übertragen ließ. In allen Fällen fehlte aber die für Schweinepest charakteristische diphtherische Entzündung im Dickdarm. Daher wurde die Diagnose „Schweinepest“ nicht gestellt.

Die Ausbrüche in Norrland kamen weit ab von Verkehrswegen und ohne direkte Verbindung mit den größeren

Importhäfen und ihren Löschungsplätzen vor. Beim Ausbruch in Östersund erhielten die Schweine Küchenabfälle und Spülicht, und wahrscheinlich sind auch bei den beiden anderen Ausbrüchen Küchenabfälle verfüttert worden. Daher liegt es nahe, an amerikanischen Speck zu denken, der in Norrland in großen Mengen verwendet wird. Denn nach den oben erwähnten Versuchen Birchs kann der Ansteckungsstoff im Schinken über drei Monate lebensfähig bleiben. Ob er sich ebenso lange in der Speckschwarte hält, darüber sind Versuche noch nicht angestellt worden.

Auch in Norwegen, wo die Schweinepest nicht stationär ist und von außerhalb eingeschleppt werden muß, werden vereinzelt Fälle von Schweinepest an ganz isolierten Stellen beobachtet, ohne daß die Tiere mit anderen Schweinen in Berührung gekommen wären. Solche Fälle wurden 1919 im Bezirk Hedemarken, 1920 in Tunge und 1925 und 1926 in Drammen und in Östre Aker beobachtet. In Drammen erkrankten die Schweine unter hohem Fieber — Temperatur um 41 Grad —, Mattigkeit und Appetitlosigkeit. Im Hinterteil waren sie gelähmt, schwankten und fielen hin, wenn sie auf die Beine gebracht wurden. Außerdem wurden Krämpfe in den Hals- und Kaumuskeln beobachtet. Defäkation sehr gering. Bei der Sektion eines drei Monate alten Ferkels wurde eine hämorrhagische Entzündung im Magen, dem vordersten Teil des Pylorus, im Grimmdarm und im Rektum nachgewiesen. Der Darminhalt war mit Blut vermischt, aber die Darmschleimhaut war ohne diphtherische Schorfe oder Wunden. Bei der Unterfuchung der Eingeweide eines älteren Ferkels wurden ähnliche Veränderungen sowie gleichzeitig große gelatinöse Ausschwitzungen im Gekröse und kleine Hämorrhagien im Endo- und Epikard nachgewiesen. In der Milz wurden mikroskopisch einige gramnegative, kurze Bazillen, die Mäuse in einigen Tagen töteten, gesehen, und aus dem Blute wurden ovoide Bazillen isoliert. Eine exakte Diagnose konnte nicht gestellt werden. Erst als bei einem andern Ferkel außer heftiger Entzündung im Dünndarm, dessen Inhalt mit Blut vermischt war, und außer streifenförmigen Blutungen im Magen sowie Echymosen im Perikard, auch im stark entzündeten Grimm- und Blinddarm 4 bis 5 unregelmäßige Geschwüre mit rötlichen und verdickten Rändern angetroffen wurden, konnte die Diagnose Viruspest gestellt werden. Ähnlich war der Befund in Östre Aker. In allen diesen Fällen waren seit längerer Zeit keine Ferkel angekauft, so daß hierdurch die Seuche hätte eingeschleppt werden können, es wurde aber Spülicht aus den benachbarten Städten Drammen bzw. Oslo in ungekochtem Zustand verfüttert. Dieses Spülicht muß die Seuche vermittelt haben, und zwar durch den amerikanischen gepökelten Speck und durch Schinken, die jährlich in beträchtlicher Menge in Oslo eingeführt werden.

Damit die Krankheit nicht ins Reich eingeschleppt wird, ist jede Einfuhr von Schweinen im lebenden oder geschlachteten Zustand oder von Teilen von solchen zu verbieten. Nur durch Kochen oder durch genügendes Erhitzen sterilisierte Teile oder Produkte von Schweinen, ausgenommen Schmalz, fabrikmäßig gereinigte, abgeschabte und gefalzene Därme sowie fabrikmäßig gereinigte Borsten, dürfen eingeführt werden.

Um die Verbreitung im Lande zu verhindern, muß man nach Birch daran denken, daß Speck von Schweinen, die getötet werden, wenn die Körpertemperatur zu steigen beginnt, infektiösgefährlich ist, daß aber der Verbreitung durch Speck vorgebeugt werden kann, durch Einspritzung von Schweinepestserum vor Eintritt des Fiebers.

Nach Birch muß man

1. verhindern, daß infizierte Schweine in den Handel kommen,
2. den zum menschlichen Genuß für tauglich erklärten

Speck in solche Form oder in solche Produkte umwandeln, daß das Virus getötet wird,

3. alle Schweinehalter über die Gefahr, Schweine mit Küchenabfällen zu füttern, aufklären.

Große Besitzer, deren Betrieb auf Verfütterung von Küchenabfällen beruht, könnten ihre Schweine gegen die Einschleppung der Krankheit durch Küchenabfälle schützen entweder dadurch, daß gesetzlich bestimmt wird, daß Küchenabfälle nur gekocht verfüttert werden dürfen, oder durch Immunisierung ihrer Schweine. Im Einzelfall kann das Kochen der Küchenabfälle gute Dienste leisten, um so mehr, als dadurch gleichzeitig viele Bestandteile der Küchenabfälle leichter verdaulich gemacht werden. Als allgemeine sanitäre Einrichtung kann es jedoch nicht vorgeschrieben werden mit Rücksicht auf die Kosten und die Mehrarbeit. Daher bliebe für die Bestände, welche der Gefahr der Ansteckung ausgesetzt sind, nur die Immunisierung mit Serum und Virus übrig. Diese ist angezeigt in einem Lande, in dem die Seuche stationär und weit verbreitet ist, nicht aber in Ländern, welche die Einschleppung der Seuche von außen durch ein Einfuhrverbot von Schweinen und von infiziertem Speck aus Ländern, in denen Schweinepest herrscht, verhindern können.

Bass.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Schultze, W., O. Seifried und J. Schaaf: Die **Melkerknoten und ihre Ätiologie**. (Aus der Hautklinik (Direktor: Prof. Dr. A. Jesionek) und dem Veterinärhygienischen und Tierfeucheninstitut (Direktor: Prof. Dr. W. Zwick) der Landesuniversität Gießen.) (Zeitschr. f. Infekt.-Krankh. der Haustiere 1927, 31, Heft 4, S. 295.)

In der Hautklinik der Universität Gießen wurden in den letzten Jahren mehrfach bei Personen aus ländlicher Bevölkerung eigentümliche, knotenartige Erhebungen der Haut an den Händen beobachtet, die, da sie lediglich beim Melkpersonal vorkommen, unter dem Namen „Melkerknoten“ bekannt sind. Die Ätiologie dieser Knoten ist noch nicht hinreichend geklärt; es steht jedoch fest, daß die Erkrankung durch Übertragung beim Melken euterkranker Kühe zustande kommt. Die Melkerknoten werden meist in den Wintermonaten bei weiblichen vakzinieren und revakzinieren Personen im Alter von 15 bis 35 Jahren beobachtet. Von den Kranken wurde angegeben, daß sie Tiere gemolken hätten, die am Euter Knoten oder warzenähnliche Gebilde aufwiesen. Sie selbst hätten aufgesprungene Hände gehabt, und nach 8—10 Tagen seien bei ihnen die Knoten aufgetreten. Das klinische Bild dieser Melkerknoten kann je nach dem Alter, Sitz und Hinzukommen von Sekundärinfektionen recht verschieden aussehen. Erst einige Tage bestehende Melkerknoten stellen etwa 1—5 mm hohe und 3—10 mm breite Papeln dar, die mehr oder weniger halbkugelförmig oder kegelförmig sein können. Sie treten in der Einzahl oder Mehrzahl auf. Ihr Sitz ist meist am Handrücken in der Gegend zwischen den Fingern, wo Zeigefinger und Daumen besonders bevorzugt erscheinen. Die Farbe der typischen Melkerknoten schwankt zwischen gelbbraun bis bläulich-rot. Die Knoten heben sich aus gesunder Umgebung scharf ab und sind gut verschieblich. Manchmal werden sie von einem leicht rötlichen Hof umgeben. Bleiben die Knoten sich selbst überlassen, so flachen sie nach 2—3 Wochen ab und lassen eine zunehmende Epithelverdickung erkennen. Histologisch handelt es sich im wesentlichen um eine exsudative Entzündung im Papillarkörper; dabei tritt im Bereich der in den Papillen aufsteigenden Kapillaren eine deutliche Zellvermehrung auf. Ferner finden sich in der Oberhaut, vielfach in Fortsetzung dieser Gefäße, Zellen mit pyknotischem Kern und einem ausgesprochen hellen Hof. Bei alten Herden entwickelt sich eine mehr oder weniger ausgesprochene Akanthose und Hyperkeratose. Durch ausgedehnte

Übertragungsversuche auf verschiedene Tiere (Kalb, Schaf, Kaninchen und Meerschweinchen) haben die Verfasser festgestellt, daß die an den Händen und Fingern von Melkern und Melkerinnen auftretenden derben, tumorartigen, allgemein als „Melkerknoten“ bekannten Bildungen als Pockeninfektionen aufzufassen sind, die vom Euter pockenkranker Kühe ihren Ausgang nehmen und beim Melkgeschäft übertragen werden. Die experimentellen Versuche lassen eine immunisatorische Gleichwertigkeit der „Melkerknoten-Vakzine“ mit einer gewöhnlichen Impfvakzine erkennen. Diese Tatsache in Verbindung mit dem Ausfall der angestellten Übertragungsversuche bedeutet für die von van Heelsbergen, Gins, Toyoda, Zwick u. a. vertretene Ansicht, daß zwischen den Pocken des Menschen und der verschiedenen Haustiere enge Verwandtschaftsbeziehungen bestehen, und daß es sich hierbei wahrscheinlich nur um Standortsvarietäten eines einheitlichen Pockenvirus (Zwick) handelt, eine wesentliche Stütze. Ziegler.

Treisz, J.: Über die frühzeitige Feststellung der Trächtigkeit bei Stuten. (Allatorvosi Lapok 1927, Nr. 19, S. 235.)

Bei Anwendung eines Vaginalsepekulums und eines elektrischen Lichtstabes gelang der Nachweis von Trächtigkeit vom 18 Tage bis zu drei Monaten und in 90 Prozent der Fälle, in den ersten 14—20 Tagen in 30 Prozent, in 110 Prozent war es erst im 2. bis 3. Trächtigkeitsmonat und in weiteren 10 Prozent erst nach Ablauf von drei Monaten möglich. Der letzte Prozentsatz bezieht sich auf mehrmals gebärende, ältere Stuten, wo die unten zu schildernden Erscheinungen am Gebärmuttermund und weniger deutlich wahrnehmbar sind. Oft kann man schon beim Einführen des Vaginalsepekulums daraus das Vorhandensein von Trächtigkeit feststellen, daß die Einführung des Spekulums durch das Vorhandensein eines an die Zähigkeit des Kleisters erinnernden Schleimes in der Scheide und im Scheidenvorhof erschwert wird. Bei Beleuchtung mit dem eingeführten Lichtstab sieht man bei trächtigen Stuten außer dem bereits erwähnten zähen Schleim die kraterförmigen Falten um den Gebärmuttermund ausgeglichen, den Gebärmuttermund durch einen Schleimzapfen verschlossen und dementsprechend abgerundet, glatt, mattglänzend und mit einer Schleimhaut überzogen, die Portio vaginalis 3—5 cm lang, daumenfingerdick. Im 3.—5. Trächtigkeitsmonate erscheint der Gebärmuttermund gewöhnlich aufwärts gerichtet, weil die Gebärmutter durch das Gewicht des Fetus in die vorderen und unteren Teile der Bauchhöhle gezogen wird.

Marek.

Horváthy, L.: Uteruschnitt nach dem Tode des Tieres. (Allatorvosi Lapok 1927, Nr. 19, S. 235.)

Nach der Schlachtung einer etwa 19—20 Jahre alten und in der Agonie befindlichen Kuh, die nach drei Wochen kalben hätte sollen, wurden unmittelbar die Bauchdecken und die Wand der Gebärmutter rasch durchschnitten und das Kalb hervorgezogen. Das zunächst ganz leblos erscheinende Kalb wurde erst durch fünf Minuten lang fortgesetzte künstliche Atmung wiederbelebt, nach dem mittlerweile die Rachenhöhle und die Nasenöffnungen vom anhaftenden Schleim befreit worden waren. Nach Unterbindung des Nabelstranges wurde das Kalb künstlich aufgezogen. Marek.

Dietel, F.: Bacillus abortus-Bang-Infektionen beim Menschen. (Aus der Universitäts-Hautklinik Erlangen.) (M. m. W. 1927, S. 1704.)

Im Anschluß an den von Krenter beschriebenen veröffentlicht Verf. einen neuen derartigen Fall, der durch eine erhebliche Störung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit gekennzeichnet war. Er betrifft den Kollegen Dr. O., der vor etwa zwei Jahren schon einmal wegen einer hämorrhagisch-bullösen Dermatitis an beiden Armen behandelt worden war, die 14 Tage nach Ausräumung eines infektiösen Abortes bei einer Kuh eintrat. Der blutig-seröse Inhalt der

Blasen hatte einen deutlichen fötiden Geruch, und es waren in demselben auffallend kleine Gram-negative Stäbchen nachweisbar, deren Identifizierung jedoch nicht gelang, die jedoch dem Bang-Bazillus ähnlich waren. Die Erkrankung verlief unter Fiebererscheinungen (35,5 Grad) und verursachte eine stärkere Störung des Allgemeinbefindens, als es dem Hautbefund an sich entprochen hätte. Nach entsprechender Behandlung (Klatschkompressen mit Kal. permang., Lösung und Milchinjektionen heilte die Dermatitis innerhalb 14 Tagen ab. Im Juni 1927 erkrankte der Kollege erneut und zwar nach dem Genuß einer schon länger gelegenen gebratenen Taube. Auf Opiumtropfen besserte sich das Leiden nicht, es traten vielmehr Appetitlosigkeit sowie zunehmende Entkräftung und Glieder Schmerzen ein. Im Juli waren in den Darmentleerungen schleimhautartige Beimengungen nachweisbar und es trat intermittierendes Fieber ein, das nachmittags 1 Uhr begann, bis 38,8 bezw. 39,0 anstieg und gegen Abend zur Norm abfiel. Die Stuhlentleerung, die regelmäßig während dieser Temperatursteigerung eintrat, hatte den Geruch, wie er beim infektiösen jauchigen Abort der Kuh beobachtet wird (Ausgabe des erkrankten Kollegen). Das Allgemeinbefinden verschlechterte sich weiterhin und es machten sich namentlich stechende Gelenkschmerzen bemerklich. Die Blutuntersuchung auf Paratyphusinfektion verlief negativ. Zu dieser Zeit kam Patient in die Behandlung des Verf. Da vermutet werden konnte, daß die vor zwei Jahren durchgemachte Dermatitis durch den Bangischen Bazillus verursacht war, so wurde ein Zusammenhang des jetzigen Leidens mit jener Erkrankung angenommen und deshalb Blut an die Veterinärpolizeiliche Anstalt Oberschleißheim zur Untersuchung geschickt, was später noch einmal wiederholt wurde. Beide Male wurde die Hämolysse bis zur Serummenge 0,01 gehemmt, und gegen Bangbazillen betrug der Agglutinationstiter 1:2000. Um diese Zeit war bei dem Kollegen noch eine ulzeröse Stomatitis eingetreten, die auf Behandlung mit Kal. permangan.-Lösung verhältnismäßig rasch verschwand. Das Darmleiden behandelte Verf. mit fünf in ein- bis zweitägigen Abständen gegebenen Omnadin-Injektionen, was zur Folge hatte, daß schon nach der zweiten Injektion das Fieber zur Norm abfiel, die schleimigen, fötid riechenden Stuhlbeimengungen verschwanden und der Kranke sich zusehends erholte. Die Besserung schritt weiter fort und die Ausleerungen nahmen normale Form an. Ein Zusammenhang der erwähnten Hauterkrankung mit dem Darmleiden wurde auch von Prof. Dr. Ernst in Oberschleißheim vermutet. Für die Annahme des Fortbestehens der Erkrankung als latente Infektion bietet der Verlauf beim Rinde ein Analogon: Der auslösende Faktor für die Erkrankung wäre in der bei dem Kollegen nach Genuß der verdorbenen Taube aufgetretenen Indigestion zu suchen, jedoch sind schlüssige Beweise für die Art der Infektion nicht zu erbringen. Carl.

Gräub, E.: Infektionen beim Menschen durch den Bazillus des infektiösen Abortus Bang. (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 394.)

Der im Mittelmeergebiet bei Ziegen vorkommende vom B. Bang morphologisch und biologisch nicht trennbare B. melitensis geht durch die Milch auf den Menschen über und verursacht das Maltafieber. Man weist daraufhin, daß der B. Bang beim Menschen vielleicht auch fieberhafte Erkrankungen hervorrufen könnte. Verf. erwähnt zwei Fälle beim Menschen, deren Serum den B. Bang bis zu 1:1200 agglutinierte. Die vier aus der Literatur angegebenen Fälle ergaben serologisch starke Agglutination mit dem Bazillus Bang, wobei man die Ursache auf abortus-infizierte Milch zurückführen mußte. H. G.

Veilchenblau: Die Infektion mit dem Bact. abort. Boum (Bang). (M. m. W. 1927, S. 1705.)

Verf. ist in der Lage, den bis jetzt bekannten drei Fällen dieser Krankheit, die als Berufsleiden bei Tierärzten regel-

mäßig nach manueller Abnahme der Nachgeburt eintrat, einen weiteren Fall hinzuzufügen. Der betreffende Kollege hatte je am 5. und 11. August eine derartige Arbeit vorgenommen, worauf am 21. August Mattigkeit, Glieder schwere und leichtes Frösteln eintrat. Dabei bestand mäßiges Fieber, das jedoch auf Terpichin nicht nachließ. Im letzten Septemberdrittel machte sich eine Verschlimmerung des Allgemeinbefindens bemerkbar und das Fieber nahm trotz Injektion von Grippeferum zu, ja es entwickelte sich ein septisches Krankheitsbild, das den Eindruck eines Paratyphus machte, der jedoch durch die Blutuntersuchung ausgeschlossen werden konnte. Schüttelfröste mit Temperaturen über 40 Grad blieben nach Disparageninjektionen aus. Am 5. Oktober wurde Patient in die Universitätsklinik in Würzburg aufgenommen, wo jedoch eine Aufklärung des Krankheitsbildes nicht möglich war. Auf intravenöse Gaben von Trypaflavin trat insofern Besserung ein, als die Temperatur fast zur Norm herabfiel, und der Kollege wurde deshalb aus der Klinik entlassen. Als er zum ersten Male einen Ausgang machte, stieg die Körperwärme wieder an (Abendtemperatur 38,6). Es wurden nun fortgesetzt intramuskuläre Injektionen (zweimal täglich 0,6 ccm) von folgender Mischung gemacht: Jod. pur. 0,05, Menth. 5,0, Camph. 0,25, Ol. Eukal. 5,0, Ol. Ricin. 10,0, worauf innerhalb elf Tagen das Fieber verschwand. Die Rekonvaleszenz, die durch weitere derartige Injektionen unterstützt wurde, dauerte bis zum Januar, es zeigten sich aber auch später manchmal Erscheinungen von Mattigkeit und Schwäche. In der Zwischenzeit war die Veterinärpolizeiliche Anstalt in Schleißheim um Rat angegangen worden, da die Humanmedizin das Krankheitsbild nicht deuten konnte. Die dort vorgenommene Agglutination mit Patientenserum ergab gegenüber Bang-Bazillus einen Titer von 1 : 6000. Die Komplementbindung ergab noch eine Hemmung der Hämolyse bei 0,01 ccm. Damit war die Ätiologie des Falles geklärt. Verf. schließt seine Arbeit mit allgemeinen Bemerkungen über die bis jetzt erfolgten diesbezüglichen Veröffentlichungen.

Carl.

Lentz, W.: Erforschung und Behandlung der Streptokokkenmastitis bei Kühen. (Aus dem Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg und für Berlin. — Direktor: Dr. Scharr.) B. T. W. 1927, S. 693.

Die Streptokokkenmastitis hat in den letzten 2 Jahren eine erschreckende Ausbreitung erreicht. In Übereinstimmung mit den Angaben anderer Autoren konnte Verf. feststellen, daß besonders Kühe mit großer Milchleistung und solche im Alter von 4—6 Jahren erkranken, daß ferner Infektionen nach dem Kalben beobachtet werden. Zu Beginn des Leidens sind vorwiegend kurze Streptokokkenketten in der Milch nachweisbar, die bei weiterem Bestehen der Krankheit an Länge zunehmen. Nicht bestätigen konnte Verf. die von verschiedenen Seiten ausgesprochene Auffassung, daß neben der Infektion durch den Strichkanal eine Infektion per os möglich sei.

In therapeutischer Beziehung steht Verf. auf dem Standpunkte, daß es nicht angebracht ist, das Euter durch Infusionen von Flüssigkeit in die Striche zu belasten, daß vielmehr der Gesamtorganismus zum Kampfe gegen die Krankheitserreger herangezogen werden muß. Es wurde daher versucht, die Bekämpfung der Streptokokkenmastitis durch die Anwendung von Stall-, in hartnäckigen Fällen von tierispezifischer Vakzine durchzuführen. Letztere besteht in einer Abschwemmung von Streptokokkenagarkulturen, die nach eigenem Verfahren schonend abgeschwächt werden. Die Applikation erfolgte subkutan am Hals in Mengen von je 10 ccm und in Zeitabständen von 10—14 Tagen. Eine gleichzeitige lokale Behandlung unterblieb. Die kranken Tiere wurden nur abgefordert und so häufig wie möglich ausgemolken. Nach den an ca. 400 Kühen gemachten Erfahrungen reichte bei einer großen Zahl von Fällen besonders im Frühstadium der Erkrankung

eine einmalige Injektion der stallspezifischen Vakzine zur Heilung des Tieres aus. Die übrigen Fälle wurden zweimal im Abstände von 10—14 Tagen behandelt. Später ging Verfasser dazu über, einzelne Tiere und ganze Bestände prophylaktisch zu behandeln, auch hier mit Erfolg. Die Wertbestimmung der Impfung erfolgte durch die bakteriologische Prüfung von Einzelmilchproben der erkrankten und Gruppenmilchproben der gefundenen Tiere.

Carl.

Geflügelkrankheiten.

Latif, A.: Untersuchungen über einen dem Geflügelcholeraerreger ähnlichen Bazillus, zugleich ein Beitrag zur Antikörperbildung bei Geflügelcholera. (In.-Dissert. Berlin 1926.)

Aus den Versuchen ist zu schließen, daß eine Vermehrung der spezifischen Agglutinine bei mit Geflügelcholera vorbehandelten Hühnern und Tauben am dritten Tage nach der Impfung nicht immer vorhanden ist. Am neunten oder zehnten Tage ist die Agglutinationssteigerung ausgeprägt, kann aber unter Umständen auch schon wieder eine rückläufige Tendenz zeigen. Lebende Kulturen produzieren besser Agglutinine als abgetötete, von letzteren eignen sich frisch hergestellte Abschwemmungen besser als alte.

A.

Lerche: Die Paracholera der Puten und ihre Beziehung zur Pseudotuberkulose der Nagetiere. (Aus dem Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer Niederschlesien in Breslau.) (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 104, S. 493, 1927.)

Verf. beschrieb im Jahre 1926 eine unter jungen Puten auftretende, durch Abmagerung, gestäubtes Gefieder, Herabhängen der Flügel, durch Blässe der Gesichtshaut und Lähmungsercheinungen gekennzeichnete Krankheit, die durch einen der Bakterien der hämorrhagischen Septikämie sehr nahe stehenden Erreger hervorgerufen wird. Für das Leiden wurde später von Beck und Huck die Bezeichnung „Paracholera“ vorgeschlagen. Verf. schloß sich diesem Vorschlage an, machte jedoch auf die große Ähnlichkeit aufmerksam, die der fragliche Mikroorganismus gegenüber dem Erreger der Nagetierpseudotuberkulose aufweist. Die vorliegende Arbeit macht es sich zur Aufgabe, durch Vergleichsuntersuchungen die beiden Krankheitskeime von einander abzugrenzen oder ihre Gleichheit zu beweisen.

Zu den Versuchen wurden insgesamt 35 Stämme von Puten, 1 Stamm vom Kanarienvogel, 9 Stämme von Hafen und 5 Stämme von Meerschweinchen benutzt. Es ergab sich, daß mit den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln, nämlich der mikroskopischen Untersuchung, der Kultur, der Prüfung auf biochemische Eigenschaften, der Agglutination und der Tierimpfungen, es nicht möglich ist, die sogenannte „Paracholera der Puten“ und Kanarien von der Pseudotuberkulose der Nagetiere zu unterscheiden.

Bezüglich der Nomenklatur gelangt Verf. auf Grund dieses Untersuchungsergebnisses dahin, das wir von jetzt ab analog dem *Bacterium pseudotuberculosis rodentium* auch von einem *Bacterium pseudotuberculosis avium* zu sprechen haben.

Carl.

Bederke: Amerikanische Studien auf dem Gebiete der bazillären weißen Ruhr der Kühen und Versuche über den Wert der Agglutinationsprobe. (Festschrift Eugen Fröhner zu seinem 70. Geburtstage. 1928. S. 26. Zusammenge stellt von v. Ostertag, Stuttgart. Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart.)

Verf. bringt zunächst eine Übersicht über die amerikanische Literatur der weißen Ruhr und geht dann auf seine in Amerika gemachten eigenen Untersuchungen über.

Bederke hat den Wert der Agglutinationsmethode zur Bekämpfung der weißen Ruhr in der Forschungsanstalt in Nebraska studiert. Die Versuche wurden in Gemeinschaft mit Olney ausgeführt. Insgesamt wurden 7208 Tiere der Agglutinationsprobe unterworfen, von denen 5,2 Prozent positiv reagierten. Hiervon kamen 185 Tiere zur Schlachtung und konnte bei rd. 90 Prozent die serologische

Diagnose bestätigt werden. Als positiv galt ein Agglutinationswert von 1 : 100. Die Blutentnahme wurde an der Flügelvene durch Skarifikation der Vene oder mittels Spritze vorgenommen. Es empfiehlt sich, die Tiere 18 bis 24 Stunden vor der Blutentnahme hungern zu lassen, um störende Trübungen in den Teströhrchen zu vermeiden.

Berge.

Fleischhauer, G.: Untersuchungen beim normalen und gestörten Legeakt des Geflügels mittels Röntgendurchleuchtung nebst statistischen Beiträgen zur Legenot.
(In.-Diss. Berlin 1926.)

Die Legenotkurve erreichte in jedem Jahre zu Beginn der Legeperiode (Februar, März oder April) ihren Höhepunkt und fiel daraufhin bis Oktober bzw. November wieder ab (höchste Zahl der Fälle von Legenot an der Berliner Klinik im Jahre 1924 = 31,1 Prozent der Gesamtzahl). Die Legenot hat nicht nur absolut, sondern auch relativ zugenommen und in den Jahren 1920—1922 die höchsten Ziffern zu verzeichnen als Folge der durch die damaligen Zeitverhältnisse bedingten unnatürlichen Haltung, Fütterung und Aufzucht der Hühner. Es ist daher der naturgemäßen und gefundenen Haltung und Pflege der Hühner die größte Beachtung zu schenken. Als Ursachen der Legenot kamen in erster Linie Bauchhöhlentumoren, in zweiter Linie Eileiterentzündungen, ferner Windeier und zuletzt Bauchhöhleneier zur Beobachtung. Der Geflügelhalter kann sich durch sofortige Hinzuziehung tierärztlicher Hilfe vor Schaden bewahren, da bisher mehr als die Hälfte aller Legenotfälle ohne Gefahr für Huhn und Ei zu beheben möglich war. Die Legenot des Wassergeflügels hat eine ganz untergeordnete Bedeutung im Verhältnis zur Legenot der Hühner. Zur schnellen Orientierung über Lage des Eies usw. ist ohne vorherige manuelle Untersuchung die Röntgendurchleuchtung sehr geeignet. Dünnchalige Eier gaben sich auf dem Schirmbilde nur andeutungsweise zu erkennen, Wind- und hartchalige Eier waren vereinzelt undeutlich. Bauchhöhlen-Eier waren ohne weiteres festzustellen, sie erschienen, da sie die Bewegungen des Tieres mitmachten, gleichsam in der Bauchhöhle schwimmend. Die Röntgendurchleuchtung ist geeignet, die Diagnose in Bezug auf die Lage des Eies bei Legenot — abgesehen von den Bauchhöhleneiern — unter Ersparrung der oft zeitraubenden und für den Patienten schmerzhaften vorherigen manuellen Palpation binnen kurzem zu sichern und die Notwendigkeit einer etwa vorzunehmenden Lageveränderung (Wenden) darzulegen. Zur Klärung der Frage, inwieweit die Lage des Eies bei gewissen Fällen der Legenot als alleinige Ursache in Betracht kommt, bedarf es noch weiterer eingehender Beobachtungen und Untersuchungen.

A.

Standesangelegenheiten.

Tierärztliche Buchführungsstelle Pommern e. V.

Ordentliche Mitgliederversammlung am 22. April in Stettin. Anwesend 16 Mitglieder, als Gast der Geschäftsführer der Tierärztlichen Verrechnungsstelle Brandenburg Dr. Hesse-Falkensee. Nach Verlesung des Berichts über die Nachprüfung der Ertragnisse für das Geschäftsjahr 1927 nebst einer Unkostenaufstellung durch den beeideten Buchfachverständigen Zander-Stettin sind von diesem als Geschäftsunkosten 3,2 Prozent ermittelt und als durchaus normal bezeichnet worden. In der anschließenden Diskussion legt Dr. Kleine-Löcknitz der Geschäftsführung nahe, die Unkosten nach Möglichkeit herabzudrücken, um noch höhere Gewinne herauszuwirtschaften. Die Zerlegung und Begründung der einzelnen Posten des Unkostenkontos durch den Geschäftsführer gibt der Versammlung eine ausführliche Darstellung des Geschäftsbetriebes, dessen Kosten durch Herabsetzen der Gehälter für das Personal nur zum Schaden der Zuverlässigkeit und Sicherheit des Betriebes gemindert werden können. Ein Vergleich mit den Geschäftsunkosten einiger (3) ärztlicher Verrechnungsstellen, welche mit rund 5 Prozent angegeben werden, läßt erkennen, daß der Einwand unkaufmännischer Wirtschaftsführung unserer B. St. mit 3,2 Prozent

Unkosten unbegründet ist. Der Vors. beendet die Diskussion mit dem Versprechen, die Geschäftsführung auch weiterhin im Interesse der Mitglieder unter Wahrung größter Sparfameit zu gestalten und beantragt, dem Geschäftsführer Entlastung erteilen zu dürfen. Nach einstimmiger Annahme des Antrages dankt der Vors. dem Geschäftsführer Dr. Eggebrecht herzlich für seine Mühewaltung und umsichtige Geschäftsführung. Der alte Vorstand wird wiedergewählt: Dr. Auerbach, 1. Vors.; Dr. Eggebrecht, 2. Vors. u. Geschäftsf., Proelss-Pasewalk, Dr. Pfeiffer-Gülzow, Dr. Schulz-Elmenhorst als Beisitzer. Folgende Satzungsänderung wird angenommen: Dem § 3 wird hinzugefügt: „Tierärzte, die keine Praxis treiben, können dem Verein beitreten und an den Wohlfahrtseinrichtungen teilnehmen, wenn sie die von den übrigen Mitgliedern für die Verforgung — Sterbegeld, Unfallchutz, Tagegeld, Witwen- und Waisenverforgung — aufzubringenden Beiträge zahlen.“ — Bei § 4 folgt in der zweiten Reihe nach dem Worte „Voritzenden“: „nach Unterzeichnung der Beitrittsklärung erfolgen und erhält nach Zustellung der Aufnahmeerklärung Verbindlichkeit.“ — § 5 erhält eine vollständig neue Fassung: „Mit Zustellung der Aufnahmeerklärung hat jedes Mitglied sofortigen Anspruch auf Teilnahme an den Wohlfahrtseinrichtungen des Vereins, wenn es seinen Verpflichtungen nach § 4 nachkommt.“ — § 6 wird dahin geändert, daß der letzte Abschnitt lautet: „Mitglieder, die aus dem Vereinsbereiche verziehen oder ihre Praxis aufgeben, können Rechte und Ansprüche an den Verein beibehalten.“ Es besteht bei den Mitgliedern der Wunsch, eine Zusatzversicherung der schon bestehenden Unfallversicherung einzugehen, um bei Erkrankungen durch Unfall (Arbeitsunfähigkeit) ein Tagegeld von RM. 10,—, 15,— oder RM. 20,— zu erhalten. Die Prämien für den Zusatzvertrag über Gewährung eines Tagegeldes sind jedoch von den Mitgliedern persönlich zu tragen und von der B. St. zu verauslagen. Durch schriftliche Umfrage sind die Mitglieder, welche den Zusatzvertrag abzuschließen wünschen, zu ermitteln. Alles weitere veranlaßt die B. St. Ferner sollen künftig alle Beiträge für Standesorganisationen, Tierärztekammer, R. p. T. usw. zu Lasten der Mitglieder durch die B. St. gezahlt werden. Zum Schluß legt der Geschäftsführer nahe, alle Rechnungen für Arzneien, Impfstoffe, Instrumente usw. nach Empfang durch die B. St. bezahlen zu lassen, um das 5-Prozent-Skonto zu erhalten, von welchem 2½ Prozent der Verforgungskasse zugehen und die restlichen 2½ Prozent auf das Sparguthaben des betreffenden Mitgliedes gebucht werden.

Dr. Auerbach, Vors. Dr. Eggebrecht, Geschäftsf.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Der Privatdozent a. o. Prof. Dr. med. vet. Curt Krause der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin wurde als Ordinarius auf den neuen Lehrstuhl für Allgemeine Pathologie und Spezielle pathologische Anatomie der veterinärmedizinischen Fakultät an der Universität Sofia berufen. Prof. Krause hat die Berufung angenommen.

Feier des 150jährigen Bestehens der Tierärztl. Hochschule zu Hannover.

13. bis 15. Juni 1928.

FESTFOLGE.

Mittwoch, den 13. Juni 1928:

- 11 Uhr: Kranzniederlegung am Gefallenendenkmal in der Aula der Tierärztlichen Hochschule. Nur für Angehörige der Gefallenen und Mitglieder der Hochschule! Die Studierenden versammeln sich um 10,45 Uhr in der Aula. (Anzug: Dunkler Rock, Kriegsorden.)
- 12 Uhr: Sitzung der Gesellschaft der Freunde (Beethovenaal, Stadthalle). Vortrag von Geheimrat Prof. Dr. Uhlenhuth-Freiburg i. B.: „Die Bedeutung des Tierexperiments für die Bakteriologie und Hygiene.“ — (Anzug beliebig.) Teilnahme unbeschränkt. Im Anschluß daran, etwa 13,30 Uhr: Überreichung etwaiger Spenden und Adressen, soweit das nicht am folgenden Tage beim Festakt erfolgt.
- 15 Uhr: Pferderennen auf der Großen Bult mit einem „Rennen der Tierärztlichen Hochschule“, wofür der Rennverein aus Anlaß des

150jährigen Jubiläums der Tierärztlichen Hochschule Hannover einen Ehrenpreis und 4000 Mk. und die Tierärztliche Hochschule einen Ehrenpreis gestiftet haben.

19 Uhr: *Begrüßungsabend bzw. Gartenfest* auf der Terrasse und im Garten der Stadthalle. Ende 24 Uhr. (Anzug beliebig.)

Donnerstag, den 14. Juni 1928:

11 Uhr: *Akademischer Festakt* im Kuppelsaal der Stadthalle.

(Anzug: Ehrengäste und Professoren, die am Einzug beteiligt sind, Frack bzw. Amtstracht; sonst Frack oder dunkler Rock.)

Einzug der Chargierten, des Lehrkörpers der Tierärztlichen Hochschule, der Rektoren und offiziellen Vertreter anderer Hochschulen bzw. veterinär-medizinischer Fakultäten sowie der Ehrengäste, die eine Ansprache halten.

Prolog. Verfaßt von Prof. Dr. J. o. h. P a e c h t n e r - München, vorgetragen von Schauspieler H. R u d o l p h, Städt. Schauspielhaus Hannover.

Vorspiel zu „Parsifal“ von Richard Wagner. Geführt vom Orchester des Städt. Opernhauses zu Hannover unter Leitung von Generalmusikdirektor Prof. Dr. R. K r a s s e l t.

Festrede Seiner Magnifizenz des Rektors der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover, Prof. Dr. M i e ß n e r.

Deutschlandlied.

Ernennung der Ehrendoktoren und Ehrenbürger durch den Rektor.

Begrüßungsansprachen.

Schlußwort des Rektors.

Ouvertüre zu „Oberon“ von Carl Maria v. Weber. Geführt vom Orchester des Städt. Opernhauses zu Hannover unter Leitung von Generalmusikdirektor Prof. Dr. R. K r a s s e l t.

Auszug der Chargierten, Ehrengäste, Professoren usw.

15 Uhr: *Festessen* in der Ausstellungshalle.

(Anzug: Frack oder dunkler Rock.) Eingang nur rechts neben der Stadthalle, Stadtseite.

20 Uhr: *Festvorstellung* im Opernhaus und Schauspielhaus.

„Fatinitza“. Komische Oper in 3 Akten von Suppé und „Pygmalion“. Komödie in 5 Akten von Shaw. (Anzug: Frack oder dunkler Anzug.)

Freitag, den 15. Juni 1928:

11 Uhr: *Einweihung einer Gedenktafel für Robert Koch* an seiner Wirkungsstätte in Langenhagen bei Hannover. (Anzug beliebig.) Treffpunkt 10,30 Uhr am Hotel „Königlicher Hof“, Ernst-August-Platz 8, gegenüber dem Hauptbahnhof. Abfahrt dafelbst 10,45 Uhr.

15 Uhr: *Grundsteinlegung der Neubauten* auf dem Erweiterungs-Gelände der Tierärztlichen Hochschule. (Anzug beliebig.) Zugang vom Pfortnerhaus der Tierärztlichen Hochschule (Ecke Misburger- und Bischofsholer Damm). An die Grundsteinlegung schließt sich in der Reithalle bzw. auf der Reitbahn die Vorführung einer Reitabteilung der Studierenden der Tierärztlichen Hochschule sowie die Besichtigung der Hochschule an. In den einzelnen Instituten halten sich Führer bereit.

Anschließend bei günstigem Wetter gemeinsamer Treffpunkt im Garten des Café Kröpcke, Georgstraße.

15 Uhr: *Besichtigung von Alt-Hannover*.

Für die an der Grundsteinlegung usw. nicht teilnehmenden Damen! Treffpunkt 14,45 Uhr in der Georgspassage (Georgstraße 8), die zum Zwecke der Versammlung reserviert worden ist. Von da Abmarsch pünktlich 15 Uhr unter Führung von Museumsdirektor Dr. W. P e ß l e r. Ende der Besichtigung gegen 17 Uhr.

Anschließend bei günstigem Wetter gemeinsamer Treffpunkt im Garten des Café Kröpcke, Georgstraße.

20,15 Uhr: *Festkommers* in der Ausstellungshalle, veranstaltet von den Studierenden der Tierärztlichen Hochschule. (Dunkler Anzug.) — Für die teilnehmenden Damen sind besonders gekennzeichnete Tische reserviert.

Damen nehmen an allen Veranstaltungen teil.

Auskünfte in allen Festangelegenheiten werden erteilt:

Tierärztliche Hochschule, Misburger Damm 16, Hauptgebäude, Erdgeschoß rechts, Fernruf Nr. 502 61,

Dienstag, den 12. bis Sonnabend, den 16. Juni 1928, 8 bis 20 Uhr.

Auskunftstellen ferner:

Verkehrsverein (Reisebüro), Hannover, Bahnhofstraße 8, Fernruf 270 10. (Im Hause des Hotels „Ernst August“, gegenüber dem Hauptbahnhof, neben Zigarrengeschäft von Aug. Henne.) Auskunft hauptsächlich in Wohnungsangelegenheiten!

Dienstag, den 12. bis Freitag, den 15. Juni 1928, 8 bis 18 Uhr.

Stadthalle während des Begrüßungsabends am Mittwoch, dem 13. Juni 1928, ab 18 Uhr in einem von der Weinterrasse zu erreichenden, durch Schild kenntlich gemachten Raum.

Vom Zentrum der Stadt (Hauptbahnhof) ist die Tierärztliche Hochschule mit den Linien 5, 9, 15, die Stadthalle bzw. die Ausstellungshalle mit der Linie 6 der elektrischen Straßenbahn zu erreichen.

150-Jahrfeier der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Die für Mittwoch, den 13. Juni, 12 Uhr, angesetzte Sitzung der Gesellschaft der Freunde — Vortrag von Geheimrat Prof. Dr. U h l e n h u t h: „Die Bedeutung des Tierexperiments für die Bakteriologie und Hygiene“ — wird wegen der starken Beteiligung nicht in der Aula der Tierärztlichen Hochschule, sondern im Beethovenaal der Stadthalle abgehalten.

Im Anschluß daran, etwa gegen 13,30 Uhr, erfolgt gleichfalls im Beethovenaal die Übergabe von Adressen und Spenden an den Rektor der Tierärztlichen Hochschule. Bei der großen Zahl der Teilnehmer während des akademischen Festaktes am 14. Juni in der Stadthalle kann dafelbst leider nur ein ganz beschränkter Kreis von Rednern für die Behörden, Universitäten und Hochschulen, wissenschaftlichen Gesellschaften, Standesvereine usw. zu Worte kommen. Deswegen werden diejenigen Teilnehmer, welche die Glückwünsche persönlich zu überbringen beabsichtigen und eine Aufforderung zu einer Begrüßungsrede während des Festaktes am 14. Juni nicht erhalten haben, höflichst gebeten, dies am 13. Juni 13,30 Uhr im Beethovenaal zu tun. Anmeldungen sind erbeten an den Rektor der Tierärztlichen Hochschule.

Um 15 Uhr desselben Tages beginnt das Pferderennen auf der Großen Bult mit einem „Rennen der Tierärztlichen Hochschule“, wofür der Rennverein aus Anlaß des 150jährigen Jubiläums der Tierärztlichen Hochschule Hannover einen Ehrenpreis und 4000 Mk. und die Tierärztliche Hochschule einen Ehrenpreis gestiftet haben. Um recht zahlreiche Teilnahme auch an dem Rennen wird gebeten.

Dr. Max Fritz †.

Am 1. Mai d. Js. starb in der Klinik zu Gießen der prakt. Tierarzt Dr. Max Fritz aus Fronhausen (Kreis Marburg a. Lahn) an den Folgen eines Motorradunfalles. Mitten aus seiner erfolgreichen Tätigkeit wurde uns der liebe Kollege, erst 35 Jahre alt, entzogen. Mit seiner Frau und zwei Kindern, sowie seiner alten Mutter, deren einziger Ernährer er war, stehen wir trauernd an seiner Bahre. Wir werden ihm stets ein gutes Andenken bewahren.

Verein Kurheffischer Tierärzte.

Oellerich, Vors. Dr. Rathje, Schriftf.

Reichsverband praktischer Tierärzte.

Hauptversammlung 1928 zu München, 1.—3. Juni 1928.

Freitag, den 1. Juni, Beginn 9,30 Uhr vorm. und am Sonntag, den 3. Juni, Beginn 1 Uhr mittags. Deutscher Veterinärat (Wahlen der Auschußmitglieder zum D.V.R.), Dispensierrecht; Sparrücklagen der Serumwerke; „Unsere Stellungnahme zum Bidam in Rücksicht auf das Vorgehen der Apotheker“; „Was ist standesunwürdig?“, „In welchen Praxisfällen können die Tierärzte auf die Verfehrung und Abgabe der im § 1 des Opiumgesetzes genannten Stoffe nicht verzichten?“, Viehver sicherungsfragen. Am Sonnabend, 10 Uhr: „Die Verantwortlichkeit der in der Fleischbeschau tätigen Tierärzte bei Fleischvergiftungen. Abänderung des § 33 Abs. 1 Z. 7 der B.B.A. (Prof. Dr. M. Müller-München)“; „Die Notwendigkeit der Neuregelung des Reichsfleischbeschaugesetzes (Dr. Albin-Schönberg (Schl.))“; „Vollbefolgung der beamteten Tierärzte (Dr. Dreyer-Walsrode und Dr. Kopp-Heidel-

berg)". Ferner gemeinsam mit der am Sonnabend, Beginn nachm. 2 Uhr stattfindenden Hauptversammlung der Landesgruppe Preußen im R. p. T.: „Die Notlage der Freiberufstierärzte (Dr. Dreyer-Walsrode)“; „Fortbildungskurse“; „Fleischbeschaufragen: a) preuß. Min.-Erlaß vom 18. Januar 1928 betr. Kontrolle der Fleischbeschau, b) Erhöhung der Fleischbeschaugebühren, Min.-Erlaß vom 17. Septb. 1927“; Dr. Erlé-Klotzsche (Sa.) „Die Fleischbeschaustatistik in ihrer heutigen Form“; „Amtliche Feststellung des Rotlaufs durch Freiberufstierärzte“. Neben den satzungsmäßigen Punkten (u. a. Neuwahl des Vorstandes) behandelt die Hauptversammlung der Landesgruppe Preußen noch: „Die Vollbefolgung der preußischen Veterinärärzte“. Am Freitag, nachm. 5 Uhr: Vorführung des elektrischen Betäubens und Niederlegens von Tieren im Schlachthaus. Am Sonntag, den 3. Juni, Beginn 10 Uhr, findet die diesjährige Hauptversammlung der Tierärztlichen Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums statt, an welcher die Delegierten des R. p. T. teilnehmen werden. Vortrag des Koll. Dr. Kranich-Darmstadt über Vigantol. Sämtliche Sitzungen finden im Hotel „Vier Jahreszeiten“, Cherubimsaal, Maximilianstraße, Eingang von der Marktallstraße, statt. An geselligen Veranstaltungen sind vorgesehen: Donnerstag, den 31. Mai, abends 8 Uhr: Begrüßungsabend im Bahnhofshospiz Hotel „Drei Löwen“, Schillerstraße 44; Freitag, abends 8 Uhr: Treffpunkt Ratskeller; Sonnabend, abends 8 Uhr: Treffpunkt Löwenbräukellerfestsaal, Stieglmayrplatz; Sonntag, nachm. 6 Uhr: gemeinsames Festessen im Hotel „Vier Jahreszeiten“; Montag vorm. gemeinsamer Ausflug, entweder Fahrt nach Starnberg und Rundfahrt auf dem Starnberger See, oder Fahrt nach Garmisch und von dort mit der Bergbahn nach dem Kreuzeck. Unterkunft: Hotel „Vier Jahreszeiten“ (Zimmer mit 1 Bett etwa 6,— Mk., mit 2 Betten etwa 10,— Mk.); Bahnhofshospiz (Zimmer mit 1 Bett etwa 5,— Mk.). Vorbestellungen von Quartier (mit Angabe der Dauer und gewünschter Preislage), unverbindliche Anmeldungen zur Teilnahme am Festessen und am gemeinsamen Ausflug (an welchem und mit Angabe der Personenzahl) und zu einer in Aussicht genommenen, gemeinsamen Rundfahrt durch München werden baldmöglichst erbeten an den Koll. Dr. Eder, München, Auerfeldstraße 1/o. Für Unterhaltung der Damen während der Sitzungen und Führung der Damen wird bestens gesorgt; am Freitag ist eine Führung der Damen durch die Ausstellung „Heim und Technik“ in Aussicht genommen. Nichtmitglieder sind als Gäste an den Verhandlungen und Veranstaltungen willkommen.

Dr. Kleine-Löcknitz, Vors. der Landesgruppe Preußen.

F. Train-Baruth (Mark), Präsident des R. p. T.

Zentralni Medizinski Journal.

(Russisches medizinisches Zentralblatt.)

Das russische Schrifttum war bisher außerordentlich unübersichtlich. Die Entwicklung des letzten Jahrzehntes, die eine Menge neuer Zeitschriften für Sowjetrußland brachte, machten diese Zustände nur noch verwickelter. Daher ist es zu begrüßen, daß endlich ein Referatenblatt im Staatsverlag in Moskau seit dem 1. Januar 1928 erschien (herausgegeben von Glawnauka), das diesem Übelstand abhelfen will. Das ganz im Stil des Springerischen Zentralblattes gehaltene „Zentralni Medizinski Journal“ (Medizinisches Zentralblatt) erscheint jährlich in zwölf Heften (zu insgesamt 3000 Seiten). Es werden 146 russische Zeitschriften aus dem Gebiet der gesamten Medizin (einschließlich Verwaltungs- und Versicherungsmedizin) und Tierheilkunde referiert. Damit die deutschen Gelehrten sich auf dem laufenden halten können, bekommen vier große deutsche Büchereien von nun an regelmäßig das russische Zentralblatt und zwar die Staatsbibliotheken von Berlin, Hamburg, München und die Universitätsbibliothek Königsberg (Pr.).

Bücherbesprechungen.

Tebbe, Hermann: Die Schweinezucht in Oldenburg. Arbeiten der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde Heft 36. Verlag M. & H. Schaper, Hannover. Preis Mk. 6.—, für Mitglieder der D. G. f. Z. Mk. 4.—.

Die statistischen Ermittlungen über die Schweinezucht Oldenburgs zeigen vom Jahre 1864 bis 1926 mit Ausnahme des Jahres 1873 und der Kriegsjahre eine stetige Zunahme der Anzahl der vorhandenen Tiere. 1864 waren in Oldenburg 76 511 Schweine vorhanden, 1913 wurde mit 574 126 der Höchststand erreicht. Während des Krieges erfolgte eine

rapide Abnahme (1917 = 87 045 Stück), doch erholte sich die Schweinezucht nach dem Kriege sehr schnell wieder und hatte bereits 1926 die Zahl 346 199 erreicht. Dank seiner natürlichen (Boden und Klima) und besonders seiner wirtschaftlichen Verhältnisse (Nähe der großen Getreideeinfuhrhäfen und des rheinisch-westfälischen Industriegebietes) sind in Oldenburg bei vorwiegend bäuerlicher Betriebsform die Vorbedingungen für eine rationelle Schweinezucht gegeben. Gezüchtet wird im Freistaate das große, weiße Edelschwein, das oldenburgische veredelte Landfischwein und als besonderer Typ des letzteren das Südoldenburger Schwein, ein stark veredeltes Landfischwein. Bei der Züchtung der Schweine ist der Unterschied zwischen Hochzuchten, die im allgemeinen mit nur wenig erstklassigen Zuchttieren arbeiten, und den Gebrauchszuchten, die über ein verhältnismäßig großes, wenn auch gewöhnlich nicht sehr wertvolles Zuchtmaterial verfügen, in Oldenburg besonders scharf festzustellen. Leistungsprüfungen werden in der Ammerländischen Schweinezuchtgenossenschaft durchgeführt. Für die Fütterung der Schweine kommen in erster Linie Handelsfuttermittel in Betracht (Gerste und Fischmehl), während die wirtschaftseigenen Futtermittel (Grün- und Saftfutter, Kartoffeln, Roggen, Hafer usw.) nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Die Haltung der Schweine ist naturgemäß mit Weidegang oder Auslauf in Tummelplätzen. Neben der Verwertung der Schweine in der eigenen Wirtschaft durch Hauschlachtungen spielt der Verkauf von Bratenfischweinen im Gewichte von 190 bis 220 Pfund nach den westdeutschen Städten Köln und Düsseldorf die Hauptrolle. Schwerere, fettreichere Schweine gehen in erster Linie nach Essen und Dortmund, wo die überwiegende Arbeiterbevölkerung fetteres Fleisch bevorzugt. Die beiden letzten Kapitel behandeln die öffentlichen und privaten Maßnahmen zur Förderung der Schweinezucht (Eberkörungen — Schweinezuchtgenossenschaften usw.) und die volkswirtschaftliche Bedeutung der oldenburgischen Schweinezucht.

W. Schäper, Hannover.

Die Geflügeltuberkulose. Von Privatdozent Dr. Fritz Schmidt, wissenschaftl. Hilfsarbeiter am Bakteriolog. Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen. Arbeiten der Landwirtschaftskammer für die Prov. Sachsen. Heft 49. Verlag der Landwirtschaftskammer für die Prov. Sachsen, Halle a. S., Kaiserstr. 7. Preis 1,50 RM.

Das Problem der Geflügeltuberkulose, der verheerendsten Seuche der Hühnerbestände, wird in der Arbeit eingehend gewürdigt unter Zugrundelegung von fast dreijährigen praktischen und wissenschaftlichen Untersuchungen. Die Arbeit wird mit einer umfangreichen und eingehenden Literaturbesprechung eingeleitet, sie enthält weiter genaue Angaben über die Verbreitung der Seuche in der Provinz Sachsen sowie die dortigen Bekämpfungsmaßnahmen, wobei auch die wirtschaftliche Lage entsprechende Berücksichtigung findet. Es ist dies die erste Zusammenstellung der bisherigen Kenntnisse der Geflügeltuberkulose von tierärztlicher Seite und dürfte die Arbeit infolge der aktuellen Frage der Geflügelkrankheiten reges Interesse in Kollegenkreisen erwecken.

Berge, Hannover.

Neuere Erfahrungen und Bestrebungen auf dem Gebiete der Geflügelzucht und -haltung. (Buchbesprechung.)

Berichtigung. In Nr. 20, S. 360, 7. Reihe von unten muß es heißen: die hinter jener der Leghorn kaum zurücksteht, gebracht.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Stadtobertierarzt Bärtling zum Stadtoberveterinärarzt, Dr. Peters und Dr. Grundmann zu Stadtveterinärärzten am städt. Schlachthof in Kassel; Dr. Ay zum Schlachthoftierarzt in Frankfurt a. O.; der wissensch. Assistent Dr. Freese an der Klinik für kleine Haustiere zum Oberassistenten; Tierarzt Dr. W. Mayr zum wissensch. Assistenten an der Klinik für kleine Haustiere; Tierarzt Dr. Schulze-Gahmen aus Dortmund-Kurl zum wissensch. Assistenten an der med.-forensischen Klinik der tierärztlichen Hochschule Hannover.

Verstorben: Kreistierarzt i. R. Karl Schlägel in Kottbus; Tierarzt Wilhelm Wolff aus Kaisersesch (Eifel); Veterinärarzt Alfred Nitzschke in Lüchow; Tierarzt Dr. Niedhorn in Burgwerben bei Weißenfels; Tierarzt Dr. Max Fritz aus Fronhausen.

chriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Eberlein & Co., Hannover

Veterinärhistorische Mitteilungen

Herausgegeben von der

Gesellschaft für Geschichte und Literatur der Veterinärmedizin

Schriftleiter:

Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

Zwanglos erscheinende Beilage zur „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“

Verlag von M. & H. Schaper in Hannover

Sonderbezugspreis 1,50 Goldmark das Jahr, freibleibend

Nr. 5.

1928.

8. Jahrgang.

Bücherbesprechungen.

Die Finnigkeit des Schweinefleisches in historischer Beleuchtung. Von G. A. Gach (Inaug.-Diss. Leipzig, vet.-med. Fak. 1925).

(Fortsetzung.)


Therapie. de Crescentiis a. a. O. empfiehlt Pfefferkörner und Erbsen beizufüttern, J. J. Becher, der kluge Hausvater, Straßburg 1685, Erbsen und Hanfkörner in den Trog zu legen, v. Hochberg a. a. O. Hanfsamen in Menschenharn gesotten, Erbsen, geschrotene Wicken; Schwefel, Lorbeer, Alaun ana; eine Handvoll Feueressenruß, Adlerlaß, Bäder. Nach Scherckfeld, a. a. O. S. 63, 120, 121 benutzten die schlesischen Bauern gegen Finnen eine Streu von Porsch = wildem Rosmarin (Ledum Silesiacum): Rusticae feminae herbam seu folia (Ebuli) porcis adversus scrofulas et grandinem substernunt . . . Rustici in stabulis substernunt iumentis et porcis adversus eorum scabiem et grandinem. Die Pflanze hieß Säugränzenkraut oder Granze.

(Zedler, Universallexikon, Krünitz, Ökonomisches Lexikon, Pritzlert-Jessen, Volksnamen der Pflanzen). In der Schrift Haushaltung in Vorwerken, ein landwirtschaftliches Lehrbuch usw. wird S. 87 als „Mittel, die Finnen zu vertreiben“, empfohlen: Nimm lindene Segesphne, menge dieselben den Schweinen unter das Futter acht oder vierzehn Tage, so vergehen sie. Erzlische nehmen für diesen Gebrechen auch Hanfkörner in das Fressen, so vergehen sie auch. Auch gibt man ihnen gefeilt Hirschhorn im Essen und Trinken, hilft für die Finnen und andere Krankheiten und ist ihnen gar nützlich. — Eine kleine anonyme Druckschrift ohne Titelblatt, mit der in Ostpreußen ein Pfuscher arbeitete, enthält ein Kapitel — S. 66 — „Wider die Finnen der Schweine“; Gib dem Schweine alle vier Wochen einmal Lorbeeren und weißen Senf zu fressen, das vertreibt die Finnen. Oder: Stoße Lorbeeren und menge sie mit Träbern, gib ihnen mit Kleie und Sauerkeim zu fressen, dadurch vergehen die finnenigen Blättern samt der inwendigen Krankheit. Oder: schütte bisweilen ein wenig Erbsen in den Trog, davon vergehen die Finnen. Oder: gib ihnen ein wenig Pfefferkörner zu fressen. Oder: Wider die Finnen der Schweine hilft, und wenn es auch erst acht Tage vor dem Schlachten geschieht, früh morgens eine Hand voll rohe Hirse geben.

Beurteilung finnenigen Schweinefleisches. Es wurde entweder vernichtet, oder auf der Freibank oder auf einer besonderen Finnbank veräußert, oder beim Verkauf wurde das Fleisch oder der Tisch oder der Verkäufer

Seitz führt es in die Praxis ein. 1911 Der Chirurg Kulenkampf tritt für das Chloräthyl ein. 5. Örtliche Betäubung. 1857. Hieronymus Roselle skarifiziert das Zahnfleisch und pinselt Koloquithenextrakt auf. 1892 Schleich macht seine Lokalanästhesie bekannt.

Der erste Versuch mit dem Chloroform in Deutschland wurde an einem starblinden Bären des Berliner Zoologischen Gartens von Prof. Schönlein gemacht. Prof. Jüngken operierte die Augen mit bestem Erfolg, aber der Bär wachte aus der Narkose nicht wieder auf. Der Bildhauer Wilhelm Wolff stellte den aufsehenerregenden Vorgang durch eine Plastik dar: In der Mitte



einer Tiergesellschaft sitzt der Bär mit Brille, er trägt die Züge Schönleins, unter den anderen Tieren ähnelt ein großer Affe dem Prof. Jüngken. König Friedrich Wilhelm amüsierte sich über die Arbeit so, daß er einen Preis aus schrieb für die beste poetische Erklärung der Gruppe. Paul Heyse, damals Student in Berlin, erhielt diesen Preis für folgende Verse:

Der Bär ist nun ein stiller Mann, / Das Chloroform ist schuld daran;

Ein ärztliches Collegium / Ging mit dem Vieh zu menschlich um.

Das Füchselein grinst, das Bärlain flennt, / Der Wolff setzt ihm dies Monument.

Reinhard Frochner (Groß Strehlitz).

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Rieck, Berlin-Cöpenick, Kirchstraße 4. Verlag von M. & H. Schaper Hannover. — Druck von Eberlein & Co., Hannover.

gekennzeichnet; weiter gab es Verkauf nur unter Deklaration, endlich jeweils erst nach Entfernung der Finnen. Oder dieses Fleisch wird an die Armen überwiesen oder besonderem Verkaufsmodus (nicht nach Gewicht) unterstellt.

Verrechnung. In Wessel bei Starkfinnigkeit, s. oben S. 15. In Osnabrück, siehe daselbst. — Es soll ein jeder fleischhacker fleisch feil haben, das zu vertun sei, daß es nit phing noch schelmig sei; und ob man des in seiner gewalt begriff, so soll man das selbig fleisch auswerfen in einen graben und soll in darzu nöten mit 72 Pf. Pannraiding zu Hernals v. 1520 in Niederösterreich. Weist. I. (1886) S. 794. Finniges Fleisch in einen Graben zu werfen ist ferner vorgeschrieben in dem Bannraiding zu Dornbach v. 1515, daselbst S. 825. — In St. Pölten wird finnisches Fleisch weggenommen und darf nicht verkauft werden: Auch meldet mein herren das abeg vier schawer schullen sein und den fleischhacker und schullen mager fleisch und phinnig fleisch nemen und nicht veil haben, Stadtbuch der Stadt St. Pölten 2. d. 15. Jahrh., Niederöstr. Weist. III. S. 285. — Item ist unser ernstlicher befehl und manung das hinfüran kein fleischhacker ainig phinniges oder anderes unsauber oder schedliches fleischwerk haumblich oder offentlich verkaufe, und da mit solchem ainer betreten wirdt, solle unser hauptmann oder pfleger denselben exemplarisch und wol empfindlich straffen. Gemärke zu Hollenburg v. 1563, daselbst III. S. 359. — In Lübeck war der Verkauf finnigen Fleisches grundsätzlich verboten. Rörig, Der Markt von Lübeck, Leipzig 1922, S. 58, Anm. 1. —

Freibankverkauf. In Ulm mußte alles arge Fleisch (modriges, Bullen-, Juden-, finnisches usw.) nach der Ordnung von 1490 auf der Freibank verkauft werden. Ulmer Metzgerordnung v. 1490, zweites Gesetzbuch, Bl. 92 b. Nürnberg, Ulms Fleischerwesen im Mittelalter, Ulm 1892, S. 14. Jäger, Ulms Verfassungs-, bürgerl. u. kommerzielles Leben im Mittelalter, Stuttgart 1831, S. 628. Nach einer Verordnung von 1414 war die Stelle für den Verkauf dieses minderwertigen Fleisches „innerhalb der stiege“, Nürnberg, daselbst S. 14. — In Miltenberg mußte der Tisch quer stehen oder außerhalb der Reihe und dazu noch quer: (7-) es ist also herkommen, daz kein metzler kein finnecht fleisch feile, sall han, er stehe danne über zwerch oder hin usen auch über zech, daz man das erkennen moege; wer das anders feile hette, der hette das fleisch verlore und 5 ß der stadt zu buß, auch so mogen die burgermeister oder die besetzer das fleisch in den spitel tragen oder hufarmen luden geben, Heingerichte der metzler zu Miltenberg v. 1379, Oberheinische Stadtrechte I. Heft 4, S. 368. phynig fleisch darf in Schlestadt nicht „unter der metzigen“, sondern „vor der metzige“ gehauen werden. Schlestädter Fleischerleid v. 1498 a. a. O. S. 561. Nach einer Verordnung v. 1503 darf dort der Verkauf nirgends anders statfinden, als „auf dem bande, da man phinnig fleisch verkaufen soll“. — In Würzburg mußte seit Ende des 14. Jahrh. phinneth oder rewdig fleisch „am Creutz beim Main“ verkauft werden. J. Morgenthau, Die Entwicklung des Metzgerhandwerks in Würzburg, 1925, S. 8. — Si (die zwei Fleischbeschauer) sond ouch als schwinffleisch geschouwen vnd sundren, das finning vnd süwin vnd heigelztin sunderbar feil haben, d. h. fleisch mit Finnen und Saufleisch für sich und fleisch von kast. Schweinen auch für sich. Stadtbuch von Baden v. 1384, Argovia, Jahrg. 1860, S. 59. — In Cronach war durch Verordnung von 1488 festgesetzt, daß die fleischer finnisches Schweinefleisch einen schritt von ihrer Bank entfernt auflegen mußten. C. u. H. Stöhr, Neue Chronik der Stadt Cronach, Cronach

1825, S. 153. — An einem besonderen fleck in der stadt, nämlich „bi Berschins huse“ mußte Saufleisch und finnisches fleisch feilgehalten werden in Disshofen nach dem Stadtrecht von 1460. Zeitschr. f. noch ungedruckte Schweizerische Rechtsquellen herausg. v. Schauberg, II. (1847) S. 23. — In Frauenfeld wurde finnisches fleisch „bi dem badhe“ verkauft, von den fleischbänken soweit entfernt, „als verre das man zwischen hin gan mug“. Älteste Stadtorordnung v. Frauenfeld v. 1331, daselbst S. 117. — ez schol ouch dhein fleischawer nicht phynnichs fleyschez vnder den pendchen verdrauffen wan bi irem slat hawse, swer ez dar vber iement geit der sein enweiz der muz Voder wandel dwlden. Die ältesten Statuten der Stadt Regensburg v. 1320. v. Freyberg a. a. O. S. 9. — was von moeken, tragenden swinen und finnem fleisch gesoden wurde, da sol man das gerybe, das fynnecht fleisch und wurse ufwendig der schtiren bei dem spirale feile han. Metzgerordnung f. Frankfurt a. M., 2. a. O. S. 355. Reinhard Froehner.

(Schluß folgt.)

Ebstein, Erich, Leipzig: Geschichte der Narkose. Zeitschrift für ärztliche Forschung 1927, 24. Jahrgang, S. 373 ff.
1. Stickoxydul. 1776 von Priestley entdeckt. 1800 Humphrey Davy empfiehlt es als Narkotikum bei Operationen. 1828 Der englische Arzt Hickman annimmt König Karl X. von Frankreich, durch Chirurgen an Menschen Versuche zur Betäubung bei Operationen mit Gasgemischen, insbesondere mit Lachgas, anstellen zu dürfen. Nur Larrey trat — ohne Erfolg — für Hickman ein. 1844 Der Zahnarzt Horace Wells wandte die Lachgasnarkose bei zwölf Kranken an, nachdem er an sich das Gas hatte versuchen lassen. 1845 führt Wells sein Verfahren Bostoner Ärzten vor, ohne Anklang zu finden. 1847 veröffentlicht er: „A history of discovery of the application of nitrous oxid gas, ether and vapors to surgical operations.“ 1878 führt Bertlang andauernde Narkosen damit aus. 2. Äther. 1540 beidreibt Valerius Cordus unter dem Namen Oleum Vitrioli dulce den Äther, den 1730 der deutsche Chemiker Frobenius Spiritus aethereus nennt. Der Hallische Kliniker Friedrich Hoffman verwendete ihn unter der Bezeichnung Liquor anodynus mineralis, später nach ihm Hoffmanns Tropfen (Liquor anodynus Hoffmann) genannt. Bei Schiller kommt noch der alte Name Naphtha dafür vor. 1821 wird der Äther von Avogadro richtig analysiert. 1846 erkennt Laurent die Natur des Äthers. 1846 erste Veröffentlichung über Äthernarkose durch Bigelow. 1846 erste Anwendung in England (R. Liston), 1847 in Frankreich (Malgaigne) und in Wien (Schuh). 1846 Joh. Friedrich Dieffenbach: „Der Äther gegen den Schmerz.“ 1901 führt Sudeck den Äthernarkose ein und 1902 Witzel die Äthernarkose. 3. Chloroform. 1831 v. Liebig stellt Chloroform her aus Alkohol und Chlor. Ebenso gleichzeitig Soubeiran. 1847 berichtet Florens über die anästhetisierende Wirkung bei Tieren. 1847 verwendet James Young Simpson die Chloroformnarkose zuerst in der Geburtshilfe. 4. Chloräthyl. 1500 von Paracelsus als Salzäther erwähnt. 1759. Cottenvaux stellt es zuerst rein dar. 1831 v. Lens und Méral erkennen es als Betäubungsmittel. 1847 Versuche von Florens an Tieren. 1848 Heyfelder führt in Deutschland damit erfolgreiche Operationen aus. 1896 Lotheisen wendet es für die Allgemeinnarkose an. 1898 Zahnarzt

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edlmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 22.

Ausgegeben am 2. Juni 1928.

36. Jahrgang.

(Aus dem Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen, Halle a. S. — Direktor: Prof. Dr. Dr. Raebiger.)

Rindertuberkulosebekämpfung in der Provinz Sachsen in den Jahren 1926/27.

Von Dr. H. Rautmann, Vorsteher der Tuberkulose-Abteilung.

Das staatlich anerkannte Tuberkulosefötilgungsverfahren zeigte in der Berichtszeit eine stete Ausbreitung, so daß es gelang, die Tuberkulose-Bekämpfung auf eine breitere Basis zu stellen. Die Entwicklung wird durch die nachfolgende Übersicht gekennzeichnet.

Es sind untersucht worden:

im Jahre 1919	3 399 Rinder,
im Jahre 1920	25 398 Rinder,
im Jahre 1921	48 500 Rinder,
im Jahre 1922	55 790 Rinder,
im Jahre 1923	70 237 Rinder,
im Jahre 1924	66 648 Rinder,
im Jahre 1925	101 312 Rinder,
im Jahre 1926	110 427 Rinder,
im Jahre 1927	160 578 Rinder.

Da in den dem Tuberkulosefötilgungsverfahren unterstellten Beständen nur die über ein Jahr alten Rinder der Untersuchung unterzogen wurden, die Bekämpfungsmaßnahmen sich aber auf alle Tiere erstrecken, so wird mithin schon heute ein hoher Prozentsatz, nämlich annähernd 40 Prozent, aller überhaupt in der Provinz Sachsen vorhandenen Rinder der planmäßigen Tilgung unterzogen.

Die in den letzten Jahren untersuchten 160 578 (110 427)* verteilen sich auf 21 257 (14 012) Bestände. Da im Jahr 1925 11 584 Bestände mit 101 312 Rindern im Verfahren untersucht wurden, so hat sich daselbe seit der Zeit bis heute um 83,5 Prozent der Bestände und 58,6 Prozent der untersuchten Tiere vermehrt. Damit ist aber der Höhepunkt seiner Ausbreitung immer noch nicht erreicht, da in der letzten Zeit fortgesetzt Neuanschlüsse stattfinden.

Berücksichtigt man, daß die Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen freiwillig erfolgt, so darf man wohl behaupten, daß die Landwirtschaft durch das Verfahren wenigstens in der Provinz Sachsen in hohem Maße befriedigt wird.

Das Bedürfnis nach einer planmäßigen Tilgung der Seuche hat sich neuerdings besonders auch in den Milchkontrollvereinen und Molkereigenossenschaften gezeigt. Von letz-

teren sind im Verfahren im Jahr 1927 86 mit einem Bestand von 61 091 untersuchungspflichtigen Tieren bereits angegeschlossen. Die seit dem 1. Juli vorigen Jahres in Kraft befindliche Milchpolizeiverordnung hat die Anregung gegeben, daß Milchwirte und Molkereien in besonders hohem Maße der Tuberkulose ihr Interesse zuwenden.

Zur Erledigung der klinischen Untersuchungen arbeiten in engster Föhlungnahme mit dem Bakteriologischen Institut z. Zt. 358 Tierärzte der Provinz sowie vier im Außendienst der Tuberkulose-Abteilung tätige Sachverständige.

In den Jahren 1927 (1926) sind insgesamt von den 160 578 (110 427) untersuchten Rindern 3259 (gegen 3802 im Vorjahr) mit Lungentuberkulose, 186 (gegen 144 im Vorjahr) mit Eutertuberkulose, 28 (gegen 49 im Vorjahr) mit Gebärmuttertuberkulose,

4 (gegen 4 im Vorjahr) mit Darmtuberkulose, also in Summa 3477 (3999) Fälle mit einer offenen Tuberkuloseform festgestellt worden. Der Prozentsatz ist mithin von 3,6 auf 2,1 gefallen, und zwar trotz der vorgenannten Vermehrung durch neu aufgenommene stärker verfeuchte Bestände.

Außerhalb des Tuberkulosefötilgungsverfahrens wurden insgesamt 113 (gegen 107 im Vorjahr) Rinder mit einer offenen Tuberkulose festgestellt, und zwar

91 (gegen 95 im Vorjahr) mit Lungentuberkulose,
21 (gegen 10 im Vorjahr) mit Eutertuberkulose,
1 (gegen 2 im Vorjahr) mit Gebärmuttertuberkulose.

Der Erfolg einer planmäßigen Prüfung der Bestände ist somit wiederum erwiesen.

Zur Ermittlung der Ansteckungsquelle wurden im Tuberkulose-Laboratorium untersucht:

13 633 (gegen 11 392 im Vorjahr)
Lungenschleimproben, davon 13 285 (11 134) aus angechl. Beständen,
1357 (gegen 1273 im Vorjahr)
Einzelmilchproben, davon 1236 (1183) aus angeschlossenen Beständen,
172 (gegen 210 im Vorjahr)
Gebärmutter schleimproben, davon 168 (198) aus angechl. Beständen,

*) Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 1926.

66 (gegen 36 im Vorjahr)
Kotproben, davon 62 (gegen 34 im Vorjahr) aus angechl.
Beständen,
insgesamt sind mithin geprüft 15 228 (gegen 12 911 im
Vorjahr),
Proben, davon 14 751 (12 549) aus angechlossenen Be-
ständen.

Um die Fälle der festgestellten Tuberkulosen von den-
jenigen der hohen Wahrscheinlichkeit und denen des ein-
fachen Verdachtes sowie denen zu unterscheiden, bei welchen
die klinischen Verdachtsmerkmale nur unvollkommen
waren, sind sie in der nachfolgenden Tabelle kenntlich ge-
macht worden.

Regierungs- Bezirk	Sputum - Proben			
	positiv	negativ		
		bei hoher Wahrschein- lichkeit	bei einfachem Verdacht	bei klinisch unvollständi- gem Verdacht
		der Lungentuberkulose		
Magdeburg	1582 (1727)	233 (193)	1068 (527)	2023 (1578)
Merseburg	1356 (1780)	267 (220)	926 (626)	1995 (1589)
Erfurt	321 (295)	77 (46)	229 (159)	422 (300)
also in der Provinz Sachsen	3259 (3802)	577 (459)	2223 (1312)	4440 (3467)

Summa = 10 499 (9040).

Durch diese Gegenüberstellung wird bewiesen, daß die
negativen Prüfungen sehr schnell mit den leichteren Ver-
dachtsgraden zunehmen.

Gesamtmilchprüfungen sind im Jahre 1926 in 617 und
im Jahre 1927 in 1012 Fällen ausgeführt. Während im
ersten Jahr 19 tuberkelbazillenhaltige Proben ermittelt wer-
den konnten, stieg die Zahl im letzten Jahre auf 35; das
sind 3,4 Prozent aller Prüfungen.

Um eine objektive Beurteilung des Wertes der Misch-
milchprüfungen für die Ermittlung von eutertuberkulösen
Tieren zu gewinnen, muß hervorgehoben werden, daß im
Jahre 1927 nur viermal = 0,39 Prozent eine Kuh mit Euter-
tuberkulose, also die Ansteckungsquelle, ermittelt werden
konnte.

In allen übrigen Beständen führte die klinische Nachunter-
suchung und die gleichzeitige bakteriologische Prüfung der
Milch von Einzeltieren bzw. des Restbestandes zu einem
bakteriologisch negativen Ergebnis.

Ist das Beobachtungsmaterial auch nicht sehr groß, so läßt
sich doch mit Sicherheit sagen, daß die Mischmilch-
untersuchungen auch bei einem für Tu-
berkelbazillen positiven Ergebnis nur in
Ausnahmefällen zur Ermittlung von
Eutertuberkulose führen. Eine Erklärung für
diese Tatsache ist darin zu erblicken, daß

1. in vielen Fällen der Tuberkelbazillengehalt der Misch-
milch auf eine indirekte Verunreinigung der Milch mit
diesen Erregern durch den Kot, Ausfluß aus den Ge-
schlechtsorganen usw. zurückzuführen ist,
2. häufig die eutertuberkulöse Kuh vor ihrer Ermittlung
schon ausgemerzt war, weil bei der Verunreinigung
von Mischmilch aus durchschnittlich kleinen Beständen
das Feststellungsverfahren sehr schwierig ist und unver-
hältnismäßig längere Zeit in Anspruch nimmt als in
Einzelbeständen mit größerer Tierzahl,
3. in der Provinz Sachsen das klinische Untersuchungs-

verfahren besonders gepflegt wird, da der Prozentsatz
der festgestellten Eutertuberkulose nicht hinter
dem anderer Provinzen zurücksteht,
obwohl der Anteil der durch positive Mischmilch-
prüfung ermittelten Fälle nur ein ganz geringer,
nämlich 2,1 Prozent ist. Demgegenüber ist bekannt,
daß in anderen Provinzen dieser Anteil mit 50 Pro-
zent und mehr so hoch ist, daß die Eutertuberkulose
in der Hälfte der Fälle erst durch die Hilfe der Misch-
milchprüfung erfaßt wird,

4. die Eutertuberkulose, von Ausnahmefällen abgesehen,
stets sekundär auftritt und bei Feststellung der offenen
Tuberkulosen durch Ausmerzungen der Tiere mit
Lungentuberkulose, seltener mit Gebärmuttertuber-
kulose, gleichzeitig beseitigt wird.

Wenn für Preußen auf 100 offene Tuberkulosen ein
Durchschnittssatz von 3,2 Eutertuberkulose errechnet wurde,
so ist in der Provinz Sachsen diese Zahl ohne eine regel-
mäßige Gesamtmischmilchprüfung nicht nur erreicht, son-
dern im Berichtsjahr mit einem Satz von 5,34 sogar um 2,14
überschritten.

Trotzdem soll im kommenden Jahr die Mischmilch-
prüfung weiter gefördert werden, und es geht das Bestreben
dahin, aus möglichst allen Beständen wenigstens einmal, und
zwar im Anschluß an die klinische Untersuchung, eine Probe
zu untersuchen.

Eine Beurteilung des Bekämpfungsver-
fahrens nach den Richtlinien des Ministerial-Erlasses vom
31. Dezember 1923, IA III Nr. 14114 hat sich dadurch als
unmöglich erwiesen, daß die Ausmerzungen der tuberkulösen
Tiere zu einem hohen Prozentsatz im beschleunigten Ver-
fahren erfolgte und über diese Rinder seitens der beamteten
Tierärzte der leitenden Stelle nicht oder doch sehr unvoll-
kommen berichtet wurde.

Es mußten daher die Unterlagen benutzt werden, die auf
Antrag durch den Herrn Landeshauptmann bereitwilligst zur
Verfügung gestellt wurden.

Hiernach sind im Jahre 1927 (im Gegensatz zum Vor-
jahr) 4988 (4982) Rinder im Tuberkulosestillungsverfahren
verwertet worden, und zwar allein 1449 Tiere im beschleu-
nigten Verfahren.

Eine Tuberkulose im Sinne des Seuchengesetzes ist bei
4622 Rindern einschließlich der 1185 beschleunigt ausge-
merzten Tiere bestätigt worden. Es sind daher 366 Fälle von
Fehldiagnosen zu verzeichnen. Diese verteilen sich auf 102
Fälle = 2,88 Prozent im normalen Gang des Verfahrens und
264 Fälle = 18,22 Prozent im beschleunigten Verfahren.
Bei einer Sicherung der Diagnose durch den bakterio-
logischen Befund bleibt daher die Zahl der nicht bestätigten
Tuberkulosen in mäßigen Grenzen. Ganz zu vermeiden
sind solche Fehldiagnosen wohl nicht, da der Tuberkel-
bazillen-Nachweis auch zuweilen gelingt, wenn die Träger
des Erregers noch keine makroskopisch erkennbaren tuber-
kulösen Prozesse zeigen. Da solche Tiere aber fast nur in
Stallungen ermittelt wurden, in denen andere Rinder mit
offenen Tuberkulosen festgestellt waren, so spricht der posi-
tive Tuberkelbazillenbefund dafür, daß zuweilen schon die
frühesten Infektionsstadien erfaßt werden. Ob das immer
als ein Fehler zu bewerten ist, muß bezweifelt werden.

Von den 4622 nach der Schlachtung tuberkulös befundenen
Tieren sind:

195 der Abdeckerei } überwiesen und
307 der Freibank }
4120 abgesehen von der Befehlagnahme der tuberkulösen
Organe unbeanstandet geblieben.

Demgegenüber sind im Jahre 1926 4982 Rinder tuber-
kulös befunden und von diesen:

251 der Abdeckerei } überwiesen und
310 der Freibank }
4421 abgesehen von der Befehlagnahme der tuberkulösen
Organe unbeanstandet geblieben.

Trotz der Aufnahme der 7247 neuen, stärker verfeuchten Bestände und der damit verbundenen Ausbreitung des Verfahrens um 31 Prozent der untersuchten Tiere ist ein Rückgang der ermittelten Tuberkulose von 4,51 Prozent auf 2,87 Prozent durch die Schlachtung festzustellen.

Die Tötung der nicht tuberkulös befundenen Tiere war häufig im volkswirtschaftlichen Interesse angezeigt, da der Prozentsatz bei den der Freibank zugeführten wie den der Abdeckerei überwiesenen Rindern höher war, als bei den tuberkulösen Tieren und 7,6 Prozent bzw. 10,4 Prozent gegen 6,6 Prozent bzw. 4,1 Prozent betrug.

Der Provinzialverband hat im Jahre 1926 je Tier Mk. 228,90, im Jahre 1927 je Tier Mk. 202,93 mehr bezahlt als der Erlös ausmachte, und zwar betrug die Zubeße:

- a) bei den unbeanstandeten Tieren durchschn. Mk. 197,19,
- b) bei den der Freibank zugeführten . . . Mk. 260,86,
- c) bei den der Abdeckerei zugeführten . . . Mk. 233,27.

Daraus ist zu ersehen, daß die Tiere der Gruppe

- a) mit 5,74 Mk. unterschätzt,
- b) mit 57,93 Mk. überschätzt,
- c) mit 30,27 Mk. überschätzt

sind, das Taxverfahren mithin im allgemeinen durchaus befriedigte.

Das Tuberkulosefälgungsverfahren hat in der Berichtszeit aber nicht nur eine größere Verbreitung, sondern gleichzeitig eine Vertiefung erfahren, und zwar soweit die Ermittlung der Krankheit und die tuberkulosefreie Aufzucht in Betracht kommt.

In erster Linie hängt der Erfolg des Verfahrens von der rechtzeitigen Tuberkulosefeststellung ab, die eine Aufgabe des tierärztlichen Sachverständigen bleibt. Aber auch bei fortgesetzter Verbesserung der Untersuchungsmethoden und ihrer gewissenhaften Anwendung wird es den tierärztlichen Sachverständigen, Vertrauentierärzten und Veterinärärzten und den wissenschaftlichen Beamten der leitenden Stelle nicht möglich sein, das erwünschte Ziel zu erreichen, wenn der Tierbesitzer nicht mit Verständnis mitarbeitet.

Die von den Sachverständigen so oft beklagte Ungültigkeit dem Leiden gegenüber schwindet in dem Maße, in dem der Laie in das Wesen der Krankheit eindringt und begreifen lernt, daß man der Tuberkulose nicht machtlos gegenübersteht. Die Unkenntnis des Tierbesitzers wird wesentlich dadurch begünstigt, daß die Tuberkulose im Anfangsstadium keine charakteristischen Symptome zeigt. Wären solche vorhanden, so wäre sicher die Anregung zum Eingreifen in weit höherem Grade gegeben. Das Gleiche wäre der Fall, wenn die Tuberkulose nach kurzem Krankheitsverlauf zum Tode führte. Da aber Ansteckung und sichtbare Erkrankung weit auseinander liegen, so verkennt der Laie die Ursache des Leidens und hat kein Verständnis für den richtigen Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Tierarztes. Befindet sich die Tuberkulose aber im letzten unverkennbaren Stadium, der Schwindfucht, so kommen die Verhütungsmaßnahmen meist zu spät, weil die gefundenen Stallinfassen inzwischen Gelegenheit zur Massenaufnahme der Tuberkelbazillen gefunden haben.

Es ist daher der Standpunkt zu vertreten, daß nicht die ärztliche Unvollkommenheit die Erfolge des Verfahrens in so hohem Maße verhindert, als das fehlende bzw. falsche Urteil des Landwirtes. Daher ist in der Provinz Sachsen zur Aufklärung desselben insofern ein ganz neuer Weg beschritten worden, als durch unentgeltliche Verteilung eines „reich illustrierten“ Merkblattes an alle Besitzer der dem Verfahren angehörenden Bestände eine Belehrung zu erreichen versucht wurde. Es ist zu hoffen, daß die Verbindung des Bildes mit dem erläuternden Text das Verständnis des Laien über das Wesen und die Bekämpfung der Rindertuberkulose heben wird.

Erst dann wird eine gewissenhafte Durchführung der Verhütungsmaßnahmen möglich sein und erwartet werden

können, daß hierzu die Besitzer nicht nur vorübergehend, sondern in verfeuchten Beständen sogar jahrelang die nötige Energie aufbringen werden.

Eine fehlende Mitarbeit des Landwirtes kann auch nicht durch die von verschiedenen Seiten empfohlene, mehrmals jährlich auszuführende Gesamt-Untersuchung ersetzt werden, da durch die praktischen Erfahrungen reichlich erwiesen ist, daß eine akut, ja sogar perakut verlaufende Tuberkulose nicht zu den Seltenheiten gehört, so daß wenige Wochen nach einer negativen klinischen Untersuchung die Rinder dem Leiden erliegen können.

Größere Schäden lassen sich in solchen Fällen nur dann abwenden, wenn der Besitzer den Gesundheitszustand seiner Tiere fortgesetzt kontrolliert und schon die ersten Verdachtserscheinungen meldet und aufklären läßt.

Die Schwierigkeiten der Diagnose werden oft unterschätzt und an den Sachverständigen Anforderungen gestellt, die nicht berechtigt sind. So fordert man vom Tierarzt, daß er sich nach kurzer Untersuchung über die Natur des Leidens klar ist, während es dem Humanmediziner nicht verübelt wird, wenn er erst nach wochen- und monatelanger Beobachtung und vielen Untersuchungen des Patienten zu einem abschließenden Urteil kommt.

Eine zwei- oder mehrmalige Untersuchung des Gesamtbestandes kann daher nur einen unvollkommenen Ausgleich schaffen zumal in Beständen, in denen ein größerer, regelmäßiger Viehwechsel eintritt, wohl aber der durch Aufklärung geschärfte Blick des ständig fein Rindvieh beobachtenden Landwirtes.

Wenn von verschiedenen Seiten die Erfolge des Tuberkulosefälgungsverfahrens im Vergleich zu denjenigen bei anderen Seuchen nicht nur angezweifelt, sondern sogar bestritten wurden, so muß darauf hingewiesen werden, daß beispielsweise die Lungenfeuche und die Maul- und Klauenfeuche Infektionskrankheiten sind, die stets nur in größeren oder kleineren Seuchengängen und auch dann nur mit örtlicher Bedeutung aufzutreten pflegen, daß dagegen die Tuberkulose in starker Ausbreitung ständig, und zwar schon Jahrtausende herrscht, und an der Bekämpfung des Leidens viele Generationen und namhafteste Forscher ohne durchschlagenden Erfolg gearbeitet haben.

Man darf daher die Erwartungen bei der Tuberkulosebekämpfung durch das freiwillige Verfahren nach Ostertags Richtlinien nicht zu hoch spannen und nichts Unbilliges verlangen. Ein Versagen läßt sich erst beweisen, wenn bei einer allgemeinen Durchführung des Verfahrens die Seuchenziffer nicht zurückgehen sollte.

Auch ist es nicht zulässig, den Mißerfolg damit beweisen zu wollen, daß bei den getöteten Tieren immer wieder solche zu finden sind, welche schon lange Zeit bestehende tuberkulöse Veränderungen nach der Schlachtung zeigen.

Bis zu einem gewissen Grade vermag die von einigen Seiten vorgeschlagene vierteljährliche Prüfung zur Ausfindigmachung solcher Tiere beizutragen. Auf Grund der in der Provinz Sachsen gemachten Erfahrungen müssen wir aber bezweifeln, daß mit der häufiger wiederholten Prüfung die Krankheitsformen schwinden, die zu einer Beanstandung des Fleisches, sei es durch Überweisung auf die Freibank oder Abdeckerei Veranlassung geben.

Aus vorstehenden Angaben über die Verwertung der getöteten Rinder ist zunächst ersichtlich, daß der Prozentsatz der schwerkranken Tiere nur ein relativ kleiner ist, und daß er in erster Linie dadurch bedingt wurde, daß die fraglichen Tiere in überwiegender Mehrzahl aus neu dem Verfahren unterstellten Beständen stammten. So läßt sich ohne Schwierigkeit der Nachweis erbringen, daß in sehr vielen Fällen überhaupt erst das Auftreten einer Tuberkulose den Anreiz zur Einführung des Tuberkulosefälgungsverfahrens gegeben hat. Da nach dem Ausführungserlaß vom 28. März 1912 (IA IIIe 3397) die Tötungsbefugnis auch dann für zu-

läßig erklärt wird, wenn der Beitritt erst nach Feststellung der Tuberkulose in dem Bestand erfolgt ist, werden die Fälle von schwerer Tuberkulose, die unter Umständen zur Beanstandung des Fleisches führen, erst dann in Fortfall kommen, wenn keine neuen Bestände mehr aufgenommen zu werden brauchen.

Da der Tuberkuloseverlauf weiterhin durch verschiedene äußere Ursachen ungünstig beeinflusst werden kann, ist damit zu rechnen, daß das Leiden in viel höherem Grade als bisher angenommen wurde einen akuten Charakter annimmt. Ob in diesem Falle eine viermalige Gesamt-Untersuchung ausreichen wird, ist zum mindesten zu bezweifeln.

Voraussetzung für den Erfolg bleibt in jedem Falle die Forderung, daß im Gegensatz zu den jetzigen Feststellungen die beamteten Tierärzte mit größerer Beschleunigung die verdächtig ermittelten Tiere ausmerzen. Daß das zu einem hohen Prozentsatz nicht der Fall ist, ist ohne weiteres aus der Statistik zu entnehmen, da von den 10 499 in der Provinz Sachsen im letzten Jahre tuberkuloseverdächtig erklärten Tieren nur 4988, also nicht einmal die Hälfte, getötet worden sind. Da in allen Verdachtsfällen der beamtete Tierarzt die letzte Entscheidung hat, ob eine Tuberkulose im Sinne des Seuchengesetzes als vorliegend anzusehen ist oder nicht, ist es sehr wohl möglich, daß unter Umständen die Tuberkulose den vorerwähnten hohen Grad erlangen konnte, weil die veterinärpolizeiliche Abnahme verzögert wurde.

Die gleiche Verzögerung muß natürlich eintreten, wenn die als Vertrauens-tierarzt tätigen Sachverständigen mit der Einlieferung von evtl. erforderlich werdendem Kontrollmaterial in Verzug geraten. Beide Ursachen lassen sich nach unseren Erfahrungen schon bei der einmaligen Durchführung einer Gesamt-Untersuchung im Jahre nachweisen, da im Jahre 1926 insgesamt 1602 und im Jahre 1927 3765 Zuschriften an unsere 340 bzw. 358 Vertrauens-tierärzte und in der gleichen Zeit 2446 bzw. 2691 Erinnerungsschreiben an die 43 in der Provinz tätigen beamteten Tierärzte erforderlich waren, um die eingeleiteten Arbeiten zu Ende zu führen.

Aus diesem Tatbestand ist zu folgern, daß bei einer allgemein angeordneten mehrmaligen Untersuchung aller Bestände die restlose Erledigung der Arbeiten auf erheblich größere Schwierigkeiten stoßen müßte, vielleicht überhaupt nicht auszuführen wäre.

Die Verluste durch schwere Tuberkulose lassen sich jedenfalls viel eher vermeiden, und zwar ohne daß die Kosten untragbar würden, wie das sicher bei einer generell durchgeführten viermaligen Gesamt-Untersuchung der Fall wäre, wenn eine planmäßige Nachuntersuchung der Bestände auf die Fälle beschränkt bleibt, in denen

- a) eine stärkere Verfeuchung des Bestandes nachgewiesen wurde, oder
- b) Rinder ausgemerzt waren, die auffallend schwere Formen der offenen Tuberkulose auf Grund des Schlachtbefundes erkennen ließen.

Eine Nachuntersuchung ist in letzterem Falle, zumal wenn Geschwürsbildung im Kehlkopf, in der Luftröhre, oder wenn ein flächenhafter Zerfall der Darm- bzw. der Gebärmutterflehnhaut bestanden hatte, schließlich falls umfangreiche tuberkulöse Veränderungen im Euter vorhanden waren, angezeigt, weil unter diesen Voraussetzungen mit einer starken Ausbreitung der Tuberkelbazillen und Infektion gesunder Stallinsassen zu rechnen ist.

Im Jahre 1927 wurde in diesen Fällen statt des jährlichen Untersuchungsturnus ein halbjährlicher zur Durchführung gebracht, auch wurde anhand eines zu diesem Zwecke besonders hergestellten Fragebogens, der Interessenten jederzeit zur Verfügung steht, versucht, die Ursachen der stärkeren Tuberkuloseverfeuchung zu ermitteln.

Das Schema berücksichtigt zunächst die Anamnese; die Fragen erstrecken sich:

1. auf Zukauf von Rindern ohne vorherige tierärztliche Untersuchung,
2. auf das Vorhandensein einer größeren Disposition für die Tuberkulose infolge Schwächung des Körpers durch Krankheiten bzw. durch einseitige und ungenügende Ernährung,
3. auf die bisher getroffenen Maßnahmen zur Verhütung der Tuberkuloseinfektion der Kälber.

Des weiteren sind die Beschaffenheit des Stalles und die hygienischen Verhältnisse einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Auf Grund der gemachten Ermittlungen konnte festgestellt werden, daß immer wieder ganz bestimmte Ursachen vorhanden waren, die ein Aufflackern einer Tuberkulose-Verbreitung begünstigten. Als solche kamen in erster Linie in Betracht:

1. Einseitige bzw. ungünstige Ernährung infolge schlechter Futterjahre, Überschwemmung usw., auch Fütterung mit Nährstoffgemischen ungünstiger Zusammensetzung, Fehlen von Salzen.

In letzterem Falle wurden die Besitzer auf die Unzulänglichkeit dieser Futtergemische aufmerksam gemacht.

2. Auftreten von Krankheiten, die eine Schwächung der Körper-Konstitution hervorriefen, wie Maul- und Klauenfeuche, Leberegelseuche, Rachitis.

Es wurde auf die Notwendigkeit einer Bekämpfung dieser Krankheiten hingewiesen und gleichzeitig wurden Ratsschläge zur Abstellung gegeben.

3. Zukauf von Rindern, die sich nach einiger Zeit als tuberkulös erwiesen, und zur Neuansteckung anderer Tiere des Bestandes Veranlassung gegeben hatten.

Diese Fälle sind verhältnismäßig häufig beobachtet worden und gaben Veranlassung, die Käufer auf die Notwendigkeit einer Erweiterung der Mängelgewähr hinzuweisen. Es ist empfohlen worden, bei Tieren, die zu reellem Preis erworben werden, zu verlangen, daß der Verkäufer eine Gewähr für alle erheblichen Fehler übernimmt. Außerdem ist nachdrücklich auf die in den Grundsätzen für das Verfahren aufgestellte Forderung aufmerksam gemacht, wonach neugekaufte Tiere vor der Einstellung auf Tuberkulose zu untersuchen und tuberkuloseverdächtige sofort zurückzuweisen sind.

4. Das im Interesse der Leistungsfütterung durchgeführte Umstellen der Milchkühe.

Dieses trug häufig zur stärkeren Ausbreitung der Tuberkulose in einem Bestande bei, da durch ein tuberkulöses Tier immer wieder Rinder der neuen Umgebung infiziert wurden. Die Züchter wurden auf diese Gefahren aufmerksam gemacht.

5. Mangelhafte Absonderung des Jungviehs.

Wenn auch zugegeben werden muß, daß durch Raumnot eine ideale Isolierung nicht immer möglich ist, so läßt sich mit verhältnismäßig einfachen Maßnahmen die Ansteckung leicht auf ein Mindestmaß beschränken. Dieses wird erreicht durch Abschlüsse vom Großviehstall mit Trennwänden, welche eine Tröpfcheninfektion ausschließen und trotzdem in ausreichender Weise Licht und Luft Zutritt gewähren.

Außerdem wurde stets auf die Grundsätze des Tuberkulosestillungsverfahrens hingewiesen und diese durch kostenlose Überreichung des vorerwähnten Merkblattes verständlich gemacht. Andererseits wurde hervorgehoben, daß bei Außerachtlassung der Vorschriften ein Ausschluß aus dem Verfahren erfolgen müsse.

6. Die bei bestehender Eutertuberkulose eingetretene Fütterungsinfektion durch Verabreichung von Rohmilch.

Diese gab wiederholt die Veranlassung zu erneutem Aufflackern der Tuberkulose in bisher gering verfeuchten Be-

ständen. Auch hier wurde auf die strenge Durchführung der Grundätze hingewirkt.

7. Mangelhafte Stallhygiene.

Diese mußte sehr häufig beanstandet werden, weil die Aufstellung in vielen Fällen an schmalen Futtertischen geschieht, die Tiere mithin mit dem Kopf einander gegenüberstehen und sich durch Anhusten zu infizieren vermögen. Durchgehende Tränken spülen das mit Tuberkelbazillen infizierte Trinkwasser von Tier zu Tier. Ungenügende Beleuchtung und dumpfige Stallungen verhindern die Abtötung evtl. ausgeschiedener Tuberkelbazillen durch das Sonnenlicht. Hinzu kommt oft eine ungenügende Ventilation. Wiederholt wurde erreicht, daß Umbauten im Interesse der Sanierung der Bestände vorgenommen wurden.

Außerdem wurde verschiedentlich als Ursache für die starke Verfeuchung eine bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht planmäßig durchgeführte Tuberkulose-Bekämpfung ermittelt. Hier kommen mithin diejenigen Bestände in Betracht, die erst im Jahre 1927 erstmalig untersucht sind.

Ein Erfolg unserer in vorstehendem Sinne gekennzeichneten Bemühungen ist nicht ausgeblieben, da wir in mehreren Fällen schon nach zweimaliger Untersuchung ein Zurückgehen des Tuberkuloseprozentsatzes feststellen konnten und auch beobachteten, daß die Besitzer der Seuchentilgung ein weit höheres Verständnis entgegenbrachten.

War die Prüfung durch einen Vertrauens-tierarzt ausgeführt, so gab die Zustellung des Fragebogens für diesen beachtenswerte Winke, die er im Interesse der Tuberkulose-Ermittlung bei der nächsten Untersuchung berücksichtigte.

Endlich ist noch zu erwähnen, daß in vielen Fällen im Anschluß an ermittelte Tuberkulosen bei geschlachteten Kälbern und Schweinen mit Erfolg Nachprüfungen in den Ursprungsbeständen durchgeführt und hierdurch die Infektionsquellen, nämlich euter- und gebärmuttertuberkulöse Kühe, aufgedeckt wurden.

Daß andererseits der Tierarzt besonders für die Ermittlung der Tuberkulose geschult sein und alle nur irgend möglichen Hilfsmittel zur Anwendung bringen muß, ist eine unerläßliche Forderung.

Um die Tätigkeit des Sachverständigen zu erleichtern, waren wir auch in der Berichtszeit fortgesetzt um die Verbesserung des diagnostischen Verfahrens bemüht.

So haben wir in vielen Fällen die Untersuchung der Bestände gemeinsam durch den Vertrauens-tierarzt und einem Fach-tierarzt der leitenden Stelle ausführen lassen und sämtlichen Sachverständigen im Oktober 1927 ein Rundschreiben mit 5 Anlagen zugehen lassen, in dem nicht nur die inzwischen in Kraft getretenen Bestimmungen des Landwirtschaftsministeriums aufgeführt, sondern auch wichtige Hinweise über den Untersuchungsgang, die Kennzeichen aller offenen Tuberkuloseformen, die Probeentnahme, die Anordnung von Schutzmaßnahmen und die Berichterstattung gegeben wurden.

Da sich insbesondere eine Neubearbeitung der im Anhang A zu Abschnitt II Nr. 12 (§ 300 Abs. 1 V.A.V.G.) zum Abdruck gebrachten „Anweisung für die tierärztliche Feststellung der Tuberkulose“ durch die Praxis als erforderlich erweist, ist vielleicht der im Rundschreiben gekennzeichnete Untersuchungsgang als eine erste Anregung für die Neufassung der gesetzlichen Anweisung zu verwerten.

Eine wesentliche Erleichterung der klinischen Untersuchungen dürfte bei Anwendung der durch Prof. Dr. Dr. Raebiger bzw. Dr. Rautmann konstruierten Atmungshemmer zu erwarten sein. Die Herstellung und den Vertrieb hat die Firma Hauptner in Berlin übernommen. Die Beschaffenheit beider Apparate wird durch die beigelegten Bilder gekennzeichnet.

Der Atmungshemmer nach Prof. Dr. Dr. Raebiger ist bereits mit Gebrauchsanweisung in einem Nachtrag des Hauptner-Kataloges veröffentlicht worden.


Die Anwendung der Konstruktion nach Dr. Rautmann erfolgt, wie aus dem Bild ersichtlich, in der Weise, daß je ein Stab durch die an den Breitseiten eines



L 3351. Atmungshemmer nach Raebiger.

derben Drehtuches von 70—80 cm befindlichen Durchsteckösen geführt wird und diese bis zur Mitte zusammenge-schoben werden.

Der so entstehende Beutel wird dem Tier über Nase und Maul gelegt, und durch Drehen der Stäbe im Sinne des Uhrzeigers zugeschnürt.



Atmungshemmer nach Rautmann.

Ganz mühelos wird auf diese Weise ein vollständiger Luftabschluß und damit in kürzester Zeit eine viel hochgradigere Atemnot erreicht, als das durch die stärkste Bewegung der Tiere im Freien möglich ist.

Durch ein sehr festes Anziehen wirkt der Atmungshemmer gleichzeitig wie eine Nasenbremse, so daß auch bei widerstehlichen Tieren, Bullen usw. der erwünschte Erfolg bequem erreicht wird.

Ebenso wie wir für die Aufklärung der Landwirte sorgten und um eine Verbesserung der klinischen Untersuchungen bemüht waren, haben wir eine Vervollkommnung des bakteriologischen Ermittlungsverfahrens angestrebt.

Da beim Rind im Gegensatz zum Menschen nicht immer ein gutes Sputum in reichlicher Menge gewonnen werden kann, andererseits das Rind die Ausscheidungen aus den Luftwegen nicht auspeit, sondern abflockt, lag der Gedanke nahe, den Tuberkelbazillennachweis durch Kotuntersuchungen zu erbringen, um so die Sputumprüfungen mehr oder weniger zu ersetzen.

Wir wählten insgesamt 70 Rinder aus, die sich auf Grund der klinischen Untersuchung als lungentuberkuloseverdächtig erwiesen und entnahmen von diesen Tieren nicht nur eine Lungenschleim-, sondern gleichzeitig eine Kotprobe.

Die Verarbeitung der letzteren erfolgte in Abänderung der Anweisung im Anhang A zu Abschnitt II Nr. 12 (§ 300 Abs. 1 V. A. V. G.), da der Antiforminvorbehandlung des Kotes große Schwächen anhaften, nach der von uns für Rinder modifizierten Methode von Verdina (Zentralblatt f. d. ges. Tuberkuloseforschung, Bd. XXVI, 1926) in folgender Weise:

Zunächst wurde in jedem Fall ein Ausstrich angefertigt, (Färbung nach Ziel-Neelsen) und durchgemustert. Sodann wurde eine walnußgroße Menge Kot mit 10prozentiger

Schwefelsäure im Mörtel fein zerrieben und danach im Spitzgläschen zentrifugiert, so daß die Säure 20 Minuten einwirken konnte. Nach dieser Zeit wurde die über dem Sediment stehende Flüssigkeit abgesehen, der Rückstand mit physiologischer Kochsalzlösung aufgerührt und mit 20prozentiger Sodalösung neutralisiert.

Da trotz der Säurewirkung das Sediment noch reichlich Zellulosebestandteile aufweist, die eine Verimpfung untunlich erscheinen lassen, wird durch ein doppeltes Gazefilter filtriert, nochmals zentrifugiert und der ausgeschleuderte Bodensatz verimpft.

Um jeden Verfehlungsirrtum zu vermeiden, wurde der Tierversuch auch dann ausgeführt, wenn schon mikroskopisch Tuberkelbazillen nachgewiesen werden konnten. Diese Maßnahme erscheint notwendig, da bekanntlich im Kot säurefeste Stäbchen bei gefundenen Tieren vorzukommen pflegen.

Von den 70 verarbeiteten Proben scheiden acht für die Beurteilung aus, da die Impftiere vorzeitig starben. Dieser Prozentsatz (= 11,1 Prozent) an interkurrenten Todesfällen entspricht der Norm, die nach den bisherigen Erfahrungen mit 10—15 Prozent zu berechnen ist.

Von den restlichen 62 Rindern erwiesen sich die Sputa (in 35 Fällen negativ) in 27 Fällen positiv, davon 20mal bereits durch die mikroskopische Prüfung. In den Kotproben derselben 62 Rinder konnten niemals Tuberkelbazillen gefunden werden, wenn der Lungenauswurf keine Erreger enthalten hatte. Bei den 27 Rindern mit positivem Sputum fanden sich im Kot 13mal Tuberkelbazillen, das sind etwa

48 Prozent der mit offener Lungentuberkulose erkannten Tiere.

Der Nachweis gelang in neun Fällen erst durch den Tierversuch, viermal war der Befund bereits mikroskopisch positiv, konnte aber nur in drei Fällen durch den Impfversuch bestätigt werden.

Damit ist der Beweis erbracht, daß bei einem Verzicht auf jede Lungenschleimunterfuchung nicht ganz in der Hälfte der Fälle die Auffindung der lungentuberkulösen Tiere mit Hilfe der Kotunterfuchungen möglich sein wird. Zu berücksichtigen bleibt jedoch, wie die Versuchsdurchführung lehrt, daß das Ergebnis von dem Ausfall der Verimpfung abhängig gemacht wird.

Eine praktische Bedeutung haben die Kotunterfuchungen allerdings nur als ein wertvolles Behelfsmittel, wenn aus irgendeinem Grunde eine Lungenschleimentnahme unmöglich ist, wie das bei Widerfetzlichkeit des Tieres, Mangel an Hilfskräften, Fehlen des Entnahmeinstrumentes eintreten kann, oder wenn ein tierärztlicher Sachverständiger nicht zur Verfügung steht.

In einer weiteren Prüfungsreihe soll der Wert des Zellgehaltes, insbesondere die Bedeutung der Lymphozyten, in Milchproben für den Nachweis der Eutertuberkulose ermittelt werden. Da bisher aber erst 56 Proben bearbeitet wurden, in denen allerdings bei Anwesenheit von Lymphozyten bereits 19mal Tuberkelbazillen durch die mikroskopische Unterfuchung gefunden wurden, läßt sich ein endgültiges Urteil nicht abgeben, so daß über diesen Teil unserer Versuche auf den nächsten Bericht verwiesen werden muß.

(Aus der Pasteur-Abteilung des Bakteriologischen Instituts Kiew.)

Über Glykämie bei experimenteller Wutkrankheit.

Von Privatdozent B. Koldajew.

Die Glukofurie wird von einer Reihe von Autoren für eines der Kennzeichen zur postmortalen Diagnostik der Hydrophobie gehalten. Nocard, welcher auf dieses Merkmal als erster hingewiesen hat, sowie andere Autoren (Rabieaux - Nicolais, Arloing - Pellissie, Porcher, Michin, Pfeil u. a.) finden bei Lyssa in etwa der Hälfte der untersuchten Fälle Zucker im Harn und halten den positiven Ausfall der Harnunterfuchung an Leichen lyssaverdächtigter Tiere für diagnostisch verwertbar. Die Glukofurie ließ sich an einer Reihe verschiedener Tiere beobachten, sowohl nach dem Tode bei Infektion mit Straßenvirus als auch bei experimenteller Wutkrankheit. Die Glukofurie ist keine beständige Erscheinung bei Hydrophobie; bei Herbivoren tritt sie häufiger und im größeren Maße auf, als bei Carnivoren. Arloing - Pellissie fanden beim Bestimmen des Blutzuckergehaltes bei lyssakranken Tieren, daß die Glukofurie vom erhöhten Blutzuckerpiegel abhängt.

Nachstehende Unterfuchungen über den Blutzuckergehalt des Blutes von Kaninchen, die zur Herstellung von Material für antirabische Impfungen mit Lyssavirus infiziert worden sind, wurde unternommen, weil die Literaturangaben über die Häufigkeit der Glukofuriefälle bei experimenteller Hydrophobie zum Teil widersprüchlich sind. Ferner wollte ich den Zeitpunkt des Auftretens der Glykämie genauer bestimmen. Dank der gegenwärtigen Mikromethodik der quantitativen Bestimmungen läßt sich eine derartige Unterfuchung mit großer Genauigkeit ausführen, indem die Bestimmungen im Laufe der Inkubation und Erkrankung mehrmals wiederholt werden. Als die Versuche schon beinahe beendet waren, wurde mir nach einem Referat in der Monographie von Sawatejew („Wutkrankheit“) die Mitteilung von Cornwall bekannt, der ebenfalls den Blutzuckerpiegel bei Lyssa unterfuchte und fand, daß der Zuckergehalt des Blutes 24 Stunden nach der Impfung etwas zunimmt. Die kleinsten Werte werden am vierten Tage

beobachtet, die Zunahme beginnt am 5. bis 6. Tage. Der Zuckergehalt einzelner Kaninchen weist von Tag zu Tag individuelle Schwankungen auf (l. c., S. 91). Leider war mir die Originalarbeit von Cornwall nicht zugänglich, so daß ich keine Möglichkeit hatte, sie mit meinen Ergebnissen zu vergleichen.

Im ganzen wurde der Blutzuckerpiegel im Laufe der experimentellen Hydrophobie bei 20 Kaninchen unterfucht. Ich nahm die Bestimmungen nach der Methode von Hagedörn - Jensen (nach den Hinweisen von Rona) vor, wobei je 0,1 ccm Blut aus den Ohrvenen mit der Landsberg'schen Pipette entnommen wurden. Die Kaninchen waren subdural mit virus fixe geimpft. Sie erkrankten in der Regel am fünften Tage und gingen am 7. bis 8. Tag nach der Impfung zugrunde.

Der Blutzuckergehalt der Versuchskaninchen schwankte vor der Impfung von 65 bis 112 mgr pro 100 ccm Blut. Bei der Mehrzahl der Tiere (12) betrug der Zuckergehalt 70 bis 90 mgr pro cento.

Im Laufe der ersten Tage nach der Impfung, vor dem Beginn der Erkrankung, ließ sich keine merkliche Zunahme des Blutzuckers feststellen. So zeigte:

Kaninchen 18 vor der Impfung 100 mgr Prozent,
am dritten Tage 86 mgr Prozent,

Kaninchen 19 vor der Impfung 72 mgr Prozent,
am dritten Tage 84 mgr Prozent,

Kaninchen 3 vor der Impfung 90 mgr Prozent,
am zweiten Tage 92 mgr Prozent.

Die geringen Schwankungen des Blutzuckers dürfen nicht in Betracht gezogen werden, da ja schon die Fesselung des Tieres auf das Operationsbrett eine Hyperglykämie erzeugen kann (Morawitz, l. c., S. 121). Während der Inkubation sind also keine Änderungen des Blutzuckergehaltes zu verzeichnen.

Das Bild änderte sich mit dem Beginn der Erkrankung; zwar blieb der Zuckergehalt des Blutes bei mehreren Kaninchen auch nach der Erkrankung unverändert (Tiere Nr. 6, 7, 12, 14, 15, 16, 18), andere wiesen aber eine mäßige Zunahme auf:

Kaninchen 1 am zweiten Krankheitstage 107 mgr Proz. anstatt 67,

Kaninchen 20 am dritten Krankheitstage 92 mgr Proz. anstatt 74.

Manchmal war die Zunahme bedeutender:

Kaninchen 13 136 mgr Prozent anstatt 105 am ersten Krankheitstage.

Möglicherweise ist die Zunahme des Blutzuckers durch den Anstieg der Temperaturkurve beim Beginn der Erkrankung zu erklären, ähnlich wie in den Versuchen von Jazmirska beim experimentellen Fleckfieber der Meerfischweihen (vgl. noch Pollak). Bei einem Teil der Kaninchen wurde parallel mit den Zuckerbestimmungen die Temperaturkurve verfolgt. Eine Übereinstimmung des Zuckerpiegels mit der Temperaturkurve konnte nicht immer beobachtet werden; manchmal wurde aber der Temperaturanstieg von einer Zunahme des Blutzuckers begleitet: Kaninchen 17 142 und 139 mgr Proz. bei 38,5 Grad anstatt 89 mgr Prozent bei 36,9 Grad,

Kaninchen 19 99 und 114 mgr Prozent beim Anstieg bis 39,7 Grad anstatt 84 mgr Prozent.

In anderen Fällen blieb der Zuckergehalt des Blutes trotz Temperaturanstieg unverändert.

Wie schon erwähnt, wird angenommen, daß namentlich die postmortale Glukosurie ein diagnostisches Symptom der Wutkrankheit darstelle. Der Blutzuckergehalt wurde deswegen bei allen Versuchstieren am letzten Krankheitstage untersucht, bei zwölf Kaninchen auch eine postmortale Blutuntersuchung unternommen (Blutentnahme mittels einer Spritze aus dem Herzen des zugrundegegangenen Tieres). Was den Zuckergehalt am letzten Krankheitstage betrifft, so ergaben sieben Kaninchen keine wesentlichen Änderungen im Vergleich zu den vor der Impfung gefundenen Werten, vier Tiere zeigten eine Abnahme des Zuckergehaltes (um 5 bis 50 Prozent des Wertes vor der Impfung), bei neun Tieren ließ sich eine Zunahme um 20 bis 60 Prozent des ursprünglichen Zuckergehaltes konstatieren. Der Zuckerpiegel vor dem Tode war unabhängig davon, ob der Zuckergehalt im Blute bereits im Beginn der Erkrankung eine Änderung aufwies oder nicht:

Kaninchen 5 vor der Impfung 86 mgr Prozent, beim Beginn der Erkrankung Zunahme bis 119 mgr Prozent, vor dem Tode nur 98 mgr Prozent,

Kaninchen 11 entsprechend 83 mgr Prozent, 124 mgr Prozent, 89 mgr Prozent,

Kaninchen 17 entsprechend 94 mgr Prozent, 142 bis 139 mgr Prozent, 125 mgr Prozent.

Die postmortalen Zuckerbestimmungen im Blute aus dem Herzen der Tiere ergaben zwar ebenfalls keine beständigen Änderungen, in der Mehrzahl der Fälle (8 Fälle aus 12) wurde aber eine wesentliche Zunahme des Zuckergehaltes beobachtet, die 79, 200 und sogar 221 Prozent der ursprünglichen Menge betrug (245 mgr Prozent anstatt 83 Kaninchen 11, und 286 mgr Prozent anstatt 105 Kaninchen 13). Bei den übrigen vier Versuchstieren lag dagegen eine Abnahme der ursprünglichen Zuckermenge um 13 bis 57 Prozent vor.

An unseren Kaninchen mit experimenteller Hydrophobie ließ sich also hauptsächlich erst nach dem Tode des Tieres eine wesentliche Steigerung des Blutzuckergehaltes beobachten; doch fand dies auch letzterenfalls nicht immer statt, 33 Prozent der untersuchten Fälle wiesen sogar eine Abnahme des Blutzuckers auf.

Außer dem Blute wurde bei 11 Kaninchen mittels der-

selben Methode der Gehalt an reduzierenden Substanzen im Harn nach dem Tode an Hydrophobie bestimmt. Die Entnahme des Harnes geschah mit einer Spritze aus der Harnblase. Zur Bestimmung nach Hagedorn-Jensen wurden ebenfolche Mengen gebraucht, wie zu den Blutzuckerbestimmungen. Gewöhnlich wurde ein bedeutender Gehalt des Harnes an reduzierenden Substanzen in den Fällen konstatiert, wo eine erhebliche postmortale Hyperglykämie vorlag, letzteres war bei der Mehrzahl der Tiere der Fall. Bei den Kaninchen ohne postmortale Hyperglykämie oder mit geringer Steigerung des Blutzuckers war auch die Menge der reduzierenden Substanzen im Harn entsprechend relativ geringer (siehe die nachstehende Tabelle).

	Blutzucker in mgr. %		Gehalt an reduzierenden Substanzen in Harn in mgr. Zucker pro cento
	Vor der Impfung	Nach dem Tode	
Kaninchen 11	83	245	281
" 12	101	275	390
" 13	105	286	561
" 14	101	324	399
" 17	94	152	302
" 18	100	273	265
" 9	84	48	59
" 16	98	42	102
" 15	92	62	193
" 8	112	139	123
" 10	112	98	178

Zusammenfassung.

Auf Grund dieser Untersuchungen glaube ich mich zu dem Schlusse berechtigt, daß die experimentelle Hydrophobie der mit virus fixe geimpften Kaninchen nicht immer den gleichen Einfluß auf die Blutzuckerkurve ausübt. In der Inkubationsperiode ließen sich einigermassen wesentliche Änderungen des Blutzuckerpiegels nicht sicher feststellen. Die verhältnismäßig geringe Hyperglykämie, die bei einem Teil der untersuchten Tiere im Beginn der Erkrankung auftrat, läßt sich durch den Temperaturanstieg erklären. Eine bedeutendere Hyperglykämie wurde bei etwa einer Hälfte der Kaninchen vor dem Tode (am letzten Krankheitstage) beobachtet. Nur bei postmortaler Blutuntersuchung konnte die Hyperglykämie bei der Mehrzahl der Tiere (66 Prozent) festgestellt werden; in diesen Fällen wurde auch eine wesentliche Zunahme der reduzierenden Substanzen im Harn gefunden. Die Unbeständigkeit des Auftretens der Hyperglykämie und deren sehr wechselnde Intensität scheinen zugunsten der Erklärung von Porcher zu sprechen, der meint, daß die Glukosurie bzw. Hyperglykämie bei Wutkrankheit desselben Ursprungs ist, wie bei dem bekannten Zuckerstich, daß sie also infolge einer Schädigung des Bodens des vierten Ventrikulus durch den fort schreitenden Prozeß entsteht.

Literatur.

Nocard: zit. nach Porcher. Rabieaux-Nicolas: Journ. d. phys. et path. gen: 4, 95, 1902. Porcher: Bioch. Zeitschr. 2, S. 291, 1907. Michin und Pfeil: zit. nach Lubinsky-Prausnitz, Lyssa: Ergebn. der Hygiene VIII, 57, 1926. Cornwall: Ird. Journ. of Med. Res. 12, 1925, zit. nach Sawatejew, Wutkrankheit. Moskau 1927, S. 91 (russ.). Rona-Bloch: Handbuch der biolog. Arbeitsmeth. Abt. IV, Teil 4, S. 875. Morawitz: Oppenheimer's Handbuch der Bioch. 2. Aufl., 4, S. 121. Jazmirska: Journal experim. biologii i mediciny, Nr. 14, 1927 (russ.). Pollak: zit. nach Morawitz l. c., S. 114.

Innere Medizin und Chirurgie.

R ä t h: Pharmakologisch-biologische Versuche mit Präparaten der Pyridinreihe. (T. R. 1927, S. 892.)

Die Arsenpräparate B.R. 1 (5 wertiges Arsen) und B.R. 34 und 68 (3 wertiges Arsen) wurden auf ihre Verträglichkeit an Maus und Kaninchen geprüft. Therapeutisch beeinflussen sie stark Trypanosomen. Das Selectan zeigt eine ausgesprochene Wirkung gegenüber Strepto- und Staphylokokken. Die Dosis tolerata beträgt 0,4 Gramm pro Gramm Maus iv. und 1 mg pro Gramm Maus sk. Kaninchen, die sk., imusk. oder iabd. mit Strepto- bzw. Staphylokokken infiziert waren, konnten durch Behandlung mit Selectan am 7. Tage fieber- und dauernd bakterienfrei gemacht werden. Versuche in vitro verliefen weniger günstig. Anscheinend werden vom tierischen Organismus Stoffe vom Charakter der Antitoxine gebildet, die den Heilvorgang verstärken. Durch dahingehende Versuche bei Spirillen konnte festgestellt werden, daß der Tod der Mikroorganismen durch Bakteriolyse erfolgt. Geiger.

Schultz, O.: Versuche mit ultraviolett bestrahlten, fettgebundenem Sterin bei normaler Jungtier- und Geflügel-aufzucht, sowie Heilung florider Rachitis. (B. T. W. 1927, S. 584.)

Durch die neuere Forschung wurde nachgewiesen, daß die Rachitis durch Ultraviolettbestrahlung geheilt werden kann, und daß außerdem derselbe Erfolg durch Verabreichung bestrahlter Nahrungsmittel zu erreichen ist, soweit dieselben das in diesem Falle wirksame Cholesterin enthalten. Verf. gelang es nach zweijährigen Versuchen ein haltbares und wohlgeschmeckendes MilCHFett-Sterin herzustellen, das bei den Versuchen sich außerordentlich wirksam erwies. Schwere experimentelle Rattenrachitis konnte beispielsweise bei täglicher Zugabe von $\frac{1}{10} \text{ g} = \frac{5}{10000}$ wirksame Substanz in neun bzw. 20 Tagen völlig geheilt werden. Prophylaktisch gefütterte Tiere erkrankten bei einer Diät, die sonst Rachitis verursacht, nicht. Vier junge Azarafüchse im Hagenbeck'schen Tierpark, die schwer an Rachitis litten, konnten auf diese Weise wieder hergestellt werden. Das fragliche Mittel wird unter der Bezeichnung Liposterin „G 110“ von der Firma G. Kersten, G. m. b. H., Chem.-Pharmaz. Milchpräparate in Grebenstein in den Handel gebracht. Den gleichen Erfolg hatte Verf. bei unseren Haustieren mit einem ultravioletten Strahlen ausgesetzten Pflanzenöl, das mit Futtermehl vermischte unter dem Namen „Aufbaumehl“ von G. Kersten, Landesprodukten-Großhandlung in Grebenstein bezogen werden kann. Versuche mit diesem Präparat an einem infolge Rachitis sehr heruntergekommenen einjährigen Fohlen ergaben, daß das Tier nach 14tägiger Behandlung klinisch als völlig geheilt zu betrachten war. Gesunde Kälber, denen bei völligem Milchentzug Aufbaumehl zugefüttert wurde, nahmen innerhalb vier Wochen gegenüber den Kontrolltieren durchschnittlich um 11 Pfund mehr zu, waren kräftiger und zeigten ein lebhafteres Benehmen. An Hühner verabreicht, nahmen reduzierte Tiere sehr rasch und stark zu, und bei künstlicher Bebrütung schlüpften aus den Eiern behandelter Tiere bedeutend mehr Küken wie aus den Eiern unbehandelter Hühner. Außerdem war das Eigewicht größer wie bei den Kontrolltieren. Carl.

Ziegler, H.: Über Bau und Funktion exokriner Drüsen. (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 121.)

Exokrine Drüsen sind Epithelflächen, die an beschränkter Stelle des sonst impermeablen Oberflächenepithels vorzukommen pflegen und zum Durchtritt der verschiedensten Körperstoffwechselprodukte dienen. Sie sind nach dem Prinzip der Oberflächenvergrößerung bei kleinem Volumen gebaut. Der Bau der einzelnen Drüsengruppen ist speziell vom vergleichend-anatomischen Standpunkt aus eingehend beschrieben und nomenklatorisch berichtigt ausgeführt. Auf die einzelnen Formen kann hier nicht weiter eingegangen

werden. Interessant ist die schematische Darstellung der Mandibularis der Wiederkäuer, deren Auffassung auch der Verschleimungstheorie weitgehende Stützen bietet. Dabei kommt gleichmäßige Verschleimung vor, die zu verschiedenen morphologischen Formen in den Drüsenpartien führt. Die ungleichmäßige Verschleimung ist dadurch gekennzeichnet, daß bei ihrem Fortschreiten auf der einen Seite des Ganges Schleimzellen, auf der andern Halsstückzellen gebildet sind, die aber verschmelzen können, oder aber daß der Verschleimungsprozeß gleichmäßig beginnt, stehen bleibt, so daß eingeschaltete Halsstücke die einzelnen Schleimzellenreihen trennen. — Man unterscheidet Eiweiß- (seröse) und Schleim- (muskulöse) Zellen. Über weitere Verhältnisse wird auf das Original verwiesen. — Die Rohstoffe treten durch das Kapillarendothel, umspülen als Bestandteil des Gewebssaftes die Drüsenhauptstücke, durchtreten die Basalmembran und die Basal- oder Korbzellen in die eigentlichen Drüsenzellen, wo sie zu spezifischen Sekretstoffen umgebaut werden. Gelegentlich sind auch morphologische Anzeichen dieses intrazellulären Stoffwechsels wahrzunehmen (Formveränderungen des Kernes der Eiweißdrüsenzellen). Im Mandibularissekret lassen sich als zwei getrennt abgeforderte Granulaarten differenzieren. Bei der Abgabe dieser Granulasekrete können zwei Modi vorhanden sein: allmähliche Ansammlung bis zur Tropfenbildung in der Zelle und ruckweise Ansammlung unter der Zellwand. Bei der Verflüssigung des Sekretes soll der Golgi'sche Netzapparat eine bedeutende Rolle spielen. Sekrete von Drüsen müssen in verschiedenen Fällen aktiviert werden (z. B. Pankreasferment). Nach Zimmern soll die Salzsäurebildung des Magens durch ein Azidogen der Belegzellen eingeleitet werden und die Zellen der Sammelröhrchen und Magenoberfläche die Azidase dazu bilden. Der Sekretionsdruck ist physikalisch als auch biologisch durch kontraktile Elemente (Myoepithelzellen) erklärt worden, vielleicht sind auch elastische Fasern daran beteiligt. — Über die verschiedenen Theorien der Milchsekretion, die von Rubeli und Tetzeli kürzlich vertreten worden sind, ist vor kurzem an dieser Stelle referiert worden. Außerdem wird auf die Dissertation von O. Wirz, Bern 1913, verwiesen. H. G.

Konge, W.: Ultraviolette Strahlen in der Hundepaxis. (B. T. W. 1927, S. 601.)

Verf. verwendet in seiner Klinik eine Solluxlampe der Quarzlampengesellschaft in Hanau. Versuche ergaben, daß das Scheren der Hunde bei ihrer Anwendung nicht notwendig ist, und daß die Bestrahlung mit rotem Filter in einer Entfernung 10 cm von der Lichtquelle $\frac{1}{2}$ Minute nicht übersteigen darf. Nach einer halben Minute Bestrahlung fällt die Pulszahl von 120 auf 60 in der Minute. Eine Wiederholung dieser Therapie in Zwischenräumen von drei Tagen ist notwendig. Die besten Resultate wurden damit bei nervöser Staupe erzielt. Lähmungen der Nachhand verschwanden oft schon nach einmaliger Bestrahlung. In schweren Fällen wurden noch Einspritzungen von Testikularflüssigkeit nach Prof. Krawkoff oder 30 ccm folgender Lösung jeden dritten Tag vorgenommen: Natr. chlorat. 6,5, Kal. chlorat. 3,0, Calc. chlorat. 0,2, Magnes. sulfuric. 0,3, Natr. bicarbon. 1,0, Natr. glycerophosph. 1,0, Glucosae 1,0, Aqu. dest. 1000,0. Eine drei Minuten währende Bestrahlung bei einem an Chorea leidenden Hunde rief Nephritis hervor. Bei Rachitis und bei Ekzem der Rute wurden gute, bei Räude keine Erfolge erzielt. Verf. empfiehlt die Anwendung der Solluxlampe in der Praxis aufs wärmste. Carl.

Laue: Schlundschnitt bei einer Kuh mit anschließender offener Wundbehandlung. (B. T. W. 1927, S. 600.)

Eine 7jährige Kuh hatte eine rohe Kartoffel verschluckt, die im Halse stecken blieb. Starke Aufblähung, Atemnot und Erstickungsanfälle waren eingetreten, als Verf. hinzukam. Da der Panstich wenig Erleichterung brachte, wurde zur Operation geschritten. Mit einiger Mühe gelang es, einen

36 cm langen Hautschnitt anzulegen und dann bis zum Schlunde vorzudringen, und eine faustgroße, mit Schleim und Blut überzogene Kartoffel zu entfernen. Eine Wundnaht wurde nicht angelegt. Die starke Blutung wurde durch Tamponierung mit ausgekochten Handtüchern gestillt. Nach der Operation wurde das Tier ruhig und nahm gierig mit Therapogen verletztes Trinkwasser auf, das teilweise durch die Wunde abfloß und diese desinfizierte. Als Nahrung wurde anfangs Kleien- und Leinkuchenschlapp gereicht, später leichtes Futter. Bei äußerlicher Reinigung der Wunde mit H_2O_2 und innerlicher Verabreichung von Therapogenwasser trat innerhalb 7 Wochen Heilung ein. Carl.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Schutzimpfungen gegen Maul- und Klauenseuche.

MfLDuF v. 10. Mai 1928 — V 3886 —.

Aus den Einzelberichten, die zufolge meines Rund-Erlasses vom 4. Mai 1927 — V 3361 — (LwMBI. S. 448) über veterinärpolizeiliche Schutzimpfungen gegen Maul- und Klauenseuche erstattet worden sind, ist zu entnehmen, daß vielfach die Notimpfung (Heil- und Simultanimpfung) in verfeuchten Einzelgehöften unter Übernahme der Hälfte der Impfkosten auf die Staatskasse veterinärpolizeilich angeordnet wird. Dies entspricht nicht dem Sinne meines obigen Rund-Erlasses, namentlich dann nicht, wenn es sich um abgefordert gelegene Gehöfte handelt. Die Notimpfung im Seuchengehöft dient in erster Linie dem Zwecke, den Verlauf der Seuche zu mildern. Gleichzeitig wird allerdings eine Abkürzung des Seuchenverlaufs erreicht. Die Abkürzung des Seuchenverlaufs kann aber auch durch künstliche Ansteckung der Tiere ohne gleichzeitige Impfung mit Serum erzielt werden. Die Notimpfung im Seuchengehöft liegt somit in der Hauptsache im Interesse des Besitzers. Die Kosten dieser Impfungen sind wie bisher im allgemeinen von diesen und gegebenenfalls von der Provinz oder den Kreisen, soweit sie sich zur Übernahme eines Teiles der Impfkosten bereit erklärt haben, zu bestreiten. Nur wenn bei einem bedrohlichen Auftreten der Maul- und Klauenseuche gemäß Ziffer VII des Erlasses vom 4. Mai 1927 zur Verhütung der Weiterverbreitung der Seuche in einer Ortschaft Schutzimpfungen unverfeuchter Gehöfte (Ringimpfungen) veterinärpolizeilich angeordnet werden, übernimmt der Staat im allgemeinen die Hälfte der Kosten (Serumkosten und Kosten für tierärztliche Bemühungen), und zwar sowohl für die Simultanimpfung im Seuchengehöft als auch für die Schutzimpfung in den gefährdeten unverfeuchten Gehöften.

Im übrigen haben sich die Ringimpfungen auch in der Berichtszeit bewährt und bei zweckdienlicher Anwendung als ein zuverlässiges Mittel erwiesen, Einzelausbrüche der Seuche in unverfeuchten Ortschaften in kurzer Zeit zum Erlöschen zu bringen. Die Schutzringe dürfen jedoch nicht zu klein bemessen werden. Außerdem können die Impfungen naturgemäß nur dann Erfolg haben, wenn sie gleichzeitig, also möglichst an einem Tage, erfolgen. Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, daß die Maul- und Klauenseuche in der Berichtszeit keine große Neigung zur Ausbreitung gezeigt hatte, so daß die Unterdrückung einzelner Seuchenfälle meistens auch ohne Anwendung von Ringimpfungen gelungen ist. Man wird deshalb weitere Beobachtungen bei andersartigen Seuchengängen abwarten müssen.

Sollte in einem Bezirke die Seuchelage bedrohlich werden, so daß umfangreiche Impfungen erforderlich erscheinen, so ist sofort, nötigenfalls drahtlich, zu berichten. Ich behalte mir vor, meinen Sachbearbeiter an Ort und Stelle zu entsenden.

Die nach Abschluß jedes Einzelfalles zu erstattenden Berichte, namentlich die Abrechnung, sind in Anlehnung an das beiliegende, in Stadien eingeführte Muster aufzustellen, dem kurze Ausführungen über Zweckmäßigkeit, Anlage und Erfolg des Impfversuches beizufügen sind.

Kostenrechnung

über die am auf polizeiliche Anordnung vom erfolgte Schutzimpfung gegen Maul- und Klauenseuche in Kreis

A. Serumkosten.

Zahl der geimpften Bestände, darunter Seuchenbestände
Zahl der geimpften Rinder Serumverbrauch ccm

Zahl der geimpften Schweine			
Schafe, Ziegen			
über 8 Wochen	Serumverbrauch	ccm	
Zahl der geimpften Schweine			
Schafe, Ziegen			
unter 8 Wochen	Serumverbrauch	ccm	
	zusammen:	ccm	
Laut Rechnung	RM.	Rpf.	
Außerdem entfallen an Porto und Verpackungskosten auf diese Menge Serum	RM.	Rpf.	
	zusammen:	RM.	Rpf.

B. Tierärztliche Gebühren:

für geimpfte Rinder . . . je 1,— RM. =	RM.	Rpf.
für geimpfte Schweine, Schafe, Ziegen		
über 8 Wochen je 0,50 RM. =	RM.	Rpf.
für geimpfte Schweine, Schafe, Ziegen		
unter 8 Wochen je 0,25 RM. =	RM.	Rpf.
	Summe B	RM. Rpf.
	dazu Summe A	RM. Rpf.
	Gesamtbetrag:	RM. Rpf.
Von dieser Summe entfallen auf den Staat $\frac{1}{2}$ mit	RM.	Rpf.
auf die Provinz $\frac{1}{2}$ mit	RM.	Rpf.
Die Richtigkeit bescheinigt:		
., den 1928.		
Der Veterinärrat.		

Festgestellt:

Regierungs-Inspektor.

Dold, H. und H. Groß: Zur Frage der Wirkung einer tuberkulösen Infektion auf die Bildung von Hämolytinen.

Aus dem Institut für experimentelle Therapie „Emil von Behring“, Marburg. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 104, S. 343, 1927.)

Die immunbiologischen Reaktionsänderungen, die durch eine Infektion oder durch Injektion von Antigenen im Tierkörper hervorgerufen werden, bezeichnet von Pirquet allgemein als „Allergie“. Man kann eine prophylaktische Allergie, bei der die Empfindlichkeit gegenüber der Krankheitsursache herabgesetzt, von einer anaphylaktischen Allergie (Überempfindlichkeit) unterscheiden. Ersterer Begriff ist jedoch in letzter Zeit mehr und mehr aufgegeben worden. Bei der Tuberkulose bezeichnet man heutzutage als Allergie einen Zustand, bei dem nach Einverleibung kleiner Dosen eines spezifischen Reizmittels (Tuberkulin) sinnfällige zelluläre und humorale Immunitätsreaktionen auftreten, und man versteht unter Anergie einen Zustand, bei dem die Abwehrkräfte darniederliegen, also auf einen Reiz hin keine Reaktion mehr eintritt. Bei der Tuberkulose des Menschen entwickelt sich die Allergie mit dem Entstehen des Leidens und steigert sich während der Generalisierung der Tuberkulose zur höchsten Reaktionsempfindlichkeit. Im dritten Stadium der Krankheit besteht eine relative Unempfindlichkeit.

Ausgehend von diesen immunbiologischen Tatsachen haben verschiedene Autoren sich mit der Frage beschäftigt, ob der tuberkulöse Organismus während seines allergischen Zustandes auch auf einen unspezifischen Antigenreiz mit einer gesteigerten Antikörperproduktion antwortet. An Meerfischweinen angestellte Versuche ergaben ein diesbezügliches positives Resultat. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich nun mit der Nachprüfung dieser Untersuchungsbefunde, wobei sich folgendes ergab:

1. Bei 20 Kaninchen, die $1\frac{1}{2}$ bzw. 3 Monate vor Beginn der Immunisierung gegen Hammelerythrozyten mit Tuberkelbazillen (Typus bovinus) infiziert worden waren, hatte die bestehende tuberkulöse Erkrankung (tuberkulöse Allergie) keinen Einfluß auf die Bildung von Hämolytinen. Die Durchschnittstitern der von der Gruppe tuberkulöser Kaninchen einerseits und von einer entsprechenden großen Gruppe normaler Kaninchen andererseits gewonnenen hämolytischen Sera waren ungefähr gleich hoch. 2. Aller-

dings bestand bei unseren tuberkulösen Kaninchen nur eine starke örtliche Drüsentuberkulose, keine allgemeine Organtuberkulose. 3. Vielleicht sind die Differenzen zwischen unseren Ergebnissen und denen von Lewis und Loomis, Dienes und Schoenheit und Andrei auf diesen Umstand zurückzuführen, sowie auf die verschiedenartigen Versuchstiere (Kaninchen gegenüber Meerfischweihen). 4. Auch wenn es möglich wäre, bei Kaninchen durch Erzeugung einer allgemeinen Organtuberkulose eine Steigerung ihrer Fähigkeit zur Hämolysinfärbung zu erzielen, könnte diesem Verfahren aus wirtschaftlichen Gründen für die Praxis der Hämolysingewinnung keine Bedeutung zukommen.

Carl.

Stickdorn: Immunisierungsversuche an Mäusen mit avirulenten Rotlaufkulturen. Vortrag gelegentlich der 12. Tagung der deutschen Vereinigung für Mikrobiologie in Wien 1927. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 104, S. 147, 1927.)

Verf. hat aus einer zehn Jahre alten, in zugeschmolzener Glasröhre aufbewahrten Impfrotaufkultur im Jahre 1923 einen avirulenten Stamm herausgezüchtet, der selbst in Dosen von 0,5 ccm weiße und graue Mäuse nicht tötete und die Tiere gegen eine nachfolgende Infektion schützte. Angeregt durch die auf ähnlichen Grundätzen beruhende Veröffentlichung von Sabella hat Verf. mit der fraglichen, von ihm mit IIIc bezeichneten Kultur weitere Impf- und Immunisierungsversuche angestellt. Das Ergebnis der letzteren kann dahin präzisiert werden, daß es mit geeigneten avirulenten Rotlaufkulturen tatsächlich gelingt, Mäusen eine absolute Immunität gegenüber einer Rotlaufinfektion zu verleihen. Vorbedingung ist jedoch dabei die Verwendung möglichst frischer Bouillonkulturen von einer 8,0 pH entsprechenden Alkalität und die intraabdominale Form der Immunisierung. In diesem Falle wird selbst ein Schutz gegen höchste Infektionsdosen erzielt, selbst bei drei- bis viermaliger Wiederholung der Infektion. Ob es auch möglich ist, den Stamm IIIc in der Praxis zu einer wirksamen Schutzimpfung von Schweinen gegen natürlichen Rotlauf zu verwenden, sollen weitere Versuche ergeben. Vorläufig dürfte im Hinblick auf die ungünstigen Ergebnisse der aktiven Immunisierung von Schweinen mit Kultur ohne Serum nach den früheren Methoden und mit Rücksicht auf die unsicheren Ergebnisse bei Verwendung älterer und wenig alkalischer Kulturen im Mäuseversuch Zurückhaltung am Platze sein.

Carl.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Kiener, E.: Erfahrungen über Prolapsus uteri. (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 434.)

Verf. teilt aus seiner langjährigen Praxis verschiedene sehr interessante Fälle von Prolapsus mit bei Rind, Pferd, Ziege und Schwein. Beim Rind ist es mitunter schwer, liegende Tiere zum Aufstehen zu bringen. Er wendet die Schwanzbremse oder auch Erschrecken durch einen Hund an. Die Amputation eines schwerverletzten Uterus gelang, jedoch gelang es nicht, auch unter möglichst straffer Ligatur des Stumpfes, eine Blutung zu hindern. Dieser Fall war aussichtslos, weil gleichzeitig ein Vorfall der Gedärme im Uterus vorhanden war. Auch die Tuberkulose kann bedrohlich werden, weil die Widerstandsfähigkeit des Uterus für die immerhin erhebliche Gewalt bei der Reposition zu klein ist. Das Ablösen der Sekundinae muß der großen Blutungsgefahr wegen sehr sorgfältig geschehen. Bereits im Beginn der Reposition kann eine Notchlachtung notwendig werden. Ein interessanter Fall, wo ein Prolapsus schon 24 Stunden bestand, konnte geheilt werden. Das Tier, das auf der Weide geworfen hatte, war nicht zum Aufstehen zu bringen. Es wurde auf zwei zusammengebundenen Leitern an einen Abhang geschleppt und dort die Reposition vorgenommen. (Nachher hinten höher legen und dreimal täglich Eingüsse von Malventee mit 1/2 Prozent Therapogenlösung

örtlich.) Bei Stuten wurden drei Fälle mit Erfolg reponiert. Bei der Ziege war bei einem Fall vorher eine Scheidennaht nötig vor der Reposition. Zwei Fälle beim Schwein waren nicht zu korrigieren; vielleicht ließe sich hier eine Amputation mit Erfolg vornehmen. H. G.

Wenger, F.: Beitrag zur Sterilität des Rindes. Der Spitzenkatarrh der Uterushörner. (Schweiz. Archiv f. Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 493.)

Die genannte Erkrankung kommt bei Kühen und Rindern vor, die nicht konzipieren, in regelmäßigen Brunstperioden umrindern. Die Erscheinungen sind: Ödematöse Schwellung der Hornspitzen, die Ovarien sind manchmal normal, manchmal tragen sie Zysten und gelbe Körper. Nach den Erfahrungen des Verf. kann man den Hornspitzenkatarrh als Vorstadium einer Endometritis oder eines Fluor albus, sowie von zystöser Durchsetzung des Ovars oder auch von abnormen gelben Körpern auffassen; damit ist nicht gesagt, daß es sich um das einzige und zuverlässige Symptom handle. In den untersuchten Fällen waren es ca. ein Fünftel bis ein Viertel der Sterilitätsfälle. Bei der Sektion findet man ein bis mehrere Kubikzentimeter eitrigem Schleimes. Das Cavum uteri ist in der Regel leer. Die Wandung kann ödematös fein, was per rektum nicht immer feststellbar ist. Diese Schleimstagnation und ödematöse Schwellung sind in ihrer Ausdehnung sehr verschieden. Die Schwellung beruht scheinbar auf Störungen im Saftaustausch in den Interzellularlücken (Stagnation). Ursächlich kommen zurückgebliebene Nachgeburtssteile, dann Gefäßkontraktion zufolge Abkühlung durch den benachbarten „mit kaltem Futter gefüllten Pansen (Frühjahrs- oder Spätherbst-Weidegang) u. a., die mit der Fütterung selbst zusammenhängen. Therapeutisch behandelt man durch Massage, bis der ganze Uterus geschmeidig und weich ist. Behandlung des Ovars. Zur Vermeidung von gefährlichen Nachblutungen wird das Corpus luteum oder die Zyste nicht vollständig abgedrückt, im Bedarfsfalle nach 10—14 Tagen vollständig. Zeigen sich dem belehrten Besitzer bedrohliche Symptome, so wird 1 Liter ca. 1 Prozentiges Salzwasser eingegeben, für den Fall ernstlicher Verblutungsgefahr 40 Prozent Antifebrin zur fraktionierten Gabe. — Wenn kein Ausfluß eintritt, ist die Prognose für Fruchtbarkeit günstiger. Jedenfalls soll man bei der Behandlung postpartaler Uterusleiden die Hörner stets mitprüfen. Mitunter kommt man nur durch rektale und vaginale (bimanuelle) Untersuchung zur Diagnose der Hornerkrankung.

H. Graf.

Lehmann, W.: Die Bedeutung der Klitoridektomie als Behandlungsmethode bei Nymphomanie der Stute. (Schweiz. Arch. f. Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 199—210, 269—286.)

Die Kitzler bei gefundenen und nymphomanen Stuten weisen Verschiedenheiten auf: Die nymphomanen Kitzler zeigen mikroskopisch das Bild einer chronischen Entzündung. Die Klitoridektomie ist einfach und ohne Komplikationen. Der Ausgang der Operation erwies sich bei 54 klitoridektomierten Stuten in 18,52 Prozent der Fälle als erfolgreich (völlige Heilung der Nymphomanie), 37,04 Prozent teilweise erfolgreich (Besserung der Nymphomanie), 44,44 Prozent erfolglos (keine Besserung). Die Klitoridektomie ist bei Nymphomanie der Stute für sich oder im Verein mit der Ovariectomie angezeigt. Die Operation wird folgendermaßen ausgeführt: Füllen des Pferdes evtl. unter 0,5 Morphin. subkutan (1/2 Stunde vorher), Fesseln, Entfetten der Wurfumgebung (Benzin, 75prozentiger Alkohol), Desinfektion mit Sublimat (1 : 1000). Andrücken der Lefzen an den Körper zwecks Vortreten der Klitoris, Desinfektion derselben (Therapogen, Lysoform), Bepinseln mit 5 bis 10 Prozent Kokain steril. Anlegen der Nasenbremse, tiefes Fassen des Kitzlers mit der Hackenzange und herausziehen. Umschneiden der Schleimhaut und Ausschneiden bzw. Ausschneiden des Kitzlers. Blutstillung, Jodoform; Aufstehen-

lassen. Keine größere Nachbehandlung nötig. Das Werfen des Tieres ist im Interesse der Sicherheit des Operateurs unbedingt zu empfehlen. H. G.

Carlens, O.: Untersuchungen über die Fütterung von Rindern mit Zuckerrübenkraut. (B. T. W. 1927, S. 713.)

Die am medizinisch-chemischen Institut zu Lund ausgeführte Arbeit führte zu folgenden Ergebnissen:

1. Der Oxalsäuregehalt der Zuckerrübenblätter beträgt 6,9 bis 10,3, im Mittel 8,2 Gramm per 1 kg.

2. Unfere übrigen gewöhnlicheren Futterpflanzen wie Klee, Luzerne oder Grasarten enthalten nur ungefähr 0,74 bis 0,96 Gramm Oxalsäure per Kilogramm.

3. Bei normaler Fütterung enthält der Harn der Rinder ungefähr 11 mg Oxalsäure per Liter. Diese Oxalsäurekonzentration steigt während der Zuckerrübenfütterung auf das Doppelte und darüber.

4. Die Blutkoagulation wird während der Zuckerrübenkrautfütterung bedeutend verlangsamt. Die normale Blutkoagulationszeit für Rinderblut beträgt 3—6 Minuten, bei oben genannter Fütterung 10—20 Minuten.

5. Die mit dem Futter aufgenommene Oxalsäure wird durch die Gärungsprozesse in den Vormägen nicht vollständig zerstört, sondern ein Teil derselben gelangt in das Blut.

6. Die in das Blut gelangte Oxalsäure füllt einen Teil des Blutkalkes, wodurch der Kalziumgehalt im Blutserum von normal 12—13 mg per 100 ccm Blut auf 10—6,6 mg sinkt.

7. Der stark verminderte Blutkalziumgehalt scheint den Gesundheitszustand der Tiere nicht zu beeinflussen. Der Kalziumgehalt der Milch wird durch den verminderten Blutkalkgehalt nicht gesenkt.

8. Fütterung mit Rübenblättersilage scheint gewöhnlich keine Verlangsamung des Koagulationsvermögens des Blutes herbeizuführen. Sandström erwähnt aber einige Fälle von Verblutung bei Ausquertung der Corpora lutea. Er ist der Ansicht, daß eine Fütterung mit 18—24 kg Preßfutter von Rübenkraut die Ursache hierzu gewesen ist. Carl.

Theiler, A. und E. M. Robinson: Der Botulismus der Haustiere. Definition, Historisches, Literatur-Übersicht, Experimentelles. (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1927, 31, H. 3, S. 165.)

Theiler und Robinson geben in vorliegender Arbeit eine zusammenfassende Darstellung über den Botulismus bei den Haustieren. Dieser beruht auf der Wirkung eines Giftes, das von einer Gruppe von anaeroben Bakterien erzeugt wird. Dieses Gift kann, sowohl enteral als parenteral verabreicht, in äußerst geringen Quantitäten wirksam sein. Die Gruppe kann allgemein als *Clostridium botulinum* bezeichnet werden, in der bis jetzt verschiedene Typen oder Varietäten beschrieben sind, und die verschiedene Namen erhalten haben, wie *Cl. botulinum*, Typus A, B, C (die C-Gruppe wird auch *Cl. Luciliae* genannt), das *Cl. parobotulinum* (von Seddon als *Bacillus parobotulinus* bezeichnet) und das *Cl. parobotulinum bovis* und *Cl. parobotulinum equi* der südafrikanischen Autoren. Der Botulismus kommt bei allen Tieren vor und ist bisher unter den verschiedensten Namen beschrieben worden, so als Futtervergiftung der Pferde in Amerika, als Bulbärparalyse des Pferdes in Australien und Europa, als Spinalparalyse der Pferde und Lamsiekte der Rinder in Südafrika, als Limberneck beim Geflügel usw. Überall wird die Nahrung mit der Krankheit in ursächliche Beziehung gebracht, und die amerikanischen Beobachter, wie auch die australischen, haben durch Verabreichung von verdächtigem Futter wirklich auch die Krankheit erzeugt. In Europa hat man eine Krankheit, die in ihrem Bilde mit dem Botulismus übereinstimmt und unter verschiedenen Namen beschrieben ist (Wasenmeisterkrankheit in Deutschland), noch nicht genügend ätiologisch verfolgt, z. T. wird sie

auf eine Infektion zurückgeführt, aber es sind auch Vermutungen geäußert worden, die die Krankheit auf den Genuß von beschädigtem oder giftigem Futter zurückführen.

Es stellt sich nun die Frage ein, ob wirklich der Anaerobe im Futter gedeihen und Toxin erzeugen kann. Von vornherein dürfte das wohl ausgeschlossen sein, soweit es sich um Wiesenheu und Haferstroh handelt. Es wird kaum fehlgegangen, wenn behauptet wird, daß die sog. Futtervergiftung dann zustande kommt, wenn im Futter tierische Kadaver der Zersetzung unterliegen, Kadaver, die mit einem der verschiedenen *Clostridium*-Typen infiziert waren. Als solche Tiere dürften zunächst Mäuse, Ratten und Katzen in Betracht kommen, vielleicht auch die gewöhnlichen Raubtiere, die in Häusern, speziell im Heustock vorkommen. Jedes Land, oder vielmehr jeder Kontinent, hat in dieser Hinsicht seine eigene Fauna, und in Südafrika bildet Heu im Freien aufgestapelt, wie auch die in Ballen gepackte Luzerne einen Unterschlupf für alle möglichen wilden Tiere, und nichts ist natürlicher, als daß sich solche Tiere, die sich aus einer oder der anderen Ursache krank fühlen, verstecken und im Versteck verenden. Die Amerikaner und Australier dürften keine Schwierigkeit haben, jene Tiere anzugeben, die sich im Heustock verstecken oder in die Silos geraten können. Auch Futter, das mit Hühnerkot befudelt ist, kann als Ursache in Frage kommen, da die Hühner so ziemlich Allesfresser sind und Kadaverteile, auch Maden der Schmeißfliege, fressen, die mit dem *Clostridium* infiziert sein können. Auch bei der sog. Wasenmeisterkrankheit dürften ähnliche Verhältnisse vorkommen, Futter, das durch sich zersetzende Kadaverteile oder durch tote Ratten befudelt worden ist, die in den alten Abdeckereien nicht selten waren.

Bei dem enzootischen und selbst epizootischen Auftreten des Botulismus der Rinder, des sog. Parabolismus, wie nun die Lamsiekte Südafrikas, die Bulbärparalyse Australiens und die Rinderparalyse in Texas bezeichnet werden darf, sind es aber besondere Umstände, die eine Massenerkrankung verursachen können. Hier hat die Beobachtung gezeigt, daß Tiere, die auf der Weide sind, oft Knochen und Abfälle von tierischen Kadavern fressen und in der Folge dann erkranken können. Die Ursache dieser, von den Autoren als Osteophagie bezeichneten Erscheinung ist der Mangel an Phosphor in der Weide, der dann einen ähnlichen Zustand beim Rinde hervorbringt, welcher von den Autoren Aphosphorosis genannt wird. Das Knochenfressen kann geheilt und beseitigt werden durch Verabreichung von verdaulichen Phosphatverbindungen. Kleie, Knochenmehl, praezipit. Kalziumphosphat, Natriumphosphat und selbst Phosphorsäure, im Trinkwasser verdünnt, sind dafür geeignet, und das Symptom verschwindet gewöhnlich innerhalb weniger Wochen, wenn eine systematische Verabreichung erfolgt.

Der Botulismus der Ziegen und Schafe kommt selten zur Beobachtung. Gelegentlich erkranken Ziegen auf der Weide und gewöhnlich dann, wenn sie, ähnlich wie das der Esel tut, Rumeninhalt zerfallener Rinderkadaver fressen. Der Vogel Strauß ist empfänglich für das Botulismusgift. Da er auch so ziemlich Allesfresser ist, kann er das Gift, abgesehen von der Fütterung mit Knochen, auch auf der Weide auflesen.

Bei den Enten ist die Ursache des Botulismus das Verzehren von fauligem Fleisch.

Als refraktär gegen das Botulismusgift haben sich Hunde, Schweine und zum Teil auch Ratten erwiesen und doch können die Kadaver derselben in ähnlicher Weise wie die der anderen Tiere die Quelle der Toxinbildung sein.

Es darf noch erwähnt werden, daß nun keineswegs angenommen werden muß, daß alle sich zersetzenden

Kadaver Toxine bilden. Auch da scheinen wieder ganz besondere Umstände im Spiele zu sein, die von klimatischen und tellurischen Verhältnissen abhängen. Die Botulismus-Clostridien kommen nicht überall vor, wenn sie auch ohne Zweifel weit verbreitet sind.

Das Symptom des Botulismus besteht hauptsächlich in Lähmungen, die sich in weitaus den meisten Fällen im lokomotorischen System, sodann im Freß-, Kau- und Schluckapparat einstellen, das sog. Syndrom der Bulbärparalyse. Immerhin ändert sich das Bild bei den verschiedenen Haustieren etwas, bald ist es das eine, bald das andere Organsystem, das hauptsächlich befallen ist, und daselbe ist der Fall bei verschiedenen Tieren derselben Art. Die Krankheit beginnt in der Regel nach einer Inkubationszeit, die sowohl bei artifizierter als auch bei natürlicher, durch Fütterung verursachter Vergiftung beobachtet wird. Dieser Intervall kann Stunden, oft auch Tage dauern, währt aber selten mehr als zehn Tage. Man kann eine perakute, akute, subakute und chronische Form der Krankheit unterscheiden. Heilungen gibt es bei allen Formen der Krankheit und bei allen Tierarten, sie sind aber verhältnismäßig selten. Die leichtesten Fälle bestehen in einem vorübergehenden Unwohlsein, das sogar nur einige Stunden dauern kann. Schwere Fälle nehmen meist einen subakuten, häufiger noch einen chronischen Verlauf. Dieser kann sich dann auf Wochen und selbst Monate erstrecken.

Ein Charakteristikum der Krankheit ist, daß sie in allen Fällen fieberlos verläuft — nicht selten gibt es subnormale Temperaturen — und daß das mikroskopische Blutbild keine Veränderungen zeigt. Auf die einzelnen Krankheitserscheinungen der verschiedenen Formen bei den einzelnen Tieren, die in der Arbeit ausführlich geschildert werden, kann hier nicht eingegangen werden.

Das Überstehen der Krankheit hat keine Immunität im Gefolge. Typische pathologisch-anatomische Veränderungen sind beim Botulismus nicht nachweisbar. Die Krankheit stellt eine reine Vergiftung dar, die, wie schon erwähnt, fieberlos verläuft und keine pathognomonischen Veränderungen im Körper zurückläßt. Beim Tiere sind außer den motorischen Nerven der Gliedmaßen offenbar die motorischen Teile des 5., 9., 10. und 12. Nerven ergriffen, weniger die des 7. und gar nicht die des 3., 4. und 6. Nerven. Diese sind häufig beim Menschen ergriffen und stellen das vollständige Bild des Botulismus dar. In dieser Hinsicht unterscheidet sich also der Botulismus des Menschen von dem der Tiere. Man ist geneigt, die Wirkung des Toxins in die Nervenzentren zu verlegen, daher die Bezeichnung bulbäre und spinale Paralyse. Diese Auffassung mag eine gewisse Berechtigung haben. Die Verfasser sind aber geneigt, die Toxinwirkung in die Nervenenden zu verlegen. Nach ihrer Auffassung besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Bilde der Kurarevergiftung, wenn der Botulismus sich damit auch nicht vollständig deckt. Die Erhaltung der Reflexe während des ganzen Krankheitsverlaufes beweist das Vorhandensein eines intakten Reflexbogens, der ja im Hals- und Rückenmark gelegen ist, was also gegen eine Beschädigung der Zentren sprechen dürfte. Wie dem auch sei, jedenfalls ist das Toxin ein Nervengift, dessen Wirkung sich nur auf die motorischen Nerven erstreckt.

An Heilung des Botulismus ist kaum zu denken, auch nicht mit spezifischen Sera. Die Lösung der Aufgabe liegt in der Verhütung. Die Ätiologie gibt die Weisung dafür: Verhüten, daß Futter mit faulenden Kadaverflüssigkeiten befudelt wird, Verhüten überhaupt, daß tierische Kadaver in die Futtermittel geraten. Die Weide bedarf besonderer Aufmerksamkeit, und die Prophe-

tie verlangt eine streng durchgeführte Beseitigung aller Kadaver durch Vergraben oder Verbrennen. In Südafrika besteht das souveräne Mittel bei der Verhütung der Krankheit in der Bekämpfung der Osteophagia durch systematisches Verfüttern von Knochenmehl. Dadurch wird der Phosphormangel im Grafe gedeckt, die Tiere suchen keine Knochen mehr und damit hört die Vergiftung auf. Amerikanische Autoren haben versucht, die Futtervergiftung der Pferde mittels prophylaktischer Seruminjektionen zu verhüten, und im Experiment scheint dies auch gelingen zu sein.

Ziegler,

Duvillard, A.: A propos d'un cas d'hydropisie des enveloppes foetales. (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 395.)

Über die Ursachen der Eihautwassersucht, die nach der Literatur zu urteilen nicht häufig ist, wissen wir wenig. Verf. beurteilt einen Fall. Eine Simmenthaler Kuh zeigte für den 7. Trächtigkeitsmonat eine auffallende Größenzunahme des Uterus, die auf die Pansenstätigkeit einen stark mechanisch hemmenden Einfluß ausübte und auch sonst verschiedene klinische Erscheinungen (abnorme Weichheit und Fluktuation) im Bauch zeigte. Die Diagnose lautete auf Eihautwassersucht. Bei der Sektion ergab sich, daß die Nabelschnur gedreht war, so daß eine Stauung der Blutzufuhr eintrat, die sich in Transsudation von Flüssigkeit im Eihüllen-Gewebe geäußert hat. An den anderen Organen war nichts zu finden.

H. G.

Nahrungsmittelhygiene.

Kolbe, F.: Die sanitätspolizeil. Beurteilung der Schweinepest. (Zschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene, 38. Jhg., S. 227/28.)

Nach Besprechung der Diagnostik der Schweinepest, wobei es auch sanitätspolizeilich auf eine Unterscheidung von Viruspest, Mischinfektion und bazillärer Form dieser Seuche nicht ankommt, macht Kolbe mit Rücksicht auf das Vorkommen von Paratyphusbakterien im Fleische schweinepestkranker Schweine darauf aufmerksam, daß eine bakteriologische Fleischuntersuchung vorgenommen werden müsse, sobald Verdacht auf eine Paratyphusinfektion des Muskelfleisches vorliegt. Dies ist vor allem bei einer stärkeren Schwellung der Milz der Fall. Werden in den eingefandten Muskelproben Paratyphus B- oder Enteritisebakterien oder Tierseuchenerreger, zu denen auch der Bac. paratyphos. supestifer gehört, nachgewiesen, so ist das Fleisch des betr. Schweines für untauglich zu erklären.

Edelmann.

Raschke, O.: Die elektrische Betäubung des Schlachtviehes. (Zschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene, 38. Jhg., S. 209—214.)

Zur Prüfung der Frage, ob die elektrische Betäubung allen Anforderungen der Humanität Rechnung trägt und andererseits praktisch verwertbar ist, hat Raschke eine Anzahl Versuche an Rindern vorgenommen. Der zur Verwendung gelangte Gleichstrom hatte eine Spannung von 120 Volt. Die eine Elektrode wurde in der Lendengegend in Form eines sattelförmigen 1 mm dicken Kupferblechs von etwa $\frac{1}{5}$ qm Ausdehnung angebracht und durch einen Gurt festgehalten. Als andere Elektrode fand ein $\frac{3}{4}$ zölliges, flach geschlagenes Kupferrohr Verwendung, das an einem einfachen, behelfsmäßigen Zaun befestigt war und in der Maulhöhle quer über die Zunge verlief. Sobald sich das Tier im Stromkreis befand, stürzte es nicht wie beim Erschießen blitzartig zusammen, sondern es sank zu Boden. Die gesamte Muskulatur, vor allem die der Gliedmaßen, streckte sich. Eine zweimalige Einschaltung des elektrischen Stromes auf fünf Sekunden mit einem Zwischenraum von einer Sekunde führt eine vollständige Betäubung des Tieres herbei, ohne es zu töten und ohne die Ausblutung nachteilig zu beeinflussen. Irgend ein nachteiliger Einfluß auf die Beschaffenheit des Fleisches konnte, gleichviel ob die Tiere nach der Betäubung geschächtet oder abgestochen wurden, nicht beobachtet werden.

Zusammenfassend läßt sich folgendes sagen: Der elektrische Strom ist zur Betäubung von Schlachtvieh geeignet. Die elektrische Betäubung kann das rituelle Schächten der Juden vom humanen Standpunkt aus in wertvoller Weise ergänzen. Damit ist z. Zt. die praktische Verwendbarkeit der elektrischen Betäubung erschöpft, da ihre Durchführbarkeit bei Schweinen und Kleinvieh auf technische Schwierigkeiten stößt, und beim Rinde ein Bedürfnis für die Einführung neuer Methoden nicht vorliegt.

Ein Literaturverzeichnis mit 28 Nummern ist der interessanten Arbeit angefügt. Edelmann.

Bolle, W.: Beiträge zur Technik der bakteriologischen Fleischbeschau. (In.-Diss. Berlin 1925.)

Die zuverlässigste Methode der Oberflächensterilisierung von Fleisch- und Organproben besteht in der Verwendung der Gebläselampe. Keime, die in der Tiefe von 1 cm lagern, sind erst nach drei Minuten langer Einwirkung der Stichflamme gefährdet. Ein einfaches Mittel, die Instrumente (Messer und Pinzetten) zu sterilisieren, besteht darin, daß man sie in der Flamme des Bunsenbrenners abbrennt und bis zum Gebrauch in Brennspirituss verewahrt. Die Verfüguug des preußischen Landwirtschaftsministeriums vom 20. April 1914 wird den anatomischen Verhältnissen nicht gerecht, wenn sie verlangt, aus Beugern und Streckern der Vorder- und Hinterfüße würfelförmige Stücke von 6+8 cm Seitenlänge herauszuschneiden. Zur bakteriologischen Untersuchung des Muskelfleisches der Schweine entnimmt man Stücke aus Schinken- und Nackenmuskulatur oder nach Vierteilung der Tierkörper aus Rücken- und Lendenmuskeln. Bei der Untersuchung von Kälbern, Schafen und Ziegen können Beuge- und Streckmuskeln der Vorder- und Hinterfüße verwandt werden. Das geeignetste Umhüllungsmittel der Fleisch- und Organproben ist Kleie oder Sägemehl. Es ist zu verlangen, daß bei der Zufendung des Materials durch Boten zur Verpackung steifwandige Behälter Verwendung finden. Die Proben sind vor ihrer Abendung durch den Tierarzt mit dem Untauglichkeitsstempel zu versehen. Faszien auf der Oberfläche von Muskelfleischproben müssen vor der Oberflächensterilisierung entfernt werden. Fleischwürfel ohne Faszien, die erst einige Zeit nach der Entnahme aus dem Tierkörper untersucht werden, sind in ihren Oberflächendesinfektion eine 2—3 cm dicke Schicht abgetragen. Von den Anreicherungsverfahren ist das Einbringen kleiner, steril entnommener Muskelstücke in Nährbouillon das einfachste und zuverlässigste. Bei der bakteriologischen Untersuchung der Fleischlymphknoten verdient die Kniekehldrüse wegen ihrer morphologischen Beschaffenheit den Vorzug vor der Kniefaltendrüse. Der von Grunt festgestellte sehr hohe Prozentsatz von keimhaltigen Lymphknoten gesunder Schlachtrinder muß auf eine unzweckmäßige Anreicherung des Untersuchungsmaterials zurückgeführt werden. Röhrenknochen sollen im uneröffneten Zustande dem bakteriologischen Institut zugestellt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann aber auch bei Knochen mit freigelegtem Mark ein zweifelfreies Untersuchungsergebnis erzielt werden.

A.

Englmann, K.: Das heutige Molkereiwesen und seine Beziehung zur Typhusfrage in Pommern. (Aus d. Medizinischen Universitätsklinik Greifswald. — Direktor: Prof. Dr. H. Straub.) (Zeitschr. für Hygiene 1928, 108, H. 2, S. 292.)

Englmann hatte anlässlich einer durch eine Molkerei in Pommern verbreiteten Typhusepidemie Gelegenheit, Erfahrungen über die Molkereiverhältnisse in einem Teile Pommerns zu sammeln. Er konnte im Kreise Naugard 26 Molkereien, und zwar 25 Genossenschaftsmolkereien und 11 Privatmolkereien, kontrollieren. Einrichtung und Betrieb der Genossenschaftsmolkereien sind durchweg als reinlich und einwandfrei zu bezeichnen. Ganz anders aber lagen die Verhältnisse bei den Privatmolke-

reien. Englmann hebt hervor, daß von diesen unkontrollierbaren Zwergbetrieben die Gefahren der Seuchenverbreitung ausgehen. Ihre Aufhebung würde uns dem Ziel der Bekämpfung der Typhusgefahr um einen großen Schritt näherbringen. Ziegler.

Standesangelegenheiten.

Verein Ostfriesischer Tierärzte.

Verfammluug 13. Mai 1928 in Emden.

Anwesend 25 Mitglieder. 1. Da für die Errichtung einer Buchstelle unter den Mitgliedern keine Stimmung herrscht, soll die Angelegenheit ruhen bleiben. 2. Prof. Dr. Hupka - Hannover: „Die hypoglykämischen Erkrankungen der Kühe mit besonderer Berücksichtigung der Azetonämie“. Den glänzenden Ausführungen des Vortragenden, die gerade in unserem Hochzuchtgebiet viele neue Anregungen boten, schloß sich eine lebhafte Aussprache an. 3. Reg.- und Vet.-Rat Dr. Peters machte der Verfammluug Mitteilung von dem Entwurf zur Kammerwahlordnung. Die dort vorgesehene Listenwahl fand in keiner Weise die Zustimmung der Verfammluug. 4. Zum Punkte „Fleischbeschau“ wurden die Kollegen wiederum ermahnt, in der Beurteilung vor allem von Notchlachtungen und unreifen oder abgemagerten Tieren strengste Sorgfalt walten zu lassen und sich bei der Beschau aller zu Gebote stehenden Hilfsmittel besonders der bakteriologischen Fleischbeschau zu bedienen. Dr. Neemann, Schriftf.

Niederfachlengruppe des Reichsverbandes praktischer Tierärzte e. V.

23. Hauptverfammluug am 19. Mai 1928, im Brauergildehaus zu Hannover.

Der Vors. begrüßt zunächst alle erschienenen Kollegen, insbesondere den Ehrenvorsitzenden der Gruppe, Kollege Friese. Er weist darauf hin, daß dem letzteren seit der letzten Gruppenverfammluug die wohlverdiente Krönung seines Lebens zuteil geworden ist, dadurch, daß der Landtag das Tierärztekammergesetz angenommen hat in einer Form, wie er es wünschte und wie es allein der Lage der praktischen Tierärzte entspricht. Er bittet die Erschienenen, zu Ehren des Kollegen Friese sich von ihren Plätzen zu erheben. Des weiteren kann er mitteilen, daß nach einer Meldung der Direktion des Preuß. Landtages vom 13. April 1928 der Geschäftsstelle des T. K. A. mitgeteilt ist, daß die Vollsitzung des Landtages dem Beschlusse des Ausschusses für die Landwirtschaft beigetreten ist und die Eingabe des Reichsverbandes der deutschen Großschlächter in Berlin gegen die Erhöhung der Fleischbeschaugebühren vom September 1927 zurückgewiesen hat. Damit hat der Landtag die Berechtigung der Erhöhung der Fleischbeschau- und Trichinenschaugebühren anerkannt. Der Vors. macht dann noch die Verfammluug darauf aufmerksam, daß seitens des T.K.A. und des Präsidenten des R. P. T. mit der Vereinigung deutscher Schweinezüchter- und -Mäster betreffs der Rotlaufimpfgebühren ein Abkommen getroffen ist, um die Laienimpfung nach Möglichkeit auszuschließen. Auf Grund dieses Abkommens werden den Mitgliedern der Vereinigung deutscher Schweinezüchter und -Mäster 20 Prozent Ermäßigung auf die lokalen Impftarife seitens der Impftierärzte gewährt, wenn zur Impfung etwa 50 Schweine angemeldet werden, die an einem Tage geimpft werden können und wenn der Zeitpunkt der Impfung vom Tierarzt bestimmt bzw. mit ihm vereinbart wird. Bei besonders großen Beständen ist ein Sonderabkommen zwischen Tierarzt und Schweinehalter möglich. Den praktischen Tierärzten ist das Recht der Feststellung des Rotlaufs erhalten geblieben und sind entsprechende Formulare zur Anmeldung des Rotlaufs an die Polizeibehörden vom Ministerium entworfen. Er bittet die Kollegen, nun aber auch ihrerseits die Formulare auszufüllen und abzuschieken. Der Vors. bedauert, daß vom Akademischen Auskunftsamt in Berlin die Ausichten des tierärztlichen Berufes noch immer als normale bezeichnet werden und daß solche Artikel in den Tageszeitungen verbreitet werden. Er macht darauf aufmerksam, daß Kollege Friese sich durch ein Schreiben vom 16. März hiergegen gewandt hat und verweist auf den Artikel in den Tierärztlichen Mitteilungen Nr. 12. Die Mitglieder werden dann noch gebeten, den Fragebogen des Reichsverbandes, der der Nr. 18 der Tierärztlichen Mitteilungen beigelegt hat, genau auszufüllen und dem Präsidenten des R. P. T., Kollegen Train, einzufenden. Dann berichtet der Vors. über die vom Reichsarbeitsministerium ergangene Anfrage über eine

allgemeine Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung für Angehörige der Heilberufe. Er kann hierzu berichten, daß der Hartmannbund der Ärzte sich gegen die Einführung einer solchen Versorgungseinrichtung ausgesprochen hat. Auf Grund dieser Ausführungen hält die Versammlung die Einführung einer solchen Versorgung nicht für wünschenswert, insbesondere auch deshalb, weil die meisten Tierärzte als in der Fleischbeschau tätig, heute der Angestelltenversicherung unterliegen. Es muß das eifrigste Bestreben aller Tierärzte sein, diese Angestelltenversicherung noch weiter auszubauen. Als Delegierte für die R. P. T.-Tagung in München werden bestimmt die Kollegen Friese, Machens, Heinemann, Dreyer, Ehlers und Wewer. Von diesen haben die vier ersten ein Referat übernommen. Ausgeschlossen sind wegen Fortzuges: Dr. Frerichs, Dr. Hüttig, Dr. Sommermeyer. Neu aufgenommen: Sachleben-Bad Lautenberg, Dr. Bütter-Rütenbrock (Kr. Meppen), Dr. Helmerlingen, Dr. Wittenberg-Stadthagen, Bollinger-Langlingen, Dr. Priewe-Bremen, Dr. Kunze-Berlinchen. Der Vors. berichtet dann über die bevorstehende 150jährige Jubelfeier der Tierärztlichen Hochschule. Die Feier wird eine ganz bedeutende werden und dazu beitragen, das Ansehen des tierärztlichen Standes in jeder Weise zu heben. Er berichtet, daß 64 Rektoren von in- und ausländischen Universitäten und Hochschulen ihre Teilnahme angemeldet haben und er mahnt alle Kollegen, schleunigst ihre Teilnahme anzumelden, soweit das noch nicht geschehen ist. Bei dieser Gelegenheit macht er darauf aufmerksam, daß der im Kuppelsaal der Stadthalle am 14. Juni, vormittags 11 Uhr, stattfindende Festakt durch Rundfunk über ganz Deutschland verbreitet werden wird, so daß alle diejenigen Kollegen, die verhindert sind, am Feste persönlich teilzunehmen, durch den Rundfunk die Möglichkeit erhalten, der Feier im Geiste beizuwohnen. Kollege Friese macht darauf aufmerksam, daß in verschiedenen Tageszeitungen über eine Versammlung der Gemeindetierärzte in Lüneburg Berichte erschienen sind, die seitens des praktischen Tierarztes nicht unwidersprochen bleiben dürfen. Der Vors. wird beauftragt, sich dieserhalb an den Vors. des Vereins der nordwestdeutschen Gemeindetierärzte zwecks Abänderung zu wenden. Mit Worten des Dankes schließt der Vors. die Versammlung um 18,30 Uhr.

Dr. Machens, Vors. Dr. Heinemann, Schriftf.

Verein Kurhessischer Tierärzte.

Frühjahrsversammlung 25. März 1928 in Kassel.

Anwesend 49 Mitglieder. Der Vors. empfiehlt einen Film über Tuberkulose für Vorträge in landwirtschaftlichen Kreisen; ferner die Zeitschrift für Kaltblutzucht. Neu aufgenommen werden: Generaloberveterinär a. D. Dr. Breithor-Marburg (Lahn), Oberstabsveterinär a. D. Dr. Ibel-Hoheneiche, Dr. Hoernack-Niederhone, Dr. Arnold-Wanfried, Stelkens-Neustadt und Dr. Schults-Grebenstein. Darauf empfiehlt der Vors. nochmals die Jubiläumsspenden für die Tierärztliche Hochschule Hannover und für Prof. Ellenberger. Für letzteren wird beschlossen, außer einem Glückwunschtelegramm einen Betrag von Mk. 100,— aus der Kasse zu übersenden mit Rücksicht darauf, daß Prof. Ellenberger Ehrenmitglied unseres Vereins ist. Es wird beschlossen, den Jahresbeitrag von Mk. 5,— jährlich beizubehalten. Dr. Karsten: „Das Zusammenarbeiten der prakt. Tierärzte mit dem Tierseucheninstitut der Landwirtschaftskammer.“ In 1½stündiger, eingehender Rede führte der Vortragende aus, daß früher eine Zusammenarbeit der Tierärzte mit den bakteriologischen Instituten nur in geringem Maße stattgefunden hat. Heute sei das anders. Heute werden die Institute oft mehr als notwendig in Anspruch genommen, d. h. auch in Fällen, wo der Praktiker selbst die Untersuchung vornehmen kann, z. B. Untersuchung von Kotproben auf Leberegelier u. ä. Dagegen ist es durchaus notwendig, daß der prakt. Tierarzt mit den bakteriologischen Instituten arbeitet in der bakteriologischen Fleischbeschau, in serologischen Untersuchungen usw.; damit läßt er auch die Verantwortung in den betr. Fällen von sich auf andere Schultern. Zur Zeit ist bekanntlich auch eine gesetzliche Grundlage für die bakteriologische Fleischuntersuchung geschaffen. Darauf geht der Redner über zu den hauptsächlichsten Seuchen, bei denen der Praktiker mit dem bakteriologischen Institut zusammenarbeiten muß. Zum Schluß empfiehlt er auch bei der Sterilitätsbekämpfung ein Zusammenarbeiten und weist auf die Gebiete hin, die uns zu entziehen z. Zt. andere Wissenschaftler, Laien und Pfuscher bemüht sind. Hierzu gehören in erster Linie die

Nahrungsmittelchemiker, die die Milchkontrolle vollständig an sich reißen wollen und sie bereits zum großen Teil an sich gerissen haben. Aber auch diplom. Landwirte bemühen sich, rein tierärztliche Gebiete zu erobern. Das Kapaunisieren, die Bekämpfung von Geflügel- und besonders Kükenkrankheiten in den Geflügelfarmen wird vielfach von Laien ausgeführt. Es sei daher unbedingt notwendig, daß auf vielen Gebieten eine enge Zusammenarbeit der Tierärzte mit den bakteriologischen und Seucheninstituten Platz greift, denn nur so kann die durchaus notwendige Einigkeit beibehalten bleiben. Eine lebhafte Aussprache schloß sich dem Vortrage an. Dieselbe fand ihren Niederschlag in folgendem Beschluß: Wenn sich in besonderen Fällen bei der Sterilitätsbekämpfung die Zuziehung eines Fachtierarztes der Landwirtschaftskammer Hannover als notwendig erweist, so wird diese dafür Sorge tragen, daß der behandelnde Tierarzt zu den fachtierärztlichen Untersuchungen zugezogen wird. Über die Kosten der bakteriologischen Fleischbeschau entpann sich eine lebhafte Debatte, weil sie im allgemeinen zu hoch seien, besonders in Frankfurt a. M. Es werden dann noch mehrere Fleischbeschaufragen besprochen. Hierauf referiert Dr. Beier-Niederaula über eine Ergänzung der Gebührenordnung bei Abgabe von Arzneimitteln auf Grund des Min.-Erlasses vom 17. Febr. 1928. Gemäß seines Referats wird die Gebührenordnung des V.K.T. unter „1. Allgemeine Bestimmungen“ folgendermaßen geändert: § 5. Alle dem Tierarzte entstehenden Auslagen (Umsatzsteuer, Papier, Porto, Telephonegebühren, Telegramme usw.) müssen vom Tierbesitzer voll bezahlt werden und sind der berechneten Gesamtsomme zuzuzählen. § 6. Die Arzneien sind zu Preisen abzugeben, die die Arzneitaxe nicht überschreiten, haben sich vielmehr möglichst weit unter den in der Arzneitaxe vorgeschriebenen Preisen zu halten. Die Berechnung der tierärztlichen Verrichtungen und der abgegebenen Arzneien in einer Pauschsumme ist unzulässig, vielmehr muß dem Tierbesitzer in jedem Falle, spätestens nach erfolgter Bezahlung der ihm zugestellten Rechnung, eine Einzelberechnung der Arzneipreise zugestellt werden.

I. A.: Dr. Rathje.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Der Geheime Regierungsrat Prof. Dr. et Dr. h. c. R. Schmaltz ist am 1. Juni auf seinen besonderen Wunsch vorzeitig von seinen amtlichen Verpflichtungen an der Tierärztlichen Hochschule, der Landwirtschaftlichen Hochschule und beim Landesveterinäramt zu Berlin entbunden worden. Am 19. Mai hielt er seine letzte Vorlesung über Anatomie. Die besonderen Ehrungen, die ihm anlässlich einer Abschiedsvorlesung von Seiten des Professorenkollegiums, der Assistentenschaft, der Studentenschaft und darüber hinaus von vielen Berliner und auswärtigen Tierärzten und Behörden geplant und in die Wege geleitet waren, hat er zum allgemeinen Bedauern nicht angenommen. Am 24. Mai hat Geheimrat Schmaltz sich in einer Sitzung des Professorenkollegiums als Direktor des Anatomischen Institutes verabschiedet. Der Rektor sprach ihm im Namen des Kollegiums, dem er nahezu 40 Jahre angehört hat, den wärmsten Dank aus für seine unermüdliche, hervorragende und erfolgreiche Tätigkeit für die Hochschule, die Wissenschaft und den tierärztlichen Stand und gab Kenntnis von einem ehrenvollen Schreiben des Herrn Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Leider hat Geheimrat Schmaltz gebeten, auch von den vom Professorenkollegium geplanten Ehrungen und Festlichkeiten Abstand zu nehmen. Dankenswerterweise hat er sich auf Wunsch des Kollegiums entschlossen, im nächsten Wintersemester die Vorlesung über die Geschichte der Tierheilkunde weiter zu lesen. St.

Antrittsvorlesung an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Am 21. d. Mts. hielt der Honorarprofessor für Bienenkunde und Bienenkrankheiten an der Tierärztlichen Hochschule Hannover und Direktor des Landesinstituts für Bienenforschung und bienenwirtschaftliche Betriebslehre in Celle, Prof. Dr. Koch, vor versammeltem Lehrkörper, der Studentenschaft und zahlreichen Ehrengästen in der Aula der Hochschule seine Antrittsvorlesung über das Thema: „Zweck und Ziel der deutschen bienenwirtschaftlichen Forschungsanstalten (mit Lichtbildern)“. Der Vortragende führte etwa folgendes aus: Um die Jahrhundertwende gab es rund 2½ Millionen Bienenvölker in deutschen Landen. Diese erzeugten jährlich durchschnittlich für 35 Millionen Mk.

Honig, Wachs und Schwärme. Vergleicht man diese Bruttoerträge der deutschen vorkriegsmäßigen Imkerei mit den entsprechenden Zahlen anderer Zweige unserer damaligen Volkswirtschaft, so erfieht man, daß sich die deutsche Bienenzucht schon allein durch diese unmittelbaren Erträge mit vielen Produktionsgebieten sehr wohl messen konnte. So wurden im Jahre 1913 bei der Ölgewinnung 5,5 Millionen, beim Steinsalzbergbau 6,9 Millionen, bei der Teererzeugung 27,1 Millionen, bei der Benzolproduktion 32,1 Millionen, beim Weinbau 41 Millionen und bei der See- und Küstenfischerei 45 Millionen Mark als Brutto-Erträge erzielt. Zu ganz anderen Vergleichszahlen für die Bewertung der deutschen Bienenzucht kommt man aber, wenn man die indirekten Werte, die durch die Bestäubungsarbeit der Bienen erzeugt werden, in Rechnung stellt. Etwa drei Viertel aller für die Bestäubung unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen bei uns in Frage kommenden Insekten sind Honigbienen. Auf eine Insektenbestäubung sind angewiesen neben unseren Obstbäumen und Beerensträuchern noch eine außerordentliche Fülle anderer Kulturpflanzen, wie Raps, Rüben, Buchweizen, Kleearten, Leindotter, Mohn, Esparsette, Luzerne, Seradella, Gurken, Küchen- und Arzneikräuter usw. Sie alle bedürfen zur Körnerbildung oder zur Samenerzeugung der Befruchtung ihrer Samenanlagen, also der Bestäubung. Der vorkriegsmäßige Jahresertrag unserer deutschen Obsternte wurde auf 500 Millionen, der Ertrag der anderen genannten Nutzpflanzen auf 130 Millionen Goldmark geschätzt. Das sind zusammen 630 Millionen Goldmark. Davon verdankt die Landwirtschaft den Bienen etwa drei Viertel; das sind rund 450 Millionen Goldmark. Wenn auch diese Summe gelegentlich nur auf 200 Millionen Mark geschätzt worden ist, so ergibt sich als Wertzahl für die deutsche Bienenzucht vor dem Kriege immer noch die ansehnliche Summe von 35 Millionen Mark (für die direkten Erträge) plus 200 Millionen (für den indirekten Nutzen); das sind zusammen 235 Millionen Goldmark. Im Jahre 1913 ergaben sich für die Eisenerzgruben 115,7 Millionen, für den Braunkohlenbergbau 191,2 Millionen, für die Binnenfischerei 200 Millionen Goldmark als entsprechende Wertzahlen, so daß die vorkriegsmäßige deutsche Imkerei eine sehr achtunggebietende Stellung im Rahmen der deutschen Erzeugung einnahm. Leider ist die Zahl der Bienenvölker in Deutschland während des Krieges und vor allem in der Nachkriegszeit um rund 33 Prozent zurückgegangen und damit natürlich auch die Wertzahl für die direkten und indirekten Erträge der deutschen Imkerei. Daß infolgedessen die Einfuhrzahlen für Auslandshonig (von 4,5 Millionen Kilogramm im Jahre 1925 auf 7,8 Millionen Kilogramm im Jahre 1927) stieg, ist selbstverständlich. Aber diese Tatsache allein läßt den Rückgang der deutschen Bienenzucht noch nicht in solch hohem Maße bedenklich erscheinen. Bei der Imkerei liegen die Verhältnisse in erster Linie im Hinblick auf den indirekten Nutzen der Bienen als Bestäuber unserer Kulturpflanzen so sehr besorgniserregend. Das viel zitierte Wort, daß nach einem Untergang der deutschen Bienenstände die Staatsverwaltungen von sich aus Bienenstände in deutschen Ländern einrichten und unterhalten lassen müßten, hat noch nie diese Bedeutung erlangt wie gerade heute. Als Hauptursachen des erschreckenden Rückganges der deutschen Bienenzucht hat man die Mißernten in den letzten Jahren, die Bienenkrankheiten, den Wegfall des Bienenzucker-Steuerprivilegs, die Verteuerung der bienenwirtschaftlichen Gerätschaften, den Rückgang der Bienenweide und die Konkurrenz seitens des Auslandshonighandels bezeichnet. Zur wissenschaftlichen Erforschung und klaren Erkennung all dieser Mißstände, zur Schulung und Weiterbildung der Imker sind nun — hauptsächlich in den Nachkriegsjahren — in fast allen preußischen Provinzen und in den meisten außerpreußischen Ländern staatlicherseits oder mit namhafter Staatsunterstützung eine Reihe von Instituten für Bienenkunde und Bienenzucht geschaffen worden. Im ganzen gibt es jetzt 14 derartige Anstalten. Einige, wie die Institute in Erlangen, Berlin und Celle tragen vorwiegend wissenschaftlichen Charakter; andere leisten als sogenannte Versuchs- und Lehranstalten für Bienenzucht in der Hauptfache praktische Imkerschulungs-Arbeit. Der Aufgabenbereich dieser Anstalten umfaßt im wesentlichen folgende Gebiete: Erforschung des Bienenlebens, Feststellung und Bekämpfung von Bienenkrankheiten, Zucht hochwertiger Königinnen, Erprobung alter und neuer Bienenwohnungen und Geräte, Untersuchung von Bienen-Nährpflanzen, Prüfung von Honig- und Wachsarten, Beratung der Imker in allen Angelegenheiten der praktischen Bienenzucht durch Abhaltung von Vorträgen, Standbesuche usw. Wie außerordentlich notwendig die Gründung der wissenschaftlichen

Institute für Bienenkunde war, geht unter anderem auch daraus hervor, daß noch eine große Zahl wichtigster Probleme aus dem Bienenleben der Klärung harret: über den Erbvorgang, die Verdauungsphysiologie, über viele Bienenkrankheiten, über eine Reihe grundlegender Fragen der Honig- und Wachschemie sind wir noch ganz ungenügend unterrichtet, und doch haben gerade diese Probleme die allergrößte Bedeutung für die praktische Bienenzucht. Durch Zusammenschluß der deutschen Bienenforscher wie der Leiter der preußischen Versuchs- und Lehranstalten soll eine Zusammenarbeit der Institute versucht werden. Und vielleicht dürfen unsere Anstalten in der erfreulichen Tatsache, daß in den Jahren 1925, 1926 und 1927 in Preußen die Zahl der Bienenvölker erneut um 8 Prozent zugenommen hat, ein erstes nach außen hin in Erscheinung tretendes Zeichen für den Erfolg ihrer unausgesetzten Bemühungen, um die Förderung der deutschen Bienenzucht sehen! Dankbar ist es auch zu begrüßen, daß durch Schaffung der neuen Honorar-Dozentur für Bienenzucht an der Tierärztlichen Hochschule Hannover nunmehr auch den Studierenden der Tierheilkunde Gelegenheit geboten wird, sich näher mit dem Leben der gesunden und der kranken Biene zu beschäftigen!

Veterinärat Schlägel-Kottbus †.

Am 15. Mai 1928 verschied Veterinärat i. R. Karl Schlägel in Kottbus im 67. Lebensjahre an den Folgen einer Oberarmfraktur. Sein Tod trifft die märkische Tierärzteschaft als ein besonders schmerzlicher Verlust. Mit Schlägel ist ein Mann aus ihren Reihen geschieden, der sich durch seine aufrichtige Art, seinen Frohsinn und seine Herzengüte, die ihn jederzeit zu selbstloser Hilfe bereit sein ließ, unter seinen Kollegen viele Freunde erworben hatte. Er war ein Mann, der die Entwicklung des tierärztlichen Berufes immer mit größter Anteilnahme verfolgte und das tierärztliche Vereinsleben in seiner Heimat nach Kräften gefördert hat. Bei den Landwirten seines Wirkungskreises genoß Schlägel wegen seiner reichen Erfahrungen und Tüchtigkeit einen guten Ruf. 35 Jahre war er im Staatsdienst tätig und hat sich darin durch seine große Gewissenhaftigkeit und seinen unermüdlichen Fleiß ausgezeichnet. Sein Beruf ging ihm über alles. Erholung und Kraft zu neuem Wirken fand er im Kreise seiner Familie, an der er mit größter Liebe hing. In Zinna, Kreis Jüterbog geboren, ist er seiner märkischen Heimat seinem Leben lang treu geblieben. Nach dem Studium in Berlin praktizierte er in Rhinow und Jüterbog, bis er 1892 als Kreistierarzt in Lübben bestellt wurde. 1910 übernahm er die Geschäfte des Nachbarkreises Kottbus. 1927 schied er aus dem Amte, doch ließ ihn auch nachher seine Arbeitsfreudigkeit nicht ruhen. Er unterstützte seinen Amtsnachfolger in dessen umfangreichen Dienstgeschäften und zog sich dabei vor einigen Monaten die verhängnisvolle Fraktur zu. Selbst als dem schwerkranken Mann der rechte Arm hatte abgenommen werden müssen, war es ihm noch nicht möglich, untätig zu Hause zu sitzen und als er endlich ganz an das Zimmer gefesselt war, setzte er noch den ihm besonders lieb gewordenen Unterricht an der Lehrschmiede fort. Zäher Arbeitswille und Pflichttreue waren die Richtschnur seines Lebens. Sie nötigten jedem Achtung ab, der sein Wirken verfolgte und sichern ihm ein treues Gedenken im Herzen aller, die ihm im Leben nahe standen. Dr. Wiendieck.

6. wissenschaftlicher Referierabend an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Donnerstag, den 7. Juni 1928, 20,15 Uhr im Hörsaal des Pathologischen Institutes: Dr. phil. Sokolowsky-Hamburg: „Das biologische Prinzip in Tierhaltung und Tierzucht“, mit Lichtbildern.

Zietzschmann.

Ellenberger-Schütz Jahresberichte.

Notiz an die Herren Autoren.

Da unser „Ellenberger-Schütz“ Jahresbericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinärmedizin in der Schrifttum häufiger als früher zitiert wird und sein langer Titel, der aus Gründen der Pietät und der Buchtechnik beibehalten werden muß, die Schriftumsverzeichnisse recht belastet, so schlage ich den Herren Autoren vor, in Zukunft für den ganzen Titel nur die beiden Buchstaben „ES“ (= Ellenberger-Schütz) zu gebrauchen. Diese Zitierungsart dürfte sich, falls sie Anklang findet, bald durchsetzen und brauchbar erweisen.

Neumann-Kleinpaul.

Bücherbesprechungen.

R ö s i ö, Birger: Die Bedeutung des Exterieurs und der Konstitution des Pferdes für seine Leistungsfähigkeit. Verlag von Richard Schoetz, Berlin-Upsala. 1927. 181 Seiten, 12 Figuren. Preis Mk. 9,—.

Der Verf. hat umfangreiche wertvolle Untersuchungen an Pferden über die Bedeutung des Exterieurs und der Körperkonstitution für die Leistungsfähigkeit in Schweden, Deutschland und Amerika vorgenommen.

Die nach G. Forsell ausgeführten Längen- und Winkelmessungen für die Festlegung der Exterieurverhältnisse wurden bei 55 nordischwedischen und 20 warmblütigen Trabern vorgenommen, außerdem noch für jedes Pferd die Schrittlänge, Schrittzahl, Schritt- und Kilometerzeit festgelegt. Die Schrittmessungen erfolgten im schnellsten Trab, meist auf vorher unbefahrenem schneefreiem Glatteis. Gerade auf dieser Bahn konnte Verf. eine große Präzision und Konstanz der Schrittlänge der einzelnen Pferde erzielen, durch die sich in der Regel die schnellsten und besten Pferde auszeichneten.

Unter Zugrundelegung der Hypothese der Stärke (Zugfestigkeit) der Mähnenhaare als Gradmesser der Konstitution wurden bei den gemessenen Pferden auch in dieser Richtung Untersuchungen angeschlossen. Von den aufgeführten Ergebnissen der Untersuchungen der beiden Rassen und Geschlechter seien besonders die bezüglich Überbau, Brusttiefe, Brustbreite, Mähnenhaarstärke der absoluten Schrittlänge wie derselben im Verhältnis zur Widerristhöhe und Brustbreite, der Schritt- und Kilometerzahl hervorgehoben.

Zwecks Feststellung der Wechselbeziehungen zwischen Exterieur und Konstitution gegenüber der Leistungsfähigkeit (Kilometerzeit) wurden Korrelationstabellen aufgestellt, aus denen der Korrelationsgrad zu erfassen ist bzw. durch Ermittlung der Korrelationskoeffizienten mit Hilfe der Bravais'schen Formel errechnet wurde.

Neben der Schrittlänge haben hiernach die Widerristhöhe und die Kreuzhöhe sehr große Bedeutung für die Geschwindigkeit. Überraschend wenig Bedeutung kommt den Brustmaßen zu, die bei Zugleistungen eine größere Rolle spielen. Ungefähr gleichgroßen Einfluß haben von den Extremitäten die Buglänge, die Oberarmlänge, die Länge des Oberschenkels, des Unterschenkels und der Hinterröhre, ebenso die Länge des Vorder- und des Hinterfußes. Dem Unterarm kommt merkwürdigerweise, eine wenn auch nur wenig, geringere Bedeutung zu. Die Kreuzlänge scheint nicht ganz die Bedeutung für die Geschwindigkeit zu besitzen, die man ihr allgemein zuzuschreiben pflegt. Die Gelenkwinkel zeigen ausnahmslos negative Korrelationskoeffizienten, d. h. je weniger stumpf sie sind, um so größer ist die Geschwindigkeit.

Bei getrennter Aufstellung der Koeffizienten für die beiden untersuchten Rassen ergeben sich bezüglich der Brust- und Extremitätenmaße deutlich unterschiedliche Werte, aus denen hervorgeht, daß für die Geschwindigkeit bei den nordischwedischen Pferden die Brust, bei den Warmblütern dagegen die Extremitäten eine größere Rolle spielen. Unter Zugrundelegung des aus sämtlichen Messungen gezogenen Mittelwertes werden dann die anderen Pferde auf dieses „Durchschnittspferd“ bezogen und die Plus- und Minusvarianten ermittelt. Hiernach lassen sich die Pferde bezüglich der Brust- und Extremitäten-Varianten in vier Gruppen einteilen; fog. Brustplus-Beinplus-Pferde, Brustplus-Beinminus-Pferde, Brustminus-Beinplus-Pferde, Brustminus-Beinminus-Pferde. Die ersteren sind stets gut, die letzteren stets schlecht. Die beiden Mittelgruppen zeigen auf der Rennbahn keine unterschiedlichen Leistungen, dagegen ist ohne weiteres einzusehen, daß bei der praktischen Arbeit, wie zum Ziehen von Lasten, die Brustplus-Beinminus-Pferde den Brustminus-Beinplus-Pferden nicht unbedeutend überlegen sind. Wenn die Leistungsprüfung auf der Trabrennbahn ihren Hauptzweck erfüllen will, nämlich eine Prüfung für die praktische Arbeit zu geben, so müßte die Bewertung teilweise anders gestaltet werden.

Des weiteren werden die Korrelationen der einzelnen Extremitäten-teile zur Schrittlänge berechnet. Je längere Extremitätenteile, aber je verhältnismäßig kürzeres Röhrbein, und je kleinere Winkel, desto größere Schrittlänge. Das Überbautsein hat einen bedeutenden Einfluß auf die Schrittlänge und damit auf die Geschwindigkeit. Die alten Beobachtungen, daß beim Pferde hinsichtlich der Länge, Unterarm und Röhrbein umgekehrt proportional, Unterschenkel und Hinterröhre jedoch im Gegensatz zu den meisten Tieren direkt proportional sind, finden in den aufgestellten Korrelationskoeffizienten eine neue Stütze.

Die Zusammenordnung der Pferde nach ihren Übereinstimmungen in Exterieur und Konstitution (Mähnenhaarstärke) ergibt auch eine Übereinstimmung in der Leistung. Sind die Exterieurverhältnisse gleich, die der Konstitution jedoch nicht, so sind auch die Leistungen verschieden, derart, daß dabei das Tier, das die größere Mähnenhaarstärke besitzt, auch die bessere Leistung zeigt, weshalb Verf. sich zu dem Schlusse der Proportionalität zwischen Mähnenhaarstärke und Konstitution berechtigt glaubt. Bei gleicher Konstitution und verschiedenem Körperbau weist das Pferd mit günstigerem Körperbau auch die besseren Leistungen auf, woraus noch mehr die Bedeutung des Exterieurs für die Leistungsfähigkeit erhellt.

Die Mähnenhaarstärke ist im allgemeinen mehr eine Rasseeigenschaft als eine individuelle; es hat das Vollblut die stärksten Haare, der Ardennen die schwächsten, in der Mitte stehen das Halbblut und das nordischwedische Pferd. Die Auffassung, daß die weißen Haare schwächer seien, kann nicht bestätigt werden. Weiter hat Verf. in Amerika noch zur Ermittlung der Einwirkung des Exterieurs auf die Leistungsfähigkeit Untersuchungen ausgeführt, die in Reitproben mit Kavalleriepferden und Zugleistungsprüfungen am Dynamometer-Wagen bestanden. Die Reitproben vermochten nur ein Drittel der Pferde durchzuhalten, diese waren ausschließlich englische und arabische Vollblutpferde oder solche der Morganrasse. Alle Siegertiere zeichneten sich durch gute Brusttiefe, etwas vorwärts stehende Hinterbeine und vor allem tadellose Beinfstellungen und Beinbewegungen aus. Die Widerristhöhe hat im Gegensatz zur Brusttiefe bei dieser Leistungsprüfung nicht die große Bedeutung gehabt, wie bei den nordischwedischen Trabern, was auch einleuchtet, da es sich bei letzteren ja um kurze Schnelligkeitsproben, bei ersteren um Ausdauerproben handelte.

Die Prüfungen am Dynamometer ergaben, daß ein Pferd bis zu $12\frac{1}{2}$ Pferdestärken entwickeln kann, also über eine außerordentliche Kraftreserve verfügt. Die absolute Stärke ist in sehr hohem Maße abhängig von dem lebenden Gewicht des Pferdes, jedoch vermag ein Pferd im günstigsten Falle 92 Prozent seines Gewichtes hebend zu ziehen. (Für die Lokomotive beträgt der Wert nur 25 Prozent). Diese Zugfähigkeit des Pferdes läßt sich durch Belastung des Rückens steigern. Die besten Pferde hatten im großen und ganzen die größten Maße. Die sich über mehrere Monate erstreckenden Prüfungen eines Pferdepaares am Dynamometer von täglich achtfündiger Dauer ergaben folgendes:

Bei dem relativ kleinen Magen des Pferdes sind häufigere Gaben von kleineren Futterportionen sowie häufigere kurzdauernde Raften von günstigem Einfluß auf die Erhaltung des Körpergewichtes. Der empfindlichste Körperteil des Pferdes, der zuerst leidet, ist die Schulter. Durch Konstruktion von luftkollerartigen Kummetschirren konnte der Druck auf die Schulter gleichmäßig verteilt und die Beschwerden behoben werden. Demnächst erlitten bei der Arbeit auf den harten Wegen die Vorderbeine Schaden.

Trautmann.

Personal-Nachrichten.

Bestanden: die Prüfung für Veterinärärzte: Dr. Ewald Bürmann in Dortmund, Dr. Joseph Dröger in Ascheberg, Dr. Rudolf Eigendörfer in Hannover, Dr. Paul Geldsetzer in Berlin, Dr. Berthold Grasnick in Breslau, Dr. Kurt Rösler in Minden, Dr. Albert Schönwetter in Staffel (Lahn), Dr. Karl Schultz in Stettin-Bredow, Dr. Arthur Thalau in Bartenstein, Dr. Oskar Ullrich in Münster, Dr. Adolf Weyl in Kiel.

Approbiert in München: Otto Eckert aus Urach (Baden), Dr. Alfons Englert aus Dillingen a. D., Karl Essig aus Niedermoschel (Pfalz), Anton Kircher aus Egling (Oberbayern), Heinrich Thoma aus Amberg (Oberpfalz), Anton Weikl aus Thalmassing b. Regensburg.

Niedergelassen: Dr. Waldemar Rose, bisher Assistent am Bakt. und Seruminstitut Dr. Schreiber, G. m. b. H., Landsberg (Warthe), in Hermsdorf b. Berlin.

Gestorben: kommiss. Kreistierarzt Johannes Kröhn in Heydekrug (Memelgebiet); Oberreg.-Rat Denhardt in Würzburg.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zusendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Ausperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 23.

Ausgegeben am 9. Juni 1928.

36. Jahrgang.

Zwei Beobachtungen über die Ansteckungsfähigkeit bei Maul- und Klauenseuche.

Von Veterinärarzt Oehl, Kreisveterinärarzt i. R., Alzey.

Von den staatlichen Forschungsanstalten Infel Riems sind Übertragungsversuche bei Maul- und Klauenseuche (M.K.S.) ausgeführt worden, um festzustellen, wann frühestens eine künstliche Infektion möglich ist und wie lange diese Möglichkeit besteht. (Archiv für wissenschaftl. und praktische Tierheilkunde, Bd. 55, Heft 4). Die Versuche wurden mit Speichelimpfungen infizierter Tiere begonnen und die Dauer der Ansteckungsfähigkeit des Speichels und der Blafendeckenreste geprüft.

Das Ergebnis dieser Versuche ist: „Daß der reine Speichel nach der künstlichen Infektion von der neunten Stunde an bis zum sechsten Tage post infectionem (p. i.) für Meerschweinchen infektiös sein kann. Bei der Verimpfung von Blafendecken und aus diesen stammenden Epithelresten ließ sich das Virus bis zum elften Tage p. i. = acht Tage nach der Generalisation nachweisen.“

In obiger Veröffentlichung sind Versuche von Le Bailly auszugsweise wiedergegeben, der die Verhältnisse in der Praxis nachzuahmen und die Infektion durch Zusammenstellen in Seuchenställen unter Ausschluß jeder Desinfektion zu bewirken versucht hat. Le Bailly schreibt: „Wenn man von dem Zeitpunkte an, wo die Temperatur zu steigen beginnt, bis zum Ausbruch der Aphthen ein empfängliches Rind mit einem kranken in Kontakt bringt, so erwirbt ersteres unfehlbar die Seuche. Wenn man aber vier Tage nach dem Ausbruch der ersten Aphthe verstreichen läßt, welche in der Regel dem initialen Fieber folgt und äußerlich durch das Speicheln in Erscheinung tritt, und erst dann ein empfängliches Tier in den Stall bringt, so infiziert sich dieses nicht, trotzdem ein inniger Kontakt mit dem kranken Tier besteht, beide Tiere sechs Stunden lang an ein und demselben Ring angebunden sind, aus derselben Raufe und Krippe fressen, aus demselben Eimer saufen und dieselbe Streu benutzen und das neue Tier nach sechs Stunden auf den Standplatz des kranken Rindes gebracht wird.“

Vallée und Carré haben die Untersuchungen Le Baillys nachgeprüft und können sie im wesentlichen voll bestätigen. Auch sie konnten feststellen: „Daß der Speichel der erkrankten Rinder sehr schnell seine Infektiosität verliert. In einen nicht gereinigten und nicht desinfizierten Stall kann man empfängliche Tiere in engen Kontakt mit erkrankten Tieren bringen, deren Mundaphthen bereits vier Tage alt sind. Die empfänglichen Tiere werden in diesem Fall nicht erkranken.“

Der Befund bei den zur Ansteckung benutzten Virusträgern ist folgendermaßen beschrieben: „Ihre geplatzten Aphthen sind mit einer grauweißen Schmiere bedeckt, Epithelfetzen stoßen sich noch ab, schaumiger Speichel fließt aus dem Munde, und man hört von Zeit zu Zeit das charakteristische Schmatzen.“

Die natürlichen Ansteckungsvorgänge entsprechen nicht der künstlichen Übertragung, wobei ein sicheres Einbringen des Infektionsstoffes in frische Wunden stattfindet. Auch das vorgenommene lange Zusammenstehen und Verbringen in mit frisch seuchenkranken Tieren besetzten Ställen wird im Verkehr seltener vorkommen und mehr die kurzen Berührungen überwiegen. Es ist deshalb interessant, Beobachtungen aus der Praxis kennen zu lernen, die diese Versuche bestätigen.

Das bei direkter Berührung von Tieren, die schon einige Tage sichtbar krank waren, mit gefunden Tieren nicht immer eine Übertragung erfolgt, hat sich wiederholt gezeigt. Auf Grund dieser Erfahrung wurde mir gegenüber von Landwirten sogar die Ansteckungsfähigkeit der Maul- und Klauenseuche bestritten. Es soll nur ein besonders charakteristischer Fall erwähnt werden.

In einer Gemeinde wurde der Fasel zum Sprunge herausgeführt und lahmte. Das Rind wurde gedeckt. Der Faselhalter ließ durch den Schmied, der selbst Vieh besitzt und es auch selbst füttert, die Klauen des Bullen ausfeilen. Zugleich wurde ein Tierarzt zugezogen, der Maul- und Klauenseuche feststellte und meldete. An demselben Nachmittage erfolgte die amtliche Feststellung bei dem fraglichen Bullen, einem jüngeren Bullen und 2 Kühen des Bestandes. Das Gehöft des Schmiedes und des Besitzers des besprungenen Rindes wurde bestimmungsgemäß gesperrt. In beiden Gehöften ist die Maul- und Klauenseuche, wie die wiederholte Untersuchung ergab, nicht zum Ausbruch gekommen. Bei der Seuchenfeststellung waren Blafendeckenreste im Maule und an den Klauen nicht mehr zu finden, sie waren vollkommen abgestoßen und zeigten die Erosionsstellen eine frische rote Farbe (gefunde Granulation). Trotz der innigen Berührung beim Sprunge wurde die Seuche in diesem Stadium nicht mehr übertragen.

Umgekehrt und noch interessanter ist folgender Fall der Übertragung, der ausführlich geschildert werden soll.

Am 11. Februar 1927 wurde in A. um die Mittagszeit eine Kuh zum Fasel gebracht. Der Sohn des Halters führte den älteren Bullen heraus. Dieser ist langsam im Sprung. Er beroch und beleckte die Kuh in der Schamgegend. Jetzt kam der Faselhalter dazu und bemerkte, daß der Fasel

zitterte und leicht die Haare sträubte. Er ließ den Fasel wieder in den Stall bringen. Die Kuh wurde dann von dem jüngeren Fasel besprungen. Die Untersuchung des Fasels, die Abends stattfand, ergab leicht gestörte Futteraufnahme, gesträubtes Haar und Fieber. Eine Organerkrankung war nicht nachzuweisen, Rötung oder Veränderungen im Maule und im Klauenspalt nicht festzustellen. Es wurde der Verdacht einer beginnenden Erkrankung an Maul- und Klauenfeuche ausgesprochen und vorsorglich das Gehöft gesperrt. Am anderen Tage ist das Zittern und Sträuben der Haare noch stärker. Am Abend fand die zweite Untersuchung statt und wurde eine beginnende Aphthe am Rande des rechten Nasenloches und am zahnlosen Rande des Oberkiefers festgestellt. Die Haut im Klauenspalt, am Rande der Klauen und der Afterklauen war geschwollen und hochgerötet. Der Gang beim Herumtreten gespannt. Die generalisierte Aphthenfeuche war festgestellt. Nach zwei Tagen erkrankte der danebenstehende Bulle und dann das übrige Vieh und sämtliche Schweine.

Nach dem Sprungregister wurden die in den letzten vierzehn Tagen zugeführten Tiere ermittelt und die Gehöfte gesperrt, darunter das Gehöft der Kuh, die mit dem fiebernden Bullen in Berührung gekommen war. Aus diesem Gehöfte war zwei Tage vorher schon eine Kuh von demselben Bullen besprungen worden. In dem Gehöfte, das fast am anderen Ende des Dorfes liegt, waren neun Rinder. Die Kuh stand an der Wand am weitesten vom Stalleingang, die früher besprungene Kuh an sechster Stelle gerade an der Stalltür. Den Kuhstall besorgt die Frau mit Hilfe der Tochter, eine Magd ist nicht vorhanden, die landwirtschaftliche Arbeit wird durch den Knecht mit zwei Pferden ausgeführt und kommt dieser nicht in den Kuhstall. Die Pferde stehen auf der anderen Seite des Hofes in besonderem Stall.

Verkehr im Stall hatte nicht stattgefunden. Nur die beiden Kühe hatten den Stall verlassen, um zum Bullen gebracht zu werden. Der Weg dahin ist die Ortsstraße und ca. 400 m bis zum Fasel.

Die in Abständen vorgenommene Revision der gesperrten Gehöfte ergab deren Unverdächtigkeit. Auf Erfuchen wurde gelegentlich einer Durchfahrt (am Beginn des fünften Tages für die zuletzt besprungene Kuh) beide Kühe untersucht und zwar die an der Stalltür stehende zuerst. Im Maule und an den Klauen waren keine Veränderungen, auch kein Fieber zu bemerken. Die Temperatur wurde leider nicht gemessen.

Der Besitzer freute sich und sagte, er sei noch einmal gut durchgekommen. Er wurde jedoch auf die noch bestehende Möglichkeit des Ausbruches hingewiesen und die Sperre nicht aufgehoben. Zwei Tage später war die Er-

krankung der mit dem Fasel im Fieberstadium in Berührung gekommenen Kuh sichtbar, die zwei Tage früher besprungene Kuh war noch fieberfrei und unverdächtig. Der übrige Bestand und diese Kuh erkrankten einige Tage später.

Die Seuche ist somit in der Inkubationszeit (im fieberhaften Stadium) übertragen worden.

Es könnte eingewendet werden, daß die Kuh auf dem Wege zum Fasel oder durch Personenverkehr infiziert wurde. Hierzu ist zu bemerken, daß die am weitesten vom Eingange stehende Kuh zuerst erkrankte, daß vor dem Ausbruch beim Faselhalter die Seuche im Orte nicht bekannt war. Das fragliche Gehöft war das Zweite, das verfeuchte. Dann kamen erst einige Zeit später Neuausbrüche zur Anmeldung, die sämtlich um die beiden ersten Gehöfte herumlagen und so gewissermaßen zwei Seuchenzentren in dem langgestreckten Orte bildeten, während dazwischen weder in der Hauptstraße noch in Seitengassen des Ortes ein Gehöft verfeuchte. Da Todesfälle auftraten, die entschädigt wurden, ist nicht anzunehmen, daß nachdem der Ort einmal verfeucht war, eine Verheimlichung, die den Verlust der Entschädigung nach sich zog, stattfand. Es ist demnach das Betreten des Gehöftes des Faselhalters und das Belecken des im Fieberstadium befindlichen Bullen als die nächstliegende Ursache der Übertragung zu betrachten, zumal experimentell die Infektiosität des Speichels schon neun Stunden nach der Infektion festgestellt ist.

Diese Feststellungen sind veterinärpolizeilich für die Bekämpfung der Maul- und Klauenfeuche von hoher Bedeutung. Sie zeigen, daß bei Erstausbrüchen in seither freien Gemeinden die Schutzmaßregeln zu spät einsetzen, die in den jetzigen Bestimmungen vorgeschriebene lange Sperrdauer der Seuchengehöfte nicht mehr wissenschaftlich begründet ist, die Maßnahmen in den Gefahrenzonen erhöhte Bedeutung haben und in Seuchenzeiten der Verkehr in Ställen eine große Verschleppungsgefahr bedeutet, die die Landwirte mit Recht fürchten. Geht doch die Furcht oft so weit, daß in Seuchenzeiten lieber auf tierärztliche Hilfe verzichtet wird, als daß ein Tierarzt geholt und in den Stall gelassen wird, weil er angeblich die Seuche verschleppt.

Für die Ausübung der Praxis ergibt sich hieraus die Forderung, in den Fällen, wo fiebernde Tiere untersucht wurden, ohne daß eine das Fieber verursachende Erkrankung ermittelt werden konnte, das Betreten anderer Ställe und die weitere Untersuchung von Klauenvieh vor Wechsel der Kleidung und des Schuhwerks zu vermeiden, da das Maul- und Klauenfeuchevirus schon im Fieberstadium mit den Sekreten ausgeschieden wird und übertragen werden kann, auch wenn jede sichtbare Erkrankung fehlt.

Halten die Konservierungssalze des Hackfleischs wirklich eine bakterielle Zersetzung hintan?

Von Dr. Walther Mathieu, 2. Polizeitierarzt zu Hannover.

Hackfleisch (Schabefleisch, Mett usw.) verliert bekanntlich bereits kurze Zeit nach seiner Herstellung, namentlich wenn es ohne Eis frei im Laden steht, sein frisches Aussehen, wird glanzlos, später grau und schließlich schmierig und unansehnlich. Unter den Bezeichnungen: Präservesalz, Konservesalz, Hacksalz usw., hat die chemische Industrie aber Stoffe hergestellt und in den Handel gebracht, welche dem Mett, wenn sie in bestimmter Menge (meist bloß 0,5 Gramm pro Kilogramm Fleisch) zugesetzt werden, sein frisches Aussehen auf Tage zu erhalten imstande sind. Der § 21 des Reichsfleischbeschaugesetzes vom 3. Juni 1900 bestimmt:

Bei der gewerbsmäßigen Zubereitung von Fleisch dürfen Stoffe und Arten des Verfahrens, welche der Ware eine gesundheitschädliche Beschaffenheit zu verleihen vermögen, nicht angewendet werden. Es ist ver-

botten, derartig zubereitetes Fleisch aus dem Auslande einzuführen, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst in Verkehr zu bringen. Der Bundesrat bestimmt die Stoffe und die Arten des Verfahrens, auf welche diese Vorschriften Anwendung finden. Der Bundesrat ordnet an, inwieweit die Vorschriften des Abs. 1 auch auf bestimmte Stoffe und Arten des Verfahrens Anwendung finden, die eine gesundheitschädliche oder minderwertige Beschaffenheit der Ware zu verdecken geeignet sind.

In der daraufhin erlassenen Bundesratsbestimmung vom 18. Februar 1902 und 4. Juli 1908 sind diejenigen Chemikalien namentlich aufgezählt, welche damals hauptsächlich dazu verwendet zu werden pflegten. Hierunter fällt das sogenannte Präservesalz, welches durch seinen Gehalt an schwefliger Säure ausgezeichnet ist. Daß dieses aber auch

heute noch in ganz erheblichem Umfange angewendet wird, geht aus der sehr großen Zahl von mir dieserhalb eingeleiteten Mettproben hervor, wobei zu berücksichtigen ist, daß ich bei den Betriebsrevisionen oft kein Hackfleisch vorfinde und Proben nur im Verdachtsfalle entnehme, während vier Polizeibeamte mit dem systematischen Probeankauf dauernd beschäftigt sind. In anderen Städten dürfte es auch nicht viel anders liegen. Nebenbei wurde in mehreren Fällen von mir Befugung des Hackfleisches bzw. der zur Bereitung von Mett vorgesehenen Fleischstücke festgestellt.

Die chemische Industrie machte sich die namentliche Aufzählung der verbotenen Chemikalien zunutze und stellte nunmehr Hackfalze aus anderen Grundstoffen her, die etwa die gleiche farberhaltende Wirkung haben. In der Hauptsache wurde und wird hierzu die Benzoesäure benutzt. Vielfach wurden diese Mittel — von denen einige nichtsagende Phantasienamen tragen — von den Fabriken und deren Reisenden an die Fleischer verkauft unter der Angabe, daß diese Präparate ohne weiteres erlaubt seien, also auch ohne Deklaration verwendet werden könnten. Es besteht aber meines Erachtens gar kein Zweifel, daß Hackfleisch, das überhaupt mit einem Stoffe, den der Käufer in dem doch angeblich reinen Fleische nicht vermutet, der auch ohne weiteres nicht wahrzunehmen ist und den man in vielen Fällen nicht wünscht, verfälscht ist, als mit einem fremden Stoffe versehen, also als verfälscht anzusehen ist. Infolgedessen ist derartige Mett nicht nur nach § 21 Rfl.-Ges., sondern nach §§ 3 und 4 L.M.G. zu beanstanden, falls es nicht entsprechend deklariert ist. Über die Benzoesäure an sich sagt ein Gutachten der Deputation für das Medizinalwesen in Preußen (1911), daß bereits bei geringen Mengen epileptiforme Krämpfe bei kranken Menschen auftreten können, weil diese nicht imstande sind, die Benzoesäure im Körper durch Umwandlung in Hippursäure zu entgiften. Daß aber selbst ein gesunder Mensch ein Übermaß, auch in Form von stets wiederkehrenden kleinen Dosen, nicht vertragen, bzw. abwandeln und als Hippursäure ausscheiden kann, ohne Schaden zu leiden, versteht sich von selbst. Es ist also meines Erachtens allein schon aus diesem Grunde nicht berechtigt, alle SO_2 -haltigen Hackfalze zu verbieten, die Benzoesäurehaltigen hingegen unter Deklaration zu gestatten.

Der Deklaration selbst, um dies gleich anschließend abzuhandeln, ist ein durchaus beschränkter Wert beizumessen, denn die bei der Verwendung der betreffenden Präparate gelieferten Schilder werden entweder gar nicht benutzt oder z. T. absichtlich so aufgehängt, daß die Kundschaft sie nicht oder nur mit Mühe sehen und lesen kann. Außerdem gibt der Inhalt dieser von dem Vertreter der betr. Hackfalzfabrik jeder Packung beigegebenen Plakate in keiner Weise Aufschluß über die Bedeutung des Hackfalzes und seine chemische Zusammensetzung, denn er lautet stets etwa so: „In diesem Geschäft wird zur Konservierung des Hackfleisches X'sches Hackfalz verwendet.“

Ein Laie wird hieraus, falls er das Schildchen überhaupt bemerkt, entnehmen, daß das Mett konserviert ist und hierunter eine dem Verfahren beim Konservieren von Früchten, Gemüse usw. ähnliche Bearbeitung verstehen. Daß er ein Mett mit Benzoesäure vor sich hat, kann niemand ahnen, selbst der Fleischer, der derartige Präparate verwendet, weiß über die chemische Zusammensetzung auf Befragen meist nichts zu sagen.

Allein schon die Bezeichnung Hackfalz ist nicht glücklich gewählt, da der Käufer dem „Salz“ gefühlsmäßig den meisten Wert beimißt und evtl. einfach an Verwendung von Salz (NaCl) denkt. Es wäre also stets in deutlicher Schrift die Angabe der chemischen Zusammensetzung zu fordern.

Noch irreführender ist aber die Bezeichnung: „Zur Konservierung“, denn von einer solchen, d. h. einem Verhindern der bakteriellen Zersetzung, ist bei keinem Präparat etwas zu merken. Zur Stützung dieser Behauptung wurden von mir nachstehende Versuche angestellt.

Es wurden untersucht:

1. frisch hergestelltes Hackfleisch ohne jeden Zusatz,
2. frisch hergestelltes Hackfleisch mit 0,5 Gramm pro Kilogramm Fleisch von Tho Seeths neuem Hackfalze (wirksames Prinzip: Benzoesäure),
3. Hackfleisch, das eine Stunde nach Herstellung offen im Laden gestanden hatte und mit 0,5 Gramm pro Kilogramm des gleichen Präparates versetzt war.

Die Proben wurden selbstverständlich unter den gleichen äußerlichen Bedingungen gewonnen, verpackt, transportiert usw.

Von den Hackfalzen wurde mit Vorbedacht „Tho Seeths neues Hackfalz“ gewählt und zwar aus folgenden Gründen:

1. Nachdem durch mich eine erhebliche Reihe von Fleischern wegen Verwendung von Präservfalz angezeigt worden waren, wird dieses Präparat in steigendem Maße sowohl von den hiesigen Großfirmen als auch von den anderen Schlachtern in der Stadt Hannover verwendet. Die anderen Hackfalze treten hiergegen ganz erheblich in den Hintergrund.

2. Bei Cassalin, Probat, Hackolit, Goebels Hackfalz usw. wird nach kurzer Zeit das damit versetzte Schabefleisch in unerwünschter Weise backig und schmierig (siehe meine diesbezügliche Abhandlung in Nr. 44, 1926).

3. In Fleischerkreisen kommt man immer noch nicht von der Anschauung los, daß einmal dem Mett überhaupt ein Hackfalz zugesetzt werden muß und daß andererseits sich zur sog. Konservierung nichts so gut eignet, wie das (leider nun verbotene) Präservfalz. Man hat aber in dem Tho Seeth das angeblich in seiner Wirkung diesem am nächsten kommende festgestellt.

Von allen drei Proben, die in dieser Abhandlung der Kürze halber entsprechend vorstehender Aufzählung mit 1, 2, 3, bezeichnet werden, wurden sofort nach Entnahme Kulturen angelegt. Nach 24 Stunden zeigten 1 und 2 kein Wachstum, 3 vereinzelte Kokkenkolonien. Nach 48 Stunden war bei 1 und 2 Wachstum, bei 3 starkes Wachstum festzustellen.

Es wurden ferner angesetzt: je eine Probe in offener und in geschlossener Schale in den Brutschrank, je eine Probe in offener und in geschlossener Schale und ladenmäßig verpackt bei Zimmertemperatur, ferner drei gleiche Proben jeder Art bei konstant 5 Grad C.

Nach 24 Stunden ergab sich folgendes Bild:

A) Die Proben in offener Schale im Brutschrank zeigten sämtlich eine eingetrocknete, harte, schwarzrote Oberfläche, hatten ihre Struktur verloren und strömten einen intensiven Fäulnisgeruch aus. Beim Durchschneiden war 1 noch rötlich und feucht, 2 grünlich und trockener, 3 z. T. rötlich, z. T. grünlich. Die Eberische Fäulnisprobe war bei allen drei Proben stark positiv. Im Ausstrich wurden bei 1 massenhaft große und kleine Kokken, bei 2 außerdem noch vereinzelte Stäbchen, bei 3 außerdem noch viele Lang- und Kurzstäbchen gefunden.

B) Die in geschlossener Schale in den Brutofen gestellten Mettstücke waren sämtlich grünlich, feucht und gaben einen überaus starken Fäulnisgeruch ab. Auf dem Durchschnitt zeigte sich 2 noch etwas rot, während 1 und 3 graugrünlich mit teilweise rötlichem Schein waren. Die Eberische Fäulnisprobe war stark positiv. Ausstriche lieferten daselbe Bild, wie unter A beschrieben.

C) Die in offener Schale bei Zimmertemperatur aufbewahrten Proben wiesen eine dunkle, krustige Oberfläche auf. Die Innen- und Unterseite ist noch feucht. Die Struktur des Mettes ist noch erkennbar. Die Eberische Probe bringt bei 1 deutlichen, bei 2 und 3 beginnenden Nebel. Ausstriche aller drei Proben geben etwa das gleiche Bild: erhebliche Mengen von Kokken und Stäbchen.

D) Die in geschlossener Schale im Zimmer aufgestellten Mettstücke hatten ein von einander durchaus verschiedenes

Aussehen. 1. Graurot, muffig riechend, trocken. 2. rot, Unterseite spiegelnd blank, muffig. 3. rot, muffig riechend, Unterseite blank. Bei allen drei Proben beginnende Nebelbildung bei der Eberfchen Probe.

Ausstriche:

1. Kokken in großen Mengen in jedem Gesichtsfelde, auch einige Hefezellen,
2. Kokken in erheblichen Mengen in jedem Gesichtsfelde,
3. desgleichen, aber etwas mehr als bei 2, dazu einige Stäbchen.

E) Die eingewickelten Proben waren nach 24 Stunden folgendermaßen verändert: 1 war grau mit Spuren rot, 2 war dunkelrot mit erhaltener Struktur. An einer Stelle war das Einwickelpapier leicht durchfeuchtet. 3 war hellrot bis dunkelrot, Struktur erhalten. Nachdem die Proben etwas über eine Stunde offen gelegen hatten, waren 2 und 3 deutlich heller geworden, während 1 unverändert blieb. Fäulnisprobe bei allen drei Proben positiv, bei 2 und 3 allerdings nicht ganz so stark, wie bei 1. In den Ausstrichen wurden bei allen drei Proben Kokken in Menge, bei 2 und 3 auch einige Stäbchen festgestellt.

F) Die Untersuchung der bei 5 Grad offen hingestellten Mettproben ergab: 1. Grau mit Spuren rötlich, trocken innen und außen, 2. dunkelrot, etwas trocken, 3. dunkelrot, innen etwas heller. Die Eberfche Probe war bei allen drei Proben schwach positiv, am schwächsten bei 1. Die Ausstriche lieferten folgendes Bild: bei 1 finden sich in jedem Gesichtsfelde drei bis fünf Kokken, z. T. in kleinen Häufchen. Bei 2 drei bis zehn, aber auch weit über 20, in kleinen und großen Haufen, bei 3 noch mehr Kokkenhaufen wie 2, daneben vereinzelte Stäbchen.

G) Waren die Proben hingegen bei 5 Grad in geschlossener Schale aufbewahrt, dann war 1 leicht angegraut, besonders an der Seite, 2 und 3 zeigten eine frische, hellrote Farbe und sahen so aus, als ob sie vor kurzem hergestellt seien. Die Eberfche Probe war bei allen drei Sorten schwach positiv. Die Ausstriche bei 1 und 2 waren einander gleich, indem etwa drei bis acht Kokken in kleinen Häufchen in jedem Gesichtsfelde lagen, 3 zeigte viele Kokken.

H) Die ladenmäßig verpackt bei 5 Grad aufbewahrten Teile waren 1 außen und innen angegraut, 2 und 3 dunkelrot. Bei allen drei Proben kaum feststellbare Nebelbildung, in den Ausstrichen vereinzelte Kokken.

Ich habe absichtlich diese Proben so ausführlich beschrieben, um zu zeigen, welche Veränderungen sich am und im Hackfleisch innerhalb von 24 Stunden unter den verschiedenen Aufbewahrungsbedingungen abspielen. Es muß also vom Verkäufer stets eine möglichst frische Ware verlangt werden, der Konsument hat sich aber auch seinerseits stets davor zu hüten, Hackfleisch vor dem Verzehr noch längere Zeit (namentlich unter ungünstigen Bedingungen) aufzubewahren.

Sämtliche angefetzten Proben wurden weiterhin mehrere Tage nach dem gleichen Schema geprüft. Hier sollen jedoch lediglich noch die Untersuchungsergebnisse derjenigen Mettstücke erwähnt werden, welche evtl. noch ihrer Farbe nach in praxi hätten zum Verkauf (bezw. bei Aufbewahrung im Hause des Konsumenten zum Verzehr) gelangen können.

Nach 48 Stunden zeigte Versuch D folgendes Aussehen:

1. ist grau, matschig-feucht, und hat muffigen Geruch,
2. hat eine graurote Oberfläche, wie überaltertes Mett, sonst wie 1,
3. hat eine dunkelrote Oberfläche, sonst wie 1.

Bei allen drei Proben deutliche Nebelbildung. Durch Ausstriche wird eine erhebliche Vermehrung der Keime festgestellt, wobei die Zahl derselben bei allen drei Proben etwa die gleiche ist.

- E) 1. ist formlos, matschig, mit Spuren rot und hat Fäulnisgeruch,
 2. ist dunkelrot, Struktur noch vorhanden, Fäulnisgeruch desgleichen,
 3. ist hellrot bis dunkelrot, feucht, sonst wie 2.

Eberfche Probe positiv. In den Ausstrichen merkbare Keimvermehrung gegenüber dem Vortage, ohne besondere Unterschiede der Proben untereinander.

- F) 1. grau mit Spuren rötlich,
 2. rot, Unterseite lachsrot, würde von Laien sicher als frisch angesehen werden,
 3. wie 2.

Eberfche Probe positiv. In den Ausstrichen: Keimvermehrung.

- G) 1. grau, 2. als ob es eben hergestellt sei, 3. wie 2.

Bei 1. starker, bei 2. und 3. gut sichtbarer Nebel. Keimvermehrung bei 1. und 3. stärker als bei 2.

H) 1. grau, ohne Struktur, 2. lachsrot mit einigen grauen Stellen, Struktur erhalten. 3. wie 2.

Bei 1. und 3. Nebelbildung, bei 2. schwache Nebelbildung. Keimvermehrung bei 1. und 3. stärker als bei 2.

Nach 72 Stunden sahen die Proben G 2 und 3 so aus, als ob sie erst einige Stunden alt wären, wohingegen H 2 und 3 deutlich rot bis lachsfarben geblieben waren. Es machte sich aber ein nicht unerheblicher Fäulnisgeruch bemerkbar.

Nach 96 Stunden hatte sich dieser noch verstärkt, trotzdem sahen selbst G 2 und 3 noch recht frisch aus. Das Mett selbst aber war trotz der leuchtend roten Farbe (H 2 und 3) eigentlich nichts weiter mehr, als ein wimmelnder Bakterienhaufen, wie die Ausstriche ergaben. Es ist erstaunlich, wie stark die Färbkraft der Benzoesäure in der kleinen Menge von 0,5 : 1000 noch nach vier Tagen ist. Es fiel auch auf, daß das präparierte Mett schließlich nicht ganz so schmierig wurde, wie das hackfalsfreie.

Aus sämtlichen Proben wurden außerdem nach 24 Stunden sowohl Platten, als auch Schrägkulturen mit filtriertem Material und mit Osen angelegt. Die Prüfung der Kolonien ergab keine besonderen Unterschiede; lediglich das bei fünf Grad ladenmäßig verpackt aufbewahrte Mett 2 (Versuch H) zeigte eine geringere Keimzahl als die Vergleichsproben. Dies hat aber für die Praxis keine Bedeutung, da dieses Hackfleisch sofort nach der Herstellung, ohne den Laden berührt zu haben, eingepackt worden war.

Frisches Fleisch an sich ist keimfrei oder so gut wie keimfrei. Die sich alsbald beim Hackfleisch bemerkbar machende bakterielle Zersetzung fordert gebieterisch, daß das Mett stets kurze Zeit nach seiner Herstellung, selbst bei peinlich sauberer Gewinnung und Aufbewahrung, verbraucht wird. Der Zusatz von Hackfals hält in der für den Verkauf praktisch in Frage kommenden Zeit die bakterielle Zersetzung nicht hintan; diese geht vielmehr ungehindert vor sich. Es bleibt aber die rote Farbe erhalten, evtl. wird sogar das Fleischrot zu einem „Knallrot“. Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer kann sich daher bei Verwendung von Hackfalsen kein Urteil mehr darüber bilden, wie weit die bakt. Zersetzung in Wirklichkeit schon fortgeschritten ist.

Aus allen diesen vorstehend abgehandelten Gründen ist es meines Erachtens notwendig, auch die bisher unter Deklaration gestatteten Hackfals zu verbieten.

Tierzüchterische Beobachtungen in Bayern.

Von von Patow, Hannover.

Im Sommer v. Js. hatte ich Gelegenheit, an einem Lehr- ausfluge teilzunehmen, den Prof. Kronacher-Hannover mit Studierenden der Tierärztlichen Hochschule nach Bayern unternahm. Derartige Ausflüge, die ja für die Ausbildung des zukünftigen Tierzuchtbeamten unentbehrlich sind, müssen heute leider sehr eingeschränkt werden. So konnten auch für diesen Ausflug nur acht Tage vorgesehen werden, aber dank sorgfältigster Vorbereitung und Durchführung durch den Leiter und dem Entgegenkommen aller beteiligten bayerischen Behörden, Zuchtverbände und Züchter konnten in der kurzen Zeit die Hauptzuchten der bayerischen Berge vom Chiemsee bis Weilheim, eine Simmentaler Zucht bei Freising und Frankenzuchten bei Würzburg besichtigt werden. Und diese Besichtigungen waren nicht nur gründlich genug, um eine gute Übersicht über den Stand jeder Zucht zu gewähren, es wurde auch noch Zeit zum Besuch der wichtigsten staatlichen Anstalten, die der Förderung der Tierzucht dienen, erübrigt.

Ich möchte hier kurz einige Gedanken bringen, die die bayerischen Zuchtverhältnisse dem Norddeutschen nahelegen und die mir der Beachtung wert scheinen.

Die Tierzucht ist in Bayern durchweg staatlich organisiert. Der Tierzuchtbeamte ist vom Staate angestellt und damit für die Zucht in seinem Bezirk verantwortlich, im besonderen hat er die technische Leitung der in seinem Bezirk bestehenden Zuchtverbände. Die besonderen Verhältnisse in Süddeutschland, insbesondere das Überwiegen des Kleinbesitzes, erforderten diese Maßnahme; sie hat sich durchaus bewährt. Der Staat hat sich der Tierzucht mit großer Liebe und großem Verständnis angenommen und seinerzeit große Mittel auf deren Förderung verwendet. Heute sind seine Mittel in dieser Beziehung auch beschränkt. Die musterhaften Einrichtungen, die er zur Ausbildung und Weiterbildung der Tierzuchtbeamten, zum Seuchenschutz wie gleichzeitig zur Forschung in früheren Jahren errichtet hat, wie Grub und vor allem Schleißheim, sind jetzt im allgemeinen darauf angewiesen, sich selbst zu erhalten. Ein Vergleich mit norddeutschen Verhältnissen ist natürlich kaum zu ziehen. Dr. Peters-Königsberg hat in einem Vortrag auf dem ersten Lehrgang für süddeutsche Tierzuchtbeamte in München ein Bild der heutigen Ziele und Methoden eines großen Zuchtverbandes entworfen. Ihm schwebte dabei seine Ostpreussische Holländer Herdbuchgesellschaft vor. Er betonte aber dabei ausdrücklich, daß eines sich nicht für alle schickt, daß sein norddeutsches Vorbild sich nicht ohne weiteres auf süddeutsche Verhältnisse übertragen läßt, daß aber immerhin einer vom anderen lernen kann. Das bayerische System hat entschieden den Vorzug, die tierzüchterische Arbeit innerhalb der gegebenen Grenzen einheitlicher zu gestalten. Man sieht dort nicht neben vorbildlichen Hochzuchten der Verbandsmitglieder ganz abfallende Bilder in den Ställen der Nichtmitglieder. Die vom Staate und den Zuchtverbänden geleistete Arbeit kommt der ganzen Landeszucht zu gute. Nur auf diese Weise dürfte es auch möglich geworden sein, einheimische Rassen in dem Umfange, wie wir ihn an Ort und Stelle sahen, zu erhalten und auch zu verbessern.

Beginnen wir mit der Rinderzucht, und zwar mit dem Fleckvieh. Eine gewisse Umstellung auf die Leistungszucht ist erkennbar, im Flachland wie in den Bergen sahen wir Ställe mit ständiger Leistungskontrolle, die recht beachtenswerte Ergebnisse zeitigte. Die dreifache Leistungsrichtung in der Fleckviehzucht wird die reine Milchleistung gegenüber der der Tieflandschläge immer geringer erscheinen lassen. Dies wird jedoch durch den höheren prozentischen Fettgehalt in etwas ausgeglichen. Die Betonung der Leistung kann leicht eine Änderung der Form herbeiführen. In den schwarzbunten Zuchten Norddeutschlands ist aber der Be-

weis erbracht, daß Schwere sich mit hoher Milchleistung verbinden läßt. Wir konnten in einigen Fleckviehställen das- selbe feststellen: tiefe, schwere Kühe mit guter Rippenwölbung und starkem Fundament, die gute Leistungen in Milch und Fett aufwiesen. Ob freilich dabei nicht in der Größe etwas zurückgegangen werden muß, wie dies Peters bei der erwähnten Gelegenheit auch andeutete, erscheint mir



Abb. 1. Fleckviehkuh im „Wirtschaftstyp“. 9 Jahre alt, Widerristh. 144, Brustumfg. 196, Länge 176 cm, Gew. 730 kg.

noch fraglich. An einzelnen Stellen hatte man den Eindruck, daß das Streben nach Leistung unter Beibehalt großer Figuren schmale, hochbeinige Tiere erzeugt, die nicht dem entsprechen, was man auch in Bayern heute unter „Wirtschaftstyp“ versteht. Andererseits ist nicht zu verkennen, daß das Fleckvieh nun einmal nicht frühreif ist, es ist frohwüchsig. Das ist ganz etwas anderes und bedingt bis zu einem späteren Altersstadium als bei frühreifen Rassen eine Unausgeglichenheit der Körperformen, die uns besonders in Überbauten und einer geringen Brusttiefe entgegentritt. Wollte man an junge Tiere, besonders männliche hier schon den Maßstab des „Wirtschaftstyps“ anlegen, so würde man die Frohwüchsigkeit unterdrücken und binnen kurzem zu „verbütteten“ Figuren kommen. Es wird nicht ganz leicht sein, hier den richtigen Mittelweg zu finden. Eine gewisse Verschiedenheit im Typ zwischen den Zuchten der Berge und denen des Flachlandes wird wohl immer bestehen bleiben, vielleicht werden die ersteren sich dem von letzteren erstrebten und teilweise schon erreichten Typ der tiefen, breiten Leistungskuh noch mehr anpassen müssen. Die nötige Wüchsigkeit wird freilich dann immer wieder Einfuhr aus dem Schweizer Originalgebiet bedingen, wie er an Bullen, aber auch an weiblichem Material bisher ständig stattgefunden hat. Die Milchleistung braucht dadurch nicht beeinträchtigt zu werden. Man kann in der Schweiz heute Tiere mit Leistungsnachweisen erhalten, die sich auf mehrere Generationen erstrecken und recht hohe Zahlen aufweisen. Es erscheint sicher, daß mit Erreichung größerer Brusttiefe und -breite auch die französische Stellung der Vorderbeine, die ein alter Fehler des Simmentalers ist und sich heute noch öfters zeigt, gebessert werden würde. Die früher bei Bullen nicht selten beobachtete stuhlbeinige Stellung der Hintergliedmaßen ist heute kaum noch zu finden. Hose, Sprunggelenk und Schienbein sind im Gegenteil meist gut. An und für sich wäre es ja auch ein Unding, beim Fleckvieh, das Zugarbeit leisten und auf Alpen gehen soll, steile Hinterstellung mit angedrücktem Sprungbein anzustreben. Die Klauenpflege, auf die in Bayern jetzt durchweg großer Wert gelegt wird, mag dabei auch mitsprechen. In allen Teilen des Fleckviehzuchtgebietes sieht man rege Arbeit. Leicht ist sie nicht. Besonders der Züchter im Hochland leidet unter

den heutigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten ganz besonders. Seine Einnahmen beruhen, wo nicht Waldbesitz mit-hilft, einzig und allein auf dem Viehfall. Hat der Vieh- oder Milchmarkt schlechte Zeiten, so hat er keine Möglich-keit, den Ausfall auszugleichen. Der Fremdenverkehr, der immer weiter in die bayerischen Alpen eindringt, bringt der Landwirtschaft gleichfalls leider gar manche Nachteile, er drängt sie zurück.

Braunvieh fahen wir nur im Weilheimer Zuchtgebiet. Die Ausgeglichenheit war in den besichtigten Herden gut, die früher öfters beobachtete Leere hinter der Schulter ist nicht mehr in erheblichem Maße zu finden. Auf einem Hofe fanden sich unter der Braunviehherde rotbunte Nieder-rheiner. Sie waren angekauft, um durch Seuchen entstan-dene Verluste auszugleichen. Die Angaben des Betriebs-leiters deuteten bereits an, daß die Milchleistungen hinter den Erwartungen zurückbleiben, jedenfalls die des ein-heimischen Braunviehs nicht übertreffen. — Auch in diesem Zuchtgebiet führt man noch immer jährlich eine ganze An-zahl Schweizer Originaltiere beiderlei Geschlechts ein. Über den Wert und die Notwendigkeit dieser Einfuhr kann man ebenso wie beim Fleckvieh verschiedener Ansicht sein. H a n s e n stellt in seiner Rinderzucht die Forderung: „Nach meiner Ansicht muß eine Landeszucht auf eigenen Füßen stehen und, selbst wenn sie ursprünglich auf ausländischer Einfuhr aufgebaut wurde, nach einer gewissen Zeit vom Ursprungslande unabhängig sein“. Das ist sicher richtig; manches ließe sich in dieser Hinsicht auch heute schon in Süddeutschland tun. Aber daß die deutsche Fleckvieh- und Braunviehzucht je ganz unabhängig von der Schweiz werden wird, möchte ich bezweifeln. Eine weitgehendste Einschränkung der Einfuhr aus dem Auslande ist mit allen Mitteln zu erstreben. Aber liegen die Verhältnisse hier nicht ähnlich wie bei manchen schwarzbunten Zuchten des Binnen-landes, die immer und immer wieder aus den Marfchen Zuchttiere, und zwar nicht nur für ihre Hochzuchten und nicht nur männliche einführen, die sich aber gegen den Vor-wurf, sie ständen nicht auf eigenen Füßen, ernstlich ver-wahren würden?



Abb. 2. Pinzgauer Kuh. (Phot. C. Kronacher.)

Wenden wir uns jetzt den einheimischen bayerischen Rinderschlägen zu, so möchte ich zunächst die in Nord-deutschland im allgemeinen wenig bekannten Pinzgauer er-wähnen. Ihr Zuchtgebiet liegt in den Bezirksämtern Berch-tesgaden, Laufen, Traunstein und Rosenheim. Dieser Schlag umfaßt immerhin 12,5 Prozent des Gesamtrinderbestandes im Reg.-Bezirk Oberbayern und 2,6 Prozent desjenigen von Bayern. Er hat sich nach den letzten Erhebungen der D.L.G. nicht nur zahlenmäßig gehalten, sondern sogar etwas zugenommen. Begünstigt ist er allerdings dadurch, daß der Pinzgau, die Heimat dieses im Österreichischen weit ver-breiteten Schlages, unmittelbar an das bayerische Zucht-gebiet stößt. Es ist eine Freude zu sehen, was zielbewußte, unermüdliche Züchterarbeit hier geleistet hat. Die Zucht zielt in der Hauptsache auf Zugtätigkeit und Mastfähig-keit. Doch finden sich z. B. am Chiemsee auch Ställe mit

recht guten Milchleistungen. Dabei sind die Formen durch-aus nicht schlechter geworden, im Gegenteil ist der an und für sich etwas lange Rücken jetzt fester, das Becken breiter. Bemuskulung und Stellung der in der Nachzucht manchmal etwas feinen Gliedmaßen sind recht gut, die Euterentwick-lung hat Fortschritte gemacht.

H a n s e n sagt, daß die Zucht in Bayern mindestens auf gleicher, wenn nicht auf höherer Stufe steht als im Pinzgau selbst. Was man an Ort und Stelle sieht und hört, bestätigt dies Urteil vollkommen. Die Zeit scheint nicht mehr fern, in der das „Originalgebiet“ Tiere aus dem Bayerischen in größerer Zahl holen wird.

Anders steht es mit den Murnau-Werdenfelsern im Be-zirk Garmisch. Sie sind in den letzten 20 Jahren um rund 75 Prozent zurückgegangen. Dieses leichte, genügsame Vieh ist aber für ein freilich kleines Gebiet jetzt noch nicht zu entbehren. Entweder muß man in diesem die Möglichkeiten schaffen, ein anspruchsvolleres Vieh zu halten, oder man muß den alten Schlag aus sich heraus zu verbessern suchen. Die Züchter und der Staat scheinen sich für den letzteren Weg entschieden zu haben. Die Aussichten werden ver-schieden beurteilt. Es wird immer eine schwere Aufgabe bleiben, eine Zucht, die von rund 62 000 Tieren im Jahre 1896 heute auf rund 10 000 gesunken ist, überhaupt nur zu erhalten. Hier hat die Arbeit anscheinend etwas spät ein-gesetzt bzw. der frühere Versuch des Ersatzes des Schlages durch Braunvieh schon zuviel des wertvollen Materials ver-drängt. Die Hauptschwierigkeit wird die Bullenbeschaffung bilden.

Ein ganz anderes Bild sieht man in Franken. Die Zucht des gelben Frankenviehs umfaßt die Reg.-Bezirke Ober-franken mit 22 Prozent des Gesamtbestandes, Mittelfranken mit 26,7 Prozent und Unterfranken mit 75,9 Prozent. Das Frankenvieh hat seit 1906 eine bedeutende Abnahme — um rund 25 Prozent — erfahren; doch darf man hoffen, daß es sich in seinem jetzigen Bestande erhalten wird, zumal wenn die angrenzenden Zuchten mit den bayerischen zu-fammenarbeiten. Was man sieht, macht einen selten aus-geglichenen Eindruck, auch in den nicht dem Zuchtverbände angeschlossen Ställen. Für die dortigen wirtschaftlichen Verhältnisse — Kleinbesitz, keine Weiden, vielfach fast keine Wiesen — ist das Frankenvieh der gegebene Schlag. Beson-ders fällt die anscheinend sehr feste Konstitution auf. Die Verwendung zum Zugdienst schafft scheinbar einen genügen-den Ausgleich gegenüber der Stallhaltung. Das Fleckvieh würde unter diesen Verhältnissen kaum daselbe leisten. Man hat in Franken auch der Milchleistungsprüfung Aufmerk-samkeit geschenkt. Die Leistungen der Frankenkühe sind durch Verbesserung der Fütterung und Zuchtwahl steige-rungsfähig; das zeigen die jetzt schon erreichten Erträge. Der Milchabatz ist aber so schlecht, daß die Milchnutzung für die Gesamtzucht keine Rolle spielt gegenüber der Zug- und Fleischleistung. In diesen beiden letzteren stehen die Franken auf der Höhe.



Abb. 3. Pinzgauer Stute. (Phot. C. Kronacher.)

Über den Stand der Zucht des Norikers bekamen wir einen guten Überblick. Er findet sich von außerdeutschen Ländern in Österreich und Böhmen. Der Tischeoslowakische Staat setzt sich energisch für seine Zucht als einziges Kaltblutpferd im Lande ein. So ist das an und für sich kleine Zuchtgebiet in Bayern doch nicht auf sich allein angewiesen. Bayern züchtet im Traunsteiner Verband und in Schwaben den schwereren Pinzgauer, im westlichen Oberbayern den leichteren, manchmal scheinbar nicht ausreichend wüchsig und deswegen vielfach wieder mit Pinzgauer Hengsten gepaarten Oberländer.



Abb. 4. Oberländer. (Phot. C. Kronacher.)

Man hat den Eindruck, daß diejenigen, die den Noriker vor oder vielmehr aus der Verkreuzung retteten und den bayerischen Staat bewogen, die Zucht in den beiden genannten Formen mit großen Mitteln zu fördern, sich ein großes Verdienst erworben haben. Zwar hört man hie und da im Lande andere Stimmen, es werden Zweifel laut, ob das doch verhältnismäßig kleine Stammzuchtgebiet auf die Dauer leistungsfähig bleiben kann. Der erfolgreiche Widerstand, den der Noriker allen früheren Kreuzungs- und Verdrängungsversuchen entgegengesetzt hat, ist wohl Beweis genug für seine erblich einheitliche Konstitution. Diese hat es wohl auch nur ermöglicht, daß die beiden Zuchttrichtungen,

die beide im Kriege alle Erwartungen übertroffen haben, heute zum Teil bereits einen Grad der Ausgeglichenheit aufweisen, den man nach so kurzer Zeit nicht erwarten sollte. Die alten Fehler, schlechte Beinstellung und weicher Rücken, sind mit Erfolg bekämpft. Ausschlaggebend aber sollte die Wirtschaftlichkeit sein. In dieser Hinsicht ist der Noriker für sein Gebiet den anderen Kaltblütern unstreitig weit überlegen. Seine Leistungen in den Bergen kann kein anderes Pferd ersetzen.

Und wenn man sieht, wie er im Flachlande bei — abgesehen von den besseren Weiden — durchaus nicht viel reicherer Aufzucht an Rippe, Breite und Tiefe gewinnt,



Abb. 5. Pinzgauer Stuten auf der Weide. (Phot. C. Kronacher.)

muß man annehmen, daß er auch für Nordbayern und manche andere süd- und mitteldeutschen Gegenden das gegebene Kaltblutpferd wäre. Noch ist die bayerische Zucht in gewissem Umfange auf die Einfuhr aus dem Pinzgau angewiesen. Wenn sie mehr an Boden gewinnt, wird sie in absehbarer Zeit auch selbständig werden. An fördernder Züchterarbeit fehlt es nicht.

Die kurze Reife war tierzüchterisch ein Genuß. Man hat den Eindruck zielbewußter Arbeit an allen Stellen, einer Arbeit, die auch unter den heutigen schwierigen Verhältnissen den hohen Stand der bayerischen Tierzucht nicht nur zu wahren sondern auch zu verbessern weiß.

Innere Medizin und Chirurgie.

Lasch, W. und A. Behrens: Über die Wirkung des Ergosterins auf Rachitis. (Aus der Universitätsklinik, dem Säuglingsheim und der Medizinischen Klinik in Göttingen.) (D. m. W. 1927, S. 1552.)

In der Rachitisforschung sind in den letzten Jahren drei Fortschritte zu verzeichnen. Zunächst die von Huldsky festgestellte Tatsache, daß dieses Leiden durch Ultraviolettbestrahlung der Körperoberfläche geheilt werden kann. Sodann machten Hess und Steenbock die Entdeckung von der Übertragbarkeit der erwähnten Lichtwirkung durch Ultraviolettbestrahlung bestimmter Nahrungsmittel. Schließlich konnte Windaus vor kurzem über Versuchsergebnisse berichten, nach denen die antirachitische Wirksamkeit der vorbestrahlten Nahrungsmittel auf der Anwesenheit eines chemisch wohl charakterisierten Stoffes, des Ergosterins beruht, das ultraviolett vorbestrahlt auch für sich imstande ist, schon in minimalsten Mengen (1/1000 mg p. d.) und kürzester Zeit Rattenrachitis zur Heilung zu bringen.

Bei rachitischen Kindern wurde das fragliche Mittel zuerst von Beumer und Falkenhain sowie von György und zwar mit Erfolg erprobt. Die vorliegende Arbeit berichtet über analoge Versuche, die an sieben ausgesprochen rachitischen Kindern von 1/2 bis 1 1/4 Jahren vor-

genommen wurden. Dieselben erhielten 3—4 mg bestrahltes Ergosterin p. d. teils in Olivenöl gelöst, teils in Form von Schokoladetabletten. Beide Präparate wurden unter dem Namen „Vigantol“ von der I. G. Farbenindustrie A.-G. und Merck (Darmstadt) hergestellt. Schon wenige Tage nach der Verabreichung des Präparats war ein deutlicher Umschwung in der Stimmung und eine Hebung der statischen Funktionen zu beobachten. Die Kinder wurden lebhafter, begannen Kopf und Oberkörper zu heben und die vorhandene Kraniotables war in längstens 14 Tagen abgeheilt. Im Röntgenbilde erschien schon nach 2 1/2 Wochen eine deutliche Kalk-einlagerung. Endgültige Heilung trat innerhalb 6—8 Wochen ein. Auch prophylaktisch wurde Vigantol mit Erfolg angewandt. Es hat vor der künstlichen Höhenfonne den Vorteil, daß es auch da, wo letztere nicht zur Verfügung steht, z. B. in ländlichen Bezirken, angewandt werden kann und daß für die Mütter die große Zeitverfümmnis beim Besuch der Bestrahlungsstätte wegfällt. Carl.

Binz und Rätth: Chemotherapeutica aus der Pyridinreihe. (Aus dem chem. Institut der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin. Direktor: Prof. Dr. A. Binz.) (T. R. 1927, S. 891.)

Im Gegensatz zu der Salvarsanreihe, wo das Arsen stets an einen karbozyklischen Kern, den Benzolkern, gebunden ist, stehen die Verbindungen, deren molekularer Aufbau durch das Vorhandensein eines heterozyklischen, stickstoffhaltigen Ringystems ausgezeichnet ist, die also den Stickstoff

nicht wie das Salvarsan am, sondern im Ring enthalten. Hierher gehört z. B. das Pyridin C_5H_5N . Durch Verbindung mit Arsen gelang es, zwei Präparate B.R. 34 und 68 herzustellen, die bei Trypanosomen die Verbindungen der Salvarsangruppe übertrafen. Die Verbindung mit Jod führte zu dem Präparat C_5H_4NOJ , das sich als geeignet zur Bekämpfung von Strepto- und Staphylokokken beim Klein- und Großtier erwies, das Selectan. Es gehört nach seiner ganzen Entstehungsweise zu einer neuen Klasse chemotherapeutischer Verbindungen. Geiger.

Hendriock, A.: Experimentelle Untersuchungen über die präventive und lokaltherapeutische Wirksamkeit feuchter Verbände, insbesondere der sogenannten spezifischen Verbände Besredkas. (Aus der chirurgischen Universitätsklinik zu Marburg a. L.) (Zentralbl. für Chir. 1927, S. 2325.)

Aus der Tatsache, daß mit dem Alterwerden einer Bakterienkultur die Virulenz der Keime sinkt, gelangte Besredka zu der Annahme eines „Antivirus“, eines heilenden Agens in den Bakterienzellen. Dieses Antivirus soll eine hitzebeständige, spezifische Substanz sein, die in Filtraten 8—10 Tage alter Bouillonkulturen, selbst wenn diese erhitzt sind, enthalten ist.

Besredka wendet diese abgekochten Bakterienfiltrate in Form feuchter Verbände an und glaubt so auf perkutanem Wege immunisatorische Wirkung zu erzielen. Die Vermehrung der Bakterien soll gehemmt und die Körperzellen zur Verteidigung aktiviert werden. Zur Prüfung dieser Angaben stellte Verf. in der Weise Versuche an, daß er Kaninchen einseitig rasierte und unter Verwendung von Streptokokken bekannter Virulenz zwei Infektionen setzte, von denen die eine unbehandelt blieb, während die andere mit Verbänden versehen wurde. Zu letzteren wurden mit identischen Streptokokkenkulturen hergestellte Antivirusfiltrate benutzt, zur Kontrolle außerdem gewöhnliche sterile Bouillon und effigsaure Tonerde. Aus den im Einzelnen angeführten Versuchsergebnissen folgert Verf., daß sich zwar eine geringe präventive und deutliche lokaltherapeutische Wirkung auf infektiöse Prozesse durch Antivirusverbände erzielen läßt; die Erfolge sind aber keineswegs rascher oder gründlicher als nach Behandlung durch Verbände mit einfacher steriler Bouillon oder effigsaurem Tonerde. Es ist also kein Grund vorhanden, zur Erklärung der therapeutischen Wirksamkeit von keimfreien, ungiftigen Bouillonkulturfiltraten die Existenz eines besonderen „Antivirus“ anzunehmen. Vielleicht sind die erwähnten günstigen klinischen Erfahrungen ebenso wie die Ergebnisse der vorliegenden Experimente geeignet, den mancherorts verpönten feuchten Verband wieder zu Ehren zu bringen. Carl.

Köppen: Kleine Mitteilungen aus der Praxis. (B. T. W. 1927, S. 600.)

1. Milben als Erreger des Hustens bei Schweinen. Verfasser wurde zu Rate gezogen, weil sechs Läuferfische seit Wochen stark husteten und nicht recht zunahmen. Der Husten trat in langanhaltenden Anfällen auf, die den ganzen Körper der Tiere erschütterten. Die Autopsie nach Schlachtung eines Schweines ergab, daß die Bronchien mit einem dicken, blutigen Schleime angefüllt waren, in dem bei der mikroskopischen Untersuchung sich keine Würmer, dagegen zahlreiche Milben vom Aussehen der Käsemilben vorfanden. Verf. vermutet, daß die Milben gelegentlich der Verfütterung von Käseabfällen vom Rachen in den Kehlkopf und von da in die Bronchien gelangten und hier zu echten Parasiten wurden.

2. Raufbrandähnliche Erkrankungen im Anschluß an eine Puerperalinfection. In einem Falle von Retentio secundinarum bei einer Kuh stellte Verf. im April 1913 fest, daß das Tier mit einer schweren diphtherischen Entzündung der Scheide und der Gebärmutter behaftet war. Zu gleicher Zeit bestand Appetitlosigkeit, Puls klein, 130 in der Minute, große Schwäche. Bei der Obduktion des kurz

nach der Untersuchung verendeten Tieres boten die Geburtswege das Bild der Diphtheria profunda. Die Schleimhaut war 2—3 cm hoch geschwollen und in eine gelbgraue, abgestorbene Masse verwandelt. Von da ab erkrankten alle Färsen und einige junge Kühe nach dem Kalben. Sie verweigerten das Futter und wiesen Schwellungen auf an den Vorder- und Hintergliedmaßen bis zum Schulter- bzw. Kniegelenk. Wurden die Tiere nicht geschlachtet, so traten die Erscheinungen wie beim ersten Falle auf. Exitus letalis am zweiten oder dritten Tage. Obduktionsbefund: gelatinöse Ergüsse unter der Haut und zwischen den Muskeln der Extremitäten. Herzbeutel reichlich mit Exsudat gefüllt. Muskulatur selbst ohne Veränderungen. Im Frühjahr 1914 erfolgte die feuchthafte Erkrankung von selbst.

3. Lähmungen nach dem Verfüttern von Erbsengemenge. Ein mit Hafer, Gerste und Erbsen zu je einem Drittel gefüttertes Pferd erkrankte nach dem Mittagfutter auf dem Felde unter den Erscheinungen von Schweißausbruch, vermehrter Atemfrequenz, Lähmung in der Nachhand und verendete nach drei Stunden. Bei der Sektion wurde nur eine leichte Rötung des Dünndarmes festgestellt. Die Krankheit wurde über ein Jahr hindurch bei mehreren Pferden beobachtet. Einmal erkrankten drei Pferde tödlich an demselben Tage. Verf. hatte schon beim ersten Falle auf den Zusammenhang der Krankheit mit der intensiven Erbsenfütterung hingewiesen, jedoch ohne Erfolg. Erst als Geheimrat Eggeling in Berlin dieselbe Ansicht aussprach, unterblieb die Erbsenfütterung mit dem Erfolg, daß weitere Krankheitsfälle nicht mehr beobachtet wurden. Carl.

Emoto, O.: Untersuchung über das Wesen der Lendenparalyse bei Ziegen. (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1927, 69, S. 299.)

In Japan kommt bei importierten in der Niederung gehaltenen und milchenden Ziegen besonders im Spätsommer oder Herbstanfang eine eigenartige feuchthafte Lendenparalyse vor. Sie ist gattungsspezifisch. Der Verlauf dieser Krankheit ist verhältnismäßig lang, wobei sich vielerlei Grade motorischer Lähmung zeigen. Im akuten Stadium findet man pathologisch-anatomisch im Rückenmark Septomeningitis serosa et lymphocytica, Myelitis circumscripta ventralis und Myelomalacia periarterialis, im Gehirn Septomeningitis serosa und lymphocytica basillaris, in der den Ventrikeln benachbarten weißen Substanz: Encephalitis lymphocytica und Encephalomalacia periarterialis. Bei chronischen Fällen findet man Leptomeningitis fibroplastica und Sclerosis gliosa spinalis et cerebri, sowie Periarteriitis fibrosa auf. Es ließ sich in allen Fällen aus dem Rückenmark und Gehirn ein charakterisierter Streptokokkus isolieren (Str. paralysis lumbaris caprinae Emoto). Die experimentellen und kulturellen Versuche sind eingehend beschrieben. H. G.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Orskov, Jensen und Kobayashi: Studien über die Breslauinfektion der Mäuse, speziell mit Rücksicht auf die Bedeutung des Retikuloendothelgewebes. (Zeitschr. für Immunitätsf. 1928, Bd. 55, S. 34.)

Bei oraler Eingebung der Keime gehen die meisten Breslaubakterien im Darm zugrunde. Einige Keime werden aber resorbiert und sind bald in den Lymphknoten des Mesenteriums anzutreffen. Von hier aus gehen sie in die Blutbahn über, werden aber sehr schnell, speziell von der Leber und Milz abfiltriert. Früher oder später setzt eine konstante Bakteriämie ein und beim Tode der Tiere sind alle Organe und das Blut mit Bakterien gefüllt. Der Darm, der primär sehr schnell von den Keimen befreit wurde, wird meistens im späteren Verlauf wieder durch die Galle infiziert. Nach intravenöser Injektion der Bakterien wird das Blut zunächst ziemlich schnell (innerhalb weniger

Stunden) von den Keimen befreit. Sie werden speziell von den Leber- und Milzendothelien phagozytiert und aufgelöst. Zurückgebliebene Bakterien fangen nach einiger Zeit an, sich zu vermehren und erzeugen eine konstante Bakteriämie. Bei subkutaner und intravenöser Injektion vergeht stets eine längere Zeit, bis die Bakterien in die Galle, und damit in den Darm kommen.

Normalen und aktiv immunisierten Tieren wurde 1 Million Breslaubakterien in die Blutbahn gespritzt. Die Immuntiere hatten schon nach einer halben Stunde ihr Blut gereinigt, die nicht immunen erst nach drei Stunden. Die Kontrolltiere hatten nach 24 Stunden ihre Bakteriämie, während das Blut der Immuntiere keimfrei blieb. Phagozytose und Auflösungsvermögen der Endothelien sind also bei aktiv immunisierten Mäusen sehr erhöht. Meyn.

Mertens, V. E.: Hat das Alter mit der Entstehung der bösartigen Geschwülste urfächlich etwas zu tun? (Medizinische Klinik 1927, Jhg. 23, Nr. 52, S. 1999—2001.)

Da Krebs in jedem Alter, also auch bei Kindern vorkommen kann, so hat nach M. das Alter mit der Entstehung der bösartigen Geschwülste nichts zu tun. Kein Alter ist sicher, deshalb kann auch keine Theorie über die Entstehung des Krebses Anspruch auf Gültigkeit erheben, wenn sie irgendwie oder gar hauptsächlich auf den morischen Säulen des Alters ruht. Zur Entstehung eines bösartigen Gewebes müssen mehrere Umstände zusammenwirken. Sie können verschiedener Art sein (chemischer, traumatischer, thermischer usw. Natur). Andererseits muß noch ein einheitlich wirkender Umstand dazukommen, den wir bisher nicht kennen. Nicht mehr darf gefragt werden: Wodurch entsteht ein Karzinom, sondern es muß heißen: Durch welche Störung wird ein Gewebe bösartig? Bei Behandlung von Mäusen mit Teer entsteht Krebs, ganz selten aber auch ein Sarkom. Das wesentliche ist also, daß eine Störung wirksam wird, die gewisse Zellen der Mäuse bösartig wuchern läßt. Eine gewisse Berichtigung für diese Anschauungsweise scheint auch darin zu liegen, daß es oft dem erfahrenen Pathologen unmöglich ist, Karzinom und Sarkom histologisch zu trennen. Gelingt es dereinst, die Bösartigkeit auslösende Störung in ihrem Wesen zu erfassen, so wird sich wohl auch zeigen, daß sie gemäß den veränderten Stoffwechselverhältnissen im alternden Organismus bei alten Individuen häufiger auftreten muß, daß sie aber beim geschwulstkranken Säugling genau so nachzuweisen ist. Es ist jede Entstehungstheorie abzulehnen, die nicht auf das Neugeborene anwendbar ist. Auch wissen wir nicht, wie lange jemand krebskrank sein kann, ohne eine Geschwulst oder gar eine nachweisbare Geschwulst zu haben. Altersstatistik des Krebses ist bedeutungslos. Der Arzt, der an dem Wahn festhält, daß der Krebs eine Alterserscheinung sei, muß ihn notwendig beim jungen Kranken übersehen, den er dann durch seine falsche Diagnose schwer schädigen kann. Verf. führt den Fall an, daß der Anatom Heller in Kiel im Jahre 1892 eine Karzinomdiagnose wegen der Jugend des Kranken ablehnte (dreijähriger Knabe mit enormem Krebs der rechten Nebenniere und sekundären Krebsknoten in der Lunge). A.

Nevinny, H.: Zur Pathologie der Trichinose. (Medizinische Klinik 1927, Nr. 29, S. 1105—1106.)

Pavlica teilt mit (M. Kl. 1927, Nr. 5 und 6), daß bei einer von ihm beschriebenen Trichinenepidemie neun Patienten sich am Fleische einer sechsjährigen Sau infizierten, deren Fleisch teils roh aus der Beize, teils wenig gekocht oder kurz gefeilt genossen worden war. Die letzten Ferkel dieses Schweines im Alter von 3—4 Monaten waren nun ebenfalls trichinös und P. nimmt an, daß die Ferkel intrauterin, durch den plazentaren Kreislauf infiziert worden seien, während die Infektion des Mutter Schweines im Verlauf der Trächtigkeit, das ist in den letzten 4—8 Monaten des Lebens, erfolgt sei. Es steht längst fest, daß bei Mensch und Tier

die von einer trichinösen Mutter geborene Nachkommenchaft frei von Trichinose ist. Im Tierversuch gelingt es leicht, selbst zur Zeit der akuten Darmtrichinose, Konzeption zu erzielen. Es läßt sich nun an solchen Tieren die absolut zuverlässige Dichte des Plazentarfilters erweisen (Gerlach, Stäubli). Verf. erinnert an die alte Beobachtung Gerlachs, der bei einem von zwei drei Monate alten Spanferkeln eine geringgradige Muskeltrichinose feststellte. Diese Spanferkel hatten mit einem trichinösen Schwein den Kofen geteilt, welches mit Absicht außerhalb des Stalles zweimal — das letzte Mal fünf Wochen vor der Tötung der Spanferkel — mit trichinösem Material gefüttert worden war. In diesen sowie in anderen Fällen (v. Osterreich u. a.) ist keine intrauterine Trichinellenübertragung anzunehmen, sondern wäre dadurch zu erklären nach der von v. Osterreich angenommenen Weise, daß die Ferkel sich wahrscheinlich an erbrochenen Massen der Mutter Schweine oder an unverdaut im Kote dieser Tiere abgegebenen trichinösem Material (unverdaute Muskelstücke aus dem Fütterungsmaterial, evtl. an einer vom Mutter Schwein verzehrten trichinösen und wieder erbrochenen Ratte) selbst infiziert hatten. A.—

Schwarz, L. und W. Deckert: Hygienische Betrachtungen über einige Räucherapparate zur Vernichtung tierischer Schädlinge. (Aus dem Hygienischen Staatsinstitut Hamburg. — Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. med. u. phil. R. O. Neumann, Abteilung VI, Gewerbe-, Bau- und Wohnungshygiene, Schädlingsbekämpfung.) (Zschr. für Hyg. 1928, 108, H. 2, S. 283.)

Seit einer Reihe von Jahren werden kleine Räucherapparate in den Handel gebracht, die mit Erfolg zur Abtötung von Ratten und Mäusen usw. benutzt werden, indem aus angezündeten Räucherpatronen Rauchschwaden entstehen, die in die Rattengänge usw. eingeleitet, diese Schädlinge alsbald abtöten. Verf. mußten kürzlich die Frage bearbeiten, ob ein derartiger Apparat auch in Wohnungen Verwendung finden könne. Dabei stellten sie folgendes fest: Die wirklichen Bestandteile sind im allgemeinen Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlenstoff und Kohlenoxyd. Die Benutzung dieser Apparate in geschlossenen Räumen sollte nur durch konzessioniertes Personal unter Innehaltung der erforderlichen Vorichtsmaßnahmen erfolgen. Räucherpatronen, die Arsen enthalten, dürften nur gegen Giftfische abgegeben werden. Ihre Benutzung in geschlossenen Räumen müßte verboten werden. Gegen die Verwendung der untersuchten Apparate im Freien bestehen bei Innehaltung primitivster Vorichtsmaßnahmen keine hygienischen Bedenken. Ziegler.

Beller, K.: Infektionswege und Entwicklung des Hakenwurms vom Schafe (Bunostomum trigonocephalum Rud. 1808). (Aus der Veterinärabteilung des Reichsgesundheitsamtes.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 32, H. 3, S. 231.)

Beller erbringt in vorliegender Arbeit, in Übereinstimmung mit anderen Autoren, den Nachweis, daß der als Bunostomum trigonocephalum (Rud. 1808) bezeichnete Hakenwurm vom Schafe nicht etwa einen harmlosen Schmarotzer darstellt, sondern einen Parasiten, der bei fog. Jährlingen schon in verhältnismäßig geringer Zahl ernsthafte Gesundheitsstörungen bedingen kann. Die Beobachtungen der Praxis werden vollauf bestätigt durch die künstliche Züchtung, die eine dem Hakenwurm des Menschen entsprechende Entwicklung aufdeckte und die künstliche Infektion von Versuchstieren ermöglichte. Diese gelang nicht nur per os, sondern, ebenfalls in Übereinstimmung mit den aus der praktischen Beobachtung sich ergebenden Erwartungen, auch perkutan bei Schafen und Ziegen. Der Grad der Erkrankung wächst keineswegs mit der Zahl der Würmer, sondern steht oft dazu in einem umgekehrten Verhältnis. Er ist dagegen wesentlich abhängig von dem Alter des Wirtstieres. Ganz

ausgeschlossen erscheint die vielfach bestehende Vermutung, daß Hakenwürmer außer im Dünndarm auch in den dicken Därmen ihren Sitz haben. In Bezug auf den Nachweis einer Hakenwurminfektion am lebenden Tier wurde die früher beschriebene Eigenschaft des Blutserums, zugesetzte Erythrozyten aufzulösen, bestätigt. Es handelt sich dabei um thermostabile Stoffe, die auf eine Giftwirkung der Hakenwürmer zurückgeführt werden. Mit alkoholischen Wurmextrakten scheint ein Allergiezustand der Haut bei erkrankten Tieren nachweisbar zu sein. Der Eizählung bei der Hakenwurmflechte der Schafe muß in prognostischer Beziehung nur ein sehr bedingter Wert zugesprochen werden. Wohl in der Regel wird die Diagnose nicht wie beim Menschen mittelbar, sondern anlässlich der Obduktion gesichert werden. Die pathologisch-anatomischen Veränderungen liefern dann schon bisweilen charakteristische Merkmale, die aber nur im Zusammenhang mit dem Nachweis der Hakenwürmer selbst als beweisend betrachtet werden dürfen. Abgesehen von dem festen Anhaften an der Darmwand vertragen sie sich durch ihre Haltung, die beim Weibchen in einem mehr oder weniger regelmäßigen Bogen verläuft, während das Männchen am Hinterende stets eine hakenförmige Krümmung aufweist. Die morphologischen Eigenschaften, ebenso die biologischen Merkmale stimmen mit denen des Hakenwurms des Menschen und des Hundes in den wesentlichsten Punkten überein. Wenn demgegenüber die pathogene Bedeutung des Hakenwurms vom Schafe bisher weniger hervorgetreten ist, so mag dies teils in dem für die Entwicklung der Hakenwürmer ungünstigen Klima der gemäßigten Zone, teils in der Art der Haltung der Schafe begründet sein, die nur während der härtesten Wintermonate praktisch eine Ansteckung zulässt.

Ziegler.

Gansser, A.: Letale Wirkungen bei medikamentöser Behandlung sowie Exstirpation von Hypodermenlarven. (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1928, Bd. 70, S. 197—200.)

Nach Peter (B. T. W. Nr. 39, 46, 1927) ergibt die Befragung mit Chlor oder SO_2 bei Dasselfliegenplage keine befriedigende Resultate, weil sich die Stigmata der Larven reflektorisch schließen. Verf. äußert, es könne hierbei auch die alkalische Reaktion des sich bei Zurückziehen der Larve in dem Kanal legende Serum die Wirkung dieser gasförmigen Stoffe herabgesetzt werden. Die in Frankreich erfolgreich angewendete Paradichlorbenzolfalbe wurde in Deutschland nicht erfolgreich verwendet. Karbolsäure (als Salbe) wirkt zwar auf die Parasiten gut, ist aber wegen des Überganges des Geruches ins Fleisch kontraindiziert. Auch liegt die Möglichkeit einer Vergiftung durch Ablecken durchaus vor. Nach Hypokotin (ein Tabakpräparat) wie Karbolsäure zeigen die abgetöteten Larven Pulverhorn-Form; diese wird gelegentlich auch sonst bei ihnen beobachtet. Bei der Abtötung kann man vier verschiedene Zustände unterscheiden: 1. Die Larve bleibt äußerlich normal, trocknet aber ein (am häufigsten). 2. Sie wird dunkelbraun, dann schwarz, behält aber die Form (wohl als Winterlarven anzusehen). 3. Sie wird schwarz, bekommt Puppenform, entwickelt sich nicht weiter. 4. Sie ist von abnorm langer Lebensdauer, stirbt aber dann ab, diese Form ist anscheinend auf besondere biologische Bedingungen zurückzuführen (entspricht vielleicht auch der Winterform). Wie die Form 1 und 4 zeigen, muß man mit der Beurteilung der Abtötungswirkung vorsichtig sein. Auch kommt es auf eine Gewinnungsmethode an, welche das Leben der Parasiten nicht schädigt. Verf. hat sie zu seinen Versuchen nicht durch Abdämpfen, sondern durch Loslösen aus dem Bindegewebslack auf der Fleischseite der frisch abgezogenen Haut gewonnen, wodurch Läsionen vermieden, außerdem viele Puppen erhalten werden können. Der Scheintod wird mit Hilfe des Sonnenlichtes oder durch Anhauchen warmer (37 Grad), feuchter Luft festgestellt. Verf. rät vergleichende Untersuchungen von Karbol- und

Hypokotinfalben an, um zu einem praktisch und gewerblich brauchbaren Vertilgungsmittel zu gelangen. H. G.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Schnürer: Die Schutzimpfung bei Tieren durch aktive Immunisierung. Vortrag gelegentlich der 12. Tagung der deutschen Vereinigung für Mikrobiologie in Wien 1927. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 104, S. 115, 1927.)

Das vorliegende Immunisierungsverfahren, das zum größten Teil mit Erfolg angewandt wird, hat in Bezug auf die Zahl der hier in Betracht kommenden Tierseuchen (ca. 40) wie auch auf die Zahl der Impflinge eine große Bedeutung erlangt. Die Grundtatsachen, nach denen die aktive Immunisierung durchgeführt wird, sind bei unseren Tieren die gleichen wie beim Menschen, doch ergibt sich der fundamentale Unterschied, daß erstere nur eine in Geldeswert darstellbare Sache darstellen, und daß dementsprechend auch die Tötung von Tieren selbst dann von Vorteil sein kann, wenn für die betreffende Krankheit ein wirksames Impfvorhanden ist (Lungenseuche, Rinderpest, Maul- und Klauenseuche usw.). Der Vortragende verbreitet sich sodann in kritischer Darstellung über sämtliche Impfmethode, wie sie z. Zt. im Gebrauch sind. Da zu kurzem Auszuge nicht geeignet, sei auf das Original verwiesen. Zum Schluß hebt Schnürer die ungeheuer weittragende Bedeutung der aktiven Immunisierung bei Haustieren für die Volkswirtschaft und Volksgesundheit hervor. Es wäre jedoch nichts verfehler, als wenn man annehmen wollte, daß mit der aktiven Immunisierung alles getan sei. Die Wirkung schwerwiegender Fehler bei der Zucht, Aufzucht, Haltung und Fütterung kann dadurch nicht beseitigt werden. Erst wenn die Zucht auf Gesundheit, die beste Form der aktiven Immunität, mehr berücksichtigt wird, d. h. wenn natürliche Verhältnisse an Stelle der maschinenmäßigen Ausnützung des Tierkörpers getreten sind, dann werden wir der wenigen noch notwendigen, aber höchst wirkungsvollen Schutzimpfungen erst wirklich froh werden. Carl.

Grävinghoff, W.: Untersuchungen über die Ziegenmilchanämie. (Abhandlungen aus der Kinderheilkunde und ihren Grenzgebieten, Heft 18, 1928.)

Auf Grund einer kritischen Sichtung der Literatur und eigener Versuche gelangt Verf. zu folgenden Schlüssen:

1. Für die Entstehung der alimentären Anämie des Kindes, besonders für die Ziegenmilchanämie, kann bisher weder eine einzelne Ursache als allein schuldig bewiesen werden, noch können von den dafür angeschuldigten Ursachen die eine oder andere mit Sicherheit als unbeteiligt ausgeschlossen werden.
2. Die Obduktionsbefunde bei Ziegenmilchanämie lassen schwere Schädigungen der blutbereitenden und -abbauenden Organe erkennen und zeigen nähere Beziehungen zu den Befunden bei kryptogenetischer, perniziöser Anämie und aplastischer Anämie der Erwachsenen.
3. Beim neugeborenen Hunde entwickelt sich eine „physiologische Anämie“, die etwa drei Monate anhält.
4. Die Tierversuche von Hoeßlin, Cloetta, Häusermann u. a., die den Eisenmangel in der Nahrung als Anämie Ursache beweisen sollen, bedürfen der Nachprüfung. Die Bunge'sche Theorie von dem Eisenvorrat in der Leber, der, vor der Geburt angelegt, den Eisenmangel der jeweiligen Muttermilch als Anämieversuche ausgleichen sollte, wird durch die festgestellte „physiologische Anämie“ für den jungen Hund unwahrscheinlich.
5. Ziegenmilchnahrung verstärkt beim jungen Hund die „physiologische Anämie“ und verhindert die mit fortschreitendem Alter eintretende regelmäßige Erholung der Blutverhältnisse.
6. Die Ursache dieses Einflusses der Ziegenmilch ist beim

jungen Hund neben einer Hemmung der Leukopoëse vorwiegend in einer Hemmung der erythroplastischen Tätigkeit des Knochenmarks zu suchen.

7. Im Verein mit klinischen Beobachtungen, die denen Glanzmanns und Stettens entsprechen, sowie mit den Tierversuchen Glanzmanns geben die angeführten Befunde eine Erklärung für die besonders schwere Verlaufsform der Ziegenmilchanämie. Carl.

Park, H. W.: **Über Tuberkulose und Milch.** Wissenschaftliche Tagungen der V. Internationalen Konferenz der Vereinigung gegen die Tuberkulose in Washington vom 30. September bis 2. Oktober 1926. (Schweizerische Mediz. Wschr. 1927, Jhg. 8, Nr. 12, S. 282—283.)

Unter den Faktoren, welche die Häufigkeit der Infektionsmöglichkeit durch Milch bedingt, spielen die Verbreitung der Rindertuberkulose, sodann das von den Säuglingen verbrauchte Milchquantum, sowie die Art der Behandlung der Milch eine große Rolle. Der einzig mögliche Weg der Diagnose der Rindertuberkulose liegt in dem bakteriologisch-biologischen Nachweis vermittelt Kulturverfahren und Einimpfung auf das Kaninchen. Die Umwandlung der Rindertuberkelbazillen in den menschlichen Bazillentypus erscheint dem Ref. sehr fraglich. Die halbjährige Tuberkulinprobe des Rindviehs (subkutan, intradermal und konjunktival) ist ein Weg zur wirksamen Bekämpfung der bovinen Tuberkulose, vorausgesetzt, daß diese Methode nicht auf einzelne Herden, sondern auf einen ganzen Landstrich ausgedehnt wird unter sorgfältiger Vermeidung der Reinfektion durch Kontakt mit anderen verseuchten Herden und unter Ausschluß von neuhinzugekommenen, aber infizierten Tieren. Park spricht sich weiter für die Pasteurisation der Milch aus, sie sollte sich aber auch auf die Butter erstrecken, um eine vollkommene Elimination der bovinen Infektion zu erreichen. Ebenso soll die Milch von infizierten Kühen zur Aufzucht der Kälber erst erhitzt werden. Es steht fest, daß durch Genuß roher Milch Kinder infiziert werden. Nicht absolut sicher ist die Vermutung, daß die Gesamtzahl der Tuberkulosefälle der Menschen (speziell auch der in der einen Gemeinde vorkommenden Sterbefälle) eine Steigerung erfährt durch Genuß roher Milch. Viele der durch Rindertuberkulose hervorgerufenen Infektionsfälle könnten dadurch einen Schutz gegen den menschlichen Bazillienstamm erworben haben. Trotzdem muß das Ausmerzen der Infektionsursache durch den bovinen Tuberkelbazillus unsere Aufgabe bilden. In Städten, wo nur pasteurisierte Milch Verwendung findet, hat die Zahl der Fälle von menschlicher Rindertuberkulose abgenommen (ebenso Scharlach, septische Halserkrankungen, Diphtherie und Typhus). Als zweckmäßigste Pasteurisierungstemperatur in großem Maßstabe hat sich eine Minimaltemperatur von 61—62 Grad C ergeben und bewährt. Schroeder hebt die Häufigkeit der Tb.-Bazillen selbst in der am höchsten bewerteten Butter hervor (in Washington 7 Prozent im Mittel). Die Resistenz des bovinen Bazillus ist sehr groß, es war nach 100 Tagen Aufbewahrung im Eisschrank noch eine Infektion der Schweine möglich. Ebenso erwies sich der Rahmkäse in 14 Prozent der Proben infiziert. Durch Pasteurisierung des Rahmes und der Käseforten kann die Infektionsmöglichkeit auf ein Minimum weniger wie 1 Prozent reduziert werden. Unter Aufsicht eines vom Bunde und von den Staaten bestimmten Viehinpektors und unter Assistenz bewährter Tierärzte werden dreifache Tuberkulinproben ausgeführt und beobachtet. Ist die tuberkulöse Erkrankung nach mehrfacher Prüfung einwandfrei festgestellt, so wird das Tier getötet (Entschädigung 50 Prozent). Auch werden seit 3½ Jahren mit gutem Erfolge Schutzimpfungen abgeschwächter Tuberkulosestämmen (von Vogel-, Rinder- und verschiedenen menschlichen Tb.-Bazillensstämmen) vorgenommen, die auch bei der menschlichen Tuberkulose erfreuliche Resultate versprechen. Bemerkenswert ist noch die

Mitteilung von Korber, daß bis zum Jahre 1884 die Indianer von dieser Krankheit verschont blieben; er leitet deren Infektion teils vom Genuß an Tuberkulose verstorbenen Tiere ab, teilweise von dem Kontakt mit den Weißen.

A.—

Detre, B.: **Die Ätiologie der tierischen Ruhr.** Vortrag gelegentlich der 12. Tagung der deutschen Vereinigung für Mikrobiologie in Wien 1927. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 104, S. 246, 1927.)

Auf Grund jahrelanger Untersuchungen waren Verf. und sein Mitarbeiter Rohonyi zu dem Ergebnis gelangt, daß die im Blute und den Organen ruhrkranker Säuglinge nachweisbaren Coliarten nicht in ätiologischer Beziehung zu der Krankheit stehen könnten. Bei der Suche nach dem wirklichen Ruhrerreger wurde in der Weise vorgegangen, daß der Autor die typisch veränderten Dünndarmteile aufschnitt, auf ein Brett aufspannte und sodann mit einem kräftigen Wasserstrahl alle an der Oberfläche befindlichen Keime entfernte. In aus der Tiefe des nekrotischen Gewebes hergestellten Präparaten konnte ein kurzer, dicker, grampositiver Bazillus fast in Reinkultur nachgewiesen werden. Die Reinzüchtung dieses Mikroorganismus wurde in der Weise versucht, daß der gereinigte Darm umgekehrt (Serosa nach oben), auf einer Unterlage befestigt, die oberste Schicht mit dem Rasiermesser abgetragen und das so entnommene Material zu Kulturen verarbeitet wurde. Bei anaerober Kulturmethode (Tarozzi-Bouillon) wuchsen vier Bakterienarten, darunter die gesuchte. Schließlich gelang es, aus der Gekrösdrüse eines mit Material vom Ferkel geimpften Meerschweinchens den Keim unter streng anaeroben Bedingungen in Reinkultur darzustellen. Letztere erwies sich dem erwähnten Versuchstiere gegenüber ausnahmslos als tödlich pathogen, und es konnte der Erreger aus den Organen der Meerschweinchen wieder herausgezüchtet werden. Derselbe Versuch gelang, als Verf. gelegentlich mehrerer Seuchengänge unter Ferkeln und Lämmern die Mesenterialdrüsen in derselben Weise verarbeitete. Der neue Erreger stellt ein unbewegliches, dickes, sporenfrees Stäbchen von etwa Milzbrandlänge dar, das eine Kapsel aufweist. Nach seinen morphologischen und biologischen Eigenschaften gehört es zur Gruppe der Fränkelschen Anaeroben. Mit der neuen Keimart läßt sich nicht nur subkutan, sondern auch per os durch das Auge und den After bei neugeborenen Ferkeln eine tödliche Infektion hervorrufen. Züchtungsversuche ergaben den erwähnten Erreger wieder teils in Reinkultur, teils gemischt mit Coli. Eine subkutan infizierte hochtrachtige Sau warf nach 48 Stunden ohne krank gewesen zu sein drei Ferkel, die nach drei Tagen unter den typischen Erscheinungen und dem Sektionsbefund der Neugeborenenruhr zugrunde gingen. Da ein dem beschriebenen ähnlicher Mikroorganismus vom Verf. auch bei an anderen Krankheiten verendeten Tieren nachgewiesen werden konnte, so nimmt er an, daß diese wohl weit verbreitete Keimart nur unter bestimmten Verhältnissen krankheitserregend wird. Als primärer Erreger der fälschlich sogenannten Coliruhr wäre nach Ansicht des Verf. der von ihm isolierte Keim anzuprechen, während den Coliarten wie den Bipolaren und Pestiferarten bei der Schweinepest nur eine sekundäre Rolle zukommen würde. Carl.

Zeissler, J. u. K. Neller: **Anaerobe Wundinfektionen im Frieden.** (Arch. f. klinische Chirurgie 1928, Bd. 149, S. 793.)

Die Bezeichnung „Gasödem“ gibt am treffendsten das klinische Bild aller Wundinfektionen durch anaerobe Bazillen wieder. Obwohl in Wunden oft pathogene Anaerobier gefunden werden, kommt es doch nur in den allerwenigsten Fällen zur Entwicklung eines Gasödems. Neben allgemeiner Schwächung des Körpers (Alkoholismus, höheres Alter), scheint besonders eine unterdrückte Blutzirkulation in und um die infizierte Wunde die Entstehung einer Erkrankung zu begünstigen. Bei 21 untersuchten Fällen stellten Verff. den Fränkelschen Gasbazillus 21mal, den Novy'schen Bazil-

lus 7mal, den Pararaufschbrandbazillus einmal, den Bac. histolyticus einmal und den Tetanusbazillus dreimal fest. Diese Zahlen entsprechen etwa dem prozentualen Vorkommen der betreffenden Mikroorganismen in 200 Erdproben, die im Kriege an allen Teilen der europäischen Fronten gesammelt und im Zeißlerschen Institut bearbeitet wurden. Neben der möglichst frühzeitigen und gründlichen chirurgischen Versorgung evtl. infizierter Wunden versprechen sich die Verff. viel von der Anwendung eines polyvalenten Anaerobenserums und erklären seine Herstellung für höchst wünschenswert. Merkwürdigerweise wird der Gasödemfrage wenig Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl die Zahl der Erkrankungs- und Todesfälle ein Mehrfaches der des viel beachteten Milzbrandes beträgt. Am Schluß der Arbeit sind die Krankengeschichten der untersuchten Gasödemfälle zusammengestellt. Schoop.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Meyer und Loeventhal: Untersuchungen über Antikörperbildung in Gewebekulturen. (Zeitschr. f. Immunitätsforschung 1928, 54, S. 409.)

In Kulturen von Milz, Lymphdrüsen und „Mischflecken“ des Netzes des Kaninchens wurde regelmäßig Agglutininbildung beobachtet, und zwar sowohl wenn die Organe von Tieren stammten, bei denen die Antikörperbildung durch Injektion abgetöteter Typhusbakterien in Gang gebracht war, als auch bei Verwendung der Organe normaler Tiere, denen unmittelbar vor Anlegung der Kultur die Bakterien intravenös eingespritzt worden waren. Die Agglutininbildung war bereits nach 48 Stunden nachweisbar, erreichte am dritten Tage ihren Höhepunkt und nahm dann sehr schnell ab. Nach fünf Tagen war eine Agglutininbildung nicht mehr nachweisbar.

Durch die Feststellung der Agglutininbildung in Kulturen von „Mischflecken“ des Netzes, in denen außer Fibroblasten nur Elemente des retikulo-endothelialen Systems enthalten waren, wurde zum ersten Male der direkte Nachweis geführt, daß diese Zellen Antikörperbildner sind, so daß ihnen auch innerhalb der lymphoiden Organe die Hauptrolle bei der Antikörperbildung zukommen dürfte. Das frühzeitige Erlöschen der Antikörperbildung in den Kulturen wird auf die bald einsetzende Entdifferenzierung des retikulo-endothelialen Gewebes zurückgeführt. Meyn.

Schander, H.: Zur Frage der Spirochaetenpersistenz im Zentralnervensystem und ihre chemo-therapeutische Beeinflussbarkeit bei experimenteller Rekurrenz. (Arch. für Schiffs- und Tropen-Hyg. 1928, S. 1.)

Im Zentralnervensystem der mit Rekurrenzspirochäten infizierten Ratten lassen sich in der Immunperiode stets Spirochäten nachweisen. Sie wurden im Großhirn, Kleinhirn, Rückenmark sowie im Nervus opticus gefunden. Dabei ergab die Verimpfung der Hirnrinde seltener positive Impfergebnisse als die des Markes. Da es sich um eine reine humorale Immunität handelt, konnte diese Erscheinung nach Verf. mit der besseren Blutgefäßversorgung der Rinde und mit dem infolgedessen größeren Immunerumgehalt erklärt werden. Im chemotherapeutischen Versuch mit rekurrenzinfizierten Mäusen konnten drei Stadien der Beeinflussbarkeit des Infektionsverlaufes beobachtet werden. Im ersten Stadium (Behandlung zwei Tage infekt.) wurde zwar eine Reinigung des Blutes von den Erregern erzielt, doch kam es offenbar zur Flucht der Spirochäten ins Zentralnervensystem, wo sie im biologischen Versuch stets nachgewiesen werden konnten. Setzte die Behandlung erst 8 bis 9 Tage nach der Infektion ein, so war auch die Vernichtung der im Gehirn befindlichen Spirochäten möglich (2. Stadium). Im dritten Stadium, Behandlung während der Immunperiode, wurden die Erreger im Gehirn nicht beeinflusst. Wetzel.

v. Holzhausen, G.: Ein bisher unbekannter Erreger einer Mäuseseptikämie (Corynebakterium murisepticum n. sp.). (Aus dem Hygiene-Institut der Universität Graz.) (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 105, S. 94, 1928.)

Bei der intramuskulären Verimpfung von Hirnbrei eines wutverdächtigen Hundes auf weiße Mäuse erkrankten diese regelmäßig unter Lähmungsercheinungen und verendeten am dritten Tage nach der Impfung. Als Krankheitserreger wurde ein zartes, unbewegliches, grampositives 1,2—1,5 μ langes Stäbchen nachgewiesen, das im Tierkörper, nicht aber in der Kultur an beiden Enden zarte, kugelige, wie die Polkörner der Diphtheriebazillen aussehende, sich intensiver färbende Auftreibungen trägt. Sonstige Färbung mit allen Anilinfarben möglich, Züchtung desgleichen auf den gebräuchlichen Nährboden namentlich bei Zusatz von nativem Eiweiß. Kulturell treten zwei Typen in die Erscheinung. Auf Agarplatten wächst der Mikroorganismus in Form von runden, scharf begrenzten, wasserhellen ungranulierten Kolonien, die sich aus gleich großen regelmäßig angeordneten Stäbchen zusammensetzen (Typus I). In Bouillon tritt gleichmäßige Trübung ein und im hängenden Tropfen sind alsdann lange Scheinfäden nachweisbar. Bei Weiterzüchtung auf Agar bilden letztere unscharf begrenzte, leicht grau getrübe Kolonien (Typus II). Nach jeder Form der parenteralen Einverleibung auf Mäuse ruft der Bazillus ohne toxisch zu wirken eine tödliche Septikämie hervor, die besonders dadurch gekennzeichnet ist, daß einzig und allein die Endothelzellen der Blutgefäße des Körpers das Bakterium geradezu elektiv speichern, während die eigentlichen Retikulo-Endothelzellen frei bleiben. Der Erreger dürfte in die Gruppe der Corynebakterien einzureihen sein und wurde daher provisorisch als Corynebakterium murisepticum n. sp. bezeichnet. Carl.

Seelemann, M. und Klingmüller, H.: Die Züchtung von Tuberkelbakterien aus verschiedenen Ausgangsmaterialien mit Hilfe des sog. Säurebehandlungsverfahrens. (Aus dem Bakteriologischen Institut der Preussischen Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft in Kiel.) (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 104, S. 482, 1927.)

Seelemann war es schon früher öfters gelungen, mittels des Hohnschen Säureverfahrens unter Verwendung des Lubenaufchen Eiernährbodens Kolonien des Tuberkulosebazzillus selbst dann herauszuzüchten, wenn das von Versuchsmeerschweinchen stammende Ausgangsmaterial im nach Ziehl gefärbten Ausstrichmaterial keine Bazillen enthielt. Bei der Bedeutung dieses Verfahrens für die Praxis der Diagnosestellung wurden von den Verff. weitere diesbezügliche Untersuchungen angestellt, die zu folgenden Ergebnissen führten:

In Übereinstimmung mit Hohn müssen auch wir auf Grund unserer Erfahrungen an Hand von 78 Einzelversuchen zu einer günstigen Beurteilung des Kulturverfahrens für Tuberkelbazillen unter Anwendung von Säuren kommen.

Der Vorteil des Säurebehandlungsverfahrens liegt gegenüber allen anderen Züchtungsverfahren insbesondere in der Einfachheit seiner Durchführung und der zufriedenstellenden Sicherheit im Endergebnis. Es ist Hohns Verdienst, zuerst darauf hingewiesen zu haben, daß sich das Verfahren durch den Wegfall des Auswaschens und die ausschließliche Verwendung des Lubenaufchen Eiernährbodens sehr einfach gestalten läßt. In Frage kommen sowohl HCl wie H₂ SO₄ in Konzentrationen von 10, 12 und 15 Prozent, je nach Menge des Keim- und Tuberkelbazillengehaltes. Wenn wir auch mit Hilfe der H₂ SO₄ im Durchschnitt befriedigende Resultate erzielten, so müssen wir doch auf Grund von Beobachtungen in einzelnen Versuchen der HCl vor der H₂ SO₄ den Vorzug geben. Die HCl halten wir für besonders geeignet in solchen Fällen, in denen man auf Grund des mikroskopischen Bildes mit einem äußerst spärlichen Tuberkelbazillengehalt rechnen muß. Es liegt die Ver-

mutung nahe, daß auf Grund der Ergebnisse in einigen Versuchen die H_2SO_4 bei zwar stärkerer Wirkung auf die Begleitbakterien auch die Tuberkelbazillen bis zu einem gewissen Grade „angreift“, ein Nachteil, der auch durch Anwendung einer schwächeren Säurekonzentration nicht ausgeglichen werden kann.

Die Frage, ob der Kulturversuch und Tierversuch als gleichwertig anzusehen sind, ist auf Grund der vergleichenden Prüfungen dahin zu beantworten, daß unseres Erachtens der Tierversuch zweifellos die größere Sicherheit zum Nachweis der Tuberkelbazillen bietet. Hierdurch sind selbstverständlich dem Kulturverfahren, das in der Regel nur in mikroskopisch negativen Fällen zur praktischen Nutzanwendung kommen wird, gewisse Grenzen gesetzt, wenn auch hervorzuheben ist, daß die Züchtung noch in einem hohen Prozentatz aus Material gelingt, das wir schlechthin als „mikroskopisch negativ“ zu bezeichnen pflegen. Jedoch glauben wir, daß nicht restlos alle „mikroskopisch negativen“ Fälle durch die Kultur allein erfaßt werden, und zwar besonders dann nicht, wenn im Untersuchungsmaterial Sporenbildner vorhanden sind, die sich durch die Säurebehandlung nicht immer gänzlich ausscheiden lassen. In dieser Beziehung dürften besondere Schwierigkeiten bereiten die Untersuchung von Kot, Rinderisputa und in geringerem Grade Milch.

Die hier gemachten Einwendungen und Einschränkungen bezüglich des Kulturverfahrens sollen keineswegs bezwecken, seinen Wert als Nachweismethode für Tuberkelbazillen herabzumindern. Wir glaubten jedoch auf Grund des bisher vorliegenden Versuchsmaterials diese vorsichtige Kritik üben zu dürfen. Vielleicht läßt sich durch weitere Arbeiten eine noch günstigere Vervollkommenung des Züchtungsverfahrens auf dem nunmehr beschrittenen Wege erzielen.

Carl.

Schuberg, A.: Das gegenwärtige und frühere Vorkommen der Malaria und die Verbreitung der Anophelesmücken im Gebiete des Deutschen Reiches. (Arbeiten aus dem Reichsgesundheitsamt 1927, 59. Bd., Heft 1 und 2.)

Die umfangreiche über 400 Druckseiten umfassende Arbeit bringt einmal genaue statistische Angaben über Malariavorkommen im Deutschen Reich sowie auch über die Verbreitung der Anophelesmücke im besondern. Es sollte hierdurch speziell die Frage geklärt werden, ob die Malaria durch die während des Krieges erfolgten Einschleppungen eine Wiederausbreitung im Gebiete des deutschen Reiches zur Folge gehabt hat. Die Zusammenstellung ergab, daß nirgends eine nennenswerte Ausbreitung der Seuche noch eine Entstehung neuer Herde nach dem Kriege nachweisbar waren. Eine Zunahme der Erkrankungen wurde lediglich im Reg.-Bezirk Aurich festgestellt, der Nachweis aber, daß sie während des Krieges durch Übertragung von eingeschleppten Fällen ausging, konnte nicht erbracht werden. Die Anophelesmücke ist, wenn auch in verschieden großer Häufigkeit, im Gebiete des Deutschen Reiches fast allgemein verbreitet.

Aus den gemachten Erfahrungen erwächst ferner die Überzeugung, daß nur eine ganz durchgreifende und lange Jahre andauernde Verschlechterung unserer kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse ein Wiederaufleben der Malaria zur Folge haben könnte und auch das wohl nur in einzelnen Teilen des Reiches. Der Arbeit ist eine Übersichtskarte am Schluß angefügt.

Berge.

Geflügelkrankheiten.

Klimmer, M. und H. Haupt: Über Infektion von Hühnern mit dem Bacterium gallinarum Klein 1889. (Aus dem Veterinär-hygienischen Institut der Universität Leipzig.) (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 105, S. 99, 1927.)

Die Krankheit trat in zwei größeren, aus derselben Brut-

anstalt bezogenen Sendungen Eintagsküken auf und ergriff hauptsächlich die Lungen der Tierchen. Die Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen:

1. Als Ursache eines gehäuft auftretenden Kükensterbens wird das Bact. gallinarum Klein ermittelt, das bei den Küken eine herdförmige Pneumonie verursacht hat und das im Blute der Kadaver nachweisbar gewesen ist. 2. Das B. gallinarum tritt bei den Küken in zwei Varianten auf, deren eine dem von Rettger (1909) beschriebenen B. pullorum gleicht, während die andere dem von amerikanischen Autoren aufgestellten Typus des B. gallinarum bis auf die Gärfähigkeit für Maltose und Dextrin gleicht. 3. Im Verlaufe der Untersuchungen variieren die Stämme in mannigfacher Weise. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ergebnisse und der Ergebnisse anderer Autoren mit kreuzweisen Abfärbungsversuchen, die übereinstimmend eine serologische Einheit der bisher als getrennte Arten geführten B. pullorum Rettger und B. gallinarum Klein erweisen, erscheint es gerechtfertigt, unter B. gallinarum Klein die gramnegativen, Sporen nicht bildenden, unbeweglichen Bakterien zusammenzufassen, die aus Infektionskrankheiten der Hühner stammen, kein Indol bilden, Saccharose nicht vergären, stets Alkali bilden (zuweilen verzögert) und serologisch eine untrennbare Einheit darstellen (Hauptcharakteristika). Dieses Bact. gallinarum Klein umfaßt die bisherigen Arten B. gallinarum Klein und B. pullorum Rettger sowie alle Varianten dieser Arten. Es ist in der Gruppe B. typhi, B. Salmonella (K. B. Lehmann 1927), B. coli, Dysenteriegruppe als selbständige Art etwa zwischen B. typhi und B. Salmonella einzuordnen.

Carl.

Picard, W. K.: Coccidiosis. (Aus der Abteilung für Geflügelkrankheiten des Veterinärinstituts zu Buitenzorg. — Direktor: Dr. C. Bubberman.) (Niederlands-Indische Bladen voor Diergeneeskunde Deel XXXIX 6. Aflev. S. 468—475.)

Die Coccidiosis kommt auch in Niederländisch-Indien häufig unter jungen Küken vor und kann auch unter Tauben Massensterben veranlassen. Wie der Ansteckungsstoff in gesunde Bestände gelangt, ist oft schwer zu ermitteln. Ist doch eine kleine Brut Leghornküken des Veterinärinstituts zu Buitenzorg, die unmittelbar nach dem Ausschlüpfen in einen hölzernen Kükenbehälter mit herausnehmbarem Mistbrett aus Zink gebracht wurden, nach 1½ Monaten an Coccidiose völlig zugrunde gegangen, trotzdem der Behälter täglich gereinigt und desinfiziert wurde und trotzdem die Tierchen nur Trockenfutter, kein Gras oder Grünfutter erhielten und niemals auf dem Erdboden gewesen waren.

Die ersten Krankheitsercheinungen traten bei den Tierchen auf, als sie vier Wochen alt waren und 14 Tage später waren die zehn hübschen Tierchen gestorben. Die Glucke wurde geschlachtet, der Darminhalt mikroskopisch untersucht, aber Coccidien ließen sich nicht nachweisen.

Allgemein nimmt man an, daß die Infektion durch Futter oder Trinkwasser erfolgt, die durch die Ausleerungen infizierter Tiere verunreinigt sind. Auch der Aufenthalt in infizierten Käfigen oder die Verschleppung des Ansteckungsstoffes durch die Menschen mit ihren Füßen, durch Hunde, Katzen oder wild lebendes Geflügel sowie durch ältere Hühner, die an einer chronischen Form von Coccidiosis leiden und andauernd Coccidien ausscheiden und verbreiten. Der Verf. beobachtete ausschließlich Krankheitsercheinungen an sehr jungen, 14 Tage bis zwei Monate alten Küken und an jungen Tauben von drei Monaten. Die erste Erscheinung war, daß sich die Tierchen nach dem Fressen absonderten. Sie standen bewegungslos in einem Winkel des Kükenbehälters, steckten das Köpfchen zwischen die Schultern, ließen den Schwanz und die Flügel hängen, hielten die Augen geschlossen und piepten andauernd kläglich. Wurden sie aufgejagt, so schienen sie sehr munter zu sein, der Kropf war gut gefüllt und so lange man in der Nähe blieb, waren sie noch munter. Die Fäzes wurden häufig und unter Pressen abgesetzt, waren von normaler Konsistenz,

nicht einheitlich diarrhöisch, aber stets, und zwar bereits bei den ersten Krankheitsercheinungen, mit schleimigen Blutgerinnfeln vermischt. Selbst die schwer erkrankten Tiere zeigten guten Appetit. Charakteristisch ist der Stand der kranken Tierchen. Der Rumpf steht steil auf den Pfoten. Infolgedessen ragt der gefüllte Kropf sichtlich vor. Schließlich werden Gleichgewichtsstörungen beobachtet. Im Stehen schwankt das Tierchen hin und her und droht zu fallen, es kann nicht geradeaus laufen und schlingert beim Gehen. Mitunter purzeln die Küken hin, rollen um ihre Längsachse, kommen aber bald wieder auf die Beine, purzeln über den Kopf nach vorn oder über den Rücken nach hinten und bleiben dann hilflos zappelnd liegen.

Der Verlauf ist schleichend und kann 2—4 Wochen dauern.

Bei der Sektion wird leichte Hyperämie des ganzen Dünn- und Dickdarmes festgestellt. Die Dünndarmschleimhaut ist meistens hämorrhagisch entzündet und sieht nach Entfernung des Darmes lammetartig aus. Das zweiteilige Coecum ist stark ausgedehnt und mit einer orangefarbenen, braunen, pastenartigen Masse gefüllt. Sie besteht zum größten Teil aus Oozyten, roten Blutkörperchen, abgestoßenem Darmepithel und Fäzes. Streicht man diese weg, so bemerkt man zahlreiche kleine Ulzera in der Darmwand. In drei Fällen waren äußerst feine, graue, kleine Herdchen von der Größe einer Stecknadelspitze in der Leber zu sehen. Wie die histologische Untersuchung ergab, bestand ein nekrotischer Prozeß. Die Nieren waren stark hyperämisch, Coccidien waren aber bei der mikroskopischen Untersuchung nicht nachzuweisen. Die Diagnose ist mitunter schwer. In stark infizierten Beständen fällt oft die Sektion und die mikroskopische Untersuchung bei mehreren Tieren negativ aus. Es müssen daher immer möglichst viele Tiere sezuiert werden. Differentialdiagnostisch ist die weiße Ruhr der Küken und die bakteriellen Infektionen der Colityphusgruppe zu berücksichtigen. Diese sind mikroskopisch nachzuweisen, und die weiße Ruhr der Küken kommt höchst selten bei Tieren vor, die älter als 10 Tage sind.

Bei der Behandlung der Coccidiosis haben am besten gewirkt Tannoform und Arecanuß. Vom Tannoform genügt ein Teelöffel voll, vermischt mit einem hart gekochten, fein geriebenen Ei für zehn Küken von 3—6 Wochen und wird zwei Tage hintereinander mit je 1 Tag Pause, bis Besserung eintritt, verabreicht. Die Arecanuß wird getrocknet und fein gepulvert mit dem Trockenfutter vermischt. Es ist höchstens 1 Gramm auf zehn Küken zu geben. An weiteren Arzneimitteln werden empfohlen reines Creolin (1 Eßlöffel auf vier Liter Wasser), Catechu (1 Eßlöffel auf vier Liter Wasser), Sublimat (1:10.000 Trinkwasser mit Zwischenräumen von je zwei Tagen. Zwei Tage hintereinander, aber im ganzen höchstens zehn Tage zu verabreichen).

Sehr wichtig ist es, die Fäzes mehrere Male am Tage zu entfernen und die Küken möglichst lange vom Erdboden abzuhalten oder Auslauf nur auf Stein- oder Zementfußboden zu gestatten. Grünfutter soll vor drei Monaten nicht verabreicht werden. Kunstmütter, Kükenbehälter und Ställe, die infiziert gewesen sind, sind stets gefährlich, auch wenn sie gründlich desinfiziert worden sind. Am besten ist es, solche Ställe lange Zeit unbenutzt und das direkte Sonnenlicht einwirken zu lassen.

Die Sektionsercheinungen bei den an Coccidiosis verendeten Tauben stimmen mit den bei den Küken erwähnten überein. Die Därme, besonders das Duodenum, zeigten das Bild einer chronischen Enteritis, die Caeca waren stark ausgedehnt und mit der typischen, orangefarbenen pastenartigen Masse angefüllt. In Ausstrichpräparaten wimmelte es von Oozyten, Leber, Nieren und Lungen zeigten nichts Abnormes.

Bass.

Verschiedene Mitteilungen.

Bernhard Bang zum 80. Geburtstage.

(Eine Autobiographie.)

Bernhard Bang ist als Sohn eines Gymnasiallehrers in Sorø (Seeland) am 7. Juni 1848 geboren. Nach vollendeter Schulbildung kam er 1865 nach Kopenhagen, wo er Medizin studierte und im Januar 1872 das ärztliche Examen absolvierte. In der Studienzeit interessierte er sich lebhaft für die pathologische Anatomie. Es war damals keine Gelegenheit zur weiteren Ausbildung in diesem Fache an der Universität, und dies war eine mitwirkende Ursache dazu, daß er beschloß, Tierheilkunde zu studieren. Er ließ sich an der tierärztlichen Hochschule Kopenhagens einschreiben, studierte dort mit Eifer 1½ Jahr und absolvierte im Oktober 1873 das tierärztliche Examen. Besonderen Unterricht in der pathologischen Anatomie gab es damals nicht, wohl aber Gelegenheit, viele pathologische Sachen zu sehen. Er schloß sich besonders an den hervorragenden Anatomen Bendz und den tüchtigen und eifrigen Chirurgen Stockfleth unter seinen Lehrern an. Diese beiden wünschten, ihn an die Hochschule zu knüpfen; es gelang ihnen aber vorläufig nicht, etwas für ihn zu tun. Er kehrte dann zur Medizin zurück, suchte weitere Ausbildung an Spitälern und nach einem kurzen Studien-Aufenthalt bei v. Recklinghausen in Straßburg erhielt er die Stelle als Prosektor an dem großen kommunalen Spital in Kopenhagen. Er heiratete seine Koufine, trieb eine kleine ärztliche Praxis und unterrichtete viele ärztliche Studierende in der pathologischen Anatomie. Nach etwa drei Jahren erhielt er die Stelle als erster Assistent an der internen Abteilung an dem kommunalen Spital, und er hatte somit vorläufig die Tierheilkunde aufgegeben. Dann starb Stockfleth im Oktober 1879, und jetzt wurde Bang die Stelle als sein Nachfolger angeboten. Es war für ihn eine sehr schwierige Wahl, indem es sich um eine Lehrstelle in Chirurgie und Geburtshilfe und um die Leitung der recht großen ambulatorischen Klinik handelte, und seine Ausbildung gerade in diesen Fächern war ja so gering wie möglich. Er nahm jedoch die Stelle an unter der Bedingung, daß ihm Gelegenheit gegeben würde, eine Studienreise in das Ausland zu machen. Zuerst vollendete er seine Dissertation (Habilitationsschrift) und reiste dann nach Berlin, wo er namentlich Dieckerhoffs Klinik folgte und auch in freundliche Verbindung mit H. Möller und Schütz trat. Dann machte er kürzere Besuche in Dresden (Johns und Siedamgrotzky) in Wien, München und Stuttgart und blieb endlich mehrere Wochen in Paris, wo er namentlich Nocard kennen lernte, eine Bekanntschaft, die sich später zu einer wirklichen Freundschaft entwickelte. Gegen Ende Mai 1880 übernahm er endlich seine Lehrerstelle, und jetzt folgten schwere Arbeitsjahre, in welchen er sich selbst zum praktischen Tierarzt ausbilden mußte. Es war aber eine glückliche Zeit mit besonderer reger Entwicklung auf dem pathologischen Gebiete. Seine ärztlichen Kenntnisse kamen ihm sehr zu statten. Antiseptische Methoden waren damals fast unbekannt in der Tierheilkunde, und er hatte Glück, dieselben in die dänische Veterinärkunde einzuführen. So machte er zum Beispiel sehr viele Spitzhengstkastrationen mit ausgezeichnetem Erfolg. Es war ja auch die Zeit, wo die Bakteriologie aufblühte. Bang studierte dieses Fach bei seinem Jugendfreunde Carl Salomonsen, dem es im Jahre 1883 gelang, eine Dozentur der medizinischen Bakteriologie an der Universität zu begründen. 1885 hatte Bang die Freude, ein bakteriologisches Laboratorium als Abteilung des landwirtschaftlichen Versuchslaboratoriums einzurichten. Aus dieser Abteilung, in welcher C. O. Jensen lange arbeitete, sproß 1908 das jetzige große Serumlaboratorium hervor. Die Abteilung bestand übrigens als Physiklaboratorium bis 1922. — Selbstverständlich vergaß Bang nicht die pathologische Anatomie. 1887 gelang es ihm, eine neue Professur für pathologische Anatomie und allgemeine Pathologie zu errichten. Diese Stelle übernahm er, während Sand sein Nachfolger in den anderen Fächern wurde. Als der alte Bagge im November 1889 zurücktrat, folgte Bang ihm als Professor der speziellen Pathologie und Leiter der stationären Klinik, und C. O. Jensen übernahm die allgemeine Pathologie und die pathologische Anatomie.

Für Bang blieb es immer ein Ideal, den klinischen Unterricht in inniger Verbindung mit der pathologischen Anatomie zu halten.

Auch auf dem administrativen Gebiete wurde seine Arbeitskraft in hohem Grade in Anspruch genommen, indem er 1892 neben seinem

Lehreramt die damals nur mit einem bescheidenen Honorar befeldete Stelle als Veterinärphysikus (Landestierarzt) übernehmen mußte. 1914 trat er von seiner Professur zurück, behielt aber die Stelle als Veterinärphysikus bis 1922, und erst mit seinem 80. Jahre wird er seine öffentliche Tätigkeit als Vorsitzender des veterinären Gesundheitsrates niederlegen.

Bang hat viele Reisen in das Ausland gemacht, besonders als Vertreter seines Landes bei internationalen Kongressen für Veterinärwesen, Tuberkulose und Hygiene. Noch im letzten Herbst war er ein paar Monate in Amerika (U.S.A.). Seine literarische Tätigkeit ist recht groß gewesen. Aus seiner ärztlichen Zeit stammt seine Dissertation: „Dodelig Embolie og Thrombose i Lungearterierne“ (241 S.), 1880. Als Profektor hatte er eine Reihe derartiger Fälle beobachtet, und er konnte feststellen, daß die tödlichen Embolien immer recht frische Thromben waren, die noch nicht mit der Venenwand fest verbunden waren und eben deshalb als sehr lange Stücke fortgeschwemmt werden konnten, was sich in der Regel mehrfach wiederholte. Der Tod erfolgte erst, wenn die großen Lungenarterien fast ganz verstopft wurden. Diese Verhältnisse waren damals sehr wenig bekannt, namentlich in der deutschen Literatur. — Von seinen veterinär-medizinischen Arbeiten handeln sehr viele über Tuberkulose (Eutertuberkulose, tuberkulöse Milch, Abtötung der Tb. bei Wärme, Geschichte der Haustuberkulose, in Dänemark, Wert der Tuberkulinprobe) und namentlich über seine Idee zur Ausmerzungen der Tuberkulose mittels Entfernung der neugeborenen Kälber aus dem infizierten Stalle und ihre Ernährung mit hinlänglich erhitzter Milch, sowie die Bildung eines neuen, gefunden Bestandes durch Jahr für Jahr fortgesetzte Isolation der Kälber und der jungen Rinder unter Verwendung der Tuberkulinprobe als Kontrolle über die bleibende Tuberkulosefreiheit des neugebildeten Bestandes. Wo diese Methode richtig durchgeführt wurde, hat sie ausgezeichnete Resultate gegeben, sowohl in Dänemark als in Schweden, Finnland, Ungarn und teilweise in mehreren anderen Ländern. Von Bangs zahlreichen Arbeiten über diese Frage sind mehrere auch deutsch, französisch und englisch veröffentlicht und auf verschiedenen Kongressen mitgeteilt. Im Jahre 1896 fand er in Verbindung mit seinem Assistenten V. Stribolt das Abortusbakterium als Hauptursache des ansteckenden Verwerfens beim Rinde. Die Hauptarbeit darüber erschien sowohl deutsch als englisch im Jahre 1897. Später hat er kleinere Arbeiten über diese Krankheit in dänischer und englischer Sprache veröffentlicht. Eine klinische Studie über die verschiedenen Formen der Rinder-Aktinomykose stammt aus dem Jahre 1883. Über Rotlauf-Endocarditis bei Schweinen und über die bazilläre Pyelonephritis beim Rinde hat er 1889 und 1892 geschrieben. Er bedauert, daß zwei größere Arbeiten nur dänisch veröffentlicht sind, nämlich Studien über Euterentzündung (von Streptokokken und anderen Bakterien herrührend) 1888 und namentlich eine 1890 erschienene größere Studie über „die Ursache lokaler Nekrose“, worin er den Nekrosebazillus genau studiert und die sehr große Rolle schildert, die derselbe bei vielen Tierkrankheiten spielt. Auch über Schweinepest, Rotz und Maul- und Klauenseuche hat er kleinere Arbeiten geschrieben. Eine gewisse Bedeutung haben seine Studien über paratuberkulöse Enteritis der Rinder gehabt (1906, 1909, 1910). Er war wohl der erste, der die selbständige (nicht tuberkulöse) Natur dieser Krankheit nachgewiesen hat (vergl. Mitteilungen an den Haager Kongress 1909). Über Simulium-Vergiftungen bei dänischen Rindern schrieb er 1918 und über die epizootische Lymphangitis beim Pferde 1922. Die Geschichte der dänischen Veterinärschule hat er ausführlich geschildert sowie biographische Darstellungen von Abildgaard, Viborg und anderen bekannten dänischen Tierärzten gegeben. Eine kurze allgemeine Geschichte des Veterinärwesens hat er 1924 zusammengeestellt. Im Jahre 1888 veröffentlichte er einen Supplementband zu Stockfleth's Veterinärchirurgie (Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane) unter Benutzung eines rudimentären nachgelassenen Manuskriptes des Verfassers.

In seinem langen Leben hat Bang viele Auszeichnungen erhalten. Er ist Ehrenmitglied oder korrespondierendes Mitglied sehr vieler tierärztlicher, landwirtschaftlicher und medizinischer Gesellschaften, Dr. med. (h. c.) und Dr. med. vet. (h. c.) in Christiania, Wien und Utrecht, hat mehrere hohe fremde Dekorationen erhalten und das Großkreuz des dänischen Danebrogordens. Bei seinem 50jährigen tierärztlichen

Jubiläum veranlaßten dänische und norwegische Tierärzte und andere Freunde die Aufstellung seiner Porträtbüste an der tierärztlichen und landwirtschaftlichen Hochschule.

Bronzene Ehrenplakette der Technischen Nothilfe für die Tierärztliche Hochschule Hannover.

Am Freitag, den 25. Mai 1928, wurde die bronzene Ehrenplakette der Technischen Nothilfe im Beisein Sr. Magnifizenz, des Rektors der Tierärztlichen Hochschule, Prof. Dr. Mießner, der Vertreter des Professorenkollegiums und der Studierenden durch den Landesbezirksleiter Korvettenkapitän Schläger und dessen Stellvertreter, Ingenieur Holschmit, im Rahmen einer kleinen Feier überreicht. Als erster ergriff der Landesbezirksleiter das Wort zu einer kurzen Ansprache. Er hob unter anderem das selbstlose und tatkräftige Einfpringen bei Notfällen hervor, durch das sich die Tierärztliche Hochschule während des achtjährigen Bestehens der Technischen Nothilfe ausgezeichnet hat, getreu dem Leitspruch der Nothilfe:

„Der Not zum Trutz — dem Volk zu Nutz“.

Anerkennend wurde auch hervorgehoben, daß der Prozentplatz der Mitgliedschaft an der Technischen Nothilfe bei der Tierärztlichen Hochschule der höchste im ganzen Landesbezirk ist. Das war nur durch die tatkräftige Unterstützung des Herrn Rektors und des Lehrkörpers, sowie der Vertrauensmänner der Studierenden möglich. Der Landesbezirk ist sich seiner Dankeschuld wohl bewußt und ergreift gern die Gelegenheit, diese auch in äußerer Form kundzugeben. Hierauf erwiderte Sr. Magnifizenz, daß es für die Tierärztliche Hochschule eine selbstverständliche Pflicht sei, dem deutschen Volke in seiner Not zu helfen; aber er freue sich, daß dieses Bestreben anerkannt werde und die Tierärztliche Hochschule Hannover zu den wenigen gehöre, die diese Auszeichnung empfangen haben. Er danke dafür und hoffe, daß es auch in Zukunft so bleiben werde. Sodann sprach der Vertreter der Studierenden, cand. med. vet. Thiele, seinen Dank aus und versprach, daß auch fernerhin von Seiten der Studierenden alles geschehen werde, um sich dieser Auszeichnung würdig zu erweisen.

Veterinärarzt Rudolf Simon †.

Am 15. Mai d. Js. entschlief nach langem qualvollen Leiden der langjährige Veterinärarzt des Kreises Hadeln Rudolf Simon in Otterndorf im 55. Lebensjahre. Vor zwei Jahren etwa mußte der Entschlafene sich einer Operation unterziehen. Auf Grund des Ergebnisses durfte man hoffen, daß jede Gefahr beseitigt war. Da stellten sich vor etwa Jahresfrist Erscheinungen ein, die auf Verallgemeinerung des Leidens schließen ließen. Simon war am 8. Februar 1874 zu Babe, Kreis Ost-Priegnitz, geboren. Er besuchte das Leibniz-Gymnasium in Berlin und nach erlangter Reife die Tierärztliche Hochschule in Berlin. Bereits als 21jähriger erwarb er die Approbation. Im Anschluß hieran genügte er seiner Militärpflicht beim 2. Garde-Ulanen-Regiment und assistierte darauf wiederholt dem damaligen Kreistierarzt Nevermann in Bremervörde, späteren Ministerialdirigenten im preußischen Ministerium für Landwirtschaft. Nach kurzer praktischer Tätigkeit in Lübeck übernahm er die Stelle eines Assistenten an der medizinischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin, die damals dem Altmeister Dieckerhoff unterstand, erwarb im Jahre 1899 das Fähigkeitszeugnis zum preussischen beamteten Tierarzt, erhielt noch im gleichen Jahre die kommissarische Verwaltung der Kreistierarztstelle des Kreises Hadeln mit dem Sitz in Otterndorf und am 1. März 1900 seine definitive Anstellung. Er ist demnach fast ein Menschenalter im Kreise Hadeln beamteter Tierarzt gewesen. Ausgestattet mit hervorragenden Geistesgaben, aufs beste vorbereitet für den Beruf, dessen Pflege ihm alles galt, von vorbildlicher Pflichttreue, hat er es verstanden, sich in seinem Wirkungskreise und darüber hinaus eine einflußreiche, der Allgemeinheit nutzbringende Stellung zu erwerben. Obwohl Brandenburger, war er ganz heimisch geworden an der hannoverschen Küste und mit Land und Leuten verwachsen. Das allgemeine Vertrauen, dessen er sich erfreute, berief ihn während des Krieges an die Leitung der Kreisfleischstelle, deren schwierige und undankbare Aufgaben er in musterhafter Weise erledigte. Als Mensch war er jederzeit hilfsbereit und voller Verständnis für alles Menschliche. Sein Begräbnis gestaltete sich zu einer eindrucksvollen Kundgebung seiner Wertschätzung aus Nah und Fern. Durch sein Wirken und Schaffen hat er sich in seinem Wirkungskreise und bei seinen Berufsgenossen, die ihm näher getreten waren, ein Denkmal gesetzt aere perennius. Sch.

Dr. med. vet. Kurt Ludloff †.

Am 20. Mai starb plötzlich und unerwartet an Herzlähmung unser jüngstes Mitglied Dr. med. vet. Kurt Ludloff im 36. Lebensjahre. Der Verstorbenen hatte sich im Oktober 1927 als Fachtierarzt für Hunde und Kleintiere in Bremen niedergelassen, nachdem er von 1923—1927 am Institut für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin als Assistent tätig gewesen war. Dr. Ludloff stand während des Krieges als Veterinär im Felde und stellte sich am Schluß des Krieges als Baltikumkämpfer weiterhin in den Dienst des Vaterlandes. Er war Inhaber des Eisernen Kreuzes und der Baltikumsauszeichnung. In der kurzen Zeit seiner hiesigen Tätigkeit hatte er es verstanden, sich auf Grund seiner fachärztlichen Kenntnisse und seiner Persönlichkeit eine angefehene Praxis zu gründen. Der Verein bedauert außerordentlich sein frühes Hinscheiden und verliert in ihm ein Mitglied, das zu großen Hoffnungen für unseren tierärztlichen Stand berechtigte.

Der Verein Bremischer Tierärzte E. V.

I. A.: Dr. Pothe.

Internationaler Tierärztlicher Kongreß 1930 in London.

Am 14. Mai fand in Paris eine Besprechung des Ständigen Ausschusses der Internationalen Tierärztlichen Kongresse statt. Anwesend waren zufolge einer Einladung des Sekretariates in Leyden (Holland) Vertreter zahlreicher europäischer Staaten sowie ein Vertreter von Argentinien. Alle Kulturstaaten mit Ausnahme von Rußland und Ägypten hatten ihre Mitwirkung bei künftigen Kongressen zugesagt. Da von den früheren Mitgliedern des aus 21 Vertretern bestehenden Ständigen Ausschusses nur noch sechs am Leben sind, fand zunächst eine Zuwahl und Ergänzung des Ständigen Ausschusses statt. Danach wurde der Vorstand gewählt und zwar als Präsident Prof. Hutyrá-Budapest, Stellvertretender Präsident Prof. Leclainche, Vorsitzender der Veterinärabteilung im Ministerium Paris, als 1. Generalsekretär und Schatzmeister Prof. De Blicck-Utrecht (Holland), 2. Generalsekretär Prof. Stang-Berlin. Ferner entsprechend der Satzung, da der nächste Kongreß in England stattfindet, als Präsident des sogenannten Büros Mac Fadyean, als Mitglieder Breattbank und Minart, alle drei Engländer. Als nächster Kongreßort wurde London bestimmt und zwar soll der Kongreß an einem noch näher zu bestimmenden Tage Anfang August 1930 stattfinden. — Aus der Mitte der Versammlung wurde dem Wunsche Ausdruck verliehen, nicht nur wissenschaftliche Dinge zur Sprache zu bringen, sondern auch volkswirtschaftliche und die Mehrheit der praktischen Tierärzte berührende Fragen (Kurpfuchstum). Zu den Verhandlungssprachen wird auch Deutsch gehören.

DVR.

Reichsverband der Deutschen Gemeindetierärzte.

Tagung in Karlsruhe vom 11. bis 14. Oktober 1928.

Abgesehen von sonstigen Erwägungen ist Karlsruhe als Tagungsort in der Hauptsache deshalb gewählt worden, weil die Technische Hochschule ein eigenes Kältetechnisches Institut besitzt und in diesem Demonstrations- und Lehrvorträge aus dem für die deutschen Gemeindetierärzte so ungeheuer wichtigem Gebiet der Kältetechnik abgehalten werden sollen. Das Institut hat bereits in dankenswerter Weise hierzu die Bereitwilligkeit ausgesprochen. Ferner schweben auf Anregung der Landesgruppe Baden Verhandlungen mit Architekt Hennings-Stuttgart, über Abhaltung eines Lichtbildervortrags über Bau und Inneneinrichtung moderner Schlachthof- und Kühlanlagen. — An fachwissenschaftlichen und fachwirtschaftlichen Vorträgen wird über „die Übertragung der Veterinärpolizei an die Leiter der Schlacht- und Viehhöfe“ (Referent Fries-Mannheim), ferner „Über die Gefahren des Unterfrierens der Gebäudefundamente in Gefrierhäusern“ (Referent Raschke-Chernitz) verhandelt, und schließlich werden Vorträge über das Lebensmittelgesetz und seine Ausführungsbestimmungen, Organisation der Milchkontrolle, allgemeine und bakteriologische Fleischschau, Beurteilung von Notchlachtungen usw. gehalten und zur Beschlußfassung gestellt werden. Die Referenten für letztere Themen stehen noch nicht fest. Der Vors. bittet daher dringend die einzelnen Gruppen um Namhaftmachung geeigneter Berichtstatter. Außerdem sind Vorführungen elektrischer Betäubung an Schlachttieren am Schlachthof Karlsruhe angeregt worden. Ferner muß laut Satzung die Neuwahl des Vorstandes vorgenommen werden. Die Landesgruppen werden ersucht, hierzu baldigst Stellung nehmen zu wollen. — In Anbetracht der großen Bedeutung und der Wichtigkeit der auf der Karlsruher Tagung zur Verhandlung kommen-

den Gegenstände für die städtischen und allgemein öffentlichen Interessen werden die Kollegen dringend aufgefordert, bei ihren Stadtverwaltungen beizeiten zwecks Teilnahme vorstellig zu werden. Das genaue Programm wird später veröffentlicht werden. Weitere Anträge und Anregungen hierzu nimmt der Vors. gern entgegen. — Unter Bezugnahme auf die Beschlüsse der 19. und 20. Vollversammlung des Deutschen Veterinärates macht der Reichsverband die in Betracht kommenden Kollegen an den größeren Orten auf die Beschlüsse S. 96 des Berichts über diese Verhandlungen erneut aufmerksam, mit der Bitte bei ihren Stadtverwaltungen die Einrichtung regelmäßiger Fortbildungskurse für die die Nahrungsmittelkontrolle ausübenden Tierärzte, sowie den Ausbau der Veterinär-Untersuchungsämter auf den Schlachthöfen sobald als möglich zu beantragen.

Reichsverband der Deutschen Gemeindetierärzte.

Dr. Hafemann-Dessau.

Bücherbesprechungen.

Dissertationen der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover S.-S. 1928.

Hugo Böttger: Der Nachweis stattgehabter Erhitzung gewöhnlicher und chemisch konservierter Milch. — Walter Ehlers: Intravitale Speicherversuche mit besonderer Berücksichtigung des experimentellen Rotlaufs (Maus, Schwein). — Hinrich Kackmann: Klinische und histologische Untersuchungen über die Wirkung einiger Antisepten (Phenolkampfer, Protargol, Rivanol und Aiol) in Gelenken bei intraartikulärer Applikation. — Paul Luy: Gasometrische Mikrobefestigungen von Wasserstoffsuperoxyd, Stickstoffverbindungen und Gärungs-Kohlendioxyd. (Ein Beitrag zur Technik des Ponderovolumeters (P. V. M.) nach Paechner). — Erich Scheel: Über die Leberergüsse im Kreise Dannenberg a. E. in den Jahren 1926—1928. — Karl Sönksen: Versuche zur Leitungsanästhesie am Hintersehenkel des Rindes. — Ernst Wortberg: Über einen Fall von Basalzellenkrebs der Haut eines Schafes.

Dissertationen der Tierärztlichen Hochschule Berlin S.-S. 1928.

Adolf Swoboda: Über den Utriculus masculinus der Haustiere. — Rolf Zimmermann: Die hygienische Beschaffenheit der Glogauer Marktmilch und Vorschläge zu einer einwandfreien Milchbelieferung der Stadt. Gleichzeitig ein Beitrag für die Informierung der Gemeindeverwaltungen. — Friedrich Wilh. Weiss: Histologie und Spermatogenese der Damhirschhoden außerhalb der Brunftzeit. — Karl Hagge: Über die Adsorptionsleistung verstärkter Granulatifte in viskösen Medien bei verschiedener Temperatur. — Hermann Heisig: Kalzium und Eiweiß im Harn bei mit Spreewaldheu und Zugabe von Nitakalk gefütterten Rindern. — Ulrich Lockau: Untersuchungen am Uterusepithel der Hausfaugetiere.

Personal-Nachrichten.

Verliehen: Vom 1. Juni an dem Oberregierungsrat im Staatsministerium für Landwirtschaft, Sigmund Settele in München, der Titel eines Oberlandstallmeisters mit dem Rang eines Ministerialrates.

Ernannt: der mit der kommissarischen Verwaltung der Regierungs- und Veterinärstelle bei der Regierung in Arnberg beauftragte Veterinär Dr. Preßler zum Regierungs- und Veterinärat ebendafelbst.

Promoviert in Berlin: Tierarzt Adolf Swoboda in Hindenburg (Schles.), Tierarzt Rolf Zimmermann in Glogau (Schles.), Tierarzt Friedrich-Wilhelm Weiss in Mutterstadt (Rheinpfalz), Tierarzt Karl Hagge, Assistent an der staatl. Lehrschmiede in Dresden, Tierarzt Hermann Heisig, Veterinärassistentenwärter in Berlin, Tierarzt Ulrich Lockau aus Rehden; in Hannover: Oberstabsveterinär H. Böttger aus Kastel, Tierarzt Walter Ehlers aus Ettingen, Tierarzt Hinrich Kackmann aus Hollenbeck, Tierarzt Dr. ing. Paul Luy aus Mörs, Tierarzt Erich Scheel aus Altona, Tierarzt Karl Sönksen aus Norderwilstrup, Tierarzt Ernst Wortberg aus Kirchderne.

Verstorben: Veterinär Dr. Rudolf Simon in Otterndorf, Tierarzt Dr. Curt Ludloff in Bremen, Veterinär Alfred Nitzschke in Lüchow, Veterinär Hanft in Ellwangen (Wttbg.), Tierarzt Emil Ehrhardt in Wunstorf.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10: nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 24.

Ausgegeben am 16. Juni 1928.

36. Jahrgang.

Es ist für mich eine große Freude, daß für die Tierärztliche Hochschule im Staatshaushaltsplan ihres Jubiläumsjahres beträchtliche Mittel zur Schaffung bedeutsamer neuer Unterrichts- und Forschungsstätten (Geburtshilfliche und Buiatrische Klinik und Physiologisches Institut) bereitgestellt sind, und daß auch der Wunsch nach dem Besitz einer eigenen Turnhalle und einer neuen Mensa durch die Jubiläumsspende der Staatsregierung erfüllt werden kann. Darum umschließen meine der Hochschule zu ihrer Jubiläumsfeier aus warmer Anteilnahme dargebrachten Glück- u. Segenswünsche die Hoffnung, daß in aller Zukunft die Staatsfinanzen die Möglichkeit dazu bieten möge, der Hochschule zu erfolgreicher Fortführung ihrer für Vaterland und Volk so wichtigen Wirksamkeit das nötige äußere Rüstzeug zur Verfügung stellen zu können.

Berlin, am 5. Juni 1928.

Der Preußische Finanzminister.

Dr. Höpker Aschoff

Leider traf das für die Festschrift bestimmte Geleitwort des hochverehrten Herrn Preußischen Finanzministers Dr. Höpker Aschoff erst nach Drucklegung ein. Bei der hohen Bedeutung dieser Kundgebung, die von neuem das große Interesse der Staatsregierung an der Entwicklung der Tierärztlichen Hochschule Hannover dartut, freue ich mich, die Veröffentlichung an dieser Stelle bringen zu können. Ich spreche dabei dem Herrn Finanzminister den besonderen Dank des Professoren-Kollegiums und der Studentenschaft dafür aus, daß er die Mittel für den Bau einer Turnhalle nebst Mensa bereitgestellt und dadurch einem lang bestehenden dringenden Bedürfnis abgeholfen hat.

Mießner.

Feier des 150jährigen Jubiläums der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover vom 13. bis 15. Juni 1928.

150-Jahrfeier der Tierärztlichen Hochschule Hannover! Festlich geschmückt erwartete die Alma mater ihre zahlreichen ehemaligen Angehörigen, die Vertreter der Behörden und Körperschaften zur Jubelfeier. Eine würdige Einleitung war die Ehrung der Gefallenen, die am Mittwoch, den 13. Juni vormittags die Mitglieder des Lehrkörpers und die Studierenden sowie die Angehörigen der Gefallenen in der Aula der Hochschule zu einer stillen Feier vereinte. Prof. Dr. K ü n n e m a n n betonte in seiner Rede, daß es in den Tagen der Jubelfeier unsere erste Ehrenpflicht sei, in stiller Einkehr der Kommilitonen zu gedenken, die den Heldentod für das Vaterland starben. Mit dem Gelöbnis, alle Zeit bereit für die Ehre, Freiheit und Recht wurde die Ehrentafel mit frischen Kränzen geschmückt, die von dem Professorenkollegium und der Studentenschaft gestiftet waren.

Anschließend fand im Beethovenaal der Stadthalle eine Sitzung der Gesellschaft der Freunde der Tierärztlichen Hochschule statt. Der Präsident der Landwirtschaftskammer Hannover, Baron von Reden-Reden, gab als Vorsitzender der Gesellschaft zunächst einen kurzen Geschäftsbericht, der erkennen ließ, daß der Gesellschaft erfreulicherweise von vielen Stellen erhebliche Zuwendungen gemacht worden waren. Im Mittelpunkt der Sitzung stand der Vortrag von Seiner Magnifizenz, Geheimrat Prof. Dr. U h l e n h u t h, Rektor der Universität Freiburg i. Br., über „Die Bedeutung des Tierexperiments für die Bakteriologie und Hygiene“. Danach überreichte Ministerialdirigent Dr. M ü s s e m e i e r Magnifizenz M i e ß n e r eine goldene Amtskette, die von Ehrenbürgern und Freunden der Hochschule auf Anregung von Professor Dr. P a e c h t n e r-München gestiftet wurde und anstelle der bisherigen eisernen Amtskette getragen werden soll. Die prachtvolle Kette war entworfen und in uneigennützigster Weise angefertigt von dem leider so früh verstorbenen Juwelier L a m e y e r-Hannover, dem wir ein ehrendes Andenken bewahren. Der Rektor dankte und bemerkte, daß die alte Kette als Kleinod im Archiv der Hochschule aufbewahrt werden wird und nur bei besonders feierlichen Anlässen getragen werden solle. Bei der großen Anzahl der Glückwunschschriften und Spenden, die der Jubilarin dargebracht wurden, war es nicht möglich, alle Freunde der Hochschule während des Festaktes am Donnerstag zu Worte kommen zu lassen. Es wurde daher den Erschienenen Gelegenheit gegeben, schon hier offizielle Ansprachen zu halten. Glückwunschschriften überbrachten Geheimrat W e h r l e als Vertreter des Präsidenten des Reichsgesundheitsamts und des Reichsgesundheitsrates, Senator E i s e n b e r g als Vertreter der Freien Hansestädte Hamburg und Lübeck, S. Spektabilität Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. K l i m m e r, namens der Universität Leipzig, S. Spektabilität Prof. Dr. J o d l b a u e r für die Universität München, Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. S c h m i d t-Leipzig, als Vertreter der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, Prof. Dr. R a e b i g e r-Halle namens der Landwirtschaftskammer der Provinz Sachsen und des Verbandes der preuß. Kammertierärzte, Oberregierungsrat Dr. O e h m k e, Landestierarzt von Braunschweig, überreichte im Namen des Braunschweigischen Landespferdezuchtvereins eine Bronzestatue des vorbildlich schönen hannoverschen Hengstes „Alemanne“. Prof. Dr. B o h l überbrachte die Grüße der Tierärztlichen Hochschule zu Kasan in Rußland. Dr. K a n k a n b ä ä die Glückwünsche des Finnischen Staates, dessen Tierärzte zum großen Teil ihre Ausbildung in Hannover genossen haben, Dr. L e h n e r t-Stockholm die Grüße der Tierärztlichen Hochschule Stockholm und des Vereins der Tierärzte

Schwedens. Prof. Dr. A c k e r k n e c h t die Glückwünsche der Universität Zürich, Prof. Dr. K a n g r o die Glückwünsche der Universität Riga, Prof. S a r a l die Glückwünsche der Universität Dorpat. Ob.-Reg.-Rat u. Geh. Vet.-Rat M a t t h i e s e n-Hannover für den Tierschutzverein Hannover-Linden, Schlachthofdirektor K o r m a n n-Nienburg für den Reichsverband der deutschen Gemeindetierärzte, Vet.-Rat G u n d e l a c h-Magdeburg für den Tierärztl. Zentralverein der Provinz Sachsen, Thüringen und Anhalt sowie den Verein der beamteten Tierärzte des Reg.-Bezirks Magdeburg, Dr. D e m n i t z, Vertreter der Behringwerke, Marburg. Frau Prof. Dr. R i c h t e r-Dorpat stiftete eine von ihr angefertigte Statuette eines aufspringenden Pferdes. Weiter gingen viele Hunderte von Glückwunschschriften und -Telegrammen ein, ein Zeichen für die große Wertschätzung, deren sich die Hannoversche Tierärztliche Hochschule im In- und Auslande erfreut.

Der erste Ehrendoktor der Hochschule, Reichspräsident von Hindenburg, der wegen dringenden Amtsgeschäften zu seinem größten Bedauern der Feier fernbleiben mußte, sandte nachstehendes Schreiben:

„Der Tierärztlichen Hochschule spreche ich zu dem 150-jährigen Bestehen meine herzlichsten Glückwünsche aus. Ich gedenke dabei in dankbarer Anerkennung der großen Verdienste, die sich die Tierärztliche Hochschule zu Hannover in den 150 Jahren ihres Wirkens durch die Forschung ihrer Professoren, wie durch die Erziehung vieler Generationen von Tierärzten erworben hat.“

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. med. vet. v o n H i n d e n b u r g.

Nachmittags veranstaltete der Hannoversche Rennverein zu Ehren der Hochschule ein Rennen. Die vielen Studenten und alten Herren in Farben boten mit ihren duftig gekleideten Damen bei dem herrlichen Wetter auf dem grünen Rasen ein schönes Bild. Das Hauptrennen des Nachmittags um den Preis der Tierärztlichen Hochschule war sehr stark besetzt und wurde von dem Hengste „Radio“ gewonnen. Der Hannoversche Rennverein stiftete einen Preis von Mk. 4000,—. Die Tierärztliche Hochschule fügte einen Ehrenpreis (eine silberne Schale) zu, die von Magnifizenz M i e ß n e r dem Sieger überreicht wurde.

Bei wundervollem Wetter fand auf den Terrassen der Stadthalle ein Begrüßungsabend statt, der von annähernd 2500 Personen besucht war. In den von bunten Fontänen und Lampions erleuchteten Anlagen lustwandelnd, bot sich reichlich Gelegenheit, sich zu begrüßen und alte Bekanntschaften zu erneuern.

Den Höhepunkt der Veranstaltungen bildete am Donnerstag, den 14. Juni 1928, vormittags der akademische Festakt, im Kuppelsaal der Stadthalle, der unter überaus großer Beteiligung der Vertreter der Reichs- und Staatsbehörden, der befreundeten Hochschulen des In- und Auslandes, der Kommunalbehörden und zahlreicher sonstiger Körperschaften und Verbände stattfand. An der Feier nahmen rund 4000 Personen teil, so daß die Festversammlung, bei der auch zahlreiche Damen anwesend waren, ein feierliches Gepräge zeigte. An der Spitze der Vertreter der Preuß. Staatsregierung war Landwirtschaftsminister Dr. S t e i g e r, als Vertreter des Reiches Ministerialdirektor Dr. D a m m a n n, als Vertreter der Veterinärabteilung des Landwirtschaftsministeriums Ministerialdirigent Dr. M ü s s e m e i e r, als Vertreter des Preuß. Finanzministeriums Ministerialdirektor Dr. K i e s s l i n g erschienen. Außerdem waren Vertreter sämtlicher Länder des Deutschen Reiches, von 18 deutschen Universitäten, sämtlicher technischer, land-

wirtschaftlicher, forstlicher und tierärztlicher Hochschulen, Handelshochschulen und Bergakademien sowie zahlreicher Akademien und wissenschaftlicher Gesellschaften anwesend. Von den ausländischen Hochschulen und Universitäten waren vertreten Wien, Bern, Utrecht, Liverpool, Edinburgh, Helsingfors; Riga, Budapest, Stambul, Alnarp, Manchester, Dorpat, Innsbruck, Kopenhagen, Sofia, Kasan, Moskau, Rockefeller Institut-Princeton, Lund und Zürich. Unter den Klängen des Einzugsmarsches der Gäste auf der Wartburg zogen unter Vorantritt der Chargierten der Lehrkörper der Tierärztlichen Hochschule, die Rektoren und Vertreter der anderen Hochschulen bzw. veterinärmedizinischen Fakultäten sowie die zahlreichen Ehrengäste ein. Besonders farbenprächtig war der Aufmarsch der Magnifizenzen der in- und ausländischen Hochschulen in ihren zum Teil überaus kostbaren Amtsroben. Herr Rudolph, vom Städt. Schauspielhaus Hannover, eröffnete die Feier mit folgendem von Prof. Dr. Paechter-München verfaßtem Prolog:

Vorpruch.

(Alma mater in aeternum).

Alma mater! Deine Söhne kommen
Ringsumher zur Mufenstadt gezogen,
Diesen Feiertag an Deinem Herzen
Mitzuerleben.

Und ihnen feh' ich froh bewegten Sinnes
Viele und werthe Gäste beigesellt,
Des Festes Glanz zu teilen und zu mehren,
Mit Dir sich einend.

Mit Dir wir wenden rückwärts unsre Blicke, —
Dahin, wo Du vor 150 Jahren
Zu Deiner stolzen Gegenwart den Grundstein
Sorglich gelegt hast.

Wohl war bescheiden Deines ersten Hauses
Wie auch des Wirkens engbegrenztes Ausmaß;
Doch in ihm trieben strebender Entwicklung
Lebend'ge Keime.

Und in der Obhut kluger, treuer Pfleger
Drangen ans Licht sie, wuchsen auf und blühten —
Blüthen und trugen Dir und Deinem Wirken
Früchte um Früchte.

Siehe, und heute kam ein Tag der Ernte,
Wo sich zur Feier festlich um Dich scharen,
Gunst und Gaben gerne Dir zu bieten
Alle die Deinen.

Wir alle, die in dieser hehren Halle
Erwartungsvoll der schönen Feier harren,
Fühlen mit Dir Befriedigung im Herzen
Ob des Errung'nen.

Sehen erfreut, wie Deine Räume wachsen,
Dein Werk sich weitet, und die Fäden vielfach
Und fest sich knüpfen, die Dich eng verbinden
Dem großen Ganzen. —

Wir alle, die wir diese hohe Stunde
Erhob'nen Herzens hochgemut erleben,
Einen uns, Dir für künftig darzubringen
Innige Wünsche:

Wolle Dein Werk und Walten froh gedeihen,
Wachsen und blühen, und daraus erfprießen
Segen und Wohlfahrt unserm Vaterlande — —
In aeternum!

Die Festrede hielt der Jubiläumsrektor Prof. Dr. Meißner. Er gab einen kurzen Überblick über die Entstehung und Entwicklung der Tierärztlichen Hochschule Hannover und zeichnete ihren zukünftigen Weg. Anschließend überbrachten Glückwünsche:

Preuß. Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten Dr. Steiger, Berlin für das Preuß. Staatsministerium und alle Preuß. Behörden.

Ministerialdirektor Dr. Dammann, Berlin, für das Deutsche Reich.

Geh. Obermed.-Rat Prof. Dr. Lentz, Berlin, für das Ministerium für Volkswohlfahrt.

Landeshauptmann Dr. von Campe, Hannover, für die Provinzialbehörden.

Oberbürgermeister Dr. Menge, Hannover, für die Stadt Hannover.

Magnifizienz Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Ziehen, Univers. Halle, für alle Deutschen Hochschulen.

Magnifizienz Prof. Dr. Stang, Th. Ho. Berlin, für die Tierärztliche Hochschule Berlin, die Deutschen Veterinärmedizinischen Fakultäten, den Deutschen Veterinär- und die drei Tierärztlichen Reichsverbände.

Magnifizienz Prof. Dr. Heubner, Univers. Göttingen, für die Niedersächsischen Hochschulen.

Magnifizienz Prof. Dr. Quincke, Th. Ho. Hannover, für die Hannoversche Schwesterhochschule.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Thiersch für die Akademien der Wissenschaften.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Walther, Präsident, für die Kaiserl. Deutsch. Akademie der Naturforscher, Halle.

Staatsminister a. D. Exz. Dr. Schmitt-Ott, Berlin, für die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft.

Dr. ten Broeck, Princeton (U. S. A.) für Amerika (Rockefeller Institut).

Präsident Prof. Dr. Brittlebank, Northenden (England) für die Hochschulen Englands.

Magnifizienz Prof. Dr. Keller, Th. Ho. Wien, für die Hochschulen Österreichs, für die Deutsche Universität Prag, die Tierärztliche Hochschule in Budapest sowie für die Österreichischen Tierärztlichen Verbände.

Prof. Dr. Mörkeberg, Kopenhagen, für die Hochschulen Dänemarks, Stockholms, sowie für Norwegen und Finnland und die Veterinärmedizinischen Fakultäten der baltischen Staaten.

Prof. Dr. Kroon, Utrecht, für die Hochschulen Hollands und die Gesellschaft der Holländischen Tierärzte.

Prof. Dr. Bohll, Kazan, für die Hochschulen Rußlands und der Balkanstaaten.

Prof. Dr. Rubeli, Bern, für die Hochschulen der Schweiz.

Ministerialrat Prof. Dr. v. Ostertag, Stuttgart, für die Landestierärzte des Deutschen Reiches.

Exz. Oberlandstallmeister Kammerherr von Wenckstern, Redefin, für die Deutsche Landw.-Gesellschaft.

Ökonomierat Keiser, stellvertr. Direktor der Preuß. Hauptlandwirtschaftskammer Berlin, für die Preuß. Landwirtschaftskammern u. deren Bakteriologischen Institute.

Baron v. Reden-Reden, Präsident der Landwirtschaftskammer Hannover, für die Gesellschaft der Freunde und die gesamte niedersächsische Wirtschaft.

Friese, Präsident des Ausschusses der Preuß. Tierärztekammern Hannover, für die preuß. Tierärztekammern.

Dr. med. Rosenberg, Hannover, für die Ärzte, Zahnärzte und Apotheker Hannovers.

cand. med. vet. Thiele, Hannover, für die Studierenden der Hochschulen.

Mit den Glückwünschen für die Hochschule waren persönliche Ehrungen für den Jubiläumsrektor, Prof. Dr. Meißner, verbunden; so ernannte ihn die medizinische Fakultät der Landesuniversität, der Georgia Augusta Göttingen zum Ehrendoktor der Medizin und die Kaiserlich Deutsche Akademie der Naturforscher zu Halle zu ihrem Mitgliede.

Bewegten Herzens sprach der Rektor allen Gratulanten für die Wünsche den herzlichsten Dank aus, insbesondere dankte er für die namhaften Spenden, die zur Förderung der wissenschaftlichen Arbeiten überbracht worden waren. Um der Dankbarkeit der Hochschule auch äußerlich Ausdruck zu verleihen, haben Rektor und Professorenkollegium zu Ehrenbürgern ernannt: Landeshauptmann Dr. jur.

Martin von Campe-Hannover; Schlachthofdirektor Dr. Christian Elsässer, Landestierarzt von Bremen; Direktor P. Franzen in Hamburg; Ministerialrat Julius Jörn, Landestierarzt von Mecklenburg-Schwerin; Oberbaurat Hermann Kaiser-Hannover; Ökonometrat Fr. Keiser-Berlin, Referent an der preußischen Hauptlandwirtschaftskammer; Fr. Lautenschläger jun.-Berlin; Ober-Reg.-Rat Dr. Paul Oehmke, Landestierarzt von Braunschweig; Geh. Veterinärarzt Adolf Pirl, Landestierarzt a. D. in Dessau; Ministerialrat Dr. Aug. Schotte, Landestierarzt von Thüringen; Generaldirektor W. Tischbein-Hannover; Tierarzt Felix Train, Baruth (Mark), Präsident des Reichsverbandes prakt. Tierärzte; Exz. Oberlandstallmeister Kammerherrn v. Wenckstern in Redefin (Mecklenburg); Oberamtmann Heinrich Wex in Rettmer bei Lüneburg.

Ferner wurde die Würde eines *doctor medicinae veterinariae* ehrenhalber verliehen an: den Rektor der Universität Göttingen, Prof. Dr. Heubner; den Rektor der Technischen Hochschule Hannover Prof. Dr. Quincke; den Direktor des Tierzuchtinstituts der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin, Geheimen Reg.-Rat Prof. Dr. Dr. h. c. Johannes Hansen; den Rektor der Tierärztlichen Hochschule in Wien Prof. Dr. Keller; Geheimen Regierungsrat Prof. Dr. Friedrich Karl Kleine; vom Institut für Infektionskrankheiten „Robert Koch“ Berlin; den Schlachthofdirektor Dr. Heine-Duisburg. Der Rektor begrüßte im Namen des Professorenkollegiums die neuernannten Ehrendoktoren als Glieder der Civitas academica.

Nach der Feier fand in der Ausstellungshalle der Stadthalle ein großes Festbankett statt, an dem etwa 2000 Personen teilnahmen. Magnifizenz Mießner brachte auf das deutsche Vaterland und sein Oberhaupt, den Reichspräsidenten, Generalfeldmarschall von Hindenburg, ein kräftiges Hoch aus. Prof. Dr. Oppermann entbot in launiger Weise den Anwesenden den Willkommengruß. Den Dank der Gäste sprach Oberpräsident Noske aus, dessen Hoch der Tierärztlichen Hochschule galt. Großen Beifall fand die Rede des Gefandten der Finnischen Republik, Wuolijoki, der die herzlichen Beziehungen der finnischen Tierärzte zu der Tierärztlichen Hochschule Hannover hervorhob. Weiter sprachen der Rektor der Bergakademie Clausthal, Magnifizenz Gumbrecht, und Prof. Dr. Dankwortt, Ti. Ho. Hannover, der die Damen in launigen Versen feierte. Abends fanden Festvorstellungen im Städt. Opernhaus und Schauspielhaus statt.

Am Freitag, den 15. Juni, vormittags fand im Beisein zahlreicher Jubiläumsteilnehmer sowie der Professoren und Studentenschaft der Tierärztlichen Hochschule am Wohnhaus von Robert Koch die feierliche Enthüllung einer von der Tierärztlichen Hochschule Hannover gestifteten Gedenktafel statt. Robert Koch, den Magnifizenz Mießner in seiner Weiherede den „Meister der Bakteriologie“ nannte, hat in den Jahren 1866—1868 in Langenhagen als Arzt der Provinzial Heil- und Pflegeanstalt gewirkt. Die Tierärztliche Hochschule Hannover glaubte, den Tag ihres 150jährigen Bestehens nicht besser ehren zu können, als daß sie diesem Manne eine Gedenktafel an der Stätte errichtete, wo er zwei Jahre seiner Tätigkeit verbracht hatte. Die Gedenktafel ist eine Schrifttafel aus deutschem Juramarmor. Sie ist angefertigt von dem Bildhauer Friedrich Buhmann, Hannover, und trägt in goldenen Lettern die Inschrift: „Dem großen Meister der Bakteriologie Robert Koch (1843—1910) in dankbarer Erinnerung die Tierärztliche Hochschule.“ 15. Juni 1928.“ Nachdem die Tafel der Obhut der Gemeinde Langenhagen übergeben war, ergriff Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. Kleine, ein Mitarbeiter Robert Kochs, vom Institut für Infektionskrankheiten „Robert Koch“ in Berlin das Wort und

dankte der Tierärztlichen Hochschule für die Stiftung der Tafel. Geheimrat Dr. Wehrle legte für das Reichsgelandschaftsamt einen Kranz nieder. In gleicher Weise ehrte die Ärztekammer der Provinz Hannover den großen Forscher.

Am Freitag Nachmittag fand die Feier der **Grundsteinlegung** für die durch die Entwicklung der Hochschule notwendig gewordenen Erweiterungsbauten statt. Nach Verlesung der von dem Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Dr. h. c. Steiger, für den Grundstein vollzogenen Urkunde begaben sich Rektor, Professorenkollegium, Ehrenbürger, Ehrengäste und Chargierte der Korporationen in feierlichem Zuge zum Gedenkstein auf dem Neubaugelände, an dem die übrigen Studierenden und Teilnehmer bereits Aufstellung genommen hatten. Hier ergriff Prof. Dr. Kronacher das Wort und dankte dem Staat, der Provinz und Stadt, den Ministerien, Kuratorium und städtischen Behörden für das verständnisvolle Eingehen auf die Wünsche und Belange der Hochschule. Dann wurde die Urkunde in den Grundstein versenkt und von dem Landwirtschaftsminister die ersten Hammerschläge geführt mit den Worten: „Die neuen Unterrichts- und Forschungsstätten mögen in Einrichtung und Leistung würdig der Vergangenheit sein, den höchsten Anforderungen der Gegenwart gerecht werden, allen Entwicklungsmöglichkeiten weitblickend die Bahn bereiten! Das walte Gott!“ Hieran schlossen sich die Hammerschläge von den Vertretern der nachstehend bezeichneten Behörden, von denen folgende Begleitworte gesprochen wurden:

Für das Finanzministerium Ministerialdirektor Kießling: „Des Baumeisters Tat, der Wissenschaft Saat will schützen der Staat.“

Für das Oberpräsidium Oberpräsident Noske: „Dienie heute noch ungeahnten Erforschungen und Lehren!“

Für das Landesdirektorium Landeshauptmann Dr. von Campe: „Ich rufe den Studierenden, welche in den hier zu errichtenden Gebäuden Kenntnisse und Erfahrungen für ihr Leben sammeln wollen, den Goethespruch zu: „Wer mit dem Leben spielt, kommt nie zurecht! Wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer Knecht!“

Für die Stadt Hannover Oberbürgermeister Dr. Menge: „Für die Wissenschaft, für das Vaterland, für die Stadt Hannover!“

Für die Veterinärabteilung des Landwirtschaftsministeriums Ministerialdirigent Dr. Müssemeier: „Der tierärztlichen Forschung und Lehre zur Förderung, der leidenden Tierwelt zum Wohle, der Landwirtschaft zum Nutzen!“

Für die Landwirtschaftskammer Präsident der Landwirtschaftskammer für die Provinz Hannover von Reden: „Der Grundstein gelegt zu Zeiten der Not, gibt seinen Hütern das Mahngebot: Forchet und lehret mit Fleiß und Kraft, zum Segen der deutschen Landwirtschaft.“

Für die Industrie- und Handelskammer Präsident Platze: „Möge dieses Haus immerdar sein und bleiben: Ein Hort reiner Wissenschaft, eine Stätte ernster Arbeit und zielvollen Strebens, ein Afyl deutscher Lebensideale.“

Für die Handwerkskammer Präsident Plate: „Seit anderthalb Jahrhunderten in dieser Stadt gepflegtem Teile der Wissenschaft, hier wird ihm ein neues Heim. Möge es in aller Zukunft Menschen in sich haben — Lehrer wie Lernende —, den Vorgängern gleich: treu, fähig, fleißig!“

Für die Studentenschaft cand. med. vet. Thiele: „Auf der Vergangenheit aufbauend; die Gegenwart befruchtend; der Zukunft dienend!“

Für das Neubauamt Reg.- und Baurat Kaßbaum: „Die Bauleitung setzt diesen Stein mit dem Wunsch, daß in den neuen Bauten Forschung und Lehre eine Stätte finden möge! Auf neuen Wegen, zu neuen Zielen!“

Die letzten Hammerschläge wurden von Sr. Magnifizenz, Prof. Dr. Mießner, mit folgenden Worten getan: „So werde und wachse, behütet und gepflegt von jetzigen und

künftigen Generationen, ein Haus des Wissens und der Forschung zum Segen des deutschen Volkes!“

Anschließend an die Feier begaben sich die Teilnehmer zur Reitbahn der Hochschule, um der Vorführung der Reitabteilung der Studierenden beizuwohnen.

Am Abend veranstalteten die Studierenden in der Ausstellungshalle der Stadthalle einen großen F e s t k o m m e r s , an dem zahlreiche Vertreter der Reichs-, Staats- und Kommunalbehörden, der Geistlichkeit, der Wehrmacht und der Polizeibehörden sowie alte Herren der Korporationen und viele Kollegen teilnahmen. Die Begrüßungsansprache hielt cand. med. vet. Thiele; die Festrede hatte cand. med. vet. Siegert übernommen, der nach Absingen des Deutschlandliedes einen donnernden Salamander auf das Wohl des Vaterlandes reiben ließ. Prof. Dr. Trautmann richtete an die Studierenden herzliche Worte des Dankes für die Einladung zum Festkommerse.

Das veterinärmedizinische Studium zu Hannover vor hundert Jahren.

Von Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

Die Tierärztliche Hochschule zu Hannover feiert im Juni 1928 ihr 150jähriges Jubiläum. Die glänzende Entwicklung, die diese älteste veterinärmedizinische Lehranstalt Deutschlands in der letzten Hälfte ihres Bestehens, besonders seit ihrer Zugehörigkeit zu Preußen genommen hat, wird erst ganz offenbar, wenn man sich einmal in aller Nüchternheit die Zustände vor Augen führt, die vor hundert Jahren an dem hannoverschen Institut herrschten. Nach den Tagebuchaufzeichnungen Carl Heinrich Hertwig's, deren Abschrift sich in meinem Besitze befindet, will ich im folgenden das Leben und Treiben an der alten Tierarzneischule anno 1828 schildern und insbesondere Studienverhältnisse, Lehrmittel und Lehrer berücksichtigen.

Die „Schule“ lag 1828 dicht vor dem „Clever Thor“ zu beiden Seiten der Herrenhauser Chaussee, stand unter der Aufsicht des Obermarstallamtes zu Hannover und hatte keine Verbindungen zu wissenschaftlichen Behörden. Sie wurde von 34 Schülern besucht, die fast ohne Ausnahme Angehörige des Königreiches Hannover waren. Die Besuchsziffer war in manchen Jahren bereits höher als 40. Die Schüler setzten sich nur aus „Frei-Eleven“ zusammen. Militär-Eleven, wie in Berlin, gab es in Hannover nicht. Jeder studierte auf eigene Kosten. Besondere Aufnahmebedingungen hinsichtlich des Alters und der Vorbildung existierten nicht. Über die jeweilige Aufnahme eines Schülers, die ohne die geringste Schwierigkeit zu jeder Jahreszeit möglich war, entschied nur der Direktor. Seinen Anordnungen, natürlich auch den örtlichen und den allgemeinen hannoverschen Landesgesetzen, mußten sich alle Studierenden fügen. Besondere Gesetze der Tierarzneischule fehlten. Das veterinärmedizinische Studium umfaßte offiziell zwei Jahre. Jedoch wurden ausnahmsweise Schüler auch schon nach einjährigem Kursus zur Schlußprüfung zugelassen. Das Abgangs-Examen wurde ganz allein von den beiden Professoren der Schule unter Ausfluß der Öffentlichkeit abgehalten. Diese beiden Lehrer schrieben auch das Zeugnis aus. Sonstige Prüfungen, z. B. halbjährige, gab es nicht. Die Unterrichtsgebühren waren in Hannover im Verhältnis zu Berlin sehr teuer, zumal in Hannover den Schülern längst nicht soviel geboten wurde wie in Berlin. Das hannoversche Honorar betrug für das erste Jahr 10 Louisd'or, für das zweite Jahr 8 Louisd'or und für ein weiteres drittes Jahr 6 Louisd'or. Für ein dreijähriges Studium mußte ein Student in Hannover also damals 24 Louisd'or = 120 rx Gold,¹⁾ in Berlin dagegen nur 60 rx Courant, also viel weniger als die Hälfte, zahlen. Von den Unterrichtsgebühren erhielt der als Direktor fungierende erste Professor U. F. Hausmann zwei Drittel, der zweite Professor J. H. F. Günther ein Drittel. Die Höhe der Gebühren veranlaßte die Studenten, gewöhnlich nur zwei

Begünstigt von wundervollem Wetter nahmen die Festlichkeiten der Tierärztlichen Hochschule einen glänzenden Verlauf; sie stellten etwas fast noch nie dagewesenes dar, und immer wieder versicherten in- und ausländische Gäste, welchen gewaltigen Eindruck die Veranstaltungen bei allen hinterlassen habe. Vom Festausschuß, insbesondere Prof. Dr. Trautmann, bis ins kleinste großzügig und weitblickend vorbereitet, bot die Jubiläumsfeier der Tierärztlichen Hochschule eine schöne Gelegenheit, der wissenschaftlichen Welt des In- und Auslandes sowie der breiteren Öffentlichkeit die große Bedeutung der Veterinärmedizin in Deutschland kundzutun. Die Veranstalter können mit berechtigtem Stolz auf ihr Werk zurückblicken, mit dem sie nicht nur der Hannoverschen Hochschule, sondern auch dem gesamten tierärztlichen Stand einen großen Dienst erwiesen haben.

W.

Jahre oder in einzelnen Fällen nur ein Jahr in Hannover zu bleiben, um dann im zweiten Jahre eine andere Tierarzneischule zu besuchen. Bei diesem Wechsel bevorzugten die jungen Veterinäreleven in den ersten Jahren des XIX. Jahrhunderts Viborg's wegen Kopenhagen. Die Berliner Tierarzneischule war in dieser Zeit gar nicht auf der Höhe. Erst in den zwanziger Jahren, nach Gurlt's und Hertwig's Berufung, zog sie auswärtige Studierende an sich. Seitdem kamen fast regelmäßig einige Eleven aus Hannover nach Berlin, um hier ein weiteres Jahr zu studieren. Abgesehen von ein oder zwei Eleven, die in der Hochschule wohnten, hausten alle übrigen in Hannover in Bürgerquartieren.

Der gesamte Unterrichtsstoff war zwischen den beiden Professoren ziemlich gleichmäßig verteilt und wurde innerhalb eines einzigen Jahres den Schülern derart vorgetragen, daß jeder Professor täglich nur eine Vorlesung hielt. Der Ausbildungskursus war also nur einjährig. Man mußte ihn aber noch ein zweites Jahr lang absolvieren, um die Zulassung zum Examen zu erhalten. Der Ausbildungskursus für die hannoverschen Veterinäreleven begann Michaelis zu Anfang des Wintersemesters. Die Vorlesungen verteilten sich im Winter folgendermaßen. Osteologie, Exterieur und Hufbeschlag trug Direktor Hausmann vor. Anatomie, Physiologie und Geburtshilfe lehrte Professor Günther. Im Sommersemester behandelte Hausmann Physik, Naturgeschichte, äußere und innere Krankheiten. Günther unterrichtete Botanik (mit einer allwöchentlichen Exkursion), Chemie, gerichtliche Tierheilkunde und Rezeptierkunde. Von diesen Disziplinen trug jeder Professor immer nur ein- und dieselbe ununterbrochen bis zu ihrem Ende vor. Von beiden Lehrern wurden also jederzeit nur zwei verschiedene Gebiete in den täglichen Vorlesungen behandelt. Sie sprachen nicht frei, sondern lasen aus besonderen Heften den Schülern vor. Auf das Mitschreiben und Ausarbeiten verwandten die Studenten sehr viel Mühe und Zeit. Merkwürdigerweise fehlten 1828 in Hannover Vorlesungen über allgemeine Pathologie und Therapie, Arzneimittellehre, Pharmakologie, Diätetik und Tierzucht, während in Berlin diese Disziplinen schon jahrelang eingehende Berücksichtigung fanden. Übrigens war auch die in Berlin übliche Teilung der Chirurgie, Therapie und Pathologie in einen allgemeinen und einen speziellen Abschnitt in Hannover gänzlich unbekannt. Die Möglichkeit, die Lehrmittelsammlungen der Schule an gewissen Tagen als Lernsaal benutzen zu dürfen, wie es in Berlin Sitte war, bestand leider in Hannover nicht. Dehnte sich das veterinärmedizinische Studium eines Eleven länger als ein Jahr in Hannover aus, dann hörte er im zweiten Jahre dieselben Vorlesungen noch einmal, war aber außerdem noch als

¹⁾ Ungefähr 360 Reichsmark.

Praktikant in den Krankenställen und in der ambulatorischen Klinik tätig. Zum praktischen Dienst im Krankenstall wurde der Student häufig schon im zweiten Semester hinzugezogen, wenn er auch in den beiden ersten Semestern offiziell nur auscultando dem Unterricht beizuwohnen brauchte. Seltenerweise wurde seitens der hannoverschen Schule kein praktischer Unterricht im Schmieden und im Hufbeschlag erteilt. Eine Schmiede war allerdings vorhanden. In früheren Jahren konnte jeder Student, dem die „schwarze Kunst“ Spaß machte, bei dem Marstallschmied *Kleine* für 1 Louisd'or²⁾ praktischen Unterricht nehmen. Leider war diese Möglichkeit 1828 nicht mehr vorhanden, da *Kleine* der berühmten Giftmörderin *Gottfried* aus Bremen 1827 zum Opfer fiel, und sein Sohn, der äußerst geschickte Marstallschmied und tüchtige Tierarzt *Kleine*, im Jahre 1828 noch unter den Folgen der Vergiftung, die ihn gleichfalls betroffen, litt und noch nicht unterrichten konnte.

Die Räumlichkeiten der Tierarzneischule befanden sich fast durchweg in einem mangelhaften Zustande. Der „Zergliederungsfaal“ war so klein, daß immer nur wenige Schüler an den Präparierübungen teilnehmen konnten. Der Raum war so dunkel, daß im Winter meistens nur bei künstlichem Licht gearbeitet werden konnte. Immerhin war die hannoversche Anatomie der Wiener bis 1823 noch weit überlegen, die ja bis dahin überhaupt keinen Präparierfaal besaß. Über eine Apotheke, ein chemisches und pharmazeutisches Laboratorium verfügte die hannoversche Schule 1828 noch nicht, nur über einen kleinen Bestand von physikalischen Apparaten. Die Bibliothek bestand aus 80 Bänden. Ihre Mehrzahl gehörte dem „Hannoverschen Magazin“ an, aus dem der Veterinärhistoriker noch manche längst verschollene tierärztliche Abhandlung verwerten kann.

Ein Fond zu Neuanschaffungen für die Bücherei bestand nicht. Die Krankenställe reichten gerade für neun Pferde, waren baufällig und hygienisch nicht einwandfrei. Ställe für Rinder, Schweine und Hunde fehlten. Gegebenenfalls wurden diese Tiere in den Krankenställen der Pferde untergebracht. Eigens angestelltes Pflegepersonal für die Patienten war nicht vorhanden. Die wenigen kranken Tiere, die zur Tierarzneischule gebracht wurden, mußten stets von den Veterinäreleveen selbst gefüttert und gepflegt werden. Dabei sollen die Patienten oft zu kurz gekommen sein.

In den Krankenställen befanden sich damals fünf Patienten: ein staupekranker Hund (in Hannover hieß Staupe damals „die Seuche“), zwei lahme Pferde, ein druse- und ein maukekrankes Pferd. Mehr Pfleglinge beherbergte der Klinikstall sehr selten, eher noch weniger. Mitunter stand er wochenlang leer, da sich die Besitzer nur in ganz dringenden Fällen von ihren kranken Tieren trennten. Fast ausnahmslos behielt man die kranken Tiere bei sich zu Hause und ließ die Professoren oder die Scholaren zu einem Besuch des Patienten bitten.

Der Mangel an Krankenstallinassen wurde überreichlich ausgeglichen durch die zahlreichen Außenpatienten (1834: 1867 Tiere; 1838: 2934 Tiere in Hausmann's Praxis), deren Behandlung sich im Rahmen der ambulatorischen Klinik abspielte. Zur Vermeidung von Streitigkeiten hatten die beiden Professoren *Hausmann* und *Günther* ihre Wirkungskreise genau abgegrenzt. *Hausmann* verfuhr die Stadtpraxis, *Günther* die Landpraxis. Zur klinischen Ausbildung der Studenten dienten fast ausschließlich *Hausmann's* Patienten in der Stadt und den Vorstädten. *Hausmann* verdient als Begründer und Organisator der ambulatorischen Tierklinik einen Ehrenplatz in der Geschichte der Hochschule. Unter *Hausmann* spielte sich die klinische Ausbildung folgendermaßen ab. In der Regel besuchte der Professor die Patienten zuerst, stellte ihre Krankheit fest und überließ sie dann einem oder höchstens 2 Praktikanten zur Behandlung, die ihm täglich

Bericht erstatten mußten und dann die jeweils erforderlichen Heilmittel erhielten. Selbständige Operationen durften die Studenten nicht vornehmen. Zu besonderen Eingriffen mußten die Patienten morgens um 10 h ins Institut gebracht werden. Dort operierte *Hausmann* selbst in Gegenwart aller Studenten. Die Behandlung durch die Praktikanten sowie durch den Professor galt als Privatpraxis des Lehrers. Die Kosten mußte der Tierbesitzer an den Lehrer zahlen. *Hausmann* rühmte *Hertwig* gegenüber die Vorteile der ambulatorischen Tierklinik. Der Veterinärpraktikant würde in Hannover unmittelbar in die Privatpraxis eingeführt, käme hierbei genau so wie später als Freiberufstierarzt mit Menschen aus den verschiedensten Ständen in Berührung, gewänne dadurch frühzeitig Sicherheit und Geschicklichkeit im Umgang mit Menschen und Tieren und einen besseren Überblick über tierwirtschaftliche Belange als in dem Klinikstall einer tierärztlichen Lehranstalt mit seinem ewigen Einerlei. Fraglos war die Berliner Veterinärtschule der Hannoverschen hinsichtlich der Heranbildung tüchtiger Praktiker insofern im Rückstand, als in Berlin der klinische Unterricht nur im Krankenstall vor sich ging.

Wertvolle Hilfsmittel für den tierärztlichen Unterricht besaß die Hochschule schon vor hundert Jahren in ihren reichhaltigen Sammlungen, die zum Teil aus *Kersting's* Nachlaß stammten, anatomische und pathologische Präparate sowie Veterinärintstrumente und Hufeisen umfaßten.

Das anatomische Kabinet war sehr reichhaltig, aber weder geordnet aufgestellt noch katalogisiert. Viele Gegenstände und Gläser trugen keine Bezeichnung. Eine Besichtigung ohne Führung durch einen der beiden Professoren war unmöglich. Das anatomische Museum enthielt Präparate von gefundenen und kranken Ovarien, von Embryonen verschiedener Tiere und verschiedenen Alters, ferner eine fortlaufende Reihe der verschiedensten Entwicklungsperioden des Fötus in einer Vollständigkeit, wie sie damals *Gurlt* in Berlin noch nicht besaß. Durch besondere Feinheit zeichneten sich Präparate des Urogenitalapparates vom Schwein und des Herzens und Magens einer Schildkröte aus, zu deren Injektion eine Wachsmasse und Quecksilber Verwendung gefunden hatte. Sogar ein ganzes Pferd, an dem *Kersting* die Muskeln und die Gefäße präpariert hatte, war nach dieser Methode injiziert. Die Gefäße waren an den Stellen, wo sie die Injektionsmasse nicht ausfüllte, durch künstliche Stränge aus rotem und blauem Wachs markiert. Hierbei war einst dem sonst so genialen *Kersting* ein Versehen unterlaufen, das seine Nachfolger in nicht gerade taktvoller Form ausgeflachtet haben. *Kersting* war blindlings der Regel gefolgt, daß einer Vene immer eine in unmittelbarer Nachbarschaft verlaufende Arterie entspricht, und hatte, als er neben der vena thoracalis lat. keine Arterie fand, kurz entschlossen einen roten Wachsstrang neben den blauen gelegt. Ganze Skelette waren von allen Haustieren vorhanden, allerdings nicht sehr zweckmäßig aufgestellt. Recht lehrreich wirkte eine Reihe kranker tarsi, an denen *Havemann* († 26. Juli 1819) seine Untersuchungen über den Spat anstellte (veröffentlicht im Hannoverschen Magazin 1788, Nr. 47 und 48). Als einziges deutsches Veterinärinstitut besaß damals das Hannoversche in seiner Sammlung schiffsförmige und Huf-Beine von Pferden, die an Podotrochitis chronica aseptica litten. Gerade diese Krankheit, von *Coleman* 1802 als „Coffin joint lameness“, von *James Turner* später „the navicular disease“, von *Hertwig* „chronische Hufgelenkslahmheit“ bezeichnet, beschäftigte vor hundert Jahren die besten tierärztlichen Forscher. Die Therapie dieser Lahmheit durch Neurotomie der Volarnerven, die *Hausmann* als erster deutscher Tierarzt in Hannover ausführte, illustrierten mehrere Präparate. Bei ihnen waren die Enden der zerschnittenen Nerven kakteenartig zu sog. Amputationsneuromen aufgetrieben, in einem Falle sogar wieder zu-

²⁾ Ungefähr 15 Reichsmark.

fammengewachsen, allerdings ohne Wiedervereinigung der beiderseitigen Achsenzylinder. Bemerkenswert waren noch folgende Stücke der Sammlung, die sonst nirgends vorhanden waren:

1. Eine geheilte Becken- und Femurfraktur vom Pferde;
2. zwei zum größten Teile verknöcherte larynges von Pferden, die Kehlkopfpeifer („hart schnaufig“) waren; eine Verletzung des larynx durch ungeschicktes Eingeben von Pillen mit einem Stock hatte die Verknöcherung veranlaßt.
3. zwei larynges von „hart schnaufigen“ Pferden, deren Kehlkopfpeifen bedingt war durch Schwund des musc. crico-arytaenoideus dorsalis (= musc. Kryco-Arytaenosus posterior 1828 genannt), wie es zuerst Field in London beobachtet hat;³⁾
4. ein Oesophagus-Divertikel (= „Schlundbruch“) eines Pferdes mit Ruptur der Speiseröhrenmuskulatur;
5. eine verknöcherte Nierenkapfel eines alten Pferdes, das im Leben keine Funktionsstörungen zeigte;
6. die Nasenscheidewand eines rotzkranken Pferdes mit zwei ausgebildeten „Polypen“;
7. eine Dermoidzyste von der Schultergegend eines Pferdes, aus der ganze Büschel 1 cm langer dunkelbrauner Haare hervorgewachsen sind;
8. zwei knorpelartig harte Ovarien von Stuten, das eine von gewöhnlicher Größe, das andere viermal so groß. Beide Ovarien zeigten im Innern eine Höhle, aus der 1—2,5 cm lange schwarze Haare hervorgewachsen waren. In beiden Fällen handelt es sich um zystische Teratome. Zu ihnen gehört auch noch das folgende Präparat: Der Schädel eines etwa acht Monate alten Fötus, der ohne Körper im Eierstock eines Schweines eingeschlossen gefunden war.

Die Instrumentensammlung war sehr vollständig. Sie enthielt nicht nur den Kersting'schen Nachlaß, von dem K. Günther 1878 in seiner Festschrift zum 100jährigen Jubiläum ein genaues Verzeichnis gibt, sondern auch alle neueren, insbesondere englischen Veterinärinstrumente, die bis 1828 in Gebrauch waren. Zwei an andern Veterinärinstituten unbekannte Instrumente befanden sich in der Sammlung: ein von Hausmann verbessertes Kastrationsmesser zum Kastrieren weiblicher Schweine und ein Apparat zum Abbinden von Stollbeulen und Balggeschwülsten.

Die reichhaltige Hufeisensammlung enthielt u. a. eine 2,52 cm dicke, einem persischen Hufeisen ähnliche Bleiplatte. Versuchsweise hatte sie Hausmann einem Pferde, das „sich griff“, auf einen Vorderhuf aufgeschlagen, um an den Eindrücken auf der Außenseite der Bleiplatte zu sehen, in welcher Weise das trabende Pferd beim „Sichgreifen“ mit dem Hinterhuf den Vorderhuf traf.

Die beiden Professoren, denen von hundert Jahren die Ausbildung der Veterinärstudenten in Hannover oblag, waren im wahrsten Sinne des Wortes Hochschullehrer. Ihre Forschungen und Vorlesungen litten allerdings darunter, daß die Lehraufträge zu vielseitig waren. Trotzdem haben beide Lehrer in ihren Lieblingsdisziplinen Hervorragendes geleistet. Ulrich Friedrich Hausmann hatte im Anschluß an seine tiermedizinische Ausbildung in Berlin⁴⁾ (1798) und in Göttingen (1802) die Naturwissenschaften gründlich studiert. Sein elfjähriger Aufenthalt in London (1803—1814), wo er die englische Tiermedizin gründlich

³⁾ Bekanntlich gelang zuerst 1846 Friedrich Günther in Hannover die operative Heilung des Kehlkopfpeifens durch Exzision der Stimmlaiche.

⁴⁾ Beim Generalstabsapotheker und Professor der Chemie Sigismund Friedrich Hermbschädt.

kennen lernte und als Famulus des berühmten Astronomen Herschel seinen physikalischen Neigungen nachging, kam seiner späteren Lehrtätigkeit sehr zu gute. Sein therapeutisches System, in dem der Rasorismus⁵⁾ und die alte Empirie der englischen Tierärzte mit ihren beiden Universalmitteln — Aderlaß und Aloepille — die Hauptrolle spielte, fand allerdings nicht allseitige Anerkennung. Hausmann's Können und Wissen lag mehr auf dem Gebiete der Anatomie und Chirurgie. Als Forscher beschäftigte er sich intensiv mit der mikroskopischen Untersuchung der Ovarien und Föten der verschiedenen Haustiere. Bereits 1824 hatte er für eine derartige Arbeit einen Preis der Universität Göttingen erhalten. Mit feinem, nach Hertwig's Urteil sehr gutem Mikroskope, nahm Hausmann schon zu einer Zeit Untersuchungen vor, als tierärztliche Lehrer anderer Institute kaum an diese Möglichkeit dachten. Hausmann und damit der Hannoverschen Hochschule gebührt also der Ruhm, das Mikroskop zuerst in den Dienst der veterinärmedizinischen Forschung gestellt zu haben.

Mit gutem Recht kann man den Tierarzt Hausmann als den Vater der Veterinärembryologie bezeichnen. Seine Untersuchungen liefen gleichzeitig mit denen Karl Ernst v. Baers, der 1828 sein die Entdeckung des tierischen Eies beschreibendes klassisches Werk „De ovi animalium et hominis genesi“ erscheinen ließ. Hausmann war übrigens mit v. Baers Ergebnissen nicht einverstanden und erklärte die Eizelle im Graafischen Follikel für ein Kunstprodukt. Ebenso unverständlich wie Hausmann's Stellung zu v. Baers Entdeckung bleibt auch die Tatsache, daß Hausmann's Befunde „Über die Zeugung und Entstehung des wahren weiblichen Eies bei den Säugethieren und den Menschen“ erst 1840 erschienen, trotzdem schon 1820 das Manuskript nach Hertwig's Angabe druckfertig vorlag, und Zeichner und Kupferstecher bereits an den Abbildungen arbeiteten. blieb Hausmann auch der Ruhm einer großen Entdeckung verlagert, so gehört er doch zu den ersten biologischen Forschern, soweit sie sich damals aus Tierärzten rekrutierten. Erst seit Hausmann's Wirken datiert eine wirklich erfolgreiche Berücksichtigung der biologischen Fächer an der Hochschule.

Der zweite Lehrer, Johann Heinrich Friedrich Günther, war vor hundert Jahren, als Hertwig ihn kennen lernte, noch ein unbeschriebenes Blatt, trat allerdings damals schon sehr selbstbewußt auf und verfügte nicht über jene lebenswürdige vornehme Art, die an Hausmann so gefiel. Daß Günther ein ganz außergewöhnlich begabter und fleißiger Forscher und Tierarzt war, hat die lange Reihe seiner Untersuchungen und Abhandlungen aus späteren Jahren bewiesen, darunter 1859 „die Beurteilungslehre des Pferdes“, sein klassisches Werk.

Am Ende unseres Rundganges durch die Anstalt zur Zeit ihres 50jährigen Bestehens nehmen wir Abschied von dem beschaulichen Leben der Biedermeierzeit, kehren zurück in die Gegenwart und staunen, was ein Jahrhundert geschaffen: An Stelle der kleinen tierärztlichen Lehranstalt steht heute eine tierärztliche — „Universität“.

⁵⁾ Auch Contrastismus, vom ital. Ärzte Rasori (1766—1837) begründete Lehre, wonach Gesundheit durch das richtige Verhältnis zweier entgegengesetzter Kräfte, des sog. Stimulus und Contrastismus, bedingt ist. Ist das Gleichgewicht zwischen beiden gestört, so entstehen die verschiedenen Krankheiten.

Eine Enteritisinfektion bei Kühen.

Von Veterinärarzt Dr. Behnke-Köln und Veterinärarzt Dr. Heuner-Bensberg.

Goedecke und Grüttner*) beschrieben eine durch verdorbene Futtermittel verursachte Darmerkrankung bei Kühen, bei der sich sekundär das Bacterium enteritidis breslaviense angesiedelt hatte. Im Nachstehenden möge als

kaufmännischer Beitrag eine Massenerkrankung beschrieben werden, bei der genannter Erreger als Ursache einer Darmerkrankung angelehnt werden muß.

Der Landwirt St. in N. im Kreise Mülheim (Rhein)

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 7, S. 106.

kaufte Ende November zur Befetzung seines noch nicht belegt gewesenen, neu errichteten Musterstalles 15 tragende Kühe, die in zwei Transporten, von acht Kühen am 27. November 1927 und von sieben Kühen am 5. Dezember 1927 aufgestellt wurden und aus der Gegend von Lübeck mit der Bahn bezogen waren. Der Stall enthielt drei Querreihen von je fünf Ständen. In der ersten Reihe standen die Nummern 1—5, in der zweiten Nummer 6—10, wobei Nummer 6 der Nummer 5 mit dem Hinterteil gegenüberstand, in der dritten Reihe Nummer 11—15, wobei Nummer 11 der Nummer 10 mit den Köpfen einander gegenüberstand. Bei der Übergabe der ersten acht Kühe am 27. November 1927 war die Nummer 6, die auf dem Eisenbahntransport gekalbt hatte, mit Durchfall behaftet. Diefem wurde eine besondere Beachtung nicht beigelegt, da das Allgemeinbefinden nicht wesentlich gestört war. Am 6. Dezember war der Durchfall verschwunden. Die Kuh kaute wieder und hatte normalen Appetit, jedoch war in dem linken hinteren Euterviertel, nachdem einige Tage lang nur eine grauweiße, schlickerige Milch zu ermelken war, die Milch vollständig bis auf einige Tropfen versiegt.

Die von einem von uns (H.) am 29. November vorgenommene Untersuchung des Euters ergab an den anderen Vierteln normalen Befund am Euter und an der Milch. Auch an dem kranken linken Hinterviertel waren während der ganzen Krankheitsdauer äußerlich wahrnehmbare Entzündungsercheinungen nicht festzustellen. In einer an das Provinziallaboratorium in Köln zur Untersuchung auf Galt-erregere eingefandten Milchprobe des erkrankten Viertels konnte einer von uns (B.) Galt-erregere oder sonstige Bakterien nicht feststellen. Dagegen fanden sich große Mengen von großen Zellen mit runden Kernen (Parenchymzellen) und Zellen der Milchgänge, dagegen keine Leukozyten, so daß die Diagnose auf katarrhalische Mastitis lautete. Auf differenzierenden Nährböden angelegte Kulturen der Milch ergaben auf der Endo- und der Drigalskiplatte keine Kolonien, auf der Gassnerplatte einen kleinen blauen Belag und auf der Agarplatte eine kleine graue Kolonie. Am 19. Dezember konnten wieder einige Tropfen normal aussehender Milch aus dem erkrankten Viertel gemolken werden, ein Wideranstiegen der Milch ist aber auch nach Wochen nicht erfolgt. Die Kuh blieb dreistrichig. Am 5. Dezember erkrankte die nebenstehende Kuh, Nummer 7, plötzlich unter heftigem Durchfall. Die flüssigen Kotmassen wurden in weitem Bogen abgesetzt. Die vom Besitzer wie bei der Kuh Nummer 6 eingeleitete Behandlung mit Kaffee, Kognak und Haferfischsuppen neben gutem Heu blieb erfolglos. Bei meiner Ankunft am 6. Dezember hatte der durch die große Hinfälligkeit der Kuh beunruhigte Besitzer diese bereits in der Nacht notschlachten lassen.

Bei der Fleischschau fanden sich außer geringer Schwellung der Milz und Schwellung der Schleimhaut von Dünn- und Grimmdarm, die mit zähem graugelben Schleim bedeckt war, punktförmige und einzelne ausgebreitete Blutungen bis zur Größe eines Fünfpfenigstückes in der Schleimhaut des Blinddarmes. In den Darmlymphknoten und den Körperlymphknoten wurden auf der Schnittfläche vereinzelt Blutpunkte bemerkt. Weitere krankhafte Veränderungen waren an keinem Organ festzustellen. Besonders fehlten Blutungen am Herzen und unter den serösen Häuten.

Das Fleisch machte äußerlich einen vorzüglichen Eindruck. Der Nährzustand war sehr gut. Bei der bakteriologischen Fleischuntersuchung im Provinzial-Laboratorium Köln ergab sich folgender Befund:

	Endo	Drigalski	Gassner	Agar
Muskeln	—	—	—	fein. zart. Belag
Milz, Niere	feiner zarter farbl. Belag	—	gelbe Kolonien	feiner Belag
Lymphknoten	—	feine blaue Kolonien	feine gelbe Kolonien	feine runde flache Kolonien

Die Probeagglutination mit Para B- und Breslauferum ergab starke Agglutination.

Die bunte Reihe ergab: Milchzucker kein Gas, Traubenzucker Gas, Lakmusmolke rot, nach zwei Tagen Umschlag in blau, Milch unverändert, Barsiekow I rosa ausgefällt, Barsiekow II blau, Neutralrotagar verfärbt und zerrissen. Hefschlößung rosa ausgefällt, Sternbouillon nach 24 Stunden tintig verfärbt, Rhamnosemolke kirschrot, Indolbildung negativ. Die große Agglutination ergab mit Para B-Serum vom Titer 1:16000 eine Agglutination bis 1000, mit Breslauferum 1:16000 eine folche bis 8000. Hiermit mußte der Stamm als *Bacillus enteritidis breslaviense* diagnostiziert werden, was in den hygienischen Instituten der tierärztlichen Hochschule Hannover, sowie der Universitäten Köln und Kiel bestätigt wurde.

Am 7. Dezember erkrankte die Nachbarkuh Nummer 8 an heftigem Durchfall. Bei der Untersuchung am folgenden Tage konnte die schwer kranke Kuh nur mit Mühe aufgetrieben werden, wobei aus dem weitgeöffneten After, rotbrauner breiartiger mit Blut durchsetzter Kot abfloß. Die Augen waren eingefallen und die Kuh fühlte sich auf der Haut kalt an. Herzschlag war unregelmäßig, Puls schwach, die Atmung geschah angestrengt. Wiederkauen und Panfentätigkeit sistiert. Nach kurzer Zeit verendete sie. Bei der Zerlegung fand sich Lungenödem und punktförmige und ausgebreitete Blutungen unter dem Herzüberzuge, dem Lungen- und Brustfell. Punktförmige Blutungen in der Dünndarmschleimhaut. Stärkere punktförmige und ausgebreitete Blutungen der Schleimhaut des Dickdarmes und namentlich des Blinddarmes, der auch mit Blut durchsetzte Kotmassen enthielt.

Am 9. Dezember erkrankte Nummer 1 an leichtem Durchfall, nachdem die Kuh einige Tage zuvor nur etwa $\frac{3}{4}$ Liter Milch täglich gegeben hatte. Temperatur betrug 39,3 Grad C, Pulszahl 80, Atemzüge 18 in der Minute. Das Allgemeinbefinden scheint nicht wesentlich gestört. Am 12. Dezember ist die Kuh unter Behandlung mit Methylenblaulösung und Creolin in Schleimsuppe genesen. Der Wiederanstieg der Milchmenge bei der mit sehr guter Euteranlage versehenen Kuh erfolgt sehr langsam. Erst nach mehreren Wochen wird mit Verabreichung von 10—12 Pfund Kraftfutter und reichlichem Beifutter von Heu und Rüben ein Ertrag von 15—16 Litern erreicht. Entzündungsercheinungen am Euter wurden nicht festgestellt.

Das von dieser Kuh am 4. Dezember geborene Kalb erkrankte am Abend des 9. Dezember an Durchfall und wurde am 10. Dezember im Verenden notgeschlachtet. Das Fleisch verworfen. Der Zerlegungsbefund war derselbe, wie bei den Kälbern der Kühe Nummer 9 und 14, die am 2. Dezember und am 5. Dezember geboren waren. Beide Kälber waren am 8. Dezember an leichtem Durchfall erkrankt. Methylenblaulösung und Creolin in Milch bzw. Schleimsuppe waren erfolglos. Bei der Zerlegung fanden sich bei beiden punktförmige und ausgebreitete Blutungen in der Schleimhaut des Dickdarmes und besonders des Blinddarmes.

Am 10. Dezember abends erkrankten zwei weitere Kühe Nummer 11 und Nummer 14 an Durchfall. Die Tiere setzten einen ungewöhnlich stinkenden, breiartigen Kot in großem Bogen etwa 2 m weit an die gegenüberliegende Wand ab. Die Tiere hatten 80—100 Pulse und 20 und 24 Atemzüge in der Minute. Temperaturen betrugen 39,2 und 39,5 Grad C. Panfentätigkeit ist unterdrückt. Am Morgen des 11. Dezember sind die Durchfallsercheinungen zurückgegangen und die Tiere nehmen ihr Futter in gewohnter Weise auf. Die Behandlung bestand im Einschütten von Schleimsuppen mit Methylenblaulösung und Creolin abwechselnd. Sehr auffällig ist der Milchertrag geschwunden. Nummer 11 gibt nur noch 2—3 Liter, Nummer 14 5 bis 6 Liter. Erst nach etwa zehn Tagen wird der frühere Ertrag von 15—20 Litern allmählich wieder erreicht.

Weitere Erkrankungen sind in dem Bestande dann nicht mehr vorgekommen.

Am 12. Dezember wurden den Kühen Nummer 6, die am 27. November erkrankte, und den am Abend des 10. Dezember erkrankten Kühen Nummer 11 und Nummer 14 Blutproben entnommen und hiermit bei Nummer 6 und Nummer 14 an dem aus Kuh Nummer 7 gezüchteten Breslauftamm eine Agglutination von 1:100 festgestellt. Die Befichtigung der verabreichten Futtermittel, ein Gemisch aus Sojafchrot, Erdnußmehl und Palmkern-

kuchen, sowie der Rüben und des Heues ergab einwandfreie Befchaffenheit. Das Kraftfuttermisch wurde in gleicher Mischung aus dem gleichen Lager bezogen, in einem anderen, mit 43 Kühen besetzten Stall des Besitzers ohne Nachteil verfüttert.

Da die Krankheitserrscheinungen bei allen Tieren klinisch und pathologisch im wesentlichen die gleichen gewesen sind, muß angenommen werden, daß das bei der Kuh Nummer 7 isolierte Bacterium enteritidis breslaviense auch bei den anderen Tieren als Erreger in Frage kommt.

(Aus der Ambulatorischen Klinik der Tierärztl. Hochschule Hannover Leiter: Prof. Dr. E. Hupka.)

Über eine Hüft- und Kniebeugehaltung als Geburtshindernis.

(Mit 1 Abbildung.)

Von E. Hupka.

Bei einer Stutengeburt kam das Fohlen anscheinend in normaler Hinterendlage zur Geburt. Die Hufe des Fohlens waren gerade eben noch zwischen den Schamlippen der Stute zu sehen, die Sprunggelenke, der Schweif und die Hinterhand des Fohlens im Becken deutlich zu fühlen. Trotz heftiger Wehen der Stute und gewaltiger Zugkraft von mehreren Männern war das Fohlen jedoch nicht zu entwickeln. Ja selbst das Festlegen der Stute mittels eines Gefchirres an der Krippe und das Vorspannen eines Flaschenzuges waren nicht imstande, das Fohlen auch nur ein geringes aus den Geburtswegen herauszubringen. Es wurde nun unsere Hilfe beansprucht, und wir stellten bei der Untersuchung folgenden Befund fest: Die Stute liegt in Seitenlage und preßt heftig; die Schamlippen der Stute sind hochgradig geschwollen und blau verfärbt. Dazwischen sind zwei Fohlenhufe mit dorsalwärts gekehrten Sohlenflächen sichtbar. Die Sprunggelenke des Fohlens befinden sich in starker Beugehaltung, wobei die Sprungbeinhöcker sich fest an die obere Scheidenwand andrücken. Schweif und Kruppe des Fohlens sind gleich hinter den gebeugten

hydrat, gelöst in 400 Gramm Wasser, intravenös. Nach ca. 10 Minuten liegt die Stute in tiefem Schlaf, und mit Hilfe einer langen Geburtskrücke kann das Fohlen langsam in den Uterus zurückgehoben werden. Man kann nun feststellen, daß die Oberschenkel des Fohlens in schräger Richtung von hinten oben nach vorne unten verlaufen. Jetzt ist auch zu verstehen, warum das Fohlen selbst auf den gewaltigsten Zug nicht zu extrahieren war. Bei jedem Zug stellte sich der Oberschenkel steiler, und das Kniegelenk rutschte immer tiefer unter den unteren Beckenrand, während Schweif und Kreuzbein des Fohlens sich um so fester an die Wirbelsäule der Stute anpreßten. Nachdem nun das Fohlen weit genug in den Uterus zurückgebracht worden ist, gelingt die Streckung der Gliedmaßen verhältnismäßig leicht, und ein mäßiger Zug von zwei Mann genügt, um die Geburt zu bewerkstelligen.

Es handelt sich bei dieser Haltungsveränderung um eine in der Literatur bisher noch nicht beschriebene Hüft- und Kniebeugehaltung. Das beigelegte Bild, das nach einer Nachkonstruktion der betreffenden abnormen Haltung gezeichnet ist, zeigt deutlich die einzelnen Phasen der abnormen Haltung. Selbst wenn ein enger Scheidenraum und das im Becken fest eingekeilte Hinterteil des Fohlens das Einführen der Hand in die Gebärmutter nicht gestatten, ist die Haltung leicht durch die beiden stark gebeugten Sprunggelenke, die nur wenig aus der Scheide herausragenden Fohlenhufe und das Fehlen der Kniegelenke im Beckenraum zu erkennen. Es muß zugegeben werden, daß das Vordringen der Fohlenkruppe in das mütterliche Becken leicht dazu verleitet, eine zu starke Entwicklung des Jungen anzunehmen und kräftig ziehen zu lassen. In dem vorliegenden Falle war bei dem enormen Zug die untere Uteruswand durch die Kniegelenke des Fohlens völlig auseinander gerissen worden.

Eine analoge Haltung hat John e bei der Vorderendlage und zwar bei einem Dromedar beschrieben. Das Dromedarfohlen war bereits soweit in die Geburtswege eingedrungen, daß Kopf und Karpalgelenke sichtbar waren. John e neigte zuerst bei seiner Untersuchung auch dazu, einen zu großen Fötus zu vermuten. Die Entwicklung des Jungen ging aber trotz heftigen Zuges von acht Männern nicht einen Zentimeter vorwärts. Nach einer weiteren Untersuchung, die in dem durch den eingekeilten Fötus verengten Becken sehr schwierig war, erkannte er als Hindernis das fast senkrecht mit dem unteren Ende etwas nach hinten gerichtete Oberarmbein des Fohlens. Nach Zurückschieben der einzelnen Schultergelenke mit der Hand gelang das Anschleifen und Strecken des zugehörigen Beines sehr leicht und das Fohlen konnte ohne Mühe entwickelt werden. Frank erwähnt diese Haltung im Anschluß an die Karpalbeugehaltung. Er schreibt, daß die Extraktion des Fötus sehr schwer gelingt, weil sich mitunter der Oberarm senkrecht stellt und sich in der Beckenhöhle festkeilt. Dasselbe Hindernis kommt nach Frank eventl. auch bei der Sprunggelenksbeugehaltung vor, indem gleichzeitig bei der Sprunggelenksbeugehaltung auch der Oberschenkel und das



Sprunggelenken zu fühlen. Die ganze Beckenpartie des Fohlens liegt so fest im Becken der Stute, daß es unmöglich ist, mit der Hand vorbeizukommen. Bei näherer Untersuchung fühlt man aber, daß die Kniegelenke des Fohlens sich nicht im Becken befinden, sondern an dem unteren Beckenrand anliegen. Ein Zurückstoßen des Fohlens in den Uterus der Stute ist trotz gewaltiger Kraftanstrengung nicht zu bewerkstelligen; einesteils deswegen, weil das Fohlen vollkommen eingekeilt in dem Becken der Stute liegt, andernteils weil jede verfrühte Hilfeleistung sofort heftige Wehen und Abwehrbewegungen der Stute zur Folge hat.

Um nun jedes Pressen der Stute auszuschalten, wird die Stute narkotisiert, und zwar erhält sie 40 Gramm Chloral-

Knie gebeugt find. Es liegen dann Schienbein, Unter- und Oberfchenkel übereinander. Würde man ziehen, so würde sich der Oberfchenkel senkrecht stellen und an die untere Uteruswand anspreizen und dieselbe sogar durchreißen. Die Möglichkeit, daß aber ein Fötus mit gestrecktem Metakarpus in die Scheide eindringen kann, obwohl Knie- und Sprunggelenke gebeugt find und der Oberfchenkel sich in

Schrägstellung vor dem Beckenrand befindet, sah ich bis jetzt nirgend erwähnt.

Literaturverzeichnis.

1. Frank-Oppermann, Handbuch der tierärztl. Geburtshilfe 1922, S. 327.
2. Johne, Bericht über das Veterinärwesen im Königreich Sachsen 1882, S. 27.
3. Harms Lehrbuch der Tierärztlichen Geburtshilfe 1924.

Anatomie und Physiologie.

Strasser, A.: Die Beeinflussung von Infektionskrankheiten durch Schwitzkuren. (Wiener Klinische Wochenschrift 1927, Nr. 31, S. 1005—1007.)

Die Frage, ob man Infektionskrankheiten mittels Schwitzkuren unterbrechen kann, ist dahin zu beantworten, daß in den wenigen Fällen, wo erfahrungsgemäß solche günstige Wirkungen vorliegen, nicht die Provokation des Schweißes unter dem Gesichtspunkte einer Entledigung von Infektionsstoffen an sich das Ausschlagende ist, sondern die Wirkung der verschiedenen Pharmaka, die vielleicht teilweise spezifisch antiseptisch oder antitypisch ist, oder die Wirkung der Überhitzung als solcher, deren Einfluß auf die Infektion, oder besser gesagt auf die Abwehrfähigkeit des Organismus, nicht mehr ganz hypothetisch, sondern durch einzelne experimentelle Befunde gestützt erscheint. A.

Mansfeld, G. und Szirtes, L.: Über die Beziehungen zwischen äußerer und innerer Sekretion der Drüsen. I. Mitteilung. (Mit 5 Kurven.) (Aus dem pharmakologischen Institut der Universität Pécs [Ungarn]). (Naunyn-Schmiedeberg's Archiv für exp. Pathol. und Pharmacol. 1928, 130. Bd., S. 1—27.)

Durch eine bereits früher mitgeteilte Methode wird ein Pankreasfragment bei ungestörter Blutversorgung in einen Zustand versetzt, in welchem der eigentliche azinöse Teil verodet, die Langerhans'schen Inseln funktionstüchtig bleiben müssen. Durch diesen Eingriff haben die Verf. an normalen Hunden eine dauernde Überproduktion von Insulin und damit einen Zustand erzielt, welcher noch drei Jahre post operationem durch einen Tiefstand der Nüchternblutzuckerwerte und Blutzuckersturz im Hungerzustand charakterisiert ist. R. Völker.

Mansfeld, G.: Über die Beziehungen zwischen äußerer und innerer Sekretion der Drüsen. II. Mitteilung. (Aus dem pharmakologischen Institut der Universität Pécs [Ungarn]). (Naunyn-Schmiedeberg's Archiv für exp. Pathol. und Pharmacol. 1928, 130. Bd., S. 28—36.)

Zur Prüfung der Beziehungen zwischen innerer und äußerer Sekretionstätigkeit weist der Verf. auf die Steinach'schen Versuche sowie auf seine eigenen am Pankreas ermittelten Befunde hin, nach denen nicht nur an den Geflechtsdrüsen, sondern auch am Pankreas das Erlöschen der äußeren Sekretion eine gesteigerte Inkrettätigkeit zur Folge hat. Die Frage, ob nicht gewisse physiologische Produkte der Drüsenzelle, je nach dem sie nach außen sich ergießen, oder, daran verhindert, ins Blut gelangen, die äußerlich so different erscheinenden Wirkungen der äußeren und inneren Sekretion in Erscheinung treten lassen, wird bei Hunden an der Speicheldrüse experimentell geprüft. Die abgebundene Speicheldrüse bedingt wie die früher beschriebene Ligatur des Pankreas typische Karenschypoglykämie und tiefe Nüchternwerte. Die Speicheldrüse vollbringt unter den neugeschaffenen Bedingungen eine innersekretorische Funktion. R. Völker.

Innere Medizin und Chirurgie.

Uhlinger, P.: Wasserlöslicher Teer. (Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1927, 69, S. 332.)

Verf. unterluchte bei chronischem Rückenekzem, sowie

andern mit starkem Juckreiz verbundenen Ausschlägen beim Hunde einen neuen wasserlöslichen Teer (Cosma-Teer), der nach Angabe der Firma alle Teerbestandteile in unveränderter Form enthält. Der Vorteil dieser Teertherapie, die übrigens auch bei andern Tieren Erfolge verspricht, liegt in der Sauberkeit der Applikation des Präparates, sowie dessen besserer Resorption, auch dadurch, daß dem Teer noch Parasitika und Keratolytika, Nikotinextrakte (Hydro-sulfide, Sulfide) beigelegt sind. Bei der Räude erleichtert die gute Abwaschbarkeit des Felles die Behandlung wesentlich. H. Graf.

Matsson, Gotth.: Zwei wegen der Symptome und der Komplikationen eigentümliche Fälle von traumatischer Perikarditis bei der Kuh. (Aus der ambulatorischen Klinik der tierärztlichen Hochschule.) (Skandinavisk Veterinär-Tidskrift 1927, S. 260—272.)


(Mit 3 Abbildungen.)

Verf. beobachtete zwei Fälle von Pericarditis circumscripta adhaesiva traumatica. Dabei besteht eine Adhärenz zwischen Epi- und Perikardium in einem kleineren begrenzten Bezirk. In dem ersten Fall war die Kuh vor drei Monaten gekauft worden und war die ganze Zeit gesund gewesen. Zwei Monate vorher war sie gedeckt worden und hatte etwa 10 Liter Milch pro Tag gegeben. Nach Verlauf von ungefähr drei Monaten zeigte sich ihr Allgemeinbefinden gestört, der Appetit verschlechterte sich, die Kuh kaute nicht wieder, ging im Milchertrag zurück, und das Sensorium war abgestumpft. Drei Tage später fiel sie im Stande um und konnte nicht aufstehen. Sie streckte alle vier Füße von sich und stöhnte dann und wann. Wurde sie auf die Brust gesetzt, so fiel sie bald wieder um. Die Augenlider waren geschlossen, der Nährzustand war mittelgut, subkutanes Ödem war nicht vorhanden. Temperatur 38,8 Grad Cels., 88 kräftige, rhythmische und regelmäßige Pulse, das Perkussionsfeld des Herzens normalgroß und die fünfte Rippe an der linken Seite gibt hellen Ton in ihrer ganzen Ausdehnung. Die Herztöne sind verstärkt, aber rein, ohne Nebengeräusch. 15 Atemzüge in der Minute, Atmung ruhig und gleichmäßig. Magentätigkeit fast nicht vorhanden, Dünger fest, mit Schleim belegt. Das Perkussionsfeld der Leber normal groß, Harn hellgelb, spez. Gewicht 1,027, Reaktion alkalisch, Albumin 1,5 ‰. Das Tier befindet sich in einem komatösen Zustand. Die Haut am Rumpfe zeigt deutliche Hyperästhesie. Die Kiefer sind fest geschlossen infolge toxischer Krämpfe in den Kaumuskeln. Ebenso sind die Strecker des Halses und der Vorderfüße krampfhaft kontrahiert.

Es wurde ein Gehirnleiden unbestimmter Natur diagnostiziert und Luft in das Euter gepumpt. Einige Sekunden später setzte sich die Kuh von selbst auf die Brust, wurde aber wieder unruhig und bekam einen Tobfuchtsanfall, die Temperatur stieg auf 40,2 Grad. In der Nacht wechselte Schlämmerfucht und Aufregung, und daher wurde die Kuh am nächsten Morgen geschlachtet.

Bei der Sektion fand sich Netzmagen und Zwerchfell durch dickes schwieliges Bindegewebe verwachsen. Dieses umschloß ein dunkelgefärbter Fistelgang mit schwieligen Wänden, der hinten gegen die Wand des Netzmagens blind endigte, vorn sich durch das Zwerchfell und den Herzbeutel

fortsetzte und in einer Abszeßhöhle in der hinteren Wand der Spitze der linken Kammer endete. Der Fistelgang ent-




hielt nur eine kleine Menge übel-
riechender, schwarzgefärbter Ge-
websreste, aber keinen Fremdkörper.
Auf dem Epikardium fanden sich
wollichtähnliche fibröse Neubil-
dungen, aber kein Fibrin. Die Ad-
härenz bildet einen etwa 3 cm
langen Strang, der vom Herzbeutel
zur Herzspitze verläuft. Unter
feiner Anheftung am Herzen findet
sich die erwähnte, etwa hühnerei-
große, vom Cavum pericardiale
durch eine 2 bis 3 cm dicke, fibröse,
äußere Wand geschiedene Abszeß-
höhle. Im Lumen der Kammer ist
die Scheidewand nur papierdünn an
einer Stelle von der Größe eines Ein-
örestückes und hier hat auch ein
Durchbruch stattgefunden, so daß
Abszeßhöhle und linke Herzkammer
mit einander direkt verbunden sind.
An der entsprechenden Stelle des
Endokardiums finden sich grau-
schwarze thrombotische Massen. Sie
sind leicht von ihrer Unterlage ab-
zulösen und nicht organisiert. In der
nächsten Umgebung finden sich zahl-
reiche kleine Blutungen unter dem
Endokardium.

Die Leber ist über die ganze Fläche mit gelben und grau-
weißen stecknadelkopfgroßen Herden besetzt. Zum Teil

enthalten sie gelben, fadenziehenden Eiter, zum Teil eine
kompakte, käfige Masse. Beide Nieren sind normal groß
und von normaler Konsistenz. Auf ihnen finden sich ähn-
liche, grau oder rot gefärbte Herde. Sie sind von einer
dunkelroten Zone umgeben. Auf dem Querschnitt er-
strecken sie sich keilförmig gegen das Mark und
liegen hauptsächlich in der Rindenschicht. Beide Groß-
hirnhemisphären sind mit gelbweißen, durchsichtigen,
kleinen Herden überfät. Sie liegen vorzugsweise in der
grauen Substanz.


Wie die histologische Untersuchung ergibt, bestehen die
Herde im Leberparenchym aus einer zentralen strukturlosen
Masse, von polynukleären Leukozyten umgeben, die auch
herdförmig zwischen den Leberzellenbalken angehäuft und
im Bindegewebe ringsum die Blutgefäße und Gallengänge
diffus eingelagert sind. In den Nieren werden punkt- bis
hanfkorngroße Herde von polynukleären Leukozyten so-
wie Herde mit strukturlosem nekrotischem Zentrum, die
zum Teil von einer dünnen Bindegewebskapsel umgeben
sind, nachgewiesen. Das interstitielle Bindegewebe ist an ge-
wissen Stellen etwas vermehrt. Im Gehirn finden sich punkt-
bis stecknadelkopfgroße Ansammlungen von polynukleären
Leukozyten. Das Zentrum ist zum Teil nekrotisch. Die
Herde liegen zerstreut in dem sonst intakten Nervengewebe.
Kapselbildung fand sich nicht. Die Wandungen der Pia-
gefäße sind diffus verdickt infolge von Einlagerungen von
Zellen im Bindegewebe.

Im zweiten Fall erkrankte eine Kuh, die zwei Monate
vorher gekalbt hatte und an Kalbfieber mit Erfolg behan-
delt worden war. Die Temperatur betrug 40 Grad, der
Puls war rhythmisch und äqual und wurden 100 Pulschläge
in der Minute gezählt. Das Perkussionsfeld des Herzens ist
normal groß, die Herztätigkeit forciert und die Herztöne
metallisch klingend. Nebengeräusche sind nicht zu hören.
Die Lungen sind normal, Appetit und Wiederkauen und
Tätigkeit des Magens normal. Von Seiten des Peritonäums
keine Schmerzen, wohl aber wird durch die Perkussion eine
Vergrößerung der Leber festgestellt und deswegen ein Leber-
leiden angenommen. Acht Tage später erscheint die stark
abgemagerte Kuh schlummerfüchtig, stöhnt schwach, ihr



Blick erscheint leidend, beim Gehen schwankt sie und all-
gemeine Schwäche zeigt sich. Die Zahl der Pulse beträgt un-

gefähr 100, der Herzschlag ist pochend und die Herzaktion etwas unrein. Nebengeräusche oder Arythmie sind nicht zugegen. Bei Auskultation der Lungen verstärktes Geräusch über beiden Lungen. Das Perkussionsfeld der Leber war weiter vergrößert und bei der Perkussion und der tiefen Palpation wurden hinter der letzten Rippe auf der rechten Seite Schmerzen erzeugt. Der Milchertrag war bis auf drei Liter zurückgegangen. Temperatur hielt sich zwei Tage um 38,5 Grad C, stieg aber am dritten Tage auf 41 Grad. Die Kuh wurde geschlachtet.



Die Sektion lieferte folgenden Befund: Die Brusthöhle ohne abnormen Inhalt, beide Lungen über der ganzen Fläche mit stecknadelkopf- bis erbsengroßen Knoten überfät. Es sind, wie bei der Palpation sich ergibt, kleine Verhärtungen im Lungengewebe. Sie enthalten hellgelben, zähen Eiter und, wie die mikroskopische Untersuchung ergibt, den *Bacillus pyogenes*. Der Zwerchfellappen der rechten Lunge ist vorn mit dem Herzbeutel und hinten mit dem Zwerchfell verwachsen. Der untere Teil des Lappens ist in fibröses Gewebe gewandelt und infolgedessen verdickt und hart. Man fühlt einen fremden Körper, der sich zum Herzen erstreckt. Es ist ein etwa 6 cm langer Drahtnagel. Er liegt in einem dunkelgefärbten Kanal. Die Lymphdrüsen der Lungen sind serös durchfeuchtet und angeschwollen. Die Pleura ist normal. Der Befund am Herzen und am Herzbeutel stimmt genau überein mit dem bei der ersten Kuh. Wie hier sind auch bei der zweiten Kuh das Herz und der Herzbeutel miteinander verwachsen, die Verwachsung erstreckt sich aber weiter nach rechts auf einen Bezirk von der Größe eines Fünforeststückes über die hintere untere Fläche der rechten Kammer. Auf dem Epikardium zeigen sich an der Herzbasis kleine fibröse Neubildungen, die einzigen Zeichen der Perikarditis. In der erwähnten Verwachsung liegt der Nagel verborgen. Mit seiner Spitze ragt er in die Höhle der rechten Kammer, die zum größten Teil mit throm-

botischen, in Schmelzung begriffenen, übelriechenden Massen gefüllt ist.

In beiden Fällen waren aber trotz der beträchtlichen Veränderungen der Herzgegend klinische Symptome eines Herzleidens nicht zugegen. Daher konnte auch eine bestimmte Diagnose nicht gestellt werden und es ist wahrscheinlich, daß, wenn infolge des Durchbruchs in die Kammerwand nicht Komplikationen eingetreten wären, niemals Krankheitsercheinungen infolge der Perikarditis aufgetreten wären. Es ist also anzunehmen, daß traumatische Perikarditiden unter solchen Umständen völlig ausheilen können. B a ß.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Nörr, J. (1927): **Vergleichende pathologische Physiologie der Kreislauforgane.** (Aus: Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie, herausgegeben von Bethe, v. Bergmann, Emden und Ellinger, Bd. VII, Blutzirkulation, 2. Teil, S. 1803 bis 1834.)

Von dem auf breiter Basis angelegten Handbuch sind bisher folgende Bände herausgekommen: Atmung, Verdauung und Verdauungsapparat, Energieumsatz, Rezeptionsorgane, Fortpflanzung, Entwicklung und Wachstum, Korrelationen. Der eben erschienene Halbband VII, 2 schließt das große Kapitel „Blutzirkulation“ ab, in welchem Nörr den Anschluß an die Veterinärmedizin vermittelt. In den beiden Abschnitten „Gefäße“ und „Herz“ werden die funktionellen Störungen an diesen Organen bei Haustieren behandelt und zwar Zirkulationsstörungen des Gesamtkreislaufs und solche örtlicher Natur. Thrombose und Embolie, Aneurysmen, Arteriosklerose, Herz- und Gefäßruptur, Klappenveränderungen, Herzhypertrophie und -Dilatation, Herzschwäche usw. werden nach Ursache und Wirkung und im Zusammenhang mit den verschiedensten Erkrankungen infektiöser und nicht infektiöser Natur unter besonderer Berücksichtigung der Störungen der Herzschlagfolge erörtert. 26 Abbildungen im Text.

Granzow, J.: **Pathologische Anatomie der endokrinen Drüsen bei Sublimatvergiftung.** (Zeitschrift für die gesamte, experimentelle Medizin 1926, Bd. 49, S. 487—499.)

Die typische Sublimatvergiftung ist charakterisiert durch eine Trias funktioneller und anatomischer Nieren-, Darm- und Myokardschädigungen. Daneben gibt es aber noch eine Anzahl inkonstanter oder doch weniger markanter Erscheinungen dieser Vergiftung, deren Ursachen durch die erwähnten Momente nicht klargestellt sind. Dahin gehören die Polyurie, die Glykosurie, die Hypothermie, soweit sie nicht agonal bedingt oder sonst Teilercheinung eines allgemeinen Kollapszustandes ist, und schließlich Fälle von exzessiver Gewichtsabnahme bei fehlenden Durchfällen und erhaltenem Fressvermögen. Diese Faktoren sind auch abhängig vom System der endokrinen Drüsen. Die Versuche ergaben, daß bei der tödlichen Sublimatvergiftung des Hundes an Hypophyse und Nebenniere in einem hohen Prozentsatz der Fälle Veränderungen anatomischer Art auftreten, welche als der Ausdruck einer hochgradigen Funktionsstörung anzusehen sind. An Schilddrüse, Epithelkörperchen und Pankreas sind derartige Befunde nicht zu erheben. Am Ovar dagegen beobachtet man gesteigerte Follikelbildung. Bei der Behandlung sind diejenigen Methoden hauptsächlich anzuwenden, welche von vornherein auf eine Beseitigung der Toxizität des Sublimates gerichtet sind. A.

Karetta, F.: **Über ein metastasierendes Sarkom der Parotis beim Rinde.** (W. t. Mschr. 1928, Jhg. XV, S. 262.)

Verf. beschreibt ausführlich ein Sarkom der Parotis mit metastatischen Herden in Lunge, Bronchiallymphknoten.

Berge.

Ilgnier: **Zur Statistik der Distomatose der Rinder und Schafe.** (B. T. W. 1928, S. 161.)

Am Schlachthofe in Königsberg wurden durch die dor-

tigen Kollegen im Sommerhalbjahr 1927 Aufzeichnungen über die Zahl der an Distomatose erkrankten Rinder und Schafe vorgenommen, wobei durch Wägungen die diesbezüglichen wirtschaftlichen Schädigungen mit berücksichtigt wurden. Zahl der vom 1. April bis 30. September geschlachteten Rinder 9341. Mit Egeln befallen 7980 Lebern, 1361 Lebern ohne die Parasiten. Von den erkrankten Organen 751 genußuntauglich (Wert 6399 Mark), desgleichen 4434 kg verändertes Gewebe (Wert 6296 Mark), von den übrigen 7229 Lebern. Prozentfuß der mit Distomatose behafteten Rinder 85,4, der untauglichen Lebern 9,4. Von den im gleichen Zeitraume geschlachteten 10395 Schafen waren 1795 Lebern = 17,2 Prozent mit Egeln behaftet, davon 1093 Lebern = 61 Prozent als untauglich zu entfernen. Gewicht des bei den übrigen 702 Lebern beanstandeten krankhaften Gewebes 278 kg. Carl.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Schnürer, J. und H. David: Zur Rotztilgung in Österreich in den Jahren 1916 bis 1926. (Aus d. Bakteriologischen Institute der Tierärztlichen Hochschule in Wien. — Vorstand: Prof. Dr. J. Schnürer.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 32, H. 3, S. 206.)

Schnürer und David berichten anlässlich der am 1. Juli 1927 in Österreich festgestellten Rotzfreiheit über die Ergebnisse der dort durchgeführten diagnostischen Verfahren. Durch die Malleinaugenprobe konnten 97,7 Prozent der rotzkranken Pferde als rotzverdächtig erklärt werden. Als wichtige Maßregel, Fehlresultate bei der Malleinaugenprobe zu vermeiden, sieht Schnürer die Sensibilisierung des bereits malleinisierten Auges und die Temperaturmessung der malleinisierten Pferde an. Durch die Hautprobe (Kutanreaktion) allein konnten 94,9 Prozent der rotzkranken Tiere zumindest als rotzverdächtig festgestellt werden. Die Kutanprobe hat niemals, im Gegensatz zur Subkutanreaktion und der intrapalpebralen Methode die serologischen Reaktionen gestört. Durch die Agglutinationsproben wurden 94,1 Prozent (von 122 rotzigen Pferden 115) richtig erkannt, so daß die Behauptung Pfeilers für die österreichischen Verhältnisse keineswegs zu Rechte besteht, daß die Agglutinationsmethode für die Diagnose der Rotzkrankheit nur noch wissenschaftliches und kein größeres praktisches Interesse mehr beanspruchen kann. Durch eine einmalige Untersuchung wurden mittels der Komplementbindung 98,1 Prozent erkannt. Die Komplementbindung war der Agglutination in fünf Fällen überlegen. Die Verfasser heben weiter hervor, daß zur reiflosen Ausmerzung der infizierten Tiere aus den mitunter dichtbesetzten Beständen in 86,9 Prozent der Fälle eine einmalige Einleitung des diagnostischen Verfahrens genügt und daß in keinem Falle eine längere Zeit als vier Wochen benötigt worden war, um die rotzkranken Pferde zu erfassen. Daraus geht hervor, daß die Rotzbekämpfung in Österreich geeignet ist, in veterinärpolizeilicher Hinsicht alles zu leisten, was von einer Seuchentilgungsmethode, welche die Keulung aller infizierten Tiere voraussetzt, derzeit verlangt werden kann. Volkswirtschaftlich könnte die Methode noch in der Weise ausgebaut werden, daß von der Tötung der immunologisch reagierenden Pferde dann abgesehen werden kann, wenn keine klinischen Erscheinungen bestehen und die Verwendung zur Arbeitsleistung durch den Ort und die Art derselben veterinärpolizeilich unbedenklich erscheint. Ein Vorgang, den die Veterinärbehörden auch bereits in einzelnen Fällen mit Erfolg eingehalten haben. Doch dürfte sich dieser Vorgang nur dort empfehlen, wo die Rotzkrankheit in größerem Umfange herrscht und die sofortige Tötung derartiger Rotzpferde zu empfindlichen finanziellen Verlusten führen würde. Ziegler.

Süreya Tahssin: Zur Wertbestimmung des Malleins. (Vorläufige Mitteilung.) (Zschr. für Infekt.-Krankh. der Haustiere 1928, H. 3, S. 185.)

Verf. hat im Reichsgesundheitsamt die Versuche fortgesetzt, ein genaues quantitatives Prüfungsverfahren für das Mallein ausfindig zu machen. Die Nachprüfung der Methode von Schnürer, bei der der Grad der Schwellung nach intrakutanen Einspritzungen des Malleins als Maßstab benützt wird, ergab keine zuverlässigen Anhaltspunkte für die Beurteilung der untersuchten Präparate. An künstlich mit lebenden Rotzkulturen infizierten oder mit abgetöteten Rotzbazillen behandelten Kaninchen lassen sich zwar mittels der Augen- und Lidprobe qualitative Anhaltspunkte für die Beurteilung von Malleinen gewinnen. Dabei ist aber zu beachten, daß Kaninchen nicht selten an Bindehautreizungen leiden und auf diese Weise Fehlergebnisse zustande kommen können. Auch die serologische Auswertungsmethode nach Schreiber und Stickdorn kann als sicheres Verfahren zur quantitativen Auswertung des Malleins nicht bezeichnet werden. Ebenso verfaßt die von Bosmann verführte Prüfung der antigenen Wirkung des Malleins im Kaninchenversuch. Eine Abänderung dieses Verfahrens in der Art, daß Antikörperbildung und antigene Fähigkeit mit homologen Reagentien ausgewertet wurden, hat dagegen bei 38 Malleinen der verschiedensten Herkunft und des verschiedensten Alters mit der Augenprobe übereinstimmende Ergebnisse geliefert. Auf Grund dieser vergleichenden Prüfung ergab sich eine Einteilung in unbrauchbare, brauchbare, gute und sehr gute Malleine. Das Alter vermindert die Wirksamkeit der Malleine nicht in dem Maße, wie man bisher angenommen hat. Frische Malleine besitzen neben der spezifischen bleibenden Wirkung eine vorübergehende flüchtige. Als gut ist ein Mallein zu bezeichnen, wenn es seine Wirksamkeit sechs Monate und länger behält. Es ist anzunehmen, daß Rotzbazillen Rassen bilden, die sich in serologischer Hinsicht nicht immer gleichartig verhalten. Malleine müssen daher aus möglichst vielen Rotzstämmen hergestellt werden, wenn sie einen hohen Grad von Wirksamkeit erhalten sollen. Durch öfteres Hinzufügen von Rindfleischbouillon zu Glycerinbouillonkulturen wird das Wachstum der Rotzbazillen unterhalten und die Wertigkeit des Malleins erhöht. Alte unwirksame Malleine eignen sich nach Zusatz der dreifachen Menge von Rindfleischbouillon als Nährboden für Rotzbazillen und lassen sich nach Verlust ihrer Wertigkeit auf diese Weise wieder auffrischen. Ziegler.

Sorgo, J.: Über die Behandlung der Lungentuberkulose durch intrakutane Einverleibung der „Calmette'schen Tuberkelbazillen“ (Stamm BCG). (Medizinische Klinik 1927, Nr. 34, S. 1202—1294.)

Calmette hat seinen Stamm als völlig avirulent bezeichnet. Verf. hält aber einen tatsächlich vollkommen avirulenten Stamm nicht für geeignet zur Erzielung therapeutischer Wirkungen; denn wenn einem Virus jedwede Angriffsfähigkeit auf den Organismus fehlt, so ist auch eine Gegenreaktion nicht zu erwarten. Die bisherigen Resultate, den therapeutischen Weg der intrakutanen Einverleibung lebender Tuberkelbazillen sind weiter zu verfolgen. Sollten weitere Erfahrungen und längere Beobachtungen ergeben, daß die mit dem BCG-Stamm von Calmette zu erzielenden Resultate keine vollbefriedigende sind, so würde es sich empfehlen, andere schwach virulente Stämme hinsichtlich ihres therapeutischen Effektes zu prüfen, eine Anregung die auch Uhlenhuth bezüglich der Schutzimpfung gegeben hat. A.

Moeller, A.: Aktive Immunisierung gegen Tuberkulose durch intrakutane Einreibung virulenter Tuberkelbazillen. (Zeitschrift für Tuberkulose 1927, Nr. 47, S. 1.)

Virulente Tuberkelbazillen bewirken durch ihre

sensibilisierende Gruppe eine Tuberkulinempfindlichkeit, durch ihre toxische Gruppe rufen sie Immunität hervor. Tote bzw. avirulente Tuberkelbazillen erzeugen durch ihre sensibilisierende Gruppe eine anaphylaktogene Tuberkulinempfindlichkeit, die toxische Gruppe fehlt; sie sind deshalb auch imstande, zu immunisieren. Eine passive Immunisierung gibt es nicht; nur eine aktive homologe Immunisierung ist möglich, aber nicht mit toten oder abgeschwächten, sondern sie scheint nur mit homologen virulenten Bazillen erfolgversprechend zu sein. Von allen Applikationsmethoden dürfte wohl die intrakutane ausfallsreich sein (Gefährlichkeit der intravenösen, Abszesse bei subkutaner Einverleibung, die orale bei Erwachsenen wirkungslos, beim Kinde gefährlich).

A.

Internationales Tierseuchenamt in Paris.

Die diesjährigen Sitzungen des Internationalen Tierseuchenamtes haben in Paris in den Tagen vom 15. bis 16. Mai stattgefunden. Den Vorsitz führte der im Vorjahr auf die Dauer von drei Jahren zum Präsidenten gewählte Leiter des belgischen Veterinäramtes, Herr Generalinspektor de Roc. Erschienen waren Vertreter aus folgenden Ländern: Deutschland, Argentinien, Österreich, Australien, Belgien, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, England, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Marokko, Monaco, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Rußland, Siam, Schweiz, Tschechoslowakei, Jugoslawien, Neu-Seeland.

Zu dem ersten Beratungsgegenstand: **Bekämpfung der Tollwut**, wurden nach dem Bericht von Professor Dr. Hutyrá folgende Schlusssätze einstimmig angenommen.

Die große Verbreitung der Tollwut in der Mehrzahl der Länder, insbesondere seit dem Weltkriege, und die ernste Gefahr, die sie für Mensch und Tier darstellt, macht den Kampf gegen diese Krankheit brennend, einen Kampf, der mit allen Mitteln, über die man verfügt, aufgenommen werden muß.

Nach den bisher gemachten Erfahrungen kann die Krankheit völlig getilgt werden durch die strenge Anwendung veterinärpolizeilicher Maßnahmen, die besonders wirksam sind, wenn sie über weite Gebiete hin nach denselben Grundsätzen und mit gleicher Strenge durchgeführt werden.

Die Tollwutbekämpfung hat nach folgenden grundsätzlichen Richtlinien zu geschehen:

1. Vernichtung aller umherirrenden und aller herrenlosen Hunde.
2. Um dieses Ziel zu erreichen ist es notwendig, das Tragen einer sichtbaren Marke vorzuschreiben, die auf den ersten Blick erkennen läßt, ob der Hund unter Kontrolle steht. Hunde, die mit dieser Marke nicht versehen sind, werden als herrenlos erachtet und getötet.
3. Wutkranke Tiere sind sofort zu töten, ebenso unter Umständen auch wutverdächtige Hunde, namentlich solche, die Menschen gebissen haben; diese wutverdächtigen Hunde sind vor der Tötung einer sorgfältigen tierärztlichen Untersuchung zu unterwerfen.
4. In gleicher Weise sind unschädlich zu beseitigen diejenigen Hunde, die, ohne gebissen worden zu sein, mit wutkranken oder verdächtigen Tieren in Berührung gewesen sind.
5. In großen Städten oder in verseuchten Gegenden ist der Gebrauch des Maulkorbes und der Leine als unerläßliche Maßnahme zu empfehlen.
6. Hunde, die Personen gebissen haben, werden dann als unschädlich erachtet, wenn sie nach einer Überwachung von zwei Wochen keine Erscheinungen zeigen, die den Tollwutverdacht rechtfertigen.
7. Die anderen der Ansteckung verdächtigen Tiere werden während wenigstens drei Monaten unter Überwachung gehalten.

Diesen wesentlichen Maßnahmen haben sich ergänzende Vorschriften anzuschließen, wie die Anzeigepflicht, die Einsperrung während drei Monaten in den verseuchten Distrikten, die unmittelbare Benachrichtigung der bedrohten Distrikte, das Verbot, Fleisch oder sonstige von wutkranken oder der Tollwut verdächtigen Tieren stammende Erzeugnisse zu verwenden oder zu verkaufen, die unschädliche Beseitigung der Kadaver dieser Tiere, die Belehrung über die Gefahr der Ansteckung und der Erscheinungen der Wut usw.

Der Kampf gegen die Krankheit kann unterstützt werden durch die vorbeugende Impfung der Hunde. Die Impfung darf aber nur bei gefunden und unter tierärztliche Überwachung gestellten Tieren und unter folgenden Bedingungen ausgeführt werden:

1. Die Impfungen müssen geschehen mit abgetötetem oder so abgeschwächtem Virus, daß damit unter keinen Umständen nach subkutaner oder intramuskulärer Einspritzung Tollwut hervorgerufen werden kann.
2. Die Impfung von Hunden, die von wutkranken oder verdächtigen Tieren oder von Katzen gebissen worden sind, ist unter allen Umständen verboten.

Die Impfung anderer Tiere soll so bald als möglich nach der Infektion in einer Frist von drei Wochen vorgenommen werden und zwar unter den von den zuständigen Behörden festgesetzten Bedingungen.

Die Mitglieder der Kommission werden gebeten, bei ihren Regierungen darauf zu dringen, daß diese Maßnahmen in Kraft gesetzt werden. Ferner werden sie gebeten, dem Internationalen Tierseuchenamt jährlich vor dem 31. März einen Bericht über den Stand der Krankheit in ihrem Lande während des vorhergehenden Jahres einzufenden.

Namens der deutschen Delegation erklärte Herr von Osterreich seine volle Zustimmung zu den Ausführungen des Hutyrá'schen Berichts und den Ergebnissen dieser Arbeit. Er unterstrich besonders die Bedeutung der Tötung verdächtiger Tiere in verseuchten Gegenden. Die Ergebnisse der Impfung könnten als endgültig feststehend noch nicht angesehen werden. Gleichwohl bestehen keine Bedenken, die Impfung namentlich in Grenzgebieten versuchsweise anzuwenden.

Zu dem zweiten Beratungsgegenstand: **Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche** erstattete zunächst Prof. Vallée Bericht „Über die Pluralität des Maul- und Klauenseuchevirus“. Die nachstehenden von ihm aufgestellten Schlusssätze fanden ungeteilte Zustimmung:

1. Der Begriff der Pluralität des Virus darf als wissenschaftlich festgestellt erachtet werden. Es ist wünschenswert, daß ein internationales Einverständnis für seine Benennung nach den Regeln des biologischen Namensverzeichnisses zustandekommt.
2. Den Typen O und A, die von Vallée und Corré bestimmt und von verschiedenen Gelehrten bestätigt worden sind, ist der Typus C, der von Waldmann und Trautwein bestimmt wurde, hinzuzufügen. Unter diesen drei Virustypen kann außer ihrem immunisierenden Wert, der als streng monovalent zu erachten ist, kein Unterscheidungsmerkmal aufgestellt werden.
3. Es treten heterotypische Formen des Virus auf. Über ihre Bezeichnung kann gegenwärtig keine geschlossene Meinung formuliert werden.
4. Unter den gegenwärtigen Versuchsbedingungen ist beobachtet worden:

Das Vorhandensein des Virus O in Deutschland, England, Dänemark, Frankreich, Holland, Italien, der Schweiz, Jugoslawien; das Virus O ist heute der am weitesten verbreitete der virulenten Typen (81 von 113 studierten Stämmen).

Das Vorhandensein des Virus A wurde dargetan in Deutschland, England, Frankreich; diese Spielart

ist z. Zt. weniger verbreitet als die vorgenannte (13 Stämme).

Das Virus C wurde angetroffen in Deutschland, Italien, Schweden, der Schweiz und Jugoslawien (19 Stämme); es konnte noch nicht bestimmt werden in Frankreich und in Großbritannien.

5. Um eine gute Orientierung über ihre veterinärpolizeilichen Schutzmaßnahmen und ihre Immunisierungsversuche sicher zu stellen, werden die verschiedenen Staaten vorteilhaft eine dauernde Prüfung der virulenten Typen, die den von ihnen festgestellten Seuchenherden entsprechen, einrichten. In dieser Hinsicht sollten Mitteilungen durch das Internationale Tierseuchenamt ausgetauscht werden.
6. Es ist ratsam, in allen Ländern systematische Versuche anzustellen, um den Charakter, die Veränderlichkeit und Abänderungsmöglichkeit der virulenten Typen ganz im Anfang der Seuchengänge, in ihrem Verlauf und an ihrem Ende zu studieren.
7. Der Begriff der Pluralität des aphthösen Virus genügt für sich allein keineswegs, um alle Tatsachen des natürlichen Wiederausbruchs der Infektion zu erklären. Unter bestimmten Bedingungen, die noch festzusetzen sind, führen die aufeinanderfolgenden Impfungen mit demselben Virus, weit entfernt, ein „Stadium der Überempfindlichkeit“ zu erzeugen, den Organismus zu seiner anfänglichen Empfindlichkeit gegen denselben Typus des Virus zurück. Die in Nr. 6 empfohlenen Versuche werden vielleicht gestatten, in Zukunft die Rolle, die diese Erscheinung hinsichtlich der Entstehung von Wiederausbrüchen der Seuche spielt, näher zu würdigen.
8. Alle Versuche der aktiven Impfung, der Hämotherapie oder der Serotherapie und überhaupt alle spezifischen Versuche hinsichtlich der Vorbeuge gegen die Maul- und Klauenseuche müssen künftighin, sei es in ihrer schöpferischen Vorstellung, sei es bei ihrer Durchführung, dem Begriffe der Pluralität des aphthösen Virus Rechnung tragen.

Danach folgten der Bericht von Prof. Dr. Waldmann „Über den Stand der Maul- und Klauenseuche-Versuche in den staatlichen Laboratorien der Insel Riems, und zwar die prophylaktische Rolle des Hochimmunserums gegen die Maul- und Klauenseuche“ und ein kurzer Bericht von Dr. Berger, Chef des Veterinärdienstes in den Niederlanden, „Die Schutzimpfung des Exportviehes gegen Maul- und Klauenseuche“. Beiden Berichten waren Schlußsätze, die zur Annahme hätten gelangen können, nicht beigegeben. Schließlich berichtete noch Prof. Bürgi, der Direktor des eidgenössischen Veterinäramts in Bern über „Die allgemeinen Methoden der Vorbeuge der Maul- und Klauenseuche.“ Seine nach eingehender Aussprache von der Versammlung angenommenen Schlußsätze lauten:

1. In allen Staaten soll die Gesetzgebung vervollkommen und dem Fortschritt der Wissenschaft angepaßt werden.
2. Insbesondere soll der rationellen Organisation des amtlichen Veterinärdienstes — unter der Leitung eines Veterinärs, der dem Minister unmittelbar verantwortlich ist — die größte Aufmerksamkeit gewidmet werden, desgleichen der gewissenhaften Zwangsanmeldung von Erkrankungen sowie der Seuchenstatistik.
3. Die einheitliche Anwendung der unter 1. und 2. formulierten Grundsätze ist zu fordern, um eine spätere Regelung des internationalen Tierhandels zu erleichtern; zu diesem Zwecke wäre eine Reorganisation und eine entsprechende Einrichtung der Grenzbahnhöfe außerordentlich wünschenswert.
4. In jedem Lande sind die veterinärpolizeilichen Maßnahmen streng zu beachten und es empfiehlt sich, daß

die an Maul- und Klauenseuche erkrankt gewesenen Tiere gekennzeichnet und einer geeigneten Absonderung unterworfen werden.

5. Gegenwärtig ist noch keine Schutz- oder Heilmethode bekannt, die den Bedürfnissen der Praxis in befriedigender Weise Rechnung trägt. Es ist deshalb wünschenswert, daß der Staat auch in Zukunft die wissenschaftlichen Forschungen und den praktischen Kampf gegen die Maul- und Klauenseuche noch weiter aufrecht erhält.
6. Solange man nicht geeignetere Mittel zur Bekämpfung dieser Krankheit entdeckt hat, empfiehlt es sich, unter den bekannten Vorbehalten, kranke oder verdächtige Tiere abzuschlachten. Hierbei ist es unerlässlich, daß der Staat den Tierbesitzern angemessene Entschädigungen bewilligt.
7. Es ist überaus wünschenswert, daß die Regierungen strengstens und mit allen Mitteln ihrer Gesetzgebung das Anpreisen, Hausieren und den Verkauf von Mitteln, die als spezifisch zur Vorbeuge oder Heilung der Maul- und Klauenseuche benannt werden, unterdrücken, sofern ihre Wirksamkeit nicht wissenschaftlich festgestellt ist.

Zum Beratungsgegenstand Maul- und Klauen-seuche wurde von der deutschen Delegation (Dr. Müsse-meier) eingehend über die Erfolge der Schutzimpfung mit polyvalentem Serum berichtet, die es ermöglicht haben, inmitten stark verseuchter Gebiete Auktionen, Tierfchauen und Märkte abzuhalten. Auch an der Hand zahlreicher statistischer Aufzeichnungen wurde der große Erfolg der Schutzimpfung bewiesen. Neben der Schutzimpfung wurde auf die Wichtigkeit der Desinfektionsmaßnahmen hingewiesen. Zur Bekämpfung des Geheimmittelschwindels wurde vorgeschlagen, es möchte in dem Monatsbericht des Internationalen Tierseuchenamts eine Liste der staatlich nachgeprüften Geheimmittel regelmäßig veröffentlicht werden. Die Direktion versprach, diesem Vorschlage zu entsprechen.

Einem Wunsche der Herren Vallée und Waldmann entsprechend nahm die Versammlung folgende Entschließung an: In der Erwägung, daß ein häufiger Meinungsaustausch der mit dem Sonderstudium der Maul- und Klauenseuche beschäftigten Gelehrten gegenseitig von größtem Nutzen sei, hält es das Internationale Tierseuchenamt für wünschenswert, daß die Regierungen diese Verständigung fördern und den Meinungsaustausch zwischen den Forschern ermöglichen. Das Internationale Tierseuchenamt wird, sobald es im Besitze seiner normalen Wirtschaftsmittel ist, zur Verwirklichung dieses Zieles beitragen.

Die von dem Herrn Direktor des Internationalen Tierseuchenamtes (Prof. Lécainche) vorgelegten Verwaltungs- und Kassenberichte für das Jahr 1927/28 wurden von einer Kommission von vier Herren geprüft, wonach Prof. Hutyrá unter lebhaftem Beifall der Versammlung Prof. Lécainche für seine vorbildliche Amtsführung den wärmsten Dank aussprach. Zum Kassenbericht wies Prof. Bürgi auf die korrekte Buchführung und besondere Sparsamkeit und Uneigennützigkeit der Direktion hin, die alle Achtung und Dankbarkeit verdienten. Er hob hervor, daß die Zahlung der von den beteiligten Ländern zu erstattenden Beiträge in Goldfrank zu entrichten seien; denn die finanziellen Mittel des Amtes stünden zu der von ihm geleisteten Arbeit in keinem richtigen Verhältnis. Ferner schlug er vor, bei der nächstjährigen Zusammenkunft einen Beschluß über eine Gehaltszahlung an den Direktor ins Auge zu fassen.

Zu der Frage der periodischen Viehseuchen-Nachweisungen wurde beschlossen, daß sie allgemein alle 14 Tage und zwar jeweils am 1. und 15. jedes Monats erscheinen sollen. Nähere Vereinbarungen werden bei der nächstjährigen Konferenz beschlossen werden.

Die nächste Versammlung soll in der ersten Maihälfte 1929 stattfinden. Die Tagesordnung wird unter anderem folgende Gegenstände umfassen: Maul- und Klauenseuche (Berichterfatter: Jackson, Chef des englischen Veterinärdienstes, Prof. Waldmann), Einschleppung des Milzbrandes durch Einfuhr von tierischen Produkten und von Futtermitteln (Berichterfatter: Dr. Müssemeier), Impfungen gegen Tuberkulose, Pseudotuberkulose des Schafes, Vereinheitlichung der periodischen Viehseuchennachweisungen (die Berichterfatter zu den letztgenannten Gegenständen werden vom Internationalen Tierseuchnamt noch ernannt werden).

Der Vorsitzende dankte den Delegierten für ihre Arbeit. Geheimrat Wehrle sprach dem Präsidenten namens der Delegierten für seine Geschäftsführung besonderen Dank aus.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Unter dem Rektorat des Professors der Pharmakologie Dr. med. Wolfgang Heubner ernannt die Medizinische Fakultät der Georg August-Universität durch ihren Dekan, den Professor der gerichtlichen Medizin Dr. med. Theodor Lichte, Herrn Dr. phil. et med. vet. Hermann Mießner, Professor der Hygiene und Bakteriologie an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, dessen hervorragende Arbeiten auf dem Gebiete der Tierseuchen in hohem Maße auch der Lehre von den menschlichen Infektionskrankheiten zu Gute gekommen sind und insbesondere neue Wege zu ihrer Erkennung und Verhütung gezeigt haben, ehrenhalber zum Doktor der Medizin.

Göttingen, den 13. Juni 1928.

Der Dekan. gez. Dr. Lichte.

Nunquam otiosus.

Die im Jahre 1652 gegründete und im Jahre 1677 durch Kaiser Leopold I. als Academie des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bestätigte Kaiserlich Deutsche Academie der Naturforscher zu Halle ernannt hierdurch S. M. Herrn Prof. Dr. Mießner, Hannover, in Anerkennung seiner ausgezeichneten Leistungen zu ihrem Mitgliede und ladet ihn zur Mitarbeit an der seit drei Jahrhunderten gestellten hohen Aufgabe: Die Natur zu erforschen zum Segen der Menschheit.

Halle, am 31. Mai 1928.

gez. Joh. Walther, Präsident der Academie.

Anlässlich ihres 150jährigen Bestehens ernannte die Tierärztliche Hochschule Hannover zu Ehrendoktoren: den Direktor des Pharmakologischen Instituts der Universität Göttingen, ord. Professor Dr. Wolfgang Heubner, wegen seiner vielseitigen, auch für die Veterinärmedizin bedeutungsvollen pharmakologischen Tätigkeit, der Erforschung des Wefens der Methämoglobinbildung, des Phosphor- und Kalziumstoffwechsels und der Kapillargifte, den Rektor der befreundeten niederländischen Landesuniversität Georgia Augusta; den Direktor des Chemisch-technischen Laboratoriums an der Technischen Hochschule Hannover, ord. Professor Dr. Fr. Quincke, den erfolgreichen Organisator der chemischen Großindustrie, den Forscher und Lehrer auf dem Gebiete der angewandten Chemie, den Rektor der befreundeten Schwesterhochschule in Hannover; den Direktor des Tierzuchtinstitutes an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, Geheimen Regierungsrat Prof. Dr. h. c. Johannes Hansen, für hervorragende Verdienste um die Förderung der deutschen Tierzucht als Forscher, Lehrer und Organisator; den ord. Professor für Tierzuchtlehre und Geburtshilfe an der Tierärztlichen Hochschule in Wien, Dr. Karl Keller, in Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen als Forscher und Lehrer auf dem Gebiete der Haustierentwicklung der Sexualbiologie und der tierärztlichen Geburtshilfe; den Abteilungsdirektor am Institut für Infektionskrankheiten „Robert Koch“ in Berlin, Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Friedrich Karl Kleine, den langjährigen Schüler und unermüdlichen Mitarbeiter von Robert Koch, wegen seiner hervorragenden biologischen und erfolgreichen chemotherapeutischen Arbeiten auf dem Gebiete der Protozoenforforschung; den Direktor der Städt. Schlacht- und Viehhöfe in Duisburg,

Dr. med. vet. Paul Heine, der durch seine erfolgreichen wissenschaftlichen Arbeiten den Ausbau der animalischen Nahrungsmittelkunde sowie durch vorbildliche tierärztliche Mitarbeit die Belange der Milchverförgung gefördert hat.

Zu Ehrenbürgern: Landeshauptmann Dr. jur. Martin von Campe-Hannover; Schlachthofdirektor Dr. Christian Elsässer, Landestierarzt von Bremen; Direktor P. Franzen-Hamburg; Ministerialrat Julius Jörn, Landestierarzt von Mecklenburg-Schwerin; Oberbaurat Hermann Kaiser-Hannover; Ökonomierat Fr. Keiser-Berlin, Referent an der Preussischen Hauptlandwirtschaftskammer; Fr. Lautenschläger jun., Berlin; Oberregierungsrat Dr. Paul Oehmke, Landestierarzt von Braunschweig; Geh. Veterinärat Adolf Pirl, Landestierarzt a. D., Dessau; Ministerialrat Dr. August Schotte, Landestierarzt von Thüringen; Generaldirektor W. Tischbein-Hannover; Tierarzt Felix Train-Baruth i. Mark, Präsident des Reichsverbandes prakt. Tierärzte; Exzellenz Oberlandfallmeister Kammerherr von Wenckstern-Redefin; Oberamtmann Heinrich Wex-Rettmer.

Johann Adam Kersting's Elternhaus.

Von Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

Da über Kersting's Vorfahren bisher so gut wie nichts bekannt war, stellte ich Nachforschungen an seinem Geburtsort Liebenau (Kreis Hofgeismar) an, die folgende Tatsachen ergaben:

Der Großvater des Gründers der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover war der Schulmeister Johann Kersting zu Liebenau. Er ließ am 20. März 1687 (1) einen Sohn Johann Georg taufen. Dieser Johann Georg Kersting, Stadtrat zu Liebenau, verheiratete sich am 5. Dezember 1715 (2) mit Tebea Dißen (4) und ließ am 24. April 1727 (3) seinen Sohn Johann Adam taufen, dessen Geburtstag leider nicht festzustellen ist.

Außer den unten verbo tenus wiedergegebenen Kirchenbuchurkunden, die ich Herrn Pfarrer Bierschenk zu Liebenau verdanke, existiert noch ein ehrwürdiger Zeuge aus Kersting's Jugentagen: das Haus seiner Eltern. Bald zwei Jahrhunderte hat es überdauert und bildet heute ein besonders Schmuckstück des heffischen Städtchens Liebenau.



Laut Türinschrift wurde das Haus von Johann Georg Kersting, dem Vater des ersten Direktors unserer ältesten deutschen Tierärztlichen Hochschule, anno 1730 erbaut. In seinen Mauern ist Johann Adam Kersting zum Jüngling herangewachsen. Die Bauart des Hauses verrät Geschmack und Wohlhabenheit. Zahlreiche Räume und Kammern lassen auf einen großen Haushalt schließen. Das Haus zeigt eine besondere Note und steht über dem Durchschnitt der Ackerbürgerhäuser, die aus damaliger Zeit in Liebenau noch erhalten sind. Wahrscheinlich hat Johann Georg Kersting (5) außer der Landwirtschaft noch einen andern Beruf ausgeübt. Das Elternhaus Johann Adam Kersting's ist heute als Arbeiterwohnhaus im Besitze des Herrn B. v. Pappen-

heim (Rittergut Liebenau), dem ich für die liebenswürdige Auskunft und die Überlassung des Bildes an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

Über Johann Burchhard Kersting, „Huffschmidt, Wund und Roßarzt zur Liebenau“, dessen Manuskript über Roßarzneikunst vom Jahre 1711 die Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover aus Johann Adam Kersting's Nachlaß übernahm, ließ sich aus den Rats- und Kirchenakten Liebenaus nichts näheres feststellen.

Urkunden:

1. den 20. Martius 1687: Ist Herrn Joh. Kerstings Schuelmeisterß Söhnlein Johann Georg getauft, dessen Pate ist Herr Johannes Kersting, studiosus juris.
2. den 5. Dezembris 1715: Johann Georg Kersting mit s. Braut Tebea Dißen copuliret worden.
3. den 24. Aprilis 1727 hat der RathsVerwandte Johann Georg Kersting seinen Sohn Johann Adam taufen lassen. Pathe war sein Schwieger-Vatter Adam Steinmetze, Post- und Gasthalter zu Wertkel, in dessen Abwesenheit aber hat die Stelle versehen sein Eydam Adam Künckel, Müller zu Werna.
4. den 7. Jan. 1751: Johann Georg Kersting Ehefrau begraben worden.
5. den 1. Novembris 1754: Joh. Georg Kersting beerdigt worden

80. Geburtstag von Prof. Bernhard Bang, Kopenhagen.

Der Altmeister der dänischen Tierärzte Prof. Bernhard Bang, der bahnbrechende Forscher auf dem Gebiete der Rindertuberkulosebekämpfung und (gemeinsam mit V. Stribolt) Entdecker des nach ihm benannten Erregers des infektiösen Abortus des Rindes, vollendete am 7. Juni sein 80. Lebensjahr. Aus diesem Anlaß wurden dem hochverdienten Forscher und Lehrer zahlreiche Ehrungen und Glückwünsche aus Dänemark und aus dem Auslande dargebracht. Die überaus große Zahl von Beglückwünschungen gab beredtes Zeugnis davon, welcher Wertschätzung sich der Jubilar in der ganzen tierärztlichen Welt erfreut.

Um persönlich ihre Glückwünsche zu überbringen, hatten sich im Heim des Jubilars eingefunden: der Rector magnificus der Universität Prof. Martin Knudsen, der gleichzeitig für die dänische Gesellschaft der Wissenschaften sprach, der Dekan der Medizinischen Fakultät Prof. Oluf Thomsen, der Direktor des staatlichen Serum-Instituts Dr. Madsen, als Vertreter des veterinären Gesundheitsrates Prof. C. O. Jensen, als Vertreter des Vereins dänischer Tierärzte Ober-tierarzt Gautier, als Vertreter des Militär-veterinärkorps Stabstierarzt St. Friis, als Vertreter der schwedischen Tierärzte Prof. Hedin und viele andere. Ministerialrat Prof. v. Ostertag überreichte im Auftrage der Berliner Tierärztlichen Hochschule, deren Ehrendoktor Bang ist, eine künstlerisch ausgeführte Tabula gratulatoria und außerdem die Urkunde als Ehrenmitglied des tierärztlichen Landesvereins in Württemberg; Prof. Poppe-Rostock überbrachte die Glückwünsche des Vereins mecklenburgischer Tierärzte, der von früher her zu Prof. Bang und zu der dänischen Tierärztschaft in näherer Beziehung gestanden hat. Eine Abordnung unter Führung von Prof. Paulli, von der Veterinärhochschule in Kopenhagen, überreichte eine Festschrift von fast 400 Seiten mit Beiträgen von Professoren der Kopenhagener Hochschule, von Mitarbeitern und Freunden des Jubilars (Boas, Grunth, Christiansen, Paulli, Bendixen, Per Tuff, C. W. Andersen, Plum, Mörkeberg, Folmer, Nielsen, C. H. Hansen, Oluf Bang). Am Abend des Festtages hatte der Jubilar zu einer Feier in kleinem Kreise geladen. Viele und launige Ansprachen gaben Zeugnis von der Verehrung, der sich B. Bang in so großem Maße erfreut. Bewundernswert war die Frische und Rüstigkeit, mit der der Jubilar allen Anstrengungen des Tages und bis in die Nacht hinein gewachsen war. Möge ein glückliches Geschick walten und B. Bang diese Kraft des Geistes und des Körpers noch recht lange erhalten!

Poppe-Rostock.

Veterinärarzt Gustav Meyer, Diepholz, †.

Am 11. April 1928 starb nach längerer Krankheit der Veterinärarzt des Kreises Diepholz, Gustav Meyer. Wir verlieren in ihm einen Kollegen von vorbildlicher Berufsauffassung, Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue als Praktiker und als Beamter; von einer Pflichttreue bis zum letzten Atemzuge. Schwer krank und von Schmerzen geplagt, hielt

er sich noch am Tage vor seinem Tode für verpflichtet, seine amtliche Berichterstattung zu erledigen, und mit Recht kann man von ihm sagen, daß er in den Sielen gestorben ist. — Gustav Meyer wurde am 4. Januar 1866 in Meyerhöfen, Kreis Wittlage, Reg.-Bez. Osnabrück, geboren. Seine Approbation erlangte er am 26. April 1888. Er war zunächst als Tierarzt in seinem Heimorte tätig, siedelte aber im November 1890 nach Diepholz über. Im November 1900 erwarb er das Fähigkeitszeugnis für die Anstellung als beamteter Tierarzt, wurde am 1. Juli 1901 mit der kommissarischen Verwaltung der Kreistierarztstelle in Diepholz betraut und am 1. November 1902 endgültig angestellt. Fast 38 Jahre hat Kollege Meyer in Diepholz seinen schweren Beruf ausgeübt, hochgeschätzt als Tierarzt wegen seiner Tüchtigkeit, der unverdrossenen Ausübung seiner Praxis und steten Hilfsbereitschaft; geachtet als Mensch wegen seines bescheidenen, biedereren Wesens und seines geraden, offenen, untadeligen Charakters. Ein zahlreiches Trauergefolge legte Zeugnis ab von der allgemeinen Wertschätzung, welche Veterinärarzt Meyer in allen Schichten der Bevölkerung und bei den Behörden genossen hat. Viele Kollegen waren von nah und fern gekommen, um diesem Berufsgenossen, den jeder schätzen und achten mußte, der ihn kennen lernte, das letzte Geleit zu geben. Gustav Meyer deckt der Hügel, aber das Andenken an ihn wird in vieler Herzen fortleben.

R. i. p. Matthiesen. Dr. Beutler.

Das Hygienische Institut der Anhaltischen Kreise in Dessau.

Die Entwicklung des Hygienischen Instituts in Dessau hat mit der Errichtung einer Chemischen Abteilung einen vorläufigen Abschluß gefunden. Aus diesem Anlaß fand am 22. Mai eine Besichtigung des gesamten Instituts statt, an der die Staatsminister Dr. Weber und Dr. Müller, Regierungspräsident Mühlenbein sowie Vertreter der Medizinalbehörden, der Landwirtschaftskammer, der Kreisdirektionen, Presse usw. teilnahmen. Auch die veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig hatte hierzu ihren Dekan entsandt. Der Schöpfer und Leiter des Hygienischen Instituts, Direktor Dr. med. vet. Wolters, gab zunächst einen Überblick über den Werdegang und die Aufgaben des Instituts. Das Institut wurde 1922 in den Zeiten schlimmster wirtschaftlicher Not ursprünglich nur für veterinärmedizinische Zwecke errichtet. Zwei Jahre später wurde die humanmedizinische Abteilung und schließlich die Chemische Abteilung angegliedert und damit die vom Reichsgesundheitsamt als vorbildlich aufgestellte Forderung der Zusammenarbeit der Humanmedizin, Veterinärmedizin und Chemie in einem Institut praktisch verwirklicht. Das von unserem Kollegen Dr. Wolters mustergültig organisierte und geleitete Hygienische Institut mit seinen drei Abteilungen, auf das unser ganzer Stand stolz sein kann, bearbeitet nunmehr alle Fragen der Gesundheitslehre. Direktor Dr. Wolters besprach die einzelnen Abteilungen und skizzierte ihre wichtigen Aufgaben für die Zuhörer in fesselnder Weise. — Die humanmedizinische Abteilung (Vorstand: Dr. med. Sütterlin) erfüllt die Aufgaben der in den übrigen deutschen Staaten bestehenden Medizinal-Untersuchungsämter und führt u. a. alle diagnostischen Untersuchungen aus, die für die Feststellung der Krankheiten in der Praxis des Arztes nicht entbehrt werden können. Die veterinärmedizinische Abteilung (Vorstand: Dr. med. vet. Hoffmann) erledigt die Arbeiten eines staatlichen veterinärpolizeilichen Untersuchungsamtes sowie eines bakteriologischen Instituts der Landwirtschaftskammer. Die Aufgaben gliedern sich somit in die Feststellung anzeigepflichtiger Seuchen, die Fleischhygiene, die Milchhygiene, das Tuberkulose-Ermittlungsverfahren, die Bekämpfung der Unfruchtbarkeit der Haustiere und in die allgemeine diagnostische Untersuchung. Sie hat also eine hohe volkswirtschaftliche Mission zu erfüllen. Die chemische Abteilung (Vorstand: Dr. phil. Szeliński) entspricht in ihrem Aufbau den staatlichen Nahrungsmittel-Untersuchungsämtern. Darüber hinaus bearbeitet sie einschlägige Fragen aus der technischen und pharmazeutischen Chemie und nimmt Futtermitteluntersuchungen, Begutachtungen von Trink-, Gebrauchs- und Abwässern, milchwirtschaftliche, forensische, toxikologische Untersuchungen, Analysen von Geheimmitteln usw. vor. Außer der umfangreichen Untersuchungstätigkeit widmet sich das Hygienische Institut noch erfolgreichen Forschungsarbeiten.

Das Hygienische Institut deckt seine gesamten Ausgaben, einschl. der Verzinsung und Tilgung der zur Errichtung des Instituts aufgenommenen Anleihe durch eigne Einnahmen. Das ist nur möglich durch die An-

gliederung des staatl. Anhaltischen Serum-Instituts im ehemaligen Herzogl. Gestüt Luisium, das Impfstoffe für Menschen und Tiere herstellt, und dem eine Sonderabteilung für die Bekämpfung tierischer und pflanzlicher Schädlinge sowie eine Geflügelzucht- und Lehranstalt unterstehen. 70 Morgen Land, meist Wiese, stehen dem Serum-Institut zur Verfügung. Weit über Anhalts Grenzen hinaus hat sich das Hygienische Institut einen guten Ruf und großes Ansehen erarbeitet und es wird auch in Zukunft seine hohe Kulturaufgabe, der Volksgefundheit und Volkswirtschaft zu dienen, erfüllen.

Klimmer.

Ausstellung „Die Ernährung“^{*)}

Auf der Ausstellung „Die Ernährung“, Berlin, weist in der Halle „Tierzucht“ (8), etwas versteckt an der Westseite des Funkturms, die Veterinärverwaltung des Preussischen Landwirtschaftsministeriums mit Hilfe von Bildern, statistischen Tafeln und Karten auf die Gefahren hin, die der landwirtschaftlichen Tierhaltung durch die gefährlichsten Seuchen und Krankheiten drohen. Daneben gibt die Veterinärabteilung des Polizeipräsidentiums Berlin durch geeignetes Anschauungsmaterial einen kleinen Einblick in das Wesen der tierärztlichen Lebensmittelkontrolle, besonders Milch- und Eierkontrolle, wie sie seit Jahren im Bereich des Landespolizeibezirks Berlin von Polizeitierärzten gehandhabt wird.

^{*)} Siehe D. T. W. 1928, Nr. 20, S. 354.

Cand. med. vet. Wolfgang Ross vom Fürstlichen Segler-Verein, Sohn des verstorbenen ordentlichen Professors Ross an der Technischen Hochschule Hannover, wurde zum Olympiade-Vertreter des hannoverschen Kreises des Deutschen Segler-Verbandes bestimmt.

Zahl der Studierenden an Tierärztlichen Hochschulen und Veterinärmedizinischen Fakultäten. S.-S. 1928.

Ort	Gesamtzahl	davon I. Semester
Berlin	250	45
Gießen	132	25
Hannover	326	92
Leipzig	119	29
München	195	53
	1022	244

Fleischerei-Berufsgenossenschaft.

Anlässlich der 48. Reichstagung des deutschen Fleischerverbandes vom 24. bis 29. Juni in Breslau, soll am 26. Juni dortselbst eine Sitzung des Genossenschaftsvorstandes der Fleischerei-Berufsgenossenschaft stattfinden. Eine Vorbesprechung der Schlachthofdirektoren, die an dieser Sitzung teilnehmen, findet am Tage vorher — also am 25. Juni — abends 8 Uhr im Hotel Monopol in Breslau statt. Die Herren Kollegen werden gebeten, zu dieser Besprechung zu erscheinen. Dr. Bützler-Köln.

7. wissenschaftl. Referierabend an der Tierärztl. Hochschule Hannover.

Montag, den 2. Juli 1928, 20,15 Uhr, im Hörsaal des Pathologisch-anatomischen Instituts. Prof. Dr. Hupka: „Wirtschaftliche Beobachtungen nach Kastration von Kühen“. Dr. Krüger: „Demonstration topographisch-anatomischer Präparate; Sinn und Einrichtung einer Lernsammlung.“

Tierärztlicher Fortbildungsrundfunk.

Tagesordnung für Freitag, den 22. Juni 1928, 19,20 bis 19,45 Uhr: Dr. Schmid, Tierärztliche Hochschule Berlin: „Die Lungenwurmkrankheit der Haustiere“. Dr. Giese.

Kraftfahrer-Vereinigung Deutscher Ärzte, Gau IV.

Fahrt nach Schwerin i. Mecklenburg: Sonntag, den 24. Juni 1928, mit Angehörigen und interessierten Kollegen nebst Familie. 10—11 Uhr: Sammeln der Teilnehmer im allbekannten Weinrestaurant Uhle in Schwerin, Schusterstraße 13—15. Parken der Wagen auf dem Marktplatz, eine Minute von Uhle entfernt. Die polizeiliche Beaufsichtigung

der Wagen ist behördlich zugesichert. 11,30 Uhr: Gemeinsame Besichtigung des Schloßmuseums unter fachverständiger Führung. 1 Uhr pünktlich: Mittagessen bei Uhle, ohne Weinzwang. Gedeck RM. 4,—. 2,30 Uhr: Dampferfahrt auf den herrlichen Seen Schwerins. Fahrpreis RM. 1,—. 4 Uhr: Gemeinsame Kaffeetafel im Kurhaus des Seebades Zippendorf. Spaziergang. Fahrgelegenheiten nach Schwerin bestehen bis 12 Uhr nachts. — Zufügende Antwort über die Teilnahme am Mittagessen verpflichtet. Antwort bis spätestens 18. d. Mts. erbeten. Die Fahrt findet bei jedem Wetter statt. Gäste willkommen. — Hotels in Schwerin: Niederländischer Hof; Reichshof. Evtl. Anfragen in Schwerin beim Kollegen Boreilly, Telefon: 22 77.

Zu unserem Bilde

„Festmahl zur 100jähr. Jubelfeier der Thierarzneischule in Hannover“.

5. August 1878.

Wir entnehmen einem Artikel von Prof. Dr. Dammann, Beschreibung des Festmahls zur 100jährigen Jubelfeier der Tierärztlichen Hochschule in Hannover am 5. August 1878^{*)}, folgendes: „Die Teilnehmer wurden durch die vor ihren Plätzen liegende, durchweg deutsch gehaltene, humoristische Speisekarte überrascht, welche nach den Angaben des Schreibers dieser Zeilen in der lithographischen Anstalt von Edler & Krische sehr hübsch ausgeführt war. In der Mitte derselben prangt ein Günther'sches Maulgatter, zwischen dessen Schenkeln die Genüsse eingetragen sind, welche der Genossen am Festmahl harreten, und daneben ein Bild, welches den Festordner Prof. Dammann darstellt, in Begriff dem als unermüdlichen Toaster bekannten Prof. Begemann den Redequell zu wehren, zum Zeichen, daß anderweitige Trinkprüche erst nach Beendigung der offiziellen Tischreden auszubringen und vorher bei dem Festordner anzumelden seien. Oben auf dem Querbalken des Maulgatters thront Medicinalrat Günther, die von ihm verfaßte kostbare Festschrift als unentbehrlich jedem anpreisend, der sich ein richtiges Verständnis von dem Gange der Entwicklung der Thierarzneischule in Hannover und der thierärztlichen Wissenschaft überhaupt aneignen wolle. Zu den Seiten des Instruments sind sieben Bilder angebracht, welche die allmähliche Entwicklung der Thierheilkunde von den rohesten Anfängen bis zu dem heutigen Höhepunkt zum Ausdruck bringen sollen. Oben links und rechts stellt je ein Bild die graue Vergangenheit dar, mit dem die Vieharzneikunst ausübenden Schmied als Kernstecher und dem alten, langrockigen Thierarzt, welcher mit der riesigen Verbandstasche unter dem Arm und der mächtigen Klystierspritze in der Linken seine ärztlichen Visiten abstattet. Zwei Mittelbilder charakterisieren das Zeitalter der Blutfanger und der Brennwütheriche, in dem es als Dogma galt, daß kaum eine innere Krankheit ohne Aderlässe und abermals Aderlässe, und kein äußeres Leiden ohne Brenneisen und wiederum Brenneisen geheilt werden könne. Die drei unteren Zeichnungen endlich sind bestimmt, die Experimentier- und Untersuchungsweise der modernen Epoche zu verfinnbildlichen; Prof. Harms ist eifrig bemüht, eine Kuh durch Einblasen von Luft in die Blutgefäße mit seiner Aerämie“ zu beglücken; ob sie ihm den Gefallen tut wird, in das „Milchfieber“ zu verfallen, kann man freilich in deren Mienen noch nicht lesen. Dr. Rabé sucht mit gelassenem ironischem Antlitz vergeblich, mit dem Mikroskop das Bild einer „Gerlachschschen Riefenzelle“ zu Gesicht zu bekommen und — auf dem Höhepunkt der Situation — gelangt es dem Prof. Lustig, vermittle des Reagens- und Vergrößerungsglases mit beneidenswerther Sicherheit jeden embolischen Herd in der Niere eines lebenden Thieres zu diagnostizieren.“

^{*)} Günther, Jahresberichte der Königl. Thierarzneischule zu Hannover. 1877/78, S. 55.

Personal-Nachrichten.

In den Ruhestand getreten: Veterinär Dr. Kaiser in Hünfeld. Verstorben: Geh. Medizinalrat Prof. Dr. med., Dr. med. vet. Paul Frosch, Direktor des hygien. Instituts der tierärztlichen Hochschule in Berlin; Stadtveterinär Dr. W. Müller in Mannheim; kommiss. Kreistierarzt Joh. Kröhn in Heydekrug (Memelgebiet).

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck: Eberlein & Co., Hannover.

Veterinärhistorische Mitteilungen

Herausgegeben von der

Gesellschaft für Geschichte und Literatur der Veterinärmedizin

Schriftleiter:

Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

Zwanglos erscheinende Beilage zur „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“
Verlag von M. & H. Schaper in Hannover
Sonderbezugspreis 1,50 Goldmark das Jahr, freibleibend

Nr. 6.

1928.

8. Jahrgang.

Tierheilkundliches in den naturwissenschaftlichen Schriften der Hildegard von Bingen.

Von Reinhard Froehner, Gr. Strehlitz.

Unter den spärlichen mittelalterlichen Quellen über die Veterinärmedizin in Deutschland verdient Hildegard eine größere Beachtung als ihr bisher von unferen Fachhistorikern zuteil geworden ist. Eichbaum (S. 38) und Postolka (S. 167) werden ihr in keiner Weise gerecht. Eine spezielle Durchforschung ihrer Schriften nach tierärztlichem Inhalt ist m. W. noch nicht vorgenommen worden; so erscheint es an der Zeit zu referieren, was in dem Naturwissen der Äbtissin von Bingen für die Veterinärgelehrte von Wichtigkeit ist.

Hildegard, von adeligen Eltern im Jahre 1098 auf Burg Bechtheim an der Nahe geboren, wurde im Kloster Disibodenberg erzogen und gründete das Frauenkloster der Benediktinerinnen auf dem Rupertsberge bei Bingen, das sie von 1156 an lange Jahre leitete. Ihr Tod fällt in das Jahr 1179 (Vita Hildegardis auctoribus Godefrido et Theodoro monachis, Acta S. S. Boland. Sept., tom. V, die 17; De vita et scriptis S. Hildegardis notitia auctore F. A. Reuss). Die Klöster waren damals neben den Fürstentümern der Sitz der Bildung, auch der medizinischen und naturwissenschaftlichen; sie hatten schon im hohen Mittelalter umfassende Bibliotheken. Die Benediktiner haben von je besonders Naturwissenschaft und Medizin gepflegt; aus ihrem Orden sind berühmte Natur- und Heilkundige hervorgegangen wie Hrabanus Maurus, der Fuldaer Constantinus Africanus, der die arabische Medizin dem Abendlande über-Enzyklopädist, dessen Schüler Walafrid Strabo, der Dichter des Hortulus, mittelt hat, Aegidius Corboliensis, der Erfinder der Uroscopie, Bartholomaeus Anglicus de Glanvilla, der Enzyklopädist, Marbod, Bischof von Rennes, der Verfasser des Lapidarius, Bischof Theobald, Albertus Magnus, der Polyhistor und Scholastiker. Der Orden hat dauernd über wertvolle Traditionen auf medizinisch-naturwissenschaftlichem Gebiete verfügt, auch der Hildegard sind solche zweifellos zugute gekommen. Übereinstimmungen finden sich sonst noch mit den Regimen scolae Salernitanae, mit Maer und dem Physiologus, einer Kollektion von mythisch-symbolischen anonymen Pflanzen- und Tierbüchern. Aber sie hat ihre Kenntnisse auch aus einer umfassenden ärztlichen Praxis genommen, wird sie doch als eine so gelehrte und glückliche Ärztin gelchildert, ut fere nullus aegrotus ad eam accesserit, quin continuo sanitate receptit. (C. Daresberg in der praefatio zur Physica). Außerdem kennt und verwertet sie auch Plinius (Historia naturalis), Vergil (Bucolica

(V 1, III 62). Die mehrfache Erwähnung der Viehpest beweist die Bedeutung, die sie im 11./12. Jahrhundert in Mitteldeutschland hatte. Die Seuche befällt nach der Physica Pferde, Esel, Rinder, Schafe, Schweine et omnia cetera pecora (III 12, VII 13), so daß die Rinderpest wohl nicht allein gemeint ist. Es wird auch ein schelmo nur der Schweine erwähnt (VI 4) und ein schelmo nur der Rinder (IV 3). Über die Ursache der verheerenden Krankheit ist nichts gesagt. In VIII, 12 wird aber folgendes erwähnt: si basiliscus in quolibet agro et vinea mortuus fuerit, et ibi cadaver suum computruerit, locus ille infocundus est et sterilis efficitur; vel si in aliqua terra vel in aliqua domo moritur et ibi computruerit, . . . animalia, quae ibi sunt pestilentia id est schelmo frequenter occupat, ita quod saepius moriuntur. Also für gewisse Seuchenausbrüche wenigstens wird das Fabeltier basiliscus verantwortlich gemacht, das nach Ansicht der Alten aus einem Hahnenei durch eine Kröte auf dem Miste ausgebrütet, durch seinen Blick töten und durch seinen Hauch Pflanzen zum Absterben bringen und Steine sprengen können. (Nach Albertus Magnus De animalibus, R y f f'sche Ausg., ist der Basilisk ein Vogel mit Schlangenleib. Plinius, nat. hist., erwähnt den Basilisk, der in der Provinz Kyrenaika vorkomme. Galenos, de theriaca, sagt, er habe ihn nie gesehen. Aldrovand bildet ihn als gekrönte Schlange ab, Lonicerus als Hahn mit Schlangenleib. Nierenberg, hist. nat., nennt ihn den König der Schlangen. Nach Paracelsus kann man den Basiliskus künstlich erzeugen, wenn man Menstrualblut im Bauche eines Pterdes faulen läßt. Vergleiche auch die Beschreibung bei Rabanus Maurus, De Universo lib VIII, cap. 2, Ausgabe des Pamelius, 1626, S. 134). Heilmittel gegen den schelmo sind bestimmte Edelsteine, Teile von Fischen, vierfüßigen Tieren und zahlreiche Pflanzen.

liber IV (de lapidibus) cap. 3 (de onychino [= Onyx]). Quod si schelmo boves infestat et occidit, aquam ad ignem in vase caletae et de igne ablata onychinum super eandem fumigatam aquam tene, et sudor de eo exiens illi commisceatur, et tunc eum in aquam illam per tres dies pone et deinde ablato eandem aquam bobus ad potendum saepe tribue, et pabulum eorum cum ipsa aqua asperge, atque furfures cum eadem aqua commisce, et eis ad comedendum propone et hoc saepe fac, et melius habebunt.

liber V. (de piscibus) cap. 1 (de cete*) [= Balaena mysticetus]). . . . Sed et si boves ac porci de pestilentia moriuntur, de eiusdem piscis ossibus pulveriza et pulverem istum in aquam proice et illis in potu ad bibendum saepe da, et schelmo ab eis cessabit.

liber VI. (de avibus) cap. 4 (de grue [= Ardea grus, Kranich]). Et si schelmo porcos fatigat et occidit, rostrum gruis pulveriza et ipsum pulverem aut in muz (= Muz) quod comedunt, aut in aquam quam bibunt illis ad comedendum et bibendum da, et melius habebunt, et schelmo ab eis cessabit.

liber VII. (de animalibus) cap. 13 (de wisant) . . . si autem schelmo equos aut asinos, boves et oves, capras et porcos et alia quaecumque animalia fatigat, de cornibus wisant⁷⁾ in aquam schabe et per novem dies illis ad bibendum da, et schelmo ab eis cessabit.

⁶⁾ = ketos, Aristoteles, hist. animal. 6, 11.

⁷⁾ Dies die ahd. Form. Mhd. wisent, wisente, wisen. Zu lat. bisón. Plinius, nat. hist. 8, 15; Solinus, hist. nat. 2, 3; griech. bison, Pausanias, periegesis 9, 21, 2; 10, 13, 1.

(Schluß folgt.)

und Aeneis), Ovid (Metamorphosen); Physica III, 58 gibt sie den Hilarius Aegyptius (gemeint ist der heilige Hilarius, geb. 292 in Tabatha in Palästina), als Quelle an, I, 51 die medicinarum philosophi, VII, 5 wird philosophus quidam als Gewährsmann erwähnt, was auf die bei Plinius, hist. nat. VIII, 17 erwähnten zoologischen Studien des Aristoteles hinzuweisen scheint. Von früheren naturhistorischen Schriftstellern ist Hildergard wenig benutzt worden. Hie und da scheint Albertus Magnus sich an sie anzulehnen, und auf den Hortus sanitaris ist ihre Arbeit nicht ohne Einfluß geblieben.

Hildergard hat viele Schriften hinterlassen; über die Echtheit einiger ist lange gestritten worden. Heutzutage gelten als echt Episcopia, Scivias seu Visiones, Liber divinorum operum simplicis hominis, Solutiones triginta octo quaestionum, Explanatio regulae S. Benedicti, Explanatio symboli S. Athanasii, Vita S. Ruperti, Vita S. Disbodi und die Physica.

Das Latein der Hildergard ist nach Ansicht einiger Philologen (Paul Kaiser, die naturw. Schriften der H. v. B., Wissenschaftl. Beilage z. Progr. des Königsstädt. Gymn. zu Berlin, Offern 1901, S. 6) ungeschickt und fehlerhaft, der Sprachschatz dürftig, der Ausdruck aber bilderreich. Häufig sind deutsche Worte eingestreut (z. B. nachscaden = Solanum, freyschlich, freislich = Erysipel, trofo = Apoplexia, gelsucht, gelwesucht = Icterus, ridden = Fieber, hauptsich, strengel, veräng, husten, hirnwidig, magensich).

Die Physica, die uns Veterinären mancherlei Ausbeute liefert, ist in den Jahren 1150 bis 1160 entworfen worden. Die Biographen der Äbtissin Hildergard, die Mönche Godelfrid und Theodorich, nennen das Werk Libri de natura hominis, elementorum diversarumque creaturarum, Trithemius bezieht es Libri simplicis et composite medicine. Im Druck erschien es zuerst (in folio) zu Straßburg 1533, herausgegeben von J. Schott, unter dem Titel Physica S. Hildegardis: Elementorum, Fluminum aliquot Germaniae, Metallorum, Leguminum, Fructuum et Herbarum, Arborum et Arbustorum, Piscium denique Volatilium et Animantium terrae naturae et operationes IV libris mirabili experientia posteritate trahens. Im Jahre 1544 gab G. Kraut die Physica unverändert neu heraus. Die Ausgabe in der Patrologie (Patrologiae cursus completus . . . series secunda, accurate J.-P. Migne, toms CXC VII, Paris 1855, S. 1118 bis 1551) ist nach der Handschrift 6952 der Pariser Nationalbibliothek hergestellt und trägt die Überschrift S. Hildegardis Abbatissae subtilitatum diversarum naturarum creaturarum libri IX. C. Daresberg hat die Ausgabe besorgt und F. A. Reuss prolegomena et adnotationes dazu geschrieben. Die Libri subtilitatum, sagt Reuss, Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, 6. Band (1859), 1. Heft, S. 59, sind ein deutsches Nationalwerk, als ein Codex deutscher Natur- und Heilkunde, deutscher Mönchs- und Volksmedizin aus einer Zeit, in welcher diese Wissenschaften in unserem Vaterlande noch keine gründliche Bearbeitung aufzuweisen haben, von höchstem Werte und als solche auch von fachkundigen Gelehrten wie Choulant und Diebach nach Verdienst gewürdigt worden. Nicht minder lehrreichen Stoff bietet das Werk für die deutsche Sitten- und Mythologie und Ökonomie. Auch die Latinität des Mittelalters und der deutsche Sprachschatz gewinnen daraus eine ansehnliche Bereicherung, auch viele seltene Wortformen.

Das Werk enthält eine Beschreibung der Heilkräfte der jener Zeit bekannten Tiere, Pflanzen und Mineralien und Anweisungen zur Bereitung von Arznei-

mitteln gegen Krankheiten des Menschen und der Haustiere. Die Verfasserin steht auf dem Boden der Humoralpathologie: Die Krankheiten entstehen aus einem Ueberfluß oder einer Verderbnis der Körperflüssigkeiten (humores superflui, humores mali, humores pravi, flegma). Eine Heilung ist nur möglich, wenn Gott dazu hilft und nicht etwas anderes will (I 55, 60, III 7, 26, IV 16, I 112, VI 7, IV 14, 16, VI 64, III 11, VI 40, VII 43, III 2, VII 5). Hildergard stellt sich zur Natur ein entsprechend der mittelalterlichen mönchlichen Weltanschauung, die vom Aberglauben der Alten noch stark beeinflußt ist. Sie glaubt an Lucifer (Physica IV, praefatio³⁾), an den antiquus serpens (III, 7⁹⁾), an den Diabolus (IV praefatio³⁾), an maligni spiritus (IV, 10⁴⁾), die aerei spiritus (VII, 19), an daemones, deren es aurei, leves und amari gibt, an fantasmata (I, 47, IV, 2), an Zauberei: magica et incantationes daemumum (I, 47), zauber (I, 101), vergebnisse aut zauber (I, 188), et si aliquis per magica aut per maledicta verba amens efficitur (III, 7). Die Krankheiten werden durch Benedictionen und Exorzismen, wobei die Mandragora, Zypressenholz, Buchenäße, Smaragd, Hyazinth, Saphir, Topas u. a. Edelsteine Vermittler sind, ausgetrieben, z. T. auch direkt angeredet und beschworen: tu, furens malum, cede, oder das Heilmittel wird beschworen, Krankheiten abzuwenden, so der Wein und das Wasser, das auf einen bestimmten Edelstein gegossen wird: Ego, o aqua, super istum lapidem —Chrysopas— in virtute illa te fundo (IV, 13), Ego vinum hoc super te —Saphir— fundo, ut . . . te me abstrahas (IV, 6). Sympathetische Mittel spielen eine große Rolle: cor und dextra auri leonis (VII, 3), Teile des Einhorn, Gräten des Stiers, angekohltes Hirschhorn, die Amselfeber, Teile des Löwen, des Kamels, des Dromedars, von Pflanzen Pimpernell und Zypressenholz werden als Amuletts getragen; das Herz eines Speckes, in den Fingerring gelegt, macht diesen apotropäisch. Die Erde ist heilkräftig, sie wird persönlich gedacht und angerufen: tu terra cresce ac profice, ut . . . tu terra in homine isto dormis (II, 14).

Hildergard erwähnt in ihrem Buche außerordentlich viele Krankheiten, äußerliche und innerliche, und gibt die dagegen wirkenden Heilmittel an, deren Zahl ungeheuer groß ist. Von Mineralien zähle ich 18, von Pflanzen 63, von Tieren zahlreiche aus den Klassen der Fische, Vögel, Vierfüßer, Amphibien, Insekten und Würmer. Die Heilmittel müssen z. T. in besonderer Weise gesammelt und aufbewahrt werden. Für einige gibt es auch Vorschriften über Zeit und Art der Applikation. An Heilverrichtungen werden erwähnt Aderlaß (minutio), Schröpfen (scarificatio), Brennen (mit dem Holz des Spindelbaumes), Von Tierkrankheiten kommen folgende vor:

Der schelm^o) (IV 3, VI 4, VII, 13, VIII 12) oder die pestilentia Maflag.

¹⁾ Nam deus primum angelum quasi pretiosis lapidibus decoraveret, quos idem Lucifer in speculo divinitatis splendore videns, et inde scientiam accepit, et in eis cognovit, quod deus multa mirabilia facere voluit . . .

²⁾ Nam cum antiquus serpens magica et maledicta verba audierit, ista suscipit, et illi insidias super quem dicuntur, nisi deus prohibeat cum . . .

³⁾ Nam Dyabolus pretiosos lapides abborret et odit et dedignatur . . .

⁴⁾ Iapidem in manu sua habeat, et maligni spiritus tanto minus eam (es handelt sich um eine Kindspetterin) et infantem interim nocere poterunt . . .

⁵⁾ ahd. scälmo, scelmo = pestis, pestilentia, mhd. auch schelme, schelm, schalme, schalm, scholm, schölm.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechter, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrzabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erliefert. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 25.

Ausgegeben am 23. Juni 1928.

36. Jahrgang.

Zur Erforschung und Bekämpfung des seuchenhafte Verkalbens (Kasuistischer Beitrag).

Von Dr. Schüle, Dozent an der Deutschen Kolonialschule in Witzenhausen.

Das Interesse, welches das seuchenhafte Verkalben heute noch für unsere Rindviehzucht erheischt, und die Unklarheiten an vielen Stellen, wie ich es noch auf der letzten Fachtagung in Jena beobachten mußte, veranlassen mich, meine Erfahrungen und Beobachtungen auf diesem Gebiete darzulegen in der Hoffnung, hiermit den interessierten Kreisen etwas Nützliches zu geben.

Da die Beteiligung des Bazillus Bang an dieser Seuche ca. 70 bis 90 Prozent beträgt, so soll in folgendem in der Hauptsache nur auf diesen Bazillus eingegangen werden.

Denn für die Behandlung des Paratyphusaborts würden dieselben Maßnahmen durchzuführen sein wie beim Paratyphusabort der Stuten, bei welchem mit spezifischen Impfungen im Verein mit hygienischen Maßnahmen befriedigende Resultate vorliegen. Und in der Behandlung der anderen Abortusarten hat man greifbar Positives überhaupt noch nicht geboten.

Für die praktische Bekämpfung ist hinsichtlich der Eigenart des Erregers und der Krankheitsercheinungen folgendes von Interesse:

Außerhalb des Tierkörpers hält sich das Bakterium unter günstigen Verhältnissen längere Zeit lebensfähig und virulent, so z. B. in feuchtem, sterilem Kuhkot ca. 75 Tage lang (Zwick und Wiedemann), in trockenem Kuhkot stirbt er schon nach einigen Tagen ab, desgleichen im Kuhharn! Monatlang hält er sich im Uterus des Muttertieres und in abgestorbenen Früchten.

Mit Abortusbazillen angesteckte, noch nicht trüchtige, milchende Rinder, Schafe und Ziegen können monatlang, manchmal sogar jahrelang die Bazillen mit der Milch ausscheiden! So wurden dieselben auch in mehreren Fällen in Amerika in ca. 16 Prozent der Marktmilch und in Deutschland hierin ebenfalls in ca. 19 Prozent (Eber), 32 Prozent (Winkler), nachgewiesen. Der Erreger kann also hiernach auch mit ungenügend erhitzter Milch durch Sammelmolke-
reien verschleppt werden!!

Im allgemeinen ist derselbe aber an den trüchtigen Uterus gebunden. Eine Übertragung resp. Einschleppung durch Kälber und nichttrüchtige Jungrinder ist daher unwahrscheinlich, wohl aber noch nicht genügend nachgeprüft worden. Möglich ist es aber immerhin, daß der Digestionsapparat lebender Frühgeburten von infizierten Müttern Bakterien ausscheiden kann. Es ist fernerhin als möglich anzusehen, daß eine Reinfektion der Gebärmutter vom

Euter aus erfolgen, das Tier mithin zum zweiten Male verkalben kann.

Mit Lebendkulturen behandelte Deckbullen können ebenfalls Bazillenträger und -Ausseider sein.

Die natürliche Ansteckung geht wohl am meisten per os vor sich durch Aufnahme von Futter und Streu und dann durch Belecken des Stallbodens und der Geräte infizierter Stallungen, auch durch gemeinfames Putzzeug usw. Eine Übertragung durch den gemeinfamen Bullen auf rein mechanischem Wege liegt nahe und ist zahlenmäßig vielleicht! von größerer Bedeutung als vielerorts angenommen wird. Ich habe hierfür genügend Beweise.

Künstlich wie natürlich infizierte Tiere müssen also als Bazillenausscheider gelten!

Die Sterilität in Abortusbeständen wird nicht so sehr durch diese Infektion als vielmehr durch die Sekundärerkrankungen verursacht.

Das Umrindern ist ätiologisch von mehreren Gesichtspunkten zu betrachten:

1. als Folge der zur Sterilität führenden bekannten Ursachen,
2. es muß als natürliche Folge eines nicht beobachteten, kurz vorausgegangenen Abortus zu betrachten sein. Letzteres habe ich einmal bei einer ganzen Reihe von Kühen im Anschluß an die erstmalige Impfung mit Lebendkulturen festgestellt,
3. als Folge unsachgemäßer Fütterung und Haltung insofern, als dadurch eine funktionelle Störung der Geschlechtsdrüsen (hierzu Hormone der Schilddrüsen) eintreten kann.

Beim infizierten Bullen ist öfter eine schon äußerlich durch Schwellung auffallende Hodenentzündung festgestellt worden, wobei in den veränderten Geweben oft Bang'sche Bazillen nachgewiesen worden sind.

Es sollte jeder Verkalbefall ohne handgreifliche Erklärung, mehrere hintereinander auftretende Fälle von Zurückbleiben der Nachgeburten auch trotz sonst normaler Geburt, weißer Fluß, gehäuftes Auftreten von Umrindern, desgleichen Hodenentzündung des Stallbullen sofort die Untersuchung auf etwaiges Vorhandensein des Bang'schen Bazillus veranlassen. In vielen Fällen tritt der Verdacht auf diese Seuche zu spät auf! — So früh wie möglich die Diagnose sichern!!

Der ansteckende Scheidenkatarrh steht in keinem urfächlichem Zusammenhang zu dem feuchenhaften Verkalben. Ein typisches Beispiel: Auf Wunsch einer Verwalterin wurden die Kühe in Beständen mit gehäuft auftretendem Verkalben gegen den dort bestehenden Scheidenkatarrh (mit Ausfluß) behandelt. Eine andere Diagnose war noch nicht sicher. Als trotz längerer und erfolgreicher Behandlung dieses Katarrhs das Verkalben nicht nachließ, ergab die dann vorgenommene Blutuntersuchung beispielsweise eines Bestandes mit ca. 70 Kühen bei fast allen diesen Tieren eine positive Reaktion auf *Bazillus Bang*.

In verseuchten Beständen zeigen öfter auch gesunde Bullen, Ochsen und Kälber Blutwerte. Die gangbare Blutuntersuchung (Agglutination) hat eigentlich praktischen Wert nur für gesunde z. B. neu einzustellende Tiere und als erste Untersuchung überhaupt.

Eine größere Widerstandskraft einzelner Rinderrassen speziell gegen diesen Erreger scheint nicht zu bestehen. Höhengvieh-Bestände können genau so stark verseucht sein wie Niederungsvieh (Beobachtungen in Hessen).

Die im gemeinsamen Stalle eines verseuchten Bestandes groß gezogenen Kälber, welche wahrscheinlich Bakterien durch die Milch, Streu usw. aufgenommen haben, erlangen nicht genügend natürliche Widerstandskraft gegen das Bakterium und verkalben in der Regel das erste Mal schon, doch ist die Frage m. E. noch nicht genügend geklärt. Jedenfalls aber sind solche Erstgebärende unter allen Umständen vor einer Infektion zu schützen, soll der Seuche möglichst schnell Einhalt getan werden. Bei Kühen, welche mehrmals verkalben, beobachtet man jedesmal eine längere Tragezeit, die Widerstandskraft wird von Fall zu Fall größer, bis sie ausgetragen. Die größere Immunität scheint tatsächlich erst im trächtigen Uterus erzeugt zu werden.

Hinsichtlich der künstlichen Erzeugung einer Immunität durch Impfungen liegen nun Versuche mit den verschiedensten Impfstoffen in sehr großer Anzahl vor. Die Beurteilung derselben ist aber heute noch recht verschieden und längst nicht einheitlich.

Sicher ist: Immunserum allein bewirkt nicht einen genügend langen Schutz. Abgeschwächte Kulturen zeigen ebenfalls nicht den gewünschten Erfolg. Abgetötete Kulturen und auch die Bakterienextrakte werden verschieden beurteilt, von ersteren wird vielerorts dem „Antektrol“ und von letzterem dem „Abortin“ eine günstige und verwertbare Wirkung nachgesagt. Viele Kollegen wenden sich wieder dem Abortin zu, weil sie mit Lebendkulturen auch nicht zum Ziele gelangt sind.

Behauptungen, man könne Lebendkulturen in unverhältnismäßig großen Mengen z. B. 100 ccm und mehr ohne jeden Schaden des Tieres geben, sind nur so zu erklären, daß diese Kulturen nichts getaugt haben, zumal auch in diesen Fällen jede Schutzwirkung ausgeblieben sein soll. Weshalb hat man es hier nicht einmal mit anderen Kulturen versucht?

Allgemein steht heute die Ansicht fest, daß die Lebendkulturen in richtiger Anwendung die höchste und längste Schutzwirkung zeitigen.

Das kombinierte Verfahren hat bisher zu keinem besseren Resultate geführt als die Impfungen mit Lebendkulturen allein.

Die Abortusruhr der Kälber kann mit Serumimpfung erfolgreich behandelt werden.

Diese Uneinigkeit in der Behandlung und Ungleichmäßigkeit in der Bewertung der Impfstoffe sind nun m. E. darauf zurückzuführen, daß die Verwendung der Lebendkulturen eine viel größere Arbeit und genaue, laufende Beobachtung (Liste) jedes einzelnen Tieres des in Behandlung stehenden Stalles erfordert, als es beispielsweise bei Verwendung von Antektrol, Abortin der Fall ist, welche man ja hochtragenden Tieren ohne Schaden derselben applizieren kann. Und hier liegt m. E. der Kern der Frage!! Eine Un-

kenntnis des Decktermins kann den ganzen Erfolg umstoßen, desgleichen ein Wechsel der Tiere ohne Wissen des behandelnden Tierarztes. Der Praktiker hat ja oft gar nicht die Zeit und Möglichkeit zum Feststellen dieser kleinen, aber so sehr wichtigen Punkte. Deshalb stehe ich den großen Versuchen mit vielen hundert oder tausend Stücken, von Einem ausgeführt, hinsichtlich der Genauigkeit und der Resultate manchmal etwas skeptisch gegenüber.

Diese Unsicherheit in der Praxis, ferner die Tatsache, daß die Kühe von selbst immun werden können, falls nicht wieder neue Tiere ohne vorherige Untersuchung eingestellt werden, hat auch vielerorts dazu geführt, gänzlich von einer medikamentellen und Impfbehandlung abzusehen und zu versuchen, nur unter Anwendung spezifisch-hygienischer Maßnahmen diese Seuche zum Stillstand zu bringen, und man ist auf diesem Wege ebenfalls zum Ziele gelangt.

Diese spezifischen Maßnahmen sind speziell für diese Seuche oberstes Gesetz! Aber dieselben lassen sich in der nötigen Form in der Praxis sehr schwer durchführen, es fehlt ja zu oft an Abkalbeställen und Isolierstallungen für die kranken Tiere überhaupt. Ferner versagen häufig die Schweizer. Dieselben tragen auch vielfach zur Verbreitung der Seuche dadurch bei, daß sie in anderen Stallungen Hilfe leisten bei Geburten, Abnehmen der Nachgeburt usw.

Die angegebenen Heilerfolge dieser Krankheit mit innerlichen Mitteln entbehren m. E. doch der Beweiskraft schon wegen des häufigen Durcheinanders in solchen Fällen. Auch auf der letzten Tagung in Jena wurde über günstige Erfolge auf diesem Wege referiert, wobei selbiger Referent der Impfbehandlung jeden Erfolg absprach. Seine Ausführungen haben uns aber nicht weiter gebracht. Man kann mit innerlichen Mitteln nicht die Grundlage dieser Infektion fassen, die Kühe erst recht nicht vor einer Neu- resp. Reinfektion schützen, der dieselben in einem verseuchten Bestande doch jederzeit ausgesetzt sind. Solche Mittel können nur unterstützend wirken.

Vom wirtschaftlichen Standpunkte aus wird man die Erhaltung der erkrankten, unter Umständen sogar einen Zukauf neuer Tiere in einen verseuchten Bestand bejahen müssen. Und hier wird man den oben angegebenen Immunisierungen mit Lebendkulturen nicht aus dem Wege gehen können, wenn nicht die hygienischen Maßnahmen streng durchgeführt werden können, was aber m. E. in der Allgemeinheit nicht der Fall sein dürfte.

Tatsächlich empfehlenswerte Impfmethoden sind schon vor längerer Zeit herausgegeben worden (Reichsgesundheitsamt — Zeller, Impfstoffwerk — Perleberg u. a.), welche bekannt sein dürften.

Eigene Versuche.

Im Jahre 1924 übernahm ich einen seit mehreren Jahren stark verseuchten Bestand in Behandlung. In demselben war vorher Abortin längere Zeit hindurch ohne Erfolg geimpft worden. Mein Eindruck war der, daß hier aber die hygienischen Maßnahmen nicht genügend durchgeführt worden waren. Die von mir vorgenommene Blutuntersuchung ergab Abortus Bang! Da sich mehrere Kühe mit alter Metritis hierunter befanden, demzufolge man es auch immer mit ansteckendem Scheidenkatarrh zu tun zu haben glaubte, ferner mehrere Tuberkulosefälle von mir festgestellt wurden, merzte man diese chronisch-kranken Tiere aus und entschloß sich zu einem Neuankauf. Die Stallverhältnisse dieses Bestandes waren nicht günstig, eine Unterstützung seitens des Schweizers — das ist aber unbedingt nötig — nicht zuverlässig, was noch dadurch erschwert wurde, daß dieser Stall gleichzeitig Lehrstall und somit häufigeren Besichtigungen ausgesetzt ist. Nebenbei hält dieser Betrieb durch den einen Schweizer neben dem Stallbullen noch einen Gemeindebullen, welcher von Zeit zu Zeit im gemeinsamen Stalle stand. Es ist also hier ganz besondere Vorsicht geboten.

So ähnlich und vielleicht noch ungünstiger werden wohl die Verhältnisse in vielen anderen Stallungen liegen.

Meine bis 1909 zurückliegenden Beobachtungen und Behandlungsmöglichkeiten auf diesem Gebiete veranlaßten mich zu der Impfung erstmal mit abgetöteten Kulturen

Perleberg. Diese Impfungen nun in Verbindung mit möglicher Beachtung der hygienischen Maßnahmen führten zu keinem befriedigenden Resultate. Es verkalbten im Laufe

Lfd. Nr.	Name	ge-, verkalbt	Impfung			ge-deckt	Be-fund	ge-, verkalbt	Impfung			ge-deckt	Be-fund	ge-, verkalbt	Impfung			ge-deckt	Be-fund	ge-, verkalbt
			1.	2.	3.				1.	2.	3.				1.	2.	3.			
1.	Alberta ♀ ×	ge- 2. 3. 1926	29. 3. 26.	14. 4.	28. 4.	15. 5.	tragend	ge- 11. 2. 27.	17. 2.	4. 3.	20. 3.	10. 5.	tragend	ge- 12. 2. 28.						
2.	Sophie ♀ ×	ge- 27. 3. 26.	14. 4.	28. 4.	15. 5.	29. 5.	"	ge- 6. 6. 27.	18. 6.	3. 7.	20. 7.	1. 8.	"	ver- 23. 3. 28.	(verdorbenes Silofutter)					
3.	Alma + ×	Färse	22. 12. 25.	4. 1. 26.	19. 1.	17. 10. 25.	"	ge- 7. 7. 26.	24. 7.	10. 8.	24. 8.	29. 10.	"	ge- 23. 7. 27.	1. 8.	15. 8.	31. 8.	19. 9.	tragend	ge- 9. 6. 28.
4.	Elvira + ×	"	10. 4. 26.	26. 4.	10. 5.	12. 5.	"	ge- 3. 2. 27.	17. 2.	4. 3.	20. 3.	21. 4.	"	ge- 28. 1. 28.						
5.	Concordia + ×	"	2. 2. 26.	18. 2.	6. 3.	26. 10. 25.1	"	ver- 24. 3. 26.	22. 12. 26.	4. 1. 27.	—	22. 9. 26.1	"	ver- 3. 27.	verkauft					
6.	Beosirene O ×	ge- 3. 8. 26.	—	—	—	6. 11. 26.	"	ver- 23. 4. 27.	1. 8.	15. 8.	31. 8.	6. 9. 27.	"	"						
7.	Aguane O ×	ver- 4. 11. 25.	22. 12. 25.	4. 1. 26.	19. 1. 26.	24. 3. 26.	"	ge- 28. 12. 26.	4. 1. 27.	19. 1.	5. 2.	18. 5.	"	ge- 15. 2. 28.						
8.	Obidete O	hochtragd. eingestellt	—	—	—	—	—	ge- 9. 11. 25.	2. 2. 26.	16. 2.	6. 3.	2. 4. 12. 5.	—	ge- 30. 12. 28.	4. 1. 27.	19. 1.	5. 2.	12. 5. 27.	"	ge- 19. 2. 28.
9.	Pawinata O	"	—	—	—	—	—	16. 11. 25.	"	"	"	3. 4. 29. 4.	"	ge- 9. 2. 27.	17. 2.	4. 3.	20. 3.	29. 7. 27.	"	ge- 19. 4. 28.
10.	Sodofene O	milchend eingestellt	2. 2. 26.	16. 2.	6. 3.	14. 3. 26. 6.	"	ge- 12. 3. 27.	29. 3.	14. 4.	28. 4.	6. 5. 19. 12. 27.	"	"						
11.	Osmana O	tragend i. 5. Monat	—	—	—	—	—	ge- 19. 1. 26.	2. 2. 26. 1. 8.	16. 2. 15. 8.	6. 3. 31. 8.	8. 4. 26. 10. 7. 26. 10. 3. 27. 23. 5. 27.	"	ge- 24. 2. 28.						
12.	Citogrina O	frischm. eing. 10. 3. 27	16. 3. 27.	1. 4.	16. 4.	26. 4. 26.	"	ge- 31. 1. 28.					"	"						
13.	Konterfei O	"	29. 3. 27.	14. 4.	28. 4.	5. 3. 9. 5.	"	ge- 3. 2. 28.					"	"						
14.	Arabukia O	hochtragd. eing. 10. 3. 27	—	—	—	—	—	ge- 18. 3. 27.	4. 4.	21. 4.	6. 5.	21. 4. 22. 7.	"	ge- 23. 4. 28.						
15.	Camelina O	milchend eingestellt	22. 12. 26.	4. 1. 27.	—	1. 8. 26.1	"	ver- 10. 4. 27.	4. 5.	20. 5.	9. 6.	27. 7.	"	verkauft (chronisch leberkrank), war hochtragend, zur Schlachtung						
16.	Rhea O	"	4. 1. 27.	19. 1.	5. 2.	12. 8. 26.1	"	ver- 17. 2. 27.	verkauft, da in Euter und Milch schlecht											
17.	Martha O	hochtragd.	—	—	—	—	—	ge- 16. 12. 26.	22. 12. 27.	4. 1. 27.	19. 1.	7. 3. 27.	tragend	ge- 6. 12. 27.	notgeschlachtet					
18.	Adele O	milchend	22. 12. 26.	4. 1. 27.	19. 1.	25. 8. 26.1	"	ver- 10. 1. 27.	abgemolken											
19.	Sonja O	hochtragd.	—	—	—	—	—	ge- 26. 11. 26.	22. 12. 26.	4. 1. 27.	19. 1.	17. 1. 27.	"	ge- 19. 10. 27.	abgemolken					
20.	Willja O	"	—	—	—	—	—	ge- 26. 11. 26.	"	"	"	30. 12. 26.	"	ge- 6. 10. 27.	abgegeben					
21.	Ursula O	milchend	22. 12. 26.	4. 1.	19. 1.	17. 1. 27.	"	ge- 23. 10. 27.	14. 11. 27.	30. 11.	12. 12.	23. 1. 28.	"	"						
22.	Alice O	"	"	"	"	19. 11. 26.	"	ge- 24. 8. 27.	14. 9.	30. 9.	18. 10.	27. 10.	"	"						
23.	Gerda II O	hochtragd.	—	—	—	—	—	ge- 14. 5. 27.	18. 6.	3. 7.	20. 7.	18. 7.	"	ge- 14. 4. 28.						
24.	Beate +	Färse	30. 3. 26.	13. 4.	27. 4.	14. 4. 26.	"	ge- 17. 1. 27.	17. 2.	4. 3.	20. 3.	18. 6.	"	ge- 23. 3. 28.						
25.	Berta +	"	"	"	"	24. 4. 26.	"	ge- 27. 1. 27.	"	"	"	28. 4.	"	ge- 1. 2. 28.						
26.	Afra +	"	18. 6. 26.	3. 8.	20. 7.	10. 8. 26.	"	ge- 14. 5. 27.	24. 5.	9. 6.	2. 7.	17. 7.	"	ge- 26. 4. 28.						
27.	Anna +	"	4. 1. 27.	19. 1.	5. 2.	10. 2.	"	ge- 8. 11. 27.	14. 11.	27. 11.	12. 12.	7. 3. 28.	"	"						
28.	Elfriede +	"	"	"	"	29. 1. 27.	"	ge- 3. 11. 27.	"	"	"	28. 2. 28.	"	"						
29.	Adele II. +	"	"	"	"	3. 3. 27.	"	ge- 8. 12. 27.	27. 12.	10. 1. 28.	28. 1.	30. 1. 28.	"	"						
30.	Begonie +	"	4. 5. 27.	20. 5.	5. 6.	18. 6. 27.	"	ge- 4. 5. 28.					"	"						
31.	Blume +	"	"	"	"	29. 6. 27.	"	ge- 15. 3. 28.					"	"						
32.	Domina O	milchend d. eingestellt	22. 12. 26.	4. 1. 27.	19. 1.	22. 2. 25. 3. 10. 5.	"	ge- 8. 2. 28.					"	"						
33.	Blondine +	Färse	5. 6. 27.	20. 6.	7. 7.	18. 7. 27.	"	ge- 16. 4. 28.					"	"						

Zeichenerklärung: ♀ = alter Bestand. × = früher mit abgetöteten Kulturen geimpft. O = aus anderen Zuchtgebieten neu eingestellt. + = aus eigener Zucht eingestellt.

der Zeit von Ende 1924 bis Ende 1925 ca. 50 Prozent. Da es die wirtschaftliche Lage gestattete, wurden viele dieser Kühe, auch weil sie sonst nicht einzuschlagen schienen und man eine Leerfütterung für ca. ein Jahr ersparen wollte, verkauft und man stellte wieder neue Zuchttiere ein, und zwar in den gemeinsamen Stall erst, nachdem sie ca. acht Wochen lang auf der Weide — allerdings gemeinsam mit den anderen Kühen — verbracht hatten.

Vom Zeitpunkte dieses Ankaufs an impfte ich ausschließlich Lebendkulturen Perleberg und zwar in der Weise, daß ich die Dosen steigerte (15, 20, 25—30 ccm) und die Schlußimpfung je nach den Umständen auch in die ersten Trächtigkeitsmonate hineinlegte. So wurden auch sämtliche Färlin unseres Bestandes geimpft. Dieselben kommen ungefähr ein bis zwei Wochen vor dem ersten Kalben in den gemeinsamen Zuchtfall. Einige Kühe sind besonderer Umstände halber erst im vierten bis fünften Trächtigkeitsmonate geimpft worden.

Den jeweiligen Stallbullen habe ich durch dreimalige Impfung mit Lebendkulturen wie die Kühe immunisiert und erst ca. drei Wochen nach der letzten Impfung erstmalig decken lassen. Der letzte Stallbulle deckt seit Dezember 1926 mit 100proz. Erfolge und ist von uns selbst im gemeinsamen Stalle gezogen.

Seit Anfang dieses Jahres wird nicht mehr geimpft.

Das Ergebnis lasse ich hierunter folgen. Es handelt sich, siehe Tabelle, um verhältnismäßig viel neu eingestellte Tiere. Die aus eigener Zucht in den gemeinsamen Stall eingestellten Tiere kalben seit dieser Zeit sämtlich normal.

Es haben also seit Ende 1925 bis Anfang 1928 (Mai) insgesamt fünf Kühe feuchtenhaft verkalbt. Bei Betrachtung der Tabelle ersehen wir aber, daß die hierunter fallende Kuh

„Beosirene“ in dieser Zeit gar nicht geimpft worden war aus dem Grunde, weil sie in den vorausgegangenen Jahren trotz positiver Reaktion normal gekalbt hatte und zu den 50 Prozent mit positivem Erfolge? der Impfungen mit abgetöteten Kulturen gehörte. Eine Immunität war also nicht erzielt. Die Kühe „Camelina“, „Concordia“, „Adele“, „Rhea“ waren erst im vierten resp. fünften Trächtigkeitsmonate geimpft worden. — Von den auch neu eingestellten, ordnungsmäßig, d. h. rechtzeitig mit Lebendkulturen geimpften Kühen aber hat bis jetzt, also seit gut 2½ Jahren keine mehr feuchtenhaft verkalbt.

Schlußfolgerung!

Wenn wir diese Verkalbefälle einerseits von der ordnungsmäßigen resp. rechtzeitigen Impfung ausschließen müssen, andererseits aber auch als Kontrolltiere betrachten können, so ersehen wir hieraus, daß

1. die Lebendkulturenimpfung einen genügend langen Schutz für die ganze Trächtigkeitsperiode erzeugen dürfte,
2. diese Impfung möglichst vor Ende des dritten Trächtigkeitsmonats abgeschlossen sein soll,
3. dieselbe selbst bei Berücksichtigung ungünstiger Stallverhältnisse ein solch zufriedenstellendes Resultat zeitigt hat, wie es von Impfungen überhaupt nur erwartet werden kann,
4. man mit dieser Impfung und unter Beachtung der spezifischen, hygienischen Maßnahmen ohne allzu großes Bedenken neue Tiere zu einem verfeuchten Bestande hinzustellen kann.

Meine Beobachtungen sind hiermit nicht abgeschlossen, ich hoffe hiermit aber schon einige positive Daten für die Praxis geboten zu haben.

Sind Trypanosomen filterpassierbar?

Bemerkungen zu dem Aufsatz von W. A. Collier.*)

Von R. Kraus, Wien.

Unter dem Titel: „Sind Trypanosomen filterpassierbar?“ gelangt Collier zu dem Schluß, daß die mit *Trypanosoma equinum* infizierten Schafe im peripheren Blute nach einer gewissen Zeit wohl keine direkt mikroskopisch nachweisbaren Parasiten enthalten, das Blut aber infektionstüchtig ist. Damit gelangt Collier zur Bestätigung der von mir, Dios und Ogaryabal gefundenen Tatsache. Wir hatten nämlich bei mit verschiedenen Trypanosomen infizierten Schafen nach Monaten im Blute keine Parasiten nachweisen können und doch ergab die Verimpfung auf Meerschweinchen positive Resultate.

Weitere Versuche, welche Collier mit Filtraten angestellt hat, ergaben negative Resultate, so daß Collier zu dem Schluß gelangt, daß Trypanosomen im Schafblut nicht in einer filterpassierbaren Form vorhanden sind. Auch gelang es Collier nicht mit Organen von infizierten Kaninchen und Meerschweinchen mittels Filtrate Infektionen hervorzurufen. Wer sich mit der Filtrabilität des filtrierbaren Virus beschäftigt hat, weiß zur Genüge, daß negative Versuche weniger beweisen, als unter exakten Bedingungen ausgeführte Filtrationsversuche mit positiven Resultaten. Collier hat Seitz-Filter zu seinen Versuchen benützt. Von den Seitzfiltern wissen wir aus eigenen Erfahrungen,

daß sie wohl Flüssigkeit leichter passieren lassen als die Filterkerzen, aber daß Antigene und Antikörper z. B. von Toxin und Antitoxin stark zurückgehalten werden. Seitzfilter sind bisher in Versuchen für filtrierbare Virusarten nicht genügend ausprobiert worden, wie z. B. die Chamberland- und Berkefeldkerzen, und es müßten zunächst Versuche vorliegen, wie filtrierbare Virusarten z. B. Vakzine oder Lyssavirus diese Filter passieren.

Diese Vorprüfung hat Collier unterlassen, so daß die Schlüsse, zu welchen er kommt, bezüglich der Filtrierbarkeit seine Auffassung nicht stützen. Die Frage auf Grund dieser Versuche von Collier über die filtrierbaren Stadien bei Protozoen entscheiden zu wollen, geht also, wie aus dem Vorangehenden zu ersehen ist, nicht an. Es steht heute eine Reihe von Arbeiten mit positivem einer Reihe von Arbeiten mit negativem Resultat gegenüber. Nur durch einwandfreie Versuche mit den bereits geprüften Filtern, die für die Frage der Filtrierbarkeit schon genügend studiert worden sind, lassen sich weitere Schlußfolgerungen ziehen.

Die Arbeit Collier's ist daher nicht im Stande, die von Schaudinn bereits vertretene Auffassung, die ich zu stützen versucht hatte, über filtrierbare Formen bei Protozoen, zu entkräften.

Die Notwendigkeit der Neuregelung des Fleischbeschaugesetzes.**)

Von Dr. Albién, Schönberg (Holstein).

Die Frage der Neuregelung des Fleischbeschaugesetzes ist zwar seit dem einstimmigen Beschluß des D.V.R. in Leipzig eine dringliche, so bald wie möglich zu regelnde Angelegen-

heit des ganzen Standes; sie interessiert aber doch den R.P.T. in besonderem Maße, weil sich die Unzuträglichkeiten des Fleischbeschaugesetzes am stärksten für die in der Fleischschau tätigen Freiberufs- und Gemeindetierärzte der kleinen und mittleren Gemeinden auswirken.

Die einmütige Stellungnahme des D.V.R. und zahlreiche,

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 21, S. 363.

**) Vortrag, gehalten am 2. Juni 1928, auf der Haupttagung des Reichsverbandes prakt. Tierärzte in München.

mündliche sowie schriftliche Zustimmungen aus dem ganzen Reiche haben mich wesentlich in der Überzeugung bestärkt, daß es sich hier um eine der brennendsten Fragen des Standes und der veterinären Gesetzgebung handelt. Herr Geheimrat Schmaltz erklärte im Verlaufe der sich an meine Ausführungen in Leipzig anschließenden Diskussion: „Wenn eine Frage wichtig ist, so ist es diese“ und trat dankenswerterweise besonders energisch für einen mit tunlichster Beschleunigung einzuberufenden Arbeitsausschuß ein.

Sie werden nun mit Recht fragen: Warum ist denn aber bisher nichts weiter geschehen? M. H.! Am Tage nach jenem Beschluß kam der Bruch. Beratungen und Anträgen von so weittragender Bedeutung war damit das notwendige Fundament und Gewicht entzogen. Es war auch zu erwarten, daß der Herr Präsident des D.V.R. bei Einberufung des beschlossenen Arbeitsausschusses auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen würde. Nach der Weihnachts- und Friedenstagung in Berlin setzte die Regierungskrisis ein. Dem „Arbeitsministerium“, das sich auf Ausführung des sog. Notprogramms beschränken mußte, konnte man nicht gut mit Verhandlungen über eine Gesetzesneuregelung kommen. Wir haben die Neuwahlen gehabt. Die Bildung und hoffentlich auch Konsolidierung der neuen Regierung steht bevor. Jetzt aber so bald wie nur irgend möglich an die Arbeit! Es ist schon viel kostbare Zeit verloren gegangen.

M. H.! Gesetze sind nicht für die Ewigkeit geschaffen; sie müssen sich den jeweiligen Kulturverhältnissen anpassen. Je mehr sie hinter der Kulturentwicklung zurückbleiben, um so mehr versinken sie in Bedeutungslosigkeit. Das Rad der Zeit geht schließlich über alles hinweg, was sich seinem unaufhaltamen Lauf entgegenstemmt.

Wenn unsere Kultur auf einem Gebiete mit Riesenschritten vorwärts gegangen ist, so ist es das Gebiet der öffentlichen Gesundheitspflege, der Schutzmaßnahmen für die Volksgeundheit und der Volksaufklärung über die Bedeutung der Hygiene. Die letzten Marksteine dieses Entwicklungsganges sind das Lebensmittelgesetz, die Hygieneausstellung resp. das Hygienemuseum in Dresden, die „Gefolei“ in Düsseldorf und die Ausstellung „Die Ernährung“ in Berlin.

Es ist eine zwangsläufige Folge dieser Entwicklung, daß der Rahmen des vor 25 Jahren geschaffenen Fleischbeschaugesetzes für den Aufgabenkreis der wissenschaftlichen Fleischhygiene zu eng geworden ist. Es ist weiter eine zwangsläufige Folge dieses zu eng gewordenen Rahmens, daß die sich den heutigen Anforderungen anpassende, veterinäre Lebensmittelkontrolle, die man sprachlich unlogisch als „animalische Lebensmittelkontrolle“ bezeichnet, sich von der eigenen Mutter, der alten Fleischschau, völlig loszusagen und die Fleischschau sowie ihre Funktionäre in eine subalterne Rolle zu drängen droht.

Dies zu verhüten, sind wir uns selbst und auch unserem Altmeister v. OSTERAG schuldig. v. OSTERAG hat vor 25 Jahren sicher das für die Fleischschau herausgeholt, was damals herauszuholen war. Aber gerade deshalb, weil er für die damalige Zeit Mustergültiges schuf, was andere Staaten nachgemacht haben, hat uns der konservative Gedanke im Hinblick auf die stürmische Entwicklung auf dem Gebiete der öffentlichen Hygiene schon viel zu lange gefangen gehalten. Wenn jemand vor 25 Jahren auf den Gedanken gekommen wäre, „Schmutzeier“ als minderwertige Ware erklären zu lassen, so hätte er sich lächerlich gemacht.

Soll die Notwendigkeit einer Gesetzesreform nachgewiesen werden, müssen die Fehler des alten Gesetzes, die sich aus den Gegenwartsverhältnissen ergeben, aufgedeckt werden. Die hierdurch bedingte Kritik richtet sich nicht gegen Personen, sondern gegen das der heutigen Zeit nicht mehr gerecht werdende, herrschende System, unter dessen Zwang wir allesamt stehen, sowohl die höchsten tierärztlichen Beamten, als auch allerdings erst in seiner ganzen Auswirkung die in der praktischen Fleischschau tätigen Tierärzte.

Für Kämpfe müssen wir gewappnet sein, die sich aber hoffentlich nur gegen äußere Feinde zu richten haben. Finden sich grundsätzliche Gegner unserer Bestrebungen, die für den ganzen Stand doch wirklich nur das Beste wollen, und die deshalb auch erfreulicher Weise in Leipzig keinen ernsthaften Widerstand fanden, trotz alledem auch in unserem eigenen Lager, dann ist schonende Kritik nicht geboten.

Den äußeren Anlaß zu meinen Anträgen in Leipzig gaben mir die Veröffentlichungen einiger Kollegen, die darin gipfelten: Der „Lebensmitteltierarzt“ müsse den „Fleischbeschautierarzt“ kontrollieren (die Bezeichnung „Lebensmitteltierarzt“ ist übrigens sprachlich ein Nonsens, dann müßte es schon heißen „Lebensmittelkontrolltierarzt“). Wird die Fleischschau endgültig in ein solches Verhältnis zur Lebensmittelkontrolle, deren Ausübung wir mit anderen Berufen teilen müssen, gebracht, so erwächst nicht nur für die Fleischschau, sondern auch für den ganzen Stand eine in ihrer Größe noch gar nicht abzusehende Gefahr. Deshalb sprach ich in Leipzig von einer *Schicksalsunde*. Das, was durch meine Anträge in Leipzig verhindert werden sollte, scheint — wenigstens in Preußen — traurige Tatsache werden zu sollen.

Anstatt die überaus günstige Gelegenheit der Neuregelung der Lebensmittelkontrolle und der darin zum Ausdruck kommenden höheren Wertung der Lebensmittelhygiene dazu zu benutzen, für das Kernstück der tierärztlichen Fleischkontrolle soviel Kapital wie möglich herauszuschlagen, ist man leider auf die uns Tierärzte so bitter enttäuschende Idee gekommen, die Lebensmittelkontrolle zu einer Beaufsichtigung des sog. Beschaupersonals zu benutzen und damit den schon oft nachgewiesenen Subalternismus in der Fleischschau erneut gesetzlich zu verankern.

Dualismus des im Reichsfleischbeschaugesetz verankerten Begriffes „Fleischschau“ und seine Folgen.

Der geschichtliche Begriff „Fleischschau“ umfaßt von wirtschaftlichen Gesichtspunkten geleitete Kontrollmaßnahmen der Zünfte in den Städten des Mittelalters.

Die heutige Fleischschau als veterinäre Wissenschaft ist im Gegensatz dazu Fleischhygiene und deren Nutzenanwendung zum Schutze der Volksgeundheit einerseits und der Erhaltung wirtschaftlicher Werte andererseits.

Die Laienfleischschau von heute ist eine Art technischer Nothilfe in der eigentlichen Fleischschau, ausgeführt von notdürftig ausgebildeten Laien.

Der im Reichsfleischbeschaugesetz verankerte Begriff „Fleischschau“ umfaßt nun sowohl die veterinäre Fleischkontrolle als auch die Laienfleischschau. Sachverständige der Fleischschau, Fleischbeschauer sind nach dem Gesetz sowohl die in der Fleischkontrolle tätigen Tierärzte als auch die Laienfleischbeschauer.

Das ist ein unheilvoller und unhaltbarer Dualismus der Begriffe Fleischschau und Fleischbeschauer, der in der öffentlichen Meinung verwirrend und für uns Tierärzte niederziehend wirken muß.

Welche Folgen er für die Bewertung in der öffentlichen Meinung und bei den Behörden gehabt hat, darüber habe ich in Leipzig gesprochen. Es hieße Eulen nach Athen tragen, darüber auch heute noch ausführlich zu referieren. Aus Kollegenkreisen sind mir für den Nachweis des Subalternismus in der Fleischschau ganze Stöße von Material zugegangen, auf das ich hier nicht eingehen möchte, um mich nicht in Einzelheiten zu verlieren; ich bin aber dankbar für die Überlassung dieses Materials, weil es für die Gewinnung richtunggebender Gesichtspunkte wichtig ist.

Ich möchte hier nur noch daran erinnern, daß die maßgebenden Sachverständigen der Fleischschau bei den Beratungen des Lebensmittelgesetzes gar nicht und bei den Beratungen zur Durchführung sehr wenig mitgewirkt haben.

Die internationale Hygienekommission des Völkerbundes hat Schlacht- und Viehhöfe in Deutschland inspiziert, es haben aber nur Medizinalbeamte daran teilgenommen. Sollten alle diese Symptome uns nicht hellhörig machen, bevor es zu spät ist?

In Leipzig habe ich darauf hingewiesen, daß sich jene subalternisierende Wirkung des Reichsfleischbeschaugesetzes von den zentralen bis zu den lokalen Behörden immer mehr verstärken muß, so daß die in der Fleischschau tätigen Tierärzte auf dem platten Lande erst den ganzen Druck auszuhalten haben. Daß aber auch die zentralen Behörden sich dem Zwang jenes Dualismus nicht entziehen können, dafür ist der preußische Ministerialerlaß vom 18. Januar d. Js. ein geradezu klassischer Beweis. Insofern hat er über Preußen hinaus symptomatische Bedeutung. Auch deshalb möchte ich auf ihn näher eingehen, weil die Notwendigkeit einer Neuordnung des Fleischbeschaugesetzes durch nichts anderes eindringlicher bewiesen werden kann.

Es werden in jenem Erlaß alle Paragraphen des Fleischbeschaugesetzes, die sich auf die Kontrolle der Fleischschau beziehen, zusammengestellt, um sie einer Beaufsichtigung des Beschaupersonals durch die Lebensmittelkontrolle dienstbar zu machen. Unter III des Erlasses heißt es sogar: „Gelegentlich der tierärztlichen Lebensmittelkontrolle festgestellte Verfehlungen bei der Fleischschau sind in Zukunft in der gleichen Weise zu verfolgen, als wenn die Verfehlungen bei der fachmännischen Kontrolle des Beschaupersonals oder anlässlich der Ermittlung bei einer Fleischvergiftung zur Kenntnis der Aufsichtsbehörde gelangt wäre.“ Das bedeutet für das tierärztliche Fleischbeschaupersonal, um mich dieses schönen Ausdrucks zu bedienen, daß dem sog. Lebensmittel-tierarzt bei Feststellung von Verfehlungen in der Fleischschau eine ähnlich übergeordnete Autorität zuerkannt wird, wie dem zuständigen Regierungsveterinär. Deutlicher konnte die subalterne Rolle der Fleischschau gegenüber der Lebensmittelkontrolle nicht zum Ausdruck gebracht werden.

Der mit der Lebensmittelkontrolle beauftragte Tierarzt soll ferner über ermittelte Verstöße sofort den Ortspolizeibehörden Bericht erstatten. Hierzu ist zu bemängeln: Sind zwei tierärztliche Befunde nicht miteinander in Einklang zu bringen, so brauchen doch damit nicht gleich die Ortspolizeibehörden befaßt zu werden. Das geschieht sonst in keinem wissenschaftlichen Beruf. Vielmehr würde eine der Polizeibehörde und dem betreffenden Beschautierarzt mitzuteilende, vorläufige Beschlagnahme und unmittlere, zeitparende Berichterstattung an den zuständigen, übergeordneten Veterinär auf der einen Seite unnötige Schädigung des persönlichen und beruflichen Ansehens, auf der anderen Seite Gewissenskonflikte mit Kollegialität und Taktgefühl vermeiden.

Unter III, 4 werden Richtlinien gegeben, nach denen die zuständigen Veterinärbeamten gegen Beschautierärzte bei Verfehlungen einzuschreiten haben. Ich frage: Was gehen diese Richtlinien den ganzen Verwaltungsapparat bis zu den untersten Lokalbehörden an?

Bei Maßregelungen sollen ferner auch die Nachbarbezirke benachrichtigt werden, in denen der Gemaßregelte die Beschau hat, damit diese Nachbarbezirke das Erforderliche veranlassen können usw.

Das Niederdrückendste jenes Erlasses, der hoffentlich bald der Geschichte angehört, liegt aber darin, daß er entsprechend den im Gesetz verankerten Begriff „Fleischschau“ mit unbittlicher Konsequenz gerade in Bezug auf die Beaufsichtigung der Tierärzte und Laienfleischbeschauer den lokalen Behörden gegenüber nicht nur völlig gleichstellt, sondern unter III, 7 sogar die Tierärzte, die neu hinzugezogen sind, besonders herausgegriffen und die Behörden ihnen gegenüber zu besonderer Vorsicht angehalten werden.

M. H.! haben wir Jahrzehnte lang für Hochschulverfassung, Maturität, Doktor usw. gekämpft, um jetzt

diesen Rückfall in finstersten Subalternismus zu erleben? Würde nicht jeder andere akademische Beruf Sturm laufen gegen einen solchen Erlaß? Enthält er, wenn er in dieser Form notwendig war, nicht ein vernichtendes Urteil über das herrschende System? Ist das nach 25jährigem Bestehen des Reichsfleischbeschaugesetzes die Abstattung einer Dankeschuld?

Dieser Erlaß ist aber, wir kommen immer wieder auf des Pudels Kern, die Folge des festgestellten Dualismus in der Fleischschau, die Folge davon, daß dieser Begriff mit dem Rang einer Wissenschaft überhaupt nicht zu vereinbaren ist. Ohne jene unglückliche Zwangsehe mit der Laienfleischschau mußte sich die veterinäre Fleischhygiene als Wissenschaft entsprechend der fortschreitenden Forschung und der zunehmenden Bedeutung der öffentlichen Gesundheitspflege zu der Einheitswissenschaft der veterinären Nahrungsmittelhygiene entwickeln.

Durch das Zwitterding Fleischschau wird ein ganz unnatürlicher Trennungsstrich mitten durch die Veterinärhygiene gezogen. Durch den Ministerialerlaß vollends wird dieser unnatürliche und unlogische Trennungsstrich so dick und auffallend wie möglich gemacht.

Die Zwitterstellung der Fleischschau ist natürlich auch nicht ohne Folgen geblieben für die innere Standesentwicklung und den qualitativen Fortschritt. Wenn wir den innersten Ursachen der schleichenden und hemmenden Standeskrisis, der Unzufriedenheit und des Mangels an Berufsfreudigkeit nachgehen, so müssen wir diese Ursachen folgendermaßen präzisieren:

Der tierärztliche Beruf hat zwar in seinen äußeren Vorbedingungen die akademische Maturität erreicht, die veterinäre Gesetzgebung und das veterinäre Verwaltungssystem sind aber infolge eines starren, schwerfälligen Bürokratismus namentlich auf dem Gebiete der Fleischschau in Immaturität und Subalternismus stecken geblieben.

Eine Ausnahme hiervon macht in erster Linie das Veterinärwesen des Heeres. Man stelle Begriffe wie „Veterinär-offizierkorps“, das es nicht mehr gibt, aber in seiner Nachwirkung fortlebt, und „Fleischbeschaupersonal“, „Veterinär-offizier“ und „Fleischbeschauer“ nebeneinander, um den Unterschied zwischen naturgemäßer Entwicklung und niederziehendem Subalternismus zu sehen. Wir sehen damit auch klar die Hauptursache für den Mangel an Homogenität unseres Standes, über den immer wieder mit Recht geklagt wird und der zum Teil als etwas Unabänderliches hingenommen wird. Es ist meist nicht persönliche Schuld, wenn so viele sagen müssen: Ich schäme mich, Tierarzt zu sein.

Ein gefährlicher *circulus vitiosus* ist dadurch gegeben, daß infolge dieses Mangels an Homogenität die qualitative Verschiedenheit des Nachwuchses, der sich dem tierärztlichen Studium widmet, größer ist als in anderen akademischen Berufen. Kann von einem vor der Berufswahl stehenden Abiturienten von Qualität, dem die geschilderten subalternen Verhältnisse bekannt sind, erwartet werden, daß er trotzdem Luft bekommt, unter das Sammelfurium „Fleischbeschaupersonal“ unterzutauchen? Viele, viele von uns wären nicht Tierarzt geworden, wenn sie jene Verhältnisse gekannt hätten.

Wie ich in Leipzig ausführte, erheischt es aber das Staatsinteresse, auf allen Gebieten der Volkshygiene die allerbesten Kräfte heranzulocken und dementsprechend auch die Verhältnisse zu gestalten. Und weiter: Der D.V.R. habe die Pflicht zu verhüten, daß ein großer Teil der Berufsgenossen in Subalternismus ideeller, materieller und kultureller Art verfinke. Es war mir eine gewisse Genugtuung, daß 3½ Monate nach Leipzig die preußischen Richter auf dem Richtertage vom 8. Oktober 1927 ihre standespolitischen Forderungen mit ganzen ähnlichen Gedankengängen folgendermaßen begründeten: Kultur haben, heiße Kulturbedürfnisse haben und grundsätzlich Nichtbefriedigung dieser Kulturbedürfnisse führe schließlich zum Kulturniedergang; noch schlimmer wür-

den die unmittelbaren Folgen sein, indem sich der Nachwuchs danach einstellen würde. Heranziehung eines brauchbaren Nachwuchses liege nicht im persönlichen Interesse der Richter, sondern im Volks- und Staatsinteresse. Wörtlich heißt es dann weiter: „Werden die unpolitischen Beamten in der Rechtspflege, die Richter, als minderwertig behandelt, so muß darunter die Anziehungskraft ihrer Laufbahn für einen tüchtigen Nachwuchs notwendig leiden“.

Auf unsere Verhältnisse übertragen, ergibt sich daraus die Forderung, daß die in der Fleischbeschau tätigen Tierärzte nicht als minderwertig behandelt werden dürfen, daß vielmehr die veterinäre Fleischkontrolle als ebenbürtiges Teilgebiet der allgemeinen Lebensmittelkontrolle eingereiht und damit aus dem Milieu des Subalternen und Kontrollbedürftigen herausgehoben werden muß, wenn die Anziehungskraft dieser Laufbahn für einen leistungsfähigen Nachwuchs nicht weiterhin leiden soll. Auch hier liegt ein Staatsinteresse vor und für unseren Stand ist das eine Schicksalsfrage. Das Niveau eines akademischen Berufes läßt sich aber niemals heben durch aufdringlich in Erscheinung tretende Beaufsichtigung, durch Bestrafungen, Inspektionsreisen und Personal-kartotheken. Es genügt für einen solchen Beruf nicht, wenn er im Geist und Sinn einer aufsichtführenden Polizeibehörde regiert wird. Es kommt vielmehr darauf an, die Entwicklungsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Berufes rechtzeitig zu erkennen und realpolitisch auszuwerten. Gegenüber solcher Standespolitik sind egoistische Bestrebungen einzelner und die Reibungen zwischen den Berufsgruppen und ihren Führern von lächerlich geringer Bedeutung.

Ich möchte noch kurz auf die Folgen jenes Dualismus in der Fleischbeschau für deren wissenschaftlichen Ausbau eingehen. Den größeren Schlachthöfen steht das reichste und geeignetste Material zu wissenschaftlichen Forschungen auf dem Gebiet der vergleichenden pathologischen Anatomie, der Pathologie des Fötus, der Hereditätsforschung, der Bakteriologie und Parasitologie zur Verfügung. Mittlere und kleinere Schlachthöfe sind geeignet, in besonderen Fällen mit den praktischen Tierärzten, die die betreffenden Tiere behandelt haben, in wissenschaftlichen Konnex zu treten und dadurch die Zusammenhänge zwischen klinischem und pathologisch-anatomischem bzw. bakteriologischem und parasitologischem Befund zu klären. Forschungen über Heredität, namentlich über Tuberkulose-Heredität sind durch Untersuchungen an den Genitalorganen kranker Tiere und den dazu gehörigen Föten mit Plazenten nirgends unter günstigeren Vorbedingungen anzustellen als in Schlachthäusern. Untersuchungen an Leichenmaterial sind lange nicht so beweiskräftig, weil in vielen Fällen kurz vor dem Tode bei Infektionskrankheiten, namentlich bei der Phthisis des Menschen eine Bazilleninvasion in die verschiedensten Organe stattfindet. Daß aus diesem Grunde das wertvolle Schlachthofmaterial beweiskräftiger ist, darauf habe ich schon in einer vor 20 Jahren in der Zeitschrift für Tiermedizin erschienenen Arbeit hingewiesen. Wieviel es hier noch zu tun gibt, hat in letzter Zeit namentlich Prof. Nieberle eindringlich ausgeführt. Wird man aber bei den Behörden für diese Aufgaben Verständnis finden, solange die Fleischbeschau den Rang einnimmt, daß zu ihrer Ausübung auch in wenigen Wochen ausgebildete Laien im Sinne des Gesetzes genügende Kenntnisse nachgewiesen haben, d. h. fachverständlich sind. Im Jahre 1928 wird in der Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene mit Recht darüber geklagt, daß in den Schlachthäusern der Großstädte zum großen Teil noch nicht einmal Einrichtungen vorhanden seien, um einfache bakteriologische Fleischuntersuchungen vorzunehmen.

Um uns durch die spröde Materie nicht ermüden zu lassen, gestatten Sie mir einen kleinen Exkurs in das Gebiet des Mythos und der Philosophie. Die Phantasie, die göttliche Tochter Jovis, hat die wunderbare Aufgabe, die oft

rauen Tatsachen des Lebens mit einem verschönenden Schleier zu umhüllen und dadurch die Lebensfreude zu erhalten oder zu erhöhen. Die leichtbeschwingte Göttertochter wird aber zu einer Feindin der Menschen, wenn wir uns durch sie verleiten lassen, über jene rosafarbene Stimmung, wie sie z. B. bei feierlichen Anlässen herrscht, hinaus systematische Schönfärberei zu treiben und uns überaus gefährlichen Selbsttäuschungen hinzugeben. Deshalb kehren wir zur rauhen Wirklichkeit zurück.

Eine Schlachthofdirektion fragt in der Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene an, ob ein 30 Jahre altes Mikroskop zur Ausführung von Untersuchungen im Schlachthof ausreicht, ob es durch Nachsehen der Linfen brauchbar gemacht werden könne und ob der Betrag von 50 RM. zur Beschaffung der notwendigen Geräte, ferner von Farbstoffen und Reagenzien ausreiche. Ist die Bescheidenheit des Milieus, das diese im Jahre 1927 gestellte Frage verrät, nicht erschreckend?

Der Humanmediziner Cornet weist in seinem Handbuch „Die Tuberkulose“ darauf hin, daß in den Schlachthäusern mit Rücksicht auf den Geschäftsbetrieb die für wissenschaftliche Untersuchungen notwendige Zeit und oft wohl das Interesse fehlen. Je länger wir so bescheiden bleiben, uns mit der subalternen Umrahmung der veterinären Fleischhygiene zufrieden zu geben, umso größer wird die Gefahr eines Einbruches anderer Berufe in unser Schaffensgebiet.

Allein in der gesetzmäßigen und verwaltungstechnischen Gemeinsamkeit der wissenschaftlichen Fleischkontrolle und der Laienfleischbeschau liegt ein für uns so bescheidenes Vergleichsmoment, daß dieses schon suggestiv hemmend wirken muß. Wenn darüber geklagt wird, die Tätigkeit an Schlachthöfen wäre eintönig und ermüdend, so liegt das zum Teil daran, daß sich die Untersuchungen in dem Rahmen abspielen, der durch den auch die Laienfleischbeschau umfassenden Begriff „Fleischbeschau“ gegeben ist.

Die Notwendigkeit der Beseitigung des Dualismus in der Fleischbeschau durch Reform des Fleischbeschau-gesetzes.

Für die Notwendigkeit der Neuregelung des Fleischbeschau-gesetzes glaube ich eindringliche Beweise genug gebracht zu haben. Welche zwingende Forderungen ergeben sich nun für eine solche Reform?

Der hemmende, einengende Dualismus des Begriffes Fleischbeschau muß beseitigt werden. Die veterinäre Lebensmittelhygiene, für die die Fleischhygiene wissenschaftlich und genetisch das Fundament ist, darf nicht naturwidrig und unlogisch in „Fleischbeschau“ und „animalische Lebensmittelkontrolle“ zerrissen werden, vielmehr ist die Schaffung der organischen Einheit in der Veterinärhygiene und ihrer Anwendung in der öffentlichen Gesundheitspflege zu fordern.

Der Begriff Fleischbeschau hat in Zukunft nur die Laienfleischbeschau zu umfassen. Das entspricht auch am besten dem Sinn, den er in seiner weit zurückliegenden Geschichte gehabt hat. Die Fleischbeschauer sind Hilfspersonal in der veterinären Fleischkontrolle, wie die Krankenwärter in Krankenhäusern und die Hebammen in der Geburtshilfe.

Wie können wir diese Hauptforderungen mit dem Lebensmittelgesetz in Einklang bringen? Die Hauptforderung hat das Lebensmittelgesetz schon erfüllt. Denn nach der Begründung zu § 1 dieses Gesetzes gehören zu den Lebensmitteln auch deren Rohstoffe, z. B. auch das lebende Schlachtvieh, das in der Begründung ausdrücklich angeführt wird. Also ist die Schlachtviehkontrolle bereits Lebensmittelkontrolle. Eine Abtrennung der Schlachtvieh- und Fleischkontrolle von der sog. animalischen Lebensmittelkontrolle und eine Unterscheidung zwischen „Beschauerarzt“ und „Lebensmittel-tierarzt“ ist völlig inkonsequent und unlogisch. Man unterscheidet ja auch nicht in der Milch-

hygiene zwischen Milchviehbeschau und Milchkontrolle. Wie diese am Milchvieh im Stalle beginnt, genau so beginnt gerade nach dem Lebensmittelgesetz die veterinäre Fleischkontrolle am lebenden Schlachtvieh.

Der Streit darüber, welche Tierärzte in der Lebensmittelkontrolle tätig sein sollen und welche nicht, ist im Grunde ein Streit um des Kaisers Bart. Anstatt diesen unfruchtbaren Rivalitätsstreit innerhalb unserer Berufsgruppen auszufechten, sollten wir doch lieber unsere ganze Aufmerksamkeit dem systematischen Ausbau der Ausbildung widmen.

Es kommt nämlich bei der Durchführung der Lebensmittelkontrolle für uns hauptsächlich darauf an, daß jene Generalverfehlung, die bei der Durchführung des Fleischbeschaugesetzes gemacht wurde, sich jetzt nicht wiederholt. Es wurde seinerzeit die Fleischbeschau in Bausch und Bogen den Tierärzten übertragen, ohne der Ausbildung eine der Bedeutung der Fleischbeschau entsprechende Beachtung zu schenken. Es sind heute noch zahlreiche Tierärzte in der Fleischbeschau tätig, die weder Vorlesungen über Fleischbeschau gehört haben und hören konnten, noch einer Prüfung in diesem Fach im Staatsexamen unterzogen wurden. Sogar noch viele Jahre nach Einführung des Fleischbeschaugesetzes wurde es dem Zufall überlassen, ob die Kandidaten in Fleischbeschau geprüft wurden oder nicht.

Jetzt bei der Durchführung des Lebensmittelgesetzes sind wir in einer ähnlichen Lage wie damals. Es muß sich vor allem bitter rächen, wenn die Ausbildung in der Lebensmittelkontrolle so organisiert wird, daß ein künstlicher Unterschied zwischen „Beschautierarzt“ und „Lebensmittel-tierarzt“ (zwei sprachlich unmögliche Bezeichnungen) entsteht und sich ein Kontrollverhältnis zwischen beiden entwickelt. Das wäre ein neuer Weg zur Schaffung eines neuen, hemmenden Dualismus in der Veterinärhygiene.

Das kann und muß vermieden werden dadurch, daß **jedem Tierarzt**, der in der sog. Fleischbeschau tätig ist und tätig bleiben will, auf Grund von Ausführungsbestimmungen zum Lebensmittelgesetz aufgegeben wird, innerhalb einer nicht zu eng zu bemessenden Frist an einem staatlich anerkannten Fortbildungskursus in der veterinären Lebensmittelkontrolle teilzunehmen. Die Lebensmittelkurse müssen selbstverständlich unentgeltlich sein und in jeder Provinz organisiert werden.

Eine solche Maßnahme beseitigt mit einem Schlage alle Schwierigkeiten, eröffnet für den Stand, für unsere Wissenschaft die günstigsten Aussichten und entspricht vor allem dem Staatsinteresse.

Durch eine solche Maßnahme würden wir vor allem auch das erreichen, was doch jeder wissenschaftlich vorwärts strebende Tierarzt wünschen muß, eine klare Scheidung zwischen veterinärer Fleischkontrolle und Laienfleischbeschau; wir würden erreichen die allgemeine Hebung des wissenschaftlichen Niveaus und höhere Wertung in der Öffentlichkeit.

Infolge einer solchen Maßnahme würde dem Reich mit einem Schlage auf dem platten Lande, wo es mit der Hygiene besonders schlimm steht, ein Stab von wissenschaftlichen Mitarbeitern zur Verfügung stehen, um den Sinn und Geist des Lebensmittelgesetzes ins Volk zu tragen. Das wäre Aufbauarbeit der Gemeindeveterinäre im wahrsten Sinne des Wortes.

Eine solche Maßnahme gibt jedem bisher in der Fleischbeschau tätigen Tierarzt die Möglichkeit, in seinem Bezirk im Einvernehmen mit den Gemeinden, resp. Ortspolizeibehörden die veterinäre Schlachtvieh- und Fleischkontrolle zu einer im Sinne des Lebensmittelgesetzes liegenden veterinären Lebensmittelkontrolle auszubauen.

In der Berliner Ausstellung „Die Ernährung“ macht sich im Großen daselbe Bestreben geltend, wie in den ländlichen Hausfrauenvereinen im Kleinen, nämlich das Bestreben, das große Nationalvermögen der Nahrungsmittel, das den deutschen Hausfrauen zu treuen Händen übergeben ist, von

volksgesundheitslichen und ökonomischen Gesichtspunkten so pfleglich und nutzbringend wie möglich zu verwerten. Hier eröffnet sich den Gemeindeveterinären ein dankbares Feld der Volksaufklärung über Hygiene der Fleischaufbewahrung und Fleischverarbeitung.

Noch dringender braucht eine solche Aufklärungsarbeit das Schlachtergewerbe. Jeder Beschlagfchmied, der sich den Meistertitel erwerben will, muß sich in einem von Tierärzten abgehaltenen Kursus Elementarkenntnisse der Anatomie, Physiologie und Hygiene des Hufes aneignen. Viel wichtiger noch und im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege notwendig sind von Veterinärhygienikern zu leitende Kurse, in denen die Schlachtergefallen über die Grundsätze der Hygiene des Schlachtens, der Fleischaufbewahrung und der Fleischverarbeitung unterrichtet werden. Gerade im Hinblick auf die postmortale Infektion des Fleisches ist eine solche Maßnahme mindestens ebenso wichtig, wie es die bakteriologischen Fleischuntersuchungen sind. Wie die gewerblichen Schlachtungen auf dem Lande vielfach vor sich gehen, wie die Schlacht- und Aufbewahrungsräume beschaffen sind, das spottet oft jeder Beschreibung. Die Unsitte, beim Abfellen das Messer in den Mund zu nehmen, das sog. Bluttreten usw. können nur durch systematische Erziehung während der Ausbildung beseitigt werden. Das Ziel dieser Ausbildung muß es sein, daß dem werdenden Schlachtermeister das Verständnis für Hygiene und der Wille zur Hygiene in Fleisch und Blut übergehen. Werden die von mir vorgeschlagenen Pflichtkurse für angehende Schlachtermeister gesetzlich gefordert, so wird das Niveau des Schlachtergewerbes gehoben und den Vorurteilen gegen ein Gewerbe, das vom Standpunkt der Volksgeundheit eines der wichtigsten ist, der Boden entzogen. Ein großer Aufgabenkreis eröffnet sich für den Neuaufbau der Veterinärhygiene, der nicht mehr aufgeschoben werden darf. Ich glaube aber nicht, daß die „Fleischbeschauer“ des Fleischbeschaugesetzes die Autorität genießen, die sie in den Stand setzen, sich als Hüter der Veterinärhygiene durchzusetzen.

Die Gebührenfrage möchte ich nicht in den Vordergrund stellen. Die Tendenz der angeregten Neuregelung ist in erster Linie eine ideelle. Zwei Richtlinien müssen aber auch hier, je früher je besser, zu einer Neuregelung führen:

1. Der Unterschied zwischen veterinärer Fleischkontrolle und Laienfleischbeschau muß in den Gebühren zum Ausdruck kommen. Auch in der Rechtspflege können Laien eine Prozeßvertretung übernehmen, diese haben aber nur die Hälfte der Gebühren zu beanspruchen, die für Juristen gelten.

2. Die Kosten der Schlachtvieh- und Fleischkontrolle müssen dem sonst in der öffentlichen Verwaltung geltenden Grundsatz entsprechend, so weit das öffentliche Interesse gegenüber dem ökonomischen Interesse des Einzelfalles überwiegt, aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, um eine einseitige Belastung zu vermeiden.

Die Ausfüllung der Ergänzungsbefchaukassen nach dem jetzigen System fällt letzten Endes auch nur zu Lasten der Produzenten und des Schlachtergewerbes. Die Ergänzungsbefchaukassen der einzelnen Kreise wissen zum Teil nicht, wohin mit dem Geld, zum Teil herrscht infolge geringer Zahl gewerblicher Schlachtungen Ebbe in ihnen. Deshalb scheint mir zum besseren Ausgleich die Einrichtung von Provinzialveterinärkassen, die so weit nötig aus öffentlichen Mitteln aufgefüllt werden müßten, zweckmäßig zu sein. Jedenfalls dürfen die erheblichen Geldmittel, die in Bezirken mit sehr zahlreichen Schlachtungen durch Abzüge von den Fleischbeschaugebühren sich ansammeln, zu keinen anderen Zwecken als zur Kostendeckung der Fleischkontrolle verwandt werden.

Notwendig ist vor allem aber eine Reform der Amtsbezeichnungen für die in der veterinären Fleischkontrolle tätigen Tierärzte. Es hat sich in allen Kulturstaaten der

Brauch entwickelt, den höheren Beamten, die für die Staatsordnung zu sorgen haben, eine möglichst eindrucksvolle, die Autorität des Staates deutlich ausdrückende Amtsbezeichnung und den unteren Beamten eine möglichst impotente Uniform zu geben. Das ist eine Spekulation auf die Naivität des Publikums, die aber erfahrungsgemäß den psychologischen Imponderabilien gerecht wird. In der amtlichen Fleischkontrolle ist es gerade umgekehrt; die Tierärzte haben hier eine ihrer Tätigkeit begrifflich ins Subalterne umbiegende, geradezu irreführende Amtsbezeichnung. Es hat sich deshalb ein buntes Chaos von Verlegerheitstiteln herausgebildet: Der in der Fleischbeschau tätige Tierarzt, Beschautierarzt, Fleischbeschautierarzt, tierärztlicher Beschauer usw. Die ministeriellen Anweisungen an die nachgeordneten Behörden, den in der Fleischbeschau tätigen Tierärzten die Bezeichnung Tierarzt nicht vorzuenthalten, sind der beste Beweis dafür, daß die Amtsbezeichnung Fleischbeschauer zum Tierarzt nicht paßt. Solche Anweisungen sind völlig zwecklos; denn den Verwaltungsbehörden gegenüber bleiben wir Fleischbeschauer, solange das Gesetz nicht geändert wird.

Es ist auch ein unwürdiger Zustand, daß wir Tierärzte bei Veröffentlichungen in der Fach- und Tagespresse, bei Tagungen mit anderen wissenschaftlichen Berufen um die Bezeichnung Fleischbeschau und Fleischbeschauer herumzuehen gezwungen sind, wie die Katzen um den heißen Brei herumgehen. Vor ca. drei Wochen las ich in der Provinzpresse Schleswig-Holsteins den Bericht über eine Tagung der Fleischbeschauer und Trichinenschauer. In dem Bericht hieß es, daß an der Tagung der Veterinärassessor Dr. X. als Vertreter der Regierung teilnahm, daß der Veterinärrat Y. einen Vortrag über tierische Parasiten hielt, daß Anträge auf schärfere Kontrolle der Wochenmärkte und der Schinken- und Wurstaufkäufer angenommen wurden. Müßen sich die Leser, die sich überhaupt beim Lesen Gedanken machen, nicht fragen: Ja, war das eine Tagung von tierärztlichen Beschauern oder von Laienfleischbeschauern oder eine gemeinsame Versammlung beider?

Ich habe es nie verstanden, daß die Tierärzte diese Titulatur so ruhig auf sich genommen haben. Es wird doch aber wirklich Zeit, daß an die Stelle jener unwürdigen Nomenklatur begrifflich klare einheitliche Amtsbezeichnungen treten. Bei konsequenter Logik ergibt sich auch hier die zu schaffende Amtsbezeichnung von selbst. Es hat sich das Stammwort „veterinär“ überraschend schnell in seinen verschiedenen Variationen und Zusammensetzungen, die den verschiedenen Tätigkeiten entsprechen, immer mehr als ein allgemein verständlicher Begriff eingebürgert. Er ist international verständlich. Aus dem Roßarzt ist der Veterinär-offizier, aus dem Departementstierarzt der Regierungsveterinär-rat, aus dem Kreistierarzt der Kreisveterinär-rat geworden. Nun, dann soll in logischer Folge aus dem Schlachthoftierarzt der Stadtveterinär und aus dem Gemeindetierarzt (Beschautierarzt) der Gemeindeveterinär werden. Das wäre die Grundstufe amtlicher tierärztlicher Tätigkeit, von der aus sich weiterbauen läßt zum Stadtoberveterinär, Stadtveterinär-rat, Stadtveterinärdirektor. Aus dem Fleischbeschauamt wird das Veterinäruntersuchungsamt. Nicht weit von hier, in Nürnberg, ist kürzlich ein städtisches Veterinäramt errichtet mit einem Aufgabenkreis, der weit über den Rahmen der Fleischbeschau hinausgeht. **Der Fleischbeschauer hat sich genau so überlebt wie der Vieh- und Roßarzt.**

In Verfolg meiner Darlegungen würde an die Stelle des Reichsgesetzes betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau ein Reichsgesetz betreffend die veterinäre Fleisch- oder Lebensmittelkontrolle treten. Die §§ 1 und 5 des Fleischbeschaugesetzes müßten die grundlegenden Änderungen bringen, aus denen die Änderung der übrigen Paragraphen sich von selbst ergibt. In § 1 würde es dann etwa heißen: Die amtliche, veterinäre Lebensmittelkontrolle erstreckt sich auf die Untersuchung der Schlachttiere vor und

nach den Schlachtungen, auf die Überwachung des Verkehrs mit Fleisch und Fleischfabrikaten, Wild, Geflügel, Fischen, Krusten- und Schalentieren und den von Tieren stammenden Nahrungsmitteln.

Der § 5 würde dem Sinne nach etwa lauten: Zur Vornahme der für die veterinäre Lebensmittelkontrolle notwendigen Untersuchungen sind Veterinärkontrollbezirke zu bilden; für jeden derselben sind mindestens ein Stadt-, Bezirks- resp. Gemeindeveterinär, sowie ein Stellvertreter zu bestellen. In kleineren Gemeinden und Amtsbezirken, in denen die Bestellung eines Veterinärs zur Ausübung der Schlachtvieh- und Fleischkontrolle nicht möglich ist, sind mit dieser Fleischbeschauer, die nach einem vorgeschriebenen Ausbildungskursus genügende Kenntnisse nachgewiesen haben, nach Maßgabe der für Fleischbeschauer geltenden Begrenzung ihrer Befugnisse zu bestellen. Der den Fleischbeschauern zugewiesene Bezirk, Fleischbeschaubezirk ist ein Teil eines Veterinärkontrollbezirks. Dem dort bestellten Bezirksveterinär liegt bei Unzuständigkeit des Fleischbeschauers die Nachkontrolle ob. Die Fleischbeschauer sind Hilfspersonal der veterinären Fleischkontrolle.

Das sind natürlich nur Vorschläge, die vielleicht als Ausgangspunkt für weitere Beratungen dienen können. Die Hauptsache ist die, daß Sie die Notwendigkeit der Neuregelung und die dargelegten großen Richtlinien anerkennen. Wir brauchen uns nur zwei Fragen vorzulegen, um diese Notwendigkeit zu erkennen:

1. Wie steht das Volk zu dem alten Fleischbeschau-gesetz?
2. Wie stehen die Funktionäre dieses Gesetzes, die Tierärzte zu ihm?

Die Beantwortung dieser Fragen ergibt sich aus meinen Ausführungen von selbst. Die Notwendigkeit der Neuregelung ergibt sich vor allem auch aus der Notwendigkeit, die Veterinärhygiene neu auszubauen.

Die Möglichkeit, eine Reform des Fleischbeschaugesetzes durchzusetzen, ist von vielen Faktoren abhängig, die eingehend geprüft und bei der Begründung der Reform realpolitisch berücksichtigt werden müssen. Auf jeden Fall aber besteht die Möglichkeit, daß zunächst viele unserer Forderungen durch Ausführungsbestimmungen zum Lebensmittelgesetz erfüllt und dadurch die Wege zu einer Gesetzesreform geebnet werden.

Unsere Reformbestrebungen sind vor allem auch zu werten als ein Ringen um Auftrieb und Arbeitsfreude. Wir haben ein Recht zu verlangen, daß die Behörden und die Öffentlichkeit dieses Streben dankbar anerkennen, nachdem wir 25 Jahre eine große Verantwortung trotz vieler Unzulänglichkeiten auf uns genommen haben.

Wir erweisen ferner auch unserem Altmeister v. O s t e r t a g einen wirklich ehrlichen Dankbarkeitsdienst, wenn wir einhellig dagegen Front machen, daß sein größtes Lebenswerk, die Fleischbeschau, gesetzgeberisch und verwaltungstechnisch wie ein Affenbrödel der Veterinärhygiene behandelt wird.

In Geleitworten zur Berliner Ausstellung hieß es: Die Ernährungsfrage ist eine Schicksalsfrage des deutschen Volkes, ihre Lösung ist die unerläßliche Voraussetzung für hygienisches, politisches und wirtschaftliches Gedeihen.

Die Neuregelung der Fleischbeschau schwebt mir vor als ein Teil jenes großen Erneuerungswerkes, das nach dem Zusammenbruch unser aller Ziel ist, der Erneuerung Deutschlands. So wird Ihre Mitarbeit, um die ich Sie alleamt bitte, nicht bloß Dienst an uns und unfrem Beruf, sondern auch Dienst an Volk und Staat.

Vor 25 Jahren sind wir unter Führung v. O s t e r t a g 's mit dem alten Fleischbeschau-gesetz anderen Kulturstaaten vorangegangen. Lassen Sie uns von dem wunderbaren München aus die himmelanstrebenden, bayrischen Berge da

draußen grüßen als aufrüttelnde, zu frohen Taten herausfordernde Symbolik und unter dem Zeichen dieser Symbolik, unter dem Zeichen neuer, aufwärts gerichteter Erkenntnisse,

hoffentlich unter dem alten erfahrenen Führer, wiederum wegweisend vorangehen mit dem was uns geblieben ist und nicht genommen werden kann: **Mit Geist und Willen.**

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Lührs: Immunisierungsversuche bei der Brustfeuche der Pferde. (Festschrift zu Eugen Fröhners 70. Geburtstag. Verlag Ferdinand Enke, Stuttgart, 1928. Preis Mk. 32.—)

Verf. gibt zunächst einen eingehenden, geschichtlichen Überblick über die zahlreichen Immunisierungsversuche gegen die Brustfeuche der Pferde in der Vorkriegszeit, die sich trotz einiger, vermeintlicher Anfangserfolge später insgesamt als unbrauchbar herausstellten, da sie von falschen Voraussetzungen über die Natur des Erregers ausgingen. Erst als Robert Koch nachwies, daß es sich bei den bisher gefundenen Bakterien, insbesondere den Streptokokken, nicht um den ursächlichen Erreger der Brustfeuche handelte, sondern um Zufallsbefunde oder Sekundärinfektionen, sei man allmählich zu der heute noch geltenden Auffassung gelangt, daß der Brustfeucherreger nur ein Zellschmarotzer sein könne, der in den Epithelzellen der Luftwege seinen Sitz habe. Ihre experimentelle Grundlage erhielt diese Auffassung durch das Gelingen der künstlichen Übertragung der Brustfeuche mit dem Bronchialsekret brustfeuchekranker Fohlen, welches gefundenen Pferden intranasal oder peroral verabreicht wurde und in fast 100 Prozent der Fälle positive Resultate lieferte. Die Immunisierungsversuche, über die Verf. berichtet, wurden schon vor dem Kriege im Institut Robert Koch zuerst unter Leitung von Gaffky, später von Löffler im Verein mit dem Verf. durchgeführt, blieben aber in ihren Einzelheiten bisher unveröffentlicht. An umfangreichem Remonte- und Fohlenmaterial versuchte man unter Benutzung von Material aus zerriebenen Herden brustfeuchekranker Lungen durch subkutane, intravenöse, intrapulmonale und intramuskuläre Einspritzungen Immunität zu erzielen. Die zahlreichen Versuche berechtigten Verf. zu dem Schluß, daß mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Immunisierung empfänglicher Pferde auf angegebener Weise möglich ist. Die Immunität scheint eine langdauernde zu sein, denn als immun angesprochene Tiere erkrankten auch nach wiederholter Infektionsmöglichkeit in einer Beobachtungszeit von zwei Jahren nicht. Sollte die Brustfeuche, nachdem sie im Kriege ihren Schrecken verlor, wieder auftreten, so stellen die geschilderten Versuche, wie Verf. mit Recht sagt, eine Grundlage für die weitere Erforschung der Frage dar, die durch den Krieg unterbrochen wurde.

Gipmann.

Claussen: Vergleichende Untersuchungen über das Verhalten von Essigsäure- und Karbolsäure-Auszügen beim Milzbrandnachweis an Häuten durch das Präzipitationsverfahren nach Ascoli. (Aus dem Pathologisch-anatomischen Laboratorium des Veterinärwesens in Hamburg.) (Zschr. für Infektionskrankheiten der Haustiere 1928, 32, H. 3, S. 252.)

Claussen hat im Auftrage des Landestierarztes von Hamburg eine Reihe größerer Untersuchungen vorgenommen, um die Brauchbarkeit des von Bessubetz bekanntgegebenen Verfahrens zur Herstellung der für die Untersuchung von Milzbrandhäuten nach dem Ascoli'schen Präzipitationsverfahren erforderlichen Auszüge nachzuprüfen. Das Ergebnis seiner Untersuchungen ist folgendes: Die nach dem Verfahren von Bessubetz durch Anwendung von 0,5prozentiger Essigsäure in physiologischer Kochsalzlösung und durch Erhitzen im Autoklaven gewonnenen Präzipitinogen-Auszüge zeigten sich den mittels 5prozentiger Karbolsäure in physiologischer Kochsalzlösung hergestellten Auszügen in Bezug auf das Auftreten einer spezifischen Reaktion nicht überlegen. Bei Milzbrandhäuten ließ sich in jedem Falle eine mehr oder weniger intensive typische Reaktion beobachten, einerlei ob der Auszug mit Zusatz von 0,5prozentiger Essigsäure oder 0,5pro-

zentiger Karbolsäure hergestellt war. Es war bei meinen Untersuchungen nicht erforderlich, die Karbolsäureauszüge vor der Verwendung zu zentrifugieren. Die Bessubetz'schen Hautauszüge zeigten in vielen Fällen ein stark getrübbes Aussehen, welches nur schwer, verschiedentlich überhaupt nicht, zu beseitigen war. Auszüge aus einzelnen Häuten, darunter fämtliche Auszüge von Schweinhäuten, bildeten beim Abkühlen eine Gallerte. Auf kaltem Wege mit 5prozentiger Essigsäure in physiologischer Kochsalzlösung hergestellte Hautauszüge zeigten die oben genannten Eigenschaften nicht. Die Auszüge wurden durchweg schon nach einmaligem Filtrieren völlig klar und ergaben beim Vorliegen von Milzbrand dieselbe typische Reaktion wie die heiß gewonnenen Extrakte. 0,5 prozentige Essigsäure in destilliertem Wasser oder in physiologischer Kochsalzlösung, desgleichen Auszüge aus normaler Haut mit 0,5prozentiger Essigsäure in destilliertem Wasser ergaben sowohl in Berührung mit normalem als auch mit präzipitierendem Serum einen unspezifischen Niederschlag, der sich von einem spezifischen nicht unterschied. Mit 0,5prozentiger Essigsäure hergestellte normale Hautauszüge verhielten sich dagegen in Berührung mit Serum beiderlei Art indifferent. Ziegler.

Pohl, G.: Weitere Versuche zur Frage der Desinfektion milzbrandiger Trockenhäute. (Anwendung von Roh-Chloramin-Heyden, Chlorkalk (25 Prozent aktives Chlor) der I. G. Farbenindustrie, Elberfeld, technischem Schwefelnatrium, Sulfoliquid DS, Tetralol, Bromtetralol, Tetralresorzin, Salzsäure-Kochsalz- (Schattenfroh), Natronlauge-Kochsalz- (Hailer) und Sublimat-Ameisensäure-Verfahren (Seymour-Jones). (Aus dem Staatlichen Veterinär-Untersuchungsamt Potsdam. — Leiter: Veterinär Dr. R. Ständfuss.) (Zschr. für Infekt.-Krankh. der Haustiere 1928, 32, H. 4, S. 304.)

Pohl hat in Fortsetzung seiner Desinfektionsversuche an milzbrandigen Rinderhäuten noch weitere Mittel mit folgendem Ergebnis geprüft: Rohchloramin Heyden scheint in 3prozentiger Lösung bei 15stündiger Einwirkungsdauer und Zimmertemperatur auf milzbrandige Rinderhäute diese nicht zu schädigen, vermag sie aber bei weitem nicht restlos zu entkeimen. Ebenso werden oberflächlich an Seidenfäden haftende Milzbrandsporen nicht in allen Fällen abgetötet. Die Pathogenität der nach der Desinfektion herausgezüchteten Keime bleibt erhalten. Es erscheint daher unter den oben genannten Bedingungen für die Desinfektion milzbrandiger Rinderhäute nicht geeignet.

Der 25 Prozent aktives Chlor enthaltende Chlorkalk der I. G. Farbenindustrie A.-G., Elberfeld, besitzt gegenüber leicht zugänglichen Milzbrandsporen eine hohe keimtötende Kraft, vermag aber nicht, die in den Rinderhäuten befindlichen Milzbrandkeime zu vernichten. Technisches Schwefelnatrium besitzt in gleicher Weise wie das reine Schwefelnatrium (s. erste Arbeit) in 10prozentiger wässriger Lösung bei einem Gehalt von 6/6,2 Prozent reinem Na_2S , bei achttägiger Einwirkungsdauer und Zimmertemperatur Milzbrandsporen gegenüber eine stark keimtötende Wirkung. Sulfoliquid DS in wässriger Lösung mit einem Gehalt von 1,5 und 15 Prozent schwefliger Säure konnte eine sichtbare Keimverminderung selbst nach drei Wochen langer Einwirkung nicht hervorrufen. Auch durch Tetralol, Monobromtetralol, Tetralresorzin in 0,1—5prozentiger Lösung wurden trotz fünf Tage langer Einwirkung Milzbrandsporen nicht vernichtet. Dagegen zeigte sich, daß sich mit Hilfe der drei vom Reichsarbeitsministerium auf Vorschlag des Reichsgesundheitsamtes den Gerbereien

zur Anwendung empfohlenen Pickelverfahrens (Salzfäure-Kochsalzverfahren nach Schattenfroh) eine weitgehende Abtötung der Milzbrandkeime erzielen läßt. Ein nennenswerter Unterschied zwischen den drei Verfahren in der keimtötenden Wirkung konnte nicht festgestellt werden. Durch die Laugenbehandlung (Hailer) werden erhebliche Mengen von Milzbrandkeimen nicht abgetötet, ebenso wenig durch das Sublimat-Ameisensäureverfahren nach Seymour-Jones. Aus den vorliegenden Untersuchungen ergibt sich demnach, daß für die Entkeimung milzbrandiger Trockenhäute nur das technische Schwefelnatrium (60—62proz.) und die Salzfäure-Kochsalzverfahren in Frage kommen dürften.

Ziegler.

Imig: Die Verwertbarkeit der Komplementbindungsreaktion zur Diagnose der Borna'schen Krankheit und der Tollwut. (Zschr. für Immunitätsf. 1928, Bd. 55, S. 403.)

Die Komplementbindungsreaktion eignet sich weder zur Diagnose der Borna'schen Krankheit noch zur Diagnose der Tollwut.

Meyn.

Buzello, A.: Über die Behandlung der septischen Allgemeininfektion. (Medizinische Klinik 1927, Nr. 32, Seite 1207 bis 1211.)

Bei der Blutinfektion ist das Blut beteiligt am Krankheitsprozeß, es kann seine physiologischen Aufgaben nicht mehr in normaler Weise erfüllen, es ist selbst schwer geschädigt, selbst infiziert (septische Allgemeininfektion, bakterielle Infektion oder Intoxikation der Blutbahn). Wir verstehen darunter die Reaktionen des kranken Organismus nach dauerndem oder wiederholtem Eindringen von Eiterbakterien oder Fäulniskeimen in die Blutbahn. Die vorübergehende Anwesenheit von einzelnen Eiterkeimen im Blute, die sich bei fast jedem größeren Furunkel, jeder Phlegmone bei sorgfältiger bakteriologischer Technik nachweisen läßt, ist noch keine Blutinfektion, sondern wir sprechen in solchem Falle von Bakteriämie. Das klinische Bild der septischen Allgemeininfektion oder Blutinfektion ist nie ganz einheitlich und nie ganz charakteristisch, sondern wechselnd und kompliziert. Ein geschwächter Körper erliegt eher als ein vorher gesunder. Die Heilung der Blutinfektion kann nur vom Körper selbst besorgt werden durch Wiedererstarkung des Abwehrorganismus und durch erfolgreiche eigene Abwehr der Bakterieninvasion. Man kann das Gesamtkrankheitsbild weiter gliedern in pyogene, in toxische und putride Blutinfektion. Die nach Lage des Falles verschiedene Behandlung stellt uns in jedem besonderen Fall vor andere, sehr verantwortungsvolle, therapeutische Aufgaben (chirurgische, allgemein-symptomatische und spezifische Behandlung). Die Erfolge der spezifischen Therapie bei der menschlichen Blutinfektion sind bisher noch recht geringe. Sie hat ihre Berechtigung bei der pyogenen Blutinfektion und allerhöchstens bei der toxischen, aber immer nur als unterstützende Maßnahme neben der wirksameren chirurgischen und symptomatischen Behandlung. Die auf die Ergebnisse experimenteller Forschung, die großen Fortschritte der Chemotherapie und spezifische Serumbehandlung in Bezug auf Behandlung gesetzten Hoffnungen sind bisher nicht erfüllt worden, daher sollten wir wieder zurückgreifen auf die altbewährte chirurgische und symptomatische Behandlung, die noch immer ihre Erfolge hat. Die große Zahl der spezifischen Mittel gegen die Bakterien im Blute, mit denen uns eine rührige chemisch-pharmazeutische Industrie gerade in letzter Zeit versorgt hat, bietet die Gefahr, daß wir darüber die beiden älteren genannten Behandlungsverfahren vernachlässigen. Es ist viel schwerer, aber auch aussichtsreicher, den Kranken sorgfältig und fortgesetzt zu beobachten, die Funktion der einzelnen Organe ständig zu kontrollieren, drohende Schäden rechtzeitig zu erkennen und frühzeitig zu bekämpfen, als ein empfohlenes spezifisches

Mittel in vorgedruckter Weise einmal oder mehrmals anzuwenden und den Erfolg ruhig abzuwarten.

A.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Ludwig, H.: Über Ovarialblutungen beim Rind. (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 475.)

In einem Vortrage bespricht Verf. die Frage der Ovarialblutungen nach operativen Eingriffen. Vor allem wird dabei die Nachkompression besprochen. Hier sind verschiedene Punkte angeführt, welche sich auf die Beziehungen zwischen dem anatomisch-physiologischen Verhalten der Sexualgefäße im Brunstzyklus beziehen und die (bes. Hyperämie) mit den Nachblutungen in Zusammenhang gebracht wurden. Auch soll die unrichtige Durchführung der Kompression gelegentlich die Ursache des Verblutens der operierten Tiere gewesen sein. Auch aus der Tatsache, daß keine Nachblutungen eintreten können, wenn die Nachkompression unterlassen wird, bestätigt die Auffassung nicht, daß die Ursache restlos auf Seiten der Operationstechnik zu suchen sei. Vielmehr glaubt Verf., daß die Verblutung — er führt zwei sehr charakteristische Beispiele an — auch auf die mangelnde Gerinnungsfähigkeit des Blutes zurückzuführen ist (Hämophilie) und daß diese bei der Bedeutung der Mineralfütterung, der Vererbungskonstitution weit tiefere Ursachen hat, als im allgemeinen in der Operationstechnik und mangelhafter Nachbehandlung angenommen worden sind. Da die schlechte Gerinnung des Blutes so ohne weiteres nicht erkennbar ist im Stall, so kann bei solchen Fällen der Verblutung der Tierarzt nicht haftbar gemacht werden, weil ein Verschulden seinerseits nicht vorliegt. Interessant ist die nachträglich angeführte Arbeit von Durst, daß die Viskosität und Gerinnbarkeit des Blutes, die einigermaßen parallel gehen, mit der Funktion der Schilddrüse im Zusammenhang steht: längere Gerinnungszeiten findet man bei normalen oder gar hyperthyreoidischen, kürzere bei hypothyreoidischen Kühen. — Vielleicht ließe sich die Gerinnbarkeit des Blutes im konkreten Fall durch eine probeweise gesetzte Verletzung eines kleinen Gefäßes (Ohr) beurteilen und danach die Gefahr einer möglichen Verblutung aus den Ovarialgefäßen erkennen. Ref.

H. Graf.

McNutt, G. W.: „The Corpus luteum of Pregnancy in the domestic Cow (Bos taurus) and a brief Discussion of cyclical ovarian Changes.“ (Journ. of Am. Vet. Med. Ass. 1927, 72, S. 286.)

Das Corpus luteum einer tragenden Kuh unterscheidet sich makroskopisch nicht vom völlig entwickelten gelben Körper eines nicht trächtigen Tieres. Auch Messungen ergaben keine Abweichungen. Mikroskopisch lassen sich etwa vom fünften Trächtigkeitsmonat ab retrogressive Zellveränderungen nachweisen, doch sind sie so gering, daß bis zur Geburt keine Größenabnahme des gelben Körpers erfolgt. Nach dem Partus schreiten die retrogressiven Veränderungen ungeheuer schnell fort. Am sechsten Tage nach der Geburt ist das Corpus luteum bis auf ein Viertel der früheren Größe zurückgegangen. Die retrogressiven Vorgänge stimmen augenscheinlich mit denen bei dem gelben Körper nicht trächtiger Tiere überein.

Wetzel.

Huber, A.: Kastration bei Ovarialblutung. (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 614—615.)

Anlässlich der Entfernung eines gelben Körpers des einen oder der Zysten des andern Ovars entstand eine starke Blutung. Zur Stillung wurde am bereits liegenden Tiere beiderseitig kastriert. Außerdem Hexeton und ca. 1½ Liter physiologische Kochsalzlösung gegeben. Nach drei Tagen ist eine Besserung, nach fünf Tagen Heilung eingetreten. Drei Wochen nach der Operation war die Milchleistung wieder auf 14 Liter gestiegen, der Nährzustand sehr gut.

H. Graf.

Schilling, S. J. and Bleeker, Wm L.: An investigation on the production of B. Abortus aggrassin. (Journal of Infect. Diseases 1927, 40, S. 469.)

Die Injektion virulenter Abortusbakterien in die Bauchhöhle ließ die Versuchsmeerfischweibchen schnell zugrunde gehen. Das dadurch gewonnene Abdominalexudat steigerte die pathogene Wirkung gleichzeitig applizierter Bakterien nicht und erzeugte keine Immunität. Es konnten also Aggressive nicht nachgewiesen werden. Schoop.

Schmid, G.: Zur Kenntnis der pathologisch-histologischen Veränderungen bei der Retentio secundinarum des Rindes. (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 530—531.)

Die histologischen Veränderungen sind noch wenig beschrieben. Die Karunkeln und Kotyledonen bilden einen Komplex, beim Rinde als Semiplazentom (Strahl) bezeichnet. Es zerfällt in ein kugelig geformtes Gebilde und einen handförmigen Stiel, der sich in ersterem als Septen fötalwärts verzweigt. Die Chorionteile fügen sich in die dadurch gebildeten Räume ein. Die Erhebungen entsprechen den materiellen Septen. Nach Andersen unterscheidet man vom Plazentomstiel fötalwärts: subepitheliale Schicht, Wachstums-, Umwandlungs- und Rückbildungszone. — Das mütterliche Stoma bildet später unter Gefäßvermehrung baumartig verästelte Septen, die aus Fibrillen bestehen. Das fötale Stroma besteht aus Gallertgewebe, das später in den Hauptstämmen in Faserbindegewebe umgewandelt wird; das fötale Epithel ist zunächst zylindrisch, ändert dann seinen Charakter, bleibt aber größer als das mütterliche (Ledermann). Nach Pomayer bleibt das fötale Stroma gallertig. Die maternalen Septen enthalten ein sehr weiches Bindegewebe. Das maternale und fötale Epithel liegen direkt, ohne Zwischensubstanz auf einander. Ähnliche Befunde, mit einzelnen Abweichungen, haben auch Lehmann und Gellmann beigebracht. Die Untersuchungen Verfassers haben ergeben: Die durch besondere Bindegewebszüge gestützten Gefäße des Plazentoms sind Kapillaren, aber auch Arterien und Venen. Die großen ein- und zweikernigen Zellen findet man (besonders einkernig) auch in dem Epithel der P. fötalis. Pathologisch: hat man Veränderungen am Plazentom im Stroma der P. materna, P. fötalis im Verhalten der Leukozyten und der Durchblutungsgröße. Daraus leitet S. zwei Retentio-Formen ab: 1. bestimmt durch entzündliche Veränderungen an der Pl. materna und 2. bestimmt durch entzündliche Veränderungen an der P. materna und P. fötalis. Im ersten Fall hat man seröse Durchtränkung, Fibrillenbildung, Leukozytenansammlung, Thrombose mit Intimafschwellung, Hyperämie, Epithelabstoßung, Fibrinbildung. Später Nekrose, kollabierte Gefäße mit Degeneration der Wandung. Im zweiten Fall hat man ähnliche Veränderungen der Pl. materna, wobei die Erscheinungen je nach der Bakterienwirkung verschiedengradig sein können. Die Foetalplazenta zeigt seröse Durchtränkung, Bindegewebsfaserbildung, Chorionödem, Hyperämie, Degeneration und Bruch der Gefäße, mitunter bedeutende Blutung, gelegentlich Verkalkung. Bei der Untersuchung der Ursache des Zurückbleibens der Nachgeburt = Pl. foetalis konnten indessen Verwachsungsprozesse histologisch nicht nachgewiesen werden. Sie müßte sich durch einleitende Epithelzerstörung beider Plazenten anzeigen. Verf. hat aber die Trennungslinie auch in solchen Fällen stets feststellen können, oder dann aber zwischen beiden Geweben eine gleichartig nicht abgesetzte Zone. Die Retentio beruhte in diesen Fällen auf Verbreiterung der mütterlichen oder beider Plazenten, die auf eine Einklemmung der fötalen deuten muß. Bei beiderseitiger Erkrankung muß diese naturgemäß am stärksten sein. Bei der Ablösung wird oft auch maternales P.-gewebe mit entfernt, denn bei spontan abgehenden Eihäuten hat Verf. nie maternale Gewebe gefunden. 3 Abbildungen.

H. Graf.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Borowskaja, D.: Die Meinicke-Trübungsreaktion mit gefärbtem Antigen. (Aus dem Bakteriolog. Zentral-Staatsinstitut zu Moskau.) (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 105, S. 455, 1928.)

Allen derartigen Reaktionen ist die Unsicherheit der Ablefung eigen, da es mitunter schwer fällt, zu entscheiden, ob winzige Flocken spezifisch sind oder nicht. Verf. kam daher auf den Gedanken, letztere durch Färbung besser sichtbar zu machen. Es gelang ihm dies dadurch, daß er den Farbstoff dem Antigen zusetzte, aus dem derselbe dann durch Adsorption in die Flocken übergang, während die Flüssigkeit sich entfärbte. Die Ergebnisse der mit einer farbigen Tafel ausgestatteten Arbeit sind folgende:

1. Viktoriablau besitzt ausgesprochene elektive Verwandtschaft zu den bei der Meinicke-Trübungsreaktion entstehenden Flocken und kann deswegen zur Färbung des Antigens verwendet werden. 2. Bei der Ablefung der Resultate der Reaktion ist der Unterschied zwischen den positiven und negativen Serien scharf ausgesprochen. 3. Die Einwirkung des Chloroforms kann zur Kontrolle der Ausflockung insbesondere zur Ermöglichung der Verwendung trüber und hämoglobin- oder ikterisch gefärbter Sera verwendet werden. Carl.

Pick, F.: Eine neue Anwendungsweise der gebräuchlichen Agarnährböden. (Aus der Prosektur des Krankenhauses der Wiener Kaufmannschaft.) (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 105, S. 309, 1928.)

Verf. hat die Beobachtung gemacht, daß, wenn man flüssigen Agar im Reagenzglas in „axiale Rotation“ verletzt, sich unter allmählichem Erstarren ein gleichmäßig geformter Agartrichter bildet. Praktisch wird dies in der Weise ausgeführt, daß man ein 1½ bis zwei Querfinger hoch mit heißem Agar gefülltes Reagenzglas in eine Hülse steckt, die senkrecht auf der Achse der Zentrifuge bzw. auf den Tourenmesser aufgesetzt ist, und nun bei 3000 Umdrehungen den Apparat laufen läßt. Nach 5—6 Minuten Rotierens ist der Nährboden in Trichterform erstarrt. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, daß die innere Oberfläche des Agartrichters etwa 2½mal so groß ist wie Schrägagar gleicher Höhe. Es ist so möglich, mehr Kulturmateriel zu erhalten. Nimmt man weniger Agar, so legt sich dieser fast zylindrisch in dünner Schicht an die Glaswand an. Diese Modifikation des Verfahrens kann zur Keimzählung nach v. Esmarck benutzt werden. Wenn man nach Erreichung der vollen Tourenzahl flüssige Kohlensäure gegen die Metallhülse strömen läßt, so bildet sich der Agartrichter schon nach etwa einer Minute. Verf. verspricht sich von der Anwendung des Verfahrens in der bakteriologischen Technik manche Vorteile. Carl.

Yakimoff, W. L.: Die Piroplasmose und Kokzidiose des Rindes. (Aus der Protozoologischen Abteilung des Veterinär-Bakteriologischen Instituts zu Leningrad.) (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 105, S. 411, 1928.)

Nach vielen Autoren gehört die Blutruhr (Dysenterie) zu den Symptomen der Rinderpiroplasmose. Verf. konnte dagegen nachweisen, daß in Fällen der letzteren Krankheit die Exkremente der betr. Tiere regelmäßig Oozysten von Kokzidien enthielten. Er schließt daraus, daß letztere die Ursache der blutigen Darmausscheidungen darstellen. Durch die Piroplasmose wird oft eine in latentem Zustande befindliche Kokzidiose verschärft, so daß sogar der Tod des Tieres eintreten kann. Carl.

Gundel, M.: Über den Antagonismus von Coli-Bakterien auf Milzbrandbazillen. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 104, S. 463, 1927.)

Durch frühere Versuche konnte Verf. nachweisen, daß Coli-Bakterien in Kulturen Staphylokokken vernichteten. In vorliegender Arbeit wird das Verhalten jenes Mikroorganismus gegenüber dem Milzbrandbazillus näher untersucht, wobei von letzterem 22 Stämme verschiedener Herkunft Ver-

wendung fanden. Die gefundenen Ergebnisse sind folgende:

1. Auf festen und flüssigen Nährmedien verhalten sich die Coli-Bakterien den Milzbrandbazillen gegenüber als Antagonisten. 2. In den künstlichen Nährsubstraten erfolgt eine Abtötung der Milzbrandbazillen durch die Coli-Bakterien. 3. Auf Grund der bisherigen Tierversuche sind wir zu der Annahme berechtigt, daß auch in vivo Antagonismus der Coli-Bakterien auf die Milzbrandbazillen statt hat. Weitere Untersuchungen über diese Frage sind jedoch noch erforderlich und in Angriff genommen. 4. Eine Erklärung der antagonistischen Wirkungsweise der Coli-Bakterien konnte bisher nicht gefunden werden. 5. Die weiteren Fragestellungen, die sich aus unseren bisherigen Untersuchungen ergeben, werden kurz besprochen (Ausnutzung des fraglichen Antagonismus zur Abtötung der Milzbrandbazillen in gewerblichen Betrieben, therapeutische Beeinflussung des Milzbrandes beim Menschen und bei Tieren durch Coli).

Carl.

Wámoscher und Stoecklin: Infektionsversuche mit einzelnen Tuberkelbazillen, durchgeführt mit der mikroskopischen Methode. Vortrag gelegentlich der 12. Tagung der Deutschen Vereinigung für Mikrobiologie in Wien 1927. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 104, S. 86, 1927.)

Wámoscher konnte schon früher durch mit dem Péterfischen Mikromanipulator vorgenommenen Versuchen nachweisen, daß die weiße Maus unter Umständen einer subkutan ausgeführten Infektion mit einem einzigen Pneumokokkus, Streptokokkus oder Milzbrandbazillus erliegt, wenn man maximal, virulente Stämme zu diesem Zwecke benutzt. Die Mortalität der mit je einem derartigen Erreger infizierten Tiere belief sich auf 42, 32 bzw. 28 Prozent. Nachdem es Wámoscher in einem analogen Versuche gelungen war, einige Meerfischweichen mit einzelnen Keimen einer humanen Tuberkelbazillenkultur ebenfalls zu infizieren, wurden weitere umfangreiche derartige Experimente in Gemeinschaft mit Stoecklin angestellt. Die Autoren benutzten dazu zwei verschiedene als virulent bekannte Tuberkelbazillensämme des Typus humanus. Bei dem einen Stamm gelang der Infektionsversuch mit einem Keim in 40 Prozent der Fälle, während sämtliche Tiere des Versuches mit dem zweiten Stamme auf die angegebene Weise nicht tuberkelkrank gemacht werden konnten. Verff. führen dieses Ergebnis darauf zurück, daß in der zweiten, zehn Tage älteren Kultur schon sehr viele abgestorbene Individuen vorhanden waren.

In praktischer Beziehung beweisen diese Versuche, welcher großen Wert das Tierexperiment gerade am Meerfischweichen in solchen Fällen besitzt, wo mikroskopisch in Krankheitsprodukten, Nahrungsmitteln usw. Tuberkelbazillen nicht ohne weiteres nachweisbar sind. Es darf jetzt angenommen werden, daß schon ein unverfälschter Tuberkelbazillus zum positiven Ausfall des Tierexperiments genügt. Es eröffnet sich damit ein neuer Weg zur quantitativen Virulenzbestimmung.

Carl.

Kleinsorgen, W. und Jusatz, H.: Empfehlung eines 3prozentigen Rindergallezusatzes zum Endo-Nährboden zwecks Verhütung einer Überwucherung der Kulturen durch Bact. proteus auf Grund einjähriger praktischer Bewährung. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 104, S. 439, 1927.)

Bei der Suche nach einem Mittel gegen die oben angegebene unangenehme Eigenschaft des Bac. proteus gingen Verff. von der Voraussetzung aus, daß letzterer Mikroorganismus ein Fäulniserreger ist und daß aus diesem Grunde fäulniswidrige Mittel am ersten zum Ziele führen müßten. Nach zahlreichen Mißerfolgen mit verschiedenen derartigen Substanzen wurde bei Anwendung von Galle schließlich ein in jeder Beziehung befriedigender Erfolg erzielt. Ein Zusatz von sterilisierter Rindergalle in der Menge von 3 Prozent zu gewöhnlichem Endo-Nährboden verhin-

derte im Gegensatz zu den Kontrollplatten das Überwuchern des Proteus. Reinkulturen von Typhus, Paratyphus usw. zeigten auf der Galleplatte eher ein besseres Wachstum wie auf den Platten ohne Gallezusatz, so daß in vielen Fällen die rechtzeitige Feststellung des Erregers nur mit Hilfe der Galle-Endo-Platte möglich war. Verff. kann daher den vorliegenden Nährboden für die praktische Ausführung der Typhus-Diagnose aufs wärmste empfehlen.

Carl.

Kolle, W.: Aktive Immunisierung und Schutzimpfung. Vortrag gelegentlich der 12. Tagung der Deutschen Vereinigung für Mikrobiologie in Wien 1927. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 104, S. 90, 1927.)

Großzügige Darstellung des gesamten Gebietes unter Bezugnahme auf die einschlägigen Verhältnisse in der Veterinärmedizin. Der Vortragende gelangt am Schluß seiner Darstellung zu folgender, auch für die Veterinärmedizin wichtigen Zusammenfassung:

Neue Prinzipien sind in allen in den letzten 10 Jahren veröffentlichten Arbeiten, die sich mit aktiver Immunisierung befassen, nicht zu finden. Jedoch sind vielfach die alten Grundsätze mit neuen, Fortschritte bedeutenden Verfahren angewandt worden, und es wurden mancherlei Ergebnisse gezeitigt, die theoretisch wichtig sind oder praktische Erprobung gefunden haben, wenn auch ein abschließendes Urteil nicht in allen Fällen möglich ist. Die Jenner'sche Impfung gegen Pocken steht auch heute noch einzig und unerreicht da, was Schutzimpfungsverfahren gegen Erkrankungen des Menschen betrifft. Wir wollen aber die wertvollen experimentellen Arbeiten, die neue Probleme aufgerollt haben, und Aussicht auf Erfolg bei der Bekämpfung gefährlicher Infektionskrankheiten erkennen lassen, nicht gering veranschlagen. Hierzu sind zu rechnen namentlich die Versuche, eine aktive antitoxische Immunität bei Diphtherie herzustellen. Neben den Serum-Toxingemischen spielen die Toxoide, auch Anatoxine — übrigens ein unnötiger neuer Name — genannt, oder, wie ich sie nennen möchte, die Formoltoxine vielleicht in Zukunft die größte Rolle. Dasselbe gilt für die Scharlachimmunisierung mit Hilfe der Streptokokkentoxine oder von Formolimpfstoffen. Über die Dauer der Schutzwirkung fehlt es noch an genügenden Erfahrungen.

Die Möglichkeit der oralen Verabreichung von abgetöteten Antigenen, die auf enteralem Wege zur Resorption gelangen, ist bewiesen. Bei dem Studium dieser peroralen Immunisierungsmethode hat sich gezeigt, daß hier keine neue Art von lokaler Gewebsimmunität oder histogener Unempfindlichkeit vorliegt, sondern daß auch hier die gleichen Antikörper, wie sie nach parenteraler Zufuhr entstehen, als Folge einer Allgemeinreaktion durch Resorption vom Darmtraktus aus gebildet werden. Die perorale Immunisierung kann bei Dysenterie, ferner auch bei Cholera, wenn sie mit subkutaner Zufuhr von Antigenen kombiniert wird, eine Rolle spielen.

Das Studium der Immunisierung mit abgeschwächten Infektionsstoffen zusammen mit Zufuhr von Serum bedarf bei den menschlichen Infektionen auch weiteren Studiums und Ausbaues. Die orale Zufuhr von abgeschwächten Tuberkelbazillen bietet Aussicht auf Erfolg, ist aber für die allgemeine Verwendung noch nicht spruchreif, weil die Gefahr, daß die peroral infizierten Individuen später an Tuberkulose infolge der zwecks Schutzimpfung per os eingeführten Bazillen erkranken, noch nicht als widerlegt anzusprechen ist. Versuche an Kälbern sollten in größtem Umfange durchgeführt werden, um zunächst für die Veterinärmedizin ein abschließendes Urteil über den praktischen Wert des Verfahrens zu gewinnen.

Die kritische Betrachtung der älteren Immunisierungsmethoden mit abgetöteten Erregern zeigt mit Sicherheit und Eindeutigkeit, daß sie einen Schutz verleihen. Dieser Schutz

ist allerdings kein absoluter und ist auch zeitlich begrenzt, aber er ist sicher vorhanden und hat auch bei der Bekämpfung der Cholera und des Typhus sich nicht nur im Kriege, sondern auch im Frieden als wertvoll erwiesen. Die aktive Immunisierung mit abgetöteten Erregern ist vielleicht durch die Zufuhr von abgeschwächten oder virulenten Erregern zu ergänzen, um auf diese Weise die Grundimmunität der mit abgetöteten Mikroorganismen vorbehandelten Individuen zu erhöhen.

Carl.

Standesangelegenheiten.

Landesgruppe Nordwestdeutschland im Reichsverband der deutschen Gemeinde-Tierärzte.

Hauptversammlung am 12. und 13. Mai 1928 in Lüneburg.

Die bereits am Nachmittag des 12. Mai in Lüneburg eingetroffenen Mitglieder besichtigten zunächst die Schlachthofanlagen in Lüneburg und machten alsdann unter Führung von Stadtveterinär Dr. Brinkop einen Rundgang durch die Straßen der alten, ehemals mächtigen Handelsstadt. Am Abend fand im Hotel Deutsches Haus eine Vorversammlung statt zur Erledigung interner Verbandsangelegenheiten. In seinem Geschäftsbericht gedachte der Vors. Kormann-Nienburg des 25. Berufsjubiläums der Mitglieder: Landestierarzt und Oberveterinär Dr. Elsässer-Bremen und der Polizeitierärzte Dr. Haferkorn und Dr. Ebeling-Altona. Als Vertreter der Landesgruppe für die Jubiläumsfeier der Hochschule Hannover wurde Kollege Kormann bestimmt. Die in der Landesgruppe gesammelten Gelder für die Jubiläums-Spende wurden dem Reichsverbande überwiesen, und sollen durch den Vors. des Reichsverbandes der Hochschule übergeben werden. Das Rundschreiben des Reichsverbandes an die Landesgruppen wurde durch beraten und die Beantwortung festgelegt. Da Dr. Hafemann den Wunsch geäußert hat, von seinem Amt entbunden zu werden, wurde ihm das Vertrauen der Landesgruppe Nordwest-Deutschland ausgesprochen und es wurde einstimmig beschlossen, ihn zu bitten, den Vorsitz im Reichsverbande beizubehalten. Der Jahresbeitrag wurde auf 20,— RM. festgesetzt, worin die Beiträge für den Reichsverband, die Preußengruppe, den D.V.R. und die Gesellschaft der Freunde der Hochschule enthalten sind. Die Vorstandswahl ergab die Wiederwahl der Kollegen Kormann-Nienburg, Brandt und Fobbe-Hannover. Der Kassenführer Dr. Brandt bittet, den Beitrag auf sein Postcheckkonto Hannover Nr. 6116 möglichst bald einzuzahlen. Als Tagungsort der nächsten Hauptversammlung wurde auf Einladung des Kollegen Dr. Sosa Oldenburg bestimmt. Anschließend hielt Dr. Schröder, Oberassistent am pathol.-anat. Institut, einen Vortrag über „Die Verwendung des Trichinoskops in der Nahrungsmittelkontrolle mit besonderer Berücksichtigung der histologischen Wurstuntersuchung“. Der Vortrag war für die Hauptversammlung am 13. Mai vorgesehen, er mußte aber an dieser Stelle gehalten werden, da der für die Hauptversammlung bestimmte Saal eine Verwendung des Projektionsapparates nicht zuließ. Der Inhalt des Vortrages wird an anderer Stelle veröffentlicht werden; auch wird das in dem Vortrage behandelte Thema in Form eines Sonderdruckes demnächst herausgegeben werden. Der überaus eingehende und lehrreiche Vortrag, der durch zahlreiche Projektionswiedergaben von Präparaten, die aus den verschiedensten Wurstarten hergestellt waren, erläutert wurde, fand reichen Beifall. Die im pathol.-anat. Institut der Hochschule Hannover unter Prof. Dr. Lund ausgearbeitete Methode zur Feststellung von Wurstverfälschungen läßt sich in jedem Schlachthof-Laboratorium ausführen. In der Diskussion wurde vorgeschlagen, mit Prof. Dr. Lund in Verhandlung zu treten, ob nicht eine Belieferung der Laboratorien mit Vergleichsmaterial aus dem Hochschulinstitut ermöglicht werden kann. Ferner wurde als ein bemerkenswerter Vorgang mitgeteilt, daß die von den Gemeinden eingerichteten bakt. Laboratorien im Rheinlande durch Regierungsverfügung als öffentliche Anstalten im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes anerkannt sind. Die Hauptversammlung am 13. Mai fand im Traubensaal des Lüneburger Rathauses statt. Vorauf ging eine Besichtigung des altherwürdigen Gebäudes mit seinen zahlreichen Kunstschätzen und Erinnerungen aus vergangenen Jahrhunderten. Kreistierarzt Dr. Leyer, Direktor der Auslands-Fleischbeschau in Bremerhaven: „Frische und zubereitete Fische und ihre Kontrolle“. Einleitend wurde darauf hingewiesen, daß in den Unterweserhäfen Wesermünde und Bremerhaven die vor Jahresfrist angeregte

Kontrolle der zur Auktion gebrachten Seefische auf Betreiben der Handelskreise, insbesondere der inländischen Weiterverkäufer, bereits durchgeführt ist. Es ist nunmehr Sache der Veterinärbehörden, in den anderen Fischereihäfen Deutschlands einen gleichen Dienst durchzuführen. Die Kontrolle ist in der Hauptsache eine Prüfung der Ware auf ihren Frischzustand, wobei in Zweifelsfällen der betr. Kiste Fische entnommen werden müssen. Man prüft die Kiemen, den Geruch, die Festigkeit des Fleisches und insbesondere die Bauchdecken. Zu berücksichtigen ist hierbei, daß vielfach die Fische durch das Aufeinanderliegen infolge des nicht geringen Gewichtes und des Schaukelns der Dampfer stark gedrückt werden können, was nur in den seltensten Fällen zu einer Beanstandung führen wird. Desgleichen ist der Zustand der Augen durchaus nicht von so ausschlaggebender Bedeutung, wie dies in den Lehrbüchern angegeben ist. Auch diese Organe erleiden durch den Druck beim Transport Quetschungen, weshalb sie vielfach gedunsen und eingefallen erscheinen und Trübungen erlitten haben, ohne daß deshalb der Fisch genußuntauglich geworden ist. Auch die Rote der Kiemen kann für sich allein keineswegs für die Beurteilung von ausschlaggebender Bedeutung sein, da dieses Organ, zumal bei Plattfischen, die in der Tiefe des Meeres auf dem Boden ihr Dasein führen, durch den aufgewühlten Schlamm beschmutzt werden und dann bald einen schmierigen Belag haben. Die Totenstarre ist bei Seefischen, die in der Regel bei der Löschung mindestens einige Tage alt sind, nicht mehr vorhanden, kann also für die Frage der Genußtauglichkeit überhaupt nicht herangezogen werden. Sind hingegen die Bauchdecken mit einem pappigen Belag versehen, der unangenehm riecht, so wird dieser Befund den Sachverständigen aufmerken lassen. Das Fleisch ist bei verdorbener Ware von geringer Festigkeit, nimmt Fingerindrücke an, die längere Zeit bestehen bleiben. Für die Kontrolle im Inlande wird die Entscheidung noch schwieriger, da die Fische vielfach vor dem Versand geköpft werden, und daher ist in Zweifelsfällen eine Koch- und Kostprobe vorzunehmen, welche immer ein zweifelsfreies Urteil ergeben wird. Die Gräten sind auf Schwärzung zu prüfen. Im Gegensatz zu gekochten frischen Fischen, deren Haut beim Abziehen im Zusammenhange bleibt, ist diese bei in Zerfetzung begriffener Ware mürbe und leicht rissig. Unter der Haut sehen wir dann eine glasige, schmierige, gelbliche Masse von unangenehmem Geruch, die in vorgeschrittenen Fällen in das Körperfleisch sich fortsetzt. Derart veränderte Fische sind immer dem Verkehr zu entziehen. — An Hand von Tafeln wurden dann die einzelnen Fischarten demonstriert und den Zuhörern je ein „Seefisch-Bilderbuch“ des Deutschen Fischerei-Vereins ausgehändigt, um auch später an Hand dieser Schrift die einzelnen Arten auseinanderhalten zu können. Auffallend ist, daß im Handel viele Arten den gleichen Namen führen, wodurch eine Verwirrung entsteht, zumal an den verschiedenen Auktionsplätzen hierüber kein Einverständnis herrscht. In dieser Beziehung muß unbedingt Wandel geschaffen werden, wobei die Zusammenarbeit der Zoologen und der Handelskreise unerläßliche Voraussetzung ist. Für jeden einzelnen Fisch muß neben seinem wissenschaftlichen (lateinischen) Namen ein deutscher Name festgesetzt werden, unter dem allein er gehandelt werden darf, um eine Übervorteilung der Konfumenten möglichst auszuschalten. Die größte Verwirrung herrscht in dieser Beziehung bei den Plattfischen. Insbesondere besteht eine Neigung dazu, billigeren Massenfischen die Namen von edleren Arten beizulegen, um höhere Preise zu erzielen. Für die Preisgestaltung ist auch die Herkunft der Fische, ob in der Nordsee, dem Isländischen oder dem Weißen Meer gefangen, von großem Einfluß, weil die Fische aus der Nord- und Ostsee allgemein für qualitativ besser gehalten werden, als diejenigen aus den nördlicheren Meeren. Die in der Nahrungsmittelkontrolle tätigen Tierärzte haben die Pflicht, darauf zu achten, daß Übervorteilungen der Käufer möglichst ausgeschaltet werden, weshalb sie in der Lage sein müssen, die einzelnen Arten der Fische auseinanderhalten zu können. — Übergehend zu den Methoden zur Konservierung der Fische werden alsdann die einzelnen Verfahren eingehend geschildert. Die Herstellung von Stock- und Klippfischen ist eines der ältesten Erhaltungungsverfahren. Große Mengen von Fischen werden als Räucherware dem Konfum zugeführt. Wir unterscheiden die Kalträucherei von der Warmräucherei, je nachdem ob gefalzene oder frische Ware verarbeitet wird. Geräucherte Fische sind während des Transportes weit größeren Gefahren ausgesetzt als die frischen Fische. Bei schwüler Witterung können daher Räucherwaren, welche zu warm zum Versand gelangen, in schlechtem Zustande am Bestimmungsort ankommen. Vielfach werden die Räucherfische auch von Schimmelpilzen befallen und dadurch

mehr oder weniger genußuntauglich. Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, daß durch den Rauch die Gräten bis zu einer gewissen Tiefe geschwärzt werden. Marinier-Erzeugnisse haben im Gegensatz zu konservierten Fischen nur eine geringe Haltbarkeit und müssen daher möglichst schnell verzehrt werden. Großen Einfluß auf die Haltbarkeit dieser Präserven hat die Witterung. Während im Winter bei sachgemäßer Lagerung diese etwa 2—3 Monate aufbewahrt werden können, werden sie im Sommer unter Umständen schon nach einigen Wochen in Verderbnis übergehen. Die Erzeuger kommen in der heißen Jahreszeit durchweg nur für eine 8—10tägige Haltbarkeit der Marinaden auf. Fischmarinaden, deren Beschaffenheit nicht mehr völlig den Anforderungen genügt, sind sehr leicht zu erkennen, so daß eine Gefahr durch den Genuß verdorbener Dosenfische nicht besonders groß ist. Verdorbene Ware wird breiartig und nimmt sofort einen widerlichen Geruch und Geschmack an, während unverdorbene Ware in ihrer Festigkeit, Aussehen, Geruch und Geschmack einwandfrei bleibt. Bakterielle Bombagen sind zurückzuführen auf die Tätigkeit gasbildender Bakterien. Beim Antechen entweicht aus der Öffnung ein widerlich riechendes Gas und eine schmierige Flüssigkeit. Chemische Bombagen sind meist auf mangelhafte Verzinnung des Dosenmaterials zurückzuführen. Beim Öffnen entströmen Gase, die in der Hauptsache aus Wasserstoff und Kohlenäure bestehen. Die inneren Dosenanteile sind mehr oder weniger stark angegriffen; im Doseninhalt bemerkt man öfters Lackteilchen oder Zinnstückchen. Im Anfangsstadium kann der Inhalt einwandfrei geblieben sein, weshalb der Inhalt chemisch bombierter Dosen nicht ohne weiteres als verdorben bezeichnet werden kann. Anders liegt die Sache bei sterilisierten Fischkonserven (Sardinen in Öl, Dosenhummer usw.), bei welchen das Bombieren stets ein Zeichen dafür ist, daß der Doseninhalt verdorben ist. Weitere Bombagen können dadurch entstehen, daß bei der Fabrikation die Marinaden zu kalten Temperaturen ausgesetzt wurden (Zellular-Kältebombagen). Bei diesen dehnt sich beim Verbringen der Dosen in eine wärmere Umgebung der gesamte Inhalt aus, weshalb diejenigen Teile, welche dem Druck am leichtesten nachgeben, nach außen sich vorwölben. Bei diesen ist der Inhalt meist völlig einwandfrei. Das Sterilisieren wird weniger in Deutschland ausgeführt als in Frankreich, Spanien usw., wo hauptsächlich Sardinen in Öl hergestellt werden. In neuester Zeit werden die Massenfische auch durch Kälte haltbar gemacht. Fast ausschließlich kommt das allgemein bekannte Ottesen'sche Verfahren zur Anwendung, das vielleicht einmal in der Zukunft den Fischmarkt beherrschen wird.“ Im Verlauf der Besprechung dieses Vortrages wurde ein Antrag angenommen, den Vorstand des Reichsverbandes zu ersuchen, einen mehrtägigen Ausbildungskursus in der behandelten Materie unter Zuziehung von weiteren Sachkennern und Wissenschaftlern herbeizuführen. Mit der Durchführung eines solchen Lehrganges soll alsdann Dr. Leyer beauftragt werden. In der Diskussion wurde weiter eine allgemein interessierende Nebenfrage behandelt und zwar die Verfütterung von entfettetem Fischmehl an Schweine. Niens-Wefermünde berichtete, daß unter seiner Kontrolle bei zahlreichen Schweinen Fütterungsversuche mit 25 Prozent Futterzusatz von entfettetem Fischmehl bis zur Schlachtung angestellt wurden. Die Schweine zeigten sehr guten Fleisch- und Fettansatz und das Fleisch ließ keinerlei tranigen und fischigen Geschmack und Geruch wahrnehmen, wie er nach Verfütterung des gewöhnlich im Handel befindlichen nicht entfetteten Fischmehls in der Regel aufzutreten pflegt.

Stadtveternärat Brinkop-Lüneburg: „Aufhebung oder Abänderung des § 5 des Preuß. Gesetzes betr. Ausführung des Schlachtvieh- und Fleischbeschau-Gesetzes und § 7 der Preuß. Ausf.-Best. betr. die Schlachtvieh- und Fleischbeschau im Inlande“. Im November v. Js. hatte Dr. Machens-Elze in der Hauptversammlung des Niederfächsischen Tierärztekongresses in Hannover über obiges Thema gesprochen und eine Resolution vorgeschlagen, die die Aufrechterhaltung der §§ 5 und 7 forderte. Auf Einspruch mehrerer Kollegen wurde die Abstimmung über diese Resolution ausgesetzt und eine nochmalige Besprechung der schwebenden Frage für die diesjährige Hauptversammlung der Niederfächsischen Tierärzte vorgesehen. Kollege Brinkop brachte nun in seinen Ausführungen den Standpunkt der Gemeinde-Tierärzte zum Ausdruck. Redner gab zunächst einen kurzen historischen Rückblick auf die Entstehung des Fleischbeschau-Gesetzes und erinnerte daran, daß die umstrittene Bestimmung der Freizügigkeit des tierärztlich untersuchten Fleisches in dem Regierungsentwurf nicht enthalten gewesen ist, daß vielmehr diese Bestimmung aus der Mitte des Landtages und Herren-

hauses heraus trotz der Einwendung der Regierung in das Gesetz hineingebracht wurde, mit der Absicht, dem Landwirt den Absatz des auf dem Lande gewonnenen Fleisches zu erleichtern. Die Gründe, die die Stadtgemeinden veranlaßt haben, für die Aufhebung des § 5 d. A.G. einzutreten, sind finanzieller und sanitärer Art. Es ist erwiesen, daß z. B. Berlin und andere Großstädte in den Industriebezirken durch die freie Einfuhr von Fleisch aus dem umliegenden Lande ganz erhebliche Ausfälle an Schlachtgebühren haben; zwingender für die Städte sind aber die sanitären Belange. Unter der Herrschaft des § 5 A.G. ist den Schlachthofgemeinden und besonders den Großstädten so gut wie jede Möglichkeit genommen, darüber zu wachen, daß nur hygienisch einwandfreies Fleisch in den Verkehr gelangt. Der Wunsch der Städte nach Aufhebung des § 5 wird durch den Deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflege, die Berliner medizinische Gesellschaft und den Zentralverband der Fleischer unterstützt. Der Tierärztekammer-Ausschuß in Preußen hat in seiner Sitzung vom 4. Juni 1924 eine Entschließung angenommen, nach der er die Freizügigkeit des tierärztlich untersuchten Fleisches nicht antaaten lassen will; er erhebt aber gegen die zwangsmäßige und gebührenpflichtige Vorlegung auch des tierärztlich untersuchten Fleisches bei der Einfuhr in die Schlachthofgemeinden, lediglich zum Zwecke der Untersuchung des Verdorbenseins, keine Einwendungen. Bezüglich des § 7 A.B.I. führte Redner aus, daß der behandelnde Tierarzt niemals frei in seinem Urteile sein kann, er ist befangen und läuft Gefahr, mit seinem Gewissen in Konflikt zu kommen. Durch die obligatorische Einführung der bakteriologischen Fleischbeschau bei Notchlachtungen wird der behandelnde Tierarzt diesem Konflikte nicht entzogen. Bei negativem Befunde wird immer das Bestreben bestehen, dem Besitzer des Tieres möglichst entgegen zu kommen und Fleisch als tauglich in den Verkehr zu bringen, das mit Rücksicht auf den Krankheits- und Schlachtfund niemals als tauglich hätte abgestempelt werden dürfen. Zur Verhütung von Fleischvergiftungen hält Redner es für äußerst wichtig, daß alles Fleisch aus Notchlachtungen — wenn es nicht als untauglich befunden ist — möglichst schnell dem Verbrauch zugeführt wird. Das wird erreicht durch Minderwertigkeitserklärung und Verbringung auf die nächste Freibank. Im Anschluß an den Vortrag wurden folgende Entschließungen angenommen: 1. § 5 A.G. Abs. 2, Gemeindebeschlüsse finden auf das vorstehend bezeichnete frische Fleisch mit der Einschränkung Anwendung, als solches Fleisch an bestimmten Stellen und in bestimmten Größen zur Feststellung, ob es inzwischen verdorben ist oder eine gesundheitschädigende Beschaffenheit erlangt hat, vorzulegen und vor der Inverkehrgabe mit einem Kontrollstempel der Einfuhrgemeinde zu versehen ist. 2. Der § 7 A.B.I. ist aufzuheben. Es muß gefordert werden, daß die Untersuchung nur von Tierärzten ausgeführt wird, welche in ihrem Urteil frei und unbeeinflusst sind. 3. Das Fleisch aller wegen innerer Erkrankung notgeschlachteter Tiere, welche nach den geltenden Vorschriften der bakteriologischen Fleischbeschau zu unterwerfen sind, ist auch bei negativem bakteriologischem Befunde nicht als tauglich ohne Einschränkung zu begutachten.

Dr. Fobbe.

Verschiedene Mitteilungen.

Mitteilungen des deutschen Veterinäroffizierbundes (E. V.).

1. Höhergruppierung der Oberstabsveterinäre als Altpensionäre.

Die Angelegenheit der Höhergruppierung der O.-St.-V. als Altpensionäre, soweit sie nicht von der Verordnung des Reichsarbeitsministers vom 5. August 1925 erfaßt sind, ist nicht wesentlich weiter gekommen. Zur Zeit liegt die Beschwerde gegen die Nichterteilung eines berufungsmäßigen Bescheids an O.-St.-V. Dr. Berndt zur Wiederaufnahme des Verfahrens beim Verordnungsgericht Charlottenburg zur Prüfung und Entscheidung. Lehnt dieses die Beschwerde ab, so sind leider alle Rechtsmittel und Rechtswege erschöpft.

Wir hatten übrigens am 18. April 1928 eine Eingabe an den Reichsarbeitsminister gerichtet, den O.-St.-V. als Altverfürungsberechtigten, soweit sie nicht Pensionszuschüsse gemäß der Verordnung des R.A.M. vom 5. August 1925 beziehen, die gemäß § 27,1 des neuen Befoldungsgesetzes vom 16. Dezember 1927 stufende weitere Erhöhung von 8 Prozent zu ihrer Pension zu gewähren, weil sie auch zu denjenigen Altverfürungsberechtigten gehören, die bei der Einreihung in die Befoldungsordnung 1920 in der Eingangsgruppe verblieben sind. Mündliche

Verhandlungen mit der zuständigen Stelle haben stattgefunden. Die Entscheidung steht noch aus.

2. Höhergruppierung der kriegsbeschädigten Stabsveterinäre, Oberveterinäre und Veterinäre.

Auf Grund des Spruchs des großen Senats des R.V.G., wonach den kriegsbeschädigten Offizieren gemäß § 10 Abs. 1 des O.P.G. als pensionsfähiges Dienstfeinkommen der Gehalt der höchsten Klasse ihrer Stelle anzurechnen ist, hat der Reichsfinanzminister in Ergänzung seiner Verordnung vom 8. Januar 1925 auf Grund des § 8 der P.E.G. am 16. März 1928 (R.G.Bl. 7 Nr. 40 I B 1482) folgende Einstufung ageordnet:

Leutnants	in Befoldungsgr. A VII, 7,
Oberleutnants, Assistenzärzte und Veterinäre	in Befoldungsgr. A VIII, 4,
Oberärzte, Oberveterinäre	in Befoldungsgr. A IX, 3,
Hauptleute, Stabsveterinäre usw.	in Befoldungsgr. A X, 5.

Eine günstigere Einstufung, die sich nach den allgemeinen bisherigen Vorschriften ergibt, würde hierdurch nicht berührt.

Für die beteiligten Veterinäroffiziere, also solche mit anerkannter Kriegsdienstbeschädigung, hat die Verordnung keine große Bedeutung, da ja die Veterinäre nach dem P.E.G. in Gruppe VIII, die Oberveterinäre in IX und die Stabsveterinäre ausschließlich in X eingruppiert sind. Immerhin wird der eine oder andere noch einen Vorteil davon haben. Die Regelung bezw. Nachzahlung der Gebühren ab 1. Januar 1923 erfolgt von Amtswegen ohne Zutun der Beteiligten.

3. Eingruppierung der G.O.V. als Chefveterinäre im Kriege nach XIII.

Nach dreijährigem Kampfe ist es endlich dem D.V.O.B. gelungen, die Eingruppierung des G.-V. a. D. Dr. Ludwig auf Grund der höheren Dienststelle im Kriege als Chefveterinär in Befoldungsgruppe XIII zu erringen. In seiner Sitzung am 16. März 1928 hat der 10. Senat der R.V.G. zu Recht erkannt unter Aufhebung des Urteils des Verforgungsgerichts Altona vom 20. Mai 1925, dem Kläger ab 1. Januar 1923 Ruhegehaltsgebührriffe aus Gruppe XIII zu gewähren. Die gleiche Angelegenheit in Sachen G.-V. a. D. Kammerhoff schwebt noch bei dem Verforgungsgericht Stettin. Es ist aber Aussicht vorhanden, daß sie anlässlich des Urteils des R.V.G. vom 16. März 1928 nunmehr auf dem Verwaltungswege geregelt wird.

Der I. Vors.: Wöhler, Generalveterinär a. D.

Tierärztlicher Verein der Neumark und Grenzmark.

Verammlung Sonntag, den 1. Juli d. Js., 11 Uhr, im großen Hörsaale der Preuß. Landwirtschaftlichen Versuchs- und Forschungsanstalten in Landsberg (Warthe), Theaterstraße 26. 1. Regierungs- und Veterinär Dr. Wiendieck: „25 Jahre Fleischbeschaugesetz“. 2. Professor Dr. Knuth: „Krankheiten des Wildes“ mit Demonstrationen. 3. Tagesfragen: Erfahrungen über die Leberegelbekämpfung; Richtlinien für die Milchkontrolle; Rotlaufimpfungen; Verrechnungsstelle u. a. — Um 15 Uhr gemeinsames Essen mit Damen und Gästen im „Hotel Vater“ am Markt, anschließend Gefelligkeit mit Tanz. Treffpunkt der Damen 11 Uhr im „Hotel Vater“. Gäste willkommen!

Landsberg a. W., den 15. Juni 1928.

Dr. Stickdorn, Schriftwart. Dr. Kurtzwig, I. Vors.

Bücherbesprechungen.

Die wichtigsten Krankheiten des Kaninchens mit besonderer Berücksichtigung der Infektions- und Invasionskrankheiten. Von Privatdozent Dr. O. Seifried-Gießen. Mit 54 Abbildungen im Text. München 1927. Verlag von J. F. Bergmann. Preis 15,— RM.

Es ist ein großes Verdienst Seifried's, sich der Mühe unterzogen zu haben, die zahlreiche, verstreute Literatur über Kaninchenkrankheiten zu sammeln und kritisch zu sichten und damit eine zusammenfassende, dem heutigen Stand der Wissenschaft entsprechende Darstellung der Materie zu geben. Hervorzuheben ist die übersichtliche Gliederung des Stoffes, die das Buch zu einem wertvollen Nachschlagewerk macht. Die zahlreichen, wohl gelungenen Abbildungen bilden eine glückliche Ergänzung des Textes. Anschließend an jedes Kapitel findet sich ein reichhaltiges Literaturverzeichnis, das dem Leser ein leichtes Quellenstudium vermittelt. Alle die, welche sich des Kaninchens als Versuchstier bedienen, werden das Erscheinen des ausgezeichneten Buches begrüßen. Wenn die Darstellung des Gegenstandes auch in erster Linie sich

den Forderungen des Wissenschaftlers und Experimentators anpaßt, so findet doch auch der in der Kleintierpraxis tätige Tierarzt hinsichtlich der Symptomatologie, Diagnose und Therapie der einzelnen Krankheiten viel wertvolles. Wetzel.

Anleitung für das Photographieren von Tieren. Von Oberveterinär Dr. Braun-Pfaffenhofen. Heft 22 der „Anleitungen der D.L.G.“ 2. Auflage. Preis für Mitglieder beim Bezuge durch die Hauptstelle der D.L.G., Berlin SW 11, Dessauerstr. 14. 3,70 RM. einschl. Porto. Auch im Buchhandel erhältlich.

Das Buch enthält eine Menge praktischer Erfahrungen und Richtlinien für die Herstellung naturgetreuer Aufnahmen von Tieren. Wer die Schwierigkeit der Materie kennt, wird das Erscheinen der Anleitungen sehr begrüßen. Der Stoff ist in die zwei Abschnitte „Allgemeine Tierphotographie“ und „Wissenschaftliche Tierphotographie“ gegliedert und berücksichtigt die neuesten phototechnischen Errungenschaften wie Stereophotographie, Kinomatographie, Farbenphotographie usw. Das Buch ist für das Gelingen einer wirklich einwandfreien Tieraufnahme von ungemein hohem Wert. Wetzel.

Entstehung und Grundlagen der Pelztierzucht in Deutschland. Von Dr. P. Schöps-Leipzig und Dr. E. Tänzer-Halle. Mit 15 Abbildungen und einer Landkarte. Heft 3 der Schriften der Reichszentrale für Pelztier- und Rauchwaren-Forschung. Leipzig 1927. Verlag Arthur Heber & Co.

Im ersten Teil des Buches gibt Schöps einen Überblick über die Entstehung und weitere Entwicklung der Pelztierzuchtbewegung in Deutschland. Er berichtet dabei u. a. über die Verbandsbildung, über Körnung des Zuchtmaterials, über die Tätigkeit der Reichszentrale für Pelztier- und Rauchwaren-Forschung sowie über die Zahl und Betriebsgröße der deutschen Pelztierfarmen, die übersichtlich auf der beigegebenen Landkarte eingezeichnet sind. Im zweiten Teile des Buches behandelt Tänzer-Halle die wissenschaftlichen Grundlagen der Pelztierzucht. Das sehr lesenswerte Werk bietet eine gute Einführung in die deutsche Pelztierzuchtindustrie. Wetzel.

W. u. E. Meysahn: Flaschenmilch, die erforderlichen Geräte und Maschinen nebst einem besonderen Teil: Die Milchgewinnung an der Produktionsstätte. Verlag M. & H. Schaper, Hannover. Preis 4,50 Mk.

Die Zukunft des Milchvertriebs ist zweifellos die Abgabe der Milch in Flaschen. Die Verfasser beschreiben die Gewinnung der Milch am Produktionsorte und die Untersuchung der Milch beim Flaschenmilchhersteller, wobei sie sich auf die Anführung solcher Untersuchungsmethoden beschränken, die dieser leicht und schnell mit geringen Mitteln erledigen kann. Die zur Flaschenmilchherstellung erforderlichen Apparate, die Flaschen selbst und die Flaschenverschlüsse sind in ausgiebiger Weise berücksichtigt. Jedem, der sich über die bei der Flaschenmilchherstellung in Frage kommenden Verfahren und Apparate schnell und sicher unterrichten will, kann das Werk warm empfohlen werden. Heine.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Prof. Dr. Reinhard Demoll, Vorstand des zoologischen Instituts, der biologischen und teichwirtsch. Versuchsanstalt für Fischerei an der vet.-med. Fakultät der Universität München zum Geheimen Regierungsrat.

Übertragen: dem Tierarzt Dr. Lürer aus Rössing (Bez. Hannover) die kommissarische Verwaltung der Veterinärstelle in Wanzleben (Bez. Magdeburg).

Approbiert in Gießen: Franz Denckels aus Schaepkusen (Kreis Mörs), Eduard Huber aus Waldshut; in München: Walter Dietrich aus Laichingen (Wttbg.), Karl Hinderer aus Gaußmannsweiler (Wttbg.), Friedr. Renner aus München.

Verstorben: Veterinär Dr. Hanft in Ellwangen (Wttbg.), Tierarzt Emil Ehrhardt in Wunstorf b. Hannover, Tierarzt Dr. Geissler in Werda (Sachsen).

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck: Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 26.

Ausgegeben am 30. Juni 1928.

36. Jahrgang.

Hämatologische Studien bei einigen Krankheiten des Rindes, des Schweines und der Ziege.

Von Tierarzt Dr. Johann Rudolf, Wien.

In der Veterinärmedizin hat die Bewertung des morphologischen Blutbildes für die klinische Diagnose bis jetzt nur bei den eigentlichen Blutkrankheiten, wie den verschiedenen Anämie- und Leukämieformen, der Thrombopenie und den pseudoleukämischen Erkrankungen eine ausschlaggebende Bedeutung erlangt. Bei den meisten übrigen Krankheiten unserer Haustiere liegen im Gegensatz zur Humanmedizin noch verhältnismäßig wenig umfangreiche oder keine hämatologischen Untersuchungen vor, aus denen ein Schluß für die Brauchbarkeit derselben zur Ergänzung unserer klinischen Untersuchungsmethoden gezogen werden könnte, welche Lücke auch in unseren Lehrbüchern auffällt, da bei den Beschreibungen der einzelnen Krankheiten der Blutbefund meist nicht in Erörterung gezogen wird. Für die Hämatologie sind aber auch in der Veterinärmedizin sicher fruchtbringende Arbeitsgebiete vorhanden, die aufgeschlossen werden müssen. So kann z. B. die Differentialdiagnose zwischen entzündlichen und nichtentzündlichen inneren Prozessen oder die Unterscheidung zwischen Pyometra und Gravidität durch die Blutuntersuchung wesentlich erleichtert oder meist die Diagnose nach der richtigen Seite entschieden werden.

Die Anfertigung und Färbung eines Blutaustriches kann auch der Praktiker leicht durchführen. Hat man sich einmal mit dem Blutbilde vertraut gemacht, so werden sich in der Praxis zahlreiche Krankheitsfälle ergeben, bei welchen auf Grund des Blutbildes die Diagnose gestützt, bzw. wertvolle Anhaltspunkte für die Prognose gegeben werden können.

Bei den folgenden eigenen Untersuchungen hatte ich mir in erster Linie die Aufgabe gestellt, hämatologische Beiträge zu verschiedenen Krankheiten zu liefern, um daraus evtl. für die Prognose und Diagnose brauchbare Schlüsse ziehen zu können.

Untersuchungstechnik.

Die Blutentnahme erfolgte bei allen Versuchstieren aus einer Ohrvene nach Abrasieren der Haare und Entprephen der Reinigung. Die Ausstrichpräparate wurden an Ort und Stelle angefertigt. Für die Bestimmung der Erythrozyten und Leukozyten und des Hämoglobingehaltes wurde Blut in kleine Glasröhrchen, in welchen sich eine geringe Menge Natriumzitrat in Substanz zwecks Verhinderung der Gerinnung befand, zur Untersuchung ins Laboratorium mitgenommen. Die Bestimmung des Hämoglobins erfolgte mit

dem Härometer nach Sahli. Die Zahl der roten und weißen Blutkörperchen wurde nach Herstellung der bekannten Verdünnungen in der Bürker'schen Zählkammer ermittelt. Die Färbung der Ausstrichpräparate wurde nach Pappenheim mit der kombinierten May-Giemsalöfung vorgenommen. Bei der Durchmusterung der Ausstrichpräparate wurde der Morphologie der Blutkörperchen besonders Augenmerk geschenkt. Die weißen Blutkörperchen wurden nach dem Schilling'schen Schema der progressiven Differenzierung nach Auszählen von 300 bis 400 Zellen zur Ermittlung des prozentuellen Verhaltens der verschiedenen Arten notiert, wobei besonders auf das zur Beurteilung der Blutbilder wichtige Phänomen der Arnetz'schen Kernverschiebung Gewicht gelegt wurde.

Verfuchsmaterial.

Es wurden insgesamt bei 54 Haustieren Untersuchungen angestellt, die sich auf 17 Rinder, 27 Schweine und 10 Ziegen verteilen. Nach Krankheiten geordnet, kamen zur Untersuchung vom Rinde Tuberkulose 4, Gebärpapese 1, Eisenbahnkrankheit 1, Maul- und Klauenfeuche 3, Fremdkörpererkrankungen 3, Blutharnen 2, bösartiges Katarrhalefieber 1, Endometritis purulenta 1, Magendarmintoxikation 1 Fall.

Die beim Schweine erhobenen Blutbefunde verteilen sich auf Rachitis 4, Schweinepest 6, Rotlauf 4, Paratyphus 6, Enzootische Ferkelpneumonie 3, Lungenwürmer 2, Morbus maculosus 1 und Serosen- und Gelenksentzündung 1 Fall.

Bei den Ziegen wurden 4 Fälle von Osteomalazie und 6 gefundene Tiere untersucht.

Befunde bei einigen Erkrankungen des Rindes.

Ehe auf die eigenen Hämatogramme eingegangen wird, führe ich zum Vergleiche die von D u T o i t (1) angegebenen Werte für das normale Rinderblut an.

Hb. 62 Grade nach Sahli,

Rote Blutkörperchen 6,45 (5,86—7,42) Millionen,

Weisse Blutkörperchen 7860 (5000—10 000),

Lymphozyten 49 Prozent (35—65,5)

Monozyten 3,7 Prozent (2,5—5,5),

Neutrophile Leukozyten 38,8 Prozent (27—54,5),

Eosinophile Leukozyten 8 Prozent (4—16),

Basophile Leukozyten 1/2 Prozent (0,5—1).

Bei Jungrindern und Kälbern tritt der lymphozytäre Charakter des Blutbildes noch deutlicher hervor. Die Ge-

famtzahl der Leukozyten kann bei diesen Tieren bis zu 15 000 steigen und die Lymphozyten können auf Kosten der Neutrophilen bis 82 Prozent vermehrt sein. Mit den Untersuchungen Du Toits stimmen die von Schwanitz für das gesunde Rind erhobenen Zahlen gleich denen anderer moderner Autoren fast überein, mit der Ausnahme, daß Schwanitz (2) für die Monozyten Werte bis 10 Prozent angibt, was er mit der Stellung dieser Blutelemente zwischen den großen Lymphozyten und den eigentlichen Monozyten erklärt, wodurch es leicht geschehen kann, daß nach dem Gutdünken der Unterfucher mancher breitleibige Lymphozyt in die Rubrik der Monozyten eingereiht wird.

Auch bei meinen Untersuchungen fällt der große Prozentsatz an Monozyten auf, der sich nicht in allen Fällen durch die Erkrankungen erklären läßt und der auch durch Zuzählung von großen Lymphozyten zu den Monozyten zustandegekommen sein könnte.

Hämatogramme bei Rindertuberkulose.

Tabelle I.

Fall Nr.	Klinische Diagnose, Schlacht- befund	Erythrozyten in Millionen	Zahl der Leukozyten	Hb. Gehalt nach Sahli	Neutrophile								Anmerkung
					Lympho- zyten	Mono- zyten	Jugend- formen	Stäbker- nige	Segmen- tierte	Summe d. Neutroph.	Eosino- phile	Basophile	
in Prozenten													
I	Lungen-Tbc.	5.864	10 750	70	48.4	8.2	—	1.1	33.3	34.1	6	1.1	Anisozytose, wenig Leukozyten
II	Off. Lungen-Tb.	4.080	6900	60	38.8	8.4	—	0.7	41.7	42.4	10.4	—	
	6 Tg. später v. d. Schlachtung	5.712	6950	45	67.3	9.3	—	—	5.4	5.4	16.4	—	
III	Off. Lungen-Tb. und Euter-Tbc.	4.984	4350	65	72.2	14.5	—	4.3	8.2	12.5	—	—	Anisozytose, vereinzelte rotochromatische Erythrozyten
IV	Lungen-Tbc.	5.152	7900	68	63.5	4.8	—	1	26	27	4	—	
	16 h später nach Einspritzung eines unspezifi- schen Eiweiß- präparates	4.744	9.450	73	45.2	7	—	—	38.2	38.2	9.4	—	
	8 Tage später	—	—	—	53.2	—	—	—	33.9	33.9	12.3	0.6	leichte Anisozytose, vereinzelte rotochromatische Erythrozyten
	4 Tage nach der zweiten subkutanen In- jektion des gleichen Prä- parates	—	—	—	34.3	11.6	2	2.7	37	41.7	14.4	—	

Anisozytose, wenig Blutplättchen
leichte Anisozytose, vereinzelte rotochromatische Erythrozyten

Nach den in Tabelle I niedergelegten Blutbefunden tuberkulöser Rinder fällt in erster Linie die relative Lymphozytose und Eosinophile und die Monozytose auf. Die Zahl der roten Blutkörperchen liegt durchwegs leicht unter dem niedrigsten Grenzwerte, wobei die Sahligrade nur in Fall II erniedrigt sind. Durch subkutane Einspritzung eines unspezifischen Eiweißpräparates konnte das lymphozytäre Blutbild zugunsten der Neutrophilen verschoben werden, wobei auch eine Vermehrung der Eosinophilen in Erscheinung trat.

Ob das Ansteigen der Eosinophilen auch beim Rinde als Zeichen einer Heilungstendenz aufzufassen ist, ließe sich natürlich nur durch wiederholte Blutuntersuchungen des gleichen Falles feststellen, wobei andere Erkrankungen, die mit einer Vermehrung der Eosinophilen einhergehen, ausgeschlossen werden müßten. Eine Eosinophilie sah Uten-dörfer (3) sowohl bei künstlich mit Tuberkulose infizierten Kälbern als auch bei subkutaner Einverleibung von Tuberkulin bei gefunden und tuberkulösen Rindern.

Meine Hämatogramme bei hochgradiger Tuberkulose decken sich mit den in letzter Zeit veröffentlichten Befunden Schwabs (4) und Knoblauchs (7). Schwanitz hatte von neun Fällen nur einen Fall mit 19 Prozent Eosinophilen. Es dürfte auch für die Rindertuberkulose, die in der Humanmedizin als feststehende Tatsache Geltung haben, daß eine Neutrophilie auf einen akuten tuberkulösen Pro-

zeß hindeutet. Daß die Tuberkulose ohne Einfluß auf die Beschaffenheit und Zusammensetzung des Blutes sei, wie dies Goetze (5) angibt, kann wohl heute im allgemeinen nicht mehr aufrecht erhalten werden. Fehlende Blutveränderungen können nur bei beginnender Lungentuberkulose vorkommen. Meine Untersuchungen stehen im Gegensatz zu denen Haffners (10), der eine Zunahme der Lymphozyten auf Kosten der Neutrophilen in keinem Falle ermitteln konnte.

Hämatogramme bei Gebärpause und Eisenbahnkrankheit.

Tabelle II.

Fall Nr.	Klinische Bemerkungen	Erythrozyten in Millionen	Zahl der Leukozyten	Hb-Gehalt nach Sahli	Neutrophile								Anmerkung
					Lymphozyten	Monozyten	Jugendformen	Stäbker-nige	Segmentierte	Summe d. Neutroph.	Eosinophile	Basophile	
in Prozenten													
V	Gebärparese Blutentnahme 5h nach Luftinfusion, vor 1h aufgestanden	2.720	2750	90	42.6	17.6	2.3	14.8	8.5	25.9	3.9	—	starke Hyperchromie
	9 Tage später	3.744	7650	70	72.1	13.1	0.7	4.9	9.1	14.7	2.1		
	5 Monate später	6.432	10850	70	36.1	6.4	—	12.2	38.7	50.9	6.6		
VI	Eisenbahnkrankheit. Vor 1 Monat abgekalbt	6.472	10850	100	27.9	3.0	—	24.3	44.8	69.1	—		Hyperchromie, wenig Blutplättchen
	3 Tage später, Tier munter, aber ohne Fresslust	5.312	8505	85	53.1	3.6	—	15.2	25.2	40.4	2.9		36h ein zweiter Anfall, Not-schl.-befund — ne

Obwohl bis jetzt weit über 300 Arbeiten, welche sich mit der Gebärpause des Rindes befassen, ihren Weg in die Öffentlichkeit genommen haben, so ist die Ätiologie dieser Erkrankung doch noch immer nicht lückenlos geklärt. In der mir zugänglichen Literatur konnte nur ein einziger von Middeldorf (6) hämatologisch untersuchter Fall dieser Krankheit gefunden werden, dem nur die vermehrten Lymphozyten auffielen.

Nachdem Gelegenheit war, einen Fall von Gebärpause im eigenen Bestande durch längere Zeit unter Kontrolle zu halten, glaube ich, daß die interessanten Befunde — besonders in Vergleich gebracht mit der Eisenbahnkrankheit — zu weiteren Untersuchungen anregen dürften.

Fall V betrifft eine Kuh, die 36 Stunden nach leichter Geburt das typische Bild der Gebärpause zeigte. Die erste Blutuntersuchung erfolgte fünf Stunden nach der Luftinfusion und eine Stunde nachdem das Tier aufgestanden war. Auffällig ist die absolute Verminderung der roten und weißen Blutelemente mit einer hervorstechenden Erhöhung des Hämoglobingehaltes, die relative Lymphozytose und die Kernverschiebung nach links. Neun Tage später sehen wir insofern eine Besserung der Blutzusammensetzung, als die Gesamtzahl der Blutkörperchen im Steigen begriffen ist, die Lymphozytose aber noch besteht. Nach fünf Monaten war das Blutbild normal.

Fall VI einer Eisenbahnkrankheit hatte vor einem Monat abgekalbt und vor zwei Tagen einen langen Eisenbahntransport durchgemacht. Klinisch konnte der Fall von einer echten Gebärpause kaum unterschieden werden. Das Hämatogramm, erhoben vor der Luftinfusion, zeigt außer einem hohen Hämoglobingehalt und Hyperchromie im Gegensatz zum Blutbefunde bei der Gebärpause keine auffälligen Abweichungen vom Normalen. Eine Stunde nach der Luftinfusion und einer Digipuratum-Injektion stand das Tier auf, zeigte sich durch drei Tage bis zur zweiten Blutuntersuchung ganz munter, doch bestand vollständige

Appetitlosigkeit mit Panfenparese. Im weißen Blutbild ist eine Verschiebung zugunsten der Lymphozyten eingetreten, die Zahl der Erythrozyten ist etwas zurückgegangen. Nach weiteren 36 Stunden ein zweiter Anfall der zur Notchlachtung führte.

Die Hämatogramme der beiden in Tabelle II angeführten Krankheitsfälle lassen vermuten, daß die Ätiologie der Gebärpause und Eisenbahnkrankheit trotz oft übereinstimmender Symptome und gleicher zum Erfolg führender Therapie eine verschiedene sein muß. Weitere Untersuchungen an einem größeren Versuchsmaterial könnten möglicherweise zur Klärung der Ätiologie dieser Krankheiten beitragen helfen.

Hämatogramme bei Maul- und Klauenfeuche.

Tabelle III.

Fall Nr.	Klinische Bemerkungen	Erythrozyten in Millionen	Zahl der Leukozyten	Hb.-Gehalt nach Sahli	Neutrophile								Eosinophile	Basophile	Anmerkung
					Lymphozyten	Monozyten	Jugendformen	Stabkernige	Segmentierte	Summe d. Neutroph.	in Prozenten				
VII	frische Blasen am Euter und Klauen	4.408	6520	55	41.1	2.6	—	3.0	51.2	54.2	2.1	—			
	6 Tage später, gr. Herzschrä.	4.256	7115	70	30.1	8.9	—	11.9	43.7	55.6	5.6				
	FrISCHE u. geplatzte Blasen	4.224	7900	61	17.4	6.6	—	14.6	58.4	73.0	2.8				
VIII	6 Tage später, Pansenparese	3.800	9350	55	20.5	3.3	—	32.2	44	76.2	—				
IX	Fieber, noch keine Blasen geplatzt	4.088	12.350	55	14.9	9.1	—	11.3	62	73.3	—			leichte Anisozytose	

Bei den drei in Tabelle III angegebenen Fällen von Maul- und Klauenfeuche handelt es sich um frische Erkrankungen mit einer Körpertemperatur von 40,1 Grad C zur Zeit der Blutentnahme. Die Hämatogramme zeigen eine Anämie. (Verringerte Zahl der Erythrozyten und verminderter Hämoglobingehalt.) Fall VIII, der nach sechs Tagen zum zweiten Male untersucht wurde und klinisch eine Verschlechterung ergeben hatte, ist von einem weiteren Sinken der Erythrozytenzahl begleitet. Bei meinen Fällen war im Gegenatz zu den Angaben K n o b l a u c h s (7), der bei Maul- und Klauenfeuche eine relative Lymphozytose und Neutrophenie sah, eine Neutrophilie mit einer leichten Kernverschiebung nach links festzustellen. Nach M i d d e l d o r f bleibt das Blutbild in seiner relativen Zusammensetzung unbeeinflusst, doch sollen dabei Reizformen auftreten.

Die günstigen Ergebnisse der Leukozytenzählung zur Sicherung der Diagnose Appendizitis beim Menschen hatten früher schon den Tierarzt S c h u l t z (8) veranlaßt, beim Rinde Untersuchungen anzustellen, ob bei den so häufig in der buiatrischen Praxis vorkommenden traumatischen Fremdkörpererkrankungen auch eine Vermehrung der Leukozyten erfolge, welche Erscheinung zur Unterstützung der oft schwierigen klinischen Diagnose herangezogen werden könnte. Tatsächlich fand er, daß mit Sicherheit die Diagnose auf das Vorhandensein eines vom Magen aus nach dem Bauchfell vorgedrungenen Fremdkörpers gestellt werden kann, wenn eine hartnäckige Verdauungsstörung mit einer hochgradigen Leukozytose (zumindest aber über 15 000 weiße Blutkörperchen in 1 ccm) einhergeht. B i b e r (9) hat die Untersuchungen von S c h u l t z einer Nachprüfung an einem größeren Patientenmaterial unterzogen und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die Leukozytenzählung bei der Gastritis traumatica des Rindes in diagnostischer Hinsicht nicht die Bedeutung besitzt, als nach den Ergebnissen S c h u l t z e s angenommen werden müßte. Ein positives Ergebnis ist nach B i b e r erst dann anzunehmen, wenn nach Ausschluß aller übrigen, Leukozytose hervorufenden Ursachen (auch nach Verabreichung der bei Verdauungsstörungen üblichen Medikamente wie Fruct.

Carvi, Foenic. Rad. Gent. und Ol. Terebinth. tritt nach kurzer Zeit eine Leukozytose auf, wobei Leukozytenwerte von 15 000 und darüber gefunden werden) gleichzeitig Symptome vorhanden sind, die einen Fremdkörper vermuten lassen. Auch muß die Blutuntersuchung oft durch mehrere Tage durchgeführt werden. Ein negativer Leukozytenbefund berechtigt aber keinesfalls, das Vorhandensein eines Fremdkörpers auszuschließen.

Hämatogramme bei Fremdkörpererkrankung, Hämaturie, Katarrhalfieber, Magendarmintoxikation, Endometritis.

Tabelle IV.

Fall Nr.	Erkrankung	Erythrozyten in Millionen	Zahl der Leukozyten	Hb.-Gehalt nach Sahli	Neutrophile										Anmerkung
					Lympho- zyten	Mono- zyten	Jugend- formen	Stab- kernige	Segmen- tierte	Summe d. Neutroph.	Eosinophile	Basophile			
* in Prozenten															
X	Perikarditis traum.	5.048	14900	55	14.9	9.1	—	1.5	75.5	77.0	—	—	—	—	leichte Anisozytose
XI	Perikarditis traum.	5.048	13300	75	40	6	1	21	30	52	2	—	—	—	
XII	Gastritis traum.	5.416	14860	88	17.5	4.6	—	19.8	52.5	72.3	5.6	—	—	—	
XIII	Hämaturie	3 920	6750	32	40.4	5.6	—	—	49.7	49.7	3.9	0.4	—	—	
	2 Monate später	2.184	5900	35	26.6	1.6	0.8	4.8	57.5	63	18	7	—	—	
XIV	Hämaturie	1.600	10900	18	24.2	7.2	0.8	8.1	53.3	62.2	6.4	—	—	—	sehr zahlreiche Erythroblasten in Mitose
	14 Tage später vor d. Schlachtung	1.592	9050	25	27.6	8.4	0.7	4.2	52.8	57.7	6.3	—	—	—	Rote kernhaltige, Aniso- und Poikilozytose, basophile Punktierung
XV	Bösartiges Katarrhalfieber	4.848	9695	60	35.9	6.4	—	8.8	37.7	46.5	9.1	0.9	—	—	Das Tier hat mehrere Anfälle überstanden, hat jetzt bloß eine Keratitis
XVI	Magendar- intoxika- tion	7 016	8225	85	39.3	3.9	0.7	27.7	27.7	56.1	10.7	—	—	—	
XVII	Endometri- tis puru- lenta	5.456	4300	70	53.2	14.4	—	21.2	8.9	30.1	11.7	0.6	—	—	

Bei den in Tabelle IV angegebenen drei Fällen von Fremdkörpererkrankungen war die Diagnose nur im Falle XII durch die klinische Untersuchung nicht mit Sicherheit anzunehmen. Die Zahl der roten Blutkörperchen bewegte sich in allen drei Fällen an der untersten Grenze. Die einwandfrei vorhandene Leukozytose betrifft in den Fällen X und XII die Neutrophilen. Die deutliche Kernverschiebung nach links geht mit der Schwere der klinischen Erscheinungen und dem bei der Schlachtung erhobenen Zerlegungsbefund parallel. Meine Fälle stimmen mit dem von H a f f n e r (10) beschriebenen Fall bezüglich des qualitativen Blutbildes der weißen Blutelemente überein, quantitativ sah er eine leichte Leukopenie.

Auch ich möchte mich der Ansicht B i b e r s anschließen, daß nur in jenen Fällen durch die hämatologische Untersuchung die Diagnose „Fremdkörper“ gestellt werden kann, wenn durch die klinische Untersuchung der Verdacht als begründet anzunehmen ist, sonstige Erkrankungen und Bedingungen, welche Leukozytose hervorrufen, mit Sicherheit auszuschließen sind. Ein negativer Blutbefund berechtigt aber in keinem Falle das Vorliegen einer Fremdkörpererkrankung zu verneinen.

Die beiden Fälle von Hämaturie unterscheiden sich klinisch dadurch, daß Fall XIII einen langsamen Verlauf nahm,

während Fall XIV schon nach 14 Tagen notgeschlachtet werden mußte. In beiden Fällen ist hochgradige Anämie mit normalen Gesamtleukozytenzahlen festzustellen. Das erythropoetische System des Organismus ist nicht mehr in der Lage, die durch den ständigen Blutverlust entstandenen Abgänge an roten Blutkörperchen zu ersetzen. Daß das rote Knochenmark befreit ist, die Verluste wettzumachen, sehen wir besonders in dem akut verlaufenden Fall XIV mit seinen sehr zahlreichen Normoblasten. Auch das leukopoetische System ist bestrebt, den Körper in seinen Maßnahmen zur Kompensierung der Schädigungen zu unterstützen. Es besteht eine ausgesprochene Neutrophilie mit einer Kernverschiebung nach links. Die eosinophilen Zellen sind in fast normaler Zahl vorhanden.

Die Fälle XV, bösartiges Katarrhalfieber, XVI, Magendarmintoxikation und XVII, Endometritis purulenta, zeigen wohl Abweichungen vom Hämatogramm gesunder Rinder. Irgendwelche Schlüsse auf eine Gesetzmäßigkeit aus Einzelfällen zu ziehen geht aber nicht an.

Befunde bei einigen Erkrankungen des Schweines.

Nachdem bereits zahlreiche Untersuchungen über das normale Blutbild des Schweines vorliegen, habe ich Untersuchungen bei gefunden Tieren nicht vorgenommen. Die gefundenen Normalzahlen zeigen im Allgemeinen keine Übereinstimmung, was wohl damit zusammenhängen dürfte, daß manche Autoren bei ihren Untersuchungen auf das Alter und die Zeit, welche nach der Futteraufnahme verfloßen ist, keine entsprechende Rücksicht nahmen. Die Beurteilung der qualitativen Verteilung der Leukozyten wird sowohl durch die beim Schweine vorhandene relative Verdauungs-Leukozytose, als auch durch das eigenartige Verhalten der Zahlenwerte für Lymphozyten und Neutrophile, nachdem bei manchen Schweinen ohne Rücksicht auf das Alter (Ribbe, 11) die ersteren, bei anderen wieder die letzteren vorherrschen, erwiewert, eine Tatsache, auf welche auch Gütig (12) hingewiesen hat, die aber nicht — wie Senftleben (13) angibt — durch das Alter der Tiere bedingt ist, indem die Neutrophilen nur bei jungen Tieren vorherrschen, während bei älteren Tieren die Lymphozyten überwiegen sollen. Die angeführte Tabelle V gibt eine Übersicht über die von den Untersuchern aufgestellten Normalhämatogramme.

Die Zusammenfassung des normalen Schweineblutes.

Tabelle V.

Autor	Alter der Schweine	Erythrozyten in Millionen	Leukozyten	Hämoglobin	Lymphozyten	Monocyten u. Übergangsformen	Neutrophile	Eosinophile	Basophile	Anmerkung
Gütig (12)	4 Wochen	2.85 bis 7.80	8200 bis 41000	—	41.6%	8.8%	54%	2%	1.6%	
Lütje (14)	Ferkel Schweine, ausgewachsen	7.77 bis 8.99	14500 bis 18600	—	27% bis 48%	0% bis 11%	48% bis 60%	0% bis 10%	1 bis 4%	
Sahling (15)	3 Wochen 3 Monate 12 Monate	—	—	—	39%	4.2%	58%	0% bis 0.9%	0% bis 6%	Alter kein Unterschied
Senftleben (13)	Saugferkel Alte Tiere	2.89 bis 9.6	—	48% bis 100%	57%	2.25% bis 5.25%	36%	0.75% bis 8%	0.75% bis 1.5%	Die Roten ansteigen bis 12 Monate
Regner (16)	Saugferkel 2 Monate 3 Monate 1 Jahr	3.63 bis 7.3 6.47 bis 7.15	11000 16266	30% bis 55% 79% bis 88%	35% bis 59% 42.3% bis 53%	3.2% bis 37.5% (Im Hungerzustand) 33% bis 5h nach Fütterung	62.7% bis 3.2% 49% bis 13.3%	vereinzelte 3.2% bis 1.5%	2.3%	
Dietl (17)	4 Monate	6 bis 7.42	15000 bis 27850	—	53.4% bis 65.8%	0.6% bis 4%	25% bis 40.5%	1.3% bis 7.6%	0% bis 2.7%	
Wetzel (18)	3 Monate	7 bis 7.6	—	60%	—	—	—	—	—	
Middel-dorf (6)	—	—	—	—	44.7%	5.7%	44.7%	0.7%	0.7%	

Die Schwierigkeiten, welche sich manchmal bei der Differentialdiagnose zwischen Rotlauf, Schweinepest und Schweinefleuche ergeben, veranlaßten mich, einige Fälle genannter Krankheiten in die Untersuchungen einzubeziehen. Die bereits vorliegenden Arbeiten, welche durch das Blutbild die Krankheiten voneinander zu trennen suchten, haben keine einheitlichen Befunde ergeben.

Bei den in Tabelle VI angeführten Schweinepestfällen handelt es sich um reine Schweinepest. Die Diagnose war durch Schlachtung und bakteriologische Untersuchung gesichert worden. Das rote Blutbild erfährt mit der Krankheitsdauer Veränderungen, die sich als Symptome einer Anämie bezeichnen lassen. Auffällig ist eine Leukopenie. Bei der prozentuellen Verteilung der Leukozytenarten fällt vor allem die Kernverschiebung nach links auf. Die Lymphozyten dürften in einigen Fällen vermehrt sein. Wenn wir diese abweichenden Angaben über die prozentuelle Verteilung der weißen Blutelemente gesunder Tiere nach Tabelle V betrachten, wird es leicht begreiflich, daß die Beurteilung der Blutbilder kranker Schweine auf Schwierigkeiten stößt, besonders in der Richtung auf das Vorliegen einer Lymphozytose oder Neutrophilie. Eosinophile sind in drei Fällen noch nachweisbar. Es konnte nach meinen Untersuchungen bei Schweinepest die von Regner, Ribbe und Lütje ermittelte relative Lymphozytose (75—90 Prozent Lymphozyten) nicht einwandfrei bestätigt werden. Bezüglich der Leukopenie und der Kernverschiebung nach links stehen meine Ergebnisse mit den Befunden Regners und Ribbes in Übereinstimmung. Regner fand bei seinen sieben Schweinepestfällen ein Fehlen der Eosinophilen. Bei meinen Untersuchungen ließe sich in Fall III der verhältnismäßig hohe Prozentatz von Eosinophilen durch das Vorhandensein von Askariden erklären; die Fälle IV und V zeigten einen leichten Krankheitsverlauf, bei dem die Tiere nach leichter Temperaturerhöhung, Verlagen des Futters während einiger Mahlzeiten und leichten Durchfall sich wieder erholten, wobei es eben nicht zu einer Aneosinophilie kam. Eine andere Erkrankung als Schweinepest kommt auch bei diesen Schweinen differentialdiagnostisch nicht in Betracht, da die Tiere aus Beständen stammten, in denen akute Schweinepest herrschte.

Beim Schweinerotlauf sah Regner (sechs Fälle) eine Leukozytose mittleren Grades bei fast normaler Verteilung der Lymphozyten und Neutrophilen, mit starker Eosinophilie und Jugendformen der Neutrophilen. Middeldorf, der vier Fälle von Backsteinblattern untersuchte, sah ein Ansteigen der Neutrophilen bei sonst mit Regner übereinstimmenden Blutbildern. Die Befunde Middeldorfs stimmen mit den Untersuchungen Dietls, der das Blutbild bei Schweinen nach Rotlaufschutzimpfungen studierte, vollkommen überein.

Mein Fall IX mit Backsteinblattern zeigt ebenfalls eine ausgesprochene Neutrophilie. Im Allgemeinen kann gesagt werden, daß die hochgradige Eosinophilie für Rotlauf gegenüber Schweinepest und Paratyphus insofern charakteristisch ist, als die Vermehrung dieser Zellen nicht durch andere Krankheiten, wie z. B. Askarias bedingt wird.

Die Hämatogramme von paratyphuskranken Schweinen unterscheiden sich von den bei Schweinepest erhobenen durch eine Leukozytose, die vor dem Tode einer Leukopenie mit einer Lymphopenie Platz macht. Die starke Beeinflussung des leukopoetischen Systems zeigt sich gleich den Befunden bei Pest und Rotlauf in der Kernverschiebung nach links.

Meine Befunde bei Paratyphus der Schweine zeigen wesentliche Übereinstimmung mit den Blutbildern, welche Weisgerber (19) bei mit Paratyphus infizierten Kaninchen angegeben hat.

Nach den Ergebnissen meiner Blutuntersuchungen, welche zum Teil die Befunde der Autoren, welche auf dem

Hämatogramme bei Schweinepest, Rotlauf und Paratyphus. Tabelle VI.

Fall Nr.	Erkrankung	Erythrozyten in Millionen	Zahl der Leukozyten	Hb.-Gehalt nach Sahli	Lympho- zyten	Monozyten	Neutrophile				Eosinophile	Basophile	Anmerkung
							Jugend- formen	Stab- kernige	Segmen- tierte	Summe d. Neutroph.			
in Prozenten													
1	Schweinepest 14 Tage krank	1.392	7620	22	55.5	5.7	8.6	21.6	6.4	30.6	—	2.2	Wenig polychromatische Rote
2	Schweinepest 1 Tag krank	6.552	7550	65	23	4.5	5.1	25	42.4	72.5	—	—	Vereinzelte kernhaltige Rote, Aniso- und Poikilozytose
3	Schweinepest 3 Tage krank	4.264	10900	55	34.1	4.2	2.1	2.1	50.5	54.7	5.6	1.4	Wenige kernhaltige Rote, Askariden bei der Schlachtung
4	Schweinepest 6 Tage krank	—	—	—	54.1	9.5	—	7	27.5	34.5	0.7	1.2	
5	Schweinepest 3 Tage krank	—	—	—	20.3	3.8	1.7	55.6	17.8	75.1	0.8	—	Wenige kernhaltige Rote
6	Schweinepest 14 Tage krank	—	—	—	60.8	10.3	—	4.5	24.4	28.9	—	—	Vereinzelte kernhaltige Rote, Aniso- und Poikilozytose, Polychromasie
7	Rotlaufseptikämie	—	—	—	50.7	6.5	0.7	20.6	3.6	27.6	15.2	—	Vereinzelte kernhaltige Rote
8	Rotlauf 3 Tage nach Heilimpfung, noch schlechte Fresslust	—	—	—	56.5	6.2	—	12.3	19.9	32.2	3.1	1.6	Wenige kernhaltige Rote
9	Backsteinblattern	—	—	—	13.5	4.1	8.3	53.3	20.8	82.4	—	—	
10	Rotlaufseptikämie	—	—	—	37.4	4.8	1.4	28.2	10.1	39.7	17.1	—	Wenige kernhaltige Rote, Anisozytose
11	Paratyphus (Ferkel 6 Woch. alt)	3.064	8550	45	83.8	12.6	0.7	0.7	2.2	—	—	—	Wenige kernhaltige, geringe Hypo- chromasie
12	Paratyphus (Ferkel 6 Woch. alt)	5.468	27950	55	38.0	3.6	—	2.7	55.7	58.4	—	—	Nach Heilimpfung mit Serum gesund geworden
13	Paratyphus (3 Monate alt)	6.064	45550	75	32.0	7.2	3.3	34.4	16.3	54.0	4.3	2.5	Wenige kernhaltige Rote
14	Paratyphus (14 Tage alt)	—	—	—	59.9	8.9	1.0	10.7	16.9	28.6	1.7	—	Zahlreiche kernhaltige Rote
15	Paratyphus (14 Tage alt)	4.824	12600	60	56.7	11.0	13.7	11.7	—	25.4	—	1.3	Ungeheure Zahl kernhaltiger Roter, Mikro-, Normo- und Megaloblasten, Mitosen, Poikilozytose, Anisozytose
16	Paratyphus (5 Monate alt)	3.264	25400	28	44.0	7.0	—	—	—	49.0	—	—	Wenige kernhaltige Rote
	3 Tage später	2.080	5400	26	28.0	3.0	—	—	—	60.0	—	—	Kernhaltige Rote weiter vermehrt

Gebiete der Blutuntersuchung bei Schweinepest und Rotlauf gearbeitet haben, übereinstimmen, glaube ich, daß die Hämatologie kaum berufen sein dürfte, in der praktischen Diagnostik dieser Krankheiten eine ausschlaggebende Rolle zu spielen. Die Inkonsistenz des normalen Blutbildes des Schweines erschwert die Beurteilung erheblich. Wiederholte Untersuchungen im Verlaufe der Krankheit an gleichen Individuen könnten den praktischen Wert der Hämatogramme wesentlich erhöhen und die divergierenden Befunde könnten dann leicht ihre Erklärung finden.

Bei der Rachitis ist die Gesamtzahl der Leukozyten durchschnittlich erhöht. Im prozentuellen Verhalten wiegen die Lymphozyten vor. Fall 25 ist ein frischer Fall, bei dem auch eine Linksverschiebung der Neutrophilen deutlich in Erscheinung tritt.

Bei der enzootischen Ferkel- und Lungenwürmerpneumonie sehen wir neben der Anämie eine Neutrophilie. Die im Fall 20 festgestellte leichte Lymphopenie findet ihre Erklärung darin, daß außer einer Bronchitis nur geringgradige Infiltration des rechten Spitzenlappens bei der Sektion gefunden werden konnte.

Beim Fall 26 (fibrinöse Serosen- und Gelenkentzündung) verdient die hochgradige Neutrophilie und beim Fall 27 (Morbus maculosus) die in großer Zahl vorhandenen Normo- und Makroblasten besonders hervorgehoben zu werden.

Befunde bei Osteomalazie der Ziegen.

Nach Ranitovic (20), der das Blutbild an neun männlichen und 61 weiblichen gefunden Ziegen studierte, ergeben sich folgende Werte:

Erythrozyten 6176—25 824 Millionen (13 123 Durchschnitt),
Leukozyten 6350—23 500 (10 583 Durchschnitt),
Hämoglobin 58 Grad nach Sahli,
Lymphozyten 62,6 Prozent,
Monozyten 0,3 Prozent,
Neutrophile 43,2 Prozent,
Eosinophile 2,8 Prozent,
Basophile 1,1 Prozent.

Die von mir bei sechs gefunden Ziegen erhobenen Blutbilder stimmten mit den Werten von Ranitovic gut überein.

Hämatogramme bei enzootischer Ferkelpneumonie, Rachitis, Lungenwurm-pneumonie, Serosen und Gelenks-entzündung, Morbus maculosus. Tabelle VII.

Fall Nr.	Erkrankung	Erythrozyten in Millionen	Zahl der Leukozyten	Hb.-Gehalt nach Sahli	Lympho- zyten	Monozyten	Neutrophile				Eosinophile	Basophile	Anmerkung
							Jugend- formen	Stab- kernige	Segmen- tierte	Summe d. Neutroph.			
in Prozenten													
17	Hochgradige Räude, As- kariden, Lungenwürmer, Strongyloides	2.416	15800	46	39.0	17.0	—	—	—	37.0	8.0	1.0	
18	Lungenwurmpneumonie	5.424	45950	—	16.9	4.7	8.5	57.1	12.3	77.9	0.5	—	Vereinzelte kernhaltige Rote
19	Enzootische Ferkelpneumonie	3.704	12250	15	38.2	1.4	4.5	31.1	23.6	59.2	1.2	—	Vereinzelte kernhaltige Rote, Anisozytose
20	Enzootische Ferkelpneumonie, Räude	—	—	—	54.6	5.6	0.8	24.1	14.9	39.8	—	—	Kernhaltige Rote, Anisozytose, Poikilozytose, poly- chromatische zahlreich
21	Enzootische Ferkelpneumonie, Räude	3.408	38350	65	21.1	5.8	—	28.5	44.1	72.6	0.5	—	dtto.
22	Rachitis (Ferkel 2 Monate)	5.792	31850	72	50.0	9.0	—	—	—	37.0	4.0	—	
23	Rachitis (Ferkel 2 Monate)	5.672	31125	80	57.0	10.0	—	—	—	28.0	5	—	
24	Rachitis (Schwein 6 Monate)	3.982	16400	80	71.4	7.1	—	0.8	17.5	18.3	3.2	—	Wenige kernhaltige Rote.
25	Rachitis (Schwein 6 Monate)	7.112	28125	95	62.7	1.5	1.8	18.2	11.5	36.5	3.3	1.0	Kernhaltige Rote
26	Fibrinöse Serosen- und Gelenksentzündung (8 Wochen alt)	9.724	41250	58	9.0	6.0	—	—	—	85.0	—	—	
27	Morbus maculosus (6 Monate alt)	2.784	8600	40	48.0	—	1.7	16.0	27.9	45.6	6.4	—	Sehr große Zahl Normo- und Makroblasten

Hämatogramm bei Osteomalazie.
Tabelle VIII.

Fall Nr.	Erythrozyten in Millionen	Zahl der Leukozyten	Hb.-Gehalt nach Sahli	Lympho- zyten	Mono- zyten	Jugend- formen	Neutrophile				Eosino- phile	Basophile	Anmerkung
							Stab- kernige	Segmen- tierte	Summe d. Neutroph.				
1	—	—	—	72.1	6.2	—	—	21	21	0.7	—		
2	6.88	7900	35	61.2	4.6	—	—	35.2	35.2	—	—		
3	6.928	5450	40	30	5.1	—	15	48.7	63.7	1.2	—		
4	14.36	18200	90	41.6	5.8	0.8	4.2	47.6	52.6	—	—	frischer Fall	

Im Gegensatz zur Rachitis des Schweines fehlen wir bei Osteomalazie der Ziegen eine Verminderung der absoluten Leukozytenzahl und die Erscheinungen einer zum Teil auffälligen Anämie. In der Verteilung der Lymphozyten und Neutrophilen besteht scheinbar keine Gesetzmäßigkeit, im Fall I und II ist eine starke Lymphozytose, im Fall III eine Neutrophilie und im Fall IV besteht noch normale Verteilung der genannten Blutelemente.

Zusammenfassung.

Da in der Veterinärmedizin wirtschaftliche Momente in den Vordergrund des medizinischen Handelns treten, dürfte die Hämatologie in erster Linie ein Betätigungsgebiet der wissenschaftlichen Institute bleiben. Sie ist nicht imstande, die klinische Untersuchung zu ersetzen, kann aber in ungeklärten Fällen auch in der Privatpraxis zur Sicherung der Diagnose, Prognose und Ätiologie bei-

tragen helfen, besonders dann, wenn fortlaufende wiederholte Untersuchungen bei dem betreffenden Fall durchgeführt werden.

Schrifttum.

1. Du Toit: Beitrag zur Morphologie des normalen und des leukämischen Rinderblutes. In-Diss. Berlin 1916. 2. Schwanitz, A.: Das Blutbild des Rindes bei Lungenfeuche, Tuberkulose und septischen Erkrankungen. In-Diss. Berlin 1920. 3. Utendörfer: Über Leukozytose beim Rind. Arch. für wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde 1907, Bd. 33. 4. Schwab: Die praktische Bedeutung des roten und weißen Blutbildes für die internmedizinische und chirurgische Diagnostik in der Veterinärmedizin. Münch. T. W. 1926, Nr. 23—25. 5. Goetze: Zitiert nach Schröpfer, In-Diss. Leipzig 1912. 6. Middelhof, E.: Über die Veränderungen des weißen Blutbildes bei Schweinen, Rindern und Pferden unter verschiedenen toxischen und infektiösen Einflüssen. In-Diss. Berlin 1921. 7. Knoblauch, C.: Über die Veränderungen der weißen Blutzellen des Rindes und des Hundes unter dem Einfluß verschiedener Infektions- und Invasionskrankheiten. Diss. Berlin 1924. 8. Schultz, K.: Verhalten der Leukozytenzahl im Wiederkäuerblut. In-Diss. Bern 1905. 9. Biber, K.: Untersuchungen über das Verhalten der Leukozytenzahl im Rinderblut. In-Diss. Bern 1908. 10. Haffner, E.: Das Verhalten der weißen Blutzellen bei kranken Rindern. Archiv für wissenschaftl. und prakt. Tierheilkunde, Bd. 53, S. 311. 11. Ribbe, O.: Das Blutbild des Schweines bei verschiedenen Erkrankungen. Diss. Leipzig 1921. 12. Gütig: Ein Beitrag zur Morphologie des Schweineblutes. Archiv für mikrosk. Anaotmie und Entwicklungsgeschichte 1907, Bd. 70. 13. Senftleben: Das Blutbild des gefunden Schweines. Monatshefte für prakt. Tierheilkunde 1920, Bd. 30. 14. Lütje: Untersuchungen über die körperlichen Elemente des Blutes normaler und schweinepestkranker Schweine. In-Diss. Gießen 1911. 15. Sahling: Untersuchungen über die Granulationen der Leukozyten des Schweines. In-Diss. Hannover 1920. 16. Regner: Ein Beitrag zum Blutbild

des gefunden und kranken Schweines und dessen Verwertung bei der Diagnose von Rotlauf, Schweinepest und Schweinefeuche. In.-Diss. Wien 1923. 17. Dietl: Das Blutbild des Schweines nach Vornahme von Rotlaufimpfungen. In.-Diss. Wien 1922. 18. Wetzl: Klinische Blut-

untersuchungen. Zeitschr. für Tiermedizin 1910. 19. Weisgerber, F.: Das Blutbild bei mit Paratyphus infizierten Kaninchen. Diss. Hannover 1921. 20. Ranitovic, M.: Das normale Blutbild der Ziege. In.-Diss. Wien 1925.

(Aus dem Tierärztlichen Institute der Deutschen Universität in Prag.)

Über das Bewegungsverhalten eines großhirnlosen Schafes beim Schächten.

Von Prof. H. Dexler.

Ergibt sich ein Anlaß bei einem Tier psychologisch zu interpretieren, so müssen wir vor allem die physiologischen Grundtatsachen seiner motorischen Reaktionen genauestens untersuchen. Selbstverständlich werden unsere so gestalteten Analogieschlüsse vom Physiologischen zum Psychologischen um so bindender sein, je mehr wir von der objektiv erfahrbaren Gliederung und den Bedingtheiten der Bewegungsercheinungen wissen. Jede tierpsychologische Fragestellung setzt die erfolgreiche Inangriffnahme der Beantwortung reizphysiologischer Probleme nach der Zuordnung bestimmter, sichtbarer Reaktionen zu bestimmten Reizen voraus (Kühn, Kafka, Trendelenburg).

Die Wichtigkeit dieses Grundsatzes hat eine gleichsam praktische Beispielsbetonung in der von Lieben jüngsthin angeregten Bewegung in der Schächtefrage erhalten, der zur Betäubung von Rindern den Leduc'schen pulisierenden Gleichstrom von 10—20 Volt Spannung empfahl. Seine damit im Zusammenhange stehenden Experimente gaben Anlaß zu sehr lebhaften Meinungsäußerungen, die sich vornehmlich im Gebiete der Empfindungsdinge bewegten. Sie begnügten sich aber keineswegs mit der so berechtigten ethischen oder selbstverständlichen humanitären Forderung, allen schlachtbaren Haustieren die Wohltat einer exakten, der Tötung vorangehenden Betäubung zu sichern; sondern sie gingen in breiter Öffentlichkeit durch Einbeziehung nationaler und fideistischer Fragen zur allgemeinen Aufrolung des Kapitels des Schutzes der Tiere gegen Quälerei in den absonderlichsten Verftiegenheiten und Entftellungen über, mit stürmischer Ablehnung des rituellen Schächtens der Rinder überhaupt. Schwerwiegend war dabei, daß sich hieran auch Fachmänner beteiligten, denen die Schattenseiten der offiziellen Betäubung der zum Fleischkonsum aufgearbeiteten Tiere, und nicht nur der Rinder, im regulären Schlachthausbetriebe bekannt sein mußten.

In diesem, gerade in unserer Zeit eines so kläglich armen Menschenschutzes nachdenklich stimmenden Wirr-Warr, der einem blinden Drauflosbehaupten, Meinen und Dafürhalten so ziemlich alles durchgehen ließ, waren Junack¹⁾, Bongert²⁾ und Basel³⁾ die ersten, die zu einer wissenschaftlichen Besonnenheit unter Hinweis auf die notwendige Beachtung psychologischer Erfahrungen aufriefen, die zur Beurteilung der mit der Schächtung verbundenen Vorgänge unerläßlich seien. Dahin gehende Experimentaluntersuchungen sind sowohl von Bongert selbst, wie auch von anderen angestellt worden. Sie beschäftigen sich vorwiegend mit den Messungen des zerebralen Blutdruckgefälles, desjenigen der galvanischen Erregbarkeit der Hirnrinde und mit dem Verhalten der Reflexe mannigfacher Art während der Schächtung.

Aus den sich hieraus ergebenden Folgerungen erhob sich in logischem Zwange die von Lieben angeregte Frage nach dem motorischen Erscheinungskomplex beim Halschnitte solcher Tiere, denen das gesamte Großhirn fehlte, jenes Organ, dessen Funktionen nach einer allgemein giltigen

Hypothese, als die Hauptbedingung alles psychischen Geschehens, also auch des Empfindungsablaufes, angefohlen werden.

Zu diesem Behufe extirpierte der Physiologe R. H. Kahn einem einjährigen hornlosen Schafe in tiefer Chloralhydratnarkose unter aseptischen Bedingungen beide Endhirnhemisphären im ganzen Umfange bis zum Zwischenhirn in zwei zeitlich getrennten Operationen: Die linke Hemisphäre wurde am 10. Juli, die rechte am 29. September 1927 abgetragen. In beiden Fällen erfolgte glatte Wundheilung per primam.

Das Tier behielt nach Ausfall seines Endhirns alle Reflexe der Stellung, Haltung, des Muskelsinns und des Gleichgewichtes nebst allen gemeinen Reflexen der Haut, Sehen, des Gefastes und der sympathischen Regulation in unveränderter Form, also ohne grob wahrnehmbare Enttummung bei. Verschwunden blieben dagegen die reflektorischen Reizbeantwortungen akustischer und optischer Grundlage und die Futter- und Wasseraufnahme, nicht dagegen diejenigen des Kauens, Huftens und Schluckens. Sehr stark herabgesetzt, wenn auch nicht völlig aufgehoben waren die Reflexe der Raumorientierung bei der Fortbewegung; Ansätze einer assoziativen Anpassung oder Bindung und mechanischer Gewöhnungen wurden innerhalb der siebenwöchigen Beobachtungszeit nicht erhoben. Das Schaf verhielt sich den gewöhnlichen Umwelteinwirkungen durch Beleuchtungs- und Temperaturwechsel, Bodenerstütterungen, Lärmen, Geruchsreize, durch Anwesenheit von Artgenossen und von bellenden Hunden gegenüber in hohem Maße gleichgültig; es war sehr reaktionsarm und erschien tief verblödet. Dagegen verfügte es über deutlich unterscheidbare Phasen von schlafähnlicher Dauerruhe in normaler Lage und solcher stärkerer Bewegungsfähigkeit eines gewissen Wachzustandes mit gelegentlichem Drangwandern.⁴⁾

Sieben Wochen nach der zweiten Operation wurde bei diesem Schafe am 21. November 1927 der Halschnitt durch den amtlichen Schächter J. Schmidt vorgenommen; es wurde dabei seitlich auf den Tisch gelegt und nur durch Festhalten des Rückenvlieses in dieser Lage leicht fixiert, um feinen Abwehrbewegungen volle Freiheit zu geben.

Im Momente des Durchziehens des Schnittes wurde dem Tiere ein zusammengelegtes Salatblatt auf den Zungenrücken gehoben, der Kopf hierauf losgelassen und die die Rückenwolle haltenden Hände entfernt. Die erste Reaktion auf den sehr raschen Schnitt war ein ruckartig schnellendes und heftiges Strecken aller Extremitäten und des Rumpfes; der nach der Anbringung des Schnittes überstreckte Kopf wurde mehrere Male 10 cm hoch erhoben und kraftlos wieder auf die Unterlage fallen gelassen; ein Versuch zum Aufstehen wurde nicht produziert. Die Entleerung des auffallend schnell gerinnenden Blutes ging ungehindert vor sich; es setzte ein stoßweißes, langsames und sehr tiefes Atmen ein; Vorder- und Hinterbeine wurden zeitweise ungeordnet nährend bewegt, blieben aber bald ruhig liegen; 70 Sekunden nach dem Schnitte war leichtes Stechen der Rückenhaut von Kontraktion des Hautmuskels und von kurzer Beugung beider Vorderbeine gefolgt. Korneal- und Ohrreflex blieben leicht auslösbar; im Schwanzstummel stellte sich ein schnell-

¹⁾ Junack, J.: Mehr Wissenschaft in der Schächtefrage. D. T. W. 1927, Nr. 8, S. 68.

²⁾ Bongert, J.: Zur Schächtefrage. B. T. W. 1927, Nr. 43, S. 725 und 1928, Nr. 7, S. 113.

³⁾ Basel: Beitrag zur Schächtefrage. B. T. W. 1927, S. 655.

⁴⁾ Das genaue physiologische Examen dieses Schafes wird an anderer Stelle publiziert werden.

schlägiges Zucken ein. 2½ Minuten nach dem Schnitt kam es unter Verschwinden des Herzstoßes bei deutlichem Verebben des Blutstromes zu typischen anämischen Krämpfen in allen Extremitäten, an denen auch die Rückenmuskulatur teilnahm. Der Kornealreflex erwies sich dadurch übererregbar, daß das gleichzeitige Ohr bei feiner Auslösung mitzuckte. Die Pupillen waren noch mehr erweitert als in der Mydriase des Lebens. 3½ Minuten nach dem Schnitt war der Kornealreflex immer noch zu erhalten, der Ohrreflex nicht mehr; es kam nur mehr wenig Blut zum Vorschein. In den Beinen tauchte ein kurzes, rhythmisches Zucken auf mit leichten tonischen Streckkrämpfen, die aber nach wenigen Sekunden einer Erschlaffung wichen. Der Kornealreflex blieb von nun an aus und 4½ Minuten nach dem Beginn des Schnittes lag das Tier in völliger Muskelruhe mit halb gebeugten Gliedern tot da.

Bei der Sektion wurde das Salatblatt an dem ihm erteilten Orte ohne Bißspuren wieder gefunden; eine Kaubewegung war weder gesehen noch aus dem Zustand des Blattes erschlossen worden. Der Halschnitt hatte beide Jugularen, beide Carotiden mit den beiderseitigen Halsnerventämmen, den Schlund und die Luftröhre durchtrennt. Die Schädelöffnung ergab, daß die rechte Hemisphäre des Großhirns dorsal vom Sulcus rhinalis nasalis vollkommen fehlte; die kaudale Fortsetzung dieser Furche konnte nicht mehr festgestellt werden, weil der Operationschnitt vom Infelpole angefangen, den ganzen Lobus piriformis mitgenommen hatte. Von dem Rindenmantel der linken Hemisphäre war ein bohngroßes Stück an der Spitze des Lobus piriformis erhalten geblieben. Das Zwischenhirn war stark atrophisch, der nasale Riechlappen mit beiden Bulbi olfactorii intakt; der übrige Teil des Hirnstamms war ohne wesentliche makroskopische Veränderung, wenn man von einer recht merklichen Erweiterung des basalen Teiles beider Seitenkammern, des Hohlraums beider Riechkolben und des Mittelhirnkanals abieht. Der ganze übrige Schädelraum war bis zum stehengebliebenen Medianbogen der Calotte von einem mäßig festen, weißen, sehr blutgefäßarmen Narbenpolster erfüllt, das sowohl den Operationsnarben in der Haut wie auch dem Gehirnreste innig anhaftete.

Was nun die Beurteilung der Abwehrbewegungen beim Halschnitt dieses Schafes anbelangt, so kann nur gesagt werden, daß sich ihre Art, Gliederung, Dauer und Stärke völlig so verhielten, wie wir das beim Halschnitt unverfährter Schafe zu sehen bekommen; aus dieser einzigen Beobachtung auf kleinere Unterschiede einzugehen fühlen wir uns nicht berechtigt, weil die Todesfolge und der Bewegungsturm auch bei der gewöhnlichen Schaftötung des Kleinbetriebes und der Hauschlachtungen, bei denen eine vorgängige Betäubung meistens nicht vorgenommen wird, verschiedene Variationen in dem immerhin umfangreichen Erscheinungskomplex erkennen lassen. Manche Exemplare

sterben rascher und ruhiger, bei anderen sind 7—9 Minuten nach dem Schnitte noch lokale Krampfschüßungen zu sehen, obwohl das Blut schon verhältnismäßig lange Zeit aufgehört hat zu rieseln. Besonders betonen wollen wir nur die Tatsache, daß der Kaureflex nach dem Schnitte auf die beschriebene Weise nicht erregbar war; von irgend einer „Annahme“ eines Futterbissens kann jedenfalls nicht die Rede sein.

Hinsichtlich der psychologischen Interpretationsmöglichkeiten läßt unsere Beobachtung ersehen, wie unsicher und schwierig wir auch nur einigermaßen befriedigende Analogiebegründungen fördern können. Es ist selbstverständlich, daß wir niemals einem übertriebenen Skeptizismus das Wort reden können, der die Entblutungsreaktionen auf einen Schächteschnitt ganz auf Reflexe reduziert und uns der Frage nach den begleitenden Empfindungsphänomenen einfach enthebt; darin liegt ja der allgemein anerkannte Kern der ganzen Betäubungsfrage. Aus unseren introspektiven Erfahrungen wissen wir, daß jeder Reflexablauf in unser „Bewußtsein treten“, das heißt von subjektiven Epiphänomenen begleitet sein kann; allen voran gehen die Reflexantworten auf gewebserstörende Reize, die man ihrer akzentuierten Eigenschaft wegen schlechthin Schmerzreflexe nennt. Unter krankhaften Umständen werden uns selbst solche Reflexe bewußt, die in der Norm während des ganzen Lebens unterhalb der Bewußtseinschwelle verlaufen. Wir pflegen derartige Folgerungen auch auf den Nebenmenschen und auf die Lebensäußerungen jener Tiere zu übertragen, die einen, dem unsrigen ähnlichen Gehirnbau haben, mit einer, der Größe der strukturellen phylogenetischen Verschiedenheiten angemessenen fallenden Wahrscheinlichkeit. In der vorliegenden Untersuchung war aber der größte, und gerade jener Teil des Großhirns entfernt, dem speziell für die Bewußtseinsfunktionen die wesentlichste Bedeutung zugeschrieben wird. Alle wahrgenommenen Bewegungsverbände wurden vom Gehirnstamme allein geleistet, wie das in der Lehre von der zunehmenden Bedeutung des Urhirns in der absteigenden Tier (Edinger) zum Ausdruck gelangt. Wollen wir nicht zur aussichtslosen Häufung von Hypothesen greifen (supponierte Bewußtseinsfunktionen des Hirnstammes, der Nervenzellen u. a.) von denen keine einzige eine reale Repräsentation in unseren Erfahrungen haben kann, so müssen wir schließen, daß dieses Schaf den Schächteschnitt nicht mehr fühlen oder als Schmerz empfinden konnte; dessen ungeachtet liefen alle Abwehrbewegungen in gewöhnlicher Form ab, was uns zeigt, daß sich alle hier in Betracht kommenden Bewegungskomplexe auch ohne Bewußtsein, also rein mechanisch-reflektorisch vollziehen können. Ihre Gliederung, Intensität und Verknüpfung enthält nirgends ein objektives Bewußtseinskriterium, wie das auch den Grundzügen der vergleichenden Psychologie entspricht.

Innere Medizin und Chirurgie.

U p f f e n e g g e r, A.: Über ein neues Präparat zur Behandlung von Arthritiden verschiedener Ätiologie. (Archiv für exp. Path. und Pharm. 1927, Bd. 69, S. 321.)

Verf. hat in einer Reihe von Fällen schwerer Gonitis und Gonotrochleitis exsudativa beim Rinde eine neues Präparat Arthrin (Brändli & Gräub, Bern) angewendet. Es hat Leimkonsistenz, wirkt desinfizierend und hyperämisierend, fixiert und komprimiert. Überblickt man die beigegebene Kasuistik von 15 z. T. recht schweren Fällen und deren Verlauf unter Arthrinwirkung, so hat man den Eindruck, daß die Heilung akuter Formen bedeutend beschleunigt ist, während chronische Fälle mit pathologisch-anatomischen Veränderungen auch durch Arthrin unbeeinflusst bleiben. Dies ist bei der stabilen Natur der Knochenveränderung verständlich. Nicht nur bei exsudativer

Arthritis des Kniegelenks des Rindes, sondern auch bei Bursitis, Sprunggelenksgallen und Stollbeule des Pferdes hat Verf. durch Arthrin gute Wirkung gesehen. Es ist bei allen diesen chirurgischen Leiden Hauptbedingung, daß das Arthrin dick genug aufgetragen und nicht abgewaschen werde. Es ersetzt in seiner Wirkung die scharfe Friktion, sowie den Verband. Er behandelt beim Rind alle Fälle von Tarsitis, Carpit, Fesselgelenkentzündung mit gutem Erfolg mit Arthrinauffrich. Auch bei der Kälberlähme konnte er von 16 Fällen 13 innerhalb 3—8 Tagen zur Heilung bringen. H. Graf.

K o n g e, W.: Einige Bemerkungen über die Staupe der Hunde. (Berliner tierärztl. Wschr. 1927, S. 666.)

Nach den umfangreichen Erfahrungen des Verf. hängt die große Sterblichkeit bei dieser Krankheit in erster Linie mit der falschen Aufzucht der Hunde zusammen. Zunächst ist zu starke Inzucht zu vermeiden, sodann müssen die Hunde

von der fünften Woche ab Fleisch mit nicht zu viel Knochen erhalten. Ferner ist das Baden nach Möglichkeit zu vermeiden und es ist viel Bewegung zu gewähren. Die Tiere müssen von Feuchtigkeit und Zugluft ferne gehalten werden, und schließlich ist sowohl bei der Mutter als auch bei den Welpen eine radikale Wurmkur durchzuführen unter Anwendung des *Ol. chenopodii* bei Spulwürmern und des *Arcolinum hydrobromicum* in Verbindung mit Kamala bei Bandwürmern. Durchfall der jungen Hunde wird mit Salol und Rotwein behandelt. Infolge derartiger prophylaktischer Maßnahmen hat Verf. innerhalb zwei Jahren keinen Todesfall an Staupe zu verzeichnen gehabt.

Bewährt haben sich in der Praxis auf Grund zahlreicher Fälle das Bismuthum colloidal nach Prof. Andrejew, das Salol, Einspritzungen von Testikularflüssigkeit nach Prof. Krafkoff und von physiologischer Kochsalzlösung in verschiedenen Modifikationen. Die Behandlung mit Salvarsan, Neosalvarsan, Urotropin, Staupeferum, Blut von staubegenesenen Hunden, Strychnin subkutan und Gleichstrom hält Verf. für nutzlos, Strychnin sogar für schädlich. Bei nervöser Staupe ergaben sich glänzende Resultate durch Bestrahlung mit der Solluxlampe (rotes Filter, Dauer nicht über $\frac{1}{2}$ Minute). Zum Schlusse berichtet Verf. über einen durch Injektionen von Bismuth. colloidal geheilten Fall von Lähmung der Nachhand infolge nervöser Staupe, bei dem zwei Monate nach der Genesung ein Rezidiv eintrat, als der betr. Hund kalt gebadet wurde. Carl.

Eidg. Veterinäramt: Untersuchungen über eine anscheinend infektiöse Augenerkrankung der Gmsen. (Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 428.)

Einige dem Eidg. Veterinäramt eingelieferte Gmsen hatten sehr starke Konjunktivitis, Keratitis, Verwachsungen der Linse mit dem Glaskörper und der Iris, wolkige Trübungen der Linse; es wurde, da namentlich von seuchenpolizeilicher Bedeutung der Alpengegenden von weittragender Bedeutung, besonders auf Grund besonderer Vermutung die Untersuchung der Frage einer evtl. Identität mit der infektiösen Agalaktie der Ziegen vorgenommen. Die Erreger konnten nach Bridré und Donatien nicht nachgewiesen werden, auch gelang es nicht mit Augenmaterial, Synovialflüssigkeit und Lymphdrüsen bei gefundenen Ziegen den Symptomenkomplex der infektiösen Agalaktie hervorzurufen; ebenfalls konnte durch enges Zusammenleben, gemeinsame Fütterung solcher erkrankter Gmsen mit gefundenen Ziegen während vier Wochen keine Erscheinungen an diesen beobachtet werden, während dieselben mit agalaktischen Ziegen zusammengebracht, nach der Inkubationszeit erkrankten, somit empfindlich waren. Die beobachtete Augenerkrankung der Gmsen steht somit in keinem Zusammenhang mit der infektiösen Agalaktie der Ziegen. Auch ging die Krankheit von Ziegen nicht auf die augenkranken Gmsen über. (Subkutane Einspritzung von Milch agalaktischer Ziegen.) Wie die Ziegen, so zeigten sich auch die Schafe gegen die Erkrankungen der Gmsen resistent. Zum Bilde der Agalaktie gehören aber noch Arthritiden und Lymphadenitis, sie fehlten bei den Gmsen, so daß die Zugehörigkeit der Augenerkrankungen zum Symptomenkomplex dieser Seuche schon von Anfang an zweifelhaft war. H. G.

Hetyéssy, St.: Zaumschütteln beim Pferd als Untugend. (Allatorvosi Lapok, 1927, Nr. 17, S. 207.)

Diese bisher in der Literatur nicht beschriebene Untugend wurde bei zwei, 5 und 6 Jahre alten arabischen Halbblutpferden beobachtet. Nach dem Aufzäumen wird der Kopf soweit eingenommen, daß er senkrecht zum Boden zu stehen kommt, hierauf wird der Zaum durchschnittlich dreimal in der Sekunde am zahnlosen Rande des Unterkiefers auf- und abwärts bewegt und dabei durch den sich rasch bewegenden Zaum und dessen Ringe ein starkes Geräusch erzeugt. Das Spiel dauert im Durchschnitt 14—18 Sekunden, dann folgt eine Pause von 1—2 Sekunden und darauf wieder

das Spiel mit dem Zaum. Die Verschiebungen des Zaumes am zahnlosen Rande werden mit der Zunge ausgeführt, die während der gesteigerten Inanspruchnahme sich ziemlich stark verdickt und dementsprechend zwischen den Schneidezahnreihen eine bis 4—5 mm breite Spalte entstehen läßt, die aber durch die Lippen verdeckt gehalten wird. Gleichzeitig bemerkt man eine vermehrte Muskelspannung im Bereiche der Nüstern und des Gesichtsteiles. Nach der Entfernung des Zaumes verhalten sich die Tiere ruhig.

Marek.

Schmötzer: Angeborene Ohrfistel; Zähne an der Ohrmuschel. (Allatorvosi Lapok, 1927, Nr. 19, S. 227.)

Bei einem zwei Monate alten Lamm zeigte sich die Subparotidealgegend beiderseits ständig mit Schleim, auf der einen Seite außerdem auch mit gekauten Futterresten beschmutzt. Die Entleerung dieser Stoffe aus der Ohrmuschel nahm während der Futteraufnahme bedeutend zu. Die Ohrmuscheln zeigten sich im großen ganzen normal entwickelt, an deren vorderem und unterem Rande befanden sich aber im Bereiche des Tragus je zwei Schneidezähne eingebettet, die von einem schleimhautartigen, von Backenschleimhautpapillen besetzten Epithel umgeben erschienen. Da auf Grund dieser Erscheinungen eine angeborene Rachenohrfistel feststellbar war, wurde das Tier geschlachtet. Bei der Zerlegung fand man die Öffnung der Eustach'schen Röhre klaffend und trichterförmig gestaltet, in der Nähe des Fellenbeins aber sich etwas verjüngend. Während auf der einen Seite rudimentäre Gehörknöchelchen zu finden waren, wurden solche an der Seite, an der sich Futterteile aus dem Gehörgang zu Lebzeiten des Tieres entleert hatten, vermißt. Ein knöcherner Gehörgang fehlte vollständig. Die Entwicklungsanomalie dürfte durch ein im Laufe der zweiten embryonalen Woche den ersten Viszeralbogen treffendes Trauma veranlaßt gewesen sein, zu der Zeit somit, wo die Viszeralbogen bereits entwickelt waren, das Hervorwachsen des Meckelschen Knorpels aber infolge der traumatischen Einwirkung nicht stattfinden konnte. Marek.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Verwendung von Kadaverfleisch.

RdErl. d. MfLDuF. vom 12. Juni 1928 — V 3982 —.

Der Reichsverband Deutscher Abdeckereiunternehmer hat zur Sprache gebracht, daß vielfach keine Klarheit darüber herrsche, inwieweit den Tierbesitzern eine Verwendung der Kadaver gefallener oder nicht zu Schlachtzwecken getöteter Tiere gestattet werden könne. Vielfach sei, so wird ausgeführt, die Meinung verbreitet, daß die Ortspolizeibehörde oder die höhere Polizeibehörde auf Grund der reichsrechtlichen Ausführungsbestimmungen zum Tierkadavergesetz vom 28. März 1912 (RGBl. S. 230) und der Preussischen Ausführungsvorschriften dazu vom 1. Mai 1912 (LwMBL. S. 177) die Verwendung von Kadaverfleisch als Futtermittel für Tiere im eigenen Wirtschaftsbetriebe des Besitzers oder außerhalb dieses Betriebes auch dann zulassen könne, wenn durch Polizeiverordnung der Ablieferungszwang für die Kadaver an eine bestimmte Abdeckerei vorgeschrieben worden sei.

Die Verwendung von Kadaverfleisch nach § 2 der vorbezeichneten Ausführungsvorschriften vom 1. Mai 1912 kann sich nur auf die Fälle erstrecken, in denen solche Verwendung nicht durch andere Vorschriften ausgeschlossen worden ist. § 3 des Tierkadavergesetzes vom 17. Juni 1911 (RGBl. S. 248) behält dem Landesrecht ausdrücklich weitergehende Vorschriften, als sie das Gesetz und die zu seiner Ausführung erlassenen Bestimmungen enthalten, vor. Wenn daher durch Polizeiverordnung vorgeschrieben worden ist, daß die Kadaver bestimmter Tiergattungen an eine Abdeckerei zur unschädlichen Beseitigung abzuliefern sind, so findet auf diese Kadaver der § 2 der genannten Ausführungsvorschriften vom 1. Mai 1912 keine Anwendung, vielmehr müssen die Kadaver, soweit die Polizeiverordnung keine Ausnahme zuläßt, in allen Fällen der Abdeckerei zugeführt werden. Die Polizeibehörde ist beim Vorliegen einer entgegenstehenden Polizeiverordnung nicht befugt, Befreiungen von dem Ablieferungszwange zuzulassen.

Kraus, R.: Zur Frage der präventiven Schutzimpfungen gegen Tuberkulose nach Calmette mittels BCG. (Wiener Klinische Wochenschrift 1927, Nr. 2, S. 49—54. Siehe auch Nr. 48, S. 1508—1510.)

Schroetter, H.: Gesichtspunkte zum Schutzverfahren der Säuglinge gegen Tuberkulose nach A. Calmette. (Ebenda. Nr. 6, S. 194—195.)

Suarez, E.: Über Schutzimpfung gegen Tuberkulose mit BCG. nach Calmette. (Ebenda. Nr. 12, S. 381—382.)

Nobel, E.: Welche Bedeutung hat die Schutzimpfung nach Calmette gegen die Tuberkulose. (Ebenda. Nr. 47, S. 1499.)

Krauss faßt sein Urteil dahin zusammen, daß der Impfstoff von Calmette ein Vakzin im Sinne von Pasteur ist. Die Schutzimpfung schon heute in die Hand des praktischen Arztes oder Veterinärs zu geben, wäre verfrüht. Soll die Schutzimpfung von Calmette auf eine sichere Grundlage gestellt werden, so würde sich empfehlen, daß erst Nachprüfungen unter autoritativer Leitung bei Menschen und Tieren durchgeführt werden. Wenn man sich von der Unschädlichkeit des Impfstoffes auch durch Autopsien (der interkurrent oder an Tuberkulose Gestorbenen) überzeugt, die Frage der Revakzination und die Dauer der Immunität studiert hat, erst dann könnte dieses Impfverfahren der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Aber auch dann wird es sich empfehlen, so wie es Calmette heute tut, eine zentrale staatliche Organisation zu schaffen, wo der Impfstoff hergestellt wird, und die Kontrolle über den Verlauf der Impfung geschieht. Ob Calmette dem Ideal, welches R. Koch und Behring bei der Schutzimpfung vorstrebte, mit BCG. näher gekommen ist, werden erst die weiteren Nachprüfungen lehren müssen. — Soweit sich heute schon übersehen läßt, dürfte nach Schroetter der Forscher Calmette ein Ziel erreicht haben, das Koch und v. Behring und ihre Nachfolger in weiterverzügelter Arbeit bisher vergeblich erstrebten. Die Tuberkulose ist eine so fürchterliche Geißel der „zivilisierten“ Menschheit, daß eine Methode, die keine Gefahren birgt, die inoffensiv ist, unbedingt zur Anwendung gebracht werden soll, wenn sie auch nur einigermaßen aussichtsreich erscheint. Aus im wesentlichen theoretischen Bedenken noch 10 Jahre mit der Anwendung des Verfahrens zu warten (Vorschlag eines heimischen Bakteriologen), hält Sch. für verfehlt. Den gleichen Standpunkt möchte er auch bezüglich der Prophylaxe des neugeborenen Rindes einnehmen. Durch die von J. Schroeder in Amerika gemachten Erfahrungen (an 2000 Rindern bezgl. einjähriger Beobachtung und günstigen Sektionsergebnissen) und der in Italien durchgeführten einmaligen Impfung und Revakzination, hat diese Prophylaxe eine neue Stütze erfahren. — Suarez spricht sich ebenfalls günstig über die Schutzimpfung aus. — Nobel steht auf einem anderen Standpunkt und kommt zu dem Ergebnis, daß die etwa durch BCG. entstehende Immunität eine echte Infektionsimmunität darstellt, und das Verfahren aus diesem Grunde, da sie mit der artefiziellen Infektion des Säuglings erkaufte werden muß, wohl abzulehnen ist. Das Reichsgesundheitsamt hat nach der Mitteilung von Schlossmann ausdrücklich davor gewarnt, das durchaus noch nicht genügend im Tierversuch geklärte Verfahren bei Kindern anzuwenden.

Dahmen, H.: Beitrag zur Entstehung und Bekämpfung von Aufzuchtkrankheiten. (Aus dem Staatlichen Institut für Tierseuchenforschung und -Therapie in Klein-Ziethen.) (B. T. W. 1928, S. 65—68.)

Verf. steht auf dem Standpunkte, daß einmal die Infektion der Mutter mit Abortus Bang und das damit im Zusammenhange stehende Eindringen der Krankheitskeime in den Magendarmkanal hervorgerufen wird, das begünstigende Moment für die Entwicklung der Ruhrerreger darstellt. Sodann wirkt in der gleichen ungünstigen Weise die Verabreichung von Milch aus erkrankten Eutern auf den

Digestionstraktus der Kälber. Von diesen Gesichtspunkten aus gelangt Verf. zu folgendem Bekämpfungsverfahren:

1. Der feuchtenhafte Abortus ist durch hygienische Maßnahmen mit Hilfe der Blutuntersuchung zu bekämpfen. Die gesund befundenen Tiere sind von den infizierten (reagierenden) Tieren zu trennen. Die infizierten Tiere sind der Impfung mit lebenden Erregern zu unterziehen, um nach Möglichkeit den Abortus zu verhindern.

2. Die Ernährung der Jungtiere aus Abortusbeständen erfolgt in den ersten Tagen der Geburt nicht mit Milch, sondern mit Haferfischleim, dem eine geringe Menge eines Desinfiziens und eines Laxans beigelegt wird. Nach zwei bis drei Tagen kann die Milchernährung einsetzen.

3. In jedem Falle ist das Euter des Muttertieres zu untersuchen. Bei etwaigen Veränderungen ist die Milch von der Ernährung des Jungtieres auszuschließen. Das Euter der Mutter ist, sofern nicht Tuberkulose vorliegt, zu behandeln. Wird hierfür Selectan gegeben, so kann nach meinen Erfahrungen die Milch eines solchen Muttertieres schon nach 2—3 Tagen dem Jungtier wieder verabreicht werden. Milch aus einem tuberkulösen Euter, auch wenn nur der Verdacht vorliegt, ist in jedem Falle von der Verabreichung auszuschließen.

4. In allen Fällen ist die Dislokation auch der gesund erscheinenden Jungtiere aus dem Stalle ins Freie durchzuführen. Die Jungtiere bleiben auch bei schlechtem Wetter und in der Nacht draußen. Die Jungtiere gewöhnen sich an den Aufenthalt im Freien so schnell, daß ihnen, soweit meine Erfahrungen reichen, durch diesen Freiluftaufenthalt keine Schädigung erwächst.

Carl.

Glusmann, M., O. Kowalewa u. L. Predtetschenskaja: Zur Frage der Unschädlichkeit des Virus fixe bei subkutaner Injektion. I. Mitteilung. (Aus der Pasteurischen Abteilung des Charkower Bakteriologischen Institutes. — Leiter: Dr. M. Glusmann.) (Zschr. für Hygiene 1928, 108, H. 2, S. 426.)

Da in den letzten Jahren wiederholt Fälle von Komplikationen nach der Wutschutzimpfung beobachtet worden sind, haben die Verfasser systematische Untersuchungen darüber angestellt, ob wiederholte Injektionen von Virus fixe, wie sie beim Menschen angewandt werden, für das Kaninchen unschädlich sind. Die Immunisierung der Kaninchen wurde nach der Methode von Hoegyes-Phillips (Verwendung von Gehirn und Rückenmark) und von Fermi ausgeführt. Die Verfasser kamen dabei zu folgendem Ergebnis: Die subkutane Immunisierung der Kaninchen nach der Methode Hoegyes-Phillips endete in ihren Versuchen bei einem großen Teil der Kaninchen mit Erkrankung und Tod (von 17 Tieren gingen acht ein). Die Krankheit verlief entweder unter Lähmungsercheinungen von seiten der Extremitäten und unter typischen Symptomen der paralytischen Tollwut. Die Tiere erkrankten entweder während der Impfperiode oder kurz danach. Die Immunisierung mit der Emulsion nach Fermi wurde von den Kaninchen gut vertragen. Während subkutane Injektionen großer Mengen Emulsion aus frischem Gehirn (3 ccm einer 5prozentigen Emulsion) zu einer typischen Erkrankung der Kaninchen führten — und zwar schon sechs bis sieben Tage nach Beginn der Immunisierung — wurde die Zufuhr einer gleichen Menge der karbolisierten Emulsion sofort nach deren Herstellung glatt vertragen. Bei der letzten Behandlung traten jedoch vier plötzliche Todesfälle im Moment der Injektion ein; ein Kaninchen starb am achten Tage der Behandlung, ein zweites am 13. Tage und zwei am 14. Tage. Eine Erklärung für diese Todesfälle konnte nicht gegeben werden. Die mehrmalige subkutane Zufuhr großer Mengen von Rückenmark (3 und 5 ccm einer Emulsion aus frischem Rückenmark) wurde von den Kaninchen gut vertragen — ganz im Gegensatz zu der entsprechenden

Emulsion aus frischem Gehirn. Bei einem Teil der geimpften Kaninchen konnte im Gehirn das Virus fixiert festgestellt werden und zwar 1. bei plötzlich gestorbenen, 2. bei vorher künstlich abgekühlten und 3. bei scheinbar vollkommen gefunden Tieren. Die bei einigen Tieren vorgenommene Prüfung auf Immunität spricht dafür, daß die Behandlung nach Fermi zum mindesten nicht schlechter wirkt als die nach Hoegyes-Phillips-Ziegler.

Standesangelegenheiten.

Veterinärmedizinische Gesellschaft für Südwestdeutschland.

25. Februar in Frankfurt a. Main.

Anwesend 100 Teilnehmer. Der Vors. Dr. Berdel eröffnet die Sitzung um 3,15 Uhr nachmittags. Das Wort erhält Dr. Albrecht zu seinem Vortrage über die Immunisierung gegen Tuberkulose nach Calmette. Nach Würdigung der bisher angewandten Immunisierungsmethoden entwickelte Vortragender den Gedanken, daß nur ein tuberkulöser Prozeß, hervorgerufen durch virulente Tuberkelbakterien, zur Immunität führen könne und besprach von diesem Gesichtspunkt aus die Untersuchungen von Robert Koch, von Behring, Schütz, Mießner und Neufeld, Römer und Joseph, Uhlenhuth, Selter, Knauer und Geschke. Bei dem Calmette'schen Immunisierungsverfahren gegen Tuberkulose wird ein avirulenter boviner Tuberkelbakterienstamm benutzt. Dieser Stamm, B.C.G. (Bazillus Calmette-Guérin) genannt, soll im Laufe von 13 Jahren durch Züchtung auf Glyzerin-Kartoffel mit Zusatz von 5 Prozent Rindergalle in 230 Passagen seine Virulenz fast vollständig verloren, seine antigenen Eigenschaften und seine Fähigkeit Tuberkulin zu produzieren aber unvermindert erhalten haben. Nach seinen bisherigen experimentellen Untersuchungen glaubt C. sich zu der Annahme berechtigt, daß bei Verwendung seiner abgeschwächten Kultur als Impfstoff eine ungefährliche, aber zur Ausbildung einer Immunität doch ausreichende Erstinfektion gesetzt werden könne, die lange genug anhalte, um die gerade während der ersten Lebensjahre besonders gefährdeten Kinder zu schützen. Die Anwendung des B.C.G.-Impfstoffes erfolgt bei Kindern oral und soll, bisher sind 52 000 Kinder geimpft worden, überraschend gute Ergebnisse gezeitigt haben. Ebenfalls berechtigen die von Calmette und seinen Mitarbeitern Guérin, Richard und Boissière bei subkutaner Applikation an Großtieren gemachten Beobachtungen, die die Grundlage zu den Versuchen an menschlichen Säuglingen bildeten, zu den besten Hoffnungen, in dem Calmette'schen Verfahren ein weiteres, aussichtsreiches Kampfmittel gegen die Tuberkulose gewonnen zu haben. Nachprüfungen sind bisher erfolgt von Ascoli, Technovitz und namentlich von Gerlach. Nachdem der Vortragende die von biologischer und klinischer Seite gegen das Calmette'sche Verfahren erhobenen Einwände, vor allem die nicht allseitig festgestellte Avirulenz (R. Kraus und Gerlach), sowie die Möglichkeit der Rückwanderung in die virulente Form (Petroff) und die ungenaue stomachale Immunisierung bei Kindern gewürdigt hatte, schließt Vortragender sich der bereits erhobenen Forderung an, den Impfstoff der allgemeinen Praxis noch nicht zugänglich zu machen. Zunächst müssen vorsichtig tastende Versuche in stark mit Tuberkulose verseuchten Gehöften unter ausgiebiger Benutzung von Kontrollen, genauen Schlachtbefunden usw. angestellt werden, bevor entschieden werden kann, ob das Calmette'sche Immunisierungsverfahren unserem Tuberkulosebekämpfungsverfahren nutzbar gemacht werden kann.

Die Diskussion eröffnet Dr. Stephan: Der Statistik von 52 000 geimpften Kindern muß man kritisch gegenüberstehen. Nach den bisherigen Versuchen ist es noch nicht geklärt, ob die verwendeten Bakterien tatsächlich für immer avirulent sind oder nicht. Jahrelange Versuche sind noch nötig, um festzustellen, ob sie nicht doch wieder virulent werden. Dann ist das Verfahren für die Praxis unbrauchbar. Calmette führt selbst einen Fall an, in dem ein immunisiertes Kind an Meningitis tuberculosa gestorben ist. Ob der Tod infolge oder trotz der Impfung eingetreten ist, konnte nicht festgestellt werden. In den Brüsseler Versuchen waren die Ergebnisse jedenfalls nicht eindeutig, ein Teil der Impflinge hat Tuberkulose erworben. Zu beachten ist, daß neben der Impfung hygienische Maßnahmen einhergehen, denen

ein Teil der Erfolge zuzuschreiben ist. Calmette hat die Kinder drei Monate dem gefährlichen Milieu entzogen und dadurch einen großen Gefahrenkomplex beseitigt. — Von den verschiedenen Forschern werden immer wieder die Tierversuche Calmette's als Beweismittel herangezogen. Bei den Tieren hat Calmette jedoch subkutan geimpft, während er den Säuglingen den Impfstoff peroral gibt, was für die immunisatorische Wirkung sehr zu beachten ist.

Dr. Witte: Durch Prof. Zwick sind Versuche zur Nachprüfung des Impfstoffes an kleinen Tieren gemacht worden. Die Ergebnisse berechtigen zu der Forderung, zu Versuchen an großen Tieren zu schreiten.

Dr. Eickmann: Das grundlegende Prinzip ist, mit artgleichen Bazillen einen virulenten Herd zu setzen. Selter geht noch weiter als Calmette, insofern, als er tatsächlich virulente Bazillen verwendet. Die Stärke des Impfstoffes läßt sich ungefähr bestimmen. Nach Selter soll eine einmalige Impfung subkutan in der Leistengegend für ein ganzes Leben genügen. Die Versuche haben ergeben, daß man diesen Herd setzen kann, ohne daß aufflackernde Tuberkulose entsteht. Das Calmette'sche Verfahren ist nicht ohne weiteres auf Deutschland zu übernehmen. Die führenden Landwirte wollen abwarten, wie sich das Verfahren bewährt.

Dr. Eickmann über „das freiwillige Tuberkulose-Bekämpfungsverfahren“. Eine Tuberkulosebekämpfung im Sinne des Tuberkulose-Bekämpfungsverfahrens basiert auf den Kenntnissen, die wir über die Ansteckung und Weiterverbreitung dieser Seuche besitzen. Nicht nur der Veterinär-Mediziner, sondern auch der Human-Mediziner unterscheidet klinisch grundsätzlich zwischen geschlossener und offener Tuberkulose. Bei der geschlossenen Tuberkulose handelt es sich um tuberkulöse Herde in Organen oder Lymphknoten bis zur ausgebreiteten Serosen- und Peritonealtuberkulose, die einen Ausweg aus dem Körper nicht besitzen. Wir können heute annehmen, daß fast 100 Prozent der erwachsenen Menschen und 75 Prozent der erwachsenen Rinder solche geschlossene Tuberkuloseherde aufweisen, mit anderen Worten, Tuberkulin positiv sind. Man steht auf dem Standpunkt, daß dieser Herd, der lebende Tuberkelbakterien aufweist, einen Schutz gegen die täglichen Tuberkelbakterienattacken, denen wir ausgesetzt sind, bildet. Bekanntlich haben wir das Bang'sche Tuberkulose-Tilgungsverfahren, das mit Hilfe des Tuberkulins alle reagierenden Tiere zunächst separieren und allmählich und langsam ausmerzen will, für unsere Verhältnisse wegen der wirtschaftlichen Undurchführbarkeit ablehnen müssen. Es sollte kein Tierarzt in tuberkulösen Beständen, in denen er vom Besitzer zur Sanierung zugezogen wird, die Tuberkulinimpfung bevorzugen. Gerade in solchen Beständen werden 75 Prozent und mehr Tiere reagieren, es wird lediglich erreicht, den Besitzer kopfscheu und gleichgültig gegen eine Tuberkulose-Bekämpfung zu machen, weil er sie nach dem Ergebnis doch für aussichtslos hält. Durch die Tuberkulinimpfung leisten wir in solchen Beständen der Landwirtschaft den schlechtesten Dienst. Auch in gerichtlichen Streitfällen halte ich wenig vom Tuberkulin. Handelt es sich darum, bei einer hustenden Kuh den Prozeß einzuleiten, und ist es nicht klar, ob der Husten durch Tuberkulose bedingt wird, so wird zum Tuberkulin gegriffen. Ist die Ursache des Hustens und der Abmagerung eine gewöhnliche Lungenentzündung, oder beruht sie vielleicht auf Lungenwürmern, hat das Tier aber von seiner Jugend her durch Intestinalinfektion auch nur einen geringen tuberkulösen Darmlymphknotenherd, so wird die Tuberkulinreaktion unter Umständen sehr stark positiv ausfallen. Die Schlachtung erst ergibt da den Irrtum bezüglich der Lungentuberkulose. — Nach § 10 V.G. befranken wir uns auf die Bekämpfung der offenen Lungen-, Euter-, Gebärmutter- und Darmtuberkulose. Wissenschaftlich ist dieser Begriff zu beanstanden, denn wir kennen auch noch andere Formen der offenen Tuberkulose. Beispielsweise Hoden-, Scheiden-, (Gärtner'sche Gänge) Tonsillen-, disseminierte Nieren-, ja sogar offene Lebertuberkulose. Diese Formen sind aber äußerlich nicht oder nur schwer feststellbar, sie haben eine geringe Bedeutung und sind deshalb in das Viehseuchengesetz nicht mit aufgenommen. Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß eine offene Lungentuberkulose keineswegs eine große und auffallende Ausdehnung zu besitzen braucht. § 29 der Anweisung für das Zerlegungsverfahren bei Viehseuchen (Anlage B—V, A.V.G.) besagt, daß Lungentuberkulose in vorgeschrittenem Zustande dann vorliegt, wenn in der Lunge

das Vorhandensein wenigstens eines tuberkulösen Erweichungsherd, der in offener Verbindung mit den Bronchien oder deren Verzweigungen steht, ermittelt wird, oder wenn sich tuberkulöse Veränderungen im Bronchialbaum selbst befinden. Über die Größe des Erweichungsherd ist also nichts gesagt. Die Anweisung für die Feststellung der Tuberkulose verlangt schon bei einfachem Verdacht der Tuberkulose Störungen der Ernährung. Wir gehen im Tuberkulose-Tilgungsverfahren weiter und erklären schon Kühe mit verdächtigem Husten und selbst undeutlichen Atmungsgeräuschen für verdächtig und finden viele Tiere mit offener Tuberkulose, die sich im allerbesten Nährzustand befinden. Unser Prinzip muß sein: Früheste Feststellung der offenen Lungentuberkulose. In den letzten Jahren ist ministeriell angeordnet, daß der beamtete Tierarzt, wenn ein bakteriologisch festgestelltes, mit offener Tuberkulose behaftetes Tier auszumerzen ist, entgegen der bisherigen Anweisung nicht unbedingt die Störung der Ernährung als wichtiges Kriterium hinzustellen hat. Im übrigen ist der beamtete Tierarzt, wenn er Zweifel an der Diagnose hat, jederzeit berechtigt, gemäß § 300 V.A.V.G. amtlich eine neue Bronchialschleimprobe zu entnehmen; erst der Ausfall dieser zweiten Untersuchung entscheidet in einem solchen Falle. Unsere frühere Ansicht, daß die Schweinetuberkulose lediglich durch Aufnahme tuberkelhaltiger Milch bedingt wird, ist dahin abzuändern, daß nicht nur in Dänemark, sondern neuerdings auch in Deutschland durch Untersuchungen des Reichsgesundheitsamtes festgestellt wurde, daß bei nahezu 40 Prozent untersuchter Schweine die Tuberkulose auf den Geflügeltuberkelbazillus zurückgeführt werden konnte. Bei der zunehmenden Geflügelhaltung und der damit einhergehenden Steigerung der Tuberkulosefälle unter Geflügel werden diese Tatsachen dazu zwingen, der Geflügeltuberkulose eine erhöhte Bedeutung beizumessen. Bei der Gebärmuttertuberkulose wird darauf hingewiesen, daß seitens der Tierärzte dieser Form der Tuberkulose eine erhöhte Aufmerksamkeit unbedingt zugewandt werden muß, denn dort, wo die Tuberkulosebekämpfung gleichzeitig mit der Sterilitätsbekämpfung durchgeführt wird, kommen ganz andere Zahlen von Gebärmuttertuberkulose zum Vorschein, als bisher im freiwilligen Tuberkulose-Tilgungsverfahren.

Die Entnahme der Bronchialschleimprobe entweder durch den Lungenfleckbecher oder durch die Trachealkanüle ist den Tierärzten bisher noch frei gestellt. Frühere Untersuchungen im bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz haben ergeben, daß bezüglich einer besseren mikroskopischen Feststellung der Tuberkulose ein Unterschied zwischen den beiden Methoden nicht festzustellen ist. Bei der Verwendung des Lungenfleckbechers ist aber unbedingt darauf zu achten, daß die Proben frei von Futterpartikeln sind. Dieses läßt sich nur dadurch erreichen, daß vor der Probeentnahme dem betreffenden Rinde eine oder zwei Weinflaschen voll Wasser ins Maul zum Abschlucken gegeben werden.

Es wird besonders darauf hingewiesen, daß von allen Tieren, von denen im Tuberkulose-Tilgungsverfahren Proben entnommen sind, die Anzeige sowohl an den Veterinärrat als an den Landrat zu erstatten ist, daß die Tiere bis zum Abschluß der Untersuchung getrennt aufzustellen sind und daß sie nicht vor Abschluß der Untersuchung in den freien Handel gebracht werden dürfen. Der Landwirt kann lediglich vor Abschluß der Untersuchung Schlachtung nach Anzeige bei der Polizeibehörde vornehmen.

Zwecks Vermeidung von Fehldiagnosen ist es dringend erforderlich, daß der Tierarzt sich zwischen jeder Probeentnahme gründlich die Hände und vor allem auch die Instrumente desinfiziert. Bei den bisher vorgekommenen Fehldiagnosen im Institut konnte zu etwa 75 Prozent festgestellt werden, daß bei anscheinend gefundenen Lungen polizeilich getöteter Tiere, in dem Schleim der feinsten Bronchien Tuberkelbakterien nachweisbar waren, so daß also die öfters festgestellte Tatsache weiter erhärtet wurde, daß in gefundenen Lungen Tuberkelbakterien auftreten können. Man muß annehmen, daß Tuberkelbakterien, die inhaliert werden, zeitweise auf der gefundenen Schleimhaut sich festsetzen und ohne weitere Veränderungen hier eine Zeit lang vegetieren und sich vermehren können. Es werden weiterhin ausführliche Angaben über das beschleunigte Ausmerzverfahren im Tuberkulose-Bekämpfungsverfahren gemacht, auch wird darauf hingewiesen, daß gemäß § 302 V.A.V.G. es möglich ist, auch ohne Anschluß an das Tuberkulose-Bekämpfungsverfahren Kühe mit Eutertuberkulose unter Entschädigung auszumerzen.

Zu Anfeindungen, denen das freiwillige Tuberkulose-Bekämpfungsverfahren ausgesetzt ist, bietet der Umstand Gelegenheit, daß ein Landwirt noch dann, wenn die Tuberkulose bei einem Tier schon festgestellt ist, dem Tuberkulose-Bekämpfungsverfahren beitreten kann, und das betreffende Tier ersetzt erhält, daß also vielfach das Tuberkulose-Bekämpfungsverfahren lediglich als Tuberkuloseversicherung aufgefaßt wird. Um derartige Landwirte vom Tuberkulose-Bekämpfungsverfahren fern zu halten, ist die Unterstützung seitens der Tierärzte unbedingt notwendig. Es muß unbedingt vermieden werden, solche Landwirte zum Anschluß an das Tuberkulose-Bekämpfungsverfahren zu veranlassen. Eine rationelle Rindviehzucht ohne eine Tuberkulose-Bekämpfung ist undenkbar. Das haben selbst die Landwirte heutzutage eingesehen. Während früher für das Tuberkulose-Bekämpfungsverfahren geworben werden mußte, drängen sich heute alle Züchtervereinigungen zum Anschluß an das Verfahren in allen Provinzen. Das ist bestimmt nicht wegen der Entschädigung, sondern weil die Züchter eingesehen haben, daß sie der Tuberkulose ihren freien Lauf unter keinen Umständen lassen dürfen, wenn sie die Früchte ihrer züchterischen Arbeit ernten wollen. Selbstverständlich soll man jedes Verfahren, da, wo es verbesserungsbedürftig ist, abändern bzw. ergänzen.

Diskussion: Geh.-Rat Olt: Redner hat den Begriff „offene Tuberkulose“ besonders eingehend behandelt. Es ist ein Unglück, daß man diesen Begriff gesetzlich nicht festlegt. Unser wissenschaftlicher Begriff deckt sich nicht mit dem gesetzlichen. Bei der Lungentuberkulose beginnt der Prozeß am Übergang der Endbronchien in die Infundibula, die Herde liegen also an den Straßen, die nach außen führen. Diese Tiere scheiden also Tuberkelbakterien aus. Wenn nur die klinisch als erkrankt nachweisbaren Tiere Bazillen ausscheiden würden, wäre die Bekämpfung viel leichter. Nach der jetzigen Methode können wir jahrhundertlang bekämpfen, ohne Bestände zu erzielen, welche absolut frei von Tuberkulose sind. Natürlich ist zu begrüßen, wenn die Landwirtschaft die Notwendigkeit der Sanierung einsieht. Wir müssen aber immer wieder darauf hinweisen, daß die Nachzucht nicht geschützt ist. Trennung der Kälber von den Muttertieren unmittelbar nach der Geburt und strenge Aufsicht sind notwendig. Als offen tuberkulös müßten alle Tiere angesehen werden, welche klinisch nachweisbar erkrankt sind und solche, welche ohne nachweisbare Veränderung Tuberkelbazillen ausscheiden.

Dr. Schipp: Von größter Bedeutung für die Bekämpfung der Tuberkulose ist der Umstand, daß die erkrankten Tiere aus dem Verkehr herausgezogen werden. Früher wurden die verseuchten Tiere von Stall zu Stall geschleppt und ihnen Gelegenheit gegeben, ihre Bazillen in noch gefundenen Beständen auszubreiten, bis sie endlich zur Schlachtung kamen. Es ist erklärlich, daß die Händler früher dem Verfahren ablehnend gegenüberstanden und beschwerdeführend dagegen vorgingen. Der Bund der Viehhändler nahm aber keine Veranlassung, dagegen einzuschreiten, da ein Händler mit der zentralen Verwertung befaßt worden sei. Es ist übrigens merkwürdig, daß man gerichtlich unter Tuberkulose etwas anderes versteht, als nach dem Viehseuchengesetz. Es wäre Zeit, daß sich der deutsche Veterinärat mit der Frage befaßt, damit die Tuberkulose im Sinne der Wahrheit und im Sinne des Viehseuchengesetzes übereinstimmend definiert werde.

Dr. Westhues spricht über die Bekämpfung der Tuberkulose in den Vereinigten Staaten. Der Staat schickt Spezialärzte zu den Landwirten, um sie für das Problem zu interessieren. Wenn 75 Prozent der Landwirte für die Bekämpfung sind, wird das Verfahren zwangsweise durchgeführt. Auf Tuberkulin reagierendes Material wird abgeschafft. Der Staat zahlt 80 Prozent des Schlachtpreises. Das Verfahren wird fortgesetzt, bis nur noch $\frac{1}{2}$ bis 1 Prozent der Tiere reagieren. Das Gebiet heißt dann tuberkulosefrei. In derartige Gebiete dürfen nur Tiere eingeführt werden, welche nicht auf Tuberkulin reagieren. Auf diese Weise gelingt es, ganze Stapel von der Tuberkulose zu befreien.

Schlußwort: Dr. Eickmann: In den Tagungen der bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammer wird stets gefordert, daß offene Tuberkulose ohne weiteres auch als Gewährmangel angesehen werden soll. Das Landwirtschaftsministerium hat sich bisher nicht darauf eingelassen. Die Einführung des amerikanischen Verfahrens ist ausgeschlossen. In den Veröffentlichungen der Amerikaner fällt auf, daß die Tuberkulose eine sehr verbreitete Krankheit sein soll. Wenn nun der Prozentsatz der reagierenden Tiere auf 1 Prozent herabgesetzt

worden ist, woher kommen dann noch die vielen tuberkulösen Schweine? Die ganze Berichterstattung mutet reichlich amerikanisch an.

Dr. Berdel, Vorsitzender.

6. wissenschaftl. Referierabend an der Tierärztl. Hochschule zu Hannover,
am 7. Juni 1928.

A. Sokolowsky-Hamburg: „Das Biologische Prinzip in der Tierhaltung und Tierzucht“. Zu Beginn seiner Ausführungen schilderte der Vortragende die Unterschiede, welche zwischen wildem Tier in freier Wildbahn und Haustier bestehen. Die Zusammenhänge, welche zwischen Tier und Umwelt sich in körperlicher, physiologischer und psychologischer Differenzierung geltend machen, beruhen beim wilden Tier auf Anpassungsschutz, der ihm von der Natur auf den Lebensweg in hohem Maße mitgegeben wird, während beim Haustier, das durch die Initiative des Menschen aus dem Zusammenhang mit der Natur in mehr oder minder starkem Maße herausgerissen wird, der ihm dadurch entzogene Naturschutz durch Kulturschutz von Seiten des Menschen geboten wird.

Durch Hochzucht und übertriebene Produktionsleistung wird die Gesundheit unserer Haustiere geschwächt und es bildet sich eine „Bereitschaft zu Krankheiten“ bei ihnen heraus. Um diese ungünstige Einwirkung auf unsere Haustiere, welche die Rentabilität unserer Tierhaltung schädigen, zu begegnen, bedarf es nach Ansicht des Vortragenden der Zusammenhänge zwischen wildem Tier und Umwelt, um die dadurch gewonnene biologische Einsicht für unsere Haustierhaltung nutzbar zu machen. Es handelt sich demnach um die Erforschung der Einflüsse der Umwelt auf den Organismus nach klimatischer, physiologischer und psychologischer Richtung hin. Aufgabe unserer Tierhaltung muß es sein, mehr als bisher den sanitären Weg zu betreten und eine vertiefte Einstellung nach ökologischer Richtung anzustreben.

Die Züchtungsbiologie muß eine Haustierökologie als selbständigen Zweig in ihr wirtschaftliches Arbeitsprogramm aufnehmen. Zur Durchführung solcher Studien sind wir größtenteils auf Beobachtungen und Experimente an gefangenen Tieren angewiesen, da solche Untersuchungen sich an wilden Tieren in freier Wildbahn sehr schwer ausführen lassen. Durch die Entwicklung des Tierhandels und durch die damit verbundene Schaustellung wilder Tiere, deren fortschrittliche Durchführung von Seiten Carl Hagenbecks in hohem Maße gefördert wurde, wird uns ein reiches Studienmaterial für vergleichende Untersuchungen auf diesem Gebiete geboten. An der Hand zahlreicher Lichtbilder, welche zum großen Teile Aufnahmen aus dem Hagenbeck'schen Tierpark entstammen, verbreitete sich der Vortragende eingehend über die verschiedenen Probleme der Tierakklimatisierung, der Pflege und Haltung fremdländischer wilder Tiere und erklärte ihr verschiedenartiges Verhalten den Einflüssen der Gefangenschaft gegenüber. Der Vortragende schilderte die im Tierpark durchgeführte auf biologischer Grundlage beruhende Haltung der Tiere und schilderte die dadurch erzielten Resultate, die sich bei den einzelnen Tierarten infolge ihrer von einander abweichenden biologischen Eigenart verschiedenartig auswirken. Namentlich wurde auf die dadurch erzielten Zuchtergebnisse aufmerksam gemacht.

Am Schlusse seines Vortrags wandte sich der Vortragende dem auf diese Weise erzielten Resultate zwecks Nutzenanwendung für unsere Haustierhaltung zu. In der Gegenwart ist die Forschung durch die Beschäftigung mit dem Vitaminproblem, mit der Klarstellung der günstigen Einwirkung der ultravioletten Strahlen auf den Tierkörper sowie verschiedene Ernährungsprobleme in hohem Maße beschäftigt, die Zusammenhänge zwischen Umwelt und Organismus zu ergründen.

Das biologische Prinzip in der Tierhaltung findet Auswirkung und Anwendung in der Fütterungslehre, in der Tierhygiene und Tierzucht. Die Pelztierzucht, die Geflügelhaltung in Farmbetrieben und andere Probleme in der Tierhaltung mehr, beruhen im wesentlichen auf biologischer Einstellung. Auch der zweite Teil des Vortrags war mit Vorführung zahlreicher Lichtbilder verbunden.

Otto Zietzschmann.

Verschiedene Mitteilungen.

Spenden und Begrüßungsadressen zur 150-Jahrfeier der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Anlässlich des 150. Geburtstages der Tierärztlichen Hochschule Hannover sind zahlreiche Begrüßungsadressen und

Spenden sowie eine unübersehbare Menge von brieflichen und telegraphischen Glückwünschen, deren Einzelaufführung an dieser Stelle unmöglich ist, eingegangen. Sie legen ein beredtes Zeugnis ab von der kräftigen Förderung und von dem stetigen Wohlwollen der Reichsregierung und der preussischen Staatsregierung, der Provinzialbehörden und der Stadtverwaltung Hannover. Die hochherzigen Spenden der niederfachsischen Wirtschaft sowie der Tierärzteverbände, zahlreicher Freunde und Gönner der Hochschule und der Kollegenschaft bekunden von neuem das große Interesse weitester Kreise an dem Gedeihen und an der Entwicklung unserer Hochschule. Das persönliche Erscheinen der Rektoren fast aller Hochschulen Deutschlands sowie vieler Vertreter des Auslandes lassen erfreulicherweise erkennen, welcher Wertschätzung sich die Hochschule allorts erfreut.

Im Namen der Hochschule, insbesondere des Professorenkollegiums, sei an dieser Stelle der aufrichtigste Dank zum Ausdruck gebracht und das Versprechen gegeben, daß die Hochschule auch künftig bemüht sein wird, sich der Anerkennung würdig zu erweisen und die Weiterentwicklung der alma mater hannoverensis auf dem Gebiete der Lehre und Forschung nach Kräften zu fördern.

Es ist mir ein Herzensbedürfnis, an dieser Stelle Allen, die zu dem guten Gelingen der würdigen 150-Jahrfeier beigetragen haben, insbesondere Herrn Prof. Dr. Trautmann, für die mühevollen Vorbereitungen und die geradezu mustergültige Organisation meinen tiefempfundenen Dank zu sagen. Allseitige Anerkennung verdient auch die Studentenschaft unserer Hochschule und der Technischen Hochschule Hannover für die innige Anteilnahme und Mitwirkung an allen Veranstaltungen, die ein schönes Bild der Zusammengehörigkeit und der Freundschaft der beiden Hochschulen gaben.

Der Rektor: Mießner.

Reichspräsident.

Mit eigenhändiger Unterschrift versehenes Glückwunschschreiben Seiner Exzellenz Dr. med. vet. von Hindenburg.

Reichsgesundheitsamt.

In Leder eingebundene, mit künstlerischen Aquarellen ausgestattete Adresse.

Der Präsident des Reichsgesundheitsamtes und des Reichsgesundheitsrates
Dr. Hamel.

Senat der Freien Hansestadt Hamburg.

Schreiben mit der Bewilligung von RM. 4000,— für Forschungszwecke.

Der Präsident des Senats: R. Ross.

Provinziallandtag der Provinz Hannover.

Auf Büttenpapier geschriebene Adresse.

Der Landeshauptmann: von Campe.

Universität Basel.

Glückwunschschreiben.

Im Namen der Universität Basel: Ruck, z. Zt. Rektor.

Universität Bern.

Auf Büttenpapier gedrucktes Glückwunschschreiben

Namens des Akademischen Senates der Universität Bern.

Der Rektor: N. Kohlschütter.

Universität Halle.

Auf Büttenpapier gedruckte Adresse für alle deutschen Hochschulen.

I. A.: Ziehen, z. Zt. Rektor der Universität Halle.

Universität München.

In Pergament eingebundene und geschriebene künstlerische Adresse.

Dr. Vinzenz Schöpfer, Rektor der Ludwig-Maximilians-Universität,

Dr. Albert Jodlbauer, Dekan der Tierärztlichen Fakultät.

Universität Zürich.

Auf Büttenpapier gedruckte Glückwunschartadresse.
Der Rektor: A. Ernst. Der Dekan: Eb. Ackerknecht.

Technische Hochschule Dresden.

In Leinen eingebundene, auf Büttenpapier ausgeführte Adresse.
Rektor und Senat der Sächsischen Technischen Hochschule Dr. Nägeli.

Technische Hochschule Hannover.

Auf Büttenpapier handschriftlich ausgeführte Glückwunschartadresse.
Rektor und Senat der Technischen Hochschule Hannover Quincke.

Bergakademie Clausthal.

In Leder eingebundene, auf Büttenpapier ausgeführte Adresse.
Rektor und Professoren-Kollegium der Bergakademie Clausthal.
Grumbrecht.

Medizinische Akademie Düsseldorf.

In Ledereinband mit eingepreßtem Wappen der Stadt Düsseldorf
auf Büttenpapier ausgeführte gemalte Adresse.
I. A.: Der Rektor der Medizinischen Akademie in Düsseldorf.
Huebschmann.

Tierärztliche Hochschule Berlin.

In Leder eingebundene Glückwunschartadresse.
Rektor und Professoren-Kollegium der Tierärztlichen Hochschule.
Dr. Stang.

Tierärztliche Hochschule Budapest.

In Leder eingebundenes mit eingepreßtem Wappen versehenes auf
Büttenpapier gedrucktes Glückwunschartreiben.
Budapest, aus der Sitzung des Professoren-Kollegiums vom 4. Mai 1928.
Dr. Franz von Hutya, derz. Rektor.
Dr. R. Manninger, Schriftführer des Professoren-Kollegiums.

Tierärztliche Hochschule Constantinopel.

Handschriftliches, in türkischer Sprache ausgefertigtes Glückwunschart-
schreiben, sowie Übersetzung.
Professor M. Halid, Rektor der Tierärztlichen Hochschule
Constantinopel.

Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Dorpat.

Auf Büttenpapier geschriebene, mit Malerei versehene lateinische
Glückwunschartadresse. Umhüllung aus Leder.
Prof. K. Sarat, Prof. emer. W. Gutmann, Prof. E. Schröder,
Doc. Joh. Amser, Prof. Dr. Hans Richter, Doc. A. Raugel,
Doc. G. Heinrich, Doc. J. Karlson.

Royal Veterinary College Edinburgh.

Auf Büttenpapier gemalte Glückwunschartadresse.
O. Charnock-Bradley, Principal. A. C. Dowell, Secretary.

Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Gießen.

Auf Büttenpapier ausgeführte Glückwunschartadresse.
Die veterinärmedizinische Fakultät der Hessischen Ludwigs-Universität.
Adam Olt.

Staats-Veterinärinstitut Kazan.

Auf Büttenpapier gedruckte Glückwunschartadresse mit Ledereinband.
Prof. C. Bohl. Dozent Pitschugin.

Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig.

In Ledereinband befindliche Glückwunschartadresse.
Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig.
M. Klimmer, Dekan.

Tierärztliche Hochschule Leningrad.

Glückwunschartschreiben auf Büttenpapier gedruckt. Ledereinband, auf
Vorderseite silberne Platte mit Figuren.
Wold. Konge, Rektor.

Veterinär-Fakultät des Zootechnischen Institutes zu Moskau.

In Einband befindliche gedruckte Glückwunschartadresse.
Dekan Professor Uranow.

Veterinärhochschule Stockholm.

In Pergament eingebundene mit Malerei versehene Glückwunschart-
adresse.

Veterinärhochschule zu Stockholm, im Juni 1928.

P. von Sells. A. V. Sahlstedt.

Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Zagreb.

Auf Büttenpapier gedrucktes Glückwunschartschreiben.
Rajecvic, Dekan.

Finnländische Tierärzte.

In Lederumschlag befindliche, auf Pergament geschriebene und ge-
malte Adresse. Darunter befinden sich die Namen ehemaliger finn-
ländischer Studierender an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Verein der Tierärzte Schwedens.

Glückwunschartadresse in Ledereinband.

Etha und Hans Richter, Dorpat.

Eine Plastik, aufspringendes Pferd.

Behringwerke, Marburg.

Eine gerahmte Radierung, Geheimrat Emil von Behring darstellend.

Vorstand des ärztlichen Vereins Hannover.

Auf Büttenpapier geschriebene, in Pergamenteinband befindliche
Adresse.

Der Vorstand des Aerztlichen Vereins Hannover.

Dr. Witte, Vorsitzender. Dr. Neuberg, Schriftführer.

Tierärztekammer für die Provinz Niederschlesien.

Auf Karton gedruckte Adresse.

Riedel, Vorsitzender.

Buchbindermeister Wilhelm Hegemann, Hannover.

Ein von ihm selbst angefertigtes kunstvolles „Goldenes Buch“.

Braunschweiger Landespferdezuchtverein E. V.

Bronzestatue des Hannoverischen Hengstes Alemanne.

Von Ehrenbürgern und Freunden der Hochschule.

Auf Anregung von Professor Dr. Paechtnier eine goldene Amts-
kette für den Rektor.

Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin.

Zahlreiche Apparate und Instrumente für die Institute sowie Bücher
für die Bücherei.

Tierarzt Eugen Bass, Görlitz.

Das von ihm verfaßte Werk: „Der praktische Tierarzt“.

Tierarzt Friese, Hannover.

Seine gesamte Bücherei.

Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper, Hannover und

Verlagsbuchhandlung Paul Parey, Berlin.

Bücher für das Lehrgut Adendorf.

Justizrat Stölzle.

Von ihm verfaßtes Werk: „Gerichtliche Entscheidungen über den
Viehkauf“.

Jubiläumsspenden.

Preuß. Landwirtschaftsministerium für Bau der Turnhalle	237 000 RM.
Die Stadt Hannover stellte hierfür den Bauplatz geschenkw- eise zur Verfügung.	
Reichsfinanzministerium des Innern	10 000 RM.
Provinz Hannover	50 000 RM.

Rheinprovinz (zur Unterstützung an bedürftige Studierende aus der Rheinprovinz)	20 000 RM.
Provinz Westfalen (zu Studienbeihilfen an bedürftige Studierende aus Westfalen) jährlich	1 000 RM.
Provinz Schleswig-Holstein jährlich	500 RM.
Landesausschuß in Hessen (Stipendium für Angehörige des hessischen Bezirksverbandes) jährlich	500 RM.
Freistaat Hamburg	4 000 RM.
Freistaat Bremen	2 000 RM.
Freistaat Lübeck	800 RM.
Freistaat Braunschweig	2 000 RM.
Freistaat Waldeck	300 RM.
Freistaat Anhalt	1 000 RM.
Freistaat Schaumburg-Lippe	500 RM.
Klosterkammer-Präsident Richter für die Mensa (vorsichtlich)	3 000 RM.
Sammlung der Niederfächfischen Wirtschaft für den Niederfächfischen Hochschulfonds.	
Im Rahmen der vom Wirtschaftsverbände Niederfächfischen Kassel eingeleiteten Sammlung für die Niederfächfischen Hochschulen ist zu Gunsten der Tierärztl. Hochschule Hannover ein Betrag von insgesamt gestiftet worden. Diese Stiftungen setzen sich zusammen aus:	31 500 RM.
10 000 RM. von der Landw.-Kammer Hannover,	
500 RM. von der Landw. Hauptgenossenschaft,	
5 000 RM. von der Industrie- u. Handelskammer,	
16 000 RM. von Handel, Industrie u. Bankgewerbe.	
Die von Handel, Industrie und Bankgewerbe gezeichnete Jubiläumsspende von RM. 16 000 setzt sich wie folgt zusammen:	
5 000 RM. Direktion der Continental, Hannover,	
3 000 RM. Kommerzienrat Beindorff (Fa. Günther Wagner), und zwar je 1000 RM. für die nächsten 3 Jahre,	
3 000 RM. Hackethal Draht- und Kabelwerke A.-G., und zwar für die nächsten 3 Jahre je 1000 RM.,	
1 000 RM. Girozentrale Hannover und Direktor Thomas,	
1 000 RM. Sälzer, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer,	
500 RM. Platz, Präsident der Industrie- und Handelskammer,	
2 000 RM. Senator Nolte, Hannover, und zwar für die nächsten 5 Jahre je 400 RM.,	
300 RM. Otto Notbohm, Inh. der Fa. Ernst Reimann, Hannover,	
150 RM. Albert Lohmann, A.-G., Hannover,	
50 RM. Hostmann - Steinberg'sche Farbenfabriken Celle.	
I.G. Farbenindustrie Höchst a. Main	2 000 RM.
Reichsverband des deutschen Gefrierfleisch-Einfuhr und Großhandels	1 000 RM.
Wirtschaftliche Vereinigung in Wefermünde (Fischereihafen)	1 000 RM.
Viehversicherungs-gesellschaft A.-G. Schwerin (für die nächsten 3 Jahre je 1000 RM.)	3 000 RM.
Unterweiser-Städte Bremen und Wefermünde zusammen	1 000 RM.
Verband Mitteldeutscher Viehhändler e. V., Sitz Magdeburg	250 RM.
Firma Kebbel & Sohn in Schöningen b. Braunschweig	250 RM.
Herr Ernst Kebbel dortselbst	100 RM.
Direktor Franzen, Hamburg	5 000 RM.
Verlagsbuchhändler Schaper (zur Malkmus-Spende)	1 000 RM.
Kommerzienrat Klapproth in Zürich	1 000 RM.
Generaldirektor Fritz Ahrberg, Hannover	500 RM.
Konsul Bühring, Hannover	300 RM.
Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte	2 000 RM.
Verein beamteter Tierärzte Preußens	2 000 RM.
Reichsverband der deutschen Gemeindetierärzte	500 RM.
Tierärzteverband Niederfächfischen	1 000 RM.

Tierärztekammer für die Provinz Niederfächfischen	50 RM.
Verband der Landwirtschaftskammer-Tierärzte	200 RM.
Tierärztlicher Verein für den Freistaat Braunschweig	200 RM.
Verein der Tierärzte des Saargebiets = 500 franz. Franken,	
Tierärztlicher Verein für die Provinz Brandenburg	100 RM.
Verein ostpreußischer Tierärzte	100 RM.
Verein der Tierärzte in Neuvorpommern und Rügen	50 RM.
Tierärztlicher Verein des Reg.-Bez. Köslin	50 RM.
Tierärztlicher Verein des Reg.-Bez. Merseburg	100 RM.
Verein kurhessischer Tierärzte	253 RM.
Tierärzteschaft Thüringens	202 RM.
Tierärztlicher Verein in Westpreußen	50 RM.
Verein der Tierärzte des Reg.-Bez. Aachen	150 RM.
Verein der Tierärzte des Reg.-Bez. Wiesbaden	50 RM.
Verein der Tierärzte des Reg.-Bez. Düsseldorf	276 RM.
Verein der Tierärzte des Reg.-Bez. Koblenz	150 RM.
Verein der Tierärzte von Mosel und Saar	105 RM.
Verein der städtischen Tierärzte der Rheinprovinz	265 RM.
Verein Rheinpreußischer Tierärzte	304 RM.
Veterinärärzte des Bezirks Aurich	60 RM.
Ministerialrat Schotte, Weimar	100 RM.
Tierarzt Dr. Dietrichs in Neuhaudensleben	100 RM.
Veterinärarzt Dr. Reimers, Halle	50 RM.
Prof. a. D. F. Lüpke in Stuttgart für die Malkmus-Spende	20 RM.
Verschiedene Einzel-Einzahlungen auf das Spenden-Konto	176 RM.
Die Zusammenstellung macht auf Vollständigkeit keinen Anspruch. Etwaige Ergänzungen werden später bekanntgegeben.	

Paul Frosch †.

Am 2. Juni 1928 ist der ordentliche Professor für Hygiene und Bakteriologie, Direktor des Hygienischen Instituts der Tierärztlichen Hochschule Berlin, nach kurzem schweren Leiden entschlafen. Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Frosch ist am 15. August 1860 als Sohn des Rechtsanwaltes L. O. Frosch in Berlin geboren. 1882 absolvierte er das Askaniische Gymnasium, studierte Medizin in Würzburg, Leipzig und Berlin, wurde promoviert am 6. August 1887 und erlangte die Approbation als Arzt am 15. Dezember 1887. Am 1. Januar 1889 trat er als Volontär im Hygienischen Institut der Universität ein, wurde im August 1891 Assistent der Wissenschaftlichen Abteilung des Institutes für Infektionskrankheiten von Koch, veröffentlichte einen Beitrag zur Kenntnis der amerikanischen Schweinefeuche und der damit verwandten bakteriologischen Affektionen. Im Jahre 1893 ging er auf sechs Monate nach Bonn, dann nach Solingen und wurde später Leiter der Cholera-bekämpfung. Danach kam er nach Nakel (Bromberg). Im Juni 1897 erhielt er das Prädikat Professor; August 1899 kam er mit Koch vom Auslandsurlaub zurück, wo er Mitglied der Malariaexpedition in Brioni (Istrien) und zur Bekämpfung der Pest in Oporto war. Oktober 1899 wurde er Vorsteher der Wissenschaftlichen Abteilung des Koch'schen Institutes. 1898 ging er auf ein halbes Jahr zum Erholungsurlaub nach Ägypten. Zu dieser Zeit war er Mitglied der Kommission zur Erforschung der Maul- und Klauenfeuche. 1901 reiste er wieder nach Brioni zur weiteren Bekämpfung der Malaria und erhielt 1903 das Offizierkreuz des Franz Josephs Ordens. 1902—1905 übernahm er die Leitung der Typhusuntersuchungen in Trier und erhielt in diesem Jahre den Roten Adlerorden IV. Klasse. Im Mai 1907 wurde er zum Geheimen Medizinalrat ernannt und kam am 12. Mai 1908 nach dem Weggang v. Ostertags als o. Professor für Hygiene an die Tierärztliche Hochschule. März 1913 erhielt er den Kronenorden III. Klasse. Im Juni 1908 wurde er Mitglied der Königlichen Deputation für das Veterinärwesen. 1921 Mitglied des Landesgesundheitsrates. Der Verstorbene war ein hochbegabter und außerordentlich belehener Mann. Er beschäftigte sich in den letzten Jahrzehnten vornehmlich mit dem filtrierbaren Virus der Maul- und Klauenfeuche, mit dem er sich durch seine langjährige Mitarbeit mit Löffler vertraut gemacht hatte. Der gemeinsamen Arbeit von Löffler und Frosch verdanken wir die Kenntnis von der Filtrierbarkeit des Virus der Maul- und Klauenfeuche. Wenn ihm auch nach mühseliger und geistvoller Tätigkeit die Sichtbarmachung und Züchtung des Erregers der Maul- und Klauenfeuche nicht gelungen war, so hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, an diesem hochinteressanten Problem während seines Lebensabends ungestört weiter

arbeiten zu können. Leider hat der unerbittliche Tod diesem Streben ein vorzeitiges Ende bereitet. Wir betrauern in dem Dahingefahrenen einen Kollegen von hervorragenden Fähigkeiten und edelster Gefinnung.

Geflügel als Patient des Tierarztes.

Das Geflügel gehört bis jetzt zu den seltensten Patienten des Tierarztes. Das ist zu bedauern, gerade in der Geflügelzucht ist ein Tierarzt, der Verständnis für die Tiere hat, von unschätzbarem Wert. Denn durch das eigene „Herumdoktern“ wird manche Krankheit nicht früh genug erkannt, die Sache weiter verschleppt, bis nichts mehr zu machen ist und das Tier eingeht. Gerade beim Geflügel macht aber die Erkennung der Krankheiten dem Laien oft Schwierigkeiten. Hat er aber in der Nähe einen verständigen Facharzt, so ist Hilfe leicht zur Stelle. Wird veräußert, früh genug einen Facharzt zu Rate zu ziehen, so kann das Auftreten einer Seuche schwere Folgen haben und eine Ansteckung sich über den ganzen Hühnerbestand ausbreiten und wertvolles Material vernichten.

Es mag manchen Tierarzt bisher davon abgehalten haben, sich mehr um unsere Geflügelzucht zu kümmern, weil er denkt, das einzelne Tier habe ja keinen großen Wert. Das ist ein Irrtum, der aufgeklärt werden muß. Unsere Geflügelzucht an sich stellt heute einen so wertvollen und wichtigen Faktor vor, der von den Tierärzten nicht übersehen werden darf. Es gibt viele tausende von Geflügelfarmen, die rein auf Erwerb eingestellt sind. Die Zahl der ernsthaften Geflügelzüchter aber, die Tiere nicht aus materiellen, sondern aus ideellen Gründen halten, geht wohl in die Millionen.

Der reine Geflügelhalter ist vielleicht einmal eher geneigt, ein erkranktes Tier zu töten, wenn es gerade ein wertvolles Zuchttier darstellt. Aber wenn mehrere Tiere gleichzeitig erkranken, wird auch er den Tierarzt gern rufen oder ihm ein eingegangenes Tier zur Untersuchung übergeben.

Der reine Geflügelzüchter dagegen, der nur wenige Tiere aus Liebhaberei hält, hängt zumeist an jedem einzelnen seiner Pfleglinge mit besonderer Liebe. Jedes einzelne Tier stellt, da es zumeist ein erstklassiges Exemplar ist, auf Leistung oder auf Schönheit gezüchtet, einen hohen Wert dar, wie die Kataloge unserer großen Geflügelausstellungen ja jedem gerne sagen. Dort steht aber nur der äußerliche Wert. Was das Tier dem einzelnen Züchter sonst bedeutet, können keine Zahlen angeben, denn oft sind ihm seine Lieblinge einfach unerfetzlich.

Daß ein Geflügelzüchter für ein derart wertvolles Huhn, das erkrankt ist, viel eher den Rat eines Facharztes in Anspruch nimmt, ist verständlich, trotzdem viele dieser Züchter mit Glücksgütern nicht gesegnet sind und es sich erst überlegen müssen, ehe sie sich Kosten machen.

Es würde die gesamte Geflügelzüchterwelt freuen, wenn die Tierärzte sich mehr für unsere kleinen Schützlinge einsetzen würden. Es gibt ja schon eine ganze Anzahl bekannter Veterinärärzte, die sich tatkräftig für unsere Sache einsetzen, aber wir müssen überall, besonders auf dem Lande, solche fachverständigen Berater haben, die unsere Geflügelzucht nicht stiefmütterlich behandeln.

Solch ideales Zusammenarbeiten, wie ich es in manchen Orten sah, wo der Tierarzt Mitglied des Geflügelzüchtervereins war, und sogar die Sitzungen besuchte, auch selbst Hühner hielt, gibt es leider nur selten.

Mein Wunsch an die Herren Tierärzte ist, sich mehr unseres Geflügels anzunehmen, zum Wohl der Gesamtheit. Das Gebiet ist vielleicht zum Teil neu. Aber es lohnt sich, — ideell und — auch materiell.

Loni Lauxmann-Kinzelmann.

Ausbildungskursus für Ärzte und Tierärzte.

Im Institut für Infektionskrankheiten Robert Koch findet vom 16. Oktober bis 15. Dezember 1928 ein das Gebiet der Mikrobiologie sowie die wichtigsten Gebiete der Hygiene umfassender Ausbildungslehrgang für approbierte Ärzte und Tierärzte statt. Täglich von 10—3 Uhr Vorträge und Übungen. Außerdem Ausflüge zur Besichtigung hygienisch wichtiger Einrichtungen. Am Unterricht beteiligen sich: E. Boecker, H. A. Gins, F. K. Kleine, J. Koch, B. Lange, G. Lockemann, R. Otto, O. Schiemann, Cl. Schilling. Die Teilnahme an dem Lehrgang wird für die Kreisarzt- und Kreisierarztprüfung angerechnet. Anmeldefrist bis 15. Septbr. 1928. Nähere Auskunft erteilt die Geschäftsstelle des Instituts für Infektionskrankheiten Robert Koch in Berlin N 65, Föhrstraße 2.

Fortbildungskursus für praktische Tierärzte an der Tierärztl. Hochschule Hannover.

Vom 30. Juli bis einschließlich 4. August d. Js.
Stundenplan

Stunden	Montag 30. 7.	Dienstag 31. 7.	Mittwoch 1. 8.	Donnerstag 2. 8.	Freitag 3. 8.	Sonntag 4. 8.
8—9	Jungtier- krankheiten	Geflügelkrankheiten		Gasödeme	Diagnostik der para- sitären Krankheiten	
<i>Mießner</i>						
9—10	Demonstrationen am lebenden Pferde <i>Zietzschmann</i>		Ausgewähl- te Kapitel aus der ge- richtlichen Tierheil- kunde <i>Oppermann</i>	Klinische Demonstrationen <i>Henkels</i>		
10—11	Ausgewählte Kapitel aus der pathologischen Anatomie <i>Lund</i>					
11—12	Magen- erkrankun- gen des Rindes <i>Götze</i>	Retentio secundinar- und puerpe- rale Er- krankungen beim Rinde <i>Götze</i>	Ausgewählte Kapitel aus der Fleischschau <i>Lund</i>			
12—13	Die Diagnose der infektiösen Anämie des Pferdes <i>Oppermann</i>		Kalbfieber u. verwand- te Krankh. <i>Götze</i>	Einzelnes aus dem Gebiet der Kleintier- praxis <i>Künemann</i>	Moderne Wund- behandlung <i>Henkels</i>	
16—17	Embryo- tomische Demonstra- tionen <i>Götze</i>	Kaiser- schnitt am Rind (mit Vor- führung der Operation) <i>Götze</i>	Therapeuti- sche, diag- nostische oder chirur- gische Demon- strationen am Rind (nach Material) <i>Götze</i>	Kastrati- onen männ- licher und weiblicher Haustiere <i>Henkels</i>	Stelzfuß- erkrankun- gen bei Fohlen mit Lichtbild. <i>Hupka</i>	Eventl. Besichti- gungen
17—18					Bekämpf. der Leber- egelseuchen beim Rind und Schaf <i>Hupka</i>	

Die Teilnehmergebühren betragen 5,— Mk. Einschreibgebühr und 1,— Mk. für die Vorlesungsstunde. Anmeldungen werden bis 20. Juli an das Hochschulsekretariat erbeten.

Hannover, den 18. Juni 1928.

Der Rektor.

Zu unserem Bilde.

Am Freitag, den 15. Juni 1928, fand im Anschluß an die Jubiläumsfeierlichkeiten in Gegenwart des Preuß. Landwirtschaftsministers sowie der Spitzen der Behörden, zahlreicher Jubiläumsgäste und der Studentenschaft die feierliche Grundsteinlegung zu den Erweiterungsbauten der Tierärztlichen Hochschule statt. Das Bild zeigt den Augenblick, in welchem der Rektor die letzten Hammerschläge tut und sich gleichzeitig an die Studentenschaft wendet, deren Aufgabe es sein wird, die Tradition der alten und neuen Institute zu pflegen.

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 24, S. 414.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Distriktstierarzt Dr. Andreas Saalbeck in Amorbach zum Bezirkstierarzt in Hofheim, Dr. G. Köhler in Ludwigstadt (Ofr.) zum Distriktstierarzt dafelbst.

Approbiert in Leipzig: Heinz Röhrer aus Leipzig, Paul Henning aus Eisleben, Fritz Reuter aus Sülten i. Mecklbg., Ernst Nordmeyer aus Hamburg, Ewald Both aus Russow (Mecklbg.-Schwerin), Walter Angermann aus Claushagen, Heinrich Baumgärtner aus Seimeny (Rumänien), Per-Ivar Stenius aus Nykyrka (Finnland).

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck: Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 27.

Ausgegeben am 7. Juli 1928.

36. Jahrgang.

(Aus der Klinik für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule Hannover. — Direktor: Prof. Dr. Künnemann.)

Ein Beitrag zur Pernoctonnarkose beim Hunde.

Von W. Freese.

Das Pernocton ist nach Angabe der chemischen Fabrik J. D. Riedel, Berlin, von der es hergestellt wird, die 10prozentige wässrige Lösung von sek. Butyl-brompropenylbarbitursäurem Natrium ($C_{12}H_{14}O_3N_2BrNa$). Es gehört also zur Gruppe der Barbitursäurepräparate, die als Schlafmittel sowohl in der human- als auch veterinärmedizinischen Therapie ausgedehnteste Anwendung finden. Bumm, nach dessen Angaben das Pernocton hergestellt wurde, konnte auf Grund experimenteller Untersuchungen feststellen, daß der Wirkungsgrad dieses Schlafmittels den aller anderen übertrifft. Er stellte bei seinen Kaninchenversuchen fest, daß die unterste Wirkungsgrenze bei intravenöser Verabreichung, die praktisch allein in Frage kommt, 0,007 g pro Kilogramm Körpergewicht beträgt und daß zuweilen bei einer Gabe von 0,07 Gramm pro Kilogramm Todesfälle eintreten können. Demnach ist die therapeutische Breite dieses Mittels beim Kaninchen gleich 10. Dosen von 0,025 Gramm pro Kilogramm machten 1½stündigen, sehr tiefen Schlaf, solche von 0,04 mehrstündige Narkose. Nach seinen Angaben soll die therapeutische Breite bei subkutaner Verabreichung zwar noch größer sein, aber die erforderlichen hohen Dosen lassen diese Art der Applikation als ungeeignet erscheinen. Diese geringe Giftigkeit des Pernoctons den anderen Barbitursäurepräparaten gegenüber ist mit größter Wahrscheinlichkeit auf den glücklichen chemischen Aufbau zurückzuführen. Infolge des Vorhandenseins des Brompropenylrestes im Organismus wird nämlich ein oxydativer Abbau zu physiologisch indifferenten Substanzen bewirkt, und hierdurch wiederum kommt es verhältnismäßig schnell zur Entgiftung des Moleküls.

In der Humanmedizin haben sich bereits eine ganze Anzahl von Klinikern mit der Pernoctonnarkose beschäftigt. Bumm, der Vater des Pernoctons, gebrauchte es in der Chirurgie. Die Gaben, die er verabfolgte, betrugen 0,007 bis 0,02 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Auf Grund seiner Versuche hält er die Dosierung von 0,007 bis 0,008 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Vertiefung des Schlafes durch Äther für am ratsamsten. Bei Gebrauch höherer Dosen hat sich ein unerwünscht langer Nachschlaf als nachteilig herausgestellt. Es werden dadurch im Krankenhaus nicht durchführbare Maßnahmen notwendig, z. B. das Überwachen der Kranken bis zu vollständiger Beendigung der Narkose, was unter Umständen einen Zeitraum bis zu 24 Stunden in Anspruch nimmt. Von den übrigen

Autoren, die es teils als Narkotikum bei Operationen (Seifert, Bosse, Lessing, Haberer), teils als Mittel zur Erzeugung von Dämmer Schlaf bei gynäkologischen Eingriffen (Röttger, Federlin, Vogt, Alke) und teils in der Psychiatrie (Mehner, Rosinger) anwandten, finden die meisten Worte des Lobes für den Wirkungsmodus des Pernoctons oder empfehlen es doch zu weiteren Versuchen. Bei der Wertung des Urteils ist zu berücksichtigen, daß die Autoren von dem Bestreben ausgehen, mit dem Pernocton keine Vollnarkose zu erzeugen, sondern nur die Narkose vorzubereiten und sie dann mit einem Inhalationsästhetikum zu vertiefen. Als Vorteile des neuen Verfahrens nennen sie die geringe Beeinflussung der vitalen Zentren, die starke Herabminderung des Äther- oder Chloroformverbrauchs (sie beträgt nach Bosse etwa 80 Prozent) und die Ausschaltung des psychischen Traumas für den Kranken, der unter euphorischen Träumen einschläft und die Angst vor der Operation verliert. Nur Haberer fällt ein vollständig ablehnendes Urteil. Er hält das Pernocton für unzuverlässig in seiner Wirkung und außerdem für direkt giftig. Deshalb hat er seine Versuche bereits nach der achten Narkose, die mit einem Todesfall endete, aufgegeben. Er warnt deshalb ausdrücklich vor Anwendung des Mittels als Narkotikum beim Menschen.

In Anbetracht der günstigen Erfahrungen Bumm's wurden die ersten Versuche mit dem Pernocton in der Veterinärmedizin von Hinz beim Hunde durchgeführt. Als besonders vorteilhafte Wirkung nennt er den sofortigen Eintritt des Schlafzustandes. In dem langen Nachschlaf sieht er beim Hunde keine Kontraindikation, vielmehr glaubt er die Wundheilung günstig beeinflusst zu sehen infolge der mehrstündigen vollkommenen Ruhelage des Tieres nach der Operation. Die Gefahren des Eintritts einer hypostatischen Pneumonie, auf die von Bumm besonders hingewiesen wird, glaubt Hinz durch wechselseitige Lagerung des Patienten von der einen auf die andere Seite bannen zu können.

Die Dosis optima beträgt nach den Erfahrungen der Hinz'schen Klinik, die auf Grund von etwa 70 Fällen gewonnen wurden, 0,3 bis 0,35 ccm der 10prozentigen Lösung. Das entspricht 0,03 bis 0,035 Gramm der Substanz pro Kilogramm oder etwa der fünffachen beim Menschen als am geeignetsten befundenen Dosis. Die Applikation erfolgte stets

intravenös in die Vena saphena und zwar sehr langsam, um der Gefahr eines Injektionschocks vorzubeugen. Die Tiere verfielen noch während der Injektion in Schläfrigkeit und selbst teilweise in Schlaf, der frühestens $2\frac{1}{2}$ Minuten längstens sechs Minuten später in Unempfindlichkeit überging. Die Versuchsergebnisse bezeichnet H i n z als durchaus günstig, der Eintritt der Narkose erfolgte sehr schnell, die Narkose dauerte 3—7 Stunden, ist also auch für die Durchführung schwerster Operationen lang genug, ungünstige Nebenwirkungen traten nur selten auf, die Futteraufnahme war nach Aufhören des narkotischen Zustandes nicht beeinträchtigt und Todesfälle traten in den ca. 70 Fällen nicht auf.

Dieser Bericht von H i n z veranlaßte mich, auch meinerseits Versuche mit Pernocton zwecks Erzeugung von Anästhesie beim Hunde anzustellen, denn, obwohl wir in der Morphium-Atropin-Chloroform-Narkose ein leidlich gutes und sicheres Anästhesieverfahren für den Hund besitzen, ist es trotzdem erforderlich, jede neue Methode zu versuchen und nachzuprüfen. Man wird hierbei von dem Wunsch und der Hoffnung geleitet, ob es nicht doch noch einmal gelingen möge, die hinlänglich bekannten Mängel des zuvor erwähnten Narkoseverfahrens auszuschalten und auch für den Hund ein solches Idealnarkotikum zu finden, wie wir es z. B. beim Schwein im Chloroform besitzen.

Bei den von mir angestellten experimentellen Versuchen zur Ermittlung der Dosis optima wurden Mengen von 0,1 bis 0,7 ccm der 10prozentigen wässrigen Pernoctonlösung in Anwendung gebracht. Ich bediente mich ausschließlich der intravenösen Injektion in die Vena saphena. Diese Art der Applikation ermöglicht den Gebrauch kleinster Dosen zur Erzielung ausreichender Wirkung, während bei subkutaner Verabreichung zur Erreichung des gleichen Effekts unverhältnismäßig hohe Dosen gegeben werden müssen. Ein Hund z. B., der 0,5 ccm pro Kilogramm subkutan erhielt, eine Dosis, die bei intravenöser Verabreichung sehr häufig schon den Tod bedingt, wurde erst 15 Minuten nach der Applikation müde, verfiel nach 25 Minuten in Schlaf, ohne daß jedoch diesem Schlafzustand Narkose folgte, und erwachte nach etwa 7 Stunden. Die intravenöse Injektion hat weiterhin den Vorteil der eleganten Ausführung und der exakten Dosierung. Es muß jedoch gesagt werden, daß insbesondere bei kleinen Tieren eine gewisse Technik und Übung und daß vor allem — dies sei besonders hervorgehoben — geschultes Personal zum Halten der Hunde erforderlich sind. Andernfalls ist die Durchführung einer störungsfreien Injektion nicht gewährleistet. Daß es, wie H i n z angibt, erforderlich ist, die Injektion zur Vermeidung der Gefahren des Injektionschocks sehr langsam, in einem Zeitraum von etwa zwei Minuten, vorzunehmen, kann ich nicht bestätigen; denn ich führte bei zahlreichen Hunden die Injektion in wenigen Sekunden aus und sah davon niemals nachteilige Folgen.

Die Dosierungsversuche zeitigten im einzelnen folgende Ergebnisse:

Nach 0,1 ccm pro Kilogramm trat nach etwa zwei bis drei Minuten anfangs geringgradiges, dann etwas stärker werdendes Schwanken und Taumeln auf, das durchschnittlich eine halbe bis eine Stunde anhielt. Das Bewußtsein war nicht getrübt. Schlaf oder ein schlafähnlicher Zustand wurde nicht beobachtet.

Bei Gaben von 0,2 ccm pro Kilogramm zeigten die Tiere ähnliche, graduell jedoch etwas schwerere Zustände. In einem Falle kam es sogar zu sehr heftiger Aufregung. Der fragile Hund begann sofort nach der Injektion Gleichgewichtsstörungen zu zeigen, stürzte nach 3 Minuten schlagartig zu Boden und vermochte sich trotz aller Anstrengung nicht mehr zu erheben. Er schlug in Intervallen rücksichtslos mit dem Kopf auf den Erdboden, stieß gellende Schreie aus und vollführte mit den Beinen krampfartige Schwimmbewegungen. Dieser qualvolle Zustand währte 20 Minuten.

Durch Verabfolgung einer Zusatzdosis wurde er beseitigt und in Schlaf übergeführt.

Die Erscheinungen, die sich nach Dosen von 0,25 ccm bis 0,6 ccm bemerkbar machten, waren in hohem Maße uneinheitlich. Die einzelnen Tiere reagierten derartig verschieden, daß bei ihnen teilweise schon mit der Dosis von 0,25 pro Kilogramm tiefer Schlaf, ja selbst vollständige Narkose eintrat. Am häufigsten war dies der Fall nach der Dosierung von 0,3 bis 0,4 ccm pro Kilogramm. In einigen Fällen war der Erfolg geradezu ein frappanter. Die Tiere wurden noch während der Injektion träge und schlaff, schliefen alsbald danach tief und befanden sich bereits einige Minuten später in einem Stadium solch vollständiger Anästhesie, daß alle Operationen störungslos ausgeführt werden konnten. Der postnarkotische Schlafzustand dauerte 3—7 Stunden. Danach erwachten die Tiere, zeigten noch einige Zeit lang Gleichgewichtsstörungen und waren dann zum Teil schon wieder so munter, daß sie Nahrung zu sich nahmen. Dieser Verlauf der Pernoctoneinwirkung bildet aber leider nicht die Regel. Er ist vielmehr nur in etwa 20—30 Prozent der Fälle zu beobachten. In den übrigen 70—80 Prozent kann eine befriedigende Narkose nicht erzielt werden. Es ist besonders zu bemerken, daß mit steigender Dosis nicht in gleichem Maße die narkotische Wirkung zunimmt. So trat z. B. nach der Dosis von 0,5 ccm Anästhesie nicht in höherem Prozentsatz ein als nach derjenigen von 0,3—0,4 ccm, obwohl die Dosis von 0,5 ccm pro Kilogramm so hoch ist, daß in einzelnen Fällen schon der Tod eintritt. Selbst bei Anwendung der Dosis optima, die zwischen 0,3 und 0,4 ccm pro Kilogramm Körpergewicht liegt, macht sich eine Reihe unangenehmer Nebenerscheinungen bemerkbar. Nicht selten wird ein heftiges Exzitationsstadium beobachtet. Dieses beginnt in der Regel kurz, nachdem die Tiere die Seitenlage eingenommen haben, und äußert sich dadurch, daß sie heftige Schwimmbewegungen mit den Beinen ausführen oder daß sich ausgesprochene Streckkrämpfe der Extremitäten, ja selbst des ganzen Körpers einstellen. In diesen Fällen hat man manchmal den Eindruck, als ob Zwerchfellskrämpfe beständen. Die Hunde machen nämlich krampfartige in- und expiratorische Atembewegungen, bei denen laute schnarchende Geräusche zu hören sind und der ganze Körper erschüttert wird. Diese Dyspnoe war in einem Falle bei Gebrauch von 0,35 ccm pro Kilogramm so stark, daß unmittelbare Lebensgefahr bestand. Die beschriebenen Exzitationserscheinungen dauern durchschnittlich 5—10 Minuten. Sie treten nicht regelmäßig zu Beginn der Pernoctoneinwirkung auf, sondern zuweilen unterbrechen sie ganz unerwartet den Zustand des Schlafs oder der Narkose. Ein Hund z. B., bei dem eine eingreifende Bauchoperation vorgenommen wurde, reagierte während der Vorbereitung des Operationsfeldes und des Hautschnittes gar nicht. Bei Durchschneidung des Peritoneums aber begann er plötzlich laut zu wimmern und kräftige Abwehrbewegungen zu machen. Dieser Zustand dauerte etwa 5 Minuten und zwang natürlich zur Unterbrechung der Operation. Im weiteren Verlauf der Operation, die $\frac{3}{4}$ Stunden in Anspruch nahm, kam es noch zweimal zu gleichen Störungen. In wieder anderen Fällen kam es zu mehreren Minuten lang anhaltenden Würgebewegungen, denen einmal auch Erbrechen folgte. Hier war es erforderlich, mit der Operation aufzuhören und dem Hunde das Erbrochene aus Rachen- und Mundhöhle zu entfernen, weil sonst Erstickung eingetreten wäre. Alle diese Zufälle sind für den Operateur deshalb besonders unangenehm, weil sie ganz unerwartet auftreten und weil sie zweifellos auf den Zuschauer einen sehr häßlichen Eindruck machen. Auch im Stadium des Erwachens treten, wenn auch seltener, solche Exzitationen auf. Fast regelmäßig beobachtet man Muskelzittern von oft mehrstündiger Dauer. Todesfälle habe ich dagegen bei einer Dosis von 0,3—0,4 ccm pro Kilogramm nicht auftreten sehen, wohl aber dann, wenn die Dosis 0,5 ccm pro Kilo-

gramm erreichte oder sie überschritt. Jedoch wurde selbst eine solche von 0,6 ccm pro Kilogramm vertragen und zwar sogar von Hunden, die sich in mäßigem Ernährungszustande befanden und eine schlechte Konstitution besaßen, bei anderen kräftigen robusten Tieren trat dagegen nicht selten der Tod ein. In denjenigen Fällen, in denen die Dosen von den Hunden vertragen wurde, dauerte der narkotische bezw. Schlafzustand 10—15 Stunden, üble Folgeerscheinungen traten nicht auf.

Erst die Dosen von 0,7 ccm pro Kilogramm führte den Tod mit Sicherheit regelmäßig herbei. Die Tiere starben innerhalb von 1—3 Minuten nach der Injektion und zwar so vollkommen ruhig und ohne jeden Todeskampf, daß man hier von einer Euthanasie im wahrsten Sinne des Wortes reden kann. Ich kann deshalb, sofern man es in der Praxis mit sehr empfindlichen Besitzern zu tun hat, diese Art der Tötung nur anempfehlen.

Was die Beeinflussung der vitalen Zentren durch das Pernocton anlangt, so ist sie nach meinen Befunden im allgemeinen nicht sehr schädigend. Es gilt jedoch von ihr daselbe wie von der Wirkung des Pernoctons überhaupt, daß sie sich nämlich unterschiedlich gestaltet, je nachdem ob die Tiere empfindlich oder weniger empfindlich dem Mittel gegenüber sind. Am wenigsten häufig wird die Atmung verändert, und zwar sowohl in ihrer Frequenz als in ihrer Intensität. Selbst bei Gebrauch gefährlicher Dosen, also z. B. 0,5 ccm pro Kilogramm sah ich in manchen Fällen keinerlei Veränderung der Atmung, in anderen Fällen ging die Atemfrequenz allerdings nach etwa 5—10 Minuten auf vier in der Minute zurück, ohne daß jedoch der Tod durch Atmungs lähmung eingetreten wäre. Wesentlich stärker als der Respirationsapparat wird der Zirkulationsapparat beeinflusst. Aber auch hier treten individuell sehr verschiedenen starke Schwankungen auf. Durchweg tritt ein Ansteigen der Pulsfrequenz ein, regelmäßig dann, wenn es zu Exzitationen kommt. In diesen Fällen kann die Anzahl der Pulse auf 200 und mehr in der Minute steigen. Dann und wann ist die Pulszahl während der Zeitdauer der Pernoctonwirkung aber auch großen Schwankungen unterworfen, derart, daß die Pulsfrequenz zeitweise stark erhöht, dann wieder normal und wieder erhöht ist, bis sie schließlich mit Abklingen des Schlafzustandes zur Norm zurückkehrt. Es gibt aber auch Ausnahmefälle, in denen die Arbeit des Herzens vollkommen ungestört bleibt.

Konstant und regelmäßig ist die Einwirkung des Pernoctons auf das Wärmezentrum. Bei meinen Versuchen konnte ich stets ein starkes Sinken der Körpertemperatur feststellen. Es betrug 1,5—4 Grad C. Auffallend ist, daß der Temperatursturz nicht in geradem Verhältnis zur Höhe der Pernoctondosis steht, sondern daß auch hierbei die Empfindlichkeit der Hunde eine ausschlaggebende Rolle spielt. Es kann z. B. die Quecksilberfäule bei Dosen von 0,3 unter den letzten Teilstrich der Skala fallen, in anderen Fällen aber kann sie auch nach einer Gabe von 0,5 ccm pro Kilogramm nur eine Temperaturerniedrigung von 1,5 Grad C anzeigen. Ebenso unterschiedlich ist die Dauer der Temperaturerniedrigung. Sie beträgt 1½—6 Stunden. In denjenigen Fällen, in denen das Stadium des Erwachens mit starkem Muskelzittern oder Aufregungszuständen verbunden ist, steigt die Temperatur rasch und kann ausgesprochen fieberhaft werden. Ich sah z. B. ein Ansteigen der Temperatur von 37,8 vor der Narkose auf 39,9 im Stadium des Erwachens, nachdem die Temperatur während der Narkose auf 34,6 gefallen war.

Fasse ich meine Versuchsergebnisse hiernach kurz zusammen, so komme ich zu folgender Beurteilung: Das Pernocton vermag bei einer Dosierung von 0,3—0,4 ccm pro Kilogramm, die als Dosis optima anzusehen ist, in einem Teil der Fälle beim Hund eine so gute störungsfreie Narkose zu erzeugen, daß sie für alle operativen Eingriffe ausreicht. Hierbei sind der schnelle Eintritt des anästhetischen Zustandes, der einen Beginn der Operation fast unmittelbar nach der Injektion gestattet, und die durchweg geringe Beeinflussung der vitalen Zentren als große Vorteile zu nennen. Auch geringere Dosen als 0,3 ccm pro Kilogramm vermögen einen operationstüchtigen Zustand, wenn auch nur in seltenen Fällen bei besonders empfindlichen Hunden herbeizuführen. Größere Dosen als 0,4 ccm pro Kilogramm sind als gefährlich zu bezeichnen. In dem größeren Teil der Fälle hat sich das Pernocton bei der Anwendung therapeutischer Dosen als unzureichend in seiner Wirkung erwiesen. Es wird keine operationstüchtige Anästhesie, sondern nur tiefer Schlaf erzeugt. Dazu treten nicht selten üble Nebenerscheinungen, wie heftige Exzitationen, Würgebewegungen, Erbrechen, Schrei- und Streckkrämpfe und schließlich oft stundenlang dauerndes Muskelzittern auf. Daß durch das Pernocton in seiner jetzigen Form allein nicht regelmäßig und zuverlässig Vollnarkose erzielt werden kann, ist ein bedenklicher Nachteil. Trotzdem möchte ich den Gebrauch des Mittels als Narkotikum beim Hund nicht vollständig ablehnen. Vielleicht läßt sich eine Methode finden, bei der das Pernocton ähnlich, wie es in der humanen Chirurgie geschieht, zur Einleitung der Narkose benutzt wird, die dann durch Inhalationsanästhetika bis zu einem operationstüchtigen Zustande geführt werden kann. Hier wäre im besonderen an die Pernocton-Chloroformkombination zu denken. Weitere Versuche, die in dieser Richtung anzustellen sind, müssen lehren, ob wir uns in der Veterinärchirurgie das Pernocton seiner unverkennbaren Vorteile wegen dauernd zunutze machen können.

Literatur-Verzeichnis.

1. Alke, A.: Über die Pernocton-Äthernarkosen. Deutsche Med. Wochenschr. 1928, Nr. 6.
2. Birkholz, H.: Über eine neues Ersatzmittel des Skopolamins zur Erzielung von „Dämmer Schlaf“ bei Kopfoperationen. Monatschrift für Ohrenheilkunde und Laryngo-Rhinologie 1927, Heft 11, Jahrg. 61.
3. Bosse, P.: Über intravenöse Pernoctonnarkose. Deutsche Med. Wochenschr. 1928, Nr. 7.
4. Bumm, R.: Intravenöse Narkosen mit Barbitur-Säurederivaten. Klinische Wochenschr. 1927, 6. Jahrg., Nr. 16.
5. Federlin, Friedrich: Das Pernocton bei Inhalationsnarkosen. Münchener med. Wochenschr. 1928, Nr. 8.
6. Haberer, H.: Pernocton-Narkose. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie Bd. 2080, 2./4. Heft.
7. Hinz, W.: Über Pernocton zur Narkose des Hundes. Tierärztl. Rundschau 1927, Jahrg. 33, Nr. 52.
8. Lessing: Pernoctonnarkose. Deutsche med. Wochenschr. 1928, Nr. 8.
9. Menner, Heinz: Unsere Erfahrungen mit einem neuen injizierbaren Schlaf- und Beruhigungsmittel bei Geistes- und Nervenkrankheiten. Zeitschr. für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, Band 109, Heft 1/2.
10. Rosinger, Zoltan: Erfahrungen mit dem neuen injizierbaren Schlaf- und Beruhigungsmittel Pernocton. Wiener klin. Wochenschr. 1928, Nr. 9.
11. Röttger, Paul: Über Pernoctondämmer Schlaf in der Geburtshilfe. Zentralblatt für Gynäkologie 1928, Jahrg. 52, Nr. 12.
12. Seifert, E.: Erfahrungen mit Pernoctonnarkose. Zeitschrift: Der Schmerz, 1928, Band 1, Heft 3.
13. Vogt, E.: Erfahrungen mit Pernocton beim geburtshilflichen Dämmer Schlaf. Medizinische Klinik, Jahrg. 1928, Nr. 1.

Der derzeitige Stand der Bekämpfung der Tuberkulose des Hausgeflügels.

Von Prof. Dr. med. F. F. Friedmann.

Herr Dr. Fritz Schmidt war so liebenswürdig, im Anschluß an meine in Nr. 21 der D. T. W. an Hand der Tatsachen gegebene kurze Klärung, seine persönliche Vor-

stellung von den sog. Kaltblütertuberkelbakterien-Impfstoffen, ferner von Friedmann'schen Schildkrötentuberkelbazillen kundzugeben. Da seine Angaben in allen Punkten

nachweislich nicht den Tatsachen entsprechen, bin ich leider genötigt, noch einmal das Wort zu ergreifen.

Zunächst hat weder der von ihm erwähnte Terre (Compt. rend. de la soc. de biol. 1897) noch seine Mitarbeiter Bataillon u. Dubard (Compt. r. de l'ac. des sciences, 1898; Soc. de Biol. 1899) noch auch die übrigen damals mit Karpfenbazillen arbeitenden Forscher (Ledoux-Lebard, Ann. de l'Inst. Pasteur 1900, Ramond et Ravaut, Auché et Hobbs Arch. de Méd. expér. 1900, Nicolas et Lesieur, Morey Thèse Lyon 1900) gelegentlich ihrer interessanten, aber ganz negativ ausgegangenen Bazillen-Transformationsversuche, Immunisierungen vorgenommen, geschweige denn an eine praktisch verwertbare Schutzimpfungsmöglichkeit auch nur gedacht.

Ich habe jene Karpfenkultur, die mir der Entdecker Prof. Bataillon 1903 aus Dijon selbst übersandte, sowie die mit ihr identische Blindfischleichenkultur sehr genau studiert; diese Kulturen sind nicht als avirulente Tuberkelbazillen, sondern als einfache säurefeste Saprophyten anzuprechen, die nur bei niederen Temperaturen wachsen, bei 37 Grad und darüber — wie die menschlichen Rinder-, Geflügel- und Schildkrötentuberkelbazillen überhaupt nicht fortkommen. Nach den umfassenden Untersuchungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes (1905) finden sich solche sog. Kaltblütertuberkelbazillen in ganz gefunden, niemals infizierten, frisch gefangenen kaltblütigen Tieren, im Moose, Schlamm, in Sümpfen.

Im schroffen Gegensatz zu all diesen zeigt die das Friedmann'sche Mittel darstellende Kultur, wie unter vielen anderen das Gesundheitsamt der Regierung der Vereinigten Staaten in Washington bestätigt:

„Eigenschaften, die von denen aller anderen bisher bekannten Tuberkelbazillen gänzlich verschieden sind.“ („The bacillus has been found to be an acid-fast organism, having properties quite different from those of any tubercle bacillus with which we are acquainted.“) The Friedmann Treatment for tuberculosis, Public Health Reports. Government Printing Office. Washington. Vol. XXVIII. Nr. 20.

Ebenso kommt Machens auf Grund eigener Untersuchungen in seiner In.-Dissertation aus dem Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover „Zur Frage der Schildkrötentuberkulose“ (Centralbl. f. Bakt. 1921, Band 86, Heft 1) zu dem Resultat: „Das tierpathogene Verhalten der Friedmann'schen Schildkrötentuberkelbazillen“ (Tuberkuloseerzeugung bei der Schildkröte) „spricht für ihre strenge Spezifität. Es handelt sich offenbar um ein Bakterium sui generis“.

Auch hat Geh.-Rat Prof. Haendel, Direktor des bakteriologischen Laboratoriums im Reichs-Gesundheitsamt, noch 1926 auf Grund seiner nahezu ein Jahr umfassenden vergleichenden tierexperimentellen Untersuchungen zwischen den dem Friedmann'schen Mittel entstammenden Schildkrötentuberkelbazillen und den von den Herren Prof. Raebiger und Knuth in den „Landwirtschaftlichen Jahrbüchern“ 1926, S. 158 genannten, von ihnen gegen Geflügeltuberkulose erfolglos benutzten Kaltblütertuberkelbazillen angestellt. Auch Haendel kommt in seinem, ca. 20 enge Aktenseiten langen Gutachten zu dem eindeutigen Resultat, daß die Friedmann'schen Schildkrötentuberkelbazillen von jenen sogenannten Kaltblütertuberkelbazillenseerologisch total verschieden sind.

Nicht ich also treibe „ein Spiel mit Worten“, wie Herr Dr. Schmidt sich ausdrückt, sondern er versucht, zwei als vollständig von einander verschieden anerkannte Bakterien zusammenzuwerfen, um so die schützenden und heilenden Friedmannbazillen für die Nutzlosigkeit irgendwelcher anderer Bazillen, mit denen sie nicht das mindeste zu tun haben, scheinbar verantwortlich machen zu können.

Nebenbei sei bemerkt, daß ich selbst im Anfang meiner immunotherapeutischen Arbeiten am Menschen (1909) auch jene sog. Kaltblüterbakterien (aus Fisch, Blindfische, Frosch usw.) versucht, sie aber schon damals, also vor fast 20 Jahren, wie Schmidt u. a. jetzt, als ergebnislos habe fallen lassen (Berl. Klin. Wochenschrift 1912, Nr. 49).

Da Schmidt sich ferner auf einen Artikel von Libbertz und Ruppel (von 1905, nicht wie Schmidt angibt, 1907!) sowie auf Untersuchungen von Orth zu berufen versucht, so sei folgendes festgestellt: Libbertz und Ruppel mußten auf die, unmittelbar in derselben Nummer der Deutschen Med. Wochenschrift folgende ausführliche Widerlegung ihrer sämtlichen falschen Behauptungen (D. med. Wochenschr. 1905, Nr. 5) bis auf den heutigen Tag jede Antwort schuldig bleiben. — Geh.-Rat Professor Orth, der die Nachprüfung meiner Feststellung — daß von mir immunisierte und dann zugleich mit Kontrollen infizierte Meerschweine die Kontrollen um ein Mehrfaches überlebten oder auch überhaupt am Leben blieben — übernommen hatte, berichtete auf Grund seiner mehrjährigen Beobachtungen über seine mit Friedmannbazillen vorbehandelte und zugleich mit Kontrollen mit Reinkulturen virulenter Kochbazillen infizierte Meerschweine folgendes (Verhandl. der Berl. Med. Ges. 1907, S. 267—274): „Das Meerschwein ist als äußerst empfindliches Tier für Tuberkulose zur Prüfung von Immunisierungsverfahren ganz besonders geeignet; denn wenn bei ihm die Immunisierung glückt, dann darf man erst recht bei anderen Tieren“ (an den Menschen oder gar an Heilung wagte damals noch niemand zu denken, F.) „günstige Resultate erwarten. Freilich gilt nicht das Umgekehrte. Auch wenn beim Meerschwein die Immunisierung ungenügend ausfiel, könnte bei anderen Tieren ein besseres Resultat zu erzielen sein. Es ergibt sich, so sagt Orth weiter, daß der Schildkrötentuberkelbazillus der Gruppe der echten Tuberkelbazillen zugerechnet werden muß. Die vorbehandelten Tiere haben immer länger gelebt als die Kontrolltiere . . . Immer bleibt ein erheblicher Unterschied zu Gunsten der vorbehandelten Tiere . . . Der Unterschied ist so in die Augen fallend, daß man wohl sagen darf, da die vorbehandelten Tiere länger, zum Teil beträchtlich länger gelebt haben als die Kontrolltiere, das muß als ein Resultat der Vorbehandlung betrachtet werden, das ist das Resultat einer gewissen Immunisierung. Wie hoch man diese einschätzen will, hängt vom subjektiven Ermessen ab.“ Soweit Orth. In der Diskussion, in welcher Geh.-Rat Prof. Klebs „das Ergebnis der Versuche von Orth sehr bedeutsam“ und zwecks „Erreichung der besten Methode gerade den Versuch von Friedmann außerordentlich wertvoll“ genannt hatte, wurde dann über die im Auftrage Flügge's von Prof. Reichenbach im Hygienischen Institut Breslau infizierten von mir vorbehandelten Meerschweine berichtet, deren Organe noch über elf Wochen nach virulenter Infektion frei von Tuberkulose waren, während die der Kontrolltiere sämtlich tuberkulös waren. Schließlich erklärte Geh.-Rat Prof. F. Klemperer: „Herr Geh.-Rat Orth äußerte sich über das Ergebnis seiner Versuche etwa dahin, man könne darüber verschiedener Meinung sein, man könne das erreichte Resultat schön finden oder nicht schön, das sei gewissermaßen Geschmackssache. Nein! Das ist es nicht! Hier handelt es sich vielmehr um eine prinzipielle Entscheidung, um die Frage: ist überhaupt ein Resultat erreicht worden oder nicht? Und das entscheidet doch sicherlich weniger der anatomische Befund, als die Lebensdauer der vorbehandelten Tiere, die in einigen der dort angeschriebenen Reihen in ganz eklatanter Weise verlängert wird. In den Versuchen von Herrn Orth spricht sich ein Immunisierungserfolg aus. Das wollte ich nachdrücklich hervorheben . . . Die Infektion, wie sie im Leben des Menschen vorkommt, oder die Stallinfektion bei den Tieren wird in der überwiegenden Mehrzahl in ihrer Intensität höchstwahrscheinlich noch nicht einmal nahe-

kommen der geringsten subkutanen oder gar intraperitonealen oder intravenösen Infektion, wie wir sie im Experiment setzen. Also dürfen wir hoffen, fährt Klemperer fort, wenn wir auch nur einen geringen Schutz gegen die experimentelle Infektion erzielen, daß das vielleicht viel mehr bedeutet für die eventuelle praktische Verwertung, denn die Infektion intra vitam ist wahrscheinlich oder sicherlich eine sehr viel geringere.“ Soweit Klemperer. Übrigens hatte 1914 (Deutsche Med. Wochenschrift Nr. 10) auch der bekannte Serumforscher Prof. Hans Aronson über seine mit Friedmannbazillen vorbehandelte und zu gleicher Zeit mit einer größeren Zahl von Kontrolltieren infizierte Meerfische publiziert: „Die Kontrolltiere“, berichtet Aronson, „erlagen der Infektion sämtlich in 3—5 Monaten, während die geimpften Tiere noch nach einem Jahr völlig munter waren und sich in gutem Ernährungszustande befanden.“ Aronson schließt mit den Worten: „Dies ist als ein großer Erfolg zu bezeichnen. Denn jeder, der sich mit Immunisierungsversuchen am Meerfischchen beschäftigt hat, weiß, wie außerordentlich selten und schwer eine solche Widerstandskraft zu erzielen ist.“

Wichtiger als alle diese Resultate bei künstlichen, unnatürlichen Infektionsversuchen sind aber, wie v. Behring, Maragliano, Much, Orth, Klemperer und viele andere betonen und wie ich selbst, seitdem ich 1912 die Behandlung mit lebenden Tuberkelbazillen in die menschliche Therapie (Berl. Klin. Wochenschrift 1912, Nr. 47) und dann in die der Haustiere eingeführt habe, stets betonte, die praktischen Schutz- und Heilerfolge beim natürlich infizierten resp. infektionsgefährdeten Mensch und Tier. Hinsichtlich der hier in Rede stehenden Resultate mit dem Friedmannmittel bei der Geflügeltuberkulose, publiziert z. B. Dr. Fricke „Impfte Hühnerbestand prophylaktisch. Bis heute ist noch kein Krankheitsfall wieder aufgetreten, obwohl die Tuberkulose in dem Hühnerbestande stark verbreitet war.“ Tierarzt Höhne publiziert: „Bei Hühner-tuberkulose großartiger Erfolg. Es starben ca. 80 Stück. Küken waren kaum groß zu bekommen. Die gemutmaßte Diagnose wurde durch Untersuchung im bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für Pommern bestätigt. Darauf nahm ich die Impfung vor und zwar des ganzen Hühnerbestandes und inkl. vier recht schwer erkrankten Hühnern. Die vier sehr schwer erkrankten Hühner zeigten nach der Impfung ein ganz auffallend lebhaftes Aussehen und gute Futteraufnahme, gingen aber doch in einigen Tagen ein. Hier wäre meiner Ansicht nach eine nochmalige Impfung am Platze und auch von Erfolg gewesen. Die übrigen geimpften Tiere blieben bis heutigen Tages gesund und munter, trotzdem die Stalldesinfektion sich auf Kalkmilchanstrich beschränkte.“ Stabsveterinär Dr. Liebnitz publiziert: „Ich habe das Mittel gegen die Tuberkulose der Hühner mehrfach verwandt und namentlich als Prophylaktikum sehr nützlich befunden. Eklatant war besonders ein Fall, in dem ich von einem Bestande von 24 Hühnern 23 impfte, eines nicht. Dieses erkrankte nach drei Monaten an Tuberkulose und ging ein. Nachdem ich in diesem Bestande die Impfung wiederholte, sind mir Verluste an Tuberkulose nicht mehr bekannt geworden.“ Tierarzt Schweiger: „Ich habe vier Bestände mit zusammen 180 Hühnern geimpft und bisher noch keinen Todesfall danach gehabt, obwohl vor der Impfung in den vier Beständen ca. 70 Hüh-

ner an Tuberkulose verendet bzw. notgeschlachtet waren.“ Distriktstierarzt Wichera: „Es wurden drei Hühnerbestände (180 Tiere) geimpft, bei denen anatomisch und klinisch Tuberkulose nachgewiesen war. Die bereits abgemagerten und hinkenden Hühner wurden vor der Impfung noch beseitigt. In allen drei Beständen ist bisher kein weiteres Huhn mehr gefallen.“ Kreistierarzt Vet.-Rat Wiesner: „Habe in bäuerischen Beständen, welche Jahre hindurch große Verluste an Geflügeltuberkulose gehabt hatten, geimpft und zwar 264 Hühner und 34 Puten. Nach der Impfung sind bis jetzt noch keine Verluste eingetreten; selbst die schon sehr abgemagerten Hühner leben noch alle und sind, wie mir die Besitzer schreiben, vergnügt und munter.“ Dr. Casparius (T. R. 1924, Nr. 26/27: „Die Bekämpfung der Tuberkulose und der Aktinomykose der Haustiere durch Prof. F. F. Friedmann's Heil- und Schutzmittel), der über vier Jahre lange Behandlungen und Beobachtungen an insgesamt 2000 Hühnern in den tuberkuloseverseuchten Beständen zahlreicher Rittergüter, Domänen und Bauerngüter berichtet und ebenso wie die Rinderherden auch die tuberkulösen Geflügelbestände durch systematische Durchimpfungen mit dem Friedmannmittel saniert hat, veröffentlicht diesbezüglich folgendes: „Ganz analoge Resorptions- bzw. Vernarbungsprozesse finden wir in den Lebern und sonstigen befallenen Organen der von Tuberkulose mit dem Mittel geheilten Hühner. In einigen Fällen beobachtete ich bei Hühnern verfeuchter Bestände auch typische Tuberkulose der Gelenke. Die Gelenke waren kugelig fungös geschwollen und entleerten aus Fisteln käsig schmierige Materie, die massenhafte Geflügeltuberkelbazillen enthielt. Nach der Injektion schlossen sich diese Fisteln sehr bald und heilten vollkommen aus.“

Woraus Dr. Schmidt schließt, „daß die Zahl der Anhänger von Friedmann ständig geringer wird“, bleibt sein Geheimnis. Wie mir das Tuberkulose-Heilstoffwerk in Leipzig N. 22 auf meine diesbezügliche Anfrage mitteilt, ist die Zahl ärztlicher und tierärztlicher Bezieher des Friedmannmittels in ständiger Zunahme begriffen.

Jedenfalls geht es nicht an, angesichts zahlreicher, nahezu übereinstimmender günstiger veröffentlichter und schriftlich erstatteter, sich immer mehrender Gutachten seitens erfahrener praktischer Tierärzte über das Friedmannmittel gegen Rinder- und Geflügeltuberkulose, mit ein paar willkürlichen Redewendungen die jederzeit nachprüfbaren Tatsachen zu entstellen, zumal, wenn man wie Dr. Schmidt zugegeben hat „Um das Friedmannmittel handelt es sich allerdings nicht.“ Es handelte sich bei seinen und sämtlichen von ihm zitierten fehlgeschlagenen Versuchen weder um das Friedmannmittel, noch — wie er jetzt, um den Schein zu retten, behaupten will — um „die Friedmann-Methode“. Denn die Friedmann'sche Schutz- und Heilmethode betrifft ausschließlich die Friedmann'schen Schildkrötentuberkelbazillen. Die, z. T. schon vor meinen ersten Arbeiten bekannt gewesenen, fälschlicherweise als Kaltblütertuberkelbakterien bezeichneten, wertlosen säurefesten Saprophyten haben weder mit meinem Impfstoff noch mit meiner Methode das Geringste zu tun. Sie haben lediglich historisches Interesse. Ich rate von der Verwendung dieser immunisatorisch und therapeutisch gänzlich unbrauchbaren sog. Kaltblütertuberkelbakterien-Impfstoffe, die mit dem heilkräftigen Schildkrötentuberkelbazillus nichts zu tun haben, dringend ab.

(Aus dem chemischen Institut der Tierärztl. Hochschule zu Hannover.)

Chemische Untersuchung von Geheimmitteln.

Von P. W. Dankwort, G. Siebler und J. Bohnkamp.

Anschließend an unsere erste Veröffentlichung über diesen Gegenstand in dieser Zeitschrift (1927, S. 433) haben wir wiederum Gelegenheit gehabt, einige neuere Tierarzneimittel, deren Zusammensetzung von den Herstellern geheimgehalten wird, chemisch zu untersuchen.

Mittel gegen Scheidenkatarrh der Kühe. Ein kristallisiertes, blau gefärbtes, in Wasser leicht lösliches Pulver bestand aus einer Mischung von Kupfersulfat, Alaun und Methylviolett, verunreinigt mit Spuren von Eisen- und Magnesium-Verbindungen.

Scheidenkatarrh-Pulver, braunes, in Wasser lösliches Pulver bestand aus Kupferulfat, Alaun und Kaliumpermanganat.

Mittel gegen Scheidenkatarrh. „Zum Spülen und „zum Pulvern“, Hersteller Joh. Sterenberg, Tierheilkundiger, Hess.-Oldendorf 32. — Beide Pulver sind ganz unsachgemäß gemischt, so daß die einzelnen Bestandteile zum Teil in groben Kristallen herausgelesen werden können. Das Pulver „zum Spülen“ war hellgrün und bestand aus Alaun, Kaliumpermanganat und Methylviolett. Das Pulver „zum Pulvern“ (was zum „Pudern“ bedeuten soll) war eine mehr blaugrüne Mischung, die neben geringen Mengen Kupferulfat aus Alaun und beträchtlichen Mengen Methylviolett bestand.

Wurmmittel, farblose Flüssigkeit, war eine 3prozentige Lösung von Brechweinstein mit viel Natriumsulfat. Arsen war nicht vorhanden.

Wurmpulver für Pferde, in Papierbeutel mit Aufdruck: „Schloß-Apotheke W. Kroes, Heilsberg O.-Pr.“ mit Tintenstiftvermerk: „Giftig, Pferdewurmpulver“. Weißes Pulver, das aus reinem Brechweinstein bestand.

Pulver gegen Durchfall der Kälber. Das aus Holland stammende Geheimmittel war ein Gemisch von Fenchelpulver mit etwas Anis, das größere Mengen von freier Salizylsäure und Calciumphosphat enthielt. Der Aschengehalt betrug 7 Prozent.

Geflügelcholera-Tinktur. Hersteller: Apotheke in Konstanz. Klare, rotbraune Flüssigkeit mit neutraler Reaktion, schwach bitterem, nicht unangenehmem Geschmack, ohne auffallenden Geruch. Die Lösung enthält Silber und Eiweiß. Die quantitative Bestimmung ergab, daß es sich um eine etwa 6prozentige Lösung von Albumose-Silber handelt.

Mittel gegen Dämpfigkeit der Pferde von Apotheker Bleuler, Lachen in der Schweiz. Rotbraune feste Masse in Tablettenform, in der Hauptsache aus Stibium sulfuratum aurantiacum und Calciumphosphat bestehend, daneben geringe Mengen von Arsen, Eisen, Natriumchlorid und Milhzucker.

Wund-Perkutol, eine mit Oleum Gaultheriae versetzte Oleinseife, die Resorcin, gebundene Salizylsäure, wahrscheinlich als Salol und gebundene Benzoesäure, vielleicht Benzyl-Benzoat, enthält.

Analgit für Tiere besteht aus Senföl, Tinctura Capsici, 5,5 Proz. freie Salizylsäure und 8 Proz. veresterte Säure (berechnet auf Salizylsäure).

Scheikorin, geruchlos, feines gelbliches Pulver, das sich fettig anfühlte. Es bestand aus einer Mischung von viel Borfäure und Chinosol.

Tallianine. (Usage vétérinaire). Hersteller: Brignonnet père et fils u. Gaubert, 15 Rue du Landy Plaine Saint-Denis (Seine). Eine weiße 10 ccm-Am-

pulle enthielt eine farblose, klare Flüssigkeit, die schwach nach Terpenen roch. Rotes Lakmuspapier, das mit Kaliumjodidlösung befeuchtet ist, wird rasch gebläut. Die Lösung ist mit Wasser mischbar und gibt auf Papier keinen Fettfleck. Das spezifische Gewicht beträgt 1,0036. Der Siedepunkt liegt bei 99—100 Grad, wobei nur die ersten Tropfen trübe übergehen. Die Ätherauschüttlung aus 1½ Ampullen hinterläßt nach dem Abdunsten des Äthers nur geringen, nach Terpenen riechenden Rückstand. Tallianine ist demnach eine wässrige Lösung, in der etwas ozonisiertes Terpentinöl gelöst ist.

Distol kombiniert, schwach gelblich aussehendes Pulver mit an Kampfer erinnernden Geruch. In Alkohol und Äther nur teilweise löslich. Der unlösliche Anteil erwies sich als Talkum. Der in Alkohol lösliche Teil soll aus Rohfilicin und Hexachloräthan bestehen. Der Gehalt an letzterem wurde durch Sublimation und durch Bestimmung des Chlorgehaltes zu rund 20 Prozent ermittelt.

Serapis S.B. 444, Spezifikum gegen Leberkrankheiten der Schafe. Hersteller Chemische Fabrik Aubing bei München. Von Dr. Glusck e sind von diesem Präparat zwei Analysen veröffentlicht. Nach der ersten Analyse (Münch. tier. Wochenschrift 77, 277, 1926) wurde gefunden ein spezifisches Gewicht 1,486 und 82 Prozent Tetrachlorkohlenstoff, die restliche Menge entfällt auf ein Koniferenharz, wahrscheinlich Kolophonium. Eine zweite, spätere Analyse deselben Verfassers (Münch. tier. Wochenschrift 78, 149, 1927) ergab das spezifische Gewicht 1,267 und 65 Prozent Tetrachlorkohlenstoff. Der restliche Teil besteht aus Paraffinkohlenwasserstoffen. (Paraffinum liquidum). Das im hiesigen Institut untersuchte Präparat war eine gelblich-bräunlich gefärbte, angenehm riechende Flüssigkeit von schwach saurer Reaktion und dem spezifischen Gewicht 1,290. Der Tetrachlorkohlenstoffgehalt betrug 52,4 Prozent. Der Rückstand bestand aus geringen Mengen Kolophonium neben größeren Mengen Paraffinum liquidum.

Neo-Serapis, Hersteller Chemische Fabrik Aubing b. München. Veröffentlicht wurde bis jetzt eine Analyse von Dr. Glusck e (Münch. tier. Wochenschrift 78, 150, 1927), wobei gefunden wurde ein spezifisches Gewicht von 1,363 und folgende Zusammensetzung: 56 Teile Tetrachloräthylen, 23 Teile Hexachloräthan, 13 Teile Handelsbenzol und 8 Teile Terpentinöl.

Das im hiesigen Institut untersuchte Präparat weicht von dieser Angabe merklich ab. Es zeigte ein spezifisches Gewicht von 1,459. Die Flüssigkeit war hellgelblich gefärbt, klar und zeigte neutrale Reaktion. Die Zusammensetzung betrug:

Benzol	16 Teile,
Tetrachloräthylen	64 Teile,
Hexachloräthan	16,5 Teile,
Terpentinöl	3,5 Teile.

Innere Medizin und Chirurgie.

Kerbler, F.: Durch seborrhoisches Ekzem erzeugte Otitis externa beim Pferd. (Allatorvosi Lapok, Nr. 17, S. 206.)

Bei einem Pferd, das bei Berührung der Ohrmuscheln heftige Abwehrbewegungen machte, fanden sich an der inneren Auskleidung jeder Ohrmuschel sechs bis acht etwa zehnpfennigstückgroße, rundliche, grauweiße, fettig glänzende, mittelförmig etwas vertiefte, 3—4 mm dicke, scharf abgegrenzte Auflagerungen, die zum Teil miteinander verschmolzen waren, die Haare verklebten und sich leicht verreiben ließen. Die darunter liegende Haut zeigte außer geringgradiger Verdickung keine sonstigen Veränderungen. Die mikroskopische Untersuchung der Borkenmasse ließ keine Fadenpilze erkennen. Nach Entfernung der Auflagerungen und Behandlung der erkrankten Stellen mit zehnprozentiger Salizylsalbe und Auftragen einer Ichthyolpasta

wurde die Erkrankung zwar zum Stillstand gebracht, es traten aber wiederholt Rückfälle ein. Marek.

Gmelin, W.: Das Ekzem des Jungrindes und seine wirtschaftliche Bedeutung. (Aus dem Pathologischen Institut der Universität Tübingen. — Vorstand: Prof. Dr. Schmincke.) (Zschr. für Infekt.-Krankh. der Haustiere 1927, 31, H. 4, S. 314.)

In Württemberg wird von den Fleischern lebhaft Klage geführt über empfindliche Schäden, die sich an den Fellen geschlachteter Kälber auf der Haarseite zeigen. Die schadhafte Stellen, die sich größtenteils am Rücken befanden und wie angenagt und zerfressen ausähen, seien so groß, daß die Kalbfelle häufig als unbrauchbar bezeichnet werden müßten. Sie seien so zahlreich, daß innerhalb weniger Wochen Hunderte von Kalbfellen als mit solchen Schäden behaftet gemeldet worden seien. Die Beschädigungen seien zurückzuführen auf den Befall mit Läusen. Um zu prüfen, wie weit die Klagen der Fleischer

und Gerber gerechtfertigt waren, hat Gmelin mehrere Häute und Hautteile derartiger Kälber näher untersucht. Makroskopisch fand der Verfasser entlang der Hals- und Rückenlinie zahlreiche haarlose Stellen mit trockenem, etwas vorgewölbtem, bräunlich gefärbtem, mäßig derbem Schorf, durch den die Haare durchgewachsen sind. Ähnliche, etwa erbsengroße Stellen lassen sich nach Abschneiden der Haare noch mehrere finden, jedoch mit feuchter, sammetweicher Schorfbildung. Im ganzen sind die Stellen nicht leicht zu erkennen. Sie machen sich in der Hauptsache bemerkbar durch eine Verklebung der Haarspitzen, die aber nur bei schärferem Zusehen zu entdecken ist. Schneidet man die Haare aus, dann treten die Stellen zutage. Läuse, Nisse, Milben, Haarlinge oder sonst irgendwelche Hautschmarotzer sind an dem Fell nicht zu finden. Mikroskopisch wurde festgestellt: Schorfbildung mit Zerstörung des Papillarkörpers, Parakeratose in Verbindung mit Akanthose der Epidermis, entzündliche Infiltration des Papillarkörpers, Lockerung und teilweise Zerstörung des subepithelialen Retegewebes. Es handelt sich somit um ein chronisches multiples Ekzem der Haut. Um die Frage zu klären, inwieweit die ekzematöse Erkrankung der Haut den Gerbeprozess beeinträchtigt, wurde eine stark befallene Haut gegerbt. Die Wasserundurchlässigkeit des Leders ist bekanntlich an die lückenlose Erhaltung des Papillarkörpers gebunden. Wird dieser aber, wie im vorliegenden Falle, durch das Ekzem an vielen Stellen durchbrochen, so ist das Leder nicht mehr wasserdicht und dadurch wertlos, und zwar sitzen die Schädigungen in stärkster Ausdehnung und größter Zahl auf den Rückenpartien, dem wertvollsten Teil des Leders, und nehmen nach den Seiten hin ab. Die Ursachen dieser Ekzeme, wie ja überhaupt des Ekzems im allgemeinen, sind noch nicht geklärt. Verf. verweist auf die Angaben von Jul. Bauer, nach dem die Erkrankungen der Haut zum großen Teil Manifestationen innerer Anomalien und Störungen sind. Im vorliegenden Falle scheint nun das Ekzem der Kälber ebenfalls auf inneren Ursachen in der Hauptsache zu beruhen; denn die Schädigungen finden sich in streng segmentaler Anordnung gebunden an den Verlauf der Interkostalgefäße und -nerven. Sie sind dorsal stärker und nehmen im allgemeinen ventralwärts an Intensität ab. Es muß sich um eine erworbene, durch die Art der Ernährung bedingte Epithelempfindlichkeit der Haut handeln. Gmelin sieht in dem sehr häufigen Aufzuchtfehler, der darin besteht, daß man dem Kalbe sehr früh die Milch entzieht und es mit abgerahmten oder verdünnten Milchtränken überschwemmt, die Hauptschuld an dem Zustandekommen der Konstitutionsanomalie, weil es dadurch zu einer „exsudativen Diathese“ kommt, die die Grundlage für die ekzematöse Erkrankung der Haut abgibt. Das Kälber ekzem kann spontan abheilen, andererseits kann aber durch die meist unsaubere Pflege ein ständiger Reiz auf den entzündlichen Papillarkörper ausgeübt werden, der nach Ansicht des Verf. möglicherweise zu der bekannten Papillomatose der Jungirinder führen kann.

Ziegler.

Króó, H. und F. O. Schulze: Über die Bedingungen optimaler chemotherapeutischer Wirkung. (D. m. Wschr. 1927, S. 1759.)

Verff. konnten früher im Tierversuche zeigen, daß die gleiche Menge bestimmter therapeutischer Mittel in höherer Verdünnung eine intensivere Heilwirkung bedingt wie in konzentrierterer Lösung. Während z. B. eine Neosalvarsandosis von 0,002 Gramm in 1,0 ccm Lösungsmittel einen rezidivfreien Heilerfolg von 78,5 Prozent bei rekurrenzinfizierten Mäusen hatte, so wurden bei Injektion derselben Arzneimenge in 0,1 ccm gelöst nur 14,2 Prozent, und bei Verabreichung von 0,0033 des Mittels ebenfalls in 0,1 ccm gelöst, nur 57,1 Prozent geheilt.

Es wurden nun analoge Versuche am Menschen angestellt und zwar an Paralytikern, die zu therapeutischen Zwecken mit Malaria durch Impfung infiziert worden waren. In der einen Versuchsreihe (Fall 1—20) erfolgte je eine intravenöse Injektion von Chininum hydrochlor. und Aethylurethan $\alpha\alpha$ 0,2 gelöst in 0,9 Aqu. dest. In Fall 21—40 wurde genau dieselbe Arzneimenge jedoch gelöst in 200 ccm destillierten Wassers verabreicht. Der Erfolg war der, daß die Patienten der ersten Versuchsreihe 87 anfallfreie Tage aufwiesen, während die der zweiten Versuchsreihe zusammen in 221 Tagen anfallfrei waren. Über eine Woche blieben anfallsfrei von der ersten Gruppe 20 Prozent, von der zweiten 80 Prozent. Ähnliche Ergebnisse wurden bei derselben Krankheit nach Anwendung von Salvarsan erzielt. Es konnte also auch durch die klinische Erfahrung am Krankenbett eine Überlegenheit der therapeutischen Wirkung von Chinin und Salvarsan in stärkerer Verdünnung über die gleiche Dosis in konzentrierter Form festgestellt werden.

Carl.

Berrár, M.: Über das Panaritium der Schafe. (Allatorvosi Lapok, 1927, Nr. 9, S. III.)

Das Panaritium wird im Anschluß an Kitt und Hess bezeichnet, als jene Klauenerkrankung der paarzeher Haustiere, die in der Kronenenge, in der Klauenspalte oder an den Eckballen beginnt, dabei einen phlegmonösen Charakter zu erkennen gibt und mit Gewebstod einherzugehen pflegt. Zwei Gruppen von solchen Erkrankungen werden unterschieden: die Gruppe des sporadischen Panaritium einerseits und des feuchtenartigen Panaritium andererseits. Als Infektionsstoffe können beim sporadischen Panaritium beteiligt sein die gewöhnlichen Eitererreger für sich oder zusammen mit saprophytischen Bakterien, ferner der Nekrosebazillus und die Erreger der Gasgangrän. Je nach der Natur der Infektionsstoffe wird vorgeschlagen die Einteilung der sporadischen Panaritien in eiterige, nekrotische und gasgangränöse Formen. Mit Rücksicht auf die Schafszucht kommt die größte Bedeutung dem feuchtenartigen Panaritium zu, das zwar stets einen nekrotischen Charakter zu erkennen gibt, in seinem klinischen Bild und Verlauf aber sowohl bei den einzelnen Tieren wie auch nach den einzelnen Seuchengängen Verschiedenheiten darzubieten pflegt, insbesondere je nachdem außer dem Nekrosebazillus auch noch andere Infektionsstoffe sich beteiligen oder nicht. Außer dem Eindringen von Infektionsstoffen kommt eine wesentliche Rolle auch disponierenden und Gelegenheitsursachen zu. Im allgemeinen neigen reinrassige Wollschafe am meisten zur Erkrankung. Nasse Witterung begünstigt die Infektion (Moderrhinke), ähnlich wie jauchige Streu, ferner die Geburt und zuweilen die Mast, eine unregelmäßige Belastung der Klauen bei vernachlässigter Klauenpflege. Als Gelegenheitsursachen lassen sich anführen einerseits in beliebiger Weise entstandene Abschürfungen und Mazeration der Haut im Klauenspalte, andererseits eine intertriginöse Erkrankung im Zwischenklauenspalte, zuweilen außerdem Blasen- und Erosionsbildung im Verlaufe der Maul- und Klauenfeuche. Die krankhaften Veränderungen, denen in vielen Fällen eine Intertrigo im Zwischenklauenspalte und insbesondere in deren hinteren Abschnitten voranzugehen pflegt, entwickeln sich vorwiegend (in Verf. Fällen in 70 Prozent) im Bereiche der vorderen und namentlich der medialen Klauen, sie treten aber nicht selten gleichzeitig an mehreren Extremitäten auf oder was noch häufiger der Fall ist, es werden die einzelnen Gliedmaßen nacheinander ergriffen. Die Vorbeugung besteht in Regelung der hygienischen Verhältnisse und im Fernhalten der verschiedenen prädisponierenden und Gelegenheitsursachen, außerdem in Verhinderung einer Einschleppung durch kranke oder aus verfeuchten Herden stammende anscheinend gesunde Tiere. Sollte sich unter besonderen Umständen der Ankauf von Tieren aus verfeuchten oder aus unbekannten Herden nicht umgehen lassen, so sollen solche Tiere einer

gründlichen mechanischen und chemischen Desinfektion unterworfen werden, wobei die Klauen sorgfältig gekürzt, alle lose gewordenen Hornteile entfernt und darauf die Tiere, eins nach dem andern, mit den Gliedmaßen bis zum Karpal- und Tarsalgelenk hinauf in eine Desinfektionsflüssigkeit (frisch bereitete 1—2prozentige Chlorkalklösung oder das mehr zuverlässige Chloramin nach 20facher Verdünnung der 10prozentigen Stammlösung) getaucht und darin etwa 5 Minuten lang belassen, dann in einem besonderen Stall auf trockener Streu bis zum Trockenwerden stehen gelassen werden. Bei besonders großer Ansteckungsgefahr sollte die Desinfektion nach einigen Tagen wiederholt und die Tiere 2—3 Wochen lang abgefordert gehalten werden. Die am Orte des Desinfektionsverfahrens gesammelten Abfallstoffe und das dort verwendete Stroh sollen durch Verbrennung unschädlich gemacht werden.

In bereits verfeuchten Schafbeständen sollten die mit Sorgfalt ausgefuchten kranken Tiere abgefordert werden. Bei Undurchführbarkeit dieser Maßnahme soll man dafür Sorge tragen, daß die infizierte Streu entfernt oder im Falle von Dauerstreu täglich eine frische Streuschicht aufgetragen wird. Zur Zeit des Ablammens sollen die gebärenden Schafe mindestens für die Dauer einiger Tage in einer mit sehr reichlicher Streu versehenen und leicht zu reinigenden Abteilung untergebracht, unter allen Umständen ferner die Nachgeburt sofort aus dem Stall entfernt werden. Eine weitere Maßnahme besteht in einer guten Klauenpflege und in fachgemäßer Behandlung der intertriginösen Zwischenklauenspalthautentzündung. (Bepinselung mit einer 1 bis 3prozentigen wässerigen oder zweckmäßiger 1prozentigen Pyoktaninlösung.) Besonders in kleineren Beständen kann empfohlen werden das Einstreichen der hinteren Klauen jede Woche, der vorderen jede zweite Woche mit einer Teermischung aus Holzteer, Kreolin und Holzkohlenpulver, oder Schwefelpulver. Alle diese Verfahren lassen nur bei Einzelbehandlung der Tiere einen Erfolg erwarten. Nur bei hochträglichen Tieren, deren Niederlegen zur Einzelbehandlung mit Rücksicht auf die Möglichkeit von Verwerfen bedenklich erscheint, kann als Notbehelf in Betracht kommen das tägliche Treiben der Herde durch einen mit desinfizierenden und trocknenden Mitteln gefüllten Behälter, nachdem nötigenfalls die Tiere vorher durch reines Wasser getrieben worden waren zur Reinigung der etwa stark beschmutzten Klauen. Das Sauber- und Trockenhalten der Fütterungs- und Tränkplätze ist eine weitere Maßnahme zum Fernhalten von Gelegenheitsurflächen. Die von M o u s s u empfohlene Impfung mit einem von erkrankten Tieren genommenen Impfstoff führte in einem Bestande zu keinem günstigen Ergebnis, sie veranlaßte im Gegenteil verschieden weit ausgebreitete Nekrosen an der Impfstelle.

Bei Behandlung kranker Tiere sollen alle unterwühlten Hornteile abgetragen, die erkrankten Stellen mit einer dreiprozentigen alkoholischen Pyoktaninlösung bepinselt und die Behandlung in 2—3tägigen Zwischenräumen wiederholt werden, ohne dabei einen Verband anzulegen. Wenn beim Beginn nur noch nekrotische Flecke erkennbar sind, so läßt sich der krankhafte Vorgang oft zum Stillstand bringen durch Ätzen mit konzentrierter Salpetersäure. Nur in Fällen, wo auch die Sohlenwand unterwühlt angetroffen wird, läßt sich ein wöchentlich zu erneuernder trockener oder ein Teerverband nicht entbehren. Als Streupulver kommt in Betracht eine Mischung von Holzkohlenpulver mit Tannoform im Verhältnis von 1:10—20, bei starker Sekretion gepulverter Kupfervitriol, doch lassen sich in letzten Fällen auch Bepinselungen mit 5—10prozentiger Höllenstein- oder 10prozentiger Zinksulfatlösung mit Vorteil anwenden.

Bei ausgedehnten Unterwühlungen der Hornkapfel sowie bei ausgebreiteter Nekrose der Klauenlederhaut kann man nur durch die Abtragung der ganzen Hornkapfel und die Anbringung eines Trockenverbandes Heilung erzielen,

wenn im Bedarfsfalle der Verband mehrmals erneuert wird. Etwa nekrotisch gewordene Knochenteile entfernt man mit dem scharfen Löffel mit konzentrierter Karbolsäure, deren überschüssiger Teil durch Abspülung mit Spiritus entfernt wird. Kam es zum Durchbruch in das Klauengelenk oder in die Klauenbeugeflehne, so bleibt nur die Amputation der Klaue übrig.

Marek.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Richtlinien für die Bekämpfung des seuchenhaften Verkalbens, aufgestellt von der Abortuskommission.

Die Verhandlungen auf der Fachtierärztetagung zur Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten in Jena vom 1. bis 4. Oktober 1927*) ließen erkennen, daß der Kampf gegen den Abortus infectiosus Bang der Rinder bisher noch zu keinem übereinstimmenden Ergebnis geführt hatte. Die Meinungen über die Bekämpfungsmethoden und ihre Durchführung waren im einzelnen so verschieden, daß ein sicheres Urteil über ihren Wert nicht gewonnen werden konnte. Es wurde daher gemäß Beschluß der Jenaer Fachtierärztetagung eine Kommission von Sachverständigen gebildet, die einheitliche Richtlinien für die Bekämpfung des seuchenhaften Verkalbens aufstellen sollte. Die Kommission setzt sich zusammen aus Ernst-München; Götze-Hannover; Karsten-Hannover; Mießner-Hannover; Richter-Leipzig; Schumann-Breslau; Zeller-Berlin-Dahlem; Zwick-Gießen.

Auf Grund umfassender mündlicher und schriftlicher Beratungen ist die Kommission einstimmig zu folgendem einheitlichen Bekämpfungsplan, der die Herstellung des Impfstoffes und Richtlinien für die Bekämpfung umfaßt, gekommen. Die Impfstofflieferanten werden im Interesse der Sache gebeten, die Impfstoffe nach hier gegebener Vorschrift herzustellen. An die Tierärzteschaft geht die Bitte, sich dieser Impfstoffe zu bedienen und genau nach den Bekämpfungsrichtlinien zu verfahren. Nur auf diese Weise wird es gelingen, einen Überblick über den Erfolg der Behandlung zu gewinnen und etwaige Mängel abzustellen. Um möglichst genaue Berichterstattung an die zuständigen Veterinärinstitute wird gebeten.

a) Herstellungs- und Verwendungsvorschrift von Abortusimpfstoff.

1. Es sollen nur gegend- und stallspezifische Stämme verwandt werden.
2. Die Zahl der zu verwendenden Stämme soll bei gegendspezifischem Impfstoff mindestens 5 betragen.
3. Hinsichtlich des Alters der Stämme wird die Verwendung frisch isolierter und älterer empfohlen, indem man alle 2—4 Wochen frisch isolierte Stämme zufügt und die entsprechende Zahl alter entfernt. Die zu verwendenden Stämme dürfen nicht älter als ein Jahr sein.
4. Als Nährboden sollen nur Pepton- oder Rindfleischbouillon von 6,7 PH + Traubenzucker 0,5 + Glycerin 0,5 Prozent oder 5prozentiger Glycerinagar verwendet werden.
5. Die Bouillonkulturen sollen 6—8 Tage, die Agarkulturen 3—4 Tage bebrütet werden.
6. Die Verwendungsdauer beider Kulturen ist auf 3 Wochen zu beschränken.
7. Die Dosis beträgt bei der ersten Impfung 10 ccm, bei der zweiten 20 ccm.

b) Bekämpfung des seuchenhaften Verkalbens.

Das sich von Jahr zu Jahr mehr ausbreitende seuchenhafte Verkalben (Abortus infectiosus Bang) erfordert dringend strengste Durchführung systematischer Bekämpfungsmaßnahmen. Nachstehende von einer Sachverständigenkommission aus Vertretern fast aller großen Bundesstaaten ausgearbeitete Richtlinien sollen eine einheitliche Grundlage für die Bekämpfung der Seuche im ganzen Reichsgebiet geben. Sie umfassen:

- A. Die Voruntersuchung des Bestandes.
- B. Die systematische Durchimpfung verfeuchter Bestände.
- C. Die Durchführung hygienischer Maßnahmen.

A. Voruntersuchung des Bestandes.

Sind in einem Bestände Verkalben oder gehäufte Retentio secund. oder Endometritiden aufgetreten, so ist zunächst durch bakteriologische

*) Siehe D. T. W. 1928, S. 51 und S. 72.

oder serologische Untersuchung zu klären, ob „feuchtenhaftes“ Verkalben (Abortus Bang-Infektion) vorliegt. Man sendet zu diesem Zwecke mit genauem klinischen Befund an das nächste veterinär-bakteriologische Institut ein:

1. Eine abortierte Frucht,
2. Ein Stück Eihaut mit Kotyledonen,
3. Blutproben der Tiere, die verkalbt haben oder erkrankt sind, sowie Blutproben der übrigen Zuchttiere des Bestandes.

Inzwischen lasse man die Kühe, die verkalbt haben bzw. erkrankt sind, und evtl. noch verkalbende Tiere sofort aus dem gemeinsamen Stall entfernen und ihren Standplatz gründlich reinigen und desinfizieren (vergl. hierzu C. Durchführung hygienischer Maßnahmen).

Ergibt die bakteriologische bzw. serologische Untersuchung das Vorliegen der Abortus-Bang-Infektion, sind zur Entseuchung des Bestandes nachstehende planmäßige Impfungen und hygienische Maßnahmen peinlichst durchzuführen.

B. Systematische Durchimpfung des Bestandes.

1. Anlage einer Impfliste.

Zur Durchführung der planmäßigen Impfungen ist die Anlage einer vom Tierarzt selbst zu führenden Impfliste unerlässlich. Zuvor hat eine rektale Untersuchung sämtlicher gedeckten Tiere — soweit sie nicht sichtbar tragend sind — auf Trächtigkeit stattzufinden, um genaue Unterlagen für die Liste zu haben.

In der Impfliste führt man zuerst die tragenden Tiere und zwar zeitlich nach dem Trächtigkeitsstadium bzw. Deckdatum geordnet auf. Anschließend, am besten durch einen roten Strich getrennt, werden die z. Zt. nicht tragenden Tiere ebenfalls zeitlich geordnet nach dem Abkalben bzw. Verkalben und endlich die Sterken (Kalbinnen) nach ihrem Geburtsdatum eingetragen. Die tragenden Tiere werden jedesmal nach dem Abkalben bzw. Verkalben oben gestrichen und reihen sich als letzte unten wieder an. Hier sind auch die neu zugekauften Tiere vor dem Decken aufzuführen. Als Impfliste wird nachstehendes Muster empfohlen:

Nr. oder Name	tra- gend von	ge- kalbt	ver- kalbt	Impfung mit Kulturen		danach gedeckt am	eventl. vor- genommene Impfung mit Abortus- lymphe od. abgetötet. Kulturen	Ausgang: richtig abgekalbt bzw. verkalbt? Datum:
				I	II			

2. Impfungen mit lebenden Kulturen.

Sie ist bei allen z. Zt. nichttragenden Tieren, also bei Kühen, die verkalbt oder gekalbt haben und noch nicht wieder tragend sind, sowie bei Kalbinnen, die in den nächsten Wochen zugelassen werden sollen, durchzuführen. Dabei ist zu beachten, daß die Kulturimpfungen nach normaler Geburt in den ersten 4 Wochen, nach Fehlgeburten jedoch einige Zeit später, wenn der Ausfluß aufgehört hat, vorzunehmen sind.

Zweimalige Impfung in Abständen von etwa 14 Tagen ist unbedingt notwendig. Die Dosis beträgt für die erste Impfung 10, für die zweite Impfung 20 ccm. Die Verwendungsdauer der Kulturen ist auf drei Wochen zu beschränken.

Vier Wochen nach beendeter Impfung mit lebenden Kulturen sind die Tiere bei Auftreten der Brunst decken zu lassen. Umrindernde bzw. stillochsige Tiere müssen einer Sterilitätsbehandlung unterzogen werden.

Die Impfungen erstrecken sich im Prinzip über 2—3 Trächtigkeitsperioden, wobei die Tiere nach dem Kalben bzw. Verkalben wieder mit lebenden Kulturen behandelt werden müssen.

3. Impfung mit abgetöteten Kulturen.

(Abortuslymphe, Abortusbazillensextrakte, Abortin usw.).

Sie ist nur bei tragenden Tieren (1. bis 7. Trächtigkeitsmonat) und bei den Zuchtbullen und zwar zu Beginn der Impfmaßnahmen durchzuführen.

Die Dosis beträgt 10—20 ccm.

C. Durchführung hygienischer Maßnahmen.

1. Maßnahmen bei Ausbruch der Seuche im Bestande.

Der Erfolg der Impfung ist von der strengen Durchführung hygie-

nischer Maßnahmen abhängig. Der Landwirt ist in diesem Sinne zu belehren, und es ist darauf zu dringen, daß die nachfolgenden Richtlinien peinlichst befolgt werden.

Als unerlässlich ist die Einrichtung eines besonderen Abkalbestalles zu fordern, der unter Umständen behelfsmäßig im Pferdestall, im Ochsenstall, Scheune usw. herzurichten ist. Im Hauptstall darf keine Geburt mehr stattfinden. Alle Tiere, die sich zur normalen oder Frühgeburt anschicken (Aufklärung des Personals über die Anzeichen) sind grundsätzlich aus dem gemeinsamen Stall zu entfernen und im Abkalbestall aufzustellen. Ihre Pflege ist einer besonderen Person zu übertragen, die den Hauptstall nicht betreten darf.

Nach dem Abkalben bzw. Verkalben verbleiben die Tiere so lange im Abkalbestall; bis der Ausfluß aus den Geschlechtsteilen verschwunden ist. Vor Wiedereinstellung in den Zuchtstall sind sie gründlich zu putzen und mit schwacher Desinfektionsflüssigkeit zu reinigen, wobei besonderes Gewicht auf die Klauen, den Schwanz, die äußeren Geschlechtsteile und das Euter zu legen ist. In den Hauptstall zurückgebracht, empfiehlt es sich, die Tiere von einer besonderen Person pflegen zu lassen, zumindest aber ist zu fordern, daß sie als letzte gemolken werden.

Werden zu einer Herde, die dem Verfahren unterliegt, neue tragende Tiere zugekauft, so sind diese bis zum Abkalben abgefordert aufzustellen. Erst dann dürfen sie in den Zuchtstall eingeführt werden und sind mit lebenden Kulturen (vergl. oben) nachzuimpfen.

2. Schutzmaßnahmen gegen Einschleppung der Seuche.

Der beste Schutz gegen die Einschleppung der Seuche ist die Ergänzung des Bestandes durch eigene Nachzucht. Ist aus wirtschaftlichen Gründen der Ankauf von Zuchttieren nötig, so sollten sie nur aus bestimmt seit Jahren feuchtfreien Beständen erworben werden. Weiter kann man sich mit einiger Sicherheit gegen den Einbruch der Seuche schützen, indem man die zugekauften Tiere einer Absonderung unterwirft, bis die vorzunehmende Blutuntersuchung das Freisein von einer Abortus-Bang-Infektion anzeigt. Hochtragende Tiere hält man am besten bis nach dem Abkalben isoliert (vergl. C. 1.).

Zentrale für die Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten.
Mießner.

Standesangelegenheiten.

Tierärztekammer für die Provinz Westfalen und den Freistaat Lippe.*)
19. Mai 1928 in Bad Hamm.

Anwesend waren 16 Mitglieder. Der Tierärztliche Berufsstand sei klein und habe viele Neider und Feinde. Bei allen Sonderanträgen der einzelnen Gruppen sei die Einheitlichkeit nötiger als je. Aus diesem Gedanken heraus sei auch manches in dem neuen T.K.-Gesetz, das nach jahrzehntelangem Kampfe endlich vom Preussischen Landtag verabschiedet sei und am 13. April cr. Gesetzeskraft erlangt habe, über die tierärztliche Berufsvertretung, zu verstehen. Es bedeute dieses Gesetz einen Markstein des tierärztlichen Standes, an dem man Halt suchen müsse. Wenn auch die Fachpresse dieses Ereignis je nach ihrer Einstellung verschwiegen, erwähnt oder gefeiert habe, so habe doch der Vorsitzende zu dem Standesinteresse der Mitglieder der T.K. für Westfalen und Lippe so viel Vertrauen, daß sie dieses Ereignis, um das man so schwer gerungen habe, einmütig und freudig begrüßen würden. Daher möge an dieser Stelle besonders dankbar gedacht werden der zielbewußten Führung im Vorstande des T.K.A., der stets bereiten Mitarbeit und Vertretung unserer Interessen in der Veterinärabteilung und der so wirkungsvollen Unterstützung der fünf ärztlichen Mitglieder des bevölkerungspolitischen Ausschusses des Preuß. Landtags bei Beratung unseres Gesetzesentwurfs. Vors. bittet um die Ermächtigung, allen den herzlichsten Dank der Westf. Kammer auszusprechen zu dürfen. Möge das neue Gesetz zum Segen werden für den ganzen Stand, dann sei die mühevollen Arbeit um sein Zustandekommen gern getan. 1. Bericht des Vorsitzenden: Ein sehr rühriges Mitglied des tierärztlichen Berufsstandes, Oberregierungsrat Dr. Matschke, wurde uns durch den Tod entzogen. Einen weiteren Verlust hatte der T.K.A. und somit auch unsere Kammer durch den Tod des Vorsitzenden des T.K.A.

*) Nach einem amtlichen Bericht von Dr. Wulff und Dr. Eckardt aus Raumerparnis gekürzt wiedergegeben.

Dr. Franzenburg. Nach Inkrafttreten der neuen Fleischbeschaugebührenordnung ist bereits im Oktober v. Js. seitens der Kammer das Oberpräsidium gebeten worden, für eine möglichst gleichmäßige Festsetzung der Gebühren in den einzelnen Regierungsbezirken einzutreten. In der Fleischbeschau stehen weitere Änderungen bevor. Es sei mit der Einrichtung von zwei Fleischbeschauämtern im Reg.-Bezirk Minden, sowie eines im Reg.-Bezirk Münster und eines im Freistaate Lippe zu rechnen. In der ersten Hälfte des Mai d. Js. nahm der Vorsitzende als Vertreter der Kammer an der Tagung des T.K.A. teil. Die wesentlichsten Punkte der Beratungen im T.K.A. umfaßten das neue Kammergesetz mit seiner Wahlordnung und seinen Ausführungsbestimmungen, ferner die Angriffe auf das Dispensierrecht und seine Verteidigung und die praktische Ausübung der Fleischuntersuchungen.

2. Haushaltsplan, jährliche Umlage. Der Kammerbeitrag wird wieder auf 20,— RM. festgesetzt, von denen 10,— RM. an den T.K.A. abzuführen sind. Die Mitglieder sollen durch ein besonderes Schreiben zur Zahlung der Beiträge aufgefordert werden. **3. Reisekosten und Tagelöhner für die Teilnehmer an der Sitzung.** Es sollen 25,— RM. Tagelöhner, Fahrt II. Klasse und 20,— RM. für evtl. Übernachtungsgebühr gezahlt werden. **4. Dispensierrechtsfragen:** Referent: der Vorsitzende.

a) Zeitiger Stand der Angelegenheit, Gegenagitation. Es wird der Stand der Angelegenheit des weiteren klar gelegt. Die Kammermitglieder und die übrige Kollegenchaft wurden ersucht, für eine Aufklärung im Sinne der Erhaltung des Dispensierrechts alles zu tun. Es solle jedem Tierärzte des Kammerbezirks Aufklärungsmaterial zugesandt werden. b) Erlass des Ministers für Landwirtschaft V. 1253 betr. Abgabe von Tierarzneien. Die T.K. stellt mit lebhaftem Bedauern fest, daß aus landwirtschaftlichen Kreisen, anscheinend außerhalb des T.K.-Bezirks an maßgebender Stelle der Beforgnis Ausdruck gegeben ist, daß die Tierärzte für die in ihrer Praxis abgegebenen Arzneien den Tierbesitzern höhere Preise als die Apotheker in Rechnung stellen. Die T.K. kann nach ihrer Kenntnis der Dinge einer Berechtigung dieser Beforgnis durchaus nicht zustimmen. Sie kann so etwas nur als die Folge einer groß angelegten Agitation der Apotheker gegen das uralte tierärztliche Dispensierrecht erblicken, da letztere aus geschäftlichen Gründen einen Keil zwischen Landwirtschaft und Tierärzteschaft zu treiben suchen. Den Apothekern neue Gewinne zuzuführen resp. den angeblich notleidenden Landapothekern durch Aufgabe alter Rechte zu helfen, dazu können Landwirte und Tierärzte sich nicht berufen fühlen. Hierfür gibt es andere Mittel und Wege. Es geht ihnen beiden erheblich wirtschaftlich schlechter als den Apothekern. Die T.K. warnt dringend vor einer Änderung des bisherigen Zustandes wegen der Folgen, die sich doch wohl bei der Eigenart der tierärztlichen Berufsarbeit manche nicht klar gemacht haben. Die Allgemeinheit und nicht zuletzt die Landwirtschaft selbst würden bei dieser Untergrabung des tierärztlichen Arbeitsfeldes den größten Schaden davon tragen. Wenngleich auch bisher die Abgabe der Arzneien seitens der Tierärzte durchweg erheblich unter der Arzneitaxe erfolgt ist, so nimmt die T.K. doch entsprechend dem Erlasse des Herrn Landwirtschaftsministers V. 1253 folgenden Zusatz als § 8b in ihre amtliche Taxe auf und ersucht die Tierärzte im Kammerbezirke zur strikten Innehaltung: § 8b der tierärztlichen Mindesttaxe. Die Arzneien sind zu Preisen abzugeben, welche die Arzneitaxe nicht überschreiten, sich vielmehr möglichst weit unter den in der Arzneitaxe vorgeschriebenen Preisen halten. Die Berechnung der tierärztlichen Verrichtungen und der abgegebenen Arzneien in einer Pauschsumme ist unzulässig, vielmehr muß der Tierbesitzer in jedem Falle spätestens nach erfolgter Bezahlung der ihm zugestellten Rechnung eine Einzelberechnung der Arzneipreise erhalten. **5. Kammersteuer, Abänderungsanträge.** Auf Seiten sämtlicher Referenten herrscht Einstimmigkeit darüber, daß die Kammertaxe in wesentlichen Punkten der heutigen Teuerung nicht mehr Rechnung trägt. Da sie als Mindesttaxe gedacht ist, kann sie aber auch selbst im Hinblick auf die schwierige Lage der Landwirtschaft nicht in allen Punkten bestehen bleiben, sondern muß eine Erhöhung — wenn auch nur eine mäßige — erfahren. Auf die Vorlage des Vorstandes wurde folgendes beschlossen: Unter C 1 a) der tierärztlichen Gebührenordnung ist einzufügen: „bis 7 km vom Wohnorte der Entfernungskilometer 1,25 RM. 1 b) für jeden weiteren Kilometer 0,75 RM., dazu treten die Untersuchungsgebühren wie unter B 3 und die Gebühren für etwaige Einzelverrichtungen.“ Beim Abschnitt „Impfung“ soll eingefügt werden: Schutz- und Heilimpfung gegen Maul- und Klauenfeuche: Statt des bisherigen Ab-

satzes 7. 1. Bei kostenloser Lieferung von Serum seitens der Verbände oder des Eigentümers: a) bei Rindern über 1 Jahr alt 2,— RM., b) bei Rindern unter 1 Jahr alt 1,50 RM., c) bei Schweinen über ¼ Jahr alt 1,50 RM., d) bei Schweinen unter ¼ Jahr alt 1,— RM. 2. Bei Lieferung des Serums durch den Impftierarzt wird außer diesen Impfgebühren ein Zuschlag von 25 Prozent auf den Serumpreis erhoben. Als Absatz 8. Für Impfungen gegen Geflügelkrankheiten 0,25 RM. pro Tier einschließlich Impfstoff. Genehmigt wird ein Sonderabkommen zwischen der Vereinigung deutscher Schweinezüchter und -Mäster und dem Ausschuß der Preuß. T.K. und dem Reichsverbande der prakt. Tierärzte. Nach dieser Vereinbarung werden auf die allgemeinen Tarifgebühren den Mitgliedern der Vereinigung deutscher Schweinezüchter und Schweinemäster 20 Proz. Ermäßigung gewährt, sofern zur Impfung etwa 50 Schweine angemeldet werden, die vom Tierarzt an einem Tage geimpft werden können und wenn der Zeitpunkt vom Tierarzt bestimmt bzw. von ihm vereinbart wird. Bei besonders großen Beständen sind Sonderabkommen zwischen Tierärzten und Schweinehaltern möglich. **6a) Fleischbeschaugebühren, Sondergebühren usw.** In längerer Besprechung wurde auf die im Mindener Bezirk z. T. besonders günstig liegenden Beschauverhältnisse hingewiesen mit ihren Massenchlachtungen, und die von der Mindener Regierung in entgegenkommender Weise der T.K. mitgeteilten teilweise recht ansehnlichen Einnahmen von Kollegen aus der ambulatorischen Fleischbeschau bei freier Privatpraxis an Orten mit Sondergebührenordnungen wurden zur Kenntnis gebracht. Anbetracht des Umstandes jedoch, daß die einmal in die Gebührenordnung gelegte Breiche einer wirklichen Agitation gegen die Fleischuntersuchungsgebühren auch an anderen Orten Tür und Tor zu öffnen geeignet sind, wurde folgende Resolution gefaßt:

Gegenüber dem Bestreben der Gewerbetreibenden, die durch den Minister erfolgte Erhöhung der Fleischbeschaugebühren zu vereiteln, stellt die T.K. fest, daß die Berechtigung der Erhöhung nunmehr außer im Ministerium, auch im Landtag Zustimmung gefunden hat. Die T.K. kann nicht zustimmen, daß der Erlass von Sondergebührenordnungen eine Berechtigung hat, zumal durch die ministerielle Verfügung bei Einführung der neuen Gebührenordnung übermäßig hohe Einnahmen aus der Fleischbeschau ausgeschlossen sind. Bezüglich Sicherstellung der Beschautierärzte brachte das Referat eine Reihe von Einzelheiten, die ernster Erwägung wert scheinen. Referent wurde gebeten, diese in einem besonderen Artikel in der Fachpresse bekannt zu geben. Die T.K. faßt folgende Resolution: Es sollen die zuständigen Behörden darauf hingewiesen werden, daß es dringend notwendig und zweckmäßig erscheint, die Beschautierärzte durch feste Anstellung mit Pensionsberechtigung sicherzustellen. Aus diesem Grunde hält die T.K. die Errichtung von Pensionskassen für sehr wünschenswert. **6b) Praktische Ausübung der Fleischbeschau.** Ref. Dr. Wulff. Es wird folgende Resolution gefaßt: Vorkommnisse bei der Ausübung der Fleischuntersuchung haben wieder mit Deutlichkeit gezeigt, welche große Verantwortung auf den Schultern der Tierärzte ruht und wie leicht ihre Stellung durch ein Versehen untergraben werden kann. Die Kammer fordert alle Kollegen auf, im Interesse der Volksgesundheit die Fleischuntersuchungen nach wie vor mit der peinlichsten Gewissenhaftigkeit auszuführen. **7. Tierzuchtfragen:** Die T.K. stellt erneut fest, daß wiederum Bestimmungen getroffen sind, auch auf dem Gebiete der Kleintierzucht die Tierärzte in ihrer züchterischen Betätigung lahm zu legen. Bei der Ausbildung, die die Tierärzte an ihren Hochschulen in der Tierzucht gefunden haben, kann ihnen unmöglich zugemutet werden, sich bei der Landwirtschaftskammer die Zulassung als Preisrichter oder Körkommissar in der Ziegenzucht durch Ablegung einer Prüfung zu erwerben resp. die Anerkennung als solcher bei bereits längerer Tätigkeit auf diesem Gebiete einzuholen. Der Vors. wird beauftragt, bei der Landwirtschaftskammer zwecks Abänderung der Bestimmungen vorstellig zu werden. Es würde dies vor allem auch im Interesse der minderbemittelten Bevölkerungsschichten, die in erster Linie für die Ziegenhaltung in Frage kommen, liegen.

Tierärztlicher Zentralverein für die Provinz Sachsen, die Thüringischen und Anhaltischen Staaten, gemeinsam mit dem Verein Anhaltinischer Tierärzte am 29. April 1928 in Halle (Saale).

93. Generalversammlung.

Anwesend: 105 Teilnehmer. Prof. Dr. Götz - Hannover: Operationsvorführungen und geburtshilfliche Demonstrationen an lebenden

Rindern. In bereitwilligster und dankenswerter Weise hatte der Leiter der Tierklinik, Dr. Wulfsberg, den Operationsaal der Tierklinik und Vet.-Rat Nippert die erforderlichen Rinder zur Verfügung gestellt. In 2½stündiger Demonstration zeigte und erläuterte Professor Götze verschiedene Operationen am Rinde und ein neues geburts-hilfliches Instrument. Zunächst wurde die Epidural- (Sakral-) Narkose beim Rind vorgeführt, die in der Klinik für Geburtshilfe und Rinderkrankheiten in Hannover zu vielen Malen ohne jegliche Nachteile ausgeführt wurde. Sie hat sich als ein wesentliches Hilfsmittel bei allen vaginalen Eingriffen bewährt. Hier sind besonders zu nennen: Kastration, Reposition des prolabierte Uterus, Behandlung der Sterilität nach Albrecht. Bei Embryotomien und einer neuen vom Vortragenden kurz erwähnten Technik des Kaiserschnitts beim Rinde können unerwünschte Wehen durch die Narkose weitgehendst vermindert werden. Auch bei Penisoperationen findet die Narkose bei Bullen vorteilhaft Anwendung. Als Narkotikum genügen in der Regel 10 ccm einer 0,5 prozentigen Tutokainlösung; bei länger als 30 Minuten dauernden Operationen kann dieselbe Dosis ohne Schaden nochmals gegeben werden. Weiter wurde die Durchschneidung des medialen, geraden Kniegelenkbandes unter Infiltrationsanästhesie (20 ccm einer 3prozentigen Tutokainlösung) gezeigt. Die Operation verlief am stehenden Tiere vollkommen schmerzlos. Unter Narkose des Fußendes, die durch zirkuläres, subkutanen Umspritzen des Fußes dicht oberhalb der Afterklauen mit ca. 60 ccm einer 3prozentigen Tutokainlösung erreicht wird, wurde eine Klauenamputation mittels Drahtfäße vorgenommen. Der Vortragende erläuterte dann kurz die Fremdkörperoperation beim Rinde. Bei der Indikationsstellung zur Operation ist zu berücksichtigen, daß akute Fälle mehr Erfolg versprechen, ausschlaggebend sind wirtschaftliche Momente. Von den verschiedenen Methoden ist für die Praxis die von Kübitz vorgeschlagene zu empfehlen, die sich am stehenden Tiere den Zugang zur Bauchhöhle durch Refektion der linken 11. Rippe verschafft. Die Operation wurde vorgeführt. Die Rippenrefektion wird zweckmäßig unter Leitungsanästhesie des 10., 11. und 12. Interkostalnerven am hinteren Rand der betreffenden Rippen mit je 20 ccm 3prozentiger Tutokainlösung vorgenommen. Die Rippe wird in einer Entfernung von 15–20 cm vom Knorpelanfatz mit der Drahtfäße abgefägt. Ein besonderes Abpräparieren des Rippenperiostes ist nicht erforderlich. Muß man sich zum Haubeninnern Zugang verschaffen, so wird der Panfen aus der Hautwunde möglichst weit hervorgezogen und mittels zweier Kugelfaßzangen außen fixiert. Nach sorgfältiger Abdichtung des hervorgezogenen Panfenteils gegen die Bauchhöhle mit Billrothbatist wird extraperitoneal der Panfen geöffnet. Nach Beseitigung des Fremdkörpers wird der Panfen durch zweitägige Lembert-Naht geschlossen und die Panfenwunde evtl. mit Teilen des großen Netzes überheftet. Beim Verschluss der Bauchwandwunde wird zunächst das Peritoneum mittels sorgfältiger Knopfnäht vernäht; Muskelschichten- und Hautschnitt werden zusammen durch die etwas modifizierte Moser'sche Naht vereinigt. Über die genähte Wunde wird ein Deck- und Entspannungstampon geheftet. Von einer Schlauchdrainage kann abgesehen werden. Zum Schluß wurde an einem Kalbsfötus das von Dr. Liess, Hannover, modifizierte Drahtfäßen-Embryotom in Verbindung mit der von Dr. Liess erfundenen biegsamen, weichen, nicht rostenden und bei richtiger Anwendung sehr leistungsfähigen Drahtfäße vorgeführt. Man überzeugte sich von der einfachen und gefahrlosen Handhabung des Instrumentes und zeigte großes Interesse für seine fast unbegrenzten embryotomischen Anwendungsmöglichkeiten. Nach Beendigung der vortrefflich gelungenen Operationsvorführungen fand die Versammlung gegen 2½ Uhr ihre Fortsetzung. Der Vorsitzende begrüßt die erschienenen Gäste und Mitglieder des Zentralvereins und des Vereins Anhaltinischer Tierärzte und dankt Prof. Götze sowie seinem Assistenten Dr. Liess nochmals für die lehrreichen Darbietungen. Mit besonderem Beifall begrüßt es die Versammlung, daß an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität das Fach der Veterinärchirurgie jetzt selbständig durch Dr. Wulfsberg als Leiter der Tierklinik und nunmehr auch die Seuchenlehre und Tierhygiene durch einen Tierarzt, Privatdozent Dr. F. Schmidt, vertreten werden. Der Vorsitzende gedenkt sodann des schweren Verlustes, den der Verein durch den unerwarteten Tod seines Ehrenvorsitzenden, des Geheimrats Dr. h. c. Leistikow, erlitten hat. Am Grabe des Verstorbenen ist im Namen des Vereins ein Kranz niedergelegt worden. Um Aufnahme in den Verein haben gebeten: Ober-

regierungs- und Vet.-Rat Träger-Erfurt, der Vorsitzende des Vereins Thüringer Tierärzte, Vet.-Rat Dr. Herrfarth-Calbe (Saale), Vet.-Rat Dr. Grabert-Stendal und vom Bakteriologischen Institut in Halle a. S. Dr. Hueber, Dr. W. Schmidt und Dr. Asshauer. Die Genannten werden einstimmig aufgenommen. Bei der Feier des 150jährigen Bestehens der Tierärztlichen Hochschule in Hannover wird der Verein durch seinen II. Vorsitzenden, Vet.-Rat Gundelach, vertreten. Durch Ernennung des bisherigen Schriftführers, Obertierarztes Dr. Raschke, zum Schlachthofdirektor in Chemnitz ist die Neuwahl des Schriftführers erforderlich geworden. Es wird Dr. Wilhelm Schmidt-Halle von der Versammlung einstimmig gewählt. Nach dem Kassenbericht und Prüfung der Kasse wird dem Schatzmeister Entlastung erteilt. Darauf ergreift der II. Vorsitzende, Vet.-Rat Gundelach, das Wort zu dem Nachruf über das Wesen und Wirken des verstorbenen Ehrenvorsitzenden Geheimrat Dr. h. c. Leistikow.

Skizzen aus Leistikow's Leben.

Meine Herren! Das Wesen und Wirken Leistikow's, in Beziehung auf unseren Verein und auf unsere Mitglieder habe ich in dem von mir verfaßten Nachruf geschildert. Ich will mich heute darauf beschränken, einige Skizzen aus seinem Leben zu bringen und nur noch einzelnes aus seinem Wesen und Wirken herausheben. Voraus schicken möchte ich, daß ich mit unserem verstorbenen Ehrenvorsitzenden Leistikow 32 Jahre lang in ständigem Verkehr gestanden habe, oft dienstlich, fast täglich aber außerdienstlich, nämlich bei einem fog. Dämmerchoppen in einer kleinen Weinstube in Magdeburg, wo man einen Menschen am besten kennen lernen kann, denn in vino veritas. Ich glaube daher wohl in der Lage zu sein, ein treffendes und maßgebendes Urteil über das Leben, Wesen und Wirken Leistikow's abgeben zu können. Leistikow wurde im Jahre 1900 zum I., der Departementstierarzt Dr. Felisch in Merseburg zum II. Vorsitzenden unseres Vereins gewählt. Felisch zeigte aber schon im Beginn des Jahres 1902 seinen Austritt aus dem Verein an, angeblich weil auf Leistikow's Vorschlag der § 8 der Statuten, der früher lautete: „Die Versammlungen finden in Halle oder in Magdeburg statt“, dahin abgeändert wurde: „Die Versammlungen finden abwechselnd in Halle und Magdeburg statt“, tatsächlich aber, weil er beabsichtigte, einen neuen tierärztlichen Verein im Reg.-Bezirk Merseburg zu gründen. Leistikow legte nun nach seinen eigenen Worten „zwecks tunlichster Verhütung bzw. Zersplitterung des Zentralvereins“ sein Amt als I. Vorsitzender nieder, brachte also unserem Verein in der selbstlofesten und großmütigsten Weise ein Opfer, das aber leider den beabsichtigten Erfolg nicht hatte. Denn obwohl der Verein in einer außerordentlichen Generalversammlung beschloß, die frühere Fassung der Statuten beizubehalten, wonach die Versammlungen in der Regel in Halle stattfinden sollten, und obwohl in dieser Versammlung zum Ausdruck gebracht wurde, daß „zur Bildung eines neuen Vereins gar kein Bedürfnis vorliege, sondern daß ein ungeschwächtes Fortbestehen des Zentralvereins gerade in der jetzigen Zeit sehr nötig sei“, wurde der tierärztliche Verein im Reg.-Bezirk Merseburg unter dem Vorsitz von Felisch gegründet und besteht heute noch. Prof. Dr. Disselhorst wurde in dieser außerordentlichen Generalversammlung zum I. und Leistikow zum II. Vorsitzenden gewählt; beide haben unseren Verein in der vorzüglichsten Weise geleitet. Leistikow zeichnete sich als Verhandlungsleiter durch seine große Unparteilichkeit aus, die er besonders der Minorität gegenüber ausübte. Bei Aufrechterhaltung der Ordnung zeigte er eine gewisse Schneidigkeit, die aber manchmal bei Störungen der Verhandlung an Grobheit grenzte. In dieser Beziehung war ihm Disselhorst weit über, der sich durch seine mit freundlichem Humor gewürzte Geltendmachung der Disziplin stets den Beifall der großen Mehrheit der Versammlung zu sichern wußte. Leistikow hat sich in seinen Vorträgen am meisten mit der Lungenfeuche beschäftigt, die ja auch seiner Zeit in der Provinz Sachsen, insbesondere im Reg.-Bezirk Magdeburg, von allen ansteckenden Krankheiten die wichtigste war. Leistikow war wohl der größte Lungenfeuchkenner der damaligen Zeit, der sich infolge seiner großen Erfahrung, seiner sehr eingehenden, objektiven Untersuchung und seines Scharfblickes bei Stellung der klinischen Diagnose — selbstverständlich im offenen Stadium — sehr selten, bei der pathologisch-anatomischen Diagnose nie geirrt hat, im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger Steffen, der glaubte, die Dia-

gnose durch den „spezifischen Geruch“ der Lungenfeuchtkranken Tiere feststellen zu können und infolgedessen zu zahlreichen Fehldiagnosen kam. Leistikow übertraf in dieser Beziehung sogar unseren Altmeister Schütz in Berlin, der bei Stellung der klinischen Diagnose häufiger, bei der pathologisch-anatomischen Diagnose einige Male fehlte, dann aber später das richtige Urteil Leistikow's anerkennen mußte, was er auch offenherzig und unumwunden getan hat. Leistikow trat bei seinem Dienstantritt als Departementstierarzt in Magdeburg, was die Lungenfeucheimpfung als Bekämpfungsmittel gegen diese Seuche betraf, zunächst in die Fußtapfen seines Amtsvorgängers, der mit Schütz zusammen nach der von beiden erfundenen Methode in großem Umfange Lungenfeucheimpfungen im Reg.-Bezirk Magdeburg ausgeführt hat. Aber schon nach drei Jahren wurde Leistikow auf Grund seiner Beobachtungen und seiner eigenen Versuche der erste Impfgegner im Reg.-Bezirk Magdeburg, aus dem Saulus wurde ein Paulus. Durch diese Impfgegnerschaft und durch das starre Festhalten seines einmal eingenommenen Standpunktes hat er sich viele Anhänger der Lungenfeucheimpfung zu Feinden gemacht, als einen der ersten den Gründer unseres Vereins Pütz, der ein sehr großer Impffreund war und sich für die größte Kapazität auf dem Gebiete der Lungenfeuchebekämpfung hielt, und der bei allen Vorträgen über Lungenfeuche in unserem Verein stets zu dem Schluß kam: „als wichtigstes und wirksamstes Mittel für die Tilgung der Lungenfeuche ist demnach nur die Impfung anzusehen“, griff Leistikow mehrfach in höchst unfeiner, heftiger und persönlich verletzender Weise an und bezeichnete ihn geradezu als einen Ignoranten. Leistikow hat ihm nicht mit gleicher Münze gedient, sondern blieb ihm gegenüber stets der vornehme, ruhige, fachlich denkende und fachlich handelnde Vereinskollege. Er entschuldigte sogar noch in seiner letzten Festrede edelmütig diese Ausfälle und Feindseligkeit, indem er sagte: „Pütz war geborener Schweizer, daher etwas derber Natur und konnte für das, was er für richtig hielt, rücksichtslos kämpfen; unsere Beziehungen waren nicht immer ungetrübt“. Aber auch die meisten Kollegen der Provinz Sachsen waren, was Lungenfeucheimpfung anlangte, Leistikow's Gegner, der größte Teil wohl aus Überzeugung, der kleinere — und das ist menschlich, allzumenschlich — in der Befürchtung, daß ein Impfverbot erlassen werden könnte, was natürlich einen großen Ausfall an Einnahmen zur Folge haben mußte. Leistikow's Partei hielten eigentlich nur einige Kreistierärzte des Reg.-Bezirks Magdeburg und unser Vorsitzender Raebiger. Prof. Schütz, früher ein intimer Freund Leistikow's, und mit ihm mehrere Professoren unserer Hochschulen, wurden seine Gegner, andere nahmen eine neutrale oder doch eine abwartende Stellung ein. Die meisten, heftigsten und auch gefährlichsten Feinde hatte er aber wegen seiner Impfgegnerschaft in den Kreisen der Landwirte unserer Provinz. Leistikow stand in dieser Beziehung fast „allein auf weiter Flur“, ging aber unbekümmert um alle diese Gegnerschaften auf dem von ihm für richtig erkannten Wege langsam aber sicher Schritt für Schritt weiter. Zunächst wies er unwiderleglich nach: 1. daß infolge der Impfung nach der Schütz-Steffen'schen Methode häufig hochgradige Erkrankungen und Todesfälle bei Rindern zustande kämen, 2. daß nach der Impfung ungenügende Schutzwirkung einträte und 3. daß durch die Impfung verdeckte und verheimlichte Seuchenherde geschaffen würden, die sich der Bekämpfung entzögen und ein Stationärwerden der Seuche zur Folge hätten. Er stellte ferner unumstößlich fest, 1. daß die von Schütz und Steffen aufgestellte Behauptung, die vorgeschriebene Trielimpfung sei ungefährlich, falls eine wirksame Schwanzimpfung vorhergehe, vollkommen irrig und 2. daß die Ansicht von Schütz, durch die Trielimpfung werde die Immunität gesteigert, unrichtig ist und tat beweisend dar, „daß die Besitzer durch die infolge der Trielimpfung verursachten Verluste nicht nur materiell stark benachteiligt würden, sondern daß sie auch den meist sehr langsamen und unter großen Qualen verlaufenden Totenkampf ihrer Tiere mit ansehen mußten, ohne helfen zu können“. Infolge der geschilderten Impfverluste wurde dann im Reg.-Bezirk Magdeburg die zweite Impfung am Triel verboten. Immer und immer wieder hob er durch Wort und Schrift hervor — es war sein ceterum censeo geworden —, daß an Stelle der Impfspritze unbedingt die Keule treten müsse, wenn die Lungenfeuche getilgt werden solle. Ein überaus großes Verdienst Leistikow's ist es, daß er im Jahre 1902 durchsetzte, daß der Reg.-Präsident in Magdeburg zunächst einmal die Privatimpfungen verbot. Dies war einer der geschicktesten Schach-

züge, die Leistikow in seinem Leben gemacht hat. Denn durch diese Verfügung wurde gleichzeitig die Lungenfeuchelymphanstalt der Landwirtschaftskammer in Halle lahm gelegt, da die Kreistierärzte keine Lungen- (Primär-) Lymphe abgeben durften und infolgedessen die Anstalt keine Sekundär-Lymphe mehr herstellen konnte. Als bekannt wurde, daß die Lungenfeuchelymphanstalt infolge dieser Anordnungen eingehen mußte, wurde noch einmal ein heftiger Angriff gegen Leistikow unternommen, weniger von Seiten der praktizierenden Kollegen, mit besonderer Heftigkeit und Erbitterung aber von Seiten der Gift und Galle speienden Landwirte, insbesondere der des Reg.-Bezirks Magdeburg, deren Einfluß im Ministerium für Landwirtschaft nicht unbedeutend war. Ein tonangebender, sehr angesehener Gutsbesitzer — Freund des Landwirtschaftsministers und sogar des Kaisers, der alljährlich Jagdgast bei ihm war — erklärte mir gelegentlich einer Pferdeausstellung in Magdeburg: „Die Landwirte — und ich an der Spitze — werden nicht eher raften noch ruhen, bis dieser Schädling Leistikow, der uns jetzt durch sein Impfverbot gänzlich zu Grunde richten will, aus unserer Provinz entfernt ist“. Als ich Leistikow hiervon Mitteilung machte, um ihn vor seinem Gegner zu warnen, da sagte er ruhig an Luther'sche Worte anlehnd: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Und wenn die Welt voll Teufel wär' und wollt' mich gar verschlingen, so fürchte ich mich nicht so sehr, es soll mir doch gelingen.“ Und dem überaus frommen und sich stets auf Gott verlassenden Leistikow ist es gelungen: Der Antrag der Impffreunde — und hierzu gehören die Landwirte unserer Provinz fast ohne Ausnahme —, daß wenigstens die für die Zwecke der Anstalt zu Halle a. S. erforderlichen Lymphemengen bereit gestellt werden möchten, wurde von dem Landwirtschaftsministerium, das nunmehr von der Richtigkeit und Zweckmäßigkeit der Leistikow'schen Forderungen überzeugt war, abgeschlagen; auch erklärte sich der Landwirtschaftsminister mit dem Impfverbot der Magdeburger Regierung einverstanden, da er für die Aufhebung dieses „keinen Nutzen für die Tilgung der Lungenfeuche erblickte“. Sehr treffend hat die Tierärztliche Hochschule in Berlin — allerdings erst im Jahre 1924 unter dem Rektorat von Bongert — unserem Ehrenvorsitzenden die Würde eines Doctor medicinae veterinariae ehrenhalber verliehen „als einen der hervorragendsten Vertreter jener Generation der beamteten Tierärzte, welche durch Sachkenntnis, Pflichttreue und Sorgfalt die von der Landwirtschaft mit erklärlichem Mißtrauen aufgenommene neue Viehseuchengesetzgebung zur sicheren Wirkung und zu allgemeinem Ansehen gebracht haben“, nachdem ein im Jahre 1921 auf meinen Antrag seitens der Tierärztekammer der Provinz Sachsen gestelltes diesbezügliches Gesuch an den damaligen Rektor mit nichtsagenden Gründen abgelehnt worden war. Es muß zugegeben werden, daß das auf Leistikow's Initiative beruhende Impfverbot, wie unser Vorsitzende in seiner Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde: „Über das Verbot der Impfungen gegen die Lungenfeuche der Rinder“ richtig betont, „für diejenigen Landwirte, welche vielleicht während ihrer ganzen wirtschaftlichen Tätigkeit überzeugte Anhänger der Lungenfeucheimpfungen gewesen waren, naturgemäß eines Scheines der Härte nicht entbehrt hat. Nur zu bald aber hat die Erfahrung gelehrt, daß die Provinz Sachsen unter dem Einfluß dieser Verfügung im Jahre 1903 zum ersten Male seit Menschengedenken frei von Lungenfeuche geworden ist“. Und gestern habe ich in dem neuen von Wiemann und Francke verfaßten Buch „Der deutsche Viehbestand und die Tierseuchen“ in dem Kapitel über Lungenfeuche nachstehende Sätze gelesen: „Ein nachhaltiger Erfolg der Seuchenbekämpfung trat aber erst ein, als man die lange Zeit für nützlich angesehene, in der Tat aber versteckte Seuchenherde unterhaltende Lungenfeuche-Schutzimpfung aufhob und die Bekämpfung ausschließlich auf die Keulung der betreffenden Bestände abstellte. Es ist damit zu rechnen, daß, falls nicht außergewöhnliche Verhältnisse eintreten, die Lungenfeuche keine Bedeutung wieder erlangen wird.“ Ich möchte diesen Worten hinzufügen und dies ist in erster Linie Leistikow's Verdienst. Wenn ich mich so eingehend mit Leistikow's Wirken bei der Bekämpfung der Lungenfeuche beschäftigt habe, so liegt der Grund darin, daß er auf diesem Gebiete seine größten Taten und auch seine größten Erfolge zu verzeichnen hat. Aber nicht nur auf dem Gebiete der Veterinärpolizei, sondern auch auf dem der Sanitätspolizei hat er sich wissenschaftlich hervorragend betätigt. Im Jahre 1896 stellte er zuerst einwandfrei fest, daß bei Hunden Muskeltrichinen vorkommen, während man früher annahm, daß sich bei diesen nur

Darmtrichinen entwickeln. Er hat auch als erster die sanitätspolizeiliche Forderung aufgestellt, geschlachtete Hunde ebenso wie die Haus- und Wildschweine auf Trichinen zu untersuchen. Als ich vorige Woche in Magdeburg die Ausstellung der Werke von Albrecht Dürer besuchte, seit dessen Tode jetzt 400 Jahre vergangen sind, fesselte mich das Bild: Ritter, Tod und Teufel. Bei der Betrachtung des Ritters mußte ich unwillkürlich an Leistikow denken. So einer war auch er. Schlank, grobgliedrig, hochgewachsen — Leistikow stammte aus Pommern, wo bekanntlich die „langen Kerls“ herkommen — Antlitz ruhig, aber hart und tief gefurcht, der Blick wie Stahl, ein Tatenmensch, den Tod und Teufel nicht irre machen konnten. Wie Bayard könnte man auch Leistikow den Beinamen geben: Ritter ohne Furcht und Tadel. Wie ein solcher stets aufrecht und geradeausgehend, hochgefinnt auch gegen seine Gegner, von großer Wahrheitsliebe und bewundernswerter Offenherzigkeit, mit welcher er auch sich selbst und sein eigenes Tun behandelte. Seine Wahrhaftigkeit war ein Hauptkennzeichen seiner sittlichen Mannesstärke. Auswendig hatte er eine rauhe, harte Schale, gegen Unbekannte oder ihm nicht näherstehende war er wortkarg, verschlossen, oft schroff und geradezu furchteinflößend traf sie manchmal der kalte Strahl seines prüfenden Blickes. Aber sehr ungerecht haben ihn die beurteilt, die ihm ein kaltes Herz zuschrieben: im Gegenteil, er besaß ein zartes, weiches, empfindsames und mitfühlendes Herz. Gegen Bekannte war er treuherzig, liebenswürdig, mitteilksam und unterhaltend. Bei den Tafelfreuden in unserem Verein taute der sonst etwas eifrig erscheinende vollkommen auf, er blickte freundlich aus seinen grauen Augen, liebte den heiteren Frohsinn, guten Humor und feinen Witz. Aber selbst die besten Bekannten wurden meist nur Vertraute einzelner Stunden, nicht die Freunde seines Herzens. Nur seinen verhältnismäßig wenigen Freunden öffnete er sein Inneres, mit ihnen ging er durch dick und dünn. Ich habe den Charakter Leistikow's vor einigen Jahren gelegentlich eines fröhlichen Festmahles in unserem Verein bei einem auf ihn ausgebrachten Toast in folgenden Versen geschildert: Er reicht, wenn er Dich wenig kennt, nicht gleich als Freund Dir beide Hände, doch wird er erst Vertrauen fassen, kannst Du im Lieben, wie im Hasen, Dich felsenfest auf ihn verlassen. Ein braver Sinn, ein kluger Kopp, nur — unter uns — oft mächtig grob! Ich bin stolz darauf, zu den Freunden seines Herzens gehört zu haben. Noch einige Wochen vor seinem Tode erklärte er mir unter kräftigem Händedruck, daß er mich zu einem seiner besten Freunde rechne, da ich in Freud und Leid zu ihm gehalten hätte und stets aufrichtig gewesen wäre. Als langjähriger Freund hielt ich es auch für meine Ehrenpflicht, diese Skizzen aus seinem Leben hier zu liefern, zumal ich das Gefühl habe, daß seine Leistungen, insbesondere auf dem Gebiete der Lungenfeuchbekämpfung, zur Zeit noch nicht nach Gebühr gewürdigt werden. Möge mein heutiger Vortrag mit dazu beitragen, daß später wenigstens sein Name und sein Wirken, in der Geschichte der Veterinärmedizin, insbesondere der Tierfeuchbekämpfung, den gebührenden Platz erhalten und damit unvergessen bleiben für alle Zeiten.

Mir ist heute schon bewußt:

„Er war ein Mann, nimmt alles nur in allem,
Ich werde nimmer seinesgleichen seh'n.“

Vet.-Rat Nippert macht zu „Fragen aus der Praxis“ nähere Ausführungen über das von ihm bei der Bekämpfung der Streptokokken-Mastitis geübte Behandlungsverfahren. Vor Einleitung therapeutischer Maßnahmen empfiehlt es sich, die erkrankten Euterviertel stets durch die bakteriologische Untersuchung der Milch feststellen zu lassen, da nur deren Behandlung in Frage kommt. Die klinische Untersuchung und makroskopische Prüfung der Milch ist in vielen Fällen für die Ermittlung der kranken Viertel nicht ausreichend. Vor Anwendung chemotherapeutischer Präparate wird das Euter fünf bis sechs Tage möglichst häufig gründlich ausgemolken. Während dieser Vorbereitungszeit läßt sich fast immer eine Besserung in dem Aussehen und der Beschaffenheit des Eutersekretes feststellen. Nach vorheriger Spülung des Euters mit einer 1—2prozentigen Boräurelösung folgt die Infusion einer 0,2—0,3promilligen körperwarmen Rivanollösung, bis das betreffende Viertel gut gefüllt ist. Durch Rivanollösung 1:1000 wurden Schädigungen des Euters beobachtet. Die Verwendung einer langen Kanüle ist zweckmäßig. Außerdem empfiehlt es sich, die Zitze etwas herabziehen zu lassen, wodurch die Infusion einer größeren Flüssigkeitsmenge wesentlich erleichtert wird. Die Rivanollösung wird 12—18 Stunden im Euter belassen. Erforderlichen Falles muß die Be-

handlung wiederholt werden. Bei den behandelten Tieren wurde durch die bakteriologische Untersuchung das Freisein von Mastitis-Streptokokken festgestellt. Schädigungen traten bei dieser Behandlungsweise nicht auf. Privatdozent Dr. Schmidt lenkt die Aufmerksamkeit der praktizierenden Kollegen auf die zunehmende Verwendung von Melkmaschinen. Vielfach wurde im Anschluß an das Maschinenmelken das Auftreten akuter Streptokokken-Mastitis beobachtet. Es handelt sich aber dabei nach den im Bakt. Institut der Landwirtschaftskammer gemachten Erfahrungen meistens um ein Akutwerden latenter, chronischer Fälle, die klinisch gesund erscheinen. Deshalb ist den Tierbesitzern zu empfehlen, vor dem Gebrauch einer Maschine eine bakteriologische Untersuchung von Einzelmilchproben sämtlicher Milchkühe vornehmen zu lassen, um derartige Zwischenfälle zu vermeiden. Kranke Tiere sind vom Maschinenmelken auszuschließen. Prof. Dr. Götze weist auf Grund seiner Erfahrungen auf die überaus große Bedeutung der Durchführung hygienischer Maßnahmen bei der Streptokokken-Mastitis hin. Kranke Tiere müssen isoliert werden, die gefunden sind in verseuchten Beständen häufiger zu untersuchen. Bei der klinischen Untersuchung leistet die Verwendung einer schwarzen Glasplatte zur Feststellung von Milchveränderungen wertvolle Dienste. Die bakteriologische Untersuchung der Milch ist insbesondere in Zweifelsfällen zu veranlassen, außerdem zeigen viele kranke Tiere keine klinischen Veränderungen. Mit Infusionstherapie hat Referent befriedigende Ergebnisse nicht in allen Fällen erzielt. Häufiges Ausmelken, alle 2—3 Stunden, ist zu empfehlen. Durch Autovakzination mit Yatrenmilch gelang es, die klinischen Erscheinungen zurückzubringen. Etwa 20—30 ccm Milch von kranken Tieren werden, mit gleichen Teilen einer 4prozentigen Yatrenlösung vermischt, bis zum folgenden Tag stehen gelassen und alsdann verimpft. Die Behandlung ist dreimal im Abstand von 14 Tagen zu wiederholen. Durch die Impfung allein gelingt es nicht, die Tiere streptokokkenfrei zu machen. Neben der Impfung kommt die lokale Behandlung durch Euterinfusion mit 0,5promilliger Rivanollösung in Frage. Die Behandlung ist bei trockenstehenden Tieren am erfolgreichsten. Die künstliche Trockenstellung kranker Viertel gelingt mit 0,5prozentiger Yatrenlösung. Kranke Tiere sind auf Erhaltungsfutter zu stellen. Kühe, deren Haltung unwirtschaftlich ist, sind auszumerzen. Obertierarzt Dr. Spiegel weist darauf hin, daß auch in unserer Provinz, insbesondere in den Zuchtgebieten der Altmark, die Leberegelseuche in den letzten Jahren eine größere Ausdehnung erlangt hat. Für die Behandlung ist die richtige und frühzeitige Stellung der Diagnose Voraussetzung, wobei der Kotuntersuchung auf Leberegelei erhöhte Bedeutung zukommt. Dieselbe ist zur Feststellung des Heilerfolges 4—6 Wochen nach der Behandlung zu wiederholen. Referent gibt einen kurzen Überblick über die zur Zeit auf dem Markt befindlichen Leberegel-Heilmittel. Entscheidend für ihre Verwendung ist der Preis und die Wirksamkeit. Außer der Behandlung der befallenen Tiere ist die Bekämpfung der Leberegelschnecken durch Ausstreuen von Kupfervitriol, das bereits in Verdünnungen von 1:1000000 die Zwischenträger abtötet, von größter Wichtigkeit. Der Schnecken-tilgung in den Schadgebieten wird seitens der Tierbesitzer viel zu wenig Beachtung geschenkt.

Im Anschluß an die Versammlung, 4 Uhr nachm., gemeinsames Essen mit Damen.

Der Vorsitzende: H. Raebiger. Der Schriftf.: W. Schmidt.

Verschiedene Mitteilungen.

Preussischer Tierärztekammerauschuß.

Auf Grund des § 7 Abs. 2 des Tierärztekammergesetzes vom 13. April 1928 (Gesetzesamtl. S. 57) bestimme ich folgendes:

1. Die erste Wahl zu den Tierärztekammern findet im Dezember 1928 statt.
2. Die Wahlfrist (§ 15 der Wahlordnung vom 22. Juni 1928) dauert vom 16. bis einschließlich 23. Dezember 1928.
3. Die Wahl gilt für die Zeit vom 1. Januar 1929 bis 31. Dezember 1932.

Berlin, den 22. Juni 1928.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

In Vertretung. (gez.) Krüger.

V 5835. Den preussischen Tierärzten wird vorstehende Bekanntmachung hiermit zur Kenntnis gebracht. Fries, Vors.

Dienstverfammlungen der Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute.

Vom 10. bis 11. Juli 1928, im Hörsaal des Landw. Instituts der Universität Breslau, Hanfastraße.

10. Juli, 15 Uhr: A. Tuberkulose.

1. Ergebnisse einer längeren Fütterung von Schweinen mit Molken und Buttermilch von dauerpasteurisierter Milch in einer mit entsprechenden Einrichtung ausgestatteten Molkerei, Dr. Pröscholdt, Züllchow-Stettin. 2. Vorläufiges Ergebnis der im bakteriologischen Institut in Halle ausgeführten Versuche zur frühzeitigen Feststellung der Euter-tuberkulose durch den Lymphozytennachweis, Dr. Rautmann-Halle. 3. Über die Bedeutung der Membranfilter nach Zsigmondy für die bakteriologische Diagnose der Tuberkulose, Dr. Machens-Braunschweig. 4. Der kulturelle Nachweis von Tuberkelbakterien und seine praktische Bedeutung, Dr. Wolters-Dessau. 5. Ein Versuch mit den Weleminskischen „Tuberculumucin“ zur Heilung von Tuberkulose, Dr. Knauer-Königsberg. 6. Einige interessante Tuberkulosefälle, Dr. Rautmann.

B. Streptokokken-Mastitis.

7. Über die Bekämpfung der Streptokokkenmastitis und der Holfsteinschen Euterfleuche, Dr. Kiessig-Kiel. 8. Eigene Feststellungen bei der Streptokokkenmastitis der Rinder, Dr. Pröscholdt. 9. Über die Skarsche Methode zur Feststellung des gelben Galtes, Dr. Machens. 10. Weitere Entwicklung der amtlichen Milchkontrolle der Landwirtschaftskammern für die Provinz Schleswig-Holstein, Dr. Kiessig.

11. Juli, 9 Uhr: C. Leberegefleuche.

11. Die medikamentöse Behandlung der Leberegefleuche des Rindes, Dr. Scharr-Berlin. 12. Erfahrungen bei der Bekämpfung der Leberegefleuche der Schafe, Dr. Kiessig. 13. Welches ist das wirksamste, relativ ungefährlichste und wirtschaftlichste Leberegemittel? Prof. Dr. Raebiger.

D. Seuchenhaftes Verkälben.

14. Über die im Tierseucheninstitut zu Hannover angestellten Versuche zur Lösung der Frage, ob tragende Tiere mit lebenden Abortus-Bang-Kulturen geimpft werden dürfen, Dr. Karsten-Hannover. 15. Ist es erforderlich, bei der Agglutinationsprüfung auf Abortus Bang Richtlinien aufzustellen? Dr. Schumann-Breslau.

E. Geflügelkrankheiten.

16. Weitere Untersuchungen über Geflügeltuberkulose. Infektionsversuche an Schweinen und Hühnern. Mit Lichtbildern und Vorweisung histologischer Präparate, Prof. Dr. Raebiger, Dr. Lentz-Berlin. 17. Beobachtungen über Kükenruhr in Schlesien, Dr. Lerche-Breslau. 18. Immunisierungsversuche gegen Pocken und Diphtherie der Hühner, Prof. Dr. Raebiger, Dr. Karsten. 19. Film über die Krankheiten der Honigbiene, Prof. Dr. Borchert-Berlin.

Der Dienstverfammlungen geht am 9. Juli nachm. eine Sitzung des Verbandes der Landwirtschaftskammer-Tierärzte und am 10. Juli vorm. eine interne Besprechung der Direktoren der Bakteriologischen Institute der preuß. Kammern mit den Vertretern der Preuß. Hauptlandwirtschaftskammer voran.

Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, Hamburg 1928.

90. Versammlung.

In der Zeit vom 16. bis 22. September d. Js. findet in Hamburg die 90. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte statt. Jeder, der sich für Naturwissenschaft oder Medizin interessiert, kann teilnehmen. Der Preis der Teilnehmerkarte beträgt 25 RM. einschließlich des freien Eintritts in den Zoologischen Garten und der freien Benutzung der Straßenbahn. Mitglieder der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte zahlen nur 20 RM., und, falls sie länger als ein Jahr Mitglied sind, nur 15 RM. Für die Damen der Teilnehmer ist der Preis auf 15 RM., für Studierende auf 5 RM. festgesetzt. Bei allen Veranstaltungen werden zuerst die Mitglieder der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte nebst ihren Angehörigen, dann erst die übrigen Teilnehmer berücksichtigt. Anmeldungen für die Erwerbung der Mitgliedschaft der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte sind an deren Geschäftsstelle, Leipzig C 1, Gustav-Adolfstr. 12, zu richten.

Vorläufiges Programm:

Sonntag, den 16. September, 20 Uhr: Zwanglose Zusammenkunft

und Begrüßung in der Ernst Merck-Halle des Zoologischen Gartens;

Montag, 9 Uhr: Erste allgemeine Sitzung: Eröffnung; Vorträge: 1. Reichskanzler a. D. Geheimrat Dr. Cuno: Handel und Wissenschaft; 2. Prof. Dr. Walden-Rostock: Die Bedeutung der Wöhlerischen Harnstoff-Synthese.

15 Uhr: A): Sitzung der Medizinischen Hauptgruppe. 1. Kommen und Gehen der Epidemien: Prof. Dr. Gottstein-Berlin und Prof. Dr. Gotschlich-Heidelberg. 2. Die psychische Beeinflussung des vegetativen Nervensystems im Lichte der Physiologie und Klinik: Prof. Dr. von Brücke-Innsbruck und Professor Dr. Hansen-Heidelberg. B): Abteilungssitzungen der Naturwissenschaftlichen Hauptgruppe.

19 Uhr: Empfang durch den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg; Empfang auf verschiedenen Überseedampfern; Chorkonzert in der Gr. St. Michaeliskirche.

Dienstag, 9 Uhr: Zweite allgemeine Sitzung: 1. Dr. B. Breitner-Wien: Die Blutgruppenfrage; 2. Prof. Dr. Otto Warburg-Berlin: Gärung und Atmung; 3. Prof. Dr. v. Ostertag-Stuttgart: Bekämpfung der Tierseuchen.

15 Uhr: Sitzungen der medizinischen Gruppen und der beiden Abteilungen für Veterinärmedizin. Abends Orgelkonzert in der Gr. St. Michaeliskirche.

Mittwoch, 9,30 Uhr: Dritte allgemeine Sitzung: 1. Prof. Dr. Defant-Berlin: Wissenschaftliche Ergebnisse der Meteorfahrt; 2. Professor Dr. Rukop-Köln: Telegraphie mit kurzen Wellen.

15 Uhr: Sonder Sitzung der Medizinischen Hauptgruppe. 1. Neuere Chemie der Hormone: Prof. Dr. Barger-Edinburgh; 2. Die weiblichen Sexualhormone: Prof. Dr. Zondeck-Berlin und Dr. Fritz Laquer-Elberfeld.

19 Uhr: Gesellschaftsabend im Uhlenhorster Fährhaus, Lampionkorso auf der Alster, großes Feuerwerk.

Donnerstag, 9—13 Uhr: Hauptsitzung der beiden Veterinärmedizinischen Abteilungen. Vorträge: 1. Immunität bei Tuberkulose; 2. Seuchenhafte parasitäre Erkrankungen. Die Namen der Vortragenden werden noch genannt werden.

15—18 Uhr: Abteilungssitzungen.

20 Uhr: Gefellige Veranstaltungen.

Freitag, 9—13 und 15—17 Uhr: Abteilungssitzungen.

18 Uhr: Gemeinsame Fahrt im Sonderzug nach Kiel, daselbst Empfangsabend, gegeben von der Stadt.

Sonabend: Besichtigungen, Ausflüge.

Als Themata für die tierärztlichen Vorträge sind vorgelesen: in Abteilung 34 (Theoretische und experimentelle Veterinärmedizin): Tierhygiene (Stallung), Ernährung, Fütterungsfehler, Futterfäulnisse, Konstitution; in Abteilung 35 (Angewandte Veterinärmedizin): Hämatologie, Geburtshilfe, Milchhygiene, Geflügelzucht und Geflügelkrankheiten, Pelztierzucht und Pelztierkrankheiten.

Die Herren Kollegen, welche Vorträge aus den vorstehend genannten Fächern zu halten gedenken, werden gebeten, baldigst (spätestens 25. Juni) unter genauer Angabe des Themas Mitteilung an die mitunterzeichneten Prof. Nöller (für Abteilung 34) und Schmidt (Abteilung 35) gelangen zu lassen. Anderweitige Zuschriften, Wünsche usw. sind an die beiden Einführenden, Dr. Mayer und Dr. Stödter zu richten. Ob Vorträge auch aus anderen Gebieten Berücksichtigung finden können, läßt sich vorläufig noch nicht beurteilen. Anmeldungen sind aber erwünscht. Im Interesse der glatten Erledigung der Tagesordnung muß die Höchstdauer der einzelnen Vorträge auf 20 Minuten beschränkt bleiben.

Genaueres Programm wird später gegeben.

Hamburg, 13. Juni 1928.

Die Hamburger Einführenden

der Abteilung 34:

Ob.-Reg.-Rat a. D. Dr. R. Mayer, Landestierarzt,
Hamburg, Lagerstraße 1.

der Abteilung 35:

Dr. Stödter, Hamburg, Abendrothsweg 21.

Für den wissenschaftlichen Ausschuß:

Prof. Dr. Nöller, Tierärztliche Hochschule. Berlin NW. 6,
Luisenstraße 56.

Prof. Dr. J. Schmidt, Leipzig C 1, Oesterreicherstraße 35, II.

Rheinischer Tierärztetag.

Anlässlich der Internationalen Presse-Ausstellung in Köln findet am 14. und 15. Juli 1928 eine Tagung der rheinischen Tierärzte nach folgendem Plane statt.

Sonnabend, den 14. Juli ab 20 Uhr zwangloses Zusammenfinden der Teilnehmer mit Damen im Restaurant „Rheinterrasse“ der Pressa. (Eintritt zur Pressa ab 18 Uhr 0,50 RM.)

Sonntag, den 15. Juli 1928: 10 Uhr Versammlung im Sitzungssaal der Pressa.

1. **Reform des Tuberkulosefütterungsverfahrens:** Direktor Dr. Eickmann-Bonn. 2. **Moderne veterinärmedizinische Röntgenologie:** Prof. Dr. Henkels-Hannover. 3. **Deutsch-Südwest-Afrika vor dem Kriege und in der Gegenwart:** Direktor Dr. Scheben-Fürstenwalde. 4. **Die Ausführungen der tierärztlichen Milchkontrolle in den Städten:** Schlachthofdirektor Dr. Dr. h. c. Heine-Duisburg.

Gegen Vorzeigung der Einladungskarte werden am Sonnabend, den 14. Juli 1928, sowie am Sonntag, den 15. Juli, von 9—12 Uhr, Eintrittskarten zur Pressa zum verbilligten Preise von 1 RM. an der Theaterkasse des städtischen Verkehrsamts (gegenüber dem Hauptportal des Domes) verabfolgt.

Im Auftrage der tierärztlichen Vereine der Rheinprovinz und des Saargebiets.

Der Verein rheinpreussischer Tierärzte Dr. Lothes, Vors.

Tierärzterundfunk.

Es ist beabsichtigt, für die nächste Zeit Vorträge aus dem Gebiete der veterinären Lebensmittelkontrolle halten zu lassen, auf die hiermit besonders aufmerksam gemacht wird. Es werden zunächst im folgenden Vierteljahr sprechen: 1. Dr. Frickinger, Direktor des städtischen Schlachthofes Bochum: „Die Tätigkeit des Tierarztes in der Lebensmittelkontrolle“ am Freitag, den 27. Juli 1928; 2. Direktor Dr. med. vet. Schwerdt, geschäftsführender Vorstand des Reichsverbandes der Deutschen Fleischwaren-Industrie Berlin: „Zur veterinären Lebensmittelkontrolle“ am Freitag, den 24. August 1928; 3. Veterinär Dr. Wundram vom Polizeipräsidium Berlin: „Der Tierarzt und die Fischkontrolle“ am Freitag, den 28. September 1928. Die Vorträge werden jeweils in der Zeit von 19,20 bis 19,45 Uhr gehalten. Anmeldungen weiterer Vorträge zu der Frage der veterinären Lebensmittelkontrolle sind erwünscht. Dr. Giese.

Robert Koch.*)

(Zu unserm Bilde.)

Wir befinden uns heute an einer geweihten Stätte, an der vor sechzig Jahren unser großer Meister der Bakteriologie, Robert Koch, seine erste Praxis übernommen hatte. Er war am 11. Dezember 1843 als dritter Sohn des Bergrates Koch in Clausthal geboren und genoß eine außerordentlich einfache Erziehung. Bei der großen Zahl von Geschwistern, zehn Brüdern und zwei Schwestern, ging es zu Hause kärglich her; die Mutter hatte Sorge, die vielen Mäuler täglich zu befriedigen. Der Vater konnte sich bei seiner starken dienstlichen Inanspruchnahme wenig um die Erziehung kümmern, und so verlebte Robert Koch eine ziemlich ungebundene, aber frohe Jugend in aller Einfachheit. Schon frühzeitig fonderte er sich von seinen Spielkameraden und Geschwistern ab. Er hatte weniger Neigung zu Spiel und Leibesübungen, vielmehr beschäftigte er sich mit der Natur, untersuchte Pflanzen, Tiere, Mineralien, legte sich Aquarien, Terrarien an und wurde hierbei von seinem Großvater, der ein gleiches Interesse hatte, vielfach unterstützt.

Dem Vater schien es anfangs unmöglich, den Sohn studieren zu lassen; der junge Koch sollte daher ein Handwerk erlernen. Schließlich gelang es doch infolge Verbesserung der Einkommensverhältnisse die Mittel zum Studium der Medizin bereit zu stellen. Dem Studium ging Koch mit Eifer nach, so daß er 1865 bereits einen Preis für eine Arbeit „Über das Vorkommen von Ganglienzellen in den Nerven des Uterus“ erhielt, und im gleichen Jahre Assistent am Pathologischen Museum zu Göttingen wurde. 1866 erwarb er den Doktorgrad und studierte kurze Zeit in Berlin, wo er bei Rudolf Virchow hospitierte. Koch hatte von jeher eine große Neigung für Reisen und sein Lieblingswunsch, der ihn auch veranlaßte, das medizinische Studium zu ergreifen, war, als Schiffsarzt die Welt kennen zu lernen. Deswegen übernahm er im

Juni 1866 die Stelle eines chirurgischen Assistenten im Hamburger Krankenhause, weil er von dort am schnellsten auf ein Schiff als ärztlicher Sachverständiger zu kommen hoffte. Frühzeitige Heiratsgedanken machten indessen bald seinen Plänen ein Ende. Um sich bald auf eigene Füße stellen zu können, gab er schon nach drei Monaten die Hamburger Assistenten auf und übernahm am 1. Oktober 1866 die Stelle eines Anstaltsarztes an der Provinzial Heil- und Pflegeanstalt in Langenhagen und gleichzeitig eine bescheidene aber auskömmliche Landpraxis. Im September 1868 mußte er aber unvermutet Langenhagen verlassen, da man an der Anstalt Ersparnisse machen wollte und zum Direktor einen Arzt machte, der die Behandlung der Patienten übernehmen mußte. Für den jungen Arzt kam der Direktorposten nicht in Frage, ohne das feste Gehalt der Anstalt aber war für ihn kein Auskommen, zumal befürchtet werden mußte, daß der neue Direktor auch noch Praxis treiben wollte. So siedelte Koch im September 1868 nach Niewegk bei Jüterbog über. In Niewegk lag die Praxis in der Hand eines Heilgehilfen; Koch vermochte sich nicht durchzusetzen und ging schon nach ¼ Jahren nach Rackwitz in Posen. Während dieser ganzen Zeit wollte die Sorge um die Erziehung seiner zahlreichen Geschwister nicht schwinden. Trotzdem Koch selbst über wenig Mittel verfügte, bot er seinem Vater häufig Unterstützung zur Ausbildung der Geschwister an.

Robert Koch machte den Krieg 1870 mit und kam im Jahre 1872 als Kreisphysikus nach Wollstein. Hier hatte er Gelegenheit, sich in den Mußestunden wissenschaftlich zu beschäftigen; er legte sich ein Mikroskop zu und widmete zunächst seine Aufmerksamkeit dem Milzbrande. Es ist zu bewundern, wie dieser noch junge Mann ohne irgendwelche Anleitung, rein aus sich heraus den Weg zu den großartigen Entdeckungen fand. Dies um so mehr, als zu jener Zeit die Bedeutung der Bakterien als Krankheitserreger und ihre Spezifität und Verschiedenartigkeit noch fast völlig unbekannt waren. Mit unendlichem Fleiße und zäher Energie beobachtete er tagaus, tagein das Blut von künstlich milzbrandkrank gemachten Mäusen. Er fand darin die schon von Pollender, Rayer und Davaine ermittelten Stäbchen und sprach sie als Erreger des Milzbrandes an. Sie gingen außerhalb des Tierkörpers schnell zugrunde, eine um so auffallendere Tatsache, als der Milzbrand erfahrungsgemäß eine echte endemische Bodenkrankheit ist, die vermuten läßt, daß sich der Erreger lange in der Erde halten muß. Diese schien im Widerspruch mit der geringen Widerstandsfähigkeit der stäbchenförmigen Erreger zu stehen. Durch Beobachtung milzbrandbazillenhaltigen Blutes vermischt mit Rinderferum im hängenden Tropfen, den er 24 Stunden bei 37 Grad im Brutschrank beließ, fand der geniale Forscher die Erklärung. Es bildeten sich nämlich kleine lichtbrechende, glänzende Kügelchen in den Stäbchen, die er mit Ferdinand Cohn als Dauerformen oder Sporen ansprach; sie waren von ungeheurer Resistenz und hielten sich jahrelang im Boden lebensfähig. Die denkwürdigen Funde teilte Koch am 30. April 1876 in Breslau von einer von Ferdinand Cohn hierzu geladenen Gesellschaft hervorragender Ärzte mit. Der bekannte Botaniker Ferdinand Cohn erkannte schon in der ersten Stunde in Koch den unerreichten Meister wissenschaftlicher Forschung, dessen Eleganz und Sicherheit im Experiment, die unwiderlegliche Logik seiner Schlußfolgerungen, die klassische Klarheit seiner Darstellung er bewunderte. Es war nicht Kochs Manier, kleine Bausteine zusammenzutragen, vielmehr gab er seine Arbeit nicht eher aus den Händen, bis das ganze Gebäude vollkommen fertig dastand.

Koch zeichnete sich im persönlichen Verkehr durch Klarheit, Tiefe und Neuheit seiner Gedanken aus; er hatte ein einfaches und lebenswürdiges Wesen, war allerdings nur denen zugänglich, denen es wirklich um ernste wissenschaftliche Fragen zu tun war und die ihn nicht nur aus Neugierde interpellierten.

Die klassischen Milzbrandarbeiten Kochs hatten bald seinen Ruf verbreitet, und so wurde er im Jahre 1880 durch den damaligen ersten Direktor Struck in das Reichsgesundheitsamt in Berlin als Mitglied berufen. Hier hatte er Gelegenheit, in Gemeinschaft mit seinen Mitarbeitern, unter denen in erster Linie Löffler, Gaffky und Schütz neben anderen zu nennen sind, seine Arbeiten fortzusetzen. Dauernd um die Ätiologie der Krankheiten bemüht, gelang ihm die Entdeckung des Erregers der Tuberkulose, die er am 24. März 1882 im Physiologischen Institut im Beisein von Rudolf Virchow bekannt gab. Nicht wenige Zweifler, zu denen auch Rudolf Virchow gehörte, nahmen damals den Vortrag Kochs auf. Die Entdeckung des Tuberkelbakteriums und seine Züchtung auf Blutserum zu einer Zeit, in der

*) Mießner: Gedenkrede anlässlich der Enthüllung der Gedenktafel für Robert Koch in Langenhagen am 15. Juni 1928.

sich die Methodik noch in den Kinderschuhen befand, muß als **Großtat** ersten Ranges angesehen werden unter Berücksichtigung des Umstandes, daß noch heute der Nachweis des Erregers und seine Kultur selbst Geübten Schwierigkeiten bereiten kann.

Koch legte weiterhin das Fundament für die **gesamte bakteriologische Technik** durch die Verwendung von festen Nährböden, die allein die einfache und schnelle Isolierung der Bakterien ermöglicht. Der Gelehrte hielt diese Entdeckung selbst für die bedeutungsvollste, denn die neue Methodik konnte geradezu als Schlüssel für die weitere Entdeckung pathogener Mikroorganismen angesehen werden. Erst jetzt war man imstande, die von seinem verehrten Göttinger Lehrer Henle schon 1840 gestellten Forderungen an den Erreger einer Infektionskrankheit:

1. daß er mikroskopisch nachweisbar ist;
2. daß er züchtbar ist;
3. daß man mit dem reingezüchteten Erreger die Ausgangskrankheit wieder erzeugen kann, erfüllen zu können.

Im Anschluß an die ätiologische Erschließung der Tuberkulose erfolgte die größte Auffsehen erregende **Entdeckung des Tuberkulins** im Jahre 1890. Wenn auch dessen therapeutische Wirkung nicht den daran geknüpften Hoffnungen entsprochen hat, so bleibt doch die diagnostische Bedeutung in der Human- und Veterinärmedizin unumstritten.

Große Verdienste erwarb sich der Meister weiterhin um die **Erforschung der Cholera** in Ägypten und Indien auf Veranlassung der englischen Regierung. Sie war von vollem Erfolge gekrönt und gipfelte in der Entdeckung des Erregers und seiner Lebensweise.

In aller Erinnerung ist ferner noch die Feststellung von Koch, daß der Erreger der Tuberkulose des Menschen von dem der Rindertuberkulose oder der Perlsucht verschieden ist, auf Grund von Arbeiten, die seinerzeit in dem nach ihm benannten Koch'schen Institut und in dem Pathologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Berlin ausgeführt wurden. An sie schlossen sich passive Immunisierungsversuche beim Rinde mit menschlichen Tuberkelbakterien. Wenn auch die in London im Jahre 1901 von ihm auf der Tuberkulosekonferenz proklamierte Auffassung in dieser uneingeschränkten Form sich nicht aufrecht erhalten ließ, so wissen wir doch heute, daß tatsächlich nicht unwesentliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Tuberkelbakterientypen bestehen.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts beschäftigte sich Koch erfolgreich mit den **Protozoenkrankheiten** und war fast dauernd in Afrika im Auftrage teils der deutschen, teils der englischen Regierung tätig. Berühmt sind seine epidemiologischen Untersuchungen über die Bekämpfung der Trypanosomiasen von Mensch und Tier durch Ausmerzungen der Zwischenwirte oder chemotherapeutische Eingriffe. Letztere waren besonders erfolgreich bei der Schlafkrankheit. Sein ständiger Reisebegleiter und Mitarbeiter war Geheimrat Kleine, den wir auch heute die Freude und Ehre haben, unter uns begrüßen zu dürfen. Ebenso wandte Koch dem Rhodesia oder ostafrikanischen Küstenfieber sein Interesse zu und klärte dessen Ätiologie auf.

In den letzten Jahren seines Lebens unternahm Koch noch Reisen nach Japan und Amerika, bis ein zunehmendes Herzleiden seiner Tätigkeit ein plötzliches Ziel setzte. Der große Meister starb ohne wesentlichen Todeskampf am 27. Mai 1910 in Baden-Baden, wo er Erholung suchte. Seinem Wunsche gemäß wurden die sterblichen Überreste in aller Stille der läuternden Flamme in Gegenwart einiger Freunde übergeben. Die Asche ist beigesetzt in einem zu einem Mausoleum umgewandelten weihvollen Raum des Koch'schen Instituts in Berlin.

Wenn man das Leben dieses großen Naturerforschers überblickt, so sieht man, wie Koch aus kleinsten Anfängen heraus zielbewußt vorwärts gegangen und mit sicherem Blicke den Bedürfnissen der damaligen Zeit Rechnung getragen hat. Es war die Zeit, zu der Pasteur die Gärung des Weines und Bieres auf Hefe zurückführte, den Erreger der Seidenraupenkrankheit erkannte; die Zeit, wo der hervorragende englische Chirurg Lister die antiseptische Wundbehandlung einführte und dadurch Millionen von Patienten vor dem sicheren Tode rettete. Es fehlte aber jedes System und jede Methodik in der Erforschung der Mikroorganismen. Vielleicht war es für Koch gerade sehr günstig, daß er nach dieser Richtung hin unbeeinflusst von vorn anfangen mußte. Vor 25 Jahren hatte ich selbst Gelegenheit, mich mit ihm über wissenschaftliche Probleme zu unterhalten. Es war erstaunlich, mit welcher

Schnelligkeit Koch alle Gedanken aufnahm und wie er aus kleinsten Tatsachen mit feherischer Gabe die weittragendsten Konsequenzen zog.

So ist es dem genialen Entdecker in kurzer Zeit gelungen, die Erkenntnis der Ätiologie der Infektionskrankheiten, die Jahrtausende lang trotz vielfachen Bemühens der hervorragendsten Geister rätselhaft blieb, in wenigen Jahren restlos zu erschließen. Robert Koch steht heute vor uns in unerreichbarer Höhe und wir blicken mit Ehrfurcht zu ihm hinauf.

Wie man den Delfter Glasbläser Leeuwenhoek, der 200 Jahre früher als vollkommener Laie die ersten Bakterien entdeckte, mit Recht als Vater der Bakteriologie bezeichnet hat, so kommt Robert Koch der Ehrenname „Meister der Bakteriologie“ zu. Er hat die Mikroorganismen, die sein großer Vorgänger zuerst gefunden, gemeißelt, d. h. er hat sie gezüchtet, differenziert und ihre Bedeutung für Menschen und Tiere erkannt. Dadurch hat er gleichzeitig die Basis für eine Bekämpfung der Infektionskrankheiten geschaffen, und nicht mit Unrecht nennt man ihn den **Bekämpfer des Todes**. Dies kommt auch auf dem Koch-Denkmal in Berlin durch die Inschrift „Dem siegreichen Führer im Kampfe gegen Seuchen und Tod“ zum Ausdruck.

Die Veterinärmedizin verehrt in Koch auch einen ihrer Führer, da er, abgesehen von seinen grundlegenden Arbeiten über die Methodik, die in gleichem Maße den Menschen- und Tierseuchen zugute kommt, die Ätiologie zahlreicher Infektionskrankheiten der Tiere u. a. den Milzbrand, die Tuberkulose, die Protozoenkrankheiten geklärt und ihrer Bekämpfung nahe geführt hat.

In Verehrung und Dankbarkeit gedenkt unsere Hochschule des genialen Forschers; sie glaubt den Tag ihres 150jährigen Bestehens nicht besser ehren zu können, als daß sie diesem Manne eine Gedenktafel*) an der Stätte errichtet, wo er zwei Jahre seiner Tätigkeit verbracht hat. Sie soll alle Vorübergehenden an den großen Wohltäter der Menschheit erinnern, der sein ganzes Leben uneingennützig in den Dienst des Volkes gestellt. Mir als Rektor der Tierärztlichen Hochschule Hannover, der ich Gelegenheit hatte, mehrere Jahre unter dem großen Manne zu arbeiten, ist es eine besondere Ehre, die Gedenktafel enthüllen und der Gemeinde Langenhagen übergeben zu dürfen mit dem Wunsche, daß ihr hier für alle Zeit eine pflegliche Behandlung zuteil werde.

Mießner.

*) Die Anregung ist von Prof. Oppermann ausgegangen.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Veterinärassessor Dr. Sommerfeld in Marienberg zum Veterinärtrat; ihm ist die Veterinärtratstelle in Marienberg (Bez. Wiesbaden) übertragen; Tierarzt Dr. Franz Schwaebel zum Bezirks-tierarzt für den Verwaltungsbezirk Kusel; Polizei-Veterinär-Assessor Dr. Kortüm aus Berlin zum Polizei-Vet.-Rat bei der Polizeiverwaltung in Tilsit; Dr. Brant in zum Polizei-Assessor bei der Polizeiverwaltung in Berlin.

Übertragen: Tierarzt Dr. Conrad aus Wittstock (Bez. Potsdam) die kommissarische Verwaltung der Veterinärtratstelle in Lützen (Bezirk Frankfurt a. O.); Tierarzt Dr. Thiesmeier aus Leopoldshöhe (L.) die kommissarische Verwaltung der Veterinärtratstelle in Diepholz (Bez. Hannover).

Verletzt: Veterinärtrat Dr. Guthke in Beeskow (Bez. Potsdam) in die Veterinärtratstelle in Neuruppin (Bez. Potsdam); Reg.-Vet.-Rat Dr. Heidrich in Oschatz nach Meissen.

Angestellt: als Reg.-Veterinärträte: Dr. Müller-Sebnitz für den Vet.-Bezirk Oschatz (Sachsen); Landw.-Vet.-Rat Dr. Kern-Dresden für den Vet.-Bezirk Bautzen; als Landw.-Vet.-Rat: Dr. Teichmann bei der Landwirtschaftskammer in Dresden; als Tierärzte bei der Staatl. Vet.-Polizei-Untersuchungsanstalt in Dresden: Dr. Dutschmann und Dr. Hilbert; als Stadt-Vet.-Rat am Schlachthof in Leipzig: Dr. Lommatzsch.

Niedergelassen: Tierarzt Paul Wahl in Obernsee (B.-A. Bayreuth).

In den Ruhestand getreten: Vet.-Rat Dr. Kaiser in Hünfeld; die Reg.-Veterinäre Haubold in Meissen und Steffani in Bautzen.

Verstorben: Dr. Geissler in Werdau.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtnr, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrzabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung fein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 28.

Ausgegeben am 14. Juli 1928.

36. Jahrgang.

(Aus dem Serumlaboratorium der Königlichen Tierärztlichen und Landwirtschaftlichen Hochschule zu Kopenhagen.

Direkt.: Prof. Dr. C. O. Jensen.)

Über die Bedeutung der Paarungsinfektion bei der Verbreitung des seuchenhaften Verwerfens.

Von Abteilungsleiter Axel Thomsen.

Zur Zeit muß die Bedeutung der Paarungsinfektion für die Verbreitung des seuchenhaften Verwerfens sowohl in den einzelnen Beständen als auch von Stall zu Stall als ein Problem angesehen werden, bei dem die meisten Verfasser von Übersichtsartikeln und Handbüchern der neuesten Zeit darüber im Zweifel sind, welche Rolle dieser Ansteckung beigelegt werden muß. Meistens wird sie als von untergeordneter Bedeutung eingeschätzt. Von den extremen Verfassern behaupten einige (Kliniker) immer noch, daß ihr eine sehr große Bedeutung beigelegt werden muß, während andere, (Leiter von Versuchsanstalten) die Paarungsinfektion gänzlich verwerfen.

Aus mehreren Gründen ist die Aufklärung des Problems von größter Bedeutung. Besonders nach den neueren und neuesten Untersuchungen über die Pathogenese des Bacillus abortus bei den Stieren drängt sich die Lösung dieser Frage von neuem auf. Diese Untersuchungen haben bewiesen, daß der Bacillus abortus gar nicht selten eine spezifische Entzündung teils in den Testes [Barendregt (1), Schroeder und Cotton (2), Seddon (3), Cominotti (4), Magnusson (5), Christiansen (6), Ohlsson (7), teils im Samenbläschen (Buck, Creech und Ladson (8) und Slagvold (9)], hervorruft, so daß der Samen tatsächlich dann und wann durch den Bacillus abortus infiziert ist. Nach den Untersuchungen des Bureau of Animal Industry (U.S.A.) sollten 10 Prozent der reagierenden Stiere infizierten Samen abgeben, Schroeder (10). Nach diesen Untersuchungen ist es also im höchsten Grade zu befürchten, daß der Stier als aktiver Überträger der Infektion auftreten kann, während man früher annahm, daß der Stier nur eine passive Rolle spielt, so daß man nur mit einer direkten Oberflächenübertragung vom männlichen Tier zum weiblichen zu tun hatte.

Es ist ohne weiteres einleuchtend, wie wichtig es ist, diese Frage zu lösen. Sollte die Paarungsinfektion auch nur verhältnismäßig selten stattfinden, können die Forderungen auf Verbote (bei uns die Aufrechterhaltung des Verbotes) nicht streng genug durchgeführt werden, sowohl gegen den Gebrauch von angesteckten oder aus einem verseuchten Bestande stammenden Stieren in gefunden Beständen oder das Zuführen angesteckter Kühe zu gefunden Stieren, wie auch

das Verbot gegen Verhandeln von infizierten Stieren oder ihre Zulassung zu gemeinschaftlichen Weiden. Sollte dagegen die Paarungsinfektion von ganz untergeordneter Bedeutung sein, ja vielleicht gar nicht vorkommen, so ist es praktisch zwecklos, dem Handel und der Viehzucht große Hindernisse in den Weg zu legen, Hindernisse von so großer ökonomischer Bedeutung, daß sie in gewissen Fällen katastrophal für die Viehbesitzer oder Stiervereine werden können.

Die älteren klinischen Mitteilungen — bei uns u. a. von Sand (11) und B. Bang (12) gesammelt und kommentiert — geben deutlich den starken Eindruck, daß die Paarungsinfektion eine sehr große Rolle spielt, obwohl einzelne praktische Tierärzte schon zu der Zeit, wo diese Mitteilungen gesammelt wurden — Mitte der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts — entgegengesetzter Meinung waren.

Die Hypothese der großen Bedeutung der Paarungsinfektion wurde im wesentlichen dadurch gestützt, daß es schon 1896 B. Bang und Stribolt und später M'Fadyean und Stockman u. a. gelang, den Beweis zu führen, daß trächtige Tiere durch vaginalinfektion infiziert werden können. Dazu haben auch andere vor der Entdeckung des Bacillus abortus zeigen können, daß man bei trächtigen Tieren durch Einführung von infiziertem Nachgeburtmaterial in die Scheide Verwerfen hervorrufen konnte. Diese vaginalinfektion trächtiger Tiere mit total verschlossener Gebärmutter durch unbewegliche Bazillen läßt sich sicherlich — gemäß unserem heutigen Wissen über die leichte Empfänglichkeit der Schleimhäute für den Bacillus abortus — dadurch erklären, daß die Bazillen durch Phagozytose durch die vaginalen Schleimhäute aufgenommen werden und durch das Gefäßgewebe in die trächtige Gebärmutter gelangen, genau wie man durch Eintröpfeln von Abortuskultur auf die Oberfläche des Auges ein Tier infizieren und Verwerfen hervorrufen kann (Thomsen (13)). So zeigt die Infektionsart in diesem Zusammenhange an und für sich nichts Charakteristisches. Jedoch wurde diese Infektionsart in der Zeit nach der Entdeckung des Bacillus abortus natürlich zu Gunsten der These der Paarungsinfektion verwertet. An und für sich war es ja auch naheliegend, — ja im Grunde so naheliegend, daß man in

der Regel das benutzte klinische Material nicht eingehend genug untersucht — anzunehmen, daß der Infektionsstoff einer Abortuskuh durch den Deckakt an den Penis des Stieres gelangt, um bei der nächsten Paarung mit einer gefunden Kuh in deren Vagina und mit dem Samen durch den offenen Gebärmuttermund weiter in den Uterus eingeführt zu werden. Dann sollten die Bakterien während der darauf folgenden Gravidität weiter vegetieren und allmählich Verwerfen verursachen. Man war geneigt, das feuchenhafte Verwerfen als eine reine Paarungskrankheit anzusehen, genau wie die Gonorrhöe bei dem Menschen, was um so wahrscheinlicher war, als die Krankheit vermeintlich in den Geschlechtsorganen lokalisiert war.

Diese Auffassung der überwiegenden Bedeutung der Paarungsinfektion war vor nicht vielen Jahren gang und gebe unter den leitenden Veterinären sowohl hier, wie im Auslande, wie durch die Gesetze zur Bekämpfung der Krankheit und die älteren Handbücher über feuchenhafte Krankheiten auch bestätigt wird.

Doch auch in neuerer Zeit kann man klinische Mitteilungen über die vermutliche große Bedeutung der Paarungsinfektion finden. So teilt Slagssvold (9) einen sehr interessanten Fall mit, wo ein Stier mit ausgeprägter Telemarkfärbung, aus einem verfeuchten Bestande stammend, die Einzäunung der Nachbarweide durchbrach und eine unter dem dort grasenden Vieh befindliche brünstige Färse deckte. In diesem Bestande war seit Jahren kein Verwerfen vorgekommen. Acht Monate später verkalbte diese Färse und das Kalb hatte dieselbe eigenartige Färbung wie der Vater, während keine der Kühe in dem bisher gefunden Bestande diese Färbung hatte. Zwei Monate später war der ganze Bestand verfeucht.

Aber auf der anderen Seite bringt die Literatur, besonders der letzten Jahre, Beschreibungen von klinischen Beobachtungen, welche gänzlich die Paarungsinfektion verwerfen. In dieser Hinsicht besonders wichtige Beiträge findet man in der nordischen Literatur bei Bergman und Agren (14) und Slagssvold (9). Auch die amerikanische Literatur enthält beachtenswerte Angaben über diese Frage.

Dem Verfasser scheint es zweckmäßig zur Beleuchtung der Frage der Bedeutung der Paarungsinfektion auf einige bekannte klinische Verhältnisse hinzuweisen, nämlich, daß es in den Beständen der Rittergüter besonders Färse sind, die verkalben, trotzdem sie in der Regel von einem jungen Stier gedeckt werden, der nicht andere, besonders ältere und vielleicht infizierte Tiere belegt hatte.

Bei frisch infizierten Beständen hatte der Verfasser oft Gelegenheit, ein anderes Verhältnis wahrzunehmen. In Fällen, wo die Infektion von einer zugekauften Kuh herrührte, herrschte oft eine heftige Enzootie unter den Kühen des Bestandes, die schon längst vor dem ersten Verkalben der neugekauften Kuh gedeckt waren.

Außerdem ist noch zu bemerken, daß das Resultat des Blutprobenmaterials des Serumlaboratoriums ergibt, daß Stiere aus Abortbeständen sehr oft bei der Agglutinations- und Komplementbindungsprobe nicht reagieren, trotzdem Stiere durch die Einführung von Abort-Bazillen in das Präputium leicht nachweisbare Antikörper bilden, Thomsen (13).

Es ist auch festgestellt worden, daß der Reaktionsprozentatz der Stiere viel niedriger ist als derjenige der Kühe, Hadley und Lothe (15), Slagssvold (9). Letzterer findet den Prozentsatz sogar nicht halb so groß wie bei den weiblichen Tieren.

Diese Verhältnisse deuten ganz entschieden auf andere Infektion als die durch den Stier.

Nach Meinung des Verfassers kommt den „negativen“ klinischen Beobachtungen in diesem Falle mehr Bedeutung zu als den positiven, in dem wir — mit unseren jetzigen Kenntnissen der Krankheit — mehr mit anderen Arten der

Ansteckung der verfeuchten Bestände oder der einzelnen Tiere rechnen müssen als mit der durch das männliche Tier. Ziemlich auffallend ist indessen eine von Barendregt (1) berichtete Beobachtung: Kühe, die durch drei bestimmte Stiere gedeckt wurden, verkalbten regelmäßig, während andere Kühe in demselben Bestande, durch andere Stiere gedeckt, nicht verkalbten; zwei dieser Stiere hatten Entzündung im Samenleiter bzw. im Hoden; aus diesem Testikel wurden Abortusbazillen reingezüchtet¹⁾.

Dagegen scheinen die Beobachtungen Bergmans u. a. m. nicht mit der Anschauung übereinzustimmen, der Verbreitung der Krankheit durch den Stier eine auch nur einigermaßen hervortretende Rolle zuschreiben zu müssen.

Man wird aus dem Angeführten ersehen, daß vieles gegen die Hypothese der Paarungsansteckung spricht. Aber alle diese Beobachtungen allein können diese Frage nicht lösen, weil die klinischen Beobachtungen doch selten recht übereinstimmen. Es wären große experimentelle Versuche nötig, um eine Ansteckungsart negieren zu können, die sehr wahrscheinlich ist und deren Bestätigung von großer Bedeutung wäre. Solche experimentellen und zum Teil recht umfassenden Arbeiten sind teilweise schon von ausländischen Instituten vorgenommen worden; im großen und ganzen sind sie jedoch negativ ausgefallen; die Infektion in direkter Verbindung mit der Paarung gelang nicht.

In einer Abhandlung aus dem Jahre 1922 bespricht Schroeder (10) einige Infektionsversuche zur Reproduktion der Paarungsansteckung, die vom offiziellen Bureau of Animal Industry unternommen wurden. Vor dem Deckakt wurden einige Kühe (leider wird keine bestimmte Zahl angegeben) intrauterin mit Reinkultur von Abortusbazillen, mit infiziertem Plazentamaterial und mit Material von infizierten Föten infiziert. Andere Kühe wurden durch reagierende Stiere gedeckt, andere wiederum durch Stiere, die kurz vorher Kühe mit infizierten Genitalien belegt hatten. Endlich wurden einige Tiere von Stieren gedeckt, die sowohl künstlich wie natürlich infiziert waren und den Bacillus abortus mit dem Samen ausschieden (wie nach Vollendung des Geschlechtsakts festgestellt wurde).

Trotz sehr genauer Untersuchung der Plazenten nach der Geburt ließ sich eine Infektion der Kühe nicht feststellen. Die Tiere reagierten nicht einmal bei der Blutuntersuchung. Einige von ihnen zeigten sich später empfänglich für Abortus. Es konnte also nicht bewiesen werden, daß in Verbindung mit der Paarung eine Infektion stattfindet oder dem Bullen eine Rolle bei der Verbreitung der Krankheit durch den Deckakt zukommt.

Durch diese Versuche meint Schroeder feststellen zu können, daß Vereinsstiere — auch ohne Desinfektion der Geschlechtsorgane — für die Verbreitung der Abortusinfektion unschädlich seien, vorausgesetzt, daß die Stiere isoliert gehalten werden und daß der Deckakt auf „neutraler“ Stelle, d. h. draußen vor dem Stall, vor sich gehe.

Auch Hadley und Lothe (15) konnten durch weniger überzeugende Versuche, welche schon in den Jahren 1914 bis 1915 gemacht wurden, die Paarungsansteckung weder durch Belegen frischer Färse durch reagierende „un-

¹⁾ Zelker (19) berichtet, daß Cotton beobachtet hätte, daß Meerfischweibchen durch Paarung mit Männchen, die an starker spezifischer Entzündung der Testes und der Nebenhoden litten, infiziert wurden.

Der Verf. hat leider nicht den Original-Artikel aufreiben können. Sollte es sich jedoch unter diesen Verhältnissen auch um wirkliche Paarungsinfektion handeln (mit Abort?), so lassen die Verhältnisse bei Meerfischweibchen und Kühen sich doch schwer vergleichen, da die Zeit der Trächtigkeit bei den Meerfischweibchen 7 Monate kürzer als bei den Kühen ist.

reine“ Stiere, noch durch Belegen frischer Färsen durch nicht reagierende Stiere, die kurz vorher reagierende „unreine“ Kühe gedeckt hatten, nachweisen.

Entsprechende Versuche sind später — 1919 — durch Cotton (16) und 1921 durch Sims und Miller (17) unternommen worden.

Endlich hat Robinson (18) — Südafrika — es versucht, acht gefunde Färsen durch einen Stier, welcher sehr stark Blutreaktion nach einer intravenösen Einspritzung mit Abortus-Bazillen-Kultur gab, zu infizieren. Auch hier ließ sich die Paarungsansteckung nicht nachweisen.

Alle diese übereinstimmenden offiziellen Versuchsresultate haben selbstredend zu weiteren Untersuchungen angeregt und so hat unser Serumlaboratorium in direktem Anschluß daran auch eine Reihe von Versuchen ausgeführt.

Aus ökonomischen Gründen hat das Versuchsmaterial aus Ziegen bestanden. Diese sind für die Infektion empfänglich und das Verwerfen tritt bei ihnen ähnlich wie bei Rindern auf.

Die erste Reihe von Versuchstieren sollte dazu dienen, das Prinzipielle mit sämtlichen Traditionen brechende der amerikanischen Versuche — nämlich das Nichtinfiziertwerden von frischen Tieren im Anschluß an die Paarung — nachzuprüfen. Zu diesem Versuch wurden ein älterer Bock und 18 Ziegen in verschiedenem Alter benutzt; einige waren vorher nicht gedeckt worden.

Unmittelbar vor jeder Paarung wurden in das Präputium des Bockes 2 ccm stark bakterienhaltiges aufgeschwemmtes Nachgeburtmaterial injiziert und durch Reibung so weit wie möglich nach hinten in das Präputium gebracht, so daß der Penis notwendigerweise mit Eiterkörnchen bedeckt sein mußte. Das aufgeschwemmte Nachgeburtmaterial bestand aus 50 Gramm pathologisch veränderter frischer Nachgeburt einer Abortuskuh, die mit 200 ccm physiologischer Kochsalzlösung zusammen geschüttelt waren. Diese Infektionsflüssigkeit wurde auf Eis aufbewahrt und während der Deckzeit jeden zehnten Tag erneuert.

Bei keiner der 18 Ziegen trat während der darauf folgenden Gravidität Verwerfen ein: 17 der Tiere gebaren vollkommen normal ohne jegliches Zeichen von Infektion der Plazenta. Ein Tier wurde nicht trächtig. Die „Infektion“ hat der Konzeption keine Schwierigkeiten verursacht, denn es wurden nur 22 Deckungen vorgenommen, von welchen drei auf die nichtträchtige Ziege fielen.

Sechs der 18 Ziegen waren junge Tiere, die vorher nicht zu Versuchszwecken benutzt worden waren. Sowohl vor der Infektion wie während der ganzen Graviditätsperiode zeigten sie sich bei wiederholten Blutuntersuchungen reaktionsfrei.

Die übrigen 12 Tiere waren das Jahr zuvor zu einem andern Abortusversuche gebraucht worden und waren dabei infiziert gewesen und deshalb wohl im Besitze von einiger Immunität, aber wahrscheinlich nur in ganz geringem Grade, da beim Anfange des Versuches der Paarungsansteckung Antistoffe bei dreien überhaupt nicht nachweisbar waren, während 1 unbedeutende Antistoffreaktion zeigte, 5 gering und nur 3 kräftig reagierten. Die Nichtreagierenden verblieben auch reaktionsfrei durch die ganze Versuchsperiode, während die Reagierenden ihr Reaktionsvermögen in dieser Zeit unverändert beibehielten.

Erst einen Monat nach der ersten Präputiuminjektion zeigte sich bei dem Bock eine Andeutung von Reaktion, die während des ganzen Versuches nicht ausgeprägt wurde.

Obwohl man also mit dem Vorhandensein einer geringen Immunität bei einigen der Versuchstiere rechnen muß, bleibt doch kein Zweifel, daß die Theorie der Paarungsinfektion auch durch diesen Versuch einen Stoß erlitten hat.

Da also anscheinend festgestellt worden ist, daß man

bei der Paarung keine Infektion erzielen kann, drängt die Auffassung sich auf, daß der Fötus eine gewisse Entwicklung erreicht haben muß, ehe der Bacillus abortus, der ja auch außerhalb des Organismus weitgehende Forderungen in Bezug auf Lebensbedingungen stellt, einen geeigneten Boden in der Gebärmutter findet, um den Kampf gegen den Organismus unter derartigen Verhältnissen aufnehmen zu können, daß ihm der Sieg gewiß ist.

Unwillkürlich fragt man sich deshalb, wann findet der Bacillus abortus während der Trächtigkeit die von ihm gestellten Forderungen oder mit anderen Worten, gibt es während der Gravidität eine bestimmte Ansteckungsperiode?

Um diese Frage zu beleuchten sind Versuche mit drei Reihen von Ziegen in verschiedenem Alter gemacht worden, und zwar die eine mit 12, die beiden andern mit je 14 Tieren.

Je nachdem die Ziegen gedeckt wurden und vermutlich trächtig waren (bei den Ziegen gibt es in der Regel keine zweite Paarung) wurden sie infiziert, so daß die erste jeder Reihe am Paarungstage infiziert wurde, Nr. 2 zehn Tage nach der Paarung, Nr. 3 20 Tage nach der Paarung usw. Die letzten Ziegen (Nr. 14) der Reihen wurden demnach erst 20 Tage vor der Geburt infiziert, da die Trächtigkeit der Ziege bekanntlich normal 150 Tage dauert. Die Tiere wurden per os infiziert; jeder Ziege der ersten Reihe (12 Tiere) wurde mit dem Pillen-Eingebeapparat 30 Gramm frische feingehackte Rindernachgeburt von drei verschiedenen Fällen von Verwerfen ansteckenden Ursprungs eingegeben. Den nächsten zwei Reihen wurde 60 Gramm eingegeben. — Das Infektionsmaterial wurde auf Eis aufbewahrt und war in keinem Fall älter als 15 Tage.

Das Allgemeinbefinden der Ziegen war gut und sie vertrugen die Infektion ausgezeichnet.

In der Hauptsache wurde daselbe Resultat in allen drei Reihen erreicht, nämlich daß die Ziegen, die sich zur Zeit der Infektion am Anfang oder am Ende der Trächtigkeit befanden, nicht abortierten, sondern zur normalen Zeit gebaren, ohne daß der Bacillus abortus in der Plazenta nachweisbar war.

In der ersten Reihe fing das Verwerfen schon mit der dritten Ziege an, welche also bereits den zwanzigsten Tag der Gravidität erreicht hatte, als sie infiziert wurde; außerdem trat Verwerfen ein bei Nr. 4, 5 (6 nicht trächtig) und 7; die übrigen gebaren in jeder Hinsicht normal.

In der zweiten Reihe fing das Verwerfen erst bei der sechsten Ziege an (fünfundzigtägige Gravidität bei der Infektion); Nr. 7 wurde nicht trächtig; Verwerfen trat ein bei Nr. 8, 9 und 11, während Nr. 10 wie auch Nr. 12, 13 und 14 normaler Weise gebaren.

In der dritten Reihe fing das Verwerfen wieder früher an. Schon Nr. 4 verlammt, ebenso Nr. 5, 6, 7, 8 und 10, während Nr. 9, 11, 12, 13 und 14 normal gebaren. Es muß jedoch bemerkt werden, daß bei Nr. 5 und 6, welche nach 132- und 120tägiger Gravidität verwarfen, der Bacillus abortus nicht nachweisbar war, und daß die Blutproben der Muttertiere zur Zeit des Abortes negatives Resultat ergaben; doch hatten beide Tiere an einem früheren Zeitpunkt der Gravidität reagiert. Diese beiden Fälle sind jedoch etwas zweifelhaft.

Wie man sieht, trat in keiner Reihe Verwerfen bei den Ziegen auf, die früher als am zwanzigsten Tage und später als am hundertsten Tage der Gravidität infiziert wurden.

Anbei eine schematische Aufstellung der Versuchsresultate. Die Zahlen über dem Strich geben an, wie weit die unter dem Strich notierten Ziegen bei der Infektion in der Gravidität waren. Die Tiere, bei denen Verwerfen eintrat (und eine Ziege, die normal gebar, jedoch Bazillen in der Plazenta hatte) sind mit hervorgehobenen Zahlen angegeben; die normal Gebärenden mit gewöhnlichen Zahlen.

Abort an einem sehr frühen Stadium wahrgenommen worden. Eine solche schädliche Einwirkung wird in der Literatur den Bazillen beigelegt, Hutyrá und Marek (20). In Übereinstimmung mit dem Verfasser sind Sims und Miller, welche die prompte Konzeption der „Majorität“ von 20 Färsen, die durch einen auf natürlichem Wege infizierten Stier gedeckt waren, beobachteten.

Der Umstand, daß es weder durch die Versuche von andern noch durch die des Verfassers gelungen ist, die Möglichkeit der Deckinfektion zu konstatieren, schließt doch nicht die womögliche Bedeutung des Stieres bei der Infektionsverbreitung aus, da es ja nicht ausgeschlossen ist, daß ein infizierter Stier durch andere Mittel, als durch den Paarungsakt, Bazillen ausscheiden und die Infektion verbreiten kann, besonders falls er in einen gefunden Bestand eingestellt wird. Derartige Versuche sind jetzt erforderlich. Ehe solche vorliegen, dürfte man es wohl kaum wagen, die volle Konsequenz der übereinstimmenden Versuchsergebnisse zu ziehen, obwohl diese, wie erwähnt, die ganz bedeutungslose Rolle des Stieres als Verbreiter des Abortus bei dem Deckakt bewiesen haben dürften.

Zusammenfassung.

Das Problem der Bedeutung der Paarungsinfektion für die Verbreitung des infektiösen Abortus beim Vieh wird an Hand einer Übersicht all dessen, was diesbezüglich in der Literatur erschienen ist, klargestellt. Besonders werden eine Reihe übereinstimmender amerikanischer Versuche, die ein negatives Resultat ergaben, da die Infektion in direktem Anschluß an den Paarungsakt nicht gelang, besprochen.

Der Verfasser hat mit 18 Ziegen Versuche vorgenommen, um womöglich die Paarungsinfektion nachzuweisen; es gelang ihm jedoch nicht. Alle Ziegen gebaren in normaler Weise, nachdem sie durch einen Bock gedeckt worden waren, in dessen Präputium unmittelbar vor dem Deckakt stark bazillenhaltiges Exsudat der Nachgeburt von Abortuskühen injiziert worden war.

Drei andere gleichartige Versuchsreihen (mit 12 bis 14 Ziegen in jeder Reihe) wurden zu verschiedenen Zeit-

punkten der Gravidität per os infiziert, so daß die erste Ziege zugleich mit der Paarung (am selben Tage) infiziert wurde, die nächste 10 Tage nach der Paarung, die dritte 20 Tage nach der Paarung usw.

Es zeigte sich, daß es während der Gravidität eine bestimmte Empfänglichkeitsperiode gab — oder vielmehr zwei Resistenzperioden, während welchen die Infektion nicht gelang. Ziegen, welche in dem Zeitraum von 20 Tagen nach der Paarung infiziert wurden, gebaren in jeder Hinsicht normal, und es zeigten sich keine krankhaften Zustände in der Plazenta (Bakterienbefund negativ); desgleichen die Ziegen, die später als 100 Tage nach der Paarung infiziert wurden.

Mit Bezug auf diese Besprechungen läßt sich die Hypothese der Bedeutung der Paarungsinfektion für die Verbreitung der Krankheit nicht aufrechterhalten; jedoch ist es noch eine offene Frage, welche Rolle ein infizierter Stier anderweitig für die Verbreitung der Infektion durch Zusammenleben und Berührung mit anderen Tieren spielt.

Literatur.

1. Barendregt: Tijdschrift v. veeartsennijckunde 1913, 40, S. 691.
2. Schroeder und Cotton: Journ. of the american vet. med. ass. 1917, 50, S. 329.
3. Seddon: Journ. of comp. pathol. and therap. 1919, 32.
4. Cominotti: La clinica veterinaria 1923, S. 71.
5. Magnusson: Skand. Vet.-Tidsk. 1925, 15, S. 224.
6. Christiansen, M.: Maanedsskr. f. Dyrk. 1925—26, 37, S. 543.
7. Ohlsson: Skand. Vet.-Tidsk. 1926, 16, S. 25.
8. Buck, Creech und Ladson: Journ. of agr. research 1919, 17, S. 239.
9. Slagsvold: Norsk. Vet.-Tidsskr. 1927, 39, S. 170.
10. Schroeder: Journ. of the american vet. med. ass. 1922, 60, S. 548.
11. Sand: Maanedsskr. f. Dyrk. 1894—95, 6, S. 160.
12. Bang, B.: Ibid. 1898 bis 1899, 10, S. 321.
13. Thomsen, A.: Skand. Vet.-Tidsk. 1918, 8, S. 233.
14. Bergman und Agren: Ibid. 1923, 13.
15. Hadley und Lothe: Journ. of the american vet. med. ass. 1917, 50, S. 143.
16. Cotton: Journ. of the american vet. med. ass. 1919, 55, S. 513.
17. Sims und Miller: Ibid. 1921, 58, S. 532.
18. Robinson: Union of South Africa. The 5. & 6. Reports of the Director of the Veterinary Research 1918, S. 337.
19. Zeeler: Archiv für wiss. und praktische Tierheilkunde 1922, 49, S. 65.
20. Hutyrá und Marek: Spez. Pathologie und Therapie der Haustiere 1922, I, S. 867.

(Aus der Lehrkanzel für Bakteriologie und Hygiene der Tierärztlichen Hochschule Wien. — Vorstand: Prof. Dr. Schnürer.)

Beitrag zur Züchtung des *Bacillus — abortus — Bang* mit Hilfe der Leuchtgasmethode.

Von Tierarzt Dr. Johann Rudolf.

Auf der 4. Tagung der Fachtierärzte zur Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten im Oktober 1927 in Jena berichtet Ehrlich (1), Hannover, über ein leicht ausführbares und einfaches Verfahren zur Züchtung der Bang'schen Bazillen aus Föten mit Hilfe der sog. Leuchtgasmethode. Er beimpft schräg erstarrte Glycerin-Agarröhrchen, läßt Leuchtgas in die Kulturröhrchen, die mit der Öffnung nach unten gehalten werden, einströmen und verschließt mit Paraffin.

Ich habe diese Züchtungsmethode bis jetzt an einem kleineren Versuchsmaterial einer Nachprüfung unterzogen und die Angaben Ehrlich's bestätigen können.

Da mir geeignetes Versuchsmaterial zum direkten Züchtungsversuch aus Föten nicht zur Verfügung stand, impfte ich Meerschweinchen subkutan mit 2 ccm einer Emulsion aus Eihäuten von Abortuskühen in physiologischer Kochsalzlösung. Ergab die serologische Untersuchung des Blutes nach einer Probeblutentnahme bei den auf die Weise infizierten Meerschweinchen ein für Abortus Bang positives Ergebnis, so folgte der Kulturversuch aus der Milz der getöteten Tiere.

Da die Paraffinverschlußmethode, wie sie von Zeller (2) und Zwick (3) im Reichsgesundheitsamt mit

guten Ergebnissen zur Reinzüchtung des Bang'schen Bazillus verwendet wurde, eine einfach auszuführende Methode darstellt, nach meinen diesbezüglichen langjährigen Erfahrungen mit dieser Methode bei serologisch abortus-positiven Meerschweinchen aber öfter kein befriedigendes Resultat erzielt wurde, habe ich nach Kenntnisnahme der Leuchtgasmethode Parallelversuche mit dieser Methode angestellt, um zu ermitteln, ob die Leuchtgasmethode der Paraffinverschlußmethode in ihrer Brauchbarkeit überlegen sei.

Bei sämtlichen Versuchen verwendete ich als Nährboden 1prozentigen oder 2prozentigen Traubenzuckeragar. Bei der Paraffinverschlußmethode wurden neben Schrägagarkulturen auch Plattenkulturen angelegt. Bei den Platten erfolgte der Verschluß durch Ausgießen des Raumes zwischen den beiden Plattenhälften der Petrischalen mit heißem Paraffin.

Bei der Paraffinverschlußmethode konnten folgende Feststellungen gemacht werden:

Das Wachstum der Abortusbazillen erfolgte um so rascher und sicherer, je mehr Untersuchungsmaterial (in meinen Fällen Meerschweinchenmilz) ausgestrichen wurde. Die Kultur auf schräg erstarrtem Nährboden in Kultur-

röhrchen ist ficherer als auf der Platte. Der Grund liegt darin, daß die Röhrchenkulturen bedeutend leichter durch Paraffin luftdicht abgesehen werden können als die Plattenkulturen. Aufgefallen ist, daß trotz sorgfältigstem Verschluss beim gleichen Versuch nicht in allen beimpften Röhrchen Bang-Kolonien angehen. In der Regel wird gerade in jenen Kulturröhrchen kein Wachstum gesehen, die mit wenig Material beimpft wurden. Nach theoretischer Überlegung müsste man annehmen, daß in den Röhrchen, die mit wenig Ausgangsmaterial beimpft wurden, weniger zahlreiche Kolonien angehen sollten, wenn keine anderen Bedingungen als der gehinderte Luftzutritt für das Wachstum der Bazillen erforderlich wären. Nun dürfte aber das ausgestrichene organische Material, wie dies bei den Tarozzinährböden der Fall ist, den eingeschlossenen Luftsaurestoff zum Teil reduzieren, wodurch eine für das Wachstum des Abortus-Bazillus zuzagende Sauerstoff- bzw. Kohlenäurespannung in den Kulturröhrchen entsteht, welcher Zustand durch reichlich ausgestrichenes organisches Material ficherer und rascher herbeigeführt werden kann.

Die Leuchtgasmethode wurde in folgender Weise ausgeführt:

Nach Beimpfung der Traubenzuckerfrägarrröhrchen wurde in die mit der Öffnung nach unten gehaltenen Röhrchen durch ein zur Kapillare ausgezogenes Glasröhrchen solange Leuchtgas eingeleitet, bis Gas in die Zimmerluft ausströmte, was durch den Geruch festzustellen ist, wobei die Glaskapillare ungefähr bis zur Mitte der Epruvette eingeführt wird. Nun wurde das verkehrt gehaltene Röhrchen mit einem in flüssigem, heißem Paraffin liegenden Wattepfropf derart verschlossen, daß derselbe 1—2 cm unter die Öffnung der Epruvette hineingedrückt wurde. In der noch verkehrt aufgestellten Epruvette wurde das Paraffin erstarren gelassen. Dann wurden die so verschlossenen Röhrchen mit der Öffnung nach oben gewendet und zur vollständigen Abdichtung rasch flüssiges Paraffin aufgegossen.

In allen Kulturversuchen ist bei der Verwendung von Leuchtgas in sämtlichen beimpften Röhrchen schon nach

2—3 Tagen Bebrütung bei 38 Grad C deutliches, meist schon üppiges Wachstum von Bang-Kolonien gesehen worden, wobei die Menge des ausgestrichenen Ausgangsmaterials keinen Einfluß auf das Gelingen der Kultur hatte.

In den Röhrchen, welche nur mit Paraffin verschlossen wurden, waren makroskopisch sichtbare Kolonien erst nach 6—10 Tagen feststellbar. In einzelnen der letztgenannten Röhrchen blieben die Kulturen aus.

Die mit der Paraffinverschlußmethode gewonnenen Reinkulturen paßten sich rascher an die aeroben Züchtungsbedingungen an, als die Reinkulturen nach der Leuchtgasmethode. Um die so gewonnenen Bang-Kulturen rasch bei Luftzutritt zum wachen zu bringen, wurden die in Leuchtgas gezüchteten Kulturen auf frische Nährböden übertragen und bloß mit Paraffin verschlossen. Jetzt erfolgte rasches Wachstum. Bei der dritten Passage konnte auch der Paraffinverschluß schon weggelassen werden. Für die Gewöhnung an die normalen Züchtungsmethoden erwies es sich als vorteilhaft, die in Leuchtgas oder auch nach bloßem Paraffinverschluß angegangenen Kolonien vor der Übertragung auf frische Nährböden durch mindestens 6—8 Tage nach Ersatz der Paraffinverschlüsse durch einen Watteverschluß der Einwirkung der Luft auszusetzen. Solche Kulturen wachen dann meist gleich alten, bereits seit langen an die Luft gewöhnten Kulturen.

Zusammenfassung.

Die Leuchtgasmethode eignet sich ausgezeichnet zur Züchtung des Bazillus Bang aus Organmaterial. Sie ist einfach und leicht ausführbar und der gewöhnlichen Paraffinverschlußmethode sowohl was die Sicherheit als auch die Raschheit der Kultur anbelangt, überlegen.

Schrifttum.

1. Ehrlich: Erfahrungen mit verschiedenen diagnostischen Methoden zur Feststellung des feuchten Verkalbens. D. T. W. 1928, Nr. 4.
2. Zeller, H.: Archiv für wissenschaftl. und prakt. Tierheilkunde 1922.
3. Zwick, W.: Forschungen über das feuchthafte Verwerfen des Rindes während der letzten zwei Jahrzehnte. Arbeit aus dem Reichsgesundheitsamte Bd. 57, S. 360.

Innere Medizin und Chirurgie.

Fre y, S.: Experimenteller Beitrag zur venösen Luftembolie. Todesursache und Behandlung. (Archiv für klin. Chirurgie Bd. 148, S. 536.)

Es sind zu unterscheiden eine arterielle und eine venöse Luftembolie. Bei ersterer ist der Tod auf eine Verstopfung der Gehirn- und Koronararterien zurückzuführen. Bezüglich der venösen Embolie ist die Todesursache bis jetzt noch nicht geklärt. Vier Ansichten wurden seither vertreten: 1. Tod durch Verstopfung der Gehirnarterien. 2. Tod durch Anwesenheit der Luft im rechten Herzen. 3. Tod durch Verstopfung der Lungenkapillaren. 4. Tod durch Verstopfung der Arteria pulmonalis bzw. ihrer Äste. Die eigenen Versuche des Verf. wurden an großen Hunden angestellt, denen Luft in eine Vena femoralis mittels einer graduierten Spritze infundiert wurde. Durch die nachher vorgenommene Laparotomie bzw. Sektion konnte die Verteilung der Luft festgestellt werden. Die Gesamtversuche führten zu folgendem Ergebnis: Die durch eine Körpervene in das rechte Herz gelangte Luft wird von dem rechten Ventrikel in Gestalt größerer oder kleinerer Blasen in die Arteria pulmonalis getrieben. Die Größe der Blasen ist abhängig von der in der Zeiteinheit in die Vene eingetretenen Luftmenge. Die Luftblasen bleiben entsprechend ihrer Größe in den größeren oder kleineren Ästen der Arteria pulmonalis stecken. Bei größeren Blasen genügen kleinere Luftmengen, um durch Verstopfung großer Gefäßstämme den kleinen Kreislauf zu unterbrechen; bei kleineren Blasen sind größere Luftmengen

erforderlich, um durch Verlegung zahlreicher kleinerer Pulmonalisäste den Lungenkreislauf zu blockieren. Infolge der Stromsperre zwischen dem rechten Herzen und den Lungen steigt der Druck in der Arteria pulmonalis und im rechten Herzen, es kommt zu einer hochgradigen Stauung im venösen System des großen Kreislaufs. Lungenvenen und linkes Herz erhalten kein Blut, der Blutdruck im großen Kreislauf sinkt. Lebenswichtige Organe wie Gehirn, Herz und Lunge werden von der Ernährung ausgeschaltet. Am bedeutungsvollsten ist die Schädigung der Gehirnzentren für Atmung und Herzbewegung und der Fortfall der Blutversorgung des Herzens, insbesondere des rechten Herzens. Das muskelichwache und größeren Drucksteigerungen wenig gewachsene rechte Herz erhält durch die Koronararterien keinen Sauerstoff und erstickt; ferner wird durch die Stauung im rechten Herzen der Abfluß aus den Koronarvenen, die manchmal retrograd mit Luft gefüllt werden, unmöglich gemacht, es tritt eine Kohlenäurevergiftung des Herzmuskels ein. Unter dem Einflusse dieser vielfachen Schädigungen, zu denen bei größeren Luftmengen noch die Belastung des Herzens durch die Anwesenheit von Luft kommt, erlahmt das Herz nach anfänglichen Versuchen, das Hindernis im Lungenkreislauf durch gesteigerte Arbeit zu überwinden und stellt seine Tätigkeit ein. Der Tod bei der venösen Luftembolie erfolgt demnach an innerer Erstickung, primär bedingt durch eine Embolisierung der Arteria pulmonalis oder ihrer Äste. Bezüglich der Behandlung schlägt Verf. die operative Entleerung des Luftembolus aus der Arteria pulmonalis vor. Die großen Gefäße werden freigelegt, worauf man

eine Kanüle in die Arteria pulmonalis bzw. den lufthaltigen rechten Ventrikel einführt und die Luft mittelst einer Spritze abläuft.

Carl.

Decurtius, A.: Aus der Schweinepraxis. (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 500.)

Malignes Ödem. Ein Schwein zeigte vom rechten Sprunggelenk bis zum After und bauchwärts bis zur letzten Zitze eine starke ödematöse und beim Betaften knisternde Schwellung, Unterhaut und Muskulatur sind seröshämorrhagisch infiltriert. Nur der Dünndarm und die regionalen Lymphdrüsen sind geschwollen und zeigen Blutungen. Die Ödembazillen sind in den ödematös durchtränkten Teilen vorhanden gewesen. — **Gebärmuttervorfall:** Weil Resorption nicht möglich oder nicht angezeigt, Amputation am stehenden Tier: Ein dickes Seil vor der Schulter über den Widerrist, ein zweites vor dem äußern Darmbeinwinkel um den Leib, die Enden durch zwei Löcher an der Wand durchgezogen und auf der andern Seite der Wand festgehalten. Schwein steht fest fixiert an der Wand. Ligatur fest anlegen; bei starkem Drängen Beriefeln der Scheide mit 3 Prozent Theral. — **Ferkeltöten:** Ein Fall, wo ein Schwein nach der Geburt von zwei toten Jungen, das dritte lebende sofort tötete. Erst nach und nach duldet das Muttertier die Jungen, die durch besondere Maßnahmen gerettet werden konnten. Die Milch der Sau versiegte aber schon nach drei Tagen. — **Ovariectomie:** Kastration am besten im Alter von 8—10 Wochen. Bauchfell kurz und kräftig mit dem gestreckten Zeigefinger durchstoßen, sonst hochziehen und scharfer Scherenschnitt. Auffuchen des linken Ovars oder des Uterus ist manchmal etwas schwierig.

H. G.

Erbach: Über die Behandlung von Darmerkrankungen mit Knoblauch (Allium sativum). (M. m. W. 1928, S. 87.)

Verf. hat etwa 50 Fälle von akutem und subakutem Darmkatarrh mit dem von Prof. E. Roos in Freiburg angegebenen, aus Knoblauch hergestellten Präparat „Allisatin“ behandelt. Meist nach den ersten Gaben (drei- bis viermal täglich zwei Tabletten) machte sich eine eigenartige darmlähmende Wirkung bemerkbar, die Entleerungen wurden seltener, und der Stuhl nahm meist nach 48 Stunden normale Konsistenz an. In einzelnen Fällen dauerte es bis zur Herbeiführung dieses Erfolges allerdings bis zu 14 Tagen. Der darniederliegende Appetit stellte sich in kurzer Zeit wieder ein. In zwei Fällen von Colica mucosa, von denen der eine schon mehrere Jahre bestanden hatte, wurde nach großen Gaben von Allisatin prompt Heilung erzielt. Verf. kann daher das Mittel als ein vorzügliches Darmtherapeutikum bei den verschiedenen Formen des Darmkatarrhs aufs beste empfehlen.

Carl.

Schottmüller: Zur Behandlung der Anämia pernicioosa mit Leber. (Münch. m. W. 1927, S. 1625.)

Verf. wandte in fünf Fällen die von Minot und Murphy empfohlene Behandlung der Krankheit mit Leber an, mit dem Erfolg, daß der Hämoglobingehalt und die Erythrozytenzahl des Blutes schnell eine Steigerung erfuhr, und das Allgemeinbefinden sich wesentlich besserte. Das charakteristische Zeichen der Pernicioosa, die Makrozytose, geht jedoch nur langsam zurück, woraus geschlossen werden muß, daß zwar symptomatisch ein großer Erfolg zu erzielen ist, daß aber die Krankheit als solche nicht behoben wird. Damit steht in Übereinstimmung die schnelle Verschlechterung des einen Kranken, als er mit der Leberdiät aussetzte.

Die andauernde Aufnahme von großen Mengen Leber (bis zu 500 Gramm im Tage) begegnet deshalb oft Schwierigkeiten, weil manche Patienten auf die Dauer einen unüberwindlichen Widerwillen gegen den Lebergenuß an den Tag legen, auch wenn man sich müht, das Organ in den verschiedensten Formen darzubieten. Verf. hat daher nach einem besonderen Verfahren die Leber in Pulverform

bringen lassen, so daß sie auf diese Weise andern Nahrungsmitteln ohne den erwähnten Nachteil beigemischt werden kann. Die chemische Fabrik „Promonta“, Hamburg 26, stellt dieses Leberpulver (Hepatopson) gebrauchsfertig her.

Carl.

Steinitz, H.: Die Behandlung der perniziösen Anämie mit Leberdiät. (D. Therapie der Gegenw. 1928, S. 18.)

Die beiden amerikanischen Ärzte Minot und Murphy benutzen als Heilmittel gegen die vorliegende Krankheit eine Diät, deren Prinzip in einem Reichtum an Leber, an grünem Gemüse und an frischem Obst bei gleichzeitiger Fettarmut besteht. Es wurden auf diese Weise bei 125 Fällen erstaunliche Erfolge erzielt.

Verf. hat nach dieser Vorschrift zwei weibliche, an perniziöser Anämie leidende Personen behandelt. Dieselben nahmen täglich ein halbes, später ein viertel Pfund gekochte Leber zu sich mit dem Ergebnis, daß nach etwa acht Wochen sämtliche krankhaften Erscheinungen verschwunden waren. Bei fortgesetzten Lebergaben hielt diese auffallende Besserung bis jetzt 4½ Monate an. Als die eine Patientin wegen einer Reise mit der Leberdiät aussetzte, machten sich wieder krankhafte Erscheinungen bemerkbar, die unter dem Einflusse der Leberkost wieder verschwanden. Die Art und Weise der Wirkung des vorliegenden Heilmittels ist noch nicht sicher klargestellt. Zum Teil handelt es sich wahrscheinlich um einen stimulierenden Einfluß auf das Knochenmark. Weitere Erfahrungen müssen lehren, ob es sich in vorliegendem Falle um Dauerheilungen oder um eine symptomatische Therapie handelt.

Carl.

Über ein neues Präparat zur Behandlung von Arthritiden verschiedener Ätiologie.

Berichtigung. D. T. W. 1928, Nr. 26, S. 452, muß es anstatt Upffenegger, A.: ... Arch. für exp. Pathol. und Pharmakol. ... heißen: Nyffenegger, A.: ... Schweiz. Archiv f. Tierheilkunde ...

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Gruber, G. B.: Über Trichinose und ihre Bekämpfung. (Vortrag in der Gesellsch. der Ärzte in Wien am 11. November 1927.) (Wiener Klinische Wochenschrift 1927, Nr. 51, S. 1629—1632.)

Eine Hauptfrage für die Beurteilung der Trichinosepathologie (beim Menschen) ist jene, in wie weit allgemeine Vergiftungsercheinungen mit allgemeinen degenerativen Folgen, ferner örtliche, teils degenerative teils entzündliche, Veränderungen im Vordergrund stehen. Es ist wohl nicht daran zu zweifeln, daß die Stoffwechselprodukte der Trichinellen (dem Koffein verwandte Stoffe) für die Körpergewebe nicht gleichgültig sind. Verf. tritt für eine erhöhte Wertung der lokalen Schädigungen und der lokalen Gegenwirkungen als Grundlage des pathologischen Bildes bei der Muskeltrichinose ein, deren allgemeiner schwerer Charakter durch die Masse und dichte Anordnung der Trichinellenherde in der Skelettmuskulatur und sonstigen lebenswichtigen Organen des Körpers bedingt sein dürfte. Gelänge es dem Körper, diese Herdchen einzeln, damit natürlich auch in der Gesamtheit abzugrenzen, zu umwallen, auszumerzen, dann hören auch die schweren Krankheits Symptome auf; beim jugendlichen Individuum mag das oft leichter sein als beim Erwachsenen. Von einer Behandlung des Einzelfalles dürfte nur im Anfang Erfolg zu erwarten sein, wenn sie vor der Ausbreitung oder während der allerersten Zeit der Wanderfahrt der Jungtrichinellen die Würmer selbst zu schädigen vermag; sitzt der Wurm erst im Muskel, dann scheint er nach den bisherigen Erfahrungen gegen alle Maßnahmen gefeit zu sein. Viel wichtiger ist die Verhütung der Trichinelleninvasion. Durch das Beispiel norddeutscher Staaten ist der Weg ganz eindeutig und scharf vorgezeichnet. Diesen Weg ist die Stadt Wien bisher nicht gegangen und sie hat sich dadurch der Gefahr wiederholten Vorkommens mensch-

licher Trichinosefälle mit relativ hoher Mortalität ausgesetzt. Es bleibt nur die Durchführung der Trichinellenschau übrig und zwar einer obligaten (mit prinzipieller Unterdrückung der Hauschlachtungen) für alles Schlachtvieh oder Fleisch, das dem menschlichen Genuß dienen soll, so weit es von Schwein, Wildschwein, Hund, Fuchs, Dachs, Katze und Bären stamme. Es erscheint ferner nötig, jedem festgestellten Falle von tierischer Trichinose veterinärpolizeilich nachzugehen. Die von Schlächtern usw. aufgestellte Behauptung, die Trichinellenschau verteuere das Fleisch, ist nicht stichhaltig. Halbe Maßnahmen sind nicht am Platze. Die Einführung der obligaten Schauflicht würde zugleich auch eine volkswirtschaftliche Bedeutung haben insofern, als sie ohne große Lasten einen neuen Berufszweig (Laienbeschauer) und vielen Menschen Arbeit und Nahrung schafft.

Bricker, F.: Zur Lehre von der Entzündung.

(Aus dem Laboratorium für pathologische Physiologie des Medizinischen Instituts in Charkow.) (Naunyn Schmiedebergs Arch. für exp. Pathol. und Pharmakologie 1928, 129. Bd., 5/6. Heft, S. 285 bis 287.)

Im entzündeten Gewebe zeigt der Stoffwechsel einen pathologischen Charakter, dessen Besonderheiten darin bestehen, daß der Atmungskoeffizient $\frac{CO_2}{O_2}$ stark herabgesetzt ist und daß Kohlehydrate und Eiweißstoffe in größerem Ausmaß abgebaut werden. Aus entzündeten Kaninchenohren, durch heißes Wasser oder Krotonöl vorbehandelt, strömte venöses Blut ab, das einen höheren Gehalt an Azetonkörpern aufwies, als das von nicht entzündeten Ohren. Im Prozesse des verstärkten Stoffwechsels kommt es somit zur Bildung von Zwischenprodukten, deren Auftreten auf einer unvollständigen Oxydation organischer Stoffe zurückzuführen ist.

R. Völker (Leipzig).

Spieler: Rentabilität der Leberegelbekämpfung und Ergebnisse bei Behandlung mit Neoserapis und mit Hepol.

(T. R. 1928, S. 252.)

Die Behandlung der Leberegelfeuche scheitert häufig an der falschen Rentabilitätsberechnung des Besitzers. Es ist deshalb darauf hinzuweisen, daß nicht nur vereinzelte Notchlachtungen, bei denen Versicherungen den Schaden mildern, und ein geringer Milchausfall in Betracht gezogen werden dürfen, sondern schlechte Futterverwertung, mangelhafte Entwicklung des Jungviehs und Herabsetzung der allgemeinen Widerstandsfähigkeit den größeren Posten der Rechnung darstellen. Des geringsten Preises wegen wandte Sp. bisher Neoserapis an und zwar mit vollem Erfolge. Neuerdings gebrauchte Verf. das gleichfalls im Preise niedrig stehende Hepol. In einer Versuchsreihe zeigte es mit Neoserapis gleiche Erfolge; beide Mittel wurden gut vertragen und zeigten beide Gruppen gegenüber der Kontrollgruppe geringe Zunahme des Gewichtes und der Milch. In der stark veränderten Leber eines mit Hepol behandelten stark abgemagerten Tieres mit Ödemen an Kopf und Euter fand man nur einen abgestorbenen gut erhaltenen Egel, sonst ließen sich nur noch vereinzelt die Strukturen aufgelöster Egel erkennen. Die Behandlung eines zweijährigen Ochsen zeigte, daß die Dosis von 6 ccm je Zentner nicht ausreicht. 10 ccm müssen als Normaldosis angesehen werden.

K. H. Meyer.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Torikata und Imamaki: Über die immunisierende Wirkung des Koktoimmunogens von Tuberkelbazillen.

(Beitr. z. Klinik der Tuberk. 1928, Bd. 68, S. 306.)

Das Koktoimmunogen von Tuberkelbakterien wird nach Angabe der Verff. folgendermaßen hergestellt: eine drei bis vier Wochen alte glyzerinierte Bouillonkultur von Tuberkelbakterien wird eine halbe Stunde im Wasserbade auf 100 Grad erhitzt und durch eine Silberschmidkerze fil-

triert. Der klaren, bernsteingelben Flüssigkeit wird zur Konservierung 0,5 Prozent Karbolsäure zugefetzt.

Durch parenchymatöse Einspritzung solchen Koktoimmunogens in die eine Lunge bei Meerfischweinen konnte das betreffende Organ gegen eine hochgradige künstliche Infektion in einem beträchtlichen Grade refraktär gemacht werden, während kein einziges Tier die parallele intrapulmonale Einspritzung von nativem Filtrat aushielt, bis die Lunge immunisiert war. Danach gelingt es, bei Verwendung von Koktoimmunogen von Tuberkelbakterien experimentell eine lokale Immunität zu erzeugen. Es stellte sich dabei heraus, daß auch die übrigen Organe eine mehr oder weniger ausgeprägte Immunität gegen die tuberkulöse Infektion erworben hatten. Der Grad der Immunität war proportional der einverleibten Menge des Koktoimmunogens. Verff. glauben nicht nur bei Tuberkelbakterien, sondern auch bei anderen Mikroben die Koktoimmunogene anstelle der gewöhnlichen Vakzine nicht genug empfehlen zu können.

Meyn.

Nils Lagerlöf: Kliniskt bidrag till kännedomen om puerperal gasbrand („Geburtsrauschbrand“) hos not och dess förekomst i Stockholmstrakten. (Klinisk Beitrag zur Kenntnis des puerperalen Gasbrandes („Geburtsrauschbrandes“) beim Rinde und sein Vorkommen im Stockholmer Bezirk.) (Aus der ambulatorischen Klinik der tierärztlichen Hochschule.) (Skandinavisk Veterinär-Tidskrift 1927, S. 225—259.)

Der Geburtsrauschbrand ist eine unmittelbar nach dem Kalben auftretende, mit Fieber verbundene Wundinfektion. Sie wird durch den Bazillus des malignen Ödems verursacht. Er dringt durch Wunden in die Schleimhaut der Geschlechtswege und lokalisiert sich in der nächsten Umgebung der Infektionspforte. In Schweden, besonders in der Umgegend von Stockholm hat der Geburtsrauschbrand in den letzten Jahren an Zahl zugenommen. Wurde in der ambulatorischen Klinik vor 1915 kein Todesfall im Gefolge von Retentio secundinarum und vor 1922 keine Infektion von malignem Ödem diagnostiziert, so änderte sich von diesem Jahre ab das Bild. Denn 1922 wurden sechs Fälle mit tödlichem Ausgang, 1923 ein Todesfall, 1924—1925 drei Todesfälle, 1925—1926 vier Todesfälle und 1926—1927 acht Todesfälle festgestellt. Im Zusammenhang mit Retentio secundinarum wurden 1925—1926 dreizehn mit vier Todesfällen und 1926—1927 sieben Fälle, von denen acht tödlich endeten, ermittelt. Die 41 Fälle, von denen 21 tödlich endeten, kamen auf 20 Gütern vor, und zwar je ein Fall auf zehn verschiedenen Gütern, zwei Fälle auf sechs Gütern, drei Fälle auf einem Gut, vier Fälle auf je zwei Gütern und acht Fälle auf einem Gut. Auf einigen Gütern war die Krankheit anscheinend eine reine Stallfeuche. Auf den davon am schwersten betroffenen Gütern wurde Viehhandel gewerbsmäßig betrieben, und auf den übrigen wurde stets neues Vieh gekauft und die Stallungen entsprachen nicht den Anforderungen der Hygiene. Tiere, die unmittelbar nach dem Kalben transportiert werden, sind anscheinend mehr empfänglich bzw. erkranken leichter an einer Infektion. Die Krankheit tritt hauptsächlich im Winter und im Frühjahr auf, befällt alle Altersklassen, aber besonders 6—10jährige Tiere und stellt sich gewöhnlich 1—3, auch bis 5 Tage nach dem Kalben ein. Die Infektion erfolgt wahrscheinlich beim oder die nächsten Stunden nach dem Partus. Verursacht wird sie von Bazillen, die zur malignen Ödemrauschbrandgruppe gehören. Diese Bazillen finden sich in der in hoher Kultur befindlichen oberen Erdschicht, besonders reichlich in der Gartenerde, im Dünger und in faulenden Stoffen. Mit dem Futter kommen die Bazillen in den Darmkanal der Pflanzenfresser und dringen nach ihrem Tode in die Gewebe.

Um eine große Stadt verbreitet sich der Geburtsrauschbrand mehr als außen auf dem eigentlichen Lande, weil die Erde in hoher Kultur steht und die Gartenkultur infolge

des in reichlicher Menge zur Verfügung stehenden Düngers stark betrieben wird, die Kuhställe nicht den hygienischen Anforderungen entsprechend eingerichtet sind, auf den meisten Gütern die Tiere hochträchtig gekauft und, sobald sie abgemolken sind, verkauft werden, die eigentlichen Handelsställe Ansteckungsquellen bilden und hochträchtige Kühe durch den Transport in ihrer Widerstandskraft stark geschwächt sind.

In sämtlichen Fällen, in denen die Krankheit beobachtet wurde, waren die Secundinae zurückgeblieben und oft ganz leicht manuell gelöst worden. Daher dürfte in der Retentio secundinarum die eigentliche Ursache der Infektion liegen. Sie dürfte auf folgende Weise erfolgen. Liegt die Kuh während oder nach dem Kalben, so tritt die Nachgeburt nach außen durch die Scham, wird von der Streu, dem Dünger und dergleichen verunreinigt und infiziert. Steht die Kuh auf, so sinkt die Gebärmutter in die Bauchhöhle zurück und mit ihr die vorgetretenen, verunreinigten Teile der Nachgeburt. Die abgestorbenen Gewebsreste in der Nachgeburt, das geronnene Blut und das Fruchtwasser bieten den anaeroben Bakterien um so eher einen günstigen Nährboden, als Sauerstoff mangelt. Nach kurzer Zeit färbt sich die Nachgeburt rot, riecht übel und enthält Gase. Von der infizierten Nachgeburt dringt das Virus durch die Kotyledonen der Mutter in die Gebärmutterwand. Denn bereits frühzeitig finden sich emphysematöse Kotyledonen, wenn die Nachgeburt entfernt wird. Der Ansteckungsstoff dringt tiefer in das submuköse Gewebe und weiter ins Parametrium und in die Körpermuskulatur und von hier aus in die Blutbahn, so daß sich, wenn auch nur ausnahmsweise, Metastasen bilden können. Die Bazillen bilden Toxine, auf deren Resorption die Allgemeinerscheinungen zurückzuführen sind. In der Regel enthält die Gebärmutter blutiggefärbten Inhalt in reichlicher Menge.

Das Sektionsbild ist verschieden. Bald findet sich kein Emphysem in der Körpermuskulatur, bald bildet die ganze Seite des Rumpfes vom Kreuz über die Schulter ein zusammenhängendes Emphysem. Die Muskulatur ist dann meistens dunkel- bis schwarzrot, locker porös und knistert bei der Palpation, riecht säuerlich wie ranzige Butter. In einem Falle wurden allein in dem muskulösen Teil des Diaphragma Veränderungen angetroffen. Daß die äußeren Geschlechtsteile ödematös angeschwollen, mitunter emphysematös sind, trifft sehr häufig nicht zu. In der Bauchhöhle findet sich dann und wann blutiggefärbte seröse Flüssigkeit. Die Serosa des Uterus oft gerötet, im hinteren Teil der Bauchhöhle ringsum die Gebärmutter Perimetritis und Peritonitis. Im Beckenbindegewebe und in den Ligament. lata oft Emphysem. Die Gebärmutter, gewöhnlich nicht genügend kontrahiert, enthält gewöhnlich eine dickflüssige, rotbraungefärbte stinkende Masse oder eine ziemlich dünnflüssige, blutähnliche Flüssigkeit. Die Gebärmutter Schleimhaut ist gewöhnlich braun- bis graurot und oft mit graubraunen Massen belegt. Die Kotyledonen sind meistens in Zerfall begriffen. Die Gebärmutterwand ist oft stark ödematös verdickt, und in ihrer Schleimhaut findet sich, wie die histologische Untersuchung ergibt, häufig Ödem und nekrotisierende Prozesse sowie in der Muskulatur herdförmige Nekrosen, Rundzelleninfiltration und Ödem. In einzelnen Fällen sind aber kaum irgendwelche Veränderungen in der Gebärmutterwand nachzuweisen.

Die Symptome wechseln. Sie bestehen in Nichtabgang der Secundinae, hohem Fieber und in Trübung des Allgemeinbefindens. Anfangs und in leichteren Fällen ist der Blick der Tiere matt, sie liegen viel, stehen schwer auf und, wenn sie aufgestanden sind, schwanken sie, können schließlich nicht stehen und legen, wie beim Kalbefieber, den Kopf zur Seite und stöhnen. Die sichtbaren Schleimhäute, besonders die Scheidenschleimhaut, sind gerötet. In schwereren Fällen zeigen sich in der Haut knisternde, ödematöse Anschwellungen, die aber auch fehlen können. Die Tem-

peratur beträgt 41–42 Grad C, sinkt aber bald und wird kurz vor dem Tode subnormal. Der Puls ist schwach und sehr frequent, die Atmung beschleunigt. In sehr schweren Fällen besteht Atemnot. Einmal war auch ein kurzer schmerzhafter Husten zu hören und gleichzeitig zeigte sich das Tier bei der Perkussion und bei der tiefen Palpation über der linken Pleurahöhle empfindlich. In diesem Falle fand sich bei der Sektion eine Pleuritis fibrinosa acuta infolge von Emphysem in der Muskulatur der Brustwand. Im Beginn der Krankheit fressen die Tiere oft gut, aber bald vermindert sich der Appetit, das Wiederkauen und die Magentätigkeit hören auf. Der Dünger ist gewöhnlich fest, mitunter besteht aber auch Durchfall. Zunächst besteht Retentio secundinarum. Sie hängen in einem dicken Strange bis zum Sprunggelenk herab, sind braunrot und höchst übelriechend, der in den Genitalien befindliche Teil fühlt sich gewöhnlich emphysematös an. Meistens ist die Verbindung zwischen der Placenta materna et fötalis sehr locker, mitunter sitzt sie nur an ein paar Kotyledonen, in anderen Fällen sind die Eihäute dünn, schleimig, gelatinös und zerreißen, sobald man sie anfaßt. Sie sitzen meistens sehr fest an den Kotyledonen, und diese fallen, wenn man die Nachgeburt abzulösen sucht, leicht ab. Die Gebärmutter ist schlaff und enthält eine dünnflüssige, blutiggefärbte, oft schleimige, sehr häufig höchst übelriechende Flüssigkeit. Die Schleimhaut fühlt sich oft etwas rau an. Die Kotyledonen sind einmal ziemlich klein und hart, ein anderes Mal groß, porös und schwammig, gewöhnlich aber sind sie emphysematös und gehen leicht los.

In allen Fällen von Retentio secundinarum, in denen Verdacht auf eine Infektion mit den Bazillen der malignen Ödemgruppe bestand, wurden Proben von der Nachgeburt, des Gebärmuttersekrets oder der Kotyledonen entnommen und mittels Löffler's Methylenblau bakteriologisch untersucht. Wurden im Ausstrichpräparat sporentragende Stäbchen (Klostridiumformen) nachgewiesen, so wurden Meerfischweichen und Kaninchen geimpft. War das Material für beide Tierarten pathogen und konnten im Ausstrichpräparat von der Diaphragmafläche der Leber der toten Versuchstiere stäbchenförmige Bakterien in längeren Ketten oder sogenannte Scheinfäden nachgewiesen werden, so lautete die Diagnose malignes Ödem, war das Material nur für das Meerfischweichen, nicht für das Kaninchen pathogen, und wurden in Ausstrichpräparaten der Zwerchfellfläche der Leber stäbchenförmige Bakterien nur einzeln oder höchstens paarweise nachgewiesen, so wurde Rauschbrand diagnostiziert. In den 41 Fällen der ambulanten Klinik wurde auf Grund der bakteriologischen Untersuchung vierzigmal Infektion mit den Bazillen der Gruppe des malignen Ödems und einmal mit Rauschbrandbazillen diagnostiziert.

Der Verlauf der Krankheit ist verschieden. Etliche Kühe zeigen, nachdem die Nachgeburt abgelöst, die Gebärmutter ausgespült und mit Kohle behandelt worden ist, keine weiteren Krankheitserscheinungen, in anderen Fällen stellt sich eine schwere Metritis ein. Sie kann nach wiederholter Behandlung heilen, nicht selten aber nimmt die Schwäche zu, das Tier liegt viel, kann sich nicht erheben, stöhnt, die Temperatur sinkt, das Tier wird bewußtlos wie beim Kalbefieber und stirbt ohne Todeskampf nach Verlauf von drei Tagen.

Die Wahrscheinlichkeitsdiagnose läßt sich stellen, wenn die Nachgeburt dunkelrot, übelriechend und emphysematös ist, wenn die Kotyledonen zerfallen sind und das Gebärmuttersekret rotgefärbt und übelriechend ist. Das Emphysem in der Körpermuskulatur kann fehlen. Daher darf darauf bei der Diagnose kein zu großes Gewicht gelegt werden. Als Voruntersuchung genügt die einfache mikroskopische Untersuchung eines nach Löffler gefärbten Ausstrichpräparates von dem Nachgeburtmaterial. Vereinzelt kommen Verwechslungen mit Rauschbrand, aber auch mit

Kalbefieber und mit septischer Metritis aus anderer Ursache vor.

Die Prognose richtet sich darnach, ob die Krankheit frühzeitig erkannt und behandelt wird, oder nicht. Im ersten Fall ist die Prognose ziemlich gut. Von den 41 Fällen der ambulatorischen Klinik wurden 20, also ungefähr 50 Prozent geheilt.

Die Behandlung war zum Teil prophylaktisch, und zwar in den Kuhfällen, in denen der Ansteckungsstoff stationär war. Hier wurden die hochträchtigen Tiere vor dem Kalben aus dem Kuhstall anderswohin z. B. nach dem Pferdestall gebracht und blieben hier die nächsten Tage nach dem Kalben. Der Kuhstall wurde gründlich desinfiziert und die Nachgeburt, der Ausfluß und der Inhalt der Gebärmutter wurden unschädlich beseitigt. Bei den kranken Tieren wurde die Nachgeburt so bald wie möglich abgelöst und die Gebärmutter mit abgekochtem Wasser von Körpertemperatur gründlich ausgespült. Hinterher wird eine schwache Lösung eines Desinfektionsmittels einlaufen gelassen und schließlich werden zwei bis fünf oder mehr Merck'sche Kohlenstäbe eingelegt. Versucht wurden auch in einzelnen Fällen nach der Ausspülung der Gebärmutter mit abgekochtem Wasser eine solche mit Wasserstoff-superoxyd und in anderen Fällen wurde, allerdings ohne bestimmten Erfolg, polyvalentes Gasödemferum intravenös injiziert.

Bass.

Richtlinien für die Bekämpfung des seuchenhaften Verkälbens.

In Nr. 27, S. 468 muß es unter Punkt 4 statt 6,7 PH 7,6 PH heißen.

Standesangelegenheiten.

Ausschuß der Preussischen Tierärztekammern.

Im Ministerialblatt der Preuß. Verwaltung für Landwirtschaft, Domänen und Forsten 1928, Nr. 26, S. 347 sind die Ausführungsbestimmungen zum Tierärztekammergesetz und Wahlordnung für die Tierärztekammern veröffentlicht. Dieselben Veröffentlichungen finden sich in den neu erschienenen Mitteilungen des Tierärztekammerausschusses und der Preuß. Tierärztekammern. Ob es dazu wirklich wiederum eines neuen Blattes bedurfte und nicht die vorhandenen Wochenschriften, die sich bisher redlich bemüht hatten, die ihnen zugegangenen Veröffentlichungen möglichst schnell bekannt zu geben, genügen, darüber kann man verschiedener Ansicht sein. Jedenfalls befinden sich die tierärztlichen Wochenschriften jetzt in der bedauerlichen Lage, daß sie von den Verhandlungen des Tierärztekammerausschusses erst nach Veröffentlichung in den oben angegebenen Mitteilungen Kenntnis bekommen.

Der Ausschuß der Preuß. Tierärztekammern tagte am 8. und 9. Mai 1928 in Berlin und faßte folgende Beschlüsse:

1. Der T.-K.-A. hat den dringenden Wunsch, daß der jetzige Vorsitzende baldmöglichst als ordentliches Mitglied in das Landesveterinäramt berufen wird, damit der T.-K.-A. in demselben nicht unvertreten ist. Außerdem wird beantragt, daß nach dem Zusammentreten des neuen T.-K.-A. auch der stellvertretende Vorsitzende und noch ein weiteres Ausschußmitglied in das L.-V.-A. berufen werden, sowie in den Ständigen Beirat für das Veterinärwesen drei Vertreter des T.-K.-A., ferner daß bei Verhandlungen über wichtige tierärztliche Standesfragen drei Tierärzte, nämlich je einer der drei Berufsgruppen zu den Beratungen des L.-V.-A. mit beratender Stimme zugezogen werden. Der T.-K.-A. hat den Wunsch, daß die Berufungen der Ausschußmitglieder als ordentliche Mitglieder des L.-V.-A. und des Landesveterinärbeirats jeweilig für die Dauer einer Wahlperiode der Tierärztekammern und des T.-K.-A. Gültigkeit haben.

2. Der T.-K.-A. beschließt, über das Landwirtschaftsministerium bei dem Staatsministerium die Berufung weiterer geeigneter Tierärzte, insbesondere aus der tierärztlichen Standesvertretung, erneut zu beantragen.

3. Der T.-K.-A. bekennt sich zu den Beschlüssen des Deutschen Veterinärrates in Leipzig am 25. Juni 1927 und bittet den Herrn Minister, erneut dafür Sorge zu tragen, daß der T.-K.-A. zu der bevorstehenden reichsgesetzlichen Regelung des Apothekerwesens, soweit das Dispensierrecht hierbei in Frage kommt, zugezogen wird.

4. Die Tierärztekammern werden gebeten, dafür Sorge zu tragen, daß die Seuchenmeldungen bei der Rotlaufbekämpfung durch Freiberufstierärzte durch die in dem Ministerial-Erlaß vom 14. April 1928 — V. 1565 — bekanntgegebene „Anzeigenpostkarte für Rotlauf“ rechtzeitig erfolgen.

5. Der T.-K.-A. stellt mit Befriedigung fest, daß durch die zahlreichen Vorträge von Hochschul-Professoren und Spezialtierärzten der tierärztlichen Institute der Landwirtschaftskammern in Versammlungen und Fortbildungskursen bei den praktizierenden Tierärzten das Interesse an der Geflügelzucht und an der Bekämpfung der Geflügelkrankheiten geweckt ist. Der T.-K.-A. erachtet es aber für dringend erforderlich, daß die Beteiligung an der Bekämpfung der Geflügelseuchen seitens der praktischen Tierärzte durch die Tierärztekammern noch mehr als bisher gefördert wird.

6. Der T.-K.-A. erfucht die Tierärztekammern erneut, ihrerseits sich an der Bekämpfung des Kurpfuschertums in ausgiebiger Weise zu beteiligen und die „Tierärztliche Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums“, Geschäftsstelle: Dr. med. vet. Grawert, Frankfurt a. Main, Kettenhofweg 101, nachdrücklich zu unterstützen.

7. Der Beschluß in der 13. Tagung wird aufrecht erhalten. Die Tierärztekammern werden die Zuschriften von Tierkrankenkassen über Zusendung der Kammertaxen und dergleichen unbeantwortet lassen.

8. Der T.-K.-A. bittet den Herrn Landwirtschaftsminister, eine öffentliche Warnung vor dem Studium der Veterinärmedizin zu erlassen, wie es seitens des Preussischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung schon mehrmals vor dem Studium der Medizin geschehen ist. (cf. u. a. Wohlfahrtskorrespondenz vom 18. März 1925 Nr. 11; Schreiben des Ministers vom 21. August 1925 — W. 1 Nr. 1804 U II 1 —.)

9. Des weiteren bittet der T.-K.-A. den Herrn Minister, in Anbetracht des übergroßen Andranges zur Ablegung der Prüfung als beamteter Tierarzt die vorgeschriebenen Kurse für Kreistierärztkandidaten auf mehrere Jahre zu sperren.

10. Die Annahme von sog. Sparrücklagen der Serumfabriken für Tierärzte hält der T.-K.-A. für nicht standeswürdig und im Interesse der Landwirtschaft für unerwünscht. Der T.-K.-A. empfiehlt den Serumfabriken, die Impfstoffe und sonstigen Produkte an die Tierärzte zu Nettopreisen abzugeben.

Tierärztekammer für die Provinz Brandenburg und den Stadtkreis Berlin.

Ein Tierarzt, der neben seinem Berufe die amtliche Fleischbeschau ausübt und hierfür die behördlich festgesetzten Gebühren für seine eigene Rechnung vereinnahmt, unterliegt für diese Tätigkeit der Umsatzsteuerpflicht. UmsStG. 1922 § 1. V. Senat. Urteil vom 27. April 1928, VA 621/27. Streitig ist, ob der Beschwerdeführer mit den von ihm aus der Ausübung der Fleischbeschau vereinnahmten Entgelten der Umsatzsteuerpflicht unterliegt. Die Vorinstanzen haben die Steuerpflicht aus folgenden Gründen bejaht: Trotz Vereidigung und öffentlicher Anstellung als Fleischbeschauer sei der Beschwerdeführer, der in seinem Hauptberufe Tierarzt sei, nicht als Beamter oder Angestellter einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft anzusehen. Er übe als selbständiger Gewerbetreibender im Sinne des Umsatzsteuerrechts die Fleischbeschau in dem ihm zugewiesenen Bezirk aus und unterliege daher der Umsatzsteuerpflicht. In seiner Rechtsbeschwerde bekämpft der Beschwerdeführer zu Unrecht den vom Berufungsgericht eingenommenen Standpunkt. Nach den vom Senat in Ergänzung der Feststellungen des Berufungsgerichts getroffenen Ermittlungen, von denen der Beschwerdeführer Kenntnis erhalten hat, ist der Beschwerdeführer vom Landrat auf Grund der Vorschriften des Fleischbeschaugesetzes und der Ausführungsbestimmungen dazu auf jederzeitigen Widerruf zum amtlichen Schlachtvieh- und Fleischbeschauer für einen bestimmten Bezirk bestellt worden. Für die Ausübung der Beschau erhält der Beschwerdeführer von den Tierbesitzern für eigene Rechnung ein Entgelt, dessen Höhe in einem vom Regierungspräsidenten erlassenen Fleischbeschaugebühren-tarife vorgeschrieben ist. Durch eine nach Maßgabe des Schlacht- und Fleischbeschaugesetzes und der hierzu erlassenen Ausführungsbestimmungen erfolgte Anstellung als öffentlicher Fleischbeschauer wird noch nicht ohne weiteres die Rechtsstellung als öffentlicher Beamter erworben. Den zur Anstellung berufenen Staatsorganen ist es vielmehr unbenommen, ob sie sich die Tätigkeit eines Fleischbeschauers im Beamten- oder Angestelltenverhältnis oder auf Grund eines sonstigen

Vertrags, der dem anzustellenden Fleischbeschauer seine wirtschaftliche Selbständigkeit beläßt, sichern wollen. Die Verteidigung und öffentliche Anstellung bezweckt nur, den Fleischbeschauer auf die gewissenhafte Beobachtung der für die Fleischschau erlassenen gesetzlichen und sonstigen Vorschriften zu verpflichten und zugleich den maßgebenden Wirtschaftskreisen bekanntzugeben, daß der öffentlich angestellte Fleischbeschauer die ihm übertragenen Pflichten gewissenhaft und unparteilich ausübt. Im vorliegenden Falle ist der Beschwerdeführer zu der Anstellungsbehörde weder in ein festes Beamtenverhältnis noch in ein Angestelltenverhältnis bürgerlichen Rechtes getreten. Er übt die Tätigkeit als Fleischbeschauer neben seinem sonstigen tierärztlichen Beruf aus. Von einer Aufgabe seiner wirtschaftlichen Selbständigkeit und einem Aufgehen in den wirtschaftlichen Organismus eines anderen kann keine Rede sein. Insbesondere bestimmt der Beschwerdeführer im Einzelfalle selbst, wie er die ihm übertragene Beschautätigkeit unter Berücksichtigung der Belange der Inhaber der zu untersuchenden Tiere und Fleischwaren nach seinem pflichtgemäßen Ermessen zeitlich ausübt. Gegen seine Umsatzsteuerpflicht spricht ferner nicht, daß die Viehbesitzer im Interesse ihres Gewerbes und im öffentlichen Interesse aus gesundheitspolizeilichen Gründen die Beschau vornehmen lassen müssen, zumal dem Beschwerdeführer polizeiliche Befugnisse dahin, daß er seine Tätigkeit gegen den Willen der Beteiligten kraft obrigkeitlicher Stellung von sich aus durchsetzen könnte, nicht beiwohnen. Wenn die Anstellungsbehörden, wie hier, nicht durch ihre eigenen Organe kraft öffentlich-rechtlicher Tätigkeit die Beschau selbst ausüben, sondern ihre Befugnisse zur privatwirtschaftlichen Ausnützung einer wirtschaftlich selbständigen Persönlichkeit überlassen, in deren Gewerbe und Beruf die ihr übertragene Tätigkeit fällt, so erblickt der Verkehr in dieser Tätigkeit eine gewerbliche. Die Steuerpflicht wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Beschwerdeführer hinsichtlich der an ihn zu zahlenden Entgelte an einen von der Behörde erlassenen fogenannten Gebührentarif gebunden ist. Die für eigene Rechnung vereinnahmten Entgelte verlieren hierdurch noch nicht ihren privatwirtschaftlichen Charakter. Der Senat hat daher in Übereinstimmung mit seiner bisherigen Rechtsprechung keine Bedenken, die Umsatzsteuerpflicht des Beschwerdeführers zu bejahen. (Sammlung der Entscheidungen und Gutachten des Reichsfinanzhofs. Herausgegeben vom Reichsfinanzhof. 23. Band. München 1928. Buchdruckerei und Verlagsanstalt Carl Gerder.) I. A.: Kunibert Müller.

Tierärztekammer für die Provinz Sachsen.

Vollversammlung am 30. Mai 1928 in Magdeburg.

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt der Vors. der Verstorbenen, des Geheimen Reg.- und Vet.-Rats Dr. h. c. Leistikow und des früheren Vors. des T.K.A. Tierarzt Dr. h. c. Franzenburg mit ehrenden Worten. Die Versammlung erhebt sich von den Plätzen.

Zu 1 der T.-O. Aus dem Geschäftlichen ist erwähnenswert: Zu den Bestrebungen des Provinzial-Milch Ausschusses werden erneut 100 RM. bewilligt. — Dem Schweineversicherungsverein A. G. Eilsleben wird mit Einverständnis der beteiligten Kollegen die Herabsetzung des Rotlauf-Impfpreises bei Massenimpfungen von 1,75 auf 1,50 RM. (einmalige Impfung) wie im Vorjahre zugestanden. — Hierbei weist Vors. auf die vielfachen Streitigkeiten und Unterbietungen als ein Zeichen der Zeit hin. — Betr. Vertretung in der ordentlichen Fleischschau durch private Vertreter bei Behinderung des zuständigen Kollegen wird auf die diesbezügliche allgemeine Verfügung des Ministers für Landw. vom 20. Januar 1910, MBl. S. 70, und auf eine dementsprechende Antwort der Regierung Magdeburg zu einer Eingabe hingewiesen, wonach von Fall zu Fall zunächst die Entscheidung der zuständigen Regierung einzuholen ist. — Wegen Einrangierung eines Schlachthofdirektors in die Befoldungsgruppe 2b statt 2c ist der Antragsteller von der zuständigen Regierung abschlägig beschieden worden. Die anschließende lebhafte Diskussion bringt allgemeine Verwunderung zum Ausdruck, umsomehr als in anderen Bezirken daran festgehalten wird, daß Akademiker nach Gruppe 2b zweifellos zu befordern sind. Als Standesfrage wird beschlossen, beim Herrn Minister für Landwirtschaft vorstellig zu werden. — Hierauf gibt der Vors. bekannt, daß ein Kollege wegen zwei unterlassener Seuchenanzeigen bezw. falschen Eintragungen ins Fleischbeschautagebuch mit Geldstrafen, ebenso zahlreiche Beschauer einschl. Tierärzte wegen mangelhafter Ausführung der Fleischschau mit Disziplinarstrafen belegt werden mußten. Der Vors. bittet, auf eine größere Peinlichkeit und Korrektheit nach dieser Richtung hin wirken zu wollen. In der

Diskussion wird zwar zugegeben, daß hier und da Verfehlungen wie auch in anderen Berufen vorkommen, gegen die krasse Auffassung wird jedoch Stellung genommen. — Zur 150-Jahrfeier der Tierärztlichen Hochschule Hannover wird nach kurzer Aussprache der Vors. delegiert, die Stiftung einer Jubiläumsgabe beschlossen und über deren Höhe dem Vors. je nach den Kassenverhältnissen Ermächtigung erteilt. — Als Entschädigung außer Reiseauslagen an Versammlungen usw. der Kammer werden für das laufende Jahr für Mitglieder, welche nachweislich Praxis-Ausfälle haben, ein Tagegeld von 30,—, den übrigen ein solches von 20,— RM. bewilligt. — Als Mitglied des Provinzial-Milch Ausschusses hält es Prof. Raebiger für geboten, wenn sich die Kollegen an den Orts-Milch Ausschüssen beteiligen. Der Vors. fordert hierzu auf und bittet, entsprechend zu wirken. — Hierauf verweist der Letztere nochmals auf den Erlaß des Ministers f. Landw. vom 17. Februar 1928, betreffend die Aufstellung und Sonderberechnung selbstdispensierter Arzneien in den Liquidationen, wobei derselbe betont, daß das alte Dispensierrecht durch die skrupellose Propaganda der Apotheker tatsächlich in Gefahr sei. Der T.K.A. wird daher eine Gegenpropaganda entfalten und sich vom derzeitigen Vors. die Frage behandelnde Schriften verfaßt, die den Kollegen zugehen werden. Vors. bittet, sich hiermit in erster Linie an die Landwirtschaft zu wenden und diese unter allen Umständen zu gewinnen zu suchen. Namentlich sei es erforderlich, in den landwirtschaftlichen Vereinen die Angelegenheit gebührend zu beleuchten und auf die Vor- und Nachteile, welche letztere aus dem Fallen des Dispensierrechts für die Landwirte entstehen könnten, hinzuweisen. — Ein Antrag an den Minister für Landw., für alle Wegegebühren bei außerhalb des Wohnorts auszuführender ordentlicher Fleischschau zu gewähren, ist abgelehnt worden. — Ein Antrag, bei Obduktionen von Seuchen-Kadavern durch die Veterinärärzte diese anzuweisen, den behandelnden Tierarzt auf dessen Wunsch stets zuzuziehen, soll an die Herren Regierungspräsidenten gerichtet werden. Schriftführer wird beauftragt. — **Zu 2 der T.-O. Beratung des Entwurfs der Ausführungsbestimmungen zum T.K.G. vom 13. April 1928:** Der Berichterstatter Simmat führt zuerst mit einer kurzen Vorbesprechung in die Materie ein. Er betont hierbei, daß der Entwurf bereits dem T.K.A. vorgelegen und daß Änderungen deshalb wohl kaum in Frage kämen. An der Hand der Vorlage, welche sich in die eigentlichen Ausführungsbestimmungen mit 21 Paragraphen, ein Muster einer Geschäftsordnung mit 25 Paragraphen und eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr gliedert, wurden die wesentlichsten Neuerungen durchgegangen und im einzelnen mit Erläuterungen und Vergleichen zu den alten Bestimmungen versehen. Bei der Besprechung des Entwurfs einer Geschäftsordnung weist der Berichterstatter darauf hin, daß den Kammern der einzelnen Bezirke je nach den waltenden Verhältnissen Spielraum gelassen worden ist und nur eine gewisse Anzahl von Paragraphen als bindend anzuprehen sind. Im allgemeinen tritt eine mehr oder weniger auffallende Vollständigkeit in dem Entwurf hervor, die sich aus den bisherigen Erfahrungen zum Teil ergeben, zum Teil als zeitgemäß gelten können. — Da sich niemand zum Wort meldet, erscheint derselbe als angenommen. **Zu 3 der T.-O. Beratung des Entwurfs einer Wahlordnung für die Kammern.** Kollege Holzhausen referiert an der Hand eines Auszuges aus dem sehr umfangreichen Material eingehend über die vorgesehenen Bestimmungen, die sich mit denjenigen des derzeitigen Listen-Wahlsystems bei den Parlamentswahlen mehr oder weniger decken. Hervorgehoben wird, daß der Kammerbezirk als Wahlbezirk in drei Stimmbezirke = Regierungsbezirke zerfällt. Als Wahlausschuß fungieren der Kammervoritzende (Stellvertreter) und mindestens zwei Beisitzer (Stellvertreter). — Auf Vorschlag des Vors. wird hierauf vorweg zu **Tagesordnung Ziff. 4** für den Wahlbezirk Provinz Sachsen wegen seines Umfanges ein fünfgliedriger Ausschuß = fünf Mitglieder des alten Vorstandes beschlossen. — Der Referent fährt dann fort. Für jeden Stimmbezirk ist eine Wählerliste aufzustellen, im vierten Monat vor der Wahl öffentlich hierzu aufzurufen und nach Aufstellung die Liste selbst zu veröffentlichen. Einsprüche innerhalb zwei Wochen zulässig. Nach Ablauf dieser Frist schließt der Vors. die Liste, indem er die Zahl der Wahlberechtigten feststellt und gibt sie öffentlich bekannt. Einspruch bei der Aufsichtsbehörde innerhalb acht Tagen. Nach Ablauf fordert nunmehr der Wahlleiter zu Wahlvorschlägen auf, die spätestens 35 Tage vor Beginn der Wahlzeit an diesen gehen und von mindestens sechs wahlberechtigten Tierärzten unterschrieben sein müssen. Wahlvorschläge können verbunden werden. Auch können sie evtl. mit dem Namen eines

Vertrauensmannes verfehen fein, der in befonderen Fällen mit dem Wahlleiter verhandeln kann. In den Wahlvorfchlägen müffen Vor- und Zuname nebst Wohnort, reihenweise — ordentliche Mitglieder und Vertreter nebeneinander — genügend gekennzeichnet aufgeführt werden. Nach Beseitigung etwaiger Mängel erfolgt dann bis zum 10. Tage vor der Wahl nochmalige Veröffentlichung sämtlicher endgültiger Wahlvorfchläge, über deren Zulassung der Wahlausfchuß in öffentlicher Sitzung entscheidet. Sitzungshaus ist durch Aushang zu kennzeichnen. Hiernach erhält jeder Wahlberechtigte Stimmzettel nebst Wahlumfchlag, welchen dieser in einem zweiten Umfchlag — verfehen mit Abfender und Inhaltsangabe — an den Wahlleiter einzufenden hat. Die Kennzeichnung des Gewählten erfolgt durch Beifügung eines Kreuzes. Einwendungen werden seitens der Verfammlung nicht erhoben; jedoch wurden über die Durchführung und Geeignetheit für unsere Verhältnisse mehrfache Bedenken laut. — Zu den genannten Veröffentlichungen wurde auf Vorfchlag des Vors. befohlen, diese wie auch folche anderer Art, zukünftig in dem neu zu begründenden Amtsblatt des T.K.A. zu vollziehen. **Zu 5 der T.-O. Zur evtl. Wahl eines Kammermitgliedes zur Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft als Vertreter betont der Vor., daß diese im Interesse des gesamten Standes läge, aber ein Kollege fein müffe, der bereits engere Verbindung mit der Landwirtschaft und speziell Viehzucht habe. Auf Vorfchlag wird Schulze-Vaethen gewählt, der die Wahl annimmt. Zu 6 der T.-O. Fachtierärzten ist die Ausübung anderer tierärztlicher Praxis zu unterfagen. Nach kurzem Referat beantragt Vet.-Rat Simmat, daß bei zukünftigen Genehmigungen die Kammer diesen Standpunkt besonders zum Ausdruck bringen foll und die Erteilung der Genehmigung hieran zu binden ist. — Der Antrag wird einstimmig angenommen. Aus der Verfammlung wird hierzu gebeten, die Herren, denen die Genehmigung bereits erteilt ist, besonders von dem Befchluß in Kenntnis zu fetzen. Zu 7 der T.-O. Änderung der Preise für Geflügelimpfungen. Die Referenten, insbesondere Prof. Raebiger, weisen einerseits auf die Wichtigkeit der Geflügelimpfungen für Geflügelbesitzer und Tierärzte hin, andererseits auf ein einheitliches Zusammengehen aller, Nichtübersteuerung bei angemessener Entfchädigung für Bemühungen und Auslagen hin. Die Taxe bei diesen Verrichtungen vom 1. Oktober 1924 sei nicht mehr angemessen. Es wird befohlen:**

a) Diphtherie-Impfungen.

1 bis 100 Stück je 0,25 RM.

101 bis 250 Stück je 0,20 RM.

über 250 Stück je 0,15 RM.

einschl. Impfstoff, auschl. Reisegebühren und. Hilfspersonal.

b) Tuberkulin-Impfungen.*)

1 bis 250 Stück je 0,15 RM.

über 250 Stück je 0,10 RM.

Für Ablefen der Reaktion $\frac{1}{2}$ Stunde 3 RM., 1 Stunde 5 RM.

Dazu 0,05 RM. pro Stück, falls Impfstoff verauslagt wird, ausschließlich Reisegebühr und Hilfspersonal.

c) Geflügelcholera.

Pro Stückzahl 0,15 RM. ausschließlich Impfstoff, Reisegebühr und Personal.

Zu 8 der T.-O. Festsetzung einer Entfchädigung für in Frage kommenden Vorstandsmitglieder. Der Referent weist auf die dauernd zunehmende Tätigkeit derselben bei dem Anwachsen der Kammervorlagen, insbesondere auf die Inanspruchnahme des Schriftführers hin, wofür auch dem früheren Schriftführer Dr. Rösche bereits monatlich 20 RM. entfchädigt worden find. Andere Kammern zahlten für diese Zwecke hohe Summen jährlich. — Zur Diskussion gestellt lehnen bei der derzeitigen Finanzlage der Kammer sämtliche Vorstandsmitglieder ab. Es wird jedoch befohlen, bis auf weiteres dem Schriftführer seit Übernahme des Amtes denselben Betrag wie dem Vorgänger zu gewähren.
gez. Naumann, Vors. gez. Simmat, Schriftf.

Verein der Tierärzte des Reg.-Bez. Wiesbaden.

Außerordentliche Sitzung am 25. Februar 1928 in Frankfurt a. M.
Stellungnahme zu dem Erlaß des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom 18. Januar 1928 (Beaufsichtigung der Fleischbefchau, Berichterstattung über Verfehlungen in der Fleischbefchau).

Anwesend waren 40 Mitglieder. Der Vors. Dr. Berdel berichtet,

daß der obenbezeichnete Erlaß des Herrn Landw.-Ministers das Erstaunen vieler Tierärzte hervorgerufen habe, zumal er nicht an die Regierungs-Präsidenten ergangen sei, sondern im Ministerialblatt, in der gesamten tierärztlichen Fachpresse und sogar in der Fleischerzeitung veröffentlicht worden sei. Es erscheint eigenartig, daß man jetzt, nach 25jährigem Bestehen des Reichsfleischbefchaugefetzes, es für nötig erachtet hat, Richtlinien zu veröffentlichen, wie die technische Aufsicht des Befchauperfonals durchgeführt werden foll. Vor 25 Jahren hat man den Tierärzten mehr Vertrauen geschenkt. Ist dieses Vertrauen nicht mehr vorhanden? Der Erlaß wäre gerechtfertigt gewesen, wenn gröbere Verfehlungen vorgekommen wären. Das ist nicht der Fall gewesen, wenigstens nicht im Reg.-Bezirk Wiesbaden. Der Erlaß muß den tierärztlichen Stand diskreditieren. Wie überall, kommen natürlich auch in der Fleischbefchau Verstöße vor. Dafür gab es Strafmaßnahmen, welche immer nur den Betreffenden trafen, welcher gefehlt hatte, ohne jedoch den ganzen Stand zu diskreditieren. In dem Erlaß wird gefordert, daß nicht nur die technische Aufsichtsbehörde kontrollieren foll, sondern auch die mit der polizeilichen Lebensmittelkontrolle betrauten Tierärzte. Die Kontrolle foll u. a. sich darauf erstrecken, ob die nötigen Schnitte und vorgeschriebenen Stempel angebracht find, ob Verdorbenfein, unvollkommenes Ausbluten, Wässrigkeit, Gelbfucht, Geruchsabweichung, Unreife usw. konstatiert werden können, also Mängel, die z. T. dehnbare Begriffe find oder zum mindesten sehr schwer festgestellt werden können. Der Erlaß steht nicht nur auf dem Papier, sondern schreibt periodische Berichterstattung vor, sowie die Erstattung von „Fehlanzeigen“. Es muß genau über das Verhalten des „Schülers“ berichtet werden, ob er im abgelaufenen Jahr fleißig und ordentlich war, mit anderen Worten, es werden schwarze Listen geführt. Rigoros ist die Bestimmung III 7, wo vorgeschrieben wird, daß neu anzustellenden Tierärzten die Fleischbefchau nur dann übertragen werden darf, wenn nach den eingezogenen Erkundigungen Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit nicht bestehen. Das „Dienstbotenbuch“, welches bei Hausangestellten abgeschafft ist, führt man also bei Tierärzten ein. Selbst eine Vertretung bekommt heute ein Tierarzt erst dann, wenn er eine gute Auskunft von der Zentralbehörde aufweisen kann. Der Erlaß hat viel Ähnlichkeit mit jenem, der den Veterinärärzten zur Pflicht macht, vor Antritt einer Dienstreise dem Landrat Mitteilung zu machen. Vors. streift die Verfügungen über Packstroh, welches nach Kanada ausgeführt werden foll, sowie die Atteste, die der Veterinärarzt in dieser Angelegenheit ausstellen foll. Überall kann man ein Nachgeben den Interessentengruppen gegenüber beobachten. Man kann nur fagen, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Der Fleischbefchautierarzt verfeht seinen Dienst unter widrigen Verhältnissen und wird dabei von Strafbestimmungen aller möglichen Gefetze bedroht, dem Fleischbefchau-, Nahrungsmittel-, Viehseuchengefetz, ja auch von der im bürgerlichen Gefetzbuch begründeten Haftpflicht gegenüber dem Besitzer. Unter dieser Last erliegt der Tierarzt fast stets vor 65 Jahren. Der Schluffatz der Verfügung des Herrn Regierungs-Präsidenten in Wiesbaden zeigt uns, daß uns von Seiten dieser Regierung Gerechtigkeit widerfahren foll.

Diskussion: Dr. Schipp: Ich bedaure, daß hier kein Mikrophon angebracht ist, welches die Ausführungen des Herrn Vors. nach Berlin weitergibt. Im einzelnen kann ich mir die Ausführungen des Herrn Vors. natürlich nicht zu eigen machen, da sie eine Kritik an einer vorgesezten Stelle bedeuten. Die Kritik mag nicht verkehrt fein, geht aber zu sehr vom Extrem der Sache aus. Dr. Berdel hat mit Recht gesagt, daß man die im Erlaß angeführten Mängel einem Stück Fleisch nicht anfehen kann. Wir verstehen aber unter Fleisch alle genuffähigen Teile des tierischen Körpers, also auch Eingeweide. An diesen können wohl Mängel gefunden werden, welche überfehen find. Redner gibt derartige Fälle bekannt, welche zu einer Hetze im antisemitisch eingestellten Nassauischen Beobachter geführt haben. Auch hat er Bedenken, ob bei Rotlauf immer richtig verfahren wird. Es kann also nicht so hingestellt werden, als ob nichts vorgekommen wäre. Die Möglichkeit also, daß Fleisch vorgefunden wird, welches einer ergänzenden Befchau bedarf, ist vorhanden. Wir wissen alle, wie leicht das Publikum Befchwerde erhebt. Da ist es ein Glück, daß Sachverständige zugezogen werden, welche ausgleichend wirken. Die technische Aufsicht ist in § 75 R.G. dem Regierungs- und Veterinärarzt übertragen, der natürlich den Schuldigen nicht gleich bei der ersten festgestellten Verfehlung der geschilderten Art hängen wird, während der Staatsanwalt einschreiten wird und muß. — Nicht einverstanden ist der Redner mit Ziff. 7, in

*) Von Schutzimpfungen ist abzuzuraten.

der gefagt wird, daß die Genehmigung zur weiteren Ausübung der Fleischbefchau von der Teilnahme an einem Kurfus abhängig gemacht werden kann. Dadurch kann die Moral des Schuldigen nicht gebessert werden. Auch ist der Redner der Meinung, daß es besser gewesen wäre, wenn die Angelegenheit nicht in dieser Breite durch die Zeitungen gegangen wäre. Es ist aber selbstverständlich, daß gemäßregelt werden muß, wer gegen Grundsätze verstößt. Das wird doch immer nur einzelne betreffen, schwarze Listen werden also nicht geführt. Nicht der Erlaß als solcher ist zu beanstanden, sondern seine Form und die Art seiner Veröffentlichung. Der Verein sollte sich mit seiner etwa zu fassenden Entschloßung nicht an das Ministerium wenden, sondern an die Tierärztekammer. Wir in Hessen-Nassau stehen im Brennpunkt der Frage. Bei uns ist die Fleischbefchau seit 100 Jahren zu Hause. Wir haben die schwersten Kämpfe gegen die Interessentengruppen, z. B. in der Gebührenfrage zu führen. Da heißt es auf dem Posten sein, damit uns unsere Aufgaben nicht genommen werden. Sie können uns nicht genommen werden, wenn die Fleischbefchau regelrecht ausgeführt wird, dann ist der Erlaß ein Fetzen Papier, da er gegen niemand Anwendung finden kann.

Dr. Marcus: Ob der Erlaß notwendig war, ist nicht zu verneinen. In der Form erscheint er etwas kraß. Die Tierärzte, welche die amtliche Schlachtviehuntersuchung auszuführen haben, sind etwas schülermäßig behandelt worden. Wir können nicht leugnen, daß manche Kollegen in der Fleischbefchau etwas lässig geworden sind. Jeder Tierarzt ist durch Eid verpflichtet, die Befchau so auszuführen, daß sie vor Gott und der Welt bestehen kann. Der Erlaß hat vielleicht das Gute, daß er manchen Kollegen aufrüttelt. Der Gewerbetreibende wird irre an der Fleischbefchau, wenn sie laßch gehandhabt wird. Kommen Verfehlungen vor, so muß natürlich dagegen vorgegangen werden. Man soll die Sache jedoch kollegial ansehen und alle Begleitumstände berücksichtigen. Wir wissen, daß viele Tierärzte, diese mit ihrem Pflichtbewußtsein und ihrer Überzeugung genau nehmen, Anfeindungen und Hetzereien ausgesetzt sind. Die Anfeindungen waren in früheren Jahren noch größer. Es gehört Mut und Energie dazu, sich den Anfeindungen gegenüber zu behaupten. Die Tierärzte müssen verlangen, daß sie gegenüber den Angriffen der Gewerbetreibenden geschützt werden. Trotz größter Gewissenhaftigkeit kann es bei Massen schlachtungen vorkommen, daß hier und da etwas übersehen wird. Wir können uns gegen die Auswirkungen des Erlasses nur dadurch schützen, daß wir ihn unwirksam machen durch einwandfreie Untersuchung bei der Fleischbefchau. Wir müssen dann aber verlangen, daß die Behörde beim Vorkommen kleinerer Unregelmäßigkeiten menschlich vorgeht.

Dr. Merz: Beim Durchlesen des Erlasses habe ich das Empfinden geschabt, daß er sehr geeignet ist, um Uneinigkeit zwischen die Kollegen zu säen. Wenn die Aufsicht wirklich durchgeführt werden sollte, so kann sie sich nicht jeder Kollege ohne weiteres gefallen lassen. Die Polizeitierärzte sind junge Kollegen, welche ältere bewährte Kollegen zu kontrollieren haben. Da wird es stets etwas zu beanstanden geben. Der Schlachthoftierarzt kann nicht in allen Fällen die Gewähr dafür übernehmen, daß alle Stempel vorschriftsmäßig angebracht sind, weil er nicht selbst stempelt. Bei genauer Durchführung des Erlasses müßte die Zahl der Schlachthoftierärzte verdoppelt werden. Auch die sog. Gemeindetierärzte haben zur Sorge Grund. Wir sind weder Beamte, noch Angestellte mit deren Rechten, bekommen aber Verordnungen über Verordnungen, auch harte, wie z. B. Abgabe von Geld, bei Einnahmen über 500 RM. Für viele Tierärzte wird ein unleidiger Zustand geschaffen.

Dr. Schipp: Der Gegensatz zwischen beamteten und praktischen Tierärzten ist eine Zeitlang von letzteren geradezu gepflegt worden, scheint jetzt aber überbrückt zu sein. Wir sind aufeinander angewiesen und müssen einig sein. Ich kann jedoch die Notwendigkeit nicht einsehen, daß klare Richtlinien betr. Handhabung des Erlasses gegeben werden, da wir diese im Gesetz bereits haben. Wenn Dr. Merz sagt, die Zahl der Tierärzte auf den Schlachthöfen muß verdoppelt werden, so gibt er eigentlich zu, daß es bisher nicht gestimmt hat. Das möchte ich nicht behaupten. Selbstverständlich muß aber nachgeprüft werden, ob nicht mehr Beamte einzustellen sind. Redner setzt dann noch die Gründe auseinander, die zu der Bestimmung betr. Ablieferung eines Teiles der Gebühren geführt haben.

Dr. Sorg: Es gibt wohl niemand unter uns, dem in der Fleischbefchau nicht schon einmal ein Versehen unterlaufen wäre; besonders

an großen Schlachthöfen, z. B. ein Echinokokkus in der Leber. Früher wurde der Echinokokkus bei der Revision herausgeschnitten, jetzt hat der betreffende Polizeitierarzt Meldung zu erstatten, daß eine Unterlassung vorgekommen ist. Sogar ein kleiner tuberkulöser Herd kann übersehen werden. Auch kann Streit darüber entstehen, ob es sich um einen tuberkulösen oder parasitären Herd handelt, die Entscheidung ist oft sehr schwer. Der Erlaß ist in unseren Augen kein Fetzen Papier, sondern eine Drohnote. Der Erlaß ist aus der Rolle gefallen, weil er nicht daran festhält, daß die Fleischbefchau gewissenhaft nach dem Gesetz durchgeführt werden soll. Bei den Medizinern wäre etwas derartiges nicht möglich gewesen.

Dr. Kuppelmayr: Gegen den Erlaß an sich ist nichts einzuwenden, soweit der erste Teil in Frage kommt. Die Beaufsichtigung steht den beamteten Tierärzten zu, und es ist ein selbstverständliches Recht des Ministeriums, darüber Ausführungsbestimmungen zu erlassen. — Unglücklich ist der zweite Teil, der die Personalmaßregelungen bringt. Bisher war es üblich, daß diese Maßregelungen nicht in einem öffentlichen Erlaß gebracht wurden, sondern vertraulich den einzelnen Regierungen zugehen. Daß er in allen Zeitungen gestanden hat, ist beschämend. Wir hätten verlangen müssen, daß vorher mit den Spitzenorganisationen Fühlung genommen worden wäre. Wenn wir eine Resolution fassen, müssen wir m. E. in erster Linie der Befremdung über die Art der gewählten Veröffentlichung Ausdruck geben, daß wir erwartet hätten, daß diese Dinge vertraulich behandelt würden. Auch die krasse Darstellung wäre nicht nötig gewesen. Es hätte genügt zu sagen, daß die Bestimmungen Anwendung finden auf Tierärzte, von denen bekannt ist, daß sie dauernd Verfehlungen begehen.

Dr. Sommerfeld: Weist darauf hin, daß bei den Kontrollen Fleisch vorgefunden wird, dessen Herkunft nicht feststeht, es kann eingeführt sein und aus nicht beschaupflichtigen Haus schlachtungen stammen.

Eine Kommission, bestehend aus dem Vors. Dr. Berdel, Dr. Schaaf, Dr. Sahnner und Dr. Kuppelmayr verfaßt folgende Resolution, die einstimmig angenommen wird:

„Die in der Fleischbefchau tätigen Tierärzte fühlen sich durch die Form des Erlasses des Herrn Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, V 11723, vom 18. Januar 1928, insbesondere durch die öffentliche Bekanntgabe der vorgeesehenen Maßregelungen bei Vergehen empfindlich getroffen. Sie glaubten, erwarten zu dürfen, daß Bestimmungen, die sich lediglich auf die interne Dienstführung beziehen, nicht in einem öffentlichen Erlaß bekannt gegeben, sondern vertraulich an die Aufsichtsbehörde geleitet worden wären. Sie sehen darin nicht nur eine Herabsetzung ihres Standes nach außen hin, sondern auch eine Beeinträchtigung der kollegialen Zusammenarbeit in der Lebensmittelkontrolle. Sie erwarten, daß an die zuständigen Stellen noch Ausführungsanweisungen ergehen, welche den schwierigen Verhältnissen, unter denen die in der Befchau tätigen Tierärzte alltäglich arbeiten, Rechnung tragen und ihnen auch entsprechende Unterstützung in der Durchführung ihrer schwierigen Aufgaben sichern. Sie bitten ferner, daß Verfügungen solcher oder ähnlicher Art, die so tief in das Standesleben einschneiden, nur nach Anhörung der Berufsorganisationen erlassen werden.“

Als Mitglieder werden aufgenommen: Dr. Grawert, Dr. Wagner, Dr. Müller von der I. G. Farbenindustrie Höchst a. M. und Dr. Schönewetter, Staffell.

Dr. Berdel, Vors.

Dr. Dornis, Schriftf.

Verschiedene Mitteilungen.

Promotionstermine für das W.-S. 1928/29 an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Für die Einreichung der Arbeiten:

23. November 1928, 1. Februar 1929.

Für die mündliche Prüfung:

14. Dezember 1928, 22. Februar 1929.

Prüfung für Veterinärärzte.

Die nächste praktisch-mündliche Prüfung für Veterinärärzte wird an der Tierärztlichen Hochschule in Berlin in der Zeit vom 30. Juli bis 9. August 1928 abgehalten werden.

Der Vors.: Müssemeier.

Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. Hamburg 1928.

Festabend im Hotel Atlantic.

Der tierärztliche Hauptverein von Hamburg und Umgegend plant, am Donnerstag, den 20. September 1928, 20 Uhr, im Hotel Atlantic an der Außenalster in Hamburg, einen Festabend zu veranstalten und hat durch seinen Vorsitzenden, Herrn Obertierarzt Dr. Stödter, den großen Festsaal bereits reservieren lassen. Es soll ein gemeinsames Abendessen mit anschließendem Tanze stattfinden. Das trockene Geddeck kostet 6,— RM. Der große Festsaal des Hotels Atlantic ist die gleiche Stelle, an der der festliche Empfang der Amerikafieger stattfand. An alle Besucher der Hamburger Tagung ergeht die Bitte, sich und ihre Damen zur Teilnahme an diesem Festabend anzumelden, damit das Fest einen würdigen Besuch aufweist. Die Anmeldungen sind möglichst an Herrn Obertierarzt Dr. Stödter, Hamburg, Abendrothsweg 21, zu richten und müssen bis zum 31. Juli 1928 eingegangen sein.

Tagungsstelle der tierärztlichen Abteilungen.

Den Bemühungen der Herren Landestierarzt Dr. Mayer und Obertierarzt Dr. Stödter in Hamburg ist es gelungen, die Raumfrage für die Tagung der beiden tierärztlichen Abteilungen in Hamburg in glänzender Weise zu lösen. Durch das Zuvorkommen des Herrn Syndikus Dr. Stenzel, Hamburg, wurden für die Tagungszeit zwei Säle im Gewerbehaus, Hamburg, Holstenwall 12, zur Verfügung gestellt. Beide Säle stoßen aneinander. Der große bietet für 500, der kleine für 250 Personen Platz. Das Gewerbehaus stellt einen Bau dar, dessen Ausmaße und Innenausstattung ein Zeugnis des Hamburger Wohlstandes der Vorkriegszeit ablegen. Der große Saal ist für die kombinierte Sitzung der beiden Abteilungen 34 und 35 am Donnerstag, den 20. September 1928, vormittags, sowie für die Sitzungen der Abteilung 35 am Dienstag, den 18. September 1928, nachmittags, Donnerstag, den 20. September 1928, nachmittags, und Freitag, den 21. September 1928, vormittags und nachmittags, bestimmt worden. Im kleinen Saale finden zu gleicher Zeit die Sitzungen der Abteilung 34 statt. Projektionseinrichtung ist vorhanden. Das Gewerbehaus ist mit zahlreichen Straßenbahnlinien (1, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 31, 40) zu erreichen (Aussteigestelle Holstenwall). Die nächste Hochbahnhaltestelle liegt am Millerntor. Die tierärztlichen Abteilungen der Naturforscherversammlung dürften seit langer Zeit nicht in derartig ausgestatteten Räumen getagt haben und die hoffentlich recht zahlreich erscheinenden Herren Kollegen müssen deshalb den Hamburger Herren für diese Wahl aufrichtig dankbar sein. Da die Säle aneinander liegen, wird durch einen geeigneten Nachrichtenbetrieb in jedem Saale bekanntgegeben werden, welcher Vortrag in der anderen Abteilung jeweils gerade gehalten wird. Ein ebenfalls zur Verfügung gestelltes kleineres Konferenzzimmer sorgt dafür, daß die Vortragenden oder kleinere Tagungsgruppen Gelegenheit finden, sich vorzubereiten oder Besprechungen abzuhalten. Nöller.

Landesgruppe Nordwestdeutschland im Reichsverbande deutscher Gemeindetierärzte.

Einer gelegentlich der letzten Frühjahrsversammlung in Lüneburg gegebenen Anregung folgend, hat sich Herr Prof. Dr. Lund-Hannover in dankenswerter Weise bereit erklärt, in seinem Institut für die Schlachthoflaboratorien Vergleichsmaterial für histologische Wurstuntersuchungen anfertigen zu lassen. Es wird sich um eine Serie von etwa 25 Schnitten handeln, die zu einem Preise von ca. 25,— Mk. abgegeben werden sollen einschl. Präparatenkosten. Um einen Überblick über die Zahl der Interessenten zu bekommen, bitte ich die Herren Kollegen, die eine solche Schnittsammlung zu erwerben wünschen, mir ihre Bestellung umgehend zukommen zu lassen zwecks Weiterleitung. Selbstverständlich steht diese auch Nichtmitgliedern unserer Landesgruppe zu und ist im Interesse der Sache sehr erwünscht.

Nienburg a. W., den 8. Juli 1928. Kormann, Vors.

Bücherbesprechungen.

Henkels, Paul, Prof. Dr.: „Die Chirurgie des Tierarztes, Systematische Anleitung zum selbständigen chirurgischen Denken und Handeln“ für Tierärzte und Studierende der Veterinärmedizin. Mit 41 Textabbildungen. Verlag Paul Parey, Berlin, 1928. Großoktformat, 390 Seiten, geb. 22,— RM.

Der Autor hat ein neues Standardwerk für die Veterinärchirurgie geschaffen. Die gesamte Materie der Veterinärchirurgie wird unter ganz

neuen, von starkem wissenschaftlichen Führertum zeugenden Gesichtspunkten bearbeitet. Legten es bis jetzt die meisten chirurgischen Lehrbücher darauf an, den Stoff nach Organerkrankungen einzuteilen und zu demonstrieren, so werden im vorliegenden Werk viel weitere Perspektiven eröffnet. Zunächst werden in einem chirurgischen Vorstudium die chirurgisch interessierenden, isoliert gedachten Gewebsarten einem spezifisch-chirurgischen Fragenkomplex unterworfen, der ihre chirurgisch-histologischen Eigenarten, ihre Bereitschaft für Angriffe der verschiedenen Reizgattungen, ihre Reaktionsmöglichkeiten und ihre Regenerationsfähigkeit prüft, um aus den einzelnen Kritiken die fast zwangsläufig sich ergebenden Schlüsse für die Chirurgie des betr. Gewebes zu folgern. Mit bewundernswerter Sicherheit und Logik wird dem Lernenden gezeigt, daß in diesem einfachen chirurgischen Fragenkomplex nicht nur Ätiologie und Diagnostik, sondern auch Prognostik und Therapie der chirurgischen Erkrankungen der betr. Gewebe verankert liegen. So wird er bereits im ersten Teil auf eine höhere Warte chirurgischen Denkens gestellt und für den praktischen Teil des Buches, für die „Chirurgische Praxis“ vorbereitet, welcher ebenfalls das Problem des spezifisch chirurgischen Denkens mit unerbittlicher Logik bis in die letzten Folgerungen praktischer Chirurgie durchführt. Verf. spricht daher nicht von chirurgischen Organerkrankungen, sondern von chirurgischen Erkrankungen verschiedener Gewebekomplexe, er spricht nicht von einzelnen Ursachen, sondern von chirurgischen Reizen und chirurgischen Reizkomplexen. Nur in den sich überall vordrängenden praktischen Beispielen werden nötigenfalls chirurgische Organerkrankungen in den Brennpunkt des spezifischen Denksystems gerückt, um einleuchtend zu demonstrieren, wie einfach sich die chirurgische Beurteilung einer Geweberkrankung innerhalb des oben erwähnten Fragenkomplexes auch unter Berücksichtigung der anatomischen und physiologischen Einfügung in den Organismus gestaltet. Die Technik der Gedankenkombination ist auf eine denkbar unkomplizierte, dem Gedächtnis leicht anhaftende Formel gebracht. Eine hervorragende Leistung wissenschaftlicher und pädagogischer Begabung. So ist ein ganz neuartiges Lehrbuch entstanden, welches dem chirurgischen tätigen Tierarzte und dem Kandidaten der Veterinärmedizin ebenso sichere wie leichte Wege zu einem umfassenden chirurgischen Können und chirurgischen Weitblick erschließt. Endziel des Werkes ist, den chirurgisch tätigen Tierarzt für immer über die Unselbständigkeit und den Tiefstand chirurgischer Empirie zu erheben, ihn in der Beurteilung jeglichen chirurgischen Einzelfalles sowohl in Bezug auf Ätiologie und Diagnostik als auch in Bezug auf Prognostik und Therapie „selbständig und schlagfertig“ zu machen. Nichts am Werke ist leere Theorie, alles basiert breit auf praktischer chirurgischer Erfahrung und wissenschaftlicher Anschauung. Alles ist ebenso leicht wieder in die chirurgische Praxis zu übertragen. Jeder, der dieses überaus arbeitsreiche, in seiner Eigenart in der veterinärchirurgischen Literatur einzig dastehende Werk studiert hat, wird die sichere Führung zu einem umfassenden Wissen nachdrücklich empfinden und schätzen. Jedem praktischen Tierarzte, aber auch jedem Studierenden der klinischen Semester ist das Buch wärmstens zu empfehlen. Möge es im Sinne des Verf. der veterinärmedizinischen Wissenschaft und dem tierärztlichen Stande dienen und die wohlverdiente, weiteste Verbreitung finden. Dem Verf. gebührt der Dank der gesamten Veterinärmedizin. Die ausgezeichnete Ausstattung des Buches durch den Verlag sei hier ebenfalls anerkennend hervorgehoben. Frick.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Tierarzt Dr. van Gils in Warburg zum Veterinärarzt. Ihm ist die Veterinärarztstelle in Warburg (Bez. Minden) übertragen worden. Tierarzt Erich Malke aus Leipzig und Konrad Günther aus Hannover zu wissenschaftl. Assistenten am Tierfeucheninstitut der Universität Leipzig.

Ausgeschieden: Dr. Ruth Eber und Dr. Ernst Breusch als wissenschaftl. Assistenten am Tierfeucheninstitut der Universität Leipzig.

Verstorben: Schlachthoftierarzt Dr. Hermann Jacob in Hildesheim (Hannover).

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Veterinärhistorische Mitteilungen

Herausgegeben von der

Gesellschaft für Geschichte und Literatur der Veterinärmedizin

Schriftleiter:

Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

zwanglos erscheinende Beilage zur „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“
Verlag von M. & H. Schaper in Hannover
Sonderbezugspreis 1,50 Goldmark das Jahr, freibleibend

Nr. 7.

1928.

8. Jahrgang.

Vor 100 Jahren.

Bilder aus der Zeit vor ca. 100 Jahren, auf denen ein Tierarzt bei der Berufsarbeit dargestellt ist, sind eine Seltenheit. Das hier gezeigte Bild dürfte daher Interesse erwecken. Es ist nach einer Wiener Künstlerzeichnung aus der Zeit um 1830 hergestellt. Die Kopie ist angefertigt von Frau Elisabeth Rieck geb. Heusinger v. Waldegg. Auf dem Blatte, das mit hübschen Randverzierungen (Engel und Blumen) umrahmt ist, nimmt es die linke Seite ein; in der Mitte ist eine Apotheke, oben ein Augenarzt, rechts ein Zahnarzt, unten sind chemische und pharmazeutische Apparate abgebildet. Die Unterschrift lautet: Der Apotheker, der Augen-, Zahn- und Vieharzt, der Dürrkräuter.



Von einem Kräuterfammler ist aber nichts zu sehen, gemeint sind wohl die Engel, die im Rankenwerk der Umrahmung hantieren. Unser Blatt ist ein Nachdruck einer Tafel aus dem Werke M. R. Thoma, Der Mensch und sein Beruf oder Lexikon aller Stände, das aus 57 Lithographien von Dryer, Schwarz, Albrecht, Greger, Kühn, Kunz, Edinger,

25

Hufen bei Wiederkäuern erfordert den Gebrauch des Saftes der Ringelblume, durch die Nase eingegeben.

liber I, cap. 122 . . . sed si bos aut ovis hustet, succum ringula absque aqua naribus eorum infunde, et mox noxios humores excreant, et meliorabuntur.

Gegen Ziegenkrankheiten gibt es ein Universalheilmittel, das Laub der Elche.

liber III, cap. 27 (de Asch [= Fraxinus excelsior]) . . . et si caprae aliquo modo infirmantur, folia fraxini eis saepe ad comedendum dantur, et curabuntur.

Bei warmem und feuchtem Wetter sind die Ochsen sehr anfällig¹³⁾; man soll als Vorbeugungsmittel Dill und Iriswurzel geben.

liber I, cap. 67 (de dille [= Anethum graveolens]). In humida et leni aura, quia tunc boves facile infirmari incipiunt, anetum et minus de radice irs Illyricae pabulo eorum intermiscere et pravos humores in eis consumit.

Schafe bleiben gefund und werden fett, wenn sie Lungenkraut erhalten. Da die Lunge des Menschen eine Natur hat wie ein Schaf, so ist Lungenkraut gut zu gebrauchen, wenn ein Mensch asthmatisch ist (cum pulmo inflatus est).

liber I, cap. 29 (de Lunkwurz [= Pulmonaria officinalis]) . . . et si oves eam frequenter comedunt, sanae et pingues fiunt, nec etiam lacti earum obest. Et cum pulmo (des Menschen) inflatus est, si lunkwurz in vino coctam saepe bibit, ut praediximus, pulmo eius ad sanitatem recuperatur, quia pulmo naturam ovis fere habet.

Die Tollwut des Hundes wird an zwei Stellen erwähnt. VI, 45 wird angeordnet, dem wutkranken Hunde den Kopf einer Lerche als Heilmittel zu geben.

liber VI (de avibus), cap. 45 (de lercha) . . . et si canis furit, caput ludulae abscede et idem caput furenti cani ad comedendum da, et furorem dimittet et mansuetus fiet.

Über die Entfaltung der Wut wird VII, 22 gesagt, daß der Hund mittels feuchten und faulen Dunstes böse Geister¹⁴⁾ einatmet, die Störungen und ein böses Zifchen verursachen. Et ipse canis etiam quendam aquosum et putridum fumum aeris aliquamdiu odoratur in quo aerei spiritus irrationes suas et quosdam malos sibilos faciunt et inde ipse interdum furit.

Nach I, 1 ist der Biß des Hundes de' halitu illius venenosior quam alterius animalis¹⁵⁾. Als Heilmittel werden verordnet eine Paste von Weizenmehl und Eiweiß oder Eiweiß mit Schafgarbe.

¹³⁾ Nach Cato, de re rustica 73, ist es die Zeit, wenn die Trauben sich zu färben beginnen.

¹⁴⁾ Der dämonische Ursprung der Lyssa ist altgriechischer Glaube (Hekate). Näheres bei H. Froehner, Aberglaube in der Ätiologie . . . der Hundswut. Abhandlungen aus der Geschichte der Veterinärmedizin Heft 4, 1925, S. 79.

¹⁵⁾ Jeder Hundebiß galt bis zum Ausgange des Mittelalters vielfach als giftig, er wurde dem Schlangenbiß und Skorpionstich gleichgestellt. Vergl. das Bild von Hans Burgmaier in H. Braunschweig, Chirurgie, 1534, Vorbereitung der Amputation eines Beines. Im Zimmer steht ein Hund, auf dem Boden liegen Schlangen und Skorpione. Die Alten (Plinius) waren der Ansicht, daß der Biß eines nicht wutkranken Hundes Tollwut hervorrufen könne.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Rieck, Berlin-Cöpenick, Kirchstraße 4.
Verlag von M. & H. Schaper Hannover. — Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Radmannsdorf, Zeichnung u. a. besteht. Dieses Buch, in Imp.-Qu.-Folio erschienen etwa 1830, ist eine große Rarität. Keine deutsche und österreichische öffentliche Bibliothek besitzt es, auch keine öffentliche Kunstsammlung; die Auskunftsstelle der deutschen Bibliotheken in Berlin hat es lange vergeblich für mich gesucht. Vor etwa Jahresfrist tauchte es in einem Antiquariatskatalog auf, aber schon nach wenigen Tagen war es verkauft und drei Wochen später war es schon in dritter Hand, die es festhält. Der bekannte Kunstverlag von Karl Gerlinghaus in Planegg bei München hat die einzelnen Blätter vervielfältigen lassen und gibt sie zu 4 Mk. das Stück ab. Zum Inhalte des Blattes ist nichts zu sagen. Ein braver Biedermeyer läßt dem Tierarzt sein Pferd vorführen, das v. l. Schale hat.

Reinhard Froehner (Gr. Strehlitz)

Tierheilkundliches in den naturwissenschaftlichen Schriften der Hildegard von Bingen.

Von Reinhard Froehner, Gr. Strehlitz.

(Schluß.)

liber III. (de arboribus) cap. 12 (de cestenbaum [= Castanea sativa]) . . . et si schelmo pecora occidit, contunde corticem eius et in aquam ita pone, ut inde saporem habeat, et saepe in potu asinis et equis, bobus et ovibus at porcis et omnibus caeteris pecoribus, et schelmo ab iis cessabit, et curabuntur.

liber III, cap. 33 (de fornhaß⁹⁾) . . . sed tamen si pestilentia id est schelmo pecora vexat et occidit, recentes ramos de eiusdem arboris ante ipsa pecora pone, ut odorem eorum capiant; ubi eadem arbores nascuntur, illic ipsa pecora duci facito, ut odor eorum per nases eorum transeat, et abinde incipient husten et eicere putredines, quae in naribus et caputibus eorum sunt, et ita pestis quae ea vexat evanescet. Sed tamen cavendum est, ne eadem pecora quidquam de arboribus illis gustent, ne inde laedantur et doleant.

liber III, cap. 62 (de picea) . . . et si pestilentia pecora vexat et occidit, recentes rami ante ipsa pecora ponantur, ut odorem eorum capiant, vel pecora sub easdem arbores ducantur et incipient tussitare et eicere putredines. Sed tamen cavendum est, ne quicquam de arbore ista gustent, ne inde laedantur.

Strengel oder Hauptsiechtum⁹⁾ eine Krankheit, die auch als eine pestis bezeichnet wird (IX, 5), betrifft Pferde, Esel, Rinder, Ziegen, Schafe, Schweine und andere Tiere. Heilmittel dagegen ist Kupferwasser.

liber IX (de metallo) cap. 5 (de cupro) . . . sed et si equi aut asini aut boves aut caprae aut oves aut porci aut alia quaelibet animalia strengel aut hauptsiechtum habent, magnum frustum cupri in caldarium seu in ollam seu in patinam ponat, et aquam desuper fundat, et tunc ipsam aquam ad ignem cum eodem cupro calefac, ut ferreat, ac sic cum ipsa calida aqua pabulum iunen-

⁹⁾ Das Wort kann ich nicht erklären; ob Föhre darin steckt? In der Wolfenbüttelei Handschrift heißt das Wort Fornha.

⁹⁾ houbet-siechtum haben Mengen und die Späteren für Kopfschmerz, das Wort wird auch sonst nicht dem Begriff Strengel gleichgesetzt. Strengel ist sonst überall = Kehlucht (der Pferde). Albertus Magnus leitet strengel von stranguinae ab, was die Beugung der Arnung ausdrückt.

torum illorum, sive avena sive frenum sit, semel vel bis asperge, ut ita aspersum comedant, et pestis ab eis cessabit.

Nafenausfluß beim Pferde (I 100, 139), wobei es houset (huftee), wird mit Brenneffeln und Liebföckel behandelt.

liber I, cap. 100 (de urtica [= Urtica urens oder dioica]) . . . et si fervor reumat¹⁰⁾ de naribus equi fluit, ita quod inde houset, urentem urticam et plus de libistico in aqua coque et fumum istum calidum in nases et os eius, freno imposito, transire permittit, et sanabitur.

liber I, cap. 139 (de Lubestuckel [= Ligusticum Levisticum]). Quod si reuma de naribus equi fluit, ita quod inde tussitat, homo qui eum liberare vult livisticum accipiat, et modicum minus urentis urticae et eas in aqua coquat, et deinde de aqua ablatis fumum earum ita calidum in nases et in os eius, freno imposito, transire permittat, et sanabitur.

Gegen Leibschmerzen der Pferde (I 100, 139) find dieselben Mittel erfolgreich.

liber I, cap. 100 . . . Quod si equus in ventre dolet, urentem urticam et plus de libistico pabulo eius saepe commisce, ut simul comedat, et sanabitur.

liber I, cap. 139 . . . Si autem equus in ventre velut de morsibus dolet, homo levisticum accipiat et modicum minus de urente urtica et pabulo illius saepe intermiscat, quatenus ista simul comedat, et curabitur.

Betrifft dieses Leiden einen Esel, soll man Lactuca gebrauchen.

liber I, cap. 91 (de lactuca agresii [= Lactuca virosa]) . . . sed si asinus in ventre dolet, agrestem lactucam ad furtures in aqua modice calefactos incidendo misce et hoc saepe fac, et curabitur.

Tympanie der Rinder und Schafe, Verfangen oder Erblewen genannt, entsteht durch Diätfehler und wird durch Ringula oder durch Kalfanienblätter kuriert.

liber I, cap. 122 (de ringula [= Calendula officinalis]) . . . et si boves aut oves aliquid mali comederint, unde repente inflatur, id est erblewert¹¹⁾, ringula tundatur, et succus eius exprimatur atque modica aqua succus in illa ore eorum fundatur, ut inde gustent, et curabitur.

liber III, cap. 12 (de cestenbaum) . . . quod si equus et bos aut asinus vel aliud quodlibet pecus verfangen¹²⁾ est, da illi folia in pabulo ad comedendum, si potest, vel si comedere noluerit, ipsa folia pulveriza et pulverum illum in aquam proice et da illi saepe in potu bibere, et curabitur.

¹⁰⁾ rheuma kephales der griechischen Hippiatrker.

¹¹⁾ er-blewen von mhd. blewen, bliuwen wie griech. phléo = quellen, überquellen.

¹²⁾ Bei de Crescentiis (S. 142) ist Verfangen die Belshwerde beim Abschlucken, wobei das getrunkene Wasser durch die Nafe zurücktritt. Conrad Heresbach (1595) setzt Verfangen = discentatio, was Füllung bis zum Platzen bedeutet, und = infuscatio, von fustis = Stock, dann Schlag mit dem Stocke, schließlich Beule, die durch den Schlag hervorgerufen wird. — Vergl. die Segen gegen Verfangen und Verfahren, Vet.-hft. Mitteilungen Nr. 8, 1921 und Nr. 8, 1923.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrzabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Ausperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Erstattungsansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 29.

Ausgegeben am 21. Juli 1928.

36. Jahrgang.

(Aus der Universitäts-Tierpoliklinik Leipzig. — Direktor: Professor Dr. Reinhardt.)

Zur Diagnostik und Therapie der Magen-Darmkrankheiten des Hundes.

(Mit 7 Abbildungen.)

Von Dr. R. Völker.

Wir haben in der Behandlung der beim Hunde so häufig auftretenden Erkrankungen des Magen- und Darmtraktes die üblichen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen in bestimmter Richtung erweitert. Hierüber sowie über die erzielten Erfolge sei im folgenden kurz berichtet.

Die Gewinnung des Magen-Inhaltes und dessen Untersuchung, insbesondere der Gang der chemischen Untersuchung ist zwar von verschiedenen Autoren [Müller (8), Jakob (6), Nagl (9), Schmidt und Scheunert (11), Fr. Schmidt (12) u. a.] eingehend beschrieben. Müller (8) wendet für gewöhnlich zur Gewinnung des Magen-Inhaltes die Verabreichung eines Brechmittels an, da er mittels Sonde selten zum Ziel kommt. Er empfiehlt nämlich die Sonde einzuleiten und hierauf die Magengegend zu kneten, um so in die Öffnung des Rohres eine kleine Menge Mageninhalt hinein zu pressen; auch das Ausaugen des Magen-Inhaltes mittels einer in die Sondenmündung eingepaßten Pravazspitze hält er für möglich; er glaubt jedoch, daß nur bei gutmütigen Hunden eine Ausheberung zu diagnostischen Zwecken wirklich ausführbar sei. Jakob (6) und Nagl (9) schlagen gleichfalls künstliches Erbrechenlassen vor, Jakob weist jedoch darauf hin, daß hierbei oftmals Galle mit erbrochen wird, wodurch die Untersuchung des Magen-Inhaltes erheblich gestört wird.

Nach Schmidt und Scheunert (11) hat die Untersuchung des auf künstlichem Wege erhaltenen Inhalts einzelner Abschnitte des Verdauungstraktes weniger Verwendung gefunden, obwohl solche Untersuchungen des Magen-Inhaltes bei Hunden für die Beurteilung von Erkrankungen des Magens einige gewisse Bedeutung besitzen. Man wird dadurch in die Lage versetzt, den Magenchemismus genauer zu erkennen und festzustellen, ob eine Anazidose, Hyperazidose, Hypazidose vorliegt. Wertvoll ist namentlich die Kenntnis des Salzsäuregehaltes; denn sie gibt bestimmte Anhaltspunkte für die Diagnostik und Behandlung. Für die chemische Untersuchung des Magen-Inhaltes (Erbrochenem) werden von Schmidt und Scheunert für den Salzsäurenachweis die bekannte Günstburg- und die Tropäolinprobe vorgeschlagen.

Wenn es somit zweifellos ist, daß eine genaue Untersuchung des Magen-Inhaltes für eine exakte Diagnosestellung

und eine erfolgreiche Behandlung notwendig und wünschenswert ist, so ist andererseits die technische Schwierigkeit zur einwandfreien Gewinnung des Magenlastes in der Praxis anscheinend so groß, daß man bislang, von Ausnahmefällen abgesehen, auf diese Methode verzichtet hat. Die Schwierigkeit liegt jedoch nach unseren Erfahrungen nicht in dem Einführen der Magenfonde, das man bei einiger Übung und Beherrschung der Technik auch bei widerspenstigen Tieren bewerkstelligen kann, sondern vielmehr in dem Versuch, nach den bislang üblichen Angaben, durch Heben und Senken der Sonde bzw. durch Kneten des Magens ufw. Magen-Inhalt wirklich zu gewinnen.

Schon Dasch (3) hat vorgeschlagen, die Ausheberung mittels eines Gummiballons vorzunehmen. Wir haben die bestehende Schwierigkeit dadurch zu überwinden gesucht, daß wir, wie die beifolgende Abbildung erkennen läßt, die Magenfonde (Schlauch mit Trichter) an ein Gefäß angeschlossen haben, in dem mittels einer Wasserstrahlpumpe ein Vakuum erzeugt wird. Bei einiger Übung kann man auf diese Weise ohne jegliche fremde Hilfe die Ausheberung rasch und sicher vornehmen.




Abb. 1. Magenschlauch mit Einfülltrichter und Vakuumgefäß, angeschlossen an eine Kötting'sche Wasserstrahlpumpe. (Hier ohne Schlauchkupplung; vergl. Abb. 2.)

Als Anhaltspunkte seien unsere Maße für den Magenschlauch und das Vakuumgefäß angegeben: Druckschlauch: Länge 1 m, Wanddicke 0,6 cm, Lumen 0,55 cm, zwei elliptische Fenster, 2,2 cm lang, 0,6 cm breit und 1,7 cm vom Schlauchende entfernt. Wir haben mit diesem fast bis zu den kleinsten Hunderassen die Ausheberung anstandslos ausführen können. Nur bei Zwerghunden mußte ein engerer Trichterschlauch angewandt werden. Als Mund-Magenabstand wurde beim mittelgroßen Hunde 65 cm festgestellt. Das Vakuumgefäß faßt zweckmäßig 500 bis 700 ccm und ist mit einem doppelt durchbohrten Gummistopfen abgeschlossen. Durch diese Öffnungen führen zwei gebogene Glas- bzw. Metallröhren, von denen die eine fast bis zum Boden, die andere nur eben in die Flasche hineinreicht. An dieses Rohr wird die Saugpumpe, an das andere der Magenschlauch angeschlossen. Die Befestigung der kleinen Körtlingschen Wasserstrahlpumpe kann an jeder Wasserleitung erfolgen (vergl. Abbildung).



Abb. 2. Wasserstrahlpumpe nach Körtling mit Schlauchkupplung (Hugershoff).

Nach unserer Methode haben wir in der hiesigen Klinik die Feststellung der Sekretionsgröße des Magens an einem großen Patientenmaterial durchgeführt. Über einen Teil der Untersuchungen, die unter Anwendung des Alkohol-Probefrühstückes nach Ehrmann (15) unter Benutzung des Azidimeters nach Citron (2) angestellt wurden, hat bereits Schmidt (11) berichtet.

Das Azidimeter nach Citron (2) besteht in einem mit verschiedenen Marken und Graduierungen versehenen Reagenzglas. Man bringt zunächst 2—3 Tropfen des Citronschen Reagens, das eine Lösung von je 1 Gramm Phenolphthalein und Dimethylamidoazobenzol in 100 ccm 70prozentigem Alkohol ist, in das Azidimeterrohr und füllt, wenn genügend Magenfaß zur Verfügung steht, bis zur Marke 10 (andernfalls nur bis zur Marke 5 oder 2). Wenn der Magenfaß trübe (schleimhaltig) ist, muß zuvor filtriert werden. Unter Aufsetzen des Glasstopfens schwenkt man einige Male um. Ist freie Salzsäure vorhanden, tritt Rotfärbung ein. Fehlt freie Salzsäure, so erscheint die Flüssigkeit gelb. Im ersteren Falle setzt man unter stetigem Umschwenken ein Zehntel Normal-Natronlauge tropfenweise zu, bis die Rotfärbung in ein deutliches Gelb umschlägt. Man liest an der Skala die nunmehrige Höhe der Flüssigkeitssäule = Wert der freien Säure in Säuregraden ab. (1 Säuregrad = 1 ccm $\frac{n}{10}$ Na OH. 10 bei 10 ccm Magenfaß.) Bei weiterem Zusatz von Natronlauge tritt der Umschlag in Rotviolett (Phenolphthalein) ein. — Der jetzt erreichte Flüssigkeitsstand zeigt die Gesamtsäure des Magenfaßes an. Hat man beispielsweise als ersten Wert 20 und als zweiten Wert 40 gefunden, so bedeutet dies: 100 ccm Magenfaß enthalten soviel freie Salzsäure, als durch 20 ccm Natronlauge gesättigt werden, und besitzen eine Gesamtsäure, die 40 ccm Natronlauge entspricht.

Die von Schmidt (11) aufgestellte Normalkurve, die

im wesentlichen der von Heilmeyer und Graupner (4) beim gefunden Menschen gleicht, geht aus der beigefügten Abbildung hervor. Sie befaßt, daß die Werte für freie HCl und für gebundene (gesamt) Azidität kontinuierlich bis zu 70 Minuten ansteigen und dann langsam wieder absinken. Der geringe Abstand zwischen den beiden Kurven läßt die bei Anwendung des erwähnten Probefrühstückes überall gleichmäßig kleine Pufferung und damit die Brauchbarkeit dieser Methode erkennen.




Abb. 3.

Aziditätskurve nach Alkoholprobefrühstück eines gefunden Hundes.

Die praktische Auswertung dieser Untersuchungsmethode läßt sich dahin zusammenfassen, daß hierdurch die korrekte Diagnose gastrischer Sekretionsanomalien, die ohne Untersuchung des Magen-Inhaltes nicht gestellt werden kann, ermöglicht wird. Bislang suchte man neben verschiedenen starken Störungen der Nahrungsaufnahme in der Menge des aufgenommenen Trinkwassers einen Anhalt für die Differentialdiagnose der Achylia gastrica und der Dyspepsia acida, zu gewinnen, da bei der letzteren nach Jakob (5) die Flüssigkeitsaufnahme verringert, bei der ersteren vermehrt sein soll. Ferner liegt auf der Hand, daß eine genau gestellte Diagnose für die Therapie von außerordentlichem Wert ist, denn sie ist maßgebend für die Behandlung. Es ist nun nicht mehr notwendig, wie Jakob (5) es, in Anbetracht des Fehlens geeigneter Methoden, vorschlägt, „zuerst die für Achylie gültige Therapie zu versuchen“ und je nach dem günstigen oder ungünstigen Erfolg dieser die weitere Behandlung zu modifizieren.

Die übermäßige Salzsäurebildung des Magens beschränken wir durch Gabe von Alkalien, die den überfauren Magen-Inhalt neutralisieren, oder auch nach dem Vorschlage von Vándorfy (13) durch Mittel, welche die Sekretion des Magens unterdrücken, wie z. B. durch Essigsäurelösungen. Die längere intensive Gabe von Alkalien kann beim Menschen eine „defensive“ Hyperproduktion des Magenfaßes zur Folge haben, die durch zu hohe Alkalizität bedingt ist. Diese irritative Wirkung der Alkalien haben Vándorfy und Baráth (12) durch Verwendung von Pufferlösungen bestimmter Hydrogenion-Konzentration zu verhindern versucht. Durch die Verwendung der bekannten Sörrensen'schen Phosphatgemische, hergestellt aus n/15-Lösung von Dinatriumhydrophosphat (Na_2HPO_4) und Natriumdihydrophosphat (NaH_2PO_4) kann die säurelindernde Stärke der Lösung in einem gegebenen Falle nach Belieben gewählt werden. Mit dem Fortfall der starken Alkalizität bleibt auch die irritative Wirkung der Alkalilösung aus.

Die subaziden Fälle sind in der üblichen Weise mit Mixt. acidi hydrochlorici ufw. zu behandeln, wobei nach einiger Zeit eine neue „Funktionsprüfung“ über den Erfolg der Therapie Aufschluß gibt.

Auch für die Durchführung von Magenspülungen, die bei chronischem Magenkatarrh, bei Vergiftungen ufw. angezeigt sind,

läßt sich die kleine Apparatur mit gutem Erfolge verwenden. Wir haben zu diesem Zwecke das Ende der Sonde gegabelt (vergl. Abbildung) und können so einen am freien Ende angebrachten Trichter zur Einföllung von Spöflöfligkeit




Abb. 4. Magenpöflung beim Hund.

keit benutzen. Diese kann beliebige Zeit nachher durch Ingangsetzen der Wasserstrahlpumpe mit Leichtigkeit ausgehebert werden, wobei lediglich durch eine Klemmschraube das trichterwärts gerichtete Ende der Sonde abgedröflert wird.

Bei der Behandlung der akuten Magen- und Darmkatarrhe haben wir neben anderen Behandlungsmethoden die Adsorptionstherapie bevorzugt. Die theoretischen Grundlagen hierfür sind hinlänglich bekannt und von Bechold (1), auch von Lichtwitz und Wiechowsky (6) und Reinhardt (10) eingehend erörtert.

Das wesentliche der Adsorptionstherapie besteht nach Bechold (1) darin, daß die Oberflächenwirkung poröser feiner Pulver zur Entfernung von Bakterien und Giften bzw. giftigen Stoffwechselprodukten aus dem Körper benutzt wird. Hierbei gehen die als Adsorbens dienenden Pulver keine chemische Bindung mit den adsorbierten Giften, bakteriellen Toxinen und Stoffwechselprodukten ein, sondern üben lediglich eine Oberflächenwirkung aus. Von Bedeutung ist hierbei, daß sie auch physiologisch wichtige Fermente, wie Pepsin und Trypsin adsorbieren können und daß so die therapeutische Wirkung abgeschwächt werden kann. Wenn daher ein maximales Adhäsionsvermögen für pathogene Mikroorganismen wünschenswert ist, so sollen die genannten Fermente nach Möglichkeit nicht geschädigt werden.

Die Eigenschaft der Kohle, insbesondere der Carbo med. Merck sind von Reinhardt (10) eingehend gewürdigt. In dem Bestreben zur Adsorptionswirkung eine Desinfektionswirkung zu addieren, ist die Silberkohle in die Therapie eingeföhrt; durch den Silberüberzug soll die Wirkung verstärkt, der Desinfektionseffekt gesteigert werden.

Ein weißes Adsorbens stellt das Silargel (Chlor Silber-Kieselsäure-Gel), von Bechold (1) eingeföhrt, dar. Die weiße Farbe des Pulvers scheint in mancher Beziehung vorteilhafter bei der Anwendung zu sein, als die Kohle.

Eine Kombination von Silargel und Silberkohle stellt das Adsorgan dar. (50 v. 100 Adsorbens und 50 v. 100 Kakaomasse.) Dieses Mittel ist in Granulatform hergestellt und zeichnet sich durch feinen angenehmen Geschmack aus.

Die Schwierigkeit der Adsorptionstherapie liegt darin, daß dem Patienten nach Möglichkeit größere Mengen eingegeben werden soll. Dieses scheitert bei den üblichen Methoden des Eingebens oftmals am Widerstand des Patienten und am Unvermögen des Besitzers, dem Tier die gewünschte Menge einzuverleiben. Auch im Klinikbetrieb gehört das Eingeben von größeren Mengen aufgelöstem Kohle-

breies oder sonstigen Mitteln nicht zu den Annehmlichkeiten, da das kaum vermeidbare Überfließen beim Eingeben unangenehme Beschmutzung verursacht.

Das Eingeben in Pillenform bzw. in Granulatform (Adsorgan) gestaltet sich einfacher, nur ist hierbei der Übelstand, daß man immerhin nur geringe Mengen einföhren kann, ohne daß der Patient Widerstand leistet.

Einfacher und „eleganter“ gestaltet sich das Eingeben mit dem Magenschlauch, wobei ein bis zwei oder mehr Eßlöfl des Mittels mit 200—300 ccm Wasser angeröhrt auf einmal verabfolgt werden können. Das Einföhren des Schlauches ist denkbar einfach. Bei ruhigen Hunden faßt der Wärter mit der rechten Hand fest in den Nacken des Tieres, mit der Linken zieht er den Unterkiefer abwärts, während gleichzeitig der Eingebende mit der linken bzw. rechten Hand den Oberkiefer des Hundes aufwärts zieht, wobei zweckmäßig die Backenzähne mit der Lippen Schleimhaut gedeckt werden. Mit der anderen Hand wird das Sondenende über den Zungenrund geschoben und bei einer Schluckbewegung ruhig weitergeföhrt. (Abb. 5.) Die Wegsamkeit der Sonde




Abb. 5. Einföhren des Magenschlauches (ohne Maulkeil).

wird zweckmäßig durch Eingießen von etwas Leitungswasser geprüft. Beim Eingießen des Medikaments in den Trichter empfiehlt es sich, die Augen des Tieres verdecken zu lassen bzw. zu verdecken, da die Tiere in diesem Augenblick leicht erschrecken.

Bißigen Tieren haben wir den üblichen Maulkeil zur Sicherung angelegt und über diesen Maulkeil weg die Sonde eingeföhrt. (Abb. 6.) Ferner ist für manche Fälle die Benutzung eines in Sondenstärke durchbohrten Maulkeiles angebracht.

Wir haben im letzten Jahr die Adsorptionstherapie und



Abb. 6. Eingeben mittels Magenschlauch. Sicherung durch Maulkeil.

zwar besonders in Form der Kohlegabe (Carb. med. Merck) systematisch in vielen 100 Fällen durchgeführt und können das Resultat hinsichtlich der Technik der Eingabe und des therapeutischen Erfolges sowohl bei den akuten Magen-Darmkatarrhen, infektiöser und toxischer Ursache, als auch bei schweren Darmentzündungen als gut und für die Praxis geeignet bezeichnen.




Abb. 7. Magenfonde mit Trichter, angeschlossen an ein Vakuumgefäß.

Zusammenfassung.

I. Die chemische Untersuchung des Magen-Inhaltes [nach Citron (2)] zur Feststellung von Störung der Magenfa-

sekretion beim Hunde wird durch die Ausheberung des Magen-Inhaltes unter Benutzung einer Wasserstrahlpumpe ermöglicht; die Methodik ist auch für die Praxis brauchbar.

II. Die Behandlung von akuten Magen- und Darmkatarrhen des Hundes mittels der Adsorptions-, insbesondere der Kohletherapie wird erleichtert durch das Eingeben mittels des Magen Schlauches. Die Technik ist einfach, hat sich bewährt und ist als brauchbare Methode dem Praktiker zu empfehlen.

III. In gleicher Weise haben wir festgestellt, daß auch die übrigen angeführten Mittel wie Silargel und Argocarbon in dieser Richtung sich bewährt haben. Das Adsorban haben wir bei kleineren temperamentvollen Hunden, die sich der Einführung der Sonde widersetzen, wiederholt mit Erfolg gegeben.

Literatur.

1. Bechold: Pharmazeutische Zentralhalle für Deutschland 1928, 69. Jahrg., Nr. 18.
2. Citron, Heinr.: Verh. d. Vereins für innere Med. vom 5. Januar 1903, S. 282.
3. Dasch, Alfred: Ost. Wschr. für Tierheilkunde 1913, S. 214.
4. Heilmeyer, S. und W. Graupner: Klin. Wschr. 1927, Nr. 22, S. 1035.
5. Jakob, H.: Diagnose und Therapie der inneren Krankheiten des Hundes. Stuttgart 1913.
6. Lichtwitz und Wiechowski: Pharmazeutische Zentralhalle für Deutschland 1928, 69. Jahrg., Nr. 15.
7. Müller, G.: Die Krankheiten des Hundes. Berlin 1922.
8. Nagl, Franz: Ref. von Schwarz. W. t. Mschr.
9. Reinhardt, R.: Münch. tierärztl. Wschr. 1927, 78. Jahrg. Nr. 22, S. 309—313.
10. Schmidt, J. und A. Scheunert: Anleitung zur Mikroskopischen und Chemischen Diagnostik der Krankheiten der Haustiere. Hannover 1918.
11. Schmid, Fr. Fr.: In.-Diss. Leipzig 1927.
12. Vándorffy, Y. u. E. Baráth: Klin. Wschr., 7. Jahrg., Nr. 17, S. 800.
13. Ehrmann, R.: B. kl. Wschr. 1914, Nr. 14, S. 662.

(Aus dem Bakteriologischen Untersuchungsamt der Stadt Altona (Elbe). — Vorstand Dr. med. J. Zeissler.)

Apparatur zur Anaërobenzüchtung im luftverdünnten Raum.

(Mit 1 Abbildung.)

Von Johannes Zeissler.


In größerem Maßstabe hat zuerst Robertson Anaëroben lediglich im luftverdünnten Raume gezüchtet. Der Oberflächenzüchtung im luftverdünnten Raum bei der praktischen Rauchbranddiagnose haben sich, wohl als erste, Mießner und Meyn bedient. Das gute Wachstum der Kulturen, welche ich im Mießner'schen Institute gelegentlich eines Besuches sah, veranlaßte mich, nach einer Apparatur zu suchen, welche auch für gegen Sauerstoff viel mehr empfindliche Anaërobenarten, als es der Rauchbrandbazillus (*B. Chauvoei*) und der Pararauchbrandbazillus (*V. septique*) sind, genügende Sauerstofffreiheit sichert. Auf Grund sehr ausgedehnter Erfahrung mit 15 verschiedenen Arten anaërober Bazillen der verschiedensten Herkunft empfehle ich nun folgende Apparatur:

die Pfeiffer'sche Anaërobenpumpe¹⁾ in Verbindung mit den auf Dichte geprüften, nach meinen Angaben hergestellten Anaërobenapparaten der Firma Begerow¹⁾.

Die Luftpumpe saugt innerhalb weniger Minuten bis auf 0,02 mm Quecksilber, die Apparate sind mittels eines zwischen Unterteil und Deckel gelegten Gummiringes (der dauernd in Glyzerin aufzubewahren und vor dem Gebrauch zwischen Tüchern flüchtig abzutrocknen ist) so gut abdichtet, daß Pyrogallol oder andere Reduktionsmittel auch für die gegen Sauerstoff empfindlichsten Anaërobenarten vollkommen überflüssig sind.

Der eben beschriebene Verschuß der Apparate ist so dicht, daß die Pfeiffer'sche Anaërobenpumpe in den leeren Begerow'schen Anaërobenapparaten ein Vakuum von etwa

1 mm herstellt, in mit Nährböden beschickten infolge Austrittes von Wasserdampf aus den Nährsubstraten ein Vakuum zwischen 3 und 5 mm. Damit ist ein Grad von Sauerstofffreiheit erreicht, der sich im Herauswachsen gerade der gegen



Sauerstoff empfindlichsten Anaërobenarten selbst aus Milchkolonien dokumentiert, sogar so empfindlicher Arten, deren bloße Züchtung mit den früher benutzten technischen Ein-

¹⁾ Zu beziehen von E. C. F. Begerow, Altona (Elbe), Königstr. 127.

richtungen auf der Plattenoberfläche nur ausnahmsweise bzw. überhaupt nicht gelang, an deren Herauswachsen aus Mischkolonien mit andersartigen, gegen Sauerstoff weniger empfindlichen Anaërobenarten früher nicht entfernt hätte gedacht werden können.

Bevor die Pfeifferische Anaërobenpumpe an den Begerowschen Anaërobenapparat angeschlossen wird, muß sie solange mit (durch einen Glasstab luftdicht verschlossenem) Saugschlauch laufen, bis das zwischen beide Apparate geschaltete Quecksilbermanometer auf annähernd 0 mm zeigt und die Pumpe ein scharfes, helles Knattern ertönen läßt. Erst wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, hat sie ihre volle Leistung erreicht und darf an den Anaërobenapparat angeschlossen werden.

Sollen sehr sauerstoffempfindliche Keime auf Platten gezüchtet werden, so läßt man die Pumpe saugen, und zwar vom Eintritt des „Knatterns“ ab noch etwa 10 Minuten, überzeugt sich nach etwa einstündigem Aufenthalt des evakuierten Anaërobenapparates im Brutschrank durch erneuten Anschluß desselben an die zuvor in Gang gesetzte Pumpe davon, daß der Apparat sein Vakuum gehalten hat und wiederholt, falls die Kulturen länger als einen Tag bebrütet werden sollen, das Abaugen nach Verlauf der ersten 20 bis 24 Stunden.

Bei Kulturen von geringerer Sauerstoffempfindlichkeit genügt 5 Minuten langes „Knattern“ beim ersten Abaugen und die Kontrolle des Vakuums nach der ersten Stunde. Auch bei Oberflächenkulturen des Rauschbrandbazillus (*B. Chauvoei*) ist in dieser Weise zu verfahren und insbesondere das scharfe Abaugen nach 24 Stunden zu unterlassen, wenn typische Kolonien der Wuchsform IV wachsen sollen.

Zugleich mit der Luft wird aus den mit Kulturen gefüllten Anaërobenapparaten eine beträchtliche Menge Wasserdampf abgeaugt. Diese habe ich früher in mit Chlorkalzium oder Schwefelsäure beschickten Waschflaschen abzufangen gesucht. Der Versuch gelang immer nur unvollkommen. Mündete das Zuleitungsrohr in der Wasserflasche oberhalb des Spiegels der Schwefelsäure, so ging sehr viel Wasserdampf in die Pumpe über; mündete es unterhalb des Schwefelsäurespiegels, so wurden durch die große Schwere der Schwefelsäure zwischen 3 und 4 mm Vakuum verloren. Auch das Chlorkalzium absorbierte den Wasserdampf nur unvollständig, gefährdete aber andererseits das Getriebe der Pumpe durch kleine Körnchen, die vom Luftstrom mit in

die Pumpe gerissen wurden. Darum habe ich auf Entwässerung des Luftstromes vor seinem Eintritt in die Pumpe ganz verzichtet und beschränke mich seit zwei Jahren auf Auswechslung des Öles in der Pumpe, sobald eine gewisse Menge Wasser darin kondensiert ist. Das Öl wird durch geglühtes Kupferfulfat wieder entwässert und später wieder als Pumpenfüllung verwendet. — In meinem Institut ist die Auswechslung des Pumpenöles etwa einmal in der Woche nötig.

Im Gegensatz zu der früher von mir geübten Züchtung unter Pyrogallol und Kalilauge und Abaugen mittels einer Wasserstrahlpumpe sind mit der hier empfohlenen Apparatur Traubenzuckeragarblutplatten vom selben Tage, schon sechs Stunden nach ihrer Herstellung — nach 15 Minuten langem Trocknen auf der obersten Etage des 37 Grad-Brutschrankes offen mit der freien Schichtseite nach unten gekehrt — gut verwendungsfähig und für gewisse Zwecke wegen größerer Quellfähigkeit älteren Platten sogar vorzuziehen. So entwickeln sich z. B. die für die Wuchsform IV charakteristischen hügelartigen Anschwellungen des Nährbodens, auf deren Gipfel die Rauschbrandkolonien sitzen, regelmäßig und ausreichend nur auf Traubenzuckeragarblutplatten, welche am Tage ihrer Herstellung beimpft werden. Auf diese Weise lassen sich schon nach eintägiger Bebrütung so große Kolonien auf so großen Hügeln gewinnen, wie es mit der früheren Apparatur nur selten gelang. Der Entwicklungsprozeß verläuft jedoch so rasch, daß am zweiten Tage die Hügel schon vielfach abgeflacht sein können.

Weitere Einzelheiten sind in dem bald erscheinenden X. Band des Handbuches der Pathogenen Mikroorganismen (Kolle-Kraus-Uhlenhuth) nachzulesen.

Die eben besprochene Apparatur zur Anaërobenzüchtung ist keineswegs die absolut billigste der bis jetzt bekannten entsprechenden Einrichtungen. Doch würde, ganz abgesehen von der nicht mehr zu übertreffenden Einfachheit der Handhabung und Schnelligkeit der Arbeit, allein schon die nur mit dieser Apparatur vollbrachte Leistung der Zerlegung einer Reihe von sehr hartnäckigen Mischkulturen, die bis dahin als eigene Anaërobenarten galten, weil ihre Trennung mit anderen Apparaten uns ebenso wie anderen Autoren, darunter den erfahrensten Anaërobenforschern, jahrelang nicht gelungen war, genügen, ihr vor allen anderen Einrichtungen zur Anaërobenzüchtung den Vorzug zu geben.

Eine seltene Bildungsanomalie im Bereiche des os sphenoidale bzw. der Crista galli mit Cranioschisis beim Rinde.

(Mit 2 Abbildungen.)

Von M. Hobmaier.

In der Sammlung des Dorpater tierpathologischen Instituts befindet sich eine Kopfmißbildung, die ob ihrer Seltenheit bekannt gegeben zu werden verdient, obwohl der Erhaltungszustand des Präparates zum Teil ein mangelhafter ist.

A. Außenansicht.

Der Bezeichnung nach handelt es sich um den Kopf eines ca. 1½ Jahre alten Rindes spätreifer Rasse. Das Kranium weist eine Länge von 36 cm auf. Die Spitzen der Hornzapfen stehen 25 cm von einander entfernt. Die Stirnbreite beträgt 20 cm. Die Ventralseite des Kopfes läßt Bildungsanomalien vermissen. Das Gaumendach ist regulär gebildet und geschlossen. Die Härte der Schädelknochen entspricht der Norm. Knochenaufreibungen fehlen. Auf der Dorsalseite ist zunächst die Schädeldecke durch den Betäubungsschlag vor dem Nackenwulst zertrümmert (Abb. 1). Die Nasalia fehlen, das rechte völlig, vom linken ist nur eine mit dem os frontale verbundene, mehrere Quadratcentimeter messende Schuppe noch vorhanden. (Nasalia verloren.) In

der Mitte des Stirnbeines, genau zwischen den Orbitalhöhlen, erscheint das os frontale allseitig emporgewölbt. Dadurch wird das Dach der Schädeldecke aufgehoben. Man kann von oben her in den Schädelkapselraum des Gehirnes hineinblicken. Der Saum des dergestalt emporgetriebenen os frontale ist dünn und scharf, aber von verschiedener Höhe. Die Krateröffnung erscheint in der Querebene gemessen 4 cm breit. Nach vorne ist sie wegen des Ausfalles der Nasalia nicht mehr völlig geschlossen. Mitten aus diesem Krater erhebt sich frei, nur im Ursprunge in fester Verbindung mit der Umgebung ein fester Knochenzapfen. Er überragt die Höhe des oberen Orbitalrandes um ca. 10 cm und seine knöcherne Einfassung durch das os frontale um rund 5 cm. Der Knochenzapfen weist eine leichte Neigung nach vorne und nach der rechten Seite zu auf. Seine Schnittfläche ist queroval im Verhältnis 2:1 cm, nur das Ende rund, mit 2 cm Durchmesser. Dieses erscheint horizontal abgeflacht. Es ist wie die Verbindungsstelle einer Rippe mit dem Rippenknorpel beschaffen. Knorpel ist jedoch nicht

mehr vorhanden. Im übrigen erscheint die Oberfläche des Gebildes glatt. Der Gehirnschädel würde eine breit klaffende Öffnung nach dem Nasenraum zu aufweisen, wenn nicht jene dornfortsatzähnliche Knochenwucherung den Spalt-raum größtenteils ausfüllte. So bleibt beiderseits nur ein schmaler, nicht durch Knochen verschlossener Streifen bestehen. Wie aus dem erhaltenen Reste des linken Nasale erkenntlich ist, war auch nasenwärts das os frontale selbst

Knochenteilen ein schmaler offener Spalt. Linkerseits verbreitert er sich oben stärker, wie auf der Gegenseite. In der Höhe der Riechkolben führt ein unregelmäßig geformtes, im allgemeinen ovales Foramen mit einem Durchmesser von 1—2 cm in das Knochengebilde. Es ist dies der Beiderseits liegt zwischen ihm und den begrenzenden Anfang eines kurzen Kanales, der schräg aufwärts führend den Knochen durchdringt. Von der Gehirnseite aus be-




Abb. 1.

und der Anfangsteil des os nasale aufgebogen. Dadurch ist eine ungefähr 8 cm lange Höhle entstanden, in deren Mitte der Knochenzapfen sich erhob. Das Knochengebilde selbst durchdringt das Schädeldach in dem Kreuzungspunkt der Mediane des Kopfes mit der Verbindungslinie der Mitte der Orbitahöhlen.

B. Innenansicht.

Um sich eine genauere Einsicht in die Anomalie zu verschaffen, wurde der Kopf durch einen Sägeschnitt in der Höhe der Foramina supraorbitalia senkrecht zur Längsachse in zwei Teile zerlegt. Der hintere Teil des Schädels ließ auffallende Abweichungen von der Norm vermissen und bedarf daher keiner näheren Beschreibung. Im proximalen Teile (vergl. Abb. 2) fällt zunächst eine Asymmetrie auf. Der Hemisphärenanteil der rechten Seite ist stärker — besonders im oberen Teile — ausgebuchtet. Der Binnenraum der Schädelkapsel mißt an der Schnittfläche vom Stirnbein an bis zur Crista transversa 9 cm. Der breiteste Querdurchmesser beträgt 8 cm. Über den Fossae ethmoidales wird er noch beträchtlicher. Der Schädelinnenraum ist demnach nicht nur in der Form verändert, sondern auch vergrößert. Gleichzeitig fällt die geringe Ausprägung der Impressiones der Gehirnwindungen in der Schädelkapsel auf. Die sonstigen Abweichungen betreffen, vom Schädeldache abgesehen, ausschließlich die Form des Keilbeines. Seine Innenfläche weist zunächst einen ungewöhnlich starken Abfall nach rückwärts auf. Dieser kommt vor allem dadurch zustande, daß sowohl das Dach des Sulcus chiasmatis nerv. opt., als auch die Crista transversa fehlen, bzw. nur angedeutet sind. Die Sehnerven treten demnach in zwei, auch an der Innenseite der Schädelbasis getrennten Knochenkanälen, durch das os sphenoidale. Die Sella turcica kommt durch diese Anomalien fast senkrecht zur Schädelbasis zu liegen. In der Mediane, unmittelbar vor den Kanälen der Sehnerven, liegt eine ovale, muldenförmige Grube im Körper des Keilbeines. Ihre Bedeutung ist unklar. Vielleicht, daß infolge Verlagerung der Hypophyse, diese hier ihren Sitz hatte. Die tiefen und großen Siebbeingruben stehen 3 cm von einander entfernt. Zwischen ihnen steigt, die ganze Breite einnehmend, jener dornfortsatzähnliche Knochenkörper in die Höhe. Seine Formverhältnisse wurden bereits eingangs beschrieben.



Abb. 2.

trachtet erhebt sich demnach das Knochengebilde frei aus dem Körper des Keilbeines an der Stelle, die sonst die sog. Crista galli als Fortsetzung der Spina einnimmt. Von der Nasalseite aus gesehen wächst aus dem Grunde jenes langen Knochenzapfens, nur von dem erwähnten Transversalkanal median getrennt, die Lamina perpendicularis des Sehbeins hervor. Sie ist leider zum Teil frakturiert.

C. Deutungsversuch.

Von einer Berücksichtigung einschlägiger Literatur muß leider aus äußeren Gründen Abstand genommen werden. Anamnestisch ist lediglich bekannt, daß zu Lebzeiten des Tieres der Knochendefekt und die vorpringende Knochen- spange auf der Stirne durch einen „blasigen Hautfack“ überzogen war. Diese Anamnese, das große Gehirnvolumen und der fehlende Verschluss des Stirnbeines sind ein Beweis dafür, daß eine (Myleo-) Hydroencephalocoele ursprünglich vorgelegen hat. Auch das Fehlen der den Sulcus chiasmatis nach oben begrenzenden Knochenleiste, sowie der Crista transversa, findet in ungewöhnlichen Druckverhältnissen des Schädelinnenraumes zu embryonalen Zeit eine hinreichende Erklärung.

Die interessantere Frage ist jedoch die: Was stellt jener das Schädeldach überragende, dornfortsatzähnliche Knochenzapfen dar? Es wurde bereits bei der Beschreibung der Anomalie betont, daß er sich anstelle der sog. Crista galli bzw. der Spina aufbaut. Wir werden nicht fehlgehen mit der Annahme, daß er nichts anderes darstellt, als eine exzessive Wucherung dieses Knochenbezirkes. Spina des Keilbeines und Crista des os ethmoidale verschmelzen bekanntlich zu einem einheitlichen Knochenkörper. Es ist denkbar, daß durch eine im Laufe des Embryonallebens sich stärker ausbildende Hohlraum- bildung des Gehirnes zunächst jene Verschiebung des

Stirnbeines sich entwickelt hat. Dadurch mußte die Bildung der Lamina perpendicularis in Mitleidenchaft gezogen werden. Insbesondere ihr hinterer freier Rand, die Crista galli, entbehrte dadurch der Anlehnung an das Stirnhöhlendach. Es ließe sich so die ungehinderte Entwicklung dieses Körpers zu der im Präparat vorliegenden, außerordentlichen Größe erklären. Die Aufhebung des Druckwiderstandes bei günstigsten Ernährungsverhältnissen wären demnach für das Zustandekommen dieses Teiles der Bildungsanomalie verantwortlich zu machen. Der transversale Kanal am proximalen Ende des Knochengebildes stellt vielleicht den Durchgangskanal für Arteria, Vena und Nervus ethmoidalis dar. Aus der eigenartig engen Öffnung des Stirnbeines im Vergleich zu sonstigen Befunden bei Encephalocoele möchte man versucht sein, den Zeitpunkt der Entwicklungsstörung zum mindesten in das letzte Drittel der Embryonalzeit des

Tieres zu verlegen. Bei der ganz außergewöhnlichen Seltenheit des beschriebenen Vorkommnisses müssen daneben noch besondere Druckverhältnisse bestanden haben, die sich gerade in der Gegend der Spina des Keilbeines, bezw. der Crista galli, ausgewirkt haben. Andererseits liegt eine primäre Mißbildung oder Wucherung jener Knochengegend im Bereiche der Möglichkeit, so daß allenfalls die Eröffnung des Schädeldaches erst unter dem Andrang jenes dornfortsatzähnlichen Knochengebildes zustande gekommen wäre. Hierfür ließe sich insbesondere die Enge des Schädelspaltes ins Feld führen. Diese beiden Möglichkeiten erscheinen dem Schreiber als die naheliegenden. Freunde der Goethe-Oken'schen Schädeltheorie möchten vielleicht versucht sein, die Mißbildung für eine weitere Stütze ihrer Wirbeltheorie der Schädelbildung in Anspruch zu nehmen.

Innere Medizin und Chirurgie.

Kornherr: Tätigkeitsbericht der Tierärztl. Beratungsstelle über das Jahr 1927. (W. t. Mschr 1928, XV. Jhg., S. 302.)

Die Beratungsstelle diente in erster Linie der Förderung und Bekämpfung des feuchtenhaften Verwerfens und der Sterilität des Rindes. Besonderes Gewicht wird auf die systematische Bekämpfung des feuchtenhaften Abortus gelegt. Über die Arbeiten selbst wird auf das Original verwiesen.

Berge.

Krupski, A.: Chemische und chemisch-physikalische Untersuchungen in der internen Veterinärmedizin. (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 237.)

Durch die Prüfung und Ausarbeitung objektiver Methoden kann die wissenschaftliche Diagnostik innerer Krankheiten mächtig gefördert werden, und zu diesen Methoden gehören quantitative Verschiebungen gewisser Stoffe oder das Auftreten von neuen; möglicherweise sind diese Verhältnisse für einzelne Krankheiten typisch und daher diagnostisch doppelt wertvoll. Sie können nur chemisch behandelt werden; oft findet man aber auch Veränderungen in kolloid-chemischer Hinsicht, die teilweise eine Erklärung für gewisse veränderte Funktionen sind, oder aber direkt als Ursache identifiziert werden können. Verf. hat wohl zum ersten Mal bei Pferd, Kuh, Kalb, Schaf und Hund solche chemischen und physikalisch-chemischen Untersuchungen systematisch am Normalen und bei verschiedenen Krankheitszuständen vorgenommen. Es wurden untersucht das quantitative Verhalten des Reststickstoffes, Harnsäure, Aminosäuren, Lipoide, Blutzucker, Bilirubin, Urobilin, Indikan, Kochsalz im Blutserum, Gesamtstickstoff, Harnstoff, Aminosäuren, Urobilin im Harn, Urobilin im Kot, dann die Refraktometrie des Serums. **Reststickstoff:** Er ist bei der chronischen Nephritis des Hundes außerordentlich gesteigert (162—270 mg in 100 ccm Blut), desgleichen auch bei der Stuttgarter Hundeseuche; bei der Staupe findet man ebenfalls vor dem Tode einen starken Anstieg. Beim Pferd werden solche Steigerungen ebenfalls beobachtet (Brustseuche, schleichende Bronchopneumonie, Nephritiden). Dagegen kann man bei einigermaßen noch arbeitsfähigem Nierengewebe (M. purul. dissemin.) keine wesentlichen Schwankungen des Blut-Reststickstoffes finden. Bei sehr schweren Nierenerkrankungen steigt der Rest-N; daselbe ist auch bei Herzkrankheiten der Fall. Die Werte für **Harnsäure** unterliegen viel größeren Schwankungen, so daß sie weniger typisch sind als diejenigen des Rest-N. Steigerungen wurden gesehen bei Hammelschwanz, Nackenbrandnekrose, Nephritis, Zystitis, Bronchitis, Tetanus, Ileum-Torsion. **Aminosäuren** sind bei gewissen Kolikformen im Blute erhöht, auch wurde ein sehr hoher Wert bei einem Fall von Pharyngitis beobachtet. Hier waren auch alle anderen genannten Substanzen vermehrt. Bei der infektiösen Anämie der Pferde ist der Aminosäurenwert merk-

würdigerweise nicht erhöht. Hier kommt dem noch vorhandenen Funktionsgrad der Leber eine erhöhte Bedeutung zu, denn schwere Leberschädigungen (Distomatosis) führen zu vermehrtem Aminosäuregehalt des Blutes. Erhöhter Lipoidgehalt wurde nachgewiesen bei gangränöser Pneumonie, exsudativer Pleuritis, Milzruptur, Neuritis caudae equinae, infektiöse Anämie (hochgradiger Blutzerfall). Nach den Befunden der Blutzuckerbestimmung ist Diabetes mellitus bei Pferden sehr selten. Auch bei starken Aufregungszuständen werden mehr reduzierende Substanzen gefunden als normal (z. B. für Methylenblau). Indikan ist prognostisch ungünstig, bei schweren Erkrankungen vorhanden, wie Blutfleckenkrankheit, croupöser und gangränöser Pneumonie, Dummkoller, infektiöse Anämie, Zystitis, vorübergehende Kolik (starke Gärungen). Bilirubin kommt im Pferde Serum normalerweise vor (Hammarsten). Es ist vermehrt bei allen Erkrankungen, die eine Gallenstauung und Schädigung der Leber haben. Bei croupöser Pneumonie ist der Bilirubinspiegel proportional dem Verlauf der klinischen Entleerungen; so ist auch bei Bronchopneumonie, Verlagerungen, d. h. bei den dadurch eingeleiteten Schleimhautentzündungen, konstant erhöht. Er deutet auf eine erhöhte Zerstörung der Erythrozyten hin. Keine Erhöhung der Bilirubinwerte sieht man bei Krankheiten der Harnorgane und des Gehirnes; im Stadium der fortschreitenden perniziösen Anämie ist der Bilirubingehalt erhöht, nach dem Stillstand aber vermindert. Bei Kälbern findet man bei Blutarmut auch subnormale Bilirubinwerte. Das Bilirubin wird sehr wahrscheinlich in alkalischem Gewebe aus dem Hämoglobin gebildet. **Urobilin** ist bei den Haustieren ebenfalls im Harn vorhanden, er konnte im Blut nicht gefunden werden. An Orten stärkster Gärung (Colon) ist mehr nachzuweisen als z. B. im Dünndarm. Die Werte sind aber sehr klein. Bei allen Erkrankungen, die mit Zersetzung des Blutes verknüpft sind (Zerfall der Erythrozyten), speziell die infektiöse Anämie, findet man dann erhebliche Steigerung des Bilirubins. Diesem Farbstoff kommt bei der infektiösen Anämie der Pferde diagnostische Bedeutung zu; auch kann man den Verlauf der Therapie in Bezug auf den Einfluß auch den Blutchemismus prüfen. Eiweißveränderungen lassen sich dann durch fortgesetzte Refraktometrie sehr schön verfolgen und ergaben auch bei verschiedenen andern Krankheiten, die mit Blutveränderungen einhergehen können, Veränderungen der Zahlen. Allgemein kann man sagen, daß Erhöhung prognostisch nicht günstig ist. — Da diese Ergebnisse im Zusammenhang mit der genauen klinischen Beobachtung verbunden sind, haben sie mehr als bloß theoretisch wissenschaftliches Interesse. Deshalb sei, namentlich in Bezug auf die im beigegebenen Tabellen-Material parallel angegebenen klinischen und chemischen Befunde bei den verschiedenen Krankheiten zudem auf das Original verwiesen, das auch viele weitere Auswertungsmöglichkeiten der Ergebnisse für

die Diagnostik innerer Krankheiten enthält, auf die hier nicht eingegangen werden kann. H. Graf

Krupski, A.: Chemische und chemisch-physikalische Untersuchungen in der internen Veterinärmedizin.

II. Das Verhalten des Bilirubins im Blutstrom des Kalbes.

(Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1927, Bd. 69, S. 577—614.)

Nach R a n c soll Gallenfarbstoff der einzige Serumfarbstoff beim Pferde darstellen, beim Rind soll Karotin der wesentliche Farbstoff sein (Palmer, Eckles). Nach H. Escher ist der gelbe Farbstoff des Corp. luteum identisch mit Karotin. Beim Rinde kommen aber auch sehr geringe Mengen von Bilirubin vor (6,25 mg/100 ccm Serum). Beim Kalb ist der Bilirubinwert etwa verdoppelt, noch größer beim neugeborenen Tiere. Möglicherweise hängt die Abnahme mit zunehmendem Lebensalter zusammen mit der Abnahme des Hämoglobins (bis zwei Jahr). Die zahlreichen K's. haben durchschnittlich pro 100 ccm Serum 10 mg Brb. ergeben. Die fog. roten Kälber haben keine durchschnittlich höheren Werte, die fog. weißen Kälber zeigen etwas niedrigere. Die Tiere mit „grünen Nieren“ haben merkwürdigerweise keinem bedeutend höheren Bilirubin-Spiegel. Subnormale Werte zeigen chronische Gastritis, Tuberkulose, Pneumonie, tritt aber eine Leberveränderung hinzu, so erhöhen sie sich, vielleicht durch Infizierung der Leberzellen. Bei Flecknieren mit akzidenteller Thymusinvolutions und sekundärer Anämie vermindert sich der Bilirubingehalt sehr deutlich. Die größten Bilirubinreste findet man bei Nabel- und Leberveränderungen (Leberabszesse, Hepatitis), Polyarthrit und bei Gelbfucht. Beim Pferde sind die Schwankungen deutlicher als beim Rind. Bei Ikterus des Kalbes ist die Erhöhung merkwürdigerweise nicht immer proportional für Veränderung des Blutes. Man kann bei Niere und Leber auch Schwankungen des Urobilingehaltes feststellen, indessen wird durch weiteres Material vielleicht ein direkter Zusammenhang zwischen Farbstoffgehalt und pathologischer Veränderung aufgeklärt werden. (Sehr viele Tabellen.) H. Graf.

Hummelet: Die Beeinflussung der Gehirnhyperämie (Gehirnkongestion) des Hundes mit Luminal-Natrium. (B. T. W. 1927, S. 735.)

Nach den Beobachtungen des Verf. kommt beim Hunde eine primäre, d. h. mit andern Organerkrankungen nicht im Zusammenhange stehende Gehirnkrankheit vor, die nur bei Hunden bis zu einem Jahr hauptsächlich im Sommer beobachtet wurde. Ursache meist unbekannt, doch sind zwei Fälle festgestellt, bei denen das Leiden durch Erschrecken ausgelöst wurde. Die Erscheinungen sind folgende: Beim Spazierengehen beginnt der Hund plötzlich zu rasen und rennt heulend und schreiend ziellos umher. Er rennt gegen deutlich erkennbare Hindernisse, ohne auf eine unter Umständen eintretende Verletzung zu achten. Sucht man das Tier zu fangen, so beißt es nach seinem Besitzer und nach allem, was man ihm entgegenhält. Nach einem Exzitationsstadium von 30—60 Minuten tritt Depression ein, womit das Aufhören des irren Kläffens verbunden ist. Mitunter werden auch tonisch-klonische Krämpfe im Gefolge der Krankheit beobachtet. Letztere wurde schon mit Tollwut verwechselt, um so mehr, als die Lehrbücher keine bestimmte Angaben über dieselbe machen. Als neue Bezeichnung für das Leiden schlägt Verf. Mania furiosa canis juvenilis vor.

Bei der Behandlung des Leidens hat sich Luminal-Natrium besonders geeignet erwiesen, das in der Humanmedizin die gegen Migräne und Epilepsie seither verordneten Bromsalze fast ganz verdrängt hat. Das Mittel besitzt eine relativ große Ungiftigkeit und wird in der Dosis von 0,22 (Inhalt einer Ampulle) in 1 ccm Wasser gelöst mittelgroßen Hunden subkutan injiziert. Doggen kann man unbedenklich den Inhalt von zwei Ampullen verabreichen. Die beruhigende Wirkung tritt nach 15—45 Minuten ein und äußert

sich im Nachlassen des Kläffens und Tobens. Später schläft der Patient mehrere Stunden und ist damit in der Hauptsache geheilt. Auf Grund dieser guten Erfahrung wandte Verf. das Präparat mit ähnlichem Erfolg auch bei Eklampsie der säugenden Hündinnen, bei Epilepsie und nervöser Staupe an. Eine schmerzlose Tötung von Hunden im Beisein des Besitzers läßt sich dadurch erzielen, daß man zuerst zwei Ampullen Luminal-Natrium injiziert und dann nach Eintritt des Dämmerzustandes den Tod durch eine überdosierte Chloroformnarkose herbeiführt. Carl.

Jacobi: Transporteinrichtung in Tierlazaretten. (Wiener t. Mschr. 1928, XV. Jhg., S. 58.)

Verf. empfehlen einen von der Demag, Duisburg, gebauten fahrbaren Elektroflaschenzug mit Handfahrwerk, an dem sich eine Aufhängevorrichtung für Pferde befindet, als praktisches Transportmittel für Tierlazarette. Berge.

Krieger: Ein Beitrag zur Lichttherapie. (Zschr. für Vet.-Kunde 1927, Jhg. 39, H. 10, S. 427—434.)

Die Methoden des Brennens, der scharfen Einreibung, der Prießnitzschen Umschläge, der heißen Kataplasmen stellen nichts anderes in den Vordergrund als die Erzielung einer Blutüberfüllung im Bereich des erkrankten Bezirkes. Einigen von ihnen haften immerhin Nachteile an (vorübergehende oder bleibende Veränderungen, Narben, Haarausfall, Pigmentverlust). Eine Möglichkeit, solche Fehler bei der Hyperämieerzeugung zu umgehen, bietet die Verwertung von Wärmequellen, die durch Bestrahlungslampen hervorgebracht werden (Solluxlampe der Hanauer Quarz-lampengefellschaft). Wenn sich durch die Versuche des Verfassers (in vier Fällen) auch ein abschließendes Urteil noch nicht abgeben läßt, so kann das Urteil K i n d e r m a n n s, daß die Solluxlampe eine höher zu bewertende Hyperämie zu erzeugen vermag, als unsere gebräuchlichsten Medikamente, indes vollauf bestätigt werden. Vor allem wertvoll ist die Tiefenwirkung dieser leuchtenden Wärmestrahlen für die Veterinärchirurgie, die diese Intensität höchstens mittels des perforierenden Brennens erreichen kann. Die während der Bestrahlung von entzündlichen Prozessen in Erscheinung tretende Prominenz der Wunde, die förmlich den Lichtstrahlen entgegenquillt, kann nur erfolgen, wenn auch die unter der Wunde gelegenen, tieferen Gewebsbezirke durch die Bestrahlung hyperämisiert werden. Ein weiterer Nutzen besteht in der Nachhaltigkeit der Bestrahlung, die am besten an dem stundenlang währenden, reichlichen Sekretstrom mit Abstoßung von nekrotischen Gewebsetzen nach der Bestrahlung bemessen werden kann und nicht zuletzt in den schmerzlindernden Eigenschaften, die besonders in drei Fällen die bestandene hochgradige Stützbeinlahmheit bzw. das Belastungsunvermögen der Gliedmaße schon nach der ersten Bestrahlung wesentlich gemildert bzw. gebessert hat. A.

Sington: Über einen Fall von fog. „Ohrfistel“ eines Pferdes. (Zschr. für Vet.-Kunde 1927, Jhg. 39, H. 8, S. 356—358.)

Als „Ohrfistel“ bezeichnet man die bei Pferden in der Gegend des Ohrgrundes vorkommenden Zahnbalgfisteln (nach Fröhner: Dermoidzysten, die als Kiemenfurcinteratome aufzufassen sind). Im vorliegenden Falle lautete die Diagnose bei einer Remonte zunächst: Fistel am linken Ohrgrund; Verdacht auf Vorliegen eines „Urzahnes“. Eine Sondierung am stehenden Pferde wurde nicht vorgenommen, am niedergelegten Pferde ergab das Sondieren keinen Anhalt, erst nachdem der Kanal in ganzer Länge geöffnet wurde, fühlte man in Richtung auf das Kiefergelenk ein rundliches Gebilde mit teilweiser rauher Oberfläche, das mit der Umgebung derb bindegewebig verwachsen war. Freipräparieren und Abbrechen mit der Knochenzange förderte einen „Zahn“ zutage, dessen Kaufläche schräg nach hinten und oben gerichtet gewesen war; er hatte eine fast kugelige Gestalt und einen Umfang von 8—9 mm. Auf der feiner Unterlage abgekehrten Seite sah man deutlich Schmelzfalten.

Die Verbindung mit dem Schläfenbein war kelchartig. Der knöcherne Kelch wurde mit dem scharfen Löffel abgetragen und nach Tamponade offene Wundbehandlung eingeleitet. Nach etwa fünf Wochen war die Wunde bis auf eine zehnpfennigstückgroße Stelle verheilt. Bemerkt sei noch, daß die Fistel vorher zweimal, zum ersten Male im Jahre 1925 operiert wurde, aber nach einiger Zeit wieder aufgetreten war.

A.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Brill, Rudolph: Über den Bau der Gallensteine.

(Aus dem Forschungslaboratorium Oppau der I. G. Farbenindustrie A.-G.) (Naunyn-Schmiedebergs Arch. für exp. Pathol. und Pharmakologie 1927, 127. Bd., 1/2. Heft, S. 1—5.)

Schon Naunyn und Goldschmidt sind auf die Ursachen für die Entstehung des merkwürdigen tetraedrischen bzw. würfelförmigen Habitus der Gallensteine näher eingegangen. Die Feinstruktur der Schichten, die die Gallensteine aufbauen, sind vom Verf. mittels einer genau beschriebenen Methodik röntgenographisch untersucht. Aus den durch Bestrahlung in den verschiedenen Richtungen erhaltenen Diagrammen geht hervor, daß die Schichten der Gallensteine die gleiche Kristallanordnung (Faserstruktur) erkennen lassen, wie die Naturfasern Seide und Zellulose. Die Gallensteine aufbauenden Kriställchen sind regelmäßig angeordnet, und zwar so, daß bei allen ein und dieselbe Faserachse senkrecht zur Schichtebene steht. Die Schichten, aus denen die Gallensteine aufgebaut sind, bestehen aus submikroskopisch kleinen Cholesterinkriställchen. Durch die Faserachse ist die Richtung kleinster Wachstumsgewindigkeit des Cholesterinkristalls gegeben. Weiter ist ein Deformationseffekt gefunden, der darauf hindeutet, daß die äußere Gestalt der Gallensteine durch Druckwirkung entstanden ist.

R. Völker (Leipzig).

Harms, H.: Untersuchungen über die Lungenatelektase bei Schlachtschweinen. (In.-Diss. Leipzig 1927.)

In allen untersuchten Fällen handelt es sich um Zustände in Schweinelungen, die auf Grund des makroskopischen Befundes als Atelektase bezeichnet werden und ihren Sitz besonders in den Anhangslappen der sog. dreikantigen Spitze und mitunter auch am scharfen Rande der Hauptlappen haben. Durchweg kleineres Volumen, unter dem Niveau des anschließenden, normalen und lufthaltigen Gewebes gelegen, Farbe blaurot wechselnd nach Blutgehalt zwischen braun und graurot, Konsistenz fest, derb, fleischähnlich, Lungenüberzug glatt, glänzend und durchscheinend, kleine Stückchen sinken im Wasser unter, sie sind luftleer, Schnittfläche nur mäßig feucht, meist entleert sich erst bei feistlichem Druck aus den Bronchien eine graue, trübe, zähschleimige Flüssigkeit, in Tropfenform hervortretend; an vielen Bronchien ist die Schleimhaut verdickt. Bei der mikroskopischen Untersuchung finden wir in allen Fällen die Bronchien und Bronchiolen im Zustand der Entzündung, starke zellige Infiltration. Diese entzündlichen Erscheinungen stehen im Vordergrund besonders in den kleineren Bronchiolen und Bronchien und sind als Ursache der über größere und kleinere Lungenabschnitte ausgebreiteten atelektatischen Veränderungen anzusehen; es handelt sich also um eine erworbene Atelektase. Die Ursache der so häufig vorkommenden Bronchitiden ist noch ungeklärt (als solche kämen außer thermischen, chemischen und bakteriellen Reizen auch Parasiten in Frage (Strongylideninvasion). Die bronchitischen Veränderungen stellen demnach das Primäre dar und der Ansicht Simader's, daß der größte Teil der bei Schweinen so häufig vorkommenden luftleeren und wenig voluminösen Herde an den schlecht ventilierten Anhangslappen der Lunge angeborene Atelektase sei, kann nicht beigetreten werden. Simader glaubt, angeborene Atelektase vor sich zu haben, wenn die Lunge außer den charakteristischen Veränderungen ihrer kleinen Lappen in ihren

übrigen Teilen normal ist, oder aber wenigstens der an das atelektatische Gebiet direkt anstoßende Teil der Bronchien unverändert erscheint. Er gibt zwar zu, daß die atelektatischen Zustände häufig mit bronchopneumonischen Prozessen vergesellschaftet seien, diese seien jedoch sekundärer Natur, indem nachträglich Entzündungserreger in das atelektatische Gebiet hineingelangen. Diese Annahme bezeichnet schon Nieberle als etwas sehr willkürliches. Sie widerspricht auch der heute allgemein anerkannten Ansicht von der Pathogenese der Bronchopneumonie. Diese beginnt stets mit einer Erkrankung der Bronchien und Bronchiolen und setzt sich von hier aus auf das Alveolargewebe fort. Dem bronchogenen Charakter der Entzündung entsprechend, wird die Entzündung des Lungengewebes daher stets bzw. mit Vorliebe lobulär begrenzt auftreten, und erst späterhin kann der Prozeß sich über einen ganzen Anhangslappen ausdehnen. Die angrenzenden Lungenläppchen werden jedoch stets mehr oder weniger unverändert vorgefunden. Das Ergebnis der Untersuchungen berechtigt also zu dem Schluß, daß es sich bei den bei Schlachtreifen Schweinen so häufig vorgefundenen atelektatischen Lungenveränderungen um Folgezustände entzündlicher Veränderungen der Bronchien und ihrer Komplikationen handelt.

A.

Commichau, C.: Über die knotigen Hyperplasien der Nebennierenrinde bei Hunden, sogenannten kortikalen Hypernephrome. (In.-Diss. Leipzig 1927.)

In der Nebennierenrinde alter Hunde, die das zehnte Lebensjahr überschritten haben, werden (67 Prozent durchschnittlich bei männlichen, etwas mehr bei weiblichen) geschwulstähnliche knotige Neubildungen von Hirsekorn- bis Haselnußgröße in der Ein- und Mehrzahl ein- und beiderseitig gar nicht selten angetroffen (beiderseitig - multiples Auftreten wiegt vor). Von einem vermehrten Vorkommen bei dieser oder jener Rasse kann nicht gesprochen werden. Die rundlich-ovalen, lebhaft graugelblich bis buttergelb gefärbten Knoten liegen zumeist in der Nebennierenrinde eingeschlossen (weiche bis festweiche Konsistenz, matt glänzende Schnittfläche, homogene Beschaffenheit, keine Gestaltsveränderungen des Organs hervorruhend, nur vereinzelt über Oberfläche hervorragend). Der histologische Aufbau gleicht oder ähnelt dem verschiedener Zellschichten der normalen Nebennierenrinde. Vorherrschend zeigen die Neoplasmen gemischtzelligen Charakter vom Typus der Zona fasciculata-reticularis; solche vom Typus der Zona arcuata kommen ungleich seltener vor. Eine besondere Eigenart gegenüber normalen Zellen besteht in ihrem höheren Fett- und Lipoidgehalt; an einer Anzahl von Neubildungen sind zystische Hohlraumbildungen im Gewebe vorhanden mit strukturloser homogener Masse oder fettigem Detritus als Inhalt (nekrotische Fettinfiltration der Zellen). Die Stellung der gutartigen Nebennierenneubildungen in der Onkologie ist umstritten; sie werden bald für echte Geschwülste, bald für knotige Hyperplasien gehalten. Nach den von C. dahingehenden Untersuchungen können sie beim Hund nicht als kortikale Hypernephrome, Nebennierenrindenadenome oder Nebennierenrindenstrumen aufgefaßt werden. Es sind vielmehr meist multipel auftretende knotige Hyperplasien verschiedener Zellschichten der Rindensubstanz. Ihre Entstehung auf embryonal isolierte Zellkeime im Sinne Cohnheim's oder auf Strukturanomalien im Sinne Albrecht's zurückzuführen, kann nicht abgestritten werden und mag vielfach berechtigt sein. Die Befunde deuten jedoch noch auf andere Entstehungsursachen hin. Das ausschließliche Vorkommen der knotigen Hyperplasien beim Hunde im Senium läßt vermuten, daß in der Involutionsperiode das alternde Rindengewebe (wahrscheinlich im Sinne einer Leistungsminderung) nicht mehr funktionell vollwertig ist. Der funktionelle Defekt wird durch regenerationsartige Zellwucherungen, die sich in diffuser oder knotiger Form darbieten, ausgeglichen. Man findet auch

bei alten Hunden häufig in anderen Organen (Leber, Milz, Pankreas, Prostata, Schilddrüse) solche Hyperplasien mit denen in der Nebennierenrinde vergesellschaftet. Die Nebennierenhyperplasien lösen am lebenden Tier keine klinischen Symptome aus. Sie werden weder durch anderweitige pathologische Zustände hervorgerufen, noch auch gibt ihre Anwesenheit Anlaß zu krankhaften Veränderungen. Sie stellen Zufallsbefunde bei alten Hunden dar. A.

Kokkonen, A.: Zur Pathologie der Genitalorgane des weiblichen Rindes mit Berücksichtigung der Histologie des Eileiters. (In.-Diss. Leipzig 1927.)

Es handelte sich um Mißbildungen und Bildungsanomalien der Eileiter, Zystenbefunde, Tubenerkrankungen bei Uterusleiden, entzündliche Prozesse zur Verlegung des Tubenlumens, Veränderungen infolge Krankheiten der Ovarien (Zysten), Salpingitis, die nur mikroskopisch zu erkennen war ohne makroskopisch nachweisbare Veränderungen, tuberkulöse Erkrankungen der Eileiter (erheblicher Prozentsatz). Die Untersuchungen ergaben, daß bei Färsen, besonders aber bei älteren Kühen Tubenanomalien und -Erkrankungen vorkommen, die eine absolute oder relative Sterilität bedingen können, ohne daß man imstande ist, viele von ihnen klinisch zu diagnostizieren. Auf Grund der Untersuchungsergebnisse ist — in Übereinstimmung mit dem Bilde, das aus der neueren Literatur gewonnen worden ist — festzustellen, daß die Tubenerkrankungen hinsichtlich der Sterilität des Rindes neben den Gebärmutter- und Ovarialleiden viel mehr Beachtung verdienen als ihnen früher geschenkt wurde, und daß ihr Anteil an den Sterilitätsursachen unbedingt anerkannt werden muß. Daß diese Erkrankungen bei den Rindern zahlreicher vorkommen als beim Pferde, ist auffällig. Dieser große Unterschied zwischen unseren zwei wichtigsten Haustieren ist zum Teil in der Verschiedenheit im Bau des ganzen Genitales dieser Tiere zu suchen. Die große Prädisposition für diese Erkrankungen beim Rinde ist wohl aber in der Hauptsache in dem ungleich größeren Gebrauche des Geschlechtsapparates und in der öfteren Infektion von der Gebärmutter und vom Peritoneum aus gegeben. A.

Häussermann, H.: Beitrag zur Kenntnis der Adenome in der Lunge bei Tieren (Hund, Schaf). (Inaug.-Dissertation Leipzig 1927.)

Primäre Lungentumoren sind bei den Haustieren ähnlich wie beim Menschen ziemlich selten. In der vorliegenden Arbeit werden vier Fälle von Adenoma papilliferum in der Lunge vom Hund beschrieben. Sie zeigen sowohl makroskopisch wie mikroskopisch einen im wesentlichen übereinstimmenden Bau. Sie stellen verschieden große, grauweiße, derbe, knollige Geschwülste dar, die scharf gegen das Lungengewebe abgegrenzt sind und auf dieses eine kompressive Wirkung ausüben. Sie bestehen, wie die histologische Untersuchung zeigt, aus Drüsenhöhlenräumen mit papillenförmigen Einstülpungen, die entweder leer oder mit einem scheinbar schleimhaltigen Sekret gefüllt sind. Ihre epitheliale Auskleidung wird von mehr oder weniger hohen Zylinderepithelzellen gebildet, die den flimmerlosen Epithelien der Bronchiolen und deren Endverzweigungen ähneln. Über die Histogenese dieser Geschwülste scheint ein im Fall 2 näher beschriebenes adenomartiges Knötchen Aufschluß zu geben. Danach scheinen die Tumoren aus den Bronchioli respiratorii, Alveolengängen und Infundibeln ihren Ausgang zu nehmen; vielleicht über die Zwischenstufe einer Metaplasie der Epithelien der genannten Abschnitte des Bronchialbaumes. Die Ätiologie dieser Adenome ließ sich nicht aufklären. Chronisch entzündliche Veränderungen fehlen. Die in Schaffungen zuweilen zu beobachtenden adenomähnlichen Bildungen sind keine echten Adenome, sondern auf Grund einer chronischen Bronchitis und Bronchiolitis, die durch Parasiten (Strongylisten) verursacht worden sind, entstandene

Wucherungen und Metaplasien der Epithelien der Alveolargänge, Infundibeln und Alveolen selbst. A.

Bernhardt: Die akute Leberatrophie des Pferdes. (T. R. 1928, S. 341.)

Verf. hat fast jedes Jahr am Anfang des Herbstes Gelegenheit, einige Fälle akuter gelber Leberatrophie beim Pferde zu beobachten. Diese Krankheit wird häufig mit der subakuten Gehirnentzündung verwechselt. Differentialdiagnostisch von Bedeutung sind: der stürmische Verlauf, die schon 5—6 Stunden nach dem Verfagen des Haferfutters (Heu wird noch mit gutem Appetit gefressen) auftretenden Gehirnstörungen, die in der Regel schon im Verlauf von 24 Stunden zum Tode führen, die frühzeitige bräunlichgelbe Verfärbung der Lidbindehäute bei normaler Körpertemperatur und die dunkelgrüne Färbung des Harnes. Wenn die Tiere zum Liegen kommen, liegen sie im Gegensatz zu geistig kranken ruhig und verenden bald. Die Leber ist auffallend verkleinert und weist herdförmige Degenerationen auf. Im Gehirn fehlen rein vaskuläre, entzündliche Veränderungen. Verf. hält die Krankheit für eine Vergiftung durch irgendeine Pflanze, da sie nur im Herbst und dann nur vereinzelt und an Orten, die räumlich weit auseinander liegen, vorkommt. Durch die bakteriologische Untersuchung und Übertragungsversuche konnten keine ätiologischen Zusammenhänge gefunden werden. K. H. Meyer.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Ergänzung des Viehseuchengesetzes.

Der Reichstag hat am 11. Juli 1928 nach der ersten, zweiten und dritten Beratung und nach Zustimmung des Reichsrats das folgende, vom Reichsministerium des Innern auf Anregung Württembergs eingebrachte Gesetz beschlossen:

§ 1. Das Viehseuchengesetz vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzbl. S. 519) wird geändert wie folgt: 1. Dem § 1 Abs. 2 des Gesetzes werden die Worte angefügt: „sowie der Bienen“. 2. Hinter dem § 81 des Gesetzes wird folgender § 81a eingefügt: „Die Bekämpfung der Bienenseuchen kann abweichend von den Vorschriften dieses Gesetzes landesrechtlich geregelt werden“.

§ 2. Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

In der Begründung heißt es: „Durch die vorgeschlagene Ergänzung des Viehseuchengesetzes tritt eine Änderung des gegenwärtigen Zustandes hinsichtlich der Bekämpfung der Bienenseuchen an sich nicht ein. Die Bestimmungen des Viehseuchengesetzes finden vielmehr auch nach Durchführung der vorgeschlagenen Ergänzung auf die Bekämpfung der Bienenseuchen nur dann und nur insoweit Anwendung, als auf Grund des von einem Lande gestellten Antrags für dessen Staatsgebiet bestimmte Bienenseuchen durch besondere Verordnung des Reichs gemäß § 10 Abs. 2 des Viehseuchengesetzes als anzeigepflichtige Krankheiten erklärt worden sind. Die Weitergeltung der in den Ländern bestehenden landesrechtlichen Vorschriften, sowie die Möglichkeit des Erlasses neuer Vorschriften auf dem bisherigen Wege, soll durch Einfügung des § 81a ausdrücklich klargestellt werden.“ G.

Magnusson, H.: Är renen mottaglig för mul- och klövsjuka? (Ist das Renttier für Maul- und Klauenseuche empfänglich?) (Meddelanden från veterinärbakteriologiska anstalt XXXV.) (Mitteilungen der staatlichen veterinärbakteriologischen Anstalt.)

(Mit 5 Abbildungen.)

Die Maul- und Klauenseuche des Renttieres wurde bereits 1863, 1864, 1873 in den Berichten verschiedener Länsveterinäre erwähnt, jedoch hat sich bei genauerer Betrachtung der verschiedenen Krankheitsercheinungen ergeben, daß es sich dabei um andere Krankheiten, und zwar um eine durch Nekrosebazillen verursachte progressive Nekrose gehandelt hat. Bisher ist es, soweit sich die Literatur übersehen läßt, nicht gelungen, Maul- und Klauenseuche bei den in Freiheit lebenden Renttieren nachzuweisen. Dagegen ist es Dewel und Ekert gelungen, Renttiere, die in der Gefangenschaft gehalten wurden, so-

wohl durch künstliche Übertragung als auch durch Kohabitation mit krankem Rindvieh zu infizieren. Weil aber im Jahre 1925, in dem die Maul- und Klauenfeuche in Dänemark sehr stark verbreitet war und bösartig verlief, im Zoologischen Garten zu Kopenhagen die dort gehaltenen sechs Rentiere nicht an Maul- und Klauenfeuche erkrankten, obwohl sie denselben Wärter hatten wie die an der Seuche leidenden beiden Buckelochsen und drei Büffel, so halten Prof. C. O. Jensen und Prof. Folmer Nielsen die Rentiere nicht besonders empfänglich für Maul- und Klauenfeucheansteckung. Um nun über diese Frage Aufschluß zu bekommen, stellte der Verfasser eigene Übertragungsversuche an.




Abb. 1.

Bild aufgenommen 18 Tage nach Auftreten der Blasen. Neues Horn hat sich an Ballen und in der Sohle gebildet. Das alte löst sich am oberen Rande.

Zwei weibliche Rentierkälber Nr. 1 und Nr. 2 im Gewicht von 19 und 14 kg wurden in ein Gehöft gebracht, wo an demselben Tage die Maul- und Klauenfeuche festgestellt worden war. Es zeigten sich bei verschiedenen Rindern nicht geborstene Blasen, große Wunden in der Nase und in der Maulhöhle sowie zahlreiche Blasen an den Strichen. Die Klauen waren wenig angegriffen. Das größte Rentierkalb, Kalb Nr. 1, wurde an der Dentalplatte oberflächlich skarifiziert, und dann rieb man mit zerfchnittenen Epithelstücken einer schwer erkrankten Kuh ein. Gleichzeitig wurden auch 18 noch nicht erkrankte Rinder auf dieselbe Weise infiziert. In der Boxe der Rentierkälber wurde unter die Streu auch etwas mit Speichel der spontan erkrankten Kuh verunreinigtes Stroh und Heu gemischt. Vor dem Infektionsversuch wechselte die Temperatur der Rentiere zwischen 38,5 Grad und 39,6 Grad. Die normale Temperatur beträgt sonst etwa 38,5 Grad. Der Appetit der Tiere war gut, sie waren lebhaft und sprangen sofort auf, als man ihnen Futter anbot. 36 Stunden nach der Impfung zeigte das geimpfte größte Kalb deutliche, mit Blasen gefüllte Wundränder längs des Impfschnittes. Nach 48 Stunden betrug die Temperatur 40,1 Grad. Am ganzen Körper



Abb. 2.

Wunde infolge von Blasen an den Ballen der Hauptklauen. Schutzhaare abgeschnitten.

zeigten sich Zuckungen, die Schüttelfrösten gleichen. Das Tier war müde und schläfrig und fraß weniger. Am nächsten Tage war das Allgemeinbefinden wie gewöhnlich. Die Temperatur sank am Abend auf 38,9 Grad. Die Impfblase war so groß wie ein Einörstück. Sie war geborsten, und die Wunde war mit einem gelblichen, nekrotischen Epithelrest bedeckt (siehe Fig. 3). Das Tier speichelte nicht stärker. Am fünften Tage stieg die Temperatur von neuem auf 40,6 Grad, sank am Vormittag des siebenten Tages auf 40 und am Nachmittag auf 38,9 Grad. Gleichzeitig waren Blasen, die an den Ballen bereits geborsten waren, an den Haupt- und Afterklauen beider Hinterfüße und an den Hauptklauen beider Vorderfüße zu sehen. Zwischen den Klauen und vorn an der Krone wurde nichts bemerkt. Bei äußerer Beobachtung wurden, da die langen Haare die Ballen bedeckten, keine Krankheitszeichen, weder Lahmheit noch erschwelter Gang, bemerkt. Bei oberflächlicher Betrachtung der Füße sah man, daß sie durchfeuchtet waren. Erst wenn man die Haare abhob, sah man die Wunden sehr deutlich (siehe Fig. 2). Sobald die Sekundärblasen barsten, sank die Temperatur auf die Norm und schwankte dann zwischen 38 und 39 Grad. Die Wunden heilten rasch. In der Maulhöhle war die Wunde am 7. Tage verheilt. An einem Teil der Klauen, an der linken inneren Vorderklaue und an beiden rechten Hinterklauen (siehe Fig. 1), löste sich das Horn an den Ballen und an der Sohle, und neues Horn schob sich vor. An den übrigen Klauen wechselte das Horn nicht. Der Hornraum über den Klauenrändern zeigte keine Ringbildung. Das Tier hatte 4 kg zugenommen.



Abb. 3.

Maul- und Klauenfeuche beim Rentier.
Impfaphthen am dritten Tag nach der Skarifikation.
Auftreten von Impfaphthen. Nach Aquarell.

Beim zweiten nicht geimpften, jüngeren Rentierkalb, dessen normale Temperatur höher war als die des vorerwähnten Tieres, stieg die Körperwärme am Vormittag des vierten Tages auf 39,6 Grad und am Abend auf 40 Grad. Am fünften Tage betrug sie 40,3 Grad. Gleichzeitig bildeten sich Blasen an den Ballen sämtlicher Hauptklauen. An den Afterklauen war nichts zu sehen. Vor der Zungenwulst fand sich eine geborstene Blase von der Größe eines Zweieörstückes. Das Allgemeinbefinden des Tieres war nicht gestört. Appetit und Beweglichkeit waren wie gewöhnlich. Nur am 7. Tage zeigte sich rechts hinten eine unbedeutende Lahmheit. Speicheln oder erschwerte Futteraufnahme war nicht zu bemerken. Die Wunde heilte schwach. Am 8. Tage nach dem Einstellen war die Temperatur normal. Nach

15 Tagen waren die Wunden an den Ballen verheilt, nur an der linken inneren Vorderklaue erneuerte sich das Horn an den Ballen und an der Hornsohle. Das Tier hatte 4 kg zugenommen. Die Temperaturkurve dieses Tieres zeigte nur eine Spitze, diejenige des geimpften Tieres dagegen zwei Spitzen, eine im Zusammenhang mit dem Eintritt der Impfblase und eine in Verbindung mit dem Erscheinen der Sekundärblafen (siehe Fig. 4 und 5). Um nachzuweisen, daß




Abb. 4. Renntier Nr. 1 (Impfversuch).




Abb. 5. Renntier Nr. 2 (Spontane Infektion).

die erkrankten Renntiere wirklich mit dem Maul- und Klauenfeuchevirus infiziert waren, wurden Überimpfungen auf zwei Meerschweinchen, Reinfektionsversuche und Serumuntersuchung vorgenommen. Mit dem Blasenepithel des größeren Renntieres wurde mittelst Skarifikation an der Fußsohle ein Meerschweinchen geimpft. Es bildeten sich örtliche Blafen und Sekundärinfektion war nachzuweisen. Von dem kleineren Renntier wurde am dritten Tage nach dem Auftreten der Blafen an den Klauen Lymphe aus einer der Klauenblase entnommen, und damit wurde ein Meerschweinchen in der eben beschriebenen Weise geimpft. Am zweiten Tage traten eine große Impfblase und am vierten Tage sekundäre Blafen an den Vorderfüßen auf.

Die genesenen Renntiere wurden nun aufs genaueste durch Skarifikation an der Dentalplatte und vermitteltst Einreibung einer für Rindvieh und Meerschweinchen virulenten Lymphe geimpft. Das jüngere Renntier wurde nur einmal mit Virus Ettarp I, das andere Renntier zunächst mit Virus Ettarp I, elf Tage später mit Virus von der Epizootie von 1925 und 13 Tage darauf mit Virus Ettarp II geimpft. Keinmal, nicht einmal an der Impfstelle, zeigte sich eine Wirkung. Es bestand also über drei Monate absolute Immunität bei dem größeren Renntier. Das jüngere Renntier zog sich später einen Darmkatarrh zu und starb 29 Tage nach der Impfung.

Zum Serumversuch wurde Viruslymphe von Meerschweinchen, dritte Passage von einer in Glycerinwasser aufbewahrten Blafenwand einer Kuh verwendet. Es war dasselbe Stallvirus, mit dem die Renntiere mit Erfolg infiziert worden waren. Die Meerschweinchen wurden an der skarifizierten Fußsohle beider Hinterfüße geimpft. Von den

beiden Meerschweinchen reagierte bei der ersten Impfung das eine gar nicht, das andere bekam örtliche Blafen. Mit der nächsten Passage entstand Generalisation am dritten Tage und mit der dritten Passage Generalisation in 36 Stunden. Das Serum von dem größeren Renntier, das verflucht werden sollte, war 54 Tage nach der Generalisation abgenommen worden. Die Meerschweinchen erhielten subkutan 2,1 und 0,5 ccm Serum und eine Weile darauf wurden sie kutan an beiden Plantae pedis der Hinterfüße mit einer Mischung der Blafenwände und Viruslymphe von Meerschweinchen 390 in ungefähr der gleichen Gewichtsmenge Glycerinwasser geimpft. Zum Vergleich wurden auch Löffler Serum und Rekonvaleszenten Serum verwendet. Zur Kontrolle wurden vier Meerschweinchen 3 und 2 ccm normales Pferde Serum verabreicht.

Durch das Rekonvaleszenten Serum vom größeren Renntier wurde Generalisation bei drei von sechs Meerschweinchen verhindert. Dabei wurde bei einem Meerschweinchen, das nur 0,5 ccm erhalten hatte, keine Generalisation beobachtet, im Gegensatz zu den beiden anderen. 2 ccm schützten das eine damit geimpfte Meerschweinchen, 1 ccm schützte das eine, nicht das andere. Bei allen drei Meerschweinchen stellte sich die Generalisation aber später ein als bei den vier Kontrollmeerschweinchen.

Um die Pluralität des Virus zu studieren, wurde in einer anderen Versuchsreihe des Rekonvaleszenten Serums des Renntieres mit Rekonvaleszenten Serum von einer Kuh, die im Sommer 1926 mit einer von Prof. Karl Kling aus einer Epizootie des Jahres 1925 konservierten Virusvariante infiziert worden war. Es waren 2 ccm des Serums vom Renntier nötig, um die Generalisation zu verhindern. Bei 1 ccm stellte sich Generalisation erst am fünften Tage ein. Das Rekonvaleszenten Serum der eben erwähnten Kuh schützte überhaupt nicht, bei sämtlichen sechs Meerschweinchen, auch bei denen, die 2 ccm Serum erhielten, stellte sich bereits am dritten Tage Generalisation ein. Baß.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Priebus: Die Befeitigung der Nymphomanie bei Stuten durch Kastration. (Zschr. für Vet.-Kunde 1927, Jhg. 39, H. 8, S. 343—355.)

Die Kastration der Stuten wird auf drei verschiedene Methoden vorgenommen. Man kann von der Scheide; von der Flanke und vom Leistenkanal aus in die Bauchhöhle vordringen, um zu den Eierstöcken zu gelangen. Die meisten Operateure, die Stuten kastriert haben, nahmen die Entfernung der Eierstöcke von der Scheide aus vor. Verfasser beschreibt einen Fall von Ovariectomie bei einem Truppenpferde, die im Vet.-Institut der Universität Breslau ausgeführt wurde (von der Scheide aus). Die Untugend des Ausschlagens wurde jedoch nicht völlig beseitigt, so daß anzunehmen ist, daß diese bereits ein Charakterfehler geworden war; es wäre nach den Erfolgen anderer eine operative Entfernung der Klitoris ins Auge zu fassen, falls die Untugend des Ausschlagens noch weiterhin auftritt. In einzelnen Fällen sind auch medikamentöse Mittel von Erfolg gewesen. Auf Grund der zur Verfügung stehenden literarischen Angaben kommt P. zu folgenden Schlüssen. Die Erscheinungen der Nymphomanie, wozu auch Sattelzwang, Stetigkeit, Widerfetzlichkeit, Schlagen beim Auflitzen oder gegen den Strang und ähnliche Untugenden gehören, sind in einer großen Zahl von Fällen auf krankhafte Veränderungen an den Eierstöcken zurückzuführen. Die Nymphomanie kann durch die Kastration geheilt werden, wenn das Leiden noch nicht lange besteht und die Stuten im allgemeinen nicht über acht Jahre alt sind. (Bei Erscheinungen des Sattelzwanges kommen als Ursache auch Veränderungen der Wirbelsäule in Betracht. D. Ref.) A.

Wiechert: Messungen an ostpreussischen Kavalleriepferden und solchen mit besonderen Leistungen und die Beurteilung der Leistungsfähigkeit auf Grund der mechanischen Verhältnisse. (Zschr. für Vet.-Kunde 1927, Jhg. 39, H. 11, S. 458—468.)

Die festgestellten Messungen über die allgemeinen Körpermaße und die mechanischen Verhältnisse, Länge und Winkelung der Hebelarme der Gliedmaßen, ferner die Ergebnisse der Wägungen und Leistungen, sowie deren Vergleich, die in Tabellen niedergelegt sind, geben ein eindrucksvolles Urteil über die tatsächliche Leistungsfähigkeit der einzelnen Pferdetypen und -rassen. — Das ostpreussische Kavalleriepferd, der Typ des edlen Reitpferdes, vereinigt in sich die Haupteigenschaften eines vorzüglichen Militär- bzw. Feldzugpferdes: „Äußerste Widerstandsfähigkeit und Unempfindlichkeit im Ertragen andauernder, schwerer Anstrengungen und von Unbilden der Witterung auch unter ungewohnten und ungünstigen Ernährungsverhältnissen. Von allen Halbblutpferden ist es das schnellste und ausdauerndste und steht nach den Messungsergebnissen dem englischen Vollblut am nächsten, wie es auch seiner Abstammung nach nicht anders zu erwarten ist. Selbstverständlich bestehen zwischen ihnen Unterschiede, welche auf Haltung, Aufzucht, Klima und Gebrauchszweck zurückzuführen sind.“ A.

Waschinsky: Welcher Anteil fällt dem Veterinär-offizier bei der Überwachung der Fütterung und Pflege des Truppenpferdes zu? (Zeitschrift für Veterinär-Kunde 1927, Jhg. 39, H. 8, S. 333—337.)

Aus dem Inhalte kann jeder Tierarzt, besonders derjenige, dem größere Pferdebestände zur Behandlung anvertraut sind, Anregungen entnehmen, die zur Vorbeugung von Krankheiten dienen. Die Ausführungen betreffen u. a. Futterbeschaffung, Verabfolgung des täglichen Futters bei ausreichender Ration, Lichtverhältnisse, Ventilation der Ställe, Tränken, Salzungen, Eindecken ohne daß Verweichlichung herbeigeführt wird, Hufpflege, Freiluftaufenthalt, Zahnpflege, Beseitigung von Darmparasiten usw. A.

Semmler: Zur Frage der Blutgruppenbestimmung bei Pferden. (Zschr. für Vet.-Kunde 1927, Jhg. 39, H. 8, S. 321—332.)

Für die Untersuchungen sind aus dem Pferdebestande des Standortes Oldenburg vorerst 13 Pferde der jüngeren Jahrgänge, deren Abstammung aus den Überweisungsnationalen genau nachgewiesen werden konnte, verwendet worden (Hannoveraner, Ostpreußen, Oldenburger, Ostfriesen, Holsteiner und Belgier). Die Prüfung geschah im wesentlichen auf Hämolysen, Agglutination, Reaktionen mit Testseren usw. Aus vorliegender Arbeit geht hervor, daß es bisher bei den angewandten Untersuchungsmethoden noch nicht möglich gewesen ist, die Individualitätsreaktionen des Pferdeblutes genau und konstant nachzuweisen. Immerhin muß aber auf die bei drei Pferden (Hannoveraner, Belgier und Ostfriesen) wiederholt vorgefundenen Bluteigentümlichkeiten hingewiesen werden, denn es kann sich nicht immer um einen Zufallsfehler gehandelt haben. Die Untersuchungen sollen in anderen Modifikationen fortgesetzt werden. A.

Sennwald: Avertin (E 107) zur Bekämpfung des Geburtschmerzes in der Eröffnungs- und Austreibungsperiode. (Zentralblatt für Gynäkologie 1928, S. 155.)

Das von Willstätter (München) gefundene, später als Avertin bezeichnete organische Brompräparat, befindet sich z. Zt. noch nicht im Handel wegen der widersprechenden Angaben, die von den Versuchsanstalten bei seiner Verwendung als Narkotikum vom Rektum aus gemacht wurden. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung des Mittels zum Zwecke der Schmerzbetäubung bei Geburten. Es war möglich, durch geringe Avertingaben (0,05—0,06 Gramm auf das Kilogramm Körpergewicht),

etwa 1 Stunde vor der zu erwartenden Geburt verabreicht, den Geburtschmerz der Austreibungsperiode in den meisten Fällen völlig zu beheben oder doch erheblich zu lindern. Schäden für Mutter und Kind wurden dabei nicht beobachtet, ebensowenig trat eine Verzögerung der Geburt ein. Verf. würde es bedauern, wenn die Fabrik das als gut bewährte Mittel wieder einziehen würde. Carl.

Williams, W. L.: Sterility in Cattle. (Sterilität beim Rindvieh.) (Emeritus Professor of Obstetrics and Research in the Diseases of Breeding Animals, New York State Veterinary College, Cornell University, Ithaca, New York.) (Sonderdruck aus The North American Veterinarian, September 1927.)

Bei den Erkrankungen der Geschlechtsorgane sind drei Individuen zu berücksichtigen, das männliche Tier, das weibliche Tier und das befruchtete Ei. An diesem zeigen sich die größten Verschiedenheiten in den Ergebnissen der Krankheit. Denn jedes seiner zahlreichen Entwicklungsstadien bietet Gelegenheit für verschiedene pathologische Erscheinungen. Die wichtigste Rolle bei den Krankheiten der Geschlechtsorgane spielt die Infektion. Außerdem sind zu berücksichtigen die geschlechtliche Überlastung sowie die Fütterung und Pflege der Zuchttiere. Sowohl der scheinbar gesunde trächtige als auch der anscheinend gesunde nichtträchtige Uterus enthält regelmäßig Bakterien, die gewöhnlich nicht pathogen sind, aber schädliche Eigenschaften erlangen, wenn das Tier durch gleichzeitig vorhandene Krankheiten, schlechtes Futter oder auf irgend eine andere Weise geschwächt wird. Solche Infektionen können im Uterus dauernd zugegen sein und ein ernstes Hindernis für die Zucht bilden. Denn die Kälber können damit infiziert werden oder, wenn die Infektionen zu schwach sind, krankmachend zu wirken, kann heftige Diarrhöe oder Pneumonie ihre Virulenz gesteigert werden, und sie können in einer virulenten Form bis zum Begattungsalter im Uterus bleiben. Die Bakterien brauchen auch nicht zu bleiben; lang andauernde Krankheit setzt die Widerstandskraft des Tieres herab und macht es für eine spätere Invasion von Bakterien mehr empfänglich. Deswegen muß darauf geachtet werden, nur gesunde Kälber zur Zucht zu verwenden. Die Gefahr, die dadurch entsteht, daß dies nicht geschieht, wird durch die Behauptung verdunkelt, daß der Bacillus abortus nur vorübergehend in den Kälbern sich aufhält, daß die Infektion deswegen nur unwesentlich ist und daß infolgedessen alle Infektionen von Kälbern, soweit es sich um ihre Zeugungskraft in späteren Jahren handelt, belanglos sind.

Bei Betrachtung der Sterilität muß man sich erinnern, daß zwischen dieser und zwischen dem epidemischen Abortus keine scharfe Trennungslinie sich ziehen läßt. Das befruchtete Ei ist zuerst mikroskopisch, und es ist klar, daß viele mikroskopische, befruchtete Eier zugrunde gehen und absorbiert werden oder auf andere Weise unbemerkt verschwinden. Dies muß klinisch unter „Sterilität“ eingereiht werden. Es können ja solche Eier nur in dem geschlachteten trächtigen Tiere entdeckt werden. Das beste Beispiel dafür bietet das Schwein. Bei ihm werden während einer Brunstperiode 12—24 Eier ausgestoßen und fast sämtlich befruchtet, viele von ihnen aber sterben. Dasselbe ist bei der Zwillings-trächtigkeit der Kuh und der Stute zu beobachten. Offenbar halten ein lebender Fötus oder lebende Föten den Uterus davon ab, den toten Fötus oder die toten Föten auszustoßen. Ein im Uterus vorhandener lebender, verhältnismäßig gefunder Fötus wirkt demnach auf die Gebärmutter anscheinend ebenso wie das Corpus luteum. In der Vagina einer Kuh trifft man gelegentlich einen sehr kleinen, mit dem unbewaffneten Auge kaum sichtbaren Embryo, oder in anderen Fällen allein Stückchen der Eihäute. Daher ist auf Grund klinischer Tatsachen anzunehmen, daß der Begriff „Sterilität“ beim Rind weit mehr umfaßt als daß ein reifes Ei nicht ausgestoßen und nicht befruchtet wird. Im Durchschnitt muß eine Kuh für jede erkennbare Trächtigkeit zwei bis dreimal gedeckt werden. Einige Bullen ejakulieren nicht

lebende Spermatozoen und werden früh außer Dienst gestellt. Die Ovidukte von verhältnismäßig wenig Kühen sind unwegsam verschlossen. Wahrscheinlich stößt eine brünstige Kuh ganz ausnahmsweise kein befruchtungsfähiges Ei aus. Nichteovulation oder Nichtbefruchtung spielt höchstwahrscheinlich keine große Rolle für die Sterilität. Andererseits geht bei Kühen ebenso wie bei Sauen bestimmt nahe die Hälfte der befruchteten Eier zugrunde, ohne daß erkannt worden ist, daß die Tiere konzipiert haben. Dementsprechend bildet der frühe Tod des befruchteten Eies eine Mehrheit der Fälle von Sterilität beim Rindvieh. Sicherlich sterben ebensoviel befruchtete Eier bei Uni- wie bei Multiparen, aber der sehr frühe Tod der Eier der Kuh wird dadurch verdunkelt, daß die Kuh nach Verlauf einer oder mehrerer Brunstperioden wieder brünstig wird.

Wie man annimmt, gibt es in den Vereinigten Staaten 24 000 000 Milchkühe, und unter ihnen veranlaßt, nach der Schätzung des Ackerbauministeriums, der epidemische Abortus einen jährlichen Verlust von 20—30 000 000 Dollar, also einen Verlust von ungefähr 1 Dollar für die Kuh. Viel beträchtlicher sind aber die Verluste, welche durch die Sterilität entstehen. Denn nach der Betrachtung des Verf. lebt eine Kuh im Durchschnitt keine 7 Jahre und erzeugt weniger als fünf lebensfähige Kälber. Wäre nun die Norm für ein gefundenes Kalb auf je 14 Monate angenommen, so müßte die Kuh bis zum Alter von 13 Jahren 4 Monaten zehn gefundene Kälber haben, und der Durchschnittsverlust würde 50 Prozent des Idealwertes jeder Kuh betragen. Nun kommen aber in einer reingezüchteten Durchschnittsherde von Milchkühen 60 Kälber auf das Jahr für je 100 Kühe, also 1 Kalb für je 20 Trächtigkeitsmonate.

Besteht nun im Uterus einer trächtigen Kuh eine chronische Infektion, so kann sie den Fötus befallen und beständig infizieren. Es können dadurch auch zystische Entartung der Eierstöcke und bei Bullen Abszeßbildung in den Nebenhoden und andere Veränderungen herbeigeführt werden. Beide sind intrauterinen Ursprungs. Denn wären die Zysten dies nicht oder würden sie nicht in frühem Kalbszustand entstehen, so würden sie ebenso häufig bei Kühen wie bei Färsen auftreten, was klinisch nicht richtig ist. Diesen Gefahren kann auf zweierlei Weise vorgebeugt werden: 1. offensichtlich an einer Geschlechtskrankheit leidende Bullen oder Kühe dürfen nicht geschlechtlich verwendet werden, bis sie vollständig geheilt sind; 2. jede Nachkommenschaft von allen Tieren, die hartnäckig steril gewesen sind, müssen als Zuchtvieh streng zurückgewiesen werden ohne Rücksicht auf den Ruf der erkrankten Eltern. Die für Zuchtzwecke wertvollsten jungen Tiere sind eben die Nachkommen höchst fruchtbarer Eltern. Daher sind nur geschlechtlich gesunde Tiere zu paaren. Beim männlichen Tiere ist es deswegen wichtig, festzustellen, ob sie geschlechtlich gesund sind und ob sie nicht fehlerhafte Spermatozoen ejakulieren. Darüber geben die Untersuchungen von Savage und von W. W. Williams und Savage Aufschluß. Bei den weiblichen Tieren gibt die genaue Untersuchung der Nachgeburt Aufschluß über den Gesundheitszustand des Uterus der Kuh.

Als weitere Ursache zur Sterilität ist, wie oben erwähnt, die geschlechtliche Überlastung anzuführen. Darunter versteht der Verfasser die zu starke Inanspruchnahme der männlichen Zuchttiere sowie bei der Stute und bei der Kuh die Zwillingsträchtigkeit, dadurch, daß sie die Widerstandskraft des Uterus und des Systems im ganzen herabsetzt und das dadurch die vorhandenen, normalerweise nicht sehr gefährlichen Bakterien verderbliche Kraft erlangen. Die Stute abortiert fast immer bei Zwillingen, seltener wirft sie einen lebenden Zwilling und noch seltener bleiben beide am Leben. Bei der Kuh ist Abortus bei Zwillingen wahrscheinlich doppelt so häufig wie bei einfacher Trächtigkeit. Werden lebende Zwillinge geworfen, so ist die Trächtigkeit fast immer unverhältnismäßig verkürzt, die Nachgeburt bleibt

oft zurück, und die zugrunde liegende Metritis hat reichlich Sterilität zur Folge, wenn die Kuh am Leben bleibt. Zwillingskälber sind häufig schwach und verenden an Durchfall, und viele von ihnen kommen nicht zu, wenn sie vollständig ausgewachsen sind. Als Überlastung könnte auch bezeichnet werden, daß Färsen im Alter von zwei Jahren kalben wollen. Abortus tritt gewöhnlich in der ersten Trächtigkeit zwei- bis viermal so vorherrschend bei Milchfärsen auf wie bei späteren Trächtigkeiten und die Folge ist Sterilität. Denn viele Färsen brechen unter einer Last, die für ein erwachsenes geeignet ist, geschlechtlich zusammen. Auch die Laktation kann als ein Teil der Sexuallast angesehen werden. Ob es gut ist, daß eine 6—8 Monate trächtige Kuh eine große Menge Milch gibt, dürfte bezweifelt werden. (Nach meiner Ansicht können in nicht wenigen Fällen zur Sterilität die Milchkontrollvereine beitragen, wenn sie nicht streng darauf achten, daß ihre Mitglieder ihre Kühe auch hygienisch halten, ihnen genügend Bewegung geben und die nötige Pflege angedeihen lassen. Denn dadurch, daß die größere Menge des Blutes zum Euter fließt, dieses also stärker ernährt wird, werden die Geschlechtsorgane unterernährt und müssen in ihrer Leistung nachlassen. Ref.). Es dürfte wohl nicht richtig sein, aus einer Kuh soviel wie möglich herauszuholen, sondern der Landwirt dürfte von seinen Kühen einen größeren Nutzen haben und sie besser ausnutzen können, wenn zwischen dem Kalben ein längerer Zwischenraum bleibt, vielleicht 14 Monate, und ein noch größerer Zwischenraum für die höchstleistenden Kühe. Die Kuh wird dann wahrscheinlich länger leben, mehr und gefündere Kälber erzeugen und mehr Milch geben bei geringerer Kosteneinheit. Auch bei alten Kühen und bei denen, die schwer an Gebärmutterkrankheiten gelitten haben, muß mehr Zeit zwischen dem Kalben gelassen werden als bei jüngeren Tieren.

Das Futter kann einen nachteiligen Einfluß auf den Eintritt der Brunst bei Kühen ausüben, sei es, daß die Tiere nicht die genügende Menge oder nicht genügend gehaltreiches Futter erhalten. Auch Mangel an Mineralstoffen, wie Kalzium sowie an Vitaminen, spielen eine wichtige Rolle bei Abortus und bei der Sterilität, sei es direkt oder indirekt, dadurch, daß sie den Körper schwächen und daß dadurch die im Uterus vorhandenen Bakterien virulent werden. Auch Mangel an Trinkwasser trägt zur Entstehung von Abortus und Sterilität bei.

Um der Entstehung der Hauptursache der Sterilität, der Endometritis bei Kühen, die frisch gekalbt haben, vorzubeugen, empfiehlt sich, zuerst in den Allantoisack und später nach dem Ausstoßen der Nachgeburt in den Uterus Jodoform, Bismuth. und Paraffin. liquid. einzuführen. Nach der von vielen Tierärzten empfohlenen Impfung mit lebenden Abortusbazillen vermindert sich zwar der Abortus, die Sterilität nimmt aber in demselben Maße zu. Bass.

Geflügelkrankheiten.

Manninger, R.: Untersuchungen über Kükenruhr und Hühnertyphus. (Aus dem Institut für Seuchenlehre der k. ung. Tierärztlichen Hochschule in Budapest.) (Zschr. für Infekt.-Krankh. der Haustiere 1928, 32, H. 4, S. 265.)

Manninger, der als erster das Vorkommen der Kükenruhr in Europa (1921 in Ungarn) beobachtet hat, berichtet in vorliegender Arbeit über vergleichende Untersuchungen von Kükenruhr und Hühnertyphus. Pathologisch-anatomisch ist für beide Krankheiten das Auftreten von entzündlichen nekrotischen Herden in Herz, Leber, Milz und Lunge bemerkenswert. Bezüglich der differentialdiagnostischen Bedeutung der regelmäßig vorhandenen Degeneration der Eifollikel weist Manninger (in Übereinstimmung mit Stafseth) darauf hin, daß bei Legehühnern die Ovarien auch dann regres-

siven Veränderungen unterworfen sind, wenn sie das Legegeschäft aus irgend einem anderen Grunde einstellen.

Eingehende morphologische, kulturelle und serologische Untersuchungen ergaben, daß eine sichere Abgrenzung zwischen Pullorum- und Hühnertyphusstämmen auch bei der Berücksichtigung des Säurebildungsvermögens aus Kohlehydraten und mehrwertigen Alkoholen nicht möglich ist. Wenn auch zugegeben werden muß, daß Hühnertyphusstämmen im allgemeinen, aber durchaus nicht regelmäßig, Maltose, Dextrin und Dulzit öfter und intensiver unter Säurebildung vergären als Pullorumstämmen, so hat dies keine artbestimmende Bedeutung, sondern kann eine einfache Folge der Tatsache sein, daß Pullorumstämmen eine oft wesentlich geringere Wachstumsenergie besitzen als Hühnertyphusstämmen. Hinsichtlich der Epidemiologie der Pullorum- und Hühnertyphusinfektionen ist als sichergestellt zu erachten, daß Pullorumstämmen ebenso wie Hühnertyphusstämmen sowohl bei erwachsenen Hühnern als auch bei Küken unter natürlichen Verhältnissen Erkrankungen verursachen können. Daraus folgt, daß Kükenruhr und Hühnertyphus nur zwei Krankheitsformen einer ätiologisch einheitlichen Krankheit darstellen. *Bac. pullorum* und Hühnertyphusbazillen sind als identisch anzusehen und gehören einer Bakterienart, *Bac. gallinarum* Klein, an. Bei der Tilgung dieser Krankheit leistet die Agglutinationsprobe durch Ermittlung der Bazillenträger eine hervorragende Rolle, während die Intradermalprobe sich bisher nicht als geeignet erwiesen hat. Ziegler.

Beck u. Ruth Eber: Bakterielle weiße Ruhr der Küken.

(Aus dem Tierleicheninstitut der Universität Leipzig. — Direktor: Dr. A. Eber.) (Arch. für wiss. Tierheilkunde 1927, 56, S. 121.)

Aus 12 eingefandten Fällen (11 Küken, 1 Huhn) isolierten die Verf. 12 Stämme, die mit der durch das *Bact. pullorum* (Rettger) hervorgerufenen weißen Kükenruhr identisch waren. Sie sind mit dem *Bact. typhi gallinarum* zwar nahverwandt, aber doch gut unterscheidbar. Zwischen beiden Typen bestehen Übergänge. Auch serologisch sind die ermittelten Stämme nahe verwandt zum *Bact. typhi gallinarum*. Sie sind für Kaninchen, weiße Mäuse, Kanarienvögel, Hühner und Küken mehr oder weniger pathogen, für Meerfischweinen apathogen. Pathologisch-anatomisch finden sich bei Küken Schwellung von Milz und Leber, Nekroseherde in den Lungen, der Leber, in Herz und Muskelmagen, Darmkatarrh. Beim Huhn konnte nur Verblutung infolge Berstung der fettig entarteten Leber nachgewiesen werden. Differentialdiagnostisch ist der weiße Durchfall kaum verwertbar, da er bei allen Darmerkrankungen der Küken vorkommt. Als bakterielle weiße Kükenruhr sollte nur das durch *Bact. pullorum* hervorgerufene Kükensterben bezeichnet werden. Für die Weiterverbreitung kommen vor allem latent kranke Hühner oder keimhaltige Bruteier in Frage. Zur Ermittlung der Keimträger eignet sich die Agglutination und die bakteriologische bzw. serologische Untersuchung der Eier verdächtiger Hühner. Wichtig ist Schaffung hygienischer Verhältnisse und einwandfreie Beschaffenheit der Brutapparate. Die Frage der Schutz- und Heilimpfung bedarf noch der Lösung. Geiger.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Von der Landesuniversität Gießen.

Zum Rektor für die Zeit vom 1. September 1928 bis 31. August 1929 ist der ordentl. Professor für klassische Philologie Dr. Rudolf Herzog gewählt worden. — Der ordentl. Professor für Pharmakologie an der medizinischen Akademie Düsseldorf und Direktor des Pharmakologischen Instituts, Dr. Fritz Hildebrandt hat den an ihn ergangenen Ruf anstelle des emeritierten ordentl. Professors Geh. Med.

Rat Dr. Julius Geppert angenommen. — Der Privatdozent für physikalische Chemie und physikalisch-chemische Technik Dr. Hugo Stintzing ist zum außerplanmäßigen außerordentlichen Professor ernannt worden. Landes-Universität, Universitäts-Sekretariat.

Einweihung des Abstimmungs-Denkmal in Allenstein.

Am achten Gedenktage der Volksabstimmung vom 11. Juli 1920 weihte der Ostdeutsche Heimatdienst das von ihm errichtete Abstimmungsdenkmal in Allenstein ein. Schlicht und doch würdig verliefen die Feierlichkeiten, die mit einem Freilichtfestspiel in Allensteins wundervollem Stadtwalde am Sonnabend, den 7. Juli eingeleitet wurden. Der Abend des ersten Tages vereinigte die Gäste des Heimatdienstes mit den Abordnungen der Allensteiner Vereine zu einem Begrüßungsabend. Oberregierungs- und Veterinärat Dr. Dr. h. c. Marks, als Vorsitzender des Ostdeutschen Heimatdienstes hielt die Begrüßungsrede, getragen von herzlichen Worten des Dankes an alle, die vor acht Jahren am Werke der Abstimmung mitgearbeitet haben. Sie klang aus in der festen Hoffnung und Zuversicht auf die Wiedervereinigung Ostpreußens mit Einschluß von Memel und Soldau mit dem deutschen Mutterlande. Vertreter der Reichs- und Staatsregierung, der Stadt Allenstein, der Landesuniversität Königsberg, des Reichsverbandes heimattreuer Ost- und Westpreußen des Heimatdienstes Westpreußen und der ehemalige Reichskommissar für die Abstimmung, Freiherr von Gayl, antworteten.



Der eigentliche Festtag war Sonntag der 8. Juli. Das Wetter war dem prächtigen Festzug, der sich vom Innern der Stadt nach dem Denkmalsplatz, der nahe des Waldes inmitten schöner Parkanlagen liegt, günstig. Sein Kernstück bildeten die etwa in Stärke von 600 Mann mit über 120 Fahnen erschienenen Heimattreuen aus dem Reich sowie die Heimatvereine aus dem Abstimmungsgebiet. Etwa 7000 Menschen mit weit über 200 Fahnen und Bannern mögen das Denkmal umstanden haben, als der stellvertretende Vorsitzende des Heimatdienstes, Schriftsteller Max Worgitzki, die Weiherede sprach. Er feierte das Denkmal als Sieg des deutschen Gedankens im Ermland und Masur. Er mahnte das deutsche Volk gleich denen, die ihre Treue am 11. Juli 1920 trotz Not und Gefahr für Deutschland bewiesen haben, die Quellen seiner Kraft dort zu suchen, wo sie am stärksten und unvergänglichen fließen, in der Einigkeit. Die Mächte, die Ostpreußen verderben wollen, werden wir bekämpfen, so lange wir leben, so lange dieses Denkmal steht. Es sei denn, daß auch sie einmal begreifen, was das Denkmal in seinem Säulenrund, das die elf Kreise des Abstimmungskreises verfinbildlicht, sagt: Dies Land ist deutsch und wird deutsch bleiben.

Namens des Reiches und Preußens sprach Oberpräsident Siehr, namens der heimattreuen Ost- und Westpreußen Oberregierungsrat Hoffmann. Die Übergabe des Denkmals an die Stadt Allenstein erfolgte durch Oberregierungsrat Dr. Dr. h. c. Marks mit Dankesworten an alle, die es erdacht und vollbracht haben. Feierliche Gefänge und Musikvorträge umschlossen und beendigten die denkwürdige Feier.

Akademische Nachrichten.

Der planm. Extraordinarius für Veterinärhistologie und Veterinär-Embryologie an der Universität Leipzig, Dr. W. Schauder, hat einen Ruf als Nachfolger des emeritierten Geh. Med.-Rats Professor Dr. Paul Martin an die Landesuniversität Gießen erhalten.

Ständiger Ausschuß der Internationalen Tierärztlichen Kongresse.

Die Liste der in den Ausschuß gewählten Tierärzte liegt nun vor. Danach setzt sich der Ständige Ausschuß folgendermaßen zusammen: Hutya-Budapest, Präsident; Leclainche-Paris und Mac Fadyean-Leatherhead, Vizepräsidenten; De Blieck-Utrecht und Stang-Berlin, Generalsekretäre.

Zu Mitgliedern sind weiter ernannt: Bradley-Edinburgh, Brittlebank-Manchester, Jonescu-Braila-Bukarest, Burgi-Bern, Van Es-Lincoln (U.S.), Farid Bey-Kairo, Hamr-Prag, Hebrant-Cureghem (Belgien), Hilton-Ottawa (Kanada), Holth-Oslo, Jensen-Kopenhagen, Kasper-Wien, Kjerrulf-Stockholm, Lignieres-Buenos-Aires, Minett-London, Petrovitch-Belgrad, Sartirava-Turin, Sheather-London, Du Toit-Pretoria (Süd-Afrika), Tuleff-Sofia. St.

Ellenberger-Stiftung.

Die anlässlich des 80. Geburtstages Wilhelm Ellenbergers eingeleitete Sammlung ist nunmehr abgeschlossen und hat unter einer Beteiligung von 489 Spendern (unter denen sich gegen 80 Herren ehemalige Schüler Ellenbergers aus Finnland befinden) die Gesamtsumme von 9183,— RM. erbracht. Jedem Spender ist vom Jubilar selbst gedankt worden. Sollte dies einmal verfehentlich unterblieben sein, so wird um gefällige Mitteilung an die Unterzeichneten gebeten. Namens der Veranstalter der Sammlung spricht die mit der Durchführung beauftragte Kommission auch ihrerseits allen Spendern ihren wärmsten Dank für die Beteiligung aus. Der Erlös ist der bereits bestehenden Ellenberger-Stiftung zugeführt worden. I. A.: Baum-Scheunert.

Befprechung über Fleischbefchau.

Am 7. Juli 1928 hat in Ulm unter dem Vorsitz des Präsidenten des Deutschen Veterinärrates die von Herrn Geheimrat v. Ostertag angeregte Befprechung zwischen den Herren v. Ostertag und Max Müller stattgefunden. Sie hat zu Vorschlägen geführt, die dem Reichsministerium des Innern wegen einer etwaigen Abänderung der Fassung des § 33, Absatz 1, Ziffer 7 der B.B.A. zum Reichsfleischbefchausegesetz vorgelegt werden sollen. Zur Klärung der Frage der Latenz von Fleischvergiftungserregern im Fleisch gefunder und auch kranker Tiere sollen Untersuchungen größeren Maßstabes angestellt werden. DVR.

Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule Berlin.

In der Zeit vom 16. August bis 5. September 1928 bleibt die Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule Berlin geschlossen. Bestellungen während dieses Zeitraumes werden erst nach Wiedereröffnung erledigt. Nöller, o. Prof., Kurator der Bibliothek.

Bücherbesprechungen.

Der deutsche Viehbestand und die Tierseuchen in Zahlen, Karten und Tafeln. Von Dr. J. Wiemann, Ministerialrat im Preuß. Landwirtschaftsministerium und Dr. G. Francke, Oberregierungs- und -veterinärat in Potsdam. Verlag von Richard Schoetz, Berlin, 1928. Preis Mk. 12,80.

Die Verfasser haben es verstanden, auf dem kleinen Raum von 183 Seiten unter Beigabe von 89 Abbildungen und 9 Tafeln einen Gesamtüberblick des deutschen Viehbestandes und der Tierseuchen zu geben. Das erste Kapitel behandelt den Viehbestand und bringt eine statistische Übersicht über die Veränderungen des Viehbestandes nach Tiergattungen geordnet im Deutschen Reiche, der sich auf die letzten 40 Jahre erstreckt. Auch der Wert des Gesamtviehbestandes sowie der Viehbestände in den einzelnen Staaten und von Preußen in den Regierungsbezirken, ferner Ein- und Ausfuhr sind berücksichtigt. Der zweite Abschnitt befaßt sich mit den anzeigepflichtigen Tierseuchen; er stellt die hierdurch bedingten Verluste zusammen und bespricht die einzelnen Seuchen vom epidemiologischen Standpunkt aus. Außerordentlich wertvolles Kartenmaterial gibt eine selbst für den Laien leicht verständliche klare Übersicht über den Lauf der Seuchen, wobei

auch die Einschleppung vom Auslande eine genügende Wertung und übersichtliche kartographische Darstellung gefunden hat. Insbesondere sei auf das Kapitel der Maul- und Klauenseuche hingewiesen, das uns auf 6 Tafeln einen Überblick über den Gang der Maul- und Klauenseuche im Jahre 1911 vom Osten nach Westen und im Jahre 1920 von Westen nach Osten gibt. Im dritten Kapitel ist die Bekämpfung der Tierseuchen abgehandelt. In klarer Diktion sind die Aufgaben der Veterinärverwaltung umgrenzt. Sehr interessant und vollständig neu sind die Tafeln über das Seuchenfeststellungsverfahren, die Seuchenbekämpfungsmaßnahmen und die Seuchenentzündungsvorschriften; endlich der Viehseuchennachrichtendienst. Mit einem Blick auf die farblich gehaltenen Tafeln gewinnt man eine Übersicht über die bei den einzelnen Seuchen vorgeschriebenen Maßnahmen.

Das Buch ist eine Fundgrube von wertvollen Einzelheiten, die wohl an erster Stelle dem einen der Bearbeiter, der schon längere Zeit die Jahresveterinärberichte der beamteten Tierärzte in musterhafter Weise zusammenstellt, zu verdanken sind. Auch gibt der Inhalt Aufschluß über die verzwickten Wege vieler Seuchengänge. Ebenso regt er aber auch zum Nachdenken an, an den Stellen, wo wir über den Seuchenverlauf nicht klar sehen. Druck und Abbildungen sind in jeder Beziehung mustergültig. Man kann die Verfasser zu diesem in seiner Art einzig dastehenden Werke nur von Herzen beglückwünschen. Mießner.

Schmaltz, R.: **Anatomie des Pferdes.** In den Grenzen der Vorlesung dargestellt. Zweite erw. Aufl. Berlin, R. Schötz, 1928, XII, 646 S. und 60 Abb. Geb. 32,— Mk.

Die neue Auflage von Schmaltz's Anatomie des Pferdes ist rasch der ersten gefolgt. Ein Zeichen, daß das Werk gut war. Deshalb ist am Plane und an der Art der Darstellung im Buche nichts geändert worden trotz erheblicher Ergänzungen. Die betreffen vor allem eine tabellarische Zusammenstellung der Gewichte aller Körperteile und einen Abriss über die Bewegungslehre auf kinematographischer Grundlage. Das Werk ist absolut selbständig zu gebrauchen; allerdings wird der Leser erst den vollen Nutzen ziehen, wenn er gleichzeitig den großen Atlas des Verfassers dazu verwendet. Denn die 60 Abbildungen im Text würden nur ein unvollständiges Sicheinleben ermöglichen. Das erste Buch schildert den Bewegungsapparat (allgemeine Übersicht über den Körperbau, die Knochen, die Muskeln, den Huf und die Bewegung). Das zweite Buch behandelt den Kopf (und zwar das Skelett, das Gebiß, die Weichteile mit Muskeln, Anteilen des Verdauungs- und Atmungsapparates, Gehirnnerven, Gefäßen und topographischen Bemerkungen). Das dritte Buch schildert die Eingeweide der großen Körperhöhlen (die Brustorgane mit dem Brustfell, die Bauch- und Beckenorgane samt dem Bauchfell und dem Urogenitalapparat). Und das vierte Buch befaßt sich mit Gefäß- und Nervensystem samt Sinnesorganen und Haut. Den Anhang bilden die Gewichtstabellen. Jede „Einteilung“ in den Naturwissenschaften hat Mängel, aber auch Vorzüge. So ist es auch hier, wo topographische Gesichtspunkte über die systematischen gestellt wurden. Der Huf kam so zum Bewegungsapparat, systematisch ist er ein Hautorgan. Die Schädelknochen finden sich nicht beim Skelett, sondern beim Kopfe. Und die Gehirnnerven sind beim Kopf abgehandelt, die Rückenmarksnerven beim Nervensystem u. s. f. Das sind Folgen der gewollten Einteilung.

Die Schilderung hat den altbekannten flüssigen und packenden Stil des Meisters des Wortes und der Feder, der in den letzten Jahren eine Arbeitskraft entfaltet, die ihm zu unserer Freude und unserem Nutzen noch lange erhalten bleiben möge. Otto Zietzschmann.

Personal-Nachrichten.

Approbiert in Berlin: Hans Schliepe aus Neu-Glinke; in Leipzig: Lasse Arvi Schroeder aus Kuopio (Finnland); Lauri Porthan aus Joensuu (Finnland); Kultervo Alanne aus Lathi (Finnland); Lauri Waldmar Katras aus Abo (Finnland).

Promoviert in München: Gustav Knorpp, Tierarzt aus Murr, O.-A. Marbach i. Wittbg.; Leo Rüter, Tierarzt aus Sterkrade im Rheinland.

Versetzt: Veterinärat Dr. Kutschbach von Willkischken nach Übermemel (Memelgebiet).

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtnr, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrzabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zusendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10: nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 30.

Ausgegeben am 28. Juli 1928.

36. Jahrgang.

(Aus dem Staatlichen Veterinär-Untersuchungsamt Hannover Linden. — Leiter: Prof. Dr. Oppermann.)

Der weitere Ausbau der Diagnostik der infektiösen Anämie des Pferdes mit Hilfe der Serologie und des Kleinterversuches.

Von Prof. Dr. Oppermann und Dr. Lauterbach.

I. Die Diagnose der infektiösen Anämie des Pferdes mit Hilfe einer Lipoidbindungsreaktion.

(Mit 3 Abbildungen.)

(Fortsetzung von D. T. W. 1928, Nr. 18, S. 311.)

Zur Herstellung des Lipoidauszuges war nach den Vorgängen anderer Forscher das Pferdeherz das gegebene Organ.

In dem Auszug aus dem Blut anämiekranker Pferde, in dem das Virus der ansteckenden Blutarmut zweifelsohne reichlich vorhanden ist, hofften wir eine solche Menge virus-spezifischen Eiweißes zu gewinnen, daß unsere Reaktion auf antigenspezifischer Grundlage durchgeführt werden konnte. Bei Erweiterung der Versuche stellte sich jedoch bald heraus, daß Auszüge aus dem Blut von gefunden Pferden dieselben Dienste leisteten. Weiter konnten wir feststellen, daß allein mit dem Lipoidauszug gelegentlich eine Reaktion zu erzielen war, die jedoch schwächer und daher praktisch bedeutungslos war. Demnach spielt tatsächlich der Blutauszug eine wesentliche Rolle, wobei anzunehmen ist, daß die Erfolge mit Lipoidauszug allein darauf beruhen, daß es nicht gelingt, das Pferdeherz vollständig von Blut zu befreien. Ob die Wirkung des Blutextraktes dadurch zu erklären ist, daß bei anämiekranken Pferden mit Ausnahme der Virusträger ein periodischer Zerfall roter Blutkörperchen stattfindet, der eine Antikörperbildung anregt, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls können wir die Lipoidbindungsreaktion nur als ein unspezifisch-spezifisches diagnostisches Verfahren auffassen, wie es etwa die Wassermann'sche Reaktion ist.

Von besonderem Interesse war nun, wie bei jeder serologischen Reaktion, die Frage, wann nach stattgehabter Infektion die Ermittlung kranker Pferde möglich ist. Zur Klärung dieser Frage konnten wir leider keine gefunden Pferde infizieren, sondern mußten uns darauf beschränken, das Pferdmaterial des Veterinär-Untersuchungsamtes zu benutzen.

Die in der nachstehenden Tabelle angeführten Pferde waren nach Behandlung sämtlich serologisch negativ, aber wie neben dem positiven Ausfall der Tierversuche auch die erneut aufgetretenen Fieberanfälle zeigen, noch Virusträger.

Name des Pferdes	Fieberanfall		Lipoidbindungsreaktion		Eingetreten nach Tagen
	Datum	Höhe der Temp.	Datum	Urteil	
Mairose	4.-7. I.	40,3	21. I.	+++	14-17
Unrast	21.-26. IV.	40,8	30. IV.	+++	4-9
Mausefalle	31. X.-2. XI.	41,8	5. XI.	+++	3-5
Ostmark	22.-25. X.	39,7	5. XI.	+++++	10-13
Hoppegarten	10.-15. III.	38,9	26. III.	+++	11-16
Ondoka	9.-22. X.	40,6	5. XI.	+++++	14-17
Feuerspritze	23.-26. XII.	39,0	4. I.	+++	12-15
Celebes	2.-17. III.	40,4	14. III.	+++	12
Gais	23. II.-10. 3.	40,5	14. III.	+++	4-20
Warchau	4. II.-19. IV.	40,7	30. IV.	+++++	11-19
Lux	17.-25. IV.	40,9	30. IV.	+++	5-13
Adelgisa	30. V.-2. VI.	39,6	4. IV.	+++	2-5

Aus diesen Beobachtungen können wir den Schluß ziehen, daß im Anschluß an einen Fieberanfall häufig bereits nach 2-3 Tagen, spätestens jedoch nach 20 Tagen der ursprünglich negative Lipoidbindungsversuch ausgesprochen positiv wird. Ist die Reaktion einmal positiv, so bleibt sie es nach unseren Beobachtungen aus der Praxis und am eigenen Pferdmaterial recht lange, vorausgesetzt, daß kein medikamenteller Eingriff erfolgt. So haben wir sie an eigenen Pferden jahrelang in unverminderter Stärke festgestellt, ohne daß ein neuer Fieberanfall bei diesen Tieren zur Beobachtung gekommen wäre. Weiter müssen wir aber aus dem Auftreten der positiven Lipoidbindungsreaktion im Anschluß an einen Fieberanfall den Schluß ziehen, daß ein positives Resultat nicht durch die bloße Anwesenheit des Virus der ansteckenden Blutarmut in einem Pferdekörper ausgelöst wird, sondern daß sich der Keim aktiv im Organismus des betroffenen Tieres ausgewirkt haben muß. Reine Virusträger — solche sind ja aus der Geschichte der ansteckenden Blutarmut hinreichend bekannt — werden wir daher mit Hilfe der Lipoidbindungsmethode nicht erfassen können, diese werden wir vielmehr mit Hilfe eines Versuchstieres ermitteln müssen.

An einer großen Anzahl von Fällen, in denen die zur Behandlung zugezogenen Tierärzte und auch die Veterinärbeamten klinischen Verdacht auf ansteckende Blutarmut hegten, haben wir die Brauchbarkeit des Verfahrens nach der

positiven Seite ermitteln können. Von einer Aufführung dieser Fälle soll abgesehen werden; wir wollen uns darauf beschränken, eine Reihe von Patienten zu beschreiben, bei denen das positive ferologische Resultat durch die klinischen Erscheinungen, durch Sektion oder histologische Untersuchung erhärtet ist. Ebenfalls seien zu dieser Gruppe die Fälle gerechnet, in denen die veterinärpolizeiliche Abnahme und Entschädigung erfolgt ist.

Pferd Artige: Das Tier stammt aus einem Anämiebestand und ist im chronischen Zustand geschlachtet. Serologisch +++/++. Histologischer Befund: Siderozyten und histiozytäre Zellwucherungen in der Leber.

Pferd Wildhagen: (beobachtet im Vet.U.A.). Fieberanfälle vom 17. März bis 18. Mai bis 40,1 Grad, Tuberkulinreaktion negativ. Serologisch zwischen ++/++ bis ++++/++++, Patient ist veterinärpolizeilich abgenommen und entschädigt worden.

Pferd Herrenhausen: (beobachtet im Vet.U.A.). Das Tier ist stark abgemagert, blasse und feuchte Schleimhäute, am 13. März Temperatur 39,4, ferologisch ständig ++/++ bis ++++/++++. Das Tier ist ebenfalls veterinärpolizeilich abgenommen und entschädigt worden.

Pferd Ladenmädchen: (beobachtet im Vet.U.A.). Das Tier stammt aus einem Anämiebestand, hat während der Beobachtung keine Fieberanfälle gezeigt. Am 15. Mai 1927 ein Fohlen geworfen, 6 Wochen nach dem Fohlen plötzlich verendet. Serologisch ständig ++/++ bis ++++/++++. Sektionsergebnis: Starke Blutungen unter den serösen Häuten und im Gekröse. Milz stark geschwollen. Fohlen ebenfalls stets ++/++ bis ++++/++++, ausnehmend schlecht entwickelt.

Oberköchin: Vom 24. November 1927 mit den bei Anämie üblichen Unterbrechungen Fieberanfälle bis zum Exitus letalis am 3. Febr. 1928. Serologisch ++/+++. Sektion: Milztumor, Blutungen unter den serösen Häuten, Anämie und Ödeme. Histologische Untersuchung: in der Leber zahlreiche Siderozyten.

Adelgisa: Vom 20. Februar 1928 bis zum Exitus letalis am 17. März 1928 zahlreiche Fieberanfälle mit einer Höchsttemperatur von 40,7 Grad, Serologisch ++/++ bis ++++/++++. Sektionsbefund: Milztumor, zahlreiche Blutungen, besonders in der Muskulatur. Histologischer Befund: Histiozytäre Wucherungen in den Kapillaren, eisenhaltiges Pigment in den Sternzellen, Milz fast eisenfrei.

Kantonales Tierhospital Zürich: Serum eines wegen Anämie geschlachteten Pferdes ergab +++/++++.

Pferd des F. in W.: Das Pferd ist abgemagert, hat in der Bewegung stark beschleunigten Puls, zeigt schwankenden Gang und kann sich nur schwer erheben. Serologisch +++/++++. Sektionsbefund: Hypertrophie und Dilatation des Herzens, chronischer Milztumor sowie chronische Verdickung der Leber unter starkem Hervortreten des interazinösen Bindegewebes.

Dr. S. in A.: Ein Pferd erkrankte unter influenzaartigen Erscheinungen ohne Organerkrankung, zeigt intermittierendes Fieber und verendet. Einige Tage später erkrankt ein weiteres Tier mit intermittierendem Fieber bis zu 41,0 Grad unter Abmagerung. Andere Krankheitsursachen nicht festzustellen. Serologisch +++/++++. Nach etwa 3 Monaten Schlachtung und veterinärpolizeiliche Entschädigung. Sektionsbefund: Milz- und Leberschwellung, Dünn- und Dickdarmentzündung, starke Ausdehnung des rechten Herzens und Abmagerung. Histologischer Befund: zahlreiche Siderozyten und histiozytäre Zellanfaltungen in der Leber.

Reg.-Vet. H. in H.: In dem Bestande L. sind vor einigen Jahren zwei Pferde an ansteckender Blutarmut, die sowohl klinisch als auch durch Sektion diagnostiziert ist, verendet. Ein erneuter Verdachtsfall ergibt ferologisch ++/++.

Th. B. in N.: In dem Bestande sind vor einigen Jahren Pferde an ansteckender Blutarmut zu Grunde gegangen. Das jetzt erkrankte Tier magert rapide ab, Tuberkulinprobe negativ. Serologisch +++/++.

Landwirt H. in H.: Hochtragende ostpreussische Stute, die in den letzten Trächtigkeitsmonaten trotz bester Pflege und guten Appetits sich schlecht hält; nach normal verlaufener Geburt starke Abmagerung, die Anlaß gibt, das Pferd der Hochschule zuzuführen. Befund: Feuchtglasige Konjunktiven, nach kurzem Trab pochender Herzschlag, wiederholte Fieberanfälle, negativer Ausfall der Tuberkulinprobe und der

Untersuchung auf tierische Parasiten. Anisozytose. Fehlen einer spezifischen Organerkrankung. Verdacht auf ansteckende Blutarmut. Serologische Blutuntersuchung +++/++++. Das Pferd verendet. Sektion bestätigt den Anämieverdacht.

Pferd R. in C.: Däne; wird, da es trotz guten Appetits stark abgemagert, der Klinik zugeführt. Wahrscheinlichkeitsdiagnose: infektiöse Anämie. Serologische Untersuchung +++/++++. Pferd wird auf veterinärpolizeiliche Anordnung getötet. Anatomische und histologische Diagnose: infektiöse Anämie.

Bei weiteren drei Pferden (von F. in B., K. in N. und B. in D.) gab das klinische Bild gleichfalls Anlaß zur ferologischen Untersuchung, die bei allen drei Pferden +++/+++ ausfiel. Die drei Pferde wurden veterinärpolizeilich abgenommen und getötet. Anatomische und histologische Diagnose: infektiöse Anämie.

Überdies ergab sich bei unseren, sich über mehrere Jahre erstreckenden Untersuchungen in den Preuß. Hauptgestüten ein reiches Material an infektiös-anämisch kranken Pferden, bei denen die positiven Resultate der ferologischen Blutuntersuchung durch den klinischen und anatomischen Befund erhärtet werden konnten.

Selbstverständlich wurde nicht unterlassen zu prüfen, wie sich gesunde oder sporadisch kranke Pferde bei der Blutuntersuchung verhielten.

Zu dem Zwecke wurde im Laufe der letzten Jahre eine größere Zahl von den der Med. Klinik der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover zugeführten Pferden der serologischen Blutuntersuchung unterworfen. Über die dabei erzielten Resultate gibt die nachstehende Zusammenstellung Aufschluß.

Krankheit	Nr. d. Klinik-Tagebuchs	Serolog. Reaktion
Chron. Nephritis	376. 678	—/—
Katarrh d. ob. Luftwege	762. 3 Amb.	—/—
Laryngo-Pharyngitis	764. 1927	—/—
Druse	1856	—/—
Bronchopneumonie	Ambulant	—/—
Alv. Lungenemphys.	431. 470	—/—
Infekt. Bronchitis	343. 332. 346.	—/—
	341. 350	
Akut, Magen-Darmkatarrh	301. 397	—/—
Chron. Magen-Darmkatarrh	637. 741. 733.	—/—
	763. 844. 970.	
	969. 4 Ambul.	
Dysphagia paralyt.	785	—/—
Darmentzündung	731	—/—
Rheumat. Kolik	698. 671. 673.	—/—
	674. 726. 736.	
	738. 739. 743.	
	754. 759. 760.	
	761	
Anschoop. Kolik	341. 365. 320.	—/—
	381. 438. 430.	
	451. 464. 635.	
	651. 684. 692.	
	723. 729. 741.	
	769. 836. 881.	
	659. 666. 670.	
	672. 1147. 1246.	
Askariasis	Ambulant	—/—
Diabetes insipidus	661. 746. 1148.	—/—
Leukämie	1509	—/—
Lumbago	304. 722	—/—
Morbus maculosus	305. 468. 762	—/—
Tetanus	721	—/—
Muskelnrheumatismus	774	—/—
Rachitis	1150	—/—

In Nachstehendem sollen weiterhin einige Fälle erörtert werden, in denen durch die ferologische Untersuchung der

ursprünglich aufgetretene Verdacht auf ansteckende Blutarmut nicht bestätigt worden ist und in denen durch weitere klinische Beobachtungen oder durch Sektion eine andere Erkrankungsursache ermittelt wurde:

1. **Gefüt in M.:** Ein $\frac{1}{2}$ jähriges Fohlen ist sehr mager, matt, hat mangelhaften Appetit. 64 Pulse, 20 Atemzüge, 38,7 Grad Temperatur, Augenbindehäute schmutzigrot, feucht, ohne Gelbfärbung. Es sind Abgänge von *Ascaris megalocephala* beobachtet. Die Erscheinungen werden urfänglich auf Massenbefall mit Würmern zurückgeführt. Serologisch —/—.

2. **St. V.U. in D.:** Nach dem Vorbericht leidet das Tier an Abmagerung und Schwäche und zeigt rektal eine große höckerige Geschwulst in der Nähe der Nieren. Serologisch —/—.

3. **Th. W. in Z.:** In dem Bestand verendeten im Laufe von 4 Jahren 18 Pferde. Bakteriologische Untersuchung Paratyphus A- und Kolibazillen. Die klinischen Erscheinungen äußerten sich in Herzschwäche, Nierenentzündung, Kolikererscheinungen und zuweilen hohem Fieber. Die Todesfälle erfolgten bei den ersten Pferden in sehr gutem Futterzustand, später im Zustand der Abmagerung und Erschöpfung. Das Sektionsbild ergab in der Hauptsache: Blutige Entzündung des Dickdarmes mit Milzanschwellungen und Degeneration der Körperparenchyme. Als Nebenfund wurden massenhaft Palisadenwürmer im Dickdarm festgestellt. Bei zwei Pferden wurde im Anschluß an diese Todesfälle nach denselben klinischen Erscheinungen die Blutuntersuchung durchgeführt. Serologisch bei Pferd 1 —/—, bei Pferd 2 —/—.

4. **Vet.-Rat K. in B.:** Untersuchung von drei rotzansteckungsverdächtigen klinisch gefundenen Pferden. Serologisch Nr. 1 —/—, Nr. 2 —/—, Nr. 3 —/—.

5. **Vet.-Rat F. in G.:** ebenfalls rotzverdächtig, serologisch —/—.

6. **Vet.-Rat F. in S.:** Die Blutprobe stammt von einem Pferde, das seit etwa acht Tagen unerwartet unter fieberhaften Erscheinungen und schmerzlosen Schwellungen am Schlauche und unter dem Bauche erkrankt ist. Befund: 74 Pulse, Temperatur 38,8, Augenschleimhäute intensiv gelb. Große Mattigkeit, Mangel an Appetit. Pferd läßt dauernd den Kopf hängen; und ist, nachdem es zwei Tage fast nichts mehr gefressen hat, nur Wasser getrunken, 41,1 Grad Fieber und Durchfall gezeigt hat, verendet. Bei der Zerlegung zeigten Milz, Leber und Nieren keine Veränderungen, die für Anämie sprachen. Dagegen fanden sich namentlich im Zwerchfell und der Kruppenmuskulatur zahlreiche, grauweiße Knoten von Erbsengröße. Die histologische Untersuchung ergab: kleinzelliges Rundzellenfarkom. Serologisch —/—.

7. **E. in T.:** Das Pferd hat Temperatur bis 40,2 bei völliger Appetitlosigkeit, wässerige Darmentleerungen und anfangs dicken rötlichen Urin. Serologisch —/—.

8. **D. in S.:** Ein Pferd des A. in E. hat 39,3 Temperatur, 19 Atemzüge und 65 Pulse. An beiden Brustseiten verstärktes, etwas rauhes vesikuläres Atmen. Vor drei Monaten ist es bereits ebenfalls untersucht, Temperatur 39,0 Grad. Tuberkulinprobe stark positiv. Serologisch —/—.

9. **Sch. in G.:** Durch die Obduktion bei einem ursprünglich als anämieverdächtig angeprochenen Pferde des K. in C. wurde durch Sektion eine chronische Herzbeutel- und Rippenfellentzündung festgestellt. Serologisch —/—.

10. **Dr. R. in G.:** Bei einem Pferde des B. in O. wurde durch Sektion festgestellt, daß eine Tuberkulose der Lunge, Leber und Milz und der Lymphknoten der Bauchhöhle vorlag. Serologisch —/—.

11. **F. in H.:** Bei einem anämieverdächtigen Pferde wurde durch Sektion eine generalisierte Tuberkulose bei Fehlen jeglicher Veränderungen, die auf ansteckende Blutarmut hindeuteten, festgestellt. Serologisch —/—.

12. **W. in H.:** Pferd ist fieberhaft erkrankt, nach acht Tagen wieder fieberfrei und bei gutem Appetit. Darauf erneuter Fieberanfall; Petechialfieber, mit anschließendem Lungengangrän und Exitus letalis. Histologische Untersuchung: Tumor lienis hyperaemicus und Degeneratio adiposa hepatis; keine Veränderungen die für ansteckende Blutarmut sprechen. Serologisch —/—.

13. **O. in A.:** Ein Pferd ist auf den Vorderbeinen steif, hat Muskelschmerzen und zeigt leichte Schreckhaftigkeit. Im Futter viel Schachtelhalm. Sektion: Hämorrhagische Gastritis und eine Unmenge von

Gastruslarven, die sogar zahlreich im Duodenum gefunden werden. Serologisch —/—.

14. **P. in M.:** Zwei Pferde des Besitzers sind plötzlich erkrankt, zeigen Schreckhaftigkeit und sind steif auf allen vier Füßen. Nach Anmeldung des Anämieverdacht wird durch den beamteten Tierarzt, besonders da die Pferde Kolikererscheinungen zeigen und im Futter viel Schachtelhalm vorhanden ist, die Diagnose auf „Schachtelhalmvergiftung“ gestellt. Serologisch: Pferd 1 —/—, Pferd 2 —/—.

15. **H. in S.:** Nachdem durch den Besitzer der Pferde Anämieverdacht gemeldet wurde, wurde durch den beamteten Tierarzt bei zwei zur Diagnose geschlachteten Pferden ein starker Befall mit Palisadenwürmern als Krankheitsursache ermittelt. Serologisch beide Pferde —/—.

Aus der obigen Kasuistik erhellt, daß Pferde, die an interkurrenten Krankheiten leiden, serologisch negativ reagieren.

Es soll jedoch nicht verhehlt werden, daß bei einer nicht kleinen Zahl von Patienten der Med. Klinik, die verschiedener sporadischer Erkrankungen wegen eingeliefert wurden, die serologische Untersuchung, ein positives Resultat ergab, dessen Richtigkeit durch Taubenkontrollimpfversuche bestätigt wurde. Über diese Pferde soll in einer späteren Abhandlung weiteres mitgeteilt werden.

Zusammenfassung.

1. Mit Hilfe der Lipoidbindungsreaktion ist bei genauer Befolgung der technischen Vorschriften die Diagnose der ansteckenden Blutarmut möglich.
2. Das Auftreten der Reaktion ist weniger an die Gegenwart des Erregers, als an dessen aktive Einwirkung auf den Körper des Wirtstieres gebunden.
3. Es werden daher nur solche Pferde erfaßt, die klinisch unter dem Einfluß des Erregers stehen oder gestanden haben.
4. Die Reaktion tritt frühestens 2—3 Tage, spätestens etwa 14 Tage nach erfolgter aktiver Einwirkung auf.
5. Virusträger können serologisch nicht ermittelt werden, deren Feststellung ist vielmehr dem Tierexperiment vorbehalten.
6. Ein positiver Ausfall der Reaktion infolge anderer Erkrankungen konnte bisher nicht ermittelt werden.
7. Erfahrungen über die Brauchbarkeit der Reaktion bei der Untersuchung von Maultieren und Eseln liegen nicht vor.

II. Die Diagnose der ansteckenden Blutarmut mit Hilfe der Hämagglutination.

Der Vollständigkeit halber soll hier noch ein Verfahren mit angeführt werden, das uns vor Jahren, als die ansteckende Blutarmut noch in der größeren Anzahl der Fälle in akuter Form verlief, gute Dienste bei der Feststellung der Krankheit geleistet hat. In diesem Verfahren haben wir uns die Eigenschaft des Serums anämiekranker Pferde, die Blutkörperchen von Kaninchen zu agglutinieren, zu Nutze gemacht. Zunächst sei wiederum die Arbeitstechnik beschrieben:

Zur Ausführung der Methode sind erforderlich:

a) Tyrodelösung:

Rp. Calcium chloratum
Magnesium chloratum
Kalium chloratum ää 8,0
Natrium chloratum 334,0
Natrium bicarbonicum 2,0

werden mit Aqua dest. (2000,0 Gramm) vermischt. Das Ganze ist die Stammlösung, die vor Gebrauch kräftig zu schütteln ist. Von der Stammlösung setzt man 400 ccm : 7100 Aqua dest.

b) Karbolsäurelösung (5,0 ccm Acidum carbolicum liquefactum auf 95 ccm Tyrode).

c) Aktives Serum eines gefundenen Pferdes, und zwar 1 Teil Serum mit 9 Teilen Tyrode verdünnt.

d) Blutkörperchen von Kaninchen, und zwar von gefundenen wie von infizierten (negative und positive Kaninchen). Die Kaninchen werden folgendermaßen präpariert:

α) Gefunden Kaninchen werden zweimal, in Zwischenräumen von drei Tagen, durch Herzpunktion je 10–20 ccm Blut entzogen (= negatives Kaninchen);

β) ein gefundenes Kaninchen (Tier Nr. 1) erhält in Abständen von je drei Tagen dreimal je 5 ccm Serum eines anämiekranken Pferdes intravenös; 8 Tage nach der letzten Seruminfektion wird von diesem Tier Nr. 1 ein gefundenes Kaninchen (Tier Nr. 2) infiziert (= positives Kaninchen), und zwar erhält dieses dreimal je 5 ccm Blut in dreitägigen Abständen von Tier 1. Dem so präparierten Tier Nr. 1 werden wiederholt, wie unter α) beschrieben, durch Herzpunktion 15–20 ccm Blut entzogen. In unserem Institut werden derartig präparierte negative und positive Kaninchen ständig vorrätig gehalten.

Im Bedarfsfalle stellt man sich von diesen Kaninchen eine Blutauflschwemmung folgendermaßen her: Man gewinnt von den negativen und von den positiven Kaninchen durch Herzpunktion etwa je 4 ccm Blut, schüttelt dieses getrennt in einem Fläschchen mit Glasperlen 10–15 Minuten lang. Dann bringt man 6–8 Tropfen des Schüttelblutes in je 100 ccm auf 38,0 Grad erwärmte Tyrode. Die Blutauflschwemmung ist brauchbar, wenn 0,5 ccm derselben, mit 1,5 ccm Tyrode in einem A-Röhrchen gemischt, eine schwach perlmutterglänzende Auflschwemmung ergeben.

Technik der Hämagglutination: In ein Reagenzröhrchen werden 0,05 ccm Karbolsäurelösung gefüllt. Dazu kommen 1 ccm des zu untersuchenden, vorher gut abzentrifugierten Serums nebst 4 ccm Tyrodelösung. Nach guter Durchmischung füllt man hiervon in drei A-Röhrchen je 0,5 ccm und fügt in jedes A-Röhrchen 1 ccm des unter c) erwähnten gefunden Pferdeferums. Dieses Gemisch wird 30 Minuten lang im Wasserbade bei 56 Grad C inaktiviert und die Röhrchen werden dann in ein Wasserbad bei 38–39 Grad C gestellt. In zwei A-Röhrchen kommen je 0,5 ccm Blutauflschwemmung von einem negativen, in das dritte A-Röhrchen 0,5 ccm von einem positiven Kaninchen. Nunmehr verbleiben die Röhrchen 3–4 Stunden im Wasserbade bei 38 bis 39 Grad C, um dann geprüft zu werden. Die Reaktion gilt als positiv, wenn die Blutkörperchen in Form eines Ringes am Boden des Röhrchens haften und beim Schütteln der Röhrchen in Flocken aufwirbeln. Das Resultat ist negativ, wenn sich die Blutkörperchen in Knopfform am Boden des Röhrchens gesammelt haben und wenn sich der Inhalt des Röhrchens beim Schütteln gleichmäßig trübt. Bei starkem Gehalt des zu prüfenden Serums an Agglutininen werden die Blutkörperchen sowohl des negativen wie des positiven Kaninchens agglutiniert, bei geringem Agglutiningehalt nur die Erythrozyten des positiven Kaninchens.

Das Verdünnungsverhältnis des zu untersuchenden Serums von 1 : 20 haben wir auf Grund zahlreicher Untersuchungen ermittelt. Bei diesen stellte sich heraus, daß anämiekranken Pferde, bei denen überhaupt eine spezifische Agglutininbildung vorhanden war, eine Reaktion in dieser Verdünnung ergab. Normalsera dagegen weisen auch agglutinierende Eigenschaften auf, jedoch häufig nur in einem Verdünnungsverhältnis von 1 : 3 bis 1 : 5 (unspezifische Agglutination).

Die Vornahme der Reaktion im Wasserbad bei 38–39 Grad ist erforderlich, da Pferdeferum auch in erheblich stärkeren Verdünnungen bei niedrigeren Temperaturen die Kaninchenblutkörperchen zusammenballt. Für die Vornahme jeglicher Hämagglutination muß daher die Isothermie gewahrt bleiben, d. h. es muß die Eigenwärme des Tierkörpers beim Ablauf der Reaktion vorhanden sein, die am höchsten ist.

Eine Inaktivierung der zu untersuchenden Sera ist zweckmäßig, da evtl. hämolyisierende Eigenschaften beseitigt werden müssen.

Um die Hämagglutination unter möglichst günstigen Bedingungen abzuwickeln, muß mit möglichst wenig Blutkörperchen gearbeitet werden, diese wenigen Blutkörperchen müssen aber während der Sedimentationsdauer erhalten werden, d. h. es muß ein Verdünnungsmedium geschaffen werden, das die empfindlichen roten Blutzellen weitgehend vor der Auflösung bewahrt. Dazu muß zunächst die Verdünnung des Pferdeferums mit einer Salzlösung vorgenommen werden, die in einem möglichst nahen Verhältnis zu den physiologischen Eigenschaften des Serums steht. Mit der Tyrodelösung haben wir hier gute Erfahrungen gemacht. Weiter spielt aber auch, wie sich bei unseren zahlreichen Versuchen herausgestellt hat, der Eiweißgehalt eine nicht zu

unterschätzende Rolle. Ein Serumeiweißgehalt in einer Verdünnung von 1 : 20, wie er durch die Verdünnung des zu untersuchenden Serums erzielt wird, stellt für die Erhaltung der roten Blutkörperchen noch nicht die idealste Suspensionsflüssigkeit dar. Erst bei einem Gesamteiweißgehalt von 1 : 10 werden die Blutkörperchen weitgehend erhalten. Der natürlichste Weg wäre nun gewesen, mit Kaninchenferum, das zweifelsohne für diesen Zweck das natürlichste Auffüllungsmittel gewesen wäre, den fehlenden Eiweißanteil zu ersetzen. Bei diesbezüglichen Versuchen stellte sich jedoch heraus, daß das Kaninchenferum infolge seines hohen Globulingehaltes während der Sedimentationszeit ausflockt und dadurch die Reaktion unübersichtlich macht. Wir haben dann im Serum gesunder Pferde ebenfalls ein Eiweiß gefunden, daß dieser Aufgabe vollkommen gerecht wird.

Wie schon eingangs erwähnt wurde, kommt das Verfahren der Hämagglutination infolge der mehr chronisch verlaufenden Krankheitsfälle in neuerer Zeit für die Diagnose nicht in dem Maße in Frage, wie es vor einigen Jahren der Fall war. Es soll deshalb im Rahmen dieser Arbeit davon abgesehen werden, eine umfangreiche Kasuistik anzuführen; wir wollen uns vielmehr darauf beschränken, über Infektionsversuche zu berichten, die mit gefunden Versuchstieren angestellt wurden, um die Erfahrungen, die an bekannt klinisch kranken Pferden aus Preuß. Gestüten gemacht worden sind, zu erhärten. Diese Versuche sind uns auch aus einem anderen Grunde sehr wertvoll, da sie — das gehört allerdings nicht in den Rahmen dieser Arbeit — einen wertvollen Rückschluß auf den von einigen Seiten angefeindeten Kaninchenversuch gestatten.

Die Übertragungsversuche auf gesunde Versuchspferde sollten erhellen, ob

1. das Serum eines klinisch an ansteckender Blutarmut erkrankten Pferdes, das ein positives Hämagglutinationsresultat ergab, bei einem gefunden Pferde, das diese Eigenschaft vermissen ließ, die agglutinatorische Eigenschaft auslöst;
2. das Serum eines nicht klinisch kranken Pferdes, das in der Hämagglutination positiv reagierte, diese agglutinierenden Eigenschaften einem gefunden Pferd ebenfalls mitteilt;
3. wann mit dem Eintritt der Hämagglutination nach erfolgter Infektion gerechnet werden kann.

Bei sämtlichen Versuchstieren wurde prinzipiell dreimal täglich und zwar morgens um 8 Uhr, mittags um 12 Uhr und abends um 6 Uhr die Temperatur aufgenommen. Fernerhin wurden mit der Thoma-Zeiß'schen Zählkammer eine Zählung der Erythrozyten, eine Bestimmung des Hämoglobinswertes nach Autenrieth-Königsberger und aus diesen beiden Faktoren die Errechnung des Blutwertes vorgenommen. Diese Untersuchungen wurden regelmäßig zwischen 10 und 12 Uhr vormittags durchgeführt; gleichzeitig mit dieser Blutentnahme wurde eine Blutprobe der serologischen Untersuchung zugeleitet. Außerdem wurde jedes Versuchstier vor der Infektion im Kaninchenversuch geprüft und nur bei dessen negativem Ausfall in Verbindung mit dem negativen Befund von Temperatur und Hämogramm in den Versuch eingestellt. Nach Auftreten der Reaktion resp. der klinischen Erscheinungen wurde dann ebenfalls wiederum ein Kaninchenversuch eingeleitet.


Als Ausgangsmaterial diente das Serum einer durch das Hämagglutinationsverfahren als anämiekrank ermittelten Stute eines hannoverschen Landwirtes — Testpferd „Hannover“ —. Das Pferd war nach Angabe des Besitzers trotz guten Futters im Ernährungszustand erheblich zurückgegangen und zeigte sich bei der Arbeit außerordentlich leicht ermüdet. Eine eingehende klinische Untersuchung gestattete keine Rückschlüsse auf anderweitige Organerkrankung, dagegen stellte sich, wie vom Besitzer angegeben,

sehr schnell Ermüdung bei der Arbeit ein. Zur Kontrolle der serologischen Untersuchung wurden Kaninchen infiziert, die ein positives Hämogramm ergaben. Sehr bald wurde das Resultat auch durch die klinischen Erscheinungen bestätigt, indem vom 21. März 1924 bis 1. April 1924, weiter vom 9. April bis 20. April, vom 26. April bis zu dem am 30. April 1924 erfolgenden Exitus letalis Fieberanfälle mit Höchsttemperaturen von 40,1 Grad bzw. 41,1 Grad C bzw. 40,0 Grad C festgestellt wurden. Das Hämogramm zeigte ebenfalls die charakteristischen Erscheinungen für ansteckende Blutarmut, d. h. einen Abfall der roten Blutzellen und ein stark ausgeprägtes Ansteigen des Blutwertes. Die Diagnose „ansteckende Blutarmut“ wurde weiter durch den pathologisch-anatomischen und pathologisch-histologischen Befund bestätigt. Die pathologisch-anatomische Diagnose ergab folgenden Befund:

Hochgradige Anämie in allen Teilen, Myodegeneratio parenchymatosa cordis, Petechiae epi- et endocardiales, im Gekrösefett sowie im Knochenmark beider Femurknochen Blutungen, Blutungen in der Schleimhaut des Dickdarms, Petechiae subcapsulares lienis, Tumor lienis hyperplasticus diffus acutus, Hepatitis parenchymatosa, Nephritis, Hypostasis pulmonis sinistrae.

Histologischer Befund: Rundzelleninfiltrationen und Siderozyten in der Leber, in der Milz Pigmentschwund.

Ausgehend von diesem Virusstamm haben wir eine Reihe Passagen in den nachstehenden Versuchspferden I, II und III angelegt.



Versuchspferd I.

Die durchschnittliche Zahl der roten Blutzellen beträgt während der Voruntersuchung vom 28. Februar bis 21. März durchschnittlich 3,937 Millionen, als höchster Wert wird 4,05, als niedrigster 3,825 Millionen ermittelt. Der Blutwert schwankt zwischen 13,4 und 14,0, er beträgt im Mittel 13,7. Fieberhafte Temperatur wird während der Vorbeobachtungszeit nicht ermittelt, ebenfalls wird durch Kaninchenversuch festgestellt, daß das Versuchspferd frei vom Keim der ansteckenden Blutarmut ist. Die täglich vorgenommene serologische Untersuchung ergibt ebenfalls — Hämagglutination.

Am 21. März 1924 erfolgt die Infektion mit 75 ccm Serum des Testpferdes „Hannover“. Während nach der Infektion die Zahl der roten Blutkörperchen nur unerheblich sinkt, prägt sich das Haften der Infektion bald durch eine prozentuale Vermehrung des Hämoglobins, die sich in einem deutlichen Ansteigen des Blutwertes äußert, aus. Dieser erreicht am 11. April 1924 als Höchstwert 18,6. Nachdem bereits einige Tage vorher ein kurzer Fieberanfall aufgetreten

ist, wird am 30. März die Höchsttemperatur von 39,4 erreicht. Am 12. Tage post inf. wird die serologische Reaktion zunächst mit einem Agglutinationswert von 1:20, der nach sechs Tagen auf 1:400 gestiegen ist, positiv. Ein von dem Pferd nunmehr angefertigter Kaninchenversuch wird ebenfalls positiv. Am 13. April 1924 muß das Pferd notgeschlachtet werden. Der pathologisch-anatomische Befund bestätigt die Diagnose der ansteckenden Blutarmut.

Zusammenfassung.

Ein durch Hämogramm, Temperatur, Kaninchenversuch und serologische Untersuchung als gefund ermittelttes Pferd weist 11 Tage post. inf. eine positive Hämagglutination auf. Das Haften der Infektion wird durch ein positives Hämogramm, durch Temperaturerhöhung, positiven Ausfall des Kaninchenversuches und pathologisch-anatomische Untersuchung bestätigt (siehe nachst. Hämogramm):



Versuchspferd II.

Die durchschnittliche Zahl der roten Blutzellen beträgt während der Voruntersuchung vom 2. April 1924 bis 13. April 1924 4,062 Millionen. Als höchster Wert wird 4,087, als niedrigster 3,975 Millionen ermittelt. Der Blutwert schwankt zwischen 17,1 und 18,4. Fieberhafte Temperaturen werden während der Voruntersuchung nicht ermittelt. Neben dem negativen Ausfall der Hämagglutination beweist ein Kaninchenversuch, daß das Versuchstier frei vom Keim der ansteckenden Blutarmut ist.

Am 13. April wird das Pferd mit 10 ccm Serum von Versuchspferd I subkutan infiziert, (Passage Testpferd „Hannover“ — Versuchspferd I — Versuchspferd II.) 15 Tage p. inf. setzt ein Abfall der roten Blutkörperchen ein, der am 5. Mai 1924 mit 2,9 Millionen seinen tiefsten Stand erreicht. Gleichzeitig ist ein prozentuales Ansteigen des Hämoglobins zu beobachten, das in einem stetigen Ansteigen des Blutwertes seinen Ausdruck findet. Dieser erreicht am 3. Mai mit 27,1 seinen höchsten Wert. Am 23. April stellt sich eine geringgradige Temperaturerhöhung auf 38,7 ein, am 25. April, also 12 Tage p. inf. steigt die Temperatur auf 40,6 Grad C., um erst kurz vor dem Exitus letalis zur Norm zurückzukehren. Drei bzw. einen Tag nach dem Fieberanfall wird die Hämagglutination mit einem Titer von 1:50, später mit 1:200 positiv. Der am 1. Mai vorgenommene Kaninchenversuch ergibt ein positives Resultat und bestätigt ebenso wie die nach Verenden des Pferdes am 14. Mai vorgenommene Sektion das Haften der Infektion.


Sektionsbefund: Neben multiplen Blutungen unter den serösen Häuten des Herzens, der Därme, werden

folche im Knochenmark beider Oberschenkelknochen nachgewiesen. Außerdem besteht ein hyperplastischer Milztumor.

Histologischer Befund: Leber: Läppchenzeichnung gut erhalten, auffallend starke Erweiterung der Kapillaren. In diesen neben Erythrozyten und farblosen Blutzellen zahlreiche Siderozyten. Stärkste Erweiterung der Kapillaren in den zentralen Abschnitten der Läppchen. In der Umgebung der Pfortaderverzweigungen kleinere Ansammlungen von lymphoiden Zellen. In der Nachbarschaft der Zentralvenen machen sich kleinere, aus lymphoiden Zellen sowie Siderozyten bestehende Zellansammlungen bemerkbar. Milz: Pigmentschwund und starker Blutreichtum.

Zusammenfassung.

Ein durch Hämogramm, Temperatur, Kaninchenversuch und serologische Untersuchung als gesund ermitteltes Pferd zeigt nach 10—12 Tagen p. inf. Temperaturerhöhung, denen ein Abfall der Erythrozyten sowie ein ständiges Anwachsen des Blutwertes folgt. Die Hämagglutination wird drei bzw. einen Tag nach dem Fieberanfall oder 13 Tage p. inf. positiv. Außer durch Hämogramm und Temperaturerhöhung wird das Vorliegen der ansteckenden Blutarmut durch pathologisch-anatomischen und pathologisch-histologischen Befund sowie durch positiven Kaninchenversuch bestätigt (siehe nachst. Hämogramm):



Versuchspferd III.

Während der Voruntersuchung vom 5. Mai 1924 bis 14. Mai 1924 schwankt die Zahl der roten Blutzellen um den Mittelwert 4,430 Millionen zwischen 4,75 und 4,362 Millionen. Der Blutwert schwankt zwischen 17,4 und 19,12. Fieberhafte Temperaturerhöhungen kommen nicht zur Beobachtung. Die Hämagglutination ist ständig negativ, ebenso beweist ausgefallener Kaninchenversuch, daß das Versuchspferd frei von dem Keim der ansteckenden Blutarmut ist.

Am 14. Mai 1924 wird das Tier mit einer Aufschwemmung von Milzbrei des inzwischen verendeten Versuchspferdes II subkutan infiziert (Paßlage: Testpferd „Hannover“ — Versuchspferd I — Versuchspferd II — Versuchspferd III). 10 bzw. 11 Tage nach der Infektion tritt eine Temperaturerhöhung, die mit 40,1 Grad C ihren höchsten Stand erreicht, ein. Am 30. Mai ist die Anzahl der Erythrozyten auf 3,837 Millionen gesunken, ebenfalls ist der Blutwert von dem mittleren Wert 18,5 auf 23,2 gestiegen. Die serologische Reaktion wird am 31. Mai, also sechs Tage nach dem Fieberanfall oder 17 Tage nach erfolgter Infektion, positiv. Sie erreicht sehr bald nach einem anfänglichen Titer von 1:20 einen solchen von 1:400. Der nunmehr eingeleitete

Kaninchenversuch wird ebenfalls positiv und beweist so einerseits das Haften der Infektion. Am 14. Juni verendet das Versuchstier.

Sektionsbefund: Myodegeneratio parenchymatosa cordis. Vereinzelt subepicardiale Blutungen in der Umgebung der Längs- und Kranzfurche. Hypostasis der linken Lunge. Subpleurale Blutungen. Degeneratio parenchymatosa renum. Tumor lienis hyperplasticus diffusus. Degeneratio adiposa hepatis. Typhlitis catarrhalis.

Histologischer Befund: Leber: ausgedehnte, aus Lymphozyten, lymphoiden Elementen sowie vereinzelt Erythroblasten und Siderozyten zusammengesetzte Zellansammlungen um die Zentralvenen. Starke zentrale Erweiterung der Kapillaren. In den Kapillaren lymphoide Zellen sowie Siderozyten. Periportal gelegene Ansammlungen von lymphoiden Zellen. Milz: Starker Pigmentschwund.

Zusammenfassung.

Ein durch Hämogramm, Temperaturmessung und serologische Untersuchung als gesund ermitteltes Pferd zeigt nach einer Infektion mit Milzbrei eines an ansteckender Blutarmut verendeten Versuchspferdes einen deutlichen Abfall der Erythrozyten, verbunden mit einem Anstieg des Blutwertes. Die serologische Reaktion wird sechs Tage nach erfolgtem Fieberanfall positiv. Durch pathologisch-anatomische, pathologisch-histologische Untersuchung und durch Kaninchenversuch wird die Diagnose bestätigt.

Versuchspferd V.

Das ca. zweijährige Fohlen hat in der Voruntersuchung eine Erythrozytenzahl von durchschnittlich 5,06 Millionen bei einem Höchstwert von 5,010 Millionen. Der Blutwert beträgt im Mittel 12,6; er schwankt zwischen 10,8 und 13,3. Fieberhafte Temperaturen werden während der Vorbeobachtung zwischen dem 6. Mai und 23. Mai 1924 nicht beobachtet. Die täglich vorgenommene Hämagglutination ergibt stets ein negatives Resultat, ebenso ist ein Kaninchenversuch negativ.

Als Infektionsmaterial für dieses Versuchstier dient das in der Hämagglutination positiv befundene Serum eines klinisch unverdächtigen, aber aus einem Anämiebestand stammenden Maultieres. Seit der Beobachtungszeit aus dem Jahre 1924 bis jetzt (1928) hat das Tier niemals klinische Anzeichen der ansteckenden Blutarmut gezeigt (die genaue Beobachtung war möglich, da das Tier im Jahre 1924 in den Besitz des Veterinär-Untersuchungsamtes übergegangen ist).

Das Versuchspferd wurde am 23. Mai 1924 mit Serum dieses Maultieres subkutan infiziert. Am 3. Juni ist ein Erythrozytenabfall auf 3,912 Millionen zu verzeichnen, während der Blutwert eine steigende Tendenz zeigt und als höchsten Wert 15,7 gegenüber einem Mittelwert von 12,6 in der Voruntersuchung aufweist. Fieberanfälle treten am 27. Mai und 12. Juni auf. Die Hämagglutination wird am 31. Mai, also vier Tage nach dem ersten Fieberanfall oder acht Tage p. inf. positiv. Ebenfalls ergibt ein Kaninchenversuch p. inf. ein positives Resultat. Da das Tier im Institut nicht zur Sektion kam, steht die Erhärtung durch den pathologisch-anatomischen Befund leider aus.

Zusammenfassung.

Ein im Hämogramm, in Temperatur, serologischer Untersuchung und im Kaninchenversuch frei von ansteckender Blutarmut befundenes Fohlen wird nach Infektion mit Virus eines nicht klinisch kranken, dagegen durch das Hämagglutinationsverfahren ermittelten Virusträgers ebenfalls im Hämagglutinationsverfahren positiv. Hämogramm, Temperaturkurve und der positive Ausfall eines Kaninchenversuches beweisen, daß Virus der ansteckenden Blutarmut bei der Infektion übertragen worden ist.

Verfuchspferd IV.

Um festzustellen, ob nicht bei gefundenen Pferden etwa auch gelegentlich das Blut hämagglutinatorische Eigenschaften annehmen kann, haben wir ein Pferd ohne irgendwelche Vorbehandlung derselben Untersuchung unterworfen wie die zu Infektionszwecken benutzten Tiere. Das im Kaninchenverfuch negativ befundene Pferd wurde vom 5. Mai bis 6. September 1924 regelmäßig im Blutbild, Temperatur und Hämagglutinationsverfahren beobachtet. Die Zahl der roten Blutkörperchen ergab einen Mittelwert von 5,1 Millionen mit einem höchsten Wert von 5,225 und einem niedrigsten von 4,900 Millionen. Der Blutwert, dessen Mittel sich um 13,4 bewegt, erreicht einen Höchstwert von 14,7 und einen niedrigsten Wert von 12,9. Fieberhafte Temperaturen wurden während der ganzen Beobachtungszeit nicht ermittelt. Die Hämagglutination war ständig negativ.

An unseren Verfuchspferden haben wir feststellen können, daß bereits wenige Tage nach erfolgtem Fieberanfall das Phänomen der Hämagglutination ausgelöst wird. Auch hier liegt nach den Erfahrungen aus der Praxis wieder der Gedanke nahe, daß der Erwerb der agglutinierenden Eigenschaften nicht lediglich an die Anwesenheit des Virus gebunden ist, sondern eine Folge des Anämiefieberanfalles ist.

Diese hämagglutinierenden Eigenschaften haben wir auch bei unseren spontan kranken Institutspferden beobachtet, wenn ein erneuter Fieberanfall eingetreten war. Es seien hier noch kurz einige Daten angeführt:

N a m e.	Fieberanfall	Hämagglutination	Tage nach den Fieberanfällen
Ostmark	22. X.—25. X. 1927	14. XI.	20—23
Ondoka	13. II.—19. II. 1928	26. II.	7—13
Warchau I	21. IV. 1928	30. IV.	9
Celebes	12.—17. III. 1928	4. IV.	18—23
Bettag	24.—28. XII. 1927	4. I.	7—10
Petschili	11. II.—20. II. 1928	13. III.	22—31

(Anmerkung: Die verhältnismäßig lange Zeitdauer bis zum Auftreten der Hämagglutination nach stattgehabtem Fieberanfall ist damit zu erklären, daß eine fortlaufende tägliche Untersuchung nicht vorgenommen, sondern nur gelegentlich Blutuntersuchungen angestellt wurden. Nach den bei den täglich untersuchten Verfuchspferden I, II, III und V angestellten Ermittlungen ist auch bei diesen Tieren anzunehmen, daß eine Erfassung mit der Hämagglutination bereits viel zeitiger möglich gewesen wäre.)

In praxi besitzt die Hämagglutination, wie eingangs schon erwähnt, eine geringere Bedeutung als die Lipoidbindungsmethode, da die Bildung von Agglutininen im allgemeinen ziemlich schwach ist und nach nicht allzu langer Zeit nach den jeweiligen akuten Anfällen wieder verschwindet. Allerdings gibt es auch wieder Virusträger, die jahrelang die Reaktion in unverminderter Stärke zeigen.

Zusammenfassung.

1. Mit Hilfe der Hämagglutination können solche Pferde ermittelt werden, die vor nicht all zu langer Zeit einen akuten Anfall an ansteckender Blutarmut erlitten haben.

2. Das Auftreten der Reaktion ist weniger an die Gegenwart des Erregers, sondern vielmehr an dessen akute Einwirkung auf den Körper des Wirtstieres gebunden.

3. Die Reaktion tritt im allgemeinen 2—3 Tage nach erfolgtem Fieberanfall auf.

4. Virusträger und chronisch kranke Pferde lassen in der Regel die hämagglutinierenden Eigenschaften vermissen.

5. Ein positiver Ausfall der Reaktion infolge anderweitiger Erkrankungen wurde von uns bisher nicht festgestellt.

Im Zusammenhang mit den Veränderungen, die im Blutbild der Verfuchspferde I, II, III und V aufgetreten sind, soll noch kurz ein Vergleich mit den Veränderungen des Kaninchenblutbildes, das unter dem Einfluß des Keimes der ansteckenden Blutarmut steht, gezogen werden.

Beim Kaninchen prägt sich dieser Einfluß nach Oppermann in drei entscheidenden Faktoren aus:

1. Abfall der Zahl der roten Blutzellen,
2. prozentuales Ansteigen des Hämoglobins, das sich
3. in einem Ansteigen des Blutwertes charakterisiert.

Bei unseren Verfuchspferden haben wir in jedem Falle in einwandfreier Weise dartun können, daß auch das Pferd in derselben Weise diese Veränderungen als Folge des Einflusses des Erregers der ansteckenden Blutarmut aufweist. Auch hier finden wir einen mehr oder weniger starken Zerfall der roten Blutkörperchen und ein starkes Ansteigen des Blutwertes. Mithin dürfte durch die Gleichartigkeit der Erscheinungen beim Pferd und beim Kleintier der vereinzelt angefeindeten Brauchbarkeit des Kaninchenverfuches eine wertvolle Stütze geboten werden.

Literatur.

Dahmen: Zur Serodiagnostik der Besehlfleuche, die Lipoidbindungsreaktion, B. t. W. 1920, S. 532. Derselbe: Über zwei Lipoidreaktionen zur Diagnose der Lungenfleuche. B. t. W. 1921, S. 73. Dahmen und David: Zur Serodiagnostik der Besehlfleuche. B. t. W. 1921, S. 305. Lührs: Die Diagnose der ansteckenden Blutarmut nach Oppermann. Vet.-Dienst Jan./Febr. 1924, S. 143—150. Meinicke: Über eine neue Methode der ferologischen Luesdiagnose. B. klin. Wschr. 1917, Nr. 25, S. 613. Derselbe: Über eine neue Methode des Antikörperrachweises. Ebenda, Nr. 50, S. 1208. Derselbe: Über Theorie und Methodik der ferologischen Luesdiagnostik. B. klin. Wschr. 1918, Nr. 4, S. 83. Derselbe: Weitere serochemische Untersuchungen bei Syphilis. M. med. Wschr. 1917, Nr. 45, S. 1464. Derselbe: Zur Chemie der serologischen Luesreaktion. Ebenda, Nr. 51. Meinicke und Blei: Eine neue Methode der serologischen Rotzdiagnostik. Zschr. für Veterinärkunde, Jahrg. 30, S. 97. Meinicke: Die Bedeutung der Lipoidbindungsreaktion für die Seuchenbekämpfung. Seuchenbekämpfung 1926, H. 2. Oppermann und Lauterbach: Die Diagnose der infektiösen Anämie mit Hilfe des Kaninchens. B. t. W. 1923, Bd. 46/47, S. 487. Oppermann: Zur Diagnose der infektiösen Anämie des Pferdes. Vortrag in Abt. 33 der 80. Naturforscherversammlung in Innsbruck 1924. Derselbe: Die Diagnose der ansteckenden Blutarmut mittels des Kleintierverfuches. Tierärztl. Rundschau 1924, S. 328/29. Derselbe: Die Diagnose der infektiösen Anämie des Pferdes. D. T. W. 1923, Bd. 31, S. 183—188; 1924, S. 641—642. Derselbe: Ziele und Wege der neueren Forschungsarbeiten über die infektiöse Anämie des Pferdes. Archiv für wissenschaftl. und prakt. Tierheilkunde 1924, Bd. 51, S. 260—279. Schermer und Eigendorf: Die diagnostische Bedeutung des Kaninchenimpfverfahrens bei der infektiösen Anämie des Pferdes. Archiv für wissenschaftl. Tierheilkunde 1926, Bd. 54, S. 299. Standfuss: Zur Erkennung der ansteckenden Blutarmut der Pferde durch den Kaninchenimpfverfuch. B. t. W. 1923, S. 431. Standfuss, Schultz, Schnauder, Peters und Frenzel: Untersuchungen über die ansteckende Blutarmut der Pferde. Archiv für wissenschaftl. Tierheilkunde 1924, Bd. 51, S. 154—176.

Innere Medizin und Chirurgie.

Pietzsch: Harnstoff gegen Warzen. (Zeitschr. für Vet.-Kunde 1927, Jhg. 39, H. 9, S. 382—390.)

Die große Zahl der zur Beseitigung von Warzen empfohlenen Mittel beweist, daß keines derselben einwandfrei

befriedigende Resultate geliefert hat; zum Teil sind sie zu schwach wirkend, zum Teil ist ihre Tiefenwirkung zu stark und unberechenbar. Unter den von Stoeltzner und Stoye auf die narbenauflösende Wirkung hin geprüften kollagenquellenden Verbindungen war schließlich der Harnstoff das bei weitem an erster Stelle stehende Mittel, wobei

zu bemerken ist, daß Harnstoff in nur sehr hoher Konzentration volle Wirkung hat, und zwar als 50prozentige Harnstofflösung, also Harnstoff und Wasser zu gleichen Teilen. Der Harnstoff ist ungiftig und das Gewebe für ihn überaus leicht permeabel. Es gelang dem Verfasser in vier Fällen durch intrakutane Einspritzung von 50prozentigem Harnstoff, das Ausfallen der verschiedenen Warzen bei Pferden zu bewirken (Warzen am Vorderfessel, am linken Nasenloch, in der rechten Flanke, am Sprunggelenk von Erbsen- bis Kastaniengröße). Die Vermutung, daß wir es hierbei mit einer Bereicherung erfolgreicher Warzentherapie zu tun haben, scheint daher berechtigt zu sein, und es wäre zu weiteren Versuchen in dieser Richtung anzuregen. A.

Kern: Über einen Fall von Muskelrheumatismus. (Zeitschr. für Vet.-Kunde 1927, Jhg. 39, H. 9, S. 390—393.)

Verf. beschreibt einen Krankheitsfall bei einem Truppenpferde, das besonders heftig, nachdem es während des ganzen Tages bei kühlem, regnerischem Wetter landwirtschaftliche Arbeiten verrichtet hatte, an Muskelrheumatismus und gleichzeitig an Gelenkrheumatismus und Hufrehe erkrankte. Die Behandlung bestand in Einspritzungen von Kampferöl und Gaben von Natrium salicylicum, die Gelenksanschwellungen wurden z. T. auch mit warmen effigsauren Tonerdebädern behandelt, später traten auch Bestrahlungen mit der Solluxlampe hinzu. Nach Besserung infolge der Behandlung am elften Tage wurde das Pferd auf einen sonnigen Weideplatz gebracht und nach fünf Wochen dauernder Behandlung als völlig geheilt und zum leichten Arbeitsdienst verwendungsfähig entlassen. A.

Pietsch: Beitrag zur Behandlung chronischer Gelenkerkrankungen des Pferdes mit Sanarthrit. (Zschr. für Vet.-Kunde 1927, H. 7, S. 295—302.)

Auf Grund der bekannt gewordenen Erfolge mit Sanarthrit versuchte Verf. es in zwei Fällen; die scheinbar einen neuen Beweis liefern für den Wert des Mittels bei chronischen Gelenkerkrankungen. Bei einer jungen Remonte bestand neben geringer Lahmheit v. l. eine ringförmige Schwellung geringen Grades am Kronengelenk, die sich leicht vermehrt, warm und hart anfühlte. Bei Drehbewegungen im Kronengelenk äußerte das Pferd Schmerzen, eine diagnostische Injektion, die an den nn. volares zwischen Fessel- und Kronengelenk ausgeführt wurde, fiel positiv aus. Vom 16. Januar bis 9. Februar wurde das Pferd mit sieben Einspritzungen zu 1—4,0 (ansteigend je um 0,5 ccm) Sanarthrit behandelt und das Pferd geheilt (Verschwinden der Lahmheit und scheinbares Zurückgehen der Knochenwucherung; Messungen wurden nicht ausgeführt). Im zweiten Falle handelte es sich um Spat links bei einem Offizierdienstpferd. Das Pferd war ohne Erfolg mit Atophanyleinspritzungen behandelt worden, weshalb eine scharfe Einreibung gegeben wurde. Die Lahmheit verschwand, das Pferd ging kurze Zeit wieder unter seinem Besitzer und wurde weiterhin bewegt; nach etwa 3½ Monaten zeigte sich erneute Lahmheit und nun wurde es mit Sanarthriteinspritzungen behandelt (ebenso wie bei Fall 1). Nach etwa 25 Tagen war die Lahmheit verschwunden, das Pferd wurde demnach so gebessert, daß es seinen Dienst wieder versehen konnte. Als geheilt wurde es deshalb nicht geführt, weil die Spatexostose nicht verschwunden war. Ob Rezidiv eintritt, bleibt abzuwarten. In beiden Fällen wurden die Pferde, nachdem sie bei den ersten vier Injektionen (in viertägigen Zwischenräumen unter Steigerung von je 0,5 ccm) Ruhe bekommen hatten, dann aber, nachdem die Lahmheit kaum noch oder gar nicht mehr bestand, täglich 15—20 Minuten geführt. Sonstige Behandlung fand nicht statt. Nach diesen Ergebnissen glaubt Verf. auf diese Kur hinzuweisen, besonders auch aus dem Grunde, weil bekanntlich die gerade so häufigen Leiden der chronischen Gelenkerkrankungen jeder Behandlung trotzen, besonders auch den schweren Eingriffen der scharfen Einreibungen und des

Brennens, und letzteres an Gelenken nicht ganz ungefährlich ist. An Erkrankungen der von starken Muskelpartien bedeckten Gelenke: Hüft-, Knie-, Schultergelenke, ist meist von außen nicht heranzukommen. In diesen Fällen wäre also wohl der Versuch mit einer „Sanarthritkur“ am Platze. A.

Lautenschläger: „Yatren purissimum“ in der Wundtherapie. (Zschr. f. Vet.-Kunde 1927, H. 7, S. 302—310.)

Die eigenen Beobachtungen des Verf. erstrecken sich auf zwölf charakteristische Fälle (Quetschwunde, Rißwunde, Stich-, Biß-, Schußwunde, Kronenabszeß, Nageltritt, Mauke, Widerristfistel, Drahtang, Abszeß am Kehlring und Amputation eines Schweifwirbels). Es muß nach den Ergebnissen ohne Zweifel gesagt werden, daß das Pulver in der Wundbehandlung nicht nur als vollgültiger Ersatz für Jodoform und Jodtinktur in Frage kommt, sondern diese nach vielen Richtungen hin noch übertrifft. In allen Fällen, von denen die meisten ziemlich schwer waren, war eine günstige Beeinflussung des Wundheilprozesses festzustellen. Das Mittel hat in allen Fällen (außerdem wurden noch 60 andere Patienten mit Yatren behandelt), vollkommen befriedigt (kräftige, frühzeitige Granulation; Eigenschaft, die Wunde keimfrei zu machen; tiefe Desinfektionswirkung; schnelle Austrocknung und Sekretionsbeschränkung, rasches Abstoßen nekrotischer Gewebsteile, örtliche Reizlosigkeit und allgemeine Ungiftigkeit, blutstillende desodorisierende Wirkung, Fehlen jeder Nachwirkung, Sparfameit im Gebrauch). A.

Im mendorff: Über Yatren-Behandlung und über einen Fall von Ovariectomie. (Zschr. für Vet.-Kunde 1927, Jhg. 39, Nr. 8, S. 337—343.)

Abgesehen von zwei hoffnungslosen Fällen (chronische Hufgelenkerkrankung mit Bildung von Sohlenzwanghuf bzw. chronische Huf Lahmheit), wo die Yatrenbehandlung keinen Erfolg zeitigte, hat sie sich in Fällen von akuter Sprunggelenkentzündung, Kniegelenkentzündung bewährt und bei chronischer Entzündung des extensor carpi radialis, eine bereits monatelang bestehende brettharte Verdickung des Vorderfußwurzelgelenks ohne scharfe Einreibung zum Schwinden gebracht. — Was die erfolgreiche Behandlung eines infolge dauernder Unrittigkeit unbrauchbar gewordenen achtjährigen guten Reitpferdes mittels Ovariectomie betrifft, so wurde bei der rektalen Untersuchung eine derbe Beschaffenheit beider Ovarien, Vergrößerung des linken Ovars durch zwei deutliche feststellbare Erhebungen, von denen die eine etwa die Größe einer kleinen Pflaume hatte, festgestellt. Operation am stehenden Pferde nach Durchstoßung der oberen Scheidenwand mittels Ekraseurs. Trotz des Mißgeschicks, daß beim Abquetschen des linken Ovars die Kette sprang, konnte, da noch ein zweiter Ekraseur zur Stelle war, die Operation zu Ende geführt werden. Die Untersuchung der Ovarien ergab Verstreichen der linken Ovulationsgrube (rechte noch gering nachweisbar) und vollkommene Sklerosierung der Ovarien; im linken zwei pflaumen- bzw. haselnußgroße Blasen, die zusammen 37 ccm klare, gelbe, seröse Flüssigkeit enthielten; im rechten zwei im Zurückgehen begriffene Corpora lutea mit zusammen 14 ccm Flüssigkeit; kein Auffinden von Follikeln; beide Ovarien waren nicht mehr funktionstüchtig. Das Pferd wurde geheilt. A.

Reisenthal, Th.: Über neuere Wundbehandlung. (M. m. W. 1928, S. 173.)

Bericht über die Ergebnisse bei Behandlung von Wunden mit dem von der Firma Rosenberg in Freiburg vertriebenen „Yxin“. Dasselbe stellt ein braunes, lockeres und feines geruchloses Pulver dar, das aus einem Gemisch von ammoniakalischem Silberoxyd und Stärke besteht, denen eine Glykosidase beigegeben ist. Unter dem Einfluß des Wundsekrets bildet sich Traubenzucker, gleichzeitig fällt metallisches Silber aus unter Abgabe von Sauerstoff, welchen

drei Stoffen eine hervorragende antiseptische Wirkung eigen ist. Im Versuch an Hunden konnten künstlich mit Eiter infizierte und nachher mit Yxin behandelte Wunden entweder per primam oder unter Bildung eines geringen serösen Exsudates zur Heilung gebracht werden. Auf Grund seiner Erfahrungen kommt Verf. zu dem Ergebnis, das Yxin ein stark antibakterielles, andern Wundantiseptics erheblich überlegenes, reizloses, bequem anzuwendendes und billiges Wundheilmittel darstellt, daß sich bei der Behandlung von eiternden Wunden, besonders aber bei der Verforgung von frischen Verletzungen ausgezeichnet bewährt hat. Carl.

Müller, Alexander: **Über konservative Furunkel- und Karbunkelbehandlung.** (T. R. 1928, S. 46.)

Durch die Anwendung der Magnocidfalbe oder anderer Desinfizientien ist eine Infektion bei Entwicklung emphysematöser Früchte, Ablösung der Secundinae usw. nicht immer zu verhindern. Furunkel und Karbunkel sollen nicht operiert werden, es sei denn, daß sie sich in einen durchbruchsreifen Abszeß verwandelt haben. M. wandte mit Erfolg die von Junkermann in der Münch. med. Wschr. vom 2. April 1926 empfohlene graue Salbe an, welche dick auf einen Lappen gestrichen wird, damit der Krankheitsherd bis ins Gefunde hinein und falls sie schon erkrankt sind, auch die benachbarten Lymphdrüsen bedeckt werden. Es erfolgt rasche Erweichung und Abszedierung. Zur Vermeidung einer Quecksilberdermatitis sind die umgebenden Hautpartien durch Zinkpaste zu schützen. K. H. Meyer.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

David: **Über die Bedeutung einiger Wurmerkrankungen des Schweines.** (Aus dem Institut für Tierhygiene der Preuß. Landwirtschaftl. Versuchs- und Forschungsanstalten Landsberg a. d. Warthe.) (T. R. 1928, S. 167.)

Von den Entoparasiten des Schweines sind in erster Linie vier Wurmarten von Wichtigkeit: *Ascaris lumbricoides*, *Strongyloides longus*, *Oesophagostomum dentatum* und *Trichocephalus crenatus*. Die ersten beiden beschränken ihre Wirkung nicht nur auf den ursprünglichen Sitz der geschlechtsreifen Tiere im Darne, sondern da sie bei ihrer Entwicklungswanderung im Tierkörper die Lunge passieren, so wird auch diese vorübergehend in Mitleidenschaft gezogen. Bei der Bekämpfung ist neben der Verabreichung von Wurmmitteln ganz besonderer Wert auf die Vernichtung der Entwicklungsformen außerhalb des Tierkörpers zu legen, die in gründlichen Stalläuberungen und Desinfektionen und in Waschungen der Tiere selber besteht. Besonders bei Sauen empfehlen sich gründliche Maßnahmen kurz vor dem Abferkeln, zumal im Institut für Tierhygiene auffallend häufig lobuläre Pneumonien bei Ferkeln mit Askaridenbefall zur Beobachtung kamen. Inwiefern hiermit im Zusammenhang die durch die verschiedensten Ursachen bedingten enzootischen Lungenerkrankungen der Ferkel stehen, bedarf noch weiterer Nachprüfungen. K. H. Meyer.

Arendsee und Grupe: **Erfahrungen mit Valutin bei Spulwurmerkrankungen.** (T. R. 1928, S. 357.)

Verff. behandelten etwa 50 Hunde mit Valutin und konnten häufig schon nach 20 Minuten das Abgehen von Darmparasiten beobachten. Durch systematische Untersuchungen vor und nach den Wurmkuren konnten einige Tage nach der Kur Wurmeier im Kote nicht mehr nachgewiesen werden. Ein 4 Monate alter Schäferhund zeigte nach Verabreichung zehn großer Kapseln nur Durchfall, eine schädigende Wirkung kam nicht zur Beobachtung. Einige junge Leoparden, Jaguare, Eisbären und andere Raubtiere wurden mit gleichem Erfolge behandelt. Bei Schlangen, welche sehr häufig mit Eingeweideparasiten behaftet sind, durfte das Mittel nicht in Gelatinekapseln gegeben werden, da sich bei diesen Tieren die Eingeweidewürmer häufig oberhalb des Magens in der Speiseröhre befinden. K. H. Meyer.

Vajda, T.: **Ist Santonin ein brauchbares Mittel zur Abtreibung der Spulwürmer des Schweines?** (Tierärztl. Rundschau 1928, S. 306.)

Reines Santonin ist nicht imstande, die Spulwürmer der Schweine abzutreiben, wie an einem an 12 Schweinen angestellten Versuche gezeigt werden konnte. Es wurden mit dem Futter vermengt oder nach vorherigem Hungernlassen 0,01—0,04 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gereicht. Teils mit nachheriger Verabreichung eines Abführmittels. Ob wiederholt verabreichte kleinere oder größere Dosen Santonin eine Wirksamkeit entfalten, müssen weitere Versuche entscheiden. Eine praktische Bedeutung kommt dieser Frage wegen des hohen Preises des Santonins nicht zu.

K. H. Meyer.

Pellkofer: **Wie kann man die Verlustziffer der wegen Leberegelteuche behandelten Tiere noch um ein wesentliches drücken?** (T. R. 1928, S. 150.)

In einigen Fällen großer Hinfälligkeit und Festliegens bei wegen Leberegelteuche behandelten Rindern wurden einmalige subkutane Injektionen von Plasmarsin Bengen erfolgreich angewandt. Besonders auffallend waren die Erfolge bei drei wegen gleicher Krankheit behandelten Pferden, von denen zwei nur noch mit der Hängematte aufrecht erhalten werden konnten.

K. H. Meyer.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Nußhag, W.: **Begriffsbestimmung und Namengebung der Schweineseuchen.** (B. T. W. 1928, S. 81—84.)

Behandlung des Themas ist kritischer geschichtlicher Darstellung, die zu folgenden Schlüssen gelangt:

Der Schweinepest liegt eine Virusinfektion zugrunde. Sie verläuft akut als eine hämorrhagische Septikämie und ist dabei anatomisch durch Blutungen mannigfacher Art in allen Organen, ferner durch blutige Entzündungszustände der Lungen, des Magen-Darmkanals und der Lymphknoten ausgezeichnet, wobei unerörtert bleiben kann, inwiefern diese Entzündungszustände die unmittelbare Folge umfangreicher Blutergüsse sind. Mit zunehmender Chronizität verliert der Prozeß sein deutliches Gepräge und ist, wenn man von einer Entartung und Blässe der Organe absieht, bei ausgesprochenem chronischem Verlauf nicht selten frei von greifbaren Veränderungen. Zwischen der klassischen akuten und der chronischen Schweinepest gibt es aber alle Übergänge. Im späten Stadium stellen sich an den primären Blutungsherden, aber auch unabhängig von ihnen bei der Widerstandsfähigkeit des Organismus sekundäre Bakterieninvasionen ein, die Einfluß auf das gesamte Krankheitsbild gewinnen können, ohne indes das Wesen des Prozesses als eine Virusinfektion im Kerne zu berühren.

Der Nachweis der akuten Schweinepest ist leicht. Er nimmt mit der Chronizität an Schwierigkeit zu und ist schließlich ohne weiteres nicht mehr zu erbringen. Die Diagnose ist dann nur noch mittelbar z. B. auf dem Wege des Tierversuchs möglich. Der Name für dieses Krankheitsbild ist Schweinepest. Bezeichnungen wie Virus Schweinepest sind verwirrend, weil sie die Möglichkeit einer anderen Schweinepest, die es nicht gibt, unterstellen, und überflüssig, weil jedermann weiß, daß die Schweinepest eine Viruserkrankung ist.

Eine Schweineseuche im Schützlichen oder Löfflerischen Sinne gibt es nicht. Die Schweineseuche im Lorenzischen (Gerlachischen) und Gripschen Sinne ist keine Seuche, sondern wahrscheinlich eine Haltungs- oder Ernährungs-krankheit der Ferkel.

Die Suisseptikus-Sepsis ist keine hämorrhagische Septikämie und keine Schweineseuche, sondern ein belangloses, seltenes und sporadisches Leiden. Der Begriff der Schweineseuche ist daher leer, und es empfiehlt sich, ihn ganz allgemein für die ansteckenden Erkrankungen des Schweines zu gebrauchen.

Die bekannten Krankheitszustände der Ferkel, die auf der Grundlage eines Haltungsfehlers entstanden, aber durch sekundäre Bakterieninvasionen kompliziert sind, ähneln der späten Schweinepest außerordentlich, haben begrifflich aber mit ihr nichts gemein. Sie werden, wenn man schon, was keineswegs erforderlich ist, einen besonderen Namen für sie gebrauchen möchte, nach dem gefundenen Erreger bezeichnet.

Carl.

Görttler, V.: Der Wert der Anaeroben-Oberflächenkultur für die veterinärpolizeiliche Feststellung des Rauschbrandes. (Aus dem Staatlichen Veterinär-Untersuchungsamt Potsdam.) (B. T. W. 1928, S. 105—109.)

In einer mit Francke gemeinsam veröffentlichten Arbeit hat Verf. früher darauf hingewiesen, daß für die Zwecke der veterinärpolizeilichen Rauschbranddiagnose die Zeißler'sche Traubenzuckerblutagarplatte nicht ausnahmslos geeignet sei, ein Standpunkt, der von Zeißler angefochten wurde. In ausführlicher Darstellung begründet in vorliegender Veröffentlichung Görttler erneut seine Ansicht und gelangt dabei zu folgenden Schlüssen:

1. Die bei der Oberflächenkultur der Anaeroben nach Zeißler auftretenden atypischen Wuchsformen und Mischkolonien werden vielfach zu Fehlerquellen.

2. Die Bearbeitung derartiger unklarer Fälle ist unter Umständen sehr zeitraubend und kann sich über Wochen und Monate erstrecken, auch ist nicht immer die Gewähr dafür gegeben, daß die endlich getroffene Entscheidung durchaus den tatsächlichen Verhältnissen entspricht.

3. Der Ausfall einer Untersuchung vermittelt der Oberflächenkultur kann für sich allein mit Rücksicht auf die Entschädigungsfrage nicht immer und nicht ohne weiteres bei der Feststellung des Rauschbrandes als entscheidend angesehen werden.

4. Die Anaeroben-Oberflächenkultur hat deshalb für die veterinärpolizeiliche Rauschbranddiagnose nur einen bedingten Wert.

5. Für die Zwecke der wissenschaftlichen Anaerobenforschung dagegen ist die Oberflächenkultur auf der Zeißlerplatte als das z. Zt. leistungsfähigste Verfahren anzusehen. Durch die Oberflächenkultur wird eine weitgehende Trennung der einzelnen Anaerobenarten ermöglicht.

6. Die Ätiologie und Epidemiologie der tierischen Gasbranderkrankungen kann trotz der Verwendung der Oberflächenkultur z. Zt. als noch nicht endgültig geklärt gelten.

Carl.

Glietenberg: Rattentyphusbazillen als Erreger von Paratyphusinfektionen beim Rinde. (B. T. W. 1928, S. 70.)

Im Juli 1927 erkrankte auf dem städtischen Milchhofe eine Kuh an heftiger Darmentzündung und mußte deshalb geschlachtet werden. Ergebnis der bakteriologischen Fleischuntersuchung: Infektion mit dem Bac. enteritidis Gärtner, der in Milz, Niere, Herz, Leber und Beckendrüse nachgewiesen wurde. 14 Tage nachher Notchlachtung eines an anderer Stelle des Stalles aufgestellten Kalbes wegen Durchfalls. Bakteriologischer Befund: derselbe Erreger. Im Jahre vorher waren bei einer notgeschlachteten Kuh desselben Bestandes ebenfalls Fleischvergiftungsbakterien festgestellt worden. Die vom Verf. behufs Nachweis des latenten Infektionsherdes vorgenommenen Untersuchungen (Thermometrierung sämmtlicher Kühe, Untersuchung von Kot und Wasser, ärztlich-bakteriologische Untersuchung des Stallpersonals) verliefen negativ. Es konnte nun in Erfahrung gebracht werden, daß ein Jahr vorher und zu der damaligen Zeit auf dem über dem Stalle gelegenen Futterboden Rattentyphusbazillen ausgelegt worden waren. Die bakteriologische Prüfung einer noch unverbraucht vorgefundenen Agarkultur des Rattentyphusbazillus ergab vollständige Übereinstimmung mit den beiden bei der Kuh und dem Kalbe nachgewiesenen Gärtnerstämmen. Auf Grund dieser Beobachtungen gelangt Verf. zu dem Schlusse, daß zwischen der Er-

krankung der beiden Tiere und der Auslegung der Rattentyphusbazillen ein ursächlicher Zusammenhang vorhanden war. Der absolut sichere Beweis für diese Annahme (Fütterung von Rindern mit Rattentyphuskulturen) konnte allerdings aus wirtschaftlichen Gründen nicht geführt werden. Aus dem beschriebenen Vorkommnis ergibt sich die Notwendigkeit, bei der Verwendung von Bakterienkulturen zur Ungezieferbekämpfung die größte Vorsicht walten zu lassen, da diese eine Infektionsgefahr für Tiere und Menschen darstellen.

Carl.

Möller, O.: Beiträge zur Behandlung der Brustfeuche mit Arsalyt. (In.-Diss. Berlin 1928.)

Das Arsalyt, Bismethylaminotetraminoarsenobenzol hat sich bei der Behandlung der Brustfeuche als sicheres Heilmittel bewährt. Die Ergebnisse an 104 mit Arsalyt behandelten Pferden haben gezeigt, daß das Arsalyt bei der Behandlung der Brustfeuche dem Salvosan und Neosalvosan als gleichwertig zu bewerten ist. Das Arsalyt wurde in der Menge von 3,0 (60 ccm Lösung) und 2,0 (40 ccm Lösung) bei intravenöser Anwendung ohne Nachteil von den Pferden vertragen. Die größere Dosis von 3,0 ist der sicheren Wirkung wegen vorzuziehen. Das Arsalyt hat vor dem Salvosan den Vorzug, daß es gebrauchsfertig in Ampullen zur Infusion abgegeben wird. Das Arsalyt bewirkte in der Regel Entfieberung nach 1—3 Tagen und damit eine auffällige Besserung des Allgemeinbefindens der brustfeuchekranken Pferde. Die Mortalitätsziffer wird bei der Arsalytbehandlung erheblich herabgesetzt. Das Arsalyt zeigte auch bei Petechialfieber im Anschluß an Brustfeuche eine spezifische Wirkung. Bei Petechialfieber nach Druse, sowie Rotz war das Arsalyt ohne Wirkung. Die Herstellung des Arsalyts, die auf die I. H. Farbenindustrie (Höchster Farbwerke) übergegangen ist, wurde eingestellt. Es ist bedauerlich, daß das Arsalyt nicht mehr zu erhalten ist. Wegen seiner spezifischen Wirkung wäre eine Prüfung des Arsalyts auch bei anderen Infektionskrankheiten erwünscht.

A.

Herrmann, O.: Über einmalige obligatorische Schutzimpfung der Hunde gegen Tollwut. (Cbl. für Bakt. 1928, Orig., Bd. 107, S. 84.)

Verf. kommt zu dem Schluß, daß eine einmalige Immunisierung, einerlei mit welchem Impfstoff und in welcher Applikationsform sie vorgenommen wird, zur Erreichung eines sicheren Schutzes nicht ausreicht. Er empfiehlt strengste Durchführung der sanitätspolizeilichen Maßnahmen, ohne die nach seiner Ansicht auch bei Durchführung einer allgemeinen Impfung nicht auszukommen ist.

Schoop.

Löwenberg, W.: Die bakteriziden Kräfte des Darms und ihre Bedeutung für die Typhusinfektion. (Aus der Bakteriologischen Abteilung [Direktor: Dr. Kurt Meyer] und der 1. Inneren Abteilung [Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. L. Kuttner] des Rudolf Virchow-Krankenhauses in Berlin.) (Zschr. für Hygiene 1928, 108, H. 1, S. 1.)

Die bakteriologische Stuhluntersuchung von Typhuskranken und Bazillenträgern hat mit der Schwierigkeit zu kämpfen, daß der kulturelle Nachweis der Typhusbazillen infolge Überwucherns durch die normalen Darmbewohner oft unmöglich gemacht wird. Aber auch in dem mittels der Duodenalfonde gewonnenen Duodenalfast, der ein Gemisch von Galle, Pankreassaft und Dünndarmsekret darstellt, können die Keime — im auffälligen Gegensatz zu ihrem zahlreichen Vorkommen in der Blaufäule — wesentlich seltener und meist nur in spärlicher Zahl nachgewiesen werden. Die Ursache für diese auffälligen Unterschiede vermutet Löwenberg auf Grund früherer Arbeiten in einer bakteriziden Wirkung des Duodenalfastes. Tatsächlich ließ sich auch in vitro bei Einspritzung von pathogenen Keimen, wie Typhus- und Ruhrbazillen, in der überwiegenden Zahl der Fälle eine Abtötung derselben feststellen. Diese keimtötende Wirkung des Duodenalfastes gibt eine Erklärung dafür,

warum bei Typhuskranken und Rekonvaleszenten Typhusbazillen in einer beträchtlichen Zahl von Fällen im Duodenalfast vermißt, bzw. nur spärlich angetroffen werden.
Ziegler.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Franke: Eigenartige Puerperalinfection bei der Kuh. (T. R. 1927, S. 937.)

Verf. beobachtete verschiedene sporadische Fälle einer eigenartigen Puerperalinfection im Anschluß an eine leichte Totgeburt. Man findet eine mehr oder weniger teigige Schwellung der Scham, die sich auch auf die Innenseite der Schenkel erstreckt. Auf der Schleimhaut der Scheide ziehen hochgerötete, grünlichgelbe Stränge scharfbegrenzt zum Muttermund. Retentio secundinarum. Allgemeinbefinden ist hochgradig getrübt, Tiere liegen ächzend und stöhnend auf der Seite, verlangen das Futter, Temperatur 40 Grad und darüber, frequenter schwacher Puls. Alle Behandlungsversuche sind erfolglos. Tod erfolgt innerhalb 24 Stunden. Es finden sich gelatinöse Ergüsse und Infiltrationen in und zwischen den Muskeln der Hinterextremitäten. Fleischvergifter wurden nicht nachgewiesen.

K. H. Meyer.

Reisinger, L.: Untersuchungen über ein in Österreich gehäuft auftretendes, jedoch nicht durch den Bangschen Bazillus verursachtes Verwerfen der Rinder. (W. t. Mschr. 1928, XV. Jhg., S. 102.)

Ein bestimmtes Bakterium kommt für diese Art des Verwerfens nicht in Frage. Als primäre Ursache wurde verschiedentlich der infektiöse Bläschenauschlag angenommen. An Bakterien wurden bei drei Stieren verschiedene Bakterien (Diplo-, Strepto- und Staphylokokken), B. coli, B. pyogenes ermittelt und zwar im Sekret des Präputialsackes und dem Ejakulat. Im Gebärmuttersekret von Kühen (vier Stück) fanden sich sechs Fälle bakterienfrei, acht bakterienhaltig und zwar fanden sich Diplo-, Strepto-, Staphylokokken, B. coli, B. pyogenes bovis, B. renalis bovis in mannigfacher Mischung. Bei sieben abortierten Föten waren die inneren Organe einmal bakterienfrei, viermal fand sich B. pyogenes bovis, je einmal Milchinfection desselben mit Staphylo- + Streptokokken und Staphylokokken + Colibakterien. Eine künstliche Applikation von B. pyogenes intravenös rief bei einer Kuh 30 Tage später Abortus hervor (Fötus 7 Monate alt), aus dessen Organen sich B. pyogenes in Reinkultur züchten ließ.

Berge.

Ziemann, H.: Zur Therapie des seuchenhaften Abortus der Rinder mit Kollargol bzw. ähnlichen Präparaten. (B. T. W. 1928, S. 49.)

Verf. hatte früher ausgezeichnete Erfolge mit Kollargol bei Behandlung des Maltafiebers. Da nun der Erreger dieser Krankheit nach den Untersuchungen von Zeller morphologisch-kulturell, biochemisch und in serologischer Beziehung mit dem Bazillus des infektiösen Abortus der Rinder in allerengster Beziehung steht, so liegt es nahe, auch in derartigen Krankheitsfällen die Kollargoltherapie zu versuchen. Verf. wiederholt seine schon früher ausgesprochene derartige Anregung mit der Bitte, die Versuche auf möglichst breiter Grundlage anzustellen.

Carl.

Rudin, K. E.: Ein Fall von sekundärer, extrauteriner Trächtigkeit bei einer Kuh. (Skandinavisk Veterinär-Tidskrift 1927, S. 343—348.)

(Mit 1 Abbildung.)


Eine große kräftige, gut genährte Kuh, war vor etwa neun Monaten gedeckt worden und die ganze Zeit gesund und munter gewesen, nur hatte sie einige Zeit vor der Untersuchung durch den Tierarzt, aber nur einen Tag lang, Kolikerscheinungen gezeigt, dabei aber wie gewöhnlich gefressen und sonst sich nicht krank gezeigt. Die Zeit der Trächtigkeit war abgelaufen, und die Kuh war seit dem vorhergehenden Tage etwas unruhig gewesen, hatte Kolik-

erscheinungen gezeigt und schwache Wehen gehabt, Fruchtwasser ging aber nicht ab und von einem Kalbe war auch nichts zu sehen. Der Schweizer hatte die Kuh durch die Scheide untersucht, war aber nicht klug geworden.

Bei Ankunft des Tierarztes stand die Kuh und fraß vollkommen, machte aber einen krummen Rücken und in ziemlich langen Zwischenräumen waren schwache Andeutungen von Wehen zu bemerken. An den äußeren Genitalien war sehr wenig von einer bevorstehenden Geburt zu sehen, die Beckenbänder waren kaum eingesunken und die Vulva nur wenig angeschwollen. Wie sich bei der Untersuchung durch die Scheide zeigte, war der Schleimpfropf zum Teil abgegangen und die Zervix für zwei Finger offen. Sonst war nichts zu bemerken. Der Zustand blieb in den nächsten fünf Stunden unverändert. Bei der Untersuchung per rectum erschien der Uterus relativ klein und fest, nicht leicht fluktuierend wie bei normaler Trächtigkeit und auch nicht so tief in die Bauchhöhle herabgesunken wie normal. Das rechte Horn war etwas aufwärts gedreht und völlig palpierbar. Es war kugelförmig zusammengezogen und von fester „teigiger“ Konsistenz. Das linke Horn lag etwas unter dem rechten, konnte aber nicht deutlich unterschieden werden. Über ihm und neben dem rechten lag gleichsam eine Gardine oder ein breites Band. Es war seitwärts verschiebbar und hinten lief es zusammen gegen eine Vertiefung an der linken Seite des Corpus uteri. Die Vertiefung war anscheinend von einem recht festen Wall oder Wulst umgeben. Bei näherer Untersuchung konnte das Band in die Hand genommen und von der Gebärmutterwand in die Höhe gehoben werden. Jetzt ließ sich deutlich unterscheiden, daß es durch eine ziemlich weite Öffnung in der Gebärmutterwand hinein in den Uterus lief. Das andere Ende des Bandes schien irgendwo unten in der Bauchhöhle befestigt. Eine Frucht konnte bei der Rektaluntersuchung nicht gefunden werden, sie wurde aber von außen an der rechten unteren Bauchwand gleich hinter der Rippenwölbung palpiert. Die Zervix wurde nun mit der Hand erweitert. Dies nahm ziemlich viel Zeit in Anspruch. Dabei zeigte sich, daß die Karunkeln der Gebärmutter mit den daran sitzenden Eihäuten sich ungewöhnlich weit nach hinten bis in die Zervix hinein erstreckten. Infolgedessen mußte der Verf. einen Teil der Kotyledonen ringsum das Orific. uter. intern. ablösen, bis er richtig mit der Hand hinein gelangen konnte. Nun war genug Spielraum. Die Gebärmutter war leer, ausgenommen von den Eihäuten, die fest an den Karunkeln saßen. In der linken Wand des Corpus uteri fand sich eine quergestellte ovale, weite Öffnung. Sie war für die Hand leicht passierbar, ihr Rand war wulstig. Es war leicht zu erkennen, daß die Rupturränder abgeheilt waren. Der Riß, durch den die Eihäute in die Bauchhöhle liefen, konnte daher keineswegs frisch sein. Verfolgte Verfasser die Eihäute mit der Hand, so traf er weit unten in der Bauchhöhle die noch lebende Frucht. Sie befand sich in Rückenlage frei außerhalb der Eihäute. Es konnten dabei auch sämtliche erreichbaren Bauchorgane palpiert werden. Ringsum die Rupturstelle am Corpus uteri fühlte sich die Serosa wollicht und rauh, uneben an (Fibrinbelag).

Wie die Sektion ergab, befand sich das ganze Fruchtwasser in der Bauchhöhle, die Frucht lag außerhalb der Eihäute, durch den unverletzten, unveränderten Nabelstrang mit ihnen verbunden. Die Eihäute lagen zusammengefallen wie ein breiter Strang. Die Frucht war offenbar reif und wog nicht weniger als 28 kg. Die Tierärztliche Hochschule, welcher die Gebärmutter und die Eihäute überliefert wurden, gab hiervon folgende Beschreibung: Zervix für vier Finger offen und teilweise mit zähem Schleim gefüllt. Ihre Größe entspricht der normal kontrahierten Gebärmutter. Zwei Tage nach dem Partus. Das linke Horn ist trächtig gewesen. Ungefähr 10 cm kranial um den inneren Gebärmuttermund findet sich an der linken Wand des Corpus uteri eine ovale, etwa 25 cm lange und 10 cm breite, durchgehende Ruptur.

Sie verläuft hauptsächlich quer zur Längsrichtung des Uterus. Ihre Ränder sind abgeheilt, gerundet, fibrös, und durch die Öffnung hängt ein Teil der Eihäute heraus. Ringsum die Rupturstelle, dorso-lateral am linken Horn und am linken Lig. lat. uteri sowie in Fortsetzung nach hinten über die linke Seitenwand zur Zervix und bis in die Excavatio recto-uterina hinein ist die Serosa entzündlich verändert, gerötet und hier und da sind fibrinöse Beläge nachzuweisen. Am rechten Lig. lat. uteri ist die Serosa auf einem kleineren Bezirk rot, wollicht und scheint an die Plazenta fötalis adhäriert gewesen zu sein. Die fötalen Kotyledonen sind fort-dauernd zum größten Teil mit denjenigen der Gebärmutter vereinigt. Wie weit eine sekundäre Plazentabildung zwischen Eihäuten und Peritonäum vorlag, läßt sich nicht entscheiden. Die eben erwähnte Veränderung am rechten Lig. lat. uteri deutet möglicherweise darauf.



Was zur Gebärmutterruptur und zu der darauf folgenden sekundären extrauterinen Trächtigkeit Veranlassung gegeben hat, weiß man nicht. Die erwähnte unbedeutende Gebärmutterverdrehung nach links, weniger als $\frac{1}{4}$ Drehung, dürfte es nicht gewesen sein, sondern wird wohl sekundär, d. h. infolge des Zuges an den durch die Ruptur der linken Seite des Corpus uteri vorgefallenen Eihäuten entstanden sein. Die so unbedeutende Torsion dürfte kaum eine Uterusruptur verursachen können. Die sekundäre extrauterine Trächtigkeit mußte dann viel häufiger sein. Wäre die Torsion auch primär gewesen, und hätte sie sich teilweise gelöst, nachdem die Frucht in die Bauchhöhle vorgefallen war, so hätte eine entsprechende Torsion der Eihäute sich nachweisen lassen müssen. Dies war aber nicht der Fall.

Bass.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Barth, E.: Die Bakterien der Paratyphusgruppe. (Med. Klinik 1927, Nr. 38, S. 1445—1447.)

Verf. muß entsprechend dem Ausfall seiner Experimente trotz der gegenteiligen Ansicht vieler in- und ausländischer Forscher grundsätzlich an der Einheitlichkeit des Bac. Paratyphi B festhalten, wenn auch praktisch zwei ziemlich feststehende, in 70 bis 75 Prozent der Fälle abgrenzbare Typen bezw. Varietäten des Paratyphusbakteriums unterschieden werden müssen, von denen der eine als Erreger des typhus-ähnlichen Paratyphus, der andere im allgemeinen als Fleischvergiftungserreger in Erscheinung tritt. Den ersteren könnte man vielleicht Bazillus Paratyphi B (Schottmüller), den anderen Bazillus B (Breslau) nennen. Leider ist die feste Umgrenzung der einzelnen Vertreter der Paratyphus-

gruppe noch keineswegs vollendet, sondern es bedarf noch weiterer ausgedehnter ärztlicher und tierärztlicher Forschung vor allem in epidemiologischer, aber auch in bakteriologischer Richtung, ehe das Ziel erreicht sein wird. A.

Lehr, E.: Das Vorkommen von echten Paratyphus B Schottmüller-Bazillen bei Tieren. (Cbl. für Bakt. 1928, Orig., Bd. 107, S. 69.)

Bei 7500 bakteriologischen Untersuchungen notgeschlachtete Tiere wurden 152 mal Erreger der Paratyphus-Enteritis-Gruppe ermittelt und unter diesen in zwei Fällen das Bact. paratyphi B Schottmüller. Da der Verf. eine nachträgliche Verunreinigung des Fleisches mindestens in einem der Fälle für ausgeschlossen hält, wird der Schluß gezogen, daß das Bact. paratyphi B Schottmüller gelegentlich, wenn auch sehr selten, bei Tieren vorkommen kann. Schoop.

Gins, H. A. und Kemal Aussein: Über die serologische Differenzierung der Rauschbrand- und Pararauschbrandbazillen. (Cbl. für Bakt. 1928, Orig., Bd. 103, S. 96.)

Es wurden spezifische Antisera von Kaninchen gegen Rauschbrand und Pararauschbrand hergestellt. Das Rauschbrandferum agglutinierte verschiedene Stämme bis 1:1600 und verhielt sich indifferent gegenüber Pararauschbrandbazillen, während das polyvalente Pararauschbrandferum das umgekehrte Bild zeigte. Schoop.

Bingold: Direkte Züchtung von Tuberkelbazillen aus dem strömenden Blut. (Beitr. z. Klinik der Tuberkulose. 1928, Bd. 68, S. 734.)

Es ist Verf. in mehreren Fällen gelungen, mit Hilfe einer besonderen Methodik innerhalb 14—21 Tagen Tuberkelbakterien im strömenden Blut nachzuweisen. Meyn.

Nahrungsmittelhygiene.

Kern, W.: Untersuchungen über die Zuverlässigkeit der „Erythrozytenmethode“ zum Nachweis eines Wasserzugesatzes zu Milch nach M. I. N. Schuurisma. (In.-Dissertation Berlin 1927.)

Eine Verwässerung der Milch kann schon in einem größeren Milchviehbestande einen ansehnlichen Gewinn für den Besitzer, für den Verbraucher aber Vermögensschädigung bedeuten, da ein vollwertiges Nahrungsmittel durch ein minderwertiges ersetzt wird. Durch fortgesetzten Genuß verwässerter Milch können bei Säuglingen und Kranken, für welche die Milch oft das einzige Nahrungsmittel bedeutet, infolge des verminderten Nährwertes Gesundheitsschädigungen eintreten. Es können auch durch Wasserzugatz pathogene Keime in die Milch gelangen (Typhus). Der Wert der üblichen physikalischen und chemischen Methoden zum Nachweis einer Milchverwässerung ist nur sehr bedingt. — Durch die Erythrozytenmethode lassen sich Verwässerungen der Kuhmilch von 10 Prozent an nachweisen. Euterkrankheiten haben keinen Einfluß auf das Ergebnis; dieses kann aber durch Allgemeinerkrankungen so beeinflusst werden, daß Verwässerungen vorgetäuscht werden. In Milch mit mehr als acht Säuregraden darf die Erythrozytenmethode nicht angewendet werden. Die Erythrozytenmethode ist kein vollwertiger Ersatz der kryoskopischen Untersuchung der Milch zum Nachweis eines Wasserzugesatzes. Milch und Blut der Kühe stehen im osmotischen Gleichgewicht, entsprechend einer Gefrierpunktserniedrigung von —0,555 Grad bis 0,56 Grad. Dieses Gleichgewicht wird durch Erkrankungen nicht gestört; Gefrierpunktserniedrigung des Blutes und der Milch machen hierbei die gleichen Schwankungen mit. Das Blut der Ochsen und Bullen ist dem der Kühe äquimolekular. A.

Weisser, Fr.: Untersuchungen über die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse des Molkereiwesens in Argentinien. (In.-Diss. Berlin 1928.)

Verf. schildert die Verhältnisse der Milchgewinnung, die

natürlichen Grundlagen des Molkereiwesens in Argentinien, seine Entwicklung, die städtische Milchversorgung, Milchindustrie, Rentabilitätsverhältnisse, Zukunft, öffentliche Förderung, Steigerungsmöglichkeiten, Inlands- und Weltmarkt sowie volkswirtschaftliche Bedeutung. Was die derzeitige Betriebsweise der Milchviehhaltung anbetrifft, so ist die Umstellung vom reinen Aufzuchtbetrieb auf Milchgewinnung gegenwärtig noch stark im Fluß, woraus sich eine Vielheit der Betriebsformen ergibt. Auf der einen Seite Betriebe mit hochgezüchteten Tieren ausgesprochener Milchrasse, Weideschuppen, Melkanlagen, Futtertürme, auf der anderen rasselose Tiere, die im offenen Wind und Wetter ausgesetzten Koral gemolken und lediglich auf harten Naturkämpfen gehalten werden (zwischen diesen alle erdenklichen Übergänge). Die herrschende Art und Weise der Milchgewinnung geschieht bezüglich des Melkens im Tambo, d. h. in einem eingefriedigten Stück Kamp, das in zwei Hälften, eine größere für das Melken selbst und eine kleinere für den Aufenthalt der Kälber vor dem Melken, abgeteilt ist. Gewöhnlich liegt der Tambo in der Mitte der Weidefläche. Das Melken selbst erfolgt noch fast ausschließlich nach der herkömmlichen Weise „mit Kalb“ (Einlassen der Kälber einzeln in den Melkkoral, wo sie beginnen an der Mutter zu faugen, mittlerweile Fesseln der Hinterbeine der Kuh und Festbinden des Kopfes des fagenden Kalbes an den Vorderfüßen der Mutter). Also gefesselt erwartet die Kuh den Melker, der seine Arbeit nun ruhig ausführen kann. Ist das meist sehr unvollständige Ausmelken geschehen, so bleiben die Kälber bis in die ersten Nachmittagsstunden mit der Mutter zusammen und sie besorgen die Arbeit des Ausmelkens. Nur auf die beschriebene Weise duldet das Muttertier die menschliche Hand; auch wurde die Beobachtung gemacht, daß Kühe, deren Kälber eingehen oder denen sie weggenommen werden, innerhalb weniger Wochen, oft schon nach Tagen mit der Milchabsonderung aufhören und völlig trocken werden. Bemerkenswert ist, daß die Zahl der Betriebe, die Melkmaschinen im Gebrauch haben, zwar noch gering ist, aber gerade in den letzten Jahren merklich zugenommen hat (Melken der dreifachen Anzahl Tiere als bei Handarbeit mit demselben Personal in gleicher Zeit). Vielfach wird auch die Maschine dem Tambero in Miete gegeben. Die Versorgung der Städte geschieht z. T. in ganz moderner Weise (Pasteurisierung, gute Transportmittel usw.). Der Butterfabrikation kommt eine übertragende Bedeutung zu. A.

Bermann, H.: Über das Vorkommen von Paratyphus B- und paratyphusähnlichen Stämmen in Organen frisch geschlachteter, gesunder Tiere. (Aus dem Institut für Hygiene und Bakteriologie in Gelsenkirchen. — Direktor: Prof. Dr. med. H. Bruns.) (Zschr. für Hygiene 1928, 108, H. 1, S. 54.)

Bermann hat 162 Proben verschiedener Organe (aus Herzmuskel und Skelettmuskulatur, in der Hauptsache aber aus Leber, Milz und Niere) gesunder Schlachttiere (Rinder, Schweine, Hammel und Pferde) bakteriologisch untersucht. Die Proben hatten je etwa die Größe einer Streichholzschachtel und wurden sofort nach der Entnahme in sterile, weithalsige Gläser, die mit Wattestopfen verschlossen waren, überführt. Verf. konnte sechsmal, also in 3,7 Prozent Bazillen der Paratyphus-B-Gruppe nachweisen. Am häufigsten fanden sich die Bazillen in der Leber.

Hinsichtlich der Beurteilung des auffälligen Ergebnisses dieser Untersuchungen verweise ich auf die Kritik von Glietenberg in der Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene 1927, 38, S. 97 (Ref.).

Ziegler.

Kirsch, B.: Zur Rinderfinnenfrage. (Städtische Fleischbeschau, Schlachthof Berlin. — Direktor: Dr. Schmey, ausgef. im Laboratorium, Leiter: Obertierarzt Dr. Junack.) (T. R. 1928, S. 139.)

Von einer Zu- oder Abnahme der Finnenfunde kann vorläufig noch nicht gesprochen werden, da die Kriegsjahre nicht berücksichtigt werden können. Verf. ist der Ansicht,

daß der Begriff „ergiebige Schnitte“ des § 24 des B.B.A. durch amtliches Gutachten näher erläutert werden muß, da nach der Art der Schnitte, die beschrieben werden, die Finnenfunde schwanken. Daß in den Herbstmonaten mehr erkrankte Tiere gefunden werden, als in den übrigen Monaten, vermutet K. als mit dem Antrieb zur Weide im Zusammenhang stehend. Zu fordern ist, daß die Laienfleischbeschauer baldmöglichst durch tierärztliche Beschauer ersetzt werden, da die Statistik teilweise ergibt, daß von ersteren trotz erheblich höherer Zahl der untersuchten Tiere im Gegensatz zu den tierärztlichen Beschauern keine Finnen gefunden wurden. K. H. Meyer.

Brüggemann: Starkfinnigkeit bei einem vier Wochen alten Kalbe. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jahrgang, S. 297/298.) (Mit 2 Abbildungen.)

Bei einem männlichen Kalbe im Schlachtgewicht von 28½ kg fand Brüggemann an der Herzoberfläche und auf Schnittflächen der Herzmuskulatur zahlreiche Finnen. Weitere wurden auch in der Bauch- und Beckenmuskulatur, in den Kau- und Schultermuskeln sowie in der Lunge gefunden. Die Gesamtzahl der Finnen war auf 150—200 zu schätzen, dabei war das Fleisch fest, trocken und unverfärbt. Zur Klärung der Frage, ob es sich um eine fötale oder spätere Invasion handelte, ließ v. Ostertag die Finnen auf ihre Größe und die Entwicklung des Baues untersuchen. Nach dem Untersuchungsvorgange konnte es keinem Zweifel unterliegen, daß es sich um eine nach der Geburt zustande gekommene Invasion des Kalbes mit Finnen gehandelt hat, deren Zustandekommen leider nicht festgestellt werden konnte. Edelmann.

Kösler: Die elektrische Betäubung des Schlachtviehes. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jhg., S. 284/285.)

Im städtischen Schlachthof zu Stuttgart wurden zwei Rinder, die geschächtet werden sollten, elektrisch betäubt. Zur Verwendung kam Gleichstrom von 110—120 Volt Spannung, der Stromverbrauch war 1—2 Ampère je Betäubung. Als Elektroden dienten eine 0,06 qm große Kupferplatte, die auf der mit Wasser befeuchteten Lendengegend glatt aufgelegt und durch einen Strick festgehalten wurde, und ein Messingrohr, das wie eine Trense im Maul angebracht war. Als Zuleitung von der Lichtleitung dienten zwei isolierte Drähte mit einem Einschalter. Nach Einschaltung des elektrischen Stromes sanken die Tiere plötzlich in die Knie und legten sich alsbald glatt auf die Seite. Sofort nach dem Auschalten des Stromes, nach 3—5 Sekunden, wurde vollständige Bewußtlosigkeit durch Anwendung äußerer Reize festgestellt. Nach 2—3 Minuten kam das Bewußtsein wieder zurück, aber durch erneutes Einschalten des Stromes auf wenige Sekunden wurde erneut Bewußtlosigkeit hergestellt und der Schächtschnitt ohne jede Schmerzensäußerung und Fesselung vollzogen. Die elektrische Betäubung bedeutet eine wesentliche Vereinfachung und Verkürzung des Schächtaktes, mit der sich auch das orthodoxe Judentum wohl einverstanden erklären könnte. Edelmann.

Hoefnagel, K.: Zur Frage der Betäubung des Schlachtviehes. (Zschr. für Fleisch- u. Milchhygiene, 38. Jhg., S. 283/284.)

Im Schlachthof zu Utrecht, wo wöchentlich 600—700 Schweine geschachtet werden, geschieht die Betäubung aller Schlachttiere seit 6 Monaten durch den Schermerfchen Schußapparat, mit dessen Wirkungen alle Beteiligten außerordentlich zufrieden sind. Edelmann.

Standesangelegenheiten.

Die parlamentarische Vertretung der Tierärzte.

Mehr Ärzte in die Parlamente! so lautete der Schlachtruf in der letzten Danziger Ärztagung. Ganz richtig haben die Menschenärzte erkannt, daß sie ihre Forderungen je erfolgreicher in den Parlamenten

durchsetzen können, je mehr Standesvertreter sich darin befinden. Wir leben nun einmal in einem parlamentarischen Staat und dem müssen wir auch Rechnung tragen. Wir Tierärzte haben überhaupt keinen Vertreter in den Parlamenten, und der allerbescheidenste tierärztlich-parlamentarische Schlachtruf muß lauten: Wenigstens „ein“ Tierarzt muß ins Parlament. Gewiß, unsere Zahl von ca. 7000 Tierärzten berechtigt der Zahl nach zwar nicht zur Forderung eines Vertreters, der Wichtigkeit für Volkshygiene und Volkswirtschaft (Fleischbeschau, Veterinärpolizei usw.) entsprechend müßten wir aber weit mehr als einen Vertreter im Parlament haben. Wie steht es denn bei den Landwirten? Im Reichs- und Landtag sind immer so um zwanzig herum Abgeordnete Rittergutsbesitzer. Der Zahl nach dürften sie auch keinen ganzen Vertreter beanspruchen, höchstens einen knappen halben, denn wir haben der Zahl nach nur ca. 20000 Rittergutsbesitzer in Deutschland. Auf ungefähr 1000 Rittergutsbesitzer kommt also immer ungefähr ein Abgeordneter. Nun haben wir ja jetzt in Deutschland kein eigentliches Volkswahlrecht, sondern die Abgeordneten werden von den einzelnen Parteien ernannt. Der Rest der Liste ist nur Staffage. Und da spielen nun gesellschaftliche und geschäftliche Rücksichten leider oft bei der Aufstellung von Kandidaten eine weit größere Rolle, als die parlamentarische wirkliche Befähigung des einzelnen. Persönlichkeiten, die sich das spielend aus dem Ärmel schütteln, was uns so ein Durchschnittsparlamentarier vorsetzt, resp. ablieft, haben wir genug in unseren Reihen. Es ist schon einmal bei der Deutschnationalen Volkspartei der Versuch gemacht worden, einen Tierarzt zum Abgeordneten ernennen (wählen) zu lassen. Dieser Antrag wurde aber von Graf Westarp nach einigem Zögern abschlägig beschieden und ein Graf v. d. Schulenburg, glaube ich, dafür ernannt (gewählt). Ich war darüber so verärgert, daß ich daraufhin den mir angebotenen Posten des Kreisvorsitzenden der hiesigen Deutschnationalen Volkspartei ablehnte. Ich gebe jetzt zu, daß ich im Interesse der Sache nicht richtig gehandelt habe, da ich die Person über die Sache stellte. Aber „erare humanum est“. Bei der Wichtigkeit der Seuchentilgung, Abänderungen im Tierseuchengesetz und Fleischbeschaugesetz wird die Arbeit durch das Fehlen von Fachleuten wie auch bei dem Tierärztekammergesetz immer ganz außerordentlich erschwert. Das uns anvertraute ungeheure Volkvermögen bedarf dringend der Vertretung von Fachleuten in den Parlamenten. Gerade die Fleischbeschau steht dauernd im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, und gerade da wäre es sehr angebracht, wenn ein Fachmann bei Anfragen über Fleischvergiftungen sofort aufklärend und beruhigend wirken könnte. Darum bitte ich den Deutschen Veterinärerrat mit den einzelnen Parteien Fühlung zu nehmen und für die Vertretung von Tierärzten in den Parlamenten Sorge zu tragen. Als Nachsatz möchte ich noch folgendes hinzufügen: Ich habe geschrieben Tierseuchengesetz und nicht den falschen unzeitgemäßen Ausdruck Viehseuchengesetz gebraucht. Pferde und Hunde, die auch darunter fallen, sind kein Vieh. Ich mache folgenden Vorschlag. Wir Tierärzte schreiten einfach zur Selbsthilfe und schreiben und sprechen auch amtlich nur von Tierseuchen und Gesetzen und Tierversicherungen, nicht Viehverversicherungen. Dann wird sich ganz von selber die richtige Bezeichnung Tierseuchen und Tierversicherung durchsetzen. Erwähnenswert ist es noch, daß es eine der vielen Heldentaten von Bethmann-Hollweg gewesen ist, die s. Zt. beantragte Umbenennung im Tierseuchengesetz verhindert zu haben.

Dr. Melzer, Pritzwalk.

7. wissenschaftlicher Referierabend an der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover am 2. Juli 1928.

1. E. Hupka: Wirtschaftliche Beobachtungen bei kastrierten Kühen. Nach kurzer geschichtlicher Einleitung über die Kastration der Kühe wird über die wirtschaftlichen Erfahrungen berichtet, die bis jetzt mit sieben vor 1—1½ Jahren kastrierten Kühen gemacht worden sind. Zwei Kühe wurden kastriert, weil sie an hochgradiger Nymphomanie litten und infolge der Erkrankung erheblich abgemagert waren. Die übrigen Kühe stammten aus Abmelkställen, und bei diesen wurde die Operation zu ökonomischen Zwecken vorgenommen. Sämtliche Kühe gehörten der schwarzbunten Niederungsrasse an. Bezüglich der Länge der Laktation konnte folgendes festgestellt werden: Drei kastrierte Kühe sind innerhalb eines Jahres nach der Kastration abgeschafft worden, weil ihre Milchmenge unter das tägliche Quantum von 8 Litern ge-

funkten war. Die Dauer der Laktation bei diesen Kühen erreichte nach der Kastration 8, 10 und 9 Monate. Im ganzen betrug die Melkdauer 12, 14 und 13 Monate. Zwei von den kastrierten Kühen werden heute noch nach 13 Monaten gemolken und geben eine tägliche Milchmenge von 10 bzw. 12 Litern. Da die durchschnittliche Melkdauer in den betreffenden Ställen 11—13 Monate beträgt, außerdem in jedem Stalle Kühe vorhanden sind, die schon zwei Jahre gemolken werden und noch eine Milchmenge von täglich 10 Litern liefern, so kann man von keinem in die Augen springenden Vorteil sprechen. Bei sämtlichen Kühen ist im Anschluß an die Kastration die Milchmenge um einige Liter heruntergegangen. Nach ca. 5—6 Tagen hatte das Milchquantum wieder die alte Höhe erreicht. Höhere tägliche Milchmengen als z. Zt. der Kastration sind in keinem Falle erzielt worden.

Die Prüfung der Qualität der Milch ergab keinen Unterschied zwischen der Milch kastrierter und nichtkastrierter Kühe. Desgleichen konnte im Vergleich zu den anderen Tieren keine Zunahme des Schlachtgewichts festgestellt werden. Allerdings muß betont werden, daß die Kühe in den hiesigen Abmelkställen von vornherein viel Kraftfutter erhalten und infolgedessen sich stets in gutem Futterzustand befinden. Als hervorragend muß der Erfolg der Kastration bei nymphomanen Kühen angesehen werden. Diese Tiere, die vor der Operation hochgradig abgemagert waren, haben in kürzester Zeit an Gewicht ganz erheblich zugenommen. Vortragender ist der Ansicht, daß bei den norddeutschen Niederungsrasen eine Kastration zu wirtschaftlichen Zwecken nicht empfohlen werden kann, wohl aber zu therapeutischen.

Eine lebhafte Aussprache schloß sich den Ausführungen des Vortragenden an. Herr Künnemann weist darauf hin, daß bei dem einen Fall mit Steigerung der Milchquantität diese vielleicht auf eine unvollständige Kastration zurückzuführen sei. Herr Götzte berichtet von eigenen Erfahrungen mit ebenfalls negativem Ergebnis; immerhin sei die Frage noch nicht abgeklärt, es kommen individuelle Schwankungen zur Beobachtung. In der Schweiz seien aber doch Erfolge da. Herr Zietzschmann und Trautmann verbreiten sich über die Physiologie des Ovariums und der innersekretorischen Drüsen.

2. W. Krüger: Demonstration topographisch-anatomischer Präparate; Bau und Einrichtung einer Lernsammlung. Eine Lern- oder Studiersammlung ist ein unbedingtes Erfordernis eines modernen anatomischen Institutes. In einer solchen Lernsammlung soll unter Verwendung aller neuzeitlichen technischen Hilfsmittel eine Fülle von Anschauungsmaterial aufgestellt finden, an dem der Student in steter Arbeit seine im Hörsaal und auf dem Präparieraal gewonnenen Kenntnisse vertiefen kann. Darüber hinaus soll die Lernsammlung jedem, der in anatomischen Fragen Auskunft begehrt, ihre Tore offen halten. Als besonders wichtig für diesen Sammlungstypus werden topographische Präparate angesehen, die von der normalen Zueinanderlagerung der Knochen, Muskeln, Gefäße, Nerven und Organe ein ganz genaues Bild entwerfen. Die übliche Methode der Fixation von Organen nach ihrer Herausnahme aus dem Körper ist für eine Lernsammlung ungeeignet, weil nach der Exenteration das Organ seine natürliche Form einbüßt. Die Fixation muß bereits im Körper durch Injektion von Fixationsflüssigkeit in das Blutgefäßsystem erfolgen. Als Beispiel wird eine in situ fixierte und dann paraffinierte Hundeleber gezeigt. Ebenso ist über die Topographie des Bewegungsapparates keine richtige Vorstellung zu gewinnen an Material, an dem die Gefäße und Nerven nach der im Präparieraal üblichen Methode präpariert und aus ihrer natürlichen Lage hervorgezerrt sind, und das dann vielleicht noch zum Zwecke der Konservierung getrocknet worden ist. Es wird als Gegenstück eine Sammlung von 60 bis jetzt fertig gestellten Gefrierschnitten durch ganze Tierkörper oder Gliedmaßen gezeigt, an denen infolge Erhaltung der natürlichen Farben jeder Teil des Ganzen in seiner normalen Lage deutlich hervortritt. Diese Präparate sind außerdem den Ansprüchen einer Lernsammlung dadurch angepaßt, daß sich neben jedem Präparat eine genau beschriftete, z. T. farbig ausgeführte Photographie befindet. Für eine Lernsammlung ist weiter zu fordern, 1. daß die Präparate in möglichst bequemer Stellung für den Beschauer, also in höchstens zwei Reihen übereinander so montiert sind, daß eine Betrachtung aus allernächster Nähe möglich wird und 2. daß bei Dunkelheit jedes Präparat gut zu beleuchten ist, ohne daß der Beschauer durch Reflexe gestört wird.

In der Diskussion rückt Herr Zietzschmann das organisatorische Geschick des Vortragenden, der die ganze reichhaltige Sammlung in

wenigen Monaten mit den beiden Institutsgehilfen hergestellt hat, in helles Licht. Zur besseren Übersicht und Demonstrationsmöglichkeit hat man die Gegenstände der neuen Sammlung im Präparieraal aufgestellt, wo sie in überraschender Fülle wesentlich vorteilhafter sich präsentieren als in den gänzlich unpraktischen Schränken der alten Sammlung im ersten Stock der Anatomie. Die Präparate wurden durch den 2. Institutsgehilfen nach der Methode Spanner auf Zelluloidplatten montiert und die beschrifteten Photographien durch den 1. Institutsgehilfen gleichmäßig eingerahmt, so daß das Ganze einen einheitlichen Aufbau zeigt.

Nach dem Vortrage Besichtigung der Ausstellung.

Otto Zietzschmann.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Mit Ende des Sommersemesters tritt Paul Martin, der Ordinarius für Anatomie an der veterinär-medizinischen Fakultät der Universität Gießen von seinem Amte zurück. In 42jähriger erfolgreicher Tätigkeit hat er in Zürich und in Gießen seiner Wissenschaft und seinem hohen Lehrberufe gelebt. Im Dezember 1926 konnte Martin sein 25jähriges Jubiläum als Ordinarius in Gießen und sein vierzigstes als Professor der Anatomie feiern. Aus diesem Anlaß wurde ein kurzer Überblick



über die fruchtbringende Arbeit Martins und über den Menschen gegeben. Es sei auf diese Ausführungen (s. D. T. W. 1926, S. 895) verwiesen. Heute liegt es mir am Herzen, dem Gefeierten die besten Wünsche aller seiner Freunde und Kollegen auszusprechen für einen recht frohen gefegneten Lebensabend, den er im Kreise seiner Kinder, seines lieben Amtsnachfolgers noch für ungezählte Jahre genießen möge, mit der Sonne im Herzen, die Paul Martin, unseren verehrten Meister der veterinären Anatomie, so sehr auszeichnet.

Otto Zietzschmann.

Tierärztliche Hochschule Hannover.

Geheimer Regierungsrat, Prof. Dr. med. vet. h. c. Hermann Frick, Inhaber des Lehrstuhls für Chirurgie und Direktor der Chirurgischen Klinik an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, ist vom 1. Oktober d. Js. ab von seinen amtlichen Verpflichtungen entbunden worden. Als Nachfolger ist der Privatdozent, Prof. Dr. Paul Henkels hier selbst, berufen worden. Prof. Henkels ist im Jahre 1892 in Barmen geboren. Nach bestandener Reifeprüfung widmete er sich vom Sommersemester 1914 ab dem veterinärmedizinischen Studium an den Tierärztlichen Hochschulen Hannover und Berlin. Bei Kriegsausbruch trat er als Kriegsfreiwilliger in das Heer. Die tierärztliche Fachprüfung hat Prof. Dr. Henkels im Jahre 1920 abgelegt. Im August 1921 ist er zum Dr. med. vet. promoviert worden. Seit 1920 ist Prof. Henkels als Oberassistent an der hiesigen Chirurgischen Klinik tätig. Am 7. März 1925 habilitierte er sich als Privatdozent für Chirurgie und Röntgenologie. An größeren wissenschaftlichen Arbeiten sind bisher erschienen: Lehrbuch der veterinärmedizinischen Röntgenkunde für Tierärzte und Studierende. Verlag von Paul Parey-Berlin 1926. Die Chirurgie des Tierarztes. Systematische Anleitung zum selbständigen chirurgischen Denken und Handeln für Tierärzte und Studierende. Ver-

lag von Paul Parey-Berlin 1928. „Aufbau einer veterinärmedizinischen Röntgenkunde“ einschl. Röntgenatlas für Groß- und Kleintiere. Beiträge zur Lehre vom Zahnalter des Pferdes. Hannover 1921. Amputation der Zehe beim Pferde und Ersatz durch Prothese. Beitrag zur Kasuistik der Osteome in der Nasenhöhle des Pferdes mit allgemeinen Betrachtungen über die onkologische Diagnostik. Karzinom der Pharynx tertia beim Pferde. Die Perineoplastik in der Veterinärchirurgie, ihr Wert und ihre Technik. Über die Erkrankungen der Kopfhöhlen beim Pferde. Beziehungen zwischen der Bier'schen Stauung und der Leukotropin-Therapie nebst einigen Versuchen bei chirurgischen Krankheiten am Pferde. Die Regeneration der Wandmatrix beim Pferde und ihre chirurgische Bedeutung. Störungen im Atemzentrum unmittelbar nach der Kehlkopfoperation. Ein neues veterinärmedizinisches Röntgeninstrumentarium. Neue Wege zur Diagnostik der Erkrankungen des gesamten Harntraktes einschließlich der Nieren beim Hunde mit Hilfe des Röntgenogramms. Über das Problem der Normalisierung der Aufnahmetechnik in der veterinärmedizinischen Röntgendiagnostik. Die Radikaloperation großer Bauchhernien unter Verwendung eines neuen Instrumentariums zur Retention des Darmes. Äther gegen postnarkotische und andere Luftwegkrankungen. Neue Wege zur Diagnostik und operativen Therapie der Nasenmuschelerkrankungen beim Pferde. Chirurgisch-anatomische Studien am Leistenkanal des Pferdes im Hinblick auf die Kastration und ihre Komplikationen.

Prof. Neubert ist auf seinen Antrag mit Wirkung vom 1. April d. Js. von seinem Lehrauftrage für Land- und Volkswirtschaft und ebenso von der Verwaltung des Lehrgutes Adendorf entbunden worden. An seiner Stelle hat der Generalsekretär des Land- und Forstwirtschaftlichen Hauptvereins Hannover, Landwirtschaftsrat Dr. Engberding, Dozent an der hiesigen Technischen Hochschule, den Lehrauftrag für Land- und Volkswirtschaft an der Tierärztlichen Hochschule Hannover erhalten.

Zur 150-Jahrfeier der Tierärztlichen Hochschule in Hannover.

Unsere Abgeordneten zur Feier des 150jährigen Bestehens der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, der Rektor der Tierärztlichen Hochschule in Wien, Prof. Dr. Karl Keller, und der Präsident des Reichsvereins der Tierärzte Österreichs, Hofrat Max Führer, haben uns in der heutigen gemeinsamen Sitzung über den Verlauf dieses Festes eine eingehende Schilderung gegeben, die auf uns einen tiefen Eindruck gemacht hat. Vor allem erfüllt es uns mit großer Freude und innerster Befriedigung, daß bei dieser glanzvollen Feier der hohe kulturelle Wert der tierärztlichen Wissenschaft, ihrer Schulen und die Bedeutung des tierärztlichen Standes der Öffentlichkeit in so überwältigender Art vor Augen geführt worden sind. Wir beglückwünschen deshalb die Tierärztliche Hochschule in Hannover nicht nur allerinnigst zu dem großartigen Gelingen ihres Jubelfestes, sondern wir danken ihr auch aus vollem Herzen, daß sie bei diesem Feste der tierärztlichen Wissenschaft und dem tierärztlichen Stande so reiche Ehren eingebracht hat.

Hieran schließen wir die Bitte, auch dieses Schriftstück den Erinnerungen an die 150-Jahrfeier beizulegen.

Wien, am 26. Juni 1928.

Für die Gesellschaft der Tierärzte in Wien:

gez. Prof. Dr. Ferd. Habacher, Präsident.

Privatdozent Dr. Hans David, Sekretär.

Vet.-Rat Dr. Neugebauer, Kassierer.

Für den Reichsverein der Tierärzte Österreichs:

gez. Hofrat Max Führer, Präsident.

gez. Dr. G. Dauschl, Ob.-Vet.-Rat, Schriftführer.

gez. Prof. Dr. Benesch.

Sportfest der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover.

Am Dienstag, den 17. Juli 1928, fand auf dem T.K.H.-Sportplatz in Kirchrode das diesjährige Sportfest der Tierärztlichen Hochschule bei prachtvoller Wetter statt. Die Leitung lag in Händen unseres langjährigen Sport- und Turnlehrers Heuter, sowie des Sportwartes der Hochschule cand. med. vet. J. Steenblock. Die Kämpfe wickelten sich reibungslos vor den Augen der zahlreichen Zuschauer ab. Zeigten die Ergebnisse auch keine Rekordleistungen, so wurden doch von einzelnen Kämpfern beachtliche Resultate erzielt. Magnifizenz Mießner hielt vor der Siegerehrung eine herzliche Ansprache, in

der er darauf hinwies, neben der Wissenschaft auch den Sport zu pflegen. Im Anschluß an die Ehrung der Sieger, zu der von den Professoren, den Freunden der Hochschule und hannoverschen Firmen zahlreiche wertvolle Preise gestiftet waren, fand im Kirchröder Turm ein Essen statt, das alle Teilnehmer vereinte. Um 17 Uhr erfolgte als Schluß des Festes eine Vorführung der Anfängergruppe unserer Reitabteilung unter Leitung des Diplom-Landwirtes cand. med. vet. Bruhn, deren Leistungen allgemeinen Beifall der Zuschauer fanden. Zum Schluß dankte Magnifizenz Mießner in kurzen Worten für die erfolgreiche Arbeit auch auf diesem sportlichen Gebiete.

Nachstehend die sportlichen Ergebnisse: Sieger im Dreikampf: 1. Klingbeil (Gothia), 2. Steenblock (Normannia), 3. Hennies (Saxo-Silesia); 100 m-Lauf: 1. Klingbeil (Gothia), 2. Steenblock (Normannia), 3. Heller (V.D.St.); Speerwerfen: 1. Wiele (Landsmannsch. Arminia Berlin), 2. Balke (Alt-Germania), 3. Muth (Visurgia); Schleuderballwerfen: 1. Klingbeil (Gothia), 2. Steenblock (Normannia), 3. Krudewig (Saxo-Silesia); Schlagballweitwurf: 1. Hiby (Hannoverania), 2. Sonntag (Alt-Germania), 3. Klingbeil (Gothia); Diskuswerfen: 1. Hegmann (Visurgia), 2. Krudewig (Saxo-Silesia), 3. Steenblock (Normannia); Stabhochsprung: 1. Hennies (Saxo-Silesia), 2. Beckendorf (Alt-Germania), 3. Steenblock (Normannia); Hochsprung: 1. Baumhöfener (Cheruscia), 2. Diercking (Gothia), 3. Krudewig (Saxo-Silesia); Weitsprung: 1. Hennies (Saxo-Silesia), 2. Klingbeil (Gothia), 3. Emschermann (Visurgia); Kugelstoßen: 1. Krudewig (Saxo-Silesia), 2. Steenblock (Normannia), 3. Grünwald (Hannoverania); 400 m-Lauf: 1. Emschermann (Visurgia), 2. Bettels (Saxo-Silesia), 3. Melcher (Visurgia); 1500 m-Lauf: 1. Greiten (Visurgia), 2. Hiby (Hannoverania), 3. Klingbeil (Gothia); 4 mal 100 m-Staffel: 1. Saxo-Silesia, 2. Alt-Germania, 3. Visurgia; Schwedenstaffel: 1. Alt-Germania, 2. Saxo-Silesia, 3. V.D.St.; Mannschafts-Sechskampf: Alt-Germania mit 784 Punkten; Mannschafts-Kugelstoßen: 1. Saxo-Silesia, 2. Visurgia, 3. Hannoverania; Faustballspiel: D. B. Alt-Germania 46 Punkte gegen Corps Hannoverania 38 Punkte; Schlagballspiel: D. B. Alt-Germania gegen Corps Hannoverania 122:15.

Das neue Corpsheim der Franconia.

Die Alt-Herrenschaft des Corps im Rudolstädter Seniorenkonvent Franconia zu Berlin, gegr. 1850 als Landsmannschaft an der Tierärztl. Hochschule mit den Farben dunkelgrün-rot-gold, hat ein eigenes Grundstück in der Linienstraße Nr. 149 erworben und das auf diesem Boden befindliche Wohngebäude zu einem Corpsheim umbauen lassen. In diesem Heim finden z. Zt. etwa 30 Mitglieder des Corps aller Fakultäten eine heimatliche Stätte. Die Einweihung des Heims fand kürzlich statt. Die Weiherede hielt der Vorsitzende des Alt-Herren-Verbandes, Stadtober-tierarzt Dr. Mehlhose-Berlin, welcher das Haus der Aktivitas des Corps mit herzlichen Glück- und Segenswünschen übergab.

Schenkung für die Bücherei der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Von Schlachthofdirektor Dr. Albrecht, Minden, ist der Bücherei der Tierärztlichen Hochschule Hannover das Werk von Straus-Durckheim, Anatomie descriptive et comparative du Chat, Paris 1845 (2 Bände Text und 1 Band Tafeln) geschenkt worden. Wir danken dem Spender für die wertvolle Bereicherung der Bücherei auch an dieser Stelle.

Der Kurator der Bücherei.
Mießner.

Fortbildungskursus für praktische Tierärzte in Verbindung mit dem DVR. veranstaltet von der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig.

19. Oktober nachmittags bis 31. Oktober mittags.

1. Neues aus dem Gebiete der Geburtshilfe (mit Demonstrationen). Prof. Dr. Richter, 2 Stunden. 2. Die Bedeutung verschiedener neuerer Arzneimittel für die Praxis. Prof. Dr. Reinhardt, 1 Stunde. 3. Was muß der praktische Tierarzt von der Milchkontrolle wissen? Obermedizinalrat Prof. Dr. Klimmer, 4 Stunden. 4. Ausgewählte Kapitel aus der Pathologie und pathologisch-anatomische Demonstrationen mit besonderer Berücksichtigung der Fleischbeschau. Prof. Dr. Nieberle, 4 Stunden. 5. Periodische Augenentzündung.

Obermedizinalrat Prof. Dr. Schmidt, 1 Stunde. 6. Euteterkrankungen und ihr Einfluß auf die Beschaffenheit der Milch. Prof. Dr. Richter, 1 Stunde. 7. Geflügelkrankheiten. Prof. Dr. Haupt, 1 Stunde.

Meldungen an die Kanzlei der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig, Osterreicher Straße 55, von der vom 1. September ab die genauen Stundenpläne an die Teilnehmer verandt werden.

Bücherbesprechungen.

Einführung in die Vererbungswissenschaft. Ein Lehrbuch in 21 Vorlesungen von Prof. Dr. Rich. Goldschmidt, 2. Direktor des Kaiser Wilhelm-Instituts für Biologie in Berlin-Dahlem. Fünfte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 177 Abbildungen. Berlin, Verlag von Jul. Springer, 1928. Preis RM. 30,— geb. RM. 32,40.

Wenn ein rein wissenschaftliches Werk innerhalb 17 Jahren, dazwischen der Weltkrieg, fünf Auflagen erlebt, ist dies ein Beweis seiner anerkannten Güte. Im Jahre 1911 besprach ich die erste Auflage. Goldschmidt's Buch ist ein klares und umfassendes Abbild der gewaltigen Fortschritte, welche die in stetem Fluße befindliche vererbungswissenschaftliche Tatsachenforschung in den letzten zwei Jahrzehnten gemacht hat. Welche gründlichen Umarbeitungen, Ergänzungen, Durchfeilungen und Verbesserungen waren da auszuführen! Veraltete Abschnitte fielen weg und neue kamen hinzu. Von den Bildern sind 69 ganz neu, die übrigen nach neuen Vorlagen und Umzeichnungen neu hergestellt. Der Inhaltsaufbau (mit Namen- und Sachverzeichnis 568 Seiten) ist jetzt kurz folgender: Variabilität (Biometrisches, Galtons Gesetz, Selektion in Populationen und reinen Linien, Ursachen der Modifikabilität), Bastardierung als Mittel zur Analyse der Erbllichkeit, im Besonderen der Mendelismus in seinem ganzen Umfange (allein fast 300 Seiten), mit dem Einfachsten beginnend und aufsteigend bis zu den verwickeltesten Fragen (u. a. Geschlechtschromosome, Gynandromorphismus, geschlechtsgebundene Vererbung, Letalfaktoren, Luxurieren, Inzucht), Chromosomentheorie der Vererbung, Mutations-theorie, Propfbastarde und Chimären, Vererbung und Bestimmung des Geschlechts, hier u. a. auch Analyse der Intersexualität, das Gen und seine Wirkung, schließlich das Problem der Vererbung erworbener Eigenschaften und die Telegonie. Hier hat G. eine erfreuliche Wandlung vollzogen, wie ich neulich schon bei der Besprechung seiner „Physiologischen Theorie der Vererbung“ und seiner „Lehre von der Vererbung“ hervorhob. In der Einleitung zur 21. Vorlesung (S. 524) stehen nun die lapidaren Sätze: „Da die Erbmasse, die genotypische Beschaffenheit, von allen auf den übrigen Körper verändernd einwirkenden Umständen nicht betroffen wird, so müssen alle Reaktionen des Körpers auf die umgebende Außenwelt, die wir als Modifikationen kennen lernten, völlig bedeutungslos für das Evolutionsproblem sein. Was auch die Ursache der Veränderung sein mag, sie hat nichts mit der Modifikation des Körpers durch die Einflüsse der Außenwelt zu tun.“ Da und dort noch vorkommende kleine Zweifel, die sich in den Worten: „noch ziemlich verfragt“ (S. 535), „wohl zu weit“ (S. 539) und „wohl eine Dauermodifikation“ (S. 543) zu erkennen geben, fallen nicht mehr ins Gewicht. Besonders wertvoll sind die Literaturangaben und Hinweise nach jeder Vorlesung. Das Werk ist jetzt im Verlag von Jul. Springer, Berlin, erschienen, der für eine vorzügliche Ausstattung besorgt war. Allen Kollegen und Studierenden der Veterinärmedizin, die tiefer in die Vererbungswissenschaft eindringen, vorkommende Vererbungserfcheinungen richtig aufklären und insbesondere auch draußen durch Vorträge bezügliche Belehrung erteilen wollen, dürfte die vorliegende „Einführung“ unentbehrlich sein.

A. Hink.

Personal-Nachrichten.

Promoviert in München: Tierarzt Gustav Knorpp aus Murr (Wttbg.); Tierarzt Leo Rüter aus München.

Verzogen: Tierarzt Franz Bruns von Ostbevern (Westf.) nach Hopsten (Kr. Tecklenburg); Dr. Hilbert, Assistent aus der Veterinärpolizei-Untersuchungsanstalt in Dresden als prakt. Tierarzt nach Werdau (Sachsen).

Verstorben: Tierarzt Dr. Behnen, Hannover.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 31.

Ausgegeben am 4. August 1928.

36. Jahrgang.

(Aus der Forschungsabteilung (Leiter: Prof. Dr. M. Ziegler) der Staatlichen Veterinärpolizei-Untersuchungsanstalt zu Dresden.)

Totale Herzvorhofverknöcherung mit Verkalkung beim Pferd.

Von Dr. Georg Pallasse.

Verknöcherung der Herzwand ist ein seltener pathologisch-anatomischer Befund. Vom vergleichenden pathologisch-anatomischen Standpunkte aus betreffen Fälle von Verknöcherung der Herzwand, soweit solche bekannt gemacht wurden, in der Hauptsache das Pferd.

In einer Arbeit von Joest und Schieback (1) in Virchow's Archiv, Band 253, „Über Herzwandverknöcherung“ findet diese eigentümliche pathologische Veränderung des Herzens eine eingehende Berücksichtigung. In dieser Arbeit geben die Verfasser eingangs eine Zusammenstellung der bisher publizierten Fälle bei Mensch und Tier und fügen vier weitere Fälle von sog. „Herzwandverknöcherung“ beim Pferde hinzu, die im Laufe der letzten 12 Jahre im Pathologischen Institut der ehemaligen Tierärztlichen Hochschule zu Dresden zur Untersuchung gelangten. Nach der in jener Arbeit gegebenen Zusammenstellung — hier nur die näher untersuchten Fälle berücksichtigt — ließ sich dieser pathologisch-anatomische Befund bisher in drei Fällen bei Menschen, ferner bei 14 Pferden, zwei Rindern und 1 Hund erheben, und zwar betraf diese Veränderung in der Hauptsache, beim Pferde fast ausschließlich, den rechten Vorhof. In neuerer Zeit erwähnt Edelmann (2) einen Fall von Knochenbildung als Zufallsbefund in der Herzwand bei einem Meerfischweibchen und Altmann (3) gibt zwei weitere Fälle bekannt, die das Pferd betreffen, so daß sich die Zahl der bisher vom Pferde veröffentlichten und näher untersuchten Fälle auf 16 erhöht.

In Rücksicht auf das seltene Antreffen dieser Herzveränderung und insbesondere wegen des hier gefundenen besonders hohen Grades sei ein neuer Fall von „Herzwandverknöcherung“ beim Pferd bekannt gegeben, der kürzlich im hiesigen Institut festgestellt wurde.

Vorbericht.

Zum Zwecke der histologischen Diagnose „ansteckende Blutarmut“ wurde dem Institut von einem Bezirkstierarzt außer verschiedenen anderen Organen das ganze Herz eines Pferdes zugelandt mit dem Begleitbericht, daß das Pferd — acht Jahre alt — während eines längeren Zeitraumes Erscheinungen gezeigt habe, die den Verdacht auf ansteckende Blutarmut erweckten. Das Tier magerte ab, war schlapp bei der Arbeit und soll Ödeme gehabt haben. Aus einem vom Institut später dem behandelnden Tierarzte und dem Bezirkstierarzte zugelandten Fragebogen sind noch folgende ergänzende Mitteilungen zu entnehmen: Das Pferd war, ehe es zur Schlachtung kam, etwa 3 Monate lang krank. Außer einem chronischen Ekzem bestanden monatelang mäßige Schwellungen der Beine bis zu den Tarsal- bzw. Karpalgelenken. Ödeme

an der Unterbrust waren nicht vorhanden. Als wesentliche Erscheinung standen im Vordergrund des klinischen Bildes hochgradige Anämie aller sichtbaren Schleimhäute, besonders der Konjunktiven, ferner Herzschwäche und Kurzatmigkeit. Die Herzschwäche bestand, laut Angabe, seit Monaten in einem kleinen, pochenden Herzschlag bei einer Pulsfrequenz von 60—80 Schlägen in der Minute. Die erwähnte Kurzatmigkeit konnte in der Ruhe kaum bemerkt werden, steigerte sich aber ganz erheblich bei Bewegung. Venenpuls ist klinisch nicht beobachtet worden.

Pathologisch-anatomischer Befund.

A. Allgemeines.

Nach dem Sektionsberichte des beamteten Tierarztes fanden sich außer der Herzveränderung entsprechend der klinischen Beobachtung ödematöse Durchtränkung des subkutanen Bindegewebes der Gliedmaßen. Die Lungen wurden mäßig mit Tuberkulose behaftet gefunden. Die Milz war vollkommen durchsetzt von etwa walnußgroßen tuberkulösen Knoten. Die Mesenteriallymphknoten waren stark — bis zu Faustgröße — vergrößert, tuberkulös verändert und mit eitrigen (?) Einschmelzungen durchsetzt. Die übrigen Organe waren ohne Veränderung.

B. Herzbefund.

Der Umfang des Herzens ist im ganzen etwas vermehrt; vor allem fällt sofort eine ungewöhnliche Veränderung des rechten Vorhofes auf. Er erscheint erheblich vergrößert, seine Wand ist stark nach außen gewölbt. Seine Länge beträgt 23 cm, die Höhe an der breitesten Stelle 12 cm, der Durchmesser an der dicksten Stelle 7 cm. Infolge seiner Größenzunahme „überhängt“ er gewissermaßen an der Kranzfurche etwas die Wand der rechten Herzkammer. Die Gestalt des veränderten Vorhofes ist im allgemeinen erhalten geblieben. Die Oberfläche erscheint unregelmäßig flach gewulstet. Der seröse Überzug (Epikard) ist fast im ganzen Bereiche des rechten Vorhofes etwas verdickt, von grauweißer Farbe und mit zahlreichen fibrösen Filamenten besetzt (Epicarditis chronica fibrosa villosa). Die Konsistenz der rechten Vorhofswand ist fast in toto knochen- oder steinhart. Nur im Bereiche der Einmündung der vorderen und hinteren Hohlvene befinden sich vereinzelte kleine, höchstens Erbsengröße besitzende, miteinander nicht im Zusammenhang stehende, verdünnte Wandpartien, die grauweiß und fehnig erscheinen und etwas nachgiebige Konsistenz besitzen. Nirgends ist am Vorhof

außen eine muskulöse Stelle zu finden. Verschiedene unregelmäßig gestaltete Vertiefungen der Oberfläche der Wand des Vorhofes, die eine dünnere Wand vermuten lassen, erscheinen in ihrer Konsistenz ebenfalls unnachgiebig und sind knochenhart wie die übrige Wand. Die am eingefandten Herzen verbliebenen etwa 1 cm langen Stümpfe der Vena cava cranialis und caudalis zeigen keine Veränderungen. Sie münden mit gering komprimierter Öffnung in den starren Vorhof ein.

Da eine Eröffnung des starren rechten Vorhofes mit dem Messer nicht möglich ist, geschieht sie in der Längsrichtung mit Säge und Meißel. Auch mit diesen Hilfsmitteln läßt sich die Eröffnung wegen der außergewöhnlichen Starrheit der Wand nur mühevoll erreichen. Schon beim Sägen erkannte man, daß die ausgesprochene Starrheit der Wand zum Teil durch Kalkeinlagerungen bedingt sein mußte. Es ließ sich nämlich die Wand des Vorhofes nur stückweise sägen. Das Sägeblatt stieß häufig auf steinhartes, nicht sägbares, knirschendes Gewebe, das mit dem Meißel gesprengt werden mußte.

Der auf diese Weise gewonnene Querschnitt der rechten Vorhofswand läßt nun folgendes erkennen: Die Vorhofswand ist verschieden dick, im allgemeinen 2—3 cm, an der dicksten Stelle etwa 4 cm. Sie besteht in ganzer Ausdehnung in der Hauptsache aus einem mehr oder weniger zusammenhängenden, rauhen, gelblichen Gewebe, das das typische Aussehen von Knochengewebe besitzt und von dem sich gelblichweiße Knochenbälkchen ablösen lassen. In diesen knöchernen Bestandteil der Vorhofswand ist unregelmäßig, aber ziemlich reichlich — an der äußeren Vorhofswand sogar eine fast ununterbrochene Platte bildend — eine grauweiße, beim Schneideversuch knirschende, steinharte Kalkmasse eingelagert. In dieser aus Knochen und an ihrer äußeren Wölbung besonders aus Kalk bestehenden Wand des Vorhofes läßt sich auf dem Querschnitt fast nirgends ein nachgiebiges Gewebe erkennen. Vereinzelt kleine, verschieden gestaltete Lücken in der starren Wand des Vorhofes sind mit einem grauweißen, anscheinend aus Bindegewebe bestehenden Gewebe erfüllt.

Das Lumen der Vorkammer ist nicht, wie der uneröffnete, bedeutend vergrößerte Vorhof zunächst schließen lassen könnte, erweitert, sondern durch die erhebliche Verdickung der Wand eher etwas verkleinert, zumal die verknöcherte Wand an der Innenfläche des Vorhofes, besonders am Herzohr, flachwulstige Höcker bildet. Die Knochenwucherung und Verkalkung ist im Bereiche des Herzohres so stark, daß das Ende des Herzohres kein Lumen mehr aufweist. Auch von dem Trabekelsystem der Vorkammer ist nichts mehr zu sehen; die Trabekel sind in den Verknöcherungsprozeß mit einbezogen. Das Endokard erscheint im allgemeinen glatt und glänzend und läßt das darunter liegende Knochengewebe und die kalkigen Partien als gelbliche und weiße Bezirke durchschimmern.

Bei der Untersuchung des übrigen Herzens zeigte sich die rechte Herzkammer mäßig dilatiert. Der epikardiale Überzug ist im Bereiche der Kranzfurche sowohl der rechten wie der linken Herzkammer nicht glatt und glänzend, sondern etwas grauweißlich, getrübt und mit einigen fibrösen Anhängeln besetzt (Epicarditis chronica fibrosa). Die Wand der rechten Herzkammer erscheint geringgradig verdünnt, die der linken Kammer mäßig hypertrophisch. Die Konsistenz des Myokards erscheint normal, sie ist derb. Das Endokard aller Herzabteilungen ist überall glatt, glänzend und durchscheinend. Auch der Klappenapparat des Herzens ist normal. Am eingefandten Herz verbliebene Reste der Aorta, Pulmonalarterie und Pulmonalvenen lassen keine Veränderungen, insbesondere keine Verknöcherung und Verkalkung erkennen. Eine nähere Untersuchung des beim Pferd im Faserring des Aortenurfsprungs eingelagerten Herzknotpels ergab, daß dieser in keinem Zu-

ammenhang mit der Verknöcherung des rechten Vorhofes stand und auch selbst keine verknöcherten Partien aufwies.

Somit ist der Sektionsbefund des übrigen Herzens mit Ausnahme der mäßigen Dilatation der rechten Herzkammer, mäßiger Hypertrophie des Myokards der linken Herzkammer und einer partiellen Epicarditis chronica im Bereiche der Kranzfurche fast negativ; die Herzveränderungen beschränken sich hauptsächlich auf den rechten Vorhof.

Die beabsichtigte histologische Untersuchung der veränderten Wand des rechten Vorhofes konnte besonderer Umstände wegen leider nicht stattfinden.

Zusammenfassung.

An einem zu diagnostischen Zwecken mit anderen Organen eingefandten Herzen eines Pferdes wurde eine fast totale Verknöcherung des rechten Vorhofes mit teilweise ziemlich umfangreicher Verkalkung festgestellt.¹⁾ Die Verknöcherung betraf in vorliegendem Falle den ganzen rechten Vorhof vom Herzohr bis zu seinem distalen Ende, so daß der ganze Vorhof einen starren Hohlraum darstellte. Lediglich kleine und unscheinbare Bezirke im Bereiche der Hohlveneneinmündungen erwiesen sich als nachgiebig.

Hinsichtlich des Alters des Verknöcherungsprozesses läßt sich nichts Bestimmtes ausagen. Mit Rücksicht auf seine Ausdehnung könnte auf ein höheres Alter geschlossen werden. Zum mindesten besteht der Prozeß mehrere Monate, vermutlich länger.

Vergleichen wir den vorliegenden Fall in pathologisch-anatomischer Hinsicht mit den in der Literatur niedergelegten Fällen sogenannter Herzverknöcherung bei Mensch und Tieren, so ist zunächst festzustellen, daß dieser Fall von sogenannter Herzwandverknöcherung wie die überwiegende Mehrzahl der in der Literatur genannten Fälle das Pferd betrifft und zwar den rechten Vorhof.²⁾

Im Gegensatz zu den meisten bisher veröffentlichten Fällen, bei denen sich die Verknöcherung mehr oder weniger auf das Herzohr bzw. auf Teile des rechten Vorhofes beschränkte, stellt dieser Fall in seinem Befunde eine Verknöcherung des Vorhofes fast

¹⁾ Mit Rücksicht darauf, daß sich das veränderte Gewebe der Vorhofswand makroskopisch einwandfrei als Knochengewebe mit Verkalkung darbot, und Joest und Schieback in ihrer oben erwähnten Arbeit einen ähnlichen hochgradigen Fall von Herzwandverknöcherung beschreiben, bei dem sie auch histologisch einwandfrei Knochengewebe nachwiesen, kann der Mangel der histologischen Untersuchung dieses Falles im Sinne einer Bestätigung des makroskopischen Befundes verschmerzt werden. Da weiterhin der Verknöcherungsprozeß vorliegenden Falles einen Höchstgrad erreicht hat und auch umfangreiche Verkalkung vorhanden ist, dürfte wegen des fortgeschrittenen Prozesses von der histologischen Untersuchung auch in Hinsicht der Histogenese des Verknöcherungsprozesses wenig zu erwarten gewesen sein.

²⁾ Hinsichtlich einer anderen Lokalisation als im rechten Vorhof sei noch mitgeteilt, daß nach Gurlt (zit. nach Joest und Schieback) Otto in Alfort neben Verknöcherung der Aortenklappen auch eine Verknöcherung im linken Herzohr eines Pferdes fand und daß ferner an einem Pferdeherzen der Berliner Sammlung die ganze Seitenwand der rechten Kammer mit verschiedenen großen Knochenkernen versehen gewesen sein soll. In dem kürzlich von Edelmann in Virchow's Archiv, Band 266, veröffentlichten Fall von „Knochenbildung in der Herzwand“ eines Meerschweinchens befand sich der Knochen in der linken Vorhofswand. In den Fällen von Menschen fand sich nach Poschariky (zit. nach Joest und Schieback) Knochenbildung im Bereiche des Annulus fibrosus des linken Ostium venosum, desgleichen in einem Falle, den Kaufmann (4) beobachtete.

im Höchstmaße der Ausdehnung dar. Der vorliegende Fall gleicht bzw. überbietet Fälle, wie sie Chuchu (5), Grüner (6), Land (7) und Joest (1) von Pferden mitteilen.

Chuchu fand die ganze rechte Vorkammer hart und weiß und fast vollständig verknöchert. Bei Grüner's Fall war der rechte Vorhof eines 5 Jahr alten Pferdes hochgradig erweitert und steinhart. In dem Falle von Land war die ganze rechte Vorkammer, insbesondere das Herzohr, verhärtet und schnitt sich teils wie Knorpel, teils wie Knochen. Bei dem von Joest 1921 untersuchten Falle handelt es sich auch um eine fast vollständige Verknöcherung des rechten Vorhofs. Diese trat dabei in Form einer zusammenhängenden Platte auf, die an einzelnen Stellen von nicht verknöchelter Wand unterbrochen ist. Nach feinen Angaben waren die unverknöcherten Lücken der Wand teils durch atrophisches Muskelgewebe, teils durch Bindegewebe ausgefüllt. Die Vorhofswand war im Bereiche dieser Lücken dünn und durchscheinend. Größere unverknöcherte Lücken befanden sich am Sinus venosus und rechts und kaudal von der kranialen Hohlvene, letztere in Form eines fingerlangen, 2 cm breiten Streifens. In den anderen veröffentlichten Fällen von Vorhofsverknöcherung bei Tieren, so von Nocard (8), Stoss (9), Cadiot (10), Isepponi (11), A. Eber (12), Joest (1) bei Pferden, Joest (13) in einem Falle beim Rind und Spiegl (14) in einem Falle beim Hunde handelt es sich, wie vorher schon angedeutet, nur um partielle Veränderungen dieser Art des rechten Vorhofes, besonders im Bereiche des Herzohres.

Der im hiesigen Institut untersuchte Fall übertrifft den von Joest als weitgehendst verändert bezeichneten Fall vom Jahre 1921 noch an Ausdehnung insofern, als selbst unverknöcherte Lücken von dem Ausmaße, wie sie Joest im Bereiche des Sinus venosus und der Einmündungsstelle der V. cava cranialis beschreibt, hier nicht zugegen sind. Somit fehlt dem veränderten Vorhof meines Falles fast jegliche kontraktile Substanz. Zur Verknöcherung des Vorhofes tritt hier noch eine zum Teil ausgedehnte Verkalkung hinzu.

Wenn auch im Zusammenhang mit dieser eigentümlichen Herzveränderung Fragen von der Art, wie sich die häufige Lokalisation des pathologischen Prozesses gerade im rechten Vorhof, sowie die Entstehungsweise des Verknöcherungsprozesses an jener Stelle überhaupt erklären, besonders interessieren, so soll hier von einem näheren Eingehen auf diese Fragen Abstand genommen werden. Es kann in dieser Beziehung auf die eingehenden Erörterungen in der Arbeit von Joest und Schieback in Virchow's Archiv, Band 253, verwiesen werden, in der, nur beiläufig erwähnt, Joest weniger an eine dysontogenetische Grundlage für die Entstehung glaubt, als vielmehr das artfremde Knochengewebe im Herzmuskel auf dem Wege eines chronischen entzündlichen Vorganges entstanden wissen möchte, ähnlich den häufiger vorkommenden ossifikatorischen Prozessen im Rahmen eines chronischen Entzündungsprozesses in der Skelettmuskulatur bei Mensch und Tier. Das reizauslösende Moment glaubt er in häufigen Zirkulationsstörungen und Überlastungen durch den schweren Zugdienst bei den Pferden zu sehen. Die anscheinende Bevorzugung des rechten Vorhofes würde ihre Erklärung darin finden, daß dieser mit seiner relativ dünnen Wand am ehesten Dehnungen, diese als Reiz gedacht, ausgesetzt ist, die bei wiederholtem Vorkommen sehr leicht chronisch entzündliche Veränderungen auslösen können. Eine bestimmte Aussage über den Entstehungsmodus der Verknöcherung im Herzmuskel wird sich solange nicht machen lassen, als nicht jüngste Prozesse zu histogenetischen Studien zur Untersuchung gelangen.

Was sich aber neben diesen Gesichtspunkten jedem Untersucher dieser Veränderung an einem solchen lebenswichtigen Organ befonders aufdrängen muß, das sind die Fragen über den pathologischen Effekt, über die pathologisch-physiologische Auswirkung solcher schwerer Herzveränderungen.

Vergegenwärtigt man sich kurz die physiologisch-mechanischen Vorgänge der rechten Herzkammer als Teil des ganzen Herzens innerhalb seiner physiologischen Funktion, so besteht der Anteil des rechten Vorhofes an der Blutbewegung darin, daß er in diastolischen und systolischen Bewegungsphasen Blut und zwar das venöse, aus den Hohlvenen ansaugt und sammelt und via Atrioventrikuläröffnung, rechte Kammer, Pulmonalvenen in die Lunge zum Gasaustausch transportiert. Die Füllung des rechten Vorhofes mit Blut aus den Hohlvenen erfolgt zu einem großen Teil durch einen gewissermaßen „anfaugenden“ Wirkungsmechanismus des rechten Vorhofes, indem es unter dem im Thoraxraum herrschenden negativen Drucke im Verein mit dem damit zusammenhängenden elastischen Zuge der Lungen zu einer passiven Erweiterung des diastolischen Vorhofes kommt. Die der Diastole folgende systolische Bewegung erfordert mehr oder weniger aktive Kontraktion des Vorhofes, um das angesammelte Blut in die rechte Kammer zu drücken.

Aus dieser Überlegung erhellt, daß zum physiologischen Ablaufe der Blutbewegung die Grundfunktionen der Wand des Vorhofes, die Fähigkeit der Erschlaffung und Zusammenziehung, gewährleistet sein müssen und daß partieller oder totaler Ausfall dieser zu auffälligen klinischen Erscheinungen, in der Hauptsache auf der Basis von Zirkulationsstörungen, Anlaß geben müßte.

Bei diesem physiologischen Gedankengange drängt sich eine weitere Frage auf. Zu den Grundfunktionen des Myokards gehören außer der erwähnten Kontraktilität, noch Reizbarkeit, Autonomie und vor allem die Reizleitung. Letztere ist an ein mehr oder weniger bekanntes anatomisches Substrat gebunden, an das sog. Erregungs- oder Reizleitungssystem, das aus besonderen Muskelfasern besteht und von dem im besonderen der sog. Keith-Flaksche oder Sinusknoten an der Hohlveneneinmündung in die rechte Vorkammer liegt. Nach den physiologischen Forschungen sollen unter normalen Verhältnissen die automatischen Reize im Bereiche des Sinusknotens an der Einmündung der großen Venen in den rechten Vorhof entstehen. Es wird weiter angenommen, daß sich die im Sinusknoten beginnende Kontraktionswelle zunächst gleichmäßig über beide Vorhöfe ausbreitet, an der Grenze zwischen Vorkammer und Kammer eine kurze Pause macht, um sich dann im His'schen Bündel und dessen Schenkeln auf die Kammern fortzusetzen. Demnach scheint dem in der rechten Vorkammer liegenden Sinusknoten eine wichtige physiologische Funktion bei der Herzbewegung zuzukommen, dessen eventuelle Zerstörung durch pathologische Veränderungen vorliegender Art verhängnisvoll für die Herzstätigkeit und somit für die Lebensfähigkeit des Organismus verlaufen müßte.

Berücksichtigt man im Zusammenhang mit diesen physiologischen Fragen die Angaben klinischer Natur bei den veröffentlichten Fällen von Herzwandverknöcherung, so stößt man auf die erstaunliche Tatsache, die auch Joest und Schieback in der Zusammenfassung ihrer Arbeit hervorheben, daß die Veränderung bei Tieren im allgemeinen keine wesentlichen Störungen zu bedingen scheint, vor allem scheint sie den Tod, wenigstens was Tiere anbelangt, in keinem Falle bewirkt zu haben. Denn die Veränderungen sind bei Tieren mehr oder weniger als Neben- oder Zufallsbefund bei der Schlachtung oder Sektion festgestellt worden.

In dem schon erwähnten, von Tophä bekanntgegebenen Falle beim Menschen von Knochenbildung im rechten Vorhof, handelte es sich um einen 70 Jahre alten Mann, der nach Kollapszuständen an Herzerweiterung gestorben war.

In dem hier untersuchten Falle ähnlichen veröffentlichten Fällen mit höhergradiger Verknöcherung der Vorhofswand sind vereinzelte klinische Angaben zu finden. So berichtet Chuchu, daß das betreffende Pferd stark abgemagert war und beträchtliche ödematöse Anschwellungen an der Unterbrust und an den Gliedmaßen gezeigt hätte. In dem umfangreichen verknöcherten Falle Grüner's starb das Pferd infolge einer Grimmdarmzerreißung durch einen schweren Darmstein und anschließender Peritonitis. Auch der schwere Fall Land's war ein Zufallsbefund bei der Sektion eines an Kolik verendeten Pferdes. Er betont, daß das veränderte Herz keinen Einfluß auf den tödlichen Ausgang gehabt und auch intra vitam keine merklichen Erscheinungen hervorgerufen haben soll. In dem ausgedehnten Verknöcherung der Vorhofswand aufweisenden Falle von Joest aus dem Jahre 1921, wurde

das Pferd anscheinend wegen Alters (15 Jahre) geschlachtet und soll nach Angabe des Besitzers nie krank gewesen sein, sondern bis zum letzten Tage gearbeitet haben. In einem anderen Falle von Joest mit geringgradiger Verknöcherung der rechten Vorhofswand als der bisher genannten Fälle, soll bei dem betreffenden Pferde eine „Dämpfigkeit mittleren Grades“ festgestellt worden sein. In einem weiteren von Joest zitierten Falle mit Lokalisation der Verknöcherung hauptsächlich auf das Herzohr der rechten Vorkammer soll das Pferd intra vitam stets gesund gewesen sein, bis es eines Tages plötzlich zusammenstürzte.

Es ist verständlich, daß in Anbetracht des hochgradig verändert befundenen rechten Vorhofes des hier vorliegenden Falles das Institut sich alle Mühe gegeben hat, auch in bezug auf das klinische Bild etwas Näheres zu erfahren. Aus Nachfragen bei dem die Sektion ausführenden Bezirkstierarzte und aus den Antworten des behandelnden Tierarztes auf einem vom Institut besonders aufgestellten Fragebogen ergab sich, kurz wiederholt, hinsichtlich des klinischen Bildes ein etwa drei Monate langes Kranksein, in dem das Pferd abmagerte, bei der Arbeit schlapp war und hochgradige Blässe der sichtbaren Schleimhäute zeigte. Lange Zeit sollen auch mäßige bis erhebliche Beinschwellungen bestanden haben. Der klinische Herzbefund bestand, wie erwähnt, in Herzschwäche, seit Monaten kleinem, pochendem Herzschlag und etwa 60–80 Pulsen in der Minute. Bei Bewegung zeigten sich Anzeichen der Dämpfigkeit (erhebliche Kurzatmigkeit). Bei der wegen Verdachts der infektiösen Anämie erfolgten Notschlachtung wurde, wie schon erwähnt, außer Verknöcherung der rechten Vorkammer chronische Tuberkulose festgestellt.

Bringt man nun die erwähnten klinischen Erscheinungen in Zusammenhang mit dem gesamten Sektionsbefund, so muß die Auswertung des klinischen Symptombildes dieses Falles hinsichtlich der vorliegenden Herzveränderung mit Vorsicht und berechtigten Einschränkungen geschehen. Es darf vom klinischen Standpunkte aus nicht übersehen werden, daß eine hochgradige chronische Tuberkulose, wie sie hier vorliegt, das Bild der Kachexie zeigen kann. So dürfen wohl die klinisch festgestellten anämischen Erscheinungen, möglicherweise die Ödeme an den Gliedmaßen, ferner die Mattigkeit des Tieres als Ausdruck eines mäßigen chronischen toxischen Fieberzustandes, mit größter Wahrscheinlichkeit auf das Konto der bestehenden Tuberkulose gesetzt werden. Dagegen könnten die seit Monaten bestehende „Herzschwäche“, der beobachtete kleine, pochende Herzschlag, vielleicht auch die Ödeme an den Gliedmaßen als Ausdruck von Zirkulationsstörungen, auf die schwere pathologische Veränderung des rechten Vorhofs bezogen werden. Auch die erhebliche Kurzatmigkeit bei Bewegung konnte im Sinne einer Art Herzdämpfigkeit gedeutet, ganz oder teilweise auf den schwer geschädigten Vorhof zurückgeführt werden. Aber selbst wenn man für diese letztgenannten Erscheinungen die Veränderung des rechten Vorhofs verantwortlich machen könnte, so sind sie auch in diesem Falle als nur relativ geringe Störungen zu bezeichnen, die in keinem Verhältnis zu dem schweren pathologischen Prozeß und der dadurch bedingten Funktionsstörung zu stehen scheinen.

Denn es ist bereits oben festgestellt worden, daß für den rechten Vorhof des hier untersuchten Falles Erschlaffung und Kontraktion infolge der Starrheit seiner ganzen Wand durch den pathologisch-anatomischen Prozeß unmöglich sind und daß somit der Vorhof im vorliegenden Falle praktisch funktionslos ist. Und trotzdem sind in diesem Falle (wie auch in anderen ähnlichen schweren Fällen) die vitalen Störungen nur relativ geringer, unbestimmter und anscheinend unbedenklicher Natur für die Existenz des Individuums gewesen! Dieser Gegensatz zwischen pathologisch-anatomischer Veränderung und Funktion läßt sich nur schwer überbrücken. Es ist dies

eine höchst interessante pathologisch-physiologische Frage, deren Beantwortung auf Grund eines Falles, der sich hauptsächlich auf den pathologisch-anatomischen Befund stützt — ein restlos einwandfreier klinischer Befund fehlt — nur mehr oder weniger hypothetisch erfolgen kann.

Wie erwähnt, verhält sich in vorliegendem Falle der rechte Vorhof völlig inaktiv; er ist hier, mechanisch gedacht, gewissermaßen als passiver, toter Hohlraum — das Lumen war ja erhalten, nur etwas verengt — zwischen die großen rückführenden Körperven und die rechte Herzkammer eingeschaltet. Seine unter normalen Verhältnissen nicht unwesentliche Funktion der Blutanfugung und -sammung durch Dilatation, sowie der Weiterbeförderung des Blutes durch Kontraktion müssen in diesem Falle, da er auch keine partiellen funktionstüchtigen Abschnitte besitzt, andere Teile des Zirkulationsapparates vikariierend übernommen haben.

Für die Blutbewegung in dem Venensystem spielt nach physiologischen Erfahrungen neben anderen Faktoren die Herzkraft und zwar ihr Rest, der nach Überwindung der Widerstände im Kapillarsystem noch übrig geblieben ist, als „vis a tergo“ eine gewisse Rolle. Es wäre nun möglich, daß der Ausfall der Blut anziehenden Wirkung des rechten Vorhofs durch Mehrarbeit des linken Herzmuskels gedeckt und ausgeglichen wäre, was sich pathologisch-anatomisch als mehr oder weniger ausgeprägte Hypertrophie markieren müßte. Im vorliegenden Falle war die Hypertrophie nur in mäßigem Grade ausgeprägt.

Von anderen Hilfsfaktoren, die physiologisch die Blutbewegung nach dem Herzen zu fördern, kämen hier noch als vikariierende Kräfte für den funktionslosen rechten Vorhof hauptsächlich der negative Druck des Thoraxraumes und seine Drucksteigerung bei der Inspiration, sowie mit letzterer zusammenhängend, der abdominale Druck in Frage. Physiologisch könnte eine Verstärkung dieses Mechanismus durch Erhöhung der Atemfrequenz mit tiefen Inspirationphasen bewirkt werden.

Nach der klinischen Beobachtung vorliegenden Falles, die sich meist nur auf kurze Zeit erstreckte und sich voreingenommen auf eine bestimmte Krankheit richtete, soll eine erhöhte Atemfrequenz in der Ruhe nicht vorhanden gewesen sein, sich aber bei Bewegung in starkem Maße eingefunden haben.

Ferner wird, wie Nörr (15) im Kapitel Blutkreislauf des Lehrbuches der Physiologie der Haustiere angibt, von einigen Forschern außer der durch die Herztätigkeit bedingten Triebkraft auch eine aktive Beteiligung der muskulösen Gefäßwand bei der Blutbewegung angenommen, die sich wohl hauptsächlich bei den arteriellen Gefäßen auswirken würde. Theoretisch wenigstens wäre es denkbar, daß zur Behebung der fehlenden Funktion des rechten Vorhofes auch diese „angenommenen“ Kräfte mit eingesprungen wären. Über eine etwaige Vermehrung der muskulösen Elemente, namentlich der beiden großen Sammelhöhlvenen, die als Stümpfe am Herzen noch verblieben waren, läßt sich hier nichts ausagen, da aus obigen Gründen eine histologische Untersuchung unterblieb. Makroskopisch erschienen diese Gefäßreste, wie schon erwähnt, ohne Veränderung.

Zusammengefaßt müßten die für den funktionsuntüchtig gewordenen rechten Vorhof vikariierend eingesprungenen, eben kurz angedeuteten Kräfte außer der Beförderung des venösen Blutes zum Herzen auch noch die Kraft des Hineintreibens des Blutes in die rechte Kammer, etwa der Triebkraft der Kontraktion des rechten Vorhofes unter normalen Verhältnissen entsprechend, aufgebracht haben, um die hier anscheinend wenig gestörten Zirkulationsverhältnisse verständlich zu machen.

Noch ein weiterer Punkt muß angesichts der schweren pathologisch-anatomischen Veränderung des rechten Vorhofs und der relativ geringen klinischen Erscheinungen eine kurze Erörterung finden. Wie schon erwähnt, ist der rechte Vorhof anatomisch Sitz des für die Herzbewegung wichtigen Keith-Flak'schen- oder Sinusknotens, in dessen Bereiche an der Einmündung der großen Venen unter normalen Verhältnissen die automatischen Reize für die Herzbewegung mit dem Effekte einer Kontraktionswelle, die sich über beide Vorhöfe ausbreitet und sich im Hiss'schen Bündel und seinen Schenkeln auf die Kammer fortsetzt, entstehen sollen.

In dem hier untersuchten Falle ergreift die Verknöcherung und Verkalkung die Vorhofswand in toto mit Ausnahme kleiner, nicht zusammenhängender, bindegewebig veränderter Bezirke an der Einmündung der Hohlvenen, die aber so gering sind, daß eine Schädigung bzw. Zerstörung des Sinusknotens wenigstens zum Teil von der übrigen Veränderung angenommen werden muß. Kitt (16) sagt in seiner pathologischen Anatomie, wenn der Sinusknoten zerstört wird, steht die Herzbewegung still. Zur Erklärung des Umstandes, daß im vorliegenden Falle ein solch fataler Ausgang dem Individuum erspart blieb, könnte angenommen werden, daß der Sinusknoten als lebenswichtiges Organ von einer vollständigen Zerstörung und Aufhebung seiner Funktion durch den pathologischen Prozeß ausgenommen worden sei, so daß von der Funktion des Vorhofes wenigstens die der Reizleitung erhalten geblieben sei. Nach den Angaben von Nörr soll in Fällen, wo die Reizentwicklung an der unter normalen Verhältnissen angenommenen Stelle im Bereiche des Sinusknotens verhindert wird, diese von anderen Stellen, z. B. von der übrigen Vorhofswand, vom Atrioventrikularknoten und vom Hiss'schen Bündel und seinen Schenkeln übernommen werden können. Auch diese Möglichkeit könnte zur Erklärung der durch den funktionellen Ausfall des rechten Vorhofes eigentümlicherweise wenig gestörten Zirkulationsverhältnisse und des mäßigen klinischen Befundes überhaupt, von dem klinischen Effekt der gleichzeitig bestehenden Tuberkulose absehend, im vorliegenden Falle mit herangezogen werden.

Literatur.

1. Joest, E. und Schieback, P.: Über Herzwandverknöcherung. Virch. Archiv für patholog. Anatomie und Physiologie 253, S. 472.

2. Edelmann, H.: Knochenbildung in der Herzwand. Virch. Archiv für patholog. Anatomie und Physiologie 266, S. 51. 3. Altmann, L.: Über die Verknöcherung der rechten Herzhofswand beim Pferde an der Hand von zwei Fällen. Allat. Lapok 1926, Jahrg. 49, S. 259, ref. in Ellenberger-Schütz Jahresbericht der Vet.-Med. 1926, 1. Hälfte, S. 637; (Ref.). 4. Kaufmann, E.: Lehrbuch d. spez. pathol. Anatomie. 7. u. 8. Aufl. Berlin u. Leipzig 1922, 1, S. 32. 5. Chuchu: Affection du coeur, ossification des oreillettes. Rec. de méd. vét. 1884, S. 236. 6. Grüner: Über einen Fall von Verknöcherung der Wand der rechten Vorkammer des Herzens bei einem Pferde. Arch. für Veterinärwissenschaften 1907, S. 191 (Russisch, zit. nach Joest und Schieback). 7. Land, N.: Zur Frage der Verknöcherung des Herzens beim Pferde. Arch. für Veterinärwissenschaften 1914, 44, S. 133 (Russisch, zit. nach Joest und Schieback). 8. Nocard: Affection du coeur, ossification des oreillettes. Rec. de méd. vét. 1884, S. 237. 9. Stoss: Über Herzverknöcherung. Deutsche Zeitschr. für Tiermed. und vergleichende Pathol. 1888, 13, S. 301. 10. Cadot: Sur l'ossification des oreillettes du coeur chez le cheval. Bull. de la soc. centr. de méd. vét. 1896, S. 98. (Zit. nach Joest und Schieback). 11. Isepponi: Vollständige Verknöcherung des rechten Herzhofes beim Pferde. Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1898, 40, S. 31. 12. Eber, A.: Herz vom Pferde mit Verknöcherung des rechten Herzohres. Bericht über das Veterinärinstitut bei der Universität Leipzig 1911—1912, S. 46. 13. Joest, E.: Verknöcherung der Wand der rechten Herzhofkammer beim Rinde. Bericht über die Tierärztliche Hochschule Dresden 1907, S. 175. 14. Spiegl: Histologische Untersuchungen über Endocarditis beim Hunde nebst einem Anhang über einige seltene Veränderungen des Herzens und der großen Gefäße. Virch. Archiv für patholog. Anatomie und Physiologie 231, S. 224. 15. Nörr, J.: Der Blutkreislauf. Aus Lehrb. d. vergl. Physiologie der Hausfügetiere von W. Ellenberger und A. Scheunert, 3. Aufl., 1925. 16. Kitt, Th.: Lehrb. der patholog. Anatomie der Haustiere 1927, 5. Aufl., Bd. 3.

(Aus der Helminthol. Abteilung des Staatsinstituts für Experimentelle Veterinäre. — Leiter: Prof. K. I. Skryabin.)

Zur Charakteristik des Nematoden aus dem Schafe — *Ostertagia turkestanica* Petrow und Schachowzewa, 1926.

Mit 4 Abbildungen.

Von A. M. Petrow und E. S. Schachowzewa.

Im Jahre 1926 wurde von uns eine Kollektion parasitischer Würmer aus den Schafen Turkestans bearbeitet, die von der 5. Russischen Helminthologischen Expedition, Prof. K. I. Skryabin, gesammelt wurde. Die Ergebnisse dieser Forschung wurden von uns in russischer Sprache in der Arbeit: „Zur Fauna der parasitischen Würmer der Schafe Turkestans“, in der Zeitschrift „Trudy Instituta Exper. Veterinarij (Leistungen des Staatlichen Instituts für Experim. Veterinärmedizin) veröffentlicht (Bd. II, H. 1, S. 78—88).

Unter den in Turkestan untersuchten Schafen gelang es uns, in dieser Arbeit 22 Arten Parasiten festzustellen, die aus 16 Nematoden-, 4 Zestoden- und 2 Trematodenarten bestanden.

Bei drei in Taschkent (Usbekistan) seziierten Schafen (Nr. 681, 682, 683) wurden im Labmagen Vertreter der Gattung *Ostertagia* Ransom, 1907 vorgefunden, die bei einer näheren Untersuchung sich als zu einer neuen Art gehörig erwiesen, und von uns unter dem Namen — *Ostertagia turkestanica* Petrow et Schachowzewa, 1926 — beschrieben worden sind.

Gegenwärtig ist die Art *O. turkestanica* auf dem Gebiete der Sowjetunion noch von N. M. Werestschagin entdeckt bei den Ziegen Usbekistans und von W. K. Kamenskij bei den Schafen Turkmenistans. Aus diesem Grunde halten wir es für zweckmäßig, auch den ausländischen Veterinärarbeitern eine Beschreibung dieser Parasitenart zu geben.

***Ostertagia turkestanica* Petrow et Schachowzewa, 1926.**

Wirt: *Ovis aries* und *Capra hircus*.

Lokalisation: Labmagen.

Geographische Verbreitung: In der U. S. S. R.: Usbekistan und Turkmenistan.

Beschreibung der Art: Nematoden hellgelber Farbe mit spitz auslaufenden Kopf- und Schwanzenden. Auf der Oberfläche der Kutikula sind 16—18 längsziehende Furchen gelegen. Die Mundöffnung liegt terminal und geht in eine kleine unbewaffnete Mundkapfel über. Der Mundkapfel folgt ein enger, zylindrischer, im Hinterteile sich erweiternder Ösophagus, der bei dem Männchen 1/13,5, bei dem Weibchen 1/18,3 der Gesamtlänge des Körpers erreicht.

Der Vorderteil des Ösophagus, in der Entfernung von 0,2964 bis 0,3120 mm vom Kopfe, — ist von einem Nervenring umgeben. Exkretionsporus — ist 0,3510 bis 0,3549 mm vom Kopfe entfernt. Etwas nach hinten zu vom Exkretionsporus, in der Entfernung von 0,3786 bis 0,3978 mm vom Kopfe, befinden sich die Zervikalpapillen.

Das Männchen erreicht 9,80 bis 10,64 mm in der Länge bei einer Maximalbreite in dem hinteren Körperdrittel von 0,1755 bis 0,1950 mm; die Körperbreite im Niveau des Kopfendes erreicht 0,0234 bis 0,0273 mm; im Niveau des Ösophagusendes 0,0897 bis 0,0975 mm und im Bereich der Analöffnung 0,1482 bis 0,1560 mm. Der Ösophagus erreicht 0,7020 bis 0,7683 mm in der Länge bei einer Maximalbreite in seinem Hinterteile 0,0624 mm; die Zervikalpapillen sind in der Entfernung 0,3786 bis 0,3851 mm vom Kopfe gelegen. Das Schwanzende ist mit einer mächtig entwickelten Bursa copulatrix versehen, die die Breite 0,4336 bis 0,4860 mm erreicht und aus drei Lappen besteht, von welchen der dorsale sehr schwach entwickelt ist. Die Bursa unter-

stützenden Rippen sind folgendermaßen gelegen: Die freien Enden der beiden costae anteriores nähern sich einander; die breite costa anterior externa und die costae mediae entspringen einem gemeinsamen Stamme; die langen, schmalen costae mediae sind scharf von einander abgegrenzt und laufen im Hinterende der Bursa aus; costa posterior externa hat eine breite Basis und ein stark verengtes freies Ende; costae posteriores bestehen aus einem unpaaren dorsal gelegenen Stamme, dessen freies Ende dreifach dichotomisch verzweigt ist. Im ventralen Teile der Bursa copulatrix befindet sich eine kleine Zusatzmembrana, die auf zwei dünne auseinanderlaufende Rippen gestützt ist. Der Anus ist 0,1677 bis 0,1755 mm vom Schwanzende entfernt.




Fig. 1. Schwanzende des Männchens.

Zwei gleiche Spikula dunkelbrauner Farbe erreichen die Länge von 0,4095 bis 0,4212 mm. Jedes Spikulum ist an den Seiten mit je zwei Längsleisten versehen, deren freie Enden medianwärts gerichtet sind. Das hintere Ende der Spikula ist in der Entfernung von 0,1092 mm in 2 Zweige gleicher Länge geteilt. Etwas nach vorn zu von der Bifurkationsstelle befindet sich ein dritter 0,1170 mm vom Hinterende entfernter und sehr kurzer Prozess, der eine Länge von 0,0058 mm erreicht. Das durchsichtige, spindelartige Gubernakulum erreicht eine Länge von 0,0702 mm bei einer Maximalbreite von 0,0195 mm.

Das Weibchen ist 12,50 bis 13,50 mm lang, bei einer Maximalbreite von 0,1755 bis 0,1833 mm; die Breite des Körpers im Gebiete des Kopfendes beträgt 0,0273, im Gebiete des Ösophagusendes 0,0819 bis 0,0897; im Gebiete der Vulva 0,1365 bis 0,1755 und im Gebiete des Anus 0,0585 bis 0,0624 mm.

Der Ösophagus erreicht eine Länge von 0,7020 bis 0,7254 mm, bei einer Maximalbreite in seinem Hinterteile von 0,0585 bis 0,0624 mm. Die Zervikalpapillen sind 0,3851 bis 0,3978 mm vom Kopfende entfernt. Das Schwanzende ist konisch zugespitzt. Anus ist in der Entfernung von 0,1872 bis 0,1950 mm vom Schwanzende. Die Vulva mit einer




Fig. 2. Kopfende des Weibchens.



Fig. 3. Gebiet der Vulva des Weibchens.



Fig. 4. Schwanzende des Weibchens.

0,8440 mm langen Kutikula Falte bedeckt, ist 2,3738 mm vom Schwanzende entfernt und teilt die Körperlänge der Parasiten im Verhältnis 4,5 : 1 ein.

Der Ovektor ist scharf ausgeprägt. Die Eier sind ovalförmig, 0,0897 bis 0,0936 mm lang und 0,0468 bis 0,0507 mm breit.

Zum Schluß halte ich es für eine angenehme Pflicht, Prof. Skrjabin für seine Anleitung bei meiner Arbeit den innigsten Dank zu äußern.

Innere Medizin und Chirurgie.

Kritschewski: Über eine bisher noch unbekannte Funktion des retikuloendothelialen Systems. I. Die Beziehungen der Chemotherapie und Chemoprophylaxe zum retikulo-endothelialen Apparat. (Zschr. f. Immunitätsforschung 1927, Bd. 53, S. 506.)

Die Untersuchungen befaßten sich mit der Frage, ob der chemotherapeutische Effekt durch die Wirkung des chemischen Präparates selbst auf die Mikroorganismen hervorgerufen wird, oder ob die Vernichtung derselben auf der gemeinsamen Wirkung der chemischen Verbindung und der Schutzvorrichtung des Organismus beruht. Die vorliegenden Untersuchungen wurden unter Ausschaltung der Milz, des größten retikuloendothelialen Zellkomplexes im Organismus, ausgeführt. Die funktionelle Ausschaltung der Milz führte bei allen Modifikationen der Untersuchung zu einer schweren Herabsetzung der therapeutischen und sterilisierenden Fähigkeiten aller daraufhin untersuchten chemotherapeutischen Präparate (Trypanrot, Pyronin, Tryparosan,

Atoxyl, Neosalvarsan, Tartarus stibiatus, Trypaflavin, Germanin). Besonders deutlich zeigte sich das in Bezug auf die stärkste der trypanoziden Verbindungen, das Germanin, welches bei Fehlen der Milz nicht nur seine sterilisierende Fähigkeit verliert, sondern in vielen Fällen (40 Prozent) völlig inaktiv wird und den üblichen Verlauf der Infektion nicht hindert. Verf. betont, daß die Ausschaltung der Milz eine größere oder geringere Inaktivität der chemotherapeutischen Mittel auf die Trypanosomen bedingt. Da aber der Organismus bei Trypanosomeninfektionen seine Schutzmittel ohne Beteiligung der Milz mobilisiert, so geht daraus hervor, daß die schützende Funktion des retikuloendothelialen Systems in keinem Zusammenhang steht mit der bisher noch unbekannten Funktion, die die medikamentöse Aktivität der chemischen Verbindungen im Organismus bestimmt. Meyn.

Breithor: Zur Kenntnis der häufigsten Erkrankungen des Pferdes im Kriege. (T. R. 1927, S. 740.)

Während des Krieges sind auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen von deutschen Tierärzten insgesamt etwa

7 Millionen Krankheitsfälle behandelt worden. Die größte Bedeutung kam der Räude zu, es sind etwa $\frac{3}{4}$ Millionen Fälle im deutschen Heere vorgekommen. Eine erfolgreiche Behandlung konnte erst in den letzten Kriegsmonaten in Form des Nöllerschen Befugungsverfahrens einsetzen. Daß auch im Kriege die Räude erfolgreich bekämpft werden kann, zeigt die beigegebene Kurve über den Verlauf der Räude, in Prozenten zur Iststärke, im deutschen Westheer und im englischen Heer, wozu letzteres schon 1917 das von den Franzosen übernommene SO₂-Verfahren durchführte. Der Rotz, der bei Beginn des Krieges im größeren Umfange auftrat, hatte gegen Kriegsende dank der Blutunterfuchungen an Bedeutung verloren. Die ansteckende Blutarmut, im Frühjahr 1915 bereits in der Champagne festgestellt, ist in ihrer Bedeutung als Kriegsfeuche erst 1917 erkannt worden. Die Lymphangitis epizootica hat im Gegensatz zum französischen Heer nur eine untergeordnete Rolle gespielt, desgl. Brustfeuche und Rotlaufseuche. Die Drupe war zu Beginn bei vielen Formationen eingeschleppt worden. Die meisten Todesfälle sind auf Erschöpfung zurückzuführen; etwa ein Drittel der Gesamtsumme der im Kriege gestorbenen Pferde. Die Kolik zeigte naturgemäß infolge der Fütterungs- und Haltungsverhältnisse eine hohe Morbiditäts- und Mortalitätsziffer. Die größte Rolle unter den äußeren Erkrankungen spielten Schußverletzungen, auch Sattel- und Geschirrrucke waren von großer Bedeutung und stehen hinsichtlich der Häufigkeit ihres Vorkommens an dritter Stelle. Kampfgasvergiftungen wurden bei Tieren nur in geringer Zahl beobachtet. Die Arbeit enthält ein umfangreiches Zahlenmaterial über Ausbreitung, Todesfälle und die Verbreitung der einzelnen Krankheiten auf die verschiedenen Kriegsschauplätze, denen die englischen und teilweise auch die französischen Zahlen vergleichend beigegeben sind.

K. H. Meyer.

Neumann, Georg: Über die Wandlung des Blutbildes von Serumpferden nach Aderlässen, mit besonderer Berücksichtigung des Verhaltens bei der Wiedereinführung der eigenen oder der Zufuhr von artemgen fremden Blutzellen. (T. R. 1927, S. 778.)

Den Anlaß zu vorliegender Arbeit gab das von Dr. William James Penfold angegebene Verfahren, nach welchem es möglich sein soll, das zur Serumgewinnung bestimmte Pferdmaterial auf größere Leistungsfähigkeit zu bringen, wenn man die roten Blutkörperchen nach Abscheidung des Plasmas wieder in die Blutgefäße desselben Tieres infundiert. Die Arbeit N.'s befaßt sich mit der Untersuchung des Einflusses, welchen die Blutentziehung auf das Blutbild der Serumpferde ohne und mit nachfolgender Reinfusion der eigenen oder artemgen, aber mit körperfremden Blutzellen hat. Bei periodischen Blutentziehungen zeigt sich zunächst ein Absinken der roten Blutwerte, welches bei verhältnismäßig gleich starken Aderlässen individuell verschieden ist. Nach Abschluß der Blutentnahme erfolgt ein ebenfalls individuell verschiedener zunächst rascher und dann langsamer Anstieg der Zahl der roten Blutkörperchen. Die Reinfusion der eigenen Blutzellen nach Aderlässen wird bei geeigneter Technik ohne sichtbare Reaktion vertragen. Daß der Eingriff nicht harmlos ist, zeigt das teilweise gewaltige Steigen der Leukozytenzahl. Die sofort nach der Reinfusion bedeutend ansteigenden Blutwerte sind im allgemeinen schon am nächsten Tage wieder ebenso tief gesunken, als wenn keine Reinfusion vorgenommen worden wäre. Die Infusion artemgen, aber körperfremder Blutzellen wird ebenfalls ohne Reaktion vertragen, jedoch sind auch diese unter gewaltiger Vermehrung der Leukozyten schon nach kurzer Zeit aus dem Körper wieder ausgeschieden. Es werden also die wahrscheinlich toten, mindestens aber in ihrer Lebensfähigkeit stark geschwächten körpereigenen oder -fremden Blutzellen vom Körper offenbar als Fremdkörper empfunden und wieder ausgeschieden. Bei einem getöteten Pferde zeigte sich,

daß die wieder eingeführten roten Blutzellen in Milz und Lymphknoten abgelagert waren. Durch die Reinfusion der vom Blutplasma getrennten Blutzellen läßt sich nach Verf. die Serumgewinnung weder vereinfachen, noch die Ausbeute steigern.

K. H. Meyer.

Hetter: Die historische Entwicklung des Pferdellazarettwesens im Heeresdienst bis zum Jahre 1918. (Auszug aus den Preisarbeiten „Das Pferdellazarettwesen im Heeresdienst.“) (Zschr. für Vet.-Kunde 1927, H. 11, S. 442—458; H. 12, S. 493 bis 516 und 1928, H. 1, S. 1—22.)

Verf. behandelt zunächst die historische Entwicklung des Pferdellazarettwesens bis zum Weltkriege. Schon im Altertum werden Tierospitäler erwähnt. Wolstein reichte 1780 dem „hohen Rate der Kriege“ in Wien einen Plan für „Tierospitäler im Kriege“ ein. Schon seit Jahrzehnten vor dem Weltkriege zielten Bestrebungen dahin, Krankenställe innerhalb der Kasernements auch für nicht ansteckende erkrankte Pferde zu errichten, wie dies in Bayern schon früher der Fall war. Bis zum Jahre 1919 kannte das deutsche Heer in Friedenszeiten keine Pferdellazarette. Eine Ausnahme bildete ein Pferdeheim in Metz (Eröffnung 1902). Lediglich in größeren Manövern wurden später Pferdellazaretten errichtet. Über Personal und Einrichtung hat Rachfall berichtet, der auch anregte, für diese Sammelstellen einen Pferdetransportwagen zu beschaffen. Über die Ausstattung der Pferdellazaretten sind von Albrecht im Jahre 1913 brauchbare Anhaltspunkte gegeben. In Deutsch-Südwestafrika mußten die verwundeten und erschöpften Pferde an die auf den Märschen berührten, größeren Militärstationen abgegeben werden, wo es somit zwangsläufig zur Einrichtung von Pferdellazaretten kam. England hatte schon in Friedenszeiten Veterinärhospitale, in Frankreich bestanden sog. Depots für verwundete und kranke Pferde, in Rußland findet sich aus dem Jahre 1891 eine Angabe über Veterinär-lazarette, auch die Schweiz hatte vor dem Kriege schon ein Pferdellazarett. Verf. beschreibt weiter die Entwicklung des Pferdellazarettwesens in Deutschland während des Krieges, die Taktik, die Organisation, den Betrieb, die Bewährung des Pferdellazaretts im Kriege und Frieden, seine Beziehungen zum Front- und Nachschubdienste, das Pferdellazarettwesen im Auslande während des Weltkrieges (England, Frankreich, Bulgarien, Türkei, Ungarn, Österreich, Schweiz, Serbien). Aus der Übersicht ergibt sich zwanglos der Eindruck, daß es sich gerade bei dem Pferdellazarettwesen um einen Zweig der Heeresversorgung handelt, der, nachdem ihm lange Zeit nicht die nötige Beachtung geschenkt worden war, in den letzten Jahrzehnten mächtig im Aufblühen begriffen ist und aller Voraussicht nach mindestens in der näheren Zukunft noch weiteren Aufschwung zu nehmen berufen sein dürfte — bis vielleicht dereinst einmal das Pferd verschwindet und ganz durch den Motor ersetzt wird.

A.

Auszug aus dem statistischen Veterinärbericht über die Remonteämter für die Zeit vom 1. April 1925 bis 31. März 1926 (Berichtsjahr 1925/26). (Zschr. f. Vet.-Kunde 1927, H. 7, S. 289—295.)

Der Bericht umfaßt die vorhandenen acht Remonteämter. Geheilt wurden 95,18 Prozent der Erkrankten, ausgemustert 2,93 Prozent, gestorben oder getötet sind 2,06 Prozent der Erkrankten. Rotz kam in fünf Fällen in zwei Remonteämtern zur Feststellung. Die an Brustfeuche erkrankten Pferde wurden mit Neosalvarsan behandelt und sämtlich geheilt. Bei den mit Drupe komplizierten Brustfeuchefällen ging das Fieber am ersten Tage nach der Salvarsanbehandlung etwas zurück, um dann jedoch wieder bis zur alten Höhe und darüber zu steigen. Es wird berichtet, daß in zahlreichen dieser letzteren Fälle nach der Injektion von Druselymphe Dr. Schreiber eine auffallende Besserung des Allgemeinbefindens eingetreten sei. — Die Drupe trat im allgemeinen in schwerer Form mit schleppen-

dem Verlauf auf. Die Dauer der einzelnen Erkrankungen dauerte zwischen 14 Tagen und 4 Monaten. Die Behandlung bestand in erster Linie in hygienischen Maßnahmen, Diätetik, in zweiter Linie im Erweichen und Spalten der Abszesse. In einem Remonteamt sind Versuche mit Verfüttern von aufgebrihtem, heißem Hafer gemacht worden, mit dem Erfolg, daß die Erkrankungen im allgemeinen mit weniger Abszedierungen verliefen und gelinder auftraten; andererseits wurden jedoch sieben Fälle von Metastasenbildung in den Bauchorganen festgestellt und auffallend viel schwere Vereiterungen von Afterdrüsen, so daß man nicht gut von einem Erfolg sprechen kann. Im Anschluß an schwere Drüse trat bei vier Remonten Senkrückenbildung ein, die zur Ausmusterung dieser Pferde führte. Cajo-sol- und Jodipin-Einspritzungen waren vielfach von guter Wirkung. In einem Remonteamt wurden sämtliche Remonten nach der Einlieferung mit 15 ccm Drüsenlymphe Dr. Schreiber vorbeugend geimpft, ohne daß die Ausbreitung der Drüse mit besonderem Erfolg eingeschränkt wäre. — In zwei Remonteamtern wurde bei Blutfleckenkrankheit mit Petechialfieberferum nach Professor Jensen mit bestem Erfolg behandelt; um letzteren zu sichern, ist frühzeitige Behandlung nötig. Bei der Behandlung der Mauke haben sich neben den sonst gebräuchlichen Behandlungsmethoden Wäschungen mit Sulfoliquid und Aufpudern von Sulfofix sehr gut bewährt. A.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Minett, F. C.: Immunity in foot — and — mouth disease. (Die Immunität bei Maul- und Klauenfeuche.) (Journ. of comp. pathol. a. therapeut. 1927, Bd. 40, Nr. 3, S. 173 bis 195.)

Minett hat mit vier verschiedenen Maul- und Klauenfeuchstämmen gearbeitet, wovon drei dem Vallée'schen Stamm „O“ und einer dem Vallée'schen Stamm „A“ entsprachen. Die bei der Luesdiagnose üblichen Flockungsreaktionen sowie die Komplementbindung gaben bei Maul- und Klauenfeuche keine spezifischen Ausfälle. Der Nachweis der spezifischen Antikörper im Blute durchgefuchter Tiere ist bis jetzt nur möglich durch den viruliden Versuch in vitro, sowie durch den Serumprüfungsversuch an erwachsenen Meerfchweinchen. Bei dieser von Waldmann und Pape eingeführten Methodik erhält eine Serie von erwachsenen, etwa gleich schweren Meerfchweinchen steigende Mengen Serum subkutan einverleibt. Gleichzeitig werden die Tiere kutan an einer Planta infiziert. M. hat diese Methode im größeren Maßstab angewandt. Er empfiehlt für jede Serumdosis zwei bis drei Meerfchweinchen zu verwenden, um das Moment individuell verschiedener Krankheit möglichst auszufalten. Am besten eignet sich jeweils frisch gewonnenes, filtriertes Virus. Verf. hat gefunden, daß bei Aufbewahrung der Filtrate im Kühlraum diese eine Virulenzsteigerung erfahren können. Die Versuche haben ergeben, daß Meerfchweinchen 20 Tage nach der Infektion einen Serumtiter von 0,3 ccm besitzen, der meistens 103 Tage nach der Infektion anhält. Der entsprechende Titer bei durchgefuchten Rindern beträgt 1,0 ccm. Vereinzelt vermögen auch 0,5 ccm die Meerfchweinchen vor der Generalisation zu schützen. Meerfchweinchen-Immunserum, das bei 2 Grad C 35 Tage aufbewahrt wurde, zeigte keine Veränderung seines Titers, ebenso wie Rinderferum, das 159 Tage lang bei denselben Bedingungen aufbewahrt war. — Die weiteren Immunitätsstudien ergaben, daß das Meerfchweinchen ebenso wie das Rind sowohl partielle als auch totale Immunität erlangen kann. Partielle Immunität war zu erzielen durch Injektion von unter-infektiösen Virusdosen, deren Applikation unter Umgehung der äußeren Haut erfolgt, ferner durch Einverleibung von Immunserum mit folgender Virusinjektion ebenfalls unter Umgehung der äußeren Haut,

ferner durch Injektion von abgetötetem Virus und schließlich für eine beschränkte Zeitdauer durch Injektion von Immunserum allein. Die Theorie von der humoralen und histogenen Natur der Immunität wird abgelehnt. Die Antikörper sollen ausschließlich humoral entstehen. H.

Wagner, K.: Experimentelle Untersuchungen über die Tenazität des Virus der Maul- und Klauenfeuche in häuslichen und gewerblichen Abwässern und ihre Bedeutung für Hygiene und Veterinärpolizei. (Arch. für wiss. u. prakt. Tierheilkunde 1927, Bd. 56, H. 6, S. 481/493.)

In Parallele zu den in den letzten Jahren mit Aphthendecken-Virus angestellten Tenazitätsversuchen (Trautwein, englische, amerikanische Maul- und Klauenfeuche-Kommission), die zu dem Ergebnis gekommen waren, daß das Virus besonders in Epithelfetzen wesentlich länger in der Umwelt haltbar ist, als bis dahin allgemein angenommen wurde, hat nun Wagner Aphthendeckenvirus vom Meerfchweinchen in drei Faulgruben zu verschiedenen Jahreszeiten gehalten und auf seine Tenazität untersucht. Im Sommer blieb das Virus in dem bezeichneten Milieu 21 Tage virulent, doch äußert sich der Verf. dahin, daß eine längere Dauer der Infektiosität praktisch wohl angenommen werden kann. In den kühleren Jahreszeiten, und zwar im Herbst, betrug die Mindestdauer der Infektiosität 43 Tage und 103 Tage im Winter und Frühjahr. Am schnellsten wurde das Virus in der ersten Grube abgetötet, da in dieser die Zersetzungs- und Fäulnisvorgänge nachdrücklicher in Erscheinung traten als in den beiden anderen Faulgruben. Aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen folgt der Verfasser die Notwendigkeit einer gründlichen Abwässerdesinfektion zum Zwecke einer umfassenden Seuchenbekämpfung. H.

Trautwein, K.: Die Pluralität des Maul- und Klauen-seuchevirus. (Arch. für wiss. und prakt. Tierheilkunde 1927, Bd. 56, H. 6, S. 505—555.)

Die während zwei Jahren an Hunderten von Rindern, Schweinen und über 10.000 Meerfchweinchen angestellten Versuche haben die Pluralität des Maul- und Klauenfeuche-Virus einwandfrei erwiesen. Die 76 untersuchten Virusstämmen, die aus Spontanausbrüchen des In- und Auslandes gewonnen wurden, konnten alle in drei Typen A, B und C eingeteilt werden, die sich in ihren antigenen Eigenschaften wesentlich unterscheiden, d. h. die durch Infektion mit dem anderen Erregertyp im empfänglichen Tier erzeugte Immunität wird von den beiden anderen Typen durchbrochen. Auch kann ein empfängliches Tier dreimal unter spezifischen Erscheinungen innerhalb kurzer Zeit erkranken. Neben den drei reinen Typen wurden auch Stämme gefunden, bei denen die antigenen Eigenschaften zweier Typen nebeneinander bestehen. Im Meerfchweinchenversuch ist ferner eine Typentrennung auf immunologischem Wege gelungen. Hier konnte bei Meerfchweinchen-Sera eine gegenseitige Beeinflussung der Typen durch die homologen Immunkörper nicht festgestellt werden. Bei einmaliger Infektion ist das Meerfchweinchen-Serum monovalent, nach mehrmaliger Durchfeuchung wird es plurivalent. Bei dem spontan empfänglichen Tier war ein Übergreifen der Immunität zu beobachten. Es besteht also eine Parallele mit den Verhältnissen bei bestimmten Bakteriengruppen, bei denen serologisch (bei der Agglutination, Präzipitation und Komplementbindung) ein gewisses Übergreifen stattfindet. Das Übergreifen der Immunität war bei Rindern nur in 52 Prozent, beim Schwein in 33 Prozent der Fälle nachzuweisen. Dazu kommt, daß die heterologen Antikörper sehr schnell, etwa nach sechs Wochen, aus dem Blute verschwinden. Mit einer gegen alle drei Typen schützenden Gruppenimmunität kann also praktisch nicht gerechnet werden. Dieser Feststellung entspricht die epidemiologische Erfahrung, wonach zahlreiche Rinderbestände innerhalb kurzer Zeit wiederholt durchgefuchten. Das Vorkommen der heterologen Immun-

körper stand im indirekten Verhältnis zur natürlichen Empfänglichkeit der Tierart. Bei allen drei Typen konnten die Antikörper bereits nach sechs Tagen p. i. beim Meerfischweinch und Rind nachgewiesen werden. Die Dauer der absoluten Immunität betrug in der Regel mindestens drei Monate. Hinsichtlich Virulenz, Inkubation, klinischem Verlauf, Symptomenkomplex und pathologisch-anatomischem Befund konnten wesentliche Unterschiede der einzelnen Typen weder bei spontan empfänglichen Tieren noch beim Meerfischweinch ermittelt werden. Für die Serumbekämpfung der Maul- und Klauenfeuche geben die Versuche die Forderung nach Plurivalenz des Serums. H.

Kling, C. et A. Hojer: Recherches sur le mode de propagation de la fièvre aphteuse. Mécanisme de la transmission du contagé par l'homme. (Untersuchungen über die Art der Maul- und Klauenfeuche-Ausbreitung. Die Kontaktübertragung durch den Menschen. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. 1926, Bd. 94, S. 618/620.)

Zur Ausbreitung der Maul- und Klauenfeuche trägt nach Ansicht der Verff. in erster Linie der Mensch bei. In 10 Prozent erhalten die menschlichen Virusträger den Ansteckungsstoff direkt in den maul- und klauenfeuchekranken Rinderbeständen, zu 90 Prozent durch den Genuß infizierter Milch und durch Berührung mit bereits virustragenden Menschen. Die Verff. sind der Ansicht, daß die menschliche Schleimhaut für das Virus die günstigsten Lokalisationsbedingungen hat. Sie haben außerdem mehrere Fälle menschlicher Maul- und Klauenfeuche in Schweden beobachten können und festgestellt, daß im Blute von sechs geheilten Menschen virulizide Antikörper vorhanden waren. H.

Wagner, K.: Infektion und Immunität bei der experimentellen Aphthenfeuche des Meerfischweinchens. (Arch. für wiss. und prakt. Tierheilkunde 1927, Bd. 56, Heft 6, S. 494/504.)

Die Befunde des Verf. aus seinen mit der 1200. bis 1300. Generation des Riemser „Insel Stamm's“ vorgenommenen Versuche zur Feststellung der erfolgreichsten und zuverlässigsten Infektionsmethoden bei der experimentellen Maul- und Klauenfeuche des Meerfischweinchens entsprechen den Ergebnissen, die von Waldmann und Pape, sowie Knöfels seinerzeit gefunden wurde. Spontaninfektionen wurden beim Meerfischweinch nicht beobachtet. Die nach kutaner Infektion stets vorhandene Immunität hält 21 bis 210 Tage an. Die prozentualen Infektionserfolge betragen nach kutaner und intrakutaner Applikation des Virus 100 Prozent, nach intrakardialer (intravenöser) 86,6 Prozent, nach subkutaner und auch intramuskulärer 76,7 Prozent, nach abdominaler 71,9 Prozent, nach stomachaler Applikation 3,3 Prozent. Die Einführung des Virus auf intratrachealem Wege verlief nur in einem von 12 Fällen positiv. W. hat dann noch an infizierten, aber nicht erkrankten Meerfischweinch Immunitätsprüfungen angestellt, die nur in ganz vereinzelten Fällen das Vorhandensein einer Immunität deutlich machten. Der Verf. läßt die Frage offen, ob die Immunität dieser Tiere auf individueller Veranlagung beruht oder durch einen klinisch nicht erkennbaren Krankheitsverlauf erworben sein kann. H.

Reppin, K.: Die Infektiosität des Blutes simultangeimpfter Meerfischweinch bei Maul- und Klauenfeuche. (Arch. für wiss. u. prakt. Tierheilkunde 1927, Bd. 56, H. 6, S. 556 bis 563.)

Die Versuche wurden mit 45 simultangeimpften Meerfischweinch und 29 Kontrolltieren angesetzt. In den Versuchsreihen wurden vier Sera von verschiedener Wertigkeit simultan appliziert. Von den Versuchstieren wurden zu verschiedenen Zeiten 600 Blutproben entnommen und auf ihren Virusgehalt hin untersucht. Entsprachen die angewandten einzelnen Serumdosen der Titermenge oder waren sie größer als diese, so ließ sich in den Blutproben weder Virus nachweisen, noch kam es bei den Meerfischweinch

zu feststellbaren Generalisationserscheinungen. Nur ein Fall, bei dem das zur Simultanimpfung benutzte Serumquantum der Titermenge entsprach, verlief insofern außergewöhnlich, als sich im Blute des betreffenden Meerfischweinchens zwar Virus nachweisen ließ, eine Ausbildung von Sekundäraffekten dagegen nicht festgestellt werden konnte. Bei der Anwendung kleinerer Serummengen unterhalb des Serumtiters kam die Generalisation später als gewöhnlich zur Ausbildung. Dementsprechend war das Virus im Meerfischweinchblut von der 24. bis zur 96. Stunde p. i. nachweisbar. In zwei Fällen kam ferner zur Beobachtung die Bildung von Generalisationsaffekten, ohne daß im Blute der betreffenden beiden Versuchstiere, die der Simultanimpfung unterzogen waren, Virus nachzuweisen war. Die Blutinfektiosität fiel bei den Kontrolltieren in den Zeitraum zwischen der 8. und 96. Stunde p. i. Vereinzelt war bei diesen Tieren das Blut schon vor der Bildung sichtbarer Primäraffekten und noch 48 Stunden nach der Entwicklung der Generalisationsblasen festzustellen. H.

Ernst, W., F. Guth u. M. Hopfengärtner: Gibt es verschiedene Typen von Maul- und Klauenfeuche-Erreger ohne wechselseitige Immunität? (M. t. Wschr. 1927, Jhg. 78, Nr. 32, S. 433—436.)

Mit zwei deutschen, zwei französischen und zwei schwedischen Virusstämmen stellten die Verff. Versuche am Meerfischweinch an, ohne zur Bestätigung der Viruspluralität zu kommen. Die wiederholten Erkrankungen von Tieren werden mit Unterschieden in der Virulenz und den verschiedenen immunisatorischen Fähigkeiten der Tierkörper erklärt.

(Die von französischen, deutschen, englischen, amerikanischen und schwedischen Forschern auf sehr breiter Basis aufgebauten Forschungsergebnisse bezüglich verschiedenen Maul- und Klauenfeuche-Erregertypen können durch diese wenig umfangreichen sowie nur auf das Meerfischweinch beschränkten Versuche nicht widerlegt werden. Ref.). H.

Bedson, S. P., H. B. Maitland and Y. Burbury: Further observations on foot — and — mouth disease. (Weitere Untersuchungen über Maul- und Klauenfeuche.) (Lister inst. London.) (Journ. of comp. pathol. a. therapeut. 1927, Bd. 40, Nr. 2, S. 79/117.)

Um der Viruszüchtung näher zu kommen, wurde die Lebensfähigkeit des Virus in verschiedenen bei Bakterien erprobten Nährstoffen (2 Prozent Peptonwasser, 1 Prozent Glukose, Nährbouillon) geprüft. Diese Mittel wurden unter sonst gleichen Bedingungen einer Phosphatpufferlösung von pH = 7,6 zugesetzt. Die Lebensfähigkeit des Virus hielt in der letztgenannten Lösung allein bei 37 Grad C nur vier bis fünf Tage an. Hierin wurde auch durch die erwähnten Zusatzstoffe keine Änderung erzielt. Versuche mit zitiertem Meerfischweinchplasma oder mit Auszügen aus embryonalen Meerfischweinchorganen ergaben eine Virusabschwächung, die besonders deutlich wurde, wenn Sera vom Pferd, Schaf, Kaninchen und Meerfischweinch allein oder zusammen mit der Phosphatpufferlösung benutzt wurden oder die Sera bei 65 Grad 1/2 Stunde bzw. bei 56 Grad eine Stunde lang inaktiviert wurden. Die Lebensdauer des Virus hielt nur 24 Stunden an. Sie wurde auf 93 Stunden gebracht, nachdem zum Serum Trypsin, Gewebstückchen embryonaler oder ausgewachsener Meerfischweinch oder sterile rohe Kartoffeln zugesetzt waren. Weiteren Einfluß auf die Lebensfähigkeit des Virus durch Änderung in der Sauerstoffspannung, durch Eier oder Milchnährböden, sowie auch durch die Aufbewahrung frischen infektiösen Hautmaterials von Meerfischweinchpflanzen bei 37 Grad in den verschiedenen Nährflüssigkeiten gelang nicht. Ebenso verliefen die Symbioseprüfungen des Virus mit Bakt. coli, B. subtilis und Staphylokokken. Den letzteren wird eine besonders nachteilige Einwirkung auf

das Virus zugeschrieben. — Andere Versuche befaßten sich mit den Wertigkeitsprüfungen des Maul- und Klauenfeuchtevirus. Als beste Methode gilt den Verfassern die intrakutane Meerf Schweinchenimpfung mit gleichen Serumengen bei Zusatz steigender Virusverdünnungen, nachdem das Gemisch $\frac{1}{2}$ Stunde in Zimmertemperatur gehalten ist. Gleichzeitig wird beim Meerf Schweinchen die Minimal-Infektions-Dosis (M. — I. — D.), d. h. die stärkste, noch infektiöse Virusverdünnung festgestellt. Als Serumwertigkeit gilt die Zahl der M. I. D., die vom Serum gerade noch abgetötet wird. In Verbindung mit den oben genannten Serumprüfungsversuchen konnte durch kreuzweise Reinfektionen mit verschiedenen Virusstämmen aus Deutschland (A, B und C nach Waldmann und Trautwein), Frankreich und Schweden die Pluralität erneut bestätigt werden. H.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Maurer, F.: Beobachtungen über feuchenartig auftretende Leckfucht bzw. Osteomalazie. (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1928, 70, S. 32.)

Die als Leckfucht besprochene Osteomalazie bekannte Stoffwechselerkrankung scheint auch in der Schweiz an bestimmten Orten periodisch aufzutreten. In Hardern (Bern) trat sie besonders 1919 sehr heftig auf, war auch durch Weidegang im Frühling nicht zu beheben. Die Tiere zeigten hochgradige Allotriophagie, fraßen besonders gerne Holz. Durch Begießen aller Gegenstände, an denen die Tiere nagten, mit starker Kochsalzlösung, wurde erzielt, daß der erhöhte Durst auch die Aufnahme von Milch und Gras erleichterte. Dies war für den Verlauf von großem Nutzen. Dazu wurde Kalk und Phosphat verabreicht, mit Stärkungsmitteln. Den Hauptanteil bewirkte das Gras der nassen Weiden, denn im trockenen Sommer 1919 bis Herbst trat die Krankheit in entscheidender Weise wieder auf. Die Erscheinungen waren: Verminderung der Freßlust, Liegen, Schmerz beim Gehen, Aufkrümmen des Rückens, träge Verdauung, Leckfucht, Nagen, Holzfressen, später Fieber, hochgradige Kachexie. Im Spätherbst 1919 wurde dann wieder Gras gefüttert und die Krankheit kam zum Stillstand, um bei der Heufütterung im Frühjahr wieder aufzutreten. Typisch ist also der innige Zusammenhang zwischen Grünfütterung und Leckfucht. Sie betraf namentlich Tiere im Stadium der Wachstumsperiode. Die Behandlung besteht in frühzeitigem Futterwechsel, Verabreichung von vollwertigem Kraftfutter, fremdem Heu, Kleeheu usw. oder Verbringen der Tiere in eine andere Gegend. Medikamente sind zwecklos. Systematische Fütterung von Kalk, Chloriden und Phosphaten beeinflusst sehr günstig. H. Graf.

Grubert, P.: Untersuchungen über die Zusammensetzung der Milch während der Brunst der Kühe. (In.-Dissert. Berlin 1926.)

Die Katalase schwankt in den einzelnen Gemelken desselben Tieres, sie ist bei Beginn der Laktation hoch, nimmt im Laufe der Laktation und zugleich mit zunehmender Trächtigkeit ab und steigt dann im Endstadium der Trächtigkeit kurz vor dem Abkalben wieder an. Einwandfreie physiologische Werte für die Beschaffenheit der Brunstmilch zu erlangen, wird immer schwierig sein, da viele äußere Faktoren die Milchsekretion beeinflussen und die Milchgewinnung abhängig machen. Der Fettgehalt hat eher eine steigende als fallende Tendenz; der vereinzelt beobachtete starke Rückgang an Milch und Fett ist nur sekundärer Natur und auf das „Aufziehen“ der Milch zurückzuführen. Nur der Tierarzt (nicht der Nahrungsmittelchemiker!) kann nach Untersuchung des betreffenden Tieres und einer entnommenen Milchprobe das Urteil fällen, ob eine Milchverfälschung vorliegt oder die Verdachtswerte auf geschlechtliche Erregungszustände oder sonstige Störungen zurückzu-

führen sind. Nach Rückgang der Brunsterscheinungen wird man nur positive Werte finden (in der Regel nach 24 bis 36 Stunden, bei Stallvieh noch früher). Die vielfach beobachtete Schädlichkeit der Brunstmilch möchte Verf. weniger auf irgendwelche Toxine, deren Ursprungsstätte die Ovarien sein sollen, zurückführen, sondern vielmehr auf die Schwankungen und namentlich auf das in vielen Fällen nach der Brunst beobachtete starke Ansteigen des Fettgehaltes, dessen Menge von dem jungen Individuum nicht reiflos verdaut werden kann und Störungen im Verdauungstraktus hervorruft. A.

Niemann, Fr.: Ein Fall von Hypospadias interscrotalis beim Ziegenbock. (In.-Diss. Berlin 1926.)

Der untersuchte Geschlechtsapparat eines Ziegenbockes war rein morphologisch mit allen Eigenschaften eines männlichen Geschlechtsapparates ausgestattet, zeigt jedoch folgende Abweichungen: Das descensus testicularum ist nur unvollständig erfolgt; es besteht inguinaler bzw. subkutaner Kryptorchismus. Es besteht eine durch das völlige Fehlen der Spermiogenese gekennzeichnete sterilitas testis. Von den Müller'schen Gängen ist ein erheblicher Rest als Anlage eines uterus bicornis erhalten geblieben. Der Penis ist zwar vorhanden, liegt jedoch bis auf die Spitze völlig versteckt in der Subkutis des Dammes und der Schenkelpalte und tritt daher äußerlich nicht in Erscheinung. Die pars externa urethrae ist nur auf halbe Rutenlänge vorhanden. Die Harnröhre mündet unabhängig vom Penis dicht oberhalb der Skrota nach außen. Von dieser Mündung ab befindet sich eine mediane Längsrinne in demjenigen Teil der Kutis, welcher die apikale Hälfte des Penis überdeckt. Das den apex penis als galea penis überziehende praeputium viscerale ist gut ausgebildet. Dagegen ist das praeputium parietale nur unvollkommen gestaltet, wodurch der Eindruck einer Vulva vorgetäuscht wird. Im wesentlichen ist die vorliegende Mißbildung hiernach nur zu kennzeichnen als eine Hypospadias, die man als Hypospadias interscrotalis bezeichnen kann. A.

Hölscher, H.: Über Vorkommen lymphatischer Herde in der Thyreoidea trächtiger Tiere. (In.-Diss. Berlin 1925.)

Der Ansicht Trautmanns, daß gerade in der Thyreoidea des Schweines mit seinen sonst an vielen Körperstellen gut entwickelten und weitverbreiteten lymphadenoiden Gewebe letzteres fehlt, schließt H. sich auf Grund seiner Befunde an. Nicht dagegen geht das Ergebnis der Untersuchungen konform mit der von Trautmann getroffenen Feststellung, daß am reichlichsten die Schilddrüse des Rindes lymphatische Gebilde enthält. Verf. fand in keinem einzigen seiner zahlreichen Schnitte auch nur die allergeringsten Spuren zytoblastischen Gewebes, und zwar bei tragenden Rindern, die in verschiedenen Altersstadien waren, kein zu hohes Alter befaßen und nicht etwa aus einem räumlich eng begrenzten Landstriche stammten, sondern aus dem gesamten Versorgungsgebiet Groß-Hamburgs eingeführt wurden (Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Nordhannover). Vielleicht verhalten sich die Rinder verschiedener Gegenden oder die Rassen in dieser Hinsicht different. Da es sich bei den Untersuchungen H's. ausnahmslos um Tieflandrassen handelte, kann keine Entscheidung darüber gefällt werden, ob Exemplare der Höhengschläge nicht andere Ergebnisse liefern würden. Die Angaben Arnolds über das histologische Verhalten der Schilddrüse in den verschiedenen Altersstadien wurde im großen und ganzen durch vorliegende Untersuchungen bestätigt. A.

Treffers, W.: Vergiftiging met Chenopodii bij Honden. (Vergiftiging mit Ol. Chenopodii bei Hunden.) (Nederlandisch-Indische Bladen voor Diergeneeskunde Deel XXXIX, 6. aflev., S. 448—449.)

Der Besitzer eines etwa acht Monate alten Schäferhundes hatte von einem Drogisten Kapseln bezogen, die unter dem Namen „Gelogen“ in den Handel kamen und anscheinend

Ol. chenopodii enthielten. Er verabreichte seinem Hunde dreimal 20 Tropfen und einige Stunden darauf Ol. Ricini, das aber wieder ausgebrochen wurde. Bei der Untersuchung des Hundes durch den Verfasser erschien die Temperatur normal, das Tier war aber stumpfsinnig und schwerhörig. Es wurden einige Pulver aus Sal. Carolin, verstärkt durch Natr. sulfuric. verabreicht und zwei Tage lang Milchdiät verordnet. Darauf war der Hund gesund, aber stocktaub. In einem zweiten Falle behandelte der Verfasser ein Hündchen, Foxkreuzung, wegen Magenkatarrh. Als der Hund zwei Tage lang Sal. Carolin erhalten hatte, war das Tierchen gesund, aber stocktaub. Als Verfasser dem Besitzer auf den Kopf zusagte, er müsse eine Wurmkur vorgenommen haben, gab er dies zu.

[Die Besitzer können nicht genug gewarnt werden, auf eigene Hand Wurmkuren vorzunehmen, und auch wir Tierärzte sollten uns hüten, Wurmkapseln anzuwenden, wenn wir nicht die genaue Dosierung kennen. (Der Ref.)]

Bass.

Hjarre, A.: Över hyperkolesterinämi hos nötkreaturen under laktationsperioden och dess förhållande till acetonämien. (Über Hypercholesterinämie beim Rindvieh während der Laktationsperiode und ihre Beziehung zur Azetonämie). (Vorläufige Mitteilung.) (Svensk Veterinär-tidskrift 33. Arg. 1928, Häft 3, S. 63—69 und Häft 4, S. 99—106.)

Die Lipide stimmen in vieler Hinsicht mit dem Neutralfett überein, sind aber im Gegensatz zu ihm mehr durch ihre physikalischen Eigenschaften, nicht dadurch, daß sie wie das Neutralfett Wärme und Energie für den Organismus liefern, wichtig. Unter ihnen ist besonders zu erwähnen das Cholesterin, das bald in allen Zellen und in der Gehirnschicht vorkommt. Eine besondere Bedeutung besitzt es für den Auf- und Abbau des Fettes und für dessen Umwandlung in Zucker und ist beteiligt beim intermediären Fettumsatz. Es ist ein ständiger Bestandteil des animalischen Fettes. Mit der Nahrung zugeführt tritt es nach der Resorption im Blute hauptsächlich in Gestalt der Cholesterinester auf. Der Gesamtgehalt des Blutplasmas an Cholesterin beträgt bei nicht trächtigen, trockenstehenden Tieren in der Regel 0,10—0,15 Prozent und derjenigen an Cholesterinestern 0,06—0,10 Prozent. Zur Zeit des Partus ist der Cholesteringehalt im Plasma ungefähr normal oder erst etwas gesteigert, die nächsten Tage nach dem Partus sinkt er etwas, beginnt aber dann recht bald bemerkenswert zu steigen. Nach etwa einem Monat oder etwas länger beträgt er das Doppelte oder Dreifache des niedrigsten Wertes nach dem Partus. Etwa zwei Monate hält sich der Cholesteringehalt besonders hoch und sinkt dann langsam gegen das nächste Kalben. Ungefähr 14 Tage vor dem Partus steigt er etwas, um dann unmittelbar vor und nach der Entbindung wieder abzunehmen. Bei relativ besseren Milchtieren steigt sich der Cholesteringehalt anscheinend früher nach dem Partus und erreicht auch höhere Werte als bei Kühen von schlechterer Milchleistung. Das Gleiche trifft für die Cholesterinester und das Lezithin zu. Die starke Hypercholesterinämie nach dem Partus ist darauf zurückzuführen, daß die Cholesterinester gesteigert sind, die Menge freien Cholesterins bleibt ziemlich konstant. Die Hypercholesterinämie während der Laktationsperiode allein durch eine stärkere Zufuhr von Cholesterin mit dem Futter zu erklären, also als alimentäre Hypercholesterinämie anzusprechen, ist nicht möglich. Das mit der Nahrung zugeführte Cholesterin tritt nach erfolgter Resorption im Blute hauptsächlich in Gestalt der Fettsäureester auf. Bis zu einem gewissen Grade ist nämlich der Körper von der alimentären Cholesterinzufuhr unabhängig.

Die Menge des Cholesterins steht mit der Laktation in engem Zusammenhang. Während der stärksten Milchproduktion steigt sie und hält sich hoch, gegen die Zeit des Trockenstehens sinkt sie. Bei guten Milchtieren erreicht das Cholesterin anscheinend einen relativ höheren Wert als bei

weniger guten Milchtieren. Gewöhnliche Kuhmilch enthält etwa 0,013 Prozent Gesamtcholesterin. Es gehen aber bei einer Milchleistung von 10 Litern pro Tag dem Organismus allein mit der Milch täglich 1,3 Gramm Cholesterin verloren, und trotzdem findet sich während der Zeit, in welcher die Milchproduktion am stärksten ist, eine Hypercholesterinämie. Das dies allein mit der Bildung des Milchfettes im Zusammenhang steht, wie angenommen werden könnte, ist nicht möglich. Eher dürfte die Bildung des Milchzuckers den Lipidgehalt des Blutes während der Laktationsperiode beeinflussen. Die Laktose entsteht ja im Euter durch Umwandlung der Glykose, die mit dem Blute zugeführt wird. Die mit der Milch dem Organismus bei hochmilchenden Kühen entzogenen Mengen Zucker sind beträchtlich, z. B. bei einer Milchmenge von 20 Litern pro Tag und 4 Prozent Zucker in der Milch täglich 800 Gramm. Darunter leidet natürlich der Vorrat der Leber an Glykogen und bei weniger günstiger Fütterung kann es an Glykogen fehlen. Eine glykogenarme Leber zwingt aber den Organismus, das Fett zu mobilisieren, um es behufs Verarbeitung zu Zucker in den Leberzellen anzuhäufen, mit anderen Worten den Abbau des Fettes zu steigern. Dieser erfolgt über Lezithin und besteht in einer Spaltung der Triglyzeride in Diglyzeride und Fettsäuren. Die Fettsäuren vereinigen sich mit Cholesterin zu Cholesterinestern und die Diglyzeride mit einem Cholinphosphat zu Lezithin. Die Cholesterinradikale in den Cholesterinestern werden gegen Cholesterin ausgetauscht, und dadurch entstehen wieder Triglyzeride und freies Cholesterin. Die Spaltung der Cholesterinester erfolgt in der Leber unter der Einwirkung eines esterfälschenden Fermentes. Beim Abbau der Fettsäuren spielt die Leber eine sehr wichtige Rolle. Während der Puerperalperiode wird sie stark in Anspruch genommen. Es werden von ihr zum Teil die Eiweißstoffe abgebaut, um bei der Uterusinvolution Verwendung zu finden, der Vorrat an Glykogen nimmt bei stärkerer Milchsekretion erheblich ab. Infolgedessen kann besonders im ersten Stadium der Laktationsperiode die Oxydation der Fettsäuren sehr leicht gehemmt sein und dadurch können sich die Cholesterinester in der Blutbahn nach dem Partus stark anhäufen.

Auch die drei bis vier Wochen nach dem Partus bei guten Milchkühen nicht selten auftretende Azetonämie läßt sich auf diese Weise erklären. Bei ihr häufen sich die Ketonkörper im Blut und Harn abnorm an. Bei der Sektion fällt die starke Fettinfiltration der Leber und ihre Armut an Glykogen auf. Es besteht also bei der Azetonämie ein Mangel an Glykogen in der Leber und eine Hypercholesterinämie und Ketonurie.

Bei ungenügender Zufuhr von Kohlehydraten kann die Leber Zucker aus Stoffen bilden, die nicht Kohlehydrate sind. Ist der Vorrat an Glykogen erschöpft, wurden also andere Stoffe als Kohlehydrat zur Zuckerbildung verwendet, so beginnt die Fettwanderung zur Leber. In der Leber werden aber die Ketonkörper gebildet, und zwar besonders aus Fett, aber auch aus Eiweißstoffen. Die Ketonkörper entstehen also als Zwischenprodukte bei der Zuckerbildung aus Fett in der Leber. Steht nun die Bildung der Ketonkörper mit einer herabgesetzten Oxydation der Fettsäuren in Zusammenhang, so ist also auch für die Hypercholesterinämie und die Ketonurie dieselbe Ursache. Beide sind auf eine Störung im Kohlehydratumsatz zurückzuführen, die durch die starke Milchproduktion und die ungenügende Zufuhr von Kohlehydraten mit der Nahrung veranlaßt wird. Die Azetonämie ist also wie Ekelund richtig bemerkte, eine Laktationskrankheit. Sie kann geheilt werden durch Verabreichung leicht verdaulicher Kohlehydrate evtl. in Verbindung mit Injektionen von Glykose. Tierarzt Blomberg in Gambely will auch das Leiden durch Verfütterung größerer Mengen Zuckerschnitzel, Mohrrüben oder einem Brei aus Kartoffelmehl bei Kühen, die an Azetonämie erkrankt waren, beseitigt haben.

Baß.

Bolle, W.: Über die „subakute Leberatrophie“, ein Beitrag zur Lebertranfütterung der Jungschweine. (Aus dem Landestierseuchenamt Rostock. — Direktor: Prof. Dr. Pöppe.) (Arch. für wissensch. Tierheilkunde 1928, 57, S. 264.)

In Mecklenburg sind in den letzten Jahren in den Herbst- und Wintermonaten zahlreiche Ferkel im Alter von 10 bis 16 Wochen verendet unter den Erscheinungen einer wohl charakterisierten Lebererkrankung. Wie die eingehende pathologisch-anatomische und histologische Untersuchung ergab, handelt es sich um die subakut verlaufende gelbe und rote degenerative Leberatrophie, die sich durch streng lobuläre Gebundenheit, Vorherrschen von Degenerativnekrobiotischen Veränderungen und hämorrhagischen Charakter auszeichnete. Es ließ sich feststellen, daß alle erkrankten Ferkel mit zeretzter, ranziger Lebertranemulsion gefüttert worden waren. Geiger.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Kovacs, Eine vereinfachte Methode zum Nachweis der Indolbildung durch Bakterien. (Zschr. für Immunitätsforsch. 1928, Bd. 55, S. 311.)

Zum Nachweis von Indol wird ein Reagens in folgender Zusammensetzung empfohlen:

p-dimethylamidobenzaldehyd (Merck)	5 Gramm,
Amylalkohol purum	75 Gramm,
konz. HCL	25 Gramm.

Dieses Reagens gestattet die Ausführung der Reaktion mit großer Sicherheit auch in gewöhnlichen Bouillonkulturen. Veretzt man eine Bouillonkultur mit 25 bis 30 Tropfen des Reagens, so nimmt die überstehende Flüssigkeit nach mehrmaligem Schwenken im positiven Falle in einigen Minuten eine rotviolette Farbe an. Das Ablesen der Reaktion soll innerhalb einer Stunde vorgenommen werden. Meyn.

Hall, J. C. and Scott, J. P.: Bacillus Sordelli, a cause of malignant edema in man. (Journal of infect. diseases 1927, Bd. 41, S. 324.)

Verff. beschrieben einen anaeroben Bazillus, der die pathogenen Eigenschaften des Novy'schen Bazillus und die kulturellen des Bac. sporogenes vereinigt. Sie schlagen obigen Namen nach dem ersten Beschreiber vor. Schoop.

Jungherr, E.: A comparison of strains of B. chauvei from cattle and sheep. (Journal of infect. diseases 1928, Bd. 42, S. 84.)

Bei dem Vergleich von Schafräudebrandstämmen amerikanischen Ursprungs mit bekannten Rinderräudebrandstämmen ergeben sich kulturell und biochemisch keine Unterschiede. Agglutinations- und Immunisierungsversuche ließen ebenfalls keine Differenzierungsmöglichkeiten erkennen. Schoop.

Nahrungsmittelhygiene.

Unterlassung der bakteriologischen Fleischbeschau.

Reichsgerichtsentscheidung wegen Zuwiderhandlung gegen das Fleischbeschaugesetz vom 26. März 1928.

(2 D 1110 27. IX 1455, zu V 5720/28 MfL.)

Nach § 1 des Reichsgesetzes vom 3. Juni 1900, betr. die Schlachtvieh- und Fleischbeschau, unterliegt Rindvieh vor und nach der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung. Die Untersuchung vor der Schlachtung darf bei Notchlachtungen unterbleiben. Wer Fleisch in Verkehr bringt, bevor es der in diesem Gesetze vorgeschriebenen Untersuchung unterworfen worden ist, wird gemäß § 27, Nr. 3, des Gesetzes bestraft. Vorgeschrieben ist in § 8 Abs. 1 des Gesetzes: „Ergibt die Untersuchung nach der Schlachtung, daß kein Grund zur Beanstandung des Fleisches vorliegt, so hat der Beschauer es als tauglich zum Genuß für Menschen zu erklären.“ Daraus geht hervor, daß er es nicht als zum Genuß für Menschen tauglich erklären darf, wenn ein Grund zur Beanstandung des Fleisches vorliegt. Nicht beanstandetes Fleisch, das bei vorschriftsmäßiger

Untersuchung hätte beanstandet werden müssen, ist daher nicht einer Untersuchung unterworfen worden, wie das Gesetz sie vorschreibt. Die Frage, ob der Angeklagte fahrlässigerweise solches Fleisch in Verkehr gebracht hat, hat die Strafkammer bejaht. Ein fahrlässiges Verhalten findet sie darin, daß er die bei der Schlachtung der Kuh beteiligten Personen nicht nach den letzten Krankheitsercheinungen gefragt und vor der Freigabe des Fleisches nicht dessen bakteriologische Untersuchung angeordnet hat, die bei dem Verdacht einer Blutvergiftung oder einer anderen Erkrankung, bei der das Vorhandensein von Erregern der Fleischvergiftung nach Lage des Falles zu vermuten war, gemäß der dem Angeklagten bekannten Verordnung des Reichsministers des Innern vom 10. August 1922 über die Abänderung der Ausführungsbestimmungen zum Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetz erforderlich gewesen wäre. Den Begriff der Fahrlässigkeit hat die Strafkammer nicht verkannt, da ihre Ausführungen zweifelsfrei ergeben, daß der Angeklagte bei Anwendung der den Umständen nach gebotenen und ihm möglichen Sorgfalt die Notwendigkeit einer bakteriologischen Untersuchung des Fleisches erkennen mußte. Die Vorschrift des § 27, Nr. 3, des angeführten Gesetzes will die Gefahren abwenden, welche durch ein, wie immer geartetes Inverkehrbringen genußuntauglichen Fleisches für die menschliche Gesundheit entstehen können (vergl. auch RGSt., Bd. 3, S. 120 ff.; Bd. 7, S. 153; Bd. 16, S. 191). Sie richtet sich daher, wie die Strafkammer mit zutreffender Begründung darlegt, nicht lediglich gegen die Händler. Täter der strafbaren Handlung kann vielmehr auch der Beschauer sein, der durch fahrlässige Freigabe des von ihm zu untersuchenden Fleisches dessen Inverkehrgelangen veranlaßt. Da es von seiner pflichtmäßigen Entschließung abhängt, ob das seiner Untersuchung anvertraute Fleisch gemäß §§ 9, 10 des Gesetzes beschlagnahmt und dadurch dem freien Verkehr entzogen oder aber ob es für diesen Verkehr freigegeben wird, ist er in ganz besonderem Maße dafür verantwortlich, daß der von dem Gesetze verpönte Erfolg des Inverkehrgelangens genußuntauglichen Fleisches an die Verbraucher nicht durch sein pflichtwidriges Handeln oder Unterlassen bei Vorahme der amtlichen Untersuchung herbeigeführt wird. Da der Angeklagte auch sonst durch die Gesetzesanwendung nicht beschwert ist, war seine Revision, wie geschehen, als unbegründet zu verwerfen.

Lehr, E.: Über das Vorkommen von echten Paratyphus B-Schottmüller-Bazillen bei Tieren. (Aus dem Staatl. Veterinär-Untersuchungsamt in Potsdam.) (C. f. B. 1928, I. Abt., Orig., S. 69–83.)

Durch Arbeiten der Kieler Schule (Bitter u. a.) wurde in den letzten Jahren nachgewiesen, daß der Erreger des menschlichen Paratyphus (Bac. paratyphi B Schottmüller) von dem Fleischvergiftungen hervorrufenden Paratyphuskeim (Bac. enteritidis Breslau) streng zu trennen sei. Die Frage von dem Vorkommen der beiden Krankheitserreger im Tierreich wurde dahin entschieden, daß der B. paratyphi B Schottmüller ausschließlich beim Menschen vorkäme, während der Bac. enteritidis Breslau sowohl beim Menschen wie bei Tieren Krankheitsercheinungen hervorrufen könne. Dieser Auffassung pflichteten viele Autoren bei. Es fehlte jedoch nicht an Stimmen, die sich für das Vorkommen des Schottmüller-Bazillus auch bei Tieren aussprachen (Jordan 1825, Uhlenhuth und Seiffert 1926).

Die vorliegende Arbeit liefert ebenfalls einen Beitrag zu dem vorliegenden Thema, und zwar konnte Verf. den Nachweis führen, daß auch im Tierkörper der Bac. paratyphi Schottmüller anzutreffen ist. Bei zwei notgeschlachteten Pferden wurden bei der bakteriologischen Fleischuntersuchung Bakterien nachgewiesen, die sich unter Anwendung aller verfügbaren Untersuchungsverfahren, insbesondere auch des Abfärbungsversuchs, eindeutig als Paratyphus B-Schottmüller-Keime bestimmen ließen. Ob ihnen eine ursächliche Bedeutung an der von dem einsendenden Tierarzte als Kolik bezeichneten Erkrankung der Pferde beizumessen ist, muß zum mindesten in Zweifel gezogen werden. Andererseits erscheint nach Würdigung aller Umstände auch eine nachträgliche Verunreinigung des Tierkörpers oder der Proben nicht wahrscheinlich. Das Nächstliegende dürfte mithin sein, daß die Keime unter dem Einfluß der schweren

Erkrankung von dem schwer geschädigten Darms aus in den Organismus eingewandert sind. Das Vorkommen des Schottmüller-Bazillus scheint jedoch bei Tieren nicht sehr häufig zu sein. Im Veterinäruntersuchungsamt Potsdam wurden in den Jahren 1921—1927 Proben von mehr als 7500 notgeschlachteten Tieren einer bakteriologischen Untersuchung unterzogen. Hierbei konnten in 152 Fällen Erreger der Paratyphus-Enteritis-Gruppe ermittelt werden. Unter diesen war aber nur zweimal der Bac. paratyphi B-Schottmüller nachweisbar. Carl.

Lehr, E.: Ein Beitrag zur Arbeitsweise bei der Untersuchung von verdächtigen Fleischwaren bei Fleischvergiftungen. (Aus dem Staatlichen Veterinär-Untersuchungsamt Potsdam.) (B. T. W. 1828, S. 90.)

Nach der von Klimmek veröffentlichten Statistik für die Jahre 1924—1926 war es in 38 von 176 Fällen von beim Menschen bakteriologisch nachgewiesener Fleischvergiftung nicht möglich, in den verzehrten und verdächtigen Lebensmitteln Krankheitserreger nachzuweisen. Da nun in solchen Fällen die Möglichkeit besteht, daß die zur Untersuchung eingeschickten Fleischproben an der Außenfläche mit dem Erreger behaftet sind, so ist es erforderlich, unter entsprechender Vorsicht auch Material von letzterer Stelle behufs Untersuchung zu entnehmen. Verf. ist in der Lage zwei Fleischvergiftungsfälle mitzuteilen, bei denen der Breslau-Bazillus nur an der Oberfläche der eingeschickten Fleisch- und Wurstproben nachweisbar war. Carl.

Katzke: Tuberkulose des Spatium retromucosum der Trachea beim Rinde. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jhg., S. 298—301.)

Da über die Lokalisation der Tuberkulose im Spatium retromucosum der Trachea des Rindes keine kasuistischen Mitteilungen in der tierärztlichen Literatur vorliegen, hat Katzke drei Fälle dieser Erkrankung untersucht und zieht aus seinen Untersuchungen folgende Schlußfolgerungen:

1. Beim Rinde findet sich neben der tuberkulösen Erkrankung der Lunge anscheinend gar nicht so selten eine solche des Spatiums retromucosum.

2. Die tuberkulöse Erkrankung des Sp. retrom. steht in keinem graduellen Verhältnis zur tuberkulösen Erkrankung des ganzen Organismus.

3. Infolge des anatomischen Baues des Sp. retrom. nehmen die tuberkulösen Abszesse beim Rinde eine alltägliche Form an.

4. Es ist noch unentschieden, von welchem Grundgewebe die tuberkulösen Veränderungen im Sp. retrom. ihren Ausgang nehmen.

Ein Literaturverzeichnis von 19 Nummern ist der interessanten Arbeit beigelegt. Edelmann.

Engler, E.: Bemerkungen zur Abhandlung: Vorwiegen des Auftreten von Sekretionsstörungen im linken Schenkelviertel von Dr. F. E. Nottbohm. (Zeitschr. für Fleisch- u. Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 304.)

An der Hand des Materials, das die durch staatl. Polizeitierärzte ausgeübte Kontrolle der Berliner Abmelkwirtschaften liefert, bestätigt Engler die Feststellungen Nottboms hinsichtlich der häufigeren Erkrankung der beiden Schenkelviertel gegenüber den beiden Bauchvierteln mit dem Unterschiede, daß nach dem Berliner Material das rechte Schenkelviertel häufiger zu Entzündungen neigt als das linke. Edelmann.

Lindner, W.: Untersuchungen über den Vitamin-B-Gehalt verschiedener Brotgebäcke. (In.-Diss. Leipzig 1927.)

Sämtliche zehn untersuchten Brote und Gebäcke enthalten Vitamin B. Der Vitamin-B-Gehalt ist am höchsten bei den unter dem Namen „Vollkornbrot“ in den Handel gebrachten Brotarten (Roggen-, Graham-), sowie Kommiß- und dem üblichen Bäckerroggenbrot, am niedrigsten bei den Weizengebäcken aus feinstausgemahlenem

Mehl. — Nach den angestellten Versuchen würden die Brote nach ihrem Vitamin-B-Gehalt wie folgt rangieren: 1. Steinmetz-Graham-Brot; 2. Bäckerroggenbrot; 3. Kommißbrot; 4. Thalsia-Grahambrot; 5. Klopferroggenbrot; 6. Steinmetzkraftbrot; 7. Milchbrötchen; 8. Wasserfemmel; 9. Simonsbrot; 10. Krankenweißbrot. Ein Unterschied zwischen den aus hochprozentig ausgemahlenen Mehlen (94 Prozent) hergestellten Weizen- und Roggenbroten ist nicht zu konstatieren. Die Vitamin-B-Menge in der Brotzugabe von einem Gramm der ersten vier Brote genügt, um nicht nur die Tiere (Ratten) auf dem Anfangsgewicht zu erhalten, sondern ihnen auch ein relativ günstiges, jedoch verzögertes Wachstum zu gewähren, während letztere Wirkung bei den übrigen Broten (mit geringer Ausnahme) erst bei 2 Gramm Brotzulage erreicht werden konnte. — Ein optimales Wachstum wurde in keinem Falle erreicht. Dadurch stellen sich diese Ergebnisse in einen gewissen Gegensatz zu den Befunden des Vorarbeiters Hahn, der nur von einer Erhaltung des Anfangsgewichtes sprechen konnte. Die von ihm gefundenen geringen Vitamin-B-Werte lassen sich durch die in der damaligen Zeit nötige Streckung der Brote mit weniger wertvollen Nährmitteln erklären. Es wäre durchaus nicht unmöglich, daß, wenn unsere Umrechnung eine gewisse Gültigkeit haben kann, ein erwachsener Mensch bei einem täglichen Brotkonsum von 750 Gramm eines vollwertigen Brotes und guter Ausnutzungsfähigkeit den Hauptbedarf an Vitamin-B aus der aufgenommenen Brotmenge decken kann. Für den wachsenden Organismus (Kind) wäre allerdings diese Vitaminmenge noch nicht ausreichend. Die in diesem Vorversuch gewonnenen Ergebnisse decken sich im großen ganzen mit denen unserer umfangreichen anderen Brot- und Mehluntersuchungen. A.

Standesangelegenheiten.

Deutscher Veterinärrat.

Am 22. Juli tagte der Arbeitsausschuß für das Lebensmittelgesetz in Berlin. Er hat die Grundzüge für eine Denkschrift beschlossen, welche den zuständigen Behörden zugehen soll, damit in den Ausführungsbestimmungen zum Lebensmittelgesetz die berechtigten Forderungen der Tierärzte volle Berücksichtigung finden. DVR.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Prof. Dr. Zietzschmann, Direktor des Anatomischen Instituts der Tierärztlichen Hochschule Hannover ist zum Mitgliede der Kaiserlich Deutschen Akademie der Naturforscher in Halle ernannt worden.

Ernennungsurkunde:

NUNQUAM OTIOSUS.

Die im Jahre 1652 gegründete und im Jahre 1677 durch den Kaiser Leopold I. als Academie des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bestätigte Kaiserl. Deutsche Academie der Naturforscher zu Halle ernannt hierdurch Herrn Prof. Dr. Zietzschmann, Hannover, in Anerkennung seiner ausgezeichneten Leistungen zu ihrem Mitgliede und ladet ihn zur Mitarbeit an der seit drei Jahrhunderten gestellten hohen Aufgabe: Die Natur zu erforschen zum Segen der Menschheit.

Halle, am 19. Juli 1928.

Der Präsident der Academie.

gez. Johannes Walther.

Einweihung der Gedenktafel für Herrn Geheimrat Frick in der Operationshalle der Chirurgischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover am 28. Juli 1928.

Auf Wunsch des Herrn Geheimrat Frick erfolgte die Enthüllung der Gedenktafel nur im allerkleinsten Kreise in Gegenwart der Ordinarien und Extraordinarien, der Mitglieder der Chirurgischen Klinik sowie je eines Vertreters der Assistenten- und Studentenschaft. Die

von der Hochschule geplante feierliche Schlußvorlesung, ebenso wie ein von der Studentenschaft angebotener Fackelzug zu Ehren des Auscheidenden, war seitens des Herrn Geheimrats Frick abgelehnt worden. Magnifizenz Mießner eröffnete die interne Feier mit folgenden Worten:

Sehr geehrter Herr Geheimrat! Auf Ihren speziellen Wunsch hat sich am heutigen Tage nur eine kleine Gemeinde um Sie versammelt, um Ihrer an Ihrer alten Wirkungsstätte, an der Sie über ein Menschenalter hindurch tätig gewesen sind, besonders zu gedenken. Sie haben frühzeitig Neigung zu wissenschaftlichen Arbeiten gezeigt. Sofort nach Beendigung des Studiums und der Militärdienstpflicht im Jahre 1884 übernahmen Sie die Assistentenstelle bei dem heute noch lebenden Senior der deutschen Tierärzteschaft, Prof. Dr. Heinrich Möller, an der Berliner Hochschule. Sie legten dort den Grund zu Ihrer weiteren akademischen Entwicklung und als Sie im Jahre 1886 eine Kreistierarztstelle im Mansfelder Bezirk erhielten, widmeten Sie sich trotz umfangreicher Praxis und starker dienstlicher Inanspruchnahme weiterhin wissenschaftlichen und experimentellen Arbeiten. Ihr Name wurde dadurch mehr und mehr bekannt. Für das im Jahre 1896 neu geschaffene Ordinariat für Chirurgie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover kamen infolgedessen nur Sie in Frage. Seit jener Zeit sind Sie ohne Unterbrechung an unserer Hochschule tätig gewesen. Mit unermüdlichem Fleiße haben Sie an der Ausbildung der Studierenden Jugend gearbeitet. Sie wollte ihre Verehrung und Dankbarkeit zu ihrem alten Lehrer durch Veranstaltung eines Fackelzuges vor wenigen Tagen bekunden. Nie wurde es Ihnen zuviel, wenn die praktischen Tierärzte Ihren Rat beanspruchten. In Anerkennung Ihrer Verdienste sind Sie infolgedessen auch Ehrenmitglied verschiedener tierärztlicher Vereine geworden. Auf dem Gebiete der Veterinärchirurgie nehmen Sie eine führende Stelle ein. Hervorragende chirurgische Werke legen beredtes Zeugnis ab von Ihrer großen Arbeitskraft und schreiben den Namen Frick unauslöschlich in die Geschichte der Veterinärchirurgie. Aber auch als Kollegialmitglied waren Sie uns stets ein willkommener Freund und Berater. Unentwegt haben Sie in den verfloßenen 32 Jahren an dem Ausbau der Tierärztlichen Hochschule Hannover mit größtem Interesse mitgearbeitet. Ebenso bot Ihr eigenes Heim an der Seite Ihrer hochverehrten Frau Gemahlin und Ihrer Kinder ein stets gastfreies Haus. Die Familie Frick ist wohl eine derjenigen gewesen, welche in hervorragender Weise immer für einen gefelligen Zusammenhang der Kollegschaft eingetreten ist. Auch dafür sei Ihnen, insbesondere Ihrer verehrten Frau Gemahlin, der beste Dank zum Ausdruck gebracht.

Der heutige Tag Ihrer Entpflichtung ist für uns trotzdem kein Tag der Kummernis. Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft und haben die feste Überzeugung, daß Sie die wohlverdiente Muße benutzen werden zur Wiederherstellung Ihres infolge Überarbeitung etwas geschädigten Gesundheitszustandes und hoffen, Sie bald in alter Frische im Kollegenkreise wieder begrüßen zu dürfen, um uns mit Ihrem wertvollen Rat zu unterstützen.

Als Zeichen der Anerkennung und Verehrung glaubte das Kollegium Ihre Verdienste nicht besser nach außen hin bekunden zu können als durch Anbringung einer Gedenktafel an der Ihnen so lieb gewordenen Arbeitsstätte. Sie soll künftigen Generationen verkünden, daß ein Meister hier gewirkt und sie zu gleichem Pflichtbewußtsein und unermüdlicher Arbeitssamkeit anspornen. In diesem Sinne übergebe ich die Gedenktafel der Hochschule insbesondere der Chirurgischen Klinik zur dauernden pfleglichen Behandlung. Ihnen, verehrter Herr Geheimrat, rufe ich in dieser Stunde nicht ein Lebewohl, sondern ein frohes und gefundes Wiedersehen zu Beginn des neuen Semesters zu.

Im Namen der Studentenschaft dankte cand. med. vet. Barth unter Überreichung eines kostbaren Blumenstraußes mit folgenden Worten:

Die Beendigung Ihrer Lehrtätigkeit an der Hochschule erfüllt die Studentenschaft mit tiefer Trauer. Sie verliert in Ihnen einen ihrer ältesten und beliebtesten Dozenten, einen Freund der Studentenschaft, einen Mann, der stets für unsere jugendlichen Torheiten volles Verständnis gezeigt hat. Mit derselben Ehrfurcht und Dankbarkeit, mit der die Alten, die längst im Leben stehen, von Ihnen sprechen, danken wir Ihnen, sehr geehrter Herr Geheimrat, die jüngste Generation, die die Ehre hatte, Ihre Vorlesungen zu hören und die in der Klinik Ihre chirurgischen Meisterstücke bewundern durfte, für die Mühe und Arbeit, die Sie an uns angewandt, um uns zu tüchtigen Chirurgen zu

erziehen. Die Studentenschaft wünscht Ihnen baldige, völlige Wiederherstellung, damit Ihre wertvolle Arbeitskraft noch recht lange dem Stande erhalten bleibt.

Hierauf ergriff Geheimrat Frick das Wort:

Ew. Magnifizenz! — Sehr geehrte Herren Kollegen!

Liebe Kommilitonen!

Wenn ich auf die anerkennenden und mich hochehrenden Worte, welche Seine Magnifizenz und der Herr Vertreter der Studentenschaft unserer Hochschule mir soeben gewidmet haben, nicht in dem Umfang antworte, wie ich es selbst wünsche, so bitte ich dies mit meinem mangelhaften Gesundheitszustand zu entschuldigen, der mich zwingt, mich nach jeder Richtung hin zu schonen. Ich danke Ew. Magnifizenz für die vom Herzen kommenden und zum Herzen gehenden Worte, die Sie zugleich namens des Kollegiums mir gewidmet hatten; ebenso zu tiefem Danke verpflichtet bin ich dem Herrn Vertreter der Studentenschaft, der mein Scheiden von dieser Stelle durch seine anerkennenden Worte und durch das wundervolle Blumenarrangement zum Ausdruck gebracht hat. In kurzem werden es 32 Jahre, daß ich an dieser Stelle gestanden und verweilt habe, die Studierenden in die Geheimnisse der Chirurgie praktisch und theoretisch einzuweihen. Ich scheide von dieser Stelle mit dem Wunsche, daß mein Nachfolger das von mir geschaffene Werk in demselben Sinne und im selben Geiste und mit derselben Hingabe und Aufopferung wie ich es getan, weiterführen möge. — Die Tafel, welche Sie zum Andenken an meine 32jährige Tätigkeit hier aufgehängt haben, wird mir jedesmal, wenn ich die Klinik besuche, eine besondere Ehrung bedeuten und zugleich für meinen Nachfolger und die Studentenschaft eine Mahnung zu treuester Plichterfüllung sein. In diesem Sinne scheide ich.

Zur Emeritierung von Geheimrat Prof. Dr. Frick.*)

Karl Albert Hermann Frick wurde am 14. August 1860 in Berlin geboren. Nach Absolvierung des Friedrichs-Realgymnasiums zu Berlin wurde er Ostern 1879 an der dortigen tierärztlichen Hochschule immatrikuliert. Die tierärztliche Fachprüfung bestand er Ostern 1883. Nach kurzer praktischer Tätigkeit trat er im Oktober desselben Jahres als Einjährig-Freiwilliger in das 2. Gardefeldartillerie-Regiment zu Berlin ein und wurde am 1. April 1884 zum Unteroffizier, 1889 zum Roßarzt und 1890 zum Oberroßarzt des Beurlaubtenstandes befördert. Nach seiner Entlassung vom Militär wurde Frick am 1. Oktober 1884 Assistent am Hundespital der Berliner Tierärztlichen Hochschule bei Prof. Dr. Möller und als am 1. Oktober 1885 die Pferdeklunik an der Berliner Tierärztlichen Hochschule geteilt und Möller die Leitung der chirurgischen Abteilung übertragen wurde, siedelte Frick mit seinem Chef nach der neuen chirurgischen Klinik über. Für die Entwicklung des jungen Chirurgen ist in diesen Jahren der Umstand bestimmend geworden, daß Möller seinem Assistenten eine außerordentliche Selbständigkeit einräumte und ihn frühzeitig zum selbständigen, chirurgischen Arbeiten erzog. Nicht nur in chirurgischen, sondern auch in Hufbeschlagsfragen hat Frick dadurch frühzeitig eine Rolle gespielt. Nachdem er Ostern 1886 die kreistierärztliche Prüfung bestanden hatte, wurde er mit der kreistierärztlichen Verwaltung des Mansfelder Gebirgskreises, welcher durch die Trichinenepidemie bekannt geworden war, beauftragt. Diesen Kreis hat Frick von 1886 bis 1896 innegehabt. Er hat hier reichlich Gelegenheit genommen, sich nicht nur veterinärchirurgisch und im Hufbeschlage weiter auszubilden, sondern hat auch mit der Humanmedizin im dortigen Krankenhause enge wissenschaftliche Fühlung genommen. Unerföpflich war in ihm der Drang zum wissenschaftlichen Arbeiten. Eine große Anzahl seiner wissenschaftlichen Publikationen entstammen jener Zeit seiner kreistierärztlichen Tätigkeit. Die wichtigsten sind: „Anwendung der Magenpumpe bei Hunden“, „Operationen am Ösophagus des Hundes“, „Die operative Behandlung der Hufknorpelfistel“, „Kastration unter antiseptischen Kautelen“, „Die Universalzange von Frick und Hauptner“, „Über die Stellung der Zähne beim Pferde und deren Extraktion“, „Über Brennmethode und deren Wert für die Chirurgie“, „Die Neurektomie mit Rücksicht auf ihre Indikationen und Kontraindikationen“ u. a. An dem tierärztlichen und landwirtschaftlichen Vereinsleben nahm Frick durch seine Vortragstätigkeit lebhaften Anteil. Auch dieses hat mit zur Vorbereitung für seine spätere Lehrtätig-

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 30, S. 521.

keit beigetragen. Im Oktober 1896 wurde der durch seine chirurgisch-wissenschaftliche und praktische Tätigkeit bekannt gewordene Kreistierarzt Frick als Dozent für allgemeine und spezielle Chirurgie und Akiurgie an die Tierärztliche Hochschule in Hannover berufen, wo er gleichzeitig die Operationsübungen, die ophthalmoskopischen Übungen und, da sich eine Teilung der Pferdeklunik in der alten Hochschule nicht als tunlich erwies, bis 1899 die Leitung des Hundespitals übernahm. Am 19. Oktober 1898 wurde ihm „in Rücksicht seiner anerkannt wertvollen Leistungen“ das Prädikat Professor verliehen. Als im Oktober 1898 die neue Hochschule am Misburger Damm bezogen wurde, übernahm Frick die Leitung der chirurgischen Klinik. Gleichzeitig wurde sein Vorlesungsgebiet durch die Theorie des Hufbeschlages und die Übungen am Hufe erweitert. Im Jahre 1906 erschien seine weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gewordene „Tierärztliche Operationslehre“ im Verlage von Richard Schoetz, welche bis 1922 die 5. Auflage erlebte und welche sich vor allem durch die klare Gliederung und die knappe, verständliche Beschreibung auszeichnete. 1899 übernahm Frick die Bearbeitung von „Möllers Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie“ für Tierärzte und „Möllers Lehrbuch der speziellen Chirurgie“ für Tierärzte. Beide Bände haben bereits die 6. Auflage erlebt, welches zur Genüge für die hervorragenden Eigenschaften dieser allbekannten Lehrbücher spricht. Auch in der Zeit von 1899 bis zur Gegenwart liegt eine große Anzahl (61) wissenschaftlicher Originalarbeiten vor: Über Lokalanästhesie, über Allgemeinnarkose, über Kastrationen, über Hufbeschlag, und vor allen Dingen über moderne Wundbehandlung. Gerade in Bezug auf die Bearbeitung des letzteren Themas hat sich Frick einen Namen gemacht. Ebenso reich wie die Laufbahn Fricks an Arbeit gewesen ist, so reich ist sie auch an Erfolgen und Ehrungen gewesen. Am 18. Januar 1910 wurde er mit dem roten Adlerorden IV. Klasse ausgezeichnet. Am 27. Januar 1914 erhielt er die Würde eines Dr. med. vet. h. c. von der durch das Professorenkollegium der Tierärztlichen Hochschule zu Dresden verstärkten medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. 1915 wurde ihm der Charakter als Geheimer Regierungsrat verliehen. Für die Zeit vom 27. Januar 1916 bis zum 27. Januar 1919 wurde Frick zum Rektor der Tierärztlichen Hochschule in Hannover gewählt. 1917 wurde er durch die Verleihung des Verdienstkreuzes für Kriegshilfe und 1919 durch das eiserne Kreuz II. Klasse am weiß-schwarzen Bande belohnt. Der Verein finnischer Tierärzte und die tierärztlichen Vereine für die Provinz Sachsen und die Anhaltinischen Staaten und der tierärztliche Generalverein des Bezirks Niederfachsen ehrten ihn durch die Ernennung zum Ehrenmitgliede.

Ein weiter, ruhmvoller und arbeitsreicher Weg! — Möge die veterinärmedizinische Wissenschaft und der tierärztliche Stand stets der hohen Verdienste dieses erfolgreichen und unermüdeten Gelehrten und großen Menschen eingedenk bleiben. Unserem hochverehrten Herrn Geheimrat aber wünschen wir alle von Herzen, daß er noch lange Zeit seine reiche, stets aus dem Vollen schöpfende Erfahrung in den Dienst der Veterinärmedizin stellen könne, sich gleichzeitig aber auch noch viele Jahre der so schwer verdienten Ruhe erfreuen dürfe!

Henkels.

Verammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg.*)

Vortragsfolge in den tierärztlichen Abteilungen:

Dienstag, den 18. September 1928: Allgemeine Sitzung. Geheimrat von Ostertag: Die Bekämpfung der Tierseuchen.

Donnerstag, den 20. September 1928, 20 Uhr: Festabend der tierärztlichen Abteilungen im Hotel „Atlantic“.

Donnerstag, den 20. September 1928, 9—13 Uhr: Gemeinsame Tagung der Abteilungen 34 und 35.

1. Direktor Dr. Gerlach, Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling bei Wien: Immunität bei Tuberkulose. Sammelreferat. 2. Prof. Dr. Nöller, Berlin: Seuchenhafte parasitäre Erkrankungen. Sammelreferat. 3. Prof. Dr. Boehm, Institut für allgemeine Zoologie und Parasitenkunde der Tierärztlichen Hochschule Wien: Seuchenhafte Parasitenerkrankungen. 4. Dr. F. Schmid, Oberassistent des In-

stitut für Parasitenkunde der Tierärztlichen Hochschule Berlin: Die Lungenwurmflechte.

II. Vorträge für die Abteilung 34.

5. Prof. Dr. Zaribnicky, Institut für Milchhygiene, Nahrungs- und Futtermittelkunde der Tierärztlichen Hochschule Wien: Fütterungslehre und Futterfäulnisse. 6. Landwirtschaftsrat Dr. Stockklausner, Leiter des Institutes für praktische Tierzucht, Grub bei München: Fütterungsfragen in ihrer Beziehung zur Tierzucht. 7. Tierarzt Dr. Bolle, Landestierseuchenamt Rostock: Über Schädigungen bei Schweinen nach Lebertranfütterung. 8. Tierarzt Dr. Völker, Universitätspoliklinik Leipzig: Blutzuckerstudien an gefundenen und kranken Tieren. 9. Privatdozent Dr. med. vet. Gluschke, Assistent des Chemischen Institutes der Tierärztlichen Hochschule Berlin: Vergiftungen bei unseren Nutztieren und ihre forensisch-chemische Bearbeitung. 10. Prof. Dr. Richters, Heeresveterinär-Untersuchungsamt Berlin: Die neuesten Ergebnisse der Druseforschung und Drusebekämpfung. 11. Tierarzt Dr. Kallert, Hamburg: Strukturveränderungen des Muskelfleisches bei der Konservierung. 12. Privatdozent Dr. Seifried, Veterinärhygienisches und Tierseucheninstitut der Landesuniversität Gießen: Problem der spontanen und experimentellen Kaninchenencephalitis. 13. Dr. Kalbfleisch und Dr. Nohlen, Klinik für Kinderheilkunde Düsseldorf: Über „Spontan tuberkulose“ in Gefangenschaft gehaltener Affen und die Häufigkeit ihres Vorkommens. 14. Dr. Wagners, Oberassistent des Hygienischen Instituts der Tierärztlichen Hochschule Berlin: Stallhygiene. 15. Prof. Dr. Nöller, Berlin: Weidehygiene in ihren Beziehungen zur Stallhygiene mit besonderer Berücksichtigung der Vorbeugungsmaßnahmen gegen die parasitären Weidekrankheiten. 16. Dr. Foth, Oberregierungs- und Geheimer Veterinärarzt, Münster: Die Befestigung der Tierkadaver. 17. Dr. O. Wagner, Höchst: Experimentelle Untersuchungen über die Biologie des gemeinen Leberegels und seine Übertragung auf kleine Laboratoriumstiere. 18. Privatdozent Prof. Dr. Zeiß, Moskau, Dr. Emelin, Uralsk und Prof. Dr. Zeiß, Moskau: Fünfjährige Erfahrungen über die Behandlung der russischen Kameltrypanosomiasis Suauru mit Bayer 205. 19. Privatdozent Dr. Seifried und Schaaf, Veterinärhygienisches und Tierseucheninstitut der Landesuniversität Gießen: Über eine diphtherieähnliche Erkrankung bei Hühnern. 20. Dr. J. Fortner, Institut für Infektionskrankheiten „Robert Koch“ Berlin: Neuere Ergebnisse der Anaerobenzüchtung (mit Demonstrationen). 21. Prof. Dr. Bahr, Bakteriologisches Laboratorium, Ratin, Kopenhagen: Beitrag zur Diskussion der Artumwandlung der Paratyphus-Enteritisbazillen. 22. Dr. Standfuß, Staatliches Veterinär-Untersuchungsamt Potsdam: Übergangsstämme aus der Coli-Typhusgruppe. 23. Dr. Knöth, Landestierseuchenamt Rostock: Über das Vorkommen von Fleischvergiftungsbakterien im Darminhalt notgeschlachteter Tiere.

Die Einteilung der Vorträge auf die einzelnen Tage in Abteilung 34 ist wie folgt gedacht:

Dienstag, den 18. September 1928, 15—18 Uhr: Vorträge Nr. 5—8.

Donnerstag, den 20. September 1928, 15—18 Uhr: Vorträge Nr. 9—13.

Freitag, den 21. September 1928, 9—13 Uhr: Vorträge Nr. 14—19.

Freitag, den 21. September 1928, 15—17 Uhr: Vorträge Nr. 20—23.

III. Vorträge für die Abteilung 35.

1. Prof. Dr. Benesch, Geburtshilfliche Klinik der Tierärztlichen Hochschule Wien: Zeitgemäße operative Geburtshilfeleistung bei Großtieren. 2. Prof. Dr. Benesch: Zeitgemäße operative Geburtshilfeleistung bei Kleintieren. 3. Regierungsrat Dr. Helm und Dr. Zühd, Veterinär-Abteilung des Reichsgesundheitsamtes Berlin-Dahlem: Die Feststellung der Trächtigkeit mittels der Alkohol-Extrakt-Reaktion. 4. Prof. Dr. Poppe, Landestierseuchenamt Rostock: Die Bang-Infektion des Menschen. 5. Prof. Dr. med. von Bassewitz, Porte Alegre, z. Zt. Hamburg: Tierseuchen in Süd-Brasilien. 6. Prof. Dr. med. von Bassewitz: Intoxikationen bei Tieren in Süd-Brasilien. 7. Prof. Dr. Zaribnicky, Wien: Tierärztliche Untersuchungen über Viertelmilchproben bei verschiedenen Euterkrankheiten. 8. Dr. Pröscholdt, Gesundheitsamt der Landwirtschaftskammer für Pommern, Züllchow: Über Streptokokken-Mastitis der Rinder. 9. Dr. Ehrlich, Tierseucheninstitut der Landwirtschaftskammer Hannover: Über die Ausführung der tierärztlichen Milchkontrolle, insbesondere in Vorzugsmilchbeständen. 10. Dr. Joh. Rudolf, Veterinärhygienisches Labo-

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 27, S. 474.

ratorium der n. ö. Landesregierung Wien: Zur Kontrolle der Konsummilch vom Standpunkt des Veterinärhygienikers. 11. Prof. Dr. Glage, Bakteriologische Station des Veterinärwesens Hamburg: Beobachtungen und Erfahrungen bei der tierärztlichen Milchkontrolle. 12. Dr. Ottokar Schultz, Milchwirtschaftliches Laboratorium Grebenstein: Rachitis bei Schweinen (mit Film). 13. Prof. Dr. Schermer, Tierärztliches Institut der Universität Göttingen: Über das Vorkommen von Blutgruppen bei unferen Haustieren. 14. Privatdozent Dr. Wittmann: Oberassistent an der Chirurgischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule Berlin: Die klinische Bedeutung der Hämatologie. 15. Prof. Dr. Johannes Schmidt, Medizinische Universitäts-Tierklinik Leipzig: Die infektiöse Anämie des Pferdes und ihre Beziehungen zur praktischen Veterinärpolizei. 16. Dr. Völker, Assistent an der Universitäts-Tierpoliklinik Leipzig: Die Bedeutung des Insulins und der Insulin-Ersatzmittel für die Veterinärmedizin. 17. Privatdozent Dr. Cohrs, Veterinärpathologisches Institut der Universität Leipzig: Die gelbe Leberatrophie der Tiere (mit Lichtbildern). 18. Privatdozent Dr. Westhues, Assistent an der Chirurgischen Veterinärklinik der Universität Gießen: Die Narkose bei Haustieren. 19. Dr. Schoupee, Landes-tierhospital in Graz: Erfahrungen über die Heilung des Hufkrebeses. 20. Prof. Dr. Glage: Zur Geflügelzucht. (Dieser als Einführung bestimmte Vortrag findet nur statt, wenn sich die Befichtigung der staatlichen Geflügelfarm und des Wettlegehofes in Carlshöhe ermöglichen läßt.) 21. Prof. Dr. Raebiger, Bakteriologisches Institut der Landwirtschaftskammer Halle: Neuere Studien über Geflügeltuberkulose. 22. Privatdozent Dr. Fritz Schmidt-Hoensdorf, Bakteriologisches Institut der Landwirtschaftskammer Halle: Kükenruhr bei erwachsenen Hühnern. 23. Dr. Lerche, Tierseuchenamt der Landwirtschaftskammer für Niederschlesien, Breslau: Entstehung und Bekämpfung der Rotwurmseuche des Geflügels. 24. Privatdozent Dr. Sprehn, Assistent am Tierseucheninstitut der Universität Leipzig: Die wichtigsten tierischen Parasiten unserer Pelztiere. 25. X. X. Die Milbenseuche unserer Honigbiene.

Die Einteilung der Vorträge auf die einzelnen Tage in Abteilung 35 ist wie folgt gedacht:

Dienstag, den 18. September 1928, 15—18 Uhr: Vorträge Nr. 1—6.
Donnerstag, den 20. September 1928, 15—18 Uhr: Vorträge Nr. 7—12.
Freitag, den 21. September 1928, 9—13 Uhr: Vorträge Nr. 13—21.
Freitag, den 21. September 1928, 15—17 Uhr: Vorträge Nr. 22—25.

Für die Abteilung 34:

Mayer, Hamburg. Nöller, Berlin.

Für die Abteilung 35:

Stödter, Hamburg. Schmidt, Leipzig.

Bücherei der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Die Bücherei ist in der Zeit vom 6. August bis 1. September d. Js. geschlossen.

Der Kurator der Bücherei.

Mießner.

Bücherbesprechungen.

Dissertationen der Tierärztlichen Hochschule Berlin S.-S. 1928.

Willi Krause: Das Antivirus Besredka's und seine Verwendungsmöglichkeit in der tierärztlichen Praxis. Arno Hoffmann: Die Prüfung der Stabilität des Plasmas gesunder und kranker Rinder und ihre diagnostische Bedeutung. Rudolf Gadeberg: Untersuchungen über die Morphologie des Bacterium pullorum. Hermann Wander: Über Chinin- und Adrenalinwirkung am isolierten Uterus des Rindes. Thomas Krekeler: Experimentelle Untersuchungen über die antirachitische Wirkung der mit der Quecksilber-Quarzlampe „Vita-Ray“ bestrahlten Milch. Walter Gose: Vergleichende Untersuchungen über verschiedene Anreicherungsverfahren bei der bakteriologischen Fleischuntersuchung. Siegfried Dreifuss: Beiträge zur Geschichte, zur Technik und volkswirtschaftlichen Bedeutung der Kastration der Hähne. Karl Seidel: Der Kaiserschnitt beim Schwein, ein Beitrag zur Geburtshilfe bei den kleineren Haustieren.

Dissertationen der Tierärztlichen Hochschule Hannover S.-S. 1928.

Erwin Becker: Neun Jahre SO₂-Behandlung in der Tierklinik Sarstedt mit besonderer Berücksichtigung der bei exotischen Tieren ge-

machten Erfahrungen. — Friedrich Berner: Intravitale Speicherversuche mit besonderer Berücksichtigung des beim Hund experimentell erzeugten Paratyphus. — Kurt Brandt: Die Entwicklung des Hornes beim Rinde bis zur Pneumatisation des Hornzapfens; 17. Beitrag zum Bau und zur Entwicklung von Hautorganen bei Säugetieren. — Alfred Buchheister: Untersuchungen über den infektiösen Abortus Bang auf dem Lehrgute Adendorf. — Philipp Fromm: Untersuchungen zur medikamentösen Bekämpfung der Daffellarven bei Rindern. — Konrad Kraft: Versuche zur Technik der blutigen Zitzenkanalerweiterung beim Rinde. — Paul Regnery: Versuche zur Leitungsanästhesie am Vordersehenkel des Rindes. — Mikelis Rolle: Biologie des Bacterium pyogenes.

Dissertationen der Vet.-med. Fakultät der Universität München. S.-S. 1928.

Heinrich Deutsch: Untersuchungen über den Einfluß der Bauart der Stallungen und der Führung des Stallbetriebes auf die Beschaffenheit der Stall-Luft. Karl Rudolf Essig: Über Novirudin, ein die Blutgerinnung hemmendes Mittel. Paul Schlumprecht: Vergleichende Untersuchungen über die Haltbarkeit des Maul- und Klauenseuche-Virus in trockenem Zustande und unter anderen Verhältnissen. Rudolf Sechser: Über das Vorkommen von Ankylostomum canium E. (des Hakenwurmes) bei unseren Fleischfressern, über die Krankheitserscheinungen, die er verursacht, und über die Möglichkeit ihn abzutreiben. Otto Steidle: Über die virulizide Wirkung verschiedener SO₂ enthaltender und abgebender Desinfektionsmittel gegen den Erreger der Maul- und Klauenseuche. Josef Michael Uzupis: Über Schleimhautwucherungen des Tragfackes der Katze und der Hündin. Anton Weigl: Über das Vorkommen von Verkalkungen und Verknöcherungen in Schilddrüsenkröpfen bei Hunden. Heinrich Eckmann: Wirkung von Chlorkohlenstoffen auf die Peroxydasen, Katalasen, Amylasen, Aldehydreduktasen und auf biologische Reaktionen von Serum. Anton Kircher: Über die Struktur der männlichen Geschlechtsorgane von Pferd und Rind. Georg Sondermayer: Über die Möglichkeit einer Antisensibilisierung.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Veterinärassessor Hermann Hahn zum Bezirkstierarzt in etatsmäßiger Eigenschaft an der Veterinärpolizeilichen Anstalt in Schleißheim; Stadtveterinär Dr. Blase aus Johannegeorgenstadt zum Schlachthofdirektor in Crimmitschau (Sa.); Dr. Teichmann zum Landw. Vet.-Rat bei der Landwirtschaftskammer in Dresden; Dr. Lommatsch zum Stadtveterinär am Schlachthof in Leipzig; Tierarzt Dr. Ernst Schürmann aus Rothaufen zum wissenschaftlichen Assistenten am Pathologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule in Berlin; Tierarzt Dr. Behm zum wissenschaftlichen Hilfsarbeiter am Pathologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule in Berlin.

Promoviert in Berlin: Willi Krause aus Gleiwitz; Arno Hoffmann aus Plauen; Rudolf Gadeberg aus Brede; Hermann Wander aus Seeburg; Thomas Krekeler aus Recklinghausen; Walter Gose aus Lüdelsen; Siegfried Dreifuss aus Richten; Karl Seidel aus Pirna. In Hannover: Erwin Becker aus Darmstadt; Friedrich Berner aus Rodach; Kurt Brandt aus Birnbaum; Alfred Buchheister aus Heiligendorf; Philipp Fromm aus Heiligenstadt; Konrad Kraft aus Zierenberg; Paul Regnery aus Dillenburg; Mikelis Rolle aus Rutzau (Lettl.). In München: Heinrich Deutsch aus München; Karl Rudolf Essig aus Niedermoschel; Paul Schlumprecht, Oberschleißheim; Rudolf Sechser aus Gunzenhausen; Otto Steidle, München; Josef Michael Uzupis aus Vidgiriai (Litauen); Anton Kircher, München; Georg Sondermayer, München.

Approbiert in München: Ewald Quas-Möllmann aus Sendenhorst in Westfalen. In Berlin: Hans-Ludwig Lerna aus Glogau; Carl Quernhorst aus Camperbruch; Thomas Krekeler aus Recklinghausen; Andreas Kreuder aus Kirchheim; Ludolf Kramer aus Hannover; Erich Striegler aus Auschkowitz. In Hannover: Karl Dillhoff aus Wellingholzhausen.

Verstorben: Tierarzt Ernst Laubis in Remlingen (Bayern).

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrzabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zusendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung fein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 32.

Ausgegeben am 11. August 1928.

36. Jahrgang.

Zur gefl. Beachtung! Der Bezugspreis für das 3. Vierteljahr 1928 wird für die beim Verlag direkt bestellten Abonnements durch Nachnahme erhoben, wenn derselbe nicht bis zum 25. ds. Mts. in unseren Händen ist. — Wir bitten ev. für Einlösung der Nachnahme besorgt zu sein.

M. & H. Schaper, Verlag der „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“.

Aus dem Kapitel „Zusicherungen beim Verkauf von Zucht- und Nutztieren“.

Von Prof. Dr. Oppermann, Hannover.

Ob beim Verkauf von Zucht- und Nutztieren neben ausdrücklichen Vereinbarungen auch stillschweigende Zusicherungen gegeben worden sind, wird in jedem Einzelfalle besonders zu prüfen sein.

In einer Reichsgerichtsentscheidung vom 25. Oktober 1902 heißt es: „Es muß sich mit Sicherheit ergeben, daß der Käufer in erkennbarer Weise seinen Kaufwillen vom Vorhandensein bestimmter Eigenschaften der Sache abhängig macht, und daß der Verkäufer seinen Willen, für diese Eigenschaften einzutreten, in gleicher Weise zu erkennen gibt. Erst dann liegt eine vertragsmäßige Zusicherung vor.“ Wer also ein Wagenpferd verkauft, haftet noch nicht ohne weiteres dafür, daß das verkaufte Pferd auch zugfest ist, sondern lediglich für die bekannten Hauptmängel.¹⁾ Ähnlich ist die Sachlage beim Verkauf eines Zuchttieres; dafür ein Beispiel:

Jemand hatte zwei ostfriesische Herdbuchbullen gekauft, von denen der eine sich als zur Zucht ungeeignet erwies und daher nicht angekört wurde; die Ansprüche des Käufers, die dieser gegen den Verkäufer erhob, wurden vom Oberlandesgericht zu Rostock am 11. März 1910 zurückgewiesen mit der Begründung, daß der Verkäufer bei dem Verkaufe von Herdbuchvieh nicht ohne weiteres eine Haftung dafür übernimmt, daß die Tiere zur Zucht geeignet sind und angekört werden.

Man hört immer wieder, daß Käufer von Zuchttieren, wenn jene dem Verkäufer ein Zuchttier abverlangt haben, der Meinung sind, eine Zusicherung zur Zuchttauglichkeit bekommen zu haben, und sie sind nachher sehr enttäuscht, wenn das Gericht gegen sie entscheidet.

Immerhin muß den Züchtern, wenn sie sich eines dauernd glatten Absatzes ihrer Zuchttiere erfreuen wollen, daran gelegen sein, den Ansprüchen der Käufer weitestgehend gerecht zu werden; daher empfiehlt z. B. der Reichsverband der Kaltblutzüchter Deutschlands in den von ihm aufgestellten allgemeinen Richtlinien, daß es für den Verkäufer von Zuchthengsten empfehlenswert sei, für Deck-

fähigkeit und Befruchtungsfähigkeit für mehrere Monate zu garantieren.

Beim Verkauf von Stammzuchtböcken gibt es nach einer mir vom Reichsverband für Deutsche Schafzucht gewordenen Auskunft keine einheitlichen Richtlinien hinsichtlich der Mängelgewähr; in den vom Reichsverband aufgestellten Versteigerungsbestimmungen wird den Züchtern empfohlen, für drehkranke und zeugungsunfähige Böcke aufzukommen, wenn diese Fehler innerhalb 6 Monate nach dem Übergange der Gefahr durch amtstierärztliches Zeugnis nachgewiesen werden. Natürlich bleibt dem Verkäufer Nachprüfung des Vorliegens dieser Mängel vorbehalten.

Manche Stammzüchtervereinigungen haben sich diese Richtlinien zu eigen gemacht, andere aber nicht; so heißt es z. B. im Versteigerungsverzeichnis der Westfälischen Landwirtschaftskammer: „Die Landwirtschaftskammer übernimmt für die Güte und Zuchttauglichkeit der Böcke keinerlei Gewähr.“

Im Interesse eines ständigen guten Einvernehmens zwischen Verkäufern und Käufern von Zuchttieren jeder Art wäre es zu begrüßen, wenn eine von beiden Parteien gewählte Kommission einheitliche Richtlinien aufstellen würde, die den Interessen beider Parteien in optima forma gerecht würden und die in gedruckter Form als Flugblatt den interessierten Kreisen an die Hand gegeben würden.

Solange in dieser Hinsicht keine Einheitlichkeit besteht, wird es immer wieder zu Differenzen kommen. Da der Tierarzt in der Regel von dem sich benachteiligt fühlenden Käufer zugezogen und befragt wird, wird jener sich zwar auf Grund seiner Sachkenntnis sehr wohl über das Vorliegen von Zuchtfehlern äußern können; weiter dürfen m. E. die Befugnisse des Tierarztes als Berater nicht gehen, da er leicht Gefahr läuft, in seinen Klienten falsche Hoffnungen zu erwecken; denn für die rein juristische Seite muß sich der Käufer lediglich von seinem Rechtsbeistand beraten lassen.

Die seitens der Verkäufer von Zuchttieren ausdrücklich

¹⁾ O.L.G. Darmstadt, 24. Mai 1907.

gegebenen Zusicherungen pflegen sich gemeinhin in dreierlei Richtungen zu bewegen:

- a) daß das betreffende Tier deckt,
- b) daß es angekört wird,
- c) daß es deckt und vererbt.

Die Punkte a und b bedürfen keiner besonderen Ventilierung. Hinsichtlich Punkt c sind sich die tierärztlichen Sachverständigen darüber einig, daß unter „Vererbung“ schlechtweg Befruchtung seitens des männlichen, Konzeption seitens des weiblichen Tieres zu verstehen ist.

Von großer Bedeutung ist die rein juristische Frage, wann für die sub a bis c gegebenen Zusicherungen die sechswöchige Verjährungsfrist zu laufen beginnt. Allgemein setzt diese Frist bei Zusicherungen mit dem Ablauf des Tages ein, an dem die Gefahr auf den Käufer übergeht und wird selbst dann nicht verlängert, wenn der Mangel innerhalb dieser Frist wegen seiner Verborgenheit nicht entdeckt werden kann. Es ist also Sache des Käufers innerhalb der sechswöchigen Frist nachzuweisen, daß die gegebenen Zusicherungen nicht zutreffen.

Wer mit den Gepflogenheiten des Zucht- und Körbetriebes vertraut ist, weiß, daß dem Käufer von Zuchttieren mit einem derartigen Lauf der Verjährungsfrist meist nicht gedient ist. In vielen Zuchtbezirken sind z. B. ganz bestimmte Körtermine festgelegt; fallen diese nicht zufällig in die Zeit einer sechswöchigen Gewährfrist, so bleibt dem Käufer übrig, entweder innerhalb dieser Zeit eine außerterminliche, natürlich mit erheblichen Kosten verbundene Körung zu beantragen, oder sich mit dem Verkäufer strikte darüber zu einigen, daß die Zusicherung sich zeitlich bis zu dem nächsten Körtermin erstrecken soll.

Der Beweis der Erfüllung der Zusicherung der Deck- oder Sprungfähigkeit läßt sich oftmals nicht innerhalb sechs Wochen nach dem Übergange der Gefahr erbringen, z. B. beim Ankauf eines einjährigen Hengstes oder eines vier Monate alten Ebers, oder sei es, daß dem Käufer in der beregten Zeit keine brünstigen weiblichen Tiere zum Ausproben des männlichen Tieres zur Verfügung stehen. Es können daher in solchen Fällen oft viele Monate vergehen, ehe der Käufer den Beweis für Nichtdeckfähigkeit zu erbringen vermag. Unter diesen Umständen würden die beregten Zusicherungen für den Käufer in vielen Fällen nur illusorischen Wert haben.

Diesem Dilemma hat die bekannte Reichsgerichtsentscheidung vom 24. Februar 1914 Rechnung getragen:

Der in dem beregten Rechtsstreit erwähnte Hengst sollte laut verlangter und gegebener Zusicherung decken und vererben; diese Eigenschaften innerhalb 6 Wochen nach der Übernahme des Tieres zu prüfen war für den Käufer unmöglich gewesen. Deshalb lautete die oberste Entscheidung: „Wenn die behauptete Zusicherung überhaupt einen Sinn hatte, so kann sie von den Parteien nur so gemeint sein, daß gleichzeitig der Klägerin das Recht zu einer entsprechend späteren Geltungmachung des Mangels eingeräumt wurde.“ (B. T. W. 1914, S. 356.) Diese Reichsgerichtsentscheidung erklärt es daher in gewissen Fällen für zulässig, den Beginn des Laufens der Verjährungsfrist um Monate hinauszuschieben.

Uns interessiert bei diesem beregten Prozeß, daß der Beweis dafür, daß der Hengst die Zusicherung des Vererbens erfüllte, durch den Nachweis einer erfolgten Konzeption erbracht werden sollte. Diese Forderung ist m. E. wissenschaftlich zu weitgehend und nicht begründet; der Beweis für das Vorhandensein der zugesicherten Eigenschaften des Deckens und Vererbens ist m. E. dann erbracht, wenn der Hengst den Deckakt rite auszuführen vermag und wenn die mikroskopische Untersuchung des Spermas einen normalen Befund ergibt, d. h. zahlreiche, sich lebhaft bewegende, normal ausgebildete Spermatozoen. Den Beweis des Vererbens davon abhängig machen zu wollen, daß mindestens eine von dem Hengst gedeckte Stute tragend geworden ist, geht zu weit, ferner das Ausbleiben der Konzeption in

den meisten Fällen durch pathologische Zustände des Genitaltrakts der Stute veranlaßt zu werden pflegt.

Mit der Möglichkeit des langen Hinausschiebens des Beginns der Verjährungsfrist erwachsen aber dem tierärztlichen Sachverständigen nicht zu unterschätzende Schwierigkeiten; denn dieser soll jeweils darüber entscheiden, ob ein festgestellter Mangel in der Zuchtauglichkeit bereits bei der Übergabe vorhanden war; das wird ja nicht schwierig sein, wenn es sich z. B. um Kryptorchismus oder um Mißbildungen des Penis handelt. Bei sonstigen Fehlern, wie sie von Fröhner aufgestellt werden (Atrophie der Hoden, Hodentumoren, Aspermie, Azoospermie, Neubildungen am Penis, Phimosis, Hernien) dürfte das Zurückdatieren oft recht schwierig sein, um so mehr, wenn Monate seit der Übergabe verstrichen sind. Gleiche Schwierigkeiten werden sich in dieser Hinsicht auch bei weiblichen Zuchttieren ergeben. Insofern wird die oben angezogene Reichsgerichtsentscheidung in vielen Fällen dem Käufer nicht in dem erwarteten Maße von Nutzen sein.

Die oben beregte Reichsgerichtsentscheidung ist auch insofern für uns interessant, als sie indirekt die Frage des Nachweises der Trächtigkeit berührt; wenn schon hinsichtlich der Auswertung der gegebenen Zusicherung auf Zuchtauglichkeit und Vererbung die Hinausschiebung des Beginns der sechswöchigen Verjährungsfrist auf Monate hinaus statthaft sein kann, so müßte das vice versa auch für die Prüfung der Zusicherung auf Trächtigkeit der Fall sein.

Über diesen Punkt haben sich lebhafteste Kontroversen in juristischen und tierärztlichen Kreisen entsponnen.

Vorab wird es nötig sein, so eigenartig es klingt, sich über den Begriff „Trächtigkeit“ klar zu werden. Malkmus versteht unter Trächtigkeit denjenigen Zustand eines Tieres, während dessen es im Mutterleibe ein in der Entwicklung begriffenes Junges trägt. Dieser Ansicht dürften auch insgemein die Laien huldigen. Wenn also ein Muttertier eine abgestorbene Frucht bei dem Übergange der Gefahr in sich trägt, so ist es nicht mehr als trächtig zu bezeichnen.

Wie soll man sich aber zu einer extrauterinen Gravidität stellen? Malkmus, und ihm schließt sich Stölzle an, ist der Ansicht, daß ein solches Tier nicht als trächtig im physiologischen Sinne anzusehen ist (in den übrigen Lehrbüchern der Gerichtlichen Tierheilkunde — Gerlach, Dieckhoff, Fröhner — verlautet über diese Frage nichts). Die extrauterin gelagerte Frucht stellt gewissermaßen einen Fremdkörper, einen Tumor, dar. Eine gegensätzliche Auffassung vertritt Meisner. Zwar hat das Reichsgericht unter dem 10. November 1916 (Das Recht 1917, S. 33) ausgesprochen, daß in der Zusicherung der Trächtigkeit nichts weiter enthalten sei, als daß ein Tier ein Junges trägt, nicht aber die Zusicherung dafür, daß das Tier geeignet sei, normalerweise ein Junges zur Welt zu bringen.

Gewiß ist es richtig, daß kein Verkäufer für den letzteren Umstand eine Zusicherung abgeben kann; es dürfte aber im Sinne beider Parteien liegen, daß eine Extrauterin-schwangerschaft eine Sonderstellung einnimmt. Diese verschiedenen Auffassungen bedürfen dringlich einer endgültigen juristischen Klärung. Es kann z. B. der Fall sich ereignen, daß eine Kuh, die unter der Zusicherung „Trächtigkeit im zweiten Monat“ verkauft wird, kurz nach der Übergabe infolge Beinbruchs geschlachtet werden muß, und es findet sich im freien Raume der Bauchhöhle ein nicht abgestorbener acht Wochen alter Embryo, der auf Grund des Befundes der Genitalorgane schon vor der Übergabe dort gelegen haben muß. Wie würde in diesem Falle die juristische Auffassung sein: Trächtig oder nichtträchtig? Die tierärztliche Erfahrung lehrt, daß eine derartig gelegene Frucht bei unseren Haustieren nicht auszureifen vermag; sie ist daher von vornherein als ein Fremdkörper anzusprechen und würde auf gleiche Stufe mit einer im Uterus abgestorbenen

Frucht zu stellen sein. Ich möchte mich daher dem Standpunkte von M a l k m u s anschließen.

Bei Zuficherung „Trächtigkeit“ gibt es nach St ö l z l e keine Gewährfrist, sondern nur die sechswöchige Verjährungsfrist, beginnend am Tage nach dem Gefahrübergange. Fr ö h n e r schließt sich dieser Ansicht an. Folgt man diesen Autoren, so muß der Käufer innerhalb sechs Wochen, vom Tage des Gefahrüberganges an gerechnet, bemüht sein, nachzuweisen, daß das Tier evtl. nicht tragend ist.

Sch ä f f e r ist der Ansicht, daß bei der Zuficherung der Trächtigkeit vorab eine Gewährfrist in Frage kommt, die sich bis zur Höchstträchtigkeitsdauer erstreckt, und erst nach Ablauf dieser Zeit setzt die sechswöchige Verjährungsfrist ein. Sch ä f f e r begründet diesen Standpunkt damit, daß es nicht unter allen Umständen möglich ist, innerhalb sechs Wochen nach der Übergabe Trächtigkeit festzustellen resp. auszuschließen. M e i s n e r hingegen vertritt den Standpunkt, und zwar in Anlehnung an die erst zitierte Reichsgerichtsentscheidung bezüglich des Hengstes, daß durch stillschweigende Vereinbarung der Beginn der Verjährungsfrist auf den Zeitpunkt verschoben wird, an welchem die natürliche Trächtigkeitsperiode abgelaufen ist. Für die Richtigkeit ihrer divergenten Ansichten führen St ö l z l e und M e i s n e r eine Reihe von Gerichtsentscheidungen ins Feld; M e i s n e r betont jedoch hierbei, daß die neuerliche Rechtsprechung den Standpunkt von St ö l z l e überwiegend verlassen hat.

Man wird also vielleicht damit rechnen müssen, daß die zukünftig in hac re zu fällenden Gerichtsentscheidungen sich in dem von M e i s n e r zitierten Sinne bewegen werden.

Man muß unbedingt einräumen, daß es in vielen Fällen nicht möglich ist, innerhalb sechs Wochen nach der Übergabe mit Sicherheit Trächtigkeit festzustellen resp. auszuschließen, z. B. bei der Kuh und Stute dann, wenn der Embryo 4—6 Wochen alt ist. Diese Schwierigkeiten werden noch größer bei Schafen und Schweinen, wenn diese z. B. sich in den ersten sechs Wochen der Trächtigkeit befinden. Insofern würde dem tierärztlichen Sachverständigen der richterliche Standpunkt im Sinne M e i s n e r's zustatten kommen und ihn vor Nackenschlägen schützen.

Andererseits ist aber nicht zu verkennen, daß eine generale Bekennung zu dem Sch ä f f e r'schen und M e i s n e r'schen Standpunkte für den Viehhandel große Unbequemlichkeiten bringt, denn unter Umständen kann der Käufer den Beginn der Verjährungsfrist bis zum Ende der jeweiligen Höchstträchtigkeitsdauer hinauschieben lassen, so daß der Verkäufer z. B. beim Stutenverkauf noch nach 12 Monaten in Anspruch genommen werden kann. Es wird nämlich dem Käufer, da für ihn die Zeit arbeitet, aus Gründen der Kostenersparnis durchweg kaum einfallen, schon vor Ablauf der normalen Trächtigkeitszeit sein Tier tierärztlich untersuchen zu lassen, es sei denn, daß ihn gewichtige Gründe dazu veranlassen.

Aber auch für den Tierarzt ergeben sich Schwierigkeiten. Hält man daran fest, daß ein Tier, das eine abgestorbene Frucht im Uterus trägt, im juristischen Sinne nicht trächtig ist, so ist es Aufgabe des Tierarztes nachzuweisen, daß dieser Mangel schon am Tage des Gefahrüberganges vorlag. Ein solcher Nachweis wird aber um so schwieriger zu erbringen sein, wenn sich das Tier schon monatelang in den Händen des Käufers befindet; mit der Länge der Zeit wachsen aber die Möglichkeiten des Auftretens von Schädigungen des Jungen im Uterus.

Vom Standpunkt des tierärztlichen Sachverständigen aus würde, wie auch St o s s betont, es zweckmäßig sein, in allen Zweifelsfällen, die innerhalb sechs Wochen nach Übergabe des Tieres entstehen, Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweises seitens des Käufers zu beantragen. Ein solcher Antrag unterbricht die Verjährungsfrist und zwar so lange, bis das Beweisicherungsverfahren beendet ist, d. h.,

bis daß der Sachverständige sich Klarheit verschafft hat. Von diesem Modus profitieren in gleicher Weise Verkäufer, Käufer und Tierarzt.

Zu dieser wichtigen Frage nimmt Justizrat Dr. St ö l z l e neuerdings Stellung.²⁾

St ö l z l e hält nach wie vor daran fest, daß sich mit den zur Zeit gültigen Bestimmungen des B.G.B. allein die Auffassung vertreten lasse, daß innerhalb sechs Wochen nach Gefahrübergang die Klage erhoben werden müsse.

Unter voller Würdigung der vom Handel geforderten Rechtsicherheit läßt sich diese nach zwei Richtungen hin erbringen:

1. Parteivereinbarung, d. h. anstelle der sechswöchigen Verjährungsfrist tritt eine solche von x Monaten,

2. Änderung des B.G.B. dahingehend, daß bei Zuficherung der Trächtigkeit eine gesetzliche Gewährfrist einzuführen wäre (eine Änderung der kaiserlichen Verordnung kommt nicht in Frage, weil es sich nicht um einen Hauptmangel handelt). Es müßten also besondere, zweckmäßig nach Wochen, nicht nach Tagen, zu bemessene Gewährfristen eingeführt werden. Diese könnten, wie es G r a n i n g e r vertritt, die durchschnittliche Trächtigkeitsdauer umfassen, d. h. beim Pferd 49 Wochen, beim Rind 40 Wochen usw.; diesen Vorschlag lehnt St ö l z l e ab, weil infolge der langen Zeit eine Rechtsunsicherheit bestehen bleiben würde, zumal wenn die Tiere von einer Hand in die andere wandern. Dem St ö l z l e'schen Standpunkt möchte ich mich anschließen.

Demnach müßten die Gewährfristen kürzer zu wählen sein; man müßte sich an die Zeit halten, in der es erfahrungsgemäß für den Sachverständigen möglich ist, Klarheit darüber zu erbringen, ob die gegebene Zuficherung erfüllt ist.

Nach Rücksprache mit Sachverständigen macht St ö l z l e daher den Vorschlag, in das B.G.B. als § 482a aufzunehmen:

„Im Falle der Zuficherung der Trächtigkeit beträgt die Gewährfrist bei Einhufern 12 Wochen, bei Rindvieh 12 Wochen, bei Schafen 6 Wochen, bei Schweinen 4 Wochen.“

Die rechtlichen Folgen der Vereinbarung einer Gewährfrist wären:

- a) daß, wenn innerhalb der Gewährfrist sich Trächtigkeit nicht gezeigt hat, vermutet wird, daß die Nichtträchtigkeit schon z. Zt. des Gefahrüberganges vorhanden war (§ 484 B.G.B.),
- b) daß nach Ablauf der Gewährfrist innerhalb zweier Tage dem Verkäufer angezeigt werden muß, daß das Tier nicht trächtig ist (§ 485 B.G.B.),
- c) daß innerhalb sechs Wochen vom Ende der Gewährfrist an Klage eingereicht werden muß, wenn das Tier nicht trächtig ist,
- d) daß die gesetzliche Gewährfrist verkürzt und verlängert werden kann (§ 486 B.G.B.).

St ö l z l e hält mit Recht die Änderung des B.G.B. für sehr schwierig; das darf uns aber in der Forderung nach Änderung desselben nicht abschrecken, denn so lange keine Gesetzesänderung eintritt, müssen die Parteien durch ihre Organisationen darauf verwiesen werden, tunlichst gleichlautende Richtlinien über Parteivereinbarungen aufzustellen, etwa in Gestalt eines Trächtigkeitscheines, der die oben vorgeschlagenen Fristen berücksichtigt.

St ö l z l e hält es für wünschenswert, daß sein Vorschlag bezüglich der Dauer der Gewährfristen von veterinärmedizinischer Seite beleuchtet wird.

Die für Einhufer und Rindvieh vorgeschlagene Zeit von 12 Wochen würde allen Anforderungen m. E. gerecht

²⁾ Ein Vorschlag zur Lösung der Trächtigkeitsfrage. M. t. Wschr. 1928, Nr. 17, S. 213.)

werden, denn innerhalb dieser Zeit läßt sich durch einen einigermaßen geübten Tierarzt feststellen, ob Trächtigkeit vorliegt oder nicht, zumal in der Regel sich die verkauften Pferde und Rinder schon seit einiger Zeit als trächtig erweisen sollen.

Die für Schafe und Schweine vorgeschlagene Frist von sechs resp. vier Wochen halte ich für zu kurz, denn gerade beim Handel mit diesen Haustierklassen werden oft Tiere verkauft, die verhältnismäßig kurze Zeit vor der Übergabe gedeckt worden sind, und weil hier die rektale und vaginale Untersuchung auf Trächtigkeit nicht möglich ist, so wird sich der Sachverständige in der Hauptfache stützen müssen auf die Zunahme des Bauch- und Leibesumfanges und das Wachstum der Milchdrüse.

Ich möchte daher in Übereinstimmung mit Stoss der Einfachheit wegen vorschlagen, auch für Schafe und Schweine eine Gewährfrist von 12 Wochen zu wählen; das mindert einmal die diagnostischen Schwierigkeiten und bringt einen einheitlichen Zug in die Dauer der Gewährfristen.

Im Hinblick auf die Schwierigkeiten einer Gesetzes-

änderung müßten die Parteien und ihre Organisationen immer wieder darauf hingewiesen werden, für die Ausstellungen von Trächtigkeitscheinen nach dem Vorschlage von Stölzle zu dringen. Wird das beim Kauf unterlassen, und kann der Tierarzt innerhalb sechs Wochen nach Gefahrübergang eine sichere Diagnose nicht stellen, so wird die betreffende Partei anzuhalten sein, den Antrag auf Beweisaufnahme frühzeitig einzubringen.

Literatur.

E. Fröhner: Lehrbuch der gerichtlichen Tierheilkunde, VI. Auflage 1928. Malkmus: Handbuch der gerichtlichen Tierheilkunde, III. Auflage 1921. Chr. Meisner: Viehwährschaftsrecht, III. Auflage 1927. Schäffer: Die Verjährung bei Zuficherung der Trächtigkeit. B. t. W. 1926, S. 741. Scriba: Die Zuficherung des Deckens und der Trächtigkeit in der Auslegung des Reichsgerichts. Deutsche landw. Presse 1914, S. 786. Dr. H. Stölzle: Viehkauf, VI. Auflage 1926. B. t. W. 1926, S. 671; M. T. W. 1928, S. 213. Stoss: Trächtigkeitszuficherung, Verjährungsfrist und Trächtigkeitsdiagnose. B. t. W. 1927, S. 492. M. T. W. 1928, S. 255. Dr. Thén: Stillischweigende Zuficherung beim Viehkauf. Deutsche landw. Tierzucht 1911, S. 248.

(Aus dem Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg und für Berlin. — Direktor: Dr. Scharr.)

Über den Wert der Chlorofunk-Methode bei der Milchuntersuchung.

Von Dr. Gerhard Fleischhauer, Berlin.

Das von G. Schulze herausgebrachte vereinfachte Chlorbestimmungsverfahren soll die Möglichkeit geben, die durch Störungen der Euterfunktion — insbesondere durch Krankheitsprozesse — hervorgerufenen Veränderungen in der Milch der betreffenden euterkranken Tiere nachzuweisen. Die Methode bezweckt, den bei zahlreichen Euterleiden bestehenden Überschuß an Chloriden festzustellen, wozu die als Chlorofunk-Reagens A und B bezeichneten Lösungen Verwendung finden, und stellt eine Modifikation des Volhard'schen Rhodanid-Verfahrens dar. Die Chlorofunklösung A besteht aus Silbernitrat, Salpetersäure und Ferri-sulfat und das Reagens B aus einer Ammoniumrhodanidlösung. (Prange, G. und Behme, H., T. R. 1928, Nr. 23, S. 428.)

Zur Ausführung der Reaktion werden 10 ccm Milch in einem Schüttelröhrchen zunächst mit 5 ccm Chlorofunk-Reagens A und hierauf mit 5 ccm Reagens B zusammengebracht, verschlossen und mehrmals geschüttelt. Während bei Vorliegen einer krankhaft veränderten Milch rötliche Verfärbung eintritt, bleibt dieser Farbumschlag bei von gesundem Euter stammender Milch aus. Betreffs den hierbei ablaufenden Reaktions-Mechanismus und das einschlägige Schrifttum verweise ich auf die oben angegebene Veröffentlichung von Prange und Behme.

Der von v. Ostertag in der Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene 1927, Nr. 24, S. 422, im Anschluß an die Mitteilung aus dem Versuchslaboratorium der Firma Paul Funke & Co., Berlin, über „Eine neue Schnellmethode zur Erkennung fehlerhafter und krankhaft veränderter Milch, Schulzes Milchchlorprober „Chlorofunk““ gegebenen Anregung folgend, soll durch meine mit dieser neuen Methode durchgeführten Untersuchungen nachgewiesen werden, inwieweit sich Übereinstimmungen der durch die Chlorofunkreaktion ermittelten Ergebnisse mit den bakterioskopischen Befunden erkennen lassen.

Zur Untersuchung gelangten insgesamt 365 Einzelmilchproben.

Hiervon zeigten 69 Proben im mikroskopischen Ausstrich mäßige Leukozytenvermehrung und Schleimbildung und reagierten gegenüber Chlorofunk 41mal negativ.

Fehlresultate demnach: 59 Prozent.

Weitere 36 Milchproben mit starkem Zell- und Schleimgehalt verhielten sich in 15 Fällen negativ.

Fehlresultate: 42 Prozent.

Von 66 Proben, bei denen neben erhöhter Leukozytenzahl und Schleimbildung zahlreiche Mastitis-Streptokokken mikroskopisch ermittelt wurden, fielen 35 Chlorofunknegativ aus.

Fehlresultate: 53 Prozent.

Die übrigen 194 Milchproben waren von einwandfreier Beschaffenheit. Von ihnen konnte bei 42 ein mehr oder weniger stark positiver Ausfall der Chlorofunk-Reaktion beobachtet werden.

Fehlresultate: 22 Prozent.

Die Chlorofunk-Reaktion wurde fernerhin an 172 Sammelmilchproben vorgenommen.

Bereits vor Beginn der Chlorofunk-Verfuche bei Sammelmilchproben war es für mich zweifellos, daß die Methode in diesem Falle nicht von praktischem Werte sein könnte; wird doch in der Sammelprobe etwa enthaltene krankhaft veränderte Milch ein oder mehrerer Kühe durch die Milch der übrigen gefunden Tiere mehr oder weniger stark verdünnt, wodurch natürlicherweise auch der in der krankhaft veränderten Milch ursprünglich vorhandene erhöhte Chlorgehalt durch den in gewissen Grenzen schwankenden Chlorgehalt der von den übrigen gefunden Tieren stammenden Proben wieder herabgemindert wird. Infolgedessen habe ich mein besonderes Interesse dem Ausfall der Chlorofunkreaktion bei mikroskopisch einwandfreien Milchproben gewidmet und nur der Vollständigkeit halber die Befunde bei den mikroskopisch veränderten Sammelmilchproben angeben.

Von den 172 untersuchten Sammelproben waren 114 von einwandfreier Beschaffenheit, 28 ließen mäßigen Zell- und Schleimgehalt, 11 starke Leukozyten- und Schleimbildung und 19 außerdem noch zahlreiche Mastitis-Streptokokken erkennen.

Von den 114 als einwandfrei zu bezeichnenden Proben reagierten gegenüber Chlorofunk 17 mehr oder weniger stark positiv.

Fehlresultate: 15 Prozent.

Bei den 28 Proben mit mäßigem Zell- und Schleimgehalt wurde 26mal negative Chlorofunk-Reaktion beobachtet.

Fehlresultate: 93 Prozent.

Die 11 Proben mit starker Leukozytenvermehrung und Schleimbildung waren in ihrer Gesamtheit Chlorofunk-negativ.

Fehlresultate: 100 Prozent.

Die 19 streptokokkenhaltigen Proben ergaben in 15 Fällen negativen Ausfall der Chlorofunk-Reaktion.

Fehlresultate: 79 Prozent.

Zusammenfassend ergibt sich, daß mikroskopisch hochgradig verdächtige und Streptokokken enthaltende Einzelmilchproben in 42 bzw. 53 Prozent durch Chlorofunk als unverdächtig und 194 einwandfreie Einzel- sowie 114 Sam-

melkmilchproben in 22 bzw. 15 Prozent als krank angezeigt wurden.

Nach meinen Untersuchungsergebnissen, die die Angaben von Otten, Prange und Behme bestätigen, ist somit die Chlorofunk-Methode nicht geeignet, mit Sicherheit krankhaft veränderte Milch festzustellen. In Laienhände gegeben ist sie vielmehr dazu geeignet, unter den Milchviehbesitzern Verwirrung anzurichten und den schließlich doch noch hinzugezogenen diagnostizierenden Tierärzten bzw. Instituten die Durchführung der Feststellung und Bekämpfung der Streptokokkenmastitis nicht unwesentlich zu erschweren.

(Aus dem Veterinärbakteriologischen Laboratorium zu Chisinau [Rumänien]. — Direktor: Dr. C. Cernaianu.)

Ausgezeichnete Heilerfolge mit Hexamethylentetramin bei Geflügeldiphtherie bzw. Pocken.

Von Dr. C. Cernaianu und Dr. T. Schlenker.

Die wirtschaftliche Notlage der Nachkriegszeit war wohl die große Triebfeder des hierzulande so plötzlich einsetzenden Aufschwunges der Geflügelzucht, die z. Zt. einen äußerst wichtigen Zweig unserer Landwirtschaft darstellt. Die verschiedensten Geflügelrassen wurden aus dem Auslande eingeführt und ein großes Kapital angelegt, um die Einträglichkeit dieses überaus wichtigen ökonomischen Faktors nach Möglichkeit zu fördern. Leider sind es auch hier wie anderswo die vielen Seuchen mit ihren verheerenden Wirkungen, denen ja die feineren Kulturassen besonders leicht unterliegen, die einer rationellen Geflügelzucht hemmend im Wege stehen. Unter all den vielen Geflügelseuchen spielt hier die Geflügelpocke bzw. -diphtherie die Hauptrolle; um so mehr, als bei uns die allgemeine Schutzimpfung gegen diese Seuche noch keine praktische Anwendung findet und veredelte Rassen besonders leicht der Seuche zum Opfer fallen. Die Forschungsergebnisse der letzten Jahre führten zu der einheitlichen Benennung dieser Seuche als Geflügelpocke, anstatt der Bezeichnungen Geflügeldiphtherie und Epithelioma contagiosum, die ja nur zwei klinische Formen ein und derselben Krankheit, verursacht durch dasselbe filtrierbare Virus, darstellen.

Viel mit der Bekämpfung dieser Seuche beschäftigt und aufmerksam geworden durch die Erfolge mit Hexamethylentetramin bei Krankheiten, hervorgerufen durch dermo- und neurotrope filtrierbare Virusarten (Bornasche Krankheit der Pferde, Staupe der Hunde, epidemische Enzephalitis des Menschen usw.), kam einem von uns (Cernaianu) die Idee, auch bei den Geflügelpocken Hexamethylentetramin anzuwenden, da dieselben ja als richtige Ektodermosen aufzufassen sind, denn Haut (Schleimhaut) und Gehirn weisen hierbei die wichtigsten Veränderungen auf und beherbergen die größten Virusmengen.

Die ersten Versuche mit 0,2 Gramm Hexamethylentetramin pro Kilogramm Lebendgewicht waren nicht vielversprechend, da sie oft erfolglos blieben.

Durch eine Mitteilung von A. Machado*) im Dezember 1926, in der er von einem vollständigen Heilerfolg bei Geflügelpocken mit Hexamethylentetramin in Dosen von 0,6—1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht spricht, aufmerksam geworden, entschlossen wir uns die früheren Versuche wieder aufzunehmen, indem wir das Mittel nun in Dosen von 1 Gramm pro Kilogramm Lebendgewicht, wiederholt in 24 Stunden intramuskulär einverleiben.

Obwohl diese Dosen enorm hoch erscheinen (pro Henne von 2—3 kg Gewicht je 2—3 Gramm aktive Substanz in zwei aufeinander folgenden Tagen, Truthühner von 8 kg Gewicht 8 Gramm Hexamethylentetramin auf einmal oder

16 Gramm im ganzen), so zeigten die Tiere trotzdem keine auffallende Reaktion.

Die Anwendung des Hexamethylentetramins erfolgte stets in einer 40prozentigen Lösung in Aqua destillata. Bei einer so durchgeführten Behandlung gingen die Veränderungen an der Haut und an Schleimhäuten gewöhnlich schon nach 4—5 Tagen merklich zurück, nach 8—10 Tagen waren die Tiere wieder vollkommen hergestellt. Die Behandlung wurde schon bei über 200 Hühnern und Truthühnern bei Geflügelpocken angewendet, immer mit demselben ausgezeichneten Erfolg, selbst bei schweren und bereits weit vorgeschrittenen Krankheitsfällen, denen unbehandelte Tiere immer erlagen.

Die gleichen guten Erfolge wurden mit Hexamethylentetramin in obengenannten Dosen auch bei einer anderen Geflügelseuche — der Coryza avium contagiosa oder dem ansteckenden Schnupfen — der jungen Tiere erzielt.

Über die Ätiologie dieser Krankheit herrscht noch Dunkel, nach neueren Untersuchungen wird jedoch ebenfalls ein filtrierbares Virus als Erreger angenommen. Manche Autoren sind der Meinung, daß die Coryza avium contagiosa nur eine besondere Form der Geflügelpocke (-diphtherie, epithelioma) beim Junggeflügel sei, und durch einen Katarrh der Nasen- und Augenhöhlen charakterisiert ist.

Bei unseren epidemiologischen Beobachtungen der letzten Jahre konnten wir die interessante Tatsache feststellen, daß in Beständen, wo das ältere Geflügel, sowie die Mutterhennen und Truthennen mit Pocken bzw. Diphtherie befallen waren, unter dem Junggeflügel stets die Coryza contagiosa in ausgebreitetem Maße wütete. Durch diese Beobachtungen und bestärkt durch die hervorragenden Heilerfolge mit Hexamethylentetramin bei beiden Seuchen (Coryza und Pocken) können wir uns der Meinung derjenigen Autoren, welche die Coryza contagiosa als eine besondere Form der Geflügelpocke beim Junggeflügel aufzufassen, vollkommen anschließen.

Zusammenfassung.

Die Geflügelpocken, sowohl in der epitheliomen als auch der diphtherischen Form konnten immer durch Hexamethylentetramin in Dosen von 1 Gramm aktiver Substanz pro Kilogramm Lebendgewicht, wiederholt in 24 Stunden, durch intramuskuläre Einverleibung einer 40prozentigen Lösung in Aqua dest., geheilt werden. Dieselben hervorragenden Resultate waren auch bei der Behandlung der Coryza avium contagiosa — dem ansteckenden Schnupfen des Junggeflügels — zu verzeichnen, ein Grund mehr für die Annahme, die Coryza avium contagiosa als eine Infektion mit Geflügelpockenvirus beim Junggeflügel anzusehen.

*) A. Machado, C. R. de la Soc. Biol. T. XCV. 1926, S. 1495.

Innere Medizin und Chirurgie.

Lamatsch: Toxikologische Versuche mit Cuprex und Nissex bei Hund, Katze und Geflügel. (Aus der Lehrkanzel für interne Medizin und medizinischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule in Wien. — Vorft.: Prof. Dr. D. Wirth.) (T. R. 1928, S. 3.)

Die Nachprüfungen der Präparate Cuprex und Nissex in kutaner, subkutaner und oraler Applikation bei Hund, Katze und Geflügel ergab, daß dieselben für Hund und Geflügel ziemlich unschädliche Präparate darstellen, die nur bei ganz großen Mengen, wie sie therapeutisch nicht in Frage kommen, zu Vergiftungen Anlaß geben können. Einige Vorsicht scheint bei kranken und jungen Hunden geboten. Anders liegen die Verhältnisse bei der Katze, bei welcher Cuprex schon in kleinen Mengen tödlich wirkt. Nissex wird von der Katze etwas besser vertragen, doch darf die Menge 2,5 ccm pro Kilogramm Körpergewicht auf ein Viertel der Körperoberfläche verrieben, nicht übersteigen.

K. H. Meyer.

Liese, W.: Der Einfluß von Chinisol auf Bakterien und Protozoen im Reagenzglas und im Tierkörper. (Aus dem Hygienischen Institut der Universität Kiel.) (C. f. B. 1927, I. Abt., Orig., Bd. 105, S. 137.)

Die vorliegende Arbeit gelangt zu dem Ergebnis, daß das Chinisol ein Antiseptikum von außerordentlich bakterienwachstumshemmender Wirkung ist, und daß diese Wirkung für bestimmte praktische Fälle, wo eine häufige Anwendung oder langdauernde Einwirkung des Präparates möglich ist, als recht wertvoll bezeichnet werden muß. Da das Mittel weiterhin den Vorzug hat, praktisch ungiftig zu sein, dürfte es neben seiner äußerlichen und innerlichen medizinischen Anwendung als geeignetes Prophylaktikum für die tägliche Körperpflege (Mundpflege, Spülungen, Wäschungen, Hautpflege und dergl.) besonders in Frage kommen.

Carl.

Linhardt, W.: Über Eigenblutbehandlung bei septischen Prozessen. (W. kl. Wschr. 1927, Nr. 20, S. 657.)

Die Einverleibung des Eigenblutes kann in Form unveränderten oder veränderten Blutes, und zwar auf verschiedenem Wege erfolgen (im ersten Falle intrakutan, subkutan, intramuskulär; im zweiten als defibriniertes und gazegefiltertes Blut, als Zentrifugenserum, als Blutkörperchensuspension in NaCl-Lösung und als hämolysiertes Blut subkutan, intramuskulär, intravenös). Sie bewirkt dreifaches: 1. Eine allgemeine Immunisierung durch ins Blut gelangende aktivierte Stoffe auf dem Umwege über das vegetative Nervensystem. 2. Eine örtliche Heilwirkung. 3. Eine erhöhte örtliche Abwehrreaktion des autonomen Systems. Die Eigenblutbehandlung ist demnach kurz gesagt der Versuch, den Körper instand zu setzen, mit seinen eigenen, in ihm selbst entstandenen und durch den Reiz der Einspritzung noch frei werdenden Kräften, Angriffen gegen ihn mit Erfolg zu begegnen. Die Erfahrungen des Verf. beziehen sich ausschließlich auf intramuskuläre Injektion unveränderten frischen Blutes (geringste Menge bei Erwachsenen 20, die höchste auf einmal 120 ccm). Die Wirkungen sind: Temperaturabfall, oft nach einer Injektion schon in 2—3 Stunden, bei Notwendigkeit mehrerer Einspritzungen langsamer Abfall mit Remissionen; gleichzeitig rasches Zurückgehen der objektiven Krankheits Symptome (Schwellungen, Infiltrationen, Zeichen der Progredienz usw.), ebenso der subjektiven Beschwerden lokaler und allgemeiner Natur (Schmerzen, schweres Krankheitsgefühl, Schlaflosigkeit). Eine Reaktion ähnlich wie bei der Proteinkörpertherapie, z. B. Fieber, Schüttelfröste, wurde in den 1000 Fällen nicht gesehen. Das injizierte Eigenblut, auch bei schwersten septischen Prozessen mit Reinkulturen im kreisenden Blute, bleibt stets steril. Die Behandlung erstreckte sich auf: 1. entzündliche, eitrige, infiltrative und phlegmonöse Prozesse, wie Furunkel, Karbunkel, Mastitiden, Achselhöhleneiterungen mit oft überraschend günstigen Erfolgen, kindfaustgroße

Infiltrate verschwanden schnell; 2. akute Infektionskrankheiten: Erysipel, Erysipeloid, Stomatitis, Mastitis, postoperative Pneumonie, Gelenkrheumatismus, Zystitis, Sepsis usw. Das Erysipeloid der Fleischhauer und Köchinnen schwindet sofort. Schwerste Sepsis mit Endokarditis und Metastasen ist natürlich nicht zu beeinflussen (kein Ansprechen der Reize bei vollkommener Erschöpfung); 3. chronische Infektionskrankheiten: chronische Arthritiden, Zystitis, Alveolaryporrhoe, Endocarditis lenta usw. Meist verschwinden die subjektiven Erscheinungen rasch; röntgenologisch nachweisbare Veränderungen werden sich jedoch nicht beheben lassen.

A.

Woltmann: Einige der gebräuchlichsten und mit einfachen Mitteln durchzuführenden Wurf-, Niederlege- und Zwangsmethoden. Zusammenge stellt von Vet.-Rat Dr. Curt Reinhardt. (Zu 7. Absatz Teil 2 des deutschen Veterinärkalenders 1928/29. (T. R. 1928, S. 8.)

An Hand einiger leicht verständlicher Abbildungen erläutert Verf. die von ihm angegebene und im Deutschen Veterinärkalender nur unvollkommen beschriebene Methode zum Niederlegen und Spannen von Pferden. Ferner gibt W. eine sehr einfache Methode für das Niederlegen von Schweinen an, die aber in der Arbeit nicht ganz klar erscheint. Wahrscheinlich soll es im 5. Satze des letzten Absatzes heißen: „Die beiden Ösenstricke werden um das linke Hinter- und Vorderbein des Tieres gelegt (beim Legen auf die linke Seite) und unter dem Bauch auf die rechte Seite geführt.“ Zwei auf der linken Seite des Schweines stehende Leute ziehen das Tier an den Tauen in die Höhe, so daß es mit dem Rücken auf ihre Füße fällt. Durch Daraufknien wird es am Boden gehalten, Vorder- und Hinterbeine gefesselt und auf einen Punkt fixiert. Ein dritter Mann hält das Tier an einem um den Oberkiefer gelegten Strick.

K. H. Meyer.

Nussbagg, W.: Zur Kasuistik der Knochenbrüche beim Pferde. (Aus dem Perleberger Impfstoffwerk.) (T. R. 1928, S. 19.)

Bei einem plötzlich verendeten Pferde wurden mehrere Brüche und Sprünge des 4. Halswirbels, bei welchem die Wirbelpfanne vollständig zertrümmert und der Wirbelkamm vom Wirbelkopf in seiner ganzen Länge abgesplittert war, und des 5. Halswirbels festgestellt. Der letztere war ferner mit dem 6. und 7. Halswirbel zu einem starren Knochenkörper zusammengewachsen, indem vordere und hintere Gelenkfortsätze und Wirbelbogen mehr oder weniger innig verschmolzen waren. Das Tier hatte auf Grund verschiedener vorliegender Atteste zeitweilig typische Schulterlahmheiten gezeigt, welche wahrscheinlich auf die bestehenden Veränderungen der Halswirbelsäule zurückzuführen sind. Leider kam die Vorgeschichte erst später N. zur Kenntnis, so daß, da keine klinischen Symptome einer Lahmheit bestanden hatten, auf evtl. an der Schulter bestehende Veränderungen nicht geachtet wurde. Ein von einem Nachbartier geschlagenes Pferd, das unfähig war, aufzustehen, zeigte einen Schrägbruch des Oberschenkelbeins, von welchem sich ein schräg verlaufender Längssprung um den ganzen oberen Umdreher herumzog.

K. H. Meyer.

Graf, H. und B. Hoffmann: Über Adsorption einer Gruppe biologisch aktiver Zerfallsprodukte in Colikulturen an Granulatkohle. (Aus dem Pharmakologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin. — Direktor: Prof. Dr. Hinze.) (T. R. 1927, S. 813.)

Am Fühner'schen ganglienfreien Blutegelmuskelpreparat gelang der Nachweis der in Colikulturen verschiedenen Alters vorkommenden erregenden Muskelgifte und ihrer Adsorption an die neue Form der Merck'schen Granulatkohle. Für die Versuchsreihe wurde je ein Blutegel in drei gleiche Teile zerlegt, um drei biologisch hinsichtlich Reaktionsfähigkeit gleichwertige Kontrollpräparate zu haben. Das erste Segment wurde in sterile Bouillon, das zweite in eine Bouillonkultur von Coli, und das dritte in eine gleiche Kul-

tur nach vorherigem Zusatz von 0,5 Gramm Merck'scher Granulatkohle in einem Stück und 5 Minuten dauerndem, kräftigem Schütteln eingehängt. In der sterilen Bouillon traten nur primäre vorübergehende Reizkontraktionen auf, während solche in den Colikulturen fortlaufend entstanden und in den mit Kohle behandelten Kulturen vollständig ausblieben. Diese Untersuchungen besitzen nicht nur eine theoretische Bedeutung, ist doch somit gezeigt, daß der Kohle ein hoher Wert hinsichtlich der Intoxikationsprophylaxis durch das im Uterus sehr häufig vorkommende Colibakterium zukommt.

K. H. Meyer.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Händler, O. und G. Bugge: Über einen Leberegelherd im Herzen eines Rindes. (Städtische Fleischbeschau Schlachthof Berlin. — Direktor: Dr. Schmey. Ausgeführt im Laboratorium. — Leiter: Obertierarzt Dr. Junack.) (T. R. 1928, S. 127.)

Am rechten Herzen eines schwer tuberkulösen und mit distomatösen Veränderungen in der Leber behafteten Rindes fand sich ein gesprenkelter grünlichgrauer Herd (4 : 3 cm), der 1,2 cm in die Tiefe des Myokards reichte. Der Durchschnitt zeigte zahlreiche hirse- bis hanfkorngroße, meist kugelige Knötchen, bestehend aus bindegewebiger grauweißer Randzone und trübem, krümeligem Zentrum. Obwohl Parasiten nicht mehr nachzuweisen waren, wurde derselbe als älterer Egelherd, der auf die Bohrgänge von Jugendstadien von *Fasciola hepatica* zurückzuführen ist, angesprochen. Solche Herde werden bei der Fleischbeschau öfter im Lymphknoten, vor allem aber in den veränderten Lebern gefunden. An Hand der neueren Untersuchungsergebnisse behandeln Verff. kurz die Möglichkeit der Verbreitung der Leberegel im Körper und die Fähigkeit der jüngsten Egelstadien trotz Fehlens eigentlicher Bohraparate vermöge ihrer sehr scharfen Körperhuppen umfangreiche Bohrgänge in sämtlichen Organen hervorzurufen.

K. H. Meyer.

Lewis, J. H.: Studien über den Mechanismus der Trichinellen-Infektion. II. Mitteilung: Der Einfluß des Glykogens auf die Muskelinvasion. (Aus dem Hygienischen Institut der Universität Basel.) (C. f. B. 1928, I. Abt., Orig., Bd. 107, S. 114.)

Die bei der Auswanderung der Trichinellenembryonen aus den Kapillaren in die Muskelschläuche gemachten Beobachtungen zwingen zu der Annahme, daß dieser Vorgang unter dem Einfluße einer chemotaktisch wirkenden Substanz vor sich geht. Flury nahm an, daß dem Glykogengehalt der Muskulatur eine derartige Bedeutung zukäme. Verf. konnte jedoch nachweisen, daß die in der Regel stark mit Trichinellen besiedelten Muskeln z. B. die Mäfleren viel weniger Glykogen enthalten wie die Unterschenkel. Man muß daher annehmen, daß diese Substanz eher einen negativ chemotaktischen Einfluß auf die Parasiten ausübt. Des weiteren konnte nachgewiesen werden, daß in kurzen Zeitintervallen (2—5 Tage) wiederholte Fütterungsinfektionen beim Meerschweinchen zu fortgesetzten Einwanderungen in die gleichen Muskeln führen, bis die weitaus überwiegende Mehrzahl der Fasern von Parasiten befallen ist. Ein bereits bestehender starker Invasionszustand eines bestimmten Muskels samt seinen Folgeerscheinungen (Funktionsstörung, pathologischer Stoffwechsel, Deglykogenisierung) schützt somit die noch intakten Fasern nicht vor der Einwanderung von Trichinellen aus dem Blute. Daraus folgt, daß jede noch normale Muskelfaser unabhängig von den im Gesamtmuskel ablaufenden Prozessen befähigt ist, die in der angrenzenden Kapillare vorbeipassierenden Würmchen zum Eindringen in ihr Parenchym zu veranlassen. Um den Einfluß des Zuckerstoffwechsels auf die Einwanderung der Trichinellen zu studieren infizierte Verf. mit Zucker (Glukose) gemästete Meerschweinchen und stellte sodann einen analogen Versuch mit Tieren an, die eine Vorbehandlung mit

Insulin erfahren hatten. Im ersten Falle konnte eine deutliche Verringerung der Trichinellen-Einwanderung in die quergestreifte Muskulatur festgestellt werden. Im zweiten Falle ergab sich das Gegenteil. Bestimmte Schlüsse aus diesen Beobachtungen zu ziehen ist Verf. vor Ausführung weiterer Untersuchungen nicht in der Lage. Nur soviel kann als sicher angenommen werden, daß die Wanderung der Parasiten irgendwie mit dem Kohlehydratstoffwechsel des Wirtes zusammenhängt.

Carl.

Weß, K.: Kürbiskerne als Bandwurmmittel. (M. m. W. 1928, S. 520.)

Verf. wurde während des Krieges in Ostafrika auf dieses einfache Mittel aufmerksam. Als er kürzlich selbst eine *Taenia saginata* akquirierte, versuchte er diese Kur und nahm abends und früh nüchtern 200 zerstoßene Kerne mit Milch ein, eine Stunde später zwei Eßlöffel voll Rizinusöl, worauf nach einigen Stunden der Bandwurm samt Kopf abging. Diese Behandlung war so wenig angreifend, daß Verf. den ganzen Tag seinem Berufe nachgehen konnte. Sie eignet sich daher ganz besonders für schwächliche Personen. Nach Mitteilung eines Paters in Ostafrika befindet sich die wirksame Substanz in der zarten, grauen Haut, die den Kern unter der Schale des Kürbiskernes umgibt. Dieses Häutchen darf daher beim Schälen nicht mit entfernt werden.

Carl.

Bugge, G. und G. H. Müller: Zur Ursache der Hepatitis interstitialis multiplex des Schweines (Distomatose). (Aus der Städtischen Fleischbeschau des Berliner Schlachthofes.) (B. T. W. 1928, S. 293.)

Die vorliegende, bei geschlachteten Schweinen sehr häufig nachweisbare Veränderung verdankt ihren Ursprung nach Joest der Einwanderung von Zestoden und Nematoden, nach Kitt des *Cysticercus tenuicollis*. von Ostertag sieht Askaridenstadien als Ursache an. Andere Forscher haben Distomen dafür verantwortlich gemacht. Bei der Untersuchung der Leber eines 1½ Jahre alten Schweines konnten Verff. einen Befund erheben, der zur Klärung dieser Frage beiträgt. In dem nicht vergrößerten Organ wurden nämlich neben neun Fasziolen von 12—20 mm Länge in den Gallengängen etwa 25 gelblich-weiße, in der Hauptfläche abgegrenzte Herde, die etwas über die Oberfläche hervorragten, aber auch in der Tiefe des Parenchyms gelegen waren, ermittelt. Die älteren Herde wiesen in einer Höhlung graugelbliche Massen auf, die aus sehr zahlreichen eosinophilen Zellen bestanden. Die frischen (12) setzten sich aus mehreren graublau gefärbten, senfkorngroßen, hervorragenden Partien zusammen, die an dem peritonealen Leberüberzuge von einem feinen fibrinösen Belage überzogen waren. Auf der Schnittfläche fanden sich Räume mit bräunlichen Detritusmassen, geronnenem und flüssigem Blute. In drei Präparaten aus sechs frischen Herden konnten vier junge Leberegel von 2—8 mm Länge festgestellt werden. In einem größeren Herde waren zwei junge Egel vorhanden. Diese Veränderungen werden von Joest als Hepatitis interstitialis parasitaria multiplex bezeichnet. In den durchsichtigen Egelstadien konnten die hauptsächlichsten Organe deutlich nachgewiesen werden, und auf Grund der mit 12 Seitenästen versehenen Darmschenkel wurden die Trematoden als *Fasciola hepatica* angesprochen.

Nach diesen Feststellungen wird die in Rede stehende Veränderung der Schweineleber durch junge Bohrgänge der *Fasciola hepatica* bedingt, wie Wolffhügel als erster und Frenkel angeben. Es erscheint daher zweckmäßig von einer Hepatica interstitialis distomatosa zu sprechen, da nach anderweitigen Beobachtungen der Verff. auch interstitielle Hepatitiden beim Schweine vorkommen, die auf andere Ursachen zurückzuführen sind. Darüber soll später berichtet werden.

Carl.

Bugge, G.: Über den Invasionsweg der *Fasciola hepatica* bei der Distomatose der Rinder und Schafe. (Aus der Städt. Fleischbeschau des Berliner Schlachthofes.) (B. T. W. 1928, S. 189.)

Die vorliegende, mit 14 Abbildungen auf einer Tafel ausgestattete Arbeit, beschäftigt sich zunächst mit den in der Literatur wiedergegebenen Ansichten über das fragliche Thema. Drei Einwanderungswege werden vertreten: 1. durch die Gallenwege (Leuckart), 2. von der Bauchhöhle aus durch das Peritoneum der Leber in ihr Parenchym (May, Spinola, Gerlach, Ssinitzin u. a.), 3. durch die Pfortader (Davaine, Friedberger, Küchenmeister, Lutz, Compes). In den letzten Jahren hat dieser Weg mehr Anhänger gefunden, weil durch ihn das Vorkommen von Distomenherden in sämtlichen Organen des Körpers ohne Umschweife erklärt werden kann.

Verf. hat sich in den Jahren 1925 und 1926 eingehend mit dieser Frage beschäftigt, und es ist ihm gelungen, die Parasiten in der Größe von 0,24 bis 12 mm in mehreren Organen nachzuweisen, wo sie bis jetzt nicht bekannt oder nur ganz vereinzelt angetroffen waren. Jüngste Fasziole wurden öfter und teilweise regelmäßig bei der Distomatose der Rinder und Schafe in folgenden Organen festgestellt: a) in der Leber; b) in frischen Herden in den Mesenteriallymphknoten der Rinder, in denen sie bisher nur vereinzelt von Frenkel und Schlegel beschrieben wurden; c) in den Lungen der Rinder und Schafe in kleinsten Herden, die in Form von Blutungen und etwas größeren dunkelroten Herden auftreten und die Bohrgänge und je ein junges Distomumstadium enthalten; d) in der Milz bei der Distomatose der Schafe in feinen, mehr gestreckten Bohrgängen; e) schließlich in den knotigen Hervorwölbungen unter dem unveränderten Peritoneum in der Zwerchfellmuskulatur, die der Bauchhöhle zugewendet war. Die Herde wiesen Bohrgänge in größerer Zahl und je ein kleines Distomum auf. Nach diesen Befunden muß angenommen werden, daß die Verbreitung der Egel nur auf dem Wege des großen bzw. Pfortaderkreislaufes stattfinden kann. Es spricht dafür namentlich auch das massenhafte Auftreten gleichartiger Herde in den betroffenen Organen bei Entstehung kleinster Blutungen. Die jüngsten Egelstadien bohren sich in die Darmzotten ein, gelangen von dort in die Pfortader und weiter in die Lebervenen, von dort in die Lungen, schließlich in das linke Herz und damit in den großen Blutkreislauf. Damit erklärt sich auch das Vorkommen von Fasziole in der Plazenta und im Fötus (Schlegel) sowie das vom Verf. beobachtete Auftreten der Parasiten in der Leber und den Lungen von jüngeren Kälbern. Carl.

Glietenberg, P.: Die Verknöcherungen im Gekröse des Schweines. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jahrgang, S. 301—303.) (Mit 6 Abbildungen auf 1 Tafel.)

Über das Zustandekommen und den hauptsächlichsten Sitz der Mesenterialverknöcherungen beim Schweine hat Glietenberg sorgfältige Untersuchungen, auch histologischer Art angestellt. Die Verknöcherungen bilden einen recht häufigen Befund bei Schlachtschweinen, wenn man sein Augenmerk nicht nur auf größere Knochengebilde, sondern auch auf jene kleinen beginnenden Verknöcherungen richtet, die erst im Anfang der Entstehung sind und manchmal nur histologisch nachgewiesen werden können. Die Verknöcherung nimmt meist ihren Anfang an dem Schnittpunkt, wo die Zugwirkungen der drei Gekrösblätter, die Mastdarm, Blind- und Grimmdarm verbinden, zusammenlaufen. An diesem Punkte werden durch die mechanischen Bewegungen des Darmes, durch dessen Peristaltik und den verschiedenen Füllungsgrad der einzelnen Darmteile chronisch entzündliche Vorgänge ausgelöst, die zur geweblichen Neubildung und schließlich zur metaplastischen Knochenbildung führen. Dieser Vorgang kann sich mitunter auch an mehreren Stellen des Mesenterium gleichzeitig vollziehen und beim Größerwerden der Ossifikationen durch deren Zusammenwachsen zur Entstehung einer starken Knochenplatte führen. Histologisch zeigt sich die Ausbildung der Veränderungen derart, daß nicht das Peritonäum in seiner vollen Dicke von der

Metaplasie betroffen wird, sondern lediglich dessen oberste Schichten. In der elastischen Grenzlamelle des Peritonäums (Joest) entsteht infolge des Reizes durch die genannten Zugwirkungen fibröses Knochengewebe, in dem bald der Verknöcherungsprozeß an mehreren Stellen einsetzt. Daß natürlich gleichzeitig mit dem Knochenwachstum auch Resorptionsvorgänge durch das zahlreiche Auftreten von Osteoblasten einsetzen, sei hier nebenbei bemerkt.

Edelmann.

Baum, Hermann: Zur Technik der Injektion der Lymphgefäße. (In Abderhalden, Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Abs. VII.)

Baum gibt eine Darstellung der von ihm benützten und ausgebauten Methoden der Injektion der Lymphgefäße. Er bespricht die Injektionsmassen oder Injektionsflüssigkeiten (Quecksilber, Gerota'sche Injektionsflüssigkeit, Ultramarinblau und Wasserstoffsuperoxyd) und die Injektionsapparate und -Spritzen und faßt das Ergebnis seiner Erfahrungen in dieser Beziehung in den Satz zusammen, daß der Erfolg der Injektion der Lymphgefäße durch Einstich weniger abhängig ist von der Art der Injektionsflüssigkeit und der Art der Injektionsapparate, als vielmehr von Übung und Geschicklichkeit und der richtigen Bewertung der Art des Gewebes bzw. Organs, dessen Lymphgefäße injiziert werden sollen, und daß das Optimum des anzuwendenden Druckes für jedes Organ ausprobiert und eingeübt werden muß; dazu kommt die Erfahrung, die uns die Berücksichtigung manches kleinen, anscheinend nebensächlichen Punktes von Bedeutung erscheinen läßt. Er schildert weiter die Besonderheiten der Technik der Injektion der Lymphgefäße weicher Organe (z. B. Muskeln, Harnblase, Fett), der Lymphgefäße der Knochen und Knorpel, der Pleura, des Zwerchfells, Peritoneum, der Mandeln, des Darmes, der Gelenke, der Sehnencheiden, der Nasenhöhlen-schleimhaut, der Nerven und widmet zum Schluß einen verhältnismäßig breiten Raum der Besprechung der von Magnus begründeten Methode der Injektion der Lymphgefäße mit Wasserstoffsuperoxyd. Seine Erfahrung geht dahin, daß man mit der Methode Magnus Lymphgefäße wohl kaum in einwandfreier Weise wird feststellen, noch weniger erforschen können, daß man sehr oft aber mit der Methode Magnus die Einstichinjektion wird unterstützen und deren Erfolge wird fördern können. Autoreferat.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Stauffacher, H.: Der Maul- und Klauenfeuchterreger. (Rev. suisse de zool. 1927, Bd. 34, H. 2, S. 207—216.)

Die vorliegende Arbeit bedeutet eine Wiederholung der bereits im Jahre 1913 bekannt gegebenen Auffassung des Verf., daß nämlich der Erreger der Maul- und Klauenfeuche nicht als ultravisibles Virus, sondern als eine Protozoenart (Leishmania) anzusprechen sei. Eine in der Schweiz mit der Nachprüfung betraute Kommission kam im Jahre 1915 zu einem ablehnenden Ergebnis. Der Verf. ist auch jetzt nicht in der Lage, seine Behauptung über die Natur des Maul- und Klauenfeuche-Erregers zu beweisen. H.

Lebailly, Ch.: Expériences concernant le virus aphteux. (Beobachtungen über das Maul- und Klauenfeuche-Virus.) (Rev. vétérin. et Journ. de med. vétérin. et de zootechn. 1927, Bd. 79, Sept.-H., S. 516—517.)

Die Lösung der Aufgabe, den Erreger der Maul- und Klauenfeuche künstlich zu züchten, steht noch aus. Durch die Pluralität des Maul- und Klauenfeuchevirus wird das Problem der aktiven Immunisierung erheblich schwieriger gestaltet. Über das Vorhandensein des Erregers im Tierkörper wird mitgeteilt, daß während des Fieberstadiums das Virus im Blut, im Harn, in der Milch und in der Tränenflüssigkeit gefunden wird. In gefrorenem Milieu aufbewahrtes Virus bleibt 6—8 Monate infektiös. H.

Galli-Valerio, B.: *Symptômes rabiformes non rabiques chez les carnassiers.* (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1928, Bd. 70, S. 72.)

Tollwutsymptome kommen gelegentlich auch bei tollwutfreien Fleischfressern vor, namentlich wenn sie Parasiten beherbergen. Gelegentlich findet man auch bei Staupe-Chorea Anklänge an Tollwutsymptome. Ein Hund, der einen *Ctenocephalus canis* im Gehirn hatte, zeigte ein außerordentlich ähnliches Erregungsbild. Nicht selten findet man auch bei parasitären Ohrerkrankungen (*Chorioptes auricularum* var. *canis*, *cati*, *vulpis*) starke Apathie mit leichter Erregbarkeit und Angriffslust. Die in den Nasengängen der Fleischfresser wohnende *Linguatula rhinaria* verursacht auch Erscheinungen, die an Wut erinnern können. (Symptome des Reizschmerzes, Scheuern mit den Pfoten usw.). Die *Linguatula* ist in der Schweiz bei Hunden häufig, bei Rindern im Kanton Bern zu 8,48 Prozent gefunden. Auch Endoparasiten können, sei es auf rein reflektorischem Wege oder aber durch ausgeschiedene Toxine zu zerebral bedingten Erregungen führen, z. B. junge Hunde durch den *Ascaris canis*. Auch bei Invasionen von *Uncinaria* und *Eustrongylus* hat Verf. ähnliche Wirkungen beobachtet. Die *Filaria immitis*, die Taenien, der in der Schweiz mehrfach gefundene, nicht häufige *Mesocostoides lineatus* und *Litteratus* können bei Hund und Fuchs starke Angriffslust hervorrufen, in einem Fall fiel ein solcher behafteter Fuchs den Menschen an. Man fand bei ihm nichts weiter als starke Gehirnhyperämie. Die Morphologie dieser letztgenannten Parasiten wird kurz geschildert. — Man sollte daher im gegebenen Falle auch an die Möglichkeit einer Pseudotollwut denken, und das Tier zur parasitologischen Untersuchung einliefern. Dabei wird man natürlich die Möglichkeit der echten Tollwut beachten (Vorichtsmaßnahmen bis zur Sicherstellung des histologischen und Übertragungsergebnisses auf das Kaninchen). H. Graf.

Baermann und Zuelzer: *Über die Ätiologie der Weißchen Krankheit.* (Arbeiten aus dem Reichsgesundheitsamt 1928, 59. Bd., S. 451.)

Verff. suchten die Frage der Identität der Wasserspirochäten mit der Weißchen Spirochaeta *icterogenes*, syn. *Spirochaeta icterohaemorrhagica* weiter zu klären. Sie arbeiteten insgesamt mit 118 Stämmen verschiedenster Herkunft. Spirochäten vom Typ. der Weil-Spirochäte wurden praktisch fast überall gefunden, in den reinen Flüssen, in verschlammten und stark verunreinigten Tümpeln, Abzugsgräben, Regenlöchern usw. Ein Endemie auf der Pflanzung Sarang-Gitting war für die Untersuchungen besonders geeignet. Die Reinigung unreiner Primärkulturen wurde durch Meerfischweinchenpassage versucht. Eine serologische Differenzierung der einzelnen Spirochätenarten ist nicht möglich. Verff. stellten fest, daß beliebige, irgendwo aus dem Wasser gezüchtete Spirochäten von dem Typus der Spirochaeta *icterogenes* infektionstüchtig sind. Der Mensch ist am empfindlichsten gegenüber einer Infektion im Gegensatz zum Meerfischweinchen, Ratte, Maus, da geringste Quantitäten sowie ein relativ kurzer Kontakt hierzu genügt. Auf Grund ihrer klinischen und experimentellen Untersuchungsergebnisse sind Verff. davon überzeugt, daß alle durch Spirochaeta *icterogenes* verursachten Erkrankungen einer klinischen Einheit, der Weißchen Erkrankung angehören, und daß die diese klinische Einheit erzeugenden Spirochäten mit den Wasserspirochäten und untereinander identisch sind. Jede Bezeichnung wie Spiroch. pseudointerogenes, pyrogenes usw. muß daher fallen, da nur der Name *Spirochaeta icterogenes* - Uhlenhuth syn. *Spirochaeta ictero-haemorrhagica* - Inada als allein berechtigter anzusprechen ist. Die Therapie besteht neben allgemeiner klinischer Behandlung der Organsymptome vorläufig nur in einer Serumtherapie (polyvalentes, aus möglichst vielen Stämmen hergestelltes Pferdeantiserum). Berge.

Herrmann, O.: *Über einmalige obligatorische Schutzimpfung der Hunde gegen Tollwut.* (Katheder der Bakteriologie am Staatsinstitut für ärztliche Fortbildung in Kasan.) (C. f. B. 1928, I. Abt., Orig., Bd. 107, S. 84—94.)

Die von einer ganzen Reihe von Autoren veröffentlichten Arbeiten über Erzielung eines Impfschutzes gegen Tollwut durch einmalige Injektion von antirabischem Impfstoff werden vom Verf. auf Grund eigener Versuche einer Kritik unterzogen, die zu folgenden Schlüssen gelangt:

Das frische fixierte Virus ist für einmalige subkutane Schutzimpfungen wenig geeignet, da sogar große lebensgefährliche Dosen bei einmaliger subkutaner Einverleibung keinen genügenden Schutz gegen nachfolgende schwere Infektion bieten können. Sogar bei intramuskulärer Infektion, bei der nur ein Teil der Kontrolltiere zugrunde ging, konnten nicht alle Impflinge gerettet werden (Versuche an Kaninchen, Meerfischweinchen und weißen Mäusen). — Weiße Mäuse scheinen, im Gegensatz zu der allgemeinen Annahme, bei subkutaner Impfung in die Seiten und nicht in die Nähe der Schwanzwurzel, wo wahrscheinlich wenigstens teilweise anstatt subkutan intramuskulär infiziert wird, der Wut gegenüber nicht empfindlicher zu sein als andere Versuchstiere. — Das abgeschwächte Virus fixe ist weder gefahrlos noch von großer Wirkung bei einmaliger subduraler Immunisation. — Das getrocknete Virus „Lyssin“ von Mießner und Baars kann nicht als gefahrlos angesehen werden und bietet dabei bei einmaliger subkutaner Impfung einen verhältnismäßig geringen Schutz gegen Tollwut.* — Man müßte deshalb, um Impflyssa auf jeden Fall vorzubeugen, bei subkutanen prophylaktischen Schutzimpfungen stets nur eine abgetötete antirabische Vakzine anwenden. — Einmalige oder auch mehrmalige, aber nicht genügend lange dauernde Impfungen mit einer abgetöteten Vakzine „58—60“, die, wie meine früheren Versuche gezeigt haben, ebenfögt immunisiert als frisches fixiertes Virus, konnten keinen genügenden Schutz gegen subdurale Infektion mit fixem oder Straßenvirus bieten, ungeachtet ob präinfektionell oder postinfektionell mit verhältnismäßig kleinen, mittleren oder sehr großen Dosen, subkutan, intramuskulär oder subdural immunisiert wurde. — Somit ist zu sehen, daß einmalige subkutane Impfungen mit beliebigem Material überhaupt keinen großen Schutz gegen Lyssa liefern können. Es ist aber vielleicht immerhin besser, Hunde präinfektionell einmal als keimmal zu impfen. Noch besser wäre es, dieselben etliche Male mit Intervallen von 4 bis 7 Tagen zu impfen. — Jedenfalls aber müßte man darauf gefaßt sein, bei der Einführung der obligatorischen Schutzimpfung der Hunde auf ungeheure, wahrscheinlicher sogar auf unüberwindliche Schwierigkeiten zu stoßen. — Man würde überhaupt viel eher die Epizootie der Tollwut liquidieren, wenn man keine Mühe und Kosten scheuen würde, um alle üblichen sanitätspolizeilichen Maßregeln, die sich schon von jeher als praktisch bei der Bekämpfung der Tollwut erwiesen haben, in Zukunft mit möglichster Strenge durchzuführen. Dieselben dürften ja auch dann nicht vernachlässigt werden, wenn man Massenschutzimpfungen der Hunde vornehmen würde, da widrigenfalls letztere eher Schaden als Nutzen verursachen würden. Carl.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Kratschmaroff, B.: *Die Büffelzucht in Bulgarien.* (In.-Diss. Berlin; ohne Jahr.)

Aus den Ausführungen und Zahlen ist zu entnehmen, daß im Durchschnitt Einnahme und Ausgabe bei dem Büffel größer ist als beim Rinde, und daß der durchschnittliche Gewinn bei dem Büffel kleiner ist als beim Rinde. Gegenüber

* Die durch kein eigenes Experiment bewiesene Vermutung von Herrmann trifft nicht zu. Das Lyssin ist gefahrlos und hinterläßt eine mindestens 13 Monate anhaltende hohe Immunität. Eine Richtigstellung der falschen Auffassung des Autors wird demnächst im Zentralblatt für Bakteriologie erscheinen. Mießner u. Baars.

den Behauptungen, daß der Büffel in Bulgarien nutzbarer sei als das Rind (mehr Arbeitsleistung, mehr Milch, anspruchsloser betr. Nahrung) ist zu berücksichtigen, daß bei gleichen Arbeitstagen das Rind in Bulgarien entsprechend mehr geschont wird als der Zugbüffel, denn das Zugrind wird im allgemeinen gleichzeitig als Masttier ausgenutzt; die Arbeitsleistung eines Büffels ist allerdings bedeutend größer (Zugkraft eines Büffelpaares = derjenigen dreier Rinderpaare). Der durchschnittliche Jahresmilchertrag der Büffelkuh ist größer als die der Rinderkuh. Eine planmäßige Büffelmast besteht bis jetzt in Bulgarien nicht. Man dachte besonders bis zu der Zeit nach dem großen Kriege an keine Zuchtwahl, man glaubte, daß dieses schwarze Vieh keine bessere Pflege brauche, daß es unverbesserlich sei und seine Anspruchslosigkeit bezüglich der Nahrung im Grunde seines Wesens läge. Jetzt denkt man schon anders über diese Fragen und Bulgarien ist ein Land, in dem alle Bedingungen für die Entwicklung der Büffelmast bis zu einem höheren Grade vorhanden sind (Verbesserung der Pflege, Bevorzugung als Milchtier, Bedeutung der Fleischleistung für die arme Bevölkerung). Es gibt Büffelmastkühe, deren tägliche Milchleistung in der ersten Zeit der Laktation über acht Liter beträgt. In den Etat sind von staatlicher Seite seit 1922 zur Förderung der Büffelmast Mittel eingestellt. Die Vorzüge des Büffels sind demnach: Gute Milchleistung der Büffelkuh, Tauglichkeit des Büffels als Arbeitstier, billiger Preis des Büffelfleisches, große Anspruchslosigkeit in Bezug auf Futter. Alle diese Eigenschaften unterstützen die Behauptung, daß bei planmäßiger Büffelmast auf einen lohnenden Erfolg in kurzer Zeit zu rechnen ist, zumal die Grundlagen des wirtschaftlichen Lebens in Bulgarien hauptsächlich die Erzeugnisse der Landwirtschaft und Tiermast bilden. A.

Giessen: Beiträge bzw. Beobachtungen über Torsio uteri. (T. R. 1928, S. 322.)

G. empfiehlt die Reposition durch manuelle Drehung des Kalbes am stehenden Muttertier vorzunehmen. Nachdem die Hand sich vorsichtig durch die spiralig zusammengedrehte Zervix gebohrt, ergreift sie, evtl. erst nach vorsichtigem Durchstoßen der Eihäute mit dem Finger den Fötus und sucht durch vorsichtiges Hin- und Herdrehen die Drehrichtung zu ermitteln, in welcher das Kalb dann gedreht wird. Diese Art der Reposition geht rascher als beim Wälzen vor sich und führt gewöhnlich in längstens 2—3 Minuten zum Ziel. Gebärmutterrisse im Anschluß an Torsio uteri führt Verf. auf mangelhaftes Rückdrehen der Torsio zurück.

K. H. Meyer.

Schultz, O. K. und G. Maurmann: Über Fortpflanzung und Aufzucht. (Zschr. für Tierzüchtung und Zuchtungsbiologie, Bd. XI, 1, S. 47.)

Zur Klärung der Frage über Fortpflanzung und Aufzuchtmöglichkeit bei unzureichender Diät stellten die Autoren an acht jungen Ratten, die zu je einem Paare zusammengestellt waren, Versuche an und zwar sollte einerseits Fruchtbarkeit und Laktation, andererseits Aufzucht der Jungen von den sieben Versuchsparen sowie vergleichsweise von den drei ersten Generationen festgestellt werden. Die volle Ausführung der Versuchsdauer wurde durch interkurrente Todesfälle und durch die Unmöglichkeit der Aufzucht der späteren Generationen von einzelnen Paaren verhindert. Als Ergebnis der Beobachtungen konnte festgestellt werden, daß durch die nach der Vitaminkomponente und dem Fettgehalt hin unzureichende Ernährung der Muttertiere die Fertilität kaum beeinflusst, daß die Zahl der geborenen Jungen in der gleichen Zahl der Würfe nahezu die gleiche ist. Dagegen ist die Laktation von diesen Faktoren sehr erheblich abhängig. Das Auffressen der Jungen ist ohne weiteres darauf zurückzuführen, daß den Muttertieren zur Bildung der notwendigen Milchmenge nicht die entsprechenden Nahrungskomponenten zur Verfügung stehen. Zusammenfassend sagen die Autoren: Durch eine Grunddiät bestehend aus Mais, Weizen-

kleber, Salzmischung und sterilisierter Milch wird die Fertilität wenig, die Aufzuchtmöglichkeit der Jungen dagegen weitgehend beeinflusst. Eine Zugabe von ultraviolett bestrahltem, stearinhaltigem Milchlaktat kompensiert die Mängel der Grunddiät. Die Annahme der Existenz eines besonderen, die Fortpflanzung beeinflussenden Vitaminerscheint berechtigt, endgültige Klärung dürften erst umfangreiche Nachprüfungen bringen.

Schmey.

Ziemann: Zur Therapie des seuchenhaften Aborts der Rinder mit Kollargol bzw. ähnlichen Präparaten. (B. T. W. 1928, S. 49.)

Nach den Untersuchungen von Zeller bestehen zwischen dem Erreger des Maltafiebers und dem des infektiösen Aborts der Rinder sehr enge Beziehungen. Genannter Autor konnte durch Verfüttern bzw. durch Verimpfen von Kulturen des *Micrococcus melitensis* bei Schafen, Kaninchen und Meerfischweinen Verwerfen hervorgerufen.

Verf. hat nun bei Fällen von Maltafieber durch endovenöse Injektion von Kollargol ausgezeichnete Erfolge erzielt. Die vorher monatelang erfolglos behandelten Patienten genasen nach Injektion von 2—4 ccm einer 2prozentigen Lösung des Mittels. Schon vor Jahren sprach auf Grund dieser Beobachtung Verf. die Ansicht aus, daß Kollargol auch bei der Behandlung des infektiösen Aborts der Rinder sich bewähren werde. Da diesbezügliche Versuche seither jedoch nicht angestellt wurden, so nimmt er Gelegenheit, noch einmal auf die vorliegende Therapie hinzuweisen.

Carl.

Otten: Die „Chlorofunk“-Probe ist für die Bekämpfung des Gelben Galt unzuverlässig. (Aus dem Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz in Bonn.) (T. R. 1927, S. 969.)

Das Prinzip der Chlorofunkprobe besteht in dem Nachweis von vermehrtem Chlorgehalt in der Milch euterkranker Tiere, der nach Zusatz von Reagenzien an einem Umschlag der Milchfarbe in eine rötliche oder rote erkannt wird, während gesunde Milch vollkommen weiß bleibt. Der salzige Geschmack der Galtmilch ist auf vermehrten NaCl-Gehalt zurückzuführen, so daß durch Chlorofunk eine rötliche Farbe angezeigt wird. Es kommt aber darauf an, bereits geringgradig erkrankte, scheinbar noch gesunde Tiere bei der Galtbekämpfung herauszufinden. Hier jedoch arbeitet die Chlorofunkprobe nicht mit der nötigen Sicherheit. Bei 46 Milchproben eines galtkranken Bestandes gab dieselbe 8—17 Prozent Fehldiagnosen. Abgesehen vom Gelben Galt zeigte bei dieser Untersuchung der Chlorofunk von neun krankhaft veränderten Milchproben nur vier = 44 Prozent an.

K. H. Meyer.

Geflügelkrankheiten.

Seifried, O.: Ein neues Instrument (Spritzentrephe) zur kutanen Schutzimpfung gegen Hühnerpocken und Hühnerdiphtherie. (Aus dem Veterinärhygienischen und Tierseucheninstitut der Landesuniversität Gießen.) (B. T. W. 1928, S. 296.)

Zur Ausführung der Impfung gegen die fragliche Krankheit haben de Blieck und van Heelsbergen eine Vaccino-Trephe konstruiert, mit der der Impfstoff in die Haut eingegeben wird, nachdem an der betreffenden Stelle Federn ausgezogen worden sind. Diefem Instrument haftet jedoch der Nachteil an, daß es wiederholt in dem Impfstoff eingetaucht werden muß, was bei Massenimpfungen nicht nur zeitraubend, sondern auch wenig wirtschaftlich ist. Auch besteht keine Möglichkeit, den Impfstoff oft nur einigermaßen zu dosieren. Behufs Abstellung dieser Nachteile hat Verf. die „Spritzentrephe“ konstruiert, die von Hauptner in Berlin angefertigt wird (Abbildung). Ihr Vor-

teil besteht darin, daß der Impfanfatz, der zum Einreiben an seinem unteren Ende auf einer Platte im Durchmesser von 1 cm 12 kurze Zähne trägt, in Verbindung mit einer zur Aufnahme des Impfstoffes bestimmten Spritze gebracht worden ist. Zum Aufziehen des Impfstoffes dient ein Saugrohr, das zu diesem Zwecke an Stelle des Impfstückes auf die Spritze aufgeschraubt wird. Der gradierte Kolbenstiel ist mit einer verstellbaren Schraube versehen, wodurch einem sparsamen Verbräuche und einer genauen Dosierung des Impfmateri als Rechnung getragen wird. Mit einem Kubikzentimeter können 10—15 Hühner geimpft werden.

Die Spritze wird mit 2 ccm und 5 ccm Inhalt hergestellt, je nachdem es sich um die Impfung kleinerer oder größerer Bestände handelt. Bei der präventiven Impfung gefunder Bestände ist es möglich, mit einer Spritze und einem Impfanfatz auszukommen. In infizierten Beständen muß jedoch unter allen Umständen vermieden werden, daß das Virus von den kranken Tieren auf die noch gefunden mit dem Instrument übertragen wird. Zu diesem Zwecke muß jedes einzelne Tier auf verdächtige Krankheitsercheinungen untersucht werden, und es werden alsdann derartige Hühner isoliert und nach den gefunden geimpft. In ganz großen Beständen, wo eine Trennung nicht möglich ist, empfiehlt sich die Impfung der gefunden und kranken Tiere mit je einem besonderen Instrument. Das für letztere bestimmte ist behufs Verhütung von Verwechslungen mit einem roten Ring versehen.

Carl.

Verschiedene Mitteilungen.

Deutscher Akademischer Assistentenverband.

10. Vertretertag in Breslau (August 1928).

Fast alle Ortsgruppen und Fachgemeinschaften des Verbandes hatten zur Tagung Vertreter entsendet. Den aus Österreich und Danzig erschienenen auslandsdeutschen Vertretern war es eine große Freude, ihren reichsdeutschen Kollegen die Grüße von der südlichen und nördlichen Ostmark zu überbringen. Die Tagung wurde eröffnet durch eine Festsitzung in der prächtigen Aula Leopoldina der Schlesischen Friedrich - Wilhelm - Universität, bei der der Verband u. a. den Rektor der Universität, Geheimrat Prof. Dr. Wollenberg und den Rektor der Technischen Hochschule Prof. Dr. Gottwein, ferner den Universitätskurator, den Staatskommissar der Hochschule, Regierungspräsident Dr. v. Gröning, Stadtrat Landsberg und Prof. Dr. v. Auer, als Vertreter der Stadt Groß-Breslau, sowie Vertreter der Presse und zahlreiche Breslauer Mitglieder begrüßen konnte. Universitätsprofessor Dr. Brugsch-Halle hielt die Festrede über das Thema „Die Stellung der medizinischen Wissenschaft im Rahmen der universitas litterarum“. Herzliche Worte fand Magnifizenz Wollenberg, der dem Verbands für die Zukunft weitere gute Erfolge wünschte zum Wohle der Wissenschaft und damit des Deutschen Reiches. Der Abend vereinigte im Saale der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur alle Teilnehmer der Festsitzung wieder zu einem Festkommers, in dessen Verlauf Magnifizenz Gottwein freundlichste Worte an den Verband richtete. Nach einer am folgenden Tage stattfindenden Führung, die den versammelten Vertretern aus allen Teilen des Reiches die Schönheiten Groß-Breslaus in kulturhistorischer Beziehung zeigte, begrüßte in der imposanten Jahrhunderthalle als Vertreter des Magistrats Prof. Dr. v. Auer die Teilnehmer. Die auf mehrere Tage verteilten Plenar- und Kommissionsitzungen hatten eine außerordentliche Fülle von Stoff zu bewältigen. Die Leitung der Verhandlungen lag wie beim vorjährigen Vertretertag in den bewährten Händen der Dr. Stoklossa-Breslau und Dr. Diemer-Erlangen. Gegenstand der Beratung war in der Hauptsache die äußere Stellung des wissenschaftlichen Assistenten im Verband der Hochschule und des Staates. Es ergab sich aus den Berichten der Landesverbandsvorsitzenden, daß die fachlich unbegründete Gliederung des Assistentenstandes (planmäßige, außerplanmäßige, ordentliche, außerordentliche, Hilfsassistenten, gehobene Assistenten usw.) noch immer fortbesteht. Damit hängt auch die unbefriedigende, teilweise sogar unwürdige Befoldung der Hochschulassistenten zusammen. Zwar wurden in einzelnen Ländern bemerkenswerte Fort-

schritte erzielt, so z. B. in Bayern und Hessen durch gesetzliche Regelung der Assistentenbezüge, die bisher nur durch einseitige Verordnung der Regierung geregelt waren. In materieller Beziehung dagegen sind fast von allen Landesverbänden lebhaft Klagen laut geworden. Die Anfangsbezüge der wissenschaftlichen Assistenten mit abgeschlossener akademischer Berufsausbildung liegen mancherorts weit unter den Anfangsbezügen der anderen Staatsbeamten mit akademischer Vorbildung und entsprechen kaum dem Einkommen eines Anwärters auf den Volksschuldienst (Hilfsassistenten in Bayern!); die Gehaltsvorrückung der älteren Assistenten ist andererseits begrenzt, was wiederum eine unbillige Zurücksetzung gegenüber den anderen höheren Staatsbeamten bedeutet, die umso ungerechter wirkt, als die akademischen Assistenten keine unkündbare und pensionsberechtigte Stellung haben. Zum mindesten aber muß gefordert werden, daß die positiv-rechtliche Befoldungsregelung restlos durchgeführt wird: Die Aufteilung der für eine planmäßige Stelle bestimmten Befoldungen auf mehrere vollbeschäftigte Assistenten, wie das leider öfters vorkommt, wird unter allen Umständen verworfen. Die Berufsvertretung der wissenschaftlichen Assistenten wird im Zusammenwirken mit den zuständigen Spitzenorganisationen weiterhin daran arbeiten, daß die äußere Stellung des Assistenten so ausgestaltet wird, daß seine Arbeit im Dienst der Wissenschaft nicht beeinträchtigt wird. Sie erwartet dabei wohlwollendes Entgegenkommen der Regierungen und tatkräftige Unterstützung durch die Parlamente.

11. Deutscher Studententag in Danzig.

Auf nach Danzig! Dies war die Losung der Vertreter der Studentenschaft des gesamten deutschen Sprachgebiets in der letzten Julihälfte. Auf zu unserer alten westpreussischen Provinzial-Hauptstadt, aber auch auf zu ersten Beratungen über die Zukunft unserer großen deutschen Studentenschaft. Wohl nie sind die Vertreter mit größerer Spannung zum Studententag gefahren, als gerade in diesem Jahre. Steht und stand doch noch die gesamte Studentenschaft im Banne der Ereignisse des 30. November 1927.

Bereits in Berlin traf sich eine große Anzahl von Vertretern aus allen Himmelsrichtungen, um gemeinsam die Fahrt über Swinemünde nach Zoppot bzw. Danzig anzutreten. Nach einer schönen Nacht auf der Ostsee legte unser Dampfer „Hansestadt Danzig“ in der Frühe des 27. Juli unter den Klängen des Deutschlandliedes am Steg in Zoppot an. Eine große Anzahl Kurgäste und Danziger Bürger hatte sich bereits in der frühen Morgenstunde zur Begrüßung eingefunden, und sie legten dadurch ein beredtes Zeugnis ab dafür, daß sie sich nach wie vor, trotz aller Mühsal und Bedrängnis, stets eins fühlen mit ihren Brüdern im Deutschen Vaterlande. Nach einem kleinen Frühstück auf der Terrasse des Kurhotels und nach einer kurzen Begrüßung durch die Kurverwaltung und die Stadt Zoppot ging es in die Quartiere, die von der Danziger Bürgerschaft lebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt waren.

Gegen 12 Uhr hatten sich sämtliche Vertreter in der Aula der Technischen Hochschule in Danzig versammelt, und der 1. Vorsitz der Deutschen Studentenschaft, cand. jur. Schmadel, eröffnete den 11. Deutschen Studententag.

Er konnte eine Reihe hervorragender Ehrengäste begrüßen u. a. den Rektor der Technischen Hochschule in Danzig, Prof. Dr. Stremme, ferner die Prof. Dr. Glimm-Danzig, Dr. Kalähne-Danzig und Dr. Ssymank-Göttingen. Herzlichen Dank sprach er dem Rektor der Technischen Hochschule aus für die dem Studententag in der Hochschule gewährte Gastfreundschaft. Nach einigen Worten der Begrüßung durch den Herrn Rektor begann sodann die eigentliche Tagung.

Will man auf den Verlauf der Tagung näher eingehen, so scheidet man die Veranstaltung am besten in die drei Gruppen: Voll Sitzungen, Ausschusssitzungen und Rahmenveranstaltungen. In den ersten Voll Sitzungen gaben die Vertreter des Vorstandes der Deutschen Studentenschaft Bericht über die Geschehnisse und Arbeiten im letzten Jahre unter besonderer Berücksichtigung der Ereignisse des 30. November 1927 und der für die Deutsche Studentenschaft hieraus entstandenen Folgen. Besonders interessant war das Referat des 1. Vorsitzers. Er stellte als den Zweck der hochschulpolitischen Betrachtungen des Danziger Studententages hin, einzugehen auf die gegenwärtige Gestaltung der Beziehungen zur Hochschule und zu den Unterrichtsverwaltungen und auf die Lage in der Studentenschaft selbst. Ausgehend von der Gründung der Deutschen Studentenschaft im Jahre 1919, zeichnete er noch-

mals in knappen Zügen das Wollen und Wirken der Deutschen Studentenschaft bis zum 30. November 1927. An diesem Tage kam es an den preußischen Hochschulen zur Abstimmung über das neue vom Kultusministerium vorgeschlagene Studentenrecht. Die Studentenschaft hat gesprochen, sie hat das neue Studentenrecht abgelehnt, da es mit der Zielsetzung der Deutschen Studentenschaft nicht vereinbar war. Die Abstimmung der Studentenschaft vom 30. November bedeutet also, daß die Studentenschaften unter Bejahung des Begriffes der studentischen Selbstverwaltung das Studentenrecht abgelehnt haben, weil es die Voraussetzungen für die studentische Selbstverwaltung nicht erfüllte. Die Studentenschaften haben jedoch in keiner Weise ihren Rechtsanspruch auf staatliche Anerkennung in einer Form, die den Grundsätzen ihrer Arbeit entspricht, aufgegeben. Diese Forderung auf staatliche Anerkennung bleibt auch in Zukunft bestehen, da die studentische Selbstverwaltungsarbeit im Rahmen der Aufgaben der Hochschule im Interesse der Gesamtheit der Studierenden geleistet wird. Bis zur Durchsetzung dieses Rechtsanspruches führt die Studentenschaft in Preußen ihre Arbeit in Form freier Organisationen weiter. Nach einer recht lebhaften Diskussion wurde schließlich folgender Antrag des Vorstandes einstimmig angenommen:

„Der 11. Deutsche Studententag in Danzig dankt den preußischen Studentenschaften für ihre feste Haltung, die sie in den Kämpfen um das preußische Studentenrecht, insbesondere durch die Abstimmung vom 30. November 1927, bewiesen haben.“

Der Studententag steht auf dem Standpunkt, daß durch die Ablehnung der Staatsministerialverordnung vom 23. September 1927 der Anspruch auf staatliche Anerkennung nicht aufgegeben ist.

Inzwischen aber ist die Studentenschaft entschlossen, die studentische Selbstverwaltung in Preußen auch ohne diese Anerkennung fortzusetzen. Die auf dem föderativen Gedanken aufgebaute Würzburger Satzung, welche die unverrückbare Grundlage für den großdeutschen Zusammenschluß der Studentenschaft ist, schließt jeden Druck auf die auslandsdeutschen Studentenschaften aus, ihren Aufbau zu ändern.“

Zwischen den einzelnen Vollsitzungen tagten die Ausschüsse, so z. B. der Rechts-, Verwaltungs-, Organisations-, Auslands-, Wirtschafts-Ausschuß und der Ausschuß für Leibesübungen. In diesen Ausschüssen wurde wertvolle Kleinarbeit geleistet. Nach den Berichten der Amtsleiter und Vertreter der einzelnen Hochschulen und auf Grund verschiedener Anregungen wurden die Richtlinien ausgearbeitet, nach denen die Deutsche Studentenschaft im kommenden Jahre ihr Programm abwickeln und erledigen soll. Die Richtlinien wurden in Form von Anträgen dem Plenum zur Abstimmung vorgelegt. Sie wurden durchweg einstimmig angenommen. Auf die Anträge näher einzugehen, dürfte an dieser Stelle zu weit führen.

An Rahmenveranstaltungen sind zu erwähnen ein Gartenfest im Danziger Schützenhaus und zwei Fest Sitzungen, an denen zahlreiche prominente Persönlichkeiten teilnahmen. Es wurden dabei u. a. Vorträge gehalten über die Themata: „Der großdeutsche Gedanke als mitteleuropäisches Raumproblem“, „Ostdeutsche Schicksalsfragen“, „Danzigs Geschichte und Baukunst“. Ferner fand statt eine Ehrung unserer im Weltkriege gefallenen Kommilitonen. Hierbei legte der 1. Vorsitzende namens der Deutschen Studentenschaft einen Kranz vor der Gedenktafel im Lichthof der Technischen Hochschule nieder. Sodann ist noch anzuführen ein Empfang durch den Senat der Technischen Hochschule und den Senat der Freien Stadt Danzig. Als Abschluß fand dann eine Fahrt durch Westpreußen statt, wobei man so recht die schlimmen Auswirkungen des Schandvertrages von Versailles in unserem schönen Westpreußen feststellen konnte. Diese Eindrücke hat hinterher die Fahrt durch den polnischen Korridor gewiß nicht mindern können. So fand der 11. Deutsche Studententag in Danzig seinen Abschluß.

Interessant dürfte für die Tierärzte und besonders für alle, die früher in Hannover studiert haben, die Feststellung sein, daß in Preußen gerade an der Tierärztlichen Hochschule Hannover der Gedanke der Deutschen Studentenschaft am meisten blüht. Dies geht schon allein aus der Tatsache hervor, daß von der Gesamtstudentenschaft nicht weniger als 99,7 Prozent der Deutschen Studentenschaft angehören. Fürwahr ein glänzendes Ergebnis, aber auch zugleich ein Beweis von dem guten Geiste, der an unserer alma mater herrscht. Möge es so bleiben! Wenn nun im nächsten Jahre der 12. Deutsche Studententag — wie vorgesehen ist — in unserer Mufentstadt steigt, dann werden auch hoffent-

lich viele ehemalige Studierende wieder — wie in diesem Jahre zur Hochschul-Jubelfeier — den Weg zur Stadt ihrer alma mater finden, um durch ihre Gegenwart zu dokumentieren, daß auch sie nach wie vor feststehen zur Deutschen Studentenschaft. Darum soll im nächsten Jahre die Parole lauten: „Auf zum 12. Deutschen Studententag nach Hannover“.

Artur Thiele, cand. med. vet.

1. Vorsitzender der Deutschen Studentenschaft der Tierärztl. Hochschule Hannover.

Dritter internationaler Kongreß für Ziegenzucht Brüssel 1930.

Unter den Auspizien des belgischen Landwirtschaftsministeriums wird im Jahre 1930 in Brüssel der dritte internationale Ziegenzuchtkongreß stattfinden. Er wird unter Mitwirkung des Verbandes belgischer Ziegenzuchtgenossenschaften vom internationalen Ziegenzuchtverbande veranstaltet. Die Tagung wird mit den zwei großen Ausstellungen zusammenfallen, welche anlässlich der hundertjährigen Unabhängigkeit Belgiens in Antwerpen und Lüttich abgehalten werden. Als Verhandlungsgegenstände sind vorgesehen: 1. Abteilung: Züchtung: a) Die praktische Durchführung und die Ergebnisse der Milchleistungsprüfungen in der Ziegenzucht. b) Auswahl, Aufzucht und Zuchtbenutzung der Zuchtböcke. 2. Abteilung: Ziegenhaltung: a) Neuere Erfahrungen und Forschungen über die Ziegenfütterung. b) Stall und Stallhaltung. 3. Abteilung: Krankheiten der Ziege: a) Ergebnisse der neueren Forschungen über die Ziegentuberkulose. b) Das Maltafieber. 4. Abteilung: Ziegenmilch: a) Neues über das Wefen und die Eigenschaften der Ziegenmilch. b) Der Stand der Forschungen über die Ziegenmilch-Anämie. Außerdem wird behandelt: Die Organisation der Ziegenzucht, gestützt auf die Berichte der einzelnen Länder. Die später erscheinende Kongreßordnung wird Auskunft erteilen über den genauen Beginn des Kongresses, die Teilnahmebedingungen, die Fristen zur Einreichung der Berichte und der Anmeldungen usw. Dank der Tätigkeit des internationalen Ziegenzuchtverbandes, dessen ständiges Generalsekretariat sich in Freiburg (Schweiz) befindet, ist dem Kongreß schon heute die Mitarbeit zahlreicher Persönlichkeiten zugesichert, die in der wissenschaftlichen und praktischen Ziegenzucht große Erfahrungen gesammelt haben.

Reichsverband der Deutschen Gemeindetierärzte.

Hauptversammlung in Karlsruhe.

Donnerstag, den 11. Oktober 1928, 20 Uhr: Empfangsabend im Restaurant des Stadtgartens. Freitag, den 12. Oktober 1928, 8 Uhr: Eröffnung durch den Vors. im Restaurant „Vier Jahreszeiten“. Festsaal der Loge. Tätigkeitsbericht, 25 Jahre Fleischbeschaugesetz: Dr. Hafemann. 9 Uhr: Über die nach dem Lebensmittelgesetz vom 5. Juni 1927 erforderliche Organisation der Milchkontrolle durch die Stadtverwaltungen unter besonderer Berücksichtigung der Zuständigkeitsabgrenzung der behördlichen Sachverständigen (mit Lichtbildern): Dr. Tiede-Köln. ½11 Uhr: Fleischschau und bakteriologische Fleischuntersuchung. Kennzeichnung der ordentlichen Schlachtungen und der Notfischlachtungen: Prof. Dr. Müller-München. 12 Uhr: Begutachtung der Wurft durch den Tierarzt mit besonderer Berücksichtigung der histologischen Untersuchungen (Lichtbildervortrag): Schlachthofdirektor Dr. Frickinger-Bochum.

Gemeinsames zwangloses Mittagessen: Hotel „Vier Jahreszeiten“.

½15 Uhr: Ausübung der Sanitäts- und Veterinär-Polizei an den Schlacht- und Viehhöfen und der Lebensmittelkontrolle in den Städten: Dr. Kuppelmayr-Frankfurt a. Main und Dr. Fries-Mannheim. Dazu ergänzend: die Ausübung der Veterinär-Polizei an den Schlachtviehhöfen: a) in Bayern: Vet.-Rat Dr. Karl-Bamberg; b) in Sachsen: Schlachthofdirektor Dr. Schmidt-Dresden. 20 Uhr: Gefellige Zusammenkunft mit Damen im Restaurant des Stadtgartens.

Sonnabend, den 13. Oktober 1928, 9 Uhr: Über neue Beobachtungen auf dem Gebiet der Kühlung und Kaltlagerung von Fleisch (Lichtbilder!): Privatdozent Diplom-Ingenieur Tamm. Ort: Technische Hochschule, Abt. für Maschinenwesen, neuer Hörsaal. ½11 Uhr: Über die Gefahren des Unterfrierens der Gebäudefundamente in Gefrierhäusern: Schlachthofdirektor Dr. Raschke-Chemnitz. 12 Uhr: Vorführung elektr. Betäubung von Schlachtieren im städt. Schlachthof: Prof. Dr. Müller-München in Gemeinschaft mit Ingenieur Weinberger.

½ 16 Uhr: Über Bau und Inneneinrichtung von Schlachthöfen (Lichtbildervortrag): Fach-Architekt Hennings-Stuttgart. Ort: Hotel „Vier Jahreszeiten“. 17 Uhr: 1. Erledigung der eingelaufenen Anträge. 2. Neuwahl des Vorstandes. 3. Kassenprüfung. 4. Organisationsfragen. 5. Tagung 1929. 20 Uhr: Gemeinsames Essen — Preis 3,50 RM. mit Kaffee — mit Damen im Hotel „Vier Jahreszeiten“.

Sonntag, den 14. Okt. 1928, ½ 10 Uhr: Autoausflug in den Schwarzwald (Herrenalb, Gernsbach, Baden-Baden). Dortselbst ½ 15 Uhr Mittagstisch — Preis 3,50 RM. mit Kaffee — Restaurant: „Kurhaus“.

Vorherige Anmeldung zum Essen bei Dr. Meier-Karlsruhe, Schlachthof, zwecks Feststellung der Teilnehmerzahl unbedingt notwendig. Wegen Wohnung wird gebeten, sich unter Angabe der Hotelgruppen an den Verkehrsverein zu wenden.

	Zimmer m. 1 Bett, Frühst. u. Bedienung RM.	Zimmer m. 2 Betten, Frühst. u. Bedienung RM.
Hotels der Gruppe A (große Hotels mit über 100 Betten)	7,50—10,50	15,00—22,00
Hotels der Gruppe B (mittelgroße Hotels mit 40—100 Betten)	5,20—6,35	10,35—14,95
Hotels der Gruppe C (kleine Hotels u. Gasthäuser mit weniger als 40 Betten)	4,00—4,90	7,50—9,80
Privatquartier	3,00—4,00	6,00—8,00

Der Reichsverband der Deutschen Gemeindetierärzte.

Dr. Hafemann.

Gruppe Magdeburg-Anhalt im R.P.T.

Generalversammlung 12. August d. Js. vorm. 10 Uhr in der „Loge Harpokrates“, Magdeburg, Gr. Münzstraße 10. 1. Geschäftsbericht. 2. Kassenbericht und Prüfung. 3. Bericht über die diesjährige Hauptversammlung des R.P.T. in München. 4. Das Tierärztekammer-Gesetz. 5. Besprechung über die Wahlen zur T.K. 6. Lichtbildervortrag von Dr. Kranich-Darmstadt: „D.-Vitamine, ihre Herstellung, Wirkung und Anwendung“.

In Anbetracht der Wichtigkeit der Tagesordnung und des großen Interesses, das der Vortrag von Dr. Kranich erweckt, wird um zahlreiches Erscheinen gebeten. Nach der Sitzung gemeinsames Essen mit Damen, das voraussichtlich um 2 Uhr nachm. stattfindet.

Der Vorsitzende. gez. Dr. Holzhausen.

Vorbereitungskursus für Veterinäratskandidaten an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

In der Zeit vom 8. Oktober bis 22. Dezember d. Js. findet ein Vorbereitungskursus für Veterinäratskandidaten an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover statt. Die Kursusmindestgebühr beträgt 150 RM. Anmeldungen zum Kursus werden bis 1. Oktober an das Hochschulksekretariat erbeten. Die Zulassung zu diesem Kursus kann erst erfolgen, „wenn der Kandidat nach Erlangung der Approbation mindestens 1 Jahr lang im Deutschen Reiche tierärztliche Praxis, sei es für eigene Rechnung, sei es als Gehilfe eines die Praxis ausübenden approbierten Tierarztes, betrieben hat und außerdem mindestens drei Monate lang einem deutschen öffentlichen Schlachthof oder einer Auslandsfleischbeschau als Leiter vorgestanden oder an einem größeren deutschen Schlachthof, an dem wenigstens zwei Tierärzte für den Fleischbeschauendienst ständig angestellt sind, oder an einem öffentlichen Schlachthof, der sich an einem Standorte eines berittenen Truppenteils befindet, die Schlachtvieh- und Fleischschau ausgeübt hat“. Die betreffenden Befcheinigungen sind bei Beginn des Kursus im Sekretariat vorzulegen.

Fortbildungskursus für praktische Tierärzte an der Tierärztl. Hochschule Hannover.

In der Zeit vom 30. Juli bis 4. August ist an der Tierärztlichen Hochschule Hannover ein Fortbildungskursus für praktische Tierärzte abgehalten worden, an dem 45 Herren teilgenommen haben.

Tierärzterverein für Schleswig-Holstein.

Am 21./23. September 1928 findet in Kiel die 60. Jubiläumstagung des Tierärztervereins für Schleswig-Holstein statt. Die Kollegen, die anlässlich der Schlußtagung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte in Kiel anwesend sind, sind als Gäste herzlich willkommen.

Dr. Sieg, Schriftf.

Dr. Stietenroth, 1. Vors.

Zu unserm Bilde.

Georg Engelhard von Löhneysen (15.. bis 1623).

Diese schöne Radierung von J. Siebmacher ist äußerst selten und wertvoll. Bartsch und Schrader-Hering kennen das Bild nicht. Ich fand es im Antiquariat von J. Halle in München, Ottostraße 3a; die Firma erlaubte mir, es zu reproduzieren. Löhneysen ist bis zum Gürtel dargestellt, eine ovale Wappenbordüre umgibt das Porträt, die äußere Umrahmung bildet eine Verschlingung von Ornamenten. Die Überschrift lautet: In effigiem Viri nobilissimi ac praestantissimi Dn. Georgii Engelharti Löhneysen / in Remlingen etc. Newendorff / equitis palatini, stabuli olim principis, rerumque metallicarum in Ducatu Brunsvicensi prefecti supremi etc. Als Unterschrift dient ein Epigramm von Michael Bötner aus Eifenach (Mich. Böt. Isenac.):

Haec tibi Löhneisi faciem designat imago,

Nomen at aeternum fama librique ferent.

Nam licet a teneris titulo insignitus equestri,

Nobilibusque satis progeneratus avis.

Non tamen Harmodium sectatus, stemmate fretus,

Musae ac virtutis munera spreuit iners.

Sed velut Iphicrates propriis virtutibus auxit,

Quas natura dedit nobilitatis opes.

Die Wappen zeigen Löhneysens Güter: Löhneysen, Wallenrod, Guttenberg, Lentersheim, Schaumburg usw.

George Engelhart von Löhneysen, auch Löhneis und Löhneysen geschrieben, stammte aus einer pfälzischen Adelsfamilie. Er wurde Stallmeister des Kurfürsten August v. Sachsen, i. J. 1583 trat er als solcher in Dienst des Erbprinzen Heinrich Julius v. Braunschweig-Wolfenbüttel, wo er 1589 Berghauptmann wurde. L. errichtete sich eine eigene Druckerei, in der er seine Bücher mit Kupfern und Holzschnitten glänzend ausstattete. Drei seiner großen Werke stammen aus dieser Offizin.

L. hat über Reitkunst, Pferdeausrüstung, über Bergbau- und Hofwissenschaft geschrieben. In den erstgenannten Büchern sind auch Kapitel über Krankheiten der Pferde und ihre Behandlung enthalten. L. gehört deshalb auch der tierärztlichen Fachgeschichte an. Seine einschlägigen Werke sind folgende:

1. (G. E. Löhneysen) Gründlicher Bericht des Zeumens und ordentlichen Austheilung der Mundstück und Stangen. (Grünigen) 1588. Die zweite Auflage, die um verschiedene pferdewissenschaftliche Kapitel vermehrt war, erschien unter dem Titel:

2. G. E. v. Löhneysen. Gründlicher Bericht von allem, was zur Reuterey gehörig und einem Cavalier zu wissen nöthig. Remlingen 1609.

3. Die von v. L. noch selbst besorgte 3. Auflage gaben v. L.'s Söhne i. J. 1624 nach ihres Vaters Tode heraus.

4. Die Bibliothek der Tierärztl. Hochschule in Berlin hat eine Ausgabe unter der Signatur Ap. 5120 mit dem Titel Löhneysen, Georg Engelhart, Della cavalleria d. i. Gründlicher Bericht von allem, was zu den Reuterei gehörig und einem Cavalier davon zu wissen gebürt. (Remling 1609/10.)

5. Eine andere Auflage führt den Titel: Della cavalleria s. de arte equitandi, exercitiis equestribus et torneamentis, d. i. Gründlicher Unterricht von allen, was zu der löblichen Reiterei gehörig und einem Cavalier zu wissen von nöthen. Remlingen 1609.

6. Löhneysens Della cavalleria gab im Jahre 1729 Ludwig Trichter in Nürnberg in 6 Teilen, 2^o, heraus unter dem Titel: Löhneysen, Georg Engelhart, Neu eröffnete Hof-, Kriegs- und Reitschul.

7. Löhneysens Buch von der Complexion und Natur der Pferde habe ich als selbständiges Buch nicht aufgefunden. Enslin-Engelmann, Robert Klee, die Kataloge der Hochschulbibliotheken, Köchs Enzyklopädie usw. führen es nicht an. In Zwey gute und sehr nützliche Bücher von Stangen und Mundstücken samt einer Beschreibung der Complexion und Natur der Pferde von Johann von Fiorentini und Georg Engelhart Loeneisen, Frankfurt 1609 bei W. Hofmann ist es abgedruckt.

Im 30jährigen Kriege wurde die Remlinger Druckerei mit allen Bücherhöfen zerstört; die Löhneysen'schen Bücher sind deshalb

bibliothekarische Seltenheiten geworden. Das gilt besonders von dem „Bericht vom Bergwerck“ (Remlingen ca. 1620).

Literatur.

Schrader-Hering, Biogr.-literar. Lexicon der Thierärzte, Stuttgart 1867, S. 255. — Allgemeine Deutsche Biographie, Band 19, S. 133. — Christian Gottlieb Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Leipzig 1750, Band 2, Spalte 2494. — Katalog der Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule in Berlin, Magdeburg 1913, Spalte 370, 371, 381. Reinhard Froehner (Gr. Strehlitz).

Bücherbesprechungen.

Günther, Hans F. K.: *Rassenkunde des deutschen Volkes*. 12. Aufl. J. F. Lehmanns Verlag. München, 1928. Preis geheftet Mk. 12,—, gebunden Mk. 14,—.

Günther's „Rassenkunde des deutschen Volkes“ hat in der kurzen Zeit von fünf Jahren 12 Auflagen erlebt. Damit dürfte sie zu den meistverbreiteten Büchern ähnlicher Art gehören.

In 22 Kapiteln werden neben interessanten Erörterungen über den Begriff „Rasse“, über Geschichte der Rassenkunde, über Wachstum, Alter, Konstitution, Vererbungsercheinungen u. a. in erster Linie die leiblichen und seelischen Merkmale der deutschen Rassen geschildert. Günther unterscheidet folgende fünf europäischen Hauptassen, die für die rassische Zusammenfassung des deutschen Sprachgebiets von besonderer Bedeutung geworden sind: die nordische, westliche (mediterrane, mittelländische), dinarische, ostische und ostbaltische Rasse. Neu aufgenommen in die 12. Auflage des Werkes ist ein Abschnitt über die leiblich-seelischen Merkmale der „fälschen“ Rasse (von Paudler als „dalische Rasse“ beschrieben), jener bisher wenig beachteten breitgesichtig-langköpfigen Rasse, die als Fortsetzung der altsteinzeitlichen Crémagnon-Rasse anzusehen ist. Die Behandlung der Judenfrage wurde in der neuen Auflage weggelassen und wird in einem besonderen Werk „Rassenkunde des jüdischen Volkes“ erfolgen. Bei der Beschreibung der verschiedenen Rassen erfolgt die der nordischen mit besonderer Liebe, doch versucht Günther in der Neuauflage die anderen Rassen vorurteilsloser zu beschreiben, als er es in früheren Auflagen getan hat, wenn er auch heute noch das Heil für das deutsche Volk in der „Aufordnung“, der „Mehrung des nordischen Blutes“ sieht.

Mehr als 500 zum großen Teil sehr gute Abbildungen veranschaulichen dem Leser die körperlichen Merkmale der verschiedenen Rassen.

Wenn man auch nicht in allem den von G. vertretenen Anschauungen und Aufstellungen folgen kann, so darf Verf. doch das Verdienst für sich in Anspruch nehmen, breite Schichten des deutschen Volkes auf die große Bedeutung der Rassen- und der damit zusammenhängenden Fragen eindringlich hingewiesen zu haben.

W. Schäper, Hannover.

Das Lymphgefäßsystem des Pferdes von Dr. med. et med. vet. et phil. Hermann Baum, o. Prof. der Veterinär Anatomie an der Universität Leipzig, Geh. Medizinalrat. Mit 53 großenteils farbigen Abbildungen auf 20 Tafeln. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1928. Wilhelm Ellenberger zu seinem 80. Geburtstag. RM. 38.—, gebunden RM. 41.60.

Nach der Herausgabe des Lymphgefäßsystems des Rindes und Hundes folgt nun jene des Lymphgefäßsystems vom Pferde. Schwein und Hausgeflügel sollen sich anschließen. Damit wird eine Reihe von klassischen Arbeiten abgeschlossen sein, die der Veterinär Anatomie zur dauernden Zierde gereichen. Aber nicht nur ihr, sondern auch der Anatomie als ganzem, denn die Humananatomie hat zur Zeit nichts dem Baum'schen Arbeiten Gleichwertiges an die Seite zu stellen. Möglich war diese Arbeit auf Grundlage einer feindurchgebildeten Technik, gepaart mit einem anatomischen Scharfblick und Fleiß ohne Gleichen. Wenn man in die Einzelheiten der Arbeiten eindringt, bewundert man immer wieder die Sorgfalt, mit der sie bis ins kleinste durchgeführt sind und die Durchsichtigkeit des Planes, der dem ganzen zu Grunde liegt. Aber nicht nur als anatomische Leistung ersten Ranges ist dieses zu werten, sondern auch als ein Hilfsmittel für die Praxis, das zwar für die Fleischbeschau, Chirurgie und pathologische Anatomie ein längst gefühltes Bedürfnis gewesen, aber noch niemals mit diesem Ernst und Geschick in Angriff genommen worden ist. Abgesehen davon, daß es den früheren Veterinär Anatomen bei ihrer oft sehr vielseitigen ander-

weitigen Inanspruchnahme, durch allerlei Nebenfächer nicht möglich war, sich solch schwieriger und zeitraubender Aufgabe zu widmen, fehlte es ihnen auch an der nötigen Technik. Die Quecksilberinjektion lieferte ja „glänzende“ Ergebnisse, die aber eine infolge der Ausweitung der Gefäße eine gewisse Entstellung des natürlichen Zustandes ergaben und die Beobachtung des Verlaufes der Lymphgefäße an rotzkranken Tieren, wie sie Frank anwandte, hat zwar viele praktisch brauchbare Winke gegeben, aber eine richtige anatomische Anschauung ermöglicht sie nicht. Auf Einzelheiten des neuen Werkes einzugehen, erübrigt sich, da der bewährte Plan der Vorläufer streng eingehalten wurde. Mit der Umbauung der Lymphoglandulae in Lymphozentrum für Knotengruppen und Lymphonodi für Einzelknoten kann sich jeder Anatom einverstanden geben, dem es auf den Sinn der Sache ankommt. Auch die Bezeichnung einzelner bisher noch nicht benannter Knotengruppen muß den Beifall finden, sie sind auf Grund sorgfältigster Erwägungen entstanden. — Hohes Lob verdienen auch die klaren und wohlgedachten Abbildungen und die ganze Ausstattung des Werkes.

So möge die neue Arbeit hinausfliegen in die tierärztliche und anatomische Welt als ein neues Ruhmesblatt deutschen Scharfblickes und Fleißes. Möge sie auch in der Praxis segensreiche Früchte zeitigen.

Martin.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Tierarzt Dr. Trepel in Labes zum Veterinär rat, ihm ist die Veterinär ratstelle in Labes (Bez. Stettin) übertragen worden. Dr. E. Hölzel, Leiter des bakteriologischen Instituts am Schlachthof in Münster, zum Ober veterinär rat. Dem Tierarzt Dr. Schlenker aus Köln ist die kommissarische Verwaltung der Veterinär ratstelle in Lennep (Reg.-Bez. Düsseldorf) übertragen worden. Dr. Scheidemann, Assistent tierarzt der Tuberkulose-Abteilung des Bakteriolog. Instituts in Halle, ist zum Obertierarzt an diesem Institut ernannt. An demselben Institut sind als Assistent tierärzte eingetreten Dr. Paul Hueber, Dr. Wilh. Schmidt und Dr. Heinz Aßhauer.

Promoviert in Leipzig: Friedrich Fetzner aus Rosenberg; Heinz Röhrer aus Leipzig; Heinrich Baumgärtner aus Seimeny (Rum.); Lasse Arvi Schröder aus Kuopio (Finnland); Lauri Katras aus Turku (Finnland); Alfred Hornung aus Fürth; Per Ivar Stenius aus Nykyrka (Finnland).

Approbiert in Leipzig: Friedrich Oehme aus Borna; Hermann Stinglhamer aus Zweibrücken.

In Gießen: Wilhelm Schaumburg aus Giflitz (Waldeck); Valentin Horn aus Steinbach (Kr. Limburg); Hubert Wilmes aus Hagen in Westf.; Karl Haupt aus Nieder-Wildungen; Josef Kutsch aus Gressenich; Rudolf Maier aus Montigny.

Den Prüfungsschein als Ausländer haben erhalten in Leipzig: Matti Huovila aus Pornainen (Finnland); Erkki Estola aus Tampere (Finnland); Knut Arflot aus Borgund (Norwegen).

Ausgeschieden: Dr. Hemmert, wissenschaftl. Assistent am patholog. Institut der Tierärztlichen Hochschule Berlin; Dr. Hannemann, wissenschaftl. Hilfsarbeiter in der Klinik für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule Berlin.

Verzogen: Distriktstierarzt Dr. Franz Brücklmayer von Isen (B.-A. Wasserburg) nach Tutzing (B.-A. Starnberg); Dr. Ferd. Braun von Tutzing nach Isen; Dr. Rolf Hartig von Unterschondorf (B.-A. Landsberg a. L.) nach Südwestafrika; Dr. Wilhelm Schmidt von St. Julian (B.-A. Kusel) nach Altenplan (B.-A. Kusel); Tierarzt Gustav Wenz von Halle a. Saale nach Waichenfeld (B.-A. Forchheim).

Personalveränderungen im Veterinär offizierkorps zum 1. August 1928.

Veretzt: Die Stabsveterinäre: Dr. Pietzsch, 1. Fahr-Abteilung zum 1. Inf.-Reg.; Schlicht, 4. Art.-Reg. zur 1. Fahr-Abteilung.

Befördert: Oberstabsveterinär Dr. Thieme, 4. Reiter-Reg. zum Generalober veterinär; Stabsveterinär Dr. Pronath, 7. Art.-Reg. zum Oberstabsveterinär; Ober veterinär Dr. Richter (Kurt), 3. Art.-Reg. zum Stabsveterinär; Veterinär Dr. Steinacker, 6. Art.-Reg. zum Ober veterinär.

Ausgeschieden: Generalober veterinär Schmidt, 1. Infanterie-Regiment mit der Berechtigung zum Tragen seiner bisherigen Uniform.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Eberlein & Co., Hannover.

geben wan mit wizen . . . swär daz brichet, der ist dem burggrafen der galtnvsse schuldic als er dur reht sol. v. Freyberg a. O. S. 123. An anderer Stelle, S. 111, wird die Strafe festgesetzt auf ein Pfund Pfennige, 4 Wochen Verbannung und nach Rückkehr 4 Wochen Ausschuß aus dem Gewerbe. — Unterlassung der Deklaration wird anderwärts bestraft mit „6 schilling und 2 Pfennig für jeden finger auß der hand“, Freibuch über Gräfenwerd v. 1433, Niederösterreich. Weist. II. S. 672, anderwärts mit Wegnahme des Fleisches, Gerechtigkeit und Gewohnheit zu Seftenberg (1524 bis 1554), daselbst S. 919.

Weggabe an Arme. Nach altem Herkommen so soll hie ein fleischhacker sitzen und ob er phinnings fleisch feil hiet mit willen oder slueg, der ist dem ambtmann zu wandl 12 Pf. und das fleisch ist verfallen armen leuten. Rechte zu Kahlenbergerhof v. 1512, daselbst I. S. 944. Siehe auch oben S. 18 (Miltenberg).

Strafe ohne Konfiskation. Wer finnisches Fleisch feil hielt, mußte zur Strafe einen Strohkrantz aufsetzen nach dem Rechte des Stiftes Klosterneuburg v. Ende d. 16. Jahrh. Niederösterreich. Weist. II. (1896) S. 29. — item wer unraines fleisch fail hat, es wer pfinnings, schelmigs oder ain grosstrachtiges viech oder ander wahr, die mit rain wer, der ist zu wandel 6 ß 2 den. und steht in pesserung alß der rath erfindt. Banndating zu Rastefeld (16./17. Jahrh.) daselbst IV. S. 380. — wer auch virkouffte fynte fleisches fur reine, der virluset dryzzig kolsche (Kölnische), ob he es cleyd (wenn der Geschädigte Klage erhebt). Metzgerordnung f. Frankfurt a. M., Veröffentlichungen der Histor. Komm. für die Stadt Frankfurt a. M., S. 349. — Eine Eigentümlichkeit weist auf die Binger Stadtordnung v. 1488. Dort war der Verkauf von Fleisch mit zwei Finnen zugelassen, mit drei oder mehr Finnen aber untersagt. A. I. Weidenbach, Regesta Bingensia, Bingen 1953, S. 53.

Aufhebung des Kaufvertrages. Vortmer wilk man de levendige swin verkoft, de vynnisch sin, he sy in erem ampte, he sy borgher edder gast, de schal de zwin wedder nemen sunder jenigherleye weddersprake, se sin levendich edder doet, unde maken se sik also he nuttete kan in sinem hus, wente it gheht en ere ampt en jar na der heren gnade. wende dat is vor de heren vnde vor de ganzen menheit. Vortmer is dat zwin besen gheve vppe der tungthem vnde is it bynnen vynnich, allike wol schal he dat wedder nemen, de dat verkopt heft, wente men kan dar nemande mede vul doen. Knochenhauerordnung v. Lübeck v. 1385, C. Wehrmann, a. a. O. S. 263.

Reinhard Froehner.

Hoffmann, Dr. J. A., Strehlen: Festschrift zum 75jährigen Bestehen des Strehlener Tierchutzvereins, Strehlen (Schlesien) 1928. Selbstverlag d. Vereins.

Ein Kenner und begeisterter Arbeiter der Tierchutzbewegung, die zurückgeht auf die am 16. Juni 1824 zu London gegründete „Königl. Gesellschaft zur Verhütung von Graufamkeiten an Tieren“, zeigt hier, was in 75 Jahren Stadt und Kreis Strehlen für die hohe sittliche Aufgabe des Tierchutzes geleistet haben. Mehrere Tierärzte (Dr. Carl Ulrich, Oswald Klingmüller, Eduard Schneeweiß, Adolf Ehrlich, Max Nitschke, Dr. J. Alfred Hoffmann) haben sich um den Verein besondere Verdienste erworben.

Wilhelm Rieck.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Rieck, Berlin-Cöpenick, Kirchstraße 4. Verlag von M. & H. Schaper Hannover. — Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Veterinärhistorische Mitteilungen

Herausgegeben von der

Gesellschaft für Geschichte und Literatur der Veterinärmedizin

Schriftleiter:

Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

Zwanglos erscheinende Beilage zur „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“
Verlag von M. & H. Schaper in Hannover
Sonderbezugspreis 1,50 Goldmark das Jahr, freibleibend.

Nr. 8.

1928.

8. Jahrgang.

Hans Behme, der erste Berliner Stadttierarzt.

Von Dr. Wilhelm Rieck.

Am 22. April 1611 wurden zu Sankt Marien in Berlin Johannes Behme, Churfürstlich Brandenburgischer „Reitschmitt“ (unter Johann Sigismund) vom Jauer auß Schlesien (= Jauer) vnd Jungfrau Catharina Lewens Christof Lewens Tochter getraut. Zu dieser Ehe gehörten wohl die fünf Kinder, die ein Hans Behme (ohne Berufsangabe) am 5. August 1613, 12. Mai 1616, 16. Juli 1618, 28. Oktober 1619, 3. September 1620 (hier beim Sohne Carolus ist die Frau Stallmeisterin Pate) zu S. Marien taufen ließ. Am 20. Januar 1620 erwarb Hans Behme das Berliner Bürgerrecht (als erster Tierarzt erhielt es vor ihm am 28. Januar 1608 der „durff. gn. reitschmid Merten Behme“ für 4 Taler 8 Silbergroschen) und kam in eine Art Dienstverhältnis zur Stadt Berlin, wie aus einer interessanten Bemerkung des Ältesten Berliner Bürgerbuches (1453—1700) hervorgeht: Hans Behme braucht nur 3 Taler für das Bürgerrecht zu zahlen, „und weil ein erbar raht so ein geringes genommen, hat er zugesagt, wan etwa des rahts pferde mochten schadhaft werden, wie er dieselbe umbsonst curieren, jedoch das ihme ein erbar raht die medicamenta verschaffen“. Auf Grund dieser Bemerkung des Bürgerbuches kann man den „reitschmid“ (= Veterinär) Hans Behme als den ersten Berliner Stadttierarzt bezeichnen. Erwähnenswert ist die Einschränkung, unter der Hans Behme seine Verpflichtung, die Magistratspferde umsonst zu behandeln, eingeht. Hätte er den Nachsatz, der die Heilmittellieferung der Stadt überläßt, vergessen, so wäre er gezwungen gewesen, die „medicamenta umbsonst zu verschaffen“, da im „curieren“ auch das Liefern und Applizieren der Arzneien mit einbegriffen war, und der Tierarzt bereits vor 300 Jahren selbst dispensierte. Unter dem 7. August 1631, 40 Tage vor dem Siege Gustav Adolfs von Schweden über Tilly bei Breitenfeld am 17. September 1631, fand ich noch eine letzte Urkunde über Hans Behme: An diesem Tage wurde Hans Behme des Churfürsten Georg Wilhelm „Pferdearzt“ mit Jungfrau Catharina, Gurgens Schmid's Tochter, getraut zu S. Marien.

Bücherbesprechungen.

Die Färbbarkeit des Schweinefleisches in historischer Beleuchtung. Von

G. A. Gach (Inaug.-Diss. Leipzig, vet.-med. Fak. 1925).

(Schluß aus Nr. 5 der Veterinärärztlichen Mitteilungen.)

Färbbarkeit. Basel hatte im Mittelalter eine „färbende schule“. Das färbende und andere mangelhafte Fleisch durfte nur an auswärtige verkauft werden. K. Baas, Gesundheitspflege im Mittelalterl. Basel, Zürich 1926. Das Pfänderfleisch mußte in Bruchsal auf der Pfänderbank verkauft werden. Dorthin kam auch das Eber- und anderes minderwertiges Fleisch. Einsalzen des färbenden Fleisches war verboten. Ordnung des Bischofs Ludwig v. Speier für die Metzger in Bruchsal v. 1500, a. O. S. 885. Dieser Anordnung gleicht eine für Udenheim v. 1525 (Pfänderbank). Ordn. der Metzger v. 1525 Z. 18 u. 19, daselbst. S. 888. — Schleierstadt hat einen Pfänderbank. Schleierstädter Fleischerei v. 1498, Ober-rhein. Stadtrechte Abt. 3, Heft 1, S. 561. Würzburg hatte im 14. u. 15. Jahrh. eine eigene Färbbank, Morgenroth a. O. S. 114. — Item si (die Metzger) sond auch Judäisch fleisch, färbend fleisch, und stünd pfarren niemen anders denn vff den Pfänderbanken verkaufen und das nit anders geben wie In das von den schwern geschert wird. Metzgerordnung für Schaffhausen a. d. 15. Jahrh. Alemannia VI. (1878) S. 234, 254.

Kenntnisse. Wenn ein Meister im Pöschchen ein Schwein schlägt, und dieses sich als färbend herausstellt, so soll er es nicht in Stücken verkaufen, sondern es soll eine Tafel angehängt werden, auf der ein Schwein gemalt ist, welche solches Fleisch bezeichnen wird. G. Adler, Das großpoln. Fleischerwerk vor 300 Jahren, Zeitschr. d. Histor. Vereins f. d. Prov. Posen, IX. (1894) S. 233. — In Danzig mußte färbend Fleisch auf einer besonderen Mühle liegen. Stadtwilkehr a. d. 15. Jahrh. P. Gehrke, a. O. S. 19. — In Wesel wurde das halbe Ohr abgeschnitten. H. Foerster a. O. S. 44. — In Halberstadt mußte beim Verkauf färbenden Fleisches ein Euter auf den Verkaufstisch gelegt werden. Urk. der Knochenhauer-Innung v. 1417, Urkundenbuch der Stadt Halberstadt, 2. Teil, herausg. v. Gustav Schmidt, Halle, 1879, S. 60. — Nach der Egerer Zunftordnung v. 1440 soll, wer färbend Fleisch verkauft, „ein ströen kranz an das kreuz hängen und also hangen lassen, piß er das pfärbend fleisch verkauft hat“. Siegl. Egerer Zunftordn., Prag 1909, S. 94. In der Ordnung von 1526 steht: es soll auch keiner kein fremd schein, das da pfärbend ist, kaufen, herbringen oder slahen, wo aber eynen Byderman ein schein umhängen und pfärbend wert, daß selb auch geslagen wurde, so soll man einen Schreyherlichen (deutlich sichtbaren) Kranz auffhängen, das sulds ein itlicher sehen und erkennen muge. Daselbst S. 94. — Heft he (der fleischwer) vinnich fleisch vele, dat mot he den luden to voren seggen edder legent up einen witten doek, he endarf das anders nicht verkoepen, (das muß er den Leuten vorher sagen oder es auf ein weißes Tuch legen usw.) Rolle der Fleischer i. d. neuen Scharre zu Münster v. Anf. d. 16. Jahrh. R. Krumholz, die Gewerke der Stadt Münster bis zum Jahre 1661, Publikationen a. d. K. Preuß. Staatsarchiv, Band LXX (1898) S. 195. — welk der knochenhouwere vinnich vleesch verkoepen will, de schall dat vore deme torne (vor dem Turme) weyle hebben uppe einem dische unde das lech tolaten (den Laden geschloßen halten), unde dar anders neyn vleesch by. Verordn. d. Rates z. Lüneburg v. 1413, E. Bodemann, Die älteren Zunftordnungen der Stadt Lüneburg, Hannover 1883,

S. 121. — Vortmer wan erre (der vleischwer) vinnich Vleisch slactet und in der Scharren verkoepen will, dat sal der dan vnder spreken eyne wyte laken. Wolde oock erre yennich bukvlisch in der scharren verkoepen, dat sal dat veil dar van achter syde haen, (der soll ein weißes Laken darunter breiten...), der soll das Fell davon hinter sich aufhängen). Von den vleischweren anno Dom. 1416, Alte Statuten der Stadt Coesfeld, Niesert, Münsterische Urkundensammlung III (1829) S. 209. — hat er (der fleischwer) pfärbend fleisch feil, so soll er ein ströbens kränzl aufhaben: fät er das nit, der ist zu wandel 72 Pf. Gerechtigkeit und Bannraiding des Stifts Heiligenkreuz zu Pfaffstetten a. d. 17. Jahrh., Niederöstr. Weist. I. (1886) S. 536. — pfärbend fleisch soll kein fleischwer, er sei im Markt gesessen oder ein gast, mindert feil haben, den vor den bänken auf einem tisch den er zwecks setzen und (ein) ströbens kränzl auf sein haube haben soll, wer das nicht thät und darüber in den bänken feil hat, soll der richter alles das fleisch nemen das er in der bank findet und dazu der fleischwer gebessert werden nach rats rat. Bann- und Bergraiding zu Percholdsdorf a. d. 18. Jahrh., Niederöstr. Weist. I. (1886) S. 602. Ähnlich steht's im Bannraiding zu Baungarten a. d. Wien a. d. 15. Jahrh. daselbst S. 723. — Item ob aber ein fleischwer ain schein kaut oder mer, die do gar schön wärr auf der zungen und inwendig nicht schön wärr, so soll man das selbig fleisch mit einer gewissen schawen lassen (so beschauen lassen, daß es andere bezeugen können) und sol auch die zungen zu einem warzeichen hangen lassen und sol auch das fleisch hangen lassen und sol auch das fleisch do verkaufen und verhacken und sol auf dem haubt haben ain ströbens kränzl zu einem warzeichen. Bannraiding zu Weidling, 15. Jahrh., daselbst S. 734. — welcher fleischwer pfärbend fleisch feil hiet, und slueg das mit willen, der ist verfallen das wandel dem anbmänn 72 Pf. und soll ain ströbens kränzl aufhaben. Rechte Veits v. Ebersdorf z. Nußdorf und Heiligenstadt a. d. 15. Jahrh., daselbst S. 922. Ebenso in Rechte des Wiener Jesuitenkollegiums zu Grinzing a. d. 17. Jahrh., daselbst S. 937, und in Rechte zu Kahlenbergsdorf v. 1512, daselbst S. 944. — welcher fleischwer will feil haben pfärbend fleisch, der soll damit stehen außerhalb der fleischbank bei einem tüsch und auf seinem haube haben ein ströbens kränzl zu einem zeiger seines pfärbend fleisch und mit willen das beschawers. wer es denn kaufen will, dem sol er es geben und ist niemant phlichtig zu pißien. Rechte des Marktes Burchstall (1375 bis 1406). Niederöstr. Weist. III, S. 581. — ob es (das fleisch) pfärbend ist, so sollen se (zwei burger, die über das fleisch gesetzt sind) untersagen, das man das nicht hingab wann an den montag; und derselbig sol eine sträbens drenzeln aufsetzen, das man es dobei erdent. Rechte zu Mistelbach v. 1414. Daselbst IV. (1913) S. 225. — 30stens, welcher fleischwer pfärbend fleisch oder sonstens schädliches und ungerechtes fleisch hackt und verkauft, der soll mit einem fuß bloßer stehn mit einem ströbens kranz auf dem kopf, abgestraft und nicht verschonet werden. Bann- und Bergraiding der Herrschaft Rohrau v. 1717, daselbst IV, S. 71. Die Verpflichtung, einen Strohkranz aufzusetzen, findet sich noch in der Rügung und Freiheit der drei freien Eigen zu Neumarkt, Engsbach und Karlsbad v. 1569, daselbst III, S. 647, und im Bannraiding des Klosters Lilienfeld a. d. 15. Jahrh. daselbst III, S. 301.

Deklaration. Voert so en sal men swyne vleesch verkoepen tot bank, dat vinnich is, man en segge vnsen borgen dat tho vorne. Alte Gewohnheit und Rechte der fleischhauergilde zu Borken v. 1420, Niesert, a. O. S. 225. — ez soll auch dein fleismanger niemen chein pfärbend fleisch

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 33.

Ausgegeben am 18. August 1928.

36. Jahrgang.

Zur gefl. Beachtung! Der Bezugspreis für das 3. Vierteljahr 1928 wird für die beim Verlag direkt bestellten Abonnements durch Nachnahme erhoben, wenn derselbe nicht bis zum 25. ds. Mts. in unseren Händen ist. — Wir bitten ev. für Einlösung der Nachnahme besorgt zu sein.

M. & H. Schaper, Verlag der „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“.

(Aus der Helminthol. Abteilung des Staatsinstituts für Experimentelle Veterinäre in Moskau. — Leiter: Prof. K. I. Skrjabin.)

Drei Thelaziaarten aus der Conjunctiva des Rindes in der U.S.S.R.

Mit 9 Abbildungen.

Von W. S. Erschow.

Im Laboratorium des Prof. Skrjabin mit der Bearbeitung der in der Conjunctiva des Rindes parasitierenden Nematoden beschäftigt, stellte ich eine neue *Thelazia* — *T. skrjabini* Erschow, 1928 fest.*) Außer diesem Schmarotzer wurden von mir noch zwei Thelazien — *T. rhodesi* (Desmarest, 1827) und *T. gulosa* Railliet et Henry, 1910, aus der Conjunctiva des Rindviehes näher untersucht. Die vorliegende Arbeit bezweckt eine ausführliche Beschreibung der genannten drei Arten, die die Kerato-Conjunctivitis der Rinder verursachen.

Dank dem reichen uns zur Verfügung stehenden Material hatten wir die Möglichkeit, die individuelle Maßvariabilität einzelner Körperteile zu studieren.

Das Forschungsmaterial wurde uns freundlichst von Prof. Skrjabin zur Verfügung gestellt und der Kollektion der 50. Helminthologischen Bundesexpedition nach Sibirien entnommen, die sich im Helminthologischen Zentralmuseum zu Moskau befindet. Außerdem benutzten wir noch das von uns auf dem Moskauer Schlachthofe gesammelte Thelazien-Material, mit der genauen Angabe der Ortschaften, aus denen das Vieh stammte.

Im ganzen bestand das Material aus 2934 Thelazien-Individuen aus 61 Rinderaugen in verschiedenen Stadien der parasitären Kerato-Conjunctivitis.

Die Haustiere beherbergen folgende Arten der Gattung *Thelazia*:

1. *Thelazia rhodesi* (Desmarest, 1827) Raill. et Henry, 1910. (Wirt: Rind.)

Syn.: *T. rhodesii* (Desmarest, 1827) Blainv., 1828,

(Thelazie de Rhodes, Bosc. 1819),

Filaria bovis Baillet, 1858,

Filaria palpebrarum Baillet, 1858,

Filaria lacrimalis Gurlt of Baillet, 1856 of Railliet 1893.

*) Erschow W. S. Thelaziosen des Auges der Rinder. Oeuvres de L'Inst. de la Méd. Vétér. Expér. Moscou, 1928.

2. *Thelazia alfortensis* Railliet et Henry, 1910 (Wirt: Rind).

Syn.: *Filaria lacrimalis* Gurlt of Railliet, 1893, pro parte.

3. *Thelazia callipaeda* Railliet et Henry, 1910 (Wirt: Hund).

4. *T. gulosa* Railliet et Henry 1910 (Wirt: Rind).

Syn.: *Filaria lacrimalis* (Gurlt, 1831) pro parte.

5. *Thelazia lacrimalis* (Gurlt, 1831) Railliet et Henry, 1910 (Wirt: Pferd).

Syn.: *Filaria lacrimalis* (Gurlt, 1831) pro parte.

6. *Thelazia beesei* Railliet et Henry, 1910 (Wirt: Kamel).

7. *Thelazia skrjabini* Erschow, 1928 (Wirt: Rind).

Diese Art wurde in der U. S. S. R. vorgefunden und beschrieben.

Es sind also vier Rinder-Thelazien zu verzeichnen: *T. rhodesi*, *T. gulosa*, *T. alfortensis* und *T. skrjabini*.

1. *Thelazia rhodesi* (Desmarest 1827).

Verbreitung: Unter allen Thelazien kommt *T. rhodesi* als der häufigste Parasit der Rinder in Europa und Afrika in Betracht. Wir konnten den Wurm beim Rinde aus folgenden Gegenden registrieren: den Gouvernements Uralsk, Orenburg, Samara, Saratow, Stalingrad, Charkow, Kubangebiet, Gouvernements Chersonj, Poltawa und dem Dongebiete und den verschiedenen Gebieten des Nord-Kaukasus.

Beschreibung der Art: der hellstrohfarbige Körper verengt sich am Kopf- und Schwanzende.

Der lippenlose Mund beginnt mit der kleinen Mundöffnung, die an ihrem vorderen und ihrem hinteren Ende 0,018 bis 0,0220 mm breit ist, während sie in ihrem mittleren Teile eine maximale Breite von 0,025 bis 0,030 mm erreicht. Die zwei lateralen und vier submedianen Kopfpapillen sind von unbedeutender Größe und kegelförmig.

Der unmittelbar an die Mundöffnung sich anschließende Ösophagus ist zylindrisch und 0,470 bis 0,638 mm lang und 0,057 bis 0,081 mm breit. Bei den Männchen ist der Ösophagus bedeutend kleiner als bei den Weibchen. Etwas nach hinten vom Ösophagus finden wir eine Zervikalpapille. Der Nervenring umgibt den Ösophagus in dessen hinterem Drittel in der Entfernung von 0,486 bis 0,537 mm vom Kopfende.

Die stark ausgeprägte Querringelung der Cuticula verleiht dem Parasiten ein zackenartiges Aussehen. Die Querstreifen liegen in einer Entfernung von 0,012—0,022 mm von einander, wobei die Ringelung an den Körperenden am deutlichsten zu sehen ist, gegen die Mitte aber kaum merkbar wird.

Der Darmkanal ist immer gleich, bis 0,081 mm breit.

Männchen: Die Körperlänge beträgt 7,3 bis 11,4 mm bei einer Maximalbreite von 0,421 bis 0,457 mm. Auf der Höhe des Ösophagusendes erreicht es die Breite 0,210 bis 0,230 mm. Das Schwanzende erscheint leicht gekrümmt und verjüngt. Die Kloake ist 0,078 bis 0,092 mm vom hinteren Ende des Körpers entfernt; die Breite des Körpers im Bereiche der Kloake erreicht 0,092 bis 0,129 mm.

Die Spikula sind ungleicher Größe: das rechte ist kurz, ziemlich breit und von fast gleicher Dicke, 0,100 bis 0,113 mm lang und 0,013 bis 0,024 mm breit; das bedeutend größere linke Spikulum hat das Aussehen einer Schnur, verengt sich allmählich gegen das Ende und ist 0,624 bis 0,846 mm lang und 0,005 bis 0,006 mm breit. Es sind 12 bis 14 Paar präanaler Papillen vorhanden, die fast in gleicher Entfernung von einander gelegen sind, und zwei Paar postanaler. Railliet und Henry fanden drei Paar, aber ließen diesen Umstand unter einem Fragezeichen.

Das Gubernakulum fehlt, die Schwanzflügel, die bei manchen Arten der Familie Thelaziidae nach Railliet zu finden sind, fehlen ebenfalls.

früheren Stadium sind die Embryonen in einer zarten Schale eingerollt; die Größe des Eies beträgt 0,0259 bis 0,0286 mm; die mehr ausgewachsenen Larven, die aus dem Ei schon ausgekrochen und dicht an der Vulva gelegen sind, sind gestreckt und messen 0,2072 mm bei einer Breite von 0,0037 mm.


2. *Thelazia gulosa* Railliet et Henry, 1910.

Diese Art war unter dem Materiale aus Sibirien vorhanden (Nowo-Ssibirsk, Barnaul, Sudshenka und aus anderen Gegenden) im Uralgebiet und im Gouvernement Poltava.

T. gulosa hat einen hellen Körper mit einem gerundeten Kopf- und einem gespitzten Schwanzende. Die Cuticula ist zart querringelt. Die Querstreifen sind 0,002 bis 0,009 mm von einander entfernt. Am Kopfende sind zwei laterale und vier submediane konische Papillen.

Der lippenlose Mund beginnt mit einer kelchähnlichen Kapfel mittlerer Größe. Ihr Maximaldurchmesser liegt an der vorderen Mündung und mißt 0,025 bis 0,029 mm. In der Richtung nach hinten verengt sich die Breite der Kapfel allmählich und erreicht ihre Minimalbreite in ihrem hinteren Teile; von innen scheint die Kapfel durch vier kleine Zacken geteilt zu sein. Der Ösophagus ist fast zylindrisch, beim Übergang in den Darmkanal ist er etwas angeschwollen; seine Länge erreicht 0,255 bis 0,356 mm, seine Breite 0,048 bis 0,097 mm. Der Nervenring liegt in der Entfernung von 0,100 bis 0,297 vom Kopfende, in der Mitte der Ösophaguslänge. Der Maximaldurchmesser des Darmes erreicht 0,127 mm.


Männchen: Die Körperlänge mißt 5,3 bis 9,1 mm. Die Maximalbreite des Körpers erreicht 0,259 bis 0,534 mm, die Maximalbreite im Niveau des Ösophagus 0,129 bis 0,243 mm, die der Kloake 0,064 bis 0,113 mm. Das Schwanzende ist halbringartig gekrümmt und zugespitzt, die Kloake 0,074 bis 0,126 mm vom Schwanzende.



Thelazia rhodesi. 1. Kopfende. 2. Schwanzende ♂. 3. Schwanzende ♀.

Weibchen: Die Länge des Körpers beträgt 17,4 bis 21 mm. Die Maximalbreite in der Mitte des Körpers mißt 0,470 bis 0,502 mm. Die Breite im Niveau des Ösophagusendes erreicht 0,190 bis 0,226 mm, die Breite im Niveau der Vulva 0,259 bis 0,291 mm, die Breite im Niveau des Anus 0,081 bis 0,092 mm. Das Schwanzende ist verdünnt und ist an seinem Ende mit einem kleinen Anhang versehen. Der Anus liegt vom Schwanzende in einer Entfernung von 0,081 bis 0,083 mm.

Das reife Weibchen ist mit Larven gefüllt, die je nach dem Grade ihrer Reife eine verschiedene Gestalt haben: im



Thelazia gulosa. 4. Kopfende. 5. Schwanzende ♂. 6. Schwanzende ♀.

Die Spikula sind ungleicher Größe: das rechte ist kurz, leicht gebogen und gleicher Dicke (0,005 bis 0,018 mm); das linke lange Spikula 0,608 bis 0,962 mm (ist bedeutend dünner 0,004 bis 0,011 mm) und hat das Aussehen eines dünnen, gleichstarken Stranges.

Es sind von 8 bis 33 präanale Papillen vorhanden. Sie sind in einer Linie gelegen und sitzen desto dichter, je näher sie sich der Kloake befinden. Außerdem sind drei Paar postanaler Papillen zu verzeichnen. Nach den Angaben von Railliet ca. 14 Paar präan. und vier Paar postanal. Gubernakulum und Schwanzflügel fehlen.

Weibchen: Die Körperlänge mißt 5 bis 16,2 mm; die Maximalbreite des Körpers 0,200 bis 0,650 mm, die Breite im Niveau des Ösophagus 0,092 bis 0,340 mm; 0,162 bis 0,356 mm; 0,047 bis 0,145 mm. Das Schwanzende ist zugespitzt und mit einem kleinen Zusatz versehen, in dessen Nähe sich ein Paar Papillen befinden. Der Anus ist in der Entfernung von 0,074 bis 0,145 mm vom Schwanzende. Die Vulva ist 0,328 bis 0,648 mm vom Kopfende entfernt. Der Uterus ist doppelt mit deutlicher Bifurkation.

Das reife Weibchen ist mit einer Menge von Embryonen gefüllt, die im frühen Stadium ihrer Entwicklung in eine Eierschale gehüllt sind. Die Eier messen 0,0444 × 0,0296 mm. Mit der Ausreifung strecken sich die Larven und erreichen in der Länge 0,2599 mm.

3. *Thelazia skrjabini* Erschow, 1928.

Verbreitung: Diese Art ist von uns skrjabini zu Ehren unseres Lehrers, des Begründers der russischen Helminthologie, Prof. K. I. Skrjabin benannt worden. Sie ist in Sibirien (Nowo-Ssibirsk, Barnaul, Byisk, Sudshenka, Atschinsk, Tscheglowak) Dnjepropetrowsk und im Gouvernement Poltawa verbreitet.

Beschreibung der Art: *T. skrjabini* hat einen gelben, strohfarbigen Körper, mit abgerundeten Enden. Die Cuticula hat zarte kaum sichtbare Querstreifen, die in einer Entfernung von 0,002 bis 0,009 mm von einander liegen. Der lippenlose Mund beginnt mit einer sehr kleinen an der Mündung verengten Mundkapfel, die sich nach hinten bis zu 0,022 mm entfaltet; ihre Tiefe ist sehr unbedeutend und mißt 0,007 bis 0,008 mm. Das Kopfende ist abgerundet; auf dessen Oberfläche liegen vier submediane und zwei laterale Papillen.

Der Ösophagus entspringt direkt der Mundkapfel und hat eine fast zylindrische Gestalt; er erweitert sich kaum merkbar beim Übergang in den Darm; seine Länge mißt

0,198 bis 0,376 mm, seine Breite 0,032 bis 0,081 mm. Der Darm hat in ganzer Ausdehnung gleiche Dicke. Sein Durchmesser beträgt 0,083 bis 0,085 mm. Der Nervenring liegt im unteren Drittel des Ösophagus in der Entfernung von 0,128 bis 0,210 mm vom Kopfende.

Männchen: Die Körperlänge beträgt 5 bis 9 mm, die Höchstbreite des Körpers 0,178 bis 0,260 mm, im Niveau des Ösophagus 0,097 bis 0,207 mm, im Niveau der Kloake 0,048 bis 0,097 mm. Das Schwanzende ist stumpf abgerundet und ringförmig gekrümmt; die Kloake 0,082 bis 0,092 mm vom Schwanzende entfernt. Beide Spikula von gleicher Dicke, 0,007 bis 0,018 mm. Sie sind sehr klein; das rechte ist 0,082 bis 0,125 mm lang; das linke 0,112 bis 0,185 mm groß. Also sehen wir, daß ihre Größen nur unbedeutend von einander abstecken. Die Zahl der präanal Papillen variiert von 17 bis 32 Paar; sie sind in einer Linie von 1 bis 1,5 mm Länge gefetzt, je näher zur Kloake, desto dichter. Postanale Papillen sind 3 Paar vorhanden.

Weibchen: Die Körperlänge mißt 11 bis 19 mm. Die Maximalbreite des Körpers mißt 178 bis 378 mm, während die Breite im Niveau des Ösophagus 0,113 bis 0,178, auf der Höhe der Vulva 0,145 bis 0,244, auf der Höhe des Anus 0,064 bis 0,097 mm beträgt. Das Schwanzende ist stumpf abgerundet und besitzt 1 Paar Papillen; die Analöffnung liegt in der Entfernung von 0,081 bis 0,097 mm vom Schwanzende. Die Vulva befindet sich am Kopfende 0,480 bis 0,648 mm vom letzteren entfernt. Der Uterus ist doppelt. Das reife Weibchen ist mit einer Menge von Embryonen ausgefüllt, die im Frühstadium ihrer Entwicklung in eine zarte Eihülle eingeschlossen sind. Bei der Ausreifung kriechen sie aus, strecken sich in die Länge und erreichen 0,214 bis 0,29 mm, in der Breite 0,007 bis 0,008 mm.

Die von uns beschriebene Art *Thelazia skrjabini* muß auf Grund der kurzen Spikula in die Untergattung *Thelaziella* Travassos, 1918 eingeräumt werden.


Differentialdiagnose.

a) *Thelazia skrjabini* unterscheidet sich scharf von *T. rhodesii*, *T. gulosa* durch:

1. den Bau der Mundkapfel, die bei *T. skrjabini* nur angedeutet ist;
2. die Körperform, die bei *T. skrjabini* von gleichem Durchmesser ist;
3. die Art der Querstreifen der Cuticula und die Länge des Ösophagus differenziert diese Art von *T. rhodesii*; bei *T. skrjabini* ist die Querringelung kaum merkbar und der Ösophagus ist bedeutend kürzer als bei *T. rhodesii*;
4. die Länge der Spikula, die bei *T. skrjabini* kurz und fast gleicher Größe sind;
5. die Lage der präanal Papillen;
6. die Größe der Eier und Larven, die bei den drei Arten verschieden sind.

b) Von *T. lacrimalis* (Gurlt, 1831), die im Auge des Pferdes parasitiert, unterscheidet sich *T. skrjabini* in folgendem:

1. durch die Mundkapfel, die bei *T. lacrimalis* tiefer und breiter ist;
2. durch die Länge des Ösophagus, der bei *T. skrjabini* von 0,198 bis 0,360 mm, bei *T. lacrimalis* jedoch 0,320 bis 0,400 mm mißt;
3. durch die Körperlänge der Männchen: bei *T. skrjabini* erreicht sie 5 bis 9 mm, bei *T. lacrimalis* 8 bis 12 mm;
4. durch einen unbedeutenden Unterschied in der Länge der beiden Spikula, die bei *T. skrjabini* bzw. 0,092 bis 0,122 mm und 0,113 bis 0,185 mm, bei *T. lacrimalis* 0,130 bis 0,135 mm und 0,170 bis 0,184 mm messen;



Thelazia skrjabini. 7. Kopfende. 8. Schwanzende ♂. 9. Schwanzende ♀.

5. durch das Vorhandensein einer großen Zahl von präanal Papillen: bei *T. skrjabini* finden wir von 17 bis 32 Paar, bei *T. lacrimalis* höchstens 10;

6. durch das Vorhandensein bei unserer Art der Kopfpapillen, die bei *T. lacrimalis* fehlen und

7. durch das Vorhandensein bei den Weibchen unserer Art eines Paares postanal Papillen, die wiederum bei den Weibchen von *T. lacrimalis* fehlen.

c) Bei der Vergleichung *T. skrjabini* mit den von Railliet et Henry, 1910 nach einem Weibchen beschriebenen *T. alfortensis*, haben wir nur zu bedauern, daß letztere so unvollkommen beschrieben ist, daß sogar ihre diagnostischen Merkmale schwer festzustellen sind.

Railliet sieht das spezifische Kennzeichen dieser Art in der Form der Mundkapsel, die bei *T. alfortensis* zylindrisch ist; bei unserer Art aber ist die Mundkapsel durch eine ganz andere Struktur charakterisiert.

Was die Größe anbelangt, so erreicht sie bei den Weibchen *T. alfortensis* bis 7 bis 11 mm, und bei dem Weibchen *T. skrjabini* 11 bis 19 mm.

Auf diese Weise kann die Körperlänge nicht als Differentialkriterium betrachtet werden.

Zu den Besonderheiten muß man ein Paar Papillen zählen, die am Schwanzende des Weibchens unserer Art sitzen, ebenso wie die Kopfpapillen, die bei den *Thelazia alfortensis* fehlen.

Die Statistik der *Thelazien*.

Die Statistik des Vorfindens der *Thelazien* des Rindes wurde bis zum heutigen Tage nicht systematisch erhoben. Erst im Jahre 1924 bis 1925 unterzog Sslawin im Gouvernement Poltawa 1218 Rinder seiner Forschung, wobei bei 32 *Thelazien* festgestellt wurden. Im Jahre 1925/26 wurden ebenfalls von Sslawin 4009 Rinder untersucht und unter ihnen bei 104 *Thelazien* konstatiert; also sehen wir, daß die Invasion bei 2,5 Prozent festzustellen war.

Unter 60 von Sslawin im September 1926 untersuchten Rindern wurden *Thelazien* bei 45, d. h. schon 75 Prozent festgestellt.

Die starke Schwankung des Prozentsatzes der mit *Thelazien* befallenen Rinder (von 2,5 Prozent bis 75 Prozent) ist dadurch zu erklären, daß in den Jahren 1924/25 und 1925/26 von Sslawin eine unvollkommene Unter-

suchungsmethodik angewendet wurde; im September 1926 aber wurde von ihm die Methodik dahin vervollkommen, daß er die Abziehung des dritten Augenlids anwendet und dadurch die in der Tiefe gelegenen Parasiten herausholt. Die 50. Helminthologische Bundes-Expedition von Professor K. I. Skrjabin brachte in Sibirien eine genauere Aufindungsmethodik der *Thelazien* beim Rinde zur Anwendung.

Die angestellten Untersuchungen an 2376 Rindern ergaben 562 Rinder als befallen mit *Thelazien*. Aus der Zahl dieser letzteren beherbergten Parasiten — in einem Auge — 483 Rinder, in beiden Augen — 79 Rinder. Im ganzen konnten von diesen Rindern 2268 *Thelazien*individuen gesammelt werden.

Schlußfolgerungen.

1. Die Invasion des Auges des Rindes mit *Thelazien* erreicht in vielen Gegenden der U. S. S. R. bis 60 bis 90 Prozent. (Saporoshje, Gouvernements Saratow, Samara, Dongebiet).

2. Alle drei Arten der *Thelazien* (nach dem Forschungsmaterial aus dem Gouvernement Poltawa zu urteilen) sind in ein und demselben Auge manchmal zu finden, sehr häufig zwei Arten (dem Material aus Sibirien gemäß).

3. Die *Thelazien* können im Auge in allen Jahreszeiten angetroffen werden; junge unreife Individuen aber augenscheinlich nur in der Sommerzeit.

4. Die Maximalzahl der Parasiten in ein und demselben Auge erreichte in unserem Material 86 Exemplare (Sibirien).

5. Bei primitiver Untersuchung der Augen des Rindes sind 3—5 Prozent als mit *Thelazien* befallene festzustellen; eine spezielle Untersuchung mit Hilfe der Methode der Abziehung des dritten Augenlids ergab bis 90 Proz. Invasion in einer ganzen Reihe von Gegenden in der U. S. S. R.

Die geographische Verbreitung der *Thelazien* ist bis zum heutigen Tage sehr wenig erforscht. Darum wäre die Einführung einer Registrierung der *Thelazien* in allen Ländern erwünscht, mit einer darauffolgenden offiziellen Mitteilung derselben durch die Presse.

Zum Schluß halte ich es für meine angenehme Pflicht, meinem hochgeehrten Lehrer, Prof. K. I. Skrjabin, meinen innigsten Dank auszudrücken für das zu meiner Verfügung gestellte Thema und für die Leitung bei der Vollführung meiner Arbeit.

(Aus dem Zootomischen Institut der Universität Dorpat, Tartu.)

Verlagerung und Verwachsung der Nieren beim Pferd. (*Heferotopia symphysys renum equi.*)

(Mit 2 Abbildungen.)

Von Dr. Hans Richter.

Bei einem Anatomiepferde (Stute, etwa 20 Jahre alt, gewöhnlicher Landfischlag) konnte folgender außergewöhnlicher Befund erhoben werden: Auf der rechten Seite war keine Spur einer Niere zu konstatieren, nur die rechte Nebenniere war der vena cava angeschmiegt an der gewöhnlichen Stelle unverändert zu finden. An der Stelle, wo sonst die rechte Niere liegt, waren die Lendenmuskeln von dem spiegelnden serösen Blatt des Peritonäums lückenlos bis zur Medianlinie des Körpers hin überzogen. Es fehlte also am sogenannten „caput caeci“ die von Serosa freie Stelle, die sich sonst zwischen dieser Stelle des Caecumkopfes und der rechten Niere vorfindet. Eine solche bindegewebige Verlötung ist also scheinbar an das Vorhandensein der Niere in normaler Lage geknüpft.

Das Fehlen der Niere hatte sodann noch einen Einfluß auf die Gestaltung des dorsokaudalen Abschnittes des rechten Leberlappens ausgeübt. Durch den Druck des hier nicht mehr durch die Dicke der rechten Niere nach ventral abgedrängten Caecumkopfes war der dorsale Leberrand abge-

plattet und atrophiert. Vom Lobus caudatus war nur noch ein dünnes zungenförmiges Gebilde übrig geblieben, welches 3,2 cm lang und 1,5 cm breit war. Auch sonst war der ganze rechte Leberlappen stark durch die Druckatrophie verkleinert, ein Befund, welcher auch sonst häufig ist.

Auf der linken Seite fand sich dagegen ein großes Nierengebilde, welches auf der Oberfläche einige Furchen aufweist (siehe Figur 1). Dieses Nierengebilde ist 22 cm lang, 12 cm breit, 4—5 cm dick und wiegt etwa 1600 Gramm. Die linke Nebenniere hatte die gewöhnliche Lage. Beim näheren Zusehen und Herauspräparieren erwies es sich, daß aus diesem Nierengebilde zwei Ureter entspringen und zwar aus dem kranial von der äußeren Hauptfurche gelegenen Teile der Ureter der linken, aus dem kaudalen Abschnitt der rechten Seite. Daraus ging ohne weiteres hervor, daß es sich hier nicht um eine Aplasie der rechten Niere mit vikariierender Hyperplasie der anderen handelte, sondern um eine Verlagerung der rechten Niere auf die linke Seite und eine Aneinanderlagerung beider zu einem äußerlich einheit-

lichen Gebilde, was aber durch feichte Furchenbildung noch die ursprüngliche Teilung andeutete.



Fig. 1. Lageverhältnis der beiden verwachsenen Nieren mit Harnleiter und Gefäßen. Strichzeichnung auf eine Photographie. $\frac{1}{5}$ nat. Größe.

Arterien sind geringelt eingezeichnet. N.N. Nebennieren.

O.O. = Ovarium. Ut = Uterus. Z = Zwerchfell.

Auch der Durchschnitt zeigte dieses Doppelverhältnis (Fig. 2).



Fig. 2. Die beiden symplastischen Nieren auf dem Durchschnitt photographiert etwa $\frac{1}{2}$ nat. Größe.

R.s. = ren sinister, R.d. = ren dexter, G—G = Grenzlinie zwischen beiden. A = Aorta, a = arteriae, C, c = große und kleine Zysten, p und p pelvis renalis mit dunkelblauer Leimmasse durch Injektion vom Ureter gefüllt, bei x ist die Leimmasse in die Ausführungsgänge der papilla renalis gedrungen, u = ureter der kaudal gelegenen ren dexter, bei u sein Übergang in den pelvis.

Die Grenze der beiden Nieren ist auf der photographischen Abbildung deutlich in der Mitte des Parenchyms zwischen den beiden Nierenbecken zu erkennen als leicht gebogene Linie, die nach lateral in den Rand der großen Zyste übergeht. Außer dieser großen Zyste finden sich eine Anzahl kleinere in beiden Nieren verstreut. Beide Becken sind vom Ureter aus mit blauer Leimmasse injiziert und ihre Schleimhaut zeigt Zottenbildung.

Über die normale Verlagerung der Nieren in der Embryonalzeit sagt Zietzschmann (Embryologie S. 424): „Die Niere bleibt nicht am Orte der Entstehung

(Rind 3. Kreuzwirbel) liegen. Vielmehr wandert sie als Ausdruck eines Schubes von seiten des wachsenden Ureters in kranialer Richtung über den kaudalen Endteil der dem Untergange geweihten Urniere hinweg. Bei 22 mm Länge (Rind) steht sie bereits in der Höhe der Keimdrüse, um mit dieser eine Zeitlang noch gleichmäßig weiter kranial sich zu verschieben. Später aber bleibt die Gonade zurück oder wird aktiv nach rückwärts gezogen, so daß ein mehr oder weniger weitgehender Abstand zwischen beiden resultiert. Die stärkere Kranialverschiebung der rechten Niere macht sich beim Rinde vom 8 cm langen Embryo ab in steigendem Maße bemerkbar.“

Unter Berücksichtigung dieser Schilderung kann man sich ganz gut vorstellen, daß bei dieser Verschiebung während der Entwicklung eine Abweichung von der normalen sagittalen Richtung eintreten kann auch nach der linken Seite hinüber, so daß sich dann der rechte Metanephros hinter die linke reiht und mit ihr verwächst, wie im vorliegenden Falle. Die andere Möglichkeit, daß das Blastem des rechten Metanephros ganz verodet wäre, und die rechte Ureterknospe sich an den hinteren Abschnitt des linken Metanephroblastem angelegt hätte, ist wohl hier auszuschließen, oder wenigstens höchst unwahrscheinlich.

Der oben angeführte Befund des Fehlens der bindegewebigen Verlötung des sogenannten Caecumkopfes mit der normal liegenden rechten Niere veranlaßt mich, hier noch einige Gedanken über die Bildung der serösen Höhlen beizufügen. Gewöhnlich pflegt die Darstellung des Verhältnisses der großen Körperhöhlen (cavum pleurae, cavum peritonaei usw.) so zu sein, als ob die Organe in die häutige seröse Auskleidung des präformiert angenommenen Cavum eingestülpt wären. Sicherlich hat diese Auffassung feinen großen didaktischen Wert. Vom genetisch-funktionellen Standpunkte aus pflege ich seit mehreren Jahren im Unterricht neben dieser Darstellung folgende Erklärung zu geben: Innerhalb des Körpers kommt es überall da zur Bildung eines mehr oder weniger ausgedehnten Cavum serosum, wo Organe innerhalb des Körpers ihre Volumen regelmäßig verändern, so daß ihre Oberfläche von der Umgebung mehr oder weniger frei sein muß. Dies trifft ohne weiteres auf Herz, Lunge, Bauchorgane zu. Der Volumenveränderung gleichzuachten ist eine regelmäßige Verlagerung und Verschiebung eines Organes im Körper, was wieder zur Entstehung der Synovialhöhlen überführt.

Im vorliegenden Falle der Anomalie, wo die rechte Niere in der Nische zwischen sogenanntem Caecumkopf und dorsalem Diaphragmarand (cf. Figur 52, S. 486 im Lehrbuch der Anatomie des Pferdes von Schmalz) in Fortfall kommt, müßte eine Verlötungsstelle des Caecumkopfes auf das bewegliche Zwerchfell übergehen, was aber nicht im Interesse der freien unabhängigen Beweglichkeit beider Organe läge. So verwundert es nicht, daß eine Verklebungsfläche des Caecumkopfes mit der Umgebung nicht zur Ausbildung gekommen ist und das Cavum peritonaei sich zwischen Caecumkopf, Zwerchfell und Lendenmuskeln tief eingebuchtet hat. Auch bei dem von Litty (3) beschriebenen Fall einer angeborenen Verlagerung der rechten Niere des Pferdes nach kaudal und nach der Mittellinie zu waren die Serosaverhältnisse ähnlich; denn L. schildert, daß an der Stelle, wo normaler Weise die rechte Niere liegt, die ganzen Lendenmuskeln durch die glatte Serosa hindurchschimmerten.

Der Litty'sche Fall könnte als eine Art Übergangsstadium zu dem von mir gefundenen angesehen werden; in letzterem Falle war die Heterotopie so stark, daß eine Verschmelzung der rechten Niere mit dem kaudalen Abschnitte der linken resultierte.

Literatur.

1. Schurian, W.: Über Form- und Lageveränderungen der Nieren bei Pferdeföten. Anat. Anz. Bd. 59, S. 522. Ref. E. Sch.

Jahresber. 1925, S. 220. 2. v. Velasco, A.: Hufeisendoppelnier bei Pferde. Münch. T. W. Bd. 67, S. 205. Ref. E. Sch. Jahresber. 1916, S. 115. 3. Litty: Ein Fall von angeborener Verlagerung einer Niere (Dystopia renis) bei einem Pferde. B. T. W. 1913, Jahrg. 29,

S. 500. Ref. E. Sch. Jahresber. 1913, S. 243. 4. Alezais: Die Hufeisenniere beim Pferde und Anomalien der Renalarterien. Comptes rendus Soc. Biolog. Paris 19. Mai 1906. Ref. E. Sch. Jahresber. 1906, S. 258.

Der derzeitige Stand der Bekämpfung der Tuberkulose des Hausgeflügels.

Von Privatdozent Dr. Fritz Schmidt-Hoensdorf.

Es hätte nicht des Aufgebotes so umfangreicher Literaturangaben durch Herrn Prof. Dr. Friedmann bedurft, um meine in Nummer 21 dieser Wochenschrift geäußerten Ansichten zu widerlegen. Es ist selbstverständlich, daß Herr Prof. Friedmann über diese ihn interessierende Materie eingehender unterrichtet sein wird als ich. Auffallend ist es aber, daß er zu den von mir angegebenen Untersuchungen von Lydia Rabinowitsch nicht Stellung genommen hat, obwohl diese Arbeit ihm selbstverständlich bekannt sein muß. Aus dieser Arbeit stammen auch meine Zitate von Terre, Libbertz und Rupel und Orth.

Weiterhin ist mir aufgefallen, daß unter den von Prof. Friedmann zitierten Arbeiten die von Dr. W. Böhme (B. T. W. 1921, Nr. 12 und 13), welche sich sehr eingehend mit seinem Impfstoff beschäftigt, fehlt. Auf Grund einer umfangreichen Literatur äußert sich Böhme u. a. wie folgt: „Friedmann legte eine gewisse Zeit lang besonderen Wert auf die Argumentation, daß sein aus der Schildkröte gezüchteter Stamm ein mutierter und „wunderbar mitigierter“ Tuberkelbazillenstamm vom Typus humanus deshalb sei, weil der Wärter der Schildkröte an offener Tuberkulose gelitten habe. Es ist recht bemerkenswert, daß Friedmann später, wohl unter dem Druck biologischer Forschungsergebnisse anderer Autoren, diesen Standpunkt wieder verließ und nebst Kruse seinen Stamm für einen spezifischen Schildkrötentuberkelbazillenstamm erklärte, der dadurch charakterisiert sei, Tuberkulose im Kaltblüterorganismus zur Auflösung zu bringen und also eine ausschließlich durch diese lebenden, säurefesten Bazillen verursachte, unter proliferativer und progressiver Knötchenbildung einhergehende Infektion zu setzen vermöchte, ohne eine Mutation vom Typus humanus darzustellen. Nach eingehender Kritik aller Arbeiten, die über Verwendung des Friedmann mittel durch wissenschaftlich völlig haltlose Argumentation aus der Humanmedizin nach dort bereits recht unerquicklicher Aufführung als spezifischen, überragenden Tuberkuloseimpfstoff in die Veterinärmedizin zu übernehmen, bei all denen vorzubeugen, die eine Therapie nicht dem Hörensagen nach, sondern aus wohl begründeter, wissenschaftlicher Überzeugung zu vertreten pflegen.“

Bezeichnend für die Art des Herrn Prof. Friedmann, Zitate zu verwenden, ist folgendes Beispiel: Von Machens wird von ihm folgender Satz angeführt: „Das tierpathogene Verhalten der Friedmann'schen Schildkrötentuberkelbazillen (Tuberkuloseerzeugung bei der Schildkröte) spricht für ihre strenge Spezifität. Es handelt sich offenbar um ein Bakterium sui generis.“ Dieser Satz findet sich in der Originalarbeit, D. T. W. 1921, Nr. 13 und in dem ganz kurzen Auszug im Zentralblatt für Bakteriologie, Band 66, S. 28.

In der ausführlichen Originalarbeit finden sich dann aber Sätze wie: „Die Tatsache der Nichtidentität der Schildkrötentuberkelbazillen, der Erreger der Schildkrötentuberkulose, mit den Tuberkelbazillen des Typus humanus, bovinus und gallinaceus spricht durchaus gegen die Annahme Friedmanns, daß der Schildkrötentuberkelbazillus den Warmblütertuberkelbazillus homologe Antigene besäße.“ Jeder Tuberkelbazillus wirkt bekanntlich nur im empfänglichen Tierkörper spezifisch (Machens hatte ein Kalb, ein Schaf, vier Ziegen, zwei Meerschweinchen nicht mit Friedmannbazillen infizieren können. (Schm.). Als „spezifischer“ Tuberkuloseimpfstoff gegen die Tuberkulose der Warmblüter, die durch den Tuberkulosebazillus vom Typus humanus, bovinus und gallinaceus hervorgerufen werden, kann demnach der Schildkrötentuberkelbazillus gar nicht in Frage kommen.“

Herr Prof. Friedmann glaubt, daß meine Äußerung, daß die Zahl der Anhänger von Friedmann ständig geringer werden, mein Geheimnis sei. Meines Erachtens handelt es sich dabei nicht um ein Geheimnis, sondern um das Ergebnis des Studiums der Fachliteratur. Ich lasse maßgebende Autoren für mich sprechen. Im Handbuch der pathogenen Mikroorganismen sagen in Band 5 auf Seite 1023 Zwick und Witte: „Die Versuche zur Immunisierung mit Kaltblütertuberkelbazillen (gemeint ist der Friedmann impfstoff) und anderen säurefesten Stäbchen haben zu praktisch verwertbaren Ergebnissen nicht geführt. Durch die Impfung wird die Aufmerksamkeit des Tierbesitzers nur von den wichtigen hygienischen Maßnahmen, auf die das Hauptaugenmerk bei der Bekämpfung der Tuberkulose zu richten ist, abgelenkt, wie auch Bongert betont.“ Der Behauptung von Friedmann (Leitlinien): „Die Ausmerzungen aller kranken Tiere (Rinder und Geflügel) ist also fortan nicht mehr erforderlich und nicht mehr gerechtfertigt“, steht die Behauptung von Zwick und Witte gegenüber: „Gerade bei der Geflügeltuberkulose ist der Hauptwert auf die Beseitigung aller tuberkulösen Tiere und die Verhütung von Neuansteckungen zu legen.“

Aus der humanmedizinischen Literatur verweise ich auf das Lehrbuch von Kolle und Hetsch: „Die experimentelle Bakteriologie“ (1922, Band 2, Seite 764) und auf Wolff-Eisner: „Handbuch der experimentellen Therapie“ (1926, Seite 386 u. f.). Wenn ich von dem Geringwerden der Zahl der Anhänger spreche, so habe ich damit selbstverständlich nicht die Zahl der Käufer des Mittels gemeint.

Ich habe in meiner Erwiderung in Nummer 21 betont, daß es sich bei den Versuchen von Raebiger und Knuth nicht um das Friedmann mittel gehandelt hätte. Für Prof. Knuth ist mir nicht bekannt, woher die von ihm verwendeten Kulturen stammen. Für Prof. Raebiger und meine Untersuchungen erschien es mir jetzt, nachdem Friedmann die Verschiedenheit seines wunderbar mitigierten Tuberkelbazillenstammes und der sonstigen „immunisatorisch und therapeutisch gänzlich unbrauchbaren, sogenannten Kaltblütertuberkelbakterienimpfstoffe“ so stark betont, von größter Wichtigkeit, genaue Aufschlüsse über den Ursprung der Kaltblütertuberkelbakterienstämme zu bekommen. Es bestand ja die Möglichkeit, daß immunisatorische Unterschiede zwischen beiden Arten, wie Fried-

mann sie annimmt, tatsächlich vorhanden waren. Die Herkunft der Stämme, die uns als aus Fällen von Schildkrötentuberkulose stammend übergeben worden waren, ließ sich noch ermitteln, und zwar stellte es sich heraus, daß sie Weiterzüchtungen des **Friedmann-Stammes** darstellten. Ich habe bisher auf diese Feststellung keinen Wert gelegt und halte weiterhin an dem Satz fest: „Es handelt sich bei den Versuchen (soweit sie **Raebiger** betreffen) um Versuche, die mit Kaltblütertuberkelbakterien angestellt worden sind.“ Mit dieser Feststellung dürfte jedenfalls einer weiteren Auseinandersetzung in der Presse der Boden entzogen sein, es sei denn, daß Herr Prof. **Friedmann** an-

nimmt, daß die spezifische Art der Züchtung seines zur Impfstoffbereitung dienenden Stammes diesem besondere Wirksamkeit verleiht.

Im Interesse der Sache, deren Wichtigkeit ich im ersten Satz meiner Erwiderung ausdrücklich unterstrichen habe, wären wir nicht abgeneigt, Versuche mit dem Original-**Friedmann**-Impfstoff, um den es sich bei unseren Versuchen nicht gehandelt hat, anzustellen, wenn er uns kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Bei seinem Preise ist leider die Anwendung in Massenversuchen, die allein Klärung bringen können, nur solchen Instituten möglich, die über große Geldmittel verfügen.

Innere Medizin und Chirurgie.

Kielhorn, O.: Beiträge zur Diagnostik und Behandlung der Verdauungskrankheiten des Rindes. (Aus der ambulatorischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin. — Direktor: Prof. Dr. Schöttler.) (T. R. 1927, S. 911—918, 929—937, 949—957, 970—973.)

Die Arbeit ist ein Sammelreferat der neuesten Literatur, welche sich mit dem Fragenkomplex der Verdauungskrankheiten des Rindes befaßt und welcher der Verf. eine umfangreiche Kasuistik eigener Beobachtungen hinzufügt.

K. H. Meyer.

Bergelt: Ein neuer nagelloser Hufbeschlag nach Ertel. (T. R. 1927, S. 858.)

B. probierte den nagellosten Hufbeschlag nach Ertel an Zug- und Reitpferden der sächsischen Landespolizei aus und lag derselbe eine Beschlagperiode gut. Ein Mangel zeigte sich nur insofern, als sich meist einige Zacken der letzten Bänder lockerten. Vorzüglich bewährte sich der Beschlag bei einem Zugpferde mit hohler Wand, bei welchem die Hornwand zum Teil weggebrochen, so daß ein Beschlag mittels Hufnägel ausgefallen war. Die Art des Beschlages ist durch beigegebene Skizzen erläutert.

In Nr. 1 der T. R. 1928, S. 9, nimmt Dr. A. Fischer, Direktor der Staatlichen Lehrschmiede, Dresden, zu obigen Ausführungen Stellung. Besonders hebt er die großen Mängel der Befestigung mittels der Hakenbänder hervor, welche nicht, wie Bergelt angebe, von oben nach unten, sondern umgekehrt eingeschlagen würden, wobei häufig die in die Hornwand eingreifenden Spitzen abbrechen. Er weist kurz auf die Nachteile hin, welche beim Verlorengehen des Eisens, bei Anwendung des Winterbeschlages, bei Verwundung an kranken Hufen, bei Pferden mit fehlerhaften Gangarten — Greifen und besonders Streichen — sich einstellen. Nach F.'s Versuchen kommt der nagellose Hufbeschlag nach Ertel praktisch nicht in Frage.

K. H. Meyer.

Hutschenreiter, C.: Die Impfung beim Pferde mit Cupal. (Aus der Lehrkanzel für Pharmakologie, allgem. u. experimentelle Therapie der Tierärztlichen Hochschule in Wien. — Vorst.: Prof. Dr. Günther.) (W. t. Mschr. 1928, XV. Jahrg., S. 145.)

„Cupal“ enthält die gleichen Bestandteile wie der humane Impfstoff „Cutivaccin“, nämlich das Produkt abgebauter Saprophytenstämmchen und ein zur Eiweißgruppe gehörendes Stoffwechselprodukt aus Tbc.-Bazillen, außerdem auch abgetötete Bazillen. Die Zusammenfassung basiert somit auf dem Prinzip der unspezifischen Reiztherapie.

Die Versuche wurden an Pferden mit chronischen Lahmheiten der Gelenke ausgeführt. Insgesamt wurden 116 Pferde geimpft. Cupal ist durchsichtig, dunkelbraun, von dicklicher Konsistenz und unangenehmem Geruch. Es wird durch Unterschichtung mit Chloroform dauernd steril gehalten. Die Impfungen wurden an der Schulter vorgenommen in der Ausdehnung eines Rechtecks 25×15 cm. Die Haut wurde mit einer Impfpflanze in Gestalt eines sog. Impfkammes geritzt, so daß auf die Weise jedesmal gleich 10 Striche gezogen werden konnten. Der Impfstoff wurde in die geritzte Haut eingerieben (Dosis 20—40 Tropfen). Die Reaktion auf die Impfung bestand in Schwellung, Sekretion nach einigen

Stunden, die nach 24 Stunden wieder verschwunden waren. Außerdem traten Herdreaktionen auf mit Steigerung der Herdsymptome sowie Allgemeinreaktionen des Gesamtorganismus in Gestalt von Besserung des Allgemeinbefindens.

Die Anwendung des Cupals hat sich wie folgt bewährt: 1. als Regenerans für Habitus und äußere Haut; 2. als Roborans; 3. als Nervinum und 4. als Antirheumaticum.

Der Arbeit sind fünf erläuternde Abbildungen über die Ausführung der Impfung beim Pferde beigegeben.

Berge (Hann.).

Tannenberg und Herrmann: Experimentelle Untersuchungen über den Mechanismus der spontanen Blutstillung. (Aus dem Senckenbergischen pathologischen Institut der Universität Frankfurt a. M.) (Arch. für klin. Chirurgie 1927, Bd. 147, S. 721.)

Die Versuche wurden am Mesenterium von lebenden Mäusen, Katzen und Kaninchen, die in Urethan- oder Äthernarkose versenkt worden waren, vorgenommen. Während das Mesenterium mit körperwarmer Ringerlösung überströmt wurde, fand Durchschneidung der Blutgefäße statt, deren Wirkung unter dem Mikroskop kontrolliert wurde. Dabei ergab sich zunächst einheitlich, daß die spontane Blutstillung von Faktoren abhängt, die an der Verletzungsstelle selbst in Wirksamkeit treten, d. h. es wirkt das Verhalten des Blutes und der Gefäßwand zusammen. Die bei der Blutstillung unabhängig vom Gefäßinhalt wirkenden Kräfte werden von den Autoren in Übereinstimmung mit W. Schulz unter dem Begriff der „Selbststeuerung“ zusammengefaßt, worunter Zusammenziehung, Einrollung, Verklebungsfähigkeit der durchschnittenen Gefäßenden, Wirkung der Gewebsspannung usw. verstanden wird. Daneben trägt die Thrombusbildung sowie der Druck des sich in das Gewebe einwühlenden Blutes bei den Verletzungen der größeren Gefäße das seine zur Blutstillung bei. Bei den kleinsten Arterien und Kapillaren entsteht anstatt eines Plättchenthrombus an der Verletzungsstelle vielfach eine kleine Stasefäule aus roten Blutkörperchen, die in demselben Sinne wirksam ist. Welche von diesen Faktoren bei der Blutstillung im einzelnen Falle im Vordergrund steht, hängt von den jeweiligen besonderen Umständen ab. Gelegentlich kann die Kontraktion und Retraktion der Arterie die Blutstillung allein herbeiführen, in anderen Fällen kann die Thrombusbildung an der Gefäßwunde im Vordergrund stehen. Der Annahme von Stegemann, daß eine Ablenkung des Blutes von der Verletzungsstelle das Wesentliche und Primäre in vorliegendem Falle sei, können Verff. nicht beipflichten.

Carl.

Carnat, G.: Considérations sur les affections de l'onglon du boeuf. (Schweiz. Arch. für Tierheilk. 1928, Bd. 70, S. 80—92, 113.)

Betrachtungen über Klauenerkrankungen des Rindes sind in der tierärztlichen wie landwirtschaftlichen Literatur von verschiedensten Gesichtspunkten aus publiziert. Trotzdem man mit den verschiedensten Methoden gegen sie ankämpft, muß man sagen, sie nehmen immer noch an Verbreitung zu. Die Zahl der Abschlächtungen ihrerthalben ist nicht klein. Die Sorgfalt der Pflege läßt sehr oft zu wünschen übrig,

achtet man doch z. B. beim Kauf nur zu oft sehr wenig darauf. Der Wert eines Tieres ist nicht zum mindesten auch abhängig vom Zustand der Klauen. (Gebrauchsfähigkeit, Milchergiebigkeit, Gesundheit.) Bei schwerer schmerzhafter Affektion der Klauen ist das Allgemeinbefinden gestört, die Futteraufnahme und der Anlaß herabgesetzt; dies um so mehr, als Klauenerkrankungen meist langdauernd oder sogar durch bestimmte anatomisch-physiologisch erworbene Anomalien chronisch sind. Dies beeinträchtigt dann unter Umständen, wenn nicht rechtzeitig und vor allem fachgemäß eingegriffen wird, den allgemeinen Wert des Tieres sehr beträchtlich. Statistisch hat man festgestellt, daß von den diagnostizierten Erkrankungen 7—12 Prozent ihren Sitz oder ihren Ursprung in den Klauen gehabt haben. Die Zahl dürfte eher noch größer sein, da statistisch (die vorliegenden Angaben beziehen sich auf die Kliniken von Zürich und Bern und einzelne private Mitteilungen) sicher nicht das ganze Material erreicht worden ist. — Vielfach liegt die Ursache neben traumatischen 1. in individueller Veranlagung, 2. den Bodenverhältnissen des Stalles, 3. der Stallhaltung überhaupt, in physiologischen Bedingungen (Trächtigkeit, Milchleistung, Mästung, übermäßige Fütterung von Kraftfutter). Die individuelle Veranlagung kann schon in der Rasse liegen. Die erhöhte Milchergiebigkeit entzieht dem Körper viele der hornbildenden Substanzen (angeborene Schwäche des Hornes). In Bezug auf diesen Körperteil handelt es sich um eine typische Degenerationsercheinung. Man findet bei vielen Stämmen besonders guter Milchkühe auffallend viele Vertreter mit schlechten Klauen bzw. Flachklauen. So hat einmal eine Züchtergenossenschaft im Simmental einen erstklassigen Zuchttier, der schwache Klauen hatte, in der Unterschätzung dieser Tatsache, angeschafft; er vererbte sie aber, so daß alle an sich wertvolle Nachkommen von der Zucht ausgeschlossen werden mußten. Stellungsanomalien (Winkel der Zehenwand zur Sohle) führen durch eine ganz besondere Belastung derselben mit der Zeit auch zu Veränderungen am Klauenschuh. Die Stallverhältnisse sind sehr oft entscheidend für den Gesundheitszustand der Klauen. So sollen die Längen des Standes für Kühe 1,9 bis 2,2, 2,0 für Jungvieh und 2 bis 2,5 m für Kälber betragen. Eine große Abschlüßigkeit gegen den Stallgraben zu ist aus den sich ergebenden Extremitäten ebenfalls nachteilig. Außerdem spielt die Beschalung des Fußbodens eine große Rolle (Ausgleiten). Auch sollen die übrigen hygienischen Bedingungen hinsichtlich Lüftung usw. erfüllt sein. Niedere und zu tiefe Krippen veranlassen abnorme, gepreizte Stellungen, die sich wieder auf die Klauen auswirken können (vermehrte Belastung der innern Wand); man nimmt eine Höhe von 30—40 cm als Norm an. Die Stallhaltung spielt eine hervorragende Rolle beim Zustandekommen von Klauenerkrankheiten. In erster Linie ist es wohl der Mangel an Bewegung, der diese Organe schwächt, vor allem auch die physiologische Abnützung verhindert. Dann entstehen abnorme Blutdurchströmungsverhältnisse mit langsam wirkenden Ernährungsstörungen in der Lederhaut und damit in der Hornbildung. Deformationen sind so wohl erklärlich. Auch ist das Widerlager des meist sehr harten Fußbodens sehr geeignet, die Deformationsprozesse zu unterstützen. Diese wirken sich hernach auf die Beugefedern aus. Bei auffallend viel liegenden Tieren sollte das Stallpersonal auf solche Verhältnisse achten. Dazu kommt, daß bei ausschließlicher Stallhaltung die Reinigung der Klauen und ihre Pflege sehr oft vernachlässigt ist. Die Exkrete durchsetzen das Horn, erweichen und unterstützen auch von dieser Seite etwa durch andere Momente geförderte Veränderungen. So erklären sich die auch beim Rinde am Klauenapparat auftretenden Zerfallserscheinungen, wie sie vom Pferde her bekannt sind. Die Trächtigkeit ist von großem Einfluß auf das Hornwachstum, auch der Klauen. Das Schwergewicht der ernährenden Zirkulation ist auf den graviden Uterus verlegt.

Dazu kommt ein stark vergrößertes Gewicht des Körpers auf die schwächeren Zehenorgane. Bei vielen Fällen von „Muskelrheumatismus“ bei stark milchenden Kühen würde sich eine gründliche Untersuchung der Klauenanomalien sehr lohnen. Der Einfluß spezieller Fütterung ist ein nachteiliger, wenn bereits Klauenerkrankungen bestehen. Wenigstens hat man Verzögerungen der durch übermäßige Verabreichung von Kraftfutter beobachtet; man glaubt, es komme durch eine Störung im Säurestoffwechsel zustande. Das Beschlagen der Rinder, 4—5 mm dick, kann in vielen Fällen die Sohle weitgehend schützen. Der Beschlag muß aber unter genauer Würdigung der für den entsprechenden Fall geltenden physiologischen Eigenschaften geschehen. Einfach ein Eisen aufzusetzen, hat keinen Zweck. Die Anatomie und Physiologie bestimmt, genau wie beim Pferde, die Art des Beschlages. Die richtige Fixierung des Tieres zum Ausschneiden und evtl. Beschlagen ist etwas umständlicher als beim Pferde. Man hat verschiedene Methoden von Ständen, in welche die Tiere gestellt werden und die Gliedmaßen zur Bearbeitung freigemacht werden können. — Es wird namentlich in Hinsicht der fachgemäßen Pflege der Klauen durch Beschneiden usw. zudem die Lektüre des auch mit Abbildungen ausgestatteten, ausführlichen Originals empfohlen.

M. G.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Vogel, W.: Beitrag zur Geschichte der Veterinärhygiene der Deutschen Mittelalters und der neueren Zeit. (In.-Diss. Leipzig 1928.)

Die Veterinärhygiene hat sich im Verlauf des Mittelalters und der neueren Zeit entsprechend der Verbesserung des landwirtschaftlichen Betriebes im großen ganzen etwas gehoben. Namentlich zur Ritterszeit stand das Pferd an erster Stelle und dürfte wohl eine gute Pflege genossen haben, obwohl darüber eingehende Mitteilungen nicht vorliegen. Das Rind war als nächstbewertetes Haustier wohl nur schlecht gepflegt (geringer Wert, nur die Schweizer Zuchten gaben Anreiz zur besseren Pflege). Die Pflege der Schafe lag vollkommen in Händen des Schafhirten, für den besondere Vorschriften hinsichtlich seiner Pflichten und Gerechtsame bestanden. In nicht minder hohem Ansehen stand der Schweinehirt, für den ebenfalls gesetzliche Vorschriften erlassen waren. Das Schaf war dem Landwirt ein begehrter Handelsartikel als Wollespender, das Schwein galt als hauptsächlichster Fleisch- und Fettlieferant. Die Hundehaltung wurde im Mittelalter entsprechend hoch gewürdigt; die Geflügelhaltung und Bienenzucht standen in hoher Blüte, während die Fischerei im Mittelalter kaum größere Fortschritte gemacht haben dürfte. Die Ernährung des Viehes geschah entsprechend der extensiven Wirtschaft, solange es die Witterung erlaubte auf der Weide (Eigenweiden für Rinder, unbestelltes Brachland für Schafe und Schweine, Wälder für Schweine; Festlegung der Gemeindeweiden durch Gesetz). Beim Schweine spielt die Eichelmaß eine große Rolle; im übrigen gründete sich für die anderen Tiere die Fütterung im Winter auf Heu und Stroh als Grundfutter, nebenbei Müllereiabfälle, Hafer, Gerste, Häcksel (für Pferde), bei Schafen und Kühen Rüben als Beifutter. Die Stallungen waren einfach hygienisch, verhältnismäßig vorteilhaft errichtet (warm und infolge Porenventilation trocken). Der Fußboden war zwar nach heutigen Begriffen im allgemeinen warm, aber es fehlte meist eine ungenügende Beschleußung, die sich namentlich bei vorkommenden Seuchen schwer rächte (Holz, Balken oder Bretter, mitunter auch Kopfsteinpflaster). Hühnerställe waren primitiv, nur abgeteilte Räume der Schweine- und Rinderställe; hingegen war das Taubenhäus vielfach gesondert errichtet. Körperpflege, Putzen, Hufbeschlag erfreute sich, soweit das Pferd in Frage kam, einer besonderen Beachtung. Als Zugtier wurden Pferde und Ochsen vorzüglich verwendet (Beschlirung entsprach

bereits in den Grundzügen der heutigen). Über die Fleischi-hygiene liegen bereits die Anfänge der Fleischschau vor, entsprechend dem damaligen Wissen; der Begriff des Ekel-erregens ist wohl der ausschlaggebende Faktor gewesen und daher wurde der Hauptwert auf das Äußere gelegt. Die Milchnutzung war nur gering. Käse- und Butterbereitung, z. T. auch aus Schaf- und Ziegenmilch, scheint nicht unbedeutend gewesen zu sein (Schweizerkäsefabrikation). Die Wollnutzung war zu Beginn des Mittelalters gerade ausreichend, später wurde Wolle vom Ausland eingeführt. Gegen Ende dieser Periode wurde dieser wirtschaftliche Nachteil durch umfangreiche Züchtung des Merinoschafes behoben. Entsprechend der Nutzung des Hundes zu verschiedenen Zwecken entwickelten sich verschiedene Nutzungsrasen. Hinsichtlich der Seuchen ist festzustellen, daß bei den Rindern die Rinderpest die bei weitem schwersten Verluste verursacht hat; Milzbrand, einschl. Rauschbrand ist lange in seinem Wesen unerkant geblieben; die Lungen-seuche, die Maul- und Klauenseuche sowie Rotz sind ebenfalls bekannt gewesen; die Tollwut hat verschiedentlich zu umfangreichen Seuchenzügen Veranlassung gegeben. Die Beseitigung der gefallen Tiere einschl. der Seuchenkadaver unterblieb vielfach vollständig; immerhin sind die Anfänge eines Abdeckereiwesens bereits im Mittelalter festzustellen, da sich die Anschauung Bahn brach, daß die mangelhafte Vernichtung der Tierleichen der Verbreitung der Seuchen Vor-schub leistet. A.

Walterfang, C.: Ein Beitrag zur Behandlung der Tuberkulose des Rindes. (In-Diss. Gießen 1927.)

Verf. bespricht die bisherigen Methoden der Bekämpfung der Tuberkulose und dann seine eigenen Versuche zur Nachprüfung des von Karfunkel angegebenen Verfahrens zur Behandlung der Kindertuberkulose. K. berichtete über eine erfolgreiche Heilbehandlung der Tuberkulose durch subkutane Verwendung der Vakzine eines völlig avirulenten, saprophytischen Bazillus aus der Gruppe der Wurzelbazillen, der mit dem Tuberkelbazillus nicht verwandt, z. B. nicht säurefest ist. Hauptanwendungsgebiet soll die Kindertuberkulose sein, hauptsächlich der noch nicht tuberkulosekranken, sondern vorerst infizierten Kinder, die auf Pirquet positiv reagieren. Günstig beeinflusst wurden auch bei Erwachsenen Lungen-, Knochen-, Gelenk-, Mesenterialdrüsentuberkulosen usw.; es wurde Heilung oder weitgehende Besserung erzielt. Einen Schutz vor der Infektion mit dem Tuberkelbazillus soll die Vakzinierung nicht bieten, dagegen imstande sein, solche Infektionen, besonders in den Anfängen, zu beseitigen. Goldberg prüfte das Verfahren an Kälbern nach und fand, daß von 15 von der Vakzinebehandlung auf Tuberkulin positiv reagierenden Kälbern nunmehr 9 = 60 Proz. negativ, während 6 = 40 Prozent noch positiv reagierten. (Beseitigung bzw. Schwinden der tuberkulösen Herde oder auch das Wachstum des Körpers beeinflussender Faktor.) Nach den Untersuchungen Walterfangs an 22 Rindern im Alter von 1½ bis 5 Jahren gelang es, die Befunde Goldbergs an auf Tuberkulin reagierenden, älteren Rindern mit dem Ergebnis zu bestätigen, daß acht Wochen nach Beendigung der gleichartigen Behandlung 45,5 Prozent und auch noch elf Monate nachher 44,4 Prozent der Versuchsrinder sich tuberkulinunempfindlich zeigten. Ob eine Heilung der Tuberkulose bei diesen Tieren infolge der Behandlung eingetreten ist, entzieht sich vorläufig der Feststellung. A.

Kentrup, H.: Beiträge zur Tuberkulose-Diagnostik ver-mittelt der Komplementablenkung. (In-Diss. Gießen 1927.)

Die Komplementbindungsmethode ist nicht streng spezifisch, da man gelegentlich bei tuberkulösen Tieren auch negative und bei nicht tuberkulösen auch positive Resultate erzielt. Es läßt sich kein sicherer Unterschied feststellen zwischen aktiver und inaktiver Tuberkulose. Die Ausbreitung des Prozesses gibt nur ganz unsichere Anhaltspunkte

in Bezug auf die Stärke der Reaktion; jedoch verläuft die Reaktion um so eher positiv, je umfangreicher der Prozeß ist. Die Methode ist daher nicht ausreichend zur Diagnose und für zuverlässige, klinische Verwertbarkeit wäre ein weiterer Ausbau angezeigt. A.

Holz: Über weitere Erfolge mit dem Friedmann-Mittel bei der Tuberkulose exotischer Tiere im Tierpark Stellingen. (Aus dem Hagenbeck'schen Tierpark in Stellingen.) (T. R. 1928, S. 319.)

Durch die Anwendung des Friedmann-Mittel konnten tuberkulös erkrankte, tuberkuloseverdächtige und -gefährdete Wildtiere (Affen, Bären, Renntiere, Löwen, Tiger) geheilt bzw. geschützt werden. In einem Transport von Mantelpavianen, in welchem ein rapides Tuberkulosesterben einsetzte, so daß täglich 3—5 Tiere eingingen, hörte das Sterben sofort auf und konnten die Tiere noch ¼—½ Jahr am Leben erhalten werden. Während bei den ungeimpft eingegangenen Tieren frische Disseminationen und käsige, verjauchte, kavernöse Herde gefunden wurden, wiesen die geimpften dieselben Herde großenteils bindegewebig induriert mit Verkalkungen auf. Nach Ansicht des Verf. wären die Tiere womöglich ganz am Leben zu halten gewesen, wenn nicht die Witterungs- und Grundwasserverhältnisse die denkbar ungünstigsten gewesen wären. Eine wachsende Geschwulst am Oberkiefer eines Känguruh mit zentraler Erweichung, aus welcher sich eine grünlich gelbe, käsige Masse hervordrücken ließ, wurde vom Verf. als aktinomykotischer Natur angesprochen. Dieselbe konnte durch das Friedmann-Mittel vollkommen zur Abheilung gebracht werden. K. H. Meyer.

Jütting: Praxiserfahrungen mit Hexamethylentetramin-lösungen bei der Borna'schen Krankheit des Pferdes. (T. R. 1928, S. 303.)

Von 7 mit 15—20prozentiger Hexamethylentetramin-lösung wegen Borna'scher Krankheit behandelten Pferden, konnte nur ein Tier, welches erst am sechsten Tag zur Beobachtung kam, nicht geheilt werden. Trotz der großen Mengen — 1 Tier erhielt 1500 ccm in 12 Injektionen — welche den Tieren iv. gereicht wurden, kamen keinerlei nachteilige Folgen zur Beobachtung. K. H. Meyer.

Zimmermann, H.: Einfluß der Rotlauffchutzimpfung auf das Vorkommen des Rotlaufs in Sachsen. (Nach den Unterlagen der Anstalt für staatliche Schlachtviehversicherung in Dresden.) (T. R. 1928, S. 307.)

Um die Vornahme der Schutzimpfung zu fördern, gewährt die Anstalt für staatliche Schlachtviehversicherung in Sachsen eine Beihilfe innerhalb einer festgesetzten Impfperiode und entschädigt nur dann Tiere, die an Rotlauf oder Backsteinblattern erkranken und geschlachtet werden müssen, wenn diese Tiere der Rotlauffchutzimpfung durch einen approbierten Tierarzt unterworfen waren. In anderen Fällen tritt eine Kürzung der gesetzlichen Entschädigung um 50 Prozent ein. Anerkannt sind das Impfverfahren nach Lorenz (Simultan) und Böhme (Emphyton). An Hand der Statistik für das Berichtsjahr 1927 läßt sich zeigen, daß die Rotlauffchutzimpfung einen erheblichen Einfluß auf die Verminderung der Rotlauffschadenziffer hat. Der Prozentsatz der mit Emphyton schutzgeimpften und trotzdem erkrankten und notgeschlachteten Tiere ist höher als bei den nach Lorenz geimpften und verhält sich wie 4 : 1.

K. H. Meyer.

Berthold, G.: Aktive Immunisierung gegen Rotlauf, durchgeführt an weißen Mäusen. (B. T. W. 1928, S. 298.)

Versuch, mit durch Methylenblau abgetöteten Rotlauf-erregern aktiv zu immunisieren. Einer 24stündigen hochvirulenten Bouillonkultur wurden einige Tropfen einer 5prozentigen Methylenblaulösung zugefetzt und die Mischung im Brutschrank bei 60 Grad C während 48 Stunden gehalten. Nach dieser Zeit sind die Erreger abgetötet und zur Immunisierung geeignet. Vergleichende Immuni-

sierungsversuche an weißen Mäusen mit derartig behandelter Kultur und mit Rotlaufferum ergaben, daß im ersten Falle nach vorausgegangener Impfung mit 0,008 ccm abgetöteter Kultur erst eine Infektion mit 0,035 ccm virulenter Kultur tödlich wirkt. Wurden die Mäuse dagegen mit 0,008 ccm Serum vorbehandelt, so trat der Tod schon nach Injektion von 0,01 virulenter Kultur ein. Daraus ergibt sich, daß die Immunität der mit Methylenblau-Kultur behandelten Tiere einen höheren Grad erreichte wie die der mit Rotlaufferum immunisierten Mäuse. Carl.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Hunziker, R.: **Vielhörigkeit bei Ziegen** (Schweiz. Arch. für Tierheilkunde 1928, Bd. 70, S. 201.)

Verf. hat eine vierhörige Ziege abgebildet, deren Mutter zwei-, der Vater vierhörig war. Mit zwei Jahren warf sie ein vier- und dreihörniges Zicklein, später dann normale zweihörnige. Merkwürdigerweise ist das Tier wenig temperamentvoll, bleibt wenig bei der Herde, und ist wenig milchend; es vermeidet ängstlich jede Berührung der Hörner mit festen Gegenständen und zeigt sonst Zeichen des Unbehagens. H. Graf.

Behn, K.: **Ein Fall von echter Pentadactylie beim Schwein.** (In.-Diss. Berlin 1925.)

Die Untersuchung ergab eine Fünffzigigkeit. Die fünfte Zehe nimmt den Platz eines Daumens ein; sie ist an dem zugehörigen Mittelfußknochen Mc. I angelenkt, der selbst eine gelenkige Verbindung mit dem zuständigen Handwurzelknöchelchen, dem os multangulum maius eingeht. Die Zehe hat drei Zehenglieder. Sie ist durch selbständige Muskeln beweglich und ist mit Muskeln und Sehnen so gut versorgt wie die Hauptzehen. Sonst besteht an den übrigen Zehen keine Abweichung von der Norm. Die Fünffzigigkeit besteht sowohl am linken als auch am rechten Vorderfuß des Schweines. Für diese Mehrzehigkeit erscheint der Name „echte Pentadactylie“ berechtigt. Die Voraussetzungen für eine atavistische Erklärung treffen für unsern Fall zu; denn 1. hat die Überzahlzehe genau dort ihren Sitz, wo die Vorfahren der Gattung Sus eine Zehe mehr als die jetzt lebenden Artvertreter hatten, 2. der anatomische Befund der Überzahlzehe und ihre Artikulation stimmen mit demjenigen des phylogenetisch bekannten Gliedmaßenstücks überein, 3. es besteht nur eine Pentadactylie durch Wiedererscheinen der ersten Zehe. Außerdem bekräftigt nach der Ansicht von Kitt der Umstand die Annahme des Atavismus, daß die Hyperdactylie symmetrisch an beiden Vordergliedmaßen vorhanden ist. Die atavistische Polydactylie beim Schwein ist bisher zweimal von Stoss und Rubelie beschrieben worden. Mit dieser Arbeit wird also der dritte Fall einer atavistischen Daumenbildung beim Schwein bekannt. A.

Matoff, K.: **Zur Kenntnis der russischen Pferdezeitung vor und nach dem Weltkriege.** (In.-Diss. Berlin 1926.)

Nach den Angaben des Veterinäramtes stieg die Zahl der Pferde im europäischen Rußland in den letzten dreißig Jahren von 1882 bis 1912 allmählich von 16 Millionen auf 25 Millionen (auf 100 Einwohner 20,4 Pferde). Nimmt man in Rußland 70 Prozent erwachsene Pferde an, so entfallen auf jedes Pferd mehr als 6 ha landwirtschaftlich benutzte Fläche; damit rückt Rußland in dieser Beziehung fast an die letzte Stelle von allen Kulturländern. Die Zahlen weisen bis 1916 keine Veränderung auf; ganz anders gestaltet sich aber das Bild der russischen Pferdezeitung vom Jahre 1918 ab; es stellte sich bis 1922 ein schneller Rückgang ein, der seine kumulative Höhe während des Hungerjahres 1921 und des folgenden 1922 erreichte. Schon im Jahre 1923 begann eine Erholung und bis 1925 ist ein wesentlicher Aufstieg zu verzeichnen. Die hauptsächlichsten Faktoren des Niederganges der russischen Pferdezeitung waren: der Weltkrieg, der Bürger-

krieg, die Hungerperiode, die Seuchen und andere mit schlechter Ernährung zusammenhängende Krankheiten. Rußland besitzt Staatsgestüte, die nach ihrer Bestimmung den Hauptgestüten in Deutschland entsprechen, und die Staatsställe, die den deutschen Landgestüten gleichzustellen sind (zur Zeit etwa 15—20 Hauptgestüte; die Zahl der Landgestüte ist von 44 auf 20 gesunken). Für die russische Landwirtschaft ist die Hebung der Zucht des schweren Arbeitspferdes von größter Bedeutung. Zur Veredelung der russischen Pferdezeitung bedarf es heute ohne Zweifel einer jahrelangen systematischen Einfuhr von Pferden der schweren Arbeitsrassen (hauptsächlich kämen in Frage: Clydesdaler, Belgier und Percherons). Eine große Einfuhr solcher Zuchthengste ist allerdings nach der Auffassung mancher russischer Züchter vorerst zu verwerfen, da anfangs passende Stuten fehlen und die schlechte Ernährung und Wartung ungünstig auf die Aufzucht der Kreuzungsprodukte mit den westlichen Arbeitspferden einwirken werden. Jedoch, wenn Hengste in Gebieten verteilt werden, die sich bereits durch besondere Vorliebe und Befähigung der Bevölkerung in pferdezüchterischer Hinsicht ausgezeichnet haben, wird der Boden der obigen Annahme entzogen. Wenn überhaupt Gründe zur Einschränkung der Einfuhr ausländischen Materials bestehen, so sind sie lediglich wirtschaftlicher Art. Um eine Unabhängigkeit der russischen Pferdezeitung herbeizuführen, sollte der russische Staat zur Bildung einheimischer Zuchtgebiete für die Züchtung der schweren Arbeitsrassen in reiner oder Kreuzungsform verhelfen. Auch sollte der Staat für eine Regelung und Sicherstellung der tierärztlichen Hilfe im Falle von Seuchen und anderen Erkrankungen Sorge tragen. Dazu gehört die Durchführung eines Viehseuchengesetzes und die Vermehrung und angemessene Befoldung des tierärztlichen Personals für seine mühsame und verantwortliche Tätigkeit. A.

Jensen, C. O.: **Aus dem Gebiete der Bekämpfung und Diagnostizierung des seuchenhaften Rinderabortus in Dänemark.** (Festschrift zu Eugen Fröhners 70. Geburtstag. Verlag Ferdinand Enke, Stuttgart.)

Da in Dänemark der seuchenhafte Rinderabortus seit 1920 zu den im Tierseuchengesetze erfaßten Seuchen zählt und die dänischen Tierärzte bei Verdacht auf seuchenhaftes Verkälben Untersuchungsmaterial an eine Zentraluntersuchungsstelle in Kopenhagen einsenden müssen, stand dem Verf. umfassendes statistisches Material zur Verfügung. In den Jahren 1920—1927 wurden 67 496 Nachgeburten untersucht, von denen 17 370 = 25,7 % positiv waren. Beachtenswert ist, daß man dem Resultat der Blutuntersuchung für die Diagnose nur ausnahmsweise entscheidende Bedeutung beimißt, da sie bei positivem Ausfall nur beweise, daß das Tier unter Einwirkung von Abortusbakterien gestanden hat, nicht aber, daß es an einer Abortusinfektion leide oder gelitten hat. Die mikroskopische Untersuchung bezeichnet Jensen ebenfalls als nicht ganz befriedigend. Zuverlässige Resultate gebe die Antigenreaktion nach Holth, bei der ein Kochextrakt von Kötyledonengewebe als Antigen in einer Komplementbindungsreihe dient. Der Prozentsatz der Abortusfälle war an den diagnostischen Untersuchungen eines Jahres gemessen am größten im 8. Trächtigkeitsmonat bei Abortusbakterieninfektion, im 9. bei Tuberkulose des Uterus und der Eihäute und im 7. bei Spirillenabortusfällen. Im Kalenderjahre 1926 enthielten von 12 792 untersuchten Nachgeburtsprouben 3148 (24,6 Prozent) Abortusbakterien, 79 (0,6 Prozent) Tuberkelbakterien und 60 (0,47 Prozent) Spirillen. Gipmann.

Bang, O.: **Über Schutzimpfung mit lebenden Kulturen gegen das seuchenhafte Verwerfen des Rindes.** (Festschrift zu Eugen Fröhners 70. Geburtstag, Seite 1. Verlag Ferdinand Enke, Stuttgart.)

An insgesamt ungefähr 2500 Tieren führte Verf. in Dänemark subkutane Impfungen gegen das seuchenhafte

Verkalben aus. Davon dienten 589 mit abgetöteter Kultur behandelte Tiere als Kontrolle gegenüber den übrigen, die mit lebenden Erregern geimpft wurden. Von 1858 mit virulenten Kulturen behandelten Kühen verkalbten 14,74 Prozent, von 589 mit abgetöteten Abortusbakterien geimpften Tieren dagegen 38,71 Prozent. Verf. schließt aus seinen Immunisierungsversuchen, daß Behandlung mit lebender Kultur die Anzahl der Fälle von Verwerfen bedeutend verringern kann. Über die Impfung mit abgetöteten Erregern will er nicht urteilen, da ihm Kontrollversuche fehlen. Er glaubt aber, daß in Beständen mit chronischem Verkalben letztere Behandlungsart von Nutzen sein kann. Da es in Dänemark gelungen ist, in Fällen von febris undulans beim Menschen verschiedentlich Abortusbakterien als Ursache festzustellen, untersuchte Verf. die Häufigkeit des Auftretens von Abortusbakterien in der Milch infizierter Tiere. Von 60 Kühen aus sechs Beständen schieden 21 den Erreger des feuchten Verkalbens mit der Milch aus, was durch Meerfischweinenimpfungen ermittelt wurde. Der häufige Befund von Abortusbakterien in der Milch von Kühen, die verkalbt haben, wird damit bestätigt. Zum Schluß werden zwei interessante Versuche mit Abortuskulturen angeführt, die M. Kristensen aus dem Blute kranker Menschen gezüchtet hatte. Es wurden mit den Stämmen zwei im sechsten Monat tragende Kühe intravenös infiziert. Das eine Tier, welches zwei Schrägagarkulturen erhalten hatte, verkalbte schon acht Tage nach der Impfung und lieferte infektiöse Milch bis zum Schlachten, welches $3\frac{1}{2}$ Monate nach dem Verwerfen erfolgte. Die zweite Kuh erhielt $\frac{1}{10}$ Schrägagarkultur und abortierte 29 Tage nach der Impfung. Auch hier wurde der Erreger wieder nachgewiesen. Gippmann.

Klaften, E.: Die biologische Schwangerschaftsdiagnose. (Wiener Klinische Wschr. 1927, Nr. 35, S. 1111—1116.)

Das Abderhaldensche Verfahren ist biologisch gut fundiert, praktisch aber noch nicht in dem Maße verlässlich, daß man von einer absoluten Spezifität der Reaktion sprechen könnte. Die besten Resultate wurden mit dem kombinierten Verfahren der Dialysiermethode und des optischen Nachweises erzielt. Mit der auf demselben Prinzip aufgebauten Kottmannschen Probe erzielte man gleichzufetzende Resultate. Die auf mikrochemischem Wege aufgebaute Abderhaldensche Reaktion (Bestimmung des Refraktometerwertes) von Pregl und de Crinis hat auch wohl 92 Prozent spezifischer Ausfälle erzielt, die Methode ist von wirklicher Spezifität jedoch auch noch weit entfernt und zu kompliziert, so daß sie nur in Laboratorien zur Ausführung gelangen kann. Die Alkoholextraktreaktion von Sellheim, Lüttge-Mertz stellt einen wesentlichen Schritt nach vorwärts dar, viele Nachuntersucher kommen aber zu unbefriedigenden Resultaten. Sellheim und seine Mitarbeiter haben bekanntlich auch versucht, mit der Methode der Serumextraktreaktion die Geschlechtsprognose des Rindes in der Intrauterinperiode auszubauen (Begründung auf die Erkenntnis der fetomaternalen Organkorrelation). Der Übergang von Hodeninkreten ins mütterliche Blut erfolgt beim Vorhandensein einer männlichen Frucht im Uterus; ihr Nachweis gestattet daher den Schluß auf das Tragen eines Knaben. Ist die Frucht weiblichen Geschlechtes, dann fehlt die Hodenfremdreaktion im mütterlichen Blute. Aus den vorliegenden Nachprüfungen ergeben sich weitgehende Schwankungen in der Prozentzahl der zutreffenden Fälle (55—95 Prozent bei Nachuntersuchungen gegenüber 98,7 Prozent bei Sellheim-Lüttge-Mertz). — Eine absolut verlässliche, spezifische biologische Schwangerschaftsprobe besitzen wir nach den Darlegungen bis jetzt noch nicht. Es hängt dieses Verhalten vor allem mit der ungleichmäßigen Reaktion des Organismus auf die eingetretene Gravidität zusammen, welche sich individuell sehr verschiedenartig gestalten kann. In neuerer Zeit sind auch neben den Veränderungen im Blute und im Serum und außer den Immunitätsreaktionen

besonders die Veränderungen im Kohlehydratstoffwechsel für die Frühdiagnose herangezogen worden. Für den Praktiker kommen im Einzelfalle als Schwangerschaftsproben vor allem die alimentäre Glykosurie, am einfachsten in Form der peroralen Darreichung von 100 Gramm Traubenzucker, die Phloridizinglykosurie, die alimentäre Azetonurie und die Kottmannsche Probe in Betracht. Die Stoffwechsel-Proben fallen auch im Prämenstrum häufig positiv aus A.

Vald. Adersen: Forgifteingstilfaelde hos Svin ved Fodring med Bomuldsfrokager. (Fälle von Vergiftung bei Schweinen nach Fütterung mit Baumwollfamenkuchen.)

(Aus dem Serumlaboratorium der kgl. tierärztlichen und landwirtschaftlichen Hochschule.) (Maanedskrift for Dyrlaeger, 40. Bind, 2. Hæfte, S. 33—63.)

In verschiedenen Bezirken des Landes wurden auf zahlreichen Gütern unter den Schweinen, besonders unter den 3—4 Monate alten Ferkeln, zahlreiche Erkrankungen und plötzliche Todesfälle beobachtet. Das Futter bestand aus einem Gemisch von Baumwollfamenkuchen, Mais und einheimischer Gerste, und zwar entweder zu gleichen Teilen oder zu 2 Teilen Mais, 1 Teil Gerste und Weizen sowie 1 Teil Baumwollfamenkuchen neben ganz wenig Blutfutter und Kleie. Die Erkrankungen und Todesfälle hörten auch nicht sofort auf, als mit der Verfütterung des Baumwollfamenkuchens ausgesetzt wurde und das Futter nur aus Mais, einheimischer Gerste, Magermilch und Wasser bestand. Die Sektion ergab Stauungserscheinungen in der Leber und in den übrigen Hinterleibsorganen viel Transsudat und einzelne Fibringerinnsel in der Bauchhöhle, großes, dilatiertes und schlaffes Herz, graugelbe, marmoriert aussehende, sehr mürbe Herzmuskulatur, derbe Verdichtung in einem Falle mit beginnender Nekrosebildung in einzelnen Teilen oder in anderen Fällen katarrhalische Pneumonie, Injektion der Därme und schwache Rotfärbung der Darmflehnhaut.

Die bakteriologische Untersuchung der Milz und der Gekrösedrüsen fiel negativ aus, in den Verdichtungen der Lunge des einen Ferkels wurden zahlreiche Streptokokken und ovale Bazillen nachgewiesen. Sie waren aber, wie die subkutane Impfung einer weißen Maus und die intraperitoneale Impfung eines Meerfischweinchens ergab, avirulent.

Es bestand Verdacht, daß es sich um eine Futtervergiftung handelte und zwar erschien, da die Schweine, die nur Mais und Gerste erhalten hatten, nicht erkrankt waren, der Baumwollfamenkuchen verdächtig. Daher wurden Fütterungsversuche angestellt an 6 Ferkeln. Diese erhielten ein Gemisch aus 1 Teil Baumwollfamenkuchen, 1 Teil Korn (Gerste und Weizen), 2 Teilen Mais, ganz wenig Blutfutter und Kleie. Die Ferkel, deren Gewicht bei Beginn des Versuches zwischen 8 und 14 kg schwankte, nahmen zuerst von dem Futter jedes täglich etwa 800—1200 Gramm mit gutem Appetit auf, nach einigen Wochen verloren fünf von den Ferkeln aber die Freßlust, zeigten Atembeschwerden und starben schließlich, nachdem die letzten 4—5 Tage vor dem Tode ihre Temperatur subnormal gewesen war. Bei der Sektion wurden die oben erwähnten Veränderungen angetroffen.

Das sechste Ferkel, dessen Anfangsgewicht 8 kg betragen hatte, verzehrte anfangs das Mischfutter mit gutem Appetit, weigerte sich aber nach Verlauf von drei Wochen, das Futter zu fressen, nahm dagegen Gerstenschrot und Magermilch gern auf. Als es zehn Tage lang keinen Baumwollfamenkuchen mehr erhalten hatte, verlor es wiederum seinen Appetit, seine Temperatur war subnormal, heftige Atembeschwerden traten auf. Im Verlauf einer Woche wurde aber Temperatur und Respiration wieder normal, der Appetit kehrte zurück und das Ferkel nahm an Gewicht zu. Etwa $3\frac{1}{2}$ Monate nach Beginn des Versuches wog das Tier 48 kg und vier Wochen später, als es geschlachtet wurde, 72 kg. Bei der Sektion wurde nichts Abnormes nachgewiesen.

Um nun die Lungenkomplikationen auszuschließen, die bei einigen der Versuchstiere sich gezeigt hatten, und von

denen der Verf. annimmt, daß sie sekundärer Natur sind, wurden außerdem an vier Ferkeln, die aus Beständen stammten, in denen die letzten drei Jahre kein Lungenleiden unter den Ferkeln aufgetreten war, Fütterungsversuche angestellt. Die Tiere wurden vorsichtshalber alle zehn Tage mit Schweinefeucheserum geimpft, um sie gegen die Schweinefeuchebazillen passiv immun zu machen. Bei Beginn des Versuches waren die Tiere acht Wochen alt und wogen zu dieser Zeit 11,5—15 kg. Jedes Ferkel wurde für sich gesperrt. Die ersten Tage erhielten sie Gerstenschrot und Magermilch. Nach acht Tagen wurde bei dreien 10 bzw. 20 bzw. 30 Prozent des Kraftfutters durch Baumwollfamenkuchen ersetzt, das vierte, das Kontrolltier, erhielt dauernd ausschließlich gequetschte Gerste. 36 Tage lang zeigten die Tiere nicht die geringste Krankheitserscheinung, die folgenden drei Tage erhielten alle Ferkel ausschließlich eine Mischung ausgequetschter Gerste und Mais, und zwar wurde bei jeder Mahlzeit die Menge Mais in der Mischung gesteigert, so daß die Tiere im Laufe der drei Tage allmählich eine Mischung aus gleichen Teilen Gerste und Mais erhielten. Vom vierten Tage ab wurden für die drei Versuchsferkel wieder 10, 20 bzw. 30 Prozent der Kraftfuttermischung durch Baumwollfamenkuchen ersetzt, das Kontrolltier erhielt weiter gleiche Teile Gerste und Mais. Das Schwein, das die Mischung mit 30 Prozent Baumwollfamenkuchen erhielt, wurde 43 Tage, das mit 20 Prozent 34 Tage und das mit 10 Prozent 77 Tage nach Beginn des Versuches krank. Sie verloren den Appetit, zeigten Atembeschwerden, lagen teilnahmslos da, ihre Temperatur war subnormal, und ihre Ohren färbten sich zyanotisch. Nach einer Krankheitsdauer von 17 bzw. 7 bzw. 22 Tagen starben die Tiere. Sie hatten 12,5 bzw. 12,0 bzw. 12,4 kg Baumwollfamenkuchen aufgenommen. Das Kontrolltier war bereits 4½ Monate munter und zeigte guten Appetit. Dann verschlechterte sich dieser, da das Tier an einer Entzündung des linken Sprunggelenkes litt und dadurch heftige Schmerzen hatte. Deswegen wurde es geschlachtet. Bei der Sektion wurden beträchtliche Blutinfiltrationen und eine phlegmonöse Anschwellung von der Mitte des Unterschenkels bis zum ganzen Mittelfuß nachgewiesen. Im Sprunggelenk fand sich eine geringe Menge Synovia, ein Defekt im Gelenkknorpel am unteren Ende des Unterschenkels, starke Hyperämie im Knochengewebe, am Ende des Knochens eine starke hyperämische Zone unter dem Knorpel. Bakterien wurden in dem Gelenk weder durch Kultur noch durch mikroskopische Untersuchung nachgewiesen, wohl aber in der phlegmonösen Anschwellung Staphylokokken.

Der Verf. empfiehlt, da Baumwollfamenkuchen selbst in kleinen Mengen ein gefährliches Futter für Schweine bildet, ihnen dieses Futter nicht zu verabreichen. In therapeutischer Hinsicht empfiehlt er, die kranken Tiere in besonderen, gut ventilierten Räumen, wenn möglich im Freien, unterzubringen und ihnen völlige Ruhe zu gewähren.

Referent möchte hierzu bemerken, daß die verabreichten Mengen Baumwollfamenkuchen viel zu hoch gewesen sind. Bereits 1910 hat er in seiner „Haltung und Pflege der Haustiere in gefunden und kranken Tagen“ bemerkt, „Für Schweine sind hundert Gramm aufs Haupt und den Tag schon viel zu nennen“ und 1923 in seiner „Haltung und Pflege des Schweins in gefunden und kranken Tagen“ schreibt er „Zur Verhütung der Vergiftung ist darauf zu achten, daß das Futter tadellos beschaffen ist und daß nicht eine zu große Menge verabreicht wird. Bei Ferkeln ist die Verfütterung des Baumwollsaatmehles am besten ganz zu unterlassen, bei erwachsenen Schweinen ist sie in beschränktem Maße zu gestatten, und zwar ist nur das gereinigte sog. Erling'sche Baumwollsaatmehl zu verwenden. Von diesem sind auf das Schwein und den Tag höchstens 100 Gramm zu geben, selbstverständlich nicht sofort, sondern es ist zunächst mit einer geringen Menge zu beginnen

und diese allmählich zu steigern. Dabei ist auch noch darauf zu achten, daß Schweine von gleicher Freßlust in jeder Abteilung des Stalles zusammengestellt werden und daß das Baumwollsaatmehl mit dem übrigen Futter innig gemischt wird. Denn sonst würden die gierigen Freßer eine zu große Menge des genannten Futterstoffes aufnehmen.

B aß.

Nahrungsmittelhygiene.

Abänderung des § 36 der Ausführungsbestimmungen A zum Reichsfleischbeschaugesetz.

In Nr. 34 des Reichsministerialblattes (Zentralbl. für das Deutsche Reich) vom 3. August 1928 findet sich folgende Verordnung zur Abänderung des § 36 der Ausführungsbestimmungen A zum Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetz:

Der § 36 der Ausführungsbestimmungen A zum Reichsgesetze, betreffend die Schlachtvieh- und Fleischschau, vom 3. Juni 1900, in der Fassung der Verordnung des Reichsministers des Innern über Abänderung der Ausführungsbestimmungen A und C zum Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetz vom 10. August 1922 (Zentralbl. für das Deutsche Reich 1922 S. 477) wird nach Zustimmung des Reichsrats wie folgt gefaßt:

§ 36.

Geschlechtsteile, bei Schweinen einschl. des Nabelbeutels, und Afterauschnitte, soweit sie nicht als sog. „Krone“ am Mastdarm verbleiben, sowie Hundedärme sind stets als untauglich zum Genuß für Menschen anzusehen. Augen und Ohrenausschnitte dürfen in keiner Form als Nahrungsmittel für Menschen verwendet werden. Sie sind unschädlich zu beseitigen. Ist dies nicht bei der Fleischschau geschehen, so hat die unschädliche Beseitigung dieser Teile durch den Besitzer der geschlachteten Tiere zu erfolgen.

G.

Kennzeichnung des Fleisches bei Unterbrechung der fleischbeschaulichen Untersuchung.

RdErl. d. MfLDuF. vom 30. Juli 1928. — V 6679 I. Ang.

Einige zu meiner Kenntnis gelangten Fälle lehren, daß die Nichtkennzeichnung von Fleisch, bei dem die fleischbeschauliche Untersuchung eingeleitet, aber nicht alsbald abgegeschlossen werden kann, zu unliebsamen Zwischenfällen führen kann. Derartiges Fleisch, dessen bakteriologische Untersuchung eingeleitet war, wurde zwecks besserer Aufbewahrung an einen anderen Ort geschafft. Irrtümlich gelangte es dort vor Abschluß der Beurteilung in den freien Verkehr. Auf diese Weise ist in einem Falle sogar eine Fleischvergiftung entstanden. Eine Unterbrechung der fleischbeschaulichen Untersuchung kann aus verschiedenen Gründen notwendig werden. Sie muß z. B. stets erfolgen, wenn die bakteriologische Fleischuntersuchung eingeleitet wird. Sehr oft liegt im Falle einer Unterbrechung der Untersuchung der Verdacht vor, daß das in Frage stehende Fleisch für den menschlichen Genuß untauglich ist, oder daß dieses Fleisch sogar die menschliche Gesundheit zu schädigen geeignet ist. Im Hinblick hierauf ist die Kennzeichnung des Fleisches bei einer Unterbrechung der fleischbeschaulichen Untersuchung dringend erforderlich. Die einschlägigen Vorschriften der BBA. (§ 42) treffen zwar keine Bestimmung, daß Fleisch, bei dem die fleischbeschauliche Untersuchung aus irgend einem Grunde unterbrochen wird, mit einem Erkennungszeichen zu versehen ist. Es steht jedoch nichts im Wege, daß dies geschieht. Um zu verhüten, daß Fleisch, dessen fleischbeschauliche Untersuchung unterbrochen werden muß, nicht in den freien Verkehr gelangt, wird in Ergänzung der Bestimmungen des § 36 ABJ. folgendes angeordnet: Die Vorschriften der Ziffer 1 und 2 des § 42 BBA. in Verbindung mit den Bestimmungen der ersten beiden Abschnitte des § 36 ABJ. über die vorläufige Kennzeichnung des Fleisches im Falle einer sofort eingelegten Beschwerde gegen die fleischbeschauliche Beurteilung haben auch in allen Fällen bei einer Unterbrechung der Fleischschau, insonderheit bei der Einleitung der bakteriologischen Fleischuntersuchung, Anwendung zu finden, jedoch mit der Maßgabe, daß an den einzelnen Körperteilen je ein Zettel aus kräftigem Papier mit der deutlichen Aufschrift „Vorläufig beschlagnahmt. Datum, Unterschrift und Wohnort des Beschaubarztes“ mit starkem Bindfaden in haltbarer Weise zu befestigen ist.

Ausübung der Fleischschau durch Nichttierärzte.

Min. f. L., D. und F. Nr. V, 6974, 30. Juli 1928.

Dr. M. hat zwar in Deutschland die tierärztliche Fachprüfung abgelegt, besitzt aber, da er Ausländer ist, in Deutschland nicht die Appro-

bation als Tierarzt. Es kann ihm deshalb auch nicht die den Tierärzten vorbehaltene Fleischbeschau (Ergänzungsbeschau und Fleischbeschau gemäß § 7 A.B.J.) übertragen werden.

Im Auftrage: Müssemeier.

Schrader: Die Rationalisierung der bakteriologischen Fleischbeschau. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jhg., S. 261/262.)

Zur Erleichterung der Durchführung der bakteriologischen Fleischbeschau schlägt Schrader vor, folgendes vereinfachtes Verfahren an allen Schlachthöfen für die dort anfallenden Verdachtsfälle zuzulassen:

I. Austreichen und Bebrüten der vorgeschriebenen Proben auf geprüften, fertig bezogenen Nährböden. Beim Vorkommen verdächtiger Keime:

II. a) entweder: Eingeschränkte bunte Reihe (Neutralrotagar, Traubenzucker-Agar, Petruschki-Molke, Indolprobe) und Probeagglutination, sodann erforderlichenfalls Überweisung an ein größeres Institut,

II. b) oder: gleich Einfendung oder Überweisung der verdächtigen Platte an ein größeres Institut unter Heftpflasterverchluß.

Durch diese Vereinfachung würden die staatlichen Veterinäruntersuchungsämter nicht unerheblich entlastet werden. Auch dürfte sich die derzeitige lange und kostspielige spezialistische Ausbildung der Schlachthoftierärzte wesentlich abkürzen lassen.

Edelmann.

Dräger: Beobachtungen bei der bakteriologischen Fleischuntersuchung. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jhg., S. 262/264.)

Die Frage, ob und welche chemischen Veränderungen in der Nährbouillon bei der Anreicherungs-methode in der bakteriologischen Fleischuntersuchung eintreten, hat Dräger in einer Anzahl von Versuchen geprüft, um festzustellen, inwieweit die im allgemeinen neutrale Reaktion verändert wird. In allen Versuchen war ein Zurückgehen des Phenolphthaleinpunktes, oftmals um ein Beträchtliches festzustellen. Am deutlichsten war dies bei den Nierenproben des Schweines der Fall, die im Durchschnitt ein Mehr von 94 Prozent der für die Alkalisierung der Kontrolle nötigen Menge Lauge erforderten. Am wenigsten verändert wurde die chemische Reaktion der Bouillon durch Proben des Knochenmarks und der Lymphdrüsen. Dräger folgert aus seinen Versuchen, daß

1. bei der vielfach üblichen Anreicherungs-methode durch Verbringen von Organstückchen in Bouillon der Neutralisationspunkt der Bouillon um einiges zurückgeht, und
2. es sich daher empfiehlt, bei der Herstellung der für den Anreicherungs-zweck benötigten Bouillon mit der Neutralisierung etwas über den Phenolphthaleingehalt hinauszugehen.

Edelmann.

Weber: Zur Untersuchung von Auslandslebern. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jhg., S. 264/265.)

Auf Grund seiner Beobachtungen, daß vom Ausland eingeführte Lebern, ungeachtet äußerlich frischer Beschaffenheit, nicht selten im Innern, namentlich in der Umgebung der Leberpforte, zerfetzt und verdorben sein können, empfiehlt Weber, mit dem Anschneiden der Lymphknoten zugleich auch einen 5—6 cm langen, etwa 2 cm tiefen Schnitt in das Lebergewebe zu verbinden, der über die Beschaffenheit des Leberparenchyms in der Tiefe Aufschluß gibt.

Edelmann.

Preßler: Zur Untersuchungspflicht eingeführter getrockneter Därme. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 264.)

Die Einfuhr getrockneter Rinderdärme, die in der Längsrichtung aufgeschnitten, dann aber zu Zwei, Drei oder Vieren in der Längsrichtung zu einem rundum geschlossenen, etwa 10 cm weiten Darmrohr wieder aneinander genäht

sind und als Wursthülle oder als Hüllen von Pasteten Verwendung finden, hat Preßler zur Prüfung der Frage veranlaßt, ob diese Därme der Untersuchungspflicht unterstehen. Dies ist zu bejahen, denn auch diese Därme eignen sich zum Genuß für Menschen (§ 2 Ziff. 2 B.B.D. in Verbindung mit der Allg. Verfügung vom 4. Mai 1904).

Edelmann.

Crohn, A.: Gelbfärbung bei Jerseyrindern. (Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jhg., S. 283.)

Dänische Jerseyrinder zeigen, wie Crohn festgestellt hat, nach der Schlachtung oft eine Gelbfärbung, die sich nicht nur auf das Fettgewebe beschränkt, sondern auch Faszen, Sehnen, Knochen und seröse Häute ergriffen hat. Ungefähr ein Viertel dieser Tiere weist diese Eigentümlichkeit auf. Es liegen dieselben Abweichungen vor, wie sie bei norddeutschen Weiderindern nicht selten zur Beobachtung kommen, nur mit dem Unterschiede, daß sich die genannte Gelbfärbung bei den Jerseyrindern auch bei der Stallfütterung entwickelt. Bei ihnen dürfte eine besondere Disposition zur Pigmentablagerung bestehen, die, erworben in dem ursprünglichen Züchtungsgebiet, den grasreichen Kanalinseln, vererbt und zu einer Rasseigentümlichkeit geworden ist. Für eine Minderwertigkeitserklärung des Fleisches liegt kein Grund vor, da die Gelbfärbung sich selbst deklariert.

Edelmann.

Standesangelegenheiten.

Verein Schlesischer Tierärzte.

127. Versammlung am 29. April 1928.

Der Vors., Prof. Dr. Casper, begrüßte die Erschienenen, insbesondere Vet.-Rat Härtel aus Swinemünde, der dem Verein ein treues Mitglied geblieben ist, obwohl er infolge seiner Verletzung bereits seit 1911 nicht mehr in Schlesien wohnen konnte. Die Wiedererweckung des DVR. und die endgiltige Annahme des Tierärztekammergesetzes wurden freudig begrüßt. Dem Geheimrat Fröhner hat der Vors. am 11. März zum 70. Geburtstag telegraphisch die herzlichsten Glückwünsche ausgesprochen und am 28. März Geheimrat Ellenberger in Dresden zum 80. Geburtstag die besten Glückwünsche des Vereins telegraphisch übermittelt. Der Feier des 25jährigen Bestehens des Vereins beamteter Tierärzte Preußens und des 20jährigen Vorsitzes des Ober-Reg.-Rates Dr. Rust hat der Vors. persönlich beigewohnt. Es war für den Ober-Reg.-Rat ein guter und großer Tag. Er wurde Ehrenbürger beider preußischen Hochschulen. In dieser Frühjahrsversammlung ist er 40 Jahre Mitglied des Vereins Schlesischer Tierärzte. Die Erwähnung jeder der drei Festfeiern wurde mit allgemeinem Applaus aufgenommen. Seit der Herbstversammlung verlor der Verein folgende Mitglieder durch den Tod: 1. am 26. November 1927 Kleinsiedam in Hunsfeld; 2. am 9. Januar 1928 Vet.-Rat Felbaum in Freystadt; 3. am 14. Januar 1928 Generalvet. Müllerskowski in Köben; 4. am 28. Januar 1928 Vet.-Rat Hirsch in Liegnitz, den Vors. der Gruppe der beamteten Tierärzte Schlesiens; 5. am 31. Januar 1928 Schüler in Hunsfeld; 6. am 5. Februar 1928 Wende in Habelschwerdt und 7. am 4. März 1928 Grünig in Pitschen. Dieser Kollegen wurde in ehrendem Nachruf und durch Erheben von den Plätzen gedacht.

Ferner sind aus dem Verein ausgeschieden: 1. Generalvet. Schatz in Glogau, 2. Vet.-Rat Hamann in Schweidnitz, beide aus Gesundheitsrücksichten, 3. Schlachthofdirektor Dr. Franke in Königshütte, 4. Stabsvet. Dr. Kröcher in Ohlau, 5. Dr. Sens in Schawoine, weil sie aus Schlesien verzogen sind, und 6. Generalobervet. a. D. Gaucke in Ols.

Neu aufgenommen wurden: 1. Dr. Hager, Leiter der Auslandsfleischbeschau in Breslau, 2. Dr. Voss, Assistent am Vet. Institut, 3. Dr. Pallaske, Tierarzt am Bakt. Institut der Landw.-Kammer, 4. Dr. Schwedler, Generalobervet., alle drei in Breslau, 5. Dr. Volkmann, Tierarzt in Jauer, 6. Korn, Stabsvet. a. D. in Saabor (Kr. Grünberg), 7. Dr. Reetz, Stadt-Vet.-Rat in Gottesberg, 8. Dr. Hoeft, Obervet. im 4. Reiter-Regt. Nr. 8 in Namslau.

Als Vertreter des Vereins bei der 150-Jahrfeier der Hochschule in Hannover wurde der Vors. entsandt. Der Kassierer, Stadt-Vet.-Rat

Dr. Gerlach, erstattete den Kassenbericht. Die Kasse wies einen Bestand von 749,87 Mark auf. Für den verstorbenen stellvertr. Vors., Vet.-Rat Hirsch, wurde Vet.-Rat Dr. Skerlo in Breslau gewählt. Direktor Dr. Schumann machte der Versammlung bekannt, daß ihr Vors. Prof. Dr. Casper, am 1. April 1928 auf eine 25jährige Tätigkeit als Professor und als Leiter des Vet.-Instituts der Breslauer Universität zurückblicken konnte. Er feierte insbesondere seine Tätigkeit als Vors. des Vereins Schlesischer Tierärzte, die er schon viele Jahre mit großem Geschick und Erfolg ausgeübt hat. Unter lebhafter Zustimmung der Versammlung sprach er ihm die herzlichsten Glückwünsche aus und die Hoffnung auf ein noch langes Wirken des Jubilars auf seinem Posten.

Es folgte der Vortrag von Dr. Schebitz aus Dyhernfurth über „Die Leberegelsteine in ihrer Bedeutung für den behandelnden Tierarzt“. Es sei daraus nur einiges hervorgehoben. Die Diagnose Leberegelkrankheit ist nur gesichert, wenn durch die Kotuntersuchung das Vorhandensein von Leberegelsteinen nachgewiesen ist. Das Nichtfinden von Eiern läßt dagegen nicht den Schluß zu, daß das Tier frei von Leberegelsteinen ist. Es ist wichtig zu beachten, daß das Unterlassen der Kotuntersuchung als Kunstfehler angesehen werden kann. In der Praxis liegen die Verhältnisse für die Diagnosestellung glücklicherweise meist infolgedessen günstiger, als der Tierarzt meistens bei Herden zugezogen wird, wo die Krankheit sich schon in vorgeschrittenem Stadium befindet und durch eine Schlachtung oder Zerlegung die Diagnose gesichert ist. Die Schädigung der Leber und des ganzen Tierkörpers wird vorzüglich hervorgerufen durch die von den Eiern ausgeschiedenen und nach ihrer Resorption mit dem Lebergewebe und dem Blut in Berührung gebrachten Giftstoffe sowie durch sekundäre bakterielle Infektionen. Für die Behandlung ist es wichtig, als Grundsatz festzuhalten, nicht nur die offensichtlich erkrankten Tiere, sondern die ganze Herde zu behandeln, die der Invasion durch Weidegang ausgesetzt war. Erprobte Mittel sind: 1. die Filizipräparate: Filinol und Distol, Distol neu oder kombiniert, die für Rinder und Schafe geeignet sind; 2. die chemischen Präparate: Serapis für Schafe, Neoserapis für Rinder und die Bengenpräparate Hexachloräthan und Tetrachloräthylen für Rinder und Tetrachlorkohlenstoff für Schafe. Mißlich ist, daß trotz Aufstallung neue Invasionen durch Verfüttern von mit Zysten behaftetem Gras und sogar auch Heu erfolgen kann. Die Zerkarien können bis zu acht Monaten infektionstüchtig bleiben. Vorbeugend läßt sich nur durch Vernichtung des Zwischenwirts, der Zwergschlammfischschnecke einwirken durch Austrocknen nasser Stellen auf den Weiden, Weidegang von Enten, Schaffung einwandfreier Tränkstellen, Streuen von Koch- und Viehfalz, Chlor und Atzkalk in kleine Schneckenbüschel und auf Weiden und durch Spritzen von Kupferfufat.

Dr. Florischütz trug dann „Einiges aus der Kleintierpraxis“ vor. Er behandelte die Hautkrankheiten, Augenleiden, die Entzündung des äußeren Gehörganges, das Othämatom, die Magen- und Darmleiden, die Staupe, die Stuttgarter Seuche, die Wurmkrankheiten, die Narkose und die Laparotomie beim Hunde.

Der Vors. Prof. Casper: - Der Schriftf. Riedel.

Deutscher Veterinärat.

Kommissionsitzung zur Beratung der Vorschläge Albien-Schönberg für eine Neuregelung des Reichsfleischbeschaugesetzes in Berlin am 29. Juli 1928.

Anwesend: Prof. Dr. Stang, Dr. Albien-Schönberg, Dr. Grüttners-Quedlinburg, Dr. Herberg-Osterath, Dr. Kuppelmayr - Frankfurt (Main), Oberregierungsrat Dr. Rust - Breslau, Train-Baruth. Entschuldigt fehlt: Dr. Hafemann-Dessau.

Ergebnis:

1. Der Tierarzt ist der einzige Sachverständige in der animalischen Lebensmittelkontrolle.
2. Es wird gefordert, daß bei der nächsten Änderung der Ausführungsbestimmungen zum R.F.L.G. der Unterschied zwischen den die Fleischschau ausübenden Tierärzten und den Fleischbeschauern schärfer hervorgehoben wird. Inzwischen soll der DVR. bei dem Reichsministerium des Innern darauf hinweisen, daß seit Bestehen des R.F.L.G. die Tierärzte berechnete Klagen über die Anwendung der Bezeichnung „Fleischbeschauer“ ihnen gegenüber führen und das Reichsministerium des Innern bitten, auf die ihm unterstellten Stellen dahin zu wirken, daß von der Bezeichnung

„Fleischbeschauer“ Tierärzten gegenüber in allen Fällen Abstand genommen wird.

3. Die Kommission erkennt an, daß es zweckmäßig sei, eine Differenzierung zwischen den Gebühren für Tierärzte und denen für Fleischbeschauer zu machen, daß die Kosten für die Ergänzungsbeschau auf breitere Schultern gelegt werden, zweifelt aber, daß der jetzige Standpunkt hierfür geeignet sei, weil
 1. die Angelegenheit keine Reichsfrage, sondern Länderfrage sei,
 2. die Verhältnisse in der Landwirtschaft zur Zeit so ungünstig seien, daß Mehrkosten für die Landwirtschaft untragbar seien,
 3. zu befürchten sei, daß der weitere Ausbau der veterinären Fleischschau darunter leiden könne, weil der billigere Laienfleischbeschauer dem Tierarzt vorgezogen würde.
4. Die Kommission unterstützt die Forderung der Kommission für die Beratung über Vorschläge zu den Ausführungsbestimmungen des Lebensmittelgesetzes, daß die tierärztlichen Untersuchungsstellen als öffentliche Anstalten im Sinne des Gesetzes anerkannt werden.
5. Die Kommission nimmt davon Kenntnis, daß in den Lehrplänen der Fleischfortbildungsschulen die Hygiene schon berücksichtigt wird, und daß dieser Unterricht teilweise schon von Tierärzten gegeben wird. Der DVR. kennt die Notwendigkeit dieses Unterrichts an und empfiehlt seinen weiteren Ausbau; die Belehrung der Fleischer in der Hygiene liegt im Interesse der Bekämpfung der Fleischvergiftungen.
6. Mit Rücksicht auf die wegen der bevorstehenden Ausführungsbestimmungen zum Lebensmittelgesetz gebotene Eile und wegen des jetzt für Änderung des Reichsfleischbeschaugesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen ungünstigen Zeitpunktes hat die Kommission sich auf die in der Besprechung verhandelten Vorschläge Albien beschränkt und zunächst sich mit den in der Sitzung gefaßten Resolutionen begnügt. Zur geeigneten Zeit werden weitere Verhandlungen folgen.

Tierärztekammer für die Provinz Brandenburg und den Stadtkreis Berlin.

Die Vorsitzenden aller tierärztlichen Vereinigungen in den Reg.-Bezirken Potsdam, Frankfurt (Oder), sowie von Großberlin bitten wir um möglichst umgehende gefällige Angabe ihrer Anschrift, der Namen der Vereine und der Zahl der Mitglieder an die Geschäftsstelle Berlin-Buch. Es ist beabsichtigt, in einer Sitzung die Kandidatenfrage für die Neuwahl, sowie die Aufstellung einer gemeinsamen Wahlliste zu besprechen.

Der geschäftsführende Vorstand:

gez. Maack. gez. Dr. Haunschild. gez. Dr. Kunibert Müller.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Der außerordentl. Prof. Dr. Hans Dahmen in Klein-Ziethen ist zum ordentl. Professor für Hygiene und Bakteriologie an der Tierärztlichen Hochschule in Berlin ernannt worden.

Dr. Diedrich Küst, Veterinärat des Kreises Springe (Hannover), früher langjähriger Assistent an der Ambulatorischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover, hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Geburtshilfe und Ambulatorische Klinik an der vet.-med. Fakultät der Universität Gießen erhalten.

Zum Nachfolger des zum W.-S. 1928/29 emeritierten ordentlichen Professors für Pharmakologie der Universität Gießen, Geh. Med.-Rat Dr. Julius Geppert, ist der ordentl. Professor an der Medizinischen Akademie Düsseldorf, Dr. med. Fritz Hildebrandt, ernannt worden.

Die vet.-med. Fakultät der Universität Gießen hat den Dr. phil., Dr. med. h. c. Heinrich Alfred Ammelburg, Direktor der Pharmazeutischen Abteilung der Werke Hoechst a. M., „der sich in 34jähr. Tätigkeit für die glanzvolle Entwicklung der deutschen Arzneimittelindustrie eingesetzt hat, und unter dessen Leitung eine große Zahl wertvoller biologischer und synthetischer Arzneimittel zur Behandlung von Tierfeuchen hervorgebracht wurden“, ehrenhalber zum Doktor der Veterinärmedizin promoviert.

Auszeichnung eines Tierarztes.

Dem Tierarzt Dr. Wulf in Oelde (Westf.), der in den letzten Jahrzehnten unermüdlich und mit großem Erfolge an der Hebung der Ziegenzucht gearbeitet hat, wurde in Anerkennung seiner Verdienste vom Reichsverband der Ziegenzuchtvereine die Goldene Dettweiler-Medaille verliehen.

Dr. Santiago S. Quiroga.

Am 31. Januar 1928 wurde Dr. Santiago S. Quiroga zum Direktor des Bakteriologischen Laboratoriums im Ackerbau-Ministerium in Argentinien ernannt. Die Ernennung dieses Herrn wird in den Kreisen der argentinischen Tierärzte und Landwirte besonders begrüßt, weil er der neuen Generation von Tierärzten entstammt, welche, ausgerüstet mit den modernsten Errungenschaften, in der Lage sind, die Interessen der Wissenschaft und des Standes zu vertreten. Dr. Quiroga hat nach Abolvierung des Gymnasiums in San Luis Landwirtschaft und Tierzucht in der Universität Córdoba studiert und diese als Diplomlandwirt im Jahre 1909 verlassen. Kurz darauf widmete er sich noch dem Studium der Veterinärmedizin in Buenos Aires und wurde vom Unterrichts-Ministerium mit einem Stipendium nach Europa geschickt, um dort seine Studien zu vervollkommen. Er bezog die Tierärztliche Hochschule in Turin, wo er nach vierjährigem Aufenthalt und Spezialstudien bei Ferroncito, Mosso, Foá und Finzi sich den Dokortitel erwarb. Sein Forschungsgebiet ist die Tuberkulose, worüber er mit mehreren Arbeiten hervorgetreten ist. 1915 rief ihn die Dirección General de Ganadería nach Argentinien zurück und teilte ihm den Bakteriologischen Laboratorium des Ackerbau-Ministeriums zu. An dieser Stelle hat er sich insbesondere mit Tuberkulose-Forschungen und deren praktischer Übertragung auf argentinische Verhältnisse beschäftigt. Neben diesem Amte hat er noch den Lehrstuhl für Bakteriologie an der Fakultät für Veterinärmedizin in Buenos Aires inne. Wir begrüßen in Dr. Quiroga einen Mann, dessen Persönlichkeit uns die Unterstützung deutscher Wissenschaftler in jeder Hinsicht gewährleistet. Er ist ein Mann, dem kleinliche Gesichtspunkte vollständig fern liegen und der über die neuesten Vorkommnisse auf dem Gebiet der Veterinärmedizin in Nordamerika und England ebenso unterrichtet ist wie über neue Fachliteratur in Deutschland, Frankreich und Italien.

Dr. Lauff.

Staatliche Schlachtviehverversicherung im Freistaat Sachsen.

Durch Gesetz über die Abänderung des Schlachtviehverversicherungsgesetzes vom 10. Juli 1928 (GBl. S. 107) ist § 2 Abs. 1 des Schlachtviehverversicherungsgesetzes vom 25. Juni 1923 (GBl. S. 151) dahingehend abgeändert worden, daß die Verluste bei nichtgewerblichen Schlachtungen der Rinder nicht mehr in vollem Umfange, sondern nur noch 80 vom Hundert entschädigt werden. Diese Änderung ist auf dringenden Wunsch der landwirtschaftlichen Rinderbesitzer vorgenommen worden, die durch ihre Berufsvertretung hatten erklären lassen, daß die Umlagebeiträge, durch die der Aufwand zur Deckung der Verluste bei den nichtgewerblichen Rinderfchlachtungen größtenteils erbracht werden muß, nicht mehr tragbar wären. Es war infolgedessen schon ein Entwurf zu einem neuen Schlachtviehverversicherungsgesetz, in dem noch verschiedene andere Mängel des 23er Gesetzes mit beseitigt werden sollten, bearbeitet worden, aber bei der Überlastung des Landtages mit gesetzgeberischen Aufgaben, noch nicht zur Verabschiedung gelangt, so daß die oben erwähnte Hauptfrage zunächst durch das Zwischengesetz vom 10. Juli 1928 gelöst werden mußte. Die genannte Gesetzesänderung hat auch eine Abänderung der Versicherungsordnung der Anstalt für staatliche Schlachtviehverversicherung im Freistaat Sachsen durch die Bekanntmachung vom 25. Juli 1928 dergestalt zur Folge gehabt, daß die in Ziffer 17, Abs. 2 festgelegten Hundertsätze für die Berechnung des Wertes des einem Tierbesitzer zur Verfügung gebliebenen Fleisches herabgesetzt worden sind auf 70 Prozent für minderwertiges Fleisch von einem Tiere, das zum Verbrauch im eigenen Haushalte des Besitzers geschlachtet wurde, auf 60 Prozent für ebenfolches Fleisch, wenn es von einem krankheitshalber geschlachteten Tiere herrührt, und auf 50 Prozent für bedingt taugliches Fleisch.

Edelmann.

Titelabkürzungen der Zeitschriften.

Die Vereinigung der Deutschen Medizinischen Fachpresse hat ein „Verzeichnis und Titelabkürzungen der wichtigsten Zeitschriften der Medizin und ihrer Grenzgebiete“ bei Julius Springer in Berlin erscheinen

lassen, das für Interessenten unentgeltlich beim Verlage Julius Springer zu haben ist. Das Heft muß jeder Tierarzt haben, der referiert und Referate liest. Es ist erwünscht, daß in Zukunft keine anderen als die hier festgelegten Abkürzungen gebraucht werden. Von tierärztlichen und für Tierärzte referierten Zeitschriften sind u. a. folgende aufgeführt: Dtsch. tierärztl. Wschr., Tierärztl. Rdsch., Tierärztl. Mitt., Z. Fleisch-u. Milchhyg., Z. Geflügelkde., Z. Vet.kde., Z. Ziegenzucht, Z. Zool., Zbl. Biol., Zbl. Bakter., Veröff. ksl. Gesdh.amt, Vet. J., Vet. med., Vet. Rec., Wien. tierärztl. Mschr., Münch. tierärztl. Wschr., Mitt. Gesch. Med. u. Naturwiss., Arch. Gesch. Med., Arch. Gesch. Naturw., Arch. mikrosk. Anat., Arch. f. Physiol., Arch. Protistenkde., Berl. tierärztl. Wschr., Jber. Vet.-Med. für unferen Ellenberger-Schütz.

Reinhard Froehner (Gr. Strehlitz).

Anmerkung des Referenten: Im deutschen Österreich hat sich eine gänzlich unmögliche Abkürzung eingebürgert, nämlich „Trzt“ für Tierarzt. Diese Abkürzung verstößt gegen die Grundregel, daß man ein einfilbiges Wort keinesfalls ohne den Anfangsbuchstaben abkürzen darf. Hier und da sieht man die Abkürzung DDr. für Dr. Dr. Sie ist falsch, denn D. bedeutet allein Dr. theologiae; alle anderen Dokortitel werden Dr. abgekürzt. Und von der mehr als 100 Jahre gebräuchlichen Abkürzung darf man kein Stück abbrechen, gewissermaßen noch einmal abkürzen.

Unterrichtskurse auf dem Lehrgut Adendorf der Tierärztl. Hochschule Hannover.

In der Zeit vom 1.—14. August hat der 6. Unterrichtskursus für Studierende auf dem Lehrgut Adendorf bei Lüneburg stattgefunden, an dem 20 Studierende teilgenommen haben. Der nächste derartige Kursus findet in der Zeit vom 10. bis 24. Oktober statt.

Fortbildungskursus für beamtete Tierärzte verbunden mit einem Fortbildungskursus für Schlachthoftierärzte vom 22. Okt. bis 3. Nov. 1928 an der Tierärztlichen Hochschule Berlin.

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sonntag
8—9	Pathologische Anatomie Prof. Dr. Dobberstein			Parasitenkunde (Wichtige Erkrankungen durch Würmer) Prof. Dr. Nölter	Sterilität der Zuchttiere	Fleischbeschau u. Milchhygiene Prof. Dr. Bongert
9—10	Tierzucht Prof. Dr. Stang		Anatomie u. Gewebelehre Prof. Dr. Bittner	Neuere Erfahrungen a. d. Gebiete d. Seuchenbekämpfung	Prof. Dr. Schöttler	Viehseuchengesetzgebung
10—11	Fleischbeschau und Milchhygiene Prof. Dr. Bongert			Ministerialdirigent Dr. h. c. Müssemeier	Fleischbeschau und Milchhygiene Prof. Dr. Bongert	Ministerialdirigent Dr. h. c. Müssemeier
11—12	Währschaft und Haftpflicht Prof. Dr. Neumann-Kleinpaul	Anatomie u. Gewebelehre Prof. Dr. Bittner	Bienenkrankheiten Prof. Dr. Borchert	Parasitenkunde (Auffinden, Sammeln u. Untersuchen von Parasiten) Prof. Dr. Nölter		Bakteriologie Fleischbeschau Prof. Dr. Bongert
12—13	Bakteriologie und allgemeine Hygiene		Sanitätspolizeiliche Beurteilung der Milch, mit Demonstrationen Prof. Dr. Bongert	Protozoenkunde Prof. Dr. Nölter		Maschinelle Einrichtungen der Schlachthöfe
13—14	N. N.		Bakteriologie und allgemeine Hygiene N. N.			Prof. Dr. Koeniger

Vom 22. Oktober bis 3. November d. Js. findet an der Berliner Hochschule ein Fortbildungskursus für beamtete Tierärzte und Schlacht-

hoftierärzte nach dem vorstehenden Vorlesungsplan statt. Von den Teilnehmern an dem Kursus für Schlachthoftierärzte wird eine Pauschgebühr von 115 RM. erhoben. Anmeldungen werden bis zum 17. Oktober d. Js. entgegengenommen. Die an dem Kursus teilnehmenden Veterinärärzte erhalten für die Dauer des Kursus die gefetzlichen Tage- und Übernachtungsgelder und für die Hin- und Rückreise die Auslagen der Reise in der 2. Eisenbahnwagenklasse. Die Forderungsnachweise sind alsbald nach Beendigung des Kursus zur Nachprüfung und Erteilung der Zahlungsanweisung im Geschäftszimmer der Hochschule abzugeben.

Deutsche Vereinigung für Mikrobiologie.

Vom 30. August bis 1. September 1928 findet in Bern die 13. Versammlung statt. Neben zahlreichen Vorträgen werden gehalten über: U. Friedemann-Berlin: „Latente Infektionen in der Bedeutung für die Epidemiologie“. W. Levinthal-Berlin: „Neuere Forschungen über die Struktur der bakteriellen Antigene“. Sobornheim-Bern: „Variola und Alastrim“. Gildemeister-Berlin-Dahlem: „Encephalitis postvaccinalis“. Bieling-Höchst a. Main: „Retikulo-Endothel und Immunität“. Schlossberger-Frankfurt a. Main: „Retikulo-Endothel und Chemotherapie“. — Anmeldungen zur Teilnahme werden sofort an das Hygienisch-bakteriologische Institut der Universität Bern oder an den Schriftführer, Geheimrat Otto, Berlin, Robert Koch-Institut erbeten.

Bücherbesprechungen.

Lehrbuch der Protozoenkunde. Eine Darstellung der Naturgeschichte der Protozoen mit besonderer Berücksichtigung der parasitischen und pathogenen Formen. Begründet von Franz Doflein, Neubearbeitet von Prof. Dr. E. Reichenow, Abteilungsvorsteher am Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hamburg. 5. Auflage, I. Teil „Allgemeine Naturgeschichte der Protozoen“. Mit 388 Abbildungen im Text. Jena 1927, Verlag von Gustav Fischer. Preis brosch. 21,— RM.

Mit Freuden begrüßt man die Neuauflage des Doflein, die durch Reichenow eine fachkundige Bearbeitung gefunden hat. Der bis jetzt erschienene I. Teil des Werkes umfaßt die allgemeine Naturgeschichte der Protozoen. In klarer, übersichtlicher Gliederung werden die Morphologie und Physiologie, die Fortpflanzung und Entwicklung sowie die Ökologie der Einzelligen abgehandelt, wobei die neuesten Forschungsergebnisse eingehende Berücksichtigung erfahren haben. Das Verstehen der Materie wird durch eine große Zahl instruktiver Abbildungen wesentlich gefördert. Ein Schlußabschnitt macht den Leser kurz mit der Technik der Protozoenuntersuchung (künstliche Züchtung, Konservierung, Färbung usw.) vertraut. Ein ausführliches, nach den Kapiteln des Buches geordnetes Literaturverzeichnis vermittelt ein reiches Quellenstudium. Die Lektüre des vom Verlag Fischer gut ausgestatteten Werkes kann dem naturwissenschaftlich Interessierten nur empfohlen werden.

Wetzel.

Klatt, B.: Entstehung der Haustiere. Handbuch der Vererbungs-wissenschaft Bd. III, Lieferung 2 (III, K.). Berlin, Gebr. Bornträger, 1927. Subskriptionspreis Mk. 7.50, Einzelpreis Mk. 15.—.

Im ersten Abschnitt behandelt Verf. das Problem der Haustierwerdung, das vor allem vom psychologischen Standpunkt aus zu lösen ist, während das zweite Kapitel, das die Wirkungen der Domestikation bespricht, bei der Klärung der Fragen in erster Linie die Physiologie zur Hilfe nehmen muß. Zur Eruierung der Geschichte der Haustiere kommen neben den naturwissenschaftlichen Methoden (serologische, morphologische Methode und Messung des Fruchtbarkeitsgrades) auch solche in Frage, die ins Gebiet der Geisteswissenschaften gehören (Kulturgegeschichte, Kunstgeschichte, Sprachgeschichte). In dem speziellen Teil dieses Abschnittes behandelt Verf. die Abstammung der verschiedenen Haustiere: Boviden, Ovicapriden, Cameliden, Suiden, Equiden, Naniden und übrigen Haustiere.

Die vorliegende Abhandlung, die die Lieferung 2 (III K) des von Baur und Hartmann herausgegebenen, großangelegten „Handbuches der Vererbungs-wissenschaft“ darstellt, ist deshalb besonders zu begrüßen, weil Verf. die vielmals stritten Fragen der Entstehung der Haustiere nicht durch einseitige Bevorzugung einer Forschungsrichtung zu lösen versucht, sondern mit allen wissenschaftlich begründeten Methoden und Mitteln an die Aufhellung der Probleme herantritt.

W. Schäper, Hannover.

Köppe, Adolf: Vererbung des Milchfettgehaltes in der ostfriesischen Rinderzucht. Arbeiten der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde Heft 39. M. & H. Schaper, Hannover. 1928. Preis Mk. 5.—, für Mitglieder der D. G. f. Z. Mk. 4.—.

Der verdiente Tierzucht-fachverständige aus unserem ältesten Hochzuchtgebiet macht in der vorliegenden Schrift den Versuch, an einem wertvollen und mühevoll erarbeiteten Material die Frage der Vererbung des Milchfettgehaltes in der ostfriesischen Rinderzucht der Klärung näher zu bringen. Köppe geht hierbei derart vor, daß er die Vererbung eines Bullen bezüglich Fettgehalt der Milch feststellt: aus der Ermittlung des Durchschnittsfettgehaltes der Töchter, des Durchschnittsfettgehaltes der Töchtermütter, des Fettgehaltes der Mutter des Bullen, der Großmütter des Bullen usw. Er zieht dann noch weitere männliche Vorfahren des Bullen heran (Maßstab für diese: Durchschnittsfettgehalt ihrer Töchter) evtl. auch noch den Fettgehalt von Töchtern und Schwestern der Mutter des Bullen. Im allgemeinen nimmt er an, daß der Bulle die Fähigkeit der Vererbung des Fettgehaltes von derjenigen Seite (väterlicher oder mütterlicher) vererbt erhalten hat, auf der sich irgendwo ein dem Durchschnittsgehalt der Töchter nahestehender Fettgehalt findet. Auf Grund seiner Untersuchungen nach obigen Gesichtspunkten glaubt Verf. nachgewiesen zu haben, daß für die Vererbung des Milchfettgehaltes die Erbanlagen des Vätertieres fast ausschließlich ausschlaggebend sind. Verf. weist mit Recht darauf hin, daß das große ruhende Zahlenmaterial der Kontrollvereine für derartige praktisch überaus wichtige Untersuchungen mehr als bisher herangezogen werden muß, wobei eine gründliche Auswertung der Ergebnisse nur durch persönliche Kenntnisse der einzelnen Erbtäger (Bullen und Kühe) ermöglicht wird. Auf der anderen Seite müssen wir aber bei derartigen Arbeiten verlangen, daß das kostbare Untersuchungsmaterial mit Methoden verarbeitet wird, die jeder Kritik standhalten. Letzteres ist allerdings schwierig und leider bei der vorliegenden Arbeit nicht durchaus der Fall, wodurch der Wert der an sich mühe- und verdienstvollen Abhandlung bis zu einem gewissen Grade beeinträchtigt wird. Den Schlußfolgerungen Verfassers kann man nicht beistimmen, da sie sich mit den Ergebnissen der modernen Vererbungsforschung nicht in Einklang bringen lassen, ein Urteil, welches das Verdienst des Verfassers, diese schwierige Aufgabe im großen überhaupt einmal angefaßt und ruhendes, wertvolles Material wissenschaftlicher und praktischer Verwertung zugänglich gemacht zu haben, in keiner Weise beeinträchtigen soll.

W. Schäper, Hannover.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Tierarzt Dr. Baars zum Veterinärarzt, ihm ist die Veterinärärzstelle in Stettin übertragen worden.

Approbiert in Hannover: Ernst Nolze aus Altona-Bahrenfeld, Kurt Brandt aus Birnbaum (früher Prov. Posen), Johann Aengenheister aus Sonsbeck, Kreis Mörs (Rheinl.), Erich Deutsch aus München, Ernst Heiseke aus Lüchow, Karl Dillhoff aus Wellingholzhausen (Kreis Melle), Gustav Schütt aus Passow b. Gallin (Mecklenburg-Schw.), August Lückmann aus Cloppenburg i. Oldbg., Heinrich Iseke aus Enkhausen (Prov. Westf.).

In den hamburgischen Staatsdienst eingetreten: Dr. Ludwig Baspach, Dr. Rudolf Bontz, Dr. Karl Hoppe, Dr. Wilhelm Kastenmeyer, Dr. Helmut Krause, Dr. Maximilian Schwarz.

Promoviert in Leipzig: Peter Lorenzen aus Pellworm; August Viebrock aus Weertzen; Hans Hartwig aus Cuxhaven; Lauri Porthan aus Joensuu (Finnland); Erkki Estola aus Tampere (Finnland); Erich Malkie aus Leipzig. In München: Anton Weikl aus Haundorf; Heinrich Eckmann aus Landshut.

In den Ruhestand getreten: Oberlandfällmeister Groscurth zum 1. November 1928.

Verzogen: Tierarzt Dr. Friedrich Nippert in Vaterstetten (B.-A. Ebersberg) nach Preußen.

Verstorben: Stadtobertierarzt Dr. med. et med. vet. Max de Vrient in Berlin; Tierarzt Bernhard Hartwig in Gehrden (Hannover).

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 34.

Ausgegeben am 25. August 1928.

36. Jahrgang.

Zur gefl. Beachtung! Der Bezugspreis für das 3. Vierteljahr 1928 wird für die beim Verlag direkt bestellten Abonnements durch Nachnahme erhoben, wenn derselbe nicht bis zum 25. ds. Mts. in unseren Händen ist. — Wir bitten ev. für Einlösung der Nachnahme besorgt zu sein.

M. & H. Schaper, Verlag der „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“.

Festvortrag zur 150-Jahrfeier der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Von Hermann Mießner.*)

Hochansehnliche Festversammlung!
Sehr verehrter Herr Minister!
Exzellenzen und Magnifizenzen!

Unsere Alma mater begeht heute das Fest ihres 150jähr. Bestehens. Sie hat ein Alter erreicht und eine Entwicklung durchlaufen, auf die wir alle mit Stolz zurückblicken. Die stattliche Versammlung, die heute die Spitzen der Behörden, die Vertreter von Kunst und Wissenschaft, von Landwirtschaft, Industrie, Handel und Gewerbe, Freunde, Gönner, Kollegen und Studenten nicht nur aus allen Teilen Deutschlands, sondern der ganzen Welt zusammengeführt hat, legt beredtes Zeugnis dafür ab, welcher allgemeinen Wertschätzung sich die Tierärztliche Hochschule Hannover erfreut. Es ist mir eine besondere Ehre, als derzeitiger Jubiläumsrektor im Namen des Professorenkollegiums und der gesamten Hochschule die anwesenden Gäste herzlichst willkommen zu heißen.

Ich danke für ihre geneigte Teilnahme den zahlreichen Vertretern der Staatsregierungen, der Parlamente, des Reichsrates, der Provinzialbehörden, der städtischen Behörden, Landwirtschaftskammern, Repräsentanten von Körperschaften und Vereinen, vielen Freunden der Hochschule, Stiftern und Gönnern. Ich begrüße die glänzende Schar kollegialer Ehrengäste aus dem Auslande, von den Universitäten, Technischen, Landwirtschaftlichen, Forstlichen und Tierärztlichen Hochschulen, ich begrüße die Bergakademien und Handelshochschulen des Deutschen Reiches, ferner die Schwesternhochschulen Niedersachsens und andere höhere Schulen. Ich heiße herzlichst willkommen die zahlreichen ehemaligen Schüler unserer Hochschule, die aus nah und fern herbeigeeilt sind zum Geburtstage ihrer alma mater; desgleichen auch die Vertreter der Studentenschaften beider Hannoverscher Hochschulen, die ein schönes Bild freundnachbarlichen Gemeinns, unsere Feier mit ihren Chargen und Farben zieren und sie mit jugendfroher Hoffnung beleben; alle Kommilitonen, die heute erschienen, sowie die

Beamten und Angestellten unserer Hochschule, die sich mit uns unverdrossen um eine würdige Gestaltung unserer Feier mühten.

Die Gründung tierärztlicher Bildungsanstalten liegt über manches Menschenalter zurück, sie ist aus der Not der Zeit heraus geboren. Schwere Seuchengänge, zumeist im Gefolge langjähriger Kriege, überzogen die Länder der Kulturstaaten. Menschen und Tiere hatten hierunter schwer zu leiden und wurden durch Krankheit und Hungersnot zugrunde gerichtet.

Während die Kunst der Ärzte sich im Laufe der Jahrtausende eine Position geschaffen und gewahrt hatte und der ärztliche Beruf überall in Ehren stand, war die Veterinärmedizin seit dem Niedergange des römischen Kaiserreiches im ganzen Mittelalter bis an die Mitte des 18. Jahrhunderts als Stand und Beruf auf die Stufe eines Handwerks herabgesunken. Im Altertum hingegen, in der Zeit des Kultes und der Tieropfer, wandte man auch der Tierbehandlung, die meist in den Händen der Priester lag, großes Interesse zu. Die ersten Zerlegungen sind damals bei Tieren ausgeführt und die wertvollen Anatomien des klassischen Altertums behandeln den Bau der Tiere. Es sei nur an die historia animalium des Aristoteles aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. erinnert, auf der Carlo Ruini die Anatomie im 16. Jahrhundert aufbaute. So ist es verständlich, daß die Ärzte ursprünglich ihre Studien an Tieren machten und die Tiermedizin sich gewissermaßen als Bestandteil der Medizin hohen Ansehens erfreute.

Als in der anbrechenden Neuzeit die Vorurteile gegen die Sektion des menschlichen Körpers mehr und mehr schwanden, vermochte der Arzt seine Kenntnisse aus dem Studium des Menschen allein zu schöpfen und war nicht mehr auf das Tier angewiesen. Es hatte zur Folge, daß die Tiermedizin allmählich in die Hände von Pfuschern und Personen übergang, die sich handwerksmäßig mit Tieren zu beschäftigen hatten. Infolge der hierdurch bedingten gänzlichen Vernachlässigung der veterinärmedizinischen Wissenschaft stand man am Ausgange des Mittel-

*) Gehalten in der Stadthalle am 14. Juni 1928.

alters den Tierkrankheiten, vor allem den verheerenden Seuchengängen, völlig machtlos gegenüber.

Als dann zu Beginn des 18. Jahrhunderts Rinderpest, Pocken, Milzbrand, Räude und andere Seuchen die Tierbestände dezimierten und die wertvollen Pferde der Truppen zugrunde richteten, wurde der Ruf nach tierärztlichen Bildungsanstalten immer lauter.

Die verheerenden Seuchen, das Bedürfnis der Marfställe, Gestüte und des Heeres an geeigneten tierärztlichen Sachverständigen regten in dem französischen Advokaten und späteren Stallmeister Claude Bourgelat (1713—1779) den Gedanken an, diesem Mangel durch Errichtung einer Lehranstalt zu begegnen. So gründete er die erste tierärztliche Bildungsstätte in seiner Vaterstadt Lyon im Jahre 1761. Sie erfreute sich bald eines guten Rufes und wurde vorbildlich für viele tierärztliche Schulen, die kurze Zeit darauf in anderen Ländern entstanden.

Die ersten Anfänge zur Begründung einer Unterrichtsanstalt in Deutschland zur Ausbildung von Tierärzten sind dem Prof. Erxleben (1744—1777) an der Landesuniversität Georgia Augusta zu Göttingen zu verdanken. Er befaßte sich mit dem Studium der Naturwissenschaften und zeigte große Vorliebe für das Tierheilen. Im Jahre 1771/72 eröffnete er einen Unterrichtskursus über Tierarzneikunst. Leider ging das hoffnungsvolle und sich gut entwickelnde Göttinger Institut mit dem frühen Tode des Begründers (1777) ein.

Nach dem Tode von Erxleben war die Hannoversche Regierung darauf bedacht, in der Landeshauptstadt eine Tierarzneischule zu schaffen und durch Kabinetts-Ordre vom 18. Juli 1778 befahl König Georg III. von England, Herzog von Braunschweig und Lüneburg, in Hannover eine Roßarzneischule zur Ausbildung von Pferdeärzten für den Marfstall, die Stutereien und die Kavallerie-Regimenter zu errichten und die Anstalt baldmöglichst zu einer Tierarzneischule zu erweitern. Der 18. Juli 1778 ist also als das eigentliche Gründungsdatum unserer alma mater anzusehen. Die Anstalt befand sich bis zum Jahre 1845 unter dem Ober-Hof-Marfstall-Departement. Sie wurde dann dem Königlichen Ministerium des Innern und unmittelbar der Königlichen Landdrostei unterstellt. Seit 1872 bis zum heutigen Tage ressortiert sie aus dem Preuß. Landwirtschaftsministerium.

Zum Leiter berief der König den fürstlich hessischen Oberhoftierarzt Johann Adam Kersting (1726 bis 1784) aus Kassel, ihm adjungierte sein Schüler Havemann. Der Unterricht wurde auf zwei Jahre verteilt. Er erstreckte sich neben Anatomie und Botanik in der Hauptsache auf die Ausbildung in den praktischen klinischen Fächern. Kersting war ein hervorragender Organisator mit ausgezeichneter Schulung. Er eilte seiner Zeit weit voran und schuf eine Institution, die sich jahrzehntelang fast unverändert erhalten hat. Leider war es ihm nur wenige Jahre vergönnt, die Schule zu leiten; ein Unglücksfall im Jahre 1784 machte seinem Leben vorzeitig ein Ende. Sein Nachfolger Havemann (1784—1819) und Hausmann (1819—1847) waren den Anforderungen, die an das neue und noch im Werden begriffene Werk gestellt werden mußten, nicht im gleichen Maße gewachsen.

Unter dem folgenden Direktorat des wesentlich weit-sichtigeren Friedrich Günther wurde die Studienzeit auf sechs Semester erhöht, und fanden die Grundwissenschaften, insbesondere Botanik, Chemie, Physik und Physiologie eingehendere Berücksichtigung. Die Zahl der Lehrer stieg. Von 1858—1870 übernahm dann der Berliner Professor Andreas Christian Gerlach die Leitung der Hochschule. Er war ein Mann von ungewöhnlicher Begabung, gepaart mit zähem Willen und unermüdlicher, selbstloser Pflichterfüllung. Seiner Anregung ist es zu ver-

danken, daß die Ansprüche an die Vorbildung der Schüler auf Obersekunda-Reife festgesetzt wurden.

Leider verließ Gerlach schon im Jahre 1870 Hannover infolge Berufung als Direktor der Berliner Tierärztlichen Hochschule. Zum Nachfolger wurde in Hannover Karl Günther, der Sohn des früheren Direktors Friedrich Günther bestimmt. Er war ein hervorragender Kliniker und Lehrer und tat viel für die Verbesserung der Anstalt. Die Zahl der Lehrer wuchs allmählich auf sechs Ordinarien: Günther, Dammann, Harms, Lustig, Rabe, Begemann und vier Hilfslehrer. Auch wurden die Aufnahmebedingungen im Jahre 1878 auf Primareife und das Studium auf sieben Semester erhöht.

Eine schwere Erkrankung zwang Günther im Jahre 1881 zur Aufgabe seines Amtes; an seine Stelle wurde Karl Dammann als Direktor berufen. Mit ihm setzte die erste Phase der Hauptentwicklung unserer Hochschule ein. Unter seiner Leitung nahm die Zahl der Studierenden, die sich bisher auf 20—50 belaufen hatte, ständig zu und wuchs an bis zur Höhe von 250.

Unter ihm und größtenteils durch ihn erfolgte im Jahre 1887 — gleichzeitig mit Berlin — die Erhebung der hannoverschen Tierarzneischule zur Hochschule. Die nächste Folgerung, die er daraus zog, war die Forderung eines zeitgemäßen Neubaus unter Verlegung des Hochschulgebäudes. Nach vielen Verhandlungen und Erwägungen, insbesondere auch der eines etwaigen Zusammenschlusses mit der Berliner Hochschule oder einer Verlegung nach Göttingen mit Angliederung an die Universität, wurde dem Plane eines Neubaus schließlich nähergetreten und im Frühjahr 1895 mit den Arbeiten auf dem jetzigen Gelände begonnen. Am 11. Oktober 1899 fand die feierliche Überfiedelung vom Clevertor nach dem Misburger Damm statt. Hieran schloß sich in der neuen Aula eine Weihefeier, an der der damalige Preussische Landwirtschaftsminister v. Hammerstein, der Finanzminister v. Miquel, der Landesdirektor von Hannover, Exzellenz v. Bennigsen, der auch heute unter uns weilende Stadtdirektor Tramm und alle Spitzen der Behörden sowie zahlreiche inländische und ausländische Tierärzte teilnahmen.

Zu dieser Zeit amtierten an der neuen Hochschule neun Ordinarien (Dammann, Kaiser, Tereg, Arnold, Boether, Malkmus, Frick, Rievel, Olt) zwei Hilfslehrer und vier Assistenten.

Die Hochschule verfügte jetzt über ein Areal von 42000 qm gegenüber 10000 qm des alten Geländes und war für den Gesamtpreis von etwa 2 Millionen Mark erbaut worden. Die größeren Räumlichkeiten mit ihrer modernen Einrichtung und Apparatur trugen erheblich zur Verbesserung des Unterrichts bei und ermöglichten eine umfangreichere experimentelle Tätigkeit. Zahlreiche wertvolle Arbeiten aus allen Gebieten der Veterinärmedizin sind in der Folgezeit aus der Tierärztlichen Hochschule hervorgegangen.

Freilich fehlte es zunächst noch längere Zeit an einer den übrigen Hochschulen ebenbürtigen Verfassung, insbesondere an der Einführung des Rektorats, das an der Berliner Hochschule bereits im Jahre 1887 z. Zt. der Umwandlung von Tierarzneischulen zu Hochschulen eingerichtet worden war. Der letzte Direktor, Geheimrat Dammann, dessen hervorragende Verdienste um die Hebung der Hochschule und des tierärztlichen Ansehens unbestritten und unvergänglich bleiben werden, konnte sich jedoch nicht zum Rektorat verstehen. So ist es zu erklären, daß erst nach dem von Dammann 1912 erbetenen Abschied das Wahlrektorat für die Tierärztliche Hochschule durch Erlass vom 17. April 1913 eingeführt wurde.

Damit war endlich auch der innere Bau unserer Alma mater in den Grundzügen vollendet. Nachdem im Jahre

1903 die Maturität als Vorbereitung für das tierärztliche Studium gefordert war, das Studium auf neun Semester verlängert, und der Hochschule das Promotionsrecht verliehen sowie die akademische Habilitationsordnung eingerichtet, war die wesentliche Gleichstellung mit den Universitäten erreicht. Befriedigt schauen wir auf diese Entwicklung zurück, von der wir in Zukunft reichen Segen für unsere Hochschule, unseren Stand und Beruf und seine Wirksamkeit erwarten dürfen.

Bei den Vorarbeiten zum Neubau der Tierärztlichen Hochschule im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts mußte aus finanziellen Gründen eine weite Raumbeschränkung walten, sollte der Plan nicht gänzlich scheitern. Der noch verfügbare Platz auf dem vorhandenen Gelände war inzwischen durch Errichtung je eines Institutes für Hygiene, für Tierzucht und für Vererbungsforchung aufgebraucht worden. Doch immer lauter wurde der Ruf nach Erweiterung, da sich die vorhandenen Institute bald als zu klein erwiesen und neue Aufgaben der Lehr- und Forschertätigkeit erwuchsen. Die gewaltigen Fortschritte der Wissenschaft steigerten dauernd die Anforderungen an die Ausbildung der Studierenden. Nach langwierigen Verhandlungen mit tatkräftiger Unterstützung des Kurators der Hochschule, des Herrn Oberpräsidenten Noske, und des Herrn Landwirtschaftsministers Dr. Steiger, sowie durch dankenswertes Entgegenkommen der Stadt Hannover ist es gelungen, ein außerordentlich günstig gelegenes Gelände im Umfange von 29 000 qm, das sich dem vorhandenen unmittelbar anschließt, für die notwendige Erweiterung der Hochschulanlagen zu gewinnen. Auf dem neuen Grundstück sollen zunächst ein Institut für Buiatrik und Gynäkologie, eine neue Physiologie und Anatomie sowie ein Institut für Parasitenkunde erstehen.

Fassen wir die Entwicklung der verflossenen 150 Jahre zusammen, so können wir im großen und ganzen drei Abschnitte unterscheiden. In den ersten 50 Jahren ist die damalige Tierarztschule nicht viel über die durch Kersting geschaffene Organisation hinweggekommen. Erst mit den größeren Ansprüchen an die Vor- und Ausbildung, wie sie sich in dem zweiten halben Säkulum ergab und in der Prüfungsordnung vom Jahre 1878 zum Ausdruck kam, ist eine merkliche Weiterentwicklung festzustellen. Im Zusammenhang mit den gewaltigen wissenschaftlichen Fortschritten des dritten Zeitabschnittes der letzten 50 Jahre, auf biologischem Gebiete, die sich an Namen wie Virchow, Pasteur, Koch und andere knüpfen, nahmen auch die tierärztlichen Hochschulen einen sprunghaften Aufschwung. Die gesteigerte rege Forscher- und Lehrtätigkeit paßte nicht mehr in den alten Rahmen hinein. Durch Schaffung neuer Ordinariate, Erweiterung der einzelnen Institute, vollkommene Gleichstellung der Vorbildung sind unsere modernen Hochschulen dahin gelangt, soweit die Fachausbildung in Frage kommt, Schritt zu halten mit den Vorbildern und Führerinnen aller akademischen Entwicklung, den Universitäten.

Erfreulicherweise knüpfen sich auch in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr freundschaftliche Beziehungen zwischen den Universitäten, insbesondere deren medizinischen Fakultäten und den Tierärztlichen Hochschulen an. Außerlich ist dies dadurch zum Ausdruck gekommen, daß zwei von den bisherigen Tierärztlichen Hochschulen und zwar Dresden und München als selbständige veterinärmedizinische Fakultäten den Universitäten Leipzig und München angegliedert sind. Sie folgten dem Beispiel von Gießen, das von jeher mit der Universität verflochten war, und der Schweizerischen Universitäten Bern und Zürich, die seit dem Anfange dieses Jahrhunderts vollberechtigte tierärztliche Fakultäten führen.

In Preußen liegen die Verhältnisse bezüglich der Angliederung insofern anders, als die Frage einer örtlichen Verlegung heute für Hannover wegen des begonnenen weiteren Ausbaues kaum noch diskutabel ist. Dazu kommt, daß die beiden preussischen Tierärztlichen Hochschulen dem Landwirtschaftsministerium unterstehen, das ihnen jede erdenkliche Förderung zuteil werden läßt. Ob das gleiche auch unter dem Kultusministerium der Fall sein könnte, erscheint mehr als fraglich bei der großen Belastung des Kultusministeriums durch seine zahlreichen Hochschulen und Bildungsanstalten. Andererseits auch deswegen, weil man beim Kultusministerium begreiflicherweise nicht das gleiche Verständnis für die mit der Landwirtschaft eng zusammenhängende Veterinärmedizin voraussetzen kann wie beim Landwirtschaftsministerium.

Es soll keineswegs verkannt werden, daß an und für sich im Interesse der Universitas litterarum ein Anschluß an die Universität auch für uns sehr erwünscht und höchst bedeutsam als das ideale Ziel unserer Entwicklung erscheint. Ich glaube aber, daß im heutigen Zeitalter des Verkehrs, wo Entfernungen innerhalb einer Provinz keine Rolle mehr spielen, doch ein enges Zusammenarbeiten zwischen Universitäten und Hochschulen erreichbar ist, auch bei bestehender räumlicher Trennung.

So möge denn die kommende Zeit im Zeichen der weiteren Entwicklung, insbesondere der geistigen Wechselbeziehungen der hohen Schulen, ihrer Fakultäten und Disziplinen, vornehmlich auch der Humanmedizin mit der veterinärmedizinischen Wissenschaft stehen, zum Nutzen des Ganzen!

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir diesem kurzen Überblick über den wissenschaftlichen Werdegang unserer Hochschule noch einige Mitteilungen anzufügen, die die Entwicklung ihrer werbenden repräsentativen Institutionen, die Pflege ihrer Studentenschaft und schließlich die Förderung ihrer Aufgaben auf Grenzgebieten betreffen.

In der Not der schweren Nachkriegsjahre hat unsere Hochschule wie die große Mehrzahl ihrer deutschen Schwestern den Beistand hilfsbereiter Freunde erfahren dürfen, der in der Gründung einer Gesellschaft der Freunde der Tierärztlichen Hochschule Hannover verkörpert wurde. Im Jahre 1924 ins Leben gerufen, zählt die Gesellschaft heute schon die stattliche Zahl von 700 Mitgliedern und verfügt über ein Kapital von etwa 50 000 Mark. Dankbar sei aller derer gedacht, die sich um Gründung und Ausbau dieser segensreichen Organisation mit uns betätigt haben.

Um dem Danke der Hochschule an ihre Förderer und Freunde und den engen Beziehungen, die der gemeinsamen Arbeit um das Wohl der Hochschule entspringen, sichtbaren Ausdruck zu geben, wurde ferner am 27. Juli 1924 die Institution der akademischen Ehrenbürger geschaffen. Die Mitglieder der Ehrenbürgerschaft werden in der Ehrenbürger-Matrikel der Hochschule eingetragen und genießen besondere Ehrenrechte bei den Veranstaltungen. Sie tragen zum äußeren Zeichen ihrer Würde eine Münze am schwarz-weißen Bande, die nach dem Vorschlage unseres Kollegen Paechtners von Prof. von Hugo geschaffen wurde. Die Medaille zeigt die Bildnisse des Gründers Johann Adam Kersting und des größten Förderers unserer Hochschule, wie des tierärztlichen Standes überhaupt, Heinrich Küster, weiland Unterstaatssekretär im Preussischen Landwirtschaftsministerium. Diese verkörpern uns den Sinn, der unserer Ehrenbürgerschaft zugrunde liegt: das vorbildliche Verdienst der Persönlichkeit, das über Zeit und Berufsgrenzen hinaus unserer guten Sache dient.

Mit hoher Befriedigung blicken wir heute auf die stattliche Zahl hervorragender Ehrenbürger,

an deren Spitze wir mit Stolz unseren allverehrten Herrn Reichspräsidenten verzeichnen dürfen. Seines allzeit lebendigen und gütigen förderlichen Interesses für unsere Hochschule sei auch in dieser Stunde in Dankbarkeit ehrerbietig gedacht. Ein ehrendes Gedenken weihen wir ferner denen, die schon aus dieser Zeitlichkeit geschieden, in ihren Werken unter uns fortleben.

Die wirtschaftliche Not der Nachkriegszeit ließ die zum größten Teil charitativen Einrichtungen der Studentenhilfe, Krankenkassen, Darlehnskasse der deutschen Studentenschaft und der Studienstiftung des deutschen Volkes entstehen. Sie waren eine Notwendigkeit und haben es ermöglicht, daß ein gesunder und lebenskräftiger Stamm von jungen Akademikern über die schweren Notzeiten hinwegkommen konnte.

Besonders verdient hat sich die Studentenschaft um die Förderung der Leibesübungen als wesentliches Erziehungsmittel der heranwachsenden Jugend gemacht. Leider verfügt die Hochschule z. Zt. noch nicht über eine Turnhalle mit Studentenheim. Wir begrüßen es daher mit Freuden und find dem Herrn Oberbürgermeister Dr. Menge besonders dankbar dafür, daß die Stadt in großzügiger Weise bereits das Gelände hierfür zur Verfügung gestellt hat.**)

*

Verehrte Anwesende! Die Aufgaben der Veterinärmedizin sind von Jahr zu Jahr gewachsen. Die Erkenntnis ihrer wirtschaftlichen Bedeutung nimmt ständig zu. Dies bezieht sich nicht allein auf die kurative Seite, die auf der Grundlage der modernen Chemotherapie wesentlich günstigere Ausichten bietet als vor 25 Jahren, es betrifft insbesondere auch die gesundheitliche Vorfrage, die Hygiene und ihre mannigfachen Anwendungen, wie die Aufgaben der Tierwerbung und -Nutzung.

Die Seuchenbekämpfung hat durch Schaffung eines vorbildlichen deutschen Tierseuchengesetzes, das basiert auf der wissenschaftlichen Erforschung ihrer Ursachen, ihrer Ausbreitung und Bekämpfung in ungeahntem Maße zur Hebung des Gesundheitszustandes unserer Tierbestände, der Vorbeuge von Schäden und Erhaltung bedeutender volkswirtschaftlicher Werte beigetragen. Früher verheerende Seuchen sind restlos ausgerottet worden, andere wurden durch geeignete veterinärpolizeiliche Maßnahmen im Verein mit immuno- und chemotherapeutischen Eingriffen wesentlich gemildert. Kein geringerer als Rudolf Virchow sagte schon 1890 gelegentlich der Säkularfeier der Berliner Tierärztlichen Hochschule:

„Die Tierseuchengesetzgebung hat sich mit einer solchen Schnelligkeit vollzogen, daß ich als Mediziner bedaure, daß wir nicht in gleicher Schnelligkeit haben mitkommen können. Die Gegensätze, die einstmals in Betrachtung der Objekte zwischen kranken Menschen und kranken Tieren bestanden, sind mehr und mehr gefallen.“

Bei der großen Gefahr, der der Mensch durch Genuß von verdorbenen oder mit schädlichen Substanzen vermischten Lebensmitteln ausgesetzt ist, ist es eine der vornehmsten Aufgaben der Veterinärmedizin, die Bevölkerung durch ordnungsmäßige Untersuchung der animalischen Lebensmittel vor Gesundheitsschädigungen dieser Art zu schützen. Deutschland ist auf diesem Gebiete, unter Führung Robert v. Ostertags, erfolgreich vorangegangen: Wir hatten erst vor wenigen Monaten Gelegenheit, das 25-jährige Bestehen des Reichsfleischbeschaffungsgesetzes, einer gemeinfamen Schöpfung, deren Wohltat heute alle Kulturvölker genießen, zu begehen.

**) Die Jubiläumsspende der Staatsregierung hat erfreulicherweise den Bau einer Turnhalle mit Mensa sicher gestellt. Siehe D. T. W., 1928, Nr. 24, S. 411 ff.

Hohe Festversammlung! Die Tierärztliche Hochschule Hannover, der deutschen veterinärmedizinischen Bildungsstätten älteste, feiert heute ihren 150. Geburtstag. Ein langer und inhaltschwerer Zeitraum liegt hinter uns. In großer Volksnot ist sie gewachsen mit dem engeren und weiteren Vaterlande. Den herrlichen Aufschwung der Wissenschaft hat sie unter Mitwirkung eigener Lehrer und Forscher durchleben dürfen. Frei und froh steht sie heute im Kreise ihrer wissenschaftlichen Schwestern, geachtet und geehrt. Von beiden Hemisphären sind Sie gekommen, um an unserer Feier teilzunehmen, recht ein Zeichen, daß die Einheit und völkerverbindende Kraft der Wissenschaft tief und mächtig wirkt trotz aller weltpolitischen Spannungen und nationalen Prinzipien.

Unsere hohen Schulen stellen eine Lebensgemeinschaft der Geister dar, eine Gemeinschaft des Denkens, Fühlens, Wollens und Wirkens zwischen allen, die der Wahrheit und Wohlfahrt auf hoher Warte dienen. Ihr Inhalt und Ziel ist der hochgefinnte Dienst am Wohle der Menschheit, ihr Aufstieg zu lichterem und freieren Höhen.

Die Hochschulen sollen darum Lehrer des Volkes und Hüterinnen des Geistes sein. Wilhelm von Humboldt hat bei der Gründung der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität diese Gedanken ausgesprochen. Freistätten sollen sie sein der Forschung und der Lehre, bar aller starren Fesseln und engumgrenzter Ziele. In diesem Sinne verlangte Friedrich Thiersch bei Verlegung der Landshuter Universität nach München vor etwa hundert Jahren die Freiheit der Universitäten, kein Kollegienzwang, kein enges Eingliedern in bestimmte Richtung. Nur wenn die Wissenschaft, gar nicht an den praktischen Nutzen gebunden, ihren eigenen Götzen folgt und unbeirrt alle Wege, die sich öffnen, bis zu Ende geht, nur dann leistet sie dem Volke, der Menschheit den schuldigen Dienst und fördert das Leben auf unberechenbare Weise. Die Universitas litterarum stellt eine res publica litterarum dar, die in keiner Weise durch engherzige Vorschriften eingengt werden darf. Hierauf und insbesondere auf der Lehrfreiheit und auf dem Rechte der Berufung beruht der gewaltige Fortschritt, den die deutschen Hochschulen im vergangenen Jahrhundert errungen haben. Ein bedenklicher Rückschritt würde es sein, wenn von irgendwelcher Seite diese Rechte, die das Fundament der akademischen Entwicklung darstellen, angetastet werden sollten.

Dank der Fürsorge der früheren Patronate unserer Hochschule, des Hauses Cumberland und des Hauses Hohenzollern, dank dem hohen Verständnis des Preussischen Landwirtschafts- und Finanzministeriums, des Reichsministeriums des Innern, des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sowie neuerdings auch der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft und unserer bereits erwähnten Gesellschaft der Freunde hat sich unsere Hochschule aus kleinsten Anfängen zu ungeahnter Blüte entwickelt.

Aber wir wollen nicht stillstehen und auf Lorbeeren ausruhen. Das Leben stellt dauernd neue Anforderungen, und so geht unser Streben dahin, rüstig weiter zu schaffen. Daß die Fürsorge des Staates und des Reiches, das Wohlwollen unserer Freunde wie bisher so auch fernerhin dem Rechnung tragen und dem weiteren Ausbau ihre Hilfe nicht verlagern mögen, das ist unser Wunsch und unsere zuversichtliche Hoffnung.

Durchdrungen von der hohen Bedeutung der tierärztlichen Wissenschaft für die gesamte Volkswirtschaft und öffentliche Wohlfahrt dürfen wir versprechen, daß eine gedeihliche Fortentwicklung unserer

Hochschule in erster Linie unserem geliebten Vaterlande zugute kommen wird, wie dies in der bisherigen akademischen Entwicklung unserer Hochschule und unseres Berufes zunehmend geschehen ist.

Hohe Verfammlung! Wohl ist die Wissenschaft Gemeingut der ganzen kulturellen Welt, und ihre Errungenschaften machen heute vor keinem Grenzpfahl halt und dennoch, wie jede Nation ihre selbständige Existenz und ihren Wert für das Ganze behaupten will und muß, bleibt sich auch unsere Alma mater hannoversis stets bewußt, daß sie eine deutsche Hochschule ist und wie bisher so auch in alle Zukunft Sitz deutscher Sitte und Art.

Es muß daher auch Aufgabe der Hochschule sein, nicht allein die Wissenschaft zu pflegen und Bildung zu verbreiten, sondern aus ihren Jüngern

charaktervolle deutsche Männer zu machen, denen die Liebe zum Vaterlande über alles geht. Nicht der Drang nach irdischen Gütern, sondern die heilige Liebe zu unserer Heimat ließen uns im August 1914 ausziehen in den Kampf, das Vaterland zu schützen. Erschütternd war damals die Einigkeit des gesamten deutschen Volkes, die Bruderliebe untereinander. Seitdem sind trübe Jahre über uns gekommen, und die leider sprichwörtlich gewordene Zwietracht, unser alter Erbfeind, zehrt aufs neue erschreckend am Mark des deutschen Volkstums. Dagegen anzustehen mit den ewigen Waffen des Geistes, mit edler Begeisterung und dem unverzagten Mut des Rechten und Guten, das erkennen wir — eines Sinnes mit all unseren deutschen hohen Schulen — als unsere höchste und selbstverständliche Pflicht.

(Aus dem Regierungs-Seruminstitut für Tierfeuchen in Fusan [Korea].)

Gärtnerinfektion bei Rindern und Meerschweinchen in Japan.

Von Dr. Tsunetaro Konno in Fusan (Korea).

In Europa und Amerika ist es eine bekannte Tatsache, daß Gärtnerbakterieninfektionen in Bezug auf Fleischi-hygiene sehr wichtig sind, denn Gärtnerbakterien werden bei mehreren Tierarten beobachtet und können bei Rindern und Kälbern Septikämie erzeugen. Diese Tatsache war bis jetzt in Japan nicht bekannt, weil eine solche Infektion hier noch nicht beobachtet wurde. Im Jahre 1923 hat Verfasser mit seinem Mitarbeiter zum ersten Mal aus einer Kälberseptikämie einen Gärtnerstamm isoliert und im Jahre 1924 auch bei vielen Rindern und Kälbern Gärtnerinfektionen beobachtet.

I. Gärtnerinfektion bei Rindern.

Von Oktober 1923 bis September 1924 hat Verfasser 12 Fälle der Rind- und Kälberseptikämie beobachtet. Die Tiere wurden aus verschiedenen Gegenden Korea's in unser Laboratorium zum experimentalen Zweck eingeliefert und waren sämtlich in einigen Tagen durch Gärtnerinfektion gestorben.

Die Untersuchungsergebnisse waren folgende:

Klinische Krankheitsercheinungen: Hohes Fieber, Appetitlosigkeit, allgemeine Mattigkeit, Diarrhoe und Dyspnoe. Die Krankheit dauerte nur einige Tage, die Tiere starben meistens innerhalb einer Woche. Die pathologischen Befunde waren charakterisiert durch Hyperämie, Hämorrhagie, Hepatifikation sowie manchmal nekrotische Herde in den Lungen (serofibrinöse Pleuritis wurde selten beobachtet), Milzschwellung und akute Gastroenteritis.

Die Bakterien der Paratyphus-Gärtnergruppe konnten aus allen inneren Organen der durch Septikämie gestorbenen Tiere isoliert werden.

Die isolierten Stämme gehörten morphologisch, biologisch und serologisch zum Gärtnerstypus. Sie waren für Kälber so virulent, daß sie durch intravenöse Injektion von 0,5 c. c. einer 24stündigen Bouillonkultur Kälber, durch subkutane oder intraabdominale Injektion von 0,05 bis 0,5 c. c. derselben Kultur Kaninchen, Meerschweinchen und Mäuse in einigen Tagen töten konnten. Die Bakterien besaßen für kleinere Tiere hochgiftige Endotoxine, die bei Filtration der Bouillonkultur in die Filtrate übergingen oder durch Kochen der Bakterienaufschwemmung von Bakterienleibern frei gemacht wurden.

Der Verfasser hat auch 91 Kälber und 55 Rinder, die teils im Schlachthofe, teils zu anderen Zwecken getötet wurden, bakteriologisch und agglutinatorisch untersucht. Er konnte keinen Gärtnerstamm davon isolieren, aber die Tatsache beobachten, daß 15 Prozent der Seren von 91 Kälbern Agglutinationstiter von 1:500 bis 1:2000 gegenüber den isolierten Stämmen, 4 Prozent der Seren von 55 Rindern Agglutinationstiter von 1:1000 bis 1:2000 zeigten, wogegen

die Restseren in der Verdünnung von 1:100 keine Agglutination zeigten.

Auf Grund der oben beschriebenen Beobachtungen vermutet Verfasser, daß die Tiere, deren Seren gegen Gärtnerstämmen hohe Agglutinationstiter gezeigt haben, vielleicht früher mit Gärtnerbakterien infiziert und daß die Gärtnerbakterien überall in Korea verbreitet sind.

II. Meerschweinchen-Gärtnerepidemie.

Nach bisherigen Literaturangaben sind Paratyphusinfektionen verhältnismäßig häufiger als Gärtnerinfektionen. In Japan war eine solche Infektion noch nicht bekannt.

Im November 1924 brach eine Epidemie bei Meerschweinchen aus, die aus einer Gegend von Japan eingeführt wurden, an der das Laboratorium sehr viele Tiere verlor. Nach eingehender Untersuchung über diese Epidemie hat Verfasser festgestellt, daß sie durch eine Gruppe von Gärtnerbakterien verursacht wurde.

Die Untersuchungsergebnisse waren folgende: Verfasser hatte während seiner Rauschbrandversuche die mythische Tatsache beobachtet, daß mehrere Versuchstiere, die vor einigen Tagen aus Japan eingeliefert und geimpft waren, ganz unverhofft hintereinander starben. — Viele Tiere, die mit den oben beschriebenen Tieren zusammen eingeliefert wurden und in einem Zimmer ungeimpft untergebracht waren, erkrankten gleichfalls und starben.

Die Krankheitsercheinungen waren bei ihnen nicht sehr charakteristisch, allgemeine Mattigkeit und Appetitabnahme war zu bemerken. Der Verlauf war meistens akut, aber einige Tiere waren auch chronisch krank.

60 Tiere wurden nach dem Tode zerlegt. Die pathologischen Befunde waren in keinem Falle gleichmäßig, septikämische Veränderungen, d. h. Hyperämie und Blutungen in den Organen wurden aber in allen Fällen bemerkt. Die Übersicht der 60 Fälle ergab, daß sich als charakteristische Veränderungen in allen Fällen nekrotische Herde in parenchymatösen Organen vorfanden. Die nekrotischen Herde waren von der Größe von Mohnsamen oder Hanfsamen und sahen manchmal ganz wie Tuberkeln aus. Außer diesen Veränderungen wurden in manchen Fällen Milzschwellung, Schwellung und Blutungen an den mesenterialen Lymphknoten beobachtet. Die Wand der Gallenblase war meistens verdickt, die Galle in allen Fällen mehr oder weniger getrübt, meistens dickeiterig bzw. rötlich-geblich getrübt.

In allen untersuchten Fällen wurden morphologisch, agglutinatorisch einheitliche Bakterien der Paratyphus-Gärtnergruppe isoliert. Die bakteriologischen Befunde waren jedoch im einzelnen Falle und auch bei den verschiedenen Organen nicht gleichmäßig. Charakteristisch war, daß die Bakterien im Herzblut meistens wenig vorgefunden

wurden, während sie in Milz, Leber, Galle sowie anderen Organen in großer Zahl auftraten. Aus dem Darminhalt wurden sie gleichfalls gezüchtet.

Die agglutinatorische Prüfung ergab die Zugehörigkeit der isolierten Bakterien zur Gärtnergruppe.

Die Virulenz der isolierten Stämme war die gleiche wie die der in dem ersten Abschnitt beschriebenen Stämme, die bei Kälberseptikämie isoliert wurden.

Es wurde weiter beobachtet, daß einige anscheinend gesunde Tiere in Wirklichkeit Bazillenträger waren. Diese Beobachtung ließ vermuten, daß bei den überlebenden Tieren sehr schwer festzustellen ist, welche tatsächlich infiziert und welche nicht infiziert waren. Um sicher zu gehen, wurden 61 Tiere teils durch Injektion von Rauschbrandvirus teils durch Erschlagen getötet und pathologisch sowie bakteriologisch untersucht, ob spezifische Veränderungen in ihren Organen bestanden oder ob sie Bazillenträger waren.

Weiter wurden Blutproben, die vor der Injektion oder vor der Tötung entnommen wurden, mittels Agglutination gegenüber dem isolierten Stamm untersucht. — Die Untersuchungsergebnisse waren folgende:

- a) In Leber, Milz, Niere, Galle und Darminhalt von 14 Tieren wurden Gärtnerbakterien nachgewiesen, dagegen wurde aus den anderen 47 Tieren kein Gärtnerstamm gezüchtet.
- b) In den Organen der Tiere, aus denen Gärtnerbakterien gezüchtet wurden, fanden sich spezifische, nekrotische Herde und Veränderung der Galle, mit Ausnahme von zwei Fällen, in denen sich keine Veränderungen vorfanden.
- c) Die Organe der Tiere, in denen Gärtnerbakterien nicht nachgewiesen wurden, zeigten meistens keine Veränderung.

d) Die Sera von acht Tieren von 14 Bakterienträgern zeigten einen Agglutinationstiter von 1 : 100 bis 1 : 1000, die der anderen sechs Tiere keine Agglutination.

e) 19 Sera von Nicht-Bakterienträgern zeigten keine Agglutination, selbst nicht in der Verdünnung von 1 : 20, während vier Sera Titer von 1 : 50, die Restsera Titer von 1 : 100 bis 1 : 500 aufwiesen.

Auf Grund der oben erwähnten Erscheinungen konnte Verfasser folgende Tatsachen feststellen:

1. Bei Tierversuchen an Meerschweinchen wurde beobachtet, daß sie gegen Gärtnerbakterien sehr empfindlich waren, bei der Epidemie zeigten viele Tiere dagegen so starke Resistenz, daß 23 Prozent der kranken Tiere die Infektion überstanden und 16 Prozent überhaupt gesund blieben.
2. Die pathologischen Veränderungen, namentlich die nekrotischen Herde in den Organen usw., waren ähnlich wie bei Pseudotuberkulose.
3. Wenn einmal eine Gärtnerinfektion bei einer großen Zahl von Meerschweinchen ausbricht, hält die Epidemie infolge der Bakterienträger lange an.

III. Beziehungen zwischen den Stämmen der Rind- und Kalbseptikämie sowie der Meerschweincheninfektion.

Es wurde festgestellt, daß sich die oben erwähnten Stämme morphologisch und kulturell denen der Paratyphus-Enteritidisgruppe gleich verhielten. Die Zugehörigkeit zur Gärtnergruppe wurde durch die Agglutination bewiesen. Weiter wurde beobachtet, daß die Stämme der Rind- und Kalbseptikämie agglutinatorisch etwas verschieden von den Stämmen der Meerschweincheninfektion waren, d. h. sie wurden in zwei Gärtnergruppen eingeteilt.

Neue Erkenntnisse über die biologischen Wirkungen der Milchsäure.

Von Dr. med. F. Froboese, Heidelberg.

Ich habe an dieser Stelle schon einmal über Rationalisierung unserer Fütterungsmethoden¹⁾ gesprochen und dabei besonders die praktisch erprobten Vorteile einer milchsauren Fütterung resp. milchsauren Beifutters hervorgehoben. Ich wies dabei darauf hin, daß die Kinderärzte in der Säuglingsernährung schon seit langem Buttermilch in den verschiedensten Mischungen ihrer besonders guten Bekömmlichkeit und Wirksamkeit wegen mit größtem Erfolge anwenden, und daß in dieser Hinsicht für den wachsenden Organismus bei Mensch und Tier offenbar gleiche Verhältnisse und Bedingungen vorliegen. Ich sagte damals, daß es wissenschaftlich noch nicht genau begründet werden könne, worauf diese günstige Wirkung der Milchsäure beruhe, ob auf ihrer Beeinflussung der Darmbakterien, oder darauf, daß sie die Vitamine der Milch in besonderem Maße schützt oder aktiviert, oder darauf, daß sie die Resorption und Retention der Nährstoffe, besonders der Mineralien, begünstigt (Klotz). Wie so oft, eilten auch hier die Erfahrungen in der Praxis, sowohl in der Säuglings-Ernährung als auch neuerdings in der Viehfütterung, den theoretischen Erkenntnissen voraus. Nunmehr hat jedoch die medizinische Wissenschaft durch exakte Versuche den direkten Beweis dafür geliefert, daß die Beobachtungen der Ärzte und Tierzüchter über besseres Gedeihen der milchsauren ernährten jugendlichen Organismen auf objektiven Tatsachen beruhen, und zwar, daß es sich um eine direkte Wirkung der Milchsäure auf den wach-

senden Körper im Sinne der Wachstumsbeschleunigung handelt. Ich möchte an dieser Stelle im folgenden kurz darüber berichten, um meine früheren Ausführungen zu ergänzen und auf eine festere Grundlage zu stellen.

Nachdem in der Heidelberger Kinderklinik durch Brehme beim menschlichen Säugling ein offenkundiger, direkter Zusammenhang zwischen Wachstumstendenz und Milchsäuregehalt des Blutes (als Funktion der Glykolyse) aufgedeckt worden war, veröffentlichte Vollmer in der Klinischen Wochenschrift, 6. Jahrg., Heft 38, S. 1806, Beobachtungen, welche zeigen, daß nicht nur die endogen gebildete Milchsäure, sondern auch die mit der Nahrung exogen zugeführte eine direkte wachstumsbeschleunigende Wirkung auf junge, wachsende Organismen ausübt.

Vollmer experimentierte mit 18 jungen Ratten, die alle mit der gleichen gemischten Kost und einer genau abgemessenen Milchmenge ernährt wurden, nur enthielt die Milch der einen Hälfte der Tiere 1 Prozent Milchsäure, während die Kontrolltiere süße Milch erhielten. Schon nach wenigen Wochen war für das bloße Auge eine deutliche Größendifferenz zwischen Milchsäureratten und Kontrolltieren zu erkennen. Bei einem Anfangsgewicht von durchschnittlich 35 Gramm pro Tier wogen die Milchsäureratten am 60. Versuchstage durchschnittlich 165 Gramm, während die Kontrolltiere nur 135 Gramm schwer waren.

Andere in der Praxis bei milchsaurer Fütterung beobachtete Wirkungen sind mehr sanitärer, hygienischer, diätetischer Art. Diese sind meines Wissens in exakten, wissenschaftlichen Versuchen noch nicht nachgeprüft worden, und es wäre sehr zu begrüßen, wenn unter den Tierärzten ein-

¹⁾ Über den Nutzen vitaminreicher Ernährung der Milchkühe für Prophylaxe und Therapie von Säuglingskrankheiten und neue Wege zu rationellen Fütterungsmethoden. D. T. W. 1925, S. 871.

mal sich ein spezielles Interesse auf diese Fragen richten würde, um sie von maßgebender Seite zu beantworten.²⁾

So wird übereinstimmend berichtet, daß die mit Buttermilch gefütterten Tiere (die Erfahrungen stammen bisher im wesentlichen von Kühen und Ferkeln, wurden aber auch schon an Kälbern gemacht) wesentlich widerstandsfähiger gegen Infektionen und andere Krankheiten seien, daß sie also weniger erkranken, resp. wenn sie erkranken, leichter erkranken und die Krankheit leichter überstehen. Der Gesundheitszustand sei also im ganzen ein besserer, was sich schon äußerlich in dem glatteren Aussehen, dem glänzenden Haar resp. Gefieder, und der größeren Freßlust dokumentiere. Das entspricht dem rosigen Aussehen, dem guten Hautturgor und dem gefunden Appetit, Zeichen, die der Kinderarzt am Säugling als Kriterien besonders guter Widerstandskraft kennt.

Man hat sogar nicht nur prophylaktische, sondern auch direkte therapeutische Wirkungen der Buttermilch beobachtet: so sollen neuerdings u. a. Paratyphus-Epidemien bei Kühen durch Buttermilch äußerst günstig beeinflusst worden sein. Dem Kinderarzte würde das nicht wunderbar erscheinen, da er ja aus jahrzehntelanger Erfahrung weiß, daß Säuglings-Durchfälle — die nach neuesten Forschungen meist auf Coli-Infektionen beruhen, also dem Paratyphus verwandt sind — durch milchsaure Heilnahrungen vorzüglich beeinflussbar sind.

Kümmere unter dem Bestand der Jungtiere hat man durch Buttermilch-Beifütterung noch zu befriedigender Entwicklung gebracht, man hat auch schon ganze Sendungen von Kühen oder Ferkeln, die durch den Transport so stark gelitten hatten, daß man an ihrem Aufkommen zweifeln mußte, durch eine derartige Beifütterung wieder auf die Beine gebracht.

Entsprechend der geringeren Morbidität ist naturgemäß auch die Mortalität der mit sauren Milchprodukten gefütterten Tiere eine geringere.

Bei Legehennen scheint eine Beifütterung von Buttermilch die Legetätigkeit wesentlich zu steigern.

Nach neueren Erfahrungen soll bei Kühen, während und speziell am Ende der Laktationsperiode, durch Buttermilch-Tränke ein Ansteigen der Milchproduktion erzielt worden sein.

Die biologischen Wirkungen der milchsauren Buttermilch auf den Tierkörper im Sinne einer Leistungssteigerung, Wachstumswirkung, Gefunderhaltung und Heilwirkung sind also derart, daß der Tierarzt mehr als bisher den Landwirten gegenüber den Wert einer solchen Fütterung betonen sollte. Er sollte darauf hinwirken, daß alle entbehrliche, wirtschaftseigene oder sonst frisch beschaffbare Buttermilch dem Vieh- und Geflügelbestande zu gute kommt. (Die Milch muß jedoch gut durchgefäuert sein, da bekanntlich

eben angefäuerte, noch in der Säuerung befindliche Milch großen Schaden anrichten kann, besonders unter Kühen!) Die scheinbar hohen Kosten da, wo keine wirtschaftseigene Buttermilch zur Verfügung steht, rentieren sich unbedingt. Wo überhaupt keine frische Buttermilch in der erforderlichen Güte zu beschaffen ist, greife man unbedenklich zu den im Handel befindlichen Konserven. An erster Stelle steht da das halbfeste Fabrikat „HA-BU“, das an Wirkungswert der frischen Buttermilch nicht nachsteht, sie an Gleichmäßigkeit des Milchsäuregehaltes sogar noch übertrifft. An zweiter Stelle kommt auch die Trockenbuttermilch in Betracht. Und zwar verwende man möglichst nur Trockenbuttermilch von hellgelber flockiger Beschaffenheit. Denn je höher die bei der Herstellung verwendeten Hitze-Grade waren, desto brauner wird die Trockenmilch, desto mehr wird aber auch ihre biologische Wirksamkeit beeinträchtigt, so daß die helle Farbe direkt als Maßstab für die Güte gelten kann. Ebenso wichtig ist natürlich ein gleichmäßiger und hoher Milchsäuregehalt der Ware, den allerdings nur verhältnismäßig wenige Fabrikate aufzuweisen haben. Es ist deshalb beim Einkauf einige Vorsicht geboten. Bei der Frage, ob man besser das Trockenpräparat (das in der Verfütterung ja zweifellos etwas bequemer in der Handhabung ist) oder die halbfeste Konserve empfehlen solle, halte man sich stets vor Augen, daß — zum mindesten für Geflügel — durch Prof. Harry L. Lewis in Amerika durch vergleichende Versuche an 1800 Kühen und 400 Legehennen nachgewiesen worden ist, daß mit der halbfesten Buttermilch bei geringeren Futterkosten und geringerer Sterblichkeit eine etwas größere Gewichtszunahme bei den Kühen und eine größere Eierproduktion bei den Hennen erzielt wird (im Monat November pro Henne ein halbes Ei mehr) — bei den Vergleichsgruppen von 200 Tieren ergab das in jenem Monat einen Unterschied von fast 100 Eiern (896 gegen 799). Es erinnert also dieser Unterschied in der biologischen Wertigkeit an den zwischen Heu und Grünfutter, der ja auch nicht zugunsten des — mehr Kalorien pro Gewichtsteil enthaltenden — Heus ausfällt. Man wundert sich darüber nicht, wenn man sich die „Lösungen“ beider Präparate in Wasser einmal vergleichsweise anschaut. Während die halbfeste Buttermilch-Tränke von frischer kaum zu unterscheiden ist, bildet die Trockenbuttermilch nur eine Aufschwemmung fester Teilchen, die sich beim Stehen alsbald wieder zu Boden setzen, während das Wasser darüber fast klar bleibt. Die aus halbfester Buttermilch hergestellte Tränke (1 Pfund auf 10 Liter Wasser) kostet pro Liter ca. 3 bis 5 Pfennige, so daß sie auch in dieser Hinsicht als Ersatz für frische Buttermilch durchaus in Frage kommt.

Ich habe in dieser Mitteilung die Frage der zu empfehlenden Ersatz-Präparate für Fälle, wo frische Buttermilch nicht vorhanden ist, aus dem ganz bestimmten Grunde etwas breiter erörtert, damit der Schritt von der theoretischen Erkenntnis zur praktischen Durchführung nicht an der Beschaffungsfrage scheitert, und damit der Tierarzt, der die Fütterung der milchsauren Molkereiprodukte empfehlen will, für alle Eventualitäten gewappnet ist.

Innere Medizin und Chirurgie.

Wirth, D.: Menschenkrankheiten und Tierkrankheiten.

(Seminarabend des Wiener Doktorkollegiums vom 17. Oktober 1927.)

(W. kl. Wschr. 1927, Nr. 48, S. 1518—1520, Nr. 49, S. 1549—1551.)

Zwischen den Krankheiten der Menschen und jenen der Tiere besteht kein prinzipieller Unterschied. Die Pathogenese ist bei Tieren und Menschen die gleiche, ein und dieselbe Wissenschaft erklärt uns alle Krankheitsvorgänge. Die nicht ansteckenden Krankheiten (Organkrankheiten) der Haustiere haben für den praktischen Arzt keine unmittelbare Bedeutung; eine erst auszubauende vergleichende Medizin wird aber auch wohl auf diesem Gebiete aus dem

Vergleich derselben Krankheiten bei Mensch und Tier Nutzen ziehen können (Häufigkeit von Nieren- und Hautkrankheiten beim Hund, Seltenheit beim Pferd). — Die ansteckenden Krankheiten bakterieller und zooparasitärer Natur (Infektions- und Invasionskrankheiten) haben für den praktischen Arzt in jenen Fällen unmittelbares Interesse, in denen der Mensch vom Tier gewisse Krankheiten erwerben kann; umgekehrt gibt es solche, bei denen die Ansteckung von Mensch zum Tier erfolgt, und es kann sich der Mensch in gewissen Fällen vom Tier rückinfizieren. Während gewisse Krankheiten anscheinend leicht und regelmäßig (Rotz, Milzbrand, Trichinose, Trichophytie u. a.) übertragen werden, geht die Infektion in anderen Fällen (z. B. infek-

tiöse Anämie, Abortus infectiosus u. a.) ziemlich schwer vor sich, und es ist hier vielleicht eine besondere Disposition des Menschen oder große Virulenz des Erregers anzunehmen. Bemerkenswert ist, daß bei der Aktinomykose bis jetzt noch kein Fall bekannt geworden ist, in dem die Infektion vom Menschen ausging, obschon die Krankheit bei Mensch und Tier vorkommt (Aufnahme von Getreidegrannen u. dergl.). Bei manchen zooparasitären Krankheiten verläuft die Krankheit beim Menschen anders als beim Tier, weil der Krankheitserreger sich beim Menschen in einem anderen Entwicklungsstadium befindet (Finnen, Bandwurm). Daß Erkrankungen vom Tier aus seltener vorkommen, liegt darin begründet, daß durch die praktische Tiermedizin und gesetzliche Maßnahmen die für den Menschen gefährlichen Krankheiten der Tiere energisch bekämpft werden (Vet.-Polizei, Fleisch- und Milchhygiene). Ein schlechtes Funktionieren des veterinärpolizeilichen Apparates kann die Zahl der Tierkrankheiten beim Menschen außerordentlich ansteigen lassen. In Rußland mußten z. B. nach dem Weltkrieg wegen zahlreicher Rotzerkrankungen des Menschen eigene Rotzspitäler geschaffen werden, als durch die allgemeinen politischen Wirren die Ausübung der Veterinärpolizei Schaden genommen hatte. Verf. geht dann kurz auf die einzelnen Krankheiten ein, bei denen eine Infektion des Menschen vom Tier oder tierischen Produkten aus oder umgekehrt bekannt geworden ist; bei manchen sind der Beweis bezw. die Berichte recht mangelhaft, so daß der wissenschaftlich befriedigende Nachweis noch aussteht (u. a. bei Botryomykose, Stomatitis pustulosa contagiosa, Acne contagiosa, Bläschenauschlag, infektiöse Anämie der Pferde, Lymphangitis epizootica, Abortus infectiosus Bang, Maltafieber, Psittacosis, Geflügelcholera usw.). A.

Kleinfeldt: Vollständige Heilung einer Femurfraktur bei einem Zwergpferde. (T. R. 1927, S. 937.)

Ein etwa fünfjähriges Zwergpferd hatte sich bei einem Sprung aus einem fahrenden Auto einen Bruch des rechten Oberschenkelbeins etwa vier fingerbreit über dem Kniegelenk zugezogen. Am niedergelegten Tier wurde das betreffende Bein vom Sprunggelenk bis möglichst weit auf den Oberschenkel herab mittels Watte, Holzschienen und Binden bandagiert und am stehenden Tier ein Gipsverband angelegt. Wegen Druck, verursacht durch eine verrutschte Holzschiene, wurde etwa nach drei Wochen der Verband entfernt. Da das Tier den Schenkel schon kurze Zeit zu belasten imstande war, wurde kein neuer Verband angelegt, das Tier jedoch in der Tragschewebe belassen. Drei Wochen lang wurde Phosphorlebertran gereicht. Nach weiteren vier Wochen konnte das Tier bereits in leichtem Trabe bewegt werden; es war an der gefundenen Gliedmaße eine starke Verkrümmung nach außen eingetreten, welche aber später fast völlig ver schwand. K. H. Meyer.

Kollowa: Maximaldosis bei der Chloralhydratnarkose. (B. T. W. 1927, S. 790.)

Verf. gab in einem Falle von Prolapsus uteri zur Beseitigung des Drängens der betr. Kuh zuerst zwei Drittel von 35 Gramm Chloralhydrat innerlich, und als nach 15 Minuten keine ausreichende Beruhigung erzielt war, wurde der Rest verabreicht. Nach weiteren 5—10 Minuten war eine Reposition der Gebärmutter möglich, obwohl die Kuh auch jetzt noch mitunter wehenartig preßte. Als der Kollege am nächsten Morgen nach der Kuh sah, war sie verendet. Nach dem Berichte des Besitzers habe das Tier zuerst mit dem Kopf hin- und hergeschlagen, dann habe es versucht aufzustehen, worauf es sich ruhig hingelegt habe. Der anwesende, inzwischen eingeschlafene Besitzer traf beim Erwachen seine Kuh tot an.

Verf. nimmt an, daß in vorliegendem Falle die Dosis des Mittels zu groß gewesen sei und zu einer Herz- und Atmungslähmung geführt habe. Er verwendet seither Chloralhydrat per os nur in einer Maximaldosis von

30 Gramm und gibt gleichzeitig ein Herzmittel in Gestalt von 30 Gramm Spiritus vini. Carl.

Hinz: Über Pernokton zur Narkose des Hundes. (Aus der Klinik für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule Berlin. — Direktor: Prof. Dr. W. Hinz.) (T. R. 1927, S. 973.)

Das Pernokton ist ein sekundär-butyl-beta-brompropenylsaurer Natrium ($C_{11}H_{14}O_3N_2Br.Na$) von wasserklarer und wässriger Konsistenz. Über gute narkotische Wirkung in der Humanmedizin berichten Mehner und Bumm. Letzterer fand eine therapeutische Breite von 10 bei Kaninchen (Dosis narcotica minima 0,007, Dosis letalis minima 0,07 pro Kilogramm Körpergewicht). Bumm wendet beim Menschen 7—8 mg. pro Kilogramm Körpergewicht an und verstärkt die Narkose durch Ätherinhalationen, da bei höherer Dosierung unerwünscht langer Schlaf von 12—14 Stunden auftrat. H. wandte das Mittel bisher bei etwa 70 Hunden an; Todesfälle, die dem Narkosemittel zur Last gelegt werden konnten, traten nicht auf. Injiziert wurden 0,3—0,35 ccm pro Kilogramm Körpergewicht langsam in die Vena saphena. Schlaffrigkeit trat oft schon während der Injektion ein, frühestens nach 2½, längstens innerhalb von 6 Minuten folgte tiefe Narkose mit vollständiger Unempfindlichkeit. Die Dauer der Narkose schwankte zwischen 3—7 Stunden. Die sichere Wirkung, seine geringe Giftigkeit, das Fehlen schädlicher Nebenwirkungen und seine leichte Anwendungsmöglichkeit lassen das Pernokton auch für die Praxis als geeignet erscheinen.

K. H. Meyer.

Kroh, F.: Die Behandlung akut entzündlicher Prozesse der Haut und ihrer Anhangsgebilde mit Kohlenäureschnee. (Zentralbl. für Chirurg. 1928, S. 919.)

Nach den bei etwa 1000 Fällen gemachten Erfahrungen ist die vorliegende Methode als das souveräne konservative Behandlungsmittel anzusehen. Es sind dazu zunächst großklumpige Schneestücke erforderlich, die folgendermaßen hergestellt werden: Aus einer gekippten Kohlenäureflasche entweichende Kohlenäure wird mittels eines starkwandigen Schlauches in einen Beutel geleitet, der aus kräftigem Fensterleder gebildet und von einem Leinenstück übersichert ist. Die Schneestücke werden alsdann mit einem zu diesem Zwecke besonders konstruierten Metallspatel aus dem Beutel genommen. Das einzelne aufzulegende Schneestück (mindestens 0,5 cm dick) muß der Größe des Infektionsherdes entsprechen und muß durch Behandlung mit einem Modellierspatel der Form der betreffenden Hautstelle angepaßt werden. Das so vorbereitete feste Schneestück wird alsdann auf den Entzündungsherd gebracht und mittels eines Holzspatels fest gegen die Haut angepreßt. Die Zeit, während dies zu geschehen hat, schwankt zwischen 20—25 Sekunden (erbsengroße furunkulöse Infiltrate) und 180 Sekunden (Karbunkel größten Formats). Die vorher rasierte und durch Äther entfettete Haut ist nach Abnahme des Schneeblockes vereift, d. h. gelbweiß verfärbt, eingesunken und knochenhart. Die weitere Behandlung besteht in Anlegung eines Borbalkanverbandes. Die Vereifung ist für den Patienten schmerzhaft, jedoch nicht unerträglich. Empfindliche Kranke erhalten Beruhigungsmittel. Nach 24, seltener nach 48 Stunden, kommt es alsdann zur Abszedierung und der Eiter entleert sich meist spontan aus der Kuppe des Infiltrats. Eventuell kann mit einer Sperrpinzette nachgeholfen werden. Der durch die Vereifung infolge der eintretenden Nekrose entstehende Gewebsdefekt ist nicht sehr bedeutend und wird in kurzer Zeit vom Rande her oder von erhalten gebliebenen Epidermisinseln aus überhäutet. Die Heilung erfolgt bei erbsen- bis kirchgroßen furunkulösen Infiltraten innerhalb 6—10 Tagen restlos, bei größeren innerhalb 10—14 Tagen, bei ganz großen Karbunkeln innerhalb 3—4 Wochen.

Bezüglich der Wirkungsweise des vorliegenden Verfahrens steht Verf. auf dem Standpunkte, daß eine direkte Beeinflussung der Eitererreger durch die Kälte nicht anzu-

nehmen ist. Der Untergang der Krankheitskeime ist vielmehr Folge der nach der Vereifung plötzlich entstehenden und schnell sich ausbreitenden Gewebsektrose in der näheren und weiteren Umgebung derselben. Carl.

Giovanoli, G.: Fremdkörper im Verdauungsapparat des Rindes. (Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1928, 70, S. 77.)

Gewöhnlich gilt das Auftreten gastrischer Störungen als Hauptmoment von Fremdkörpern in den Vormägen. Daß das Fehlen solcher Symptome die Abwesenheit nicht immer sicherstellt, zeigt folgender Fall. Ein Ochse zeigte plötzlich beim Bergabgehen Lahmheit der linken Hintergliedmaße. Im Stehen schwache Belastung der Zehe. Mit Ausnahme einer angedeuteten Schmerzempfindlichkeit in der Kniegegend kein Befund. Verschwinden der Lahmheit, gelegentlich Rezidive nur beim Abwärtsgehen. Mästung. Sektion: In der Haubenwand festverwachsene ca. fingerdicke, 10 cm lange Geschwulst in die Bauchhöhle ragend. Darin ein Nagel, dessen Kopf durch die Haubenwand festgehalten. Verf. ist der Ansicht, daß der Nagel die Haubenwand durchstoßen hat und durch Druck auf die Bauchwand in der Gegend der Hinterextremität die Lahmheit verursacht hat. Die sich bildende Geschwulstmasse diene als Polster, so daß später weniger Schmerz ausgelöst wurde. — In einem andern Falle entstand ohne irgend welche klinischen Symptome an der Vorderbrust ein Abszeß, der gespalten und behandelt verschwand. Ein Fremdkörper war in der Höhle nicht fühlbar. Rezidive ohne allgemeine oder gastrische Störung. Wegen Unträchtigkeit Schlachtung. Sektion: Ein Nagel in der Mukosa des Dünndarmes eingekapfelt. Vor der Einkapfelung hat er die Bauchwand durchstoßen und so die Abszesse verursacht. — Beim Gebärakte, dem Pressen können bislang ungefährlich gelegene Fremdkörper perforieren und zu den schwersten Störungen führen. Scórna z z i n i berichtet über zwei derartige Fälle, wo die gastrischen bzw. Herz-Komplikationen direkt nach der Geburt eintraten und sich die Diagnose durch den Sektionsbefund bestätigen ließ. M. G.

Ariess: Über die Wirkung der Komponenten des „Cejodyl-Atarost“ und dessen Indikationsgebiet. (T. R. 1928, S. 65.)

Die Cer-Jod-Lösung „Cejodyl“ besitzt gegenüber Intröcid den Vorzug, daß sie durch Zusatz eines indifferenten Reduktionsmittels und einer organischen Säure vor der Zersetzung in freies Jod und Cerhydroxyd geschützt und daher auch im Anbruch unbegrenzt haltbar ist. Verf. verbreitet sich über die pharmakologische Wirkung der Komponenten des Cejodyl und weist kurz auf die Indikationsgebiete: maligne Tumoren und septische Erkrankungen jeglicher Art hin. Durch die Verwendung von Sol. Cerii jodati kadylici verbreitert sich das Indikationsgebiet und umfaßt fämliche Krankheiten, welche im Organismus einen locus minoris resistentiae bedingen. K. H. Meyer.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Fugling, M.: Über die Desinfektionsfragen bei der Tuberkulose. (W. Kl. Wschr. 1927, Nr. 26, S. 850—853.)

Den Veterinärmediziner interessiert in erster Linie, was Verf. über die Möglichkeit der bovinen Infektion sagt. Zu den Desinfektionsfragen gehört auch die Pasteurisierung der Kindermilch. Die Übertragung durch ungekochte Kindermilch spielt heute nicht mehr die Rolle wie früher (viel strengere Überwachung der Milchproduktion, große Fortschritte in der Belehrung der Mütter). Durch die neueren Forschungen und Erfahrungen über die Vitamine hat aber die Lehre über das Abkochen der Milch eine gewisse Einschränkung erfahren, weil die Vitamine bei längerem Abkochen zugrunde gehen. Milch, deren einwandfreie Herkunft nicht absolut verlässlich ist, wird man aber dennoch abkochen oder pasteurisieren. Von den beiden Methoden

(Hochpasteurisierung bei 85 Grad durch 2 Minuten; Dauerpasteurisierung bei 63 Grad durch eine halbe Stunde) wird man der Dauerpasteurisierung den Vorzug geben, weil bei der Hochpasteurisierung ein Großteil der Vitamine schon zugrunde geht. Die Pasteurisierung bietet aber nicht nur einen Schutz gegen Tuberkulose, sondern auch gegen Typhus und andere Krankheiten. Eines aber darf nicht vergessen werden, daß die Sporen der Heubazillen und auch andere Sporenbildner in der Milch bei Pasteurisierung nicht abgetötet werden, und man daher die Milch nach Pasteurisierung in der Kälte bei mindestens 8 bis 10 Grad C aufbewahren muß, da in der Wärme die Sporen auskeimen, die Milch wieder keimreich wird und dann von Kindern schlecht vertragen wird sowie auch Krankheiten erzeugen kann. Die Hauptinfektionsquelle für die menschliche Tuberkulose ist der kranke Mensch, der auf dem Wege der Tröpfcheninfektion beim Husten und Sprechen die überwiegende Mehrzahl der Ansteckungen vermittelt. Der Tuberkelbazillus kann durch Hitze mit aller Sicherheit abgetötet werden (bei 65 Grad in 15 Minuten, bei 85 Grad in 1 Minute). Spucknapfe sind am besten mit 2prozentiger Kresolseifenlösung zu füllen. Mit dieser Lösung können auch Gegenstände, wie Wäpche, nach Sodabehandlung (Aufkochen) desinfiziert werden, Fußböden werden mit dieser Lösung aufgewaschen; Bücher und Zeitschriften können Heißluftbehandlung (bis 160 Grad) oder Formalindämpfen ausgesetzt werden. A.

Bautz und Amiraslanow: Über die Hautinfektion und Hautimmunität bei Milzbrand. (Zschr. für Immunitätsf. 1928, Bd. 56, S. 1.)

Die kutane Vakzinationsmethode nach Besredka ist der subkutanen sehr überlegen. Eine viermalige kutane Vakzination schützt regelmäßig alle Tiere gegen eine kutane Infektion. Im Gegensatz dazu gelingt es nur in 10 Prozent der Fälle, die Tiere subkutan zu vakzinieren, um sie gegen eine kutane Infektion zu schützen und zwar erst nach zahlreichen Injektionen, die in einem Zeitraum von über 2½ Monaten gegeben werden müssen. Die Versuche zeigen aber, daß die Annahme Besredkas von der elektiven Hautempfindlichkeit gegen Anthrax nicht aufrecht erhalten werden kann. Es erkranken nämlich genügend vakzinierter Meerfweinchen in der Regel nicht bei kutaner Infektion, wohl aber bei subkutaner Infektion. Meyn.

Ruppert, F.: Beitrag zur Diagnostik des Milzbrandes. (B. T. W. 1928, S. 245.)

Bei der Untersuchung von eingeschickten Proben auf Milzbrand ergaben sich nach den Beobachtungen des Verf. oft widersprechende Resultate. Beispielsweise war in zwei Fällen die Untersuchung der Ausstriche positiv, desgleichen die Impfung, während die Kultur versagte. Einmal war der Ausstrich überzeugend positiv, Kultur, Impfung und Präzipitation negativ. Ähnliche Beobachtungen werden noch eine ganze Reihe angeführt. Verf. gelangt daher in Bezug auf die praktische Durchführung der Milzbranddiagnose zu folgenden Schlüssen:

1. Die Untersuchung von Ausstrichpräparaten allein genügt nicht, um in allen Fällen das Vorhandensein von Milzbrand zu beweisen.
2. Mit dem Kulturverfahren wurden in 106 untersuchten Fällen 27mal (25,5 Prozent) negative Resultate erzielt, in denen durch andere Methoden Milzbrand nachgewiesen werden konnte.
3. Das Impfverfahren zeigte von 106 Milzbrandfällen 102 an und muß daher als sehr wertvoll in der Diagnostik angesehen werden.
4. Das Präzipitationsverfahren versagte nur dann, wenn die unbedingt notwendigen Grundbedingungen für die Herstellung der Extrakte wegen der Art der Eindickungen nicht eingehalten werden konnten.

Hieraus folgt, daß im Interesse einer sicheren Milzbrand-

bekämpfung unbedingt gefordert werden muß, alle vier oben erwähnten Untersuchungsverfahren in Anwendung zu bringen.

Carl.

Schreiber, O.: Über Tuberkulose-Immunität. Vortrag, gehalten vor der Ärzte-Gesellschaft der mittleren Ostmark am 13. XI. 1927. (B. T. W. 1928, S. 17.)

Nach einem allgemeinen Bericht über die feither vorgeschlagenen Tuberkulose-Immunsifizierungsmethoden bespricht Verf. die diesbezüglichen Versuche, die seit sechs Jahren am Institut in Landsberg angestellt wurden. Gegen Geflügeltuberkulose wird jetzt ein Impfstoff (Katebin gallin.) hergestellt, der sich in der Praxis an einem großen Materiale und nach den übereinstimmenden Mitteilungen der Berichterstatter seit zwei Jahren als sicheres Mittel bewährt hat. Das Impfpräparat enthält lebende Bakterien des Typus gallinaceus in einer Form, die subkutan eingespritzt weder an der Impfstelle noch im Körper tuberkulöse Herde verursacht, dagegen eine spezifische Gewebsumstimmung erzeugt, die in der positiven Tuberkulin-Kehllappenprobe zum Ausdruck kommt.

Bei den übrigen Versuchen knüpfte Verf. an die Beobachtung von Arloing an, nach der Kulturen von Tuberkelbazillen, die in der Tiefe ihrer Nährbouillon wachsen, unfähig geworden sind, tuberkulöse Veränderungen zu erzeugen. Diese Versuche sind dem Verf. in gleicher Weise geglückt. Es konnten aus der mit dem Typus bovinus infizierten vorderen Augenkammer von Ziegen, Meerfischweinen und Kaninchen Kulturen gewonnen werden, die wie echte Tuberkelbazillen auf Eiernährböden wachsen, bezüglich deren jedoch der Unterschied besteht, daß sie innerhalb vier Tagen angehen und daß diese Kulturen bei subkutaner, intravenöser oder intraperitonealer Injektion sich als avirulent erweisen. Bei subkutaner Einspritzung entsteht zwar an der Impfstelle ein Knötchen, das jedoch nicht aufbricht und ulzeriert, sondern abheilt. Der zugehörige Lymphknoten schwillt an, ohne daß Vereiterung eintritt. Werden die Versuchstiere 6—8 Wochen nach dem Abklingen der Reaktionerscheinungen mit echten, virulenten Kulturen in einer Dosis nachinfiziert, die bei den Kontrollen eine tödliche Tuberkulose hervorruft, so entsteht an der betreffenden Stelle zwar wieder ein Knötchen, das aber abheilt. An den zugehörigen Lymphknoten wird Schwellung, manchmal auch Verkäsung beobachtet, jedenfalls kommt es aber nicht zu allgemeiner Tuberkulose und der Prozeß heilt allmählich aus. Dies ist der Fall auch bei dem empfindlichsten Versuchstiere, dem Meerfischweinen.

Der auf diese Weise hergestellte Impfstoff (Katebin bovin.) wird z. Zt. an einem größeren Tiermaterial nachgeprüft. Die Impfung der Ziegen, Kälber und Schweine erfolgt subkutan in die Leistenfalte, der Rinder an der Halsseite. Bei gesunden Tieren entsteht ein Infiltrat, das meist bald resorbiert wird, bei Kälbern ein Strang zur zugehörigen Lymphdrüse, der sich später zurückbildet. Nach der Impfung tritt gewöhnlich eine leichte Temperatursteigerung ein, am wenigsten bei Kälbern. Die Dosis des Impfstoffes beträgt bei Großvieh 0,5 ccm auf 1 Zentner Lebendgewicht bis zu 5 ccm, bei Kälbern 0,5 ccm. Die Nachprüfung des Impfstoffes ist der ambulatorischen Klinik an der Tierärztlichen Hochschule in Berlin übertragen worden.

Carl.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Hofferber, O.: Individualitätsreaktionen (Isohaemagglutination, Isolysis, Heteroagglutination und Heterolysis) des normalen Pferdeblutes. (In.-Diss. Berlin 1927.)

Untersucht wurden das Serum und die roten Blutkörperchen von 50 Pferden (11 Warmblut- und 39 Kaltblutpferden). In 2121 Kombinationen von Serum und Erythrozytenaufschwemmung konnte 410mal eine Isoagglutination festgestellt werden. Das Vorkommen der Isolysis

im Pferdeblut konnte ebenfalls nachgewiesen werden. Pseudoagglutination und andere unspezifische Reaktionen wurden durch geeignete Versuchsanordnungen ausgeschlossen. In 475 Kombinationen von Pferdeerythrozyten bzw. Pferde Serum mit den roten Blutkörperchen bzw. den Seren von Mensch, Rind, Schaf, Schwein, Hund und Kaninchen konnten Heteroagglutinine und zum Teil auch Heterolysine ermittelt werden. Auf Grund der Isoagglutinationsversuche konnten beim Pferde Blutgruppen aufgestellt werden. Es wurden fünf Hauptgruppen und sechs Nebengruppen festgestellt. Bei Annahme von zwei Blutkörpereigenschaften X und Y und dementsprechend zwei Serumeigenschaften x und y erhalten die fünf Hauptgruppen folgende Formeln:

I. X y, II. X o, III. Y x, IV. Y o, V. O x y oder O z. Von den untersuchten Tieren gehörten der Gruppe I 10 Prozent, II 34 Prozent, III 6 Prozent, IV 10 Prozent, V 18 Prozent und den Nebengruppen insgesamt 22 Prozent an. Die einzelnen Gruppen sind durch Ausfall an Agglutininen bzw. Agglutininogenen nicht in sich gefestigt. Der Ausfall dürfte, wie auch Hirschfeld annimmt, auf eine Schwäche der Serum- bzw. Blutkörpereigenschaften zurückzuführen sein. Es gelingt deshalb nicht immer, mit Hilfe nur weniger Sera bzw. Erythrozyten, wie beim Menschen, irgendein Pferd in das Blutgruppenschema einzureihen. Die Einreihung gelingt nur dann mit einiger Sicherheit, wenn durch eine große Versuchsreihe der Ausfall an nach dem Schema zu erwartenden positiven Reaktionen ausgeglichen wird. Eine Abfättigung der Agglutinine x und y der Gruppe I und II gelang. Eine Trennung der Agglutinine zy der Gruppe V durch die Abfättigung gelang nicht. Abfättigungsversuche der Heteroagglutinine hatten ein positives Ergebnis.

A.

Kojtscheff, J.: Über das Gestütswesen in Bulgarien. (In.-Diss. Berlin 1925.)

Es gibt zwei Zeitabschnitte der Pferdezüchtentwicklung in Bulgarien; der erste reicht bis zur Zeit der Befreiung im Jahre 1878. Es ist nichts Genaueres darüber bekannt. Der zweite beginnt mit der Schaffung des selbständigen Staates, d. h. mit dem Ende des russisch-türkischen Krieges, der die damals vorhandene Pferdezücht vernichtet hatte, so daß ein Wiederaufbau von Grund auf nötig wurde. Die bulgarischen Pferde gehören zur Gruppe der orientalischen Rassen: Altes veredeltes Landpferd mit viel Araberblut und das veredelte Landpferd (Verwendung von Arabern, Angloarabern, englischen Warmbluthengsten und ihren Kreuzungen). Das Gesetz von 1925 zur Förderung der landwirtschaftlichen Besitztümer behandelt auch die Gestüte, deren Leiter Tierärzte oder Landwirte sind. Es sollen künftighin zur Zucht nur Verwendung finden: Araber, Angloaraber und Anglo-normannen oder Nonius. Hauptgestüte sind: Kabujuk, Klementina und Kaja Burun (Erzeugung von Landbeschälern); Landgestüte: Philippopel und Stara-Zagora. Das Kriegsministerium schuf für seine Zwecke das Gestüt „Boschuriste“, das in erster Linie Pferde für Kavallerieoffiziere erzeugt und die nichttauglichen hierzu unter die Regimenter als Remonten verteilt. Privatgestüte fehlen in Bulgarien. Die Gestüte dienen auch zur Verbesserung der übrigen Tierzucht durch die bei ihnen angeschlossenen Rinder-, Schaf- und Schweinezuchtstationen (daher der Name „staatliche Zuchtanstalten“). Die Haupt- und Landbeschäler decken im Gegensatz zu früher, da der Herdensprung allgemein üblich war, nur durch „Sprung aus der Hand“. Die Hauptbeschäler decken nur Stuten der Gestüte; die Landbeschäler nur die Stuten der Landbevölkerung (300 Deckstationen von März bis Juli). Privatbeschäler dürfen nach einer Körung fremde Stuten decken, die Genehmigung muß jedes Jahr von der Körkommission erteilt werden. (Mitglieder: beamteter Landwirt, Tierarzt und Züchter-Mitglied des Regierungsbezirksrates).

Zum Schutze gegen ansteckende Krankheiten werden vor dem Decken alle Stuten kostenlos untersucht. Die Fruchtbarkeit der Stuten betrug in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nur 40—50 Prozent, beim Sprung aus der Hand, beim Herdenprung 58—88 Prozent. Die Fruchtbarkeit der von den Landbesitzern während der Deckperiode 1910 gedeckten Stuten betrug 39,75 Prozent, die Fruchtbarkeit der Stuten in den Hauptgestüten für das Jahr 1923 betrug 47,16 Prozent. Zwillingsgeburten wurden in 10,16 Prozent beobachtet.

Schübel, K.: Zur Auswertung von Uterusmitteln. (Verhandlungen der Deutschen Pathologischen Gesellschaft, 7. Tagung, 1928, S. 115.)

Es wird eine neue Auswertungsmethode für Uterusmittel angegeben. Die Bewegungen des puerperalen Uterus der Katze können ohne operativen Eingriff, nach Füllung des Organs mit körperwarmer Ringerlösung durch Gummischlauchverbindung mit einer Mareyschen Kapfel einfach und leicht registriert werden. Da das bewegungslose Organ mit dem Gefäß-, Nerven- und Lymphsystem in Zusammenhang bleibt, erscheint es zur Auswertung ganz besonders geeignet. Allerdings steht Tiermaterial nur von Ende März bis Ende September zur Verfügung; jede Katze ist fünf Tage brauchbar, wobei täglich ein Präparat ausgewertet werden kann. Im übrigen wird die Methode als einfach und leicht durchführbar bezeichnet, sie soll wenig Zeit, keine besondere Erfahrung erfordern und mit großer Genauigkeit arbeiten.

R. Völker (Leipzig).

Laqueur, E.: Über weibliche (Sexual-) Hormone. (Verhandlungen der Deutschen Pathologischen Gesellschaft, 7. Tagung, 1928, S. 73—87.)

Es werden ausführlich die Amsterdamer Untersuchungen über das weibliche (Sexual-) Hormon *Menformon* geschildert. Das wasserlösliche Präparat zeigt Brunst-, Wachs-, Mamma-, antimaskuline und Stoffwechselwirkung, es ist völlig ungiftig und auch bei intravenöser Zufuhr ohne Wirkung auf Kreislauf und Atmung. Zur Eichung wird die sog. Brunstwirkung bei Nagern, deren Feststellung amerikanischen Untersuchungen zu verdanken ist, benutzt. Im wesentlichen werden die Veränderungen der Vagina durch Austreibung des Inhaltes festgestellt. Wachstum der weiblichen Genitale sowie Wachstum der Mamma, bei dieser Vergrößerung der sekretorischen Teile, konnten gezeigt werden. Bezüglich der antimaskulinen Wirkung konnte durch dreiwöchentliche Behandlung eine Rückbildung von Testis, Penis, Prostata, Semina vesicalia erreicht werden; die Samenkanäle wurden vollkommen leer gefunden. Der respiratorische Stoffwechsel war erhöht, vom zweiten Tag der Einspritzung ab bestand gleichmäßige Erhöhung von O_2 Aufnahme wie CO_2 Abgabe. Bezüglich der physikalisch-chemischen Eigenschaften und der Darstellungsweise müssen Einzelheiten in dem ausführlichen und bedeutungsvollen Vortrag nachgelesen werden.

R. Völker (Leipzig).

Bertil Erikson: Behandlung der Sterilität mit Ovarien des Schweines. (Svensk Vtdskr. 33e Arg. 1928, S. 127—131.)

Bei Behandlung der Unfruchtbarkeit wurden, wenn bei der Untersuchung der Ovarien und des Uterus keine Abweichungen nachgewiesen werden konnten, mit der Verabreichung der Ovarien bei Säuen und bei Kühen sehr gute Erfolge erzielt. Jene bekamen innerlich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen je 150 Gramm frische Eierstöcke geschlechtsreifer Ferkel, diesen wurden 50 ccm eines Extraktes aus solchen Ovarien am Halbe subkutan injiziert. Die Herstellung des Extraktes geschieht in folgender Weise: Die Eierstöcke frischgeschlachteter Ferkel werden herausgeschnitten und während einer Nacht im Kühlraum auf + 4 Grad C abgekühlt. Dann werden sie in einer gewöhnlichen Fleischmühle gemahlen. Die gewonnene Masse wird auf der Apothekerdrogenpresse gepreßt und der so erhaltene Extrakt mit etwas Chinosol und der Phenollösung der Phar-

makopoe veretzt. Er ist sehr trübe. Vor der Injektion wird er nur umgeschüttelt, niemals filtriert.

Auf die vorerwähnte Weise wurden 40 Säue und 38 Kühe behandelt. Bei den Säuen stellte sich am 2. bis 14. Tage nach Verabreichung der 300 Gramm Ovarien Brunst ein, nur bei einer Sau mußte nach Verlauf von 14 Tagen nochmals die doppelte Dosis in zwei Gaben an zwei aufeinanderfolgenden Tagen verabreicht werden. In diesem Fall rauchte das Tier nach acht Tagen, wurde gedeckt und trächtig. Bei den Kühen, die schon längere Zeit nicht gerindert hatten, stellte sich die Brunst innerhalb von drei Tagen bis drei Wochen nach erfolgter Injektion ein. In den beiden Fällen, in denen Verf. Stuten behandelte, blieb der Erfolg aus.

Baß.

Becker, O.: Langsam verlaufende Gebärpause beim Rind. (B. T. W. 1928, S. 249.)

Patient hat vor fünf Tagen gekalbt. Kurz nach der Geburt Lahmen hinten rechts. Nachlassen der Milch, Aufhören der Freßlust. Häufig Brummen hörbar. Verf. konnte in der Hauptsache eine starke Schwäche in der rechten Hintergliedmaße feststellen, infolge deren die Kuh beim Vorwärtsschreiten einknickte. T. 36,3, P. 60, A. 25. Wiederkäuen seit zwei Tagen aussetzend, Pansen- und Darmbewegung unterdrückt, Kot hart. Euter schlaff und kühl. Therapie: Aufpumpen des Euters. Während desselben Eintritt des Ruminierens, vollständige Wiederherstellung am nächsten Tage. Verf. hat einen derartigen durch fünf Tage sich hinziehenden Fall von Gebärpause in der Literatur nicht angeführt gefunden.

Carl.

Hartwig: Erfahrungen mit Metritis-Vakzin. (B. T. W. 1928, S. 210.)

Das von der Impfstoffgesellschaft Phava in Leipzig hergestellte polyvalente Vakzin wurde vom Verf. mit gutem Erfolge angewandt. Er empfiehlt folgende Behandlung: Zunächst Ausspülung mit schwacher Lösung von Kaliumpermanganicum, danach Abhebern und Massage des Uterus, schließlich Einspritzung des Mittels, die nach fünf Tagen wiederholt wird. Kurzer Bericht über zehn Fälle aus der Praxis. Verf. bittet um Nachprüfung seiner Beobachtungen.

Carl.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Eisler: Zur Genese und Charakteristik der Bakteriengifte. (Zschr. f. Immunitätsf. 1928, Bd. 56, S. 209.)

Aus den Versuchsergebnissen wird geschlossen, daß die Toxine unter normalen Bedingungen nicht, wie bisher angenommen wurde, als Stoffwechselprodukte von den lebenden Bakterien abgegeben werden, sondern zu ihrem Austritt eine durch irgendwelche Faktoren bedingte Veränderung der Zellmembran in der Richtung einer Permeabilitätssteigerung erforderlich ist. Eine solche tritt beim Absterben der Bakterien in sehr starkem Ausmaße ein, so daß die Zellmembran nunmehr Stoffe passieren läßt, für die sie während des Lebens undurchlässig war. Künstlich kann diese Durchlässigkeit durch die Einwirkung von Salzen auch an lebenden Bakterien hervorgerufen werden.

Als Beweis für die Ansicht des Verf., daß die Toxine aus toten Bakterien entstehen, wird unter anderem auch die Tatsache erwähnt, daß Wachstums- und Toxinkurve von Bouillonkulturen nicht parallel gehen, sondern daß vielmehr die Giftausbeute abhängig ist von der Zahl der abgestorbenen Bakterien.

Meyn.

Kritschewski u. Schwarzmann: Die Bedeutung des retikulo-endothelialen Apparates bei Infektionskrankheiten. (Zschr. f. Immunitätsf. 1928, Bd. 56, S. 322.)

Verff. fassen das Ergebnis ihrer Versuche in folgenden Sätzen zusammen:

1. Das retikulo-endotheliale System dient dem Organis-

mus bei Infektion mit *Tryp. gambiense* nicht oder nur teilweise als Schutzapparat.

2. Das retikulo-endotheliale System spielt bei Infektion mit *Schizotrypanum cruzi* keine den Organismus schützende Rolle.

3. Bei der experimentellen Infektion der Mäuse mit *Sp. morsus muris* zeigt der retikulo-endotheliale Zellkomplex auch keine Schutzfunktionen. Meyn.

Dold und Müller: Studien über das fog. Antivirus nach Besredka bei experimentellen Streptokokkeninfektionen.

(Zschr. f. Immunitätsf. 1928, Bd. 56, S. 347.)

Sterile Filtrate von genügend alten, mehrfach mit Bakterien beimpften Bouillonkulturen (sog. „Antivirus“ nach Besredka) zeigen bei erneuter Beimpfung mit den gleichen Bakterien Wachstumshemmung, die in hohem Maße spezifisch ist. Diese Wachstumshemmung ist aber schon seit längerer Zeit bekannt und befriedigend erklärt.

Es gelang nicht, Kaninchen durch Vorbehandlung mit dem homologen Antivirus gegen tödliche Streptokokkeninfektionen zu schützen. Jedoch konnten lokale Entzündungsreaktionen durch intrakutane Vorbehandlung und „Antivirus“-Verbände meist abgeschwächt werden. Dieselbe Wirkung konnte aber auch mit Bouillon, ja sogar mit gewöhnlicher physiologischer Kochsalzlösung erzielt werden. Eine gleichzeitig mit der Infektion einsetzende Behandlung mit Antivirus, Bouillon oder physiologischer NaCl verschlechterte vielfach den Zustand der Tiere. Die therapeutische Anwendung von Antivirus führte zu wechselnden Ergebnissen und vielfach zu Mißerfolgen. Die Versuche könnten für die von Besredka angenommene Existenz eines neuartigen aus Bakterien abspaltbaren und mit besonderer Affinität zu den Hautzellen begabten Antikörpers (des fog. Antivirus) keine Stütze liefern. Meyn.

Granouillit, Khoan et Thu: Contribution à l'étude clinique, anatomo-pathologique, épidémiologique de la trypanosomiasis des chevaux d'Annam. (Rev. vétérin. et Journ. de méd. vétérin. et de zootechn. 1928, Bd. 80, Jan.-Heft, S. 5—19.)

Verf. untersuchte 1927 100 anamitische Ponys und fand hierbei 23 Fälle von Trypanosomiasis. Elf kranke Pferde starben, die anderen wurden getötet. Ein künstlich infizierter Hund starb nach 12 Tagen und wies im peripheren Blute zahlreiche Trypanosomen auf. Verff. machten folgende Beobachtungen bei ihren Untersuchungen: Niemals wurden Ödeme, Hauterkrankungen oder Augenentzündungen festgestellt. Die Seuche besaß besondere Virulenz und Affinität zu den nervösen Zentren. Symptome von Bewegungslosigkeit, Paralyse der Hintergliedmaßen, die an *Mal de Caderas* erinnerten, wurden beobachtet. Widerstandsfähigkeit der kranken Tiere gewöhnlich groß, mehrere todkranke erholten sich wieder, zeigten jedoch Rückfälle mit Dyspnoe, Herzschwäche, Gliederzittern vor dem Ende. Fieber war das erste Krankheits-symptom, ohne daß bereits Trypanosomen im peripheren Blut nachweisbar waren. Appetit stets gut. Im Blute aus Ohr, inneren Lippen oder Krone der Hinterfüße fanden sich Parasiten nicht immer gleichzeitig in allen Präparaten. Beim lebenden Tier schleimigeitriges Exsudat im inneren Augenwinkel. Ein einziges Mal bei einem geschlachteten Tier ein Ödem in der Nafengegend der inneren Partie des Kopfes, gleichzeitig zahlreiche Trypanosomen im peripheren Blute. In der feuchten Jahreszeit schien die Trypanosomiasis weniger verbreitet als in der trockenen, oft Epizootien zur Zeit der größten Hitze (März, April). Rinder erkrankten gewöhnlich Ende der feuchten und Anfang der trockenen Jahreszeit. Durch Rinderpassage wurde die Virulenz der Parasiten erhöht. Hunde ließen sich ebenfalls künstlich mit *Trypanosoma anamense* infizieren. Berge.

Zuelzer: Über eine bartonella-artige Infektion der Feldmäuse. (Arbeiten aus dem Reichsges.-Amt 1928, 59. Bd., S. 475.)

Verf. fand 1917 bei Zerlegung von Versuchsmäusen im

Blute in den Erythrozyten grahamella- oder bartonella-artige Einschlüsse, wie sie ähnlich bei Carrionscher Krankheit beschrieben sind. Einschlüsse gut färbbar nach Giemsa, sie nehmen hierbei leuchtend rote Farbe an. Sie liegen in der Art von kleinen kokkoiden Stäbchen einzeln oder zu kleinen Haufen in den roten Blutkörperchen, häufig auch diplokokkenartig. Hunde ließen sich mit Blut positiver Mäuse infizieren. Berge.

Gildemeister und Herzberg: Versuche zur Frage des unzüchtbaren Typhusvirus (kryptantigenes Virus von Friedberger und Meißner). (Arb. aus d. Reichsges.-Amt 1928, 59. Bd., S. 467.)

Mit Leichenmaterial direkt infizierte Meerfchweinchen wiesen in keinem Falle den von Friedberger und Meißner beschriebenen Fiebertypus auf. Die Passagen zeigten, von gelegentlichen interkurrenten und diagnostizierten Erkrankungen abgesehen, keine Temperaturkurve im Sinne obiger Autoren. Nur einmal waren Typhusbakterien bei einem direkt mit Leichenmaterial (Milz) infizierten Tier in spärlicher Zahl vorhanden. Die verimpfte menschliche Typhusmilz war stets reichlich typhusbakterienhaltig, das menschliche Hirn stets typhusbakterienfrei. 3—8 Wochen nach der Organimpfung mit Typhusbakterien intraperitoneal gespritzte Passagemeerfchweinchen zeigten keine erhöhte Resistenz gegenüber Typhus. Normalkaninchen bildeten nach Injektion (iabd. und iv.) von Milz- oder Hirnbrei von Passagemeerfchweinchen keine Agglutinine gegen Typhus. Berge.

Kirchner, O.: Zur Frage der Differenzierungsmöglichkeit humaner und boviner Tuberkelbazillen durch Komplementablenkung. (Arb. aus dem Reichsges.-Amt 1927, 59. Bd., Heft 3, S. 553.)

Humane und bovine Tuberkelbazillen lassen sich mit der Komplementablenkungsmethode unter Verwendung von Bazillenaufschwemmungen als Antigen nicht unterscheiden; die Untersuchungen wurden an sechs Seren ausgeführt mit einer Reihe verschiedener Antigene. Auch bei Anwendung fallender Antigene sowie fallender Serummengen ließen sich keinerlei Unterschiede erkennen. Berge.

Tschernowitzer, M. und Karut, T. A.: Zur Frage der Filtrierbarkeit der Tuberkelbazillen. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 107, 1928, S. 189.)

42 Serienversuche an 104 Meerfchweinchen. Benutztes Material: Sputa mit zahlreichen Bazillen, Tuberkelkulturen (8 Typ. human., 5 Typ. bovin.) und Eiter von kranken Menschen und Tieren. Ergebnisse:

1. Chamberlandsche Filter von bestimmter Porosität, die einer gewöhnlichen biologischen Kontrolle standhalten, können offenbar das Tuberkulosevirus passieren lassen.
2. Die Filtrierbarkeit des Tuberkuloseerregers durch die Chamberlandschen Kerzen ist eine nicht gesetzmäßige und äußerst seltene Erscheinung.
3. Die Filtrate können bei Meerfchweinchen spezifische Veränderungen in den Bronchialdrüsen mit Tuberkelbazillen daselbst hervorrufen, ohne daß in den Organen sichtbare Erkrankungen zu erkennen wären; in der Milz sind Riefenzellen zu konstatieren.
4. Die Filtrierbarkeit der Tuberkelbazillen als besonderer Fall der Filtrierbarkeit der Bakterien und als eine nicht gesetzmäßige Erscheinung kann ihre Erklärung finden nicht so sehr im Vorhandensein eines „filtrierbaren Tuberkulosevirus“, als vielmehr darin, daß einzelne Teilstücke, die Biogene der Tuberkelbazillen darstellen, die Kerzen passieren. Carl.

Nahrungsmittelhygiene.

Burke, V. and Rodier, E. A.: Excretion of antiseptic dyes through the mammary gland. (Journal of infect. diseases 1927, Bd. 40, S. 672.)

Nach intravenöser Injektion von Gentianaviolett, Merckurochrom und Acriflavin konnte nur das letztere in der

Milch nachgewiesen werden. Ein Einfluß auf die Bakterienflora der Milch wurde nicht festgestellt. Schoop.

Keiser: Die Zucht und Haltung von Schlachttieren in ihren Beziehungen zu den Verschiebungen des Vieh- und Fleischmarktes. (Tierzüchterische Zeitfragen. Verlag M. & H. Schaper, Hannover, 1927.)

Die Produktion und der Konsum von pflanzlichen Fetten steigt, was nicht ohne Auswirkung auf die Produktion der tierischen Fette bleiben kann. Durch Vermehrung des Milchviehes in überfeyischen Gebieten wird außer Fleisch auch überfeyische Butter auf dem deutschen Markte stärker erscheinen. Eine große Konkurrenz für die Produkte der deutschen Viehhaltung ist von dem gesamten Osten zu erwarten, wo noch eine starke Entwicklung der Viehhaltung möglich ist. Da 65—70 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche der Tierhaltung dienen, ist leicht zu erkennen, wie sehr die Einfuhr tierischer Produkte die gesamte Rentabilität der Landwirtschaft drücken muß. Nach einer Besprechung von Stand und Entwicklung der Tierhaltung, Klarstellung der Marktverhältnisse werden die Konsequenzen erörtert, die sich daraus für die Zucht und Haltung der Tiere ergeben. Arcularius.

Geflügelkrankheiten.

Beller, K.: Das Auftreten und die Bedeutung der Kükenruhr in Deutschland, nebst Vorschlägen zu ihrer Bekämpfung. (Aus der Veterinärabteilung des Reichsgesundheitsamtes.) (B. T. W. 1928, S. 33.)

Das Deutsche Reich vermag nur knapp zwei Drittel seines Bedarfs an Eiern zu erzeugen und ist daher in erheblichem Maße auf die Einfuhr angewiesen. In wichtiger Erkenntnis dieser Sachlage wurden in Deutschland an vielen Orten zum Teil mit staatlicher Unterstützung Lehr- und Versuchsanstalten und außerdem von privater Seite Geflügel-farmen ins Leben gerufen, welche letztere sich hauptsächlich mit der Produktion und dem Verkauf von Bruteiern und Eintagsküken beschäftigen. Diesen großen Geflügelbeständen droht nun neuerdings eine große Gefahr seitens der zuerst von Rettger näher erforschten Kükenruhr, die durch das von ihm so benannte Bacterium pullorum hervorgerufen wird. Es wurde festgestellt, daß dieser Krankheitskeim auch in die Eier übergeht, und daß die daraus hervorgehenden Jungen entweder im Ei zugrunde gehen oder nach dem Schlüpfen an Ruhr erkranken und die Krankheit weiter übertragen. Bei letzterer beträgt die Sterblichkeitsziffer bis zu 100 Prozent. Küken, die die Krankheit überstehen, können Bazillenträger bleiben und zu infizierten Hühnern heranwachsen. Der Nachweis einer vorausgegangenen Infektion läßt sich nach den Untersuchungen von Jones und Rettger durch ein serologisches Verfahren mit Sicherheit liefern, wovon im Auslande, namentlich in der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, in Holland und Belgien in zahlreichen Fällen Gebrauch gemacht wurde. Bedauerlicherweise ist die Seuche nun auch schon nach Norddeutschland in Geflügel-farmen eingeschleppt worden, wie aus den Veröffentlichungen von Beck und Ruth Eber, von Nußhag und von Mießner hervorgeht. Es ist daher dringend erforderlich, durch Reinigung der Zuchtbestände die Erzeugung eines gefunden Nachwuchses zu gewährleisten und der Seuchenverbreitung durch infizierte Bruteier und Eintagsküken vorzubeugen. Dies ist nach dem Gesagten möglich durch die Untersuchung des Blutes der Elterntiere. Der mit der Kontrolle beauftragte Tierarzt entnimmt zu diesem Zwecke aus der Flügelvene fäktlicher Hühner und Hähne des betreffenden Bestandes 1—2 ccm Blut behufs Einsendung an ein Institut zur serologischen Untersuchung. Diese Manipulation ist sehr einfach und geschieht dadurch, daß man mit der Spitze eines kleinen Skalpells die über dem Ellbogengelenk unmittelbar unter der Haut liegende Vena cutanea ulnaris anritzt. Geeignete Blutröhrchen (27 in

einem Kasten) werden von der Firma Hauptner angefertigt. Eine Durchführung dieser Kontrolle auf Anordnung der Behörde wäre zweifellos sehr vorteilhaft. Carl.

Bass: Die Impfung gegen die Geflügeldiphtherie und die Geflügelpocken mit Antidiphtherin. (T. R. 1927, S. 875.)

Verf. berichtet zunächst zahlenmäßig über die guten Erfolge der Impfung, vornehmlich in Holland und Belgien. Das in Pulverform gelieferte Antidiphtherin muß kalt aufbewahrt und innerhalb zwei Tagen in Glycerin gelöst verbraucht werden. 1 ccm reicht für 15 Hühner. Drei beigegebene Abbildungen zeigen die Ausführung der Impfung, das Impfinstrument Trephine und die Reaktion an der Impfstelle (Unterschenkel), die sich im Auftreten von Pocken nach 6—8 Tagen äußert. Am besten wirkt die Schutzimpfung bei Hühnern von 3—4 Monaten, wenn sie vom Juni bis August vorgenommen wird, da dann z. Zt. der meisten Erkrankungen vom Oktober bis Dezember ein kräftiger aktiver Schutz besteht. Schwierig ist die Differentialdiagnose gegenüber Coryca contagiosa. Für diese sprechen: Nasenausfluß, Röcheln, für Diphtherie die gelben Membranen im Schnabel und in der Rachenhöhle oder die Pocken auf Kamm, Kehllappen oder Haut. Geiger.

Wortmann, H.: Versuche über die Wirkung des Antidiphtherins gegenüber künstlicher und spontaner Infektion mit Hühnerdiphtherievirus. (In.-Diss. Leipzig 1928.)

Bei den Versuchen gelangte ausschließlich flüssiges Antidiphtherin von Schreiber-Landsberg zur Anwendung und zwar das frischeste. Die Impftechnik wurde genau innegehalten, aber an zwei Körperstellen geimpft (Kamm, Schenkel). Es zeigte sich, daß das Antidiphtherin weder bei der kutanen noch bei der intravenösen Impfung einen ausreichenden Schutz gewährt hat, um Hühner gegenüber einer spontanen Infektion mit Diphtherie ausreichend zu schützen. Das Antidiphtherin hat also im Experiment die Bedingungen nicht erfüllt, die es in der Praxis in ausreichendem Maße erfüllen sollte. Es hat sich im letzten Versuche auch noch gezeigt, daß eine klinisch abgeheilte Diphtherie erneut zum Aufflammen und zu noch schwererem Verlauf wie beim ersten Versuch gebracht werden kann, wenn das Huhn mit Antidiphtherin behandelt wird. Das entspricht auch den Erfahrungen der Praxis. Dieser 100prozentige Erfolg des Angehens der Diphtherieinfektion nach vorausgegangener Antidiphtherinimpfung steht mit einer Reihe von Beobachtungen aus der Praxis im Widerspruch, wo angeblich ausgezeichnete Erfolge bei der Behandlung mit Antidiphtherin beobachtet worden sind. Verf. kann seine Versuche demnach nur so deuten, daß es zweifellos Virusarten geben muß, die durch die Antidiphtherinimpfung sich gar nicht beeinflussen lassen, so daß diese Impfung mit Antidiphtherin keinesfalls dazu angetan ist, irgendeine ausreichende Wirkung gegenüber der Diphtherieinfektion auszuüben, mithin dann nichts anderes darstellt als einen unpezifischen Hautreiz. In dieser Auffassung bestärkt die Tatsache, daß gegen dieses Virus, das Verf. verwandt hat, auch in der Praxis die Antidiphtherinimpfung der noch gefundenen Hühner vollkommen verfaßt hat. A.

Fitch, C. P. und R. E. Lubbehn: The Agglutination Test as applied in the Control of bacillary white diarrhea. (Die Agglutinationsprobe angewendet bei der Kontrolle der bazillären weißen Ruhr der Küken.) (Minnesotas Universität, St. Paul.) (The Cornell Veterinarian Volume XVIII Nr. 1, S. 19—27.)

Auf den Wert der Agglutinationsprobe für die Diagnose der weißen Ruhr machte zuerst im Jahre 1910 Jones aufmerksam. Hitchner wies 1923 daraufhin, daß bei sehr guten Legern durch den hohen Fettgehalt des Blutes die genaue Deutung der makroskopischen Agglutinationsergebnisse oft erschwert wird, daß dadurch, daß die Hühner die letzten 36 Stunden vor dem Aderlaß hungern, klare Sera und ausgezeichnete Ergebnisse erzielt werden und daß infolge des

Hungerns der Ertrag an Eiern erheblich zurückgeht und sich erst nach vier Tagen langsam wieder hebt. 1926 berichtete Rebrassier, daß die sogenannten cloudy reactions (trüben, wolkigen Reaktionen) ausgeschaltet werden können, wenn bei der Herstellung des Antigens der Zusatz von Phenol vermieden wird. Einige Zeit darauf, ebenfalls 1926, machte Matthews darauf aufmerksam, daß der Niederschlag in den sogenannten cloudy reactions nicht vom Fett, sondern hauptsächlich von Protein gebildet wird, daß erst durch 48stündiges Hungern die cloudy reactions erheblich zurückgehen und daß ein Zusatz von 2 ccm einer 2prozent. Natronhydratlösung zu 100 ccm Antigen die Agglutinabilität nicht beeinflusst und 95 Prozent der „cloudy tests“ (der trüben Proben) ausschaltet. Die Verff. konnten die Beobachtungen Matthews hinsichtlich des Eiweißgehaltes des Niederschlages, nicht aber hinsichtlich der Wirkung des Zusatzes von Natriumhydroxyd bestätigen und stellten fest, daß das Eiweiß von Globulinen herrührte, daß die Änderung von pH nur in einigen Fällen im Serum mit schwachen Agglutinationseigenschaften die Ergebnisse beeinflusste, daß aber die Störung dadurch veranlaßt wird, daß Bakterien in den Röhren, die bebrütet wurden, sich entwickeln. Wie die mikroskopische Untersuchung von Ausstrichpräparaten aus solchen Röhren ergab, sind es stäbchenförmige Organismen, die in langen Ketten auftreten und zu der Myconesgruppe gehören. Diese unbefriedigenden Proben treten reichlich auf, wenn das Serum nicht frisch war oder nicht richtig gewonnen wurde. Es muß also frisch und nahezu steril sein. Ein Zusatz von Acid. boric. zu den Röhren, wie Baker empfohlen hat, leistet gute Dienste. Die Verff. verwenden jetzt ein Antigen, das aus Agarährkulturen von *Salmonella pullorum* frisch hergestellt wird. Diese Kulturen werden mit Salzlösung (0,85 Prozent) gewaschen, tüchtig geschüttelt und durch Watte filtriert. Das Antigen wird nicht erhitzt und mit physiologischer Kochsalzlösung verdünnt, bis es eine Dichtigkeit von ungefähr 0,75 der Röhreneinheit des Mc Farlands Nephelometers besitzt. Hinzugefetzt wird 0,25 Prozent Acid. carbolic. crystallisat. Nachdem die Verdünnung (1 : 50, 1 : 100) gemacht worden sind, werden die Röhren bei 37 Grad C 48 Stunden in den Brutschrank gesetzt und die Proben abgelesen. Dadurch wird die Zahl der ungenügenden Proben bis auf ein Minimum verringert.

In den verschiedenen Laboratorien wechselt die Technik der Probe. Selbstverständlich muß der Unterschied in der Menge des benutzten Serums, im spezifischen Gewicht und der Natur des Antigens, Länge der Zeit und Temperatur des Einstellens in den Brutschrank zu einer irrigen Beurteilung der Reaktionen führen. Die Verff. haben nun 1925 die Agglutinationsprobe bei einer Gruppe von annähernd 400 Hühnern angewendet. 16 davon reagierten und wurden isoliert. In Zwischenräumen wurden diese geprüft, um andere Reagierende in der nicht infizierten Gruppe und die unveränderliche Fortdauer der Reaktion bei den positiven Hühnern zu bestimmen. Diese Einzelwesen wurden ein Jahr beobachtet, schließlich getötet, sezziert, und Juli und August 1926 wurden Kulturen angelegt. Dabei wurde der hohe Wert der Agglutinationsprobe für die Kontrolle der weißen Kükenruhr erkannt. Nur zwei Hühner gaben eine positive und verdächtige Reaktion, 70,6 Prozent der reagierenden Hühner zeigten eine Infektion mit *Salmonella pullorum*. Die Verff. beobachteten weiter, daß die Reaktion der einzelnen Hühner stark schwankt, weil Agglutinine fehlen, und daß aus diesem Grunde wiederholte Proben angestellt werden müssen. Außerdem besteht eine Kreuzungsagglutinabilität der *Salmonella pullorum* und bestimmter Glieder der Colityphoidgruppe. Der Prozentsatz Hühner mit sogenannten nicht spezifischen Agglutininen ist nicht gering. Daher wurden im Jahre 1926 92 Hühner, die aus verschiedenen Quellen stammten und geprüft wurden, nach der Entnahme des Blutes und nach dem Schlachten genau sezziert, und dann wurden aus der Leber und den

Ovarien Kulturen angelegt, um die Anwesenheit von *Salmonella pullorum* festzustellen. Dabei ergab sich, daß die Anwendung der Agglutination weiter studiert und daß eine gleichförmige Technik auf genau durch Versuche kontrolliertem Studium angewendet werden muß. Denn die in drei Laboratorien erhaltenen Reaktionen stimmten nur in 44 Prozent der geprüften Sera überein. Wie sich ergab, tritt der größere Teil der Widersprüche in den negativen und verdächtigen Zonen auf und wird dadurch veranlaßt, daß unbedeutende Klumpenbildung oder partielle Agglutination in einer oder in mehreren Verdünnungen von manchen für eine positive Reaktion gehalten, von anderen nicht dafür angesehen werden. Ferner lassen sich nicht alle reagierenden Hühner durch eine einzige Probe entdecken. Es muß also, ohne Rücksicht ob neue Hühner in die Herde eingeführt worden sind oder nicht, wiederholt geprüft werden. Außerdem gibt es „falsche“ positive und negative Ergebnisse, d. h. solche, die bakteriologisch nicht gestützt werden. Darunter befinden sich auch einige Hühner, die gleichmäßig stark positiv sind und nicht die Gegenwart des Mikroorganismus sehen lassen. Ob diese Reaktion durch eine frühere oder eine unentdeckte augenblickliche Infektion verursacht ist, ist noch nicht entschieden. Es muß daher die Agglutinationsprobe genau sondiert werden, bevor sie amtlich für die Kontrolle der bazillären weißen Kükenruhr angenommen wird.

B a B.

Rohonyi, Nikolaus: Über die weiße Ruhr des Geflügels. (Aus dem Laboratorium der Hungaria Serumwerke in Budapest.) (T. R. 1928, S. 163.)

Verf. konnte in einem Bestande das für Ungarn seltene Auftreten der weißen Ruhr des Geflügels beobachten. Bakteriologisch wurde ein kurzes gramnegatives unbewegliches Stäbchen ermittelt, das auf Grund seiner biologischen Eigenschaften als *Bac. pullorum* anzusehen ist. Der Nachweis im Bestande geschah durch die Intradermalprobe und die agglutinatorische Blutuntersuchung, wobei die letztere bei einer größeren Anzahl von Tieren auf eine Infektion hinwies als die Intradermalprobe. Durch die bei der Intradermalprobe eingeführten Bakterienproteine wurde der Agglutinationsgehalt des Blutes auch noch nach einem Monat nicht beeinflusst. Es konnte aber festgestellt werden, daß der Agglutinationstiter der kranken Tiere während der Genesung sinkt.

K. H. Meyer.

David: Wichtige parasitäre Krankheiten des Geflügels. (Aus dem Institut für Tierhygiene der Preuß. Landwirtschaftlichen Versuchs- und Forschungsanstalten in Landsberg a. d. Warthe. — Direktor: Prof. Dr. Knuth.) (T. R. 1928, S. 335.)

Verf. gibt eine kurze Beschreibung der für die Geflügelzucht wichtigsten Entoparasiten, der Übertragungsmöglichkeiten, klinischen Erscheinungen, Prophylaxis und Behandlung.

K. H. Meyer.

Reinhardt: Unfruchtbarkeit und Aufzuchtkrankheiten beim Geflügel. (T. R. 1928, S. 351.)

Der Veröffentlichung liegt ein Vortrag zugrunde, der beim Fortbildungskursus des Tierärztlichen Vereins der Neu- und Grenzmark über Geflügelkrankheiten in Landsberg und des Landestierseuchenamts in Rostock gehalten wurde. Der Inhalt der Arbeit ist so umfangreich und heute von derartiger Wichtigkeit, daß er in Form eines kurzen Referates nicht erfaßt werden kann, sondern auf die Arbeit selber verwiesen werden muß.

K. H. Meyer.

Baumann: Beitrag zur aktiven Immunisierung gegen Pocken und Diphtherie der Hühner. (Aus der Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung in Mödling bei Wien. — Direktor: Dr. F. Gerlach.) (Arch. für wiss. Tierheilkunde 1928, 57, S. 299.)

Verf. wandte das holländische Antidiphtherin in vier größeren, bereits infizierten Hühnerbeständen an und konnte damit die Seuche wirksam eindämmen. Erkrankungen traten in den folgenden drei Wochen nur bei den Hühnern auf, die z. Zt. der Impfung schon im Stadium der Inku-

bation waren. Eine therapeutische Wirkung kommt dem Antidiphtherin naturgemäß nicht zu. Der Ausfall verschiedener Übertragungsversuche bestimmte Verf. zu der Annahme, daß das Antidiphtherin Taubenvirus darstellt. Da es ihm weiterhin gelang, mit Taubenpockenvirus bei Hühnern Immunität gegen Diphtherie und Pocken zu erzeugen, wird in Mödling nunmehr auch eine Lymphe zur Schutz- und Notimpfung von Hühnern hergestellt, die sich bereits gut bewährt hat. Geiger.

Baumann: Desinfektionsversuche bei Geflügelpest mit Sulfoliquid D.S. (Aus der Bundesanstalt f. Tierseuchenbekämpfung in Mödling bei Wien. — Direktor: Dr. F. Gerlach.) (Arch. für wissenschaftliche Tierheilkunde 1928, 57, S. 110.)

Geflügelpestvirus, in Form von filtriertem Leberbrei in der gleichen Menge 50prozentigen Glyzerins aufgenommen, wurde von 5prozentiger Sulfoliquidlösung (einfache Menge) sofort abgetötet. In Leberbrei enthaltenes Virus wurde durch (die doppelte Menge) 5prozentiges Sulfoliquid nach 1½ Minuten zerstört. Für Geflügelpest scheint also Sulfoliquid ebenfalls ein gutes Desinfektionsmittel zu sein. Geiger.

Bushnell, L. D. and Hudson, C. B.: Preparation of Salmonella pullorum antigens for complement fixation tests.

Dieselben: Complement fixation and agglutination tests for Salmonella pullorum infection. (Journal of infect. diseases 1927, Bd. 41, S. 383 und 388.)

Verff. beschreiben eine Methode zur Gewinnung von Antigen zum Komplementbindungsverfahren. Sie halten diese Probe der Agglutination für gleichwertig und glauben durch Kombination beider fragliche Resultate der Blutuntersuchung herabdrücken zu können. Schoop.

Verschiedene Mitteilungen.

Selbstdispensieren.

Von Eugen Baß, Görlitz.

Der Minister für Landwirtschaft hat bestimmt, daß in den tierärztlichen Liquidationen die Beträge für die abgegebenen Arzneien getrennt von denjenigen für die tierärztlichen Bemühungen aufzuführen sind und hat empfohlen, sie unter der Arzneitaxe zu berechnen.

Als ich vor einigen 40 Jahren die Kreistierarztstelle Steinau a. d. Oder übernahm, hatte ich dort anfangs einen schweren Stand. Mein Vorgänger Kampmann hatte nicht selbst dispensiert, sondern alles aus der Steinauer Apotheke, mit deren damaligem Besitzer Hofschilde befremdet war, verschrieben. Nun kam ich hin und verschrieb alles selbst. Das paßte natürlich dem Apotheker nicht, und auch einzelne Besitzer waren damit nicht einverstanden, vielleicht weil sie kein Rezept in die Hand bekamen und es beliebig neu anfertigen lassen konnten, vielleicht auch auf Anregung des Apothekers. Allerdings half es ihnen nichts, denn wollten sie ihre Tiere von mir behandelt haben, so mußten sie sich eben fügen. Nach etlichen Jahren verkaufte der Apotheker Hofschilde seine Apotheke an einen Apotheker Kämpf, den bekannten Vorkämpfer für die Verstaatlichung der Apotheken. Kämpf machte mir seinen Besuch, und ich erklärte mich bereit, von ihm sämtliche Arzneien zu beziehen und ihm 25 Prozent über die Drogenliste von Gehe bzw. Merck zu bezahlen. Dies lehnte er ab. Ich bezog also meine Arzneien weiter von meinem bisherigen Lieferanten. Es dauerte nicht lange, da denunzierte mich Kämpf eines Tages bei der Regierung in Breslau, weil ich direkte Gifte abgegeben hätte. Der damalige Kreisphysikus Dr. Schmidt erhielt von der Regierung den Auftrag, meine Hausapotheke zu revidieren. Das geschah auch bald. Dabei fand er Ungt. Hydragyr. bijodat., Ungt. Hydrag. praecipitat. alb., Physostigm. und einige andere Gifte, die für den äußerlichen Gebrauch bestimmt waren. Die Regierung gab mir nun auf, diese Arzneien aus meiner Hausapotheke zu entfernen. Dies geschah natürlich auch. Ich verschrieb mir nun größere Mengen der genannten Salben aus Breslauer Apotheken. Meine Liquidationen lauteten aber von dieser Zeit nicht mehr „für tierärztliche Bemühungen sowie für gelieferte Arzneien“, sondern „für tierärztliche Bemühungen sowie für gelieferte Arzneien nach Abzug von 30 bzw. 40 Proz. Rabatt“. Damit machte ich Eindruck auf

die Besitzer. Sie kannten ja alle die teuren Apothekerpreise, und es wurde ihnen klar, welchen Vorteil sie dadurch hatten, daß ich die Arzneien selbst abgab. Kein Besitzer hatte jetzt dagegen etwas einzuwenden. Auch für mich war es vorteilhaft. Ich hatte nicht nur pekuniären Nutzen, sondern konnte auch manches neue Arzneimittel, das sonst zu teuer war, anwenden. Ich konnte eben dann anstatt der von mir sonst gewährten 30 Prozent 40 oder sogar 50 Prozent Rabatt gewähren und hatte immer noch einen entsprechenden Verdienst. Deswegen rate ich meinen Kollegen in der Praxis, es ebenso zu machen, würde aber empfehlen, nicht zu schreiben, 50 und 50 Prozent unter der Arzneitaxe, sondern von den in den Apotheken nach der Arzneitaxe zu zahlenden Preisen. Für uns Tierärzte ist es eine Kleinigkeit, für die Apotheker aber nicht. Denn die Besitzer werden dadurch über den hohen Verdienst der Apotheker etwas aufgeklärt und werden sich nicht wie in Schleswig-Holstein von ihnen gegen uns aufhetzen lassen.

Auszeichnung eines Tierarztes.

Für seine hervorragende Tätigkeit auf dem Gebiete der Tierzucht wurde dem Kreisveterinärarzt in Darmstadt, Oberveterinärarzt Nuss, von der Hessischen Landwirtschaftskammer die „Goldene Dettweiler Medaille“ verliehen.

Festabend der tierärztlichen Abteilungen anlässlich der 90. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg.*)

Der Tierärztliche Hauptverein von Hamburg und Umgegend veranstaltet am Donnerstag, den 20. September d. Js., 20 Uhr, in den Räumen des Hotel Atlantic an der Außenalster in Hamburg zu Ehren der auswärtigen Teilnehmer einen Festabend mit Damen, zu welchem bereits zahlreiche Anmeldungen von nah und fern eingegangen sind. Preis des trockenen Gedecks RM. 6.—, Gesellschaftsanzug oder dunkler Reifeanzug erwünscht. Weitere Anmeldungen möglichst umgehend an den Vorsitzenden des Tierärztlichen Hauptvereins Obertierarzt Dr. Stödter, Hamburg 30, Abendrothsweg Nr. 21 erbeten.

Wegen Unterkunft wende man sich rechtzeitig an den „Fremdenverkehrsverein Hamburg e. V.“ in Hamburg 36, Neuer Jungfernstieg 1, unter gleichzeitiger Anzahlung eines Betrages von RM. 5.— pro Bett auf Postcheckkonto Fremdenverkehrsverein Hamburg 383 68. Der Betrag wird im Quartier voll angerechnet.

Die Hamburger Einführenden

der Abteilung 34: Dr. Mayer, Landestierarzt,
der Abteilung 35: Dr. Stödter, Obertierarzt.

Tierärzteverein Unterwerfer.

Seitens des Tierärztlichen Hauptvereins von Hamburg und Umg. ist uns eine Einladung zu dem anlässlich des Naturforscher- und Ärztesages am Donnerstag, den 20. September d. Js., 20 Uhr, im Hotel „Atlantic“, an der Alster 72—79, stattfindenden Festabend mit Damen zugegangen. Da aus dem In- und Auslande zahlreiche Vertreter unseres Standes erwartet werden, wird um eine recht gute Beteiligung gebeten. Bremerhaven, den 18. August 1928.

Dr. Leyer, Schriftführer.

Bücherbesprechungen.

Teichert, K.: **Jahrbuch der Milchwirtschaft.** III. Band. 220 S. Hannover 1928. Verlag M. & H. Schaper. Preis brosch. Mk. 14.—.

Der dritte Band des Jahrbuches der Milchwirtschaft schließt sich in seinem Inhalt den beiden vorhergehenden Bänden würdig an. Es werden die neuesten Erfahrungen auf dem Gebiete der Gewinnung, Verarbeitung und Verwertung der Milch bekannt gegeben. Wie in den früheren Bänden, so finden auch hier in erster Linie Arbeiten Berücksichtigung, die wirtschaftliche und technische Fragen behandeln. Wertvolle wissenschaftliche Beiträge wurden geliefert von A. Anton: „Die Entwicklung der Niederländischen Goudakäseerei“, H. Kalt: „Die Wärmewirtschaft in Molkereibetrieben“ und O. Trüdinger: „Die Preisbewegung, sowie die Gestaltung der Ein- und Ausfuhr von Milch und Milcherzeugnissen seit 1924“. Hierauf folgen im zweiten Abschnitt des Jahrbuches Auszüge und Hinweise von K. Kiesel: „Die Aufzucht des Milchviehs im Schriftwesen der Jahre 1924 bis 1926“, F. Dittborn: „Die Bakteriologie der Milch und Milcherzeugnisse im Schrift-

*) Programm siehe D. T. W. 1928, Nr. 31, S. 537.

wesen der Jahre 1925 und 1926“, W. Meysahn: „Physik der Milch“, „Chemie der Milch“, „Physik der Butter“, „Chemie der Butter“, „Chemie der Käse“, R. Kotterer: „Untersuchungsverfahren für Milch und Milcherzeugnisse im Schriftwesen der Jahre 1925 bis 1927“, H. Kalt: „Neuere milchwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Verzeichnis der Verfasser, Forscher und Erfinder“.

Die von tiefer Sachkenntnis zeugenden Abhandlungen werden für jeden Tierarzt, der sich auf dem Gebiete der Milchwirtschaft betätigt, viele wertvolle Anregungen bieten. Lund.

Carl Hagenbeck und sein Werk von Dr. Alexander Sokolowsky, ehemals wissenschaftlicher Assistent des Herrn Carl Hagenbeck im Tierpark Stellingen. Leipzig 1928. Verlag E. Haberland.

Sokolowsky, der langjährige Mitarbeiter von Carl Hagenbeck, zeichnet hier die Persönlichkeit seines Chefs und bietet einen Überblick über das Entstehen und Werden des Stellingener Tierparks. Die Bedeutung des Buches liegt nicht nur in der Beschreibung des Hagenbeck'schen Werkes, sondern in der Betonung der psychologischen und biologischen Momente, die die Gestaltung des Tierparks bedingten. In den Kapiteln „Hagenbeck als Erzieher“ und „der Einfluß Hagenbecks auf Tier- und Völkerbiologie“ lassen so recht den Wert von Hagenbecks Lebenswerk erkennen. Daneben bietet der Verfasser reizende Schilderungen aus dem Leben der verschiedensten exotischen Tiere, wie sie nur ein scharfer Beobachter und Tierfreund, der sich viel mit seinen Lieblingen beschäftigt hat, schreiben kann. Das mit zahlreichen, guten Abbildungen versehene und vom Verlage im schönen Gewand herausgebrachte Buch wird jeden Leser erfreuen. Wetzel.

Justizrat Dr. Hans Stölzle, Rechtsanwalt in Kempten, **Gerichtliche Entscheidungen über den Viehkauf**. II. Folge. Stuttgart 1928. Verlag W. Kohlhammer. Preis 15,— RM.

Das vorliegende Buch, das der Verf. in feinsinniger Weise dem Mitarbeiter bei seinem bekannten Buche „Viehkauf“, dem Geheimrat Fröhner, gewidmet hat, stellt die seit 1910 ergangenen gerichtlichen Entscheidungen über den Viehkauf in übersichtlicher Form zusammen. Für den tierärztlichen Sachverständigen sind besonders die Kapitel über Mangelanzeige, arglistiges Verheimlichen, Haftung des Verkäufers wie des Käufers, Verjährung, Nebenmängel und Zusicherung beachtlich.

Diese II. Folge der gerichtlichen Entscheidungen — deren kritische Würdigung seitens des Verf. besonders wertvoll ist — wird gleich der ersten wesentlich zur Förderung der Rechtseinheit auf dem Gebiete des Viehwirtschaftsrechtes beitragen und verdient die größte Beachtung in juristischen wie tierärztlichen Kreisen. Oppermann.

E. Korschelt und H. Stock: „**Geheilte Knochenbrüche bei wildlebenden und in Gefangenschaft gehaltenen Tieren**.“ Verlag von Gebroder Bornträger, Berlin 1928, 176 Seiten, 185 Textabbildungen. Preis gebunden 26,50 Mk.

Verff. haben an etwa 220 untersuchten Tieren und zwar an Säugtieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien interessante Untersuchungen darüber angestellt, wie sich der Spontanverlauf von Knochenbrüchen bei wildlebenden Tieren gestaltet. Vor allem richteten Verff. ihr Augenmerk auf die Folgen der Frakturen für die Gebrauchsfähigkeit der betr. Skeletteile vor und nach der Heilung. Verff. kamen dabei zu dem Schluß, daß in den überwiegend meisten Fällen eine Spontanheilung des Bruches bei wildlebenden Tieren in dem Sinne zustande kommt, daß die Gebrauchsfähigkeit des Extremitätenteiles (Flügel, Gliedmaße) wiederhergestellt wird. Das bei den Untersuchungen verwendete Material ist außerordentlich reichhaltig und vielseitig. Die Abbildungen, die neben Röntgenaufnahmen zum größten Teil Lichtbilder von Präparaten darstellen, sind außerordentlich instruktiv. Die Arbeit hat nicht nur für Jäger Bedeutung, sondern auch für Tierärzte, welche chirurgisch und biologisch interessiert sind. Dem Verlag gebührt Dank für die schöne Ausstattung des Buches. Henkels, Hannover.

A. Lungwitz: „**Der Lehrmeister im Hufbeschlag, ein Leitfaden für die Praxis und die Prüfung**.“ Neubearbeitet von Dr. med. vet. und Dr. phil. A. Fischer. 21. Auflage. Verlag von M. & H. Schaper, Hannover, 1928. Mit 228 Abbildungen. Preis gebunden 6,50 Mk.

Der altbekannte Lehrmeister im Hufbeschlag ist in der 21. Auflage neu erschienen. Dieses Büchlein hat sich so bewährt, daß über seinen theoretischen und praktischen Wert an dieser Stelle nichts mehr gesagt

zu werden braucht. Wichtige Ergänzungen hat der Anhang in Bezug auf gesetzliche Bestimmungen der einzelnen Länderregierungen erhalten. Die vom Reichsrat endgültig geforderten Mindestbelange über Ausbildung und Prüfung von Hufschmieden hat die verschiedenen Länderregierungen veranlaßt, vom 1. April 1927 entsprechende Neuausführungen zu geben. Sie werden in dieser Auflage im Anhang restlos berücksichtigt. So hat das Buch, welches durch seine knappe, logisch gefaßte, klare Gliederung des Stoffes immer wieder auffällt, neue Vorzüge erhalten. Henkels, Hannover.

Parasitologie. Ismail Hakki, Professor für Parasitologie an der Medizinischen Fakultät der Universität und der Tierärztlichen Hochschule Konstantinopel. 1. Band. Konstantinopel 1928. Devlet Matbaası.

Ismail Hakki, Professor für Parasitologie an der Universität Konstantinopel, hat es unternommen, ein großes türkisches Werk über die menschlichen Parasiten und die durch sie hervorgerufenen Krankheiten zu schreiben, dessen erster 772 Seiten umfassender Band jetzt vorliegt. Nach einem einleitenden Kapitel über die Geschichte der Parasitologie und ihre medizinische und volkswirtschaftliche Bedeutung werden die einzelnen Schmarotzer abgehandelt. Die Darstellung beginnt mit den Protozoen, die der Autor in Spirochäten, Rhizopoden, Sporozoen, Flagellaten und Ziliaten einteilt. Die für die Türkei so wichtige Malaria hat eine besonders eingehende Berücksichtigung erfahren. Ihr Vorkommen in den einzelnen Gegenden des Landes sowie das Vorkommen der verschiedenen Mückenarten sind übersichtlich auf einer großen Karte eingetragen. Anschließend an die Protozoen werden die Trematoden und Zestoden abgehandelt. Der Verf. beschränkt sich nicht nur auf die Morphologie und Biologie der Parasiten, sondern berücksichtigt auch die Pathogenese, Klinik, Diagnose und Therapie der von ihnen hervorgerufenen Krankheiten. Die Darstellung wird durch 389 Abbildungen im Text und drei farbige Tafeln ergänzt. Wetzel.

Disertationen der Vet.-med. Fakultät der Universität Leipzig.

Friedrich Fetzner: „Beitrag zur spezifischen Prophylaxe und Therapie der Metritiden bei unseren Haustieren mit besonderer Berücksichtigung des Rindes.“ — Heinz Röhrer: „Untersuchungen über die Schrumpfnier des Hundes unter besonderer Berücksichtigung des Vorkommens und der Bedeutung der Gefäßveränderungen.“ — Heinrich Baumgärtner: „Zur Kenntnis der knotigen Hyperplasien im Pankreas alter Hunde.“ — Lasse Arvi Schroeder: „Bestimmung des Cholesteringehaltes des Blutes bei gefunden und kranken Pferden, Hunden und Kühen.“ — Lauri Katras: „Über therapeutische Versuche mit „Gehe 125“ (Acarestol) bei Hautkrankheiten der Tiere, insbesondere Acarus-Räude des Hundes.“ — Alfred Hornung: „Bestehen beim Pferde Beziehungen zwischen dem Einbiß (Einschliff) und der Beschaffenheit des Backzahngebisses?“ — Per Ivar Stenius: „Untersuchungen zur Kenntnis der Altersveränderungen an den Blutgefäßen des Hundes.“

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Gattermann, Ministerialrat zum Oberlandstallmeister; Dr. Lindemann, Ob.-Reg.- und Vet.-Rat zum Ministerialrat; Dr. Gerriets, Ob.-Reg.- und Landesökonomierat zum Ministerialrat; Dr. Klimmeck, Reg.- und Vet.-Rat zum Ob.-Reg.- und Vet.-Rat. Der mit der kommissarischen Verwaltung der Regierungs- und Veterinärstelle bei der Regierung in Marienwerder beauftragte Veterinär Dr. Siebel zum Regierungs- und Veterinär in Marienwerder. Schlachthoftierarzt A. Jakubczyk in Johannesburg (Ostpr.) zum Schlachthofdirektor in Lötzen; Dr. Friedrich Wolf, Assistent am vet.-pathologischen Institut in Gießen, zum Schlachthoftierarzt in Hof seit 1. August 1928.

Während meinesurlaubes im Monat September bitte ich alle dienstlichen oder die D. T. W. betreffenden Angelegenheiten unpersonlich an das Hygienische Institut oder an die Deutsche Tierärztliche Wochenschrift, Misburgerdamm 16, zu richten. Mießner.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrijabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten. Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 35.

Ausgegeben am 1. September 1928.

36. Jahrgang.

(Aus dem Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover. — Direktor: Prof. Dr. Mießner.)

Morphologische und kulturelle Eigenschaften des *Bacterium pyogenes*.

(Mit 7 Abbildungen.)

Von Dr. M. Rolle, Riga.

In den letzten Jahren des vorigen und in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts wurde viel über die Rolle des *Bacterium pyogenes* in der Tierpathologie geschrieben. Am häufigsten wurde der Erreger in abgeforderten verkästen, eiterähnlichen Herden ermittelt und wurde darum *Bact. pyogenes* genannt. Über die eiterbildende Natur finden wir in der Literatur viele Widersprüche. Ebenso finden wir keine sicheren Methoden zur Isolierung und Differenzierung des *Bact. pyogenes*.

Literatur.¹⁾

Schon im Jahre 1890 hatte Kitt auf eine Pneumonienart bei Rindern aufmerksam gemacht. In Gefrierchnitten aus den betreffenden Lungen hatte er grampositive Rotlauf-ähnliche Stäbchen gesehen. Er schreibt: „Die Bazillen unserer Pneumonie sind teils halb so lang, teils nur um ein geringes kürzer, aber ebenso dünn wie die Rotlaufbazillen. Was das Strukturbild der Lungenerkrankungen betrifft, so zeigen nach Hämatoxylin- und Borax und Pikrokarmintinktion die Schnitte der Hauptfläche nach den Befund chronischer zelliger Infiltration und der Koagulationsnekrose. — Bazilläre käsig Bronchopneumonie. Die auf Nährgelatine, Agar, Kartoffeln und Blutserum gemachten Aussaaten sind resultatlos geblieben, ebenso die Infektionsversuche an Kaninchen, Meerschweinchen, Tauben und weißen Mäusen“.

Drei Jahre später publizierte Lucet seine Untersuchungen über das Vorkommen von Bakterien bei Eiterungen der Rinder. Er hatte drei verschiedene Stäbchenarten gefunden und mit den Namen *Bacillus pyogenes bovis* (von 52 Fällen sechsmal), *Bacillus liquefaciens pyogenes bovis* (von 52 Fällen viermal) und *Bacillus crassus pyogenes bovis* (von 52 Fällen einmal) bezeichnet.

Von diesen Bakterien gibt Lucet leider eine zu kurze Beschreibung. Er nennt für den *Bacillus pyogenes bovis* folgende Merkmale: Er ist etwas kürzer als der Tuberkelbazillus, unbeweglich, wächst nicht auf Kartoffeln und schwer auf Gelatine, trübt flüssige Nährböden kaum und nur vorübergehend. Nur in einem einzigen Falle starb ein geimpftes Meerschweinchen, in allen anderen Infektionsversuchen wurde jede pathogene Wirkung vermißt. Der als *Bac. liquefaciens pyogenes* beschriebene Mikroorganismus ist ähnlich dem vorigen. Bei Kaninchen ruft er nach intravenöser Injektion Abszesse hervor, die an den Gliedmaßen oft bedeutende Dimensionen annehmen.

Im Jahre 1897 beschrieb Poels ziemlich ausführlich einen ähnlichen Bazillus unter dem Namen *Bacillus polyarthritidis*, weil er diesen

Erreger als Ursache der Polyarthritiden bei Kälbern fand. Von diesem Autor wurde das Bakterium auch in Mastitis- und Polyarthritidenfällen erwachsener Rinder gefunden.

Im Jahre 1898 fand Grips einen ähnlichen Mikroorganismus bei Schweinen und beschrieb ihn unter dem Namen *Bacillus pyogenes suis*.

Später, im Jahre 1903, hat Künnemann Inhalt von Abszessen bei Rindern untersucht und fand auch einen ähnlichen Bazillus. Das von ihm gefundene Stäbchen nannte Künnemann *Bacillus pyogenes bovis*. In demselben Jahre erklärte Glage den von Grips und Künnemann beschriebenen Mikroorganismus als identisch und benannte ihn einfach *Bacterium pyogenes*. Die Bezeichnung *Bacterium pyogenes* hat sich seitdem eingebürgert.

Da das *Bacterium pyogenes* in seiner Größe und Gestalt ziemlich veränderlich ist, finden wir in der Literatur in dieser Hinsicht keine großen Widersprüche. Keine Einigkeit besteht über die Färbbarkeit des Bakteriums. Einige Autoren erklären es als gramnegativ, andere als grampositiv und noch andere als gramlabil. Über diese so wichtige Frage sucht nur Olt eine Erklärung zu finden. Er kam zu dem Schluß, daß lebende Bakterien sich grampositiv färben, aber tote Bakterienleiber aus dem Organismus des Wirtstieres sich gramnegativ verhalten. Die Nährsubstrate ohne Serum- oder Blutzusatz werden als ungeeignet für die Züchtung des *Bacterium pyogenes* angesehen. Dagegen wächst es gut auf Medien, denen Serum oder Blut zugesetzt ist. Das erstarrte Serum wird als geeignet für die Diagnose des Bakteriums bezeichnet.

Grips, Glage und Nieberle schreiben: „Für Untersuchungen der Bakterien im Laboratorium steht bis jetzt demnach nur ein brauchbarer, wenn auch nicht stets zuverlässiger, fester Nährboden, das Serum, ein durchaus zuverlässiger flüssiger, die Milch, zur Verfügung“. Über die Differenzierung zwischen ähnlichen Stäbchen bei Züchtung aus verunreinigtem Material finden wir keine sicheren Angaben. Alle Autoren sind einig, daß das *Bacterium pyogenes* unbeweglich ist und keine Sporen bildet, ebenso kein Gas erzeugt und kein Indol bildet.

Nach Pütz produziert der Bazillus Säuren, nach Berger nicht. Pfeiler fand Barsikow I und II und Heische Löfung im allgemeinen nicht verändert, ab und zu sah er ganz leichte, kaum merkliche Rötung.

1. Morphologie und Färbbarkeit.

Ich habe 37 Rinder- und 21 Schweinestämme untersucht.

a) Die Form und Gestalt habe ich in Ausstrichen aus kranken Organismen und aus verschiedenen Nährböden beobachtet. In Ausstrichen aus veränderten Organen ist das *Bacterium pyogenes* ein kleines zartes Stäbchen, in der Regel

¹⁾ Ausführliche Literatur: M. Rolle, Biologie des *Bacterium pyogenes*. In.-Diss. Hannover 1928.

etwas kürzer und dicker als das Rotlaufbakterium. Außer Stäbchen kann man auch sehr kurze Formen sehen, welche Ähnlichkeit mit kleinen Kokken haben. In serum- und bluthaltigen Nährböden überwiegt die Stäbchenform. Aber auch hier kommen manchmal ziemlich kurze Formen zur Beobachtung. In nicht serumhaltigen Nährböden wie z. B. in Stichagar, Milchzucker- und Glycerinagar wächst das *Bacterium pyogenes* in der Regel in sehr kurzen Formen. Diese sind ab und zu so kurz, daß man keine Ähnlichkeit mit Stäbchen wahrnehmen kann. Die kleinen rundlichen Gebilde können auch hintereinander angeordnet sein, so daß im ersten Augenblick Streptokokken vorgetäuscht werden. Nach etwas aufmerksamer Betrachtung kann man diese jedoch nicht mit Streptokokken verwechseln.

Um den Einfluß des Serumzusatzes zu Bouillon und Agar auf die Bakterienform zu prüfen, habe ich folgende Versuche angestellt. Es wurde Serumbouillon mit 5 Prozent, 10 Prozent, 20 Prozent und 40 Prozent Serumzusatz hergestellt, ebenso Serumagar. In diesen Serumnährböden mit verschiedenem großen Serumzusatz konnte ich keine bemerkenswerten Formenunterschiede finden. Nach meinen oben angeführten Beobachtungen, daß in Nährböden ohne Serumzusatz die Bakterien kürzer sind, konnte man erwarten, daß in Nährböden mit geringerem Serumzusatz die Länge der Bakterien abnehmen mußte. Angestellte Versuche mit der niedrigsten Serumdosis von 5 Prozent bestätigte dieses nicht. Die Beobachtungen K ü n n e m a n n s und B e r g e r s, daß die Bakterien bei größeren Serumzusätzen kürzer werden, trat bei meinen Untersuchungen nicht in Erscheinung. In allen angegebenen Serumverdünnungen herrscht die Stäbchenform bei weitem vor. Die Länge der Stäbchen ist nicht gleichmäßig. Zwischen stäbchenförmigen kann man auch kokkenähnliche Gebilde sehen. Die Enden einiger Stäbchen sind etwas zugespitzt. In älteren Kulturen, in der Regel in über 30 Tage alten, treten verschiedene Blähformen auf.

b) In bezug auf die Färbbarkeit fielen mir schon die Widersprüche der Literatur auf, daß nämlich einige Autoren das Bakterium für ausgesprochen gramnegativ, andere für grampositiv halten.

Im Anfang meiner Arbeit konnte ich zeitweise bei Entfärbung in Alkohol bis 1 Minute grampositive Präparate erhalten, während in derselben Zeit das als Kontrolle benutzte *Bacterium coli* entfärbt war. Dieselben Bakterienstämme färbten sich manchmal in keinem Falle grampositiv. Sie waren schon bei einer Entfärbungszeit von 25 Sekunden gramnegativ. Auch die längere Behandlung mit Carbol-Gentianaviolett und Lugol'scher Lösung war nutzlos. Als ich von nun an Rotlaufbakterien und pyogene Mikrokokken als Kontrolle benutzte, waren zu meiner Überraschung auch diese gramnegativ. Damit war klar, daß das Verhalten mit der Färbung in Zusammenhang zu bringen war. Als ich meine Färbungsversuche mit neu hergestellten Farblösungen, reinem Alkohol und auf möglichst sauberen Objektträgern wiederholte, beobachtete ich, daß das *Bacterium pyogenes*, Rotlaufbakterien und Mikrokokken noch nach 10 Minuten Entfärbung in Alkohol gleichmäßig grampositiv waren. Zur Aufklärung, an welcher Stelle der Fehler lag, habe ich erstens frischen Alkohol in sorgfältig gereinigten Gefäßen und vorher bereits gebrauchtes Carbol-Gentianaviolett und Lugol'sche Lösung genommen. In weiterer Verfolgung dieser Frage stellte sich heraus, daß die Pyogeneststäbchen noch nach 24stündiger Entfärbung ausgesprochen grampositiv waren, während Rotlaufbakterien bereits nach 2—3 Stunden entfärbt wurden.

Erst nach drei Tagen konnte man eine beginnende Entfärbung des *Bacterium pyogenes* bemerken. Nach 4 Tagen hatten die Bakterien zum Teil ihre schwarzblaue Farbe verloren. Die Mikrokokken waren auch nach dieser Zeit noch ganz dunkel gefärbt.

Die Nachfärbung habe ich immer mit Fuchsin gemacht.

Zwischen neu hergestellten und vorher gebrauchten Farblösungen konnte man keine Unterschiede finden. Nach diesen Versuchen war klar, daß der Fehler im Alkohol gelegen hatte. Hier muß ich bemerken, daß der Alkohol für Entfärbungszwecke in ungefähr 100 ccm großen Porzellangefäßen gehalten wurde. Die mit Carbol-Gentianaviolett und Lugol'scher Lösung bearbeiteten Präparate wurden in das Gefäß mit Alkohol eingetaucht. Wenn der Alkohol etwas verdunstet war, wurde neuer Alkohol hinzugefügt. Unter genannten Verhältnissen konnte es geschehen, daß der Entfärbungsalkohol mit irgendeinem entfärbungsbeschleunigenden Stoff verunreinigt wurde. Es ist auch sonst in der Bakteriologie schon des öfteren über die verschiedenen Resultate bei Gramfärbung grampositiver Bakterien berichtet worden. Die Ursachen der manchmal beobachteten beschleunigten Entfärbung waren bisher noch nicht völlig aufgeklärt. Daß die Gramfärbung in der Bakteriologie im allgemeinen und bei Diagnose der Infektionskrankheiten sehr große Dienste leisten kann, ist bekannt.

Auch bei der Pyogenesinfektion ist diese Färbung ein sehr wichtiges diagnostisches Hilfsmittel. Um die Fehlerquellen der Gramfärbung abstellen zu können, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, die die Entfärbung beschleunigenden Stoffe aufzufuchen. Schon früher habe ich beobachtet, daß ein nach Gram gefärbtes grampositives Präparat, auf welchem schon Zedernöl war, sich im Augenblick entfärbt, wenn man es in Alkohol taucht. Jetzt habe ich diesen Vorgang systematisch verfolgt. Wenn man ein mit Carbol-Gentianaviolett und Lugol'scher Lösung behandeltes Pyogenes-, Rotlauf- oder Mikrokokken-Präparat nimmt, tropft etwas Zedernöl darauf und taucht das Präparat in reinen 96proz. Alkohol, dann sind Pyogenes- und Rotlaufbakterien schon in 25—30 Sekunden entfärbt; nach einer Minute sind auch die Mikrokokken entfärbt. (Auf in ebenfolcher Weise behandelten Präparaten ohne Zedernöl waren in reinem 96prozentigen Alkohol Rotlaufbakterien noch nach 1 Stunde, Pyogenesbakterien noch nach drei Tagen grampositiv. Die Mikrokokken hatten sogar nach 4 Tagen völlig ihre dunkle Farbe behalten.) Die Resultate blieben auch dann dieselben, wenn das Öl mit einem Tuch oder Fließpapier abgewischt wurde.

Die geprüften Bakterienausstriche habe ich von Kulturen angefertigt.

Nach diesen Versuchen habe ich überlegt, welche chemischen Vorgänge sich hier abspielen können.

Wir wissen, daß die Hauptbestandteile des Öles Fettsäuren und Glycerin sind. Es ist bekannt, daß das Jod zu bestimmten Fettsäuren chemische Affinität hat. Diese Eigenschaft wird bei Fett- und Ölanalysen, in den sogenannten Jodzahlbestimmungen ausgenutzt. Meine Vermutung ging nun dahin, daß das Jod des Jodpararosanilins mit den Fettsäuren des Öles in Verbindung tritt und so ein alkohollöslicher Stoff entsteht, der die Entfärbung der Bakterien bewirkt. Wenn meine Behauptung richtig wäre, dann müßte die Entfärbungsbeschleunigung auch bei Anwesenheit von anderen Fetten und von Glycerin bemerkbar sein.

Um dies nachzuprüfen, habe ich folgende Versuche angestellt.

Nach 2 Minuten langer Färbung mit Carbol-Gentianaviolett und ebenso langer Bearbeitung mit Lugol'scher Lösung wurden die Präparate

1. mit einer dünnen Schicht von Schweinefett (geschmolzenem Fett),
2. mit einer dünnen Schicht von Milhfett bestrichen und mit Fließpapier oder einem Tuch abgewischt.

Die Präparate mit den verschiedenen Fetten wurden je nach Art des zu prüfenden Stoffes in besonderen Entfärbungsküvetten mit 96prozent. reinem Alkohol entfärbt.

Die Resultate waren folgende: Die mit Schweinefett und Milhfett behandelten Präparate wurden ebenso schnell entfärbt wie die mit Zedernöl bestrichenen Objektträger oder

gewöhnliche Präparate in verunreinigtem Alkohol. *Pyogenes*- und Rotlaufbakterien waren bereits nach 30 Sekunden bis 1 Minute entfärbt. Die Kontrollpräparate ohne Fett in reinem 96prozent. Alkohol waren nach einer Stunde grampositiv. In diesem Falle habe ich den Entfärbungsvorgang nicht längere Zeit beobachtet. Nach diesen Versuchen halte ich für bewiesen, daß die die Entfärbung beschleunigenden Stoffe Fette sind. Jetzt ist es leicht erklärlich, daß bei Nichtbeachtung dieser Verhältnisse grampositive Bakterien sich manchmal gramnegativ färben.

Weiter habe ich verglichen, ob die Gramsche Färbung durch nicht geschmolzene Organfette ebenso leicht beeinflussbar ist.

Die Präparate, welche mit Speck überstrichen waren, entfärbten nicht so schnell, wie mit geschmolzenen Fetten oder Öl behandelte Präparate. Wenn mehrere Ausstriche von fettigen Organen in ein und demselben Alkohol behandelt werden, dann beginnen sich mit der Zeit auch ganz fettfreie Ausstriche in diesem Alkohol schneller zu entfärben. Die Fetteilchen der Ausstriche werden von dem Alkohol allmählich gelöst und in der Küvette angereichert. Damit ist auch erklärlich, warum viel gebrauchter Alkohol mit der Zeit für die Gramfärbung unbrauchbar wird. Wie empfindlich die Gramsche Färbung gegen Fette und Öle ist, geht daraus hervor, daß die Entfärbung schon dann schnell eintritt, wenn nur die gefärbten und mit Lugolscher Lösung behandelten Ausstriche mit Fingern befaßt werden. Manchmal haben so befaßte *Pyogenes*- oder Rotlaufbakterienausstriche schon in 30 Sekunden ihre dunkelblaue Farbe verloren. Die Hauptbedingungen einer einwandfreien Gramfärbung sind demnach:

Fettfreie Objektträger, fettfreie Gefäße mit reinem Alkohol. Die Präparate dürfen nicht mit den Fingern angefaßt werden. Fettige Organausstriche müssen vorher entfettet werden.

Aber auch unter diesen Bedingungen dürfen wir die Gramfestigkeit nicht als etwas Absoletes betrachten. Selbst die am stärksten grampositiven Bakterien werden mit der Zeit entfärbt. Aus oben angeführten Versuchen haben wir gesehen, daß einige Bakterienarten sich schneller entfärben als die anderen. Darum müssen wir die Bakterien als grampositiv betrachten, welche eine bestimmte Entfärbungszeit in Alkohol aushalten können. Nach den vorstehenden Ausführungen erscheint es nötig, in der Bakteriologie allgemein bestimmte Fristen für die Entfärbungszeiten festzusetzen, nach denen die Bakterien entweder grampositiv, gramlabil oder gramnegativ bezeichnet werden. Bestimmte Vorschläge behalte ich mir für eine spezielle, meine Versuche in dieser Richtung ergänzende Arbeit vor.

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse über Morphologie und Färbbarkeit des *Bacterium pyogenes*.

In Organen und in serum- und bluthaltigen Nährböden ist das *Bacterium pyogenes* ein kleines, zartes, in der Regel etwas kürzeres und dickeres Stäbchen als das Rotlaufbakterium. Ab und zu kann man kurze, mehr kokkenförmige Gebilde beobachten.

In Nährböden ohne Serum- und Blutzusatz ist das *Bacterium pyogenes* ein sehr kurzes kokkenähnliches Stäbchen.

Das *Bacterium pyogenes* ist ausgesprochen grampositiv. Es ist stärker grampositiv als das Rotlaufbakterium und schwächer als Mikrokokken. Andere Resultate sind auf Fehler in der Gramfärbung zurückzuführen.

Die Anwesenheit von Fetten bewirkt eine beschleunigte Entfärbung grampositiver Bakterien.

2. Kulturelle Eigenschaften des *Bacterium pyogenes*.

1. Auf Agarplatten ist unter aeroben Verhältnissen bei 37 Grad C kein Wachstum zu erkennen. Auf der Oberfläche von Agarstichkulturen ist um die Einstichsstelle herum ebenfalls kein Wachstum festzustellen. Dagegen kann man

ungefähr nach zwei Tagen $\frac{1}{4}$ bis 1 cm unter der Oberfläche Wachstum sehen, welches nach drei bis vier Tagen sehr gut ausgeprägt ist und sich bis zum Ende des Stiches fortsetzt. Wenn mit der Stichnetel zuviel Impfmateriel genommen ist, besonders aber wenn von serumhaltigen Nährböden der Nadel serumhaltiges Materiel anhaftete, ist Wachstum entlang des ganzen Stiches bis zur Oberfläche zu beobachten. Wenn dagegen mit solcher Stichnetel mehrere Stiche in demselben Röhrchen gemacht werden, beginnt das Wachstum meistens im zweiten Stich schon tiefer. In dem dritten bis vierten Stich erreicht es in der Regel seine optimale oben angeführte Tiefe. (Abb. 1 und 2.) Haften der Nadelspitze nur Bakterien an, dringt das Wachstum schon im ersten Stich nicht bis an die Oberfläche. Bei meinen weiteren Versuchen habe ich zur Sicherheit immer drei bis vier Stiche mit derselben Nadel gemacht. Außerdem habe ich die Züchtung im Anaeroben-Apparat nach Zeissler ausprobiert. In diesem Apparat ist bei Druck von etwa 5 mm Quecksilber Wachstum gleichmäßig entlang dem ganzen Stich und auch auf der Agaroberfläche. Auch auf der Oberfläche der Agarplatten kann man bei dem erwähnten Vakuum Wachstum beobachten.

2. Auf Traubenzucker-, Milchzucker- und Glycerinagarplatten tritt unter aeroben Verhältnissen kein Wachstum auf. Im Stich wächst das Bakterium in diesen Nährböden wie in gewöhnlichem Stichagar. Im Anaeroben-Apparat sind auch auf der Oberfläche Kolonien. Die Schrägröhrchen zeigen nur im Kondenswasser (besser Synaeresis) und dicht darüber geringes Wachstum.



Abb. 1. *Pyogenes* Agar-Stichkultur.



Abb. 2.

Schema einer *Pyogenes* Agar-Stichkultur.

3. Im Gelatinestich findet bei Zimmertemperatur kein Wachstum statt.

4. In gewöhnlicher Bouillon wächst das *Bacterium pyogenes* nicht. Nur wenn in der Bouillon etwas Niederschläge sind, kann man geringes Wachstum beobachten. Das beruht sicherlich auf der Eigenschaft des Bakteriums, in einfachen Nährböden besser anaerob als aerob zu wachsen. In den korpuskulären Bestandteilen des Niederschlages findet das Bakterium mehr oder weniger natürliche Verhältnisse zum anaeroben Wachstum.

5. In Traubenzucker-, Milchzucker- und Glycerinbouillon tritt etwas Wachstum ein. Die Bouillon wird leicht getrübt und bildet ein wenig zähen Niederschlag. In Bouillon mit diesen Zusätzen erzeugt das Bakterium kein Gas.

6. In Traubenzucker- und Milchzucker-Barsikow wächst das *Bacterium pyogenes* verhältnismäßig gut. Nach 36 bis 48 Stunden tritt leichte Rötung auf und nach 3 bis 4 Tagen

auch manchmal Trübung und Ausflockung. Die genannten Veränderungen dieser Nährböden treten nicht regelmäßig auf. Von ein und demselben Stamm kann man einmal die Veränderungen des Nährbodens (Säurebildung) beobachten, ein anderes Mal nicht. Nach Zusatz von Serum zu diesen Nährböden ist das Wachstum bedeutend besser, jedoch bleibt die Rötung des Lackmusfarbstoffes aus.

7. In Indolbouillon wachsen die Bakterien ohne Indolbildung.

8. 20prozentige Serumbouillon (Rinderferum) wird nach 24 Stunden stark getrübt durch Bildung größerer und kleinerer Flocken. Nach 48 Stunden ist die Bouillon beinahe klar geworden. Die Bakterien-Klumpen sind auf den Boden des Röhrchens gesunken.

9. Auf Serumagarplatte²⁾ wachsen bekanntlich die Bakterien auch unter aeroben Verhältnissen gut. Nach 24 Stunden sieht man unter dem Mikroskop mit schwachem Trockensystem (50—100mal) durchsichtige, fein granuliert, runde Kolonien mit etwas ausgezackten Rändern und dunklerem Zentrum. Nach 48 Stunden sind die Kolonien größer; ihre Struktur ist dieselbe. Das mikroskopische Bild vom Bau der Kolonien ist sehr typisch, so daß man sie von vielen anderen Kolonien auch aus verunreinigtem Material leicht erkennen kann. (Siehe Abbildung 3 und 4.) Mit welchen Bakterien-Kolonien man diese verwechseln kann, werde ich in dem Kapitel über die Differentialdiagnose näher erörtern.




Abb. 3. 24 Stunden alte Pyogenes-Kolonie auf der Serumagarplatte. Phot. „Mikam“ Leitz Okular 12, Obj. 3.

Um den optimalen Serumzusatz zu dem Agar zu finden, habe ich Nährböden mit 5, 10, 20 und 40 Prozent Serum hergestellt. Auf 5prozentigem Serumagar ist das Wachstum unsicher. Auf 10—40prozent. wächst das Bakterium gut in feinen typischen Kolonien. Als optimalen Serumzusatz zu dem Agar habe ich 20 Prozent gewählt; in dieser Zusammensetzung habe ich den Nährboden später zur Züchtung benutzt.

Ob die Erhitzung des Serums auf 60—65 Grad C, welche Temperatur bei fraktionierter Sterilisierung des Serums gebraucht wird, auf das Wachstum Einfluß haben kann, habe ich durch Versuche mit denselben Serumverdünnungen, wie oben angegeben, geprüft. Eine Reihe von Versuchen wurde mit zwei Stunden lang auf 65 Grad C erhitztem Serum und eine Reihe mit unerhitztem Serum angestellt. Auf unerhitztem Serum habe ich manchmal besseres Wachstum beobachtet als auf erhitztem Serum. Im allgemeinen konnte man bemerkenswerte Unterschiede auf diesen Nährböden nicht feststellen. Ebenso angestellte vergleichende Versuche über Rinder- und Pferdeferum ergaben keine besonderen Unterschiede.

In Serumstichagar begann das Wachstum an der Oberfläche und war entlang dem ganzen Stich gleichmäßig. Nach 3—4 Tagen konnte man eine Trübung um den Stich bemerken. Manchmal begann die Trübung gleich an der Oberfläche, sonst etwas unter derselben. Der Stich hatte dann eine entfernte Ähnlichkeit mit einer dichten Gläserbürste. Diese Wachstumsform habe ich als Gläserbürstenform bezeichnet.

Ob die Bürstenform besser in erhitztem oder frischem Serum auftritt und welche Serumkonzentration für ihre

²⁾ Verflüssigter und auf 60 Grad abgekühlter Agar + 20 Prozent klares steriles Rinderferum.



Abb. 4. Vier Tage alte Pyogenes-Kolonie auf der Serumagarplatte. Phot. „Mikam“ Leitz Okular 12, Obj. 3.

Entwicklung die beste ist, habe ich durch vergleichende Versuche geprüft; eine Reihe von Versuchen mit zwei Stunden auf 65 Grad C erhitztem Serum und eine zweite Reihe von Versuchen mit frischem Serum. Zu dem Agar habe ich 5, 10, 20 und 40 Prozent Serum zugefetzt. Im Agar mit Zusatz von unerhitztem Serum tritt in keiner der Konzentrationen die beschriebene Bürstenform in Erscheinung. Mit Ausnahme der 5prozentigen Serumagarröhrchen zeigten alle Wachstum entlang dem Stich und um ihn herum auf der Oberfläche.

Die Röhrchen mit erhitztem Serum gaben folgendes Resultat: In 5prozent. Serumagar begann das Wachstum unter der Oberfläche, auch nach 3—5 Tagen konnte man Bürstenform nicht wahrnehmen. In 10prozent. Serumagar konnte man das Wachstum auch auf der Oberfläche und entlang dem ganzen Stich beobachten. Die Bürstenform trat nicht regelmäßig auf.

Im 20—40prozent. Serumagarschich war nach 3—4 Tagen im Brutschrank die Bürstenform gebildet.

Eine allgemeine Bedingung sowohl für Serumagarplatten wie für Serum-Stichagar ist klares Serum. Trübes Serum stört die Befichtigung der Kolonien.

10. Auf Blutplatten³⁾ sind im Brutschrank bei 37 Grad C nach 24 Stunden nadelfischgroße farblose Kolonien vorhanden. Nach 48 Stunden erreichen diese Kolonien Stecknadelkopfgröße. Sie sind rund und etwas erhaben. Bei dünner Nährbodenschicht kann man manchmal leichte Hämolyse sehen, die bei dicker Schicht nicht in Erscheinung tritt. Auf Blut- und Serumagarplatten ist das Wachstum im Anaerobenapparat bei einem Druck von 5 mm ebenfögt wie unter aeroben Verhältnissen.

11. In steriler Milch ist schon nach 24 Stunden ziemlich üppige Vermehrung der Bakterien eingetreten, die Milch ist aber zu dieser Zeit meist noch unverändert. Nach 48 Stunden beginnt sie am Boden des Reagenzglases zu gerinnen. Dieser Prozeß schreitet allmählich nach der Oberfläche fort.

³⁾ Verflüssigter Agar in Röhrchen von 55—60 ccm wird auf 60 Grad C abgekühlt. Zu dem Agar wird 20—25 Prozent mit steriler Luerpritze aus der V. jugularis frisch entnommenes Rinder- oder Schafblut zugefetzt, gemischt und auf Platten ausgegossen. Für Schrägröhrchen wird ebenso entnommenes Blut zu dem verflüssigten Agar zugefetzt und in Schrägstellung erstarren lassen.

Bei völliger Gerinnung ist die Milch eine gleichmäßige Gallerte, aus der sich nun eine wasserklare Molke abzuscheiden beginnt. Nach 4—5 Tagen liegt das zusammengepreßte Milchgerinnfel auf dem Boden des Gefäßes unter der Molke wie ein Blutkuchen im abgetrennten Serum. (Abb. 5.)

12. Auf erstarrtem Serum tritt nach ungefähr 3—4 Tagen Verflüssigung des Nährbodens auf. Die Kolonien senken sich ein und es bilden sich kleine Grübchen. Manchmal kann die Verflüssigung in der Umgebung der Kolonien auf erstarrtem Serum ausbleiben. Als Nährboden für Isolierungszwecke kann man das erstarrte Serum nur dann gebrauchen, wenn die Bakterien mehr oder weniger in Reinkultur anzutreffen sind. Aus verunreinigtem Material gelingt es vielfach nicht, das Pyogenesbakterium auf diesem Substrat zu isolieren, da in den Einschnitzstellen zugleich auch andere Bakterien wachsen. Es ist möglich, daß an der Einschnitzung auch andere Bakterien urfänglich beteiligt sein können. Auch er-

Außer Serum- und Blutplatte habe ich von den erwähnten Nährböden als wichtigste für die Erkennung des Bacterium pyogenes den Agarstich und Milch ausgewählt. Einige Zeit habe ich auch den Serumagarstich gebraucht, später aber als unnötig und zu teuer davon abgesehen. Alle von mir isolierten Stämme wurden unter Berücksichtigung der Morphologie und Färbbarkeit in Agarstich und Milch kontrolliert.

Für Dauerkulturen habe ich zu Anfang Serumagarschrägröhrchen benutzt, später aber Blutagarschrägröhrchen. Die Kulturen wurden nach je drei Monaten überimpft.

3. Morphologische und kulturelle Differentialdiagnose.

Das Bacterium pyogenes hat morphologisch große Ähnlichkeit mit dem Rotlaufbakterium. Auch das Wachstum auf der Blutplatte gibt für ein ungeübtes Auge ein ähnliches Bild. Auf der Serumagarplatte, im Agarstich und in Milch kann eine Verwechslung nicht stattfinden.



Abb. 5. Pyogenes Milchkulturen.

schwert die Undurchsichtigkeit des Nährbodens sehr die Auffindung der richtigen Kolonien. Aus den hier aufgezählten Nährböden habe ich zur Fortsetzung meiner Arbeit diejenigen ausgewählt, welche mir zur Isolierung des Bacterium pyogenes aus kranken Organen und zur weiteren Differenzierung von ähnlichen Keimen praktisch auswertbar erschienen.

Zur Isolierung aus Organen finde ich die Serumagarplatte am geeignetsten. Die Kolonien auf dieser Platte sind bei Mikrodurchsicht (50—100mal) sehr typisch. In 95 Prozent der Fälle kann man schon nach der Kolonieform allein die Bakterien erkennen und dann auch isolieren. Neben der Serumagarplatte ist auch die Blutplatte brauchbar. Wo das Bacterium pyogenes mehr oder weniger in Reinkultur anzutreffen ist, gelingt es auch ziemlich leicht auf der Blutplatte die Bakterien zu isolieren. Doch ist die Kolonieform auf der Blutplatte nicht ganz so typisch. Hier tritt das Bakterium in kleinen, runden, langsam wachsenden Kolonien auf. In Verbindung mit dem mikroskopischen Bilde (grampositive, kleine Stäbchen), kann man hier Verdacht auf das Bacterium pyogenes aussprechen. In allen fraglichen Fällen sind die später angegebenen Differentialnährböden zu benutzen.

Bei Untersuchungen von Organen auf das Bacterium pyogenes habe ich immer neben der Serumagarplatte auch die Blutplatte gebraucht. Dies geschah weniger zur Isolierung des Bacterium pyogenes als für die Ermittlung der anderen Keime, wie z. B. Streptokokken, Diplokokken und hauptsächlich zur Erkennung des Bacterium bipolare.




Abb. 6. Zwei Tage alte Kolonie eines gelben Farbstoffbildners auf der Serumagarplatte. Phot. „Mikam“ Leitz Okular 12, Obj. 3.

Einige Streptokokkenarten wachsen auf dem Serum- und auch auf dem Blutagar etwas ähnlich dem Bacterium pyogenes (Abb. 7). Ein geübter Bakteriologe kann schon nach den Wachstumsformen allein die sichere Unterscheidung treffen. Für weniger geübte genügt in vielen Fällen der Ausstrich. Bei noch bestehenden Zweifeln führt der Agarstich und die Milchkultur zur Entscheidung. Kokken wachsen im Agarstich auf der Oberfläche und dicht unter der Oberfläche vielfach besser als in der Tiefe des Agars. Die




Abb. 7. Streptokokken-Kolonie auf der Serumagarplatte. Phot. „Mikam“ Leitz Okular 12, Obj. 3.

Milch gerinnt in vielen Fällen überhaupt nicht. Wenn sie gerinnt, ist das Bild der Gerinnung ein völlig anderes.

Außerdem bieten manchmal auf Serumagarplatten einige, gelben Farbstoff bildende Saprophyten Anlaß zur Verwechslung, besonders, wenn es kleine grampositive Stäbchen sind. (Abb. 6.) Die nach einigen Tagen im Licht eintretende Farbstoffbildung, vor allem aber der Agarstich und die Milchkultur führten hier zur Entscheidung.

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse über kulturelle Eigenschaften des *Bacterium pyogenes*.

1. Das *Bacterium pyogenes* wächst in aeroben Verhältnissen auf der Agaroberfläche nicht. Im Stichagar beginnt das Wachstum immer $\frac{1}{4}$ —1 cm unter der Oberfläche.
2. Im Anaerobenapparat nach Dr. Zeissler wächst das Bakterium auch auf der Agaroberfläche.
3. In den blut- und serumhaltigen Nährböden wächst das Bakterium ebenso gut unter aeroben wie anaeroben Verhältnissen.
4. Die Koloniform auf der Serumagarplatte bietet unter dem Mikroskop ein typisches Bild.
5. In Trauben-, Milchzucker- und Glycerin-haltigen Nährböden kann man geringes Wachstum beobachten.

6. In Milch- und Traubenzucker erzeugt das Bakterium Säure, aber kein Gas.
7. In Serumstichagar wächst das *Bacterium pyogenes* in Bürstenform.
8. Der optimale Serumzusatz zu dem Agar ist 20 Prozent.
9. Das erstarrte Serum wird in der Umgebung der Kolonien zumeist verflüssigt.
10. In Bouillon ohne Serumzusatz tritt kein Wachstum ein, in solcher mit Serumzusatz sieht man nach vorübergehender Trübung Ausflockung.
11. Die Milch gerinnt nach etwa zwei Tagen. Nach 3—4 Tagen beginnt Ausscheidung der Molke und Zusammenballung der Kaseinmassen am Boden des Reagenzglases.
12. Das Bakterium bildet kein Indol.
13. Aus den aufgezählten Punkten ergeben sich als wichtige Nährböden:
 - a) Serumagarplatte — zur Isolierung und Differenzierung.
 - b) Blutplatte — zur Isolierung.
 - c) Agarstich (3—4 Stiche in einem Röhrchen) — zur Differenzierung.
 - d) Milch zur Differenzierung und Anreicherung.

(Aus dem Zoologischen Institut der Universität Göttingen, Direktor: Prof. Dr. A. Kühn, und dem Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Direktor: Prof. Dr. H. Mießner.)

Strongyliden der Pferde in Deutschland.

2. Nachtrag.¹⁾

(Mit 2 Abbildungen.)

Von Oberassistent Dr. R. Wetzel, Hannover.

Bei meinen systematischen Untersuchungen über die in deutschen Pferden vorkommenden Strongyliden sind bis jetzt aus dem Genus *Triodontophorus* Looss nur die Arten *T. serratus* und *T. brevicauda* festgestellt worden. Es gelang mir vor kurzem, eine weitere Spezies, *Triodontophorus tenuicollis* Boulenger, 1916, aufzufinden, die nachstehend kurz beschrieben wird. Die Würmer entstammen der Mehlis'schen Sammlung (Glas Nr. 836 und 841) und wurden 1832 durch Hausmann, dem damaligen Direktor der Tierarzneischule Hannover, überwiesen. Herrn Prof. Dr. Kühn - Göttingen danke ich für die freundlichst gewährte Untersuchung des Materials.

Genus *Triodontophorus* Looss, 1902.²⁾

Triodontophorus tenuicollis Boulenger, 1916.

Der Parasit wurde bis jetzt gefunden in England (Boulenger 1916, S. 426; Yorke and Macfie 1919, S. 138; Le Roux 1924, S. 130; Ortlepp 1925, S. 1; Lewis 1926, S. 181; Kanada (Ransom and Hadwen 1919, S. 209); U.S.A. (Riley 1921, S. 222), Holland (Ihle 1922, S. 31), Südafrika (Gertrud Theiler 1923, S. 77), Rußland (Popoff 1928, S. 194).

Grösse und Gestalt: Die Männchen haben bei einer durchschnittlichen maximalen Breite von 714 μ eine Länge von 18—20 mm (13,5—19 mm nach Boulenger), während die Weibchen 19—21 mm (16—19,5 mm nach Boulenger) messen. Ihre durchschnittliche Breite beträgt 850—894 μ . Der drehrunde Körper verjüngt sich bei beiden Geschlechtern von der Mitte aus oralwärts stärker als kaudalwärts. Die Kutikula zeigt die übliche Querringelung. Die Querringe der vorderen Körperhälfte sind jedoch kaudal breiter als vorn und verleihen dadurch der Kutikula ein gezähntes Aussehen (Abb. 1a).

Kopf (Abb. 1a, b): Das 148—160 μ breite Kopfende ist

nicht vom Körper abgesetzt. Die kreisrunde Mundöffnung wird von einem niedrigen, sich nach außen stark abflachenden Mundwall begrenzt, der an seiner Basis durch eine tiefe ringförmige Einschnürung von der übrigen Kutikula getrennt wird. Die schlanken submedialen Kopfpapillen überragen mit ihren kurzen konischen distalen Enden den Mundwall vorwärts. Die mit breiter Basis entspringenden lateralen Papillen treten nicht hervor. Der äußere Blätterkranz wird in Übereinstimmung mit den Angaben von G. Theiler (S. 78) und Popoff (S. 195) von etwa 50 (40—44 nach Boulenger) schlanken, blattförmigen Elementen gebildet. Sie nehmen ihren Ursprung am proximalen Rande der Innenfläche des Mundwalls, sind vorwärts und leicht axial gerichtet und überragen den Mundwall.

Die Mundkapsel ist klein, aber verhältnismäßig dickwandig. Sie hat die Gestalt eines Rotationsellipsoides mit abgeflachten Polen. Ihre maximale Breite beträgt etwa 130, ihre Tiefe 75 μ . An der Innenfläche des distalen Mundkapselrandes befindet sich der innere Blätterkranz, der aus derselben Zahl kleiner, plättchenartiger Elemente gebildet wird, wie der mit ihm in Verbindung stehende äußere Blätterkranz. Der vordere Mundkapselrand zeigt außen eine ringförmige Verdickung, die von den sechs Kopfpapillen unterbrochen wird. Dorsal verläuft in der Kapselwand bis zu ihrem vorderen Rande der Ausführungsgang der dorsalen Ösophagusdrüse (Dorsalrinne). Vom Ösophagustrichter her ragen etwa bis zur halben Kapselhöhe drei Zähne in das Lumen, die den drei Ösophagussektoren entsprechen und Fortsätze der chitinosen Auskleidung des Ösophagus darstellen. Ihr freier Rand ist unregelmäßig geschweift und gezähnt.

Der Ösophagus ist 850—920 μ lang. Er beginnt mit einem erweiterten kranialen Abschnitt, der sich nach dem Nervenring zu verjüngt, um kaudal von ihm wieder anzuschwellen. An die Mundkapsel anschließend bildet der Ösophagus einen deutlichen Trichter, in dem die drei erwähnten Zähne ihren Ursprung nehmen. Die Zervikal-

¹⁾ Hauptzusammenstellung D. T. W. 1926, S. 619. Nachtrag D. T. W. 1928, S. 101.

²⁾ Charakterisierung des Genus und Beschreibung der Arten *T. serratus* und *T. brevicauda* D. T. W. 1926, S. 621.

papillen und der Exkretionsporus finden sich etwa auf der Höhe des Nervenringes, durchschnittlich $550\ \mu$ vom vorderen Körperende entfernt.




Abb. 1. *Triodontophorus tenuicollis* Boulenger, 1916. a) Kopf eines Weibchens, dorsal, ca. $140\times$, b) Vorderende eines Männchens, lateral, ca. $40\times$, c) Bursa copulatrix, lateral, ca. $42\times$, d) Mittellappen der Bursa, dorsal, ca. $42\times$, e) Spikula nach Boulenger Fig. 6, f) Hinteres Körperende des Weibchens, lateral, ca. $22\times$.

Hinteres Körperende des Männchens (Abb. 1c, d, e): Die Bursa copulatrix ist ventral geschlossen und zeigt einen feingezähnten freien Rand. Popoff (S. 192) macht auf einen größeren Zahn in der Mitte des Mittellappens aufmerksam, der bei den mir vorliegenden Exemplaren aber nicht zu beobachten ist. Der dorsal aufgerichtete Mittellappen erscheint kurz und ist deutlich von den beiden lateralen Lappen abgesetzt. Der gemeinsame Stamm der dorsalen Rippen teilt sich gleich nach Abgabe der externo-dorsalen Rippen in die zwei Hauptäste; sie messen durchschnittlich $350\ \mu$. Die äußeren, mittleren und inneren Zweige der dorsalen Rippen entspringen dicht beieinander. Die externo-dorsalen Rippen verlaufen fast kaudal und haben ein leicht dorsal gebogenes distales Ende. Die kräftigen lateralen und die ventralen Rippen haben einen gemeinsamen Stamm. Die postero-laterale Rippe bildet mit den annähernd parallel laufenden medio- und externo-lateralen Rippen einen Winkel. Die schwächeren ventralen Rippen entspringen mit breiter Basis und zeigen leicht divergierende distale Enden. Der Conus genitalis wird von einem mächtigen Hautkragen umgeben. Die Präbursalpapillen sind sehr lang. Die Spikula, die ich bei meinen Exemplaren leider nicht genau sehen konnte, enden nach Boulenger (S. 429) und Popoff (S. 196) mit einem Haken. An der Ursprungsstelle des Hakens findet sich am Schaft ein kleiner Anhang.

Hinterende des Weibchens (Abb. 1f): Der Körper des Weibchens verjüngt sich kaudalwärts allmählich und endet mit einer stumpfen Spitze. Der Anus befindet sich etwa 90 , die Vulva etwa $590\ \mu$ von der Schwanzspitze entfernt. Auf der Höhe der Vulva hat der Körper eine Breite von $340\ \mu$.

Die Eier haben nach Popoff (S. 198) elliptische Ge-

stalt, sind dünnchalig und messen $99\times 48\ \mu$. G. Theiler (S. 78) gibt die Größe der Eier mit $84-92\ \mu\times 44-48\ \mu$ an.

Vorkommen: *T. tenuicollis* ist beim Pferd, Maulesel und Esel gefunden worden, wo der Wurm besonders im dorsalen Colon anzutreffen ist. In Südafrika sind etwa 33 Prozent der Pferde damit behaftet (G. Theiler, S. 78). Noch häufiger scheint der Parasit in England (Le Roux, S. 130) und Rußland (Popoff, S. 194) zu sein, während er in Holland sehr selten ist (Ihle, S. 32). Das gleiche scheint auch für Deutschland der Fall zu sein, da ich den Wurm trotz systematischen Suchens bei fast hundert geprüften Pferden bisher nicht gefunden habe.

Pathogene Wirkung: Ransom and Hadwen (1918, S. 205) machen darauf aufmerksam, daß bei Anwesenheit von *T. tenuicollis* in der Schleimhaut des Colons Geschwüre beobachtet werden. Sie erwähnen zwei Fälle und bilden die Geschwüre ab, ohne jedoch eine nähere Beschreibung zu geben. Nach ihrer Meinung werden die Schleimhautveränderungen durch die darauf sitzenden Parasiten verursacht. Die gleiche Auffassung haben Yorke and Macfie (1919, S. 138), die *T. tenuicollis* und Geschwüre in England bei aus Amerika eingeführten Pferden sahen. Auch Le Roux (1924, S. 130) berichtet, daß er die Parasiten stets im rechten dorsalen Colon den Geschwüren anhaftend beobachtete. Die Geschwüre fanden sich gewöhnlich längs der A. colica dorsalis. Nach Le Roux besteht nicht der geringste Zweifel, daß die Würmer als Ursache der Schleimhautveränderungen anzusehen sind, weil Geschwüre bei Anwesenheit der Parasiten nie gefunden wurden.

Unter dem mir zur Verfügung stehenden Material befindet sich auch ein Stück Schleimhaut des Colons, das derartige Veränderungen zeigt. Es ist in zwei Teile zerfurcht, doch kann man durch Zusammenlegen einen Überblick über die Ausdehnung der Veränderungen gewinnen (Abbildung 2). Es handelt sich um einen ellipsenförmigen $2,7\times 1,5\ \text{mm}$ großen Herd. Er ist von schwarzbrauner Farbe, ragt leicht über die umgebende Schleimhaut hervor und zeigt eine zerklüftete, bröcklige Oberfläche. An dem Herd haften ziemlich fest fünf Würmer, die zum Teil mit ihren Vorderenden tief in den schwarzbraunen bröckligen Massen stecken. Einer der Würmer konnte einwandfrei als *T. tenuicollis* identifiziert werden. Die Schleimhaut in der Umgebung des Herdes zeigt keine makroskopisch wahrnehmbaren Veränderungen.




Abb. 2. Schleimhaut des Colons mit nekrotischem Herd und darauf sitzenden Würmern.

Zur histologischen Untersuchung wurden etwa $6\ \mu$ dicke Schnitte angefertigt und mit Hämatoxylin-Eosin oder Karbolthionin gefärbt. Bei Lupenvergrößerung zeigt sich im Hämatoxylinpräparat der Herd als eine homogene rosa gefärbte schollige Masse, die sich bis tief in die Submukosa er-

streckt. Am Übergang zur Submukosa bemerkt man eine schmälere, dunkler gefärbte Zone. Die Oberfläche des Herdes erscheint zerklüftet, glanduläre Strukturen sind nicht mehr erkennbar. In die homogenen Massen eingebettet findet sich ein Querschnitt durch das vordere Körperende des Wurmes. In seiner Umgebung ist die homogene Masse aufgelockert. Auch in den übrigen Teilen der Masse sieht man vereinzelt derartige aufgelockerte, mit einem unregelmäßigen Lumen versehene Stellen, die als Haftstellen von bei der Konservierung abgefallenen Würmern gedeutet werden.

Mit starkem Trockensystem lassen sich in den trockenen scholligen Massen keine Kerne mehr nachweisen, doch bemerkt man an einzelnen Stellen Kerntrümmer und Kernschatten, die besonders in den Karbolthioninpräparaten in Erscheinung treten. Der Herd hebt sich von dem umgebenden Submukosagewebe ab. In der oben erwähnten dunkler gefärbten Grenzzone findet sich ausgeprochene Karyorhexis. Die Submukosa selbst enthält sehr viele eosinophile polymorphkernige Leukozyten, die besonders gehäuft in der Nähe des Herdes auftreten.

Über die Pathogenese der Schleimhautveränderungen läßt sich auf Grund des vorliegenden Einzelfalles nichts sagen. Hierzu müssen Untersuchungen an weiterem Material durchgeführt werden. In Übereinstimmung mit den oben genannten Autoren glaube ich aber auf Grund der erhobenen Befunde, daß die Veränderungen durch *T. tenuicollis* erzeugt werden. Die Tatsache ist infofern bemerkenswert, weil bei den sich ebenfalls an die Schleimhaut anhaftenden *Strongylus*-Arten niemals so ausgedehnte nekrotische Herde beobachtet werden. An ihrem Zustandekommen ist vermutlich bei *T. tenui-*

collis auch die eigenartig gebildete Kutikula der vorderen Körperhälfte nicht unbeteiligt.

Zusammenfassung.

Es wird ein bisher in Deutschland noch nicht bekannter Rundwurm aus dem Pferde, Triodontophorus tenuicollis Boulenger, 1916, beschrieben. Der Parasit erzeugt an seiner Haftstelle an der Schleimhaut des Colons nekrotische bis tief in die Submukosa reichende Herde.

Literatur.

Boulenger, C. L.: Sclerostome Parasites of the Horse in England. 1. The Genera Triodontophorus and Oesophagodontus. Parasitology 1916, 8, S. 420. Ihle, J. E. W.: De in den dikken darm van het paard levende volwassen Strongyliden (Sklerostomen). Rapport der Commissie voor het Sklerostomiasis-onderzoek in Nederland. s'Gravenhage 1922. I. Zoölog. Gedeelte S. 32. Lewis, E. A.: Helminths collected from Horses in the Aberystwyth Area. Journ. of Helminthology 1926, 4, S. 181. Popoff, N. P.: K Wijawlenije Gelmintologisches kogo status Loschadej S.S.S. R. Westnik, Sowremennoij Veterinarij. 1927, 5, S. 141. Derselbe: Zur Kenntnis der Strongyliden der Pferde der Union S.S.R. Sammlung helminthologischer Arbeiten. Prof. Skrjabin, Moskau 1922, S. 186. Ransom, B. H. and Hedwen, S.: Horse Strongyles in Canada. Journ. of Am. Vet. Med. Ass. 1918, 53, S. 205. Riley, W. A.: A provisional Key to the adult Nematode Parasites of Equines. Trop. Vet. Bull. 1921, 9, S. 222. Le Roux, P. L.: Helminths collected from Equines in Edinburgh and London. Journ. of Helminthology 1924, 2, S. 129. Theiler, G.: The Strongylides and other Nematodes parasitic in the Intestinal Tract of South African Equines. Thèse Neuchâtel 1922, S. 77. Yorke, W. and Macfie, J. W. S.: Strongylidae in Horses. VIII. Species found in American Horses. Ann. Trop. Med. Parasit. 1919, 13, S. 138.

Innere Medizin und Chirurgie.

Heusser, H.: Über den Bau und die Funktionen des Pferdehufes und ihre Beziehungen zur Hufknorpelverknöcherung und zum Hufmechanismus. (Schweizerische Arch. für Tierheilkunde 1928, Bd. 70, S. 169—182. Mit 8 Abb.)

Durch den Mazerationsprozeß können gewisse anatomische Gebilde des Hufes derart zur Darstellung gebracht werden, wie es durch andere Präparationsmethoden bis anhin nicht möglich war. Insbes. gilt dies von der Hufbeinbeugeflehne und deren ausgedehnter Infertion an der Hufknorpelinnenfläche, vom Bau des Strahlkiffens und den Bändern des Fußes. Die Hufknorpel stellen neben ihrer Aufgabe, einem Teil der Wandlerhaut als Stütze zu dienen, Strebpfeiler dar, für die Anhaftung stoßbrechender Zugelemente, wie der Hufknorpeläste der tiefen Beugeflehne, des Strahlpolsterbandapparates und des Hufknorpelstrahlbeinbandes. Die Hufknorpelverknöcherung kommt zustande vornehmlich als Folge einer fortgesetzten Zerrung dieser Sehnen und Bänder, die im Moment des Abrollens am intensivsten ist. Der Strahlpolsterbandapparat stellt in seiner Gesamtheit ein kräftiges Spannband dar, welches die Hufbeinäste miteinander verbindet und derart über das Eckstreben gewölbe gelagert ist, daß einem Versinken der hintern Abchnitte des Hufbeins in der Hornkapfel wirksam begegnet wird. Durch die Inanspruchnahme des Eckstreben gewölbes als Widerlager für den Strahlpolsterbandapparat bei der Hufbelastung kommt eine hufmechanismusfördernde Wirkung dadurch zustande, daß durch Abflachung jenes Gewölbes die Erweiterung der hintern Hufabschnitte begünstigt wird. Durch den Hufmechanismus erfährt zufolge des nach Einwärtsziehen der Hufknorpel bei gleichzeitiger Erweiterung der Hornkapfel im Moment intensiver Hufbelastung die Blutzirkulation im Huf eine Förderung.

H. G.

Krause, B.: Die Bearbeitung des Hufes zum Beschlage von Lafosse bis in die Jetztzeit in historisch-kritischer Betrachtung und nach eigenen Erfahrungen. (In.-Diss. Berlin 1926.)

Krause gibt am Schlusse der historisch-kritischen Betrachtung eine Zusammenfassung der Grundsätze für rationelle Hufbeschlagsausführung, welche im Folgenden bestehen: I. Planer Auftritt, II. Gestreckter Verlauf der Zehenachse, III. Naturgemäße Form und Größe des Hufes, IV. Gleichmäßige Belastung aller Huftragerandteile, V. Breite Hufeisenaufgabe auf dem Hufe mit zweckentsprechender Oberflächen- und Umflächenpassung des Hufeisens. 1. Oberflächenpassung zwischen Tragerand und Hufeisenoberfläche in luftdichter, inniger Berührung. A. Huftragerand: aus Hornwand, weißer Linie, anschließendem Eckstrebenstück in 1½—2 cm Länge — je nach Hufform — und äußerem Sohlenrande in einer Breite von etwa Hornwandstärke an entsprechender Stelle. B. Hufeisenoberfläche: mit vom äußeren zum inneren Hufeisenrande um 1—2 mm — je nach Hufform — leicht nach innen geneigter Tragefläche, soweit die Wände schräg nach außen stehen oder im Bereiche der Nagellöcher, in allen Fällen anwendbar; mit horizontaler Hufeisenoberfläche mit in Breite und Tiefe von 1—2 mm gebrochenem inneren Hufeisenrande, bei hornstarken Hufen mit kräftiger Sohle, hornreichen Hufen ohne Nachteil anwendbar. Schenkelendenoberfläche im Bereiche des Trachten-tragerandes bei a und b stets horizontal. (Leicht nach außen geneigte Schenkelendenoberfläche gelegentlich bei Trachtenzwang verwendet, Ausnahmefall.) 2. Umflächenpassung zwischen Huf und Hufeisen: Bis zur weitesten Stelle des Hufes, d. i. soweit Hornwände schräg nach außen stehen, Richtung des Hufeisens nach dem Verlaufe des Huftragerandes, von da ab nach dem Verlauf der Hufkrone, Schenkelenden 4—5 mm — je nach Hufform und Gebrauchszweck des Pferdes mehr oder weniger — seitwärts und rückwärts vorstehend, beide Schenkelenden in gleicher Entfernung von der mittleren Strahlfurche, die Trachtenecken stets deckend.

A.

Woltmann: Über eine neue Art der Bruchoperation. (T. R. 1928, S. 110.)

Das Fohlen wird auf die linke Seite gelegt. Nach ent-

sprechender Zubereitung der Operationsstelle legt man in der Nähe der Bruchpforte parallel zur Bruchwand einen einige Zentimeter langen Hautschnitt an. Nachdem mit dem Zeigefinger der Bruchhals von der Haut losgelöst ist, legt man mit einer geknüpften Sonde einen starken Seidenfaden um denselben und unterbindet, indem man den Bruchfack nach unten ziehen läßt und die Seidenfaden nach oben zieht. Füllung der Wundhöhle mit Lugolscher Lösung. Es tritt starke Schwellung auf, die sich aber nach zehn Tagen zurückzubilden beginnt.

K. H. Meyer.

M ü n i c h : **Zum Schlundchnitt beim Bullen.** (T. R. 1927, S. 974.)

Das Tier wird auf die Seite gelegt, der Kopf gut gehalten. Über der Fremdkörperstelle wird das Haar geschoren und desinfiziert. Nach Bildung einer Hautfalte, um kein Gefäß anzuschneiden, wird ein 12—15 cm langer Hautschnitt gemacht. Das darunter liegende Gewebe wird stumpf lospräpariert. Nachdem man den Schlund genügend weit geöffnet, holt man den Fremdkörper mittels Krallenzange heraus. Sitzt dieser besonders hoch, schiebt man ihn mit dem Finger in die Maulhöhle; in diesem Falle braucht man den Schlundchnitt nicht so lang zu machen. Heilung erfolgt per primam bei täglicher Reinigung und Betupfen mit Jodtinktur in 4—6 Wochen. Man läßt dem Tier dauernd Wasser vorsetzen und verabreicht Heu, Klee oder Blätter.

K. H. Meyer.

T g e t g e l, H.: **Beobachtungen über Osteomalazie (Giallera, Malmagliar) im Engadin mit besonderer Berücksichtigung der Therapie.** (Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1928, Bd. 70, S. 126—158, 183—197.)

Im Engadin, schon früh beobachtet, kommt die Krankheit relativ häufig vor. Schon vor 300 Jahren habe man die erkrankten Tiere mit Wagen auf die Alpen führen müssen. Früher war sie derart verbreitet, daß in bestimmten Gegenden das Vieh nur schwer versichert werden konnte, da das Risiko für die Gefellschaften zu groß war. Besondere Gegenden haben die Krankheit manchmal endemisch. Dies wirkte sich in verschiedener Hinsicht für die Landwirtschaft sehr nachteilig aus. Die Beobachtungen des Verf. erstrecken sich auf etwa 500 Fälle im Engadin, wovon 50 ganz besonders eingehend studiert worden sind. Sie betrifft vorzugsweise das Rind, am meisten zwischen 10—14 Jahren, aber auch bei jedem anderen Alter; sie kommt auch bei Pferden und Ziegen vor. Sie tritt nur im Winter bei Heufütterung auf. Das Anfangsstadium wird gewöhnlich übersehen. Erfahrungsgemäß pflegt sie beim Weidegang auszuheilen. Es sind verschiedene Ursachen: Kalk- und Phosphormangel im Organismus, vererbte und erworbene Disposition, Mangel an Licht und Luft (Sonnenlicht) und Mangel an Vitaminen. Diese Ursachen sind durch genaue Beobachtung der Umweltfaktoren, Untersuchung des gefütterten Heues, namentlich auf Erdalkalien, durch Bodenuntersuchungen ermittelt. Bezüglich der Lichtwirkung und der Vitamine haben die therapeutischen Erfolge manche Aufklärung gebracht. Auch sind vergleichende Untersuchungen des Vitamins D, seinen Einfluß auf den Kalzium- und Phosphorstoffwechsel von anderer Seite zur Erklärung der guten therapeutischen Wirkung der Phosphor-Lebertran und Lichttherapie herangezogen. Das Heu ist von großer Wichtigkeit. Es kommt auf die Art des Einheuens und die Witterung an: überhitztes, schlechtgewittertes Heu fördert die Krankheit, offenbar weil im Erhitzungsprozeß die Vitamine zerstört worden sind. Die Symptome sind Lahmen, Auftreibungen an Gelenken, Verbiegen der Knochen, Auflockerung der Zähne, Abmageren, Stupidität, eine Manie, alle möglichen Substanzen zu benagen und aufzunehmen. Die Frühdiagnose ist durch genaue Anamnese und Beobachtung der Umweltfaktoren zu stellen und von einer bloßen Magenverstimmung zu differenzieren. Im weiteren Verlauf zeigt sich das Bild zunehmenden Zerfalles. Die Entwicklung der Krankheit erfolgt sehr langsam, beginnend mit perver-

Freßlust; dann kommen die Erscheinungen an den Gelenken und Knochen, schließlich Abmagerung und Anämie. Die Heilung hat in vier Fünftel der Fälle erreicht werden können. Rezidive können auftreten. Die Sektion ergibt besonders an den Gelenken (Abnahme des Knorpels, Defekte mit Geschwürbildung, vermehrte Synovia, mit Fibrinflocken, gelb-rötlich getrübt und dünnflüssig), die Gelenke zeigen überhaupt das Bild einer verschiedengradig heftigen Arthritis. Andererseits kann die Synovia vollkommen fehlen. Die Knochen selbst zeigen auffallend wenig Veränderungen (etwelche Brüchigkeit nur an den ulzerierten Gelenkstellen); Veränderungen im Verlauf des Knochens fehlen gewöhnlich; gelegentlich nur Verbiegung (z. B. Tibia). Für die oft bedeutende Trübung des Sensoriums hat man keine anatomischen Anhaltspunkte. Sie kann mit Ausfallserscheinungen im Mineralstoffwechsel teilweise erklärt werden. Prophylaktisch wird man der Heubereitung, dem Wechselbau der Wiesen größte Beachtung schenken, Kraftfutter mitverabreichen und vor allem für genügende Belichtung der Ställe sorgen. Therapeutisch hat Verf. im Anfang Murrentfett mit gutem Erfolge gegeben, in späteren Stadien mit Lebertran + Phosphoröl (Öl enthielt 1 Prozent Phosphor und wurde dem Tran 1:100 zugesetzt) sehr gute Ergebnisse erzielt; man kann bis 700 Gramm pro Tag während längerer Zeit geben; besonders bewährt hat sich 200 bis 300 Gramm täglich während 2—3 Monaten. Kalzium und Phosphor brauchen dann nicht gegeben zu werden, wenn sie im natürlichen Futter vorhanden sind. Die Wirkung der Trankur zeigt sich nach etwa 3—4 Wochen, freieres Sensorium, Besserung des Ganges, der evtl. örtlichen Erscheinungen, Zunahme der Milchleistung. Innerhalb 1½ bis 2 Monaten pflegen die Tiere geheilt zu sein; dabei ist kraftvolles Futter, Weidegang, Sonnenlicht von stark fördernder Wirkung. Bei dieser Behandlung können bis 95 Prozent der Fälle geheilt werden. Einige Krankengeschichten und spezielle Beobachtungen. Die Lektüre des Originals wird empfohlen.

H. Graf.

F r o e l i c h, H. W.: **Zur Kastration der Hengste mit der Eschini-Zange und der Schopperschen Derbyligatur.** (In.-Diss. Berlin 1927.)

Bei halbblutjährligen (kurzer dünner Samenstrang) und bei alten Kaltbluthengsten (ödematöse Unterhaut, dicker Samenstrang) ist die Anwendung der Zange oft unmöglich. Um die Quetschung bei geeigneten Pferden wirkungsvoll durchführen zu können, ist ein Umlegen der Hengste von der einen auf die andere Seite und ein Wiedereinfesseln und erneutes Ausbinden notwendig. Dies nimmt viel Zeit in Anspruch und ist in der Praxis sehr umständlich. Der Tierarzt kann die einzelnen Manipulationen allein nicht durchführen, er bedarf dazu einer geschulten Hilfskraft. Das Quetschen des Samenstranges ist für das Pferd ungemein schmerzhaft und löst, trotz Narkose, krampfartige Abwehrbewegungen aus (Frakturengefahr). Das Quetschen der Samenstränge, insbesondere das von Eschini geforderte mehrfache Quetschen, vor allem aber das Abreißen des Samenstranges ist eine ungemein rohe Manipulation. Sie wirkt auf den Laien grausam und unhuman. Bei älteren Hengsten ist der Erfolg der Operation, trotz zweimaliger Quetschung, oft erst nach Monaten festzustellen. Auch nach dieser Zeit zeigen die Kastraten noch Hengstmanieren, die ihre wirtschaftliche Ausnutzung einschränken. Bei feinhäutigen Pferden wird fast die ganze äußere Haut durchquetscht. Daher sind Wundinfektionen, insbesondere Tetanusinfektion, leicht möglich. Alte Hengste zeigen nach Quetschung des Samenstranges wochenlang sehr umfangreiche Schwellungen des Skrotums, des Schlauches und der Unterbauchgegend in einer Ausdehnung, wie man sie nach blutigen Operationsmethoden nicht zu sehen gewohnt ist. Nach Rückbildung der Schwellung vollzieht sich nach erfolgreicher Quetschung die Atrophie der Hoden nur sehr langsam. Die Pferde sind aber inzwischen — da sie noch

monatelang Hengstmanieren zeigen — im Handelsverkehr minderwertig und können von gewissenhaften Züchtern und Händlern nicht als Wallache verkauft werden. Für den Tierarzt ist die Entscheidung der Frage, ob ein mit der Eschini-Zange behandelter älterer Hengst noch Hengst oder Wallach ist, selbst nach Monaten oft sehr schwer. Die Eschini-Zange ist kostspielig und zeigt dazu zahlreiche technische Mängel. Sie verteuert das Instrumentarium des praktizierenden Tierarztes und macht durch ihr Gewicht (7 Pfund) den Instrumentenkoffer des Praktikers unnütz schwer. Die unblutige Quetschung der Samenstränge mit Hilfe der Eschini-Zange vermag die bei uns gebräuchlichen blutigen Kastrationsmethoden nicht zu ersetzen.

Soll die Derby-Ligatur exakt angelegt werden, so muß dem operierenden Tierarzt ein geschulter Assistent zur Seite stehen. Die Asepsis verbietet es aber, einen Laien zur Hilfeleistung heranzuziehen. Um beim Anlegen der Ligatur Zerrungen des Samenstranges zu vermeiden, muß dieser bauchwärts von der Ligatur erfaßt und festgehalten werden. Eine Infektion des im Leistenraum verbleibenden Samenstrangstumpfes ist hierbei oft unvermeidlich. Die auf den Samenstrang (einschließlich gemeinschaftliche Scheidenhaut) angelegte Derby-Ligatur bedingt nach dem Aufstehen des Pferdes bisweilen eine starke Schmerzáußerung (kolikähnliche Erscheinung). Eine derartige Komplikation macht den Besitzer ängstlich und erweckt den Eindruck, als ob die Operation nicht vorschriftsmäßig verlaufen sei. Bei den mit Derby-Ligaturen versehenen Kastraten treten oft starke Schwellungen und Temperatursteigerung ein. Das Entfernen der Ligatur nach fünf Tagen, wie es Schopper vorschreibt, ist am stehenden Pferde oft nicht möglich. Es kann dazu ein erneutes Niederlegen des Patienten notwendig werden. Es darf das Entfernen der Ligatur keinesfalls dem Besitzer überlassen werden, wie dies Schopper empfiehlt (Gefahr der Wundinfektion). Stets bildet der an der Ligatur befestigte und aus der Wunde hervorstehende Seidenfaden eine Gefahr für die Wunde (Infektion). Tritt eine Nekrose des abgesehnürten Samenstrangstumpfes nicht ein und verbleibt die Ligatur auf dem Samenstrang liegen, so kann eine Samenstrangfistel zurückbleiben. Die Ligatur kann andererseits trotz sorgfältigen Anlegens abgleiten und eine Nachblutung eintreten. Auch Netz- und Darmvorfälle sind in diesem Falle nicht ausgeschlossen. Der Ansicht Schoppers, daß durch seine Derby-Ligatur das Instrumentarium des kastrierenden Tierarztes vereinfacht würde, kann man nach den Erfahrungen nicht beitreten. Der Tierarzt ist, um Zufällen vorzubeugen, gezwungen, Emaskulator und Kluppe vorrätig zu halten. Nach den ungünstigen Erfahrungen, welche mit der Derby-Ligatur als Kastrationsmethode in der Chirurgischen Klinik gemacht worden sind, ist der Ansicht Silbersiepes beizutreten, daß die Derby-Ligatur kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt der operativen Veterinärchirurgie ist. Die Schopper'sche Methode ist für die Praxis ungeeignet und im höchsten Grade unsicher und kann daher dem praktizierenden Tierarzt nicht empfohlen werden. Sie ist schlechter als die Kluppenmethode und vermag erst recht die Emaskulatormethode nicht zu verdrängen. A.

Walther, E.: Der Einfluß der Bestrahlung mit künstlicher Höhensonne auf das Blutbild verschiedener Versuchstiere sowie auf den Keimgehalt infizierter Kuhmilch unter besonderer Berücksichtigung der Bestrahlungstherapie zur Bekämpfung von Aufzuchtkrankheiten in zoologischen Gärten. (In.-Diss. Berlin 1927.)

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, daß bei behaarten, pigmentierten Tieren (Meerschweinchen, Kaninchen) auch durch längere und des öfteren wiederholte Bestrahlung mit künstlicher Höhensonne weder Erythem noch eine Veränderung des roten bzw. weißen Blutbildes oder des Hämoglobingehaltes erreicht wird (vorhandene Schwankungen

um 0,1—0,5 Millionen sind durchaus physiologisch. Kurth fand bei seinen Untersuchungen solche um 0,5—0,7 Millionen). — Auch physikalische Momente können eine Änderung der Blutkonzentration herbeiführen und damit der Erythrozytenzahl. Bei einem unpigmentierten Ferkel angestellte Versuche ergaben dieselben Resultate. Beim Menschen tritt neben Erythem eine Vermehrung der roten Blutkörper ein. Auch die weißen Blutkörperchen erfahren eine Vermehrung zu Gunsten der Lymphozyten. Der Hämoglobinwert erleidet nur geringe Schwankungen. Die Versuche lassen erkennen, daß auch bei Tieren in zoologischen Gärten kaum eine Beeinflussung des Blutbildes unter der Einwirkung künstlicher Höhensonne zu erwarten ist. Ob indessen der therapeutischen Anwendung künstlicher Höhensonne bei Aufzuchtkrankheiten von Tieren in zoologischen Gärten eine gleich günstige Bedeutung zukommt wie bei gewissen Kinderkrankheiten des Menschen, läßt sich hämatologisch nicht entscheiden. Auch durch intensive und langdauernde Bestrahlung konnte abgekochte und danach mit Paratyphus B und Gärtner infizierte Kuhmilch nicht sterilisiert werden. Selbst eine Abschwächung der Virulenz der Erreger blieb aus. Ob die Anwendung der künstlichen Höhensonne infizierte Milch von Kühen, welche an Streptokokkenmastitis litten, irgendwie beeinflusste, konnte durch die angestellten Versuche nicht erwiesen werden. Ob es möglich ist, durch die in verschiedenen zoologischen Gärten übliche Bestrahlung die Milch vor der Verabfolgung zu aktivieren und damit ihren Nährwert zu erhöhen, soll hier nicht entschieden werden; da es aber, wie durch die Versuche erwiesen, nicht gelingt, sie durch Einwirkung der künstlichen Höhensonne gleichzeitig zu sterilisieren, muß vor Verwendung der Milch in ungekochtem Zustande gewarnt werden. A.

Giovanoli, G.: Über die Gefährdung durch Schlangenbisse. (T. R. 1927, S. 775.)

Die Gefährlichkeit eines Schlangenbisses hängt ab von der Menge des eingeführten Giftes, von der Tiefe des Bisses, der Lage und Beschaffenheit des gebissenen Körperteils und der Widerstandsfähigkeit des Gebissenen. In der Nachbarschaft der Bißwunde entwickelt sich eine rasch an Umfang zunehmende, schmerzhafteste, teigig-ödematöse Anschwellung; sehr bald tritt eine lähmungsartige Schwäche des Bewegungs Vermögens hinzu, die Tiere sind unfähig zu gehen, liegen am Boden und sind schwer zum Aufstehen zu bewegen. Das sicherste Schutzmittel ist zweifelsohne die Ausrottung der Giftschlangen. Ein kräftiger Schlag mit einem Stock oder Stein ist hinreichend, um der Schlange das Rückgrat zu brechen und sie wehrlos zu machen. Man veräume aber niemals, den Kopf zu zerfetzen, denn der vom Leibe getrennte Kopf der Viper züngelt und beißt ebenso wütend um sich, wie vorher. Der Tierarzt bekommt die gebissenen Tiere erst zur Behandlung, wenn das Gift bereits im Körper kreift. Es empfiehlt sich folgende Behandlung: Man lege einen Kreuzschnitt in die Haut bis auf das gesunde Gewebe, presse die vorhandene gelbliche Flüssigkeit aus und wasche die Wunde mit Alkohol aus. Innerlich gebe man Brantwein, um die bald in den Vordergrund tretende lähmende Wirkung des Giftes zu beseitigen: Großvieh bis zu 1 Liter, Kleinvieh 2—300 Gramm. Ein Mittel, das Gift im Blute zu neutralisieren, besitzen wir nicht. Die Arbeit enthält Ausführungen über Lebensweise und Naturgeschichte der Giftschlangen, einzelne Krankheitsgeschichten und sofort nach Schlangenbissen zu ergreifende Maßnahmen, welche im Original nachgelesen werden müssen. K. H. Meyer.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Helm: Das Vorkommen von Geflügeltuberkulose beim Schwein. Zugleich ein Beitrag zur Züchtung der Tuberkelbazillen nach der Methode von Hohn. (Aus d. Veterinärabteilung des Reichsgesundheitsamtes.) (Arch. für wiss. Tierheilkunde 1928, 57, S. 230.)

Verf. untersuchte 117 tuberkulös veränderte Organe von Schweinen. Durch bakterioskopische Prüfung war es nicht möglich, zu ermitteln, ob die tuberkulösen Veränderungen durch den Typ. bovinus oder gallinaceus verursacht waren. Dagegen gelang die Differenzierung sicher durch den Tierversuch an Hühnern, Ratten und Meerfischweinen. In 38,9 % wurde so Typ. gallinaceus nachgewiesen. Das Kulturverfahren nach H o h n erwies sich als sehr wertvolle Bereicherung der Kulturmethode, indem es in fast 90 % gelang, aus verunreinigtem Material Tb.-Bakterien rein zu züchten. Durch den H r u s k a 'schen Versuch gelang die Differenzierung nicht. Ebenfalls erwies sich eine Unterscheidung durch histologische Untersuchung als möglich. Geiger.

v. S e i g n e u x : Zur bakteriologischen Diagnose des Rauschbrandes. (Aus dem hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Berlin. — Direktor: Geh. Med.-Rat Dr. P. F r o s c h.) (Arch. für wiss. Tierheilkunde 1927, 56, S. 420.)

Die Erzielung typischer Wuchsformen nach Zeißler ist nach der auf Untersuchungen gegründeten Ansicht des Verf. nicht leicht. Von grundlegendem Einfluß sind Zusammensetzung und Alkaleszenz des Nährbodens, Feuchtigkeit der Nährsubstrate und die Methode der anaeroben Bebrütung. Die Oberflächenkulturen sind daher nur mit Vorsicht zu verwerten. Der Meerfischweinenversuch und der komplizierte Tierversuch ist differentialdiagnostisch unzuverlässig. Für die Veterinärmedizin liegt eine große Schwierigkeit bei der Untersuchung darin, daß die eingefandten Muskelproben meist auch Pararauschbrandkeime enthalten, die die Rauschbranderreger überwuchern. Das Zeißler'sche Verfahren eignet sich nur für Untersuchungsstellen, die sich laufend mit solchen Untersuchungen befassen und genügende Erfahrung besitzen. Geiger.

D a h m e n : Über die diagnostischen Hilfsmittel bei der Ermittlung der Lungenfeuche der Rinder. (Aus dem hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin. — Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. P. F r o s c h.) (Arch. für wiss. Tierheilkunde 1928, Bd. 57, S. 251.)

Für die Ermittlung der Lungenfeuche hat sich die Blutuntersuchung mittels Komplementbindung und der Präzipitations-Agglutinationsreaktion als gutes Hilfsmittel zur Ergänzung der klinischen Untersuchung bewährt. Zur Unterstützung der pathologisch-anatomischen Diagnose ist die kulturelle Untersuchung von Veränderungen an den Lungen unerlässlich. Von den allergischen Methoden ist die Lidprobe unzuverlässig. Die thermische Reaktion nach Giese kann erst nach Abschluß der Blutuntersuchung angewendet werden. Chemotherapeutische Mittel, z. B. Neosalvarsan eignen sich nicht zur Bekämpfung der Lungenfeuche, weil sie, ähnlich wie bei der Tuberkulose, an die abgekapselten Herde nicht heranzubringen sind. Durch zahllose Blutuntersuchungen konnte erwiesen werden, daß die Lungenfeuche durch Deckakt oder einfache kurzfristige Berührung nicht übertragen wird. Die Beobachtung darf sich nicht nur auf das kranke und ansteckungsverdächtige Vieh beschränken, sondern muß das gesamte Vieh der Ortschaft, in der ein Lungenfeuchefall aufgetreten ist, sowie etwaige Zwischenträger (Händler usw.) berücksichtigen. Geiger.

Schutzimpfung gegen die Tollwut der Tiere.

Nach dem Prager Archiv für Tiermedizin und vergleichende Pathologie hat man in der Tschechoslowakei bei der Durchführung der Impfungen gegen die Tollwut bei einigen tausend Hunden, die der Tollwutinfektion nicht verdächtig waren, und auch bei verschiedenen anderen Tiergattungen, die im Verdacht der Ansteckung durch Tollwut waren, gute Erfahrungen gemacht. Mit Rücksicht hierauf hat sich das dortige Ackerbauministerium damit einverstanden erklärt, daß eine allgemeine freiwillige Schutzimpfung von gefunden, nicht gebissenen Hunden durch die Amtstierärzte vorgenommen wird. In besonders verseuchten oder bedrohten Gegenden kann die obligate Schutzimpfung aller

Hunde und Katzen nach der Regierungsverordnung vom 10. Juni 1927 vorgenommen werden. Dies geschah z. T. im Bezirk Tani, wo in 24 Gemeinden 869 Hunde obligatorisch geimpft wurden, weil in der Zeit von zwei Monaten vor der Impfung in dieser Gegend 61 Fälle von Tollwut vorgekommen sind. Nach Durchführung der Zwangsimpfung ist die Tollwut dort nicht mehr aufgetreten. Die freiwillige Schutzimpfung der Hunde gegen Tollwut wird auf Kosten des Hundebesitzers mit einem von der staatl. Veterinäranstalt in Ivanovice erzeugten Impfstoff subkutan ausgeführt und verschafft dem Tiere eine sichere, bis zu einem Jahre dauernde Immunität gegen natürliche Ansteckung mit Wutgift.

Die Tschechoslowakei ist in Mitteleuropa der erste Staat, wo die Schutzimpfung gegen die Tollwut in größerem Umfange und mit gutem Erfolge durchgeführt wird.

Edelmann.

Hardenbergh, J. G. and Schlotthauer, C. F.: Incidence of mastitis and the infecting organism in four dairy herds. (Journal of infect. diseases 1927, Bd 40, S. 667.)

Verff. fanden als Ursache der infektiösen Mastitis vorwiegend Streptokokken. Daneben traten vereinzelt Staphylokokken und Bakterien der Coli-Typhusgruppe auf. Schoop.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Schwangart, F.: Zur Stammes- und Typenkunde der Hauskatze. (Arbeit der Reichs-Zentrale für Pelztier- und Rauchwaren-Forschung.) (Aus Zeitschrift für Pelztierkunde „Die Pelztierzucht“, April 1928, Nr. 2, 3 und 4, 31 Seiten.)

Verf. faßt als „Hauskatze“ die Gesamtheit domestizierter Kleinkatzen, zum Unterschied von wildlebenden Sorten auf. Nach Hilzheimer tut man gut, zur Annahme einheitlicher Herkunft zurückzukehren; als einzigen Ahnen möchte man heute die afrikanische Falbkatze (*Felis ocreata* Gm., in nubisch-ägyptischen Sonderformen) ansehen. Von jeher hat man zwischen einem hochgestellten, schlankeren und einem kleineren, mehr gedrungenen Typ. unterschieden, die Übergänge zeigen. Verf. neigt dazu, den gedrungenen Typ für ursprünglich zu halten und freilich auch für ein Haustier, den schlankeren aber für das Produkt einer Hochzucht zu nehmen, durch Selektionierung von gezüchtetem oder durch Stammwahl aus wildem Material entstanden. Ein solcher Formgegensatz wird auch bildlich in unserem gegenwärtigen alteingesessenen Kurzhaarbestand erläutert. Der schwerere Schlag dürfte Einkreuzungen unserer eigenen Wildkatze (*Felis silvestris*) zu verdanken sein, deren sonstige Unterscheidungsmerkmale eingehend auseinandergesetzt werden. Es kommen vier Gattungen in Frage:

1. *Felis silvestris* ist struppig oder wollig, im Grundton (Einschlag von Gelb oder Rötlich im Grau) variierend an Intensität, Kontrastierung und Verlauf der Streifen.

2. *Felis ocreata* Gm. mit Neigen der Streifen zum Aufgehen in die Farbe des Grundes.

3. *Felis caudata* Gray mit Auflösung der Streifen in distinkte Flecke.

4. Der Manul, von ihm sollen nach Vermutung von Pallas unsere Langhaarkatzen (Perser, Angora) abstammen.

In der Katzenzüchtung sind uns England und Frankreich vorangegangen. Aber auch die englische Sortenauffassung (die bessere von beiden) krankt an irrigen Grundfätzen.

1. Die Färbung gibt dort einseitig den Ausschlag, nur wenig bedeutet die Form. 2. Einseitige Achtung genießen die sog. „Rassekatzen“, also Langhaar und der exotische Kurzhaartyp der Siam, im Gegensatz zu den „Domestics“. 3. Man neigt in England zur Zucht auf Degeneration (man bevorzugt unter den weißen Katzen die zur Hälfte tauben blauäugigen, ebenso die knoten- und knickschwänzigen, die so-

gar schwanzlos werden, und die schieläugigen). 4. Man mißachtet die ursprünglich gearteten graugemusterten Schläge bei Kurzhaar im Vergleich zu Einfarbenen und Schecken, den sekundär überfärbten.

Im übrigen teilt Verf. die Katzen ein in:

I. Kurzhaar.

1. Heimischer Kurzhaartiger. Tigerzeichnung, Kurzgesicht, Kopf und Schwanz breit; Stirn weder empor- noch übertrieben vorgewölbt. Nacken stark. Statur gedrungen auf stämmigen Beinen. Rute kurz, etwas buschig. Mit vier sicheren Untertypen.

a) krautiger wildfarbener Kurzhaartiger; gelbgrau, bräunlich-grau bis reingrau, schwach abgehobene Streifung. Rauhaar. Weißer Kehl- und Bauchfleck.

b) Zebrakatte, scharf und durchgezogen gestreift; keinerlei Weiß, Augen grau oder zitron.

c) Braun- (bezw. Rot-, Gelb-)tiger, keinerlei Weiß, meist verschwommenes Muster, Augen gelb, orange, ambra.

d) Blautiger, Grund und Muster deutlich blaugrau, der Grund heller. Kein weiß, Augen gelb oder grau.

2. Edle Schlankform. Gegensatz zu 1. Einfarben mit leichtem Anflug von Streifung, mehrfarbig, evtl. Schecken. Kopf schmal, Schnauze gestreckt, sich gleichmäßig verjüngend. Stirn emporgewölbt. Hals schlank, Nacken fein, feingliedrig, hochbeinig, schlanker Leib. Langer, dünner, buschiger Schwanz. Augen nach der Pelzfarbe.

3. Marmor an Stelle der Tigerzeichnung, ein typisches Barockmuster; schwerer oder schlanker. Farbnuancen wie bei Tigern; Marmormuster sich gut abhebend; eher samtiges Haar; Augen lichtgelb bis grün bei den grauen, eher orange bis ambra bei den rotbraunen und gelben.

4. Siam, importierte Hochzuchtrasse; Herkunft von getigerten Ahnen, verrät sich in ausnahmsweiser Andeutung von Streifen. Grundfarbe ein zartes Crem; Ohren, Pfoten, andere Stellen braun, in der Symmetrie eine Maskenkatze. Augen blau, gegen das Licht rubinen leuchtend.

II. Langhaar, in England gezüchtet (in Deutschland sollte der Hauptwert auf heimisches Kurzhaar gelegt werden).

1. Perser.

2. Angora (von den Engländern nicht anerkannt).

Vererbungswissenschaftlich interessieren noch mehr als Siams und Angoras unter den Hauskatzen die Dreifarbschecken, mindestens die sog. „reinen Schildpatts“, gelb-rotbraun-schwarz ohne Weiß. Diese Tiere kommen bekanntlich fast ausschließlich weiblich vor. Wenige in England ermittelte Männchen waren steril.

Otto Zietzschmann (Hannover).

Sellentin, R.: **Untersuchungen in der Stammschäferei Blumenhagen.** (In.-Diss. der Landw. Hochschule Berlin 1927.)

Verf. bespricht das Fleischwollschaf in Frankreich und Deutschland, die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse der Stammschäferei Blumenhagen, die Entwicklung der Herde, die wichtigsten Bockstämme, Untersuchungen über die weiblichen Familien, Leistungsprüfung und Untersuchungen über Zwillingsgeburten. Die Ergebnisse der Untersuchungen über die Frage der Zwillingsgeburten sind einerseits geeignet, viele noch heute in der Praxis vorhandene Anschauungen über sie zu entkräften, wie andererseits die auf diesem Gebiete heute vorliegenden neueren Untersuchungen zu bestätigen und zu unterstützen. Für die praktische Züchtung aber, soweit sie eine Steigerung des Zwillingsprozentatzes in ihren Herden erstrebt, ergibt sich die Notwendigkeit, weitgehend zu erforschen, welche Erbanlage für Zwillingsvererbung für jedes einzelne zur Zucht kommende Tier, also für die Böcke, anzunehmen ist. Dabei wird es schon von wesentlichem Vorteil sein, wenn man die weiblichen Familien für mehrere Jahre nach dem von ihnen hervorgebrachten Zwillingsprozentatz aufrechnet und bei der Paarung und Merzung den Angehörigen zwillingsreicher Familien besondere Auf-

merksamkeit zuwendet. Auch die besondere Kennzeichnung der Zwillingstiere und ihrer Nachkommen in den Zuchtbüchern und bei den Tieren selbst wird für diese züchterische Arbeit eine gute Hilfe sein. Doch darf man hierbei nicht vergessen, daß die bei der Vererbung der Zwillingsanlagen sich abspielenden Vorgänge — wie alle übrigen Vererbungsvorgänge auch — so verwickelte sind, daß auch die oben gekennzeichneten Zuchtungsmaßnahmen nur eine bedingte Gewähr für die Steigerung des Zwillingsprozentatzes geben können. Erst die eingehende Familienforschung, die es ermöglicht, auch die auftretenden Abspaltungen zwillingsfreier Äste zu erkennen, wird dazu führen, mit verhältnismäßig genügender Sicherheit die tatsächlich vorhandenen Erbanlagen zu erkennen und für die Züchtung zu verwerten. Doch erst dann werden der Züchter und der Schafhalter an diese züchterische Betonung der Zwillingsgeburten gehen können, wenn die erste Voraussetzung für die Entfaltung der Zwillingsanlagen eine ausreichende, kräftige Ernährung, in der Herde gegeben ist. Auf diese überaus wichtige, aber oft vergessene Vorbedingung, die auch durch die Untersuchungen in Blumenhagen wiederum neue, eindeutige Bestätigung erfuhr, sei noch einmal besonders hingewiesen.

A.

Baur: **Neuzeitliche Vererbungserkenntnis.** (Tierzüchterische Streitfrag. Verlag M. & H. Schaper, Hannover, 1927.)

Die Zucht ist in die Praxis umgesetzte Vererbungslehre. Jeder Organismus, jede Pflanze, jedes Tier vererbt nur das, was es selbst ererbt hat. Die Erkenntnis des Zuchtwertes ist nur auf Grund von Nachzucht möglich; es ist falsch durch besonders gute Futter- und Haltungsmaßnahmen schlechte Anlagen zu verdecken. Zuchttiere dürfen höchstens unter normalen, besser sogar unter sehr harten Bedingungen aufgezogen werden. An Hand von Beispielen wird kurz die Mendelsche Spaltungsregel gestreift. Höchstleistungen sind nur dann möglich, wenn die Tiere möglichst viele günstige Erbfaktoren homozygotisch enthalten, für die Haustierzucht bleibt hierfür der gefährvolle Weg der Inzucht. Um zu hohen Leistungen zu kommen, verlangt der Verf. die völlige Abkehr von jeglichem Formalismus, so hält er beispielsweise den Farben- und Formenkult in der Geflügelzucht, eine Trennung von schwarz- und rotbunten Niederungsvieh, von schwarzen und weißen Schweinen mit Steh- oder Hängeohr für hoffnungslos rückständig. Konstant und einheitlich soll die Rasse in ihren praktisch wichtigen Eigenschaften sein, alles andere ist Sport und Spielerei. Weitausholende Kombinationszüchtungen sind in der Tierzucht praktisch unausführbar, aber durch einfache Kombinationszüchtungen aus verschiedenen Rassen mit verschiedenen Anlagen für dieselben Nutzungseigenschaften kann eine beträchtliche Steigerung der Leistung über die Ausgangsrassen hinaus erreicht werden. Diese Art der Züchtung (Transgressionszüchtung) wird aber hoffnungslos erschwert, wenn unnötige Merkmale berücksichtigt werden sollen.

Arcularius.

Schmidt: **Leistungsprüfungen und Schweinezucht.**

(Tierzüchter. Zeitfragen. Verlag M. & H. Schaper, Hannover, 1927.)

Die gesunde formalistische Beurteilung soll vertieft werden durch Leistungserhebungen, die Körperbeurteilung muß aber die Hauptrolle behalten, denn das Gesamtaußere steht im engsten Zusammenhang mit der Nutzung. Der Verf. beschreibt die Organisation der Schweinezucht und die Durchführung der Leistungsprüfungen in Dänemark, Schweden und Nordamerika. Für Deutschland wäre als Mindestforderung zu verlangen: das Vierwochengewicht des Wurfes und der Ferkel (einzeln), sowie die Zahl der geborenen Ferkel (auch der toten), diese Zahlen lassen Rückschlüsse auf Fruchtbarkeit und Säugeleistung der Mutter, sowie auf die Entwicklungsfreudigkeit der Nachkommenschaft zu; spätere Abfatzgewichte sind zu stark von dem Futter beeinflusst. Für eine beschränkte Anzahl von Zuchtfauen kann noch ein zweiter Teil, die Probemästung und Probefschlachtung, in Frage kommen. Aus dem Bericht über die

Göttinger Probemaßverfuche sei nur kurz entnommen, daß die Maßt mit der 13. Lebenswoche beginnt und bei einem Gewicht von etwa 110 kg endet. Das Gewicht wurde von den besten Tieren in 79 und von den schlechtesten in 156 Lebenstagen erreicht; die größte durchschnittliche Tageszunahme betrug 964,8 Gramm und die kleinste 526,3 Gramm; die besten Tiere brauchten 258,2 kg Stärkewerte und 32,0 kg Eiweiß zur Erzeugung von 100 kg Lebendgewicht und die schlechtesten 330,2 kg Stärkewerte und 41,8 kg Eiweiß. Weiter berichtet der Verf. noch über die Wichtigkeit vom Fleisch-Fettverhältnis und dem Schlachtverlust. Zu erstreben sind Schweine mit einer guten Veranlagung zur Fleischwüchsigkeit, die mit 100—125 kg Lebendgewicht schlachtreif sind.

Arcularius.

Bartels, Joh.: Staatliche Maßnahmen zur Förderung der Schafzucht in Preußen im 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, insbesondere die Einführung des spanischen Schafes. (In.-Diss. Berlin 1928.)

Die preußische Landesschafzucht stand im 18. Jahrhundert unter schwierigen Verhältnissen, und es bedurfte eingreifender Maßnahmen des Staates, um hier Wandel zu schaffen. Mit Recht wird der Einführung des Merinoschafes die größte Bedeutung für die nachfolgende Blütezeit des Wollschafes in Deutschland beigemessen. Der preußische Staat hat von Anfang an und vorbildlich für die Einbürgerung der Merinos gewirkt. Noch ehe Privatzüchter ernstlich daran dachten, kaufte er selbst in Spanien ein. Als dann im beginnenden 19. Jahrhundert die Nachfrage nach diesem Schaf größer wurde, unterstützte er Privatankäufe und gründete selbst aus umfangreichen Ankäufen eigene Stammschäfereien, die für die Verbreitung der Merinos und vor allem für ihre planvolle Zucht Hervorragendes leisteten. Der Landesschafzucht war so die Richtung gewiesen, und jeder weitere Anstoß seitens des Staates war überflüssig. Alle anderen Umstände sprachen dafür, daß das Zuchtziel sich auf das feine Wollschaf richten mußte. Trotzdem ist gar nicht zu verkennen, daß es mit der Einfuhr des spanischen Schafes allein nicht getan war. Um diese wirklich fruchtbar für die Landesschafzucht zu machen, bedurfte es noch mancherlei Änderungen in der Rechtsauffassung und Wirtschaftsregelung, der Beseitigung des Wollausfuhrverbotes, Erleichterung der Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, Hebung der Verkehrsverbindung im Lande. Das alles schaffte der Industrie neue Absatzmöglichkeiten und förderte die Erzeugung ihrer Rohstoffe in der Landwirtschaft. Eine größere Bewegungsfreiheit war nötig, wenn der Landwirt sich ernstlich mit der Schafzucht befaßte. Bisher hatten ihn die herkömmlichen Rechte der Schäfer, besonders in der Haltung und Mitnahme eigener Schafe, vielfach von einer erfolgreichen Zucht abgehalten. Erst alle diese scheinbar nebenfächlichen Neuerungen haben zusammen die staatliche Förderung der Schafzucht so wirksam gemacht. Die Folgezeit bewies, welcher Ausdehnung die preußische Schafzucht auf Grund der neuen Gestaltung der Verhältnisse noch fähig war. Im Jahre 1861 sind 50,4 Prozent mehr Schafe als 1825 vorhanden. Die Vermehrung geht also nicht mehr so stürmisch vor sich wie in den neun Jahren vor 1825. Der Höhepunkt wird im Jahre 1864 erreicht mit 19 329 030 Schafen. Von da an setzt eine regelmäßige Abnahme ein, am meisten wohl veranlaßt durch die weitere Verbreitung der Merinos in anderen Weltteilen, die dann die Versorgung Europas mit Wolle zum größten Teil übernehmen. Der gegenwärtige Bestand in Preußen mit 3 177 505 Schafen im Jahre 1925 liegt weit unter den Zahlen selbst des viel kleineren Gebietes im 18. Jahrhundert. Die Veredelung hält mit der Vermehrung gleichen Schritt und wird später, als die Fleischrichtung allgemeiner eingeschlagen wurde, nicht mehr amtlich festgestellt. Die Geschichte der Schafzucht, wie sie hier geschildert worden ist, beweist, wie ein bestimmter Betriebszweig von ausschlaggebender Bedeutung

werden kann. Es ergibt sich aus den Ausführungen aber gleichzeitig, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse entscheidend sind für die Stellung der einzelnen Betriebszweige, und weiter, daß eine verständnisvolle Unterstützung die Landwirtschaft wesentlich zu fördern vermag.

A.

Rohwedder, W.: Untersuchungen in der holländisch-friesischen Rindviehzucht über die Milch- und Fettvererbung. Die Jan 3265 Blutlinie. (In.-Diss. der Landw. Hochschule Berlin 1927.)

Bei 51 von 70 untersuchten Tieren stimmt der von den Söhnen vererbte Fettgehalt mit dem der Mütter resp. Urgroßmütter überein. Bei sechs Bullen ist, wenn man die Möglichkeit berücksichtigt, daß die Urgroßmutter eine Plusvariante, die Mutter aber eine Minusvariante oder umgekehrt war, und der Mittelwert dann dazwischen liegt, der vererbte Fettgehalt ebenfalls zu erklären. Nur in dreizehn Fällen kann eine ausreichende Deutung nicht gegeben werden. Dieses Ergebnis ist zweifellos auffallend und könnte zu der bestimmten Behauptung verleiten, daß die Fettgehaltvererbung tatsächlich diesen Weg geht. R. ist sich aber bewußt, daß diese rohe Gegenüberstellung Fehlerquellen enthält und die Auslegung etwas Gezwungenes an sich hat, und vor allen Dingen dieser Erbgang mendelistisch nicht zu erklären ist. Bei der Unmöglichkeit neben dieser Arbeit noch vererbungswissenschaftlichen Studien nachzugehen, mußte Verf. sich deswegen darauf beschränken, ohne einen Schluß zu wagen, auf diese Erscheinung an Hand der Ahnentafeln, die reicher als in anderen Zuchtgebieten mit Leistungsnachweisen versehen sind, hingewiesen zu haben. Diese Frage bedarf weiterer Klärung. Bei aller Einschränkung muß das friesische Bestreben, möglichst nur Bullen mit hohem Fettgehalt aufzuziehen, als richtig anerkannt werden. Bei den Distriktskörungen in Friesland werden nämlich nur Söhne von Müttern mit einem Fettgehalt von mindestens 3,25 Prozent berücksichtigt. Es stehen heute in Friesland eine große Zahl von Kühen über 3,5 Prozent Fett zur Zucht zur Verfügung; fraglos wird man in kurzer Zeit eine weitere Fettgehaltssteigerung erreicht haben. Daß diese Steigerung nicht auf Kosten der Milchmenge gehen darf, bedarf keiner Erwähnung. Die ganze Größe des Vorsprunges zeigt die Tatsache, daß Woda n 6204 hundert Töchtern einen Fettgehalt von 3,81 Prozent durchschnittlich mitzugeben vermochte. Solche Leistungen haben abgesehen von der rein wirtschaftlichen Bedeutung auch einen solchen für den Viehabatz, besonders nach dem rekordsuchenden Amerika. Holland hat 30 Jahre zur Erlangung der heutigen Leistungshöhe gebraucht, wir dürfen diese Zeit nicht darauf verwenden. Bei aller Würdigung der Nachteile und Gefahren sollte daher nüchtern überlegt werden, ob es nicht richtig wäre, einmal bestes Bullenmaterial aus dieser fettsteigernden Linie aus Friesland zu holen, um durch einmalige Einmischung jahrelange Züchterarbeit zu ersparen. Wenn wir daneben dann auch von unseren Bullenmüttern mindestens einen Fettgehalt von 3,20 Prozent verlangen und nicht mehr mit Kühen unter 3 Prozent zufrieden sind, so werden wir in kurzer Zeit auch auf diesem Gebiete Verfümtes zum Nutzen unserer Volks- und Landwirtschaft einzuholen vermögen.

A.

Lehmann: Die Fütterung unserer Nutztiere nach dem Stand neuerer Erkenntnis. (Tierzüchterische Streitfragen. Verlag M. & H. Schaper, Hannover, 1927.)

Bei der Betrachtung über die Ausdrucksweise für den Wert eines Futtermittels kommt der Verf. zu dem Schluß, daß keine Veranlassung besteht, von Kellners Methoden abzugehen oder neue Namen zu wählen. Die Ration für Milchvieh ergibt sich aus dem Erhaltungsfutter (für 500 kg Lebendgewicht 3 kg Stärkewert und 0,3 kg Eiweiß) plus der für die Erzeugung der Milch notwendigen Menge von Nährstoffen. Für je 10 Liter Milch verlangt der Verf. 2,5 kg Stärkewert und 0,5 kg Roheiweiß. Dazu sind für 500 kg

Körpergewicht noch 4,3 kg Ballastfutter für den normalen Ablauf der Verdauung notwendig. Die Ballastmenge ändert sich mit der Leistung nicht, so daß mit der höheren Leistung die Futterration höher verdaulich werden muß. Futtermischungen werden für nützlich gehalten. Das wirtschaftseigene Futter ist weitgehend zur Fütterung heranzuziehen, und je nach dem verfügbaren Wirtschaftsfutter ist die Zulage der Mischung zu berechnen. Die Mast der volljährigen Tiere erzeugt eine Gewichtszunahme, die aus bedeutend mehr Fett als Fleisch besteht (günstigenfalls 1:3), bei wachsenden Tieren ist das Verhältnis etwa 1:1, und bei ganz jungen Tieren verhält sich der Zuwachs etwa Fleisch:Fett wie 3:1. Die drei Mastarten unterscheiden sich auch im Futterverbrauch, je stärker der Fleischzuwachs um so billiger ist die Mast. An Hand von vielen Beispielszahlen werden die Grundsätze für eine neuzeitliche Mast von Schweinen, Rindern, Kälbern und Geflügel besprochen. „Neuzeitliche Mast ist Jungviehmast.“ Arcularius.

Linnenkohl, W.: Beitrag zur Feststellung der Gewichtsverhältnisse der Fleischqualitäten beim veredelten deutschen Landschwein. (In.-Diss. Leipzig 1927.)

Der Hauptwert der Schlachttiere liegt im eigentlichen Fleische, d. h. der Skelettmuskulatur. Die Einstufung der Fleischqualitäten erfolgt nach Edelmann in vier Wertungen (ausgenommen bei Pferd und Hund der Zahl nach gleich). Beim geschlachteten Schwein gelten hiernach als I. Qualität: Keule (Schinken) und Rücken; II. Kamm, Blatt, Bruststück; III. Schälrippe, Bauch; IV. Eisbein, Kopf mit Backen, Rüssel, Spitzbeine. Raschke ermittelte folgende Prozentanteile des Schlachtgewichtes: I. Schinken 19 Prozent, Rückenstück 13 Prozent, Kotelettenstück 11 Prozent; II. Kamm 15 Prozent, Vorderfischen und Bruststück 14 Prozent; III. Bauch 13 Prozent; IV. Kopf mit Backen 10 Prozent, Beine 2 Prozent, Flomen 3 Prozent. Verf. hat, um eine einwandfreie Berechnung der Fleischqualität beim Schwein, vornehmen zu können auf Vorschlag von Raschke an größerem Material des veredelten deutschen Landschweines Wägungen vorgenommen und in Tabellen niedergelegt. Man erhält u. a. einen Überblick über die errechneten Ergebnisse bei der Auswertung der Qualitäten in Bezug auf die verschiedenen Schlachtgewichte, und man ist imstande, in kurzer Zeit und ohne Spezialkenntnisse in der Fleischkunde den Wert eines geschlachteten Schweines — von den Innereien abgesehen — zu berechnen (genaue Kalkulation von seiten des Handwerks möglich, Kontrolle der Preisgestaltung). Bei der Bearbeitung ergaben sich einige fachliche Unterschiede. Der Wertung in vier Qualitäten nach Edelmann hat sich das deutsche Fleischergewerbe im allgemeinen angeschlossen. Doch ist bei ihm die Abgrenzung eines Qualitätsstückes „Brust“ nicht mehr üblich, da dieser Teil in die zweite Qualität zum „Blatt“ gerechnet wird. Abweichend von dieser Einteilung führt von Ostertag in der ersten Qualität Schinken, Rückenstück und Kotelettenstück, in der zweiten Kamm, Vorderfischen mit Bruststück auf. Die dritte Qualität wird vom „Bauchstück“ gebildet, während Kopf und Beine zur vierten Stufe gezählt werden. In dem kürzlich im Verlage der Allgemeinen Fleischerzeitung erschienenen Buche von Borsch „Anleitung zum rationellen Betrieb in der Fleischerei und Wurstfabrikation“ werden in der I. Qualität Schinken und Karbonade, in der II. Stufe Nacken und Schulter genannt. Als III. Qualität gelten Bauch, Rücken und Kammipeck, während Eisbeine, Pfoten, Backen, Schwanz, Kopf und Bauchabschnitte die letzte Stufe bilden. Es ist verständlich, daß infolge der vielgestaltigen Zusammenfassung des deutschen Volkes und des dadurch bedingten verschiedenartigen Sprachgebrauches mehrere Bezeichnungen für das gleiche Fleischstück vorhanden sind. Wünschenswert wäre es jedoch, wenn sich das Fleischergewerbe entschließen könnte, eine Art der Einteilung der Qualitäten zu

wählen, weil dadurch eine wesentliche Erleichterung der Kalkulation herbeigeführt werden könnte. Um zur rationellen Wirtschaftsführung zu kommen, werden in der gesamten deutschen Industrie Versuche zur „Normung“ unternommen, die nicht ohne Erfolg geblieben sind. Und auch bei der Fleischbildung, bei der Fleisch- bzw. Wurstfabrikation würde eine derartige Normung, die Einteilung in Qualitäten betreffend, zum Guten führen, da neben der bereits erwähnten Erleichterung der Kalkulation eine bessere Einsicht in die Preisbildung gewährt würde, was jede so oft von Konsumenten vorgefaßte Meinung zu hoher Kalkulation widerlegen würde. A.

Köster: Bekämpfung des infektiösen Abortus des Rindes durch einmalige Verimpfung von lebenden Kulturen auch bei trächtigen Kühen. (Aus dem bakter. Institut der Landwirtschaft für die Rheinprovinz in Bonn. — Leiter: Dr. Eickmann.) (T. R. 1928, S. 119—126 und 142—150.)

Die wesentlichen Ergebnisse der in einigen Herden durchgeführten Immunisierungsversuche sind folgende: Die Impfung trächtiger Rinder und Kühe mit lebender Kultur bis zum vierten Monat einschließlich der Trächtigkeit ist als ungefährlich zu bezeichnen; dasselbe ist auch noch für den fünften Monat anzunehmen. Eine nur einmalige Impfung mit lebender Kultur hat gegenüber der Impfung mit abgetöteter Kultur oder Kulturextrakt keinen Vorteil gezeigt. Bei nicht trächtigen Tieren und solchen im ersten und zweiten Trächtigkeitsmonat ist doppelte Impfung im Abstand von 14 Tagen zu empfehlen. Um der Gefahr eines nicht ausreichenden Impfschutzes bis zum Ablauf der Trächtigkeit vorzubeugen, ist eine dritte Impfung mit lebender Kultur im vierten bzw. fünften Monat der Trächtigkeit angebracht. Der Nachteil der nur einmaligen Impfung mit 20 ccm lebender Kultur läßt sich durch einmalige Verimpfung erhöhter Dosen nicht ausgleichen. Hygienische Maßnahmen sind neben der Impfung unerlässlich K. H. Meyer.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Kitt, Th.: Vereinfachte Anaerobierkultur. (M. m. W. 1928, S. 531.)

Das vorliegende Kulturverfahren stellt eine Modifikation der Buchnerschen Pyrogallolmethode dar. Es wurden dazu starke Reagenzgläser von 22 cm Länge und einem Durchmesser von 5 cm benutzt, die am unteren Teile ringförmig eingeschnürt sind. In diese Gläser passen viereckige 9 cm lange und 4 cm breite Plattenschalen mit Deckelplatte. Der Verschuß wird mit einem lichten Gummistopfen bewerkstelligt. Beim Gebrauch gießt man, nachdem der ganze Apparat sterilisiert worden ist, zunächst nach Zeisslerischer Vorschrift hergestellten Agar in die Schale und bedeckt dieselbe bis zum Erkalten, worauf die Beimpfung der Platte mit Platinöse oder Glasstab erfolgt. Die besäte Platte läßt man sodann in den Glaszylinder gleiten und gießt hinter der ersten Natriumsulfid-Kalilauge (2—4 Gramm Natr. hydrosulfid und 20—30 ccm 10prozentige Kalilauge) in das Glas, so daß die Flüssigkeit an der Wand herabläuft. Schließlich wird der Zylinder mit dem Gummistopfen gut verschlossen. Verf. bevorzugt die angegebenen beiden Chemikalien gegenüber dem Pyrogallol, weil man sich nicht so beeilen muß wie bei diesem. Außerdem setzt sich die Sauerstoff-Absorption fort, wenn man das Glas geöffnet und die Platte auf kurze Zeit herausgenommen hat. Auf diese Weise entstehen auf dem Nährboden schon nach 12—24 Stunden bzw. nach einigen Tagen Bakterienkolonien. Durch zwei Abbildungen wird das Wachstum des Bac. botulinus und des Bac. sarcophysematos veranschaulicht. Zur Weiterzüchtung in Reagenzgläsern ist die von Theobald Smith und vom Verf. zuerst angewandte Methode des Zusatzes aseptisch abgeschnittener Rohfleisch- oder Organstücke zur Nährfleischbrühe, ferner die Pfuhsche Leberbreibouillon, der Hibler-

sche Gehirnbrei und der vom Verf. angegebene Milzbrei- und Blutbreizusatz zur Fleischbrühe geeignet. Carl.

Gins, H. A. und Hussein, K.: Über die serologische Differenzierung der Rauschbrand- und Pararauschbrandbazillen. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 107, 1928, S. 96.)

Mit den Fortschritten auf dem Gebiete der Anaerobenzüchtung, insbesondere durch die Verwendung der Zeißlerschen Traubenzuckerblutagarplatte ist jetzt die Möglichkeit gegeben, von anaeroben Bakterien genau so gut Reinkulturen herzustellen wie von aeroben Arten. Damit konnte aber weiter an die Trennung der Rauschbrand- von den Pararauschbrandbazillen auf dem Wege der Agglutination herangetreten werden. Verff. haben derartige Versuche mit sieben Rauschbrand- und zehn Pararauschbrandstämmen angestellt, wobei das benötigte Serum durch Immunisierung von Kaninchen mit steigenden Dosen lebender Bazillen (intravenöse Injektion) gewonnen wurde. Als Bakterienaufschwemmung diente eine 48stündige Leberbouillonkultur, die vor dem Gebrauch durch Papier filtriert war. Das Ergebnis der Versuche kann dahin praktiziert werden, daß eine ausgesprochene Spezifität des Agglutinationsphänomens insofern vorhanden war, als das mit einem Rauschbrandstamm erzielte Serum sämtliche übrigen Rauschbrandstämmen bis zum Titer 1 : 1000 agglutinierte, während alle verfügbaren Pararauschbrandstämmen unbeeinflusst blieben. Als Verff. analoge Versuche mit einem Pararauschbrandstamm anstellten, agglutinierte das auf diese Weise hergestellte Immunserum nur den homologen Stamm. Es gelang jedoch schließlich durch Behandlung eines Kaninchens gleichzeitig mit vier verschiedenen Pararauschbrandstämmen ein polyvalentes Serum herzustellen, das sämtliche derartige Kulturen, nicht aber die zu den Versuchen benutzten sieben Rauschbrandkulturen agglutinierte. Es ist also die serologische Trennung der beiden Krankheitskeime durchaus möglich, und es ist vorauszu sehen, daß die vorliegende Methode bei der Diagnose der beiden Bakterienarten in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Carl.

Klimmer, M., Haupt, H., Roots, E.: Zur Trennung einiger in der Milch vorkommender Streptokokken mit besonderer Berücksichtigung der Isolierung des *Str. agalactiae* Guillebeau. (Aus dem Veterinär-Hygienischen Institute der Universität Leipzig.) (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 107, 1928, S. 206.)

Das Material zu den vorliegenden umfangreichen Versuchen stammte teils aus dem Institut der Verff., teils wurden die hier in Betracht kommenden Bakterien aus der Milch von sechs Milchviehbeständen isoliert. Die gefundenen Ergebnisse sind folgende:

1. Von 222 Streptokokkenreinkulturen, die aus Milchproben von Kühen galtverdächtiger Bestände gewonnen waren, wiesen 175 in Lackmismilch bei 37 und 10 Grad C, in Methylenblau-milch, in Milchzuckerbouillon, in der Blutplatte und gegenüber Natriumhippurat ein gleiches Verhalten auf, wie es u. a. von Klimmer und Haupt als charakteristisch für den *Streptococcus agalactiae* Guillebeau geschildert ist. Gleiche biologische Eigenschaften besitzen 21 Laboratoriumsstämme dieses Typus und 5 Stämme, die aus bei 37 Grad C geronnener Milch eines Bestandes gewonnen sind, in dem mehrere galtinfizierte Kühe stehen.

2. Für diese 201 Stämme des *Str. agalactiae* Guillebeau wird als weiteres Charakteristikum das Gärvermögen für Saccharose und die Unfähigkeit, Raffinose zu spalten, festgestellt.

3. Nach den Angaben des Schrifttums trennt das Gärvermögen für Saccharose den *Str. agalactiae* von der Mehrzahl der Stämme des *Str. lactis*, die Unfähigkeit, Raffinose zu spalten, ihn von der Mehrzahl des *Str. Kefir* und vom *Str. bovis*, dem Streptokokkus des Rinderkotes und der Mundhöhle des Rindes. In unseren Versuchen erwiesen sich 14 Prozent der wahllos aus der Serumagarplatte, die mit

natürlich gefäuerter Milch beimpft war, abgestochenen Art Laktis-Kolonien als Saccharosevergärer.

4. Zur Reinkultivierung des *Str. agalactiae* aus Milchproben wird ein nährstoffreicher Gäragar mit Saccharose empfohlen, der Bromkresolpurpur als Indikator enthält. Auf ihm wächst der Galtstreptokokkus in 24 Stunden zu großen, 1/2–3 mm Durchmesser messenden Kolonien aus, die dunkelgelb und fast undurchsichtig sind, sowie den umgebenden Nährboden hellgelb verfärben und einen schmalen Saum in unmittelbarer Nachbarschaft der Kolonie trüben. Schwächer Saccharose vergärende Streptokokken anderer Art sind als durchsichtige, den Nährboden nicht trübende Kolonien zu erkennen.

5. Es wird weiterhin empfohlen, charakteristische gelbe Kolonien isolierter Lage auf schräg erstarrten nährstoffreichen Gäragar mit Raffinose und Indikator zu übertragen. Die dieses Disaccharid nicht spaltenden Streptokokkenstämmen sind weiterhin in Lackmismilch und Methylenblau-milch zu prüfen. Bei Verdacht auf Streptokokken menschlicher Herkunft ist es empfehlenswert, gleichzeitig Hippuratsbrühe zu infizieren. Die Beimpfung von Laktosebouillon erscheint zur Prüfung der Reinheit der Kultur und zur Ergänzung der bakteriologischen Diagnose ratsam.

6. Die Sicherheit, mit der Galtstreptokokken durch das angegebene Kulturverfahren in Milchproben nachweisbar sind, ergibt sich daraus, daß bei der Untersuchung von 130 Milchproben, die Saccharospaltende Streptokokken enthielten, 109mal Galtstreptokokken, 7mal abweichende, Mastitis verursachende Stämme (überdies zweimal gleiche Stämme aus unverdächtigem Euter), zweimal Laktis-Stämme und zehnmal wilde Streptokokkenstämmen abgestochen wurden.

7. Im Vergleiche mit den bakterioskopischen Befunden ist das angegebene Kulturverfahren bei weitem sicherer. In Milchproben mit typischen Staketformen sind stets Galtstreptokokken oder eine abweichende pathogene Streptokokkenart gefunden worden. Galtstreptokokken wurden weiterhin in 78,7 Prozent der Milchproben mit unsicherem bakterioskopischen Befunde (nicht typische rundliche Streptokokken oder diphtheroide Stäbchen) und in 29 Prozent der Milchproben, die bakterioskopisch völlig unverdächtig waren, gefunden.

8. Nebenher wurde die Verfeuchung dreier Bestände mit Galt festgestellt. In einem Bestande waren von 78 untersuchten Kühen 16,6 Prozent mit offener Mastitis behaftet, 47,4 Prozent beherbergten nach der kulturellen Untersuchung Galtstreptokokken und bei 36 Prozent konnten Galterreger auch kulturell nicht nachgewiesen werden. Bakterioskopisch konnten von den 37 Kühen, die nicht mit Euterentzündung behaftet waren, jedoch nach der Kulturmethode Streptokokken beherbergten, nur sechs (13 Prozent) als infiziert erkannt werden. In den Milchproben der 13 euterkranken Kühe waren kulturell Streptokokken nachweisbar; in 12 Fällen handelte es sich um die charakteristischen Galterreger. In einem weiteren Bestande beherbergten 60 Prozent der Kühe Galtstreptokokken im Euter; bei 3 Prozent (1 Kuh) dieser Streptokokkenträger waren die Erreger bakterioskopisch feststellbar. Der Bestand hatte früher stark unter klinischem Galt zu leiden gehabt. In einem dritten, erst vor kurzer Zeit neu befallenen Bestande betrug die Verfeuchung 30 Prozent; von den infizierten Tieren konnten 57 Prozent bereits bakterioskopisch als infiziert erkannt werden.

9. Streptokokken abweichenden biologischen Verhaltens sind in der Milch euterkranker Tiere nur in einem Falle festgestellt worden. Streptokokken gleichen biologischen Verhaltens wie die eben genannten, wurden aus zwei unverdächtigten Milchproben festgestellt. Nach ihrer Fähigkeit, sich bei 10 Grad C zu vermehren, gehören diese Stämme zu den fakultativen Parasiten. Carl.

Standesangelegenheiten.

Verein der Tierärzte des Reg.-Bez. Lüneburg.

19. August 1928 in Celle.

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachten die Teilnehmer des zu Anfang d. Js. verstorbenen Kollegen v. d. Ohe-Celle durch Erheben von den Sitzen. Es wurde eine Einladung der Mitglieder bekanntgegeben zum Festabend der tierärztlichen Abteilungen gelegentlich der Hamburger Naturforscherversammlung am 20. Septbr. Wie die Umfrage ergab, ist eine rege Beteiligung insbesondere der in der näheren Umgebung Hamburgs wohnenden Kollegen zu erwarten. Die vom Vorstande vorgeschlagene Wahlliste zu den Kammerwahlen wurde nach eingehender Aussprache und Vornahme einiger Abänderungen mit großer Mehrheit (22:3) angenommen. Sie lautet: 1. Dr. Becker, prakt. Tierarzt in Bevenfen, Dr. Loewe, prakt. Tierarzt in Soltau; 2. Dr. Dreyer, prakt. Tierarzt in Walsrode, Dr. Lürßen, prakt. Tierarzt in Burgdorf; 3. Dr. Lowey, Veterinär in Burgdorf, Dr. Sonnenberg, prakt. Tierarzt in Schnede; 4. Brinkop, Stadtveternär in Lüneburg, Dr. Boedecker, prakt. Tierarzt in Lehrte. Darauf konnte Kollege Dr. Karsten, Direktor des Tierseucheninstituts der Landwirtschaftskammer Hannover mit seinem Vortrage über „Die Zusammenarbeit der prakt. Tierärzte mit den Bakteriologischen Instituten“ beginnen. Die in Frage kommenden gemeinsamen Arbeitsgebiete: bakteriologische Fleischschau, Seuchenbekämpfung, Behandlung der Sterilität und des Abortus, Abwehr des Kurpfuschertums, Milchkontrolle wurden ausführlich durchgesprochen und wertvolle Ratsschlüsse erteilt betr. Entnahme und Versand der Untersuchungsproben, Anwendung der Impfstoffe, Führung der Impflisten u. a. mehr. Als besondere Zukunftsaufgaben wurden hingestellt: mehr Betätigung in der Behandlung der Geflügelkrankheiten, damit diese nicht ebenso wie das Kapaunen in Laienhände übergehe, mehr Interesse für Sterilitätsbekämpfung und Milchuntersuchungen, weil auch hier unsere Stellung bedroht werde. Für seine 1½stündigen lichtvollen Ausführungen wurde dem Redner reicher Beifall gespendet. Die anschließende Diskussion gab Gelegenheit, noch manche Einzelfrage zu klären. Bei der Sterilitätsbehandlung behält der Besitzer von Herdbuchtieren die Wahl zwischen seinem Haustierarzt und dem Spezialisten der Kammer. Im übrigen kommt letzterer nur dort in Frage, wo die prakt. Tierärzte die Behandlung überhaupt ablehnen, was leider im Hochzuchtgebiete (!) der Fall ist. Vom Koll. Bartels-Celle wurde angeregt, einmal mit der Abhaltung von Kursen zu beginnen, in denen die Untersuchung auf Tb., Sterilitätsbehandlung, Kapaunisieren demonstriert wird. Koll. Dr. Becker-Bevenfen bat, die Urotropin-Behandlung bei Geflügeldiphtherie zu versuchen. Für das Kapaunen empfahl er die alte Methode, da sie in manchen Fällen allein zum Ziele führe. In seinem Schlußwort betonte Koll. Dr. Karsten nochmals, daß bei Abortus das Durchseuchenlassen des ganzen Bestandes das Gegebene sei (kein Einstellen neuer Tiere!). Dr. R. Becker, Schriftf.

Verschiedene Mitteilungen.

Jahresversammlung der „Fachgruppe Fleischsalatfabriken“.

Die „Fachgruppe Fleischsalatfabriken“ des Reichsverbandes der deutschen Fleischwaren-Industrie tagte mit ihrer diesjährigen Jahresversammlung unter Leitung des geschäftsführenden Vorstandes des Reichsverbandes, Direktor Dr. Schwerdt, am 20. und 21. August d. Js. in Bremen. Bei der Versammlung in der Handelskammer (Haus Schütting) stand in dem 1. Teil nach einem allgemeinen Bericht von Herrn Dr. Schwerdt über rein interne Fachgruppen-Angelegenheiten ein Vortrag des Herrn Fabrikant Hermann Ofterdinger, Altona-Ottenfen, über „Die Herstellung von Fleischsalat und Mayonnaise“ im Vordergrund der Tagesordnung. In der ebenso eingehenden wie fruchtbringenden Aussprache über die Ausführungen, die das Wichtigste über die Herstellung von Fleischsalat, Heringsalat und Mayonnaise dargelegt hatten, wurde in allen Punkten Übereinstimmung der Versammlungsteilnehmer erzielt. Für etwaige Verhandlungen mit Behörden usw. wurde nochmals folgende Begriffsbestimmung für Fleischsalat festgelegt: „Fabrikmäßig hergestellter Fleischsalat ist eine Mischung einer stets frisch zubereiteten in Streifen geschnittenen Fleischfarce aus Rind-, Kalb- oder Schweinefleisch als Grundlage, mit Mayonnaise, geschnittenen Gurken, Gewürzen und Würzstoffen.“ Jeder sonstige Zusatz von Gemüse, wie

gelben oder roten Rüben, Kohlrabi, Blumenkohl, Kürbis wurde als nicht handelsüblich und daher als unzulässig bezeichnet. Einmütigkeit bestand ebenfalls darüber, daß jeder Zusatz von besonderen chemischen Konservierungsmitteln für die trockene Grundlage des Fleisch- und Heringsfalates zum Schutze der in der Fachgruppe vereinigten realen Hersteller abgelehnt werden müsse, und daß nur, wie in der Verordnung vom 17. Juli 1925 vorgef. sehen, die für Fleischsalat und Mayonnaise zugelassene Benzoesäure für die Konservierung von ausländischem (chinesischem) Eigelb, das zur Herstellung von Mayonnaise Verwendung finden müsse, Geltung haben könne. (Diese Auffassung ist auch bereits durch die Herren Dr. Schwerdt und Hermann Ofterdinger bei den unmittelbar nach der Versammlung in Bremen stattgefundenen Beratungen über die Ausführungsbestimmungen zum neuen Lebensmittelgesetz betr. Konservierungsmittel mit den Behördenvertretern in Nürnberg festgelegt worden.) Für die Verwendung kleiner Packungen, bei Lieferung von Fleischsalat, die wiederum als unzweckmäßig bezeichnet wurde, wurde beschlossen, durch eine Rundfrage des Reichsverbandes bei den Fachgruppenmitgliedern prüfen zu lassen, wie weit es möglich ist, bei der vom Reichsverbande bereits beschlossenen Normung von Dosen für eine Reihe von Fleischkonserven die Normung von Dosen zum Verlande von Fleischsalat einzufalten, damit gleichzeitig auch der von der Fachgruppe abgelehnte Dosenverschluß mit Stechdeckel bei Fleischsalat verschwindet. Der 2. Teil der Versammlung, an dem die Hauptlieferanten der Fleischsalatfabriken als korrespondierende Mitglieder des Reichsverbandes teilnahmen, umfaßte eine sehr eingehende Aussprache über die wichtigsten Rohmaterialien, insbesondere Eigelb, Öle und Gurken. Im Anschluß an die Versammlung wurden auf Einladung der Bremen-Besigheimer Ölfabriken deren Anlagen besichtigt.

Reichsverband der deutschen Fleischwaren-Industrie, e. V.

Druckfehlerberichtigung.

Selbstdispensieren von Eugen Bass, Görlitz. D. T. W. Nr. 34, S. 553 linke Spalte, Zeile 9, muß es heißen anstatt: „verschrieb alles selbst“, „dispensierte alles selbst“.

Bücherbesprechungen.

Fritz Backhaus, Ministerialrat im Preussischen Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. „Das Preussische Tierärztekammergesetz vom 13. April 1928 nebst Ausführungsbestimmungen und Wahlordnung für die Tierärztekammern.“ Berlin 1928. Verlagsbuchhandlung von Richard Schoetz, Wilhelmstr. 10. Preis 6,50 RM.

Das Werk enthält das vollständige Tierärztekammergesetz mit entsprechenden Erläuterungen. In einer kurzen Einleitung wird auf den Werdegang des Gesetzes eingegangen. Der Autor, der bekanntlich als Referent an der Ausarbeitung und bei der parlamentarischen Durchberatung des Gesetzesentwurfes amtlich beteiligt war, hat durch sinn-gemäße Anmerkungen und Erläuterungen im Text das Verständnis für das Gesetz wesentlich gefördert. Es dient daher jedem Tierarzte, der sich mit der Materie eingehend im Standesinteresse beschäftigen sollte, als unentbehrlicher Wegweiser. Mießner.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Schlachthofdirektor Dr. Rößle in Ulm zum Oberveterinär; Dr. Walther Gutsche aus Dugehnen (Ostpreußen) zum Leiter der Haupt- und Untersammelstelle für Fleischverwertung der Stadt Berlin; Dr. Willi Stotz aus Salem und Dr. Eduard Huber aus Durlach zu Assistenten am Tierhygienischen Institut in Freiburg; Dr. Heinrich Thoma aus Amberg zum Assistententierarzt in Seckenheim; dem Tierarzt Dr. Waldmann aus Berlin-Buchholz ist die kommissarische Verwaltung der Veterinärstelle in Beeskow (Bez. Potsdam) übertragen worden.

Verzogen: Dr. Ludwig Huber aus Seckenheim nach Hagen (Westf.); Dr. Paul Eberwein, bisher Assistent am Tierhyg. Institut in Freiburg, nach Hagen (Westf.).

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Eberlein & Co., Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelman, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 36.

Ausgegeben am 8. September 1928.

36. Jahrgang.

Neues über Fischkrankheiten.*)

Von Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Hobstetter, Jena.

In der Zeitschrift für Fischerei von Schiemenz und Seydel (Band 25, Nr. 1) finden sich drei sehr lezenswerte Arbeiten. Szidat berichtet über ein Fischsterben im Kurischen Haff, das zumeist die Kaulbarfische, ab und zu auch Barfische und Weißfische betraf, und hervorgerufen wurde durch die Gabelschwanzzerkaria des Möwenparasiten Hemistomum spathaceum Rud. Szidat konnte die Beobachtungen Wunders (siehe mein vorjähriges Referat) bestätigen und erweitern. — Die zweite Arbeit stammt von Schäperclaus und betrifft die Rotseuche des Aals im Bezirk von Rügen und Stralfund. Die Arbeit eignet sich wegen der Fülle des Materials nicht zum kurzen Referat, ist aber, besonders im Hinblick auf die sorgfältigen pathologisch-anatomischen und bakteriologischen Untersuchungen äußerst bemerkenswert. Der als Erreger isolierte *Vibrio anguillarum* wird mit ähnlichen verglichen; er erzeugt auch im Tierversuch die Seuche wieder. — An dritter Stelle macht Holzinger Mitteilung über „phenolhaltige Abwässer der Kokereien als Fischgift“.

Im Band 26, Heft 1, der Zeitschrift für Fischerei findet sich ein Aufsatz von Staff und Sawicki über den Einfluß der Pockenkrankheit der Karpfen auf das Wachstum der Fische. Es wird da gezeigt, daß pockenranke Karpfen im Wachstum erheblich zurückbleiben, und daß es nötig ist, die Karpfenbrut bei jedem Umsetzen sorgfältig vor allen Verletzungen der Oberhaut zu bewahren, um das Entstehen der Wundpocken zu vermeiden. — In der gleichen Nummer stehen zwei Aufsätze über die Wirkung salzhaltiger Abwässer in Seen von Quiel und über die Giftigkeit einiger Schwermetallsalze von Ebeling. Aus dem ersten ist berichtet, daß die Fische schon bei einem Salzgehalt von 1—1,5 Prozent abwandern, weniger weil sie selbst gefährdet sind, als weil ihre Nahrungstiere zugrunde gegangen sind. Der zweite Aufsatz läßt erkennen, daß von den Schwermetallsalzen die Kupfersalze in der schädlichen Wirkung an der Spitze stehen. Bei der Einleitung dieser Salze nehmen die Fische eine typische Stellung ein: Sie stehen mit dem Kopfe nach unten und schlagen nach oben kräftig mit dem Schwanz. Auffällig ist weiter die starke Einwirkung von Aluminiumsulfat. Eisen und sogar Arsenik treten demgegenüber zurück. Über die Schädlichkeitsgrenzen der einzelnen Metallsalze muß im Original nachgelesen werden.

Scheuring referiert in Nr. 17/27 der Neudammer Fischereizeitung (F.Z.) über eine Arbeit von Ejsmont, die im Jahre 1925 im Bull. Acad. Polon. über die Art des Genus *Sanguinicola* veröffentlicht worden ist. Es sind demnach drei Arten dieser Saugwürmer aus dem Blute der Fische zu unterscheiden: *S. inermis* Plehn aus dem Blute von Karpfen, *S. armata* Plehn aus dem Blute von Schleien und *S. intermedia* Ejsmont aus dem Blute von Karauschen. Erwachsene Parasiten, Eier und Mirazidien aus dem Fisch, Sporozysten und Zerkarien aus Schnecken als Zwischenwirt werden beschrieben.

In Nr. 20/27 der F.Z. findet sich ein Referat Scheurings über eine Arbeit von Ward und Miller, die im Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene über eine neue Stielaugenkrankheit bei Forellenbrut erschienen ist. Die Krankheit wurde in Oregon (U.S.A.) beobachtet. Ursache war eine Masseninfektion mit kleinen Zysten, die in allen Organen zu finden waren. Bei einem Fisch wurden 1600 Zysten gezählt. In den Zysten kleine Wurmlarven, die wahrscheinlich in den Entwicklungskreis von Vogelsaugwürmern gehören, und denen der Name *Distomulum oregonensis* gegeben wird.

Bereits im vorigen Jahre hatte ich über eine Reihe von Arbeiten über die Daktylogyrusarten der Karpfen berichtet, die zum Teil auf den schwedischen Forscher Nordquist zurückgingen. In Nr. 27/27 der F.Z. legt Nordquist nunmehr selbst seine Anschauungen nebst neueren Erfahrungen nieder. Danach scheint nunmehr festzustehen, daß in mehrmals hintereinander zur Brutauzucht benutzten Teichen sich der Boden immer stärker mit Daktylogyruseiern anreichert, und daß die Infektion der Brut fast ausschließlich vom Boden aus erfolgt. Nordquist vermutet weiter, daß der Parasit besonders widerstandsfähige Winter Eier liefert, und er rät alternierende Verwendung verschiedener, voneinander isolierter Teichkomplexe für die Brutauzucht, vollständige Entwässerung der Teichböden vor dem Auswintern, besser noch alternierende landwirtschaftliche Nutzung der Teiche als bestes Mittel an, um die Infektion der Brut zu verhüten. Von der Behandlung (Kochsalz- oder Essigsäurelösung) der bereits befallenen Brut hält er nicht viel. In Nr. 35/27 der F.Z. macht Plehn neuere Vorschläge über die Bäderbehandlung der Karpfenbrut gegen *Daktylogyrus vastator*. Das Bad, etwa 2½—4prozentige Kochsalzlösung sollte 2—3 Grad wärmer sein als das Teichwasser. (Parasiten nach 10 Minuten tot.) Nach dem Bade

*) Referat, erstattet in der Verbandsitzung der Landwirtschaftskammertierärzte am 9. Juli 1928 in Breslau. (Sitzungsprotokoll S. 5612.)

mit reinem, noch 1 Grad wärmerem Wasser nachspülen! Beim Zurücksetzen der Brut selbstverständlich Vermeidung von Erkältungen!

Gehring teilt in Nr. 28/27 der F.Z. mit, daß in der Waldecker Talperre ein Jahrgang Regenbogenforellen der Gasblasenkrankheit zum Opfer gefallen sei. Infolge Überfäufung des Wassers mit Sauerstoff (im vorliegenden Falle 13,7 ccm je Liter statt normal 7 ccm) trete ein Überschuß des Gases ins Blut der Fischchen über und werde dann in Form kleiner heller Bläschen ins Unterhautzellgewebe, insbesondere am Kopfe und den Augenhöhlen wieder ausgeschieden. Hierdurch werde Exophthalmus bedingt.

Haempel hat nach der Österreichischen Fischerei-Zeitung, Nr. 28, versucht, diese Sauerstoffvergiftung künstlich zu erzeugen (Sättigung bis 31 ccm pro Liter), aber ohne daß es ihm gelungen ist, die von Plehn und Gehring beschriebene Gasblasenkrankheit zu erzeugen.

In Nr. 11/28 des Korrespondenzblattes für Fischzüchter usw. bringt Wunder einen sehr bemerkenswerten Artikel über die Kiemenfäule der Karpfen. Wieder wird auf den Zusammenhang zwischen hoher Wasserwärme und Erkrankung hingewiesen. Die von Wunder empfohlene Notabfischung und Umsetzung der Karpfen in sauerstoffreichere Teiche läßt sich wohl nur bei kleineren Teichen durchführen. v. Davier empfiehlt, dem Sauerstoffmangel bei gefährdeten Teichen dadurch vorzubeugen, daß schon im Frühjahr (auf je Hektar 20—40 kg) frisch gelöschter Kalk in Form von Kalkmilch möglichst gleichmäßig über den ganzen Teich mit der Schaufel verteilt werde.

Demoll erwähnt in Nr. 29/27 der F.Z., ebenso in Nr. 15/27 der Allgemeinen F.Z., daß die kritische Wassertemperatur für das Entstehen der Kiemenfäule etwa 22 Grad C betrage und mit der größten Hitzewelle im Juli und August zusammenfalle. Ausnahmen kommen vor. Wegen mancher Verschiedenheiten hinsichtlich der mikroskopischen Veränderungen der kranken Kiemen und des Wuchses der Parasiten fordert Demoll weitere Untersuchungen.

Die Landesanstalt für Fischerei hat als Ursache eines Fischsterbens eine Blutinfektion mit Trypanoplasma festgestellt. Der Parasit, der nicht näher bezeichnet ist, (Borelli?) wird durch Fischegel übertragen.

Schäperclaus beschreibt in Nr. 5/28 der F.Z. eine seltsame Glotzaugenbildung bei einem achtförmigen Hecht. Ursache ein 22 mm langes Holzstückchen, das in die Orbita eingedrungen war und hier eine eitrige Entzündung hervorgerufen hatte.

Fräulein Prof. Plehn bringt in Nr. 19/27 der Allgemeinen F.Z. vorläufige Mitteilungen über die sogenannte Hechtkrankheit im Wörther-See in Kärnten, die dort anscheinend ein allmähliches Aussterben des Hechtes zur Folge hat. Charakteristisch für die Krankheit ist das Auftreten von Hauttrübungen, dann flachen Geschwüren mit blutigem Grunde, insbesondere am Kopf, in der Gegend über den Bauchflossen und der Rückenflosse. Plehn ist der Meinung, daß die Haut für den Hecht den locus minoris resistentiae darstelle und bei allerlei Erkrankungen (auch inner-

parasitären und bakteriellen Infektionen) in Mitleidenschaft gezogen werde. Mit dieser Hypothese erklärt sie die bisherigen Beobachtungen:

- a) von Anfang an übergroße Empfindlichkeit der Hechthaut;
- b) sie steigert sich während der Laichzeit oder durch Parasitenbefall;
- c) in die absterbende Haut dringen Bakterien verschiedener Art; sie verursachen flache Geschwüre, große Wunden;
- d) von den Wunden aus ergreift die Infektion zu Zeiten geringerer Widerstandsfähigkeit den ganzen Körper, und ein großer Teil der Erkrankten verendet.

Um diese Hypothese aber einwandfrei zu begründen, sei noch viel Arbeit zu leisten.

In Nr. 20/27 der Allgemeinen F.Z. findet sich ein Artikel über die Kiemenkrankheit der Schleien. Ursache: Ergasilus sieboldi. Die Parasiten sitzen an den Kiemen, haben lebend eine weiße, tot eine blauschwarze Farbe. Nach 4 bis 5 Jahren trete allmählich ein Abnehmen der Krankheit ein. Daß ein 40 Morgen großer See innerhalb verfeuchter Teiche völlig frei blieb, führt Verfasser auf den großen Kalkgehalt des Bodens in diesem See zurück.

Im vorigen Jahre hatte ich auf eine Arbeit aus dem Fiebiger'schen Institut in Wien über die Vibrionenseuche der Karpfen aufmerksam gemacht, die im Zentralblatt für Bakt. erschienen war. Fiebiger und David berichten nunmehr über diese Seuche in Nr. 20/28 der D. T. W. Da diese jedem von Ihnen leicht zugänglich ist, bedarf es nur des Hinweises. Dann hat mir Kollege Fiebiger in lebenswürdiger Weise den Jahresbericht 1927 des Instituts für Fischkrankheiten an der Tierärztlichen Hochschule in Wien zur Verfügung gestellt, abgedruckt in Nr. 11/28 der Österreichischen Fischereizeitung. Er betrifft 59 Einsendungen, und von bakteriellen Infektionen solche mit Bact. salmonicida, Vibrio piscium, Bact. fluorescens liquefaciens, Bact. proteus, Saprolegnien, von tierischen Infektionen die Myxobolusart Henneguya psorospermiae lobosa (Mundschleimhaut Hecht), Cyclochaeten, Gyrodactylus, Ligula avium, Ascaris capsularia und von anderen Krankheiten Struma cystica (Forellen), Karpfenpocken, Dotterblasenwasserlucht (Forellenbrut), Mißbildungen (Mopsköpfigkeit bei einer Regenbogenforelle). Auch Fiebiger beklagt sich darüber, daß so sehr viele Einsendungen infolge ungeeigneter Verpackung, Verfrachtung usw. völlig unbrauchbar zur Untersuchung im Institut eintreffen.

Am Ende darf ich noch erwähnen, daß sich außer den von mir referierten Arbeiten in den Fischerei-Zeitungen eine große Menge von Mitteilungen über Abwässerschäden befindet, die als Ursache für Fischsterben anzusprechen waren. Ich bin aus den bereits im vorigen Jahre angegebenen Gründen über diese Arbeiten hinweggegangen.

Ich möchte aber doch darauf aufmerksam machen auf ein Referat, das sich in Nr. 38/27 der F.Z. findet über einen Vortrag, den Fritzsche im Ausschuß für Binnenfischerei der Preussischen Hauptlandwirtschaftskammer über Maßnahmen gegen Abwässerschäden gehalten hat.

Die in den Bakteriologischen Instituten der Landwirtschaftskammern im Geschäftsjahr 1927/28 ausgeführten Fischuntersuchungen. *)

Von Prof. Dr. Dr. Raebiger, Halle (Saale).

Seit der im Jahre 1922 in Jena, dem Wohnort des Vorsitzenden des Thüringischen Fischereivereins, unseres Mitgliedes Herrn Geheimrat Hobstetter, abgehaltenen Dienstversammlung haben die Fischkrankheiten regelmäßig auf den Tagesordnungen unserer Sitzungen gestanden.

*) Referat, erstattet in der Verbandsitzung der Landwirtschaftskammertierärzte am 9. Juli 1928 in Breslau. (Sitzungsprotokoll S. 612.)

Wenn wir uns auch heute wieder mit diesen Fragen beschäftigen, so hat das eine besondere Berechtigung, gehört doch Schlesien zu denjenigen preussischen Provinzen, in denen die Teichwirtschaft in hoher Blüte steht. Hier habe ich schon im jugendlichen Alter auf den väterlichen Gewässern die Fischerei kennen und lieben gelernt.

Wenn sich unsere Institute mehr und mehr der Erfor-

schung und Bekämpfung der Fischkrankheiten widmen, so dienen sie damit nicht nur wissenschaftlichen Interessen, sondern tragen in gleichem Maße zur Förderung der Fischzucht und zur Steigerung des Reinertrages der Wirtschaften bei.

Mit Recht sagte Major Conze, der Vorsitzende des Vereins Deutscher Teichwirte, in seiner die Mitgliederversammlung am 1. Februar d. Js. eröffnenden Rede, daß der Praktiker im Kampfe gegen die Fischkrankheiten mit dem Wissenschaftler enge Fühlung behalten muß, denn die durch die Krankheitsherde drohende Gefahr wird umso größer, je weiter sich die Teichwirte von der natürlichen Haltung der Fische entfernen.

Wie Sie aus folgenden Angaben ersehen werden, ist die Zahl der von uns ermittelten Krankheitsfälle von Jahr zu Jahr gestiegen. Das ist jedoch nicht allein darauf zurückzuführen, daß die uns in erster Linie interessierenden bakteriellen Infektionskrankheiten nach dem Jahresbericht der Preussischen Landesanstalt für Fischerei (1927/28) in der Zunahme begriffen sind, sondern fraglos auch darauf, daß wir in der uns zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen Presse durch Bekanntmachungen und Artikel auf unsere Untersuchungsstellen hingewiesen und die Teichwirte von der Bedeutung der bakteriellen und parasitären Fischkrankheiten mehr und mehr überzeugt haben.

Wenn man die Zahlen der in den letzten 3 Jahren ausgeführten Untersuchungen einander gegenüberstellt, so ergibt sich, daß unsere Verbandsinstitute im Geschäftsjahr 1925/26 183, 1926/27 198, 1927/28 211 Einsendungen erhalten haben. Hiervon entfallen auf die preussischen Institute in Berlin, Bonn, Breslau, Halle, Hannover, Kiel, Königsberg, Münster, Züllchow-Stettin 148 bzw. 151 bzw. 144 Untersuchungen, auf die uns angeschlossenen außerpreussischen Institute in Braunschweig, Dessau, Jena und Oldenburg 35 bzw. 47 bzw. 67 Eingänge.

Von den preussischen Kammerinstituten war das Breslauer, dessen Gastfreundschaft wir heute genießen, mit 67 Untersuchungen an der Spitze. An zweiter Stelle steht die Thüringische Veterinäranstalt in Jena mit 38 Fällen. Darauf folgt das Hallenser Institut mit 29 Untersuchungen, während das Untersuchungsmaterial der anderen Institute die Zahl 10 nicht überschreitet.

Das Bakteriologische Institut in Münster hat keine Untersuchungen ausgeführt, weil die Landwirtschaftskammer für die Provinz Westfalen ein eigenes fischereibiologisches Institut besitzt, das die Fischkrankheiten und Fischsterben mit bearbeitet. Der Tätigkeitsbericht desselben für das Jahr 1927 verzeichnet 15 verschiedene Fälle. Damit erhöht sich die Untersuchungsziffer der preussischen Institute auf 159 und die Gesamtzahl auf 226.

Demgegenüber kamen, wie dem Jahresbericht des Privatdozenten Dr. Schäperclaus zu entnehmen ist, in der preussischen Landesanstalt für Fischerei in Friedrichshagen im Jahre 1925 37 Fälle, im Jahre 1926 83 und im Haushaltsjahr 1927/28 123 Fälle zur Untersuchung.

Unter den an die Landwirtschaftskammerinstitute eingesandten Fischarten befanden sich in der überwiegenden Mehrzahl Karpfen, und zwar über 170 Stück. Darauf folgen Forellen, die ebenfalls in größerer Zahl zur Untersuchung kamen. An dritter Stelle stehen Schleien, während sich die übrigen Fischarten verteilen auf Plötze, Hechte, Aale, Rotfedern, Döbel, Häslinge, Barsche, Äschen und Brassen.

Unter den Karpfen war am häufigsten die Rotzeuche vertreten, während bei den Forellen und Schleien verschiedene Befunde erhoben werden konnten, ohne daß eine bestimmte Krankheit vorherrschte hätte.

Außer den bakteriellen kamen auch parasitäre Krankheiten zur Feststellung. So wurde z. B. der gefährliche Hautparasit *Costia necatrix* bei Bach- und Regenbogenforellen ermittelt, ebenfalls bei Forellen *Argulus foliaceus* und bei Karpfen ein starker Befall von *Chilodon cyprini* und einem

der wichtigsten protozoischen Haut- und Kiemenparasiten, den wir fast ebenso häufig wie *Costia* und *Chilodon* antreffen, ein peritriches Infusor aus der Familie *Vorticellidae*, *Cyclochaeta*. Das Tierchen hat, wenn es der Fischhaut anliegt, die Form einer flachen Glocke.

Weiterhin beobachteten wir wieder *Gyrodactylus*, bekanntlich ein mikroskopisch kleiner Saugwurm, der sich von Oberhaut- oder Kiemenepithelzellen nährt, sowie *Ichthyophthirius multifiliis*, der in Schlesien und Thüringen wiederholt in der Haut von Karpfen ermittelt wurde, aber auch anderen Fischarten gefährlich werden kann.

Solange der Parasit tief in der Haut seines Wirtes steckt, kann er durch Bäder nicht vertilgt werden, da er jedoch den anderen Teil seines Lebens frei im Wasser zubringt, bekämpft man ihn in dieser Periode in der Weise, daß man die erkrankten Fische in eine Brutrinne setzt, deren Abfluß sich am Boden befindet, und möglichst starken Zulauf gibt.

Die Parasiten verlassen, sobald sie heranwachsen, einer nach dem anderen ihren Wirt, fallen herunter und werden fortgespült.

Die befallenen Fische können bisweilen schon in weniger als einer Woche von den Parasiten befreit werden, da *Ichthyophthirius* den Wasserwechsel schlecht verträgt. Aber auch die Fische sind dagegen empfindlich und müssen zur Vermeidung von Erkältungen allmählich an die Temperatur des Wassers gewöhnt werden.

Gut bewährt haben sich aber die Bäder bei den anderen Hautparasiten, wie *Chilodon*, *Costia*, *Cyclochaeta* und *Gyrodactylus*.

Hierzu verwendet man Kochsalzbäder in einer Konzentration von 25 Gramm auf 1 Liter Wasser während einer Zeit von 15—30 Minuten.

Auch den Befund von *Echinorhynchus truttae* (früher *E. clavula*) bei Forellen möchte ich nicht unerwähnt lassen. Der Parasit kommt im Darm von Salmoniden nicht gerade häufig vor, kann aber zu Massensterben führen. Der Zwischenwirt ist nicht bekannt.

Da wir uns in den letzten Jahren mit besonderem Nachdruck der Bekämpfung der Leberegelkrankheit unserer Haustiere und damit auch der Vernichtung der Zwergschlammfischschnecke (*Limnaea truncatula*), des Zwischenwirtes von *Distomum hepaticum*, widmen, wird es Sie im Anschluß an die soeben genannten Parasiten interessieren, daß auch die Teichwirte die Wasserschnecken bekämpfen, weil sie für die Entstehung parasitärer Fischkrankheiten von Bedeutung sind.

Die Schnecken können in ihrem Innern eine große Reihe verschiedener Wurmart (Saugwürmer mit kompliziertem Entwicklungsgang, digenetische Trematoden) beherbergen, die sich in der Leber ihres Wirtes bisweilen außerordentlich stark vermehren.

Außer den Gabelschwanz-Zerkarien erlangen noch folgende dieser Saugwürmer, die sämtlich ihre Entwicklung in Wassermollusken durchmachen, gelegentlich Bedeutung als Krankheitserreger bei Fischen:

Holostomum perlatum, *Holostomum cuticula*, *Bunodera luciopercae*, *Crepidostomum farionis*, *Asymphylogora tincae*, *Azygia lucii*, *Sanguinicola inermis* u. a. m.

Die Gefahr für die Übertragung und Ausbreitung von Fischkrankheiten durch Wasserschnecken dürfte nach Dr. Wunder in Breslau nicht unbedeutend sein, denn er hebt in einer Preßfehde mit einem Schnecken spezialisten, der für die Erhaltung der Wasserschnecken eintritt, hervor, daß die Wirtschaften, in denen die Teiche nicht fortgesetzt zur Fischzucht benutzt, sondern zwischendurch auch einmal als Wiese oder Acker verwendet werden, wobei die Wasserschnecken fast restlos zugrunde gehen, wenig oder gar nicht unter Fischkrankheiten zu leiden haben.

Bedauerlicherweise ist die Zahl der Fische, die im Zustande hochgradiger Fäulnis bei den Untersuchungsstellen

eintrafen, in einigen Provinzen ziemlich hoch gewesen. Mit diesem Übelstand hat auch die Landesfischereianstalt in Friedrichshagen zu rechnen.

Sie wies daher in einer Bekanntmachung in Nr. 7 der Neudammer Fischereizeitung vom 12. Februar d. Js. besonders darauf hin, daß Untersuchungen von Fischkrankheiten nur dann erfolgreich vorgenommen werden können, wenn die übersandten Fische lebend oder lebend-frisch eingeliefert werden, und bat um Beachtung folgender Punkte:

1. Das Untersuchungsmaterial ist auf schnellstem Wege zu befördern, möglichst am Abend, damit es am nächsten Morgen eintrifft.
2. Den Sendungen sind stets ausführliche Begleitschreiben über Art des Gewässers, Auftreten und Verlauf der Krankheit beizufügen (nicht erst nachzusenden).
3. Die Fische sind mit allen ihnen anhaftenden Schmarotzern abzufinden.
4. Bei größerem Fischsterben ist es erwünscht, die sichtlich erkrankten Fische lebend einzusenden, da sich manche Krankheiten nur am lebenden Tiere untersuchen lassen. Hierzu eignen sich kleine Fischkannen, während frisch verendete Fische einzeln, trocken, in Pergamentpapier, zu verpacken sind (nicht in lebenden feuchten Pflanzen), evtl. auf Eis. Faulige Fische einzusenden, ist zwecklos.
5. Falls für das Absterben eine Wasserverschlechterung in Betracht gezogen werden kann, muß gleichzeitig eine Wasserprobe in einer sauberen Flasche von mindestens Bierflaschengröße mitgesandt werden.

Unsererseits würde diese Wasserprobe an die zuständige agric.-chemische Kontrollstation weiterzugeben sein.

In meinem 1924 in der Königsberger Dienstversammlung erstatteten Referat über die Zusammenarbeit der Kammerinstitute mit Fischzüchtern, Teichwirten und praktischen Tierärzten habe ich bereits nähere Angaben über Entnahme, Behandlung und Verpackung des Untersuchungsmaterials gemacht und Hinweise für die Begleitberichte gegeben.

Im Gegensatz zu den früheren Jahren sind im vergangenen Geschäftsjahre in unseren Instituten Feststellungen von Kiemenfäule nicht gemacht worden. Es ist möglich, daß sich unter den bei Ankunft im Institut schon in Fäulnis übergegangenen Fischen derartige Fälle befunden haben. Jedenfalls empfiehlt es sich, im laufenden Jahre besonders auf die Kiemenfäule zu achten, wie schon aus dem Referat des Herrn Geheimrat Hobstetter hervorgeht.

Die Kiemenfäule ist nach Prof. Scheuring und Dr. Gaschott auch in diesem Jahre wieder als Geißel der Teichwirte aufgetreten und gilt als die gefährlichste aller Karpfenkrankheiten.

Nach Prof. Plehn tritt besonders an heißen Tagen in den Karpfenteichen zuweilen ein heftiges Sterben ein, das in kurzer Zeit den ganzen Besatz vernichten kann.

Die Fische werden auffallend träge, schwimmen am Rande, fliehen nicht mehr, wenn man sie zu fangen versucht, und verenden innerhalb weniger Tage. Alle Altersklassen können ergriffen werden, die ältesten Tiere am schwersten.

Beim Lüften der Kiemendeckel sieht man, daß dieselben teils ganz blaß, teils blutunterlaufen, stellenweise wie angefressen sind. Obgleich auf den Kiemen vielfach dicke Pilzrasen wuchern, so lebt der eigentliche Erreger doch nur in den Blutgefäßen der Kiemen.

Es ist *Branchiomyces sanguinis*, ein Verwandter der Schimmelpilze.

Prof. Wundsch hat kiemenfäuleähnliche Erkrankungen auch bei Hechten und Schleien ermittelt. Es ist demnach die Plehn'sche Kiemenfäule der Karpfen nicht die einzige Erscheinungsform, und es gibt außer dem *Branchiomyces sanguinis typicus*, der immer in den Gefäßen der Kiemenblättchen wuchert, noch einen anderen Erreger, der

häufig deren Wandungen durchbricht und anscheinend frei ins Bindegewebe auswächst, wie der von Wundsch bei Hechten beobachtete Pilz.

Bei dem von Scheuring und Gaschott im Juni v. Js. im Hofer-Institut in Wielenbach beobachteten Karpfensterben hatten die Kiemen infolge eines mäßig starken Schleimbelages einen mattgrau-rolafarbenen Grundton, durch den leuchtend rote bis braunrote, pustelähnliche, scharf umschriebene Flecken durchbrachen.

Kein einziger Karpfen zeigte die für die Plehn'sche Krankheitsform charakteristischen mißfarbigen, fauligen Kiemen.

Ein weiterer Unterschied war der, daß bei dem früheren Sterben hauptsächlich fast nur die bestgenährten und kräftigsten Tiere dahingerafft wurden, während bei der neuerdings beobachteten Erkrankung auch schwache und kleine Tiere infiziert waren.

Interessant ist die Tatsache, daß das Wielenbacher Karpfensterben bereits bei einer Wassertemperatur von 17 °C beobachtet wurde (der Erreger ist also nicht an ein so hohes und eng begrenztes Temperaturoptimum gebunden wie der *Branchiomyces sanguinis* Plehn) und innerhalb zweier Tage erlosch, nachdem der Zustrom des Teiches verstärkt worden war.

Die Biologische Versuchsanstalt für Fischerei in München, Veterinärstr. 6, bittet um Angabe aller verdächtigen Fälle und um Einsendung von Material. Dabei ist darauf zu achten, bei welchen Temperaturen die Krankheit auftritt und ob es sich um Teiche handelt, die reich an faulenden organischen Substanzen, wie Stallmistdüngung und gemähem Schilf sind.

Vermutlich schaffen in großen Mengen vorhandene fäulnisfähige Stoffe die Vorbedingungen für das Auftreten der Krankheit.

Es muß im übrigen auch noch die Frage geklärt werden, ob eine Übertragung von Fisch zu Fisch stattfindet, oder ob die Pilzkeime so massenhaft ins Wasser gelangen, daß die Fische sich gleichzeitig infizieren.

Ist Kiemenfäule oder eine ähnliche Erkrankung bei Karpfen oder anderen Fischen festgestellt und besteht keine Möglichkeit, durch Verstärkung des Zustromes eines Teiches Abhilfe zu schaffen, muß sofort abgefischt werden.

Die Karpfen und evtl. andere erkrankte Fische sind, ob groß oder klein, zu verwerten. Sie sind nach Entfernung des Kopfes als Speisefische zuzulassen, da sie oft sehr fett und wohlchmeckend sind und eine Ansteckungsgefahr für den Menschen nicht in Betracht kommt.

Die Erforschung der Kiemenfäule bringt unseren Instituten ein neues Arbeitsgebiet, das besonders für die Provinzen von größter Wichtigkeit ist, in denen, wie in Schlesien, in umfangreichem Maße Karpfenzucht betrieben wird.

Die Mitarbeit unserer Institute auf diesem Gebiete ist dringend erwünscht, denn die Sorge der Teichwirte um die Gefunderhaltung ihrer Fischbestände ist groß.

Literatur.

Mehring, H.: Entwicklung und Stand der Fischzucht in Schlesien. Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Jahrgang XLI, Nr. 33. Referat in Nr. 38, 1927, der Berliner Tierärztlichen Wochenschrift. — Bericht über die Mitgliederversammlung des Vereins deutscher Teichwirte. Nr. 9, 1928, der Neudammer Fischereizeitung. — Lehmann-Münster: Tätigkeitsbericht des Fischereibiologischen Instituts der Landwirtschaftskammer für die Provinz Westfalen für das Jahr 1927. Ebenda Nr. 16, 1928. — Wundsch: Der Gesundheitszustand unserer Teichfischbestände und Maßnahmen zu seiner Verbesserung. Ebenda Nr. 8, 1928. — Gaschott: Eine Badeanweisung für Karpfen. Ebenda Nr. 24, 1928. — Wunder: Die Bedeutung der Wasserfische für die Entstehung von Fischkrankheiten. Ebenda Nr. 36, 1927. — Boback: Derselbe Titel. Ebenda Nr. 10, 1928. — Wunder: Derselbe Titel. Ebenda Nr. 12, 1928. — Brauer:

Süßwasserfauna (enthält Tabelle über die Zerkarien und die zugehörigen Trematoden, soweit bis jetzt bekannt). Verlag: Fischer, Jena, 1909 bis 1912. — Raebiger: Die Zusammenarbeit der Kammerinstitute mit Fischzüchtern, Teichwirten und praktischen Tierärzten zwecks Unterfuchung ansteckender Fischkrankheiten. Nr. 51, 1924, der D. T. W. — Plehn: Praktikum der Fischkrankheiten. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1924. — Scheuring und Walter:

Beobachtungen über die Kiemenfäule der Karpfen. Bd. 29, 1926, der Neudammer Fischereizeitung, S. 577—581. — Scheuring und Gaschott: Neue Beobachtungen über die Kiemenfäule der Karpfen. Ebenda Nr. 24, 1928. — Schäperclaus: Bericht über die Abteilung für Fischkrankheiten. Aus dem Jahresbericht der Preuß. Landesanstalt für Fischerei in Berlin-Friedrichshagen über 1926/27 und 1927/28.

Seuchentilgungsgemeinschaften. *)

Von Dr. Lührs, Oldenburg.

Der oft vergebliche Kampf gegen manche Seuchen und die dadurch bedingte Einstellung der Landwirte zeigt wohl, daß in der Organisation der Bekämpfung Lücken vorhanden sein müssen. Eine solche Lücke sehe ich darin, daß der Kampf gegen verschiedene Seuchen nicht immer auf genügend breite Basis gestellt ist; eine weitere darin, daß die Desinfektion nach Abheilung der Seuche nicht genügend fachgemäß durchgeführt wird.

Diese Erwägungen waren es, welche mich veranlaßten, der Oldenburgischen Landwirtschaftskammer die Gründung von Seuchentilgungsgemeinschaften in den verseuchten Gegenden vorzuschlagen. Es tauchte dann natürlich die Frage auf, ob damit neue Organisationen geschaffen werden sollten, oder ob man diese Gemeinschaften an bestehende angliedern sollte. Die Erwägung, daß mit diesen Gemeinschaften eine Hebung des Vereinslebens und damit ein stärkerer Beitritt zu diesen Vereinen erreicht werden könnte, veranlaßte, diese Seuchentilgungsgemeinschaften den landwirtschaftlichen Vereinen anzugliedern, wobei aber ein Zwang für die Vereinsmitglieder zum Beitritt zur Tilgungsgemeinschaft nicht besteht. Für diese Seuchentilgungsgemeinschaften wurden dann Statuten aufgestellt.

Nach diesen Statuten gestaltet sich die praktische Bekämpfung so, daß jeder Besitzer den Tierarzt benennt, der die Maßnahmen in seinem Bestande durchführen soll und gleichzeitig die Anzahl der Tiere angibt, die zur Behandlung in Betracht kommen. Dann wird auf Grund dieser Angaben vom bakteriologischen Institut ein Bekämpfungsplan für die betreffende Seuche ausgearbeitet und an Hand dieses mit den Tierärzten eine ungefähre Kostenrechnung aufgestellt. Dieser Bekämpfungsplan und die Kostenberechnung wird dann mit dem Vorstand der Seuchentilgungsgemeinschaft durchberaten. Der endgültige Plan und die ungefähre Kostenberechnung dienen dann als Unterlage für einen Antrag an die Zweck- resp. Amtsverbände zur Unterstützung. Die Tierärzte und das Institut senden dann ihre Bedingungen an die Besitzer, diese bescheinigen die Richtigkeit und senden sie an den Vorsitzenden der Tilgungsgemeinschaft, der die anteiligen Kosten einzieht und die Zahlungen an Institut und Tierärzte leistet.

Unabhängig von diesen Zahlungen hat dann aber jedes

*) Referat, erstattet in der Verbandsitzung der Landwirtschaftskammertierärzte am 9. Juli 1928 in Breslau. (Sitzungsprotokoll S. S. 612.)

Mitglied einen auf die Kopffzahl seines Viehbestandes zu berechnenden Betrag an die Kasse der Tilgungsgemeinschaft einzuzahlen, der dazu dienen soll, eine Rücklage zu schaffen. Diese Rücklage ist in bestimmter Höhe zu erhalten und soll in erster Linie dazu dienen, bei plötzlichen Seuchenausbrüchen sofort Geldmittel zur Verfügung zu haben, um durch schnelle Maßnahmen die Gefahr zu beseitigen.

Mit Hilfe dieses Zusammenchlusses der Landwirte, dürfte es dann auch möglich sein, die Kosten für die Seuchentilgung herabzumindern. Einmal liegt ja die Seuchentilgung auch im Interesse der Allgemeinheit und deshalb haben sich Amts- resp. Zweckverbände in Oldenburg dazu bereit erklärt, die Sache durch Bewilligung von Geld zu unterstützen und haben Geldmittel dafür bereitgestellt, so daß sich damit schon eine Verbilligung herbeiführen läßt. Dem Bakteriologischen Institut wird es möglich sein, bei den Massenuntersuchungen die einzelne Untersuchung billiger zu berechnen. Dann dürfte es auch möglich sein, mit Hilfe solcher Seuchentilgungsgemeinschaften auch Apparate wie z. B. Räudebegabungszellen zu beschaffen. Wenn sich dann mehrere Seuchentilgungsgemeinschaften in einem Gebiete zusammentun, dürften sich auch kostspielige Untersuchungen mit Hilfe staatlicher Unterstützung durchführen lassen.

Weiterhin ist gedacht, mit Hilfe dieser Seuchentilgungsgemeinschaften auch planmäßige Desinfektionen durchzuführen. Die Desinfektion auf dem Lande liegt ja vielfach noch sehr im Argen und das ist auch ein Grund für den häufigen Neuausbruch von Seuchen. Deshalb sollen vom Institut aus Desinfektoren ausgebildet werden, die den Seuchentilgungsgemeinschaften zu mäßiger Gebühr zur Verfügung gestellt werden sollen. Diese Desinfektoren sollen dann auch alljährlich planmäßige Bekämpfungen der Ratten, Mäuse und sonstigem Ungeziefer vornehmen. Diese Maßnahmen erwähne ich deshalb, weil sie bei jedem Seuchentilgungsplan mit in die Kostenberechnung eingestellt werden.

Durch dieses planmäßige Vorgehen verspreche ich mir auch eine gewisse Einwirkung auf das Geheimmittel- und Kurpfuscherwesen.

In den neun bisher bestehenden Seuchentilgungsgemeinschaften wurden Maßnahmen gegen das seuchenhafte Verkälben, Umrindern, Paratyphus der Kälber und Leberegel durchgeführt. Die Einrichtung hat sich bewährt.

Versuche über Werfbemessung des Virusschweinepestserum an kleinen Versuchstieren.

Von Veterinär Dr. Schubert, Münster.

Der zwingende Grund für die Forderung, das Schweinepestserum unmittelbar an Schweinen und nicht, wie andere Immunsera, etwa das Schweinerotlaufferum, an kleinen Versuchstieren auszuwerten, liegt in der bisherigen Erfolglosigkeit aller Versuche, mit dem Virus der Schweinepest andere Tierarten als Schweine wirksam zu infizieren. Sobald es sich als möglich erwies, Laboratoriumstiere zu ermitteln, für welche das Schweinepestvirus pathogen ist, wäre auch der Weg für die Ausarbeitung eines Prüfungsmodus angebahnt,

mit dem man den schützenden oder heilenden Wert des Schweinepestserums im Versuche mit solchen Tieren unter Ausschaltung des kostspieligen und umständlichen Schweineexperimentes bemessen könnte.

Ich erinnere an die so lange vergeblich gebliebenen Versuche, die Maul- und Klauenseuche auf kleine Versuchstiere zu übertragen, Versuche, die schließlich doch von Erfolg gekrönt wurden, indem sich herausstellte, daß man Meerfischweinchchen mit dem Virus der Maul- und Klauenseuche in

spezifischer, deutlich erkennbarer Weise infizieren und, wie es heute offiziell geschieht, das Maul- und Klauenseuche-Immunserum an Meerfischweinch zuverläßig auswerten kann. Das wurde durch die Verwendung von hochvirulentem Virus möglich, für das eben doch das Meerfischweinch bei zweckentsprechendem Infektionsmodus eine gewisse physiologische Empfänglichkeit hat, die sich in der Bildung typischer Aphthen am Maule und an den Gliedmaßen der infizierten Meerfischweinch äußert.

Bei der Viruschweinepest liegen die Verhältnisse aber wesentlich anders. Jede Art der Einverleibung auch noch so hochvirulenten Schweinepestblutes wird von allen Versuchstieren reaktionslos getragen, und bei der uns bisher in mehrfacher Hinsicht rätselhaften Natur dieses Virus erschien es ausichtslos, etwa eine künstliche Beeinflussung in der erwünschten Richtung zu versuchen. — Deshalb habe ich einen anderen Weg eingeschlagen.

War es nicht erreichbar, das Schweinepestvirus direkt für andere Tierarten pathogen zu machen, so mußte die Möglichkeit erwogen werden, eine Pathogenität desselben auf indirekte Weise zu erzielen, indem man die Versuchstiere künstlich dafür empfänglich machte. Eine solche Möglichkeit schien gegeben, wenn es gelang — wie wir nach der Vorstellungsweise der modernen Immunitätslehre sagen müssen — den Rezeptorenapparat des Zelleneiweißes der Versuchstiere so zu beeinflussen, daß er sich in seinen bindenden Gruppen ähnlich verhielt wie beim Schweine.

Theoretisch erschien dieses Ziel erreichbar durch systematische immunisatorische Eingriffe von verhältnismäßig einfacher Art.

Allgemein ausgedrückt, ist es eine uns geläufige Tatsache, daß man, wie es bei der Gewinnung gewisser vielfach praktisch verwendeter Sera — der Antitoxine, Bakteriolysine, Agglutinine, Hämolysine, Präzipitine usw. — geschieht, durch wiederholtes Einspritzen artfremden Eiweißes bei Versuchstieren Antikörper erzeugen kann; die einen hohen Grad von spezifischer Gegenwirkung gegen das eingespritzte Eiweiß entfalten. So könnte man z. B. durch Injektionen von Schweineblut im Organismus von Versuchstieren die Produktion eines energisch wirkenden Antikörpers gegen Schweineblut-Eiweiß hervorrufen, der von den mit passenden Rezeptoren ausgerüsteten Zellen infolge des immunisatorischen Reizes in großem Überschuß gebildet und in Gestalt „freier Rezeptoren“ an das Blut abgegeben wird.

Von diesem, den mit Schweineblut behandelten Tieren entnommenen „Antischweineblut“ bin ich nun bei meinen Versuchen ausgegangen.

Bei der theoretisch angenommenen und experimentell vielfach nachgewiesenen hochkomplizierten Zusammensetzung der Riesenmoleküle des Tierkörper-Eiweißes erschien es nicht als unwahrscheinlich, daß sich im Organismus normaler — d. h. noch nicht vorbehandelter — Versuchstiere auch Rezeptoren finden würden, die mit dem Antischweineblut nicht allein eine Bindung eingingen, sondern auch zu übermäßiger Produktion eines Antikörpers gegen „Antischwein“ angeregt werden würden, daß also freie Rezeptoren mit hoher Bindungsaffinität für letzteres im kreisenden Blute der Versuchstiere auftreten würden.

Der wirksamste Antikörper gegen Antischwein-Eiweiß ist natürlich im Schweine, im normalen Schweineeiweiß zu gegen. Denn das Antischwein-Eiweiß ist ja erst durch das Antigen Schweineblut künstlich erzeugt worden. Und wenn es nun umgekehrt in der Tat gelänge, auch mit Antischweineblut im Körper beliebiger Versuchstiere einen hinsichtlich der Bindungsmöglichkeiten passenden Gegenkörper zu erzeugen, so müßte sich dieser logischerweise in seinen bindenden Gruppen ähnlich oder vielleicht genau so verhalten wie normales Schweineeiweiß, mit anderen Worten: die Versuchstiere müßten durch die Behandlung mit Injek-

tionen von Antischwein — was das Verhalten ihres Rezeptorenapparates anbetrifft — gewissermaßen künstlich zu Schweinen und damit auch für die pathogene Wirkung des Schweinepestvirus empfänglich gemacht werden können.

Diese Möglichkeit war um so wahrscheinlicher, als ja das Schweinepestvirus so innig an das Schweineeiweiß gebunden ist, daß man es durch keines der biologischen Eiweißdifferenzierungsverfahren getrennt davon nachweisen kann. Hierauf hat Glässer*) in einer neueren Veröffentlichung wieder besonders hingewiesen, in der er eine neue Theorie über die Natur des Schweinepestvirus aufstellt. Nach dieser Theorie handelt es sich beim Schweinepestvirus um gewisse Eiweißkörpergruppen der weißen und sekundär auch der roten Blutkörperchen, die in hemmungslose Wucherung geraten, also gewissermaßen parasitär geworden sind. Mag nun diese — wie alles Neue — uns zunächst etwas fremdartig anmutende Theorie in ihren Einzelheiten einleuchtend erscheinen oder nicht, jedenfalls dürfte sie auf manchen bisher in Dunkel gehüllten Vorgang bei der Schweinepest-Infektion und -Immunisierung Licht fallen lassen und würde mit dem etwaigen Gelingen der oben skizzierten Versuche im Einklange stehen.

Ein volles Gelingen dieser Versuche würde ich aber nur in Folgendem erblicken: Es müßte der Nachweis erbracht werden, daß man durch eine einfache systematische Vorbehandlung mit Antischweineeiweiß kleine Tiere in so konstanter Weise für Schweinepestvirus empfänglich machen kann, daß sich eine bestimmte oder wenigstens in engen Grenzen schwankende kleinste, die Versuchstiere in spezifischer Weise krankmachende oder tötende Menge des Virus ermitteln läßt und daß man dieselben gegen ein Mehrfaches dieser Virusmenge durch Gaben des Immunserums, die ihrem Körpergewichte entsprechen, schützen kann. Dann brauchte man nur die Versuchstiere etwa 14 Tage vor dem Serumprüfungs-Versuch mit dem Antischweineeiweiß in entsprechender Weise vorzubehandeln und könnte den Wert des Viruspest-Immunserums in ähnlicher Weise an ihnen bemessen wie den des Schweinerotlaufserums an Mäusen.

Versuche.

Zur Prüfung der im Vorstehenden dargelegten Gedankengänge und Schlußfolgerungen habe ich die folgenden praktischen Versuche angestellt.

Ich habe Kaninchen und Meerfischweinch, Tierarten, denen man der Größenverhältnisse wegen leicht ausreichende Blutmengen entnehmen kann, mit wiederholten Injektionen von normalem, defibrinierten Schweineblut behandelt, indem ich es ihnen in drei- bis fünftägigen Zeitabständen teils subkutan, teils intraperitoneal einspritzte.

Sobald man annehmen konnte, daß eine beträchtliche Bildung von Antikörper eingetreten war, also etwa acht Tage nach der letzten Einspritzung, habe ich sodann mit dem den Meerfischweinch und Kaninchen entnommenen Antischweineblut einige Meerfischweinch und weiße Mäuse in ähnlicher Weise, wie vorher die ersten Versuchstiere, behandelt. Die Absicht, auch noch Kaninchen zu diesen letzteren Versuchen heranzuziehen, habe ich der Kosten wegen und weil gerade die Kokzidiose unter den Kaninchen ihre Opfer forderte, vorläufig aufgegeben.

Nach wiederum acht Tagen glaubte ich durch diese letztere Behandlung den Rezeptorenapparat der Meerfischweinch und Mäuse derart beeinflussen zu haben, daß in ihrem Blute ein reichlich erfolgtes Abstoßen von Antikörper gegen das Antischweinblut anzunehmen war, das Bluteiweiß der Versuchstiere sich also hinsichtlich der Reaktionsfähigkeit gegen Antischwein möglichst ähnlich verhielt wie das Bluteiweiß von Schweinen.

Die Wahl zweier Tierarten, der Meerfischweinch

*) Glässer, „Ätiologie, Diagnose und Bekämpfung der Krankheiten des Schweinepest- und Schweinefeuchekreises“. D. T. W. 1928, Nr. 11 und 12.

und der Mäuse, zu den eigentlichen Infektions- und etwaigen Serumprüfungsverfuchen geschah in doppelter Absicht:

1. Von den Meerfischweincheln, die mit Meerfischweincheln-Antischweineblut vorbehandelt wurden, konnte man erwarten, daß sich der Vorgang der gewünschten Antikörperbildung am reinsten, am ungestörtesten durch sonstige antigene Vorgänge abspielen würde. Denn außer dem an Meerfischweincheneiweiß gebundenen Antischwein-Komponenten war ja nichts Artfremdes eingespritzt worden. Andererseits aber erschien es nicht sicher, ob der „ictus immunisatorius“ des Meerfischweincheln-Antischweineblutes bei Meerfischweincheln hinreichend kräftig sein würde, um nachweisbare Mengen von Antikörper zu erzeugen.

2. In den übrigen Meerfischweincheln, denen ja vom Kaninchen gewonnenes, und in den Mäusen, denen vom Kaninchen oder vom Meerfischweincheln entnommenes Antischweineblut eingespritzt wurde, konnte somit zwar artfremdes Eiweiß wirksam werden, aber man mußte berücksichtigen, daß die demgemäß zu erwartende Antikörperbildung gegen Meerfischweincheln- oder Kaninchen-Eiweiß möglicherweise auf Kosten der Bildung desjenigen Antikörpers stattfinden würde, auf den es ankam, des schweine-eiweißähnlichen Antikörpers gegen Antischwein.

Außerdem glaubte ich gerade auf den Mäuserverfuch vorzugsweise Wert legen zu sollen, weil ja das Endziel der Verfuche eine Auswertung des Schweinepestserums mit möglichst geringem Kostenaufwande war. Stellte es sich etwa heraus, daß die Verwendung des von artgleichen Tieren gewonnenen Antischweineblutes vorzuziehen war, so konnte man auch durch Auspressen ganzer Mäufekörper — nach Enthäutung und Herausnahme von Magen und Darm — genügende Mengen von Antischwein-Mäufeeiweiß herstellen, um damit die Prüfungsmäuse vorzubehandeln.

Das nächstliegende Ziel der Verfuche mußte sein, bei den mit Antischweineblut vorbehandelten Versuchstieren durch nicht übermäßig große Gaben von Virus Schweinepestblut eine spezifische, womöglich tödliche Erkrankung hervorzurufen. Zu diesem Zweck erbat ich mir vom „Institut zur Bekämpfung der Virus Schweinepest“ in Eystrup a. d. Weser einige Kubikzentimeter hochvirulenten Schweinepestblutes, das mir von Herrn Prof. Mießner und Herrn Dr. Geiger in bereitwilligster Weise gütigst zur Verfügung gestellt wurde, und spritzte davon den vorbehandelten Mäusen 0,1 und 0,2 und den vorbehandelten Meerfischweincheln 0,5 ccm in der Weise ein wie es bei der Serumauswertung an Schweinen geschieht, also intramuskulär. Zur Kontrolle wurden gleichfalls vorbehandelten Tieren der genannten Arten 0,2 und 0,5 ccm normalen Schweineblutes eingespritzt, ferner einigen nicht vorbehandelten dieselben Mengen Virusblut.

Der Verlauf der Verfuche ist in den Tafeln I und II wiedergegeben.

Das — leider völlig negative — Ergebnis beweist, daß durch die gewählte Vorbehandlung, die theoretisch durchaus Erfolg zu verheissen schien, eine Empfänglichkeit der Meerfischweincheln und weißen Mäuse für Schweinepestvirus nicht zu erreichen war. Ob es möglich ist, durch verstärkte Vorbehandlung — längere Fortsetzung der Behandlung sowohl der ersten Versuchstiere (der Kaninchen und Meerfischweincheln) mit normalem Schweineblut, evtl. ohne vorheriges Defibrinieren desselben, wie auch der zweiten Versuchstiere (Meerfischweincheln und Mäuse) mit Antischweineblut oder sonstige zeitliche Variationen — zum Ziele zu kommen, müssen weitere Verfuche ergeben. Mit einer umständlicheren Vorbehandlung der Versuchstiere würde allerdings die praktische Brauchbarkeit des Verfahrens in Frage gestellt.

Sollten diese Verfuche, deren Ergebnis mir mit der erwähnten Glässer'schen Theorie im Widerspruch zu stehen scheint, zur Lichtung des Dunkels beitragen, das über dem Wesen der Schweinepestinfektion liegt, so wären sie trotz des völlig negativen Ergebnisses nicht ganz vergeblich gewesen.

Tafel I.

Mäuse-Infektionsverfuch.

Vorbehandlung mit Antischweineblut, das 11 Tage nach der letzten (vierten) Injektion (je 2,0 ccm subkutan und 1,0 ccm intraperitoneal), mit gleicher Menge Kochsalzlösung, den Meerfischweincheln, acht Tage nach der letzten (dritten) Injektion (intraperitoneal) den Kaninchen entnommen und defibriert eingespritzt wurde.

Weisse Maus Nr.	Vorbehandlung. Am 8., 11. und 14. Mai je 0,2 ccm Antischweinblut, von Meerschweinchen gewonnen	Infektion mit Schweinepest- virusblut, defibri- niert, am 22. Mai	Kontrollen. Normales Schweineblut, defibriert	Ergebnis
1	0,2 ccm subkutan	0,1 ccm intramuskulär	—	Die Mäuse wurden täglich genau beobachtet. Keine Mäuse erkrankte. Am 16. August, dem 27. Tage nach dem Infektionsversuch, wurden sie sämtlich gesund aus dem Versuch entlassen.
2	0,2 „ „	0,1 „ „	—	
3	0,2 „ „	0,2 „ „	—	
4	0,2 „ „	0,2 „ „	—	
5	0,2 „ „	—	0,2 ccm intra- muskulär	
6	Am 8., 11. und 14. Mai je 0,3 ccm Anti- schweinblut, von Ka- ninchen gewonnen	0,1 ccm intramuskulär	—	
7	0,3 ccm subkutan	0,1 „ „	—	
8	0,3 „ „	0,2 „ „	—	
9	0,3 „ „	0,2 „ „	—	
10	0,3 „ „	—	0,2 ccm intra- muskulär	
11	—	0,2 „ „	—	
12	—	—	0,2 ccm intra- muskulär	

Tafel II.

Meerfischweincheln-Infektionsverfuch.

Vorbehandlung mit Antischweineblut derselben Herkunft wie in Tafel I.

Meer- schwein- chen Nr.	Vorbehandlung. Am 8., 11. und 14. Mai je 3,0 ccm Anti- schweinblut, defibri- niert, mit der gleichen Menge Kochsalzlösung, von Meerfischwein- chen gewonnen 2 ccm intraperitoneal	Infektion Schweinepestvirus- blut, defibriert, mit der gleichen Menge Kochsalzlösung, am 22. Mai	Kontrollen. Normales Schweineblut, defibriert	Ergebnis
1	1,0 ccm subkutan	0,5 ccm intramuskulär	—	Meerschweinchen Nr. 2 erkrankte gleich nach der letzten Injektion und starb am 9. Tage an eitriger Peritonitis. Alle anderen wurden, ohne erkrankt zu sein, am 27. Tage gesund aus dem Versuch entlassen.
2	1,0 „ „	—	0,5 ccm intra- muskulär	
3	Von Kaninchen gewonnen, 2 ccm intraperitoneal. 1,0 ccm subkutan	0,5 ccm intramuskulär	—	
4	1,0 „ „	—	0,5 ccm intra- muskulär	
5	—	0,5 „ „	—	
6	—	—	0,5 ccm intra- muskulär	

Innere Medizin und Chirurgie.

Sellhausen: Über eine neuartige Chinintherapie in Form von Transpulmin gegen Lungenerkrankungen der Kleintiere und Transpulvet gegen Lungenerkrankungen des Großviehes. (T. R. 1927, S. 879.)

Transpulmin ist eine klare Lösung von Chinin. bas. anhydr. und Kampfer in ätherischen Ölen. In der Humanmedizin wurde daselbe bei einer großen Zahl von Lungenerkrankungen mit Erfolg angewandt. Verf. benutzte das Mittel erfolgreich bei schweren Lungenerkrankungen der Hunde, besonders im Verlaufe der Staupe. Die Dosis betrug 1—5 ccm pro die. Transpulvet ist ein für Großtiere verstärktes Mittel, das intramuskulär in Dosen bis zu 10 ccm täglich gegeben wird. Behandelt wurden bisher vom Verf. 93 Pferde, die teils an schwerster Pneumonie, Bronchitis und Bronchopneumonie litten. Einige Krankenberichte sind angeführt. Transpulvet hat selbst in großen Dosen keine schädigende Wirkung, es bewirkt ein allmähliches Fallen der Fieberkurve, stützt und kräftigt allmählich die Herztätigkeit und fördert den Nafenausfluß, der allmählich abnimmt. K. H. Meyer.

Landshut: Thiosal, ein sicher wirkendes Heilmittel gegen alle Räudearten und Hautkrankheiten. (B. T. W. 1928, S. 37.)

Das von den Chemischen Fabriken Dr. Joachim Wiernik & Co., Berlin-Waidmannslust hergestellte flüssige Präparat besteht aus lipoidlöslichem polyvalentem Schwefel, dessen bekannte Wirkung durch Kombination mit einem für den vorliegenden Zweck erprobten Phenolderivat ergänzt ist. Das Thiosal wird ohne jede Vorbehandlung des Tieres mit Soda oder Seife angewandt. Es bedarf nur einer einmaligen Einreibung auf die Haut, wonach das Tier möglichst eingedeckt werden soll. Nach den Versuchen des Verf. an Hunden hat sich das Mittel als ein unbedingt zuverlässiges Mittel namentlich bei Sarkoptes- und Akarusräude erwiesen. Der große Vorzug des Thiosal besteht in der Erzielung einer restlosen Heilung durch nur einmalige Anwendung bei ganz niedrigen Kosten. Carl.

Seyfarth: Erfahrungen mit der Behandlung der perniziösen Anämie durch Leberdiät. (Aus der Medizin. Klinik der Universität Leipzig.) (D. Archiv für klin. Med. 1928, Bd. 159, S. 93.)

Die vorliegende, von den Amerikanern Minot und Murphy angegebene Behandlungsmethode wurde vom Verf. an 29 Patienten mit ausgezeichnetem Erfolge durchgeführt. Es wurden dabei regelmäßig so schnelle und anhaltende Remissionen erzielt, wie sie bisher mit andern Methoden nicht zu erreichen waren. Eine gleichzeitige regelmäßige Bestrahlung der Kranken mit ultraviolettem Licht (Höhensonne) erhöhte die Wirkungen der Leberkost. Als wirksam erwies sich das „Leberpulver für Diättherapie“ der Firma E. Merck in Darmstadt. Mit bestrahltem Leberpulver waren dieselben Erfolge zu verzeichnen wie mit frischer oder gekochter Leber.

Bei Leberdiät mit entsprechender Beikost steigen die Retikulozyten und die Eosinophilen im strömenden Blute regelmäßig an. Systematische Bestrahlungen der Kranken führen zu einer weiteren Vermehrung dieser Zellen im peripheren Blute. Auch bei Gefunden bewirkt die streng durchgeführte Leberkost einen deutlichen Anstieg in der Zahl der erwähnten Blutzellen, und bei sekundären Anämien infolge sehr großer oder anhaltender Blutverluste hatte Verf. sehr gute Ergebnisse mit der Verabreichung von Leberkost. Carl.

Odermatt, W.: Zur Jod-Alkoholfrage. (Schweizer. Med. Wschr. 1927, Jahrg. 8, Nr. 23, S. 549—551.)

In der Jodtinktur können sich flüchtige Stoffe bilden, welche die Augen röten, zum Tränen reizen und evtl. auch Schnupfen verursachen; bei Revisionen von Apotheken führt die Jodtinktur wegen ihrer Unbeständigkeit häufig zu Be-

anstandungen. Es besteht die Möglichkeit, die erwähnten Reizgase (bes. in Operationsräumen) auszuschalten bei Verwendung von reinem Jod, einer Konzentration von 5proz. Jod, einem Zusatz von Jodkalium und einer Verdünnung des nicht denaturierten Alkohols bis evtl. zu 70prozentigem Alkohol. Auch Abwaschen dieser Tinktur mit denaturiertem Alkohol läßt keine Reizgase entstehen. Zu bemerken ist, daß in Operationsräumen mit dem großen chemischen Inventar auch andere flüchtige Reizstoffe entstehen können. A.

Naucke, Otto: Zur Injektionstherapie in der Veterinärmedizin bei Erkrankungen katarrhalischer Art der Luftwege und der Lungen (Druse usw.). (T. R. 1928, S. 110.)

Transpulmin wird zweckmäßig da angewandt, wo es gilt, bei allgemeiner Staupeerkrankung prophylaktisch Lungenkomplikationen vorzubeugen und bereits vorhandene Lungenerkrankungen in günstigem Sinne zu beeinflussen. Auf der Höhe der Lungenstaupe empfiehlt N., neben Transpulmin Itrid zu geben, um eine rasche Wirkung zu ermöglichen. Bei Transpulvet, in welchem die Chinindose bedeutend erhöht wurde, spricht auch N. von einer spezifischen Beeinflussung der Lungenerkrankungen. Verf. konnte den günstigen Einfluß des Transpulvet besonders bei Druse feststellen; auch bei der Brustfleuche wandte er daselbe mit Erfolg an und fiel hier bei rechtzeitiger Anwendung der abortive Verlauf der Seuche auf. K. H. Meyer.

Schulz, Ottokarl: Experimentelles über die antirachitische Wirksamkeit von ultraviolettbestrahlten animalischem Öl. (Aus dem Milchwirtschaftlichen Laboratorium Grebenstein. — Leiter: Dr. Ottokarl Schulz.) (T. R. 1928, S. 85.)

Aus den Stoffen, die durch indirekte Strahlenenergie antirachitisch werden, wurde Knochenöl auf seine antirachitische Wirksamkeit geprüft, um evtl. in der Großtiertherapie Verwendung zu finden. Verschiedene Versuchsreihen junger Ratten erhielten die rachitogene Kost nach Chermann-Pappenheimer Nr. 84 bezw. diese und tägliche Gaben bestrahlten Knochenöls. Während die Kontrolltiere mit florider Rachitis reagierten, blieben die behandelten Tiere selbst bei nur täglicher Gabe von 0,05 Gramm bestrahlten Knochenöls frei von Rachitis. Die gleiche Dosis genügte, um eine röntgenologisch festgestellte Extremitätenrachitis in 18 Tagen zur Abheilung zu bringen. Die rechnerisch gefundenen Dosen für Großtiere sind: Kälber 10 ccm, Rinder 20—25, Fohlen 40—50 ccm. Das aktive Öl wird zweckmäßig mit Mehl als Latwerge angerührt. K. H. Meyer.

Wildegans, H.: Die Lebensdauer direkt transfundierter Erythrozyten. (Archiv für klin. Chirurgie 1926, Bd. 139, S. 135, bis 190.)

Bei Verwendung fremdartigen Blutes lassen sich bei direkter Transfusion die Spender- und Empfängererythrozyten im Blutbild deutlich unterscheiden und in ihrem Abbau verfolgen. So sind Taubenblutkörperchen, die Kaninchen direkt transfundiert wurden, 48 Stunden lang nachweisbar (Zerfall also sehr schnell ohne Übernahme von Funktionen). Durch vitale Färbung flüssigen Blutes ist es möglich, die gefärbten Spenderblutkörperchen im Empfängerblut der gleichen Tiergattung sichtbar zu machen. Die Untersuchungen auf Hämoglobinämie nach der direkten Transfusion beim Menschen zeigen, daß bereits im Laufe der ersten Woche nach der Transfusion Hämolyse eintreten kann, daß diese in der zweiten Woche ihren Höhepunkt erreicht, um dann in der dritten bis vierten Woche zurückzugehen. Die transfundierten Erythrozyten, welche im zirkulierenden Blute zugrunde gehen, entsprechen nur einem geringen Prozentsatz des zugeführten Blutes, während der größte Teil jedenfalls im Kreislauf nicht zerfällt. Die transfundierten Erythrozyten erhalten sich im Empfänger mehrere Wochen, sie werden nicht zu integrierenden Bestandteilen des Wirts, sondern sind wie alle Zellen der Abnutzung und Erschöpfung verfallen, aber sie zirkulieren

in den Gefäßen des Empfängers und verhalten sich zum großen Teil wie das bereits vorhandene Blut, sie beteiligen sich am Gaswechsel und tragen zur Vergrößerung der Atemoberfläche bei. Die Erhaltung der Sauerstoffträger stellt das belebende Prinzip der Bluttransfusion dar, sie ist bei großen Blutverlusten, bei chronischen sekundären Anämien, als Vorbereitung zu eingreifenden Operationen und als Unterstützungsmittel nach solchen Eingriffen angezeigt und bei gewissenhafter Blutprüfung und Technik ungefährlich. A.

Lieschke, G.: Die Eisentherapie bei den sekundären Anämien der Pferde. (In.-Diss. Berlin ohne Jahr.)

Nach Verabfolgung von Eisenpräparaten bei sekundären Anämien des Pferdes trat eine Vermehrung des Hämoglobingehaltes und eine Zunahme der Erythrozytenzahl ein, die nach den Kontrollversuchen nicht nur auf die Beseitigung der mutmaßlichen Ursache der Anämien bezogen werden kann. Die Vermehrung und die Zunahme waren oft bedeutend. Eine Norm für das Ansteigen konnte nicht festgestellt werden. Hämoglobinwerte und Erythrozytenzahlen zeigten kein bestimmtes Zahlenverhältnis. Die Zahl der Erythrozyten stieg im Verhältnis zum Hämoglobin oft unverhältnismäßig stärker (Hb.-Armut der neugebildeten roten Zellen). Die Wirkung des Eisens scheint danach in einer direkten Reizung des Knochenmarkes zu bestehen. Nach dem Aussetzen der Therapie folgt mitunter eine Erlahmung der formativen Tätigkeit. Eine vierwöchige Behandlung hatte bessere Ergebnisse als eine nur vierzehntägige. A.

Lendle: Probleme der Schlafmitteltherapie. (Sitzung der pharmazeutischen Gesellschaft Leipzig vom 27. April 1928.) (Pharmazeutische Zentralhalle 1928, S. 333—335.)

Um der Gewöhnung, der Kumulation und den Nebenwirkungen der verwendeten Narkotika genügend Rechnung zu tragen, ist eine größere Auswahl brauchbarer Schlafmittel erwünscht. Ein gutes Schlafmittel soll mit möglichst kleinen Dosen einen tiefen Schlaf herbeiführen, hierbei ist die Geschwindigkeit, mit der die Lähmung im Großhirn eintritt, und die Zeitstufe, in der diese Wirkung wieder abklingt, von Bedeutung. Die Narkosebreite, also der Abstand der narkotischen Konzentration, bei der die lähmende Wirkung einsetzt und der letalen Konzentration, ist ein Maß für die Größe der Gefahr der Überdosierung. Die eine Gruppe der Schlafmittel gehört der Fettreihe an und umfaßt die Halogenderivate (Paraldehyd, Alkohole, Chloralhydrat usw.). Diese Mittel sind durch rasche unter rauchartigem Zustand eintretende, aber sehr bald wieder abklingende Wirkung gekennzeichnet. Sie wirken vor allem auf die Großhirnrinde und können bei Halogensubstitution zu Herzscheidungen führen. Die andere Gruppe, die Harnstoffderivate, wirken dagegen erst später, verursachen aber einen tiefen und dauerhaften Schlaf. Sie reagieren vor allem mit dem im Hirnstamm lokalisierten Schlafsteuerzentrum und haben eine Blutdrucksenkung zur Folge. Da es ein „ideales“ Schlafmittel in keiner von beiden Gruppen gibt, so wird man je nach den Anforderungen Einschlaf- oder Dauerschlafmittel bevorzugen oder beide kombinieren. Für den Charakter als Narkotikum ist die Lipoidlöslichkeit einer Substanz von Bedeutung; Parallelen zwischen der chemischen Konstitution und Wirkung werden an verschiedenen Beispielen erörtert. Die Heilmittel der Kombinationstherapie, insbesondere das Veramon werden unter dem Gesichtspunkt des Gesetzes von Bürgi besprochen. Dieses befragt bekanntlich, daß die Mittel, die gleiche Wirkung, aber verschiedene Angriffspunkte haben, bei Kombination eine potenzierte, jedenfalls mehr als additive Wirkung zeigen. Es ist zu befürchten, daß der Markt mit neuen Kombinationspräparaten übersättigt wird; es ist zu fordern, daß die wirkliche Leistungsfähigkeit nicht kritiklos nach der Bürgischen Regel angenommen wird, sondern mit großem Versuchsmaterial beurteilt wird. R. Völker.

Gremels, H.: Über die Wirkung einiger Diuretika am Starling'schen Herz - Lungen - Nierenpräparat. (Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Hamburg [Allgemeines Krankenhaus St. Georg].) (Naunyn-Schmiedeberg's Archiv für exp. Pathol. und Pharmakol. 1928, 130. Bd., S. 61—88.)

In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die Wirkung der Diuretika an der isolierten Niere zu untersuchen. Trotz bestimmter diskutierter Mängel ist die Methodik für den angeführten Zweck brauchbar. Es wurden untersucht: Coffein, Theobromin, Theophyllin, Euphylin, Novasuröl, Salyrgan, Strophanthin und Digitoxin. Die Stoffe haben eine in ihrem Charakter gemeinsame an der Niere angreifende diuretische Wirkung. Außerdem besitzen die eben angeführten Stoffe aus der Purinreihe und der Gruppe der Digitalisglykoside noch eine peripher angreifende, die Nierengefäße erweiternde Wirkung, die eine durch die Steigerung der Durchblutung bedingte Diurese hervorrufen kann. Diese Gefäßwirkung ist unabhängig von der spezifischen Nierenwirkung. R. Völker.

Kionka, H.: Untersuchungen über Alkohol. III. Mitteilung: Die Schwankungen im Alkoholgehalt des menschlichen Blutes. (Aus dem Pharmakolog. Institut der Universität Jena.) (Naunyn-Schmiedeberg's Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1928, 128. Bd., S. 133—145.)

Die Untersuchungen erstreckten sich auf die Feststellung des Alkoholgehaltes des menschlichen Blutes und die Beeinflussung durch verschiedene, künstlich herbeigeführte Momente. Eine Erniedrigung kann erzielt werden, wenn man den Alkohol in einen reichlich gefüllten Magen bringt und wenn man gleichzeitig mit der Alkoholfuhr eine stärkere Diurese einleitet. Wenn es somit auch möglich ist, den Alkoholspiegel auf einer bestimmten niedrigen Höhe zu halten, so vermögen wir dennoch nicht, die resorptiven Alkoholwirkungen im Organismus überhaupt auf solche Weise graduell zu beeinflussen. Die Alkoholmenge im Blut ist somit durchaus nicht als Gradmesser für den „Vergiftungszustand“ bei akuter Alkoholeinwirkung aufzufassen. Für den Alkohol im Blute muß es nach Ansicht des Verf. einen gewissen Schwellenwert geben, unterhalb welchem der Alkoholgehalt für den Organismus völlig indifferent sein muß, da dieser Zustand den normalen Verhältnissen entspricht. Da unter Umständen der normale Alkoholgehalt des Blutes auch ohne Zufuhr des Alkohols Werte erreichen kann, welche höher liegen als der Alkoholgehalt, der nach dem Trinken von recht nennenswerten Mengen Alkohol (etwa 20 ccm) im Blute erreicht wird, so dürfte eine einmalige Zufuhr mäßiger Alkoholmengen tatsächlich unschädlich sein. R. Völker.

Hirsch, Paul: Untersuchungen über Alkohol. IV. Mitteilung: Die Bestimmung des Äthylalkohols im Harn. (Aus dem Pharmakolog. Institut der Universität Jena.) (Naunyn-Schmiedeberg's Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1928, 128. Bd., S. 146—149.)

Die von Kionka und Hirsch angegebene Methode zur Bestimmung des Äthylalkohols im Blut wird auch auf den Harn ausgedehnt. Normalerweise kommen auch im Harn abstinenten Versuchspersonen geringe Mengen von Alkohol vor, der auf eine Bildung von Alkohol im intermediären Stoffwechsel zurückzuführen ist. Bisweilen wird auch kein Gehalt an Alkohol beobachtet. Fehler durch Fettsäure, Ammoniak flüchtiger organischer Basen können ausgeschaltet werden. Aceton konnte nicht nachgewiesen werden und kommt als Fehler hier nicht in Betracht. Die Methode führt zu brauchbaren Ergebnissen. R. Völker.

Weisbach, W.: Über den Wirkungsmechanismus von Metallhydroxyden gegenüber pathogenen Mikroorganismen im Vergleich zu Bolus alba. (Fortschritte der Therapie 1926, Jahrg. 2, Nr. 10, S. 192—324.)

Das Alkaliadsorptionsvermögen von Bolus alba und von Metallhydroxyden hat für die Beseitigung der pathogenen Flora an den Schleimhäuten viel größere Bedeutung als die

austrocknende und adstringierende Wirkung. Das Alkaliadsorptionsvermögen kolloidaler Tonerde in statu nascendi ist wesentlich größer als bei Bolus alba. Die obige Feststellung hat insofern eine Bedeutung, als sich auf Grund großer Versuchsreihen die Überzeugung Bahn gebrochen hat, daß eine auch nur oberflächliche Desinfektion von Schleimhäuten im Sinne der „sterilisatio magna“ mit den gebräuchlichsten und im Reagensglas vorzüglich wirkenden Desinfektionsmitteln sich nicht durchführen läßt. Der Grund liegt darin, daß diese Desinfektionsmittel in wirksamer Dosis an der Oberfläche der Schleimhäute stark adstringierend wirken, wobei die Keime zum Teil in Winkel und Schluchten der Schleimhautfalten gedrängt werden, wo sie sich dann ungehindert weiter entwickeln können. Wendet man aber eine Tiefenwirkung mittels Ätzmittel an, so ist die Möglichkeit eingreifender Gewebsschädigung gegeben. A.

Yukzio, Ohno: Zur Frage der Pathogenese des Ikterus.

(Medizinische Klinik 1927, Nr. 43, S. 1639—1643, Nr. 44, S. 1685 bis 1687.)

Trotz zahlreicher experimenteller Forschungen ist die Entstehungsweise der Gelbfucht bis heute noch nicht aufgeklärt, insbesondere ist noch wenig bekannt, wie die einzelnen Ikterusformen in ihren ätiologisch innig zusammenhängenden Momenten einwandfrei zu erklären sind. Eppinger glaubte nach seinen Befunden, daß die Gallenkapillaren beim sog. Stauungsikterus deutlich erweitert und mehr oder weniger zerrissen sind. Seine Behauptung über die Pathogenese des sog. Stauungsikterus stimmt in manchen Beziehungen mit der Stärke und der zeitlichen Schwankung der Gelbfucht nicht überein. Erweiterung, Zerreißung oder Gallenzylinderbildung in den Kapillaren sind sicher ein Zeichen der Gallenstauung, aber meist als sekundäre, oder wenigstens Teilercheinungen zu betrachten. Durch die experimentellen morphologischen und chemischen Untersuchungen bei Choledochusuntersuchungen ergibt sich, daß die Galle entweder durch die Zerreißung der Gallenkanälchen beim Kaninchen oder beim Hunde infolge Durchsickerns ohne Kontinuitätstrennung auf dem Lymphwege ins Blut tritt (Gallenaustritt hauptsächlich an Übergangsstellen der Gallenkapillaren zu den interlobulären Gallenkanälchen). Beim toxischen Ikterus handelt es sich fast ausschließlich, wenigstens anfangs um einen echten Resorptionsikterus, bei dem Galle durch die toxisch geschädigten Gallenkanälchen durchsickert. Später bleibt infolge des mangelhaften Ausscheidungsvermögens der Leberzellen selbst die Galle im Blute zurück, und es gefellt sich der Retentionsikterus hinzu. Dies Verhalten ist genau das gleiche wie beim Retentionsikterus. Das Bilirubin kommt im wesentlichen auf zwei verschiedenen Wegen im Blute vermehrt vor, entweder durch die Rückresorption vom Gallengangsyst. aus, oder durch das Zurückbleiben des Gallenfarbstoffes im Blute. Im letzteren Falle kommen wiederum zwei Momente in Betracht: eine Störung des Ausscheidungsvermögens infolge der Leberzellenschädigung oder eine Überproduktion des Gallenfarbstoffes unabhängig von der Leberzellenfunktion. Die „Parapedese“ Minkowskis kommt in Wirklichkeit gar nicht in Betracht, wenn man auch extrahepatozelluläre Bilirubinbildung anerkennt. Es ist noch nicht erschöpfend untersucht, ob eine Gelbfucht im strengsten Sinne, ohne jede Beteiligung der Leberzellen, vorkommen kann; auch ist es zur Zeit kaum möglich, ganz positiv festzustellen, ob irgend eine Funktionsstörung der Leberzellen vorliegt oder nicht. — Der Ansicht Aschoffs folgend teilt Verf. die Gelbfucht ein in: I. Hepatozelluläre Gelbfucht a) Hepatozelluläre Gelbfucht im engeren Sinne (Retentionsikterus); b) Cholangogene Gelbfucht (Resorptionsikterus) — 1. Rhektische Gelbfucht, 2. Diapedetische Gelbfucht. II. Anhepatozelluläre Gelbfucht (Hyperbilirubinämie). A.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Schmitt, M.: Neuere Praxiserfahrungen mit Therapogalt bei Mastitis infectiosa-parenchymatosa (gelber Galt) der Milchtiere, insbesondere der Milchkühe. (T. R. 1928, S. 128.)

Therapogalininfusionen (30 Therapogalt auf 1000 abgekochtes bzw. lauwarms dest. Wasser) in Mengen bis zu 250 ccm pro Euterviertel, die 6—10 Stunden im erkrankten Viertel belassen wurden, genügten meist schon in einmaliger Anwendung zur Ausheilung nicht allzuschwerer Fälle ansteckender Mastitis. Bei vorgeschrittenen Fällen bzw. solchen mit schweren Allgemeinerkrankungen wurden neben der Infusion Therapogaltinjektionen vorgenommen. Intravenöse Injektionen wurden der unangenehmen Nebenwirkungen wegen nicht angewandt; bei intramuskulärer Injektion können selbst größere Dosen ohne Schädigungen verabfolgt werden. Günstige Wirkungen sah Schmitt auch bei anderen Infektionskrankheiten (Druse, Staupe), namentlich bei den hochfieberhaften Erkrankungen der Schweine (Backsteinblattern, Rotlauf) teils mit, teils ohne Anwendung von Serum. Im gleichen Sinne günstig wirkte Therapogalt-Nuclein. K. H. Meyer.

Meyer, Fr.: Die Therapie der Sterilität des Rindes unter besonderer Berücksichtigung der Yatren-Vakzine-Therapie nach Prof. Oppermann. (Arch. für wissenschaftl. Tierheilkunde 1928, 57, S. 310.)

Während die früheren chirurgischen Methoden der Sterilitätsbehandlung nur in 50—60 Prozent zum Erfolg führten und infektiöse Erkrankungen der Eileiter und Tuben kaum heilbar waren, waren die vom Verf. mit Yatren-Vakzine in 200 Fällen erzielten Ergebnisse bedeutend besser. Bei chronischer Endometritis betrug der Prozentsatz der Heilung 88,71 Prozent, bei chronischer Endometritis und gelben Körpern 78,94 Prozent, bei Corpus luteum persistens 74,28 Prozent, bei unbestimmter Diagnose 67,26 Prozent, insgesamt 77,5 Prozent. Tiere, die nach Scheidenkatarrh nicht aufnahmen, wurden nach Yatren-Vakzine-Behandlung wieder tragend. Neben der manuellen Behandlung empfiehlt sich die Anwendung der Yatren-Vakzine-Therapie, besonders in den Fällen, wo eine bestimmte Diagnose nicht zu stellen ist, da dadurch die Heilungsziffer bedeutend erhöht wird. Geiger.

Weiß: Tuberkulose-Burow bei der Sterilitätsbehandlung. (T. R. 1928, S. 296.)

Bei einer Kuh, welche 7 Kälber geboren hatte, regelmäßig rinderte, aber trotz wiederholten Deckens nicht aufnahm, wurde eine Vergrößerung des rechten Eileiters festgestellt und als Ursache Tuberkulose angenommen. Die Ophthalmotuberkulinprobe fiel positiv aus. Behandlung mit dreimaliger subkutaner Injektion von je 10 ccm Tuberkulose-Burow war erfolgreich und sieht Verf. hierin ein Mittel zur Heilung beginnender oder nicht allzuweit vorgeschrittener Eierstocktuberkulose. K. H. Meyer.

Seiderer: Die chemisch-therapeutische Behandlung des infektiösen Abortus und des Umrinderns mit dem unspezifischen Impfstoff „Gulisan“. (B. T. W. 1928, S. 209.)

Verf. hat das von der Tierarzneimittelfabrik Veterinaria in Rostock hergestellte Mittel in feiner Praxis mit 100 Prozent Heilerfolg angewandt. Dasselbe wird in der Menge von 10 ccm subkutan injiziert. Preis der Dosis Mk. 1,50. Zusammenwirkung nicht angegeben. Carl.

Thomas, K.: Ein Beitrag zur Ätiologie der Metritiden des Rindes. (In.-Diss. Leipzig 1927.)

Von 277 wahllos untersuchten Uteri waren 7 krankhaft verändert. Unter 52 nach dem äußeren Aussehen krankhaft veränderten Uteri erwiesen sich bei der bakteriologischen Untersuchung 14 als keimfrei; in 12 Fällen wurden Tuberkelbazillen und in 26 Fällen andere Erreger als Ursache der Metritis gefunden. Die keimfreien Uteri zeigten durchgehend anatomische Abweichungen, die vorzüglich die

Schleimhaut betrafen (wahrscheinlich abgelaufene infektiöse Prozesse). Bei tuberkulöser Metritis war die Anzahl der Bakterien* zumeist erheblich. Von miliaren Tuberkeln bis zum Zusammenfließen der Herde, so daß die Schleimhaut eine große käfige Fläche darstellte, wurden verschiedene Übergangsformen gefunden. Der bakteriologische Befund bei 52 Uteri ergab Bakterienarten, die mehr oder weniger als typische Eitererreger zu gelten haben und zwar *Bac. pyogenes* in Reinkultur oder in Verbindung mit Kokken, bipolaren Bakterien; *Bac. fusiformis*; Kokken in Reinkultur oder mit bipolaren Bakterien und *Bac. fusiformis* (?). Der *Bacillus pyogenes* ist vorwiegend bei chronischen Entzündungen des Uterus anzutreffen. Die aus den Metritiden gezüchteten Kokkenstämme erwiesen sich durchgehend morphologisch als Staphylokokken, von denen drei in Form von Tautropfen wuchsen. Eine Eingliederung in eine bestimmte Art war bei diesen Stämmen nicht zu erreichen. Ein zum Vergleich untersuchter Fall von Staphylokokkenmetritis des Schweines ließ charakteristische anatomische Veränderungen erkennen (vollkommene Nekrose der Schleimhaut). Die aus dem Fall gezüchteten Staphylokokken verhielten sich wie die vom Rinde stammenden mit porzellanem Belag erscheinenden Staphylokokken. A.

Kronacher, C. und J. Kliesch: Die Körperentwicklung der Ziege von der Geburt bis zum Alter von einem Jahr unter Berücksichtigung des Nährstoffbedarfs und der Nährstoffverwertung der Lämmer sowie der Ernährung und Leistung der Muttertiere. (Mit 28 z. Teil mehrfarbigen Abbildungen im Text und auf Tafeln.) (Zschr. für Tierzüchtung u. Züchtungsbiologie, Bd. XI, Heft 2.)

Bei der großen volkswirtschaftlichen Bedeutung der deutschen Ziegenzucht — Wert der Gesamtjahreserzeugung (Milch, Fleisch, Felle, Dünger) nach Linkh über 405 Millionen Mark — dürfen die äußerst sorgfältigen und gründlichen Untersuchungen, die Kronacher und Kliesch im Jahre 1926/27 mit einem Bock und vier Ziegen des reifarbenen Wintersheimer Schlages, sowie mit sechs von diesen Eltern abstammenden Lämmern (5 Bocklämmer und 1 weibliches Lamm) durchführten, ein lebhaftes Interesse beanspruchen. Es wurden geprüft: 1. Die Körperentwicklung und der Nährstoffbedarf der Lämmer [Aufzucht und Ernährung, Nährstoffverbrauch und Kosten, Verwertung der aufgenommenen Nährstoffe, Körperentwicklung (Lebendgewichtsbewegung, Körpermaße), Gesamtbetrachtung des Wachstumsverlaufs, auch im Vergleich zu jenen bei anderen Haustiergattungen]. 2. Fütterung und Leistung der Muttertiere.

Von den Hauptergebnissen der 90 Berichtseiten umfassenden Arbeit sei folgendes erwähnt: Die Milchaufnahme der bei der Geburt 6—7 Pfund schweren Lämmer betrug am 1. Lebenstage 500 Gramm und stieg bis zum Ende der 1. Woche auf 1100—1200 Gramm. Von der 5. und 6. Woche an wurde als Beifutter Kleie, Quetschhafer, Luzerne- und Wiesenheu verabreicht. In 9—10 Wochen wurden durchschnittlich 72 Liter Milch verabreicht. Am Ende des ersten Jahres war die Futteraufnahme je Tier und Tag: 1 Pfund Hafer, 1 Pfund Luzerneheu und 1/2 Pfund Mohrrüben. Gesamtverbrauch im 1. Jahre durchschnittlich 72 Liter Milch, 148 kg Hafer, 5 kg Kleie, 98 kg Luzerneheu und 26 kg Mohrrüben. Ein Kilogramm Lebendgewichtszunahme erforderte im 1. Jahre durchschnittlich 3,78 kg Stärkewert mit 0,529 kg verdaulichem Eiweiß (beim Kalb nur 2,22 kg Stärkewert mit 0,518 kg Eiweiß; Ziegenlamm also 50 Prozent mehr Stärkewert als ein Bullenkalb bei fast ziemlich gleichem Verbrauch von verdaulichem Eiweiß). Ausnutzungsquotient (Verhältnis der aufgenommenen Trockensubstanzmenge zum Ansatz) bis zur 36. Lebenswoche ansteigend, dann auffallend sinkend infolge des vermehrten Ansatzes (Geschlechtsreife und vollkommene Ausbildung des Wiederkäuermagens). Die bei der Geburt leichtesten Lämmer entwickelten sich am besten und überholten die andern

in den Maßen. Die Mutterziegen erzeugten in den Jungen, soweit es Zwillinge waren, den 7. Teil ihres Körpergewichts (Kalb etwa der 13. Teil des Gewichts der Durchschnittskuh). In den ersten vier Wochen stärkstes Wachstum. Verdoppelung des Geburtsgewichts bei den schwereren Tieren in drei Wochen, bei den leichteren in 14 Tagen; Verdreifachung bei ersteren in sechs Wochen, bei letzteren in 4—5 Wochen; Böcke am Ende des ersten Jahres 45—50 Prozent, Ziegenlämmer 68 Prozent des Endgewichts; Geburtsgewicht bis Abschluß des Wachstums bei ♂ ungefähr verzweifelt, bei ♂ verzwanzigfacht. Widerristhöhe (34 cm bei der Geburt) nimmt im 1. Jahre 40 cm zu = 86 Prozent der Höhe des ausgewachsenen Tieres. Kreuzhöhe bei Geburt durchschnittlich 1 cm höher als Widerrist (bis Ende des 1. Jahres ausgeglichen). Körperlänge (bei Geburt 29—30 cm) geringer als Widerristhöhe, Lämmer also hochbeinig. Im Alter von vier Wochen ausgeglichen. Vom Gesamtlängenzuwachs im Alter von 1 Jahr 90 Prozent erreicht. Brustumfang (bei Geburt 32 cm, Ende des 1. Jahres bei der Ziege 70 cm = 78 Prozent des ausgewachsenen Tieres. Brusttiefe, bei Geburt 12—15 cm (am größten beim ♂), beim Abschluß des Wachstums beim ♂ verdoppelt, beim ♂ verdreifacht. Brustbreite, 5—6 cm bei Geburt, bis zum Ausgewachsensein bei ♂ verdreifacht, bei ♂ verdrei- bis vervierfacht. Hüftbreite, beim neugeborenen ♂ etwas größer als beim ♂, verschiebt sich nach dem ersten Jahre offenbar zugunsten des ♂. Beckenbreite (Umdreherbreite), bei allen Tieren bei der Geburt 2 cm größer als Hüftbreite, am Schlusse des 1. Jahres beim ♂ größer als beim ♂; beim ausgewachsenen Tier das 2—2 1/2fache der Breite bei der Geburt. Röhrenumfang, 6 cm bei der Geburt (beim ♂ etwas größer als beim ♂), Zunahme bis Ablauf des 1. Jahres 5 cm beim ♂, 2,5 cm beim ♂. Das Wachstum verläuft bei der Ziege nach den gleichen Gesichtspunkten wie bei Pferd und Rind.

Futterverbrauch der Mutterziegen für 50 kg Lebendgewicht und 2,5 kg Milchleistung täglich etwa 1000 Gramm Stärkewerte mit etwa 175 Gramm verdaulichem Eiweiß. (Ration: etwa 4 Pfund Rüben, 2 1/2 Pfund Luzerneheu, im Sommer statt Rüben und Heu 10—12 Pfund Grünfutter, 1 Pfund Hafer, 1/2—1 Pfund Weizenkleie). Trockensubstanzgehalt etwa 2000 Gramm (auf 1 kg Lebendgewicht etwa 50 Gramm Trockensubstanz). Im Vergleich zur Kuh bedarf die Ziege doppelt soviel Trockensubstanz, Eiweiß und Stärkewert. Im Verhältnis zur Körpergewichtseinheit ist aber die Milchleistung bei der Ziege 2 1/2—3mal höher als bei der Kuh. Bei obiger Fütterung lieferten die Ziegen im Verlauf der Laktation 755, 485, 708 und 781 kg Milch mit durchschnittlich 3,47, 4,40, 4,24 und 4,25 Prozent Fettgehalt. Die höchsten Erträge brachte die Grünfütterung in der 12. bis 24. Woche der Laktation. Von der 34. Woche an langsame und konstante Abnahme des Milchertrages. Verglichen mit dem Körpergewicht lieferten die Ziegen das 18,87, 11,38, 18,63 und 16,97fache an Milch. A. Hink.

Schmidt: Beiträge bzw. Beobachtungen über Torsio uteri. (T. R. 1928, S. 59 und 81.)

Von Lageveränderungen der Gebärmutter kommen in der Praxis besonders Torsio uteri und Prolapsus uteri vor, von welchen Sch. die erstere häufiger beobachtete. Am häufigsten wird dieselbe beim Rind gesehen, seltener bei kleinen Wiederkäuern, sehr selten bei Pferd, Schwein und Fleischfressern. Die zweckmäßigste Art der Rückwälzung geschieht am liegenden Tier, wofür ein geräumiger, am besten schräg ansteigender Platz gewählt wird. Besondere Vorteile sah Verf. von der vorherigen Infusion einer dünnen Leinfamenschleimabkochung, oder im Notfalle von frisch und sauber gewonnener Milch, da die Menge des Fruchtwassers bei Torsio uteri immer gering und die trockene Gebärmutterwand sich fest auf das Junge legt. Um Reposition zu erzielen sind häufig 20—100 Wälzungen nötig. Endlich bleibt noch die Laparotomie, die aber nur unter gewissen

Voraussetzungen indiziert ist, daselbe gilt auch vom Kaiserschnitt, durch den in der Regel nur das Junge gerettet wird. Selbstheilung kann unter allmählicher Mumifizierung der Frucht beobachtet werden. Es kann aber auch Mazeration des Jungen erfolgen und durch Metritis der Tod des Muttertieres eintreten. Eingehend berichtet Verf. über Erscheinungen, Zeit des Bestehens, Ursache und gibt neben einer umfangreichen Kasuistik zahlreiche Sektionsergebnisse.

K. H. Meyer.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Leontjew, H.: Zur Biophysik der niederen Organismen. III. Mitteilung: Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes des *Micrococcus albus*. (C. f. B. I. Abt. Orig. Bd. 107, 1928, S. 308.)

Verf. gelang es auf Grund einer genaueren Methode gegenüber anderen Untersuchungsresultaten zu verlässlichen Ergebnissen zu kommen, die in folgender Zusammenfassung niedergelegt sind:

1. Die Angaben über die Dichte der Bakterien sind nicht allein für die Lösung des Problems ihrer Physiologie und Biologie bedeutsam, sondern auch für die praktische Bakteriologie, z. B. für die Standardisierung der Vakzinen von Notwendigkeit. 2. Die beschriebenen Methoden zur Bestimmung der Dichte der Bakterien sind entweder theoretisch oder experimentell unzulänglich. 3. Die Dichte des *Micrococcus pyogenes albus*, die auf Grund der Senkungsgeschwindigkeit (Stokes) bei 15,0—15,7 Grad C berechnet wurde, beträgt 1,089. 4. Als spezifisches Gewicht der Bakterien kann im Durchschnitt 1,055 genannt werden.

Carl.

Weleminsky: Über die filtrierbare Form des Tuberkelbazillus. (Zbl. für die ges. Tuberkuloseforschung 1928, Bd. 28, S. 305.)

Die Existenz filtrabler Formen des Tuberkelbakteriums erscheint bisher nicht einwandfrei bewiesen. Es stehen den positiven Befunden sehr viel negative gegenüber und die positiven selbst lassen fast ausnahmslos noch die Erklärung zu, daß wenige, vielleicht manchmal nur ein einziges Bakterium, das Filter passiert haben. Wenige Keime können aber unter Umständen beim Meerschweinchen eine atypische Krankheitsform hervorrufen. Außerdem muß mit gelegentlicher Spontaninfektion als Fehlerquelle gerechnet werden.

Meyn.

Standesangelegenheiten.

Verbandsitzung der Landwirtschafts-Kammertierärzte am Montag, den 9. Juli 1928, im Bakteriologischen Institut der Landw.-Kammer Niederschlesien in Breslau.

Protokoll.

Die Verbandsitzung wurde am Montag, den 9. Juli, 16 Uhr, von Dr. Schumann, dem Direktor des Bakteriologischen Instituts in Breslau, unter Begrüßung der Mitglieder eröffnet. Es sind anwesend: Prof. Dr. Raebiger-Halle, Geheimrat Prof. Dr. Hobstetter-Jena, Dr. Pröscholdt-Züllchow-Stettin, Dr. Karsten-Hannover, Dr. Schumann-Breslau, Dr. Kiessig-Kiel, Dr. Eickmann-Bonn, Dr. Lührs-Oldenburg, Dr. Wolters-Dessau, Dr. Rautmann-Halle, Dr. Krage-Königsberg, Dr. Lentz-Berlin, Dr. Weichlein-Prenzlau, Dr. Lerche, Dr. Gerstenberger, Dr. Grasnick, Dr. Müller, Dr. Pippert, Berenz, Dr. Froelich, sämtlich aus Breslau.

Ihr Ausbleiben haben entschuldigt: Dr. Scharf-Berlin, Dr. Knauer-Königsberg, Dr. Machens-Braunschweig und Dr. Sachweh-Münster.

1. Verbandsangelegenheiten.

Der Vors., Prof. Dr. Raebiger, erstattet darauf den Geschäftsbericht:

Im vergangenen Geschäftsjahr konnten verschiedene Institute ihr Jubiläum feiern. So konnte das Institut der Kammer Brandenburg am 1. Februar d. Js. sein 25jähriges Bestehen feiern, mit dem das 25jährige Dienstjubiläum des Leiters dieses Instituts, Direktor Dr. Scharf, verbunden war. Nachträglich sei erwähnt, daß im Jahre 1916 die Thüringer Landesveterinäranstalt in Jena auf ihr 100jähriges Bestehen zurückblicken konnte. Die damaligen Kriegsjahre gestatteten jedoch keine Festveranstaltung. Am 1. April 1927 konnte das Gesundheitsamt Stettin-Züllchow und am 1. April 1928 das Tierseucheninstitut in Kiel sein 25jähriges Bestehen feiern. — Gratuliert wurde Geheimrat v. Osterreich zur Ernennung zum Ehrendoktor der Landesuniversität Tübingen, Geheimrat Edelmann zum 25jährigen Dienstjubiläum als Landestierarzt von Sachsen, Prof. Dr. Eber zum 50jährigen Bestehen des Tierseucheninstituts in Leipzig und der Tierärztlichen Hochschule Hannover zum 150jährigen Bestehen. Weiterhin sind im Namen des Verbandes Glückwünsche ausgesprochen worden Ökonomierat Keiser anlässlich der Ernennung zum Ehrenbürger der Hannoverschen Hochschule und zur Amtsbezeichnung Oberlandwirtschaftsrat.

Der Verband beteiligte sich an der Fröhner-Spende. Das von dieser herausgegebene Bild Fröhners ist jedem Institutsleiter überliefert worden. — Für die Ernst Joest-Büste wurden vom Verbands 200 Mark bewilligt; die Leiter der Institute in Züllchow und Kiel werden in Anbetracht der früheren Zugehörigkeit Joests zu diesen Instituten voraussichtlich noch eine Sonder-Spende überweisen.

Prof. Raebiger berichtet, daß die Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene sich mit der Bekämpfung der Gesundheitschädlinge vom hygienischen Standpunkt aus befaßt und für Mitarbeit und Beiträge für die Zeitschrift für Desinfektions- und Gesundheitswesen dankbar wäre.

Ferner macht der Vors. darauf aufmerksam, daß die Hauptlandwirtschaftskammer außer den Wanderversammlungen der Leiter der Bakteriologischen Institute noch Fachsitzen der Bauamtsleiter der preussischen Landwirtschaftskammern und die Tagung der Fachabteilung für Binnenfischerei veranstaltet. Er empfiehlt an den Verhandlungen teilzunehmen, besonders wenn sie in den Städten tagen, in denen die Bakteriologischen Institute sich befinden.

Den Instituten werden folgende Geflügelzeitschriften empfohlen: Die deutsche landwirtschaftliche Geflügelzeitung, das wissenschaftliche Archiv für Geflügelkunde, beide im Verlage von Pfenningstorff-Berlin und die neu erschienene „Geflügelwelt“, Verlagsanstalt Jänicke-Hannover.

Die Versammlung beschließt, für die Untersuchung von Geflügelblutproben im allgemeinen 0,20 Mark je Probe zu erheben. Die Entnahme der Proben ist in diesen Betrag nicht einbegriffen. Wird diese durch Institutstierärzte vorgenommen, so wird dafür eine Gebühr erhoben, die sich nach der Zahl der Tiere und der Entfernung richtet und so zu bemessen ist, daß die Unkosten gedeckt werden.

Geheimrat Hobstetter regt an, wenn in Grenzgebieten Pulver-Infektion festgestellt wird, dem benachbarten Institut Mitteilung zu machen. Die gegenseitige Benachrichtigung ist auf jeden Fall sehr erwünscht.

In Verbindung hiermit gibt Dr. Karsten die Anregung, mehr als bisher die Veröffentlichungen auszutauschen. Alle anwesenden Vertreter erklären sich dazu bereit. Neben den Jahresberichten kommen die landwirtschaftlichen Zeitschriften in Frage, in welchen Artikel veröffentlicht werden.

Dr. Wolters gibt hierauf einen kurzen Bericht über die Entwicklung der chemischen Abteilung seines Instituts. Im Laufe des letzten Jahres sind 49 Untersuchungen zur Durchführung gelangt. Wenn mehr Einfendungen erfolgen würden, könnte das eingearbeitete Personal mehr ausgenutzt werden und infolgedessen auch eine Ermäßigung der Gebühren eintreten. Auf Anregung von Prof. Raebiger ist mit der Tierärztlichen Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums ein Vertrag abgeschlossen worden dahingehend, daß Geheimmittel im Dessauer Institut vertragsmäßig untersucht werden. Um mehrfache Untersuchungen deselben Mittels zu ersparen, soll Dr. Grawert-Frankfurt (Main), der Geschäftsführer der Gesellschaft, gebeten werden, den Instituten ein Verzeichnis der bereits analysierten Geheimmittel zu überfenden.

Dr. Schumann-Breslau ist als Vertreter unserer Institute in den Seuchenausschuß der D.L.-G. gewählt worden. Der Vors. wird be-

auftragt, im Namen des Verbandes bei der D.L.-G. anzufragen, ob die Ernennung Schumanns vom Vorstand bestätigt wurde. *)

In der Naturforscherversammlung in Hamburg werden alle Verbandsinstitute vertreten sein. Referate sind in Aussicht gestellt worden von den Instituten Hannover und Kiel über Milchkontrolle, Halle über Geflügeltuberkulose und Pulloruminfektion, Breslau über Streptokokken-Mastitis und Syngamose.

An der Tagung der Deutschen Vereinigung für Mikrobiologie in Bern vom 30. August bis 1. September werden die Institute Zülchow-Stettin, Königsberg, Hannover, Oldenburg und Berlin teilnehmen.

Die Anwesenden sind sich darin einig, daß in Zukunft die Dienstverfammlungen spätestens bis Ende Juni stattfinden sollen.

Im Jahre 1929 soll das 25jähr. Bestehen unserer Tagungen gefeiert werden. Bezüglich des Versammlungsortes wird der Vors. ermächtigt, mit dem Bakteriologischen Institut zu Münster in Verbindung zu treten und das Weitere zu veranlassen. Falls das westfälische Institut damit einverstanden ist, wird die Tagung in Halle stattfinden und im Anschluß daran das Hygienische Institut in Dessau besichtigt werden.

2. Kassenbericht.

Dieser wird für den abwesenden Kassenführer von Dr. Lentz erstattet. Der Jahresbeitrag soll unverändert bleiben. Wenn die Mittel für die Jubiläumstagung nicht ausreichen, soll der Vors. ermächtigt sein, eine Sonderumlage zu erheben. Dem Kassenführer wird Entlastung erteilt.

Sodann wird Beschluß gefaßt über die zu dem offiziellen Teil der Jubiläumsdienstversammlung einzuladenden Herren, über die erste Ernennung zum Ehrenmitglied unseres Verbandes und über die im Einverständnis mit dem Vorstand zum Festessen zu ladenden prominenten Persönlichkeiten.

3. Vorstandswahl.

Zur Entlastung des Vors. wird der Posten eines Schriftführers neu eingerichtet und als solcher Dr. Schumann gewählt.

4. Amtsbezeichnungen.

Der Vors. teilt die Ergebnisse seiner bisherigen Verhandlungen in dieser Angelegenheit mit.

5. Einstufung der wissenschaftlichen Assistenten.

Diese sollen auf Anregung des Vors. allgemein nach der Stufe A 2b befördert werden. Abteilungsvorsteher bzw. Laboratoriumsleiter (Overtierärzte) erhalten einen Zuschlag von 600 Mark, stellvertretende Direktoren 1200 Mark.

6. Die Eingruppierung der technischen Assistentinnen.

Die Eingruppierung der Laborantinnen und technischen Assistentinnen in die Gehaltsgruppen 4—7 bleibt den einzelnen Instituten überlassen.

7. Befreiung der wissenschaftlichen Assistenten von der Angestelltenversicherungspflicht.

Dr. Schumann hat auf Anregung von Dr. Pröscholdt versucht, die nichtplanmäßigen Tierärzte von der Angestelltenversicherung zu befreien. Der Antrag ist an das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt Berlin eingereicht worden mit dem Erfolge, daß die Befreiung für fünf Jahre genehmigt worden ist.

8. Nach Erledigung der Verbandsangelegenheiten erhält Geheimrat Prof. Dr. Hobstetter das Wort über „Neueres über Fischkrankheiten“. (Referat s. S. 601.)

9. Hiernach folgt das Referat von Prof. Dr. Raebiger über: „Die im vergangenen Geschäftsjahre von den Bakteriologischen Instituten des Verbandes ausgeführten Fischuntersuchungen“. (Siehe S. 602.)

10. Eine lebhafte Diskussion rief das Referat von Dr. Weichlein: „Landwirtschaftskammerinstitute und praktische Tierärzte“ hervor. Die Versammlung steht auf dem Standpunkt, daß ein großer Teil der den Bakteriologischen Instituten gemachten Vorwürfe übertrieben ist. So z. B. die Abgabe von Impfstoffen und Leberegelmitteln an Landwirte. Es wird dagegen festgestellt, daß von praktischen Tierärzten häufig Impfstoffe, u. a. auch Abortuskultur, Arzneimittel und auch Impfspritzen an Landwirte abgegeben und letztere auch in der Impfung

unterworfen werden. Mit Recht wird deshalb darauf hingewiesen, daß von den praktizierenden Tierärzten immer nur Anschuldigungen erhoben werden, daß aber die Dienste, die ihnen von den Kammerinstituten durch Eröffnung von Wegen zur Behandlung erwiesen werden, mit Stillschweigen übergangen werden.

Die Institute wollen auch fernerhin mit den praktischen Tierärzten Hand in Hand arbeiten. Die Mehrzahl der Teilnehmer glaubt, diesen Weg am besten so beschreiten zu können, daß alle Kammer-tierärzte Mitglied des Reichsverbandes praktischer Tierärzte werden, um auf diese Weise stets Fühlung mit den Praktikern zu haben. Es soll eine Kommission gewählt werden, die gemeinsam mit dem Tierärztekammer-Ausschuß weitere Richtlinien für die Zusammenarbeit aufstellen soll. In diese Kommission werden gewählt die Herren Prof. Dr. Raebiger, Dr. Weichlein, Dr. Scharr, bzw. in seiner Vertretung Dr. Lentz.

11. Das von Dr. Lührs erstattete Referat über „Die in Oldenburg organisierten Seuchentilgungsgenossenschaften“. (Siehe S. 605.)

12. Betrifft: Rundschreiben der Zentrale für die Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten vom 18. Juni 1928 betreffend die Bekämpfung des Abortus infectiosus (Bang) der Rinder.

Die Ansicht der Mehrzahl der Anwesenden geht dahin, daß es jedem Institut unbenommen ist, Abortusimpfstoff so herzustellen, wie es ihm richtig erscheint. Daneben soll aber im Interesse einer gleichmäßigen Bekämpfung der Kulturimpfstoff möglichst nach den von der „Zentrale“ herausgegebenen Richtlinien angefertigt werden, um die Wirkung dieses einheitlich hergestellten Impfstoffes auf möglichst breiter Basis auszuprobieren.

13. Anträge und Wünsche.

Es wird über die gute Wirkung des Infektenvertilgungsmittels „Flit“ gesprochen. — Ferner wird eine Aussprache herbeigeführt über die Zulassung von Vertrauens-tierärzten. In einzelnen Provinzen sind diese nur in denjenigen Beständen tätig, in denen sie auch tatsächlich die Praxis ausüben, in anderen Provinzen tritt für die Übertragung der Untersuchung der Wunsch des Besitzers in den Vordergrund. Von einigen Seiten werden Bedenken gegen den zweiten Modus erhoben, da dadurch leicht der Konkurrenzkampf verstärkt werden kann.

Schluß der Sitzung 20,30 Uhr.

Prof. Dr. Raebiger, Vors. Dr. Schumann, Schriftf.

Reichsverband Deutscher Gemeindetierärzte.

Den Landesgruppen wird bekannt gegeben, daß ihnen demnächst Einladungen mit der Tagesordnung der Karlsruher Tagung zur Verteilung an die Mitglieder zugehen werden. Ich bitte mir umgehend bekannt zu geben, wie viel Zufendungen von den einzelnen Landesgruppen gewünscht werden. Zur Tagesordnung in Karlsruhe wird noch bekannt gegeben, daß Herr Architekt Hennings - Stuttgart, an Stelle seines ursprünglich in Aussicht genommenen Vortrages, über „Chikagoer Schlachthäuser“ sprechen wird und daß Herr Dr. K. Müller-Buch noch einen Vortrag über „Höchstuntersuchungszahlen an größeren Schlachthöfen“ angemeldet hat. Dr. Thomas, Meissen.

Tierärzterverein für Schleswig-Holstein.

Einladung zur 60. Jubiläumstagung in Kiel am 21.—23. September 1928.

Freitag, den 21. September: 8½ Uhr abends Empfangsabend mit Damen im Hotel „Bellevue“ (Musikvorträge, bunter Abend und dergl.).

Sonnabend, den 22. September: 9 Uhr vormittags Besichtigung des Instituts für Weltwirtschaft und Seeverkehr, Düsterbrookweg, mit einführendem Vortrag von Geh.-Rat Harms.

10½ Uhr vormittags in der „Nordostseehalle“ Vortrag von Dr. Kieferle vom Milchforschungsinstitut Weißenstephan über die Beziehungen des Jodgehalts des Bodens, der Futterpflanzen und der Kuhmilch zum Kropf.

11½ Uhr vormittags in der „Nordostseehalle“ Vortrag des Physikers Behm über die Entstehung des Echolotes.

3 Uhr nachmittags von der Seegartenbrücke aus Fahrt in See. Rückkehr ca. 6 Uhr abends. Vorgeföhrt ist Vorführung der modernen Vernebelung und einer Sprengung auf See.

8 Uhr abends Festvorstellung im „Stadttheater“ (für die

*) Die Bestätigung ist in der Vorstandssitzung am 16. August d. Js. erfolgt.

Damen zu empfehlen!). Hierzu Vorzugskarten gegen Vorzeigung der Teilnehmerkarten (siehe unten!).

Diese Veranstaltungen finden statt anlässlich der Schlußtagung deutscher Naturforscher und Ärzte. Seitens des Tierärztereins ist mit der Stadt Kiel vereinbart, daß seine Mitglieder nebst Angehörigen dazu anlässlich der 60. Jubiläumstagung zu gleichen Bedingungen Zutritt haben. Für alle Teilnehmer an obigen Veranstaltungen ist besondere Teilnehmerkarte zum Preise von 5 RM. erforderlich. Da in den Tagen in Kiel mit einem sehr starken Fremdenverkehr gerechnet wird, ist rechtzeitig Quartier zu bestellen. Anfragen und Bestellungen (Teilnehmerkarten, Vorzugskarten für das Theater, Unterkunft) wolle man bis spätestens 15. September richten an Herrn Dr. Weyl, Kiel, Annenstraße 90. Zustellung der Karten erfolgt per Nachnahme entweder durch Herrn Dr. Weyl oder durch das Verkehrsbüro, Hauptbahnhof.

7 Uhr abends in Holst's Hotel: **Generalversammlung.**

Tagesordnung: 1. Geschäftsbericht. 2. Kassenbericht. 3. Wahlen. 4. Unterstützungsanträge. 5. Vorführung des hannoverschen Drahtsägen-Embryotoms an toten Früchten. Ref.: Dr. Götze-Hannover. 6. Der Stand des Buch- und Verrechnungswesens unter Berücksichtigung der daraus hervorgegangenen Versorgungseinrichtungen für die deutsche Tierärzteschaft. Ref.: Dr. Holzhausen-Gr. Ammensleben. 7. Erweiterung der wissenschaftlichen Fortbildung in der Provinz Schleswig-Holstein durch den Tierärzterein. Ref.: Dr. Weyl-Kiel. 8. Mitteilung aus der Praxis. (Insbesondere soll hierbei eine Aussprache über Euterkrankheiten stattfinden!) 9. Verschiedenes.

Sonntag, den 23. September, 11 Uhr vorm. in Holst's Hotel **Jubiläumstagung.**

1. Begrüßungsansprache. 2. Die Fleischbeschau in ihrer Beziehung zur Pathologie und Bakteriologie. Ref.: Prof. Dr. Müller-München. 3. Beschlußfassung über den weiteren Ausbau des Tierärztereins in wissenschaftlicher Beziehung. — 2 Uhr nachmittags in Holst's Hotel Festessen mit Damen. (Trockenes Gedeck 5 RM.)

I. A.: Vet.-Rat Dr. Stietenroth, Vors.

Dr. Sieg, Schriftf.

Verschiedene Mitteilungen.

Zu unserm Bilde.

Es zeigt einen Veterinär, der, mit einem Rezeptbuch in der Hand, in einem Heereslager der Hochrenaissance (unter dem Original steht die Jahreszahl MDXXXII) seine Klinik abhält. Im Vordergrund zwei innerlich kranke Pferde: dem liegenden (einem Koliker?) reicht der Assistent per os einen Heiltrank, das stehende, wohl lungenkranke Pferd, trägt einen Umschlag um seinen Leib. Die Kamele im Hintergrunde warten wohl auch auf tierärztliche Behandlung. So ähnlich müssen wir uns Martin Böhme, einen deutschen Veterinär um 1600 (vergl. sein Lebensbild, Vet.-hist. Mitt., Jahrg. 1928, Nr. 9) bei seiner Berufsarbeit vorstellen.

Die unserm Bilde zugrunde liegende Kopie ist angefertigt von Frau Elisabeth Rieck geb. Heusinger v. Waldegg nach einem Holzschnitt, der das Titelblatt der ersten deutschen Übersetzung der Mulomedicina des Vegetius schmückt. Diese Übersetzung (in meinem Besitz) erschien 1532 „Getruckt vnd volendet zu Augspurg durch Hainrich Stainer“ unter dem Titel: „Flauij Vegetij Renati / Ain Büchlein / vonn rechter vnnd wahrhaffter kunst der Artzney / Allerlay krankheyten / ynnwendigen vnd außwendigen aller Thyer / So etwas zeychen oder Tragen mügen / Als Pferd / Esel / Maulthyer / Ochsen / vnd anderer / Auch wie man allerlay krankhayten art vnn gepresten erkennen soll / die mit getrenken / Salbungen / Prennungen / Lässen (= Aderlässen) / vnd ander Artzneyen etc. zuuertreyben / Vornals durch Vegetium Renatum in Laien beschriben / yetzunder / inn Teitsche sprach verwenndt / Allen vich ärzten / Marstallern / Schmidten / Reytern / Burgern vnnd Pawren / Auch all denen die mit gemeltem vich vmbgeend / gantz nützlich vnd notwendig zu geprauchten MDXXXII.“ Manches altdeutsche Volksheilmittel für Tiere verdankt wohl dieser Vegetiusübersetzung seine Einführung in die deutschen Lande und läßt sich in der Regel auf seinen antiken Ursprung in der griechischen-römischen Veterinärliteratur zurückverfolgen. Im Bewußtsein dieser uralten Tradition innerhalb des tierärztlichen Berufes stellte

J. A. Kersting in dem ältesten deutschen tierärztlichen Hörfaal bereits 1778 zu Hannover die Büsten des Apsyrus und des Vegetius auf. Diese beiden Männer galten feinerzeit für die größten Veterinäre des Altertums. Heutzutage, nach Herausgabe der Mulomedicina Chironis (durch Eugen Oder 1901) und des Corpus Hippiatricorum Graecorum (durch Eugen Oder und Carl Hoppe 1924 und 1927) liegt ein neues Urteil vor: Wohl bleibt Apsyrus der bedeutendste altgriechische Veterinär, dagegen behält Vegetius nur den Ruhm eines geschickten römischen Kompilators. Wilhelm Rieck.

Bernhard Hartwig †.

Am 13. August ist unser verehrter Kollege Bernhard Hartwig in Gehrden, Ehrenmitglied des Tierärztereins Niederfachsen, stellvertretender Vorsitzender der Niederfachsengruppe des Reichsverbandes der praktischen Tierärzte, Mitglied der Tierärztekammer für die Provinz Hannover, von seinem langen und schweren Leiden durch den Tod erlöst worden.

Der Entschlafene ist am 6. Oktober 1869 in Hannover geboren. Nach Besuch des Realgymnasiums in Hannover und der einjährigen Dienstzeit beim Feldartillerie-Regiment von Scharnhorst Nr. 10, widmete er sich zunächst im elterlichen Betriebe der Landwirtschaft. Erst Ostern 1897 begann er in Hannover Veterinärmedizin zu studieren und wurde 1900 als Tierarzt approbiert. Nach kurzer Vertretertätigkeit erfolgte noch in demselben Jahre seine Niederlassung als praktischer Tierarzt in Gehrden. An den Bestrebungen zur Förderung des tierärztlichen Standes nahm er von Anfang an regen Anteil. Das tierärztliche Vereinsleben förderte er durch regelmäßigen Besuch der Versammlungen und durch rege Teilnahme an den Verhandlungen. Dem Tierärzterein Niederfachsen trat er 1901 als Mitglied bei und wurde von diesem in Würdigung seiner Verdienste 1924 zum Ehrenmitgliede ernannt. Er war Mitbegründer der Niederfachsengruppe des Reichsverbandes prakt. Tierärzte und von der Gründung an ihr stellvertretender Vorsitzender. Der Tierärztekammer gehörte er von 1920 bis zu seinem Tode an. An den Bestrebungen um das Zustandekommen des Tierärztekammergesetzes nahm er großen Anteil. Leider durfte er dessen Auswirkungen auf den Stand nicht mehr erleben.

Sein ganzes Sinnen und Trachten galt in erster Linie seinem Berufe. Groß ist die Anerkennung, die ihm, dem tüchtigen und hochgeschätzten Praktiker, aus allen Teilen seiner Klientel stets zuteil geworden ist. Mit warmem Herzen hing er an seinem Vaterlande und schwer hat ihn dessen Zusammenbruch getroffen. Um an seiner Erneuerung und Hebung mitzuwirken, widmete er sich der Stahlhelmbewegung und wurde ihr ein tätiges und überzeugtes Mitglied. Auch die Geschicke seines Wohnortes Gehrden lagen ihm stets warm am Herzen. Wegen seiner regen Anteilnahme am kommunalen Leben wählten ihn seine Mitbürger in das Bürgervorsteherkolleg, deren eifrigstes Mitglied und Worthalter er lange Jahre gewesen ist.

Nun stehen wir Tierärzte Niederfachsens in tiefer Trauer an seiner Bahre, zusammen mit seiner Witwe, die ihm immer eine treue Helferin und Pflegerin war. Wir werden sein Andenken stets in hohen Ehren halten. Er ruhe in Frieden!

Tierärzterein Niederfachsen.

Friese, Vors. Dr. Machens, Schriftf.

Niederfachsengruppe des Reichsverbandes praktischer Tierärzte.

Dr. Machens, Vors. Dr. Heinemann, Schriftf.

Tierärztekammer für die Provinz Hannover.

Friese, Vors. Dr. Machens, Schriftf.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Zu Stadtveterinäräten am Schlachthofe Leipzig die Herren Dr. med. vet. Kurt Richter, Dr. med. vet. Rudolf Schneider, Dr. med. vet. Ernst Breusch.

Übertragen: Dem Tierarzt Dr. Schulte aus Gr. Krentz (Mark) die kommissarische Verwaltung der Veterinäraratsstelle in Otterndorf (Bez. Stade); dem Tierarzt Dr. Meyer aus Asendorf (Kr. Hoya) die kommissarische Verwaltung der Veterinäraratsstelle in Lünen (Bezirk Liegnitz).

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Veterinärhistorische Mitteilungen

Herausgegeben von der

Gesellschaft für Geschichte und Literatur der Veterinärmedizin

Schriftleiter:

Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

Zwanglos erscheinende Beilage zur „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“
Verlag von M. & H. Schaper in Hannover
Sonderbezugspreis 1,50 Goldmark das Jahr, freibleibend.

Nr. 9.

1928.

8. Jahrgang.

Martin Böhme, ein deutscher Veterinär um 1600.

Von Dr. Wilhelm Rieck.

1592 berief Johann Georg von Brandenburg auf Anraten des Grafen Lynar, des bekannten Architekten des alten Berliner Schlosses, einen „Reitschmied“ (= Veterinär) an seinen Hof, der zu den besten Vertretern seiner Zeit gehörte, Martin Böhme. Da das Leben dieses Tierarztes interessante fach- und kulturgeschichtliche Momente bietet, sei es hier ausführlich wiedergegeben. Seinem bekannten Werke „Ein New Buch von bewehrter Roß Artzneyen, Berlin 1618“ schickte Martin Böhme eine kurze Lebensbeschreibung voraus, allerdings ohne Sorge um strenge Chronologie. Das darf bei einem Schizogen, der weder lesen noch schreiben konnte und sich nur auf sein Gedächtnis verlassen mußte, nicht Wunder nehmen. Nach Gegenüberstellung der Zeitergebnisse mit Martin Böhmes Berliner Urkunden und seiner Autobiographie läßt sich der Lebenslauf dieses ersten uns bekannten Veterinärs der deutschen Kavallerie folgendermaßen schildern.

Martin Böhme wurde um 1559 in Schlesien geboren, zog 1574 (nicht erst 1577, wie Böhme selbst erzählt) als 15jähriger Burche des Obristen Sigmund von Kurtzpach in die Niederlande. Sein Oberst ist eine historische Persönlichkeit, er wurde geboren 1547 (Siebmacher VI, 8) als Sohn des Johann von Kurtzpach, vermählte sich 1568 mit Helena Herzogin von Liegnitz und starb 1579 als holländischer General infolge Unvorsichtigkeit seines Pagen durch unüberlegt verurlichtes Aufhängen von Pulver. Mit seinem Obersten hielt sich Martin Böhme im Lager der Oranier auf und erlernte bei seinem „Reitschmied Hans Jacob“ die Roßarzneikunst. Spätestens bald nach der Schlacht von Gemblours am 3. Januar 1578 verließ Martin Böhme die Niederlande und zog mit seinem Obersten, der in kaiserl. Dienste getreten war, nach Ungarn. Dort gelangte er durch Vermittlung seines Obersten, der wieder in holländische Dienste zurückging, zum Obristen Claudio Rosellin, dem Festungskommandanten von Szent-Endre, ein wenig nördlich von Budapest. Bei ihm blieb Martin Böhme sieben Jahre, hier erhielt er die „bestallung eines Fahnenrichtmiedes unter den schwarzen Deutschen Reitern“. (franz. „reîtres“, ital. „raïri“). Nach Delbrück (Gesch. der Kriegskunst, 1920) sind die schwarzen deutschen Reiter in demselben Sinne als die Väter der europäischen Kavallerie zu betrachten wie die deutschen Schweizer als Väter der europäischen Infanterie. Die Deutschen Reiter fochten bei Protefanten und

33

wurde leider unter dem ersten preussischen König um 1710 abgedruckt, da sie seitens der Veterinärcholaren mißbraucht worden war. Martin Böhmes Lebenslauf bietet uns ein getreues Bild des bewegten deutschen kleinbürgerlichen Lebens um 1600. Derartige Darstellungen sind sehr selten. In der tierärztlichen Fachgeschichte läßt sich schwerlich eine zweite gleich interessante Biographie aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Kriege zusammenstellen.

Tierärztliches aus der badischen Stallmeister-Ordnung (1590).

Von Dr. Wilhelm Rieck.

In der „Stallmeister-Ordnung“, die Markgraf Jakob von Baden-Durlach (gestorben 1590) für seinen Marstall auf der Karlsburg erlassen hat, finden sich einige Verfügungen über Hufbeschlag und Pferdebehandlung. Im Gegenlatz zum kurbrandenburgischen Hofe, wo der „Reitschmied“, der zugleich als Veterinär und Beschlagchmied fungiert, im 16. Jahrhundert neben dem Stallmeister schon eine gewisse Rolle spielt, erscheint der badische Marstallchmied in einer sehr bescheidenen Stellung: er ist nicht nur dem Stallmeister, sondern unter Umständen sogar dem Sattelknecht untergeordnet.

Als Quelle benutzte ich eine zeitgenössische Abschrift obiger „Stallmeister-Ordnung“, deren Akten (Repertorium XVII, B, 2) mir das Brandenburg-Preussische Hausarchiv dankenswerterweise zur Veröffentlichung überließ. Im einzelnen lauten die veterinärhistorisch wertvollen Sätze folgendermaßen: „Wan dan einer, dem das Pferd gelihen, dasselb schadhafft reitten, also, das darmit gefehrlich oder solches gar zu scheitern richten wuerde, soll er (= der Stallmeister) ihn darueber Recht fertigen, vnd vns anzeigen“. — „Mitt beschlagung vnserer Pferde soll ehr (= der Stallmeister) darmit Ordnung halten, dergestalt, das solches zu rechter Zeit, vnd nach jedes Pferds gelegenheit beschehe, Wo aber noththalben, nicht eben der Ordnung gemess zu uerfahren, das dieses mitt seinem vorwissen, verrichtet werde.“ — „Aber der Pferd Aderslassen halber, soll ehr (= der Stallmeister) sich jedes mahls bey vns zuvor bescheids erhollen, es sey denn, das ein Pferd, eines solchen Kranckheit halber, nöttig, vnd ehr vns nicht besprechen möchte, als dann nach gelegenheit handeln, Wie auch, da ein Gaullkrank, der Schmidts nichts, ohn sein (des Stallmeisters), oder in seinem Abwehnen, des Sattelknechts vorwissen, mit ihm vornehmen solle, Wie auch wier jedes mahl, da ein Pferd schaden zu stehet, eines solchen wissenschaft haben wollen“. „Von Handtwercks-Leuten. Aber der Schmidten halber, soll ehr (der Stallmeister) diese Ordnung anstellen, vnd halten, das der Schmidts alle wochen, in sein Register ordentlich vnd vnderschiedlich sezen soll, waß ehr vor Pferd Newe, vnd alte Eisen, vnd sonst in vnserm Marstall möchte geschafft.“

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Rieck, Berlin-Cöpenick, Kirchstraße 4
Verlag von M. & H. Schaper Hannover. — Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Katholiken, führten nur Pistole und Degen und griffen mit der Karacole an. Vor Erla im Egertale nördlich der Theiß wagte sich Böhme einmal unvorsichtigerweise zu weit vor und geriet in türkische Gefangenschaft. Davon verbrachte er zwei Jahre (wohl 1584/85) in Konstantinopel bei einem Herrn Mustapha, dort erlernte er wertvolle türkische Behandlungsmethoden kranker Pferde.

Vergeblich versuchte Vespasian von Reinsperg, Churf. Sächsischer Artzbeim beim Kaiserl. Gelantien in Konstantinopel, Martin Böhme frei zu bekommen. Erst ein Jude erlöste ihn aus der türkischen Gefangenschaft und ließ ihn ein ganzes Jahr (wohl 1586) auf einer Galeere rudern. Bei diesen Meerfahrten wurde unser Veterinär sogar bis an „das schwarze Gebirge der Mohren in Afrika“ verschlagen. Schließlich glückte Böhme die Flucht von der Galeere. Dank seiner ungarischen und türkischen Sprachkenntnisse erreichte er die Moldau und seine schwarzen Deutschen Reiter, deren Obrist von Kollonitsch ihn gern wieder aufnahm und ihm drei Pferde gab.

An der schweren Niederlage der Türken bei Kanischa im Jahre 1587 hatte er mitgewirkt, er bezeichnet dies Treffen, wie die Landknechte, als die große Schlacht bei Six. Unmittelbar danach trat unser Veterinär Martin Böhme mit fünf Pferden unter das Kommando des Herrn Generalfeldmarchalls Melchior von Redern, der 1577 durch seine Belagerung von Danzig berühmt wurde (Siebmacher IV, 9). M. v. Redern führte 1000 Reiter in der 1100 Mann starken Armee des Erzherzogs Maximilian von Österreich auf dem Zuge nach Polen. Dieser Feldzug Maximilians endete am 24. Januar 1588 vor Pilschen bei Oppeln mit der völligen Vernichtung der kaiserlichen Truppen. Martin Böhme verlor in diesem verhängnisvollen Treffen seine fünf Pferde und mußte zu Fuß nach Ungarn zu seinen Deutschen Reitern zurücklaufen. Bald hatten sie ihren Fahnenkned mit Rossen und Rüstungen von neuen „aufstaffiert“.

Martin Böhme hatte das unfreie Kriegesleben satt und sehnte sich nach Ruhe. Die gründlichste Ausbildung als Reitknecht hatte er in 15 schweren Kriegsjahren genossen. Sein Können war nicht unbekannt geblieben. Insbesondere hatte Kurfürst Christian I. von Sachsen an ihm Gefallen gefunden. Er beauftragte Vespasian von Reinsperg, gelegentlich eines Transportes tüchtiger Pferde aus Ungarn, Martin Böhme zu bewegen, als Reitknecht an den kurfürstlichen Hof zu kommen. Gern folgte Martin Böhme dem ehrenvollen Rufe. In Dresden sah unser Kollege die Jahre 1589 und 1590 ruhig dahinfließen und hoffte schon, er könne dort seinen Lebensabend beschließen. Da kam alles anders. Martin Böhme mußte 1591 wieder hinaus ins Feld, und zwar mit Christian I. zu Anhalt. Dieser hochgebildete Feldherr muß großen Wert auf die Begleitung durch Martin Böhme gesetzt haben, als er 1591 als französischer Generalleutnant ein Korps von 1600 Mann gegen die Liga führte. Er wirkte für Martin Böhme ausdrücklich drei Monate Urlaub bei Christian I., um diesen kriegserprobten Reitknecht bei sich zu haben. Kaum war Martin Böhme aus Frankreich heimgekehrt, da starb sein Gönner, der Kurfürst von Sachsen, am 25. September 1591. Alle Zukunftspläne unseres Reitknechtes schienen über den Haufen geworfen.

Da erinnerte man sich seiner am Berliner Hofe. Der Graf Johann Casimir zu Lynar holte Martin Böhme 1592 von Dresden nach Berlin. Hier konnte

unser Meister ausruhen nach seinem abenteuerlichen Leben und eine Familie gründen. Seine Frau Ursula Saubert (sächsisch; Saupé, plattdeutsch; Sope) und eine Tochter Anna hat Martin Böhme wohl schon aus Dresden mitgebracht nach Berlin. Als Vater taucht hier Merten Behme zum ersten Male am 7. August 1593 im S. Nikolai-Kirchbuch bei der Taufe seiner Tochter Magdalena auf, bei der Carl der „Churf. pferdebereiter“ Pate steht. Nach einer Tochter Maria (getauft am 24. November 1594, getraut S. Marien 26. April 1619) läßt er am 28. Januar 1596 einen Sohn Casparus taufen, als dessen Pate der Markgraf Christian und der Graf Lynar erscheinen. Während die Urkunden der S. Nikolaikirche nie Martin Böhmes Beruf angeben, wird er am 15. Febr. 1604 (Taufe seiner Tochter Hedwig, † 11. Sept. 1614), 15. Okt. 1605 (Taufe seines Sohnes Zacharias), 1609 (Taufe seines Sohnes Hans Jürgen, † 23. Okt. 1609) als Churf. Reitknecht bezeichnet im Kirchenbuch der Sankt-Marienkirche, deren Gemeinde er bis zu seinem Tode angehörte. Am 28. Januar 1608 erwirbt Martin Behme, Churf. gn. Reitknecht für 4 Taler 8 Silbergroschen das Berliner Bürgerrecht. Vor ihm erhielt m. W. kein Tierarzt das Bürgerrecht, nach ihm erwarben es im 17. Jahrhundert noch sechs Tierärzte: Hans Behme, 20. Januar 1620; Christoff Weisenberg, pferdarzt, 20. Februar 1636; Caspar Gleibberger, 13. Februar 1649; Gurgens Schmidt, 1655; Michel Dreyloff, 1683; George Blötnet, 1694; (Ältestes Berliner Bürgerbuch 1453—1700, her. von Peter von Gebhardt, Berlin 1927). Martin Böhmes erste Frau starb am 16. Februar 1615. Am 24. Juni 1616 heiratete er, als „Churf. gn. pferdarzt“ bezeichnet, Frau Catharina Mensesen, Andreas Biers zu Spandau nachgelassene Witwe, die ihm eine Tochter Hedewich (getauft 29. April 1617) schenkte.

Mit andern zeitgenössischen Kollegen zusammen steht Martin Böhme in zwei Urkunden genannt. Einmal als Pate des Sohnes Johannes des Churf. Reitknechtes Hans Gendler im Oktober 1603. Auf diesen Gendler bezieht sich wahrscheinlich folgende interessante Traurkunde vom 14. August 1603: „Ist der Reitknecht im Churf. Stall mit einer vom adel, die er zu vor (fleischlich) erkan (= geldwängert) getraut worden.“ Dann finden wir den Reitknecht Martin Böhme, der 1618 in seinem Buche „Churf. Brandenburgischer bestalter Roßarzt“ heißt, als Reitknecht eines Obristen (Name unleserlich) neben Caspar Kürschner, dem Reitknecht des Obristen v. d. Heyde, als Pate bei „artimis“ der Tochter eines Martin Behme, der ein gefeyrter vnter dem Obristen Heyde ist (S. Marien 15. Januar 1633). Als Martin Behme am 10. November 1636 starb — leider ist die Todesurkunde ohne Berufsangabe — hinterließ er niemand unter seinen nächsten Angehörigen, der den tierärztlichen Beruf ausübte oder den reichen Schatz seiner Erfahrungen weiter verwerten konnte. Martin Böhme war Marfalleveterinär unter vier brandenburgischen Kurfürsten: er diente Johann Georg, Joachim Friedrich, Johann Sigismund und Georg Wilhelm, im Dreißigjährigen Kriege verlor er noch in hohem Alter den Veterinärstand bei brandenburgischen Truppen. Mander Reitknecht verdankte seinem Meister Martin Böhme sein tierärztliches Wissen und Können. Wohl seit Martin Böhmes Wirkamkeit am Berliner Marfalle datterte ebenda der Brauch, junge Scholaren für mehrere Jahre einzustellen und im „Pferdecurieren“ auszubilden. Diese legendäre Einrichtung, die den Berliner Marfalle zur ältesten offiziellen Lehrstätte der Pferdeheilkunde in Kurbrandenburg erhob,

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inserenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 37.

Ausgegeben am 15. September 1928.

36. Jahrgang.

(Aus dem Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover. — Direktor: Prof. Dr. Mießner.)

Das *Bacterium pyogenes* als Krankheitserreger bei Rindern und Kälbern.

(Mit 10 Abbildungen.)

Von Dr. M. Rolle, Riga.

In der Literatur*) finden wir, daß alle Autoren sich einig sind, daß das *Bacterium pyogenes* als Krankheitserreger bei Rindern, Kälbern, Schweinen, Schafen und Ziegen anzusprechen ist. Die Meinungen teilen sich darüber, ob das *Bacterium pyogenes* die primäre Rolle bei der Krankheitsentstehung spielt, oder ob es nur als sekundärer Keim bei anderen Krankheiten vorkommt. Noch größere Unklarheit herrscht über die Einwirkung des *Bacterium pyogenes* auf den Organismus. Vielfach finden wir die richtige Feststellung (Grips, Glage, Holth), daß das *Bacterium pyogenes* granulationserregende und nekrotisierende Eigenschaften hat. Merkwürdigerweise wird aber sehr oft die Schlußfolgerung daraus gezogen, daß der Mikrobe ein typischer Eitererreger ist. Der dominierende Standpunkt ist der, daß das *Bacterium pyogenes* ein Eitererreger sein müsse. Diese Ansicht herrscht besonders dort vor, wo keine histologischen Untersuchungen vorgenommen sind.

Ein Teil des Untersuchungsmaterials von erkrankten Rindern stammte aus dem Institut für Geburtshilfe und Rinderkrankheiten. Das übrige Material wurde von Tierärzten zur Aufklärung der Krankheitsursache dem Hygienischen Institut eingefandt.

a) Bei Rindern.

Fall I.

Am 10. Oktober 1927 wurde eine trächtige Färse in die hiesige buiatrische Klinik eingeliefert.

Die linken Euterviertel waren vergrößert und fühlten sich derb an. Die rechten Viertel zeigten normale Konsistenz und Größe. Das Sekret aus den linken Eutervierteln hatte keine Ähnlichkeit mit normaler Milch. Es bestand nur aus schleimigen flockigen Massen, die zeitweise mit Blut vermischt waren. Die Farbe des Sekrets war gelbgrün, der Geruch unangenehm. In den rechten Eutervierteln war die Farbe und Beschaffenheit der Milch normal. In Ausstrichen von den zähen flockigen Massen fanden sich grampositive kleine Kurzstäbchen. Kulturell wurde nach den geschilderten

Methoden das *Bacterium pyogenes* in Reinkultur ermittelt.**)

Der Krankheitsverlauf war folgender:

Das Tier wog am 11. Oktober 1927 432 kg.

Die Körpertemperatur im Rektum betrug 38,7 Grad C. Die Freßluft war gut. Die Euterlymphknoten waren unverändert.

am 18. Oktober wog es 435 kg,

am 21. Oktober wog es 448 kg,

am 25. Oktober wog es 448 kg,

am 27. Oktober wog es 446 kg.

In der Zeit vom 18. Oktober bis 1. November bewegte sich die Körpertemperatur zwischen 38,7 und 39 Grad C.

Am 1. November wurde am linken vorderen Euterviertel ein Abszeß gefalpen und darauf dem Tier 20 ccm Autovakzine subkutan injiziert. Am 14. November wurde das linke vordere Euterviertel amputiert. Bis zum 20. November bewegte sich die Temperatur zwischen 38,0 und 39,8 Grad. Nach dem 30. November waren die Temperaturschwankungen größer. An manchen Tagen stieg die Temperatur bis 41,6 Grad. Am 18. Dezember abortierte das Tier ungefähr drei Wochen vor der Zeit. Am 22. Dezember wurde es als unheilbar geschlachtet. Vor der Amputation des linken vorderen Euterviertels war die Körpertemperatur vollständig normal. Nach der Amputation stieg sie allmählich an. Diese Tatsache gibt Veranlassung anzunehmen, daß nach der Operation der Krankheitsprozeß in eine Allgemeininfektion des Körpers übergegangen ist. Die Freßluft war befriedigend und das Körpergewicht hielt sich ungefähr gleich.

Obduktion: Die Leber ist vergrößert und wiegt 11 kg (normale Rinderleber 5—6 kg). Die Leberländer sind stumpf. Im Parenchym sieht man fünfpennigstückgroße graurötliche Herde. Um die größeren Herde ist schon Kapselformung wahrnehmbar. Einzelne Herde sind von mehr grauweißlicher Farbe (Abb. 1).

*) Ausführliche Literatur: M. Rolle, Biologie des *Bacterium pyogenes*. In.-Diss. Hannover 1928.

**) Morphologische und kulturelle Eigenschaften des *Bact. pyogenes*. D. T. W. 1928, S. 585.

Histologisch: Die grauweißen Herde bestehen aus Rundzellen mit gut gefärbten Kernen. In der Mitte des Herdes sind die Leberzellen ganz verschwunden; am Rande des Herdes schieben sich zwischen die Leberzellenbalken Fibroblasten ein. In etwas größeren Herden färben sich die Zellkerne in der Mitte nicht mehr. Nach der Peripherie

eine bindegewebige Kapfel. In den größeren Herden ist die Nekrose derart vorgeschritten, daß zwischen dem gelblichen, nekrotischen Zentrum und der Bindegewebskapfel nur eine schmale grauweiße Ringzone sichtbar ist, während in kleineren Herden das nekrotische Zentrum kleiner und die grauweiße Zone breiter ist. (Abb. 3.)




Abb. 1. Pyogenesinfektion einer Rinderleber (Fall I).
a) Proliferationsherd. b) Nekrotischer Herd.

zu schreitet der nekrotische Prozeß allmählich fort (Abb. 2). Bei größeren Herden ist auf der Grenze zwischen der Rundzellenzone und dem normalen Lebergewebe eine Bindegewebskapfel in der Bildung begriffen. In den roten Herden ist die nekrotische Stelle mehr oder weniger mit roten Blutkörperchen durchsetzt.




Abb. 3. Pyogenesinfektion eines Kuheuters (Fall I). a) Rundzellen und Fibroblastenwucherungen. b) Nekrose. c) Rundzellen und Fibroblastenzone. d) Bindegewebskapfel. g) Chronische Entzündung.



Abb. 2. Pyogenesveränderungen einer Rinderleber (Fall I). a) Nekrose b) Rundzellen und Fibroblastenzone. Phot. „Mikam“ Leitz Okular 12, Obj. 3.



Abb. 4. a) Pyogenes-Proliferationsknötchen in einem Kuheuter (Fall I). Phot. „Mikam“ Leitz Okular 12, Obj. 3.

Im Euter durchschnitten befinden sich linien- bis taubeneigroße Herde. Die kleineren Knötchen bestehen aus grauweißlichem festen Gewebe. An den größeren Knötchen kann man in der Mitte des grauweißlichen Gewebes ein gelbes Zentrum unterscheiden. Das gelbe Zentrum vergrößert sich allmählich. Am Rande der grauweißen Zone entwickelt sich

Histologisch: Die kleinen Knötchen bestehen aus Zellen mit runden, gut gefärbten Kernen (Abb. 4). Stellenweise erinnert das Bild an Rundzellenfarkome. In der Mitte der einzelnen Herde befinden sich verhältnismäßig viele Leukozyten. In der Umgebung der Leukozyten trifft man Zellen mit runden und ovalen fibroblastenähnlichen Kernen an. Die Kerne sind mit einer ziemlich breiten Protoplasma-

schicht umgeben. An der Peripherie der größeren Herde ist eine Bindegewebskapsel sichtbar. Außerhalb der Kapsel findet man gewöhnlich eine interstitielle Bindegewebsvermehrung. In der Mitte der Herde färben sich die Kerne an einer oder mehreren Stellen nicht gleichmäßig gut. Die nekrotischen Herde vergrößern sich allmählich nach der Peripherie zu. (Abb. 5). In den größeren Herden wird die Rundzellschicht zwischen der Nekrose und der Bindegewebskapsel schmaler. In denjenigen Herden, in denen im Zentrum mehr Leukozyten angetroffen werden, beginnt die Nekrose mehr mit Karyorrhexis. Die Kernzerfplitterung wird nicht nur bei den Leukozyten, sondern auch bei den übrigen zwischen den Leukozyten liegenden Zellen beobachtet.

Bakteriologisch wird aus den Leber- und Euterherden das *Bacterium pyogenes* in Reinkultur gezüchtet. Die regionalen Lymphknoten sind unverändert.

In der Gebärmutter befindet sich schokoladenbraune, trübe Flüssigkeit. An der Innenseite des Gebärmuttermundes sieht man Blutungen auf der Schleimhaut und einen grauweißlichen verkästen Herd. Die Kotyledonen sind von graurötlicher Farbe und weicher Konsistenz.

Histologisch sind in der Uterus Schleimhaut kleine in Zerfall übergegangene Zellherde verstreut. In den größeren Herden sind normale Zellen nicht mehr anzutreffen; in den kleineren finden wir Zellen mit runden Kernen und polymorphkernige Leukozyten. Letztere befinden sich auch außerhalb der Herde in der ödematösen Schleimhaut. In den Kotyledonen findet man rote Blutkörperchen in großer Anzahl und daneben in Zerfall übergegangene Zellherde. Bakteriologisch werden im Gebärmutterinhalt und der Schleimhaut *Bacterium pyogenes* und Streptokokken ermittelt.

Untersuchungsergebnis des abortierten Fötus: Im Unterhautzellgewebe in der Umgebung des Nabels fulzige Infiltration. In der Milz befinden sich erbsen- bis bohnen-große derbe Knötchen. Die Knötchen sind mit einer roten Zone umgeben. Der Mageninhalt ist von grünbräunlicher Farbe. In histologischen Schnitten der Milz sieht man Rundzellen und Fibroblasten. Stellenweise kann man Zellenzerfall wahrnehmen. In der Umgebung einzelner Herde findet man zahlreiche rote Blutkörperchen.

Bakteriologisch wurde aus der Milz und dem Mageninhalt das *Bacterium pyogenes* isoliert.

Außer diesem Fall habe ich noch zwei Fälle von Euter-erkrankungen mit ähnlichen klinischen Symptomen unter-

sucht. Das Sekret der kranken Euterviertel ist von zäher, schleimiger Beschaffenheit.

Bakteriologisch wurde in dem Sekret das *Bacterium pyogenes* in Reinkultur ermittelt. In Ausstrichen des Sekrets sieht man nur sehr wenig polymorphkernige Leukozyten, aber viel homogen gefärbte Massen.

Fall IV.

Ein Rind mit Fremdkörperverletzung wurde in die Rinderklinik zur Operation eingeliefert. Wegen des sehr schlechten Allgemeinbefindens und den Erscheinungen allgemeiner Peritonitis wurde von der Operation Abstand genommen. Das Rind starb in der Nacht nach der Einlieferung. Aus den fibrinösen Entzündungsprodukten der gesamten Bauchhöhle wurde das *Bacterium pyogenes* in Reinkultur isoliert.

Fall V.

Ein Rind mit Zwischenklauenhaut- und Klauenhautentzündung wurde in die buiatrische Klinik eingeliefert. Unter der Haut konnte man kleine Herde mit verkästem Inhalt feststellen.

Bakteriologisch wurde in diesen Herden das *Bacterium pyogenes* ermittelt.

Fall VI.

Vorbericht: In einem Bestande von 50 Rindern wurden vier Kühe im Verlauf von 14 Tagen unter der Erscheinung einer scheinbar ansteckenden Pneumonie notgeschlachtet. Von einer notgeschlachteten Kuh wurden die Lungen zur Untersuchung eingefandt. Das Tier war 14 Tage krank gewesen. Temperatur: 40,2 Grad C.

Befund: Die vorderen und mittleren Lungenlappen sind graurot und derb. Auch in den Hauptlappen befinden sich einzelne Lobuli von ähnlicher Beschaffenheit. Auf der Schnittfläche sieht man die Bronchien mit gelblichen zähen Massen angefüllt. Im Parenchym befinden sich kleine grauweißliche stecknadelkopfgroße, etwas derbe Stellen. Die bronchialen Lymphknoten sind unverändert.

Histologisch: Die Bronchien sind mit polymorphkernigen Leukozyten und abgestoßenem Epithel gefüllt. In einzelnen Bronchien sind die Zellen schon in Nekrose übergegangen. Um die Bronchien sind starke Rundzellenansammlungen zu sehen, so daß man die Alveolenstruktur nicht mehr erkennen kann. Die Alveolensepten sind etwas verdickt. In den Alveolen befinden sich Flüssigkeit, abgestoßenes Epithel und einzelne polymorphkernige Leukozyten.

Bakteriologisch: In Ausstrichen des Bronchieninhaltes konnte man Streptokokken, Diplokokken und kleine grampositive Stäbchen ermitteln.

Kulturell wurden *Bacterium pyogenes*, Coli, Streptokokken- und Diplokokken isoliert.

Fall VII.

Ein trächtiges Rind wurde in die buiatrische Klinik eingeliefert. Das Tier hustete und magerte allmählich ab. Einige Tage vor der Zeit gebar es ein lebensfähiges Kalb. Am nächsten Tage verendete das Rind und das Kalb vierzehn Tage später (siehe Kalb, Fall VII).

Befund: Die retropharyngealen Lymphknoten sind stark vergrößert und enthalten käfige Massen. Die Buglymphknoten sind hühnereigroß und von ähnlicher Beschaffenheit. In den Bronchiallymphknoten befinden sich erbsen- bis linsengroße graugelbliche, ziemlich fest sitzende Herde. In der Lunge selbst sieht man zwei verschiedene Arten von Herden. I. Erbsen- bis bohnen-große Herde, die mit einer Kapsel umgeben sind. Der Inhalt der Herde ist verkäst und von grauweißer Farbe. Der Herdinhalt ist leicht aus der Kapsel zu entfernen. Das Lungengewebe außerhalb der Kapsel ist lufthaltig.

II. Linsen- bis erbsengroße Knötchen mit gelblichen, halbtrockenen, verkästen Massen. In den kleineren Knötchen



Abb. 5. b) Rundzellen und Fibroblastenzone eines Pyogenesherdes (Kuheuter Fall I). Phot. „Mikam“ Leitz Okular 12, Obj. 3.

sitzen die verkästen Massen fester als in den größeren. Das Lungengewebe außerhalb der Kapsel ist gerötet und von derber Konsistenz. In der Leber befinden sich linsengroße, graugelbliche feste Knötchen und graurötliche etwas weichere Herde. In den Gallengängen einige Leberegel. In den submaxillaren Bug- und Bronchiallymphknoten nur Tuberkulose (Ausstrich, histologisch und Tierversuch); ebenso in der zweiten Art der Lungenknötchen und den Knötchen der Leber. Aus den Lungenherden der ersten Art wurde das *Bacterium pyogenes* isoliert.

Histologisch: Die durch *Bacterium pyogenes* hervorgerufenen Herde bestehen aus einer nekrotischen Masse, welche von einer Bindegewebskapsel umgeben ist. Das Lungengewebe außerhalb der Kapsel ist unverändert (Abb. 6).




Abb. 6. Pyogenesherd in einer Rinderlunge (Fall VII).
Phot. „Mikam“ Leitz Okular 4, Obj. 3.

Fall VIII.

Bei einer an ausichtsloser traumatischer Perikarditis erkrankten Kuh wurde der Herzbeutel geöffnet. Etwa 8 Liter Eiter flossen ab. Die Kuh erholte sich zunächst, ging aber dann drei Wochen nach der Operation ein. Die Eiterung aus der Herzbeutelwunde war durch kein Mittel zu befeitigen gewesen.

Befund: Mehrere Haarnadeln sind durch das Zwerchfell und das Perikard in eine Lungen spitze eingedrungen. In der betreffenden Lungen spitze befinden sich erbsen- bis bohnen große, abge sonderte Herde mit graugelblichem Inhalt. Das an die Herde abgrenzende Lungengewebe ist luft haltig. Im Mediastinum sind ebenfalls taubeneigrö ße abge kapselte Herde mit graugelblichem käsigem Inhalt; die Bronchiallymphknoten sind unverändert.

Aus den abge schlossenen mediastinalen und Lungenherden wurde das *Bacterium pyogenes* gezüchtet.

Histologisch sieht man abge kapselte nekrotische Herde.

Fall IX.

Dem Hygienischen Institut wurde ein Stück Rinderleber zur Untersuchung eingefandt. In der Leber befinden sich linsen- bis bohnen große, fest sitzende graugelbliche Herde.

Histologisch: Die Herde bestehen aus Rundzellen mit gut gefärbten Kernen. Die Kerne sind von einer ziemlich breiten Protoplasmaschicht umgeben. In der Mitte der Herde ist schon Nekrose eingetreten. An der Peripherie sieht man beginnende Kapselbildung.

Bakteriologisch: Aus den Herden wurde das *Bacterium pyogenes* in Reinkultur isoliert.

b) Erkrankungsfälle bei Kälbern.

Fall I.

Vorbericht: Ein Landwirt mit größerem Viehbestand schreibt: Meine Kälber leiden seit Jahren an einer Lungenkrankheit. In diesem Winter tritt die Krankheit wesentlich schwerer auf, so daß schon einige Tiere notgeschlachtet werden mußten. Zur Untersuchung wurde die Lunge eines notgeschlachteten Kalbes eingefandt.

Befund: Die vorderen und mittleren Lungenlappen und die Lungenränder sind von grauroter Farbe und derber Konsistenz. In den Bronchien der veränderten Teile be-




Abb. 7. Subakute Pyogenesinfektion einer Kalbslunge (Fall I).

finden sich zähe gelbe Massen. In der Umgebung der Bronchien sieht man stecknadelkopfgroße grauweiße, nicht scharf umgrenzte Punkte (Abb. 7). Die bronchialen und mediastinalen Lymphknoten sind ohne makroskopisch wahrnehmbare Veränderungen.

Histologisch: Die Bronchien sind mit Lymphozyten, polymorphkernigen Leukozyten und abgestoßenem Epithel gefüllt. Um die Bronchien beobachtet man stellenweise Rundzellenansammlung. Die Alveolen sind mittelmäßig mit polymorphkernigen Leukozyten, abgestoßenem Alveolenepithel und roten Blutkörperchen angefüllt. An diesen Stellen sind die Alveolen septen ziemlich blutreich, an anderen Stellen sind sie verdickt und das Alveolenlumen zusammengepreßt.

Bakteriologisch: Neben einzelnen Mikro-, Strepto- und Diplokokken wurde in der Hauptsache das *Bacterium pyogenes* ermittelt.

Fall II.

Die Lunge eines notgeschlachteten Kalbes wurde ohne Vorbericht dem Institut zur Untersuchung eingefandt. Die makroskopischen Veränderungen wie in Fall I.

Histologisch: Im großen und ganzen ähnlich wie Fall I, nur in den Zellenansammlungen war schon stellenweise Nekrose eingetreten.

Bakteriologisch wurde das *Bacterium pyogenes* in Reinkultur ermittelt. Aus den Bronchien wurden außerdem andere Bakterien isoliert.




Abb. 8. Chronische Pyogenesinfektion einer Kalbslunge.
a) Normales Gewebe. b) Subakute Bronchopneumonie. c) Nekrose.

Fall III.

Vorbericht: In dem Bestande herrschte im vorigen Jahre die enzootische Pneumonie. Zur Untersuchung wurde eine Kalbslunge eingefandt.

Befund: In der ganzen Lunge, besonders im vorderen Lungenlappen befinden sich erbsen- bis bohnen große, graugelbliche Herde. Die größeren Herde sind schon abgekapselt. Die kleineren sehen gelblicher aus und besitzen keine Kapsel (Abb. 8). Stellenweise ähnelt der Befund dem Fall I. Die Pleura pulmonalis ist rau und matt. Die Bronchiallymphknoten sind unverändert.

Histologisch: In den Zellanhäufungen im Lumen der Bronchien ist schon Nekrose eingetreten (Abb. 9). Im Lungenparenchym findet man kleinere und größere nekrotische Stellen. Die Nekrose beginnt in der Mitte der Zellanfassungen. Die Alveolenwände sind verdickt. Stellenweise ist die Alveolenstruktur nicht mehr zu erkennen. An




Abb. 9. a) Nekrotische Massen im Bronchus einer Kalbslunge mit Pyogenesinfektion (Fall III). Phot. „Mikam“ Leitz Okular 12, Obj. 3.

diesen Stellen sieht man diffuse Fibroblasten- und Rundzellenvermehrung. Um die größeren nekrotischen Herde beginnt sich eine Bindegewebskapsel zu entwickeln. Bakteriologisch wurde das *Bacterium pyogenes* in Reinkultur isoliert. Die Fälle IV und V sind dem Fall III sehr ähnlich.

Fall VI.

Vorbericht: Innerhalb kurzer Zeit sind in dem Bestande 16 Kälber wegen einer feuchtenartigen Lungenkrankung notgeschlachtet worden. Zur Untersuchung wurden zwei Kälberlungen eingefandt. Die Lungen sind von grauroter Farbe und derber Konsistenz. Stellenweise sieht man linsengroße Herde mit gelbgrünlichem verkästem Inhalt. Das Lungenparenchym ist mit grauweißen stecknadelkopfgroßen Punkten durchsetzt. Die bronchialen Lymphknoten sind ohne Veränderungen. Die histologischen Veränderungen wie im Fall III.

Bakteriologisch: *Bacterium pyogenes*.




Abb. 10. a) Nekrotischer Pyogenesherd in einer Kalbslunge (Fall III). Phot. „Mikam“ Leitz Okular 12, Obj. 3.

Fall VII.

Das Kalb von der Kuh VII. Es verendete 14 Tage nach der Geburt.

Befund: Die rechte Lungenhälfte ist von grauroter Farbe und derber Konsistenz. Die Lungenpleura ist stellenweise mit der Pleura costalis verwachsen. Die Lungenveränderungen stimmen mit denen in Fall I überein. Die Bronchiallymphknoten sind ohne Veränderungen. Am Schneidezahn des Unterkiefers sieht man tiefgreifende, nekrotische Veränderungen. Die Zähne sitzen nur ganz lose in den nekrotischen Massen. An der Innenwand befinden sich linsengroße gelbliche tiefgehende Herde. Der Inhalt der Herde ist halbtrocken und bröckelig. Die histologischen Veränderungen in der Lunge sind denen in Fall I sehr ähnlich. An der Lippenwand nekrotische Herde. Bakteriologisch wurde aus allen veränderten Teilen das *Bacterium pyogenes* gezüchtet. *Bacterium necrophorum* war nicht beteiligt.

Fall VIII.

Dem Institut wurde ein Kalbskopf mit dem Verdacht auf Kälberdiphtherie eingefandt. An den Schneide- und Backzähnen tiefgehende Nekrose. Die Zähne sitzen lose in den Alveolen. An der Backenschleimhaut und in der Rachenhöhle befinden sich linsengroße gelbliche Herde.

Bakteriologisch wurde das *Bacterium pyogenes* in den

veränderten Teilen ermittelt. *Bact. necrophorum* wurde nicht gefunden.

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse von Erkrankungen bei Rindern und Kälbern, die durch *Bacterium pyogenes* hervorgerufen wurden.

Das *Bacterium pyogenes* ist als ein spezifischer Entzündungserreger bei Rindern und Kälbern anzusehen. Die Entzündungserrscheinungen treten bei Kälbern anscheinend in mehr akuter, bei erwachsenen Rindern in chronischer Form auf. In den ersten Fällen bei Kälbern finden wir ziemlich akute, in anderen Fällen schon mehr oder weniger chronische Veränderungen vor. Die Lungenveränderungen unterscheiden sich in akuten Fällen nicht viel von Lungenentzündungen anderer Ursache. In den mehr chronischen Fällen sind die Veränderungen sehr typisch.

Im Anfangsstadium beobachtet man zunächst Proliferation, später tritt mit Vermehrung der Bakterien Nekrose ein. In den nekrotischen Stellen findet man mehr Bakterien. Besonders gut kann man das Stadium der Proliferation und die später eintretende Nekrose im Euter und der Leber verfolgen.

Die regionären Lymphknoten bleiben in der Regel unverändert. Die am häufigsten befallenen Organe bei erwachsenen Rindern sind Euter und Lunge; bei Kälbern sind es Lunge und Maulhöhle. Die Neigung zur Generalisation ist nicht besonders groß. Eine Eiterbildung durch das *Bacterium pyogenes* habe ich bei Kälbern und Rindern nicht beobachtet. Die überall in der Literatur vertretene Meinung, das *Bacterium pyogenes* sei ein Eitererreger, kann man nicht aufrecht erhalten. Anscheinend sind die von mir beobachteten Lungenerkrankungen mit denen von Kitt im Jahre 1890 beschriebenen identisch, welche er sehr richtig als proliferierende, nekrotisierende Bronchopneumonie bezeichnete.

Pathogenese.

Das untersuchte Material ergibt, daß in der Regel das *Bacterium pyogenes* seine schädigende Wirkung an der Eintrittsstelle entwickelt. Im Euter befinden sich die ersten Veränderungen am Zitzenkanal. Mit der Zeit dringt der Prozeß allmählich tiefer in das Gewebe ein. Die Veränderungen bilden in der Regel zirkumskripte Herde, die von einer bindegewebigen Kapsel umschlossen sind. Durch diese bindegewebige Kapsel sind die Bakterien gegen den Einfluß von Arzneimitteln mehr oder weniger geschützt. Daraus erklärt sich auch der Mißerfolg therapeutischer Maßnahmen gegen diese Krankheit. Gegen die Annahme, daß die Bakterien durch den Lymphstrom verschleppt werden können, spricht die Tatsache, daß die regionären Lymphknoten in

der Regel intakt sind. Doch muß angenommen werden, daß eine Generalisation der Krankheit durch den Blutstrom stattfindet. Bei trächtigen Tieren können die Bakterien in die Plazenta und sogar in den fetalen Kreislauf gelangen. So wird gelegentlich durch in der Plazenta angesiedelte Bakterien Abort hervorgerufen oder neugeborene Tiere erweisen sich als intrauterin infiziert.

Die Lungenerkrankungen bei Rindern scheinen in der Regel aerogener bzw. bronchogener Natur zu sein. Die erste und älteste nekrotische Stelle findet man oft in den Bronchien.

Bei Kälbern liegen allem Anschein nach die Sachen etwas anders. Hier findet man oft bereits stark fortgeschrittene Veränderungen in Mundhöhle, während in den Lungen der Prozeß mehr akut und mehr oder weniger gleichmäßig über das ganze Organ verteilt ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist in den meisten Fällen außer der intrauterinen Infektion bei Kälbern eine Fütterungsinfektion durch Milch anzunehmen.

Schlußbetrachtung.

Über die Bedeutung des *Bacterium pyogenes* bei Rindererkrankungen finden wir in der Literatur schon Angaben. Besonders die durch *Bacterium pyogenes* hervorgerufenen Eutererkrankungen sind sehr oft beobachtet. Von mir wurden in relativ kurzer Zeit ziemlich oft Erkrankungsfälle bei Rindern und Kälbern festgestellt. Alles das spricht dafür, daß das *Bacterium pyogenes* bei diesen Tieren eine bedeutende Rolle spielt. Auch bei Schweinen*) nehmen die Erkrankungen durch *Bacterium pyogenes* eine besondere beachtenswerte Stellung ein. Welche Bedeutung diese Krankheit bei Schafen und Ziegen einnimmt, müssen erst weitere Beobachtungen und Versuche ergeben.

Die bisherigen Erfahrungen lehren uns, daß therapeutische und chirurgische Maßnahmen ohne Erfolg sind. Die Pathogenese und histologischen Veränderungen machen dies verständlich. Darum müssen wir vorläufig die Pyogeneserkrankungen als unheilbar betrachten. Für die Bekämpfung bleibt nur übrig, nach möglichst sicherer Diagnose die kranken Tiere als unwirtschaftlich und Krankheitsquelle für andere Tiere auszumerzen. Bei Rindern und Kälbern kann man die Diagnose durch Untersuchung des Bronchialschleims des Uterus- und Eutersekrets nach den vorher angegebenen bakteriologischen Untersuchungsmethoden sichern.**)

*) Näheres: M. Rolle, Biologie des *Bact. pyogenes*. In.-Diss. Hannover 1928.

**) M. Rolle: Morphologische und kulturelle Eigenschaften des *Bact. pyogenes*. D. T. W. 1928, Nr. 35, S. 585.

Dr. Vogts Scheidenverschluß.

(Mit 1 Abbildung.)

Von Oberveterinärarzt Ritter, Lichtenfels (Oberfranken).

Dr. Vogt glückte es, aus den bisherigen Verschlußmethoden eine Kombination zu finden, welche die Fehler der Methoden vermeidet.

Wie mühsam war es früher mit dem Ringelapparat zu arbeiten. Da mußten Gewinde geschnitten, die einzelnen Drähte gut geringelt werden, was bei unruhigen, sich heftig wehrenden Tieren keine leichte Arbeit war. Man war also froh, als Kollege Flessa seine einfache bequeme Verschlußmethode brachte — Hohladel mit festem Handgriff, Verschluß mit Metallstäben, auf deren Gewinde Holzkugeln aufgeschraubt wurden. Doch auch da gabs Unannehmlichkeiten.

Abgesehen von den unfauberen und unschönen Kotüberzügen, löste sich des öfters eine Kugel vom Gewinde und ging verloren, mußte also wieder ersetzt werden; weiter kam es vor, daß die Stichwunden sich so erweiterten, daß die

Kugel durchschlüpfen konnte, nicht selten waren auch Nekrosen der Scheidenwand durch den Druck der Kugel.

Dies veranlaßte mich, wohl die Flessa'sche Nadel weiter zu benutzen, aber von der Anwendung feiner Stäbe und Kugeln Abstand zu nehmen und an deren Stelle wieder wie früher Messingdrähte zu ringeln.

Diese Mängel scheinen auch Dr. Vogt bewogen zu haben, die Flessa'sche Methode zu verbessern. An Stelle der dicken Hohladel Flessa's brachte er eine viel schwächere Nadel, die nur solche Wunden sticht, daß die Nadel durchgezogen werden kann. An Stelle der Holzkugeln brachte er leicht gebogene Metallscheiben, die durch vorliegende Gummischeiben (Bierverschlußscheiben) das Aus-schlitzten bzw. Durchdrücken der Scheiben durch die Scheidenwandung verhüten sollen. Auf die geraden Verschlußstäbe ist die eine Scheibe fest aufgelötet, die andere

Scheibe wird auf das freie Gewinde des Stabes aufgeschraubt. Ein Freiwerden dieser Scheibe durch Schweißwedeln, wie dies bei Flessa's Verschluss möglich war, ist ausgefallen. Ich habe Dr. Vogt's Verschluss ausprobiert und dies bestätigt gefunden.

Die Anwendung ist leicht. In die Hohnadel wird der mit der Scheibe verlötete Verschlussstab, der vorher mit einem Gummiringe versehen ist, eingeschoben. Die Nadel wird dann unter Druck auf die Scheibe durch die gut fixierten Schamlippen an deren Grund durchgestoßen. Der Daumen der rechten Hand drückt nun gegen die Scham, während Zeige- und Mittelfinger die linke Schamlippe möglichst weit von der Nadel zurückdrücken. Nach Entfernung der Nadel steht das mit Gewinde versehene freie Ende des Stabes gut vor. Der zweite Gummiring wird übergestülpt und nun die zweite Scheibe aufgeschraubt.

Während der Rechtshänder von rechts nach links arbeitet, geht der Linkshänder von der linken Schamlippe zur rechten vor.

Die Gummischeiben können unter Umständen bei ruhigen Tieren weggelassen werden. Da man aber nie weiß, in welcher Weise das Gewebe auf den Metalldruck reagiert, gibt man sie vorsichtshalber immer bei.

Wie bei allen Scheidenverschlüssen ist auch hier darauf zu achten, daß die Schamlippen nicht fest gegeneinander gepreßt werden, sondern es muß ein kleiner Spielraum zwischen ihnen sein.

Die Verschlussstäbe und Scheiben sind gut vernickelt und können bei Kotbeschmutzungen leicht gereinigt werden.

Innere Medizin und Chirurgie.

Keller, L.: Einiges über die fibrillären Muskelzerreißen. (W. t. Mschr. 1928, Jahrg. XV, S. 98.)

Verf. beschreibt vier Fälle von fibrillärer Muskelzerreißen bei Ochsen, die im allgemeinen bei Rindern selten sind, bei Pferden und Schweinen dagegen öfter beobachtet werden. Das urfächliche Moment hierfür soll mit dem Betäubungsschlag zusammenhängen, über das wie sind die Ansichten noch geteilt.

Berge (Hann.).

Schouppe, K.: Ein praktischer Kopfverband bei kleinen Haustieren. (W. t. Mschr. 1928, Jahrg. XV, S. 97.)

Verf. empfiehlt hierzu Papierverbände aus gerippten Papierbinden, die elastisch, dehnbar, an der Oberfläche rau und auch ziemlich steif sind. Die Papierverbände sollen infolge dieser Eigenschaft gut sitzen und sich nicht verschieben. Der Nachteil, daß die oberen Touren leicht aufgehen, wird dadurch behoben, daß über den fertigen Papierverband einige Touren einer gut ausgedrückten Dextrinbinde geführt wurden.


Berge (Hann.).

Erlanger, G.: Über Verlängerung der kornealen Anästhesiedauer bei jontophoretischer Cocainisierung.

((Aus der Klinik für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule Berlin. — Direktor: Prof. Dr. Hinz.) (T. R. 1928, S. 24.)

Die Anästhesieprüfung der Cornea erfolgte durch Reizhaare verschiedener Druckstärke. Angewandt wurden 5 ccm $\frac{1}{4}$ —5prozentiger Lösungen des Cocainchlorhydrats, die zur Vermeidung fremder Beimischung mit doppelt destilliertem Wasser angesetzt waren und auf das eine Auge mit elektrischem Strom auf das andere ohne diesen zur Wirkung kamen. Die Stromstärke betrug durchweg 2 Milliampère. Jedesmal konnte festgestellt werden, daß die Dauer der Anästhesie bei Anwendung des Cocains mittels des elektrischen Stroms ungefähr das doppelte bis vierfache gegenüber der einfachen Anwendung betrug. Die Menge des eingeführten, mit dem Strom wandernden Cocains ist von Bedeutung. Als optimale Lösung wurde eine 1prozent. Lösung des Cocainchlorhydrats ermittelt; dieser Befund entspricht wahrscheinlich den Dissoziationsverhältnissen der Lösung. Durch Zusatz anderer Medien, z. B. Adrenalin,

Eine nähere Beschreibung des Apparates in seinen einzelnen Teilen ist nicht nötig, da sich alles darauf bezügliche aus der Abbildung ergibt. Der Scheidenverschluss läßt sich, wenn erwünscht, leicht dadurch entfernen, daß man die rechte Scheibe fest fixiert und die andere durch Zurückdrehung beseitigt; danach wird der Stab aus der Scheidenwand entfernt.



Mag der Aufwand für den Verschluss sich auch höher stellen wie sonst, so macht er sich doch bezahlt durch die sehr gute Wirkung und feine Sauberkeit.

Wer ihn einmal angewandt hat, wird ihn immer verwenden, dessen bin ich sicher.

Der Apparat wird hergestellt und vertrieben von der Firma C. Stiefenhofer, München, Karlsplatz 6.

Zinkum sulfuricum, Elektroferrol zur Cocainlösung, wurde die Anästhesiedauer erheblich herabgesetzt. Bei der Verforgung der Cornea mit Cocain von der Kathode aus entspricht die Anästhesiedauer der bei der Behandlung mit Cocainlösung ohne Strom. Grundbedingung ist also, das Cocain von der Anode aus abzufenden.

K. H. Meyer.

Oppenheim, O.: Eine eigenartige Ursache von Darmverdrehungen bei Pferden. (T. R. 1928, S. 64.)

In einem größeren Pferdebestande ereigneten sich innerhalb eines halben Jahres vier Fälle von Darmverdrehungen, welche alle zur Notchlachtung führten. Das wiederholte Auftreten führte schließlich zur Annahme einer mutmaßlichen böswilligen Vergiftung. Pathologisch-anatomisch fand man eine durch scharfe Stoffe verursachte akute Enteritis. Bei der chemischen Untersuchung wurden Arsen und Kupfer nachgewiesen, und ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß Schweinfurtergrün verabreicht wurde. Die sofort eingeleitete polizeiliche Untersuchung blieb ergebnislos, doch traten in der Folgezeit keine weiteren Fälle auf. Die Tat ist mit besonderem Raffinement durchgeführt, indem die Giftdosis so bemessen wurde, daß sich drei oder vier Tage nach der Aufnahme noch keinerlei verdächtige Erscheinungen zeigten. Erst nach dem Ausbruch der Kolik wurden die Tiere als krank erkannt.

K. H. Meyer.

Miescher: Zur Frage der Umstimmung (Desensibilisierung) durch Röntgenstrahlen beim Ekzem. (Schweizerischer Dermatologenkongress in Bern.) (Schweizer. Med. Wschr. 1927, Jahrg. 8, Nr. 2, S. 45—46.)

Die Röntgentherapie besonders der chronischen Ekzeme muß in vielen Fällen als die Therapie der Wahl gelten. Es kann bei der Röntgentherapie von einer eigentlichen Umstimmung des ekzematösen Terrains durch Röntgenstrahlen nicht gesprochen werden, jedenfalls wird die spezifische Komponente in der Pathogenese des Ekzems, nämlich die spezifisch gerichtete Überempfindlichkeit der Hautzelle nicht, oder jedenfalls nicht auf die Dauer verändert. Die Wirkung der Röntgenstrahlen müssen wir uns als eine unspezifische, entzündungshemmende vorstellen, wie sie sich auch bei vielen anderen entzündlichen Vorgängen gel-

tend macht. Vom praktischen Standpunkte aus ergibt sich hieraus die Konsequenz, daß Röntgentherapie des Ekzems symptomatisch durchgeführt werden muß (die prophylaktische Bestrahlung über die klinische Heilung des Herdes hinaus entbehrt jeder Begründung). Im Hinblick auf die kumulative Wirkung haben prophylaktische Nachbestrahlungen sogar den Nachteil, daß sie unter Umständen eine gefahrlose Wiederholung der an sich wirksamen Therapie im Rezidivfalle verhindern. A.

Liek, E.: Das Überleben der Gewebe in der Sauerstoffkammer. (Arch. für klin. Med. 1927, Bd. 144, S. 56—64.)

In früheren biologisch wichtigen Versuchen gelang es, osteogenes Gewebe des explantierten und in Sauerstoff aufgehobenen Knochens bei Kaninchen bis zu sechs Tagen lebend zu erhalten, da sich nach Wiedereinpflanzung ins Netz junges Knochengewebe bildete. Bei verbesserter Versuchsanordnung konnte ein weit längeres Überleben und zwar bis zu 14 Tagen, nachgewiesen werden. Die Schilddrüse erwies sich als außerordentlich widerstandsfähig (gegenüber der Abspflanzung) und zählebzig. Auch das Überleben des Eierstockes wird durch Sauerstoffzufuhr begünstigt. Es gelang auf diese Weise, Kaninchenovare 2—3 Tage in großen Teilen lebensfähig und proliferationsfähig zu erhalten. Bekanntlich wissen wir aus vielen Tierversuchen, daß das Hodenepithel gegen Ernährungsmangel ganz besonders empfindlich ist und sich daher wenig für derartige Versuche eignet. L. konnte nach 1—3tägiger Abspflanzung in dem mit Sauerstoff behandelten Hoden stellenweise erhaltenes Epithel nachweisen, während der Kontrollhoden völlig abstarb. A.

Haller, L.: Solvochin „Homburg“ als Uterinum in der tierärztlichen Praxis. (T. R. 1928, S. 85.)

Solvochin Homburg enthält Chinin als freie Base in wässriger haltbarer Lösung. Verf. erzielte in der Kleintierpraxis günstige Erfolge mit Solvochin als Uterinum, wobei die Giftwirkungen des Chinins nicht zu fürchten sind, da die zu vermehrte Uteruskontraktion bei Wehenschwäche notwendige Chininmenge nur ein geringes Quantum Solvochin erfordert. Bei einer Anzahl trächtiger Versuchstiere in verschiedenen Zeitstadien der Trächtigkeit stehend, wurde Solvochin in Mengen bis zu 6 ccm eingespritzt, ohne daß Abortus erfolgte; die Chininwirkung ist also keine wehenauslösende, sondern nur Wehen verstärkende.

K. H. Meyer.

Evers: Aus der Praxis und für die Praxis. (B. T. W. 1928, S. 85.)

1. Entfernung von Fremdkörpern aus dem Schlunde. Die Anwendung des Schlundrohres ist in solchen Fällen nicht zu empfehlen, weil leicht eine Verletzung des Schlundes eintreten kann. Verf. hat folgendes Verfahren bewährt gefunden: Nachdem der Sitz des Fremdkörpers festgestellt ist, läßt man den Kopf des Tieres durch einen Mann von rechts an den Hörnern fassen und den Kopf strecken. Bei unruhigen Tieren wird außerdem die Schwanzbremse angewandt, die darin besteht, daß man die Schwanzwirbel stark zusammenpreßt. Dies wird dadurch erreicht, daß eine kräftige Person mit der linken Hand den Schwanz an der Wurzel von oben, mit der rechten Hand von unten faßt und nun mit einem kurzen Ruck den Schwanz in die Höhe hebt. Jedes Rind steht alsdann wie festgebannt. Man kann jetzt versuchen, mit den Daumen beider Hände den Fremdkörper in der Richtung nach dem Schlundkopf zu schieben, was jedoch meist nicht gelingt. Gute Dienste leistet bei dieser Manipulation die vom Kollegen Dr. Becker angegebene Rollenzange, mit deren Hilfe man den Fremdkörper zum Schlundkopf vorschieben kann, aus dem er dann mit der Hand, allerdings oft mit vieler Mühe entfernt wird. Um Verletzungen zu vermeiden empfiehlt sich dabei die Benutzung des Maulöffners von Dr. Christoph.

2. Heilung der Thrombose der hinteren Aorta und der

Schenkelarterien. Verf. versuchte in einem derartigen Falle die von Dr. Huber in Weil für die Behandlung des Wurmaneurysmas empfohlene Kupferlösung, die dreimal in zehntägigen Zwischenräumen intravenös injiziert wurde. Als Verf. das Pferd nach vier Monaten wieder sah, war bedeutende Besserung eingetreten und schließlich konnte das Tier Wegstrecken von 20—40 Kilometer zurücklegen, ohne die charakteristischen Erscheinungen zu zeigen. Es ist wohl nicht jeder derartige Fall der angegebenen Therapie zugänglich, da jedoch zweifellos in den meisten Fällen Sklerostomen als Ursache der Thrombose zu betrachten sind, so wäre das Mittel eines weiteren Versuches wert. Dies gilt auch für die Therapie des Aneurysmas der vorderen Gekrösarterie. Carl.

Klarenbeek, A.: „Vreesziekte“ (Fright-Disease) bij Honden. (Furchtkrankheit bei Hunden.) (Aus der Klinik für kleine Haustiere der Tierärztl. Fakultät der Reichs-Universität zu Utrecht. — Direktor: Prof. Dr. H. Jakob.) (Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 54. Deel, Aflevering 18, S. 849—851.)

Angstneurose („Vreesziekte“) bij Honden. (Angstneurose [„Furchtkrankheit“] bei Hunden.) (Ebenda, Aflevering 21, S. 1004—1008.)

Bijdrage tot de aetiologie van de angstneurose bij den hond. (Beiträge zur Ätiologie der Angstneurose beim Hund.) (Ebenda, 55. Deel, Aflevering 7, S. 339—342.)

In Holland tritt seit drei Jahren in verschiedenen Gegenden und zu verschiedenen Jahreszeiten unter den Hunden jeden Lebensalters und jeder Rasse eine Krankheit auf, die nach Ansicht des Verf. identisch ist mit der seit 1915 in Nordamerika beobachteten „fright disease“ oder „Pseudo-Epilepsie“. Die von der Krankheit befallenen Tiere zeigen plötzlich ohne welche Vorboten Anfälle von großer Angst, leiden anscheinend an Halluzinationen und sind sehr unruhig. Die Angstfälle wiederholen sich vielfach in Zwischenräumen. Schäumend, häufig bellend und heulend laufen die Tiere weg, springen ins Wasser oder es treten, wenn auch selten, wie bei nervöser Staupe epileptiforme Anfälle auf. Solcher Anfall dauert nur einige Minuten. Hinterher scheint Lähmung des Nervus opticus, also Amaurosis zu bestehen. Das Tier läuft ataktisch und häufig in den Hinterfüßen einknickend ziellos ringsherum oder liegt ganz kurze Zeit stumpfsinnig und in der Hinterhand gelähmt auf dem Boden. Es erholt sich rasch und ist augenscheinlich wieder normal. Nicht selten wiederholen sich in kürzeren oder längeren Zwischenräumen die Anfälle fünf- bis achtmal oder noch häufiger. Zwischen den einzelnen Anfällen sind die Tiere anscheinend normal. Die Anfälle werden wahrscheinlich durch eine intermittierende Gehirnhyperämie hervorgerufen.

Bouillonröhrchen mit dem Gehirn eines einjährigen Schäferhundes geimpft, blieben steril, intracerebrale Impfungen einer Emulsion von Gehirnteilen bei zwei Hunden und bei zwei Kaninchen sowie intraperitoneale Impfungen bei zwei Meerschweinchen blieben erfolglos. Bei der Untersuchung gefärbter Schnittpräparate desselben Gehirns konnten weder perivaskuläre Infiltrate noch Sporen oder Zysten von Encephalitozoon nachgewiesen werden.

Gegen das Leiden werden empfohlen Sedativa, besonders Brompräparate und daneben gleichzeitig die Kokainisierung der Nasenschleimhaut durch Einträufeln einer 3prozentigen Lösung von Cocain hydrochloric. Der Rhinologe R o e l f s e m a auf B a n d o e n g (Niederl.-Indien) sieht die Angstneurose für ein Analogon zu einem von ihm in Niederl.-Indien unter den Weißen häufig beobachteten Nervenleiden an, das er für eine von der Nase ausgehende Reflexneurose hält. Verf. ist daher der Ansicht, es dürfte angezeigt sein, Untersuchungen anzustellen, ob nicht Linguatula rhinaria die Ursache zu dem Leiden ist.

(Dem Referenten sind im Sommer wiederholt spät abends Hunde zugeführt worden, die vorher völlig gesund und munter, unterwegs plötzlich nach einem längeren Spa-

ziergange epileptiforme Anfälle bekamen. Die Ursache war die Sarkoptesräude, die an einzelnen kleinen, beschränkten Stellen des Kopfes sich zeigte. Ebenso hat er wiederholt beobachtet, daß Hunde, die vorher stets ganz munter waren, infolge von Räude im Sommer plötzlich ihre Munterkeit verloren, völlig teilnahmslos wurden, nicht fraßen und sich verkrochen. In beiden Fällen verschwanden die Erscheinungen und kehrten auch nicht zurück nach geeigneter Behandlung der Räude. Es wäre daher nach Ansicht des Referenten hinsichtlich der Ätiologie auch auf Räude und besonders auf Otitis externa scabiosa zu achten.) Bass.

Schmidt, R.: Über Prinzipien der Pharmakotherapie (Minimaldosierung, Antagonistensynergie, Kombinationswirkung) nebst Stellungnahme zur Homöopathie. (Medizinische Klinik 1927, Jahrg. 13, Nr. 45, S. 1715—1718.)

Von physiologischer Grundlage ausgehend stellt Verf. zwei Gruppen von pharmakodynamischen Einwirkungen auf: 1. „Alternative“ Einwirkungen oder Reizwirkungen mit einmaligen oder vereinzelt großen Dosen (Vorteile: rasch eintretende, mächtige Effekte; Nachteile: Mangel einer Dauerwirkung, unangenehme Nebenwirkungen — Schockwirkung mit Proteinkörpern usw.), 2. „Tonisierende“, umstimmende, zustandsbedingende Therapie mit häufig zugeführten, lange fortgesetzten kumulierenden Minimaldosen (bes. geeignet sind hierfür Alkaloide, Hypnotica, Antineuralgica, Nervina und Salzverbindungen mit Ionenwirkung). Weiter erscheint es durchaus naheliegend, auch in der Arzneibehandlung unter Umständen gleichzeitig verschiedene Pharmaka einwirken zu lassen; die Empirik hat sich von jeher an diesen Grundsatz gehalten. In neuerer Zeit hat sich besonders Bürgi bemüht, den Nachweis zu liefern, daß ähnlich wirkende Pharmaka mit ungleichen Angriffspunkten in ihrer Wirkung über den Additionseffekt hinausgehen, wie z. B. Kombination von Morphium und Skopolamin, Veronal und Pyramidon. Infolge des konzentrierten Angriffes sind unter Umständen starke Effekte zu erzielen. Besonders dürfte auch dort, wo Minimaldosen zur Anwendung gelangen, eine zweckmäßige Kombination oft die Vorbedingung sein, um Minimaldosen zu aktivieren (Trypanosomenbehandlung nach Ehrlich). Ähnlich scheint ja auch eine Kombination verschiedener Antiseptika trotz sehr großer Verdünnung einen starken Gesamteffekt herbeizuführen. Die Wirkungskomponenten pharmakodynamischer Einwirkung bei Kombinationen waren: Veränderungswirkung, organotrope Wirkungen, Stoß- und Schockwirkung, sensibilisierende Effekte, korrigierende oder antagonistische Wirkungen. Was die unerwünschten Nebenwirkungen betrifft, so können die wichtigen Effekte der organotropen Gruppe gefährdet werden; die Gefahr wächst im allgemeinen mit der Größe der Dosierung. Kumulative Wirkungen können eintreten, wodurch auch Minimaldosen zur vollen Wirkung gelangen können, soweit sehr sensitive oder sensibilisierte Krankheitsherde vorliegen. Empirische Erfahrungen haben Sch. zur Überzeugung geführt, daß auch die Kombination antagonistischer Potenzen sich häufig wirksam erweisen, da vielfach kein absoluter und totaler, sondern ein partieller und korrigierender Antagonismus besteht. A.

Lubinski, H.: Die Verwendung lebender Bakterien zur Therapie. (Sitzung der Schlesischen Gesellschaft für vaterländ. Kultur [Med. Sekt. vom 27. März 1927].) (Medizinische Klinik 1927, Nr. 31, S. 1202.)

Die großen Erfolge der prophylaktischen Schutzimpfung mit lebendem Virus bei Pocken und Tollwut und die Überlegenheit der Verwendung lebender Bakterien gegenüber abgetöteten in der Veterinärmedizin haben den Gedanken nahegelegt, auch bei Behandlung menschlicher Krankheiten die Impfung mit lebenden Bakterien zu versuchen. Man benutzte sowohl pathogene Keime — hauptsächlich zur spezifischen Therapie — als auch Saprophyten — diese naturgemäß nur zur unspezifischen Reiztherapie. Was die patho-

genen Keime anbelangt, so wurden verwendet: Staphylo-, Streptokokken, Gonokokken, Tuberkel-, Diphtherie- und Colibazillen. Betr. unspezifische Therapie wäre auch die Malariatherapie der Paralyse zu nennen; als Ersatz hat man in neuerer Zeit auch ein Präparat „Saprovitan“ verwendet, das aus *B. proteus*, *prodigiosus* und *pyocyaneus* besteht (Stämme aus Luft und Milch). Es liegen über die Erfolge sowohl günstige Berichte, als auch solche über Versager und über Schädigungen vor. Verf. fand im Saprovitan auch noch andere Bakterien wie aus der Coligruppe und hämolytische Streptokokken; es fehlte stets *B. proteus* und *prodigiosus*, die innerhalb 14 Tagen bei gemeinsamer Aufbewahrung, wie die Versuche zeigten, abgestorben waren. Bei den minimalen Erfolgen mit pathogenen Keimen erscheint es als ein kaum zu verantwortendes Wagnis, Bakterien ohne Abschwächung zu überimpfen. Der Meinung, daß die Furcht vor den lebenden Bakterien völlig unbegründet sei, muß auf das schärfste widersprochen werden. Auch die Verwendung sog. Saprophyten ist nicht unbedenklich, da wir nicht wissen, wie sie sich im menschlichen Körper verhalten. Auch die Tatsache, daß in zahlreichen Fällen nach Applizierung von Saprophyten schon wenige Stunden im Blute kulturell nichts mehr nachzuweisen war, berechtigt nicht, auf allgemeine Unschädlichkeit zu schließen (häufiges Nichtgelingen des Bakteriennachweises bei schwerer Sepsis, Aufhalten nicht im Blute, sondern an anderen Orten). Vorläufig scheint das Risiko nicht zur Schwere der Erkrankung und zur Sicherheit des therapeutischen Effektes im entsprechenden Verhältnis zu stehen. Asch hält die Verwendung von lebenden Gonokokken für gefährlich und wirkungslos, auch die sonst harmlosen Heubazillen können bei Kindern schädlich wirken. A.

Goljanitzki: Die einfachste und sicherste Methode der Catgutsterilisation. (Centralbl. f. Chir. 1928, S. 975.)

Eine allgemein anerkannte Methode der Catgutsterilisation ist bis jetzt nicht bekannt geworden. Die sehr verbreitete Bearbeitung des Materials mit Lugolscher Lösung hat ihre großen Mängel, die u. a. in der unvermeidlichen Veränderung des Fadens bestehen. Das Benzolcatgut und das Chromcatgut weisen den Mangel der sehr verzögerten Resorbierbarkeit auf. Verf. hat nun gelegentlich einer Studienreise im Zentralkrankenhaus der ostchinesischen Eisenbahn in Charbin ein Verfahren zur Bearbeitung des Catguts kennen gelernt, das die Sterilisationsfrage restlos löst. Dasselbe besteht darin, daß das zu desinfizierende Nähmaterial unter Verwendung eines geschlossenen elektrischen Instrumentensterilisators in einer alkoholischen Sublimatlösung eine Stunde lang gekocht wird. Die Aufbewahrung findet in 96prozentigem Alkohol statt, und vor dem Gebrauch wird noch einmal 20 Minuten lang gekocht. Durch Zusatz von Glycerin konnte Verf. die Kochtemperatur auf 90 Grad erhöhen. Derartig behandeltes Catgut erwies sich als vollkommen keimfrei und es war trotz 30—40maliger Abkochung in Alkohol keine Abnahme der Dicke, Zugfestigkeit und Elastizität der Fäden gegenüber dem Rohcatgut zu bemerken. Carl.

Becker, H.: Untersuchungen über die Verteilung der Kohle aus Granulatstäben bei Fiebertemperatur und ihre Wirkung auf die Schleimhaut. (In.-Diss. Berlin 1927.)

Die therapeutische Wirksamkeit der Kohle, die in der Veterinärtherapie hauptsächlich zur Behandlung von Erkrankungen des Verdauungstraktes peroral, von Endometritiden intrauterin verwandt wird, führt man allgemein auf ihre Adsorptionsfähigkeit für bakterielle Gifte zurück. Nach Graf sind zwei durch das Verhältnis zwischen Kohlenmenge und Stagnatvolumen bestimmte Wirkungstypen der Kohle möglich und zwar eine hohe Aufsaugungswirkung bei überschüssiger Kohle und eine starke Dispersion der in flüssige Medien zerfallenen Kohle, die eine große Adsorptionsfläche schafft. Nun wäre auch eine stark mechanische Reizwirkung

durch Friktion an den Epithelzellen der Mukosa (beispielsweise im Uterus) als möglich anzusehen. Dieser Faktor ist im vorliegenden Falle, wo bereits eine bakterielle Entzündung vorliegt, evtl. schwerwiegend; daher waren hier noch experimentelle Untersuchungen anzustellen, die B. in dieser Hinsicht vornahm. Es ergab sich durch die Versuche, daß die bei Fiebertemperatur sich auflösenden Kohlegranulatstäbe von der Viskosität des Mediums und der Fallhöhe abhängige Teilchengrößen geben. Diese Teilchenkonglomerate üben zufolge ihrer Struktur an der Schleimhaut eine mechanische Reizwirkung aus. Fallen sie aber in hochviskösem Medium, so ist diese Reizwirkung kleiner als in krytalloiden Flüssigkeiten, so daß eine Schutzwirkung durch die Mediumkolloide vorliegt. Es wird eine Methode beschrieben, welche den durch Schmerzreiz auf der Kornea ausgelösten Lidschlag — der Reizeinwirkung proportional — graphisch zu registrieren gestattet. A.

Bennhold, Herm. und Hauptstein, Peter:
Kann die Pupille als Indikator des Gleichgewichtszustandes im vegetativen Nervensystem angesehen werden?
(Aus der I. Medizinischen Klinik zu München.) (Naunyn-Schmiedeberg's Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1928, 130. Bd., S. 89—111.)

Die Frage, ob der Zusammenhang zwischen vegetativem Nervensystem des Auges und des Gesamtorganismus so eng ist, daß die Pupille seine Gleichgewichtsschwankungen durchweg mitmacht, und ob aus ihrem Verhalten den als spezifisch bekannten Reizgiften gegenüber Aufschluß über den Zustand des vegetativen Nervensystems im ganzen Organismus zu bekommen ist, wurde geprüft. Ein Gemisch zweier antagonistisch wirkender Pharmaka, das so eingestellt ist, daß beide Antagonisten sich beim vegetativ Gefunden gerade das Gleichgewicht halten, wurde als Test benutzt. Ein übererregbarer Sympathikus des Auges muß auf dieses Gemisch mit Mydriasis und ein übererregbarer Parasympathicus (Okulomotorius) mit Myosis reagieren. Das Arbeiten mit ausbalancierten Gemischen antagonistisch wirkender Gifte ist nur einwandfrei, wenn vorher die Wirkungskurve und der Zeitpunkt des Eintrittes des Wirkungsmaximums für beide Einzelsubstanzen genau bestimmt ist. Ein Gemisch von 1,0 ccm einer 5proz. Kokainlösung und 0,08 ccm einer 5prozentigen Pilokarpinlösung ergibt beim Normalen — zu 0,1 ccm in den Bindehautsack instilliert — weder Myosis noch Mydriasis bei Ableseung 45 Minuten post instillationem. Die Reaktion der Pupille auf das ausbalancierte Gemisch gibt keinen Anhaltspunkt über den Erregbarkeitszustand im gesamten vegetativen Nervensystem. Von 15 Fällen von Thyreotoxikose reagierte keiner mit ausgesprochener Mydriasis; neun Fälle reagierten mit Myosis. Sämtliche neun Fälle von Obstipatio spastica reagierten mit Myosis. R. Völker.

Gessner, Otto: Über die Gefäßwirkung der Krampfgifte Strychnin, Pikrotoxin und Samandarin. (Aus d. Pharmakologischen Institut der Universität Marburg.) (Naunyn-Schmiedeberg's Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1928, 129. Bd., S. 261—270.)

Die Wirkung der Krampfgifte Strychnin, Pikrotoxin und Samandarin auf die Blutgefäße wird am Gefäßstreifenpräparat (Carotis vom Kalb) nach O. P. Meyer und am Längen-Trendelenburg'schen Froschgefäßpräparat untersucht. Am Gefäßstreifen erwiesen sich die Gifte als unwirksam. Die Durchströmung geschah mit einem von Gürber angegebenen Apparat, mit dem die Pharmaka dem Präparate in vorherbestimmter sicherer Konzentration zugeführt werden können. Hierdurch wird die bekannte Gefahr der Druckerhöhung, die mit dem Einspritzen der Pharmaka im Gummischlauch oberhalb der Aortenkanüle verbunden ist, vermieden; auch eine Verschiebung der Aortenkanülen selbst ist nicht zu befürchten. Die Gefäße des Längen-Trendelenburg'schen Froschpräparats werden durch Strychnin, Pikrotoxin und Samandarin in den Konzentrationen $1:10^6$,

$1:10^5$ und $1:10^4$ unbeeinflusst gelassen, in der Konzentration $1:10^3$ dagegen erheblich verengt. Die gefäßverengernde Wirkung des Strychnins und des Samandarins ist nur unvollkommen reversibel, die des Pikrotoxins meistens vollkommen rückgängig zu machen. Die gefäßverengernde Wirkung des Strychnins wird durch Ergotamin nicht verhindert, die des Pikrotoxins dagegen durch Ergotamin unmöglich gemacht. Da für den Frosch die krampferregenden Konzentrationen von Strychnin um $1:10^6$, von Pikrotoxin und Samandarin um $1:10^5$ liegen, ist somit die bei der Strychnin-, Pikrotoxin- und Samandarinvergiftung des Tieres auftretende, zur Blutdrucksteigerung führende Gefäßverengung sicher ausschließlich zentral bedingt. R. Völker.

Peschke, E.: Untersuchungen über die Verwertbarkeit der Ventralse zur Therapie des Intestinaltraktes beim Hund. (In.-Diss. 1927.)

Die Ventralse stellt eine 1prozentige Collargollösung dar, der ein Schutzkolloid (bes. Form von Muc. Gum. arab.) gegen die Unbeständigkeit des Argentum colloidalis in wässrigen Lösungen zugesetzt ist. Es kann angenommen werden, daß auch verdünnte Lösungen auf die Darmschleimhaut eine antiseptische und antizymotische Wirkung haben. Das Material umfaßt 30 Hunde, und zwar acht mit Gastroenteritis haemorrhagica, zehn mit catarrhalis acuta, zwölf mit gastrischer Form der Staupe (zur Heilung gelangten je 5, 10, 10 = 25 der Patienten). Die eigenen Versuche beim Hunde beweisen, daß bei oraler sowie rektaler Applikation, die fast durchweg gut vertragen wurden, akute Magen-Darmleiden, auch solche infektiöser Natur, und nicht zuletzt einige chronische Darmkatarrhe in verhältnismäßig kurzer Zeit zur Abheilung kamen. Nicht nur als Antiseptikum und Antizymotikum, sondern auch in den meisten aller Fälle als gutes Styptikum erwies sich das Präparat, so daß die Ventralse zur Behandlung der Magen-Darmleiden bei Carnivoren empfohlen werden kann. Von der Normallösung der Ventralse beträgt die Dosis für Hunde, je nach Größe des Tieres, $\frac{1}{2}$ —3 Eßlöffel voll pro die. Bei schlechter Futteraufnahme bzw. bei vollständiger Futterverweigerung und vorwiegender Lokalisation der Erkrankung in den hinteren Darmabschnitten, ist die Verabreichung der Ventralse als Klysma angezeigt. Gegen die künstliche Ernährung mit Eiern, denen Ventralse beigemischt ist, besteht keinerlei Bedenken. Erbrechen wird durch diese Stoffe nicht ausgelöst. Verf. hat außerdem die Anschauung gewonnen, daß diese Art von künstlicher Ernährung sehr praktisch ist. Die Applikation der Ventralse in den gefundenen Konjunktivalsack ließ bei Pferd und Hund keine Reizungen der Konjunktiva und Kornea erkennen. Es besteht die Möglichkeit, mit dem genannten Medikament akute Konjunktivitis, z. B. bei der Staupe des Hundes zu beseitigen. Weiteren Versuchen muß es daher vorbehalten bleiben, die Bestätigung dieser ange deuteten Wirkung zu erbringen. A.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Schermer, S.: Das retikulo-endotheliale System des Pferdes und seine Darstellung durch Vitalfärbung. (Aus dem Tierärztlichen Institut der Universität Göttingen. — Leiter: Prof. Dr. Schermer.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 1/3, S. 133.)

Das retikulo-endotheliale System (R.E.S.) des Pferdes hat infolge seiner stark ausgeprägten Eisenfärbung bei der ansteckenden Blutarmut große Bedeutung gewonnen. Schermer hat an einem Pferde nach Sensibilisierung mit Eiweiß eine Vitalfärbung mit Karmin vorgenommen und die dadurch hervorgerufene Veränderung des R.E.S. näher untersucht. Dabei stellte er fest, daß beim Pferde die Leber das Organ darstellt, das das stärkste Speichungsvermögen zeigt. Im Vergleich mit

den Speicherungsverfuchen bei anderen Tieren muß es geradezu überraschen, daß beim Pferde die Leber die Funktion des R.E.S. fast allein zu bestreiten scheint. Auffallend ist auch die geringe Speicherung in der Milz (vielleicht infolge des physiologisch sehr starken Eisengehaltes und dadurch bedingte „Blockierung“? Ref.), die man geradezu als ein Verlagen dieses Organes bezeichnen kann. Nächste der Leber zeigt noch die Lunge eine auffallende Speicherung. Die R.-Endothelien der Nieren zeigen nur eine geringe Speicherung, noch weniger die R. E. der Portallymphknoten, der Nebennieren und der Hypophyse, deren Retikuloendothelien man ja ohne weiteres zu dem R.E.S. rechnet. Außerdem bestand auch noch eine starke Speicherung von Karmin in den epithelialen Zellen der Leber und der Nieren. Zweifellos handelt es sich bei dem Auftreten des Karmins in diesen Zellen um einen Exkretionsvorgang: der Farbstoff wird mit Galle und Harn aus dem Körper eliminiert. Zusammenfassend läßt sich somit sagen, daß in dem R.E.S. des Pferdes die Leberendothelien eine überragende Bedeutung besitzen, alle anderen zum R.E.S. zu rechnenden Organe dagegen nur eine untergeordnete Rolle spielen. In dem Kupffer Sternzellenapparat der Leber muß man den Ort sehen, an dem die Reinigung des Blutes von allen möglichen schädlichen Stoffen in erster Linie stattfindet, an dem sich auch die defensiven Reaktionen des Körpers in erster Linie einsetzen. Ziegler.

Tscherniak, W. S.: Zur Histologie der parasitären Veränderungen bei Pferden. (Aus dem pathologisch-anatom. Laboratorium des Militär-Mikrobiologischen Instituts zu Leningrad. Leiter: W. S. Tscherniak.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 34, H. 1, S. 62.)

Tscherniak konnte bei vier Pferden Wurmaffektionen der Nieren feststellen, die durch Strongyluslarven hervorgerufen wurden. Bei dem ersten Fall war der Parasit als solcher makroskopisch nicht zu finden; es waren nur für parasitäre Affektionen typische Veränderungen nachweisbar, bestehend aus nekrotischen Massen, zwischen denen sich oft Bohrgänge oder auch Parasiten selbst mikroskopisch sichtbar vorfanden, sowie aus entzündlichen Zellen, vorwiegend eosinophilen Leukozyten. Bei den anderen Fällen gelang es, die Parasitenlarve von makroskopischer Größe zu finden. Der zweite und dritte Fall waren auch dadurch auffällig, daß lokale Eosinophilie fehlte. Da Tscherniak und Landa bereits in der Lunge und im Peritoneum des Pferdes parasitäre, durch Strongylus edentatus bedingte Veränderungen ohne lokale Eosinophilie nachweisen konnten, bedarf der früher allgemein anerkannten Feststellung Angeloffs: „Die Knötchen, die lebende oder abgestorbene und degenerierte Parasiten enthalten, sind durch die Anwesenheit von eosinophilen Leukozyten ausgezeichnet. Hierdurch sind sie mit Leichtigkeit von anderen Knötchen zu unterscheiden“ einer Änderung dahingehend, daß beim Fehlen einer Eosinophilie nicht die Entstehung auf parasitärer Grundlage auszuschließen ist. Ziegler.

Gallego, A.: Zur Kenntnis der pathologischen Histologie des Zentralnervensystems bei Hundestaupe. (Direktor des pathologisch-anatomischen Laboratoriums der Tierärztlichen Hochschule zu Madrid.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 34, H. 1, S. 38.)

Gallego hat unter Benutzung der neuesten neurologischen Methodik an 20 an nervöser Staupe erkrankten Hunden feine Untersuchungen durchgeführt, die in verschiedenen Entwicklungsphasen der Krankheit starben oder getötet wurden. Die histologischen Läsionen sind so verschieden, daß es unmöglich ist, ein für die Staupe typisches histopathologisches Bild aufzustellen. Auf jeden Fall können aber die Veränderungen der Nervenzellen bei der Staupe des Hundes auf vier Typen zurückgeführt werden: Vaskuläre Ver-

änderungen, Modifikationen der Mikroglia, Störungen der Gliazellen und Läsionen der Nervenzellen. Die vaskulären Veränderungen sind inkonstant und bestehen im wesentlichen in vaskulären oder perivaskulären Infiltrationen, die hauptsächlich aus Lymphozyten und aus vereinzelt Plasmazellen aufgebaut sind. Die Modifikationen der Mikroglia, die selten fehlen, lassen sich zurückführen auf Mobilisierung und Anhäufung von Hortega'sche Zellen, die Interstitialherde bilden, ohne irgend welche Beziehungen zu vaskulären oder perivaskulären Infiltrationen. Bei diesen mikroglialen Anhäufungen sind vor allem die Abräumzellen in großer Menge vorhanden, obwohl man unter ihnen nicht selten pseudopodische und Stäbchenzellen finden kann. Diese mikroglialen Herde lokalisieren sich in der Gehirnrinde, in der grauen Substanz des Rückenmarks und vor allem in der weißen Substanz der Kleinhirnlamellen. Die Veränderungen der Gliazellen sind von regressivem Typus. Die Gliazellen erleiden die amöboide Veränderung nach vorheriger Klastomodendrose. Die amöbioden oder präamöbioden Zellen bilden zwei Klassen: Amöboide Zellen mit körnigem Protoplasma und pyknotischem Kern (körnige Amöboide) und Amöboide mit homogenem Protoplasma und exzentrischem chromatinarmen Kern (homogene Amöboide). Die ersteren finden sich reichlich bei den Läsionen der weißen Substanz der Kleinhirnlamellen, die letzteren in der Hirnrinde und der grauen Substanz des Rückenmarks. Die Veränderungen der Nervenzellen, auch von regressivem Charakter, umfassen Prozesse von Chromatolyse, Vakuolisation und Rarifikation usw. Es kommen außerdem Prozesse von Hypertrophie und neurofibrillärer Hyperplasie vor, besonders bei den Sternzellen der Molekularzone des Kleinhirns und bei den Purkinjezellen. Ebenso ist häufig die Bildung von Retraktionskeulen und Kugeln in den Neuriten der Sternzellen, besonders in den Fibrillen, welche die Endkörbe bilden, und in dem Axon der Purkinjezellen. Schließlich findet man, wenn auch selten, silberanziehende hyaline Einschlüsse in den Zellen des stratum oriens und in den Pyramidalzellen der Hirnrinde, die man unter die Gruppe der sog. Staupkörperchen einordnen könnte. Ziegler.

Bernhardt: Eine unter dem Bilde der akuten gelben Leberatrophie auftretende Erkrankung des Pferdes.

(Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, H. 4, S. 282.)

Bernhardt beschreibt mehrere Fälle von akuter gelber Leberatrophie, die er hauptsächlich in den württembergischen Oberamte Münsingen beobachten konnte. Das erste Krankheitsymptom ist die Verweigerung der Haferaufnahme, während Heu noch mit gutem Appetit aufgenommen wird. Körpertemperatur 37,5–38,5 Grad C, Pulszahl 36, Zahl der Atemzüge 16–24 in der Minute, Lidbindehäute glasig geschwollen, braungelbrot, Nasenschleimhaut schmutzig-braunrot, Maulschleimhaut blaß gelbrot. Kot zuerst locker, später kleingeballt und im weiteren Verlauf der Krankheit übelriechend. Harn dunkelgrün, nimmt er wieder hellgelbe Farbe an, so ist die Gefahr vorüber. Zunächst außerordentliche Empfindlichkeit der Haut; später Sensorium stark getrübt, es stellen sich Zwangsbewegungen (Gehen im Kreis), ferner Drängen mit dem Kopf gegen die Wand, absolute Gefühllosigkeit ein. Der Tod tritt gewöhnlich durch Ersticken ein infolge von Aspiration von Futterbissen und zwar im Laufe von 24 Stunden nach dem Auftreten der ersten Verweigerung der Haferaufnahme. Bei der Zerlegung findet man Gelbfärbung aller Körpergewebe, Blutungen in großer Zahl und verschiedener Ausdehnung in allen Organen, Entzündung des Magenfundus, fleckweise entzündliche Rötung der Darm Schleimhaut, auffällige Verkleinerung der Leber in allen Dimensionen. Die

histologische Untersuchung der Leber ergibt vollkommenen Gewebszerfall in Form ausgedehnter albuminöser und vor allem fettiger Degeneration. Von normaler Gewebsstruktur ist überhaupt in den Präparaten nichts mehr zu erkennen. Kernfärbung ist überhaupt in den Präparaten nicht mehr zu erzielen. Der Befund ist der eines schweren toxischen Parenchymzerfalls, wie er bei der akuten gelben — toxischen — Leberatrophie zur Beobachtung kommt. Wenn man die Krankheit diagnostiziert, solange noch keine Gehirnstörungen zu bemerken sind (bläulichgelbe Verfärbung der Lidbindehäute, normale Körpertemperatur, dunkelgrüner Harn), kann man sie erfolgreich behandeln, indem man sofort am Halse einen Fixationsabszeß mit Hilfe von 5—7 ccm leicht verharztem Terpentinöl anlegt, innerlich 15 Gramm Istizin als Latwerge verabreicht und subkutan 400—500 ccm Blut eines Pferdes injiziert, das vollständig gesund ist. Ziegler.

Dobberstein, Joh.: Beiträge zur Histopathologie des Gehirns bei der Bornaschen Krankheit des Pferdes. (Aus dem Pathologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin. — Leiter: Prof. Dr. Dobberstein.) (Zschr. für Infektionskrankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 4, S. 290.)

Dobberstein hat an acht Gehirnen von Pferden, die mit Borna'scher Krankheit behaftet waren, nähere Untersuchungen über das Verhalten der Ganglienzellen und der Gliazellen angestellt. Er kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Die bisherigen Angaben, daß die Veränderungen an den Ganglienzellen und an der Neuroglia bei der Borna'schen Krankheit des Pferdes nur geringfügiger Natur seien, bestehen nicht zu Recht. Auch bei der Borna'schen Krankheit kommt es zu deutlichen Veränderungen an den Ganglienzellen und an der Glia, die durchaus den Vorgängen gleichen, die wir von anderen, nicht eitrigen lymphozytären Enzephalitiden unserer Haustiere (Lyssa, Staupeenzephalitis) her kennen.

Die Veränderungen an den Ganglienzellen sind teils leichter Art (akute Zellerkrankung), teils sehr bedrohlicher Natur (schwere Zellveränderung). Hierbei kommt es zu umfangreichem Untergang von Ganglienzellen, die in der Regel unter dem Bilde der „Neuronophagie“ vor sich geht. Im allgemeinen sind die Ganglienzellenveränderungen dort am ausgeprägtesten, wo die exsudativ-entzündlichen Vorgänge an den mesodermalen Bestandteilen des Gehirns besonders deutlich hervortreten. Die Veränderungen an der Neuroglia kommen in erster Linie an den Gliazellen zum Ausdruck, während die Gliafasern bei diesen Vorgängen keine besondere Rolle spielen. An den Gliazellen lassen sich sowohl progressive als auch regressive Veränderungen nachweisen. Die ersteren sind gekennzeichnet sowohl durch eine Vermehrung der Gliazellen (Hyperplasie) als auch durch eine Vergrößerung und ein deutliches Hervortreten der einzelnen Gliazellen (Hypertrophie). Daneben kommt es zum Auftreten von „Stäbchenzellen“ und von ungewöhnlich großkernigen Gliazellen. Die hyperplastischen Vorgänge führen zu herdförmigen Ansammlungen von Gliazellen im Gewebe. Die sog. „Gewebsinfiltrate“ (Joest) gehen aus solchen Gliazellansammlungen hervor. Ihre regressiven Veränderungen führen zu Kernwandhyperchromatosis, Karyopyknose, Karyorrhexis und schließlich zu vollständigem Zerfall der Zellen. Ziegler.

Opel: Zur Statistik der Leberegelseuche. (M. T. W. 1928, S. 65.)

An Hand der Befunde an den Schlachthöfen München, Nürnberg und Augsburg, stellt Verf. fest, daß von den aufgetriebenen Tieren im Jahre 1927 die Rinder etwa zu einem Drittel, die Schafe zur Hälfte mit Leberegeln behaftet waren. Das bedeutet eine stärkere Verbreitung der Seuche als im Jahre 1925. Wenn auch die Zahl der Todesfälle

nicht so groß ist wie im Leberegeljahr 1925, so dürfen doch die durch Ernährungsstörungen bedingten Schäden bei der starken Verbreitung nicht unterschätzt werden. Schoop.

Hupka: Hexachloraethan, Tetrachloraethylen und Tetrachlorkohlenstoff in der Behandlung der Leberegelseuche. (Aus der Auswärtigen Klinik der Tierärztlichen Hochschule, Hannover. — Leiter: Prof. Dr. Hupka.) (T. R. 1928, S. 206.)

Bei der Behandlung von ca. 350 Stück Rindvieh mit Neoserapis in flüssiger Form wurden größere Komplikationen nicht beobachtet; nur zwei Tiere zeigten einen Raufzustand von 3—5 Stunden. Die Milch nahm während der Behandlungsdauer einen unangenehmen Geruch und Geschmack an, der auch in der Butter nachzuweisen war. 80 mit Serapis behandelte Schafe haben keinerlei Folgeerscheinungen gezeigt. Es ist nicht notwendig, die Kur an drei aufeinanderfolgenden Tagen vorzunehmen, eine zweimalige Behandlung hat den gleichen Erfolg. K. H. Meyer.

Makkas, M. und Assimakopoulos, A.: Die Bedeutung der Kutanreaktion für die Diagnose der Echinokokkenkrankheit. (Zentralbl. f. Chir. 1928, S. 1795.)

Die vorliegende Methode wird seit längerer Zeit in Frankreich und Italien, weniger in Deutschland angewandt. Verf. hat die Kutanreaktion in einer großen Anzahl von Fällen ausgeführt, um sich ein Urteil über ihren Wert zu bilden. Es wurde mit von Schafen gewonnener Zystenflüssigkeit gearbeitet, die unter aseptischen Kautelen aufgefangen wurde. Durch Zusatz von etwas Karbolsäure konnte bei Aufbewahrung im Eischrank die Flüssigkeit 2 Monate lang brauchbar erhalten werden. Die Dosis derselben beträgt 0,5 ccm, welche Menge intrakutan an der Außenseite des Oberarms injiziert wird, so daß eine zehnpfennigstückgroße Quaddel entsteht. Etwa 10—15 Minuten nach der Injektion entsteht bei positivem Ausfall der Reaktion eine leicht gerötete ödematöse Schwellung der Haut von Talergröße, die 5—6 Stunden lang besteht und dann sich weiter auf eine Länge von 10 cm und eine Breite von 5 cm vergrößert. Eine Störung des Allgemeinbefindens ist damit nicht verbunden. Nach 48 Stunden beginnt der Rückgang und nach 60 Stunden ist die Anschwellung verschwunden. In manchen Fällen treten die Reaktionsercheinungen verstärkt oder auch abgeschwächt auf. Auf Grund der praktischen Anwendung vorliegender Methode in 61 Fällen der Krankheit gelangen Verf. zu dem Ergebnis, daß die Kutanreaktion eine sehr wichtige, fast sichere Methode zur Diagnose des nicht vereiterten Echinokokkus darstellt (91,8 Prozent positive Resultate). Bei vereiterten Zysten (13 Fälle) fällt sie nur etwa zur Hälfte positiv aus. Bei gesunden Leuten ist die Reaktion fast immer negativ. Bei Kranken mit Bauchtumoren oder phlegmonösen Bauchprozessen kann die Methode auch irreführen, da dieselbe nach den Beobachtungen der Verf. alsdann in 10 Prozent der Fälle positiv ausfiel. Carl.

Berger, E. und Stähelin, A.: Studien über den Mechanismus der Trichineninfektion. III. Mitteilung: Die parenterale trichinige Muskelinfektion. (C. f. Bakt., Orig., Bd. 107, S. 377—386.)

Vorliegende mit einer farbigen Tafel ausgestatteten Arbeit berichtet über Versuche mit direkter Inokulation der Trichinen in einem quergestreiften Muskel und durch Injektion der jungen Würmer in den zentralen Stumpf der unterbundenen Carotis. Bei Injektion von Muskelpressäften, die Trichinen in weit vorgeschrittenen Entwicklungsstadien enthielten, gelangten die Parasiten nicht zur Weiterentwicklung. Die weiteren Versuche wurden mit isolierten weiblichen geschlechtsreifen Darmtrichinen angestellt, die in die Maffieren von Meerfischweinen injiziert wurden. Es ergab sich, daß die bei dieser Gelegenheit frei werdenden ersten Entwicklungsstadien der Trichinen sich in großer Zahl in die quergestreiften Muskelfasern einbohrten und ihre Entwicklung bis zur Einkapselung fort-

setzten. Derfelbe Versuch aus reifen Darmtrichinen ausgepreßten Embryonen angestellt, verlief negativ. Verff. machen für dieses Ergebnis die geringe Zahl der injizierten Embryonen und die geringe Resistenz der eben aus dem Muttertier ausgechlüpften Würmchen verantwortlich. Die Darmtrichinen selbst gehen im Muskel schon innerhalb 45 Minuten zugrunde. Implantationsversuche mit im Stadium der frischen Invasion befindlichen trichinellenhaltigem Muskel in normale Muskeln führten zu dem Resultat, daß sich nach 30 Tagen das Implantat in eine bröckelige Masse umgewandelt hatte, während in dem angrenzenden gefunden Muskelgewebe 15 zum Teil verkapelte Trichinellen nachgewiesen werden konnten. Es hatte also eine Einwanderung der Würmer vom Implantat aus stattgefunden. Verff. prüften sodann das Verhalten natürlich immuner Tierarten gegen die direkte intramuskuläre Einspritzung lebender Trichinellen. Dieses an einem Hahne ausgeführte Experiment ergab, daß sich jugendliche Trichinellen im Hühnermuskel nicht anzufiedeln vermögen.

Nach intravaskulärer Injektion von trichinellenhaltigem Muskelpreßsaft in den peripheren Stumpf der durchschnittenen Carotis eines Meerschweinchens waren in der Hauptsache weder im Gehirn noch in den Muskeln Parasiten nachweisbar. Nur in einem von den acht angestellten derartigen Versuchen fand sich je eine Trichinelle im Gehirn und im Masteter. Vielleicht wurden in diesen Fällen die an sich schon schwer sichtbaren Würmchen durch die Untersuchungsmethode nur zum geringsten Teil erfaßt. Die Einspritzung desselben Materials in den zentralen Stumpf der Carotis führte in vier Fällen zu einem positiven Ergebnis. Doch war die Zahl der in der Körpermuskulatur verteilten Trichinellen verhältnismäßig gering. Dagegen waren typische histologische Veränderungen (eosinophile Zellen) an vielen Stellen sichtbar. Carl.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Kropf: Aus der Praxis (Knochtuberkulose; Leberblutung). (W. t. Mschr. 1928. Jahrg. XV, S. 356.)

Die Knochtuberkulose fand sich bei einer Kuh, die nicht mehr stehen konnte und betraf die Spongiosa der Wirbel. Die Leberblutung fand sich bei einer 16 Jahre alten Kuh. Die Leber wog 36 kg. Das Parenchym war durchsetzt mit verschieden großen, unregelmäßig verlaufenden Lakunen, die mit ganz- oder halbgeronnenem Blut oder Serum ausgefüllt sind. Nur an einzelnen Stellen noch normales Gewebe. Die Leberkapfel unversehrt, kein Blut in der Bauchhöhle. Berge.

Trepel: Ein Fall von Milzbrand bei einem Hunde. (B. T. W. 1928, S. 367.)

Zwei Hunde hatten Blut von einer wegen Milzbrand notgeschlachteten Kuh aufgenommen. Am vierten Tage nachher erkrankte der eine an Appetitlosigkeit. Zu gleicher Zeit trat in der Kehlgegend eine Schwellung auf, die rasch an Umfang zunahm, so daß das Tier unter röchelnden Atembeschwerden zugrunde ging. Die Sektion ergab zunächst eine ausgedehnte blutig-fulzige Infiltration im Kehlgang, die bis zur Hälfte der unteren Halsfläche reichte. Lungen blutreich, dunkelrot. Im Herzen schwarzrotes, nicht geronnenes Blut. Schleimhaut des Magens und Zwölffingerdarmes leicht gerötet. Inhalt des letzteren eine hellrötliche suppigtrübe, schleimige Flüssigkeit. In der nicht wesentlich veränderten Milz an einer Stelle ein Erweichungsherd, in dem Milzbrandbazillen nachgewiesen werden konnten. Der zweite Hund versagte kurz nachher ebenfalls das Futter. Verf. verordnete 1 Eßlöffel Kreolin in 1 Liter Wasser gelöst. Am nächsten Tage war das Tier vollkommen gesund. Wahrscheinlich hat es sich auch hierbei um Milzbrand gehandelt. Carl.

Müssemeier: Zur Epidemiologie und Bekämpfung des Milzbrandes der Tiere. (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 1/3, S. 5.)

In seinen Ausführungen über die Ursache der Verbreitung des Milzbrandes unter unseren Haustieren hebt Müssemeier hervor, daß auf Grund der Kriegs- und Nachkriegserfahrungen es als feststehend angesehen werden kann, daß alle bisher geschilderten, an dem Zustandekommen der Milzbrandinfektion beteiligten Verhältnisse in den letzten Jahrzehnten gegenüber der Infektionsgefahr, welche durch die Einfuhr von milzbrandkeimhaltigen Materialien (Häute, Knochenabfälle, Futtermittel) aus dem Auslande bedingt wird, stark in den Hintergrund treten. Auf die Verfütterung milzbrandkeimhaltiger ausländischer Futtermittel, insbesondere von ausländischem Fischmehl, dem ausländischer nicht oder doch nicht ausreichend erhitzter Knochenschrot beige-mengt worden war, ist das gehäufte Auftreten des Milzbrandes in unseren Schweinemästereien in den letzten Jahren vor dem Kriege zurückzuführen. Bereits in der Vorkriegszeit ließ die Tatsache, daß in Vorflutgebieten von solchen Gerbereien, welche hauptsächlich ausländische Häute verarbeiteten, Milzbrandfälle unter den Haustierbeständen, insbesondere unter dem Rindvieh, gehäuft auftraten, die Vermutung gerechtfertigt erscheinen, daß hieran die ausländischen Häute schuld seien. Diese Vermutung fand im Kriege ihre Bestätigung dadurch, daß mit dem Aufhören der ausländischen Häuteinfuhr die Zahl der in Deutschland an Milzbrand erkrankten Rinder von 4218, im Jahre 1914 auf 2077, im Jahre 1915 fiel und mit etwa 600 Fällen im Jahre 1919 den niedrigsten Stand erreichte, um dann mit dem Wiedereinsetzen der Häuteinfuhr im Jahre 1923 auf 1196 und im Jahre 1924 auf 1512 Fälle zu steigen. 1925 wurden 1502, 1926: 1312 Fälle von Milzbrand an Rindern festgestellt. Besonders deutlich tritt der Zusammenhang dieser Seuchsbewegung mit der Häuteinfuhr in Schleswig-Holstein in die Erscheinung.

Am wirksamsten würde es zweifellos sein, wenn die Länder, in denen der Milzbrand heute noch seuchenhaft und in großer Ausbreitung herrscht, für eine ordnungsmäßige Bekämpfung dieser Seuche Sorge tragen würden. Wirklich kann dies aber nur geschehen durch eine unschädliche Beseitigung der an Milzbrand gefallenen Tiere einschließlich der Häute. Das ist aber in den in Frage kommenden Ländern nicht der Fall. Die durch Milzbrand gefährdeten Bestände werden mit mehr oder minder großem Erfolg gegen die Erkrankung an Milzbrand Schutzgeimpft. Den trotzdem der Seuche zum Opfer fallenden Tieren wird das Fell abgezogen, die Häute werden exportiert, während man die enthäuteten Kadaver dem von Aas lebenden Getier aller Art überläßt. Ein derartiges Verfahren kann nicht zur Tilgung der Seuche, sondern günstigenfalls nur dazu führen, die Tierverluste einzuschränken. Diese Gefahrenquelle wird in erster Linie zu verstopfen sein. Unter den Häuten sind es so gut wie ausschließlich die Trockenhäute, welche die Gefahr der Einschleppung von Milzbrandkeimen in sich schließen. Für die Ermittlung der milzbrandverdächtigen Häute hat sich das Verfahren von Ascoli und Vallenti, wie es am Potsdamer Veterinär-Untersuchungsamt ausgebaut und von Francke und Standfuß ausführlich beschrieben worden ist, als geeignet erwiesen. Gegen die Anwendung des Ascoli-Verfahrens zur Ermittlung der von milzbrandkranken Tieren stammenden Häute sind eine Reihe von Einwendungen erhoben worden, die Verf. sämtlich als nicht stichhaltig zurückweist. Ziegler.

Kraneveld, F. C. und R. Djaenoedin: Het vaststellen van septicaemia haemorrhagica bij noodslach-

tingen. (Die Feststellung der Septicaemia haemorrhagica bei Notchlachtungen.) (Aus dem Tierärztlichen Institut zu Buitenzorg. — Direktor: Dr. C. Bubberrnan.) (Nederl.-Indische Blaaden voor Diergeneeskunde 1928, S. 177—183.)

Zwei Büffel wurden künstlich infiziert, indem kleine Wunden im Zahnfleisch mit Watte, die mit eintägiger Septikämiebouillonkultur getränkt war, eingerieben wurde. Sobald sich die geringste klinische Abweichung bei dem ersten Versuchstier zeigte, d. h. 7½ Stunde nach der Infektion, als die Temperatur stieg, wurden die Kontrollimpfung mittels Blut und evtl. mittels Ödemflüssigkeit bei Kaninchen vorgenommen und das Blut wurde mikroskopisch untersucht. Beim zweiten Versuchstier begannen die Kontrollimpfungen bereits eine Stunde nach der Infektion. Die Versuche ergaben, daß die Septikämiebazillen bereits vor dem Auftreten klinischer Erscheinungen im Blute zirkulierten und schon 6 Stunden nach der Infektion durch die Impfung nachzuweisen waren, während dies mittelst der mikroskopischen Untersuchung erst 8 Stunden nach der Infektion möglich war. Baß.

Glusmann, M. und P. Schmidt-Weyland: Zur Frage der Unschädlichkeit des Virus fixe bei subkutaner Injektion. II. Mitteilung. (Aus der Wutschutzabteilung des Instituts „Robert Koch“. — Abteilungsdirektor: Prof. Dr. J. Koch.) (Zschr. für Hygiene 1928, 108, H. 3, S. 594.)

In Fortsetzung der Untersuchungen Glusmann's über die Unschädlichkeit des Virus fixe bei subkutaner Injektion kommen Glusmann und Schmidt-Weyland zu folgendem Ergebnis: Die wiederholte subkutane Einverleibung frischen Virus-fixe-Gehirns in Dosen, wie sie beim Menschen zur Anwendung kommen, ist für Kaninchen und Meerschweinchen nicht ungefährlich. Dies gilt für Stämme, die bei subduraler Injektion bereits mit kurzer Inkubationszeit und bereits in kleiner Menge tödlich wirken (in den vorliegenden Untersuchungen der Stamm „Breslau“, in einer früheren Mitteilung die Stämme aus Charkow und Odessa). Bei schwächer virulenten Stämmen („Berlin“) scheint eine derartige Infektiosität entweder weniger ausgeprägt oder überhaupt bei Dosen, wie sie der Berliner Methode entsprechen, nicht vorhanden zu sein. Diese Frage muß jedoch noch eingehender geprüft werden. Der karbolisierte Impfstoff aus Virus-fixe-Gehirn sogar in großen Dosen sofort nach der Zubereitung angewandt, war in vorliegenden Versuchen für Kaninchen und Meerschweinchen überhaupt nicht schädlich, für Hunde ist er dagegen, wenigstens bei der Verimpfung sogleich nach der Herstellung, nicht ungefährlich. Der Nachweis des Virus fixe während oder nach Beendigung derartiger Impfungen bei äußerlich gefunden Tieren scheint nur unter besonderen und nicht genau bekannten Bedingungen möglich zu sein. Der karbolisierte Impfstoff, in großen Mengen angewendet, zeigt erheblich stärkere immunisierende Wirkung als der frische nicht karbolisierte Impfstoff aus Gehirn, der in kleineren, aber für die Versuchstiere bereits gefährlichen Dosen injiziert wurde. Ziegler.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Lange, B. und E. Jochimsen: Weitere experimentelle Beiträge zur Frage der Verbreitung von Mikroorganismen in Staubform, im besonderen von Influenzabazillen. (Aus der Seuchenabteilung des Instituts „Robert Koch“. — Leiter: Prof. B. Lange.) (Zschr. für Hygiene 1928, 108, H. 1, S. 66.)

Verschiedene frühere Untersuchungen von Lange hatten gezeigt, daß die heute herrschende Anschauung über die Verbreitung pathogener Mikroorganismen in Staubform, die sich in der Hauptfache auf die Unter-

fuchung der Flügge'schen Schule stützt, nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. In vorliegender Arbeit wurden die allgemeinen Bedingungen der Verbreitung pathogener Mikroorganismen hinsichtlich des Menschen erneut untersucht. Das Ergebnis ist folgendes: Bereits unmittelbar nach der Beschmutzung eines Objekts mit infektiösem Sputum kann sich von ihm keimhaltiger Staub ablösen. Zu einer Entwicklung von Staub in größerem Umfange kommt es, wenn stärkere mechanische Einwirkungen die infizierten Objekte treffen. Von der Kleidung entsteht aber infektiöser Staub, wenn auch in geringerem Umfange, bereits bei den gewöhnlichen Hantierungen in bewohnten Räumen. Sowohl unter dem grobsichtbaren Staub, wie er z. B. bei trockenem Fegen von einem staubigen Fußboden aufgewirbelt wird, ganz besonders aber in dem unsichtbaren, sich von der Kleidung, von Taschentüchern usw. ablösenden Staub besteht ein nicht unbeträchtlicher Teil aus feinstem bakterienhaltigem Material, das längere Zeit in der Luft zu schweben vermag. In Versuchen mit Fußbodestaub fanden die Verf. nach fünf Minuten sogar 46 Prozent, nach 30 Minuten 12 Prozent. Dieser schwebende infektiöse Staub besteht größtenteils aus freien Bakterien. Aus den angeführten Gründen dürften in der Praxis infizierte Kleidungs- und Wäschestücke viel öfter zu Staubinfektionen Veranlassung geben als z. B. ein infizierter Fußboden. Auch solche Keime, die wie Influenzabazillen gegen Austrocknen sehr empfindlich sind, können in trockenen Staub in der Luft übergehen und auf diesem Wege Ansteckungen, im besonderen durch Einatmung, veranlassen. Hierbei bestehen allerdings Infektionschancen in gleicher Weise wie bei der Tröpfcheninfektion nur im Nahverkehr des Gefunden mit Kranken. Nach den vorliegenden Untersuchungen muß die Gefahr der Verbreitung pathogener Mikroorganismen im Staub ganz allgemein höher eingeschätzt werden, als es der heute herrschenden Anschauung entspricht. Ziegler.

Meyer, K. und Edm. Meyer: Kolbenkranzbildung um tote Tuberkelbazillen als Reaktion des Wirtsorganismus. (Ein Beitrag zur Genese der Aktinomycesformen.) (Aus der Bakteriologischen Abteilung des Rudolf Virchow Krankenhauses (Direktor: Dr. Kurt Meyer) und der Pathologisch-anatomischen Abteilung des Krankenhauses am Urban (Direktor: Dr. Edmund Meyer) zu Berlin.) (Zschr. für Hygiene 1928, 108, H. 1, S. 38.)

Verf. haben das Auftreten von kolbig ange schwollenen Fadenformen nach Injektion von abgetöteten Tuberkelbazillen einer vergleichenden experimentellen Untersuchung beim Kaninchen unterworfen und dabei folgendes festgestellt: Es gelingt durch Injektion abgetöteter Tuberkelbazillen bei Kaninchen „Strahlenpilzformen“ mit Kolbenkränzen zu erzeugen. Da es sich um tote Bazillen handelt, können die Kolben keine Entwicklungsstadien der Bazillen sein, vielmehr muß die Kolbensubstanz vom Wirtsorganismus stammen. Der Wirtsorganismus antwortet auf sehr verschiedenartige Reize mit einer „Kolbenreaktion“: Auf lebende Bakterien (Aktinomyzeten, Aktinobazillen, Tuberkelbazillen und andere Säurefeste, Staphylokokken), ferner auf tote Bakterien (Tuberkelbazillen), ja sogar auf unorganische Stoffe (Tellur). Auch die Kolben der Aktinomyzeten werden auf Grund dieser Auffassung als Reaktionsprodukt des Wirtsorganismus gedeutet. Über den Mechanismus der Kolbenentstehung besteht noch Unklarheit. Da die Kolben bei sehr verschiedenen Reizen auftreten, so muß man hierin eine besondere Reaktionsform des Wirtsorganismus erblicken, die sich allerdings nicht in die üblichen Begriffe der allgemeinen Pathologie einordnen läßt und deshalb am besten rein beschreibend als „Kolbenreaktion“ bezeichnet werden kann. Ziegler.

Standesangelegenheiten.

Tierärztlicher Fortbildungskursus in Helsingfors.

Langjährige und vielseitige Beziehungen zu zahlreichen Tierärzten Finnlands ließen schon vor längerer Zeit den Gedanken rege werden, in Helsingfors einen tierärztlichen Fortbildungskursus zu veranstalten. Dieser Plan fand beim Verein der Tierärzte Finnlands alsbald vollste Zustimmung, so daß der erste Kursus vom 11. bis 15. August stattfinden konnte, der von 85 Kollegen besucht war, eine mit Rücksicht auf die nicht sehr große Zahl von Kollegen in Finnland und die weiten Entfernungen stattliche Beteiligung. Die Vorträge und Demonstrationen wurden von den Unterzeichneten abgehalten und erstreckten sich auf aktuelle, für den tierärztlichen Praktiker wichtige Gebiete aus der Hippiatrik und Bujatrik. Der von den Kollegen Dr. Stenius und Bakmann vorbildlich organisierte Kursus begegnete größtem Interesse, auch seitens des finnischen Ministeriums, und fand wärmste Anerkennung. Es sei uns gestattet, auch an dieser Stelle den Kollegen in Finnland für die überaus gastliche und herzliche Aufnahme zu danken.

Prof. Dr. Oppermann, Prof. Dr. Götze.

Verbandsitzung der Landwirtschaftskammertierärzte am Montag, den 9. Juli 1928, im Bakt.-Institut der Landw.-Kammer Niederschlesien in Breslau.

In Nr. 36 D. T. W. muß es auf S. 613, linke Spalte unter Ziffer 5 anstatt Einstufung der wissenschaftlichen Assistenten heißen: Einstufung der wissenschaftlichen Beamten.

Verschiedene Mitteilungen.

Zum 70. Geburtstag von Generalveterinär a. D. Wöhler.

Der Vorsitzende des Deutschen Veterinäroffizierbundes Herr Generalveterinär a. D. Wöhler, Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 150a,



begeht am 16. September d. Js. seinen 70. Geburtstag. In ausgezeichneter geistiger Frische und Regsamkeit waltet er des ihm durch das Vertrauen der ehem. Veterinäroffiziere vor Jahren übertragenen Ehrenamts, das weit mehr, als Fernstehende es zu ahnen vermögen, ihm Mühe und Arbeit auferlegt, mit dem selbstverständlichen Pflichtgefühl des alten Soldaten. Immer bestrebt und bereit, den Kameraden zu helfen und ihnen mit Rat und Tat beizustehen, war es ihm vergönnt, erfreuliche und wertvolle Erfolge zu erzielen, dank seiner umfassenden Kenntnis aller einschlägigen Bestimmungen und seiner unermüdlichen und geschickten Tätigkeit. Es dürfte daher aus vielen Herzen gesprochen sein, wenn an diesem Jubeltage der uneigennütigen und vorbildlichen Tätigkeit des Jubilars gedacht und ihm mit den herzlichsten Glückwünschen der gebührende Dank abgestattet wird, verbunden mit dem besonderen Wunsche, daß es ihm noch lange vergönnt sein möge, in Gefundheit und Geistesfrische zu wirken zum Wohle seiner Kameraden. Dr. M.

Zur Vortragsfolge in den tierärztlichen Abteilungen der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg.

Zur Ergänzung der Vortragsfolge, wie sie bereits zum Abdruck gekommen ist, sei das Folgende vermerkt:

Nachträglich sind folgende Vorträge gemeldet worden:

I. Vorträge für die Abteilung 34.

24. Universitätsdozent Dr. L. Detre und Dr. N. Rohonyi, Budapest. Vortrag: Die Ätiologie der Ferkelruhr. (Neuere Untersuchungen und Ergebnisse.)
25. Prof. Dr. Manninger, Tierärztliche Hochschule, Budapest. Vortrag: Die Rolle der Disposition in der Ätiologie der Ruhr neugeborener Tiere.
26. Direktor Dr. Schwerdt, Vorstand des Reichsverbandes der deutschen Fleischwarenindustrie, Berlin. Vortrag: Zum Ausbau der animalischen Nahrungsmittelkontrolle.
27. Dr. W. Nussbag, Direktor des Perleberger Impfstoffwerkes, Perleberg. Vortrag: Die enzootische Leberentzündung der Ferkel, eine Futtererschädigung?

II. Vorträge für die Abteilung 35.

5. Dr. Witte, Veterinärhygienisches und Tierseucheninstitut der Landesuniversität, Gießen. Vortrag: Über die Beziehungen der Bang'schen Abortusbakterien zu Erkrankungen des Menschen.
15. Dr. Graf Vitzthum, Poliklinik für kleine Haustiere der Tierärztlichen Hochschule, Berlin. Vortrag: Die Milbenseuche unserer Honigbiene.
10. Prof. Dr. Binz, Chemisches Institut der Landwirtschaftlichen Hochschule, Berlin. Vortrag: Chemotherapie der Streptokokken-erkrankungen.
22. Prof. Dr. Manninger, Tierärztliche Hochschule, Budapest. Vortrag: Zur bakteriologischen Differentialdiagnose zwischen Geflügelcholera und Hühnertyphus.
29. Dr. Stecher, Impfstoffwerk Perleberg. Vortrag: Immunisierungsversuche gegen Staupe.
30. Polizeiveterinär Dr. F. Biermann, Münster. Vortrag: Die Zellulärtherapie und ihre Bedeutung für die Veterinärmedizin.

Die Vorträge werden entweder in der angegebenen Reihenfolge gehalten oder bei Ausfall einzelner Vorträge oder Vortragsverlegungen an genannter Stelle eingefügt. In diesem Falle erfolgt tunlichst rechtzeitig die Bekanntgabe der Reihenfolge im Versammlungstageblatt. Dieses Tageblatt ist auch maßgebend für den Fall, daß einzelne Vorträge verlegt werden müssen.

Bei der Reichhaltigkeit der Tagesordnung, bei der es ja Ziel des vorbereitenden Ausschusses und der Einführenden war, im Brennpunkte des Interesses stehende Gebiete zur Verhandlung zu bringen, ergeht nochmals an alle Tierärzte die Bitte, ihr Erscheinen bei der Naturforscher-Versammlung in Hamburg zu ermöglichen. Alle Drucksachen können von der Geschäftsstelle der 90. Versammlung, der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg, Universitätsgebäude, auf Anforderung erhalten werden.

Auf den Festabend der tierärztlichen Abteilungen im Hotel Atlantic am Donnerstag, den 20. September 1928, abends 20 Uhr, wird nochmals aufmerksam gemacht. Der Preis für das trockene Gedeck beträgt 6,— RM. Anmeldungen sind an Herrn Dr. Stödter, Abendrothsweg 21, zu richten. Nöller, Berlin.

Vorlesungen und Übungen bei der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Gießen im W.-S. 1928/29.

König: Experimentalphysik II (Elektrizität und Optik) 5-stündig. König und Cermak: Physikalisches Praktikum, 3-stündig. Elbs: Organ. Experimentalchemie, 5-stündig. Chem. Übungen, 5-stündig. Küster: Morphologie und Systematik der niederen Pflanzen (Kryptogamen) mit besonderer Berücksichtigung der praktisch wichtigen Arten, 3-stündig. Schmidt: Zoologie und vergleichende Anatomie I (allgem. Zoologie) 5-stündig. N. N.: Systematische und topographische Anatomie des Pferdes (Eingeweide, Gefäße, Nerven) 5-stündig, Präparierübungen I 10-stündig, Präparierübungen II 15-stündig. Süssel: (Im Auftrage des Direktors des vet.-anatomischen Instituts.) Vergleichende Anatomie des Bewegungsapparates mit besonderer Berücksichtigung des Pferdes, 3-stündig. Ausgewählte Teile aus der angewandten Anatomie 1-stündig. Anatomie der Haustiere der Landwirte II 1-stündig. Süssel und Kapp: (Im Auftrage des Direktors

des vet.-anatom. Instituts), Exenterierübungen 5-stündig. Kapp: (Im Auftrage des Direktors des vet.-anatom. Instituts), Bestimmungsübungen an normalhistologischen Präparaten, 1-stündig. Bürker: Animale Physiologie 5-stündig, Praktikum der animalen Physiologie 3-stündig. Feulgen: Physiol. Chemie II 5-stündig. Herzog: Allg. Pathologie und allgem. pathol. Anatomie 5-stündig. Olt: Pathol. Anatomie der Haustiere 5-stündig, Nahrungsmittel- und Milchuntersuchungskursus 2-stündig, Obduktionen und pathol.-anat. Vorführungen. Hildebrandt: Pharmakologie und Toxikologie II 2-stündig, Pharmazeutisch-pharmakognostischer Kursus 1-stündig. Pfeiffer: Chirurgische Klinik 5-stündig, Klin. Propädeutik 5-stündig, dazu Übungen 1-stündig, Spez. Chirurgie 4-stündig, Operationskursus 2-stündig, Hufbeschlagkursus 2-stündig. Westhues: Röntgenologie mit prakt. Übungen 1-stündig. Nörr: Med. Klinik 5-stündig, Spez. Pathologie und Therapie 4-stündig, Arzneiverordnungslehre 1-stündig, klinische Terminologie 1-stündig. N. N.: Poliklinik (Ambulatorische Klinik) nachm., Geburtshilfe 3-stündig, Geburtshilf. Kursus 2-stündig, Beurteilungslehre 2-stündig, Besprechung poliklinischer Fälle, Geburtskunde für Landwirte 1-stündig. Zwick: Spez. Seuchenlehre und Veterinärpolizei II (mit Demonstrationen) 2-stündig, Kursus in der Gefundheitspflege (mit Demonstrationen) 1-stündig, Seuchenklin. Demonstrationen 1-stündig. Seifried: Die wirtschaftlich wichtigsten Infektions- und Invasionskrankheiten des Hausgeflügels (mit besonderer Berücksichtigung der pathol. Anatomie, mit Demonstrationen) 2-stündig. Modde: Fleischbeschau und Schlachthofkunde mit Vorführungen 2-stündig, Lehrgang in der Fleischbeschau I (Kurs.) 3-stündig. Kraemer: Spez. Tierzucht 4-stündig. Die öffentl. Maßnahmen zur Förderung der Tierzucht 2-stündig. Lang: (Im Auftrage des Direktors des Tierzuchtinstituts), Geflügelzucht 1-stündig. Sessous: Einführung in die Landwirtschaft für Forstwirte und Veterinäre 2-stündig.

Verein Thüringer Tierärzte.

106. Verammlung Sonntag, den 30. September 1928, vorm. 10,30 Uhr im Restaurant Münchener Bürgerbräu in Erfurt, Anger 19/20.

1. Geschäftliches. 2. Aufnahme neuer Mitglieder. 3. Stellungnahme zu dem Schreiben der Tierärztekammer für die Provinz Sachsen vom 31. August 1928 und zu den Wählerlisten. 4. Vortrag von Dr. Rautmann-Halle: „Die Entwicklung, die Erfolge und die Aussichten der Sterilitätsbekämpfung bei unseren Haustieren“ (mit Lichtbildern). Es ist ausreichende Zeit zur Wechselrede vorgesehen. Kollegen, die ihre Erfahrungen kundgeben wollen, werden gebeten, an der Hand ihrer Zeichnungen ihre zustimmenden oder abweichenden Ausführungen möglichst zahlenmäßig zu begründen. Gäste sehr willkommen. Vor der Sitzung halten um 10 Uhr die einzelnen Gruppen Besprechungen ab. Nach der Sitzung, gegen 2 Uhr, gemeinschaftliches Mittagessen mit Damen.

Der Vorstand.

Traeger, Vors.

Dr. Loeb, Schriftf.

Verordnung über die Verschreibung von Opiaten und Kokain.

Das Reichsgesundheitsamt hat den im Benehmen mit Vertretern der Ärzte- und Tierärzteschaft aufgestellten Entwurf einer Verordnung über die Verschreibung von Opiaten und Kokain Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten und Apothekern im Reichsgesundheitsrat zur Beratung vorgelegt. Wie auf dem Deutschen Ärztetag in Danzig haben sich auch hier die zahlreichen Vertreter der Ärzteschaft und der medizinischen Wissenschaft gern bereit erklärt, das ihrige zur Eindämmung der Alkaloidsuchten beizutragen und entsprechenden Vorschriften zuzustimmen, die den Ärzten zwar die Einhaltung gewisser Formalitäten zur Pflicht machen, sie aber nicht in ihrem ärztlichen Handeln dahin beschränken, daß sie nicht auch künftighin diese Betäubungsmittel, den Anschaungen der ärztlichen Wissenschaft entsprechend, als Heil- und Linderungsmittel in ihrer Praxis verwenden und verwenden könnten. Ebenso haben die Vertreter der Tierärzte und der tierärztlichen Wissenschaft bei der Beratung im Reichsgesundheitsrat ihre Bereitwilligkeit bekundet, auch die Bekämpfung der Alkaloidsuchten beim Menschen zu unterstützen. Denn wenn es auch bei den Tieren keine Süchtigen in dem in Rede stehenden Sinne gibt, so können doch durch die Verschreibung von Betäubungsmitteln in der tierärztlichen Praxis unter Umständen erhebliche Mengen solcher Mittel in einzelnen Haushaltungen und hier in unrichtige Hände

kommen. Die Tierärzte werden daher gewisse Einschränkungen im Verkehr mit den Betäubungsmitteln in Kauf nehmen und sich dabei auch der verhältnismäßig geringen Mühe bei der Einhaltung gewisser Formalitäten zum Wohle des Ganzen unterwerfen. Es steht sonach zu hoffen, daß durch die bevorstehende Neuordnung Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker vor unlieblamen Beschuldigungen und etwaigen Anklagen bewahrt bleiben werden.

Bücherbesprechungen.

Die Fleischwaren-Industrie. Die Nr. 25, 1928, der Deutschen Fleischwaren-Industrie bringt einen ausführlichen Bericht über die diesjährige Haupttagung des Reichsverbandes der deutschen Fleischwaren-Industrie e. V., Berlin, vom 19. bis 21. Juni 1928 in Braunschweig. Im Rahmen der Veranstaltung wurden mehrere wertvolle Vorträge gehalten, und zwar sprachen Graf Nostitz über „Standardisierung von Schweinen“, Dr. Schwerdt „Über Dosen in der Fleischwaren-Industrie“, Wommer „Über Maschinen für die Fleischwaren-Industrie“ und Dr. Ruttke über „Arbeitsnachwuchs in der Fleischwaren-Industrie“.

Lund.

Grundriß der allgemeinen Zoologie für Studierende. Von Dr. Alfred Kühn, o. Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie an der Universität Göttingen. 3. verbesserte und vermehrte Auflage mit 214 Abbildungen. Leipzig 1928, Verlag Georg Thieme.

Schon nach 1½ Jahren folgt auf die zweite die dritte Auflage! Bedarf es da noch einer Empfehlung des Kühn'schen Buches? Auch in der neuen Auflage ist an der erprobten Gruppierung des Stoffes festgehalten worden, doch sind in einzelnen Kapiteln der Text erweitert und die Zahl der Abbildungen vermehrt. Nach einem einleitenden Abschnitt über die allgemeinen Eigenschaften der Lebewesen und die Aufgaben der Zoologie werden nacheinander die Baupläne, die Leistungen und die Entwicklung der Tiere abgehandelt. Eine große Anzahl sorgfältig ausgewählter Abbildungen sind eine treffliche Ergänzung der knappen, aber doch erschöpfenden Darstellung der Materie. Das vom Verlag gut ausgestattete Buch kann auch den Studierenden der Veterinärmedizin als Einführung in die Zoologie bestens empfohlen werden.

Wetzel.

Dissertationen der Vet.-Med. Fakultät der Universität Leipzig, S.-S. 1928.

Peter Lorenzen: Pathologisch histologische Untersuchungen über die tuberkulösen Markherde in den Rindernieren. Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten Ausscheidungstuberkulose. — August Viebrock: Zur Histologie und Pathogenese der Tubertuberkulose des Rindes. — Lauri Porthan: Morphologische Untersuchungen über die Cervix uteri des Rindes mit besonderer Berücksichtigung der Querfaltenbildung und des Kanalverlaufes. — Erkki Estola: Klinische Untersuchungen über die spezifische Wirkung des „Adsorgan“ bei Magen- und Darmkrankheiten des Hundes. — Erich Malke: Über die Wirkung steigender Joddosen auf Wachstum und Fortpflanzung weißer Ratten.

Personal-Nachrichten.

Übertragen: dem Tierarzt Dr. Waldmann aus Berlin-Buchholz die kommissarische Verwaltung der Veterinärarztstelle in Beeskow (Bez. Potsdam).

Befördert: zu Ober-Regierungsräten die Bezirkstierärzte Obervet.-Rat Dr. Gg. Geissendörfer aus Ansbach, Obervet.-Rat Dr. Carl Haack aus Würzburg.

Promoviert in Gießen: Franz Wiethoff aus Niedersalway, Hubert Wilmes aus Hagen (Westf.), Josef Kutsch aus Gressenich, Yrjö Wilho Kontinen aus Pieksämäki (Finnland), Andreas Kreuder aus Kirchheim, Karl Quernhorst aus Camperbruck (Kr. Mörs).

Approbiert in Gießen: Eugen Ruffner aus Mähringen (Wttbg.).

Verzogen: Polizeiveterinär Dr. W. Reckwell von Schneidemühl nach Barmen.

In den Ruhestand getreten: Bezirkstierarzt Valentin Garecht in Ingolstadt.

Verstorben: Schlachthofdirektor Dr. Helmich in Northeim (Hannover).

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

unter Mitwirkung von

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Postfideckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Ausperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieger keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Ausgegeben am 22. September 1928.

36. Jahrgang.

Von Dr. Lentz, Berlin.

4) Schriftführer: Privatdozent Dr. R ä t h, Chem. Institut der Landw. Hochschule, Berlin.

Wie aus dem Namen der Gesellschaft hervorgeht, hat sie den Zweck, die Euterkrankheiten des Rindes in ihrer Ursache und die Möglichkeiten zu ihrer Bekämpfung zu erforschen. Die erforderlichen Mittel für die Durchführung der Versuche sollen vom Staat und Reich, von landwirt-

Bei der Auswahl der Bekämpfungsmittel sollen die bereits gesammelten und bekanntgegebenen Erfahrungen anderer Institute, besonders der Bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammern mit berücksichtigt werden. Eine finanzielle Unterstützung der Versuche durch die für die Herstellung der Bekämpfungsmittel in Frage kommenden Firmen soll grundsätzlich abgelehnt werden, um nicht Zweifel an der Objektivität der Untersuchungen aufkommen zu lassen.

Von Dr. Eickmann, Bonn.

stelle der reinen Laboratoriumsverfuche nunmehr möglichst in allen Provinzen in besonders geeigneten landwirtschaftlichen Betrieben durch die bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammern Verfuche mit der Schutzimpfung nach *Selter* und nach *Calmette* anzustreben seien.

Diese Kommission, die am 26. November 1927 in Berlin zusammengekommen ist, hat nachstehenden Versuchsplan aufgestellt, der am 8. Februar 1928 an 13 in Frage kommende Institute abgefaßt worden ist.

*) Referat, erstattet in der internen Besprechung der Leiter der Bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammern mit den Vertretern der Preuß. Hauptlandwirtschaftskammer am 10. Juli 1928 in Breslau.

Veruchsplan.

Der Impfstoff wird von den Behringwerken, A.-G., Marburg (Lahn) hergestellt, er besteht aus abgeschwächten, in seiner Virulenz begrenzten bovinen Tuberkelbazillen.

Es wird ein Impfstoff stark und ein Impfstoff schwach herausgegeben, die Dosis je Tier beträgt bei beiden 5 ccm.

J. stark enthält in 5 ccm 10 000 000 Keime;

J. schwach enthält in 5 ccm 500 000 Keime.

Um für die jeweilig anfallenden Impfungen stets frische Impfstoffe verwenden zu können, werden die Behringwerke diese zweimal monatlich neu herstellen. Sie können im allgemeinen als 3 Wochen lang virulent angesehen werden.

Es werden Abfüllungen zu 25 ccm als am zweckmäßigsten abgegeben.

Vorprüfung der Impflinge mit Tuberkulin.

Sie erscheint für die spätere Praxis überflüssig, für die Versuche ist sie erforderlich.

In Frage kommt lediglich die intrapalpebrale Impfung. Injiziert wird 1 ccm einer 20prozentigen Lösung von Rindertuberkulin der I. G. Farbenindustrie Höchst a. Main, Bayer-Meister Lucius. Beurteilung der Reaktion nach 24 Stunden.

Anhaltspunkte für die Beurteilung:

1. es bedeuten +++ starke Reaktion, deutliche Schwellung und Rötung gegenüber dem unbehandelten Auge,
2. es bedeuten: ++ schwächere Reaktion, beides nicht so stark ausgeprägt,
3. es bedeuten: + einfache Reaktion, nur Rötung ohne Schwellung,
4. es bedeuten: ? zweifelhafte Reaktion, nur leichte Schwellung oder leichte Rötung.

Tiere mit Reaktionen 3 und 4 brauchen nicht mit Sicherheit als tuberkulös infiziert angesehen zu werden. Reagierende Kälber sind aus dem gemeinsamen Kälber- bzw. Jungviehstall zu entfernen.

Für die Schutzimpfung kommen in Frage Rinderbestände:

- a) mit getrennter Kälberaufzucht und Ernährung der Kälber mit gekochter Milch bzw. Ammenmilch; besondere Maßnahmen sind hier nicht erforderlich,
- b) mit getrennter Kälberaufzucht, aber ohne Ernährung mit abgekochter Milch bzw. Ammenmilch,
- c) ohne getrennte Kälberaufzucht und ohne besondere Ernährungsmaßnahmen.

Bei b) und c) ist auf die Dauer von 3 Monaten nach jeder Schutzimpfung die Gesamtmilch monatlich einmal auf Tuberkelbazillen zu prüfen. Nur wenn Eutertuberkulose nicht festgestellt ist, ist der Bestand für den Versuch als brauchbar zu bezeichnen, andernfalls sind nach Feststellung der Eutertuberkulose Neuimpfungen aufzugeben, der Bestand wird dann ausgeschaltet.

Bei der Tuberkulinvorprüfung, bei jeder Schutzimpfung ist eine eingehende Untersuchung der älteren Tiere auf offene Tuberkuloseformen vorzunehmen, verdächtige Tiere sind bis zum Abschluß der Untersuchung zu isolieren.

Schutzimpfung: Zum Versuch herangezogen werden nur tuberkulin-negative Kälber bzw. Rinder. Es eignen sich Kälber vom 8. Lebenstage an bis zu 4—6 Wochen alt, in Ausnahmefällen auch Rinder bis zu einem Jahre.

Die Impfung erfolgt mit der Einzeldosis von 5 ccm subkutan ausschließlich in der rechten Leistengegend, dicht über dem Kniefaltensymphknoten.

Als Kontrollen sind 10—20 Prozent der Tuberkulin-negativen mindestens aber in jedem Bestande drei Kontrolltiere zu belassen.

Der Rest der Tuberkulin-negativen ist zur Hälfte mit Impfstoff stark, zur anderen Hälfte mit Impfstoff schwach schutzzuimpfen.

Zwecks Prüfung, ob auf die Schutzimpfung hin ein lokaler Tuberkuloseherd sich gebildet hat, findet eine Tuberkulin-Nachprüfung erst nach 3—4 Monaten nach der Schutzimpfung statt. (Tuberkulinproben und Deutung wie oben angeführt.)

Zeigen hierbei Impflinge eine negative oder fragliche Reaktion, so sind sie von dem Versuch auszuschalten, da angenommen werden kann, daß die Schutzimpfung nicht angegangen ist. Die Reaktionsstärke ist in den Protokollen zu verzeichnen.

Alle Impflinge und Kontrollen sind einwandfrei zu signalisieren durch Ohrmarke, Ohrkerbnummer und durch Einzeichnen der Abzeichen in ein vorgedrucktes Schema von Tierform.

Die Gewichte sind, wenn möglich zeitweise zu vermerken. Treten während des Versuches besondere Stallfeuchen auf, so sind hierüber Vermerke zu machen.

Soweit möglich sind Versuche nach der Calmette'schen Tuberkulose-Schutzimpfung einzufügen. Impfstoff und Anweisung für die Schutzimpfung sind durch das Bakteriologische Institut der Landwirtschaftskammer in Bonn erhältlich.

Die Resultate der Schutzimpfung lassen sich einwandfrei nur durch die Schlachtung kontrollieren.

Von jedem Versuchstier ist deshalb bei erfolgreicher Schlachtung ein genauer Sektionsbefund aufzunehmen. Erwünscht erscheint es, daß soweit es irgend möglich, dieses durch die Institutstierärzte selbst erfolgt.

In jedem Falle sind die Kniefaltensymphknoten der Impfstelle und ihre Nachbarlymphknoten auf Tuberkuloseherde genauestens zu untersuchen, in Zweifelsfällen histologisch und bakteriologisch (Tierversuch).

Soweit andere Organe mit Tuberkulose behaftet gefunden werden, unterliegen sie der gleichen Untersuchung.

Inzwischen sind Versuche nach diesem Plan wohl schon an mehreren Instituten begonnen worden und dürften jetzt einige Bemerkungen hierzu am Platze sein, gegebenenfalls wird eine Aussprache darüber bestehende Unklarheiten beseitigen können und bei geteilter Auffassung zu einer einheitlichen Versuchsanordnung führen.

Im Gegensatz zu den früheren Versuchen von Selter, Knauer und Blumenberg (10), bei denen 5000, 25000, 100 000 und 500 000 Tuberkulosekeime injiziert wurden, sind im Versuchsplan nur zwei Dosen mit 500 000 und 10 000 000 Keimen vorgesehen, weil bei den geringeren Dosen mehrfach ein tuberkulöser Herd in den regionären Lymphknoten ausblieb und selbst bei 500 000 Keimen unter acht Impflingen noch ein Tier lediglich latente Drüsenbazilliose ohne Herdbildung zeigte, somit zu ersehen ist, daß zu einer sicheren Primärinfektion des Lymphknotens eine recht große Bazillenzahl erforderlich ist. Die Parallelversuche müssen zeigen, ob die Dosis schwach im allgemeinen ausreicht und ob etwa die Dosis von 10 000 000 Keimen die Gefahr in sich birgt, daß das regionäre Lymphknotengebiet der Impfstelle überschritten wird, somit schon zu einer bald einsetzenden Gefahr für den Impfling werden kann, oder ob erst in späteren Jahren, nachdem Anforderungen an den Impfling als Nutztier gestellt werden, die Gefahr besteht, daß gerade bei den mit 10 000 000 Keimen injizierten Tieren die Herde zum Einbruch in die Blutbahn besonders neigen.

Nach persönlichen Angaben von Selter ist es ihm gelungen, durch ein besonderes Verfahren (Natriumoxalat als Verreibungs- und Verdünnungsflüssigkeit) eine fast restlose Zerreibung und Auflösung der Tuberkelbazillenkultur und damit eine genauere Auszählung der Keime als bisher zu erzielen, eine Neuerung, die im Interesse der genaueren Dosierung von besonderer Bedeutung ist und demnächst aus dem Selter'schen Institut veröffentlicht werden wird.

Wenn die Vorprüfung der Impflinge mit Tuberkulin für die spätere Praxis als überflüssig bezeichnet wird, so muß dem schon zwangsmäßig zugestimmt werden, da sie eine zu große Belastung der Landwirtschaft bedeuten und damit für die Einführung jedweder Schutzimpfung ein Hindernis abgeben würde, für die Versuche und zur Klärung irgendwelcher Impfschäden ist sie unerlässlich.

Die Vorschrift einer gleichartigen Anwendungsweise des Tuberkulins mit einem bestimmten Tuberkulin ist der Gleichmäßigkeit halber durchaus wünschenswert. Wenn die intrapalpebrale Injektion vorgeschrieben wurde, so geschah dieses, weil bei ihren Versuchen Selter und Knauer sich von ihrer Genauigkeit überzeugen konnten. Soweit ich orientiert bin, hat in Deutschland als erster Breithor (1) diese Reaktion vergleichsweise mit der alten Augenprobe geprüft, ist aber zu dem Schluß gekommen, daß sie der alten Tuberkulinaugenprobe gegenüber keine Vorteile bietet. Das Ergebnis beider Methoden stimmte im wesentlichen überein. Selter und ich haben bei gemeinsamen Versuchen, die wir zwecks Einleitung der Schutzimpfung in einem größeren, gutgeleiteten Rinderbestande begonnen haben, in einer kleineren Versuchsreihe die Genauigkeit der Methode prüfen können. Wir mußten, da wir eine genügende Anzahl von Impflingen nicht erhalten konnten, auf eine größere Anzahl zum Teil weit über acht Wochen alte Kälber bis fast zu $\frac{3}{4}$ Jahr alten zurückgreifen. Während vereinzelt erst in der ersten Lebenswoche stehende Kälber ohne jede Reaktion waren, zeigten die älteren Tiere sämtlich eine außerordentlich starke Reaktion, die bei allen in einer auffallenden Schwellung der ganzen Impfgesichtshälfte, starker Rötung der Bindehaut und stark eitrigem Ausfluß aus dem geimpften Auge bestand, ein Zustand, den man eher als eine Infektion infolge unreinen Tuberkulins oder unreiner Impfspritze als eine Tuberkulinreaktion hätte ansprechen können. Letzterer Umstand ließ sich jedoch durch den negativen Befund bei den ganz jungen Kälbern ausschließen. Zur weiteren Prüfung wurden dann noch vier Bullenkälber, die in den nächsten Tagen zur Schlachtung kamen, mit der gleichen Tuberkulinlösung geimpft. Bei dreien trat ein völlig negatives, bei einem eine gleich auffallende Reaktion wie vorher bei den älteren Tieren auf. Die drei negativen Tiere zeigten bei der Schlachtung keinerlei tuberkulöse Veränderungen, das positiv reagierende Tier etwa walnußgroße Knoten in den Darmlymphknoten mit beginnender strahliger Verkäsung und Tuberkelbazillenbefund.

Bei einer späteren Tuberkulinprüfung von etwa zwanzig unter acht Wochen alten Kälbern des gleichen Bestandes, die auf besondere Anordnung hin mit Ammenmilch aufgezogen waren, war keinerlei Reaktion nach 24 Stunden zu beobachten.

Die starken Reaktionsercheinungen bei den positiven Tieren sind in kurzer Zeit restlos zurückgegangen, so daß auch nach dieser Richtung ein Nachteil nicht zu verzeichnen ist.

Die im Versuchsplan angegebene Einteilung und Beurteilung der Reaktionsgrade dürften den praktischen Verhältnissen entsprechen, wie durch Selter an Schlachtkälbern in größerem Ausmaße später noch nachgeprüft ist und worüber durch ihn noch berichtet werden wird.

In dem betreffenden Versuchsrunderbestande, der seit langem dem Tuberkulose-Tilgungsverfahren angeschlossen ist, die Kälber aber weder mit gekochter noch mit Ammenmilch, sondern mit der Gesamtmilch aller Kühe aufzieht, war die Gesamtmilch alle vier Monate bakteriologisch auf Tuberkelbazillen untersucht und jedesmal frei davon befunden, trotzdem reagierte erstmalig die große Zahl der etwas älteren Kälber, welche absolut getrennt aufgezogen waren, während die zweite mit besonderer Ammenmilch aufgezogene jüngere Kälberserie sich frei von Tuberkulose erwies. Es bleibt also nur die Annahme übrig, daß bei der

ersten Serie in der Zwischenzeit, die zwischen den einzelnen Gesamtmilchuntersuchungen lag, eine Kuh an offener Euter-tuberkulose erkrankt und vor der nächsten Untersuchung abgeschafft worden ist.

Unter a, b und c des Versuchsplanes sind die Bestände angegeben, die für die Schutzimpfung im Rahmen unserer Versuche in Frage kommen sollen. Der Verzicht auf besondere Maßnahmen bei Beständen (a) mit getrennter Kälberaufzucht und Ernährung der Kälber mit gekochter Milch bzw. Ammenmilch, erscheint, wie schon das vorstehende praktische Beispiel gezeigt hat, gerechtfertigt, ebenso berechtigt das Beispiel, das gezeigt hat, wie leicht trotz guter Durchführung des Tuberkulose-Tilgungsverfahrens nach v. Ostertag, aber bei fehlender Ernährung der Kälber mit gekochter Milch bzw. Ammenmilch eine Infektion des Jungviehs zustande kommt, zu der Forderung, auf die Dauer von drei Monaten bei Beständen unter b und c nach jeder Schutzimpfung die Gesamtmilch monatlich einmal auf Tuberkelbazillen zu prüfen und sich als nicht einwandfrei erweisende Bestände von unseren Versuchen auszuschließen.

Bei einer gelegentlichen Nachkontrolle sahen wir zehn Wochen nach der Impfung an dem rechten Kniefaltenlymphknoten (Impfstelle) keine Vergrößerung desselben weder nach der Dosis „schwach“ noch „stark“. Eine Tuberkulin-nachprüfung der Impflinge hat bisher noch nicht stattgefunden. Sofern diese nach Ablauf von 3—4 Monaten sich als positiv erweist, sind die Impflinge nicht mehr abgefördert zu halten, sondern genau gleichen Bedingungen wie alle übrigen Altersgenossen zu unterwerfen. Bis zum Angehen des Impfherdes muß aber Absonderung und Ernährung mit Ammenmilch unbedingt gefordert werden, eine natürliche alimentäre oder Inhalationsinfektion bis dahin könnte sonst bei den späteren Sektionen Täuschungen zu Ungunsten der Schutzimpfung ergeben.

Parallel-Versuche in denselben Beständen nach Calmette sind m. E. außerordentlich erwünscht, einmal weil das Calmette'sche ebenso wie das Selter'sche Verfahren bisher in der Praxis noch nicht ausprobiert ist, dann aber auch, weil gerade das Calmette'sche Verfahren neuerdings in der Landwirtschaft mehr und mehr bekannt geworden ist. Ich habe jetzt schon in landwirtschaftlichen Blättern Veröffentlichungen darüber vorgefunden, die ganz und gar denen gleichen, die alle Jahre einmal über ein nun endgültig entdecktes Universalheilmittel gegen Krebs ebenso planmäßig wie leichtsinnig berichten und lediglich der Mitwelt in kurzer Zeit eine neue Enttäuschung bereiten. Daß dieses bezüglich einer Tuberkulose-schutzimpfung im Interesse der Landwirtschaft unbedingt vermieden werden muß und daß unsere Versuche, die sich auf Jahre zu erstrecken haben, nicht vorzeitig in die Öffentlichkeit hineingetragen werden sollen, darüber waren wir uns bei unseren Beratungen im Vorjahre völlig einig. Der Umstand, daß schon jetzt sowohl der deutschen Human- wie Veterinärmedizin der Vorwurf gemacht wird, daß sie im Gegensatz zum Auslande sich dem neuen Calmette'schen Verfahren gegenüber viel zu abwartend, wenn nicht gar ablehnend verhalte, legt auch uns die Verpflichtung auf, dieses Verfahren mitzuprüfen. macht wird, daß im Gegensatz zum Auslande sich dem neuen Calmette'schen Verfahren gegenüber viel zu abwartend, wenn nicht gar ablehnend verhalte, legt auch uns die Verpflichtung auf, dieses Verfahren mitzuprüfen.

Die eingehende Nachkontrolle der Impflinge und Kontrolltiere bei ihrer später erfolgenden Schlachtung unter Zuhilfenahme histologischer und bakteriologischer Hilfsmittel stellt den Kernpunkt unserer Versuche dar, lediglich diese Befunde werden den Wert oder Nichtwert beider Schutzimpfverfahren beweisen können.

Daß es nicht leicht ist, geeignete Bestände, die gewissenhaft alle unsere Versuchsbedingungen erfüllen werden, zu finden, hat uns schon der Anfang unserer Versuche gezeigt, deshalb ist es besser, auf wenige, dann aber zuverlässige Be-

stände zurückzugreifen. Wenn alle Institute der Landwirtschaftskammern und auch sonst geeignete Institute den langdauernden und mühevollen Versuchen ihre Mitarbeit widmen, wird auf diese Weise ein genügend großes Versuchsmaterial unzweifelhaft zusammen kommen.

Auf solche Versuche bei Rindern wartet auch in erster Linie die Humanmedizin, wie es bei der Besprechung der Tuberkuloseimpffrage auf der im Juni vorigen Jahres in Wien abgehaltenen 12. Tagung der „Deutschen Vereinigung für Mikrobiologie“ allseitig zum Ausdruck gekommen ist. Mit Recht will man nicht eher die Impfung von Säuglingen mit virulenten oder abgeschwächten Tuberkelbazillen in größerem Ausmaße aufnehmen, bis sich die Ungefährlichkeit dieser Immunisierungsmethode und auch der Erfolg beim Rinde erwiesen hat.

Die Anschauung führender Tuberkuloseforscher, daß eine echte Immunität bei der Tuberkulose nur dann erwartet werden darf, wenn im Organismus ein aktiver tuberkulöser Herd gesetzt wird und daß mit dem Ausheilen dieses Herdes jede Immunität schwindet, steht zu den Angaben Calmettes über die Avirulenz seiner Tuberkelbazillen und die damit erzielte immunisierende Wirkung in gewissem Widerspruch. Calmette hat angegeben, daß sein Impfstoff zwar keine Infektion hervorruft, sondern daß lediglich die Anwesenheit seiner eingepfunden Tuberkelbazillen im ganzen lymphatischen Gewebe ohne Bildung pathologischer Veränderungen im Gewebe (latenter Parasitismus) eine Immunität erzeuge, die aber durch Ausheilen und Absterben der Erreger in einem, längstens zwei Jahren erloschen und durch jährliche Nachimpfungen zu erneuern sei.

Daß eine Resistenzhöhung und vorübergehende Immunität nach der Calmette'schen Schutzimpfung tatsächlich eintritt, wird von denjenigen, die Versuche gemacht haben, fast allseitig zugegeben und auch Selter hat im Vorjahre in seinem vor uns gehaltenen Referat nähere Angaben darüber gebracht. Nach Calmettes (2) Angaben ist die Mortalität an Tuberkulose bei geimpften in tuberkulöser Umgebung lebenden Kindern während ihres ersten Lebensjahres nicht einmal 1 Prozent, während sie für die nicht-geimpften 24 Prozent beträgt. Eine Erklärung hierfür dürfte auf Grund neuerer Forschungen darin zu finden sein, wie weiter unten angeführt werden soll, daß der Stamm B. C. G. tatsächlich nicht ganz avirulent ist, sondern in gewissem Grade sich tuberkulogen erweist.

Hierüber sind in den letzten Jahren sowohl von deutschen wie ausländischen Forschern zahlreiche Versuche gemacht, über deren Ergebnisse von Gerlach (5), Kraus (7) und anderen auf der im Juni v. Js. in Wien abgehaltenen 12. Tagung der „Deutschen Vereinigung für Mikrobiologie“ berichtet wurde.

Danach kann heute als festgestellt gelten, daß nach subkutaner Verabreichung des B. C. G.-Impfstoffes selbst in großen Dosen an Meerschweinchen, Kaninchen und Ziegen in den ersten Wochen lediglich lokalisiert bleibende Infiltrate bzw. Schwellung und Vereiterung des regionären Lymphknoten, außer diesen Erscheinungen aber keinerlei Generalisierung eintreten, und daß diese Erscheinungen allmählich durch Resorption wieder vollständig verschwinden. In den Veränderungen der ersten Wochen lassen sich mikroskopisch Tuberkelbazillen nachweisen. Bei Verabreichung per os waren die Ergebnisse gleiche, in einzelnen Fällen wurden Vergrößerung der Halslymphdrüsen, leichter Milztumor und teils grauweiße Knötchen in Leber und Milz festgestellt.

Nach intraperitonealer Verimpfung an Meerschweinchen, Kaninchen und Ziegen treten makroskopisch als Serosentuberkulose anzuprehende Veränderungen des Netzes, Verwachsungen der serösen Häute verschiedener Bauchorgane, kleine, graue, zentral verkäste Knötchen an der Magen-, Darm-, Zwerchfellsferosa, in Milz, Niere und Leber auf, zuweilen Schwellung der Darmlymphknoten mit kleinen verkästen Herden. Bei Ziegen wurden auch Knötchen in der

Lunge gesehen, wenn auch selten. In allen diesen Veränderungen waren Tuberkelbazillen mikroskopisch leicht nachzuweisen.

Bei intravenöser bzw. intrakardialer Einverleibung an Meerschweinchen, Kaninchen und Ziegen kam es zur disseminierten Miliartuberkulose der Lungen, Vergrößerung der Bronchiallymphknoten und Milzschwellung, auch hierbei waren Tuberkelbazillen mikroskopisch leicht nachzuweisen.

Spontaner Tod tritt im allgemeinen nicht ein, Gerlach berichtet über einen derartigen Ausgang bei einigen wenigen Tieren, die mit hohen Dosen geimpft waren.

In ganz vereinzelten Fällen gelang der Nachweis der Tuberkelbazillen in den hervorgerufenen Veränderungen, durch Angehen von üppigen Kulturen, jedoch nur nach intraperitonealer und intrakardialer Vorbehandlung.

Die Weiterübertragung von feinverriebenen Organveränderungen von erkrankten Versuchstieren auf gesunde Meerschweinchen und Kaninchen gelang äußerst selten oder gar nicht, Gerlach gibt an, daß ihm bei 20 Versuchen siebenmal die Weiterübertragung glückte.

Das Gelingen hängt wesentlich von Grad und Alter des Ausgangsprozesses ab, indem ältere Veränderungen zu einem negativen Ergebnis führen. Über die histologische Untersuchung wird allgemein angegeben, daß die Prozesse als tuberkulöses Gewebe angesprochen werden müssen, daß sie sich aber doch in mancher Hinsicht von einem typisch tuberkulösen Knötchen unterscheiden.

Tuberkulinempfindlichkeit der Versuchsmerschweinchen ist nicht in gleicher Weise vorhanden wie bei Meerschweinchen, die mit vollvirulenten Stämmen infiziert wurden, auch Calmette (2) gibt an, daß nur ein Teil seiner vakzinieren Säuglinge positiv reagierte, hält dieses aber für bedeutungslos, weil zwischen Tuberkulinempfindlichkeit und Resistenz gegen Reinfektionen keinerlei Beziehungen bestehen. Intravenös und subkutan vorbehandelte Kaninchen reagierten auf Tuberkulin vom 15. Tage bis etwa zum 8. Monat positiv, die per os behandelten reagierten nicht. Neuerdings wird auch schon von Calmette auf Grund von Arbeiten in seinem eigenen Laboratorium zugegeben, daß sein Stamm die vorstehend beschriebenen Veränderungen hervorzurufen vermag. Damit kann also der B. C. G.-Stamm entgegen früheren Angaben nicht mehr als avirulent bezeichnet werden und das Zustandekommen einer im Experiment gelungenen Immunität, die nach den vielen Versuchen an Meerschweinchen, Ziegen und Kälbern usw. nicht mehr bestritten werden kann, ist im Einklang mit der heute allseitig vertretenen Theorie, daß nur der im Körpergewebe erzeugte tuberkulöse aktive Herd einen Schutz gegen eine spätere Infektion verleihen kann, auf das Zustandekommen solcher Gewebsveränderungen infolge der B. C. G.-Impfung zurückzuführen. Wenn bei den Experimenten an Versuchstieren es sich auch gezeigt hat, daß der Grad der Erkrankung sowohl von der Menge der einverleibten B. C. G.-Bazillen wie von der Art der Einverleibung abhängig ist und somit absolut gleichbedeutende Versuchsergebnisse gar nicht erwartet werden können, so kann doch festgestellt werden, daß der B. C. G.-Stamm eine gewisse Virulenz für Versuchstiere besitzt, wenn er auch nicht durch kulturelle und Tierpassagen (Rinder, Kälber, Schafe, Affen sowie alle gebräuchlichen Laboratoriumstiere) zu einem vollvirulenten Tuberkulosestamm zurückgeführt werden kann.

Versuchstiere, die bis zu 1 Jahre am Leben gelassen wurden, zeigten, obgleich sie aus der Reihe derjenigen stammten, die wenige Wochen nach der Impfung die vorher beschriebenen Veränderungen aufwiesen, trotz hoher Impfdosen keinerlei pathologisch-anatomische Veränderungen mehr, die durch den B. C. G.-Stamm hervorgerufenen tuberkulösen Prozesse besitzen also eine besondere Tendenz zur Ausheilung: Calmette (2) konnte zeigen, daß das B. C. G. nach einjährigem Verweilen unter der Haut eines Rindes trotz seiner bovinen Herkunft unverändert lebend und für

Meerschweinchen ganz unschädlich geblieben war. Selter (13) fand nach Monaten zuweilen als Rückbleibsel feinstrahlig Narben, bei einzelnen Tieren verkäste und verkreidete Knoten mit mikroskopisch nachweisbaren Tuberkelbazillen, er konnte demnach im Gegensatz zu den anderen eine so schnelle Rückbildung der tuberkulösen Prozesse, wie andere sie fanden, nicht feststellen. Immerhin steht die Tatsache fest, daß die durch B. C. G.-Vakzinierung hervorgerufenen Prozesse eine ausgesprochene Neigung zur Ausheilung besitzen. Damit steht im Einklang Calmettes Forderung nach jährlich zu wiederholender Vakzinierung.

Die praktische Bedeutung der Calmette'schen Schutzimpfung kann aber durch die bisherigen Experimente und durch die bisherigen Versuche an zahlreichen Kindern nicht erwiesen werden, es muß sich erst in der Folge durch Versuche zeigen, wie das Schutzgeimpfte Rind sich einer natürlichen Infektion gegenüber auf die Dauer verhält. Solche Versuche sind in Österreich, Frankreich, Belgien, Rußland und in anderen Ländern im Gange.

In der Literatur des letzten Jahres bis heute finden sich keinerlei Ergebnisse über Praxisversuche von längerer Dauer, es ist ja auch erklärlich, weil sowohl Calmette wie Selter ihr Verfahren erst vor einigen Jahren der Allgemeinheit übergeben haben und wie schon vorher erwähnt ist, erst eine längere Reihe von Jahren die Entscheidung bringen kann. Die in Frankreich mit der Calmette'schen Schutzimpfung an Tausenden von Kindern gemachten z. T. günstigen Erfahrungen sind nach Selter (12) nicht ohne weiteres beweisend, weil diese Kinder unter Fürsorge standen, sollen auch nach anderen (Rosenfeld, Götzl, Pirquet) (14) auf statistischen Irrtümern beruhen. Nach dem Bericht über die 12. Tagung der „Deutschen Vereinigung für Mikrobiologie“ in Wien (3) weist Leynen-Brüssel darauf hin, daß Kälber, die vorschriftsmäßig mit B. C. G. geschützt, nach einem Jahre wiedergeimpft und dann einer Infektionsgelegenheit ausgesetzt wurden, ebenso erkrankten wie die Kontrolltiere. Es fanden sich schwere tuberkulöse Veränderungen, die wohl nicht von der Impfung, sondern von der später erfolgten Infektion herrührten, und die auf andere Tiere weiter übertragbar waren.

Der 12. Mikrobiologen-Kongress erhebt durch seine Sprecher fast allseitig die Forderung, daß die Schutzimpfung mit Tuberkelbazillen, die eine Virulenz besitzen, vorläufig nicht ohne weiteres in die Hand des praktischen Arztes oder Tierarztes gegeben werden kann, ohne daß unter autoritativer Leitung durchgeführte genaue Versuche, die durch Autopsien bzw. Schlachtbefunde bei Rindern belegt sind, die Unschädlichkeit der Impfung und eine ausreichende Immunität für die praktischen Verhältnisse sicher gestellt sind. Ganz die gleiche Ansicht kommt in den diesbezüglichen Referaten, die in der Gesellschaft der Ärzte in Wien am 25. Mai 1928 gehalten wurden, zum Ausdruck (14).

Der Tierarzt Rolle in Riga (9) hat neuerdings Nachprüfungen über die B. C. G.-Eigenschaften veröffentlicht, er kommt im allgemeinen zu den gleichen Ergebnissen, wie sie vorher angegeben sind, ältere Kulturen waren avirulent, mit frischen Kulturen, die für den Organismus aber im allgemeinen unschädlich waren, ließ sich Immunität erzeugen. Er stellt sich im Gegensatz zu den anderen auf den Standpunkt, „daß man B. C. G.-Kulturen als Impfstoff in der Veterinärmedizin ruhig anwenden kann, insbesondere in solchen tuberkulös verseuchten Beständen, in denen eine tuberkulosefreie Aufzucht unmöglich ist“. Sein Standpunkt stützt sich aber lediglich auf Meerschweinchenversuche und bringt uns insofern keine neuen Beweise.

In jüngster Zeit hat gerade Eber-Leipzig (4), der durch seine langjährigen Tuberkulose-Immunisierungsversuche allseitig bekannt ist, es besonders eindeutig ausgesprochen, daß es keine Methode der künstlichen Infektion gibt, die einen sicheren Rückschluß auf das Verhalten der Impflinge gegenüber der natürlichen enzootischen Tuberkuloseansteckung

(Stallinfektion) gestattet. Die Prüfung der Schutzkraft gegenüber der natürlichen Stallinfektion muß unter genau den gleichen Verhältnissen erfolgen, unter denen die Rinder nach erfolgter Geschlechtsreife als Kühe ihren Beruf als Milch- und Kälbererzeuger zu erfüllen gezwungen sind. Da die Rinder als Kälber geimpft werden müssen, so kann vor Ablauf von 6—8 Jahren ein Urteil nicht abgegeben werden, ob sich die Schutzimpfung bei ihnen tatsächlich bewährt hat.

Das ist ein Grundsatz, den auch wir bei unserem Versuchsplan als leitendes Moment im vorigen Jahre aufgestellt haben.

Eber unterzieht die Calmette'sche und Selter'sche Schutzimpfung, allerdings nicht auf Grund eigener Versuche, einer besonderen Kritik und stellt für beide Verfahren die zwei Fragen:

1. ist es möglich, durch eine erstmalig in frühester Jugend auszuführende, alljährlich zu wiederholende subkutane Einspritzung von B. C. G. Rindern eine erhöhte Widerstandskraft auch gegenüber der späteren enzootischen Stallinfektion zu verleihen (a. Verfahren Calmette), bzw. ist das Gleiche möglich nach künstlicher Erzeugung kleinster tuberkulöser Herde in der Jugend? (b. Verfahren Selter),
2. für beide Verfahren zugleich: ist eine solche Schutzimpfung auch für die älteren, in voller Milchleistung stehenden Rinder harmlos?

Bezüglich der Frage 1a (Calmette) sagt Eber, daß keinerlei hinreichende Erfahrungen auf Grund längerer Beobachtungen von Versuchsrindern vorliegen und daß für denjenigen, der sich ernstlich mit der Rinderchutzimpfungsfrage befaßt hat und die mit dem Alter und der zunehmenden wirtschaftlichen Ausnutzung ständig steigende Anfälligkeit, namentlich der weiblichen Rinder, für die Tuberkulose kennt, nicht der geringste Zweifel besteht, daß der Calmette'sche Impfstoff das nicht leisten kann, was die in ihrer Wirkung auf den Rinderkörper weit aggressiveren Impfstoffe Bovovakzin und Tauruman nicht zu leisten vermochten. Dem ersten Satz muß man zustimmen, auch unsere Versuche bezwecken ja lediglich, hierüber Klarheit zu schaffen und es ist dies, wie schon gesagt, eine Forderung, die jetzt allseitig vertreten wird.

Bezüglich der zweiten Frage warnt Eber davor, daraus, daß Kälber und Jungrinder die Impfung der B. C. G. ohne sichtbare Gefundheitschädigungen ertragen haben, den Schluß zu ziehen, daß das Gleiche auch bei älteren, bereits in der Milchnutzung stehenden Rindern der Fall ist. Demgegenüber behauptet Guérin (6) an 30 Rindern die völlige Unschädlichkeit bis zum Alter von 6 Jahren festgestellt zu haben, die Rinder wurden erstmalig nach der Geburt geimpft und dann alljährlich nachgeimpft. Nach Ebers und den Untersuchungen anderer Forscher steht es fest, daß bei mit lebenden Tuberkelbazillen geimpften Milchkühen diese in die Blutbahn und damit in die Milch gelangen können und daß bei immunisierten, klinisch völlig gesund erscheinenden Rindern äußerst schleichende Formen der Eutertuberkulose mit Ausscheidung von Tuberkelbazillen in der Milch auftreten können. Eber hält auch die jährlich zu wiederholende Schutzimpfung nach Calmette für praktisch undurchführbar und wirtschaftlich untragbar. Hierauf habe auch ich eingangs schon hingewiesen. Auch beim Selter'schen Verfahren kann Eber die Frage zu 1 nicht bejahen, er befindet sich darin aber auch in Übereinstimmung mit Selter, der schon im vorigen Jahre vor uns seine Ausführungen damit schloß, daß nur ausgedehnte Versuche in der Praxis die Frage prüfen könnten, ob sein Verfahren geeignet sei, in Verbindung mit dem Ostertag'schen Verfahren die Rindertuberkulose noch weiter, als es bisher geschehen konnte, zurückzudrängen.

Eber setzt die Möglichkeit voraus, daß eine vorzeitige Ausheilung des nach Selter gesetzten Prozesses eintreten kann und damit der Impfschutz aufhört. Dem ist ohne

Zweifel zuzustimmen, die Versuche sollen hierüber aber erst entscheiden.

Eber hat nach der Heymans'schen Schutzimpfung in fast tuberkulosefreien Beständen schleichende Formen der Eutertuberkulose mit dauernder Ausscheidung von Tuberkelbazillen in der Milch gesehen, er befürchtet solche auch nach der Selter'schen Impfung und stellt es als fraglich hin, ob der in der Jugend gesetzte gutartige Herd bei dauernder Stallhaltung und Nutzung im Alter seinen gutartigen Charakter beibehält.

Auch Calmette (3) sagt von der Selter'schen Impfung, daß die infizierten Individuen dauernd von einer Generalisierung der Tuberkulose bedroht sind, die im Anschluß an eine langsame Verkäufung eines Tuberkels auftreten kann.

Die Bedenken Ebers müssen voll anerkannt werden, es kommt nunmehr ebenfalls auf eine genaue Prüfung unter praktischen Verhältnissen an, worüber wir uns bei unserem Beschluß, diese Fragen nachzuprüfen, völlig im klaren waren. Die Befürchtungen Ebers, daß sowohl nach der Calmetteschen wie Selter'schen Impfung in späteren Jahren bei den Rindern schleichende Eutertuberkulosen auftreten können, gibt Veranlassung, die Prüfung dieser Frage noch als besonders wichtig in unseren Versuchsplan aufzunehmen. Eine solche Prüfung wird in unseren Versuchsbeständen, die ja unserer Aufsicht unterstehen, ein leichtes sein. Hierbei wird man dann auch Aufschluß darüber erlangen, ob der Prozentsatz solcher Fälle von auftretender Eutertuberkulose bei geimpften Tieren größer ist als die Zahl der Eutertuberkulosen, die sonst in nicht geimpften, dem Tuberkulose-Tilgungsverfahren angeschlossenen Beständen festgestellt wird. Von vornherein erscheint es mir nicht erklärlich, warum bei geimpften Tieren mit einem gutartigen tuberkulösen Herd in einem Körperlymphknoten, der wie wir zunächst einmal nach Selters Angaben annehmen wollen, auf seinen Lymphknotenkomplex beschränkt bleibt, leichter ein Durchbruch ins Blut und damit ins Euter zustandekommen soll, als bei Tieren eines Bestandes mit jährlich vorkommenden Fällen von offener Lungen- bzw. Eutertuberkulose, wobei die Kälber, wenn nicht besondere Sorgfalt herrscht, einer massierten Infektion oft längere Zeit ausgesetzt sind und Tuberkuloseherde in den inneren Organen schon frühzeitig erwerben, deren Ausdehnung gar nicht zu

kontrollieren ist. Auch von diesen Herden aus kann doch im späteren Alter jederzeit ein Durchbruch ins Blut erfolgen. Wenn deshalb der Prozentsatz von Impf-Eutertuberkulose nach Prüfung während mehrerer Jahre nicht wesentlich höher als die natürlich auftretende Eutertuberkulose ist, so dürfte hierin m. E. kein Hinderungsgrund für die Anwendung der Impfung liegen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß nach den bisher stattgefundenen Versuchen die Calmette'sche und Selter'sche Tuberkulose-Schutzimpfung nicht für die wahllose Anwendung in unseren Rinderzuchtbeständen als reif bezeichnet werden kann, sondern daß erst jahrelange Versuche in besonders geeigneten Beständen den Nachweis zu erbringen haben, einerseits daß den Impfungen eine für die Zeit ihrer wirtschaftlichen Ausnutzung ausreichende Immunität gegen die natürliche Ansteckung auch bei intensiver wirtschaftlicher Inanspruchnahme verliehen wird, andererseits daß den Impfungen in späteren Jahren ein Schaden aus der Impfung nicht erwächst, besonders auch in der Hinsicht, daß die Gesundheit der Milch nicht beeinträchtigt wird.

Literatur.

1. Breithor: „Die Intrapalpebralreaktion bei der Tuberkulose der Rinder“. Diss. Berlin 1921.
2. Calmette: Wiener klinische Wochenschrift 1928, Nr. 21, S. 725.
3. Derselbe: Centralblatt für Bakteriologie ufw., Originale, Bd. 104, Heft 1/4, S. 80.
4. Eber: Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 1928, Nr. 19, S. 330.
5. Gerlach: Centralblatt für Bakteriologie ufw., Originale, Bd. 104, Heft 1/4, S. 61 bis 65.
6. Guérin: Wiener klinische Wochenschrift 1928, Nr. 21, S. 731.
7. Kraus: Centralblatt für Bakteriologie ufw., Originale, Bd. 104, Heft 1/4, S. 65—71.
8. Rautmann: „Die Bekämpfung der Rindertuberkulose im Ausland und Nutzenanwendung für die heimische Seuchentilgung.“ Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 1927, S. 737.
9. Rolle: Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 1928, Nr. 18, S. 313.
10. Selter, Knauer und Blumenberg: „Tuberkulose-Schutzimpfung der Rinder.“ Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 1926, S. 653.
11. Selter: „Ausführung der Tuberkulose-Schutzimpfung der Rinder.“ Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 1927, S. 744.
12. Derselbe: „Zur Kritik des Calmette'schen und anderer Tuberkulose-Schutzimpfungsverfahren.“ Beitrag zur Klinik der Tuberkulose 1927, Bd. 67, S. 289.
13. Selter und Blumenberg: Klinische Wochenschrift 1927, Nr. 24.
14. Vorträge, gehalten in der Sitzung der Gesellschaft der Ärzte in Wien am 25. Mai 1928. Wiener klinische Wochenschrift 1928, Nr. 23.

Innere Medizin und Chirurgie.

Bertram: Die periphere Steuerung der Blutzuckerreaktion auf Gifte. (Verhandlungen der dtsh. Gesellschaft, 7. Tagung, 1928, S. 97—98.)

Der Blutzucker wird durch eine Reihe von Giften beeinflusst. Diese werden in solche eingeteilt, die den ruhenden K. H.-Stoffwechsel verändern (Blutzuckergifte) und in solche, die nur in den veränderten K. H.-Stoffwechsel eingreifen. (Periphere Steuerung des K. H.-Stoffwechsels.) Die Unterschiede der alimentären, der Sympathikus- und der Parasympathikusglykämien hinsichtlich des Mechanismus der Steuerung werden besprochen. Durch angestellte Versuche über den Einfluß der Elektrolyte auf die Parasympathikusglykämie wird ein neuer experimenteller Beitrag zur Frage der Umkehrwirkung vegetativer Funktionen gegeben.

R. Völker.

Reisinger, L. und H. Reimann: Beitrag zur Ätiologie des Bläschenauschlages des Rindes. (Wiener t. Mschr. 1928, Jahrg. XV, S. 265.)

Bei neunENZootien von Bläschenauschlag bei Rindern wurden eingehende bakteriologische Studien angestellt. In den Scheidensekreten von 25 erkrankten Rindern teils natürlich, teils künstlich infiziert fanden sich: Staphylokokken 19mal, Diplostreptokokken 14mal (grampositiv), Diplostreptokokken gramnegativ 5mal, Colibakterien 7mal,

B. pyogenes bovis 4mal, ferner viermal nicht näher bestimmte Stäbchen, dreimal den Heubazillen ähnliche Stäbchen und einmal dem Nekrosebakterium ähnliches Stäbchen. Das negative Ergebnis dieser Untersuchungen veranlaßte Verff., die Frage zu prüfen, ob es sich hier um ein Virus als Ursache handelt. Als Material wurde Scheidensekret verwendet, das durch Porzellanfilter nach Reichl und Tonkerzen nach Chamberland filtriert wurde. Das Scheidensekret wurde vorher in NaCl-Lösung bzw. in Bouillon aufgeschloffen. Es wurden auf die Weise 15 bakterienfreie Filtrate gewonnen, von denen sich bei Infektionsversuchen an Rindern 12 als virulent erwiesen und nach Applikation bei den Tieren das typische Krankheitsbild des Bläschenauschlages erzeugten. Es büßte seine Virulenz auch bei wiederholten Tierpassagen (bis zu fünf Generationen versucht) nicht ein. Die verschiedenartigen Bakterien, die noch angetroffen wurden, sind als zufällige Begleitbakterien anzusehen.

Berge.

Krallert, L.: Inhalationstherapie bei Erkrankungen der Atmungswege mit „Tussex-Räucherkerzen“. (W. t. Mschr. 1928, Jahrg. XV, S. 265.)

Verf. verwendet die Tussex-Räucherkerzen (Tewega, G. m. b. H., Wien III., Kolonitzgasse 2a) bei ungefähr 50 Pferden bei Angina, Pharyngitis, Laryngitis, Bronchitis chronica und Druse. Die Anwendungsweise ist eine ört-

liche als Inhalation und Stallräucherung. Die Behandlung erfolgt 4—5 Tage hintereinander täglich einmal mit 3—5 Kerzen. Die Erfolge waren gut. Berge.

Freund: Über Solganalbehandlung. (Beiträge zur Klinik der Tuberkulose 1928, Bd. 68, S. 606.)

Das Solganal ist ein Goldpräparat, das gegenüber gewissen Formen der Tuberkulose eine objektiv nachweisbare therapeutische Wirkung zeigt. Diese Wirkung übertrifft die anderer Goldpräparate und kommt der Sanokrysinwirkung mindestens gleich. Das Solganal ist nahezu frei von schädlichen Nebenwirkungen und verursacht insbesondere keine Nierenschädigungen. Die bei Solganalbehandlung verhältnismäßig häufig auftretenden Goldexantheme können aller Wahrscheinlichkeit nach durch Adrenalinpräparate wirksam bekämpft werden. Das Solganal zeigt eine besonders günstige Wirkung bei den frischen Formen der Lungentuberkulose, unter der Voraussetzung, daß die Krankheit nicht allzu ausgedehnt und die allgemeine Widerstandskraft noch erhalten ist. Bei produktiv zirrhotischen oder rein zirrhotischen Lungenprozessen ist die Wirkung nur gering oder fehlt ganz. Darmtuberkulose oder degenerative Nierenveränderungen bilden eine Kontraindikation für die Behandlung mit Solganal. Die Dosierung muß immer streng individuell sein. Meyn.

Günther, Anton: Modellversuche über den Einfluß des Strychnins auf die respiratorische Funktion des Blutes. (Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Heidelberg.) (Naunyn-Schmiedebergs Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1928, 130. Bd., S. 242—249.)

Die vielfach vertretene Ansicht, dem Strychnin komme eine deutliche Wirkung auf die Zusammensetzung der Blutgase zu, die darin bestehe, daß es die Aufnahme des Sauerstoffs ins Blut und die Abgabe der Kohlensäure erschwere (Harley), oder daß Strychnin die Sauerstoffabgabe aus dem Oxyhämoglobinemolekül verzögere (Radziwillowicz), oder daß Strychnin die Aufnahme von Sauerstoff und Kohlensäure ins Blut hemme, wird zurückgewiesen. Es wird angenommen, daß die beiden erstgenannten Autoren keimhaltiges Blut verwendet haben und daß die beobachtete Beeinflussung der Blutgaszusammensetzung durch Strychnin mit der antibakteriellen Wirkung dieser Gifte zusammenhänge. Bei Verwendung von sterilem Blut ist ein Einfluß der Strychnosalkaloide nicht zu erkennen. Im Gegensatz zu v. Mikó und Pala findet der Verf., daß Kaninchenblut Sauerstoff und Kohlensäure in derselben Menge — oder mit derselben Geschwindigkeit — aufnimmt, ob es Strychnin enthält oder nicht. R. Völker.

Taniguchi, K.: Experimentelle Untersuchungen über den Bildungsort des Bilirubins. (Aus der I. Chirurgischen Klinik der Medizinischen Fakultät der Kaiserlichen Kiushu-Universität zu Fukuoka [Japan].) (Naunyn-Schmiedebergs Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1928, 130. Bd., S. 37—48.)

Für das Verständnis des Wesens des Ikterus ist die Frage nach dem Bildungsorte des Bilirubins von größter Bedeutung; intrahepatische und extrahepatische Bildungstheorie stehen einander gegenüber. Nach Totalexstirpation der Leber des Hundes (Methode Mann und Magath sowie eigene zweizeitige) tritt das Bilirubin im Blute auf und nimmt mit der Zeit zu. Durch Ausschaltung der Darmresorption wird festgestellt, daß dieses nicht aus dem Vorrat des vom Darm resorbierten Bilirubins stammt, sondern extrahepatisch gebildet wird. Bei Kontrolltieren war der Bilirubingehalt bedeutend höher, so daß die Leber als der vornehmlichste Sitz der Bilirubinproduktion anzusehen ist. Der Toluylendiaminikterus tritt bei den operierten Tieren nicht auf, während Kontrolltiere deutlich erkranken, in gleicher Weise verhält sich der Phenylhydrazinikterus, so daß geschlossen werden kann, daß Toluylendiamin und das Phenylhydrazin nur auf die Leber wirken. Die Bilirubinbildung geht somit zwar auch extrahepatisch vor sich, da durch Hämoglobininjektion bei Totalexstirpation der Leber

auch eine geringfügige Zunahme der extrahepatischen Bilirubinproduktion festgestellt wurde, im wesentlichen ist aber die Leber als Bilirubinbildnerin anzusehen. R. Völker.

Reinert, Marc.: Über die Ausscheidung von Barbitursäurederivaten im Harn beim Hund. (Aus dem Pharmakologischen Laboratorium von F. Hoffmann-La Roche & Co., A.-G.) (Naunyn-Schmiedebergs Archiv für exp. Pathol. und Pharmak. 1928, 130. Bd., S. 49—57.)

Die Frage der Ausscheidungsverhältnisse von Schlafmitteln ist nicht nur von theoretischem Interesse, sondern auch von praktischer Bedeutung, da zu den ausschlaggebenden Faktoren der Wirkungsweise und rationellen Anwendung auch die Dauer der Ausscheidung von Wichtigkeit ist. Untersucht wurde die Diäthylbarbitursäure, Phenyläthylbarbitursäure und die Allylisopropylbarbitursäure. Die beiden ersten Schlafmittel unterscheiden sich von der letzteren durch ihre charakteristischen posthypnotischen Wirkungen. Dieser Effekt wurde abhängig gefunden von der Ausscheidung im Harn. Die Phenyläthylbarbitursäure wird ebenfalls zu etwa 80 Prozent im Körper zerstört, doch erfolgt diese Zerstörung offenbar sehr langsam, denn die aus dem Harn isolierbaren 20 Prozent wurden erst im Verlaufe von neun bis zehn Tagen ausgeschieden. Das Maximum der Ausscheidung scheint auf den dritten oder vierten Tag nach der Eingabe zu fallen. Die Diäthylbarbitursäure wird im Organismus nur zu etwa 25 bis 30 Prozent zerstört; die übrigen 70 Prozent werden innerhalb von 7—8 Tagen langsam im Harn ausgeschieden. R. Völker.

Friesleben, M.: Zur Behandlung mit Autovakzinen. (Medizinische Klinik 1927, Nr. 33, S. 1257—1258.)

Zur Behandlung mit Autovakzinen eignen sich am meisten die Staphylokokkeninfektionen der Haut — besonders die hartnäckigen Niereninfektionen und die Coliinfektionen der Blase und Harnwege. Bei den ersteren war in einigen Fällen die Überlegenheit der Autovakzinen über die fabrikmäßig hergestellten Vakzinen deutlich. Bei den Infektionen der Blase hatte die Kombinationsbehandlung — Vakzine und Spülungen — gute Erfolge. Bei bakteriellen Allgemeininfektionen sind die Erfolge der Autovakzinen nicht eindeutig, immerhin erscheint ein Versuch, sie als unterstützende Therapie anzuwenden, durchaus angezeigt. A.

Wehsarg: Die Verwendung von Milchsäure bei infektiösen Darm-Erkrankungen. (Fortschritte der Therapie 1926, Jahrg. 2, Nr. 23, S. 766—767.)

Verf. macht auf die Milchsäure und ihre Präparate als wirksamstes Darmantiseptikum bei schweren infektiösen Darmerkrankungen aufmerksam; besonders bedeutende französische Kliniker haben bereits vor 30 Jahren sehr gute Erfolge damit erzielt (Ruhr, Typhus, Cholera). Es werden einzelne Fälle beschrieben, die schwere Darmstörungen, unstillbares Erbrechen (2—4prozentige Lösung oder 10 bis 15 Gramm auf 1000, halbgläserweise in 24 Stunden), Diarrhöen, Paratyphus usw. betreffen. A.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Wethmar, R.: Die Einwirkung der Karbolsäure auf das Virus fixe. (Aus dem Institut für Infektionskrankheiten „Robert Koch“.) (Zschr. für Hygiene 1928, 108, H. 4, S. 803.)

Durch die z. Zt. im Vordergrund stehende Frage, ob die antirabische Schutzimpfung mit virulenten oder abgetötetem Impfstoff erfolgen soll, gewinnt die von Fermi (Sassari) eingeführte Methode, das Virus fixe vor der Verimpfung mit Karbolsäure zu verletzen und dadurch avirulent zu machen, wieder erneutes Interesse. Bei der Nachprüfung dieser Feststellungen kam Wethmar zu folgendem Ergebnis: 1proz. Karbolsäure wirkt am besten und gleichmäßigsten auf 5prozentige Hirn-emulsion bei 20—22 Grad Temperatur. Hierbei ist eine all-

mähliche Verlängerung der Inkubationszeit festzustellen. Nach fünfmal 24stündiger Karboleinwirkung ist der Impfstoff avirulent. Emulsionen mit höherprozentigem Wutstoffgehalt zeigen erhebliche Abweichungen in dieser Hinsicht. Bei Eisfhranktemperatur ist überhaupt keine Einwirkung durch die Karbolsäure nachweisbar, wenn man subdural verimpft. Indes verlor auch bei Eisfhranktemperatur durch Karbolzusatz das Virus Sassari bereits nach 24 Stunden die Fähigkeit, von der Subkutis aus tödlich zu wirken. Bei den Versuchen zeigte sich, daß das Rückenmark wesentlich weniger Virus enthält als das Hirn. Ziegler.

Glusmann, M.: Ein seltener Fall von Tollwut. (Aus der Pasteur-Abteilung des Charkower Bakteriologischen Instituts [Leiter: Dr. M. Glusmann] und der Tollwut-Abteilung des Institutes „Robert Koch“ [Direktor: Prof. Dr. J. Koch].) (Zschr. für Hygiene 1928, 108, H. 3, S. 588.)

Der von Glusmann mitgeteilte seltene Fall von Tollwut beim Menschen ist zunächst dadurch auffällig, daß sich aus dem Vorberichte keinerlei Anhaltspunkte für die Möglichkeit der Infektion ergeben. Der Patient verstarb nach viertägiger Erkrankung unter Erscheinungen schwerster Symptome vonseiten des Zentralnervensystems. Wenn auch deutliche Krämpfe der Schluckmuskulatur bei Ess- und Trinkversuchen und starker Speichelfluß vorhanden waren, so waren doch die Symptome wenig typisch und vor allem die Umstände, unter denen die Erkrankung zustandekam, derart, daß man zunächst nicht auf den Gedanken einer Tollwuterkrankung gekommen war. Erst das Fehlen von Veränderungen im Zentralnervensystem bei der Sektion veranlaßte, das Gehirn weiter zu untersuchen. Negrische Körperchen wurden nicht festgestellt. Eigenartig ist das Ergebnis der Tierversuche. Von den mit Gehirn intrazerebral injizierten Kaninchen erkrankte ein Kaninchen nach 24 und verendete nach 48 Stunden, ein zweites erkrankte nach 4 und starb nach 6 Tagen. Lähmungen konnten bei diesen Tieren nicht beobachtet werden. Nachdem das erste Kaninchen eingegangen war, wurden noch zwei weitere mit dem Gehirn infiziert. Eines der Tiere erkrankte nach zwei Tagen und verendete vier Tage nach der Infektion. Bei diesem Tiere konnten Zuckungen und Lähmungen der hinteren Extremitäten beobachtet werden. Infolge des Krankheitsverlaufs bei diesen drei Kaninchen wurden ihre Gehirne nicht weiter verimpft. Das vierte von den infizierten Kaninchen erkrankte nach 14 und verendete nach 16 Tagen. Bei diesem Tiere wurden typische Tollwuterscheinungen beobachtet. Das mit dem Gehirn dieses Tieres weiter geimpfte Kaninchen verendete nach 15 Tagen. Die weitere Passage ergab eine Inkubationszeit von nur sechs Tagen, die folgende schon von nur 5—4 Tagen. Ziegler.

Lange, B. und K. Lydtin: Experimentelle Untersuchungen an Rindern über die Schutzwirkung der Kultur BCG (Calmette). (Aus der Seuchenabteilung des Institutes „Robert Koch“.) (Zschr. für Hygiene 1928, 108, H. 4, S. 808.)

Auf die Schutzwirkung der Kultur BCG ist von Calmette und seinen Mitarbeitern vor allem auf Grund der experimentellen Erfahrung an großen Tieren geschlossen worden. Lange und Lydtin haben diese Versuche an einer größeren Anzahl von Rindern nachgeprüft. Ihre Ergebnisse sind folgende: In zwei Versuchen trat bei subkutan mit BCG vorbehandelten Rindern ein Schutz gegen eine intravenöse Infektion nicht zutage, nicht einmal gegenüber einer Infektion, die für die Kontrollen nicht unbedingt tödlich war. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu den Beobachtungen von Calmette und sowie von Tzechnovitzer, die in ihren, denen der Verf. analogen Infektionsversuchen bei subkutan vorbehandelten Tieren regelmäßig eine Schutzwirkung sahen. Gegen die schwache Infektion, der gegenüber die subkutan vorbehandelten Rinder einen Schutz nicht erkennen ließen, war das eine intravenös nach Calmette vor-

behandelte Tier offenbar geschützt. Ob regelmäßig die intravenöse Vorbehandlung bessere Resultate gibt als die subkutane, kann aus dem einen Versuch nicht entschieden werden. Für diese Annahme sprechen allerdings auch die älteren Versuche einer Schutzimpfung mit humanen Bazillen. Die Verf. selbst hatten ferner mit der Kultur BCG bei Kaninchen im allgemeinen nur dann gewisse Erfolge, wenn die Vorbehandlung intravenös geschehen war. Nun hat die Wirksamkeit einer intravenösen Vorbehandlung nach Calmette für die Immunisierung des Menschen kein praktisches Interesse, dagegen ist von größter Wichtigkeit, ob die von Calmette empfohlene perorale Vorbehandlung etwas leistet. Die Verf. haben deshalb Versuche mit peroraler Vorbehandlung neugeborener Kälber begonnen. Ziegler.

Nahrungsmittelhygiene.

Platschek: Zur elektrischen Betäubung. (Zschr. f. Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 322/24.)

Zu den Veröffentlichungen über elektrische Betäubung von Raschke, Hoefnagel und Köslar bemerkt Platschek, daß einerseits die Verwendung eines Gleichstroms von 120 Volt im Schlachthofe für die damit beschäftigten Menschen schwere Gefahren in sich schließen und daß andererseits das Betäubungsverfahren ungenügend sei. Ob die Einwirkung des elektrischen Stromes überhaupt eine wirkliche, vollkommene Betäubung zur Folge hat, muß durch zahlreiche weitere Versuche wissenschaftlich geprüft werden. Platschek meint, daß bei den mit Gleichstrom behandelten Tieren infolge des allgemeinen Muskelkrampfes, der auch die Augenmuskeln ergreift, eine ausgehende Bewegungslosigkeit vorherrscht, die den Eindruck der Bewußtlosigkeit hervorrufen kann. Es handelt sich offenbar um einen Tetanus der willkürlichen und unwillkürlichen Muskeln. Dabei ist zu berücksichtigen, daß auch der an Tetanus erkrankte Mensch bei ausgesprochener Muskelstarre und jeder Unfähigkeit sich zu bewegen, bei vollem Bewußtsein ist. Die Fortsetzung der Versuche an schweren Bullen und Ochsen ist notwendig zur Prüfung der Frage, ob und wieviel Volt Gleichstrom nur Spasmus, und ob und wann wirklich vollkommene Betäubung eintritt. Mit Rücksicht auf etwaige Schächtlungen ist daran zu denken, daß, wenn durch die Anwendung des Gleichstroms die Tiere getroffen wurden, der Genuß des Fleisches des Tieres vom Ritual verboten bleiben würde. Edelmann.

Frickinger: Die histologische Untersuchung von Fleischgemengen. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jahrgang, S. 317—322 und 335—343.) (Mit 32. Abb. auf 8 Tafeln.)

Mit Rücksicht auf die Unzulänglichkeit der bei der Untersuchung von Fleischgemengen (Würst, Hackfleisch, Ragouts und dergl.) zur Anwendung gebrachten Methoden hat es Frickinger im Veterinär-Untersuchungsamt des städt. Schlachthofes in Bochum unternommen, histologische Untersuchungsverfahren für den vorliegenden Zweck systematisch zu bearbeiten. Amtliche Normen über die Zusammenfassung und Herstellungsweise der verschiedenen Nahrungsmittel, die Fleischgemenge darstellen, gibt es nicht. Deshalb wird in gerichtlichen Fällen die ortsübliche Zusammenfassung der Würste usw. durch geeignete Sachverständige festgelegt und geprüft werden müssen, ob ein Fleischgemenge in seiner Zusammenfassung den ortsüblichen Grundätzen entspricht. Hierzu ist das histologische Verfahren durchaus geeignet. Dessen Technik kann mit allen ihren Einzelheiten hier nicht erörtert, soll aber an dem Beispiel für die Untersuchung von Würsten wenigstens angedeutet werden.

Aus den zu untersuchenden Würsten werden aus verschiedenen Stellen Stückchen von etwa 1—2 qcm Oberfläche und 5 mm Dicke herausgeschnitten und in einer 4—10prozentigen Formollösung fixiert (am besten im Bruttofen bei 37 Grad C). In etwa 12—14 Stunden ist

Durchfixierung erfolgt. Nach kurzem Wässern, am besten in Porzellanschwimmieben, kann geschnitten werden. Kommt es darauf an, in kürzester Zeit eine Diagnose zu stellen, so wende man die auch von Renner empfohlene Schnellgefrier- oder Schnellfixiermethode an. Man kocht zu diesem Zweck das ausgeschnittene Wurststückchen in einem Reagenzglas mit einer konzentrierten Formollösung — es genügt aber auch die 10prozentige Lösung — ein paarmal auf, wässert kurze Zeit und kann dann auf dem Gefriermikrotom schneiden. Die Schnitte werden weiter nach den bekannten histologischen Methoden behandelt, gefärbt und mit dem Mikroskop untersucht. Für die von Seel und von Klimmek empfohlene optische Prüfung von Wurstwaren mittels des Trichinoskops kann sich Frickinger nicht sehr begeistern, die Schnittmethode ist der Untersuchung im Kompressorium hinsichtlich der Sicherheit der Diagnose weit überlegen.

Hinsichtlich der Eigentümlichkeiten, in denen sich die verschiedenen Gewebe und Organe des tierischen Körpers im histologischen Bilde zeigen, muß auf das Original verwiesen werden. Zusammenfassend läßt sich mit Frickinger behaupten, daß es mittels der histologischen Untersuchung möglich ist, die einzelnen Bestandteile eines Fleischgemenges mit verhältnismäßig großer Sicherheit zu analysieren.

Was die Arten von Verfälschungen anlangt, denen man bei der Untersuchung von Fleischgemengen begegnen kann, so ist folgendes zu erwähnen:

Beim Hackfleisch trifft man nicht selten auf eine Verfälschung mit der weniger wertvollen Herzmuskulatur und sogar mit Lungengewebe.

Bei Würsten wird man weitaus häufiger Gelegenheit haben, Zusätze zu finden, die entweder unerlaubt sind oder aber vom Verbraucher nicht erwartet werden. Dabei wird die histologische Wurstuntersuchung für die Entscheidung der Frage wichtig, ob eine Wurst die Bestandteile enthält, die in ihr normalerweise vom Konsumenten vorausgesetzt werden. Der Begriff oder die Bezeichnung „Leberwurst“ läßt natürlich bei jedem Käufer voraussetzen, daß die Wurst auch tatsächlich Leber enthält. Bei den besseren und teuren Sorten wird das auch immer der Fall sein; man findet in allen Schnitten mehr oder weniger große Mengen des in der Regel gut zu erkennenden Lebergewebes. Anders bei der sog. Leberwurst II. Sorte, einem billigen und namentlich von der minderbemittelten Bevölkerung gerne gekauften Nahrungsmittel. Hier wird man oft vergeblich nach Leber suchen, in der Hauptache aber auf Teile von Wiederkäuermagen, Därmen (Kalbsgekröse), Fleischabfällen und Euter, das in gut gewässertem Zustande der „Leber“-wurst eine schöne helle Farbe verleihen soll und deshalb besonders gerne verarbeitet wird, stoßen. Ein gänzlich Fehlen des Hauptbestandteiles Leber stellt ohne Zweifel einen erheblichen Mangel dar, der, da die Ware unter einer ihrer Bezeichnung nicht entsprechenden Beschaffenheit angeboten wird, unter den Begriff des Nachmachens oder der Verfälschung fällt. Gegen die Herstellung einer solchen billigen „Leberwurst“ ist an und für sich durchaus nichts einzuwenden. Im Gegenteil ist es zu begrüßen, daß die immerhin einen ziemlich großen Nährwert darstellenden Eingeweide unserer Schlachttiere zu einem preiswerten Volksnahrungsmittel verarbeitet werden; aber eine solche Wurst darf nicht die irreführende Bezeichnung „Leberwurst“ erhalten, sondern müßte nach dem Vorschlage von Seel zweckmäßigerweise als „Eingeweidewurst“ deklariert werden. Damit wäre zweifellos dem kaufenden Publikum, dem Hersteller und dem kontrollierenden Nahrungsmittelfachverständigen gedient.

In der Zungenwurst, eine in Blutdärme gefüllte Blutwurst, die Einlagen von häufig in Speckscheiben eingewickelten gepökelten Zungenstückchen enthält, werden die letzteren vielfach durch Stückchen von gepökeltem Rindfleisch oder gefälzenem Herzen ersetzt. Dies ist leicht histologisch nachzuweisen. Der Ersatz der Zunge durch Fleisch oder das minderwertigere Herz ist zweifellos eine Verfälschung. Allerdings spielt auch hier, wenn es zum Gerichts-

termin kommt, die „Ortsüblichkeit“ eine oft recht unangenehme Rolle.

Schwartenmagen wird mitunter durch Lungenteile als Ersatz von durchgepökelten Fleischstücken verfälscht.

Ragout fin und Füllmasse von Fleisch-Pastetchen, die zu einem wesentlichen Teil aus dem Kalbsbrieschen (Thymus) bestehen sollen, werden mit Kalbfleisch, Kuheuter, Pansenteilen und dergl. verfälscht.

Fleischsalat stellt mitunter ein aus einer Mehlsauce und etwas Öl hergestellte „Kunst“-majonnaise angemachtes Gemenge aus sehrmalen Streifen einer ganz gewöhnlichen Fleischwurst dar.

Alles in allem kann man Frickinger zustimmen, daß die geschilderte histologische Untersuchung ein brauchbares und wertvolles Verfahren darstellt, um Fleischgemenge verschiedener Art in einer von den bisherigen unvollkommenen und ungenügenden Methoden abweichenden Form untersuchen, beurteilen und bewerten zu können.

Die interessanten Ausführungen Frickinger's werden durch 32 instruktive Abbildungen wirkungsvoll erläutert. Der Arbeit ist ein Literaturverzeichnis von 18 Nummern angefügt. Edelmann.

Weber: „Bakteriologische Fleischbefchau.“ (Aus dem Veterinär-Untersuchungsamt der Staatl. Auslandsfleischbeschaustelle in Stettin.) (B. T. W. 1928, S. 512—515.)

Verf. legt in vorliegender Arbeit seine Erfahrungen auf dem vorliegenden Gebiete nieder und gelangt dabei zu folgenden Schlüssen:

Eine gewisse Einfachheit der Technik bei aller Wahrung streng wissenschaftlicher Grundsätze hinsichtlich der bakteriologischen und serologischen Arbeitsmethoden in Verbindung mit einer rationellen Beurteilung der Ergebnisse hat an Untersuchungsanstalten, wie Schlachthoflaboratorien usw. stets den Wert, daß die Schlagfertigkeit derartiger Untersuchungsanstalten zur raschen Ermittlung der Fleischvergifter aus dem Tierkörper gewahrt bleibt. Unter Würdigung des Hinweises, anerkannte Fortschritte berücksichtigen zu dürfen, wie es in dem Erlaß des Preuß. Landwirtschaftsministeriums vom 23. Mai 1927 verfügt ist, hat es sich neben den betr. Vorschriften als ein gleichwertiges Verfahren bewährt, zur Aerobenzüchtung von den eingefangenen Proben nur je eine Agar- und Lackmusmilchzuckerplatte nach Konradi-Drigalski sowie je eine Trauben- und Milchzuckerbouillonkultur mit Gärungsröhrchen (Kenntlichmachung der Trauben- oder Milchzuckerbouillon mit Eosin) anzulegen und einfache serologische Arbeitsmethoden anzuwenden mit dem Vorteil, daß schon im ersten Untersuchungsgang eine weit schnellere und sicherere Beurteilung des Falles ermöglicht, wie zugleich auch eine wesentliche Verbilligung erzielt, nicht zuletzt neben der Möglichkeit der Anreicherung auch eine gewisse Kontrolle über steriles Arbeiten und Zufälligkeitsverunreinigungen gewährleistet wird.

Bei Feststellung einer intravitale Fleischvergifterinfektion ist bei Schlachttieren die Diagnose „Paratyphus B“ mit Rücksicht auf die rein menschenpathogene Natur des Bacterium Paratyphi-B Schottmüller und sein Vorkommen in Verbindung mit dem Menschen stets besonders kritisch zu beurteilen.

Besondere Aufmerksamkeit ist in jedem Einsendungsfall auch der Untersuchung auf Milzbrand zuzuwenden, insbesondere ist Paketmaterial usw. auf hierzu eigens eingerichteten zweckentsprechenden Unterlagen mit Sammelvorrichtung für etwa auslaufenden Fleischsaft oder breiiges Milzbrandmaterial abzusetzen, andererseits, zumal in Fällen vorläufig nicht erkennbaren Milzbrandes die Gefahr besteht, daß Tierarzt und Laboratoriumspersonal sich infizieren und Milzbrandkeime verschleppt werden können. Unter Beachtung dessen, daß Milzbrand auf den gebräuchlichen Differential-Nährböden kulturell nicht festzustellen ist, kann die

Außerachtlassung des Anlegens von Agarplatten für den Unterfucher sowie für die Allgemeinheit außerordentlich nachteilig sich auswirken (fahrlässige Gefährdung der menschlichen Gesundheit und schwere volkswirtschaftliche Schäden durch die Verbreitung des Milzbrandes unter den Nutzbeständen mit Gefängnis und Haftbarmachung für den Betreffenden im Gefolge).

Unbeschadet vorstehender Ausführung bleibt gelegentlich der Abhaltung von Kursen zur Erlernung der Bakteriologischen Fleischbeschau von Wichtigkeit, daß Kurz Kurse dem Teilnehmer wohl einen Gesamtüberblick geben, jedoch keineswegs geeignet sind, ihn zu einem rationellen Arbeiten zu befähigen. Bei der heutigen Bedeutung der Bakteriologischen Fleischbeschau und bei der Fülle des Stoffes ist m. E. eine jahrelange Schulung notwendig, um eine wirklich rationelle Bakteriologische Fleischbeschau zur Förderung unserer Kenntnis auf dem Gebiete der Fleischvergifter und damit auch zum Segen unserer heimischen Volkswirtschaft (Viehzucht und Fleischkonsum) zu verbürgen. Eine lückenhafte Ausbildung, mit welcher bei einer Kursdauer von einigen Wochen oder Monaten gerechnet werden muß, führt nicht zu dem Ziel und zu dem weiteren Streben, in absehbarer Zeit über ein hochwertiges spezialistisch geschultes tierärztliches Personal zu verfügen. Derartige Kurz Kurse sind bestenfalls geeignet, lediglich tierärztliche Laboranten, aber keine tierärztlichen Bakteriologen auszubilden. Die Bakteriologische Fleischbeschau steht über allem Schema, sie ist Wissenschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Carl.

May: Zur Ausführung der bakteriologischen Fleischbeschau. (Zschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 372.)

Unter Zustimmung zu dem Artikel Schrad er's: Die Rationalisierung der bakteriologischen Fleischbeschau (Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jahrg., Heft 15) schlägt May vor, daß kleineren Schlachthöfen, die zur Bakteriologischen Fleischuntersuchung zugelassen werden, fertig gegossene Platten mit farbigen Nährböden überlassen werden könnten, die längere Zeit im Kühlhaus oder Eisfrank aufzubewahren sind. Die Beurteilung der farbigen Platten wird auch der bakteriologisch nicht spezialistisch gebildete Schlachthoftierarzt bald lernen und dem einsendenden Tierarzt mitteilen können, ob etwas gewachsen ist und besonders ob etwas Verdächtiges gewachsen ist. Meist wird dann der Einsender schon ein Urteil fällen können, denn in sehr vielen Fällen werden die Tiere aus Not schlachtungen bei verdächtigen Befunden ohne weiteres zu vernichten sein. Wenn die Auskunft über das Vorliegen eines Verdachtes nicht genügt, wird das kleinere Institut die Platten einem größeren zur endgültigen Erledigung überweisen.

Edelmann.

Neseni, R.: Die Bestimmung des Chlorgehaltes der Milch. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 343/44.)

Unter den vielen Methoden zum Herausfinden von pathologischer Milch hat in letzter Zeit die Bestimmung des Chlorgehaltes oder der Chlorzuckerzahl eine gewisse Bedeutung erlangt. Es ist bekannt, daß bei den verschiedensten Erkrankungen des Euters eine Erhöhung des Chlorgehaltes der Milch sowie auch eine meist gleichlaufende Verminderung des Milchzuckergehaltes eintritt. Koestler nennt das Verhältnis des Chlorgehaltes zum Zuckergehalt $\times 100$ die Chlorzuckerzahl.

Neseni bedient sich zur Chlorbestimmung in der Milch des folgenden von Zaribnick y abgeänderten Verfahrens von v. Korány: In einem 300 ccm Erlenmeyerskolben aus Jenaerglas kommen nacheinander 10 ccm halogenfreie Salpetersäure, 5 ccm n/10-Silbernitratlösung und 5 ccm Milch. Der Jenaerkolben samt Inhalt wird auf einem Drahtnetz mit Asbesteinsatz zum Sieden erhitzt und in die kochende Flüssigkeit 10 proz. Kaliumpermanganatlösung in Anteilen von 1—2 ccm aus einer Glashahnbürette einfließen gelassen. Es empfiehlt sich, den weiteren Zulauf

der Permanganatlösung erst fortzusetzen, wenn die braune Farbe der Flüssigkeit wieder aufgeht. Zur völligen Oxydation benötigt man 20—25 ccm dieser Permanganatlösung; das Kochen wird unter häufigem Umschwenken des Kolbeninhaltes solange fortgesetzt, bis die Flüssigkeit klar ist und am Boden des Gefäßes das rein weiße Halogensilber sichtbar wird. Den Kolbeninhalt kühlt man durch Eingießen von 150 ccm dest. Wassers ab und kann nach Zugabe von 2 ccm gesättigter Eisenaunlösung mit n/10-Rhodanlösung in üblicher Weise den Chlorgehalt bestimmen.

Zur Vereinfachung dieses Verfahrens, das in der Praxis nicht ohne weiteres verwendbar ist, hat die Firma Funke in Berlin einen sog. „Chlorbestimmer“ herausgebracht, an dessen Bürette der Chlorgehalt der untersuchten Milch in mg berechnet abgelesen werden kann. Neseni hat mit diesem Apparat 16 Milchproben unter Anstellung von Kontrolluntersuchungen nach der oben angegebenen Permanganatmethode untersucht mit dem Ergebnis, daß das Funke'sche Verfahren mit der jetzigen Bürette des „Chlorbestimmers“ weder fürs Laboratorium noch für den praktischen oder den in der Nahrungsmittelkontrolle tätigen Tierarzt geeignet ist. Die Hauptforderung, die an das neue Modell zu stellen ist, ist die richtige Eichung der Bürette, damit die Schwankungen gegenüber anderen Methoden nicht mehr wie ± 2 mg ausmachen. Wenn das möglich ist, so wird sich nicht nur der praktische Tierarzt, sondern auch der in der Milchkontrolle tätige Tierarzt des Apparates mit Vorteil bedienen können. Edelmann.

Lerche: Eignet sich der Milchchlorprober „Chlorofunk“ zur Erkennung fehlerhafter und krankhaft veränderter Milch. (Zschr. für Fleisch- u. Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 374.)

Im Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer Niederschlesien in Breslau hat Lerche die Schulze'sche Methode zur Erkennung fehlerhafter oder krankhaft veränderter Milch mittels der Chlorgehaltsbestimmung auf volumetrischem Wege durch den von der Firma Funke & Co. in Berlin hergestellten Milchprober „Chlorofunk“ an 800 Milchproben, die aus Rinderbeständen mit Mastitis stammten, nachgeprüft. Das Ergebnis war, daß in dem Chlorofunk ein brauchbares Verfahren für die Diagnostizierung der Rindermastitis nicht erblickt werden kann. Die Fehlergebnisse schwanken zwischen 21 und 61,5 Prozent. Wir sind daher bei der Ermittlung von euterkranken Kühen nach wie vor auf die klinische Untersuchung des Euters und auf die bakteriologische Untersuchung der Milch angewiesen.

Edelmann.

Hafemann: Dürfen die aus den Einnahmen der Schlachthöfe und Schlacht- und Viehhöfe erzielten Überschüsse anderen städtischen Haushaltsposten zugeführt werden? (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 333/35.)

Nachdem verschiedene Städte zu dem Mittel gegriffen haben, die in den Schlacht- und Viehhöfen erzielten Betriebsüberschüsse zum Ausgleich anderer Haushaltsposten zu verwenden, erörtert Hafemann die rechtliche Seite eines solchen Vorgehens. In Preußen können nach den Vorschriften in § 11 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Novelle vom 26. August 1921 (G.S. 495) für die Schlachthofbenutzung Gebühren bis zu einer solchen Höhe erhoben werden, daß durch ihr jährliches Aufkommen die Kosten der Unterhaltung der Anlage und des Betriebes und ein wirtschaftlich angemessener Beitrag zur Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals und der etwa gezahlten Entschädigungssummen sowie zur Erneuerung vorhandener Anlagen gedeckt werden. Hieraus geht klar hervor, daß alle Gebühren, die im Schlachthof zur Erhebung kommen, nur zu Zwecken des Schlachthofes Verwendung finden dürfen. Dementsprechend hat auch der Regierungspräsident von Aachen auf eine Beschwerde der Aachener Metzgerschaft entschieden. Für die Bewirtschaftung der Schlachthöfe liegen also die Verhältnisse klar. Hinsichtlich der Viehhöfe ist zu

berücksichtigen, daß der Viehhof gegenüber dem Schlachthof als eine durchaus selbständige Anlage zu betrachten ist, die höchstens im mittelbaren, losen Zusammenhang mit ihm steht; denn Schlachthöfe bestehen selbständig ohne Viehhöfe und Viehhöfe selbständig ohne Schlachthöfe. Deshalb steht beim Viehhof den Städten Freiheit sowohl in der Höhe wie in der Verwendung der Gebühren ohne gesetzliche Beschränkung zu.

Zusammenfassend ergibt sich:

1. Es ist laut Schlachthofgesetz in Preußen und den meisten anderen deutschen Ländern unzulässig, Überschüsse aus den Schlachthofgebühren anderen städtischen Verwaltungsstellen zum Ausgleich ihrer Haushaltspläne usw. zu überweisen. Überschüsse des einen Jahres sind vielmehr dem Schlachthofhaushaltsplan des nächsten Jahres vorzuschreiben.

2. Viehhöfe sind nicht als „integrierende Bestandteile vorhandener Schlachthöfe“ im Sinne des Schlachthofgesetzes zu betrachten. Ihre Bewirtschaftung, Gebührenerhebung und Gebührenverwendung ist nicht an die Bestimmung des Schlachthofgesetzes gebunden, sondern unterliegt allein der Beschlußfassung der städtischen Körperschaften.

Edelmann.

Rosenberg, R.: Eine Methode der präzipitatorischen Eiweißdifferenzierung von stark gekochtem Fleisch.

(Aus der Bakteriologischen Abteilung — Serolog. Laboratorium — des Reichsgesundheitsamtes, Berlin.) (C. f. B., I. Abt., Orig., Bd. 107, S. 448—459.)

Bekanntlich verfaßt die Uhlenhuth'sche Präzipitationsmethode bei Eiweißpräparaten, die über 70 Grad erhitzt sind, fast vollkommen. Verf. hat nun ein Verfahren ausgearbeitet, das auch bei stark gekochtem Fleisch brauchbare Resultate ergibt. Die Herstellung des Extraktes erfolgte in der Weise, daß das zerkleinerte Fleischprodukt nach möglichst vollständiger Entfernung des Fettes im Verhältnis von 1:5 bis 1:7 mit physiologischer Kochsalzlösung versetzt, in ein 50 ccm fassendes Reagenzglas gebracht und sodann in ein Wasserbad gestellt wird, das allmählich zum Sieden gebracht und mindestens 10 Minuten bei dieser Temperatur gehalten wird. Nach Abkühlung im Eischrank Filtration durch eine dünne Schicht Asbest. Der so erzielte klare Extrakt zeigt beim Schütteln starke Schaumbildung. Bei diesen Kocheiweißextrakten fällt die Kochprobe mit Salpetersäure negativ aus, ein Beweis, daß kein natives Eiweiß mehr darin enthalten ist. Der Nachweis von Eiweiß gelang jedoch mit einer Reihe anderer chemischer Reaktionen.

Das Antigen zur Gewinnung des spezifischen Serums wird folgendermaßen hergestellt: Das Rind- bzw. Schweinefleisch wird nach Entfernung des Fettes in der Maschine zerkleinert, mehrmals mit physiologischer Kochsalzlösung ausgelaugt und schließlich mit Kochsalzlösung 1:10 versetzt. Nach 48stündigem Stehen im Eischrank Filtration des Auszuges durch Watte. Verdünnen des Filtrates zu gleichen Teilen mit Aqu. dest. und Hinzufügen von ein Zehntel des Volums des Auszuges gesättigte Kochsalzlösung nebst einigen Tropfen 1prozentiger Essigsäure. Erhitzen dieser Lösung 30 Minuten lang im siedenden Wasserbad. Abfiltrieren des entstandenen Koagulums mit gewöhnlichem Filtrierpapier und Trocknen des Rückstandes, der in Kügelchen geformt und unter Toluol aufbewahrt wird. 0,05 Gramm von dieser Substanz wird mit 2 ccm Kochsalzlösung zu einer Emulsion verarbeitet, die zur Immunisierung von Kaninchen benutzt wird.

Auf Grund zahlreicher praktischer Versuche gelangt Verf. zu dem Ergebnis, daß mit der vorliegenden Methode die Arteiweißdiagnose auch noch bei stark gekochtem Eiweiß möglich ist. Das Eiweiß enthält eine thermostabile Substanz, die beim Erhitzen frei wird und in Lösung geht. Diese Substanz ist schon in einem einfachen kalten Auszug eines erhitzten Eiweißes nachweisbar. Man erhält jedoch mit Kochextrakten, deren Herstellung oben angegeben

wurde, ausgeprägtere Präzipitationsringe wie mit kalten Auszügen, weshalb es sich empfiehlt, zur Diagnose stark erhitzter Fleischpräparate Kochextrakte zu verwenden. Außerdem ist deren Herstellung einfacher und sie sind meist von klarer Beschaffenheit.

Carl.

Schulze: **Fischige Schweine.** (Aus d. Laboratorium d. „Erste Deutsche Stock- und Klippfischwerke G. m. b. H.“, Wesermünde.-G.) (T. R. 1928, S. 210.)

Bei dem ständigen Bedarf an Fischmehl kam es bald zu Auswüchsen und alles, was nur im geringsten mit Fisch und Fischabfällen aus Handel und Industrie im Zusammenhang gebracht werden konnte, segelte unter dem Namen Fischmehl und hat viel zur Miskreditierung der wertvollen Verfütterung von einwandfreiem Fischmehl beigetragen. Es sind zu unterscheiden die Verfütterung von: 1. Fischmehl, 2. Heringsmehl, 3. frischen Fischen, 4. Rückständen oder Produkten aus der Fischindustrie, a) Leberrückstände, b) Tran. Verf. schildert die Gewinnung des Fisch- und Heringsmehles, ihren Gehalt an Eiweiß, phosphorsaurem Kalk, Fett und Salz, der nach den Fangergebnissen der für die Fischmehlgewinnung in Frage kommenden Fischarten in den verschiedenen Jahreszeiten stark schwanken kann. Dann weist er auf die großen Gefahren hin, die der Schweinemast durch die Verfütterung frischer Fischabfälle erwachsen, die nicht nur darin bestehen, daß das Fettgewebe einen fischigen und tranigen Geruch und Geschmack annimmt, sondern auch in Gesundheitschädigungen der Tiere durch die Fäulnisgifte, welche sich in den meist verdorbenen Abfällen gebildet haben. Hinzu kommt noch, daß das wegen seines Gehaltes an phosphorsaurem Kalk wertvolle Knochengerüst hier nicht zur Verfütterung kommt. Um Handel und Fleischverkehr zu schützen, müßte der Fehler „Fischige Schweine“ unter die Gewährsmängel aufgenommen werden. Bei regelrechter Fleischbeschau wird solches Fleisch unter allen Umständen beanstandet; Schwierigkeiten ergeben sich aber, wenn nach Verlauf von mehreren Wochen Schinken und Speck eines vor Monaten gekauften Schweines sich als fischig erweisen. Daher sieht Verf. eine wertvolle Handhabe zur Beseitigung dieser Übelstände in einer Ausdehnung des Abdeckergesetzes auf die Fischabfälle und Zuführung derselben nach amtlicher Kontrolle unterstehenden Fischmehlfabriken. Bis zu einer derartigen Regelung empfiehlt Verf. nur Fischmehl zu verfüttern, das unter eingetragener Handelsmarke in Verkehr gebracht wird und dem eine Angabe seines Gehaltes beigegeben ist. Verf. weist an Hand eigener und der Erfahrungen anderer darauf hin, daß Schweine ohne Schaden für Geruch und Geschmack des Fleisches bis zur Schlachtung mit einem Fischmehl gefüttert werden können, daß 50 bis 60 Prozent Eiweiß, 18 bis 25 Prozent phosphorsauren Kalk, 3 bis 7 Prozent Fett und bis zu 5 Prozent Salz enthält.

K. H. Meyer.

Skar, O.: **Nachweis und Bekämpfung der Euterentzündung beim Rinde.** (Aus dem Laboratorium für Nahrungsmittelkontrolle des Gesundheitsamtes in Oslo. Abteilung des Stadttierarztes.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 34, Heft 1, S. 1.)

Skar gibt in vorliegender Arbeit eine ausführliche Schilderung der in Oslo durchgeführten Milchkontrolle. Sie umfaßt: 1. Den Nachweis von Mastitis-Streptokokken und Entzündungsprodukten in der Mischmilch der Molkereien und der Lieferanten, die die Milch direkt an die Stadt liefern und die darauf folgende genauere Untersuchung in den betreffenden Beständen.

2. Eine regelmäßige Untersuchung von Proben der Milch sämtlicher Produzenten, die genommen werden, ehe diese in den außerhalb der Stadt gelegenen Meiereien und Sammelstationen zusammengemischt wird; anschließend daran eine eingehende Kontrolle jener Bestände, in welchen Euterentzündung nachgewiesen wurde.

3. Eine systematische Kontrolle der Bestände, deren

Milch unter Garantiebezeichnung verkauft wird, und fäktlicher Bestände in jenen Gegenden, wo die Verbreitung des Leidens dies notwendig macht.

4. Eine Unterweisung der Viehbesitzer und des Stallpersonals darüber, warum die Euterleiden nachgewiesen und durch prophylaktische Maßregeln bekämpft werden müssen und wie dies geschehen kann.

Die Färbung der Ausstrichpräparate erfolgt nach einer von Skar ausgearbeiteten Methodik mit Methylviolett B, die eine Überfärbung der Streptokokken verhindert. Eingehend werden die degenerativen Veränderungen der Mastitisstreptokokken beschrieben. Hinsichtlich der Häufigkeit der Streptokokkenmastitis stellt Verf. fest, daß die meisten, insbesondere die kleineren Bestände, von dem Leiden frei sind, in vielen ist aber ein großer Teil der Tiere erkrankt. Am weitesten ist die Krankheit in jenen Beständen verbreitet, wo ständig Kühe zugekauft werden. Aber wenn die Krankheit auch selbst in diesen letzteren bei weitem nicht so verbreitet ist wie bei einer großen Reihe von Städten anderer Kulturländer, so sind nicht selten 10 bis 30 Prozent oder mehr der Tiere, in einem Fall einmal sogar 70 Prozent, an chronischer Streptokokkenmastitis erkrankt gewesen. Im Verhältnis zu den anderen Mastitis erregenden Bakterien überwiegen die Streptokokken durchaus. Von den systematisch klinisch und mikroskopisch untersuchten Fällen (einzelne Euterviertel) sind über 99% durch Streptokokken, nur sehr seltene durch Bact. coli, Bact. pyogenes oder Staphylokokken hervorgerufen. Wenn die praktizierenden Tierärzte relativ häufig Mastitiden antreffen, die durch diese Bakterien verursacht sind, so hat dies seinen Grund darin, daß sie eben besonders dann geholt werden, wenn das Leiden von deutlich gestörtem Allgemeinbefinden begleitet ist, was bei der Streptokokkenmastitis selten der Fall ist. Zum Schluß hebt Skar noch hervor, daß die beschriebene scharfe, aber verständige Kontrolle, die nur die teilweise Zurückhaltung der Milch verlangt, in Oslo selbst die Grundlage für das gegenseitige Vertrauen und die gute Zusammenarbeit gebildet hat, welche sich zwischen den Produzenten und den Kontrollbeamten entwickelt hat. Daß diese besteht, ist eine Hauptbedingung dafür, daß die Arbeit im Laufe der Zeit zum Ziele führen kann, eine Milch von der Qualität zu schaffen, daß sie in der Regel roh genossen werden kann.

Ziegler.

Standesangelegenheiten.

Interne Verhandlungen der Leiter der Bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammern mit dem Vertreter der Preussischen Hauptlandwirtschaftskammer am 10. Juli 1928.

Niederschrift.

Die Verhandlungen fanden von 9—13 Uhr unter dem Vorsitz des Oberlandwirtschafts- und Ökonomierats Keiser im Sitzungszimmer des Bakteriologischen Instituts in Breslau statt. Außer dem Genannten nahmen teil: Eickmann, Karsten, Kiessig, Pröscholdt, Raebiger, Schumann, Hobstetter, Lührs, Wolters, Rautmann, Krage, Lentz, Weichlein, Lerche, Grasnick.

Der Verbandsvorsitzende begrüßt Herrn Ökonomierat Keiser und beglückwünscht ihn anlässlich seiner Ernennung zum Ehrenbürger der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Nach Dankesworten des letzteren wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.

1. Die vorjährigen Beschlüsse und ihre Ausführung.

a) Die Mitwirkung der Veterinärärzte am Tuberkulose-Tilgungsverfahren wird gestreift.

b) Anträge auf Beihilfen für Fortbildungskurse sind von den einzelnen Kammern im verflossenen Jahre nicht gestellt worden, da allgemein angenommen wurde, daß dieses durch die Hauptlandwirtschaftskammer geschehen würde. Hierzu berichtet Oberlandwirtschaftsrat Keiser, daß der Antrag von der Hauptlandwirtschaftskammer an das

Ministerium generell gestellt worden sei, für solche Kurse Mittel zur Verfügung zu stellen. Diesem Antrag sei stattgegeben worden, wenn die zur Verfügung gestellten Mittel auch nicht sehr groß seien. Die Anträge für die Bereitstellung von Mitteln müssen allerdings von den einzelnen Landwirtschaftskammern ausgehen. Diese können zuerst an die Hauptlandwirtschaftskammer zur Befürwortung eingereicht werden. Dr. Krage berichtet, daß in Königsberg verschiedene Kurse ohne staatliche Beihilfe abgehalten worden seien. Das Institut habe die Absicht, in jedem Jahre 1—2 Kurse zu veranstalten. Dr. Kiessig teilt mit, daß das Kieler Institut in gleicher Weise tätig war. Das Institut in Halle ist in den letzten Jahren dazu übergegangen, Einzelkurse in der Weise abzuhalten, daß die Fachtierärzte des Instituts mit den praktizierenden Tierärzten zur Einführung in das Tuberkulose-Tilgungs- und Sterilitätsbekämpfungsverfahren gemeinsame Unterfuchungen ausführen. Ebenso sind vom Breslauer Institut Kurse abgehalten worden.

c) Zu dem Punkt: Bestimmungen über die Tierkadaverbehandlung bei der Feststellung von Tierkrankheiten durch die Bakteriologischen Institute verliest Oberlandwirtschaftsrat Keiser ein Rundschreiben des Landwirtschaftsministeriums vom 31. März 1928:

„Nach den Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Befestigung von Tierkadavern vom 28. März 1912 (R.G.Bl. S. 230) ist die Verwendung von Kadavern und Kadaverteilen zu wissenschaftlichen Zwecken unter den im § 4 Abs. 2—4 der Anlage C zu den Ausführungsbestimmungen zum Viehseuchengesetz bezeichneten Voraussetzungen und Bedingungen zulässig. Danach dürfen auch nicht beamtete Tierärzte Kadaverteile zur Untersuchung an staatlichen wissenschaftlichen Instituten oder anderen geeigneten Stellen entnehmen, sie müssen aber von jeder derartigen Entnahme der Ortspolizeibehörde Anzeige machen. Sofern es sich um kleine Tiere handelt, dürfen auch ganze Kadaver eingefandt werden. Die Versendung kleiner Tierkadaver an die Bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammern ist also nach den bestehenden Vorschriften grundsätzlich zulässig. Soweit Abdeckereien Anspruch auf Ablieferung solcher Kadaver haben, wird jedoch eine entsprechende Vereinbarung mit ihnen herbeigeführt werden müssen, damit Streitigkeiten wegen Nichtablieferung von Kadavern vermieden werden.“

Den Bakteriologischen Instituten der Landwirtschaftskammern ist von diesem Schreiben Kenntnis gegeben worden, damit sie ohne lange Verhandlungen in den Besitz dieser Kadaver kommen sollen. Nötigenfalls ist ein Abkommen zwischen der Landwirtschaftskammer und den Abdeckereien zu treffen.

Dr. Pröscholdt hält auch nach diesem Bescheid die Schwierigkeiten nicht für behoben, da das besagte Abkommen mit den Abdeckereien nicht immer zustande kommt.

d) Zu der Frage der öffentlich-rechtlichen Stellung der Bakteriologischen Institute berichtet Dr. Eickmann, daß gemäß § 21 L.M.G. das Bakteriologische Laboratorium der Schlachthöfe eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist. Demzufolge hat der Regierungspräsident von Köln vier Institute, die bakteriologische Fleischschau ausführen, darunter das Institut der Kammer in Bonn, zu öffentlich-rechtlichen Anstalten erklärt. Auf Veranlassung von Prof. Dr. Raebiger hat die Rechtschutzabteilung der Kammer in Halle eine Anfrage in dieser Angelegenheit an den Regierungspräsidenten in Merseburg gerichtet, der darauf geantwortet hat, daß die Landwirtschaftskammer und deren Bakteriologisches Institut eine öffentlich-rechtliche Korporation ist, und daß das Bakteriologische Institut zu amtlichen Untersuchungen ausdrücklich zugelassen wird. Auf Vorschlag von Oberlandwirtschaftsrat Keiser soll diese Frage durch den Justitiar der Hauptlandwirtschaftskammer unter Berücksichtigung der Halle'schen und Bonner Unterlagen geprüft werden. Prof. Dr. Raebiger und Dr. Eickmann lassen ihre Unterlagen hierfür umgehend der Hauptlandwirtschaftskammer zugehen.

2. Das Referat von Dr. Rautmann: „Amtliche oder freiwillige Bekämpfung der ansteckenden Euterentzündungen der Kühe?“ wird auf Vorschlag von Prof. Raebiger für die Hauptversammlung am Nachmittag zurückgestellt.

3. Die Berliner Gesellschaft zur Erforschung der Euterkrankheiten der Rinder.

Berichterstatter: Dr. Lentz. Das Referat wird an anderer Stelle der Wochenschrift veröffentlicht. Es wird von der Gründung der Ge-

gesellschaft Kenntnis genommen, sonst aber an der bestehenden Organisation der Zentrale zur Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten in Hannover festgehalten. An der Diskussion beteiligen sich Pröscholdt, Raebiger, Karsten und Keiser.

4. Über die Durchführung der Tuberkulose-Schutzimpfungsversuche nach Selter und Knauer unter Berücksichtigung neuerer Arbeiten über die Tuberkulose-Schutzimpfung.

Berichtersteller: Dr. Eickmann. Der Vortrag wird an besonderer Stelle in dieser Wochenschrift abgedruckt.

Pröscholdt stimmt Eickmann zu, daß die Versuche durchgeführt werden müssen. Es wäre wertvoll zu wissen, welche Institute Versuche machen, in wievielen Herden sie durchgeführt werden und wieviele Tiere geimpft worden sind. Es ist dringend notwendig, diese Impfversuche in Verbindung mit dem Tuberkulose-Tilgungsverfahren auszuführen, weil uns sonst von Interessenten der Vorwurf gemacht werden kann, daß wir an dem alten Ostertag'schen Verfahren festhalten und für Neuerungen nicht zugänglich sind. — In Pommern wurden die Impfungen in sechs Beständen durchgeführt. Die Vorprüfung der Kälber mit Tuberkulin fiel erstaunlich günstig aus. In drei Beständen reagierte kein einziges Kalb, in einem Bestande reagierten sechs Tiere und in einem zwei Tiere. Bisher wurden 276 Kälber geimpft, 63 Kälber dienen als Kontrolltiere. Eine Nachprüfung, ob durch die Impfung eine Infektion und damit Bildung von Abwehrkörpern stattgefunden hat, wurde bisher bei 180 Tieren vorgenommen. Bis auf zwei Kälber reagierten alle positiv. Von den 63 Kontrolltieren haben bei der ersten Tuberkulinprüfung zehn stark und zwei schwach reagiert. Unabhängig davon kamen zwei Kälber zur Schlachtung, das eine war ein Kontrollkalb, das andere ein geimpftes; das geimpfte Kalb hatte Tuberkulose der Kniefaltendrüsen. Nach der Impfung ist fast allgemein eine starke Reaktion an der Injektionsstelle aufgetreten.

Dr. Krage: Reaktionen nach der Impfung sind in Ostpreußen nicht beobachtet worden.

Oberlandwirtschaftsrat Keiser empfiehlt, die Versuche nach dem Vorschlage Dr. Eickmanns fortzuführen. Die Impfanordnung scheint sich bewährt zu haben. Später, wenn diese Versuche zu einem positiven Ergebnis geführt haben, wird die Versammlung noch einmal darauf zurückkommen.

5. Erlaß von Polizeiverordnungen über die Anpreisung und den Verkauf wertloser Geheimmittel.

Referent: Dr. Karsten.

Der Verkauf von Geheimmitteln ist reichsgesetzlich geregelt, doch entbehrt in Preußen ein allgemeines Verbot der Ankündigung von Heilmitteln gegen Tierkrankheiten der Rechtsgrundlage. Durch Polizeiverordnungen ist es aber möglich, die Ankündigung von Mitteln, die zur Verhütung oder Heilung „bestimmter, besonders gefährlicher Tierkrankheiten“ dienen, zu verbieten. Redner vermißt diese Polizeiverordnungen und ein einheitliches Vorgehen in ganz Preußen.

Dr. Grasnick weist darauf hin, daß das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten durch Erlaß vom 30. September 1927, V. 8386, sämtliche Oberpräsidenten um Bekanntgabe derartiger Polizeiverordnungen ersucht und einen bestimmten Wortlaut dafür empfohlen hat. Diefem Ersuchen sind bereits mehrere Provinzen, so Niederschlesien, Ostpreußen, die Grenzmark Posen-Westpreußen, Oberschlesien, Westfalen und Brandenburg nachgekommen. Einzelheiten darüber befinden sich in den Mitteilungen der Tierärztlichen Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums, Jahrgang 1928, Nummer 7.

6. Der Vertrieb von Maul- und Klauenfeucheferum bei Markt- und Ausstellungsimpfungen.

Dr. Eickmann referiert über die Abgabe von Maul- und Klauenfeucheferum bei Ringimpfungen und Ausstellungen.

7. Stellungnahme zur Emphyton-Impfung.

Referent: Dr. Weichlein.

Die Tierärzte sind hinreichend unterrichtet, daß die Emphyton-Impfung bei weitem nicht an die Simultan-Impfung heranreicht. Außerdem kostet ein Ferkel bei Simultan-Impfung nur 13 Pfg., bei Emphyton-Impfung 24 Pfg. Es wird folgender Beschluß gefaßt:

Die Versammlung steht auf dem Standpunkt, daß durch die Berichte aus der Praxis einwandfrei die Überlegenheit der Simultan-Impfung gegenüber der Emphyton-Impfung bewiesen ist. Sie erblickt in

dem schon seit längerer Zeit in den Zeitschriften herrschenden Schweigen über das Emphyton ein Zeichen dafür, daß die Emphyton-Impfung kein allgemeines Interesse mehr hat. Aus diesem Grunde soll auch von einer Veröffentlichung des Referates über die Emphyton-Impfung abgesehen werden.

8. Anträge und Wünsche.

Dr. Weichlein bittet die Versammlung um folgende Beschlußfassung:

Die durch die staatliche Prüfungsvorschrift bedingte Verwendbarkeitsdauer für Rotlaufferum auf ein Jahr wirkt in der Praxis sowohl wie in den Serumniederlagen der Provinz recht erschwerend. Die Versammlung steht auf dem Standpunkt, daß durch eine Verlängerung der Verwendbarkeitsdauer auf zwei Jahre, die durch die staatliche Forderung der Keimfreiheit für Rotlaufferum wissenschaftlich vertretbar erscheint, der Absatz des Rotlaufferums erleichtert wird, und beschließt, ein dahingehendes Gefuch an das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten zu richten.

Oberlandwirtschaftsrat Keiser: Es bestehen keine Bedenken gegen diesen Antrag.

Mit der Prenzlauer Rotlaufimpfanstalt sind vertraglich nicht gebunden die Institute in Jena, Oldenburg und Königsberg.

Im Anschluß hieran fand eine Führung durch das Bakteriologische Institut durch Dr. Schumann statt, der in den einzelnen Räumen Erklärungen über Einrichtung, Zweck und Betrieb abgab. Im diagnostischen Laboratorium referierte Dr. Müller über die vom Breslauer Institut herausgegebenen Richtlinien für die Impfung bei Kälberkrankheiten. Bei Ruhr (Colibazilliose) wurden mit der Vakzinierung der hochtragenden Kühe zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. Sind die Kühe nicht vorbehandelt gewesen, so werden die neugeborenen Kälber simultan mit Serum und Vakzine geimpft. Auch bei Paratyphus wurde die Erkrankung durch Impfung der Kälber mit Vakzine und Serum alsbald zum Stillstand gebracht. Bei Diplokokken-Infektionen empfiehlt sich lediglich die Serumimpfung.

Im nächsten Laboratorium demonstrierte Dr. Lerche die pathologisch-anatomischen Veränderungen bei der weißen Kükenruhr. Er zeigte an mehreren recht guten Präparaten von Hühnern und Küken die Erkrankungen am Dotter, Blinddarm, Magen, Leber, Herz und Hoden.

Im serologischen Laboratorium gab Dr. Lerche eine kurze Übersicht über die hier übliche Züchtung von Abortus-Bang-Kulturen. Beim Plattenverfahren werden Drigalski-Platten verwendet, die im Weckglas drei Tage lang im Brutschrank verbleiben. Für die Impfstoffherstellung werden Traubenzucker-Glyzerinbouillon bzw. Traubenzucker-Schrägar verwendet.

Im histologischen Laboratorium gab Dr. Pallaske an Hand von Präparaten einen kurzen Überblick über die Einbettungsmethoden. Als große Seltenheit wurde ein 14 Pfund schweres Karzinom des Ovariums einer Kuh gezeigt.

Im Tuberkulose-Laboratorium wurde zunächst auf die Vorzüge des binokularen Mikroskops aufmerksam gemacht. Dr. Grasnick referierte darauf über die Erfahrungen mit der Anreicherungs-methode nach Scharr-Lentz. Diese Methode hat die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Die tatsächliche Ausbeute betrug nur 11 Prozent, während 39 Prozent der auch nach der Anreicherung noch negativen Proben durch den Tierversuch positiv wurden. Da auch 3,9 Prozent Fehlresultate zu verzeichnen waren, die allerdings wohl nicht zu Lasten der Methode gehen, kann diese keineswegs den Tierversuch ersetzen.

Im Laboratorium für Milchuntersuchungen referierte Dr. Pallaske über die Methoden der Keimzählung, nämlich der direkten Zählung mit dem Leitz'schen Okularmikrometer und dem Plattenverfahren. Die Differenzierung der Streptokokken wird nach einem von Klimmer und Haupt aufgestellten Schema vorgenommen.

Im Tierärztezimmer wurde von Dr. Schumann an Hand der dort hängenden Übersichtskarten die Verbreitung des Tuberkulose- und Sterilitäts-Bekämpfungsverfahrens erklärt.

Die Sammlung, die infolge der im Jahre 1922 erfolgten Trennung des Bakteriologischen Instituts vom Veterinärinstitut der Universität noch sehr jung, aber schon sehr umfangreich ist, enthält eine große Zahl demonstrativer Präparate. Besonderes Interesse erweckten die Prä-

parate über Sterilität, die von Dr. Schumann und die Sammlung über Kükenruhr, die von Dr. Lerche erläutert wurden.

Bei der Befichtigung des neu errichteten Versuchstalles referierte Dr. Schumann über die Wirkung lebender Abortuskulturen, mit denen unverdächtige, trüchtige Tiere künstlich infiziert waren. Die Versuchskühe stammten aus Beständen, in denen niemals feuchthaftes Verkalben geherrscht hatte. Die Untersuchung der von sämtlichen Kühen der betreffenden Bestände entnommenen Blutproben hatte außerdem ein negatives Ergebnis. Der Versuchskuh I wurden nach dem vierten Trächtigkeitsmonat im Abstand von zehn Tagen zweimal je 10 ccm der für Impfzwecke gebräuchlichen Abortuskultur injiziert. Am Tage nach jeder Injektion trat Fieber bis 41,6 Grad auf. Der Agglutinationstiter stieg 7 Tage nach der ersten Injektion auf 400 und im weiteren Verlaufe der Infektion bis auf 6400. Die Kuh hat dann zehn Wochen nach der Injektion, also im 7. Monat, verkalbt.

Es konnte an der Hand eines einwandfreien Beobachtungsmaterials festgestellt werden, daß die subkutane mit Kultur infizierte Kuh I zehn Wochen post infektionem abortierte, während die per os infizierte Kuh II wahrscheinlich austrägt. — Ferner wurde bei diesen Versuchen festgestellt, daß mit der Milch dieser infizierten Tiere Abortusbazillen nicht ausgeschieden wurden. — Das Blutbild und die Temperaturkurven ergaben interessante Aufschlüsse über das Verhalten der künstlichen Infektion. Ein genauer Bericht über diese Versuche wird später erstattet.

Nach der Befichtigung fand in der Schweizerei im nahegelegenen Scheitniger Park ein gemeinsames Mittagessen statt, das im kühlen Schatten grüner Bäume nach der anstrengenden Sitzung bei 35 Grad C vortrefflich mundete.

Der Vorsitzende: Oberlandwirtschaftsrat Keiser.

Der Schriftführer: Dr. Schumann.

Verein der Tierärzte des Reg.-Bezirks Wiesbaden.

75. Generalversammlung am 9. Juni 1928 in Frankfurt a. M.

Der Vors. eröffnet die Sitzung um 11 Uhr mit einer Begrüßung der Mitglieder und Gäste, insbesondere des Geheimrat Pfeiffer-Gießen. Anwesend sind 31 Mitglieder und 8 Gäste. Auf die in der Sitzung vom 9. Februar 1928 gefasste Resolution betreffs den Erlaß des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten betr. Kontrolle der Fleischbeschau hat der Vertreter im Tierärztekammer-Ausschuß in einem vertraulichen Schreiben geantwortet, welches der Vors. bekannt gibt. Die Vorstandswahl ergibt die fast einstimmige Wiederwahl des Vorstandes, welcher die Wahl annimmt. Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt. Geheimrat Pfeiffer: „Ostitis fibrosa bei Haustieren“. Vom pathologisch-anatomischen Standpunkt betrachtet, beruht die Rachitis und Osteomalazie auf Störungen des Knochenbaues, während es sich bei der Ostitis fibrosa um einen überstürzten Umbau des Knochens handelt. Der Vortragende erörtert das Vorkommen dieser Knochenkrankung beim Pferd, Ziege, Schwein und Hund unter Berücksichtigung der relativ spärlichen tierärztlichen Literatur, sowie seiner und seiner Schüler Arbeiten und entwirft auf Grund der klinischen, anatomischen und histologischen Veränderungen ein jeder Tiergattung eigentümliches Krankheitsbild. Den genannten Tiergattungen gemeinsam ist die Auftreibung und Erweichung des befallenen Knochens, so daß seine Trennung mit dem Messer erfolgen kann. Gemeinsam ist ferner die mehr oder weniger ausgeprägte Wucherung eines osteoblastenreichen osteoiden Gewebes um die Umwandlung des haematopoetischen und Fettmarks in Fasermark. Das osteoide Gewebe erliegt immer wieder den Angriffen zahlreicher Riesenzenellen, die stellenweise in solchen Mengen auftreten, daß sie ein Riesenzellenarkom vortäuschen. Nicht konstant entstehen in dem wuchernden Gewebe Blutungen mit nachfolgendem Blutpigmentansammlungen und Zysten. Letztere sind immer nur dort zu finden, wo Blutungen vorausgegangen sind. Bei ein bis zwei Jahre alten Pferden stellt die sog. schleimige Degeneration der Nasenmuschel eine Ostitis fibrosa mit allen vorher erwähnten Veränderungen dar: Es entwickeln sich hier Zysten, welche die ganz stark erweiterte kaudale Abteilung der Kieferhöhle ausfüllen und eine bedeutende Auftreibung des Gesichts hervorrufen, daneben ist schleimiger, nicht übelriechender Nasenausfluß vorhanden. Die Behandlung ist erfolgreich und besteht in der Exstirpation der erkrankten Nasenmuschel und der Zystenwände. Junge Hunde erkranken am Ober- und Unterkiefer mit unförmlicher Auftreibung der Kiefer, regelloser Verlagerung der

Zähne und multipler Zystenbildung, durch die die Nase verlegt und die Futteraufnahme zunehmend behindert wird. Seltener sind Radius und Ulna, Humerus und Femur betroffen. Die Erkrankung bei Hunden hat sich seither stets als unheilbar erwiesen. Junge Ziegen werden ebenfalls am Ober- und Unterkiefer von dem Leiden befallen. Die Kiefer erweichen, treiben auf, das Maul kann nicht mehr geschlossen werden, und die Futteraufnahme hört allmählich auf. Blutungen und Zysten sind nie beobachtet worden. Bei Schweinen erkranken unter dem Bilde der Schnüffelkrankheit öfters Tiere eines Wurfes, meist im Alter von 3—12 Monaten und zwar hauptsächlich an Ober- und Unterkiefer einchl. des Rüssels und harten Gaumens. Auch der Gang kann erschwert sein. Hinsichtlich des ätiologisch noch dunklen Leidens sind die Untersuchungen Scheunerts und seiner Mitarbeiter bemerkenswert, nach denen die Drüsen innerer Sekretion im Mittelpunkt der Erkrankung stehen. Die Diskussion wird eröffnet durch Dr. Westhues, nach dessen Meinung die Krankheit öfter vorkommt, als angenommen wird. Im vergangenen Jahre sind dem Reichsgesundheitsamt in Washington eine Reihe von Präparaten vorgelegt worden, die von Hunden stammten. Die Tiere zeigten klinisch völliges Unvermögen zu kauen. Die Präparate zeigten starke Auftreibungen am Unterkiefer, besonders am Unterkieferwinkel. Pathologisch-histologische Präparate gaben ohne weiteres Auskunft über die Natur der Krankheit, welche der tierärztlichen Fakultät noch unbekannt war. Befucher aus Amerika, denen das hiesige Material gezeigt wurde, erkannten jedoch sofort, daß die Krankheit auch in Amerika vorkommt. Geheimrat Olt hat einmal einen Hund mit dieser Erkrankung gesehen, welche ebenfalls im Kieferwinkel begann und später auf die Backenzähne überging. Die Krankheit schien vom Alveolarperiost auszugehen. Vielleicht erklärt sich daraus auch die Neigung zur Zystenbildung. Der Prozeß nimmt seine Entwicklung von den Zahnreihen nach der Medianebene zu. Der Flimmerbefatz an den Riesenzellen ist nicht spezifisch für diese Krankheit, sondern wird auch bei der Tuberkulose gesehen. Er ist mit Aktinomyzesrasen vergleichbar, nur viel feiner. Dieser Flimmerbefatz der Riesenzenellen an den Nagestellen wurde zuerst von Heidenhain beschrieben. Redner fragt noch, ob nicht eine gewisse Knochenbrüchigkeit an den übrigen Skeletteilen derartig erkrankter Pferde beobachtet wird, ob nicht insbesondere die beim Abwerfen auftretenden Wirbelbrüche darauf zurückzuführen sind. Redner kommt dann auf die sog. Moorgehörne und Moorgeweiche zu sprechen, welche in besonders nassen und kalkarmen Gegenden auftreten. Derartige Hörner sind unförmig dick, zeigen unregelmäßige Auswüchse und stehen nicht steil, sondern klappen um oder wachsen korkzieherförmig. Histologisch sieht man neben vielen Riesenzenellen eine starke Vaskularisation. Auch Rosenstock und Stirnbein sind außerordentlich porös. Die Bilder erinnern an Osteoporosis, doch ist zum Unterschied von der Ostitis fibrosa noch reichlich Knochengewebe vorhanden. Als Anfangserscheinung der Osteoporosis eine Anämie anzunehmen, ist nicht angängig, im Gegenteil verhindert ein anämischer Zustand das Entstehen der Osteoporosis. Erst wenn Hyperämie einsetzt, ist die Möglichkeit für die Entwicklung kalkfreien Gewebes gegeben. Olt hält das Vorliegen von endokrinen Störungen als ursprüngliches Moment für wahrscheinlich. Schon der Umstand, daß der Prozeß zwischen Molaren und Prämolaren einsetzt, weist darauf hin, daß er mit Wachstumsvorgängen in Beziehung steht. Geheimrat Pfeiffer: Scheunert hat in einem histologisch festgestellten Falle Ostitis fibrosa an den Röhrenknochen gefunden. Daß Tiere mit dieser Krankheit an Knochenbrüchigkeit leiden, ist daher wahrscheinlich. Dr. Keller schildert den klinischen Verlauf eines von ihm beobachteten und operierten Falles von Ostitis fibrosa bei einem sechsjährigen Pferde. Das Tier mußte, als der Prozeß auch auf die Prämolaren übergegangen war, wegen der Ausichtslosigkeit des Falles getötet werden. Geheimrat Pfeiffer: Ob es sich wirklich um Ostitis fibrosa gehandelt hat, läßt sich nur schwer beurteilen. Es fällt auf, daß der Prozeß auf die Prämolaren übergegangen ist, was sonst nicht der Fall ist. Die Krankheit beschränkt sich vielmehr auf Nasenmuschel, Oberkiefer und Stirnhöhle. Übrigens ist die Krankheit von Sand ebenfalls bei einem sechsjährigen Pferde beobachtet worden, das Tier soll aber als Fohlen bereits schnarchende Atemgeräusche gezeigt haben. Ob nach der Entfernung endokriner Drüsen bei Versuchstieren Ostitis fibrosa beobachtet worden ist, ist dem Redner nicht bekannt. Dr. Reil: Nach der Exstirpation gewisser Epithelkörper-

chen ist ein Bruch von Schneidezähnen bei Versuchstieren beobachtet worden, dagegen keine Erscheinungen von Ostitis fibrosa.

Es folgt eine Ausprache über die für den Kammerbezirk festzulegende und dem Herrn Minister einzureichende Gebührentaxe. Die ernannte Kommission hat sich dahin entschieden, für den Bezirk Wiesbaden, für welchen eine Gebührenordnung nicht bestanden hat, die Taxe derjenigen von Hessen, Hessen-Kassel und Hannover anzugleichen. Die Kommission schlägt vor, 1,20 RM. für den Doppelkilometer zu nehmen. Nach längerer Debatte beantragt Dr. Berdel die Kilometergelder auf 1,20 RM. festzulegen. Der Antrag findet einstimmige Annahme.

Auf Antrag Dr. Grawert beschließt die Versammlung den Beitritt des Vereins als korporatives Mitglied in die Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums mit einem Jahresbeitrag von 50 RM. Der Vors. gibt bekannt, daß in Aussicht genommen ist, gelegentlich der nächsten Tagung der tierärztlichen Gesellschaft für Südwestdeutschland einen Fortbildungskursus abzuhalten. Der Kursus findet wahrscheinlich im November statt. Mit dem Vorschlag der Gruppe Kassel, betr. Verteilung der für die Tierärztekammer zu wählenden Vertreter auf die drei Berufsgruppen, ist die Versammlung einverstanden. Dr. Berdel: Bei Einrichtung der Fleischbeschaugesetzgebung legte Preußen den Grundsatz von der Freizügigkeit des tierärztlich untersuchten Fleisches fest, d. h. tierärztlich untersuchtes Fleisch, welches in andere Gemeinden eingeführt wird, soll von Nachuntersuchungen befreit sein. Andere Länder sind nicht so tolerant gewesen, beispielsweise wird in Bayern und Hessen auch tierärztlich untersuchtes Fleisch nachuntersucht. In Offenbach finden diese Nachuntersuchungen sogar von einem Laien statt, ein Zustand, der in Hessen zulässig und ausdrücklich genehmigt sein soll. Redner hält es für notwendig, daß die Versammlung dazu Stellung nimmt, indem sie einen Vereinsbeschluß formuliert und zum Ausdruck bringt, daß sie es des tierärztlichen Standes für unwürdig hält, wenn tierärztlich untersuchtes Fleisch von einem Laien nachuntersucht wird. Es ist dann vielleicht zu hoffen, daß die Zulässigkeit der Nachuntersuchungen durch Laien abgeschafft wird. Dr. Schipp hält die Frage von außerordentlicher und grundsätzlicher Bedeutung. Es ist deshalb nicht zweckmäßig, wenn ein einzelner Verein einen Beschluß in diesem Sinne faßt. Richtig wäre es, wenn Tierärztekammer oder Ministerium darüber befinden würden. Dr. Berdel formuliert darauf folgenden Antrag: „Der Verein steht auf dem Standpunkt, daß die Nachuntersuchung tierärztlich untersuchten Fleisches durch einen Laienbefahauer geeignet ist, das Ansehen des tierärztlichen Standes zu schädigen.“ Dr. Sahrer beantragt zu beschließen: „Wir erheben Einspruch gegen die Nachuntersuchung tierärztlich untersuchten Fleisches durch einen Laien.“ Der Antrag wird angenommen. Dr. Kupplmayr hält es für richtig den Sachverhalt dem Herrn Regierungspräsidenten mitzuteilen und ihn zu bitten, Abhilfe zu schaffen. Die Versammlung beschließt einstimmig in diesem Sinne.

Dr. Berdel, Vors. Dr. Dornis, Schriftf.

Verschiedene Mitteilungen.

Anton Stoss.

Zum 24. September 1928, dem 70. Geburtstage.

Am 24. September feiert der Münchener Anatom Anton Stoss seinen 70. Geburtstag. Das ist ein würdiger Anlaß, dem bescheidenen, lebenswürdigen Menschen und dem unermüdlichen akademischen Lehrer herzlichen Glückwunsch zum Ausdruck zu bringen. Voll rüstig kann der Jubilar den Tag begehen im lieben Kreise seiner Familie, beglückwünscht von seiner Fakultät, von zahlreichen dankbaren Schülern, von Kollegen aller tierärztlichen Lehranstalten.

Der äußere Lebensgang des Gefeierten ist folgender: Geboren am 24. September 1858 in München erlangte Stoss am 28. März 1881 die tierärztliche Approbation daselbst. Er übernahm sofort die Stelle eines Assistenten für pathologische Anatomie an der Münchener Schule, um im September 1882 zum ersten klinischen Assistenten aufzurücken. Nach dem Tode seines Lehrers in Anatomie, Franck, und nach Berufung Bonnets auf diesen Lehrstuhl erhielt Stoss die Stelle des Prosektors; das war am 6. November 1884. Im April 1889 wurde durch Weggang Bonnets nach Würzburg die Professur für Anatomie frei.

Bis zur abermaligen Befetzung des Lehrstuhls durch Rückert im November 1890 lehrte Stoss stellvertretungsweise diese Disziplin. Als dann im Juli 1897 Rückert zur medizinischen Fakultät München zurückging, wurde Stoss die Veterinär-anatomie übertragen, nachdem er im Februar 1892 in Erlangen den philosophischen Doktorhut sich erworben hatte. Diese Professur für Anatomie, Histologie und Embryologie war zunächst eine außerordentliche; sie wurde am 1. April 1908 in das Ordinariat umgewandelt. Mehr als 30 Jahre hat der Jubilar treu die Pflichten seines hohen Amtes erfüllt. Er hat daneben aber, seit Juli 1895 bis heute den Lehrstuhl für Anatomie und Entwicklungsgeschichte an der landwirtschaftlichen Abteilung der Technischen Hochschule München inne und bis 1923 überdies Unterricht in Tieranatomie für Künstler an der Akademie der bildenden Künste in München gegeben. Eine große Zahl von Schülern aus drei Berufsständen hat Stoss in dieser langen Zeit herangebildet. Von den Behörden wurde diese erfolgreiche Tätigkeit durch Ernennung zum Geheimen Regierungsrat (April 1925) anerkannt.



Seine wissenschaftlichen Arbeiten betreffen vor allem Mißbildungen und Fragen der Entwicklungsgeschichte des Magen- und Darmkanales. Für die Technik der Sektionen und Präparierübungen hat der Jubilar ein grundlegendes Werkchen verfaßt, und endlich ist es der feinere Bau der Haut gewesen, dem Stoss lange Jahre seiner Tätigkeit Aufmerksamkeit schenkte. Zahlreiche Schüler veröffentlichten wertvolle Arbeiten aus diesen und anderen Gebieten der anatomischen Disziplinen, und alle tragen den Stempel tiefster Gründlichkeit und reichen Wissens bei schlichtester Darstellung. Das sind die Grundzüge des Charakters des Jubilars: größte Bescheidenheit, verbunden mit einer nicht zu überbietenden Güte des Herzens, und Schlichtheit. Diesen Eigenschaften gefellte sich ein Fachwissen bei, dessen Tiefe wir, seine Fachgenossen, bei den Beratungen zur Erzielung einer einheitlichen anatomischen Nomenklatur festzustellen oft genug Gelegenheit hatten. Es würde der Herzensart des zu Feiernden ganz widersprechen, würde hier ein Lob gefungen. Wer den Jubilar kennt, und das sind vor allem seine ungezählten väterlich betreuten alten und jetzigen Schüler, der weiß, was er an ihm als akademischem Lehrer und als Menschen hat. Und wer einmal das Glück hatte, ihn im harmonischen Kreise seiner Familie auf seinem Landidyll in Dachau zu sehen, der hat fühlen können, welch goldenes Herz diesem Mann im Bußen schlägt.

Möge ein gütiges Geschick den Jubilar seiner Familie und seiner Wissenschaft noch lange Jahre in der Vollkraft seiner Gefundheit erhalten.

Otto Zietzschmann, Hannover.

Akademische Nachrichten.

Tierärztliche Hochschule Berlin. Der Herr Reichspräsident hat am 27. August 1928 die Professoren Dr. Bongert, Dr. Nöller, Dr. Silbersiepe und Dr. Neumann-Kleinpaul im Namen des Reichs zu ordentlichen Mitgliedern des Wissenschaftlichen Senats für das Heeresveterinärwesen ernannt.

Der bisherige Direktor der Kgl. tierärztlichen und Landwirtschaftlichen Hochschule in Kopenhagen, Prof. der Physik Dr. Ellinger, ist aus dem Amte geschieden; zum Direktor der genannten Hochschule

wurde der Professor für Veterinärchirurgie und Direktor der chirurgischen Klinik Prof. A. W. Mörkeberg ernannt.

Auszeichnung.

Maßverfuche des Tierzuchtinstituts der Tierärztlichen Hochschule Berlin wurden auf dem Hochschulgut Klein-Ziethen bei 18 Schweinen durchgeführt. In drei Gruppen wurde die Wirkung des Maisprotein-futters: Globe geprüft, das sich als gutes Ersatzfuttermittel für die sonst üblichen tierischen Eiweißfuttermittel erwies. Die Erzeugung von 1 Pfund Lebendgewicht kostete an Futter 56 — 59 — 62 Pfennige.

In der Mastviehausstellung Berlin wurden neun Versuchstiere ausgestellt, dafür erhielt das Institut

- 1 Ehrenpreis der Hauptlandwirtschaftskammer,
- 1 Silberne Medaille des Kuratoriums für die höchste Lebendgewichtszunahme nach Alterstagen,
- 3 Silberne Medaillen für die Verfuche und für die Tiere selbst einen I., einen IIa-Preis und zwei Anerkennungen.

Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde,

Sitz Göttingen.

Anlässlich der diesjährigen landwirtschaftlichen Herbstwoche in Heidelberg wird die Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde am 14. Oktober, 18 Uhr, im Hotel Prinz Max, Marfallstraße 6, ihre Herbstversammlung abhalten.

Prof. Dr. Völitz-Königsberg: „Die Bedeutung der naturgemäßen Haltung unserer Haustiere für das Wachstum und die Konstitution im Vergleich zu der absoluten Stallhaltung mit und ohne Anwendung der künstlichen Höhenfonne nach Versuchen am Rind.“ (Mit Lichtbildern.)

Prof. Dr. Frölich-Halle: „Die Beziehungen zwischen Umwelt und Rasse, dargestellt nach den Ergebnissen einer Studienreise durch Zentralasien.“ (Mit Lichtbildern.)

Dr. Freiherr v. Patow-Calberwisch: „Der heutige Stand der Frage der Milchvererbung beim Rind.“ (Mit Lichtbildern.)

Kraftfahrervereinigung Deutscher Ärzte (K.V.D.Ä.).

Gegründet 1907. — Sitz Dresden A. 29.

Aus dem letzten Geschäftsbericht der Kraftfahrervereinigung Deutscher Ärzte war zu ersehen, daß dieselbe bald eine Mitgliederzahl von 6000 erreicht hat. Befremdend aber war die Feststellung, daß zu dem Zuwachs im letzten Vierteljahr relativ am wenigsten die Tierärzte beigetragen haben. Und doch hätte, abgesehen von den Zielen unserer Vereinigung, allein schon die ausgezeichnete, wirtschaftliche Lage unserer Genossenschaft zum vermehrten Beitritt ermuntern müssen. Das letztere beweisen trockene Zahlen am besten. Nehmen wir aus dem letzten Vierteljahr nur einen Monat, allerdings den besten, heraus, so gibt dieser schon Zeugnis von unserer wirtschaftlichen Kraft. Denn es wurden verkauft durch unsere Genossenschaft 58 Fahrzeuge für 280 000 Mk., an Bereifung, Betriebsstoffen usw. wurde umgesetzt für 45 000 Mk., an Darlehen wurden ausbezahlt 107 000 Mk. Fürwahr, das ist doch ein glänzendes Ergebnis in einem einzigen Monat. Und welche Vorteile bieten die durch uns mit unseren Vertragsgesellschaften abgeschlossenen Versicherungen. Abgesehen davon, daß wir Vorzugsprämien haben, versichern unsere Vertragsgesellschaften Casco ohne Selbstbeteiligung. Auch beim Fehlen der Löschvorrichtung, wo andere Gesellschaften die Versicherten 20 Prozent des Schadens selbst tragen lassen, kommen sie für den vollen Schaden auf. Und dann, das Wichtigste, ist es nicht eine andere Sache, wenn eine starke Organisation die Schadenregulierung in die Hand nimmt, als wenn der Einzelne für seine Rechte kämpfen muß. Ferner haben wir beim Gummikauf durch unsere Geschäftsstelle, die mit allen Praktiken der Gummifabriken vertraut ist, die Gewähr, gesunde und frische Ware zu erhalten. Und am Ende des Geschäftsjahres werden auch noch für das Gekaufte, außer für Kraftfahrzeuge, Garagen und Betriebsstoffe, 10 Prozent des Kaufwertes zurückvergütet. Segensreich hat sich erwiesen die Kreditgewährung, welche die Anschaffung eines Fahrzeuges erleichtert und zu derselben ermuntert. Kostenlos erscheint zwei Mal im Monat unsere Zeitung, die uns über alles Neue auf dem Laufenden hält, aus fachkundiger Feder Abhandlungen über alles Wissenswerte im Autobetrieb bringt, auf Fragen Antwort erteilt, bei Gelegenheit von Unfällen und Strafanzeigen die Rechtslage bspriicht, durch Schilderung von Reifeerlebnissen und dergleichen auch für die Unterhaltung forgt. Die wirkfame Vertretung der berechtigten Interessen unserer Mitglieder über-

nimmt der Syndikus der Vereinigung. Für Auslandsreisen vermittelt die Vereinigung Tryptiks. Unser Betriebstagebuch ist ein klar angelegtes Wirtschaftsbuch und auch ein erschöpfendes Nachschlagebuch für alles, was den Kraftfahrer und besonders den kraftfahrenden Arzt angeht. Die glänzende Wirtschaftslage hat es uns sogar ermöglicht, aus den Überschüssen der Genossenschaft einen Fond zu schaffen, aus dem den Angehörigen der im Autobetrieb tödlich verunglückten und bei uns versicherten Mitglieder einmalig 3000 Mk. ausgezahlt werden. Im Gau regt sich das Vereinsleben immer mehr. Gauversammlungen, Unterhaltungsabende, Vorträge, gemeinsame Gausfahrten bewirken den besseren persönlichen Anschluß und die Fühlungnahme der Mitglieder untereinander. Und was ist die Gegenleistung für diese Summe von Vorteilen? Außer dem Eintrittsgeld von 20 Mk. für die Vereinigung und 5 Mk. für die Genossenschaft wird ein Jahresbeitrag von 12 Mk. verlangt und für die Genossenschaft eine Mindesteinlage von 20 Mk., welche verzinsliches Eigentum bleibt. Welche Vereinigung kann sich rühmen, mit so geringen Mitteln so große Leistungen hervorgebracht zu haben. Aber, soviel wir schon erreicht haben, wir wollen noch mehr erreichen, unser Aufgabenkreis ist noch nicht erfüllt, wir müssen auch stark sein, um alle Widerstände zu überwinden, die uns noch entgegenstehen. Dazu helfen Sie uns durch Ihren zahlreichen Beitritt.

Dr. Gogrew e, San-Rat, Limburg (Lahn).

Gauvertreter von Hessen, Hessen-Nassau, Waldeck.

Bücherbesprechungen.

Jahrbuch für wissenschaftliche und praktische Tierzucht einschließlich der Züchtungsbiologie. Hannover, 1928. Verlag von M. & H. Schaper, Hannover, Preis Mk. 22.—, für Mitglieder d. D. G. f. Z. Mk. 16.50.

Im vergangenen Jahre wurde erstmals die Teilung des Jahrbuches in zwei Bände und eine Neugliederung des Stoffes durchgeführt, die, als zweckmäßig erkannt, auch in diesem Jahre beibehalten wurde. Bei der immer mehr anschwellenden Flut von Veröffentlichungen auf den verschiedenen Sondergebieten wurde an Stelle von Einzelreferaten die Form des Übersichtsreferates gewählt, wodurch trotz erheblicher Vermehrung der Einzelarbeiten bei besserer Übersicht eine Einschränkung des Gesamtumfanges ermöglicht wurde. Im vorliegenden 1. Band hat R. Gärtner wieder die besonders wichtige, aber auch schwierige Berichterstattung über allgemeine Tierzucht übernommen. H. On camp behandelt mit bekannter Sachkunde die Neuererscheinungen auf dem Gebiete der Fütterungslehre und Futtermittelkunde. Schermer berichtet über Tierhygiene und Zorn und Christoph über Grünland. An Stelle Henselers-München hat Boeger-Bonn das Referat über Pferdezucht übernommen. Die Rindviehzucht wird von v. Falck, die Schweinezucht von Zorn und Richter und die Schafzucht von Golf und Zwanzig behandelt. Am Ende jedes Abschnittes findet sich ein Titelverzeichnis der in der Berichtszeit veröffentlichten Literatur und am Schlusse des 1. Bandes begrüßenswerterweise ein ausführliches Autoren- und Sachregister, die den Wert des Werkes nicht unwesentlich erhöhen.

W. Schäper, Hannover.

Personal-Nachrichten.

Bestanden die Prüfung für Veterinärärzte: Dr. Fritz Beduhn in Bahn, Dr. Paul Blobel in Sorau, Dr. Viktor Goertler in Potsdam, Dr. Alfred Kunze in Königsberg (Pr.), Dr. August Meyer in Lenzen, Dr. Paul Pockrandt in Reichenbach, Dr. Friedrich Schnauder in Oppeln, Dr. Walter Schroeder in Mohrungen, Dr. Erich Zink in Fischhausen.

Übertragen: Dem Veterinärassessor Dr. Schönborn in Proßken die kommissarische Verwaltung der Veterinärarztstelle in Ortelsburg (Bezirk Allenstein).

Approbirt in Berlin: Artur Holz aus Landsberg (Warthe), Martin Willimczik aus Schippenbeil (Ostpr.), Hans Heinsen aus Büllsbüll (Holstein), Hans Enderlein aus Ober-Salzbrunn, Bodo Drewke aus Brösen, Bernard Pötting aus Braunschweig, Erich Wagner aus Aussig.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelman, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrijabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10: nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 39.

Ausgegeben am 29. September 1928.

36. Jahrgang.

Die Bedeutung des Tierexperiments für die Bakteriologie und Hygiene.¹⁾

Von Geheimrat Prof. Dr. med. et med. vet. h. c. Paul Uhlenhuth, Direktor des Hygienischen Instituts der Universität Freiburg i. Br.

Meine Damen und Herren! Die Aufforderung unserer verehrten Magnifizenz, des Herrn Prof. Mießner, anlässlich des 150jährigen Jubiläums der Tierärztlichen Hochschule in der Gesellschaft der Freunde einen Festvortrag zu halten, gereicht mir zur großen Ehre. Ich bin dieser Aufforderung um so freudiger gefolgt, als Hannover meine Heimatstadt ist und ich mit Ihrer alma mater, der wir heute unsere Huldigung darbringen, durch Bande der Wissenschaft und Freundschaft eng verbunden bin. —

I.

Meine Damen und Herren!

Groß und gewaltig, hoch und ideal sind die Aufgaben und Ziele der hygienischen Wissenschaft, die ich als Lehrer und Forscher zu vertreten die Ehre habe. Ist sie doch dazu berufen, eines der kostbarsten Güter, die Gesundheit, zu schützen und zu sichern und alle ihr drohenden Gefahren mit der ganzen Macht der ihr zu Gebote stehenden Mittel zu bekämpfen.

Zu einem solchen Kampf fordern uns vor allem heraus jene größten Feinde des Menschengeschlechtes, die zu allen Zeiten im Krieg und im Frieden ihre grausame Ernte unter den Völkern gehalten haben. Das sind die Seuchen. Noch bis vor wenigen Jahrzehnten stand man ihnen ratlos und machtlos gegenüber, da man ihre Ursache nicht kannte.

Diese mit Hilfe besonderer Methoden als spezifische Mikroorganismen kennen gelehrt und zugleich in seiner Werkstätte die Waffen zum Kampf gegen diese Erreger geschmiedet zu haben, ist das unsterbliche Verdienst von Robert Koch, den wir Deutsche und besonders wir Hannoveraner mit freudigem Stolz den unsern nennen dürfen.

Viel zu wenig beachtet und gewürdigt ist die fundamentale Bedeutung, die dem Tierexperiment bei der Erforschung der ansteckenden Krankheiten zukommt. Es dürfte daher eine dankbare Aufgabe sein, in großen Zügen und an einzelnen Beispielen uns zum Bewußtsein zu bringen, was der Tierversuch für die Erforschung des Wefens, und für die Erkennung und Bekämpfung der Seuchen geleistet und was ihm unsere Wissen-

schaft auch sonst zu verdanken hat. Da sich meine eigene Lebensarbeit als Forscher auf dem Tierversuch aufbaut, sei es mir gestattet, auch dieser dabei besonders zu gedenken.

Wollen wir die gewaltigen Fortschritte unserer Wissenschaft, denen Robert Koch den Stempel seines schöpferischen Geistes aufgeprägt hat, richtig würdigen und zeigen, wie hilfreich der Tierversuch sich dabei erwiesen hat, so müssen wir uns im Geiste 50 Jahre zurückversetzen — in die Zeit der Morgendämmerung bakteriologischer Forschung.

Damals bildete die Bakteriologie nur einen winzigen Abschnitt der Botanik, die kaum ein Dutzend Arten von pflanzlichen Mikroorganismen umfaßte.²⁾ Fast der einzige, der sich ernstlich damit beschäftigte und der die Bakterien systematisch zu ordnen versuchte, war der Breslauer Botaniker Ferdinand Cohn, während andere von einer Trennung der Bakterien in wohlcharakterisierte Arten überhaupt nichts wissen wollten. Nägeli, einer der bedeutendsten Botaniker jener Zeit unterschied zwar zwischen Fäulnis- und Kontagienpilzen, nahm aber an, daß dieselben in kurzer Frist wechselseitig in einander übergehen und „bald die Säuerung der Milch, bald die Fäulnis der Eiweißstoffe, bald die Zersetzung des Harnstoffes bewirken und bald Diphtherie, bald Cholera, bald Typhus, bald Rückfallfieber erzeugen können.“ Wie Nägeli, so war auch der berühmte Chirurg Billroth der Anschauung, daß distinkte Bakterienarten nicht beständen. Er glaubte vielmehr, daß die bei den verschiedensten Wundinfektionskrankheiten gefundenen Bakterien, die er *Coccobacteria septica* nannte, ein und derselben Bakterienart angehörten, die je nach ihrem Fundort sich dem Körper anpassen.³⁾

So dachte man damals über die krankmachenden Mikroorganismen, trotzdem bereits Louis Pasteur durch seine epochemachenden Arbeiten bei den verschiedenen Gärungen ganz bestimmte kleine Lebewesen festgestellt hatte. Alles drehte sich um die Frage: Gibt es wohlumgrenzte Arten von Bak-

²⁾ R. Koch, Antrittsrede in der Akademie der Wissenschaften 1. Juli 1909, siehe D. m. W. 1909, Nr. 29.

³⁾ Siehe Abel: Überblick über die zeitfchr. Entwicklung der Infektion ufw. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen von Kolle-Kraus-Uhlenhuth Bd. I.

¹⁾ Vortrag, gehalten am 13. Juni 1928 in der Gesellschaft der Freunde der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover, anlässlich der 150-Jahrfeier.

terien, gibt es spezifische Krankheitserreger, oder gibt es nur eine Art mit unbegrenzter Vielgestaltigkeit und Wandelbarkeit?

Hier beginnen die berühmten Arbeiten des damaligen jungen Kreisphysikus in Wollstein Robert Koch. Da sehen wir den vielbeschäftigten Arzt, ganz auf sich selbst angewiesen, in seinem bescheidenen Laboratorium, das er von seinem Sprechzimmer durch einen Vorhang abgetrennt hatte, bei der Arbeit an seinem neuen Mikroskop, das ihm seine Frau dank besserer Einnahmen aus der Praxis zum Geburtstag geschenkt hatte. Die Ursache einer Tierseuche, des Milzbrandes, der in seinem Kreise unter dem Rindvieh herrschte, galt es zu erforschen. Schon lange hatte man im Blute milzbrandkranker Tiere glashelle stäbchenförmige Gebilde gesehen (Pollender, Brauell, Davaine). Ob das aber lebende Erreger oder kristallinische Ausscheidungen waren, blieb ungeklärt. Wie war das zu entscheiden? Waren es lebende Erreger, so dachte Koch, so müßten sie sich vermehren und ihr Wachstum und ihre Entwicklung sich verfolgen lassen. Das Tierexperiment brachte ihm die Entscheidung. Denn wenn er — in Fortsetzung der Versuche von Davaine — mit dem stäbchenhaltigen Blut Mäuse impfte, so gingen sie regelmäßig zugrunde und bei weiterer Fortimpfung in Passagen konnte er immer wieder die tödliche Krankheit erzeugen und in der Milz dieser Tiere fand er immer wieder diese Stäbchen. Es waren also lebende vermehrungsfähige Mikroorganismen. Diese verfolgte er in einem Tropfen Rinderblutserum oder humor aquos unter dem Mikroskop auf einem heizbaren Objekttrichter. Er sah, wie diese Fäden auswuchsen und im Innern Sporen bildeten und wie diese Sporen in frischen Nährsubstraten wieder zu Fäden auswuchsen und den gleichen Entwicklungsgang durchmachten. Und mit solchen Sporen konnte er wieder bei Mäusen Milzbrand hervorrufen, nicht aber mit anderen Bakterien. So war es (1876) mit Hilfe des Tierexperimentes zum ersten Male gelungen, einen spezifischen pathogenen Mikroorganismus als Erreger einer Infektionskrankheit nachzuweisen. Der Nachweis der Sporen, dieser arterhaltenden Dauerform gab gleichzeitig die Aufklärung über die Verbreitungsweise und legte die Grundlage zu einer rationellen Bekämpfung. Und in ähnlicher Weise gelang es R. Koch beim Studium der Ätiologie der Wundinfektionskrankheiten (1878) mit Hilfe des Tierexperimentes spezifisch unabänderliche Arten krankmachender Bakterien festzustellen.

Nachdem er dann die bakteriologische Methodik, die Präparation, Färbung und mikroskopische Optik (Abbée) weiter ausgebaut und vor allem gezeigt hatte, daß man aus Bakteriengemischen auf festen erstarrungsfähigen Nährböden die spezifischen Arten auch außerhalb des Tierkörpers in Reinkultur isolieren und mit diesen wieder Tiere in charakteristischer Weise infizieren konnte, war mit einem Male die Bahn frei für die weitere ätiologische Erforschung der Infektionskrankheiten. Wie reife Früchte — um mit seinen eigenen Worten zu reden — fielen ihm und seinen Mitarbeitern die Entdeckungen in den Schoß.

Es folgte die Entdeckung des Tuberkelbazillus und des Cholerabazillus, des Typhusbazillus, des Erregers der Diphtherie, des Rotzes, des Rotlaufs, der Influenza, der Ruhr, des Tetanus, der Pneumonie, der Pest und wie sie alle heißen. Und bei all diesen wichtigen Entdeckungen, die sich weiterhin auch auf die tierischen Mikroorganismen, die Protozoen und auf das unsichtbare, filtrierbare Virus erstreckten, hat wiederum das Tierexperiment hilfreiche Dienste geleistet besonders für das Studium des Wesens der Krankheit und ihrer Erreger innerhalb und außerhalb des Tierkörpers. Wenn ich es mir auch verfallen muß,

das im Einzelnen näher auszuführen, so muß hier doch als Schulbeispiel der größten aller Entdeckungen gedacht werden, der Entdeckung des Tuberkelbazillus. War schon durch Versuche von Villemin, Cohnheim und Salomonsen gezeigt, daß die Tuberkulose auf Tiere übertragbar ist, so herrschte über die Art und das Wesen des Erregers noch tiefes Dunkel. Mit verschiedenartigem Tuberkulosematerial impfte Koch Meerfischweichen und konnte immer wieder dasselbe typische Krankheitsbild mit den gleichen pathologischen Veränderungen feststellen. Durch neue Färbungsmethoden gelang es ihm, in den veränderten Geweben stets die gleichen feinen Stäbchen aufzufinden und sie auf besonderen neuen Nährböden (Blutserum) rein zu kultivieren und konnte er mit den Reinkulturen bei Tieren immer wieder Tuberkulose erzeugen.

Damit hatte er mit Hilfe des Tierversuchs den Beweis erbracht, daß diese gewaltigste, das Menschen- und Tiergeschlecht dezimierende Krankheit eine bazilläre, also eine vermeidbare Krankheit ist, gegen die mit Erfolg anzukämpfen nunmehr die Aussicht eröffnet war.

Wie nützlich sich der Tierversuch auch in neuester Zeit für die Erforschung des Wesens einer Infektionskrankheit erwiesen hat, möchte ich Ihnen auf Grund eigener Forschungsergebnisse noch an einem anderen Beispiel zeigen.

Im Sommer 1915 traten im Armeegebiet der VII. Armee, deren beratender Hygieniker ich war, an der Aisnefront zahlreiche Fälle von ansteckender Gelbfucht (Weil'sche Krankheit) auf, eine Seuche, die unter schweren Allgemeinerscheinungen häufig zum Tode führt und deren Ursache und Wesen völlig unbekannt war. Nachdem alle in unserem Feldlaboratorium zusammen mit Fromme unter den schwierigsten Verhältnissen unruhiger Kampftage ausgeführten Versuche, den Erreger kulturell oder mikroskopisch nachzuweisen erfolglos geblieben war, führte der Tierversuch zu einem vollen Erfolg. Es gelang uns durch Einspritzung von Blut frisch erkrankter Soldaten bei Meerfischweichen, die wir zu vielen Hunderten requiriert und in einem Gewächshaus untergebracht hatten, das typische Bild der Gelbfucht zu erzeugen und in Passagen weiterzuimpfen (siehe auch Hübener und Reiter).

In der Leber der an der Krankheit zugrunde gegangenen Tiere konnten wir dann im gefärbten und lebenden Präparat den Erreger in Gestalt einer Spirochaete von einem ganz neuartigen Formentypus auffinden, den wir Spirochaeta icterogenes genannt haben und der unabhängig von uns fast zur gleichen Zeit auch von den Japanern in ihrem Heimatland entdeckt worden ist (Jnada). Nachdem es uns dann — ebenso wie zuerst Ungermann — gelungen war, Reinkulturen in Serumwasser zu erzielen, konnten wir damit wieder Meerfischweichen krank machen und in diesen wieder den Erreger nachweisen, so daß damit der Beweisring geschlossen war. So konnte also die Ursache der Weil'schen Krankheit lediglich durch den Tierversuch aufgeklärt werden und wenn wir heute besonders in zweifelhaften Krankheitsfällen, wo die Gelbfucht noch fehlt, eine sichere Diagnose stellen wollen, so ist hier in erster Linie der Tierversuch entscheidend.

Auch unsere Vermutung, daß die Krankheit durch Ratten übertragen wird, die bekanntlich mit unseren Soldaten in den tiefen Stollen und Unterständen vielfach in Symbiose lebten, wurde durch den Tierversuch von japanischen Forschern sowie von uns selbst in positivem Sinne entschieden, indem durch Verimpfung von Urin und Nierengewebe anscheinend gesunder Ratten Meerfischweichen in etwa 15 Prozent der Fälle an typischer Gelbfucht erkrankten. Das war an der Front, in Straß-

burg und Berlin so, und ist auch bei den Freiburger Ratten der Fall. Und auf der ganzen Welt hat man diese Beobachtung bestätigt, daß die Ratten vielfach mit ihrem Urin die virulenten Erreger dieser Krankheit ausscheiden und verbreiten können.

Noch ein anderes interessantes Ergebnis hat der Tierversuch bei diesen Forschungen gezeitigt. In Friedenszeiten ist diese Krankheit in verschiedenen Garnisonen nach dem Baden in bestimmten Flüssen beobachtet worden. Das veranlaßte uns (mit Zülzer) im Wasser nach diesen Spirochäten zu suchen. Wir fanden solche morphologisch vollkommen identische Spirochäten in verschiedenen Gewässern, sogar in den Zapfhähnen der Wasserleitungen, die aber bei Verimpfung auf Meerfischweinchchen zunächst ganz harmlos waren und auch biologisch erhebliche Unterschiede aufwiesen. Es ist uns dann gelungen, in lange fortgezüchteten Serumkulturen und vor allen Dingen durch Passagen im Meerfischweinchchen (mit Herrmann) diese harmlosen Spirochäten in pathogene mit den typischen Eigenschaften der Weilschpirochäten umzuwandeln (siehe auch Zülzer und Bärman). Vermutlich kommen ähnliche Umwandlungen in der Natur auch in den Ratten vor, die solche Wasserpirochäten in sich aufnehmen. Das gleiche trifft auch vielleicht beim Menschen zu, eine Frage, die für die Entstehung der Seuchen eine eminente Bedeutung beansprucht, denn es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß die Erreger von Seuchen sich phylogenetisch aus harmlosen Saprophyten entwickelt haben. Ein Beweis dafür erscheint mir durch unsere Tierexperimente erbracht. So hat sich auch in dieser Beziehung der Tierversuch als außerordentlich fruchtbarer erwiesen.

Auch das Wesen einer anderen Gruppe von Krankheiten, die für die Volksgesundheit von allergrößter Bedeutung sind, und von denen manche früher für ansteckend gehalten wurden, ist durch das Tierexperiment restlos aufgeklärt worden. Bekannt und gefürchtet war hauptsächlich in den Reis-essenden Ländern (China, Indien, Japan) die Beri-Beri, eine mit schweren Nervenentzündungen, Lähmungen, Wasserschwellung und allgemeinem Kräfteverfall einhergehende Krankheit, die besonders im russisch-japanischen und im Balkan-Kriege zahlreiche Opfer gefordert hat. Machtlos stand man dieser Krankheit gegenüber, weil man ihr Wesen nicht kannte. War es eine Infektionskrankheit, eine Vergiftung oder was war die Ursache? Der Tierversuch gab die Antwort. Es war der bekannte holländische Tropenhygieniker Eykman, der mit einem Schlage die Sachlage klärte. Er beobachtete bei Hühnern in einem Spital eine Krankheit, die mit der Beri-Beri des Menschen größte Ähnlichkeit zeigte. Nun konnte er feststellen, daß die Hühner seit einiger Zeit statt mit rohem ungeschältem, mit gekochtem, geschältem Reis aus der Spitalküche gefüttert worden waren. Gab er dann solchen Hühnern kleinste Mengen von ungeschältem Reis oder Reiskleie, so konnte die Krankheit geheilt und auch der Ausbruch der Krankheit verhindert werden. Das Fehlen einer lebenswichtigen Substanz im geschälten Reis war also, wie der Tierversuch zeigte, die Ursache.

Ähnlich liegen die Verhältnisse beim Skorbut, einer schweren mit Haut- und Schleimhautblutungen, Blutarmut, Gelenkschmerzen und Schwäche auftretenden Krankheit, die bei Säuglingen unter dem Namen der Möller-Barloffschen Krankheit bekannt ist. Axel Holst konnte, als er Meerfischweinchchen mit Getreidekörnern oder Brot fütterte, eine Krankheit erzeugen, die mit dem menschlichen Skorbut weitgehend übereinstimmte. Durch geringe Zufuhr von frischen Vegetabilien, Zitronen- und Apfelsinen- oder Preßsaft von Rüben konnte diese Krankheit geheilt werden.

Auf Grund weiterer Tierversuche an Ratten und Hunden kam man dann weiterhin zu der Erkenntnis, daß die sog. englische Krankheit, Rachitis, sowie eine bestimmte Augenerkrankung besonders der Kinder, die zu Erblindung führen kann, auf den Mangel bestimmter Stoffe in der Nahrung beruht und daß das Fehlen besonderer Nahrungsstoffe auch das Wachstum und die Fortpflanzung beeinträchtigt, ja sogar Unfruchtbarkeit (Evans) bedingt. Fünf solcher akzessorischer Nahrungsstoffe, die wir Vitamine nennen, sind bisher bekannt; wenn sie auch zum großen Teil vorläufig chemisch noch wenig charakterisiert sind, so kann man das antirachitische Vitamin, wie die Untersuchungen von Pohl und Windaus gezeigt haben, durch Bestrahlung aus dem Ergosterin herstellen und auch in der Milch durch die Höhen Sonne anreichern.

Die eminente Bedeutung dieser Stoffe, die wir, wie gesagt, hauptsächlich in frischen grünen Gemüsen, Obst, auch in Milch, Butter, Fisch, Lebertran zu uns nehmen und die schon in ganz minimalen Mengen wirksam sind, wäre ohne Tierversuch niemals richtig erkannt worden, und wenn heutzutage die Mütter ihren Säuglingen Spinat, Zitronensaft oder Tomaten geben, so tun sie das in der durch den Tierversuch gewonnenen Erkenntnis, daß die Vitamine imstande sind, sie gegen Skorbut, Rachitis und andere Krankheiten zu schützen.

II.

Meine Damen und Herren!

Wenn wir uns nun weiterhin der zweiten Frage zuwenden und uns vergegenwärtigen, was der Tierversuch für eine richtige frühzeitige Erkennung der Infektionskrankheiten geleistet hat, so müssen wir feststellen, daß er sich hier als überaus wertvoll und in vielen Fällen als unentbehrlich erwiesen hat. Das sahen wir schon bei der Weilschen Krankheit und sahen es beim Milzbrand, der bei Mensch und Tier nicht selten beobachtet wird im Zusammenhang mit der Borsten- und Lederindustrie, wobei ausländische Felle und Tierhaare verarbeitet werden, die bekanntlich häufig mit Milzbrandbazillen behaftet sind. Wenn das zu untersuchende Material nur wenig Milzbrandbazillen enthält oder diese durch Fäulnisbakterien überwuchert sind, so ist der Tierversuch an der Maus vielfach das einzige Mittel, um die Milzbrandbazillen nachzuweisen und damit die Grundlage für medizinische und veterinärpolizeiliche Maßnahmen.

Von ähnlicher Bedeutung ist der Mäuseversuch bei der bakteriologischen Feststellung des so gefürchteten Wundstarrkrampfes.

Beim Rotz der Pferde, der auf den Menschen übertragen eine sehr gefährliche Krankheit darstellt und wo der direkte Nachweis des Erregers in dem blutigen Sekret der Nase und in den pustulösen Geschwüren selten gelingt, ist der Meerfischweinchchenversuch oft von unschätzbarem Wert. Nach geeigneter Impfung erkranken diese Tiere an typischen Hodenentzündungen, in denen dann die Erreger nachgewiesen werden können.

Unentbehrlich ist der Tierversuch bei der Feststellung der Tuberkulose. Ein einziger Tuberkelbazillus genügt, um ein Meerfischweinchchen krank zu machen. In den Fällen, wo der mikroskopische Nachweis der Tuberkelbazillen verfehlt oder zweifelhaft ist wie in einem verdächtigen Auswurf oder Eiter, einem Erguß in die Brusthöhle, einer verdächtigen Hirnhaut- oder Nierenentzündung, oder in der Milch perlsuchtverdächtigter Kühe ist der Tierversuch entscheidend. Was das für den Arzt, den Kranken und seine Familie zu bedeuten hat, bedarf keiner weiteren Erörterung; hängen doch die weitere Behandlung des Kranken und die Schutzmaßnahmen für die Umgebung häufig davon ab.

Von größter Bedeutung ist der Tierversuch bei der Erkennung einer gemeingefährlichen, exotischen Krankheit, der Pest. Mit Graulen denken Sie dabei an den schwarzen Tod, jene furchtbare Epidemie von Lungenpest, an der im Mittelalter in wenigen Jahren 24 Millionen, das heißt der vierte Teil von Europas Einwohnern dahingerafft wurde und von der Boccaccio in seinem *Decamerone* eine ergreifende Schilderung gibt. Von bleichem Schrecken gelähmt, stand man dieser Seuche als einer vernichtenden elementaren Gewalt, die alle Bande der Ordnung und der Familie löste, ratlos und machtlos gegenüber und suchte ihr durch fanatisches Flagellantentum und Judenverfolgung Einhalt zu tun. Trotzdem sich die Seuche in den letzten Jahrhunderten im allgemeinen auf ihre Heimatgebiete zurückgezogen hat, so wurde sie doch von dort, den Verkehrsstraßen folgend, in die verschiedensten Hafenstädte verschleppt. Zur Zeit herrscht sie besonders in Britisch-Indien, wo jährlich 400 000 an der Pest zugrunde gehen.

Heute kennen wir zum Glück den Erreger dieser Seuche, wir wissen auch, daß die Pest eine Rattenkrankheit ist und durch Rattenflöhe auf Ratten und Menschen übertragen wird. Die frühzeitige Erkennung der Rattenpest auf Schiffen, sowie der ersten Fälle unter den Menschen ist daher die wichtigste Forderung für die Fernhaltung der Seuche von unseren Häfen. Die strenge Überwachung des Seeverkehrs sowie die Beobachtung der Rattenverhältnisse in den Häfen, die Durchsuchung der Schiffe auf tote Ratten und ihre bakteriologische Untersuchung ist daher amtlich vorgeschrieben und international geregelt. (Sanitätskonferenz Paris 1926.) Da es sich vielfach bei den toten Ratten um faules Material handelt, wo die bakteriologische Untersuchung verfaßt, so ist hier der Tierversuch, d. h. die Verimpfung auf die äußerst empfänglichen Meerschweinchen und Ratten zur Feststellung der Pest vielfach von ausschlaggebender Bedeutung.

In den Jahren 1899—1910 wurden im hygienischen Institut in Hamburg 20 761 Rattenkadaver untersucht und davon 224 mit Pestbazillen behaftet gefunden. So pocht die Pest — auf Eintritt lauernd — auch heute noch an die Pforten von Europa, und wenn sie keinen Einlaß findet, so verdanken wir das den auf den Tierversuch sich stützenden hygienischen Maßnahmen.

Wie die Pest, so entstehen auch die Pocken lediglich durch Einschleppung aus dem Ausland. Wenn auch dank der bei uns eingeführten Schutzpockenimpfung die Gefahr der Ausbreitung nicht groß ist, so muß doch wachsam darauf geachtet werden, daß jeder Pockenfall, der etwa eingeschleppt wird, sofort erkannt wird. Der Arzt ist dazu auf Grund klinischer Erscheinungen nur selten in der Lage, da er meist echte Pocken nie gesehen hat und die Krankheit bei Geimpften meist ganz leicht verläuft. Da wir auch den Erreger der Pocken, der zu den unsichtbaren filtrierbaren Mikroorganismen gehört, nicht züchten können, so können solche Fälle, wie die Erfahrung gelehrt hat, unerkant bleiben und zum Ausgangspunkt einer Epidemie werden. Auch ist die Unterscheidung von den harmlosen Windpocken in solchen Fällen klinisch vielfach kaum möglich. Nur der Tierversuch bringt die Entscheidung, wie die Arbeiten von Guarnieri und Paul gezeigt haben. Impft man den Inhalt verdächtiger Pusteln auf die skarifizierte Hornhaut von Kaninchen, so entstehen, wenn es sich um Pocken handelt, makroskopisch sichtbare erhabene knötchenförmige Verdickungen und mikroskopische Zelleinschlüsse, die die Diagnose sichern. Es ist daher vorgeschrieben, daß in jedem verdächtigen Falle der Bläscheninhalt auf einem Objektträger angetrocknet an die amtlichen Untersuchungsstellen eingeschickt wird.

So ist der Arzt jeder Zeit in der Lage, bei pockenverdächtigen Krankheiten eine Sicherung der Diagnose mit Hilfe des Tierexperiments herbeizuführen, was medizinalpolizeilich von ungeheurer Bedeutung ist.

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der Hundswut, die durch den Biß toller Hunde auf den Menschen übertragen wird und die ebenfalls meist vom Ausland eingeschleppt wird. Auch hier ist die Erkennung und Unschädlichmachung der ersten Fälle unter den Tieren von größter Bedeutung auch für den Menschen.

Das stößt häufig auf große Schwierigkeiten, da die Krankheit beim Hunde unter wenig charakteristischen Erscheinungen verlaufen kann, und wir den unsichtbaren Erreger nicht züchten können. Da die von Negri in den Ganglienzellen bestimmter Gehirnteile entdeckten, für Tollwut charakteristischen Einschlusskörperchen nicht immer nachweisbar sind, besonders wenn das Material in Fäulnis übergegangen ist, führt in solchen Fällen die Verimpfung auf Kaninchen oder Ratten, die dann an Tollwut zugrunde gehen, häufig noch zum Ziel. Es ist daher gesetzliche Vorschrift, daß das Gehirn tollwutverdächtiger Hunde in allen Fällen, in denen ein Mensch gebissen worden ist, zur Sicherung der Diagnose bestimmten Instituten zur Untersuchung zugesandt werden muß.

Doch genug von solchen Beispielen, die die diagnostische Bedeutung des Tierversuches beweisen. Als wichtige Tatsache sei aber noch hervorgehoben, daß es bei den kulturell nicht züchtbaren Virusarten wie Pocken, Tollwut, Maul- und Klauenseuche, Schweinepest, Hühnerdiphtherie, deren Identität mit Hühnerpocken ich zuerst (mit Carnath) nachgewiesen habe, sowie von Fleckfieber nur durch Tierpassagen möglich ist, das Virus am Leben zu erhalten, was, wie wir noch sehen werden, auch für die Herstellung von Schutz- und Heilstoffen von besonders wichtiger Bedeutung ist. Ähnliches trifft zu bei gewissen Protozoen, besonders bei Trypanosomen, z. B. den Erregern der Schlafkrankheit, während es andererseits auch Krankheiten gibt, wie Malaria, Scharlach, die sich überhaupt auf Tiere bis jetzt nicht übertragen lassen.

Noch in anderer Weise hat sich der Tierkörper für die Diagnose von Infektionskrankheiten als unentbehrlich erwiesen. Seit Jahrtausenden weiß man, daß gewisse ansteckende Krankheiten den Menschen oder das Tier nur einmal befallen, so sehr sie später einer erneuten Infektion ausgesetzt sind. Daraus schloß man, daß der Organismus nach Überstehen der Krankheit Schutzstoffe gebildet haben mußte, er mußte immun geworden sein. Diese wunderbare Erscheinung blieb aber in tiefes Dunkel gehüllt, bis Emil v. Behring ihr Wesen erkannte, und die epochenmachende Entdeckung machte, daß im Blutserum von Tieren nach Vorbehandlung mit Diphtherie- und Tetanusgift Schutzstoffe, bezw. Gegengifte (Antikörper) gebildet werden, die das betr. Gift im Körper und auch im Reagenzglas unschädlich machen und den Organismus gegen die deletäre Wirkung dieser Gifte zu schützen vermögen. Die auf dem Tierversuch basierende Entdeckung dieser Antitoxine, die für die Serumbehandlung, wie wir noch sehen werden, von ungeahnter Bedeutung geworden ist, wurde der Ausgangspunkt für eine ganz neue Wissenschaft, die Immunitätsforschung und Serumdiagnostik. Denn es zeigte sich, daß es sich hier um ein allgemeinbiologisches Grundgesetz handelt. Denn wie gegen Diphtherie und Tetanusgift, so konnte durch entsprechende Vorbehandlung von Tieren nicht nur gegen andere pflanzliche und tierische Gifte Gegengifte erzeugt werden, sondern auch ganz spezifische Antikörper gegen alle möglichen Krankheitserreger, ja irgendwelche pflanzliche und tierische Zellen und ihr gelöstes Zelleiweiß. Bringt man das Serum so vorbehandelter Tiere mit den betr. Substanzen im Reagenzglas oder im Tierkörper zusammen, so treten spezifische Reak-

tionen auf. So sehen wir bei entsprechender Versuchsanordnung bald eine Auflösung (Lysis) (R. Pfeiffer), bald eine Zusammenballung (Agglutination) der Bakterien (Gruber und Durham) oder Zellen, oder auch einen Niederschlag (Präzipitation) in den betr. bakterienfrei filtrierten Kulturflüssigkeiten (R. Kraus). Diese geheimnisvollen spezifischen Stoffe, die nur die tierische Zelle in ihrer Werkstätte, nicht aber der Chemiker in seinem Laboratorium bereiten kann, sind es, die als spezifische biologische Reagentien bei der Erkennung der Infektionskrankheiten und damit für die praktische Seuchenbekämpfung eine ungeahnte Bedeutung erlangt haben.

Nur mit Hilfe dieser spezifischen Agglutinine oder Bakteriolyse sind wir in der Lage, die Typhus-, Cholera-, Rotz- und Pestbazillen in der Kultur als solche sicher nachzuweisen und von andern ähnlichen Bakterien zu unterscheiden, so daß die Anwendung dieser Methoden amtlich vorgeschrieben ist. Auch bei der so wichtigen Serumdiagnostik der Syphilis (Wassermann) sowie des Rotzes (Schütz und Mießner) benutzen wir spezifische Stoffe, die uns nur der Tierkörper liefern kann.

Während die Serumdiagnostik mittels spezifischer Präzipitine bei Bakterieneiweiß, abgesehen von Rotz und Milzbrand kaum eine praktische Bedeutung erlangt hat, ist sie für die Unterscheidung von tierischen Eiweißsubstraten von großer Wichtigkeit geworden. Im Anschluß an die Arbeiten von Bordet und Tsirowitsch konnte ich feststellen, daß das Serum von Kaninchen, denen Menschenblut oder irgend ein Tierblut eingespritzt war, nur in Lösungen der zur Vorbehandlung benutzten Blutarten einen Niederschlag erzeugte. Damit war die Blutdifferenzierung auch vom gerichtsarztlichen Standpunkt endgültig gelöst (Uhlenhuth und Beumer). Denn selbst minimale Mengen jahrzehntelang angetrockneten Blutes ließen sich mit meinem Verfahren noch einwandfrei bezüglich ihrer Provenienz bestimmen. Und wenn es heute darauf ankommt festzustellen, ob der Blutfleck an den Kleidern eines Mörders Menschenblut ist oder nicht, so kann das einzig und allein nur entschieden werden durch das Serum eines mit Menschenblut vorbehandelten Kaninchens. Sie sehen, „Blut ist ein ganz besonderer Saft“. So ist meine Methode, die in allen Kulturstaaten in die gerichtsarztliche Praxis eingeführt ist, ein entscheidendes Mittel zur Erkenntnis der Wahrheit geworden.

Und weiter! Von jeher fehlte ein Verfahren, das uns besonders z. Zt. der teuren Fleischpreise gestattete, den Schleier zu lüften über dem Schicksal von jenen edlen Tieren, die nach schwerem Kampf ums Dasein in feinerhacktem Zustande in den Garküchen ihren irdischen Kreislauf vollenden. Das ist nun ein leichtes geworden. Das Serum eines mit Pferdeblut vorbehandelten Kaninchens zu dem verdächtigen Fleischauszug hinzugefügt, läßt uns, wie ich weiter festgestellt habe, durch die auftretende Trübung sofort erkennen, ob es sich um Pferdefleisch handelt oder nicht, sei es nun in Hackfleisch, in der Wurst, in gekochtem oder geräuchertem Zustande. Auf keine andere Weise läßt sich das sonst ermitteln, denn „Wurst ist Vertrauenssache“. So ist meine auf den Tierversuch beruhende biologische Methode auch für die praktische Fleischbeschau von außerordentlicher Bedeutung geworden und im Fleischbeschaugesetz amtlich vorgeschrieben (Uhlenhuth und Weidanz). Auch bei der Untersuchung anderer Nahrungsmittel, wie Eier, Milch, Kaviar, Fischfleisch, Honig sowie von Futtermitteln hat sie sich als äußerst wertvoll erwiesen.

Forensisch wichtig und zugleich naturwissenschaftlich interessant war die Tatsache, daß die verwandtschaftlichen Beziehungen unter den Tieren bei

dieser Reaktion zum sichtbaren Ausdruck gelangen. Ähnlich wie bei meinen Versuchen über die Unterscheidung des Eiweißes verschiedener Vogeleier, machte ich die Beobachtung, daß das Blutserum eines mit einer bestimmten Blutart vorbehandelten Kaninchens auch in dem Körperweiß eines nahe verwandten Tieres einen Niederschlag hervorruft und so kam ich auf die naheliegende Idee, die biologische Reaktion zum Studium der verwandtschaftlichen Beziehungen unter den Tieren in Anwendung zu ziehen. So konnte die Blutsverwandtschaft zwischen Pferd und Esel, Hund und Fuchs, Huhn und Taube, Hammel und Ziege und Rind, sowie auch unter den Vertretern der Krustaceen und Amphibien (v. Dungern) und Fische (Neresheimer, Uhlenhuth, Kodama) durch die biologische Reaktion zum sichtbaren Ausdruck gebracht werden. Naturwissenschaftlich am interessantesten war zweifellos der Nachweis der Blutsverwandtschaft zwischen Mensch und Affe, wie er von mir, Wassermann und Stern, erbracht und wie er durch die Untersuchungen von Nuttall u. a. weiter ausgebaut worden ist. Es zeigte sich, daß die Menschenaffen auch biologisch den Menschen am nächsten stehen und die Affen der alten Welt dem Menschen näher stehen wie die Affen der neuen Welt. Dieser biologische Nachweis für die Blutsverwandtschaft zwischen Menschen- und Affengeflecht dürfte der eklatanteste und verblüffendste sein, da man ihn jederzeit im Reagenzglas ad oculos demonstrieren kann.

Die praktische Bedeutung dieser biologischen Reaktion beruht zum Teil auf ihrer außerordentlichen Feinheit, indem wir das fremdartige Eiweiß vielfach noch in Verdünnungen 1:100 000, so z. B. Spuren von Blut in blutfaugenden Insekten noch nachweisen konnten, während der chemische Nachweis meist in Verdünnungen über 1:1000 schon verlagert.

Eine noch feinere spezifische Reaktion auf fremdartiges Eiweiß beobachtet man im Tierkörper selbst, in Gestalt der sogenannten Überempfindlichkeitsreaktion (Anaphylaxiereaktion). Wenn man Meerfischweinen mit den minimalsten Bruchteilen (1 Millionstel Kubikzentimeter) von artfremdem z. B. menschlichem Eiweiß vorbehandelt, so gehen sie, wenn sie nach einigen Wochen mit größeren Mengen desselben Materials nachgeimpft werden, unter schweren Erscheinungen akut zugrunde. Die Reaktion ist also spezifisch. Es ist mir auf diese Weise in mehreren Fällen gelungen, durch Einspritzung von mehrtaufendjährigem ägyptischem Mumienmaterial Meerfischweinen gegen die Nachbehandlung mit menschlichem Eiweiß überempfindlich zu machen und damit den Nachweis menschlichen Eiweißes in den Mumien zu erbringen. (Uhlenhuth und Haendel usw.). Alles das sind Leistungen des Tierkörpers, die der Chemiker nicht auszuführen vermag und vor denen der forschende Geist des Gelehrten wie vor einem Rätsel Halt macht.

III.

Meine Damen und Herren!

Wenn uns nun der Tierkörper, wie wir gesehen haben, so feine biologische Reagentien besonders auch für die frühzeitige Erkennung von Krankheiten liefert, so hat er auch uns Ärzten und der Menschheit wirksame Schutz- und Heilmittel zur Bekämpfung mörderischer Seuchen in die Hand gegeben.

Ich erwähnte schon die Entdeckung des Diphtherieserums durch Emil v. Behring, das, wenn es frühzeitig und in richtiger Dosierung angewandt wird, tausende von Kindern jährlich vor dem qualvollen Tode rettet und vor der Erkrankung schützt. Und dieses Serum wird von Pferden gewonnen, die mit steigenden Dosen von Diphtheriegift systematisch vorbehandelt werden. Nur das

Tier kann folches Serum liefern und das Tierexperiment hat uns dieses wunderbare Heilmittel hervorgezaubert. Und wie dieses, so verdanken wir auch das Serum gegen Wundstarrkrampf dem genialen Forschergeist Emil v. Behrings. Jeder, der im Felde war, wird sich mit Schauern dieser Krankheit erinnern, die besonders im Anfang des Krieges nach schweren, mit Erde verunreinigten Geschoßwunden in erschreckender Zahl auftrat. Mit einem Schlage hörte sie auf, als man jeden Schwerverwundeten möglichst bald mit Tetanusserum impfte. Tausende unserer braven Soldaten verdanken ihm ihr Leben.

Auch in der Veterinärpraxis hat sich das Serum ausgezeichnet bewährt. Ehe das Diphtherie- und Tetanusserum in den Handel kommt, wird es auf seine Unschädlichkeit und Hochwertigkeit staatlich geprüft und das ist auch nur wieder möglich durch den Tierversuch.

Es würde zu weit führen, auf die zahlreichen anderen Sera, die gegen die verschiedensten Krankheiten, wie die Ruhr, die Lungenentzündung, die Genickstarre usw. hergestellt und mit mehr oder weniger Erfolg angewandt wurden, hier näher einzugehen. So durchschlagende Erfolge wie dem Diphtherie- und Tetanusserum sind nur wenigen beschieden gewesen. Ich selbst habe mit Fromme auf Grund umfangreicher Tierexperimente im Felde ein Serum gegen die schon erwähnte Weißsche Krankheit von Pferden hergestellt, mit dem die Krankheit bei unseren Soldaten in auffallend günstiger Weise beeinflusst werden konnte.

Von jeher habe ich mich mit besonderer Vorliebe mit Tierseuchen beschäftigt, weil deren Erforschung begreiflicherweise auch der Erkenntnis menschlicher Seuchen zugute kommt. Gemeinsam mit meinem großen Lehrer Friedrich Löffler habe ich von Rindern ein Schutzserum gewonnen gegen eine der verderblichsten Tierseuchen, die Maul- und Klauenseuche, das jetzt in großem Maßstabe auf der Insel Riems bei Greifswald in polyvalenter Form von Waldmann hergestellt wird und sich ausgezeichnet bewährt hat.

Unabhängig von dem Amerikaner Dorset ist es mir mit meinen Mitarbeitern gelungen, ein Schutzserum gegen das filtrierbare Virus der Schweinepest — das von Schweinen gewonnen wird — herzustellen, das nach meinen Angaben in Gemeinschaft mit Mießner und Geiger unter staatlicher Kontrolle im Großen in einer isolierten Farm in der Heide bei Eystrup gewonnen wird, und das bei rechtzeitiger Anwendung den Ausbruch der Pest zu kupieren imstande ist. Von eminent großer praktischer Bedeutung ist bekanntlich auch das Lorenzsche Serum gegen Rotlauf der Schweine und auch das Serum gegen Milzbrand der Tiere und Menschen, die sich glänzend bewährt haben.

Während in diesen Fällen dem Körper fertige Schutz- und Heilstoffe zugeführt werden, die im Serum der Tiere durch vorangehende Impfung entstanden sind, die aber bald aus dem Körper wieder ausgeschieden werden (passive Immunisierung), kann man durch Zuführung von abgeschwächtem oder abgetötetem Virus auch aktiv im Körper eine länger dauernde Schutzwirkung erzielen. Bei der idealsten Schutzimpfung, der Schutzpockenimpfung von Jenner, impfen wir mit dem im Körper des Kalbes abgeschwächten Virus der echten Pocken. Der Impfstoff wird vom Kalbe gewonnen und im Kalbe (resp. Kaninchen) weitergezüchtet.

Während früher von den Pocken und der Liebe keiner verschont blieb und im deutschen Reich jährlich mehrere Tausende an Pocken starben (bei der Epidemie 1871 bis 1872 162 000 Menschen) sind heute dank der durch das Reichsimpfgesetz vom Jahre 1874 eingeführten Impfung und Wiederimpfung die Pocken aus Deutschland verschwunden, während z. B. in England, wo infolge der

„Gewissensklausel“ die Schutzpockenimpfung vernachlässigt wird — sodaß ca. 50 Prozent der Kinder ungeimpft bleiben — die Pocken epidemisch herrschen und noch im letzten Jahre 14 769 Erkrankungen beobachtet sind. Ähnliches gilt für viele Kantone der Schweiz. Bei keiner Krankheit sind auch nur annähernd solch glänzende Erfolge erzielt worden und diese verdanken wir letzten Endes dem Tierversuch.

Das gleiche Prinzip, d. h. die Impfung mit durch Tierpassagen abgeschwächtem Krankheitsvirus hat bekanntlich Louis Pasteur durch seine berühmten Arbeiten exakt wissenschaftlich begründet und durch mühsame Tierexperimente ein Schutzimpfungsverfahren gegen Milzbrand, Rotlauf, Hühnercholera und vor allem Tollwut ausgearbeitet. Wenn wir einen Menschen nach dem Biß eines tollen Hundes vor dem Ausbruch der Tollwut schützen wollen, so impfen wir ihn mit dem Rückenmark eines mit Tollwut künstlich infizierten und daran zugrunde gegangenen Kaninchens, das durch Trocknen oder Verdünnung in seiner Virulenz abgeschwächt ist. Wie Sie wissen, hat vor allen Mießner diese Pasteur'sche Methode auch auf die Impfung der Hunde übertragen.

Also ohne Tier keine Rettung für den Menschen.

Es ist nicht möglich, auf alle die Schutzimpfungsverfahren hier einzugehen, die — auf dem Tierversuch begründet — in der human- und veterinären Medizin Bedeutung erlangt haben. Ich erinnere nur an die Cholera- und Typhus Schutzimpfung (R. Pfeiffer und Kolle), die sich im Weltkriege als überaus segensreich erwiesen haben, an die Impfung gegen Rotlauf mit Serum und virulenter Kultur und besonders an die von Behring angegebene aktive Schutzimpfung gegen Diphtherie mit einem Gemisch von Serum und Gift, die neuerdings besonders in Amerika in großem Stile erfolgreich durchgeführt worden ist und bei uns noch viel zu wenig Beachtung gefunden hat. Auch gegen unseren Erbfeind, die Tuberkulose hat neuerdings Calmette eine Schutzimpfung angegeben, indem durch Galle abgeschwächte Rindertuberkelbazillen Säuglingen und jungen Kälbern eingespritzt oder mit der Milch eingegeben werden. Tierversuche an Affen und Rindern gaben ihm die experimentelle Grundlage, die meiner Ansicht nach allerdings noch nicht genügend gesichert erscheint. Wenn meine mit einer weniger abgeschwächten Kultur vorgenommenen Versuche an Kälbern ein günstiges Ergebnis nicht erzielt haben, so werden die weiteren zur Zeit mit Mitteln der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft im Gange befindlichen vergleichenden Kälberversuche zeigen, was wir von dieser Schutzimpfung im Kampfe gegen die Tuberkulose zu halten haben. Ohne Zweifel muß, wie ich immer betont habe, bei der Rindertuberkulose, also beim Tierversuch der Hebel ange-setzt werden, wenn wir Fortschritte auch für den Menschen erzielen wollen.

Trotzdem die Immunitätswissenschaft uns im Kampfe gegen die Seuchen so ausgezeichnete Schutz- und Heilstoffe geliefert hat, sind die auf sie gesetzten Hoffnungen, wie schon angedeutet, längst nicht alle erfüllt worden. Die Produktion von Schutz- und Heilstoffen läßt bei vielen, besonders aber chronischen Infektionskrankheiten zu wünschen übrig, oder verfaßt ganz, so z. B. bei Trypanosomenkrankheiten, zu denen die Beshälieuche und die afrikanische Schlafkrankheit gehören und auch bei der Syphilis, Krankheiten, die durch einzellige tierische Lebewesen, d. h. durch Protozoen hervorgerufen werden. In diesem Falle müssen wir versuchen, die

Parasiten ohne Schädigung des Organismus durch chemische Mittel im Körper abzutöten. Daß das bis zu einem gewissen Grade möglich ist, ist allbekannt. Ich brauche nur an die Chininbehandlung bei Wechselfieber und die Quecksilber- und Jodbehandlung bei der Syphilis zu erinnern. Aber alle diese Mittel sind der rohen Empirie entsprungen.

Auf der Suche nach Heilmitteln war man auf das Herumprobieren am Menschen angewiesen. Erst als es gelungen war, die betreffenden Infektionserreger auf Laboratoriumstiere zu übertragen, war es möglich, die verschiedenen Mittel zu erproben und ihre Wirkung klinisch und mikroskopisch zu verfolgen. Das Tierexperiment bildet also die Grundlage für die gesamte moderne Chemotherapie.

Nichts kann Ihnen das besser vor Augen führen als die Geschichte der modernen Heilbehandlung der Syphilis, zu der meine Arbeiten die experimentelle Grundlage gelegt haben.

Auf Grund der günstigen Ergebnisse, die vor allem Robert Koch mit dem organischen Arsenpräparat, dem Atoxyl bei der Schlafkrankheit erzielt hatte, habe ich zunächst bei einer anderen Trypanosomenkrankheit, der Befschälfeuche der Pferde, an Ratten, Mäusen und Kaninchen gezeigt, daß man diese Tiere restlos heilen kann. Unter Berücksichtigung der nahen Verwandtschaft der Trypanosomen mit den Spirochaeten machte ich ähnliche Versuche bei der Spirillose der Hühner (mit Groß und Bickel). Hier gelang es die in ungeheuren Mengen im Blut kreisenden Spirochaeten durch Atoxyl zu beseitigen und die Tiere, die sonst dem sicheren Tode verfallen waren, zu heilen und sogar den Ausbruch der Krankheit zu verhüten. Ähnliche günstige Resultate erzielte ich beim europäischen Rückfallfieber (Glaubermann), nachdem es mir gelungen war, die Spirochaeten auf Mäuse und Ratten zu übertragen (mit Haendel). Im Mittelpunkt des Interesses stand natürlich die klassische Spirochaetenkrankheit, die Syphilis. Vorversuche an syphilitisch gemachten Affen (nach Metschnikoff und Roux) zeigten eine eklatante Wirkung (mit Hoffmann). Da aber die Affensyphilis keineswegs dem Krankheitsbild der menschlichen Syphilis entsprach und diese Versuche an Affen im Laboratorium schwer durchführbar sind, habe ich zunächst in umfangreichen Experimenten versucht, die Syphilis auf Kaninchen zu übertragen. Nachdem mir das mit meinem Mitarbeiter Mulzer gelungen war und wir die Syphilis von Kaninchen zu Kaninchen mit allen typischen Erscheinungen der menschlichen Syphilis regelmäßig übertragen konnten, haben wir solche Tiere durch Einspritzung von Atoxyl vollkommen geheilt und konnten dann auch beim Menschen selbst (Hoffmann) günstige Ergebnisse erzielen. Durch eine Kombination mit Quecksilber — atoxylsaures Hg. — (mit Manteufel) konnten diese Resultate noch wesentlich verbessert werden. Nachdem durch diese Tierversuche (in den Jahren 1906 bis 1909) die experimentelle Grundlage für die Arsenbehandlung der Syphilis durch mich gelegt war, hat Ehrlich aus dem Atoxyl dessen Konstitutionsformel er mit Bertheim richtig erkannt, durch chemische Modellierung bekanntlich das noch wirksamere Salvarsan (1910) hergestellt, das er in gleicher Weise an solchen syphilitischen Tieren ausgewertet hat und das sich auch weiterhin bei Rückfallfieber, der tropischen Framboesie und auch der ätiologisch noch unklaren Brustfeuche der Pferde ausgezeichnet bewährt hat.

Und es werden auch heute alle diese und andere Salvarsanpräparate vor Abgabe im Tierversuch nach besonderen Methoden staatlich geprüft (Kolle).

So hat sich der Tierversuch am Kaninchen,

das auch für Untersuchungen über Immunität und Vererbung der Syphilis sowie zum Nachweis der Syphiliserreger im menschlichen Körper von mir und meinen Mitarbeitern (Mulzer, Großmann) mit Vorteil herangezogen wurde, für den Menschen als unentbehrlich erwiesen, und wenn in letzter Zeit von hervorragenden Dermatologen in fast allen Kulturländern ein hocheifriger Rückgang der Syphilis auf die allgemeine Anwendung des Salvarsans zurückgeführt wird, so verdanken wir den für die Volksgesundheit so gewaltigen Fortschritt diesen systematisch durchgeführten Versuchen am Kaninchen.

Wie das Arsen, so haben sich nach den bekannten Arbeiten von Ehrlich unter anderem auch zahlreiche Farbstoffe, besonders bei Trypanosomeninfektionen mehr oder weniger wirksam erwiesen. Ich habe dann bestimmte organische Antimonpräparate (Stibenyl, Stibosan, Antimosan) bei Spirochaeten- und Trypanosomenkrankheiten im Tierversuch wirksam gefunden (Uhlenhuth, Kuhn, Schmidt und Seiffert) und sie haben sich auch bei zahlreichen Tropenkrankheiten (Bilharziosis, Leishmaniosis, venerisches Granulom) ausgezeichnet bewährt.

Auch gelang es uns neuerdings (mit Seiffert und Hermann) bestimmte Wismutpräparate aufzufinden, die bei der Weil'schen Krankheit der Meerschweinchen heilend wirken, so daß auch ihre Anwendung beim Menschen Erfolg verspricht.

Ich erinnere ferner an das von den Farbenfabriken in Elberfeld hergestellte Mittel gegen die gefürchtete Schlafkrankheit, das Germanin (Bayer 205), das nach den Berichten von Kleine geradezu biblische Heilungen erzielt haben soll. Auch bei bestimmten tropischen Trypanosomenkrankheiten der Rinder und der Pferde sowie der Kamele (Zeiss) im Südosten von Rußland sind mit diesem Mittel z. T. in Kombination mit den genannten Antimonpräparaten glänzende Erfolge erzielt worden. Auch das jüngste Präparat chemotherapeutischer Forschung, das Plasmochin, ein Derivat aus der Chinolingrouppe, dessen Wirksamkeit zunächst bei der Vogelmalária festgestellt wurde, scheint berufen zu sein, bei der Bekämpfung besonders der tropischen Malaria, deren halbmondförmige Geschlechtsformen es im Gegensatz zum Chinin im Blute zum Verschwinden bringt, außerordentlich wichtige Dienste zu leisten (Mühlens u. a.).

So basiert das Problem der Kolonisation und der Entwicklung der Landwirtschaft und Viehzucht in den Kolonien letzten Endes auf den durch das Tierexperiment erzielten Erfolgen deutscher chemotherapeutischer Forschung, und es entbehrt nicht der Tragik, daß Deutsche diese wichtigen Entdeckungen gemacht haben, gerade in einer Zeit, wo wir unsere Kolonien verloren haben.

So hat sich diese junge auf dem Tierversuch aufbauende Wissenschaft der Chemotherapie bereits unendlich segensreich erwiesen und es ist meine feste Überzeugung, daß das Problem der Heilung zahlreicher bakterieller Krankheiten wie Tuberkulose, Typhus, Blutvergiftung (und auch des Krebses), bei denen die Schutz- und Heilimpfung verlagert — wenn überhaupt — nur auf chemotherapeutischem Wege gelöst werden kann. Ansätze sind vorhanden (Morgenroth u. a.). Die Chemotherapie ist die Wissenschaft der unbegrenzten Möglichkeiten. —

Nur in großen Umrissen und an einigen eklatanten Beispielen konnte ich Ihnen zeigen, welche gewaltige Fortschritte die tierexperimentelle Forschung in der Erkenntnis des Wesens, der Diagnose und der Bekämpfung der Menschen- und Tierseuchen angebahnt und welchen Nutzen sie der Hygiene auch sonst

gebracht hat. Und ähnlich liegen die Verhältnisse auch auf anderen Gebieten der Medizin, Veterinärmedizin und Naturwissenschaften.

Wenn es mir vergönnt war, selbst dazu einige Beiträge zu liefern, so verdanke ich das nicht zum wenigsten meinen großen Lehrern Robert Koch und Friedrich Löffler, von denen der eine durch zähe Energie und unerbittliche Kritik, der andere zugleich durch kühnen Optimismus mich für die experimentelle Forschung wahrhaft begeistert haben. Und diese Begeisterung leitet mich auch heute noch! Gibt es denn ein erhabeneres Ziel für menschliches Streben, als Mittel und Wege zu finden, um die Leiden der Menschheit zu vermindern? Ist nicht Heilen das höchste Ziel aller medizinischen Forschung? (Oppolzer.) Ohne solchen Idealismus ist das mühsame und an Mißerfolgen, Enttäuschungen und Anfeindungen so reiche Leben des Forschers wenig erfreulich. Solche Anfeindungen entspringen nicht nur der menschlichen Schwäche mißgünstiger Fachgenossen, sondern sie gehen auch aus von Leuten, die in Unwissenheit und Verblendung die so segensreiche Tätigkeit der Forschung unter dem ominösen Schlagwort „Vivisektion“ als unnütze „wissenschaftliche Tierfolter“ hinstellen und sie, wie noch kürzlich im Kanton Zürich gesetzlich verbieten wollen. Unter der erdrückenden Wucht der von mir vorgebrachten Tatsachen müßte die Stimme dieser Leute eigentlich verstummen.

Das Tier — unter fachgemäßer Anwendung der Narkose — nach Möglichkeit vor Schmerzen und Qualen zu schützen, ist für den Forscher oberstes Gesetz und entspricht der Würde des Menschen und des Arztes. Aber das Tier muß er unter Umständen opfern, um dem Menschen Rettung zu bringen, denn das Tier ist nach sittlicher und göttlicher Ordnung um des Menschen willen da und unsittlich würde der Arzt handeln, wenn er sich den Weg zum Heilen dadurch versperren würde, daß er auf ein Leiden des Tieres verzichtet (Ludwig Köhler, Professor der Theologie an der Universität Zürich).

Wo wären wir heute, wenn wir nur auf die Ergebnisse der Tierexperimente verzichten sollten, die ich Ihnen soeben vorgetragen habe? Daher vorwärts auf der beschrittenen Bahn!

Wir müssen uns bemühen, von Grund auf Neues zu schaffen, nicht nur auf unserem Spezial-Gebiete, sondern auf allen Gebieten der Wissenschaft. Damit aber der altbewährte Ruf der deutschen Wissenschaft, dem wir unsere Führerstellung in der Welt verdanken, erhalten bleibt, brauchen wir Geld und mit reichen Mitteln ausgestattete Institute. In richtiger Würdigung dieser Tatsache hat das Reich in Verbindung mit der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft und der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft diesen so überaus segensreichen Einrichtungen — die Werkstätten der deutschen Forschung auf den verschiedensten Gebieten der Wirtschaft und des Gesundheitswesens in der schlimmen Zeit der Inflation vor dem Untergange bewahrt. Und neue wurden mit ihrer Hilfe eingerichtet! Aber noch fehlt ein besonderes Forschungsinstitut, in dem die Waffen geschmiedet werden gegen die Tod und Verderben bringenden Seuchen der Menschen und Tiere. Man könnte ja auch geeignete Hochschulinstitute zu Forschungsinstituten er-

weitern, denn jetzt liegen an den Hochschulen manche wertvollen Kräfte brach, weil ihr Schaffensdrang und ihre Arbeitsfreude durch den Mangel an Mitteln gelähmt ist, und es ihnen in einer gewissen Zurückhaltung nicht liegt, sich solche mühsam zu beschaffen, die die Unterrichtsverwaltung bei dem besten Willen nicht aufbringen kann. In dieser Beziehung hat die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft unter der bewährten Leitung von Exzellenz Schmidt-Ott bereits Großes geleistet, was ich dankbar auch hier zum Ausdruck bringen möchte. Stets sollte bedacht werden, daß der Aufwand des Staates und des Reiches für die Wissenschaft immer nur verschwindend klein ist im Vergleich zu dem Nutzen, den die wissenschaftliche Forschung an den Hochschulen durch ihre großen Entdeckungen in den letzten Jahrzehnten gebracht hat. Kein Geld kann nutzbringender für das allgemeine Beste angelegt werden als das, was für wahre wissenschaftliche Forschung verwendet wird. (Pettenkofer.) Es ist die beste Kapitalanlage nicht nur im Interesse der Wirtschaft, sondern auch im Interesse der Gesundheit des Volkes.

Ausschlaggebend für die Wissenschaft sind aber nicht allein die Mittel, sondern die Persönlichkeiten. Und wie der Staat darauf bedacht sein muß, sich Männer für die wissenschaftliche Forschung arbeitsfreudig zu erhalten, so muß es auch die Aufgabe der Forschungsinstitute an den Hochschulen sein, unter dem jungen Nachwuchs für die wissenschaftliche Forschung geeignete Männer auszuwählen und heranzubilden.

Und ganz allgemein braucht unsere Jugend mehr denn je die Geistesdisziplin und den moralischen und idealen Erziehungswert der wissenschaftlichen Forschung unserer Hochschulen. Ihres Lebens und ihrer Kraft soll sie einen Hauch verspüren. Sie soll lernen, zu dem in rastloser Forscherarbeit mühsam Errungenem in Achtung und Ehrfurcht emporzuschauen und es als heiliges Vermächtnis zu ehren und zu pflegen. Sie soll auch an sich selbst erfahren, daß wahrhaft wissenschaftliche Forschung vielfach auf Irrwegen durch die Finsternis zum Sonnenlicht der Wahrheit führt. Und „die Wahrheit wird sie frei machen“.

So ist die Wissenschaft berufen, wahrhaftige, aufrechte und charaktervolle Männer in ernster treuer Pflichterfüllung zu geistigen Führern des aufwachsenden Geschlechts heranzubilden und „den Boden zu bereiten, auf welchem mit geistiger Erkenntnis wahrhafte Gottesfurcht und Hingebung an das Gemeinwohl gedeiht.“ So wird die Pflege der Wissenschaft und Forschung zum Dienst am Vaterlande.

Möchten Human- und Veterinärmedizin, diese Schwesterwissenschaften — die, auf dem gleichen Boden wurzelnd, durch enge Wechselbeziehungen mit einander verbunden und auf einander angewiesen, den gleichen Zielen im Interesse der Volksgesundheit zustreben — in Erfüllung ihrer hohen idealen Aufgabe Schulter an Schulter marschieren! Eingedenk des Wahlversprechens, der in goldenen Lettern in dem Giebfeld meiner alten geliebten Kaiser Wilhelm-Universität Straßburg eingegraben ist und der auch Euch, liebe Kommilitonen, und uns allen als Leitstern unserer Lebensarbeit voranleuchten möge:

„Literis et patriae.“

Der Wissenschaft und dem Vaterlande
sei unser Lebengeweiht!

Innere Medizin und Chirurgie.

Claasz, M.: Die unterchlorige Säure und ihre Verwendung in der Wundasepsis. (Fortchr. der Therapie 1926, Jg. 2, Heft 14, S. 449—454.)

Pantosept und Chloramin sind in festem Zustande, wenn vor Feuchtigkeit geschützt, dauernd haltbar; Pantoseptlösungen sind in jeder Konzentration bis zu 4 Monaten unverändert haltbar. Chloraminlösungen haben eine geringere Haltbarkeit als die Dakinlösung, besonders in gebrauchts-

fertiger Stärke; solche von 2 : 1000 zeigen in 1—8 Wochen eine Abnahme von 2, 3 bis 37 Prozent Chlor. Die bakterizide Kraft des Pantosepts ist fast doppelt so groß als die des Chloramins. Es ist selbst in ¼prozentiger Lösung vollkommen reizlos, Chloramin derselben Stärke reizt und verursacht Brennen. Pantosept ist ein anerkannt mildes, dabei sicheres Antiseptikum, ohne jeden, auch den geringsten, schädigenden Einfluß auf Haut und Gewebe. Chloramin ist zur Händedesinfektion nicht geeignet, weil es bei längerem Gebrauche die Haut angreift. A.

Blume: Demonstration einer paradoxen Atropinwirkung an der Katze. (Sitzung der Niederrheinischen Gesellschaft f. Natur- und Heilkunde vom 7. März 1927.) (Medizinische Klinik 1927, Nr. 28, S. 1085—1086.)

Bei der Einträufelung einer schwachen Atropinlösung ins Auge einer Katze gelangte ein Tropfen ins Maul und bald darauf zeigte sich nach einigen Schluckbewegungen eine deutlich vermehrte Speichelsekretion, die einige Minuten anhielt und sich durch Herabhängen von langen Speichelfäden aus dem Maule kennzeichnete. Aus den weiteren Versuchen ging deutlich hervor, daß die vermehrte Speichelsekretion nach oraler Applikation von Atropin entgegen der Ansicht von Metzner eine spezifische Atropinwirkung darstellt, und nicht etwa durch den bitteren Geschmack dieser Substanz bedingt wird. A.

Kionka, H. und M. Haufe: Untersuchungen über den Alkohol. V. Mitteilung: Die Ausscheidung des Alkohols durch die Nieren. (Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Jena.) (Naunyn-Schmiedebergs Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1928, 128. Bd., S. 150—164.)

Die Verff. haben die Frage, ob nach Alkoholgenuß Alkohol im Harn nachzuweisen ist, und in welchem Verhältnis dieser durch die Nieren ausgeschiedene Anteil zu dem aufgenommenen Alkohol steht, dadurch zu entscheiden gesucht, daß sie die Beziehungen des Alkoholspiegels des Blutes zu der im Harn zur Ausscheidung kommenden Menge ermittelten. Mit steigender Diurese steigen die Ausscheidungen an absoluten Alkoholmengen, ohne daß eine Beziehung zwischen den Harnmengen und den darin enthaltenen Alkoholmengen festzustellen ist. Diese sind minimal und betragen 0,041 bis 1,9324 Prozent der eingeführten Mengen. Der Alkoholgehalt des Harnes geht mit der des Blutes nicht parallel, es besteht auch keine andere Gesetzmäßigkeit, wonach man rückläufig durch Bestimmung des Alkohol-Gehaltes im Harn ein Urteil über den Alkohol-Gehalt des Blutes gewinnen könnte. Wenn von den Nieren Alkohol durch den Harn ausgeschieden werden soll, muß der Blutalkoholgehalt einen gewissen Schwellenwert erreicht haben. R. Völker.

v. Issekutz, B. und v. Leinzinger, M.: Über die pharmakologische Wertbestimmung des Mutterkorns. I. Mitteilung. (Mit 1 Abbildung und 1 Kurve.) (Aus dem Pharmakologischen Institut der königlich ungarischen Universität Szeged.) (Naunyn-Schmiedebergs Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1928, 128. Bd., S. 165—172.)

Zur Bestimmung des Mutterkorns wird zweckmäßig die spezifische Ergotoxinwirkung verwendet. Diese wurde früher lediglich durch die eigentümliche Wirkung auf den Hahnenkamm festgestellt. Neuerdings wird die antagonistische Wirkung der Mutterkornalkaloide dem Adrenalin gegenüber angewendet. Die Verff. haben den Adrenalin-Ergotaminantagonismus mit der üblichen Magnus-Methode an überlebenden, isolierten Kaninchendärmen untersucht. Die Methode ist zum Messen der Wirkung des Mutterkornextraktes nicht geeignet, es müssen vielmehr aus dem Mutterkorn die gesamten Alkaloide hergestellt werden. Die Wirksamkeit dieser Alkaloidmischung ist meßbar. Der Ergotamin hemmt an isolierten Kaninchendarmstücken die Adrenalinwirkung. R. Völker.

v. Leinzinger, M. und v. Kelemen, J.: Über die pharmakologische Wertbestimmung des Mutterkorns. II. Mitteilung. (Aus dem Pharmakologischen Institut der königlich ungarischen Universität Szeged.) (Naunyn-Schmiedebergs Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1928, 128. Bd., S. 173—178.)

Mittels der Keller-Frome'schen Methode wird der Alkaloidgehalt Drogen verschiedener Herkunft bestimmt, die Wirksamkeit der erhaltenen Alkaloidmischungen mit Ergotamin verglichen. Da die Alkaloidmischung in jedem Falle eben so wirksam ist wie das Ergotamin, so genügt zur Wertbestimmung des Mutterkorns diese Bestimmung des Alkaloidgehaltes vollkommen; die viel schwierigere und kompliziertere pharmakologische Wertbestimmung scheint daher nicht notwendig zu sein. R. Völker.

Bertram, Ferd.: Zur Pharmakologie des Lobelins. (Mit 8 Abbildungen.) (Aus dem Pharmakologischen Institut der Hamburgischen Universität, Krankenhaus St. Georg.) (Naunyn-Schmiedebergs Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1928, 128. Bd., S. 179—191.)

Lobelin erregt bekanntlich in kleinen Dosen das Atemzentrum, lähmt nach großen Dosen das Atemzentrum und erregt den Vagus Kern. Neben diesen bekannten zentralen Wirkungen zeigt das Lobelinum hydrochloricum cristallissimum („Ingelheim“) andere periphere Wirkung. Durch Blutzuckeruntersuchung wird festgestellt, daß das Lobelin am Gesamtorganismus in kleinen Dosen in der Hauptsache als Sympathicusgift, in großen Dosen als Parasympathicusgift wirkt. R. Völker.

Annau, Ernö und Hergloz, Jenö: Über Resorptionsförderung und Potenzierung der Alkaloide und Salze durch Saponine. (Aus dem Pharmakologischen Institut der Königlich Ungarischen „Pázmány Péter“-Universität in Budapest.) (Naunyn-Schmiedebergs Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1927, 127. Bd., 1/2. Heft, S. 93—101.)

Zum Beweis der resorptionsfördernden und permeabilitätssteigernden Wirkung der Saponine wurden Versuche mit Strychnin, Kurare, Pitrotoxin, Morphin, Kokain und Magnesiumchlorid angestellt. Das Saponin wurde immer auf einem anderen Wege, intravenös, gegeben, wie die anderen gereichten Gifte, damit nicht durch die gemeinschaftliche Eintrittspforte eine gegenseitige Beeinflussung stattfände. Aus den Befunden ergibt sich, daß das Saponin nicht nur eine resorptionsfördernde, sondern auch eine potenzierende Wirkung besitzt. Diese Wirkung ist dadurch zu erklären, daß die Saponine als allgemeine Zellgifte durch das Angreifen des Cholesterin- und Lezithingleichgewichtes der Zellmembranen dort den gesteigerten Durchgang solcher Stoffe begünstigen, die beim normalen Tiere und in subtoxischer Konzentration nicht zur Geltung gelangen. R. Völker.

Bornstein, A.: Über die Wirkung des Adrenalins auf die Oxydationsprozesse. (Aus dem Pharmakologischen Institut der Hamburgischen Universität, Krankenhaus St. Georg.) (Naunyn-Schmiedebergs Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1927, 127. Bd., 1/2. Heft, S. 63—68.)

Nach Versuchen von Abderhalden und Gellhorn wurde an Organteilen unter der Einwirkung von Adrenalin im Barcroft'schen Apparat regelmäßig eine Erhöhung des O₂-Verbrauches gefunden, während Hari an kurarisierten Hunden eine Steigerung des Grundumsatzes nicht beobachten konnte. An zwei Zellsystemen, an defibrinierten Gänseblut und der überlähmenden Hundextremität wurde der Sauerstoffverbrauch nach Zusatz von Adrenalin gemessen; er wurde in beiden nicht geändert. Der Grundumsatz des kurarisierten Hundes konnte durch intraperitoneale Adrenalininjektion nicht beeinflusst werden, er stieg beim normalen Hunde sehr stark an. Die Erhöhung des Grundumsatzes, die beim normalen Menschen und Hunde nach Adrenalin regelmäßig zu beobachten ist, ist nicht auf eine primäre Oxydationssteigerung, sondern auf erhöhte Erregbarkeit der Muskulatur und Muskelzittern und daraus folgende sekundäre Oxydationssteigerung zurückzuführen. R. Völker.

Virchow: Über die Wirkung des Chinins auf den respiratorischen Stoffwechsel des Menschen. (Aus d. Medizinischen Klinik in Heidelberg.) (Naunyn-Schmiedebergs Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1927, 127. Bd., 1./2. Heft, S. 28—34.)

Antipyretisch wirkende Arzneimittel lassen die Wärmebildung sinken und die Wärmeabgabe steigen. Die beiden Vorgänge, deren Stärkeverhältnis verschieden sein kann, sind in der Regel miteinander verbunden und vereinigen sich zur Erreichung der Endwirkung, die in der Annäherung der im Fieber erhöhten Eigenwärme an die Norm besteht. Verf. hat an gefundenen und kranken Menschen den Einfluß des Chinins auf den respiratorischen Stoffwechsel untersucht. Durch Chininsalze kann an Kranken die Eigenwärme herabgesetzt werden. Hierbei sinkt auch der Energieverbrauch. Ein grundsätzlicher Unterschied der Chinin- und Antipyrinwirkung hinsichtlich des Einflusses auf die die Wärme regulierenden Apparate läßt sich nicht feststellen. Für die reine Aufgabe der Entfieberung und der Beruhigung des Kranken ist das Pyramidon dem Chinin vorzuziehen, weil es schneller und sicherer wirkt, besser dosierbar und für das Nervensystem des Kranken angenehmer ist.

R. Völker.

Mascherpa, P.: Die Giftwirkung des Morphins und seine gastrointestinale Ausscheidung. (Aus dem Institut für Pharmakologie zu Genua.) (Naunyn-Schmiedebergs Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1927, 127. Bd., 1./2. Heft, S. 17—27.)

Der wichtigste Weg, durch welche das Morphin zur Ausscheidung gelangt, ist neben der Niere (39 Prozent) der Magen-Darmtraktus. Verf. hat Untersuchungen unternommen, um festzustellen, ob die Giftigkeit des Morphins zunehme, wenn seine Ausscheidung durch die Magen-Darmschleimhaut gehemmt oder gar total unterbunden wird. Das Nickel wird hauptsächlich durch den Darm ausgeschieden; während dieses Vorganges ist dieser Weg für das Morphin fast vollständig gesperrt. Das auf diese Weise im Organismus zurückgehaltene Morphin lokalisiert sich in größeren Mengen im Gehirn und entfaltet nun eine Giftwirkung, die bedeutend erheblicher ist als sonst; in diesen Fällen führen Dosen, die nicht einmal als giftig bezeichnet werden können, zu letalen Erscheinungen. Eine vikariierende Ausscheidungsfunktion des Magens gibt es somit nicht. Diese Befunde haben die praktische Bedeutung, daß kombinierte Arzneimittel variieren können, wenn ihre Bestandteile dieselben Ausscheidungswege im Organismus benutzen. R. Völker.

Frank, E., M. Nothmann und E. Hartmann: Chemische und mikroskopische Untersuchungen über das Verhalten des Glykogens in der Leber unter der Einwirkung des Insulins. (Aus der Medizin. Universitäts-Klinik Breslau.) (Naunyn-Schmiedebergs Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1927, 127. Bd., 1./2. Heft, S. 35—46.)

Kaninchen, die 4—6 Tage gehungert haben, zeigen einen Glykogengehalt der Leber unter 0,2 Prozent. Behandelt man diese Tiere mit Insulindosen, die zwar eine Senkung des Blutzuckers hervorrufen, aber nicht zu Krämpfen führen, so werden in der Leber nicht unbeachtliche Mengen von Glykogen angereichert. Mit dem chemischen Befunde stimmten histologische, die nach einer besonderen Methode (Hartmann) gewonnen wurden, überein. Das Glykogen lagerte nicht nur in Schollen, sondern oft auch diffus in den Leberzellen. Nach der Peripherie des Leberlappens nimmt der Gehalt der Zellen an Glykogen ab. Das in der Hungerleber gebildete Glykogen kann nur aus Eiweiß stammen; die Theorien, welche dem Insulin eine Hemmung der Glukoneogenie (Laufberger) zuschreiben, werden abgelehnt. Beim normalen Tiere speichert das Insulin den Zucker wie beim pankreaslosen Tiere, es besteht also kein Gegensatz zwischen der Insulinwirkung beim normalen und Pankreasdiabetischen Hunde.

R. Völker.

Brugsch, Theodor, Melanie Cahen, Hans Horsters u. Hans Rothmann. Ödem-Studien. (Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Berlin.) (Naunyn-Schmiedebergs Archiv für exp. Pathol. und Pharmakologie 1927, 127. Bd., 1./2. Heft, S. 6—16.)

Grüne Pflanzen oder lebensfrisches Gewebe wahren eine relative Formbeständigkeit, die auf dem durch osmotischen bzw. durch Quellungsdruck mit Hilfe semipermeabler Membranen regulierten Wasserbestand beruhen. Diese Flüssigkeitsspannung liegt der „Turgeszens“ der Gewebe zugrunde. Diese Turgeszens ist bei pflanzlichen wie tierischen (Kaltblüter) Geweben von dem osmotischen Drucke unter Berücksichtigung der elektrolytischen Dissoziation abhängig, wobei die Beeinflussung semipermeabler Membranen möglicherweise in Frage kommt. Der lebende Frosch reguliert im Wasser osmotisch seine Turgeszens, während der tote Frosch ödematös im Wasser wird. Diese Wasserregulation am lebenden Frosch ist unabhängig vom Nervensystem und wird durch Kreislauf und Niere bewirkt. Neben der Intaktheit der Niere ist die venöse Strombahn zum Herzen notwendig für die Beseitigung vom Ödem.

R. Völker.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Bielkevicius, J.: Intrapleurale oder Litauische Methode der Immunisation. (Aus dem Staatlichen Litauischen Veterinär-Bakteriologischen Laboratorium in Kaunas.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 4, S. 239.)

Zur Herstellung der Schutz- und Heilsera finden in der Regel die subkutane und intravenöse, seltener die intraperitoneale, intrakutane, intramuskuläre und intrapulmonale Impfmethode Verwendung. Verf. stellte sich die Aufgabe, durch Einverleibung des Antigens in die Brusthöhle, zwischen beide Pleurablätter, die Serumtiere zu immunisieren. Er benutzte hierzu vier Pferde, von denen drei intrapleural, das vierte des Vergleichs wegen intravenös behandelt wurden. Als Antigen verwandte er virulente Schweinerotlaufbazillen in Bouillonkultur. Nach seinen Ergebnissen läßt sich die intrapleurale Methode der Immunisierung, jedenfalls beim Schweinerotlauf, gleich den anderen gebräuchlichen Methoden in der Praxis anwenden. Sie ist technisch ebenso leicht ausführbar wie die intraperitoneale, intravenöse oder intrapulmonale Methode. Bei der intrapleuralen Methode ist zwar nach Einverleibung von Rotlaufbouillonkultur die allgemeine Reaktion viel heftiger als bei der intravenösen, aber die Anhäufung der Antikörper erfolgt hier schneller und ist mit kleineren Mengen des Impfstoffes zu erzielen. Da der Impfstoff bei der intrapleuralen Methode nicht unmittelbar, sondern auf dem Wege über die Brusthöhle in die Blutbahn gelangt, scheint die Methode für die Serumtiere weniger gefährlich zu sein als die im Gebrauch befindliche intravenöse Methode. Ziegler.

Brandt, A.: Beiträge zur Frage des Vorkommens von Virusträgern (sog. „Dauerauscheidern“) bei der Maul- und Klauenseuche. I. Experimentelle Untersuchungen über die Infektiosität der Klauen der von Maul- und Klauenseuche genesenen Tiere. (Aus der Staatl. Forschungsanstalt Infel Riems. — Direktor: Prof. Dr. O. Waldmann.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 4, S. 306.)

Brandt hat in ausgedehnten experimentellen Versuchen (an Meerfischweinen, Ochsen und Schweinen) die praktisch sehr wichtige Frage zu lösen versucht, ob die Klauen durchseuchter Tiere kürzere oder längere Zeit nach der Seuche noch infektiös sein können. Seine Ergebnisse sind folgende: Die Frage, ob sich das Virus in den Klauen durchgefeuhter Rinder konservieren kann, muß auf Grund der eigenen Versuche im negativen Sinne beantwortet werden. Doch zieht Verf. aus dem

Vergleich seiner Verfluche mit denjenigen anderer Autoren den Schluß, daß durchgefeuchte Rinder in sehr seltenen Fällen Klauenfeuchtevirusräuber sein können. Ihre Zahl ist jedoch viel kleiner als allgemein angenommen wird. Der Beweis für die Richtigkeit der Hypothese von der Konservierung des Maul- und Klauenfeuchtevirus im Klauenhorn ist bisher noch nicht einwandfrei erbracht. Wahrscheinlich persistiert das Virus in den an den Klauen und in den Doppelfohlen haftenden Unreinlichkeiten. Veterinärpolizeilich sind gründliche Reinigung, Ausschneidung und Desinfektion der Klauen sowie peinlichste Entfernung aller Unreinlichkeiten notwendig. Ziegler.

Reinigung und Desinfektion von Kraftwagen zur Beförderung von lebenden Tieren. Zu V 7806 MfL.

Auf Grund der §§ 17 Nr. 11, 78 und 79 Abs. 2 des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) wird für den Umfang des Preussischen Staatsgebietes hiermit folgendes angeordnet:

1. Viehhändler, Kommissionäre, Viehverwertungs-Genossenschaften, Großschlächter und Transportunternehmer, die Klauenvieh oder Geflügel gewerbsmäßig mit Kraftwagen befördern wollen, haben dies der Ortspolizeibehörde anzuzeigen.
2. Die zum Viehtransport verwendeten Kraft- und Anhängewagen müssen möglichst undurchlässige Böden und Wände haben, die jegliches Herausfallen oder Herausfließen von Streu, Kot und Urin aus den Wagen während des Transportes verhindern. Die Wagen sollen so eingerichtet sein, daß die zu befördernden Tiere mit den Köpfen nicht darüber hinwegkommen können. Die Verwendung von Wagen mit Lattenauffätzen ist zulässig, sofern der untere Teil der Wagenwände wenigstens bis zu einer Höhe von 1 m dichtgefugt ist. Die Innenwände sind mit einem haltbaren und leicht zu reinigenden Anstrich zu versehen.
3. Kraftwagen nebst Anhängewagen, die zur Beförderung von Klauenvieh und Geflügel benutzt worden sind, sind nach jedesmaligem Gebrauch zu reinigen und verschärft zu desinfizieren (zu vergl. Ziff. 6). Der Regierungspräsident (Polizeipräsident) kann nach Anhörung des beamteten Tierarztes Ausnahmen zulassen. Er kann auch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von der Reinigung und Desinfektion nach jedesmaligem Gebrauch abgesehen werden kann.
4. Der Wagenhalter haftet für die Ausführung der Reinigung und Desinfektion und trägt deren Kosten.
5. Die Reinigung und Desinfektion hat alsbald, spätestens 24 Stunden nach der Entladung zu erfolgen. Die für die Vornahme der Desinfektion bestimmten Örtlichkeiten müssen undurchlässige Fußböden und gute Abflußmöglichkeiten besitzen, um das bei der Reinigung abfließende Schmutzwasser zur Unschädlichmachung in einer Grube sammeln oder unschädlich ableiten zu können.
6. Die Reinigung und Desinfektion der Kraftwagen, der etwa benutzten Anhängewagen und der dazu gehörigen Geräte erfolgt nach den für die verschärft Reinigung und Desinfektion der Eisenbahnwagenvagen geltenden Bestimmungen.
7. Soweit die Desinfektion in Schlachthöfen vorgenommen wird, kann die Aufsicht einem Beamten des Schlachthofes übertragen werden, erfolgt sie an anderer Stelle, so sind im Benehmen mit dem zuständig beamteten Tierarzt von der Ortspolizeibehörde besondere Beamte mit der Aufsicht zu betrauen. Die Ortspolizeibehörde und der beamtete Tierarzt sind jederzeit befugt, sich über die Desinfektionsarbeiten zu unterrichten.
8. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung unterliegen den Strafvorschriften in §§ 74 ff. des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzbl. S. 519).
9. Die Verordnung tritt mit Ausnahme der Vorschrift in Ziffer 2 am 1. Januar 1929 in Kraft. Über die Inkraftsetzung der Ziff. 2 erfolgt besondere Anordnung.

Berlin, den 15. September 1928.

Der Preussische Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Nahrungsmittelhygiene.

Verfammlung der Vereinigung der städtischen Milchgroßbetriebe Deutschlands E. V.

Die Vereinigung tagte am 30. August und 1. September d. Js. in Dresden. Nach den Ausführungen des Vorsitzenden, Direktor Reuter-Dresden, sind die Aufgaben der Vereinigung

1. die Wahrung und Förderung aller Bestrebungen, die der Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreier Milch und deren Erzeugnissen dienen;
2. die Vertretung aller gemeinsamen Interessen der in dem Verein zusammengefaßten Betriebe, insbesondere auf dem Gebiete der Gesetzgebung und Verwaltung.

Die grundsätzlichen Forderungen der Vereinigung an das Reichsmilchgesetz sind:

1. Einheitlichkeit der gesetzlichen Vorschriften für den Milchverkehr im ganzen Reiche.
2. Einheitliche und zweifelsfreie Begriffsbestimmungen für die in den Verkehr zu bringenden Milcharten und Milcherzeugnisse, wobei es dem Gesetzgeber überlassen wird, diese Begriffe entweder in dem Reichsmilchgesetz oder in den Ausführungsbestimmungen zum Lebensmittelgesetz festzulegen.
3. Aufnahme einer Reihe von Bestimmungen, die hinsichtlich der Milchgewinnung, der Milchbeförderung, der Milchverarbeitung und -Verteilung die Gewähr dafür bieten, daß die Bevölkerung nur mit einwandfreier, gefunder, krankheitsfreier Milch versorgt wird, daß aber andererseits die Wirtschaft nicht in ihren freien Entwicklung gehindert wird.

Die Vereinigung verfolgt dabei das Ziel, Rohmilch nur als Vorzugsmilch in den Verkehr zu bringen, während alle andere Konsummilch der schonenden Dauererhitzung unterworfen werden soll.

Geheimrat Bose-Berlin vom Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft sprach über „Die Bedeutung der Milchwirtschaft in der deutschen Volkswirtschaft und Maßnahmen zu ihrer Hebung“. Er erwähnte, daß das bestehende, vorwiegend die Handelserlaubnis regelnde Reichsmilchgesetz nur bis zum 30. März 1929 befristet sei und bis dahin das neue Reichsmilchgesetz erlassen werden müsse. Dieses werde ein Mantelgesetz sein. Es würde die Milchhandelserlaubnisfrage in dem Gesetz zu regeln sein, das außerdem Kontrollvorschriften für die Milch enthalten müsse. Die einzelnen Milcharten seien nach amerikanischem Vorbild etwa in geprüfte, ungeprüfte und pasteurisierte Milch zu klassifizieren. Scheinbar wird das Gesetz den größeren Städten als Kannvorschrift das Recht geben, für die Konsummilch, wie es auch seitens der Vereinigung beantragt ist, die Dauererhitzung vorzuschreiben. Dr. Heine-Duisburg referierte über „Die Behandlung der Milch mit ultravioletten Strahlen“ und stellte sich dabei auf den Standpunkt, daß nach den bisherigen Erfahrungen die ultraviolettbestrahlte Milch zweifellos als ausgezeichnetes Heilmittel gegen Rachitis anzusehen, ihre Herstellung aber vorwiegend Aufgabe der Heilanstalten sei, daß eine Bestrahlung der Molkereimilch zur Herbeiführung einer Rachitisprophylaxe erst dann in Aussicht genommen werden könne, wenn genügend Erfahrungen gesammelt und geeignete Apparate konstruiert seien.

Prof. Dr. Lichtenberger-Kiel sprach über „Betriebsstechnische Fortschritte im Molkereiwesen“ unter Anlehnung an die von ihm eingehend studierten amerikanischen Verhältnisse, Prof. Dr. Sommerfeld-Berlin über „Die Milch im Ernährungshaushalt und ihre Bedeutung für die Ernährung im Säuglings- und Kindesalter“, Frau Wagner-Wiesbaden über die „Forderungen der Verbraucher an die Milchversorgung“.

Hervorzuheben ist die Einmütigkeit, mit der sich die Verfammlung für die Pasteurisation der in die Städte gelieferten Konsummilch einsetzte, die in England längst durchgeführt ist. Bemerkenswert ist auch die Stellungnahme der Vereinigung zu der für erstrebenswert gehaltenen tierärztlichen Untersuchung aller zur Milchgewinnung benutzten Kühe, deren Beschränkung auf die Vorzugsmilch liefernden Stallungen zur Zeit aber für ratsam und allein erreichbar gehalten wurde. Die deutsche Milchindustrie ist von höchster volkswirtschaftlicher Bedeutung, repräsentiert doch die jährliche Milchproduktion einen erheblich höheren Wert wie die jährliche Kohlenförderung. Die deutschen Tierärzte werden gut tun, sich mit den Forderungen der deutschen Milchindustrie

vertraut zu machen und ihre Ziele zu fördern, soweit es im Bereiche ihrer Berufsaufgaben liegt.

Dr. Heine.

Hackenthal und Meyer: Enthält die Milch tuberkulös infizierter oder verdächtiger Wöchnerinnen Tuberkelbazillen? (Aus dem Institut „Robert Koch“. — Abteilung: Prof. Dr. Schilling.) (Zschr. für Hygiene 1928, 108, H. 4, S. 806.)

Im Gegensatz zu anderen Forschern konnten die Verf. in der Milch von 50 Wöchnerinnen, von denen 18 bei der Reaktion nach Pirquet positiv, sechs zweifelhaft reagierten, keine Tuberkelbazillen im Meerfischweinchinversuch nachweisen.

Ziegler.

Schupelius: Beitrag zur Beurteilung des Wassergehaltes im Fleisch, sowie in Fleisch- und Wurstwaren auf Grund der „Federschen Zahl“. (Aus dem Institut für Nahrungsmittelkunde der Tierärztlichen Hochschule Berlin. — Direktor: Prof. Dr. Bongert.) (T. R. 1928, S. 403.)

Verf. fand bei seinen Analysen durchweg höhere Zahlen, als sie Feder annimmt, dies ist namentlich für Schweinefleisch der Fall, bei welchem die Schwankungen zu groß sind, als daß sie sich in eine arithmetische Formel zwingen ließen. Verf. widerlegt die Feder'sche Hypothese der Wasserfreiheit des Fettgewebes. Die Anwendung der viel zu niedrigen Feder'schen Zahl verbietet sich daher bei der Beurteilung von Fleisch und Hackfleisch, und ist vollends bei Wurstwaren zu verwerfen.

K. H. Meyer.

Hock, M.: Zur Frage der multiplen Muskelblutungen beim Schweine. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jhg., S. 369/72.) (Mit 3 Abbildungen.)

Bei seinen Untersuchungen und Betrachtungen über die Entstehung und das Wesen der multiplen Muskelblutungen beim Schweine kommt Hock zu dem Schlusse, daß es sich um Blutungen per rhexin handelt; die infolge unzureichender Betäubung entstehen. Und zwar ebenso bei Betäubungen mit dem Hammer oder Schlagbolzenapparat wie bei solchen mit der Schlachtpistole; letzterenfalls wenn der Bolzen nicht ins Gehirn gedrungen, sondern daneben gegangen war und nur eine stauchend-prellende Wirkung hinterlassen hatte. Um die Blutungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, daß die Schweine unter Verwendung der Schlachtpistole betäubt und dabei eine stärkere Munition (Munition für kleine Rinder) verwendet, auch die Pistole so gehalten wird, daß der Bolzen in Richtung Hinterhauptsloch eindringt. Besondere Übung und Ruhe des Schießenden ist hierzu allerdings nötig.

Edelmann.

Hertha, Karl: Blutungen im Bauchfell der Schlachtpferde und ihre Entstehung. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 373/74.)

Im Bauchfell von Schlachtpferden finden sich häufig Blutungen, die große Ähnlichkeit mit denen haben, die wir als Begleitererscheinungen von Infektionskrankheiten antreffen. Das Peritoneum hat das Aussehen, als sei es mit einem in Blut getränkten Pinsel besprüht. Die Blutungen finden sich nur an den Stellen des Bauchfells, die mit einem dicken Fettpolster ausgestattet sind. Unter 124 von Hertha untersuchten Schlachtpferden waren 61 fette Tiere und von diesen 43 (66 Prozent) mit Hämorrhagien behaftet. Aus den weiteren Untersuchungen H.'s geht hervor, daß die Blutungen durch eine Zerreißung der Blutgefäße während des Schlachtens entstanden sind. Und zwar nur bei solchen Pferden, die beim Niederstürzen nach der Betäubung auf den Bauch oder dessen Seitenflächen gefallen sind. Die Stärke der Ausbreitung der Hämorrhagien richtet sich nach der Füllung des Darmkanals und den damit verbundenen Druckverhältnissen in der Bauchhöhle. Ob nicht vielleicht auch die Art der Betäubung bei der vorliegenden Frage eine Rolle spielt, scheint H. nicht geprüft zu haben.

Edelmann.

Danielsen: Über den Einfluß von Zwiebeln und Knoblauch auf das Wachstum von Bakterien in Würsten.

(Mitteilung aus dem Hygienischen Institut der Universität Rostock. — Vorstand: Prof. Dr. Wasielewski.) (Zschr. für Untersuchung der Lebensmittel 1928, H. 4, S. 291.)

Die Würste enthalten nach den Angaben von Schmidt und Siebert auf 100 Teile 0,12—3,2 Teile Zwiebeln; der Knoblauchgehalt ist gewichtsmäßig nicht bekannt, man kann ihn etwa mit 0,015—0,03 Prozent annehmen. Durch die Untersuchung sollte geklärt werden, ob durch den Zusatz von Knoblauch oder Zwiebel — zusammen werden Knoblauch und Zwiebel in keiner Wurst verwandt — in Würsten die Verarbeitung von nicht vollkommen einwandfreiem Fleisch, insbesondere von solchem, welches mit Bakterien in regelwidrig hohem Grade behaftet ist, verdeckt wird. Es handelt sich dabei nur um Wurstwaren, die aus rohem Fleisch hergestellt sind und nachher keine wesentlichen Veränderungen durch Kochen oder andere Maßnahmen erfahren haben, durch welche etwa vorhandene Keime unschädlich gemacht werden. Als solche in Wurstwaren vorkommende Keime wurden als aerobe Proteus, Mesentericus, Subtilis, Coli, Paratyphus B und Enteritidis Gärtner, als aerobe Putrificus tenuis, Putrificus verrucosus, Fränkel, Novy, Botulinus und Amylobacter zu diesen Untersuchungen herangezogen. Die aeroben Bakterien zeigten auf Agarplatten mit Knoblauchzusatz gutes Wachstum, nur Coli blieb bei 0,5 Zusatz etwas zurück, während bei stärkeren Zusätzen (0,8 auf 100) alle Aerobier etwas schwächer wuchsen; auf Agarplatten bei Zwiebelzusatz zeigte sich bei diesen aeroben Keimen kein Wachstumsunterschied gegenüber den zwiebelfreien Agarplatten. In Bouillon bei Knoblauch und Zwiebelzusatz trat bei aeroben und anaeroben kaum ein Unterschied im Wachstum gegenüber den Kontrollen hervor. Um den praktischen Verhältnissen etwas näher zu kommen, wurden in der letzten Versuchsreihe — schwach geräucherte, weiche Mettwürste ohne Zwiebel- und Knoblauchgehalt — als Nährböden benutzt. Auf deren Scheiben wurden Abschwemmungen einer 24stündigen Agarkultur bei den aeroben Keimen, bei den anaeroben von einer ebenso alten Leberbouillon gleichmäßig aufgespatelt und dann einzeln kleine Knoblauch- oder Zwiebelstückchen in die Wurstscheiben hineingedrückt. Auch hierbei konnte ein Wachstumsunterschied zwischen den Wurstscheiben ohne und von mit Zwiebel- oder Knoblauchstückchen nicht bemerkt werden. Das Ergebnis läßt sich also dahin zusammenfassen, daß ein Zusatz von Knoblauch oder Zwiebeln in irgendeiner praktisch erträglichen Menge das Wachstum etwa vorhandener Fäulnis- oder Krankheitserregender Keime, welche erfahrungsgemäß in Wurstwaren hin und wieder angetroffen werden und mehr oder weniger ausgesprochene Krankheitsercheinungen hervorrufen können, nicht beeinflußt. Es ist daher auch nicht möglich, daß ein Zusatz von Knoblauch oder Zwiebeln eine minderwertige Beschaffenheit des Fleisches zu verdecken geeignet ist.

Schern, K.: Die Gärkochprobe und die anaeroben Gärkochproben der Milch. (Zschr. für Infektions-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 1/3, S. 171.)

Ausgehend von der Tatsache, daß die Hygieniker gelegentlich Milch auch in gekochtem Zustande untersuchen müssen, hat Schern die bekannte Gärprobe der rohen Milch auch mit gekochter Milch und zwar sowohl bei aerober als auch bei anaerober Bebrütung angesetzt. Er er-

wähnt zwei Fälle, bei denen es ihm gelang, auf Grund dieser beiden Proben in gekochter Milch, die zu Darmstörungen bei Kindern Anlaß gegeben hatte, aerobe und anaerobe Gasbildner nachzuweisen, während dies mit den anderen Untersuchungsmethoden nicht gelungen ist. S ch e r n empfiehlt deshalb die Ausführung dieser Proben in allen in Betracht kommenden Fällen. Ziegler.

Geflügelkrankheiten.

Breusch, E.: Beiträge zur Blutmorphologie des Huhnes.

(Aus dem Tierfeucheninstitut der Universität Leipzig. — Direktor: Prof. Dr. Eber.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 1/3, S. 219.)

Das Blut normaler Hühner weicht in wesentlichen Punkten, besonders bezüglich der Morphologie, der Genese und der Zahlenwerte von dem der höheren Säuger ab. Namentlich ist es die Genese, die hier von vornherein tiefgreifende Unterschiede veranlaßt. Während die Bildung der roten Blutzellen und der Thrombozyten streng an das sinusoidale Venensystem, bezw. den extravaskulären Raum des Knochenmarks gebunden ist, muß die Bildung von weißen Blutzellen als ein im Körper weit verbreiteter Vorgang gedeutet werden. Infolge des Fehlens von Lymphknoten ist nur ein weit im Körper verbreitetes lymphoides Gewebe in Form von Follikeln und Infiltrationsherden vorhanden. Ferner konnte festgestellt werden, daß die Zusammensetzung des normalen Blutes einem dauernden Wechsel unterworfen ist, indem die Zahlchwankungen ziemlich große sein können. Schon physiologische Reize, z. B. Verdauung, regen zu solchen Änderungen der Blutwerte an. Am raschesten scheinen dabei die lymphozytären Elemente und die basophilen Leukozyten zu reagieren, langsamer die pseudoeosinophilen Leukozyten und Monozyten. Die Gründe für den raschen Wechsel im Blutbild sind zweifellos weniger in einer Verteilungsleukozytose als in einer raschen ubiquitären Abscheidung der Zellen in den hämatopoetischen Organen zu suchen. Dies ist erkenntlich an einer ungleichmäßigen Vermehrung der einzelnen Zellarten und an einer mitunter einwandfrei nachweisbaren Linksverschiebung der Granulozyten. Pathologische und sonstige Zellformen kommen im Blute des gefundenen Huhnes sehr selten vor, sie können als Zufallsbefunde unberücksichtigt bleiben. Ihre Vermehrung mahnt selbstverständlich zu vorsichtiger Beurteilung. Kunstprodukte sind häufig und können unter Umständen zu Irrtümern führen. Ziegler.

Beck, A.: Die Pseudotuberkulose der Nagetiere und ihre Beziehungen zur Paracholera der Puten, Tauben und Kanarienvögel. (Aus dem Tierfeucheninstitut der Universität Leipzig. — Direktor: Prof. Dr. A. Eber.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 1/3, S. 103.)

In Fortsetzung früherer gemeinsamer mit Huck durchgeführter Untersuchungen hat Beck über die von ihm bei der Paracholera der Puten usw. gefundenen Bakterien weitere bakteriologische und experimentelle Untersuchungen vorgenommen und dabei festgestellt, daß sie identisch sind mit dem *Bacterium pseudotuberculosis rodentium*. Bei Puten kommt die Pseudotuberkulose verhältnismäßig häufig vor, sie tritt beinahe ausschließlich in den Herbstmonaten (September bis November) auf. Auch bei Kanarienvögeln kommen nicht selten Erkrankungen vor, die auf den gleichen Erreger zurückzuführen sind. Tauben erkranken ebenfalls spontan, wenn auch seltener. Ähnlich verhält es sich anscheinend mit Erkrankungen der Hühner an Pseudotuberkulose. Damit ist erwiesen, daß die Vögel allgemein und vom Hausgeflügel im besonderen die Puten, Hühner und Tauben

an Pseudotuberkulose erkranken können, wenn auch bei einzelnen Arten Unterschiede hinsichtlich der Empfänglichkeit vorhanden sind. Neben den Vögeln sind außer Nagetieren auch andere Säugetiere gleichfalls für die Infektion mit dem *Bact. pseudotuberculosis rodentium* empfänglich, so sind pseudotuberkulöse Erkrankungen bei Katzen, Pferden und Meerkatzen beschrieben. Auch beim Menschen sind wiederholt Erkrankungen an Pseudotuberkulose festgestellt worden. Bei Infektionsversuchen darf nicht übersehen werden, daß die jeweils an verhältnismäßig wenigen Versuchstieren gewonnenen Versuchsergebnisse keine absolut sicheren Resultate darstellen, da auch die Pseudotuberkulosestämmen in ihrer Virulenz schwanken und die jeweilige Empfänglichkeit der Versuchstiere für die erfolgreiche Infektion ein nicht zu unterschätzender Faktor ist. Sind alle Bedingungen für das Zustandekommen einer Infektion vorhanden, so wird man in der Annahme nicht fehlgehen, daß es nur wenige, vielleicht keine Tierarten gibt, die sich als absolut immun gegen die Infektion mit *Bact. pseudotuberculosis (rodentium)* erweisen, wenn auch in der relativen Immunität bei den einzelnen Tierpezies beträchtliche Abstufungen bestehen. Ziegler.

Standesangelegenheiten.

90. Verammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg vom 16. bis 22. September 1928.

Zum vierten Male seit dem Bestehen ihrer Gesellschaft tagten die deutschen Naturforscher und Ärzte in der Freien und Hansestadt Hamburg. Wissend um die innigen Beziehungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft war es für die größte Handels- und Hafenstadt Ehrensache, sich festlich zum Empfang der Gäste zu rüsten und der Tagung einen würdigen Rahmen zu bieten. 10 000 Gelehrte und Forscher aus allen Gauen des Deutschen Vaterlandes, aus Österreich und dem befreundeten Auslande fanden sich in Hamburg zu ernster Arbeit zusammen. Eine machtvolle Kundgebung deutscher Wissenschaft.

Am Sonntag, den 16. September 1928, fand in der mit Flaggen und Pflanzengrün geschmückten Ernst Merck-Halle im Beisein zahlreicher Vertreter der Behörden, an ihrer Spitze Hamburgs Bürgermeister, Dr. Petersen, die feierliche Eröffnung der Tagung statt. Der Festakt wurde weihend durch den vom Hamburger Ärzteecheiter kunstvoll vorgetragenen ersten Satz von Mozarts Jupiter-Symphonie eingeleitet. Darauf entbot der Rektor der Hamburgischen Universität, Professor Dr. Blaschke, gleichzeitig erster Geschäftsführer der Tagung, den Gruß der hamburgischen Universität. Er erinnerte an die während des Krieges unterbundene Seefahrt, an den Raub der Handelsflotte durch den Frieden. Dann sprach er von Hamburgs und Deutschlands Wiederaufbau. Ernste Worte fand er gegen die inneren Zänkereien und gegen die Kleinstaatsereien, die einem aufstrebenden Deutschland nur hinderlich seien. Seine Rede schloß er mit einem Hoch auf „Unser großes und einiges deutsches Vaterland, das Deutschland, das von der Maas reicht bis an die Memel und von der Elbe bis an den Belt“. Die Verammlung fiel stürmisch in das Hoch ein und sang stehend die erste Strophe des Deutschlandliedes. Anschließend begrüßte Bürgermeister Dr. Petersen die Tagung namens der Freien und Hansestadt Hamburg aufs herzlichste. Als sichtbaren Ausdruck der Freude und des Dankes hat der Senat eine Rudolf-Hertz-Medaille gestiftet, die allen denen gewidmet ist, die sich um die Vorbereitung und Durchführung der 90. Verammlung Verdienste erworben haben. Als erstem überreicht der Redner die Medaille dem Vorsitzenden der Gesellschaft Prof. Dr. v. Eiselsberg-Wien. Er verweist dann auf das wertvolle Gut des unverlierbaren Besitzes geistiger Energien und feiert die Wissenschaft als stärkste Förderin der Freiheit und des Friedens. Als letzter Redner ergriff der erste Vors. der Gesellschaft, Hofrat Prof. Dr. von Eiselsberg-Wien das Wort und dankte dem Rektor der Universität und dem Bürgermeister für die herzliche Aufnahme und Begrüßung; ganz besonders dankte er für das sinnige Andenken, die vortrefflich geprägte Medaille, die Hamburgs großen Sohn, den Physiker Hertz darstellt. Er preist dann Hamburg als alte Pflegestätte von Kunst

und Wissenschaft, die ihre kulturelle Mission in bewundernswerter Weise erfüllt habe. Er erwähnt hier die wissenschaftliche Arbeit der jungen Universität und rühmt die auch im Auslande anerkannte Forschungstätigkeit des Institutes für Schiffs- und Tropenkrankheiten. Zuletzt betont der Redner die Zusammengehörigkeit der Naturforscher und Ärzte. Der durch zu weitgehende Spezialisierung bedingten Entfremdung vorzubeugen, sieht die Tagung in ihren allgemeinen Sitzungen ihre Hauptaufgabe darin, Naturwissenschaft und Medizin zusammenzuhalten und in ihren kombinierten Sitzungen die einzelnen Zweige vor zu weitgehender Zersplitterung zu schützen. — Mit dem Vortrage der Egmont-Ouvertüre durch das Orchester fand die eindrucksvolle Feier einen würdigen Abschluß.

In der am 20. September abgehaltenen Geschäftlichen Sitzung wurde Prof. Dr. Mießner-Hannover als Beisitzer in den Vorstand der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte gewählt. Die nächste Tagung findet 1930 in Königsberg (Pr.) statt.

Die allgemeinen Sitzungen fanden am Montag, den 17., Dienstag, den 18. und Mittwoch, den 19. September 1928 in der Ernst Merck-Halle statt. Da der Raum die Teilnehmer nicht zu fassen vermochte, wurden die Vorträge durch Lautsprecher nach dem Sagebielischen Etablissement, Drehbahn, übertragen. Am Dienstag hielt Ministerialrat Prof. Dr. v. Ostertag in der zweiten allgemeinen Sitzung einen Vortrag über „Die Bekämpfung der Tierseuchen“, der geeignet war, weiteren Kreisen einen Einblick in die verantwortungsvolle und volkswirtschaftlich wichtige Tätigkeit des Tierarztes zu gewähren. Vom Vortragenden wurden die im Gesetz vorgesehenen Mittel zur Seuchenbekämpfung geschildert und hierauf am Stand der wichtigsten Tierseuchen im Deutschen Reiche der Erfolg gezeigt, den die Tierseuchenbekämpfung im Reiche seit dem Erlaß des Tierseuchengesetzes gehabt hat. Weiter wurden Bekämpfung der Tuberkulose des Rindes und die Bedeutung der Fleischschau gewürdigt.

In der ersten Sitzung der Medizinischen Hauptgruppe am Montag, den 17. Sept., behandelten Ministerialdirektor a. D. Prof. Dr. Gottstein-Berlin und Prof. Dr. Gotschlich-Heidelberg das „Kommen und Gehen der Epidemien“. Es wurde die Forderung aufgestellt, daß die auf die Wissenschaft aufgebauten Maßnahmen des Staates auch durch die Erkenntnis von der Solidarität aller Schichten der Gesellschaft und der Verantwortungspflicht jedem einzelnen ihrer Mitglieder gestützt werden müssen. In der zweiten Sitzung der Medizinischen Hauptgruppe am Mittwoch, den 19. September, berichteten Professor Dr. Barger-Edinburgh über „Neuere Chemie der Hormone“, Prof. Dr. Zondeck-Berlin und Dr. Laquer-Elberfeld über „Die weiblichen Sexualhormone“.

Die beiden veterinärmedizinischen Abteilungen, Abt. 34, „Theoretische und experimentelle Veterinärmedizin“ und Abt. 35, „Angewandte Veterinärmedizin“ waren von etwa 400 Personen besucht. Alle Teilnehmer werden den Hamburger Einführenden, Landestierarzt Dr. Mayer und Obertierarzt Dr. Stödter, Dank wissen für die glückliche Wahl der Sitzungsfäle. Es war ihnen gelungen, im Gewerbehause am Holstenwall zwei unmittelbar an einander stoßende Räume zu erlangen. An der Tafel wurde der jeweils im Nachbaraal steigende Vortrag bekanntgegeben, so daß es jedem Teilnehmer möglich war, den ihn interessierenden Vortrag zu hören. Vor den Sitzungsfälen hatte die Firma Hauptner-Berlin die neuesten tierärztlichen Instrumente ausgestellt.

Am Donnerstag, den 20. September, fand die Gemeinsame Sitzung der beiden veterinär-medizinischen Abteilungen statt. Sie wurde von Prof. Dr. Nöller-Berlin eröffnet, der den Vorsitz Prof. Dr. Peter-Hamburg übergab. Prof. Peter dankte und legte dar, daß die veterinärmedizinische Wissenschaft auch in Hamburg gepflegt werde. Dann erhielt Prof. Dr. Gerlach-Mödling das Wort zu seinem Vortrage „Immunität bei Tuberkulose“. Laboratoriumsversuche haben mit wenigen Ausnahmen dargetan, das der BCG-Impfstoff unschädlich ist, und unter gewissen Umständen eine ausgesprochene immunisierende Wirkung erkennen läßt, wie dies z. B. Gerlach und Kraus in Infektionsversuchen an Affen demonstriert haben. Auch in der Praxis sind in manchen Staaten Immunisierungsversuche an neugeborenen Kälbern im Gange. Eine abschließende Kritik über den Wert der Methode kann allerdings erst nach mehreren Jahren gefällt werden. Eher wäre auch einer allgemeinen Freigabe der Impfung nicht näher zu treten, wohl aber empfiehlt sich eine möglichst vielseitige Nachprüfung unter

autoritativer Leitung. Eine günstige Beeinflussung der tuberkulösen Erkrankung durch Serumbehandlung oder auf chemotherapeutischem Wege konnte bisher nicht erzielt werden.

Die Vorträge von Prof. Dr. Böhm-Wien „Seuchenhafte Parasiten-erkrankungen“ und Dr. Schmid-Berlin „Die Lungenwurmsseuche“ fielen aus. Dafür sprach Prof. Zaribnicky-Wien über „Fütterungslehre und Futterfädellichkeiten“. Die Fütterungslehre hat auch den Futterfädellichkeiten ein erhöhtes Augenmerk zu schenken. Das Auftreten von Futterfädellichkeiten, ihr klinischer Verlauf bei den einzelnen Tiergattungen, die größere Anzahl der Tiere, die meist zu erkranken pflegt, lassen vielleicht im ersten Augenblick an das Auftreten einer Seuche denken. Da urfädellich die verschiedensten Momente in Frage kommen können, ist gerade bei Futterfädellichkeiten eine eingehende tierärztliche Erhebung bezüglich Verlauf, Auftreten und evtl. getroffenen Abwehrmaßnahmen unerläßlich. Weiterhin sind bei an Futterfädellichkeiten gefallenen oder notgeschlachteten Tieren genauer Sektionsbefund, richtige Entnahme und Einföndung von Organen und Organteilen für das Ergebnis der vorzunehmenden Untersuchung ausschlaggebend. Wichtig ist ferner die Einföndung von Proben aller Futtermittel, welche dem Tier verabreicht wurden, da die Vorlage lediglich solcher Futtermittel, die dem Tierbesitzer verdächtig erschienen sind, sich nicht immer als zutreffend erweist oder Futtermittel erst in Mischung mit anderen gefundheitsfädelliche Eigenschaften erlangen. Je genauer die Kenntnis von den Futterfädellichkeiten für die einzelnen Tiergattungen in klinischer und ätiologischer Hinsicht ausgebaut ist, mit um so größerer Aussicht auf Erfolg werden Abwehrmaßnahmen und therapeutische Eingriffe Verwendung finden.

Prof. Dr. Nöller-Berlin ging in seinem Referat über „Seuchenhafte parasitäre Erkrankungen“ hauptsächlich auf die Leberegelseuche ein. — Ein ausführlicher Bericht der in den Abt. 34 und 35 gehaltenen Referate folgt.

Wetzel.

Tierärzterein Stade-West (Unterweser)

am 12. September 1928 zu Wefermünde-G.

Anwesend: 16 Mitglieder, 1 Gast. 1. Neu aufgenommen Polizeitierarzt Dr. Lehr in Wefermünde-G. 2. Die von dem Vors. verlesene Satzung wird in der vorliegenden Form einstimmig angenommen. Je 1 Exemplar erhalten die Vorstandsmitglieder, der Tierärzterein Niederfachsen, der Tierärzterein Stade-Ost und der Reg.- und Vet.-Rat bei der Regierung in Stade. Ferner wird eine Satzung für die Akten angefertigt, die auf Anfordern den Mitgliedern auszuhändigen ist. 3. Nach Föhlungnahme mit dem Verein Stade-Ost (Unterelbe) werden von den beiden Vereinen im Reg.-Bez. Stade für die gemeinsame Liste des Tierärzterein Niederfachsen je ein Mitglied und ein Stellvertreter für die Tierärztekammerwahl in der Provinz Hannover benannt. Einstimmig werden gewählt für den Verein Stade-West als Mitglied der Vors. Behrens, prakt. Tierarzt in Achim, und als Stellvertreter der Kassenführer Dr. Hayen, Schlachthoftierarzt in Wefermünde. Seitens des Vereins Stade-Ost sind gewählt als Mitglied Oberregierungs- und Vet.-Rat Schaper in Stade und als Stellvertreter Dr. Tormählen, prakt. Tierarzt in Harsefeld. Der Vors. Behrens-Achim überreicht obige Liste der beiden Vereine und wird beauftragt, dahin zu wirken, daß eine möglichst gerechte Verteilung der Sitze erfolgt. 4. Von der Aufstellung einer „Schwarzen Liste“ wird Abstand genommen. Den Mitgliedern wird empfohlen, Forderungen, die länger als ein Jahr bestehen, einzuklagen. 5. In den monatlich auszustellenden Rechnungen sind getrennte Rubriken für a) Leistungen und b) gelieferte Arzneien usw. zu föhren. Auf die Preise der Großdrogenhandlungen wird ein Aufschlag von 50 Prozent erhoben, doch dürfen die von einzelnen Firmen (z. B. Merck) festgesetzten Verkaufspreise für Spezialpräparate in keinem Fall überschritten werden, da diese bindend sind sowohl für Apotheker als auch für selbstdispensierende Tierärzte. 6. Der Vorstand wird beauftragt, mit Dr. Karsten-Hannover in Föhlung zu treten, in einer im November d. Js. in Bremen abzuhaltenden außerordentlichen Versammlung einen Vortrag zu halten über „Die Zusammenarbeit der Tierärzte mit den Instituten der Landwirtschaftskammern“. Zu diesem Vortrag sollen eingeladen werden die Vereine Stade-Ost, Bremen und Oldenburg.

Wefermünde-Bremerhaven, den 13. September 1928.

Dr. Leyer, stellv. Vors. Dr. Hayen, stellv. Schriftf.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Dr. med. vet. Wilhelm Schauder, planmäßiger außerordentlicher Professor und Vorstand der Histologisch-Embryologischen Abteilung des Veterinär-Anatomischen Instituts der Universität Leipzig hat den Ruf als ordentlicher Professor der Veterinär-Anatomie an der Universität Gießen angenommen.

In der Sitzung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte wurden in den Vorstand neu gewählt: Als zweiter stellvertretender Vorsitzender Geheimrat Prof. Bosch-Heidelberg; als Beisitzer: Professor Mießner-Hannover, Prof. v. Klebelsberg-Innsbruck.

Geheimrat Prof. Dr. phil. Stoss-München wurde von der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Gießen zum Dr. med. vet. h. c. ernannt.

Heiss zum 65. Geburtstag.

Vor wenigen Wochen hat unser Altmeister auf dem Gebiete des Schlachthofbaues, der Schlachthofkunde und -Technik, Ober-Vet.-Rat Dr. Heiss-Straubing, seinen 65. Geburtstag gefeiert. Zugleich konnte Dr. Heiss die 100. Beratung in Schlachthofneu- und Umbauten buchen. Auch das ist etwas, das nicht zu den Alltäglichkeiten gehört. Gleiches wird wohl kaum einem anderen Schlachthofkollegen beschieden sein. Es beweist, welch großes Ansehen unser Kollege gerade bei den Stadtmagistraten und den Stadtbauämtern genießt und welches Vertrauen in seine langjährigen praktischen Erfahrungen auf diesem Gebiete gesetzt wird. Ungezählte Anfragen von Städten und Schlachthofdirektionen aus allen Gebieten des Schlachthofwesens ergehen an ihn, die er stets in der uneigennützigsten Weise erledigt. Niemand bleibt ohne Aufschluß, der sich an ihn wendet. Der Name Dr. Heiss ist heute weit über die Grenzen unseres Vaterlandes bekannt und geachtet. Unermüdlich ist Heiss bestrebt, das Ansehen der deutschen Schlachthöfe, auf welche die Welt mit Bewunderung blickt, zu erhalten und zu mehren. Seine unermüdliche Arbeitskraft gestattete ihm außerdem noch in hervorragendem Grade literarisch tätig zu sein: Das Standardwerk über Bau, Einrichtung und Betrieb öffentlicher Schlachthöfe, hat in aller Welt höchste Anerkennung gefunden, übertraf es doch an Reichhaltigkeit und innerem Wert alle diesbezüglichen Werke in hohem Grade. Seine Arbeit über die Notwendigkeit einer Verbesserung des englischen Schlachthofwesens, die er mit G. Cash-Coventry erscheinen ließ, war Veranlassung, daß er 1927 als offizieller Kritiker der Anlage nach London-Letchworth gebeten wurde. Seit 26 Jahren leitet er den technischen Teil der Deutschen Schlachthofzeitung. Durch die während des Krieges gemachte Erfindung des nach ihm benannten Abfallverwertungsapparates hat er sich große Verdienste um die Behebung der Not der Landwirtschaft an Kraftfuttermitteln erworben. Bei all dieser Arbeit fand er Zeit, an der Einigung der Schlachthof- und Gemeindetierärzte zu arbeiten. Im Jahre 1905 rief er den Verein der Süddeutschen Schlachthoftierärzte zu Stuttgart ins Leben. Nach jahrelangen Mühen konnte er in Dresden im Jahre 1912 das Endziel, das er sich gesteckt hatte: die Gründung des Reichsverbandes der deutschen Gemeindetierärzte erreichen. Zwölf Jahre war er in dessen Vorstandsfunktion tätig. Heiss und Garth, die beiden Kämpen des Reichsverbandes haben den Jüngeren hier Platz gemacht, ihre Leistungen zu erhalten und zu wahren ist deren Aufgabe geworden. Auch der Hebung des Tiereschutzes im Schlachthof widmet Heiss seine Kraft. Auf keinem diesbezüglichen Kongreß fehlte sein Name als geladener Berichterstatter. Ähnlich auf Kältekongressen. Sein großes Wissen auf dem von ihm geschaffenen Zweige unserer Wissenschaft, sein nie veragendes Gedächtnis, sein klarer Blick, der rasch die gegebene Situation meistert, erfüllen diejenigen, welche mit ihm zusammenarbeiten Gelegenheit hatten, mit Bewunderung für seine schöpferische Kraft und seine Fähigkeiten.

Wir Tierärzte können stolz darauf sein, daß Heiss durch eigene Kraft und unermüdlichen Fleiß sich diese führende Stelle errungen hat und viele Kollegen wissen ihm Dank für seinen sicheren Rat und seine Mithilfe in allen einschlägigen Fragen. Heiss hat insbesondere den Beweis erbracht, daß man mit verhältnismäßig geringen Mitteln betriebstechnisch richtig arbeitende Schlachthöfe schaffen kann, daß nicht ein Schlachthof dem anderen nachgeahmt werden darf, sondern daß eine solche Anlage für jede Stadt zu individualisieren ist. Das Zusammenarbeiten zwischen Bau- und Betriebsfachverständigen schafft nach dem Grundatz und nach der Erfahrung von Heiss das Vollkommene.

Zu bedauern ist, daß dem bewährten Fachmann bisher keine Möglichkeit geboten war, dem jungen Nachwuchs sein reiches Fachwissen zu vererben. Die Tierärztliche Hochschule Hannover war die erste, die ihm Gelegenheit gab, seine reichen Erfahrungen gelegentlich des letzten Fortbildungskurses darzubieten. So bleibt nur eine Bitte und ein Wunsch übrig: daß Heiss durch eine Neuauflage seines Werkes über Schlachthöfe uns nochmals sein reiches Wissen und Können zur Verfügung stelle, wodurch er sich selbst ein monumentum aere perennius setzen wird. Möge ihm, dem sportgestählten Manne im Kreise seiner Familie noch lange Jahre seine Gesundheit und freudige Schaffenskraft erhalten bleiben und sein Ruf als Autorität des Schlachthofwesens ihn in noch viele Städte des In- und Auslandes führen. Noch viele Jahre dem jungen 65jährigen!

Dr. Müller-München.

Dr. Fritz Helmich †.

Im 74. Lebensjahre starb in Northheim unser verehrtes Ehrenmitglied Dr. Fritz Helmich, Schlachthofdirektor i. R. Mit ihm ist einer unserer Alten, der die Entwicklung unseres Standes und unseres Vereins miterlebte und oft mit Rat und Tat Stand und Verein zur Seite stand, dahingegangen. Schon in den Berichten aus 1895 wird sein Name genannt und seit Gründung des Vereins der Schlachthoftierärzte der Provinz Hannover, aus dem der für Nordwestdeutschland hervorging, war er dessen eifriges Mitglied. Beim Übertritt in den Ruhestand wurde er in Anerkennung seiner großen Anhänglichkeit und steten Teilnahme an allen Vereinsangelegenheiten zum Ehrenmitglied ernannt. Als ein treudeutscher Mann, das Urbild eines kernigen und stets lebenswürdigen Kollegen steht er in unserem Gedächtnis jetzt und für alle Zeit, ihm sei die Erde leicht!

Hannover, Nienburg (W.), den 24. September 1928.

Verein der Schlachthof- und Gemeindetierärzte für Nordwestdeutschland.
Kormann, Vors.

Hideyo Noguchi †.

Am 21. Mai 1928 starb der bekannte Forscher auf dem Gebiete der Protozoenkrankheiten, insbesondere des Gelbfiebers, Hideyo Noguchi in Accra an der Goldküste. Noguchi wurde 1876 in Inawashiro geboren; er studierte in Japan und kam 1900 nach Amerika. Seit 1904 gehörte er, zuletzt als Mitglied, dem Rockefeller Institut an.

Vorlesungen und Übungen bei der Vet.-med. Fakultät der Universität Leipzig. W.-S. 1928/29.

Propädeutische Fächer. Debye: Experimentalphysik 5-ft.; Phys. Praktikum für Veterinärmediziner 3-ft.; N. N. Experimentalchemie 6-ft. Chem. Übungen für Veterinärmediziner 6-ft.; Ruhland: Pflanzenphysiologie 3-ft.; Meisenheimer: Vergleichende Morphologie und Anatomie der Tiere 4-ft.; Schmidt: Klin. Propädeutik 1-ft.; Berge: Klin. Propädeutik 1-ft.; Latein und Griechisch für Anfänger; Englisch; Physik-chem. Einführungskurs; Zoologie.

Anatomie. Baum: System. Anatomie der Haustiere (Knochen-, Muskel- und Eingeweidelehre) 6-ft.; Präparier- und Exenterierübungen und Demonstrationen am lebenden Tiere, 12-ft. für 1. und 2. Semester, 18-ft. für 3. u. 4. Semester; N. N.: Embryologie der Haustiere I (Vorentwicklung und erste Entwicklung) 2-ft.; Embryologie der Haustiere II (Embryonale Anhangsorgane, Plazentaranatomie, Organogenese) 2-ft.; Embryologische Vorweisungen 1-ft.; Bestimmungsübungen an normal-histologischen Präparaten 1-ft.

Physiologie und physiolog. Chemie. Scheunert: Physiol. der Hausfaugetiere 5-ft.; Scheunert mit Krzywanek: Physiolog. Übungen (physik. Teil) 3-ft.; Kolloquium über angewandte Physiologie 2-ft.; Krzywanek: Innere Sekretion 1-ft.; Scheunert: Arbeiten für Fortgeschrittenere täglich; Schenck: Physiolog. Chemie II (Dynamischer Teil) 2-ft.; Physiolog. chem. Übungen 3-ft.

Pathologische Anatomie. Allgemeine Pathologie. Nieberle: Spez. patholog. Anatomie der Tiere 6-ft.; Patholog.-anatom. Kursus mit Anleitung zu Obduktionen (Sektionskurs.) 4-ft.; Patholog.-histolog. Kursus 4-ft.; Patholog.-anatom. Demonstrationskurs. 4-ft.

Pharmakologie und Pharmazie. Reinhardt: Angewandte Pharmakologie und Toxikologie II 3-ft.; Pharmaz. Kursus 1-ft.; Bohrisch: Spez. Pharmakognosie 1-ft.; Manicke: Chemie der natürlichen Pflanzen- und Tierstoffe 1-ft.; Repetitorium der org. Chemie 1-ft.

Innere Medizin. J. Schmidt: Spez. Pathol. und Therapie der Haustiere 3-ft.; Diagnostik und Propädeutik inn. Krankh. 1-ft.; Med. Tierklinik 6-ft.

Chirurgie. Röder: Spez. Chirurgie der Haustiere 4-ft.; Chirurg. Pathologie und Therapie des Hufes 2-ft.; Chirurg. Tierklinik 6-ft.; Operationskursus 5-ft.; Berge: Diagnostik und Propädeutik chirurg. Krankh. 1-ft.; Kleintierchirurgie 1-ft.

Sonstige klinische Gebiete. Reinhardt: Augenheilkunde 1-ft.; Poliklinik für kl. Haustiere 6-ft.; J. Richter: Geburtshilf. Klinik 6-ft.; Weber: Buiatrik 1-ft.; Ambulat. Tierklinik 6-ft.

Animalische Nahrungsmittelkunde. Eber: Fleischbeschau 3-ft.; Kursus über Fleischbeschau und Untersuchung sonstiger von Tieren stammender Nahrungsmittel auf dem städt. Vieh- und Schlachthofe in der zweiten Hälfte des Semesters nach Übereinkunft.

Hygiene und Seuchenlehre. Klimmer: Gefundheitspflege der landwirtschaftl. Haustiere 3-ft.; Fütterungslehre 1-ft.; Kursus in Gefundheitspflege und Fütterungslehre 2-ft.; Lehrausflüge aus den Gebieten der Veterinär- und Milchhygiene an zu bestimmenden Tagen; Haupt: Futtermittelkunde 1-ft.; Ausgewählte Kapitel aus der Veterinärhygiene 1-ft.; Sprehn: Parasitologie I 2-ft.

Staatsveterinärkunde. J. Schmidt: Gerichtliche Tiermed. 3-ft.; Weber: Kursus in der Praxis der poliz. Tiermedizin täglich.

Tierzucht und Landwirtschaftslehre. J. Richter: Spez. Tierzucht 6-ft.; Kursus für die praktisch-züchterische Beurteilung der Haustiere 2-ft.; Tierzüchterische Lehrausflüge an zu bestimmenden Tagen; Müller-Lenhartz: Landwirtschaftl. Betriebslehre 2-ft.; Übungen für Fortgeschrittenere; Lehrausflüge in landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Betriebe.

Sonstiges. J. Schmidt: Pathologie und Therapie des Geflügels 1-ft.; Sprehn: Fischkunde (einschl. Fischkrankheiten) 2-ft.; Strubell-Harkort: Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiete der Immuntherapie 1-ft.

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft.

Herbsttagung in Heidelberg vom 11. bis 17. Oktober 1928.

Schafzucht-Abteilung. 15. Oktober, 8½ Uhr, Stadthalle, Kammermuffiksaal. Prof. Dr. Frölich-Halle: „Über die Einrichtung eines neuen Schafleistungsbuches, Abt. Woll.“ Dr. Mattes-Stockach: „Die Entwicklung des Württemberger Schafes, seine gegenwärtige Bedeutung und Zukunft.“

Rinderzucht-Abteilung. 15. Oktober, 11 Uhr, Stadthalle, Großer Saal. Oberveterinär Gutbrod-Würzburg: „Zuchtziel und Typfragen bei den Höhenrindern.“ Prof. Dr. Ernst-München: „Die wirtschaftliche Bedeutung der Euterkrankheiten.“

Schweinezucht-Abteilung. 15. Oktober, 15 Uhr, Harmonie, Großer Saal. Tierzuchtdirektor Viehhauer-Karlsruhe: „Grundlagen der badischen Schweinezucht und die bäuerliche Schweinehaltung.“ R. Adlung-Sindlingen: „Typfragen und ihre Bedeutung für die praktische Schweinezucht.“

Pferdezucht-Abteilung. 15. Oktober, 17 Uhr, Neues Kollegienhaus, Großer Saal. Dr. Pulte-Berlin: „Kaltblutleistungsprüfung, ihre Entwicklung, Organisation und Bedeutung für die Kaltblutzucht.“ von Wenckstern: „Meine Eindrücke auf der Landw.-Ausstellung in Nottingham (England).“

Tierzucht-Abteilung. 16. Oktober, 14. Uhr, Stadthalle, Großer Saal. Ob.-Reg.-Rat Fehsenmeier-Karlsruhe: „Staat und Tierzucht in Baden.“

Promotionstermine an der Tierärztl. Hochschule Berlin.

Promotionen finden im W.-S. 1928/29 am 20. Dezember 1928 und am 23. Februar 1929 statt. Die Dissertationen müssen spätestens am 1. Dezember bzw. 2. Februar eingereicht sein.

Tierärzteverein Westfalen.

Jahresversammlung am Sonntag, den 7. Oktober 1928, im Hotel Feldhaus in Hamm, Beginn 10½ Uhr. 1. Geschäftsbericht. 2. Kassenbericht. 3. Satzungsänderungen. 4. Tierärzte-Kammerwahlen. 5. Prof. Stang-Berlin: Über Vererbung. 6. Dr. Schultze-Grebenstein: Über Rachitisforschung mit Filmvorführung und 100 Lichtbildern. Um 2½ Uhr gemeinsames Essen.

Dr. Vossage, Meschede, Vors.
Dr. Schiebel, Herford, Schriftf.

Fortbildungskursus für praktische Tierärzte in Verbindung mit dem DVR. veranstaltet von der Vet.-med. Fakultät der Universität Leipzig.*)

Freitag, den 19. (nachmittags) bis Sonntag, den 21. Oktober (mittags). 1. Neues aus dem Gebiete der Geburtshilfe (mit Demonstrationen). Prof. Dr. Richter, 2 Stunden. 2. Die Bedeutung verschiedener neuerer Arzneimittel für die Praxis. Prof. Dr. Reinhardt, 1 Stunde. 3. Was muß der praktische Tierarzt von der Milchkontrolle wissen? Obermedizinalrat Prof. Dr. Klimmer, 4 Stunden. 4. Ausgewählte Kapitel aus der Pathologie und pathologisch-anatomische Demonstrationen mit besonderer Berücksichtigung der Fleischbeschau. Prof. Dr. Nieberle, 4 Stunden. 5. Periodische Augenentzündung. Obermedizinalrat Prof. Dr. Schmidt, 1 Stunde. 6. Eutererkrankungen und ihr Einfluß auf die Beschaffenheit der Milch. Professor Dr. Richter, 1 Stunde. 7. Geflügelkrankheiten. Prof. Dr. Haupt, 1 Stunde. — Der genaue Stundenplan wird von der Kanzlei der Vet.-med. Fakultät der Universität Leipzig, Österreichische Straße 55, kostenlos abgegeben. *) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 30, S. 522.

Fortbildungskursus in Insterburg.

Vom 21. Oktober bis Weihnachten wird in Insterburg ein tierärztlicher Fortbildungskursus über Infektionskrankheiten und pathologische Anatomie abgehalten. Die Kurse finden nur Sonntag vormittags dreistündig zu einer noch zu vereinbarenden Zeit im Hause des Herdbuchvereins, Wilhelmstraße 7, statt und umfassen hauptsächlich folgende Gebiete: Pathologie und Therapie der Jungtierkrankheiten, Infektionskrankheiten der Rinder, Schweine, Schafe und des Geflügels, Pathologie und Therapie der Euterkrankheiten, infektiöser Abortus, bakteriologische Fleischbeschau, Kot- und Milchuntersuchungen, ausgewählte Kapitel aus der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie mit Demonstrationen und Sektionsübungen. Teilnehmergebühr: 50,— RM. Anmeldungen bis 15. Oktober an das Bakteriologische Institut der Landwirtschaftskammer, Beethovenstraße 24/26.

Dr. Krage, Abteilungsvorsteher.

Ungeklärte Schädlichkeit amerikanischer Gerste.

In der Umgebung von Bremen, Oldenburg und Hamburg, dem Venn nach auch in Holland, ist in der letzten Zeit aus Nordamerika und Kanada kommende Gerste verfüttert worden, die eine bis jetzt unbekannte Schädlichkeit in sich birgt. Die mit dieser Gerste gefütterten Schweine zeigen alsbald heftiges Erbrechen und verweigern später jegliche Aufnahme solcher Gerste. Ein Teil der Schweine verweigert von Anfang an die Aufnahme. Der Gerste selbst sieht man nichts an. Die mikroskopische Untersuchung zeigt die Anwesenheit des Pilzes *Gibberella Saubineti*. Weitere Untersuchungen sind im Gange. Ausgedehnte Tierversuche macht das Institut für Tierzucht der Tierärztlichen Hochschule Berlin. Von der Gerste befinden sich große Mengen im Handel. Stang.

Personal-Nachrichten.

Veränderungen im Vet.-Offizierkorps: Befördert mit 1. September 1928: Die Unterveterinäre Dr. Hüttenreiter, 18. Reiter-Regiment und Ruthe, 6. Reiter-Regiment zu Veterinären.

Ernannt mit 1. Oktober 1928: Generalveterinär Dr. Budnowski, Div.-Vet der 3. Div., zum Gruppenveterinär des Gruppenkommandos 1; Generaloberveterinär Dr. Fontaine, 17. Inf.-Regiment zum Div.-Veterinär der 3. Div.; Oberstabsveterinär Dr. Semmler, 4. Art.-Regiment, zum Vorstand der Lehrschmiede in Hannover.

Verfetzt mit 1. Oktober 1928: Die Stabsveterinäre Dr. Gärtner, Heeres-Veterinär-Untersuchungsamt, zum 17. Inf.-Regiment, Dr. Bruder, 5. Art.-Regiment, zum 4. Art.-Regiment, Dr. Hoffmann, Stab der 5. Div., zum 5. Art.-Regiment, Oberveterinär Dr. Gilitzer, 5. Art.-Regiment, zum Stabe der 5. Div.

Mit 30. September 1928 scheiden aus dem Heeresdienst aus: Generalveterinär Dr. Müller (Willy), Gruppenveterinär des Gruppenkommandos 1, mit dem Charakter als Generalstabsveterinär, Generaloberveterinär Dr. Kuhn, Vorstand der Militär-Lehrschmiede Hannover, mit dem Charakter als Generalveterinär — beide mit der Berechtigung zum Tragen dieser Uniform.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10: nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Ausperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Erlatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 40.

Ausgegeben am 6. Oktober 1928.

36. Jahrgang.

Ergebnisse einer längeren Fütterung von Schweinen mit Molken und Buttermilch von dauerpasteurisierter Milch in einer mit entsprechender Einrichtung ausgestatteten Molkerei.*)

Von O. Pröscholdt, Züllchow- Stettin.

Die Fütterung der von der Molkerei gehaltenen Schweine erfolgte mit solch großen Mengen von Mager- bzw. Buttermilch, wie es im rein landwirtschaftlichen Betriebe kaum vorkommen dürfte. Mit einer 9—11 Monate dauernden Fütterung von durchschnittlich 4500 Liter Molken bzw. Buttermilch pro Kopf sind wohl aller- schwerste Bedingungen gestellt für die Prüfung, ob und wie- weit Milchrückstände von dauerpasteurisierter Milch Fütte- rungstuberkulose bei Schweinen hervorrufen. Bei einer derartigen Fütterung, die nach Lage der Verhältnisse nicht unter ständiger scharfer Kontrolle erfolgen kann, kann an- derweitig Gelegenheit zur Tuberkuloseinfektion gegeben sein, die mit der Milch nicht im Zusammenhang steht. Auch ist damit zu rechnen, daß während dieser langen Zeit nicht zu vermeidende Störungen und Unterbrechungen in der Er- hitzung vorkommen, so daß niedere Temperaturgrade auf die Milch einwirken und eine entsprechend geringere Schädigung der Tuberkelbazillen die Folge ist.

In diesem praktischen Versuch ist noch die Schwierigkeit zu Tage getreten, die sich aus der noch vorherrschenden Ansicht über die Herstellung von Hartkäse von erhitzter Milch und aus der Anlieferung und Verarbeitung ansaurer bzw. saurer Milch ergibt. Zahlreiche erfahrene Molkerei- fachverständige sind der Auffassung, daß von einer eine halbe Stunde lang auf 60—65 Grad erhitzten Milch ein Hartkäse von guter und bester Qualität nicht zu bereiten ist, während von anderer berufener Seite festgestellt ist, daß dieses unter gewissen Voraussetzungen möglich ist. Infolgedessen wird vielfach die Milch, die zur Herstellung von Hartkäse dient, nicht eine halbe Stunde lang auf 60—65 Grad erhitzt, wie es auch in der Molkerei nicht geschah, in der die praktischen Fütterungsversuche stattfanden. Eine leider immer noch be- stehende Schwierigkeit für die Molkereien und für die Ver- nichtung der pathogenen Keime durch ausreichende Er- hitzung der gefamten Milch, von der Rückstände als Futter- mittel für Tiere verwendet werden, ist die ansaure und saure Milch. Milch mit einem mäßig vermehrten Säuregrad kann noch in der Dauerwanne erhitzt werden, was im Hoch-

pasteur wegen der bei höherer Temperatur früher ein- tretenden Gerinnung nicht möglich ist. Aber sobald eine gewisse Säuregrenze überschritten ist, setzen auch in der Dauerwanne bei 60—65 Grad Gerinnungen ein. Für voll- kommen saure Milch schaltet für den praktischen Betrieb auch die Dauerpasteurisierung aus. Demzufolge fallen in der Molkerei mehr oder weniger häufig, besonders während der warmen Jahreszeit, Milch und Milchrückstände an, die weder der Dauerpasteurisierung noch der Hoherhitzung unterworfen sind.

In dem durchgeführten Versuch sind die Ergebnisse durch zeitweise Verabfolgung solcher ungenügend bzw. nicht er- hitzter Molkereirückstände sehr nachteilig beeinflusst wor- den, so daß die Beurteilung der Zuverlässigkeit der Dauer- pasteurisierung dadurch beeinträchtigt ist. Berücksichtigt man aber alle Nebenumstände, so bekommt man auf Grund dieser in der Praxis erfolgten Fütterung von Schweinen keinen schlechten Eindruck von dem Wert der Dauer- pasteurisierung.

Bei der Verfütterung der künstlich infizierten Mager- milch, die 0,5—1 Prozent tuberkelbazillenhaltige Milch ent- hielt und die 135 Tage lang mit insgesamt 400 Liter an jedes Schwein verabfolgt war, waren alle drei Schweine tuberkulös, das sind 100 Prozent. Von zehn Schweinen, die in den Versuchstallungen des Instituts mit gewöhnlicher Magermilch der Molkerei 147 bis 281 Tage lang in einer Menge von 378 bis 698 Liter pro Kopf gefüttert worden waren, wurde nach der Schlachtung bei 80 Prozent makro- skopisch erkennbare Tuberkulose festgestellt. Von 82 Schweinen, die beim Beginn der Kontrolle über die in der Molkerei gefütterten Tiere vorhanden waren, erwiesen sich 15,85 Prozent als tuberkulös. Gegenüber den mit roher Magermilch gefütterten Schweinen ist der Prozentatz der tuberkulösen Tiere von 80 auf 15,85 zurückgegangen. Immerhin sind die Fälle von Tuberkulose noch recht hoch, selbst wenn man nicht außer acht läßt, daß die tuberkulösen Tiere mindestens 5 Monate lang mit wenigstens 2000 Liter Molken und Buttermilch gefüttert worden waren. Es sind während der damaligen Zeit zweifellos außer den Molken von dauerpasteurisierter Milch ziemlich häufig Molken und Buttermilch von nicht oder ungenügend erhitzter Milch an

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Direktoren der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 10. Juli 1928 in Breslau.

die Schweine verabfolgt worden. Durch die überwiegende Verfütterung von Rückständen, die von dauerpasteurisierter Milch stammten, ist aber trotzdem ein wesentlicher Rückgang der Tuberkulose zu verzeichnen gewesen. Von der weiteren Gruppe von 298 Schweinen, die seit der von Zeit zu Zeit durch das Institut erfolgten Kontrolle der Dauerpasteurisierung gefüttert worden waren, wurden bei der Schlachtung 9 Prozent tuberkulös befunden. Es ist also ein weiterer Rückgang zu verzeichnen, der aber als Ergebnis der Dauerpasteurisierung nicht befriedigt, auch wenn man berücksichtigt, daß die Tuberkulose bei Schweinen vorkam, die 9 Monate und länger gefüttert worden waren und während dieser Zeit mindestens 4000 Liter Milchrückstände erhalten hatten. Der unbefriedigende Befund steht damit im Zusammenhang, daß einerseits 1½ Monate lang der Temperaturregistrierapparat außer Funktion war, andererseits aber vor allem damit, daß nach den gemachten Erhebungen neben gelegentlich roher Buttermilch, vor allem an Sonn- und Feiertagen, Molken von nicht dauerpasteurisierter Milch verabfolgt worden waren. Nach Aufdeckung dieser Fehlerquellen war bei einer Gruppe von 35 Schweinen soweit wie möglich Vorfrage getroffen, daß keine anderen Milchrück-

stände als Molken von dauerpasteurisierter Milch an sie zur Verfütterung kamen. Von diesen Schweinen erwies sich bei der Schlachtung nach 9—10 monatlicher Fütterung mit 4000—4500 Liter Molken nur eins als tuberkulös, so daß sich die Tuberkuloseerkrankung auf 3 Prozent der von dieser Gruppe geschlachteten Schweine beschränkt. Ob die Tuberkulose dieses Schweines mit einer auf andere Weise zugezogenen Infektion in Verbindung steht oder auf irgend einen Mangel in der Erhitzung bzw. einem technischen Fehler des Apparates beruht oder trotz einwandfreier Dauererhitzung der Milch während der 10 Monate auf 60—65 Grad, wie es die Temperaturkurve anzeigte, vorkam, läßt sich nicht entscheiden. Jedenfalls ist die Reduzierung der Schweinetuberkulose bei der ungefähr ¾ Jahr währenden Massenfütterung von Milchrückständen von 80 auf 3 Prozent mit Hilfe der Dauerpasteurisierung eine ganz bedeutende. Da Versuche ähnlicher Art über die Hocherhitzung nicht vorliegen, kann kein Vergleich gezogen werden, ob in der Praxis mit der Hochpasteurisierung ein besseres Ergebnis erzielt wird, wenn Molkereirückstände in solch großen Mengen während derart langer Zeit an Schweine verfüttert werden.

Vorläufiges Ergebnis der im Bakteriologischen Institut in Halle a. S. ausgeführten Versuche zur Frühdiagnose der Eutertuberkulose durch den Lymphozytennachweis in der Milch.*)

Von Dr. H. Rautmann, Halle (Saale).

Die Institute und Untersuchungsstellen, die sich planmäßig mit der Diagnose der Eutertuberkulose des Rindes befassen und die nicht nur in großem Umfang das klinische Bild der Euteränderungen kennen gelernt, sondern auch bakteriologische Massenuntersuchungen von Milchproben ausgeführt haben, verstehen aus der Beschaffenheit der Milch und der Art ihres Zellgehaltes den Verdacht auf Eutertuberkulose mehr oder weniger gut zu begründen, bevor eine Prüfung auf Tuberkelbazillen stattgefunden hat. Damit soll das Verdienst B o n g e r t's, als erster auf die Bedeutung eines Lymphozytengehaltes der Milch für die Diagnose des Frühstadiums der Eutertuberkulose hingewiesen zu haben (Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene 1928, Nr. 8), nicht geschmälert werden, weil dadurch das empirische Wissen eine wertvolle Stütze erhielt und andererseits die Anregung zur Nachprüfung des Verfahrens der histologischen Zellenanalyse der Milch auf seine Brauchbarkeit für die Feststellung der Eutertuberkulose gegeben wurde.

Wenn ich auch heute hierüber noch kein abschließendes Urteil zu fällen in der Lage bin, so möchte ich doch die jetzige Gelegenheit nicht veräumen, um Ihnen das Ergebnis unserer bisherigen Versuche mitzuteilen. Zu diesen ist, wie aus beiliegender Zusammenstellung ersichtlich, die Milch von 70 Kühen herangezogen, in welcher neben anderen Zellen 10mal Lymphozyten vereinzelt (etwa 5 in jedem Gesichtsfeld), 13mal in mittelmäßiger Menge (etwa 20—40) und 47mal sehr zahlreich, oft Zelle an Zelle, nachweisbar waren. In allen diesen Fällen wurde auf die Eigenart des Zellbildes, das Vorkommen von Mikroorganismen und besonders auf den Gehalt von Tuberkelbazillen geachtet.

Diese Erreger wurden 26mal, und zwar in drei Proben mit mittelmäßigem und in 23 Proben mit sehr starkem Lymphozytengehalt, bereits durch die mikroskopische Untersuchung sichergestellt, konnten dagegen bei vereinzelter Lymphozytengehalt nicht gefunden werden. Ließen sich Tuberkelbazillen mikroskopisch nicht nachweisen, wurden die Proben auf Meerfischweinchchen verimpft. Wie das

bei dem Versuchsmaterial nicht anders erwartet werden konnte, war die Zahl der Todesfälle nach der Impfung relativ hoch und betrug innerhalb von 3 Wochen insgesamt 13 Tiere, und zwar in den 3 Gruppen mit vereinzelter, mittelmäßigem und sehr zahlreichem Lymphozytengehalt 3, 4 bzw. 6 Tiere. Über 3 Wochen bis zu höchstens 50 Tagen wurden 31 Meerfischweinchchen gehalten. Alle Tiere, auch diejenigen, die nach der Impfung nur 6—19 Tage am Leben blieben, sind umgehend nach der Sektion auf tuberkulöse Veränderungen untersucht. Nur in einem einzigen Falle gelang es, auf Grund des Tierversuches, zu einem für Tuberkelbazillen positiven Ergebnis zu kommen und dadurch die bereits durch mikroskopische Untersuchung ermittelten tuberkulösen Befunde zu erweitern. Es ist das ein Zeichen für die gewissenhafte Ausführung der bakteriologischen Prüfung, aber gleichzeitig ein Beweis, daß ein Lymphozytengehalt nicht unbedingt das Vorhandensein der Eutertuberkulose voraussetzt.

Dagegen läßt sich nicht bestreiten, daß bei einem positiven Tuberkelbazillenbefund stets Lymphozyten, und zwar meistens sehr reichlich, vorhanden waren. Es überrascht daher nicht, wenn B o n g e r t bei der Prüfung der von ihm erwähnten 22 Kühe in sämtlichen Milchproben Vermehrung des Lymphozytengehaltes fand, da er zu seinen Versuchen nur Tiere verwandte, „die nach Feststellung der Tuberkulose auf Grund des Tuberkulosefärbungsverfahrens in Weissenhof-Berlin zur Abschachtung kamen“ und von denen 13 eine klinisch nachweisbare Eutertuberkulose und nur 9 ein anscheinend gesundes Euter besaßen. Die Schlußfolgerung, daß der Nachweis eines vermehrten Lymphozytengehaltes der Milch das Vorliegen der hohen Wahrscheinlichkeit einer Eutertuberkulose im Sinne des Viehseuchengesetzes rechtfertigt, hat sich nach unseren Versuchen bisher leider in der Mehrzahl der Fälle als unberechtigt erwiesen. Dieses Urteil ist, um das nochmals zu betonen, noch nicht abschließend, da in einer weiteren Versuchsreihe die Möglichkeit der Verimpfung des zentrifugierten Bodensatzes von größeren Milchmengen als bisher geprüft werden soll.

Daß nicht in allen Fällen nach dem Vorschlage von B o n g e r t 250—500 ccm Milch verwendet werden können, läßt sich aus der unverhältnismäßig großen Zahl der beob-

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 10. Juli 1928 in Breslau.

achteten interkurrenten Todesfälle schon jetzt mit Sicherheit vorauslagen. Es darf nicht übersehen werden, daß hier nicht der Nachweis der Tuberkelbazillen in einer stark mit gefunder Milch verdünnten Milch, sondern die Prüfung eines Sekretes von Einzeltieren in Betracht kommt, und daß, bei einem reichlichen Lymphozytengehalt immer mit größeren Mengen von Bodensatz gerechnet werden muß, dessen restlose Verimpfung unter Umständen gar nicht möglich ist.

Um schließlich dem Einwand zu begegnen, daß bei einem Lymphozytengehalt und gleichzeitigem negativen Tuberkelbazillenbefund doch mit Initialstadien der Eutertuberkulose zu rechnen ist, soll ferner bei einer Reihe von Kühen nach mehrwöchiger Pause eine Kontrolluntersuchung der Milch ausgeführt werden. Diese Prüfungen müßten bei dem zu erwartenden Fortschreiten des tuberkulösen Prozesses dann sicher ein positives Ergebnis zeitigen.

Nach unseren Versuchen können wir auch nicht den Angaben B o n g e r t's beipflichten, daß zum Unterschied von den Tuberkelbazillen die pyogenen Bakterien nur die polymorphkernigen Leukozyten beeinflussen. Im Gegensatz hierzu haben wir sowohl bei der Streptokokken-Mastitis wie bei der durch das Bacterium pyogenes bedingten Euterentzündung, und zwar regelmäßig Lymphozyten nachweisen können, andererseits oft in großen Mengen polymorphkernige Leukozyten in der Milch frischmelkender Kühe beobachtet. Daß der Lymphozyt ein ständiger Begleiter aller Entzündungen, auch der nicht spezifischen ist, dürfte aus der Literatur zur Genüge bekannt sein. So lassen sich Lymphozyten nicht nur bei Erkrankungen der zytoblastischen Gewebe, sondern auch bei eitrigen Bronchitiden, katarrhalischen und kruppösen Pneumonien neben Leukozyten und Kapillarepithelien innerhalb des Alveolarexfudates nachweisen. Wir finden lympho-leukozytäre Zellansammlungen bei subakuten wie chronischen Glomerulo-Nephritiden, besonders aber der interstitiellen Nierenentzündung. Eine Ausnahme machen auch nicht die Entzündungen, die durch Parasiten veranlaßt werden, so lassen sich Lymphozytenhaufen an den Polen der Muskeltrichinenkapfeln nachweisen.

Selbst bei Hautentzündungen beobachtet man lymphozytäre entzündliche Infiltrate. Da ferner beim Rind die Lymphozyten 25—35 Prozent aller Leukozyten im Blute ausmachen und bei jeder Entzündung nicht nur mit vermehrtem Blutzufluß, sondern auch mit einer Durchlässigkeit der Kapillärwände zu rechnen ist, so werden Lymphozyten im entzündlichen Gewebe des Euters und der hieraus stammenden Milch niemals fehlen. Alle diese Umstände müssen berücksichtigt werden, ehe man auf Grund des Lymphozytenbefundes mit der Möglichkeit einer frühzeitigen Ausmerzung latenttuberkulöser Kühe rechnen will.

Daß im übrigen die histologische Zellanalyse, auch wenn sie selbstverständlich nicht bei jeder der dem freiwilligen Tuberkulosestillungsverfahrens angeschlossenen Kuh, womöglich noch mehrmals im Jahr und am sichersten aus jeder Zitze eines Tieres durchgeführt werden kann, von praktischer Bedeutung ist, habe ich schon hervorgehoben und möchte bei dieser Gelegenheit nicht veräumen, ein Durchschnittsschema unserer Milchbefunde unter den gewöhnlichen Verhältnissen zu geben.

I. Während die normale Milch, deren Aussehen als bekannt vorausgesetzt wird, keinen Bodensatz aufweisen und auch, wie aus Abbildung 1 ersichtlich ist, keinen Zellgehalt besitzen soll und mikroskopisch eine gleichmäßige Färbung nur unterbrochen von größeren und kleineren ungefärbten Inseln, die den Fettbestandteilen der Milch entsprechen, zeigt, läßt sich in

2. der Milch frischmelkender Kühe (nach Ablauf der Kolostraperiode) bei normalem Aussehen und unterschiedlichen Mengen gelblichen Bodensatzes ein geringer, mittelstarker bis hoher Zellgehalt nachweisen. Wie

aus Bild 2 ersichtlich, besteht derselbe vorwiegend aus Leukozyten mit stark gelapptem Kern in Hufeisen-, Rosenkranz- und Kleeblattform, der auffallend gut erhalten ist und keine Zerfallsercheinungen erkennen läßt.

3. Die Milch bei Streptokokken-Mastitis zeigt sich stets stark verändert und zwar sowohl dem Aussehen als der chemischen Zusammensetzung nach. (Geschmack, Gerinnbarkeit, Konsistenz.)

Der Bodensatz ist mittel bis hoch, enthält Flocken und Gerinnsel, die darüber stehende Flüssigkeit ist trübe, schmutzig graugelb.

Der Zellgehalt ist sehr hoch; es finden sich vorwiegend Leukozyten, und zwar polymorphkernige mit unregelmäßig gelapptem sowie mit fragmentiertem Kern. Lymphozyten sind immer vorhanden, meistens aber nur in geringer Menge, daneben machen sich sehr viel Drüsenepithelien, die zuweilen einen weit vorgeschrittenen Zerfallszustand (Detritus) erkennen lassen, bemerkbar. Die Menge des Fibrins ist unterschiedlich. Im mikroskopischen Bilde sind immer Mastitisstreptokokken in typischer Form und Lagerung sichtbar.

4. Die Pyogenes-Infektion des Euters ist demgegenüber durch folgende Milchveränderungen charakterisiert.

Das Aussehen der Milch zeigt im allgemeinen noch schwerere Veränderungen als die unter 3. beschriebenen, die Konsistenz ist meistens dickflüssig rahmartig, die Farbe graugrün. Auffällig ist der häufig stinkende Geruch. Der Bodensatz ist sehr hoch, stark verfärbt und niemals kurz, sondern schleimig. Der Zellgehalt ist sehr hoch und dadurch gekennzeichnet, daß alle Zellen mehr oder weniger zerfallen sind. Nachweisbar sind Leukozyten, Lymphozyten, Drüsenepithelzellen und Fibrinfäden sowie zahlreiche Pyogenesbakterien bei Gram-Färbung.

5. Im Gegensatz zu der Milch bei Streptokokken- und Pyogenes-Mastitis beobachtet man bei der Eutertuberkulose eine Milch, die Veränderungen in Farbe wie Beschaffenheit im Anfangstadium des Leidens nur sehr wenig erkennen läßt. Beim Vergleich mit normaler Milch fällt die nicht ganz reinweiße Farbe mit einem Stich ins Graue auf. Die Konsistenz erscheint dünnflüssiger. Der Bodensatz ist anfangs nur in Spuren, später auch im Verhältnis zu der Milch unter 3. und 4. in geringen Mengen vorhanden, die darüberstehende Flüssigkeitsäule zeigt milchserumähnliche Beschaffenheit, ist also nicht flockig oder getrübt, sondern durchscheinend. Der Zellgehalt zeigt im mikroskopischen Bilde viel Lymphozyten, dagegen auffallend wenig Leukozyten, Fibrin in unterschiedlicher Menge. Eine stärkere Abstoßung von Drüsenepithelien wird vermißt. Die Zellen sind mehr oder weniger gut erhalten.

Schlußfolgerungen.

I. Aus Vorstehendem ist ersichtlich, daß sowohl eine makroskopische Prüfung der Milch auf Farbe, Geruch, Konsistenz vor dem Zentrifugieren wie der Beschaffenheit des Bodensatzes und der Flüssigkeitsäule hierüber im Zentrifugat als auch eine mikroskopische Zellenanalyse beachtliche Winke für die Diagnose der Art des Euterleidens gibt.

II. Ein Lymphozytengehalt ist nicht allein charakteristisch für Eutertuberkulose, sondern auch für alle entzündlichen Zustände selbst dann, wenn diese wie in der Zeit des Frischmelkens gewissermaßen physiologisch sind.

III. Für Eutertuberkulose ist eine Erhöhung des Lymphozytengehaltes bei gleichzeitigem Fehlen einer Leukozytenvermehrung und des Zelldetritus charakteristisch. Es muß also stets das Mengenverhältnis der Lymphozyten zu den Leukozyten berücksichtigt werden. Wir beobachteten jedenfalls bei Eutertuberkulose oft weniger Leukozyten als bei den anderen Mastitiden Lym-

phozyten. Bei dieser Beschaffenheit einer Milchprobe empfiehlt sich stets eine Färbung und Untersuchung auf Tuberkelbazillen.

IV. Eine methodische, innerhalb des Tuberkulosefärbungsverfahrens bei sämtlichen Kühen in möglichst kurzen Zwischenräumen vorzunehmende Milchezellenanalyse zur Stellung einer Frühdiagnose der Eutertuberkulose ist praktisch undurchführbar. Dieses gilt in erhöhtem Maße, wenn

bei mikroskopisch negativem Tuberkelbazillennachweis ein Tierversuch eingeleitet werden soll und besonders bei der Vorschrift der Verimpfung des Bodenatzes von 250 bis 500 ccm Milch und einer intrapleurale oder intrapulmonale Einverleibung. Die Menge des Bodenatzes schwankt sehr und beträgt bei mittlerem Lymphozyten-Zellgehalt etwa einen halben Kubikzentimeter in 250 ccm Milch.

Der kulturelle Nachweis von Tuberkelbakterien und seine praktische Bedeutung. *)

Ein Beitrag zur Frage der Züchtung von Tuberkelbakterien.

Von Dr. Wolters, Dessau.

Der Nachweis von Tuberkelbakterien ist bislang fast ausschließlich durch mikroskopische Untersuchungen und den Tierversuch geführt. Das Kulturverfahren ist zu diagnostischen Zwecken nur selten angewendet, trotzdem bereits R. Koch 1882 die Reinzüchtung gelungen ist. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, daß Verunreinigungen durch schnell wachsende Begleitbakterien die Züchtung von Tuberkelbakterien erschweren. Züchtungsversuche sind dementsprechend stets über den Umweg des Tierversuches vorgenommen. Versuche, Tuberkelbakterien direkt aus tuberkulösen Organen, Lymphknoten, tuberkulöser Milch oder sonstigen Se- und Exkreten, zu züchten, sind dagegen nur selten angestellt und haben eine größere praktische Bedeutung nicht erlangt. Auch die von Uhlenhuth angegebene Vorbehandlung mit Antiformin zum Abtöten der Begleitbakterien hat die darauf gesetzten Hoffnungen nicht restlos erfüllt. Für die Diagnose tuberkulöser Erkrankungen ist der exakte und schnelle Nachweis von Tuberkelbakterien von erheblicher praktischer Bedeutung. — Der mikroskopische Nachweis und der Tierversuch kann höheren Anforderungen in dieser Beziehung nicht immer genügen. Werden bei mikroskopischer Untersuchung Fehlergebnisse nicht zu vermeiden sein, so ist die lange Dauer des Tierversuches ein Nachteil, selbst wenn man von den unangenehmen interkurrenten Todesfällen der Versuchstiere abieht. Es würde daher eine außerordentliche Bereicherung der bakteriologischen Diagnostik bedeuten, wenn es gelänge, eine brauchbare Methode zum kulturellen Nachweis der Tuberkelbakterien zu ermitteln, die einfach in ihrer Durchführung und in ihren Ergebnissen dem Tierversuch nicht nachsteht. Sehr zahlreich sind daher die Versuche, den kostspieligen Tierversuch durch das Kulturverfahren zu ersetzen. Abgesehen von dem schon erwähnten Antiforminverfahren nach Uhlenhuth versuchten zunächst Löwenstein und Sunnyoshi die Begleitbakterien durch längeres Einwirken von 10–15prozentiger Schwefelsäure abzutöten, da sie beobachtet hatten, daß weder Natronlauge noch die starken Mineralfäuren Tuberkelbakterien in ihrer Wachstumsenergie zu schädigen vermögen. Sie legten diese Beobachtungen über die Resistenz einem Züchtungsverfahren zugrunde. Sunnyoshi gelang es dann, aus den mit Schwefelsäure, Salzsäure, Milchsäure und Natronlauge vorbehandelten zentrifugierten Sputa Tuberkelbakterien in Reinkultur auf Glycerinkartoffeln zu gewinnen. Die Methode wurde von Hohn nachgeprüft und verbessert, indem er die Menge des Sputums herabsetzte und außer der Glycerinkartoffel auch Eiernährböden nach Lubenau einführte. Auf Grund seiner Erfahrungen mit der Schwefelsäuremethode kommt Hohn zu dem Schluß, daß der kulturelle Nachweis von Tuberkelbakterien zu einer der einfachsten und

sichersten Methoden in der Bakteriologie gehört. Nachprüfungen von Pesch, Simchowitsch sowie Engel u. a. bestätigten im allgemeinen die Angaben Hohn's. Engel weist aber schon auf häufige Verunreinigungen der Nährböden hin.

In Anbetracht der außergewöhnlichen praktischen Bedeutung des kulturellen Tuberkelbakteriennachweises für die Diagnose der offenen Tuberkulose haben wir daher Versuche angestellt, das Züchtungsverfahren nach Hohn nachzuprüfen. Wir bedienten uns hierbei der von Hohn ausführlich im Zentralblatt für Bakteriologie beschriebenen Methode, wobei wir besonderen Wert auf die Herstellung der Eiernährböden nach Lubenau legten und außerdem Eiernährböden nach Besredka verwandten.

Zunächst haben wir das Verfahren von Hohn an Sputum, Eiter, Exsudat, Stuhl und Urin, die der humanmedizinischen Abteilung des Instituts eingefandt wurden, nachgeprüft. Insgesamt wurden von 179 Proben, davon 93 mikroskopisch positive, kulturell verarbeitet. Während die Kultur aus Eiter, Exsudaten und Urin keine Schwierigkeiten bereitet, wurde anfangs bei der Verarbeitung von 63 mikroskopisch positiven Sputen häufiger Verunreinigung der sterilen Nährböden durch nicht abgetötete Begleitbakterien beobachtet, so daß in 5 Prozent der Fälle trotz mikroskopisch positiven Befundes die Kultur nicht gelang. Bei späterer Verarbeitung von 94 Sputen, davon 30 mikroskopisch positiven, wurden nicht nur aus positiven Sputen, abgesehen von einigen stark verunreinigten Einzelröhrchen, Reinkulturen von Tuberkelbakterien gezüchtet, sondern auch darüber hinaus aus 13 mikroskopisch negativen (20 Prozent) positive Kulturergebnisse erzielt. (Darüber wird nach Abschluß der mit Unterstützung der Anhaltischen Regierung durchgeführten Arbeiten später ausführlich berichtet werden.)

Nachdem auf diese Weise die Methode sich als brauchbar erwiesen hatte, haben wir unsere Untersuchungen auf Lungenschleimproben vom Rind, später auch auf Milch und tuberkulöse Organe von Rind, Schwein und Geflügel ausgedehnt.

Bei Verarbeitung von Lungenschleimproben, die mit dem Lungenschleimfänger von Rautmann gewonnen waren, traten bei Anwendung der Schwefelsäuremethode so häufig Verunreinigungen auf, daß eine praktische Verwendung nicht in Frage kam. Zweifellos ist die Untersuchung von Lungenschleimproben des Rindes deswegen so außerordentlich schwierig, weil bei der Entnahme fast stets Verunreinigungen mit Sporenträgern vorkommen. Wir haben daher die Schwefelsäuremethode mit der Antiforminmethode kombiniert und folgende Technik angewandt: Die zu untersuchende Lungenschleimprobe (6–8 ccm) wird 30 Minuten lang unter öfterem Umschütteln mit 10 ccm 15prozentigem Antiformin behandelt, 5 Minuten zentrifugiert und einmal mit 0,85 prozentiger Kochsalzlösung ausgewaschen. Das Zentrifugat wird zunächst mit 10pro-

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 10. Juli 1928 in Breslau.

zentiger, später mit 5prozentiger Schwefelsäure 20 Minuten im Schüttelgläschen behandelt, darauf 5 Minuten zentrifugiert und der Bodensatz ohne Auswaschen auf je zwei sterile Eiernährböden nach Lubenau, und in zwei Röhrchen Besredka-Bouillon überimpft und bei 37 Grad bebrütet. Mit der kombinierten Antiformin-Schwefelsäuremethode ist es in 90 Prozent gelungen, Tuberkelbakterien in Reinkultur aus mikroskopisch positiven Lungen-schleimproben sowohl bei Verwendung von 10 prozentiger als auch 5prozentiger Schwefelsäure zu züchten. (Die Untersuchungen erstrecken sich mit der kombinierten Methode auf 69 Lungen-schleimproben, davon waren mikroskopisch 48 positiv und 21 negativ.) Eine Verunreinigung des Nährbodens haben wir nur gelegentlich bei Anwendung der 5prozentigen Schwefelsäure beobachtet; sie ist möglicherweise auf ungenügend vorbehandelte Sedimente zurückzuführen, da von der gewissenhaften Ausführung der Technik in hohem Maße der kulturelle Nachweis abhängig ist.

Während also das Schwefelsäureverfahren nach Hohn bei Verarbeitung von Lungen-schleimproben des Rindes nicht zu verwerten ist, gibt die kombinierte Antiformin-Schwefelsäuremethode bessere Ergebnisse, wobei im besonderen die Möglichkeit besteht, durch Herabsetzen des Schwefelsäuregehaltes günstigere Wachstumsbedingungen zu schaffen, da die Entwirkung höherer Schwefelsäurekonzentrationen das Wachstum beeinträchtigt.

Was die Zeitdauer bis zum Auftreten von Kolonien des Typus bovinus auf den Nährböden nach Lubenau betrifft, so trat das Wachstum zumeist nach 28 Tagen in Erscheinung, während bei mikroskopischer Untersuchung der Besredka-Bouillon in der Mehrzahl der Fälle nach 18—20, teilweise sogar schon nach 10—12 Tagen Tuberkelbakterien nachzuweisen waren. Es war also die Besredka-Bouillon den festen Eiernährböden bei unseren Untersuchungen in dieser Beziehung erheblich überlegen. Wir geben der Besredka-Bouillon daher den Vorzug, verarbeiten jedoch zur sicheren Kontrolle vorläufig je zwei Röhrchen Besredka-Bouillon und je zwei Röhrchen Eiernährböden nach Lubenau.

Bei direkter Züchtung aus tuberkulösen Tierorganen, die anfangs nur mit der Schwefelsäuremethode vorgenommen wurde, haben wir bei Verarbeitung von 82 Darmlymphknoten des Schweines und von tuberkulös erkrankten Hühnerlebern sehr häufig Verunreinigung durch Begleitbakterien festgestellt, so daß wir nunmehr auch hier die kombinierte Antiformin-Schwefelsäuremethode vorziehen. Es gelangten zur Untersuchung mit der kombinierten Methode Darmlymphknoten von Schweinen, tuberkulöse Lungen von Rindern, tuberkulöse Lymphknoten vom Kalb, tuberkulöse Lebern von Hühnern. Insgesamt wurden 29 Einzeluntersuchungen ausgeführt. Es gelang aus 14 Organproben vom Rind und vom Kalb Tuberkelbakterien in Reinkultur zu züchten; bei Verarbeitung tuberkulöser Lymphknoten des Schweines wurden in fünf von sechs Fällen Tuberkelbakterien in Reinkultur gewonnen, während in einem Falle die beimpften Nährböden steril blieben.

Bei Verarbeitung von 10 tuberkulös veränderten Hühnerlebern gelang es mit der Schwefelsäuremethode ebenfalls nicht immer, Reinkulturen zu erhalten, da teilweise die beimpften Nährböden verunreinigt waren. Sieben tuberkulöse Hühnerlebern wurden infolgedessen der kombinierten Antiformin-Schwefelsäuremethode unterworfen, jedes Mal wurden Tuberkelbakterien in Reinkultur gezüchtet. Zur Züchtung der Geflügeltuberkelbakterien wurde außer den veränderten Lebern auch das Knochenmark nach vorheriger mikroskopischer Untersuchung ohne jede Vorbehandlung verarbeitet. 14mal wurden mikroskopisch Tuberkelbakterien nachgewiesen. Bei Überimpfung der Kulturen nach steriler Eröffnung des Knochenmarks

wurden sowohl auf den Eiernährböden nach Lubenau wie auch in Besredka-Bouillon Tuberkelbakterien in Reinkultur erhalten. Nach unserer Beobachtung ist eine Züchtung von Tuberkelbakterien aus dem Knochenmark der Hühner außerordentlich einfach und gibt schon anscheinend ohne Vorbehandlung in allen Fällen positive Ergebnisse.

Inwieweit der kulturelle Nachweis praktisch für die Diagnose der offenen Tuberkulose beim Rind verwertet werden kann, muß durch weitere Untersuchungen festgestellt werden, wobei vor allem Trachealproben berücksichtigt werden müssen. Immerhin bedeutet die Kultur von Tuberkelbakterien mit Hilfe der Schwefelsäuremethode eine wesentliche Vereinfachung der bisher bekannten Züchtungsverfahren, wenngleich der Tierversuch zum exakten Nachweis wohl nicht entbehrt werden kann. Für den Nachweis von Tuberkelbakterien in Sammelmilchproben ist nach unseren bisherigen wenigen Beobachtungen die Züchtungsmethode kaum verwendbar.

Ob es möglich sein wird, auf Grund verschiedenartigen Wachstums auf künstlichen Nährböden eine Typentrennung vorzunehmen, muß weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben. Wir machten die Feststellung, daß zwischen dem Typus bovinus und humanus kein wesentlicher Unterschied in der Kultur auf den Eiernährböden nach Lubenau besteht. Beide wachsen als weißlich-krümelige Beläge, deren Farbton später in braunrot übergeht, wobei Typus bovinus nicht so üppig wächst. Auch in Besredka-Bouillon zeigt das Wachstum beider keine wesentlichen Unterschiede. Dagegen sind in der Art des Wachstums des Typus gallinaceus besonders in der Besredka-Bouillon Unterschiede zu erkennen. Hier wächst der Typus gallinaceus als schleimiger, zopfartiger, sich beim Schütteln nicht auflösender Bodensatz, ähnlich dem Wachstum des Bact. pyosepticum in Bouillon. Auch auf den Eiernährböden nach Lubenau sind die Wachstumsunterschiede unverkennbar, da der Typus gallinaceus in feinen, knopfartigen, schleimigen Kolonien wächst, die einen zusammenhängenden Belag bilden.

Wir fassen unsere Erfahrungen bei der Züchtung von Tuberkelbakterien menschlicher und tierischer Herkunft in folgenden Schlußsätzen zusammen:

1. Die Schwefelsäuremethode nach Hohn zur Reinzüchtung von Tuberkelbakterien des Typus humanus aus Urin, Exsudaten, Sputen und Organen infizierter Versuchstiere ist praktisch verwendbar.
2. Die Reinzüchtung des Typus bovinus aus Sputum, Milchproben und Organen tuberkulös erkrankter Tiere (Rind und Schwein), ist wegen der zahlreichen bakteriellen Verunreinigungen, schwieriger.
3. Die Reinzüchtung des Typus gallinaceus aus Knochenmark erkrankter Hühner gelingt ohne Schwierigkeiten.
4. Zur Ausschaltung bakterieller Verunreinigungen hat sich die Züchtung aus tuberkulösen Tierorganen und -Sputen nach Vorbehandlung mit Antiformin in Verbindung mit der Schwefelsäure-Methode bewährt.
5. Außer den Eiernährböden nach Lubenau eignet sich auch die Eierbouillon nach Besredka vorzüglich für die Reinzüchtung der Tuberkelbakterien.
6. Die Abgrenzung des Typus humanus vom Typus bovinus ist auf Grund des Wachstums in Eiernährböden nicht möglich. Der Typus gallinaceus zeigt dagegen besonders in Besredka-Bouillon erkennbare Wachstumsunterschiede.

(Aus dem Tierfeucheninstitut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Hannover.)

Über den Wert des Säureeinwirkungsverfahrens und der Eiernährböden für die Gewinnung von Reinkulturen von Tuberkelbakterien und für den Nachweis dieser Keime in eingesandten Lungen- und Milchproben. *)

Von Dr. Karsten, Hannover.

Nach den bisherigen Veröffentlichungen in der humanmedizinischen Literatur bildet das Säureeinwirkungsverfahren nach Loewenstein und Sumiyoski im Verein mit der Verwendung von Eiernährböden nach Lubenau einen großen Fortschritt in der leichten und sicheren Gewinnung von Reinkulturen der Tuberkelbakterien vom Typus humanus, sowie zum Nachweis dieser Keime im Sputum, Eiter, Harn usw. von Menschen. Über die Brauchbarkeit dieses Verfahrens in der Veterinärmedizin liegen bisher nur wenige Mitteilungen vor, so von Seelmann und Klingmüller und von Sawelieff, die zu dem Ergebnis kommen, daß es für die Gewinnung von Reinkulturen aus tuberkulösem Material wie Lymphknoten, Tuberkelherden der Lunge und anderer Organe des Rindes geeignet ist, während die geringe Zahl der unterfuchten vom Rinde stammenden Lungenschleim- und Milchproben kein sicheres Urteil über den Wert der Methode für den Nachweis von Tuberkelbakterien in diesen Medien zuläßt. Unfere im Tierfeucheninstitut zu Hannover angestellten Versuche über die Züchtung und den Nachweis von Tuberkelbakterien nach den Methoden Loewenstein und Sumiyoski sowie von Lubenau sind noch nicht abgeschlossen, insbesondere was die Züchtung der Tuberkelbakterien aus eingesandten Lungenschleim- und Milchproben anbelangt, trotzdem gibt uns Punkt A der Tagesordnung (Der kulturelle Nachweis von Tuberkelbakterien und seine praktische Bedeutung) Veranlassung, unfere bisherigen Ergebnisse mitzuteilen.

Die von uns angewandte Technik ist die, wie sie Hoh n im Zentralblatt für Bakteriologie, Bd. 98, Heft 7/8, angegeben hat. Da die an sich sehr einfache Technik bei diesem Verfahren immerhin von großer Bedeutung ist, wollen wir kurz erwähnen, daß wir die von Menschen stammenden Sputen und die Becherproben des Rindes in der Weise verarbeiteten, daß wir zu 2 ccm Sputum 10 ccm einer 10volumprozentigen Schwefelsäurelösung hinzusetzten und die Mischung im Schüttelröhrchen mit aufgeschliffener Glaskappe gut schüttelten. Während der Säureeinwirkungszeit von 20 Minuten wurde wiederholt geschüttelt, dann die Mischung in ein Zentrifugenröhrchen gebracht und bei 3000 Umdrehungen 5 Minuten lang ausgeschleudert. Von dem Zentrifugat wurde dann sofort, also ohne Waschen desselben, etwas Material auf eine Reihe von Röhrchen, die mit den Lubenau'schen Eiernährböden beschickt waren, verimpft, wobei auf gutes Einreiben des Materials in den Nährboden Wert gelegt wurde. Bei den mit der Trachealkanüle entnommenen Tupferproben wurde der dem Tupfer anhaftende Schleim zunächst mit steriler Pinzette ausgedrückt, mit 6—10 ccm 10volumprozentiger Schwefelsäure übergossen und gut vermisch. Im Schüttelröhrchen wurde die Mischung, in welcher der Tupfer verblieb, während der 20 Minuten währenden Einwirkungszeit wiederholt geschüttelt. Nach dem sich anschließenden 5 Minuten langen Zentrifugieren erfolgte dann sofort wieder die Ausfaat auf die Eiernährböden. Bei tuberkulösen Organen wurde das Material mit Schere und Pinzette fein zerfchnitten oder im Mörtel verrieben. Etwas Material wurde dann in ein Schüttelröhrchen gebracht, hier zunächst 2 ccm 10prozent. Schwefelsäure mittels Glasstabes verrieben, worauf weitere

8 ccm Schwefelsäurelösung zugefetzt wurden. Nach kräftigem Schütteln ließen wir die Säure 20 Minuten einwirken. Während der Einwirkungszeit fand öfteres Schütteln statt. Unter Zurücklassen größerer Gewebsbröckel wurde die schlammige Masse, welche sich bildete, in ein Zentrifugenröhrchen gebracht, das 5 Minuten lang ausgeschleudert wurde. Der entstehende Bodensatz wurde dann fogleich auf die Eiernährböden verimpft.

Um uns mit der Technik des Verfahrens vertraut zu machen, verarbeiteten wir zunächst sechs von Menschen stammende Sputumproben, die wir dem Entgegenkommen des Medizinal-Untersuchungsamtes zu Hannover verdanken. Unter Untersuchungsergebnis war folgendes:

	Mikroskopischer Tub.-Bakt.-Nachweis	Zahl der angelegten Kultur- röhrchen	Zahl d. Kulturröhrchen, auf denen Tub.-Bakt.- Kulturen wuchsen	Zahl der steril- bleibenden Kul- turröhrchen	Zahl der verun- reinigten Kultur- röhrchen ohne Tub.-Bakt.-Kult.
Probe I.	Zahlreiche Tub.-Bakt. in jedem Gesichtsfelde	4	3 Nach 10 Tagen bereits zartes Wachstum, zahlreiche Kolonien, nach 5 Wochen üppiges Wachstum		1
Probe II.	stark positiv; in jedem Gesichtsfelde etwa 6 Tub.-Bakterien; zieml. viel Begleitbakterien	5	Auf 2 Röhrchen nach 9 Tagen beginnendes Wachstum; Kulturen verunreinigt	3	
Probe III.	stark positiv; in jedem Gesichtsfelde 1-2 Tub.-Bakterien	4	3 nach 17 Tagen in 2 Röhrchen zartes Wachstum, das 3. Röhrchen zeigt 7 Kolonien, ist aber verunreinigt	1	
Probe IV.	schwach positiv, ab und zu 1-2 Bakt. in einem Gesichtsfelde; Begleitbakterien reichlich	4	—	2	2
Probe V.	schwach positiv, hin und wieder 1 Tub.-Bakt. im Gesichtsfelde; mäßig verunreinigt	4	2 nach 14 Tagen 5 und 6 Einzelkolonien	1	1
Probe VI.	mikroskopisch negativ, wenig verunreinigt	4	—	3	1

Diese Tabelle zeigt, daß der kulturelle Nachweis der Tuberkelbakterien und deren Reinzüchtung aus menschlichen Sputen auf Anrieb ohne Schwierigkeiten gelang. Schon 9 Tage nach der Ausfaat und ipätestens nach 17 Tagen war ein deutliches Wachstum der Tuberkelbakterien wahrzunehmen.

Wir versuchten nun, Reinkulturen aus tuberkulösen Lymphknoten und anderen Organen von Meerfchweinchen zu gewinnen, die durch die Verimpfung eingesandter Lungen- und Milchproben von Rindern tuberkulös erkrankt waren, um zu sehen, ob sich auch der Typus bovinus leicht in Reinkultur bringen läßt. Es wurden 10 tuberkulöse Kniefaltendrüfen, 5 tuberkulöse Knoten der Leber und 5 Knoten der Milz verarbeitet, mit dem Ergebnis, daß es gelang, aus 8 Kniefaltendrüfen, 4 Knoten der Leber und 3 Knoten der Milz die Tuberkelbakterien sofort, wenigstens in einem Röhrchen, in Reinkultur zu züchten. Das Wachstum erfolgte jedoch im Gegensatz zu den Kulturen des Typus humanus recht langsam. Frühestens nach 25 Tagen sah man

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 10. Juli 1928 in Breslau.

zarte, winzige Kolonien, nach 37 Tagen einen zarten Bakterienrasen. Aus einem tuberkulösen Lymphknoten wurde nach 70 Tagen noch kein Wachstum beobachtet, das erst nach 80 Tagen in Erscheinung trat und nach 96 Tagen soweit gediehen war, daß man feine, zarte, trockene Kolonien wahrnehmen konnte. Im allgemeinen dauert es etwa sechs Wochen, bis ein makroskopisch sichtbares Wachstum zu bemerken war. Es unterliegt keinem Zweifel, daß durch die Säureeinwirkung die Wachstumsenergie der Tuberkelbazillen mehr oder weniger, oft recht wesentlich, beeinträchtigt wird.

Wir gingen nun dazu über, wegen Tuberkulose auf dem hannoverschen Schlachthofe konfiszierte Organe des Rindes zur Kultivierung der Tuberkelbakterien zu verwenden. Das Ergebnis der von uns untersuchten 35 tuberkulösen Organe geht aus der folgenden Zusammenstellung hervor:

	Zahl der Untersuchungen:	Zahl der Fälle, in denen durch die Kultur Tub.-Bakt. nachgewiesen wurden:
1. Tuberkulöse Bronchial- und Mediastinallymphknoten	22	19
2. Tuberkelknoten der Lunge	10	7
3. Tuberkelknoten d. Nieren	1	1
4. Tuberkelknoten der Leber	2	2
im ganzen	35	29

Es gelang also, von 35 tuberkulösen Organen des Rindes in 29 durch die Kultur die Tuberkelbakterien nachzuweisen. Wenn man nach zweimaliger Überimpfung der erhaltenen Reinkulturen auf weitere Eiernährböden die feinen Kolonien auf Glycerinbouillon übertrug, konnte man in der Regel die Tuberkelbakterien auch auf diesem Nährboden zur Weiterentwicklung bringen.

Es wurden ferner aus 4 tuberkulösen Hühnerlebern Kulturen angelegt, die stets ein positives Ergebnis hatten. Das Wachstum trat frühestens am 16. Tage nach der Ausfaat makroskopisch in Erscheinung, spätestens am 29. Tage. Auch bei diesen Versuchen war fast immer ein Teil der Röhren durch Begleitbakterien verunreinigt.

Bei Röhren, auf denen die Tuberkelbakterien wuchsen, aber schwach verunreinigt waren, ist es uns durch das Säureeinwirkungsverfahren und der Eiernährbodenkultur wiederholt gelungen, Reinkulturen zu erhalten.

Es braucht nicht näher erläutert zu werden, daß die Frage der Brauchbarkeit dieser Tuberkelbakterienkultur für den Nachweis von Tuberkelbakterien in eingefandten Lungen- und Milchproben mit dem Ziele, den Meerfischweinchenversuch entbehrlich zu machen, für uns von außerordentlicher Wichtigkeit ist. Wenn unsere Untersuchungen hierüber auch noch laufen, so läßt sich doch wohl schon jetzt sagen, daß vorläufig die Tuberkelbakterienkultur den Meerfischweinchenversuch nicht zu ersetzen vermag. Denn von 20 Lungenproben, in denen mikroskopisch reichlich Tuberkelbakterien nachgewiesen wurden, gelang die Kultur aus 16 Proben, von 20 Proben, in denen mikroskopisch nur in mäßiger Menge die Tuberkelbakterien festgestellt wurden,

in 15 Proben und von 20 Proben, in denen nur vereinzelt mikroskopisch Tuberkelbakterien zu ermitteln waren, in 12 Proben. Von 20 mikroskopisch negativen Proben wurden nur in einer Probe und nur in einem Röhren vier Kolonien zum Wachstum gebracht. Bei den mikroskopisch negativen Lungen- und Milchproben fehlt uns bisher die gleichzeitige Kontrolle durch den Meerfischweinchenversuch, den wir bei unseren noch laufenden weiteren Untersuchungen angestellt haben. Erwähnt sei, daß wir hauptsächlich mit der Trachealkanüle entnommene Tupferproben verarbeiteten, bei denen die Verunreinigung der Kulturröhren durch Begleitbakterien geringer war als bei den in geringerer Zahl verarbeiteten Becherproben.

Am schwierigsten gestaltete sich aber der kulturelle Nachweis der Tuberkelbakterien in den Milchproben, da infolge von Begleitbakterien Verunreinigungen am häufigsten waren. Von 5 positiven Milchproben konnten wir nur zweimal die Tuberkelbakterien durch die Kultur nachweisen. In 10 mikroskopisch negativen Fällen gelang uns der Tuberkelbazillennachweis auch nie durch den Kulturversuch, obwohl die geimpften Meerfischweinchchen von zwei Milchproben nach 6 Wochen tuberkulös erkrankt waren. Es ist aber immerhin möglich, daß sich die Ergebnisse bei den Untersuchungen von Lungen- und Milchproben durch Vervollkommen der Technik verbessern lassen. Wir haben aber bisher durch Einwirkung der Schwefelsäure in anderen Konzentrationen, höheren und geringeren, und bei Anwendung anderer Einwirkungszeiten bisher keine besseren Erfolge verzeichnen können.

Zusammenfassung.

Das Säureeinwirkungsverfahren nach Loewenthal und Sumiyoski ist im Verein mit der Tuberkelbakterienkultur auf Eiernährböden nach Lubenau in der Modifikation von Hohn eine gute Methode, auch aus tuberkulösem, vom Rinde stammenden Material, die Tuberkelbakterien nachzuweisen und in Reinkultur zu bringen. Durch das Verfahren gelingt aber der Nachweis von Tuberkelbakterien in vom Rinde stammenden Lungen- und Milchproben nicht häufiger als durch die mikroskopische Untersuchung, so daß es vorläufig keinen Ersatz für den Meerfischweinchenversuch bildet. Auch zum Nachweis von Tuberkelbakterien in Milchproben ist das Verfahren vorläufig nicht geeignet, den Meerfischweinchenversuch entbehrlich zu machen.

Literatur.

Hohn: Die Kultur des Tuberkelbazillus zur Diagnose der Tuberkulose. Zentralbl. für Bakt., Org., Bd. 89. — Derselbe: Zur Frage der Kultur des Tuberkelbazillus und ihre Verwendung zur Diagnose der Tuberkulose. Zentralbl. für Bakt., Org., Bd. 103, Heft 6/8. — Loewenstein: Zeitschrift für Tuberkulose Bd. 7; Wiener klin. Wochenschrift 1925. — Lubenau: Hyg. Rundschau 1907. — Seelmann und Klingmüller: Die Züchtung von Tuberkelbakterien aus verschiedenen Ausgangsmaterialien mit Hilfe des sog. Säurebehandlungsverfahrens. Zentralbl. für Bakt., Bd. 104, Heft 7/8. — Sawelieff: Über die Gewinnung von Reinkulturen der Tuberkelbazillen nach der Methode Hohn. Therap. Monatshefte für Veterinärmedizin, Bd. 1, Heft 11. — Sumiyoski: Zeitschrift für Tuberkulose Bd. 39 und Bd. 40.

Einige interessante Tuberkulosefälle.

Ein Beitrag zur Pathogenese der Tuberkulose.*)

(Mit 5 Abbildungen.)

Von Dr. H. Rautmann, Halle (Saale).

Die Bestimmungen des Ministerialerlasses vom 18. April 1923, die eine Untersuchung der Lungen fordern, wenn im

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 10. Juli 1928 in Breslau.

Gegensatz zum positiven Befunde bei den klinisch privaten wie amtlichen Erhebungen und bei der bakteriologischen Prüfung durch die Zerlegung tuberkulöser Herde nicht ermittelt werden, haben sich in mehrfacher Beziehung als sehr wertvoll erwiesen. Ganz abgesehen davon, daß der durch den Erlaß beabsichtigte Zweck erreicht wurde, Fehlfeststel-

lungen, die durch ein Übersehen tuberkulöser Veränderungen nach der Zerlegung bedingt wurden, aufzuklären, ermöglichen die Nachuntersuchungen Rückschlüsse auf die Ausführung der Sekretentnahme und sind nicht zuletzt als Hinweise zu betrachten, die Erledigung der bakteriologischen Arbeiten fortgesetzt zu kontrollieren. Von besonderem Wert haben sich die Nachuntersuchungen auch erwiesen, weil sie die Kenntnis der Differentialdiagnose vervollständigen und zur Pathogenese der Tuberkulose nicht unwesentlich beitragen.

Zunächst ist es gelungen, das Vorkommen der Tuberkelbazillen in den Luftwegen von Tieren ohne manifeste tuberkulöse Veränderungen zu bestätigen. Dieses war bisher aber nur möglich, wenn in dem Bestande bereits andere Rinder mit offener Tuberkulose nachgewiesen waren. Schon früher habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß sich die Tuberkelbazillen scheinbar auch längere Zeit im Bronchialbaum vorfinden können ohne pathogen zu wirken, da ihr Nachweis sowohl in Sekreten, die zu verschiedenen Zeiten von lebenden Tieren stammten, als auch später nach der Zerlegung gelang und inzwischen mehrere Monate vergangen waren. Die Art der Probeentnahme aus der Luftröhre mittels Trokar oder aus dem Schlund mittels Lungenfängler war für das bakteriologische Ergebnis ohne Unterschied.

Interessant sind ferner eine Reihe von Fällen, in denen nach positivem Tuberkelbazillenbefund zu Lebzeiten die Lungen und auch die regionären Lymphknoten keine makroskopisch erkennbaren Veränderungen aufwiesen, dagegen die Lungenpleura stets mehr oder weniger entzündliche Veränderungen zeigte, wie das die nachfolgend kurz skizzierten Sektions-Protokolle ergeben:

1. Sektionsprotokoll vom 16. März 1926. Die Lunge ist sehr stark emphysematös, im Lungengewebe pathologisch anatomische Veränderungen nicht feststellbar. Das Lungenfell ist fast in ganzer Ausdehnung trübe und mit einem dünnen, netzartigen, stellenweise zottigen Belag versehen. Die Lymphknoten der Lungen sind geschwollen, im hinteren Mittelfellknoten finden sich mehrere bis stecknadelkopfgroße, gelbgraue Herde, die weder Verkäfung noch Verkalkung zeigen. Im Bronchialschleim sowohl wie in den Lymphknoten sind bakteriologisch Tuberkelbazillen nachgewiesen.

2. Sektions-Protokoll vom 11. August 1926. Lungenfell erscheint fast in ganzer Ausdehnung getrübt und ist mit zarten gelblichen und rötlichen, stellenweise zottigen Auflagerungen besetzt. Veränderungen in den Lungen und Lymphknoten nicht festzustellen. In Ausstrichpräparaten des Bronchialschleimes der verschiedensten Teile der Lungen mikroskopisch keine, wohl aber durch Tierversuch Tuberkelbazillen nachgewiesen.

3. Sektions-Protokoll vom 6. Januar 1927. Lunge zeigte bereits Fäulniserscheinungen, die Pleura der linken Lunge läßt in ganzer Ausdehnung, diejenige der rechten im Bereich der hinteren Hälfte des Zwerchfellappens trüben und einen sammetartigen, teilweise fädigen Belag erkennen. Tuberkulöse Veränderungen an der Lunge und den Lymphknoten nicht nachweisbar. Im Bronchialschleim schon durch die mikroskopische Untersuchung Tuberkelbazillen nachgewiesen.

4. Sektions-Protokoll vom 24. November 1927. Das Lungenfell ist stark, bis zu 1 mm verdickt, es zeigt zottige Anhänge, die sich durch eine höhere Rötung von der rosaroten Nachbarschaft abheben. Die in der Lunge vorhandenen Knoten, und zwar im linken hinteren Lungenlappen bis zur Hühnereigröße, an anderen Stellen schwankend zwischen Linfen- und Wallnußgröße, zeigen eine bis 2 mm starke bindegewebige Kapsel, einen dickbreiigen, braun gefärbten Inhalt und teilweise eine Kalkeinlagerung in der Wand. Schon makroskopisch sind Leberegel nachweisbar, so daß für diese Veränderungen die Tuberkulose als Ursache nicht in Frage kommt. Luftröhre und Bronchien enthalten schaumigen Inhalt. Die Blutgefäße der Schleimhaut treten als rotgefärbte Stränge deutlich hervor. Die Lymphknoten lassen keinerlei Veränderungen erkennen. Tuberkelbazillen konnten im Luftröhren- und Bronchialinhalt nachgewiesen werden.

5. Sektions-Protokoll vom 2. März 1927. Die Lunge läßt nur in ihrem Überzug, und zwar im Bereich des Zwerchfellappens der rechten Lunge in Handtellergröße Trübungen der Pleura erkennen und zeigt hier zottige, fleischfarbige Auflagerungen, der Bronchiallymphknoten normal. Im hinteren Mittelfellknoten fanden sich mehrere annähernd stecknadelkopfgroße, über die Schnittfläche vorspringende gelbe Herde, die weder Verkäfung noch Verkalkung zeigen, und auf Grund der makroskopischen Untersuchung nicht für tuberkulöse Veränderungen gehalten wurden. Ausstriche aus Lymphknoten und Lungenfänger für Tuberkelbazillen positiv.

In den vorgenannten Fällen handelt es sich allem Anschein nach um Initialstadien der Tuberkulose, die sich leicht der makroskopischen Feststellung entziehen, wenn nicht auffallende Veränderungen des Brustfelles eine Anregung zur mikroskopischen Untersuchung von Lungenfänger- und Lymphknotenausstrichen geben würden. Von wesentlich größerer Bedeutung sind die nachfolgenden Befunde, bei denen zwar tuberkulöse Herde in der Lunge vorhanden, die regionären Lymphknoten aber frei erscheinen oder solche Veränderungen zeigten, die nicht als tuberkulös gedeutet wurden, da wir andernfalls nicht mit der Einfendung der Organe hätten rechnen können.

6. Sektions-Protokoll vom 13. Oktober 1927. Die Lungenpleura zeigt im linken Zwerchfellappen zottige Anhänge sowie Verwachsungen des vorderen und des Herzlappens. Im letzteren und im linken Spitzenlappen leicht durchfühlbare Verhärtungen. In den Bronchien dieser Abschnitte findet sich dicker rahmiger Eiter, der sich in der Luftröhre und in den großen Bronchien angehäuft hat. Die verdichteten Stellen sind von fleischähnlicher Beschaffenheit und lassen keine käsigen und zerfallenen Herde erkennen. Die Wände der luftführenden Wege sind verdickt. Die Bronchial- und Mediastinallymphknoten leicht geschwollen, auf dem Querschnitt ohne charakteristische Veränderungen für Tuberkulose. In den Ausstrichen durch Tierversuch Tuberkelbazillen nachgewiesen.

7. Sektions-Protokoll vom 18. November 1927. Trotz zahlreicher Schnitte durch Bronchial- und Mediastinallymphknoten keine Veränderungen nachweisbar. Beim Durchtasten des rechten Zwerchfellappens finden sich in den Randpartien mehrere erbsen- bis haselnußgroße Knötchen von derber Konsistenz. Auf dem Querschnitt zeigen diese Knötchen eine feste bindegewebige Kapsel und einen graugelblichen, dickbreiigen, teils mörtelähnlichen Inhalt. Die Umgebung der Knötchen sehr saftreich. Veränderungen der Bronchialschleimhaut nicht vorhanden, die Lungen auch sonst ohne Abweichungen. Im Bronchialschleim sowie im Knötcheninhalt Tuberkelbazillen nachgewiesen.

8. Sektions-Protokoll vom 23. Februar 1928. Lungenfell stark verdickt, getrübt, höher gerötet und zottige Anhänge, namentlich im Bereich des scharfen Lungenrandes über 1 cm lang aufweisend. In den Lungen vereinzelt Konglomerate von fast kugelförmigen Knoten, die mit einer ungewöhnlich derben Kapsel bis zu 1 mm umgeben und mit einem käsigen gelbgefärbten Inhalt angefüllt sind. Solche Veränderungen, namentlich in den hinteren Abschnitten der linken Lunge, in großer Menge, aber auch in allen übrigen Lungenteilen vereinzelt. Die Lungenlymphknoten sind stark vergrößert und lassen Knoten bis zur Erbsengröße erkennen, die auf dem Querschnitt als scharf umschriebene, heller als die Nachbarschaft gefärbte Patien sichtbar sind. Eine Verkäfung oder Verkalkung läßt sich nicht nachweisen, so daß nur das Bestehen der Tuberkulose durch den Nachweis der Tuberkelbazillen im Bronchialschleim und in den Ausstrichen der Lymphknoten sichergestellt werden konnte.

9. Sektions-Protokoll vom 16. April 1928. Die Lungenlymphknoten tuberkulosefrei, dagegen ein erbsengroßes Knötchen im Herzlappen in offener Verbindung mit den Bronchien. Die Lungen sonst normal. Im Bronchialschleim und Knötcheninhalt Tuberkelbazillen.

10. Sektions-Protokoll vom 10. Mai 1928. In der Luftröhre verkäste Herde bis zur Bohnengröße nachweisbar. Diese enthalten einen breiigen, gelblichen Inhalt. Auf der Schleimhaut sind vereinzelt Geschwüre mit strahligen Narben erkennbar. Die ganze linke Lunge enthält in ihren vorderen Abschnitten zahlreiche Erweichungsherde bis

zur Taubencigröße sowie dicht gedrängt liegende, verschieden große Knötchen mit käsigem Inhalt. Die rechte Lunge zeigt namentlich im hinteren Abschnitt Zerfallsherde, die einen teils rahmartigen, teils käsigem Inhalt aufweisen. Auffallend ist, daß Bronchial- und Mediastinallymphknoten zwar stark geschwollen sind, aber nur ganz vereinzelt und auch nur bis zur Stecknadelkopfgroße weißliche Herde, die eine Verkäufung nicht erkennen lassen, aufweisen. Die Ausstriche aus den Luftröhrenherden, dem Bronchialschleim und den Veränderungen des Lungengewebes zeigten ein für Tuberkelbazillen positives Ergebnis.

11. Sektions-Protokoll vom 30. November 1926. Bronchial- und Mediastinalknoten sehr stark geschwollen, jedoch makroskopisch sichtbare Veränderungen, die für Tuberkulose sprechen, nicht vorhanden. Die Lunge besaß nach Entfernung von Herz und Herzbeutel ein Gewicht von $16\frac{1}{2}$ Kilogramm (das durchschnittliche Gewicht der Rinderlunge, soweit es sich um Großvieh handelt, beträgt 2,99 Kilogramm). Die Lunge fühlt sich derb an, erscheint stark gefeldert, das Interstitialgewebe ist stellenweise bis zu $\frac{1}{2}$ cm verbreitert und mit Luft angefüllt. Am auffallendsten sind diese Erscheinungen im Spitzenlappen der linken Lunge. Die Lungenpleura war nur an dem rechten und linken Zwerchfellappen verdickt und getrübt, während im Bereich der übrigen Lungenpartien krankhafte Veränderungen nicht nachgewiesen werden konnten. Auf den Querschnitten fanden sich im Bereiche der ganzen Lunge miliare und submiliare, fast gleichgroße gelblich gefärbte Knötchen. Im Bronchialbaum ließ sich ein anhaftender, rahmartiger, eiterähnlicher Schleim ermitteln. Sowohl in diesem als auch in den vorbezeichneten Knötchen waren Tuberkelbazillen einwandfrei festzustellen.

Vorstehende Befunde bestätigen die Angaben zahlreicher Forscher, die hervorheben, daß der Tuberkelbazillus eine gewisse lymphoide Latenz besitzt und sich daher lebend längere Zeit im unveränderten Gewebe erhalten kann. Gleichzeitig sind meine Beobachtungen ein Beispiel für die Erfahrung, daß die Erreger nicht unbedingt an der Eintrittspforte pathologische Prozesse zu erzeugen brauchen und schließlich, daß die regionären Lymphknoten nicht oder doch nur ungewöhnlich gering tuberkulös erkranken müssen.

Daß die Filterwirkung der Lymphapparate aber doch wenigstens bis zu einem gewissen Grade eingetreten war, beweist der positive bakteriologische Befund in Ausstrichpräparaten bzw. Tierversuch. In Verdachtsfällen sollte daher eine bakteriologische Prüfung der Lymphapparate zur Sicherung der Diagnose stets herbeigeführt werden. Im übrigen ist bekannt, daß je nach Überwiegen der produktiven (Granulationsbildung), nekrotisierenden (Koagulationsnekrose) bzw. der exsudativen (Gewebszerfall-Kavernenbildung) Wirkungsweise des Tuberkelbazillus das pathologisch-histologisch und anatomische Bild verschieden ausfällt. Die Verschiedenheit der Veränderungen in den Lymphknoten dürfte in einer Wechselwirkung zwischen Zahl und Virulenz der Erreger einerseits und der unterschiedlichen Organdisposition andererseits begründet sein.

Einen weiteren Fall möchte ich ausführlicher beschreiben, da ähnliche Befunde zu den größten Seltenheiten gehören. Es handelt sich um eine $3\frac{1}{2}$ -jährige Kuh, die am 24. Januar 1928 verendete. Im Frühjahr 1926 litt das Rind an Maul- und Klauenfeuche mit nachfolgender starker Abmagerung und Genesung erst auf der Weide. Anfang Dezember 1927 kalbte das Tier zum zweiten Mal und gab im Durchschnitt 18—24 Liter Milch bis Januar 1928 ohne Schwankungen und Störungen im Allgemeinbefinden; diese wurden erstmalig am 7. Januar 1928 festgestellt, und äußerten sich im wechselnden, aber niemals ganz unterdrückten Appetit, und häufigen, unter starkem Druck erfolgenden breiigen, aber nicht dünnflüssigen Kotabsatz. Der Milchertag pro Tag fiel sofort auf 6—8 Liter. Da nach 14tägiger Beobachtung keine Besserung eintrat und der Nährzustand sichtlich schlechter wurde, ließ der Besitzer die Kuh durch einen Tierarzt untersuchen, der jedoch Anhaltspunkte für einen Tuberkuloseverdacht nicht gewann, die Diagnose Magen- und Darmkatarrh stellte und eine entsprechende Behandlung ein-

leitete. Einige Tage später, am 23. Januar 1928, trat auffallende Ver schlechterung im Allgemeinbefinden ein — vollständige Agalaktie und Appetitlosigkeit. Das Durstgefühl war mäßig. Der Gesichtsausdruck wurde auffallend matt. Die Kuh hatte nach Ansicht des Besitzers mindestens 200 Pfd. Fleisch verloren, und schätzungsweise nur noch ein Gewicht von 9—10 Zentner. Die am 24. Januar 1928 vorgenommene Zerlegung ergab eine tuberkulöse Erkrankung der Mittelfellknoten, vor allem aber geschwürige Veränderungen im Dünndarm. Hier konnten isolierte, etwa 1 cm große Geschwüre festgestellt werden, deren Oberfläche leicht abhebbare Blutgerinnsel enthielt. Besonders auffallend waren pfennig- bis markstückgroße flache Geschwüre mit zackigen Rändern im Labmagen. Daneben fanden sich kleine miliare Knötchen. Die nur mäßig geschwollenen Mesenterialknoten waren durchfeuchtet und zeigten eine speckige Beschaffenheit. Verkäste oder verkalkte Herde waren nicht nachweisbar. Auf Grund dieses Befundes wurde zunächst auf die Einwirkung von Ätzmitteln geschlossen, zumal außer den veränderten Herden eine Schwellung und starke Rötung der Schleimhaut vorhanden war. Bei der mikroskopischen Untersuchung stellten wir sowohl in den Labmagen- wie Darmgeschwüren, aber auch in den Lymphknoten einen ungewöhnlich hohen Tuberkelbazillenbefund fest. Die Erreger waren so zahlreich, daß trotz der Anwendung der Säure und Blau-Kontrastfärbung das ganze Präparat bei der Betrachtung in der Durchsicht rot erschien.

Da wir einen ähnlichen Befund bei der Rindertuberkulose bisher noch niemals feststellen konnten, glaubten wir zunächst an eine Paratuberkulose bzw. Geflügeltuberkulose. Gegen die Annahme der erstgenannten Infektion sprach aber das Fehlen von nicht verstreichbaren Schleimhautwülsten, sowie die Gestalt des Erregers. Da der Paratuberkulosebazillus im Verhältnis zu dem echten wesentlich kleiner ist und auch eine andere Gruppierung zeigt, schied er von vornherein für die Differentialdiagnose aus. Das Untersuchungsmaterial war leider bei der Einföndung bereits in Fäulnis übergegangen, so daß eine histologische Bearbeitung ebenso wie ein Kulturverfahren aussichtslos erschien. Um den Typ des Erregers zu ermitteln, wurde daher ein Huhn mit 2 ccm einer Aufschwemmung, die aus den gewässerten und zermörferten Darm- und Magenwandabschnitten bereitet war, intravenös infiziert. Außerdem wurden zwei Meerfischweinen je 1 ccm der gleichen Aufschwemmung intramuskulär im rechten Oberschenkel injiziert. Das Huhn wurde 23 Tage nach der Infektion tuberkulinisiert, ohne eine Reaktion zu zeigen. Die am 31. Januar 1928 infizierten Meerfischweinen wurden am 20. März und 4. Mai getötet und zeigten eine tuberkulöse Veränderung der regionären Lymphknoten mit strahliger Verkäufung und zentraler Erweichung. Die Leber enthält in beiden Fällen zahlreiche, kleine gelblich miliare Herde, ebenso die Milz und Lunge. Bei einem Meerfischweinen konnten in der Niere vereinzelt miliare Knötchen nachgewiesen werden. Bei der mikroskopischen Untersuchung fällt der auffallend geringe Tuberkelbazillengehalt in den tuberkulösen Veränderungen auf. Von beiden Meerfischweinen wurde eine Aufschwemmung je eines tuberkulösen Lungenherdes auf weitere Meerfischweinen verimpft; auch in diesem Falle Miliar-Tuberkulose und spärliche Tuberkelbazillen in den tuberkulösen Veränderungen. Bei einer klinischen Nachuntersuchung des Bestandes erwiesen sich weitere Tiere bisher nicht als verdächtig. Es dürfte sich in ähnlichen Fällen aber empfehlen, den Bestand in kürzeren Zeitabschnitten auf Tuberkulose zu untersuchen, da mit einer Massenausbreitung der Tuberkelbazillen zu rechnen ist.

Der vorliegende Fall erinnert an die von dem Franzosen Landouzy im Jahr 1884 zuerst beschriebene und daher nach ihm benannte „Typhusbazilliose“ den Men-

Lfd. Nr. der Kühe	Lymphozyten- befund in der Milch	Tuberkelbazillen		Bemerkungen	
	+ =vereinzelt ++ =mittelmäß. +++ =zahlreich	Mikrosko- pisches Ergebnis	Tierversuch		
		+ =positiv - =negativ	abgeschloss. nach Tagen		vorzeit. abge- broch. n Tgn.
			+ =positiv - =negativ	+ =positiv - =negativ	
1	+++	+			
2	+++	-	25-		
3	+++	-	51-		
4	+++	-	42+		
5	+++	-	50-		
6	+++	-	50-		
7	+++	-	49-		
8	+ (10 in jedem Gesichtsfeld)	-	49-		
9	+ (10-15)	-	26-		
10	+++	+			
11	++	-	26-		Streptokokken mittelmäßig
12	+ (5)	-		10-	
13	+++	-	50-		
14	+++	-	50-		
15	+++	-	22-		
16	+++	+			
17	++	+			
18	+++	-	31-		
19	++	+			
20	++	+			
21	+++	+			
22	+++	+			
23	+++	-	48-		Streptokokken mittelmäßig
24	+++	-	24-		
25	+++	+(vereinz.)			
26	++	-	29-		
27	++	-	29-		
28	+ (10)	-	29-		
29	+ (vereinzelt)	-			
29	+++	+			
30	+ (vereinzelt)	-	27-		Streptok., zahlreich
31	+++	-		14-	dito
32	+++	-	29-		Streptokokken vereinzelt
33	+++	-	29-		
34	+++	-	47-		verschiedenartige Stäbchen
35	+	-		16-	
36	+	-		16-	Leukozyten
37	++	-	32-		
38	+++	+			
39	+++	+			
40	+	-	22-		Streptokokken
41	+	-	43-		Stäbchen u. Diplok.
42	++	-		14-	} Leukozyten, Fibrinfäden, Epithelien
43	++	-		6-	
44	+++	-	36-		Stäbchen u. Kokken
45	+++	+			
46	+++	+			
47	++	-	25-		zahlr. Diplokokken
48	+++	-		8-	Streptokokk.
49	+++	-		14-	Staphylokok.
50	+++	-		18-	mittl. Zellgehalt, vereinz. Leukozyt. u. zerfall. Epithelien
51	+++	+			
52	+++	+			
53	+++	-	28-		
54	+++	+			vereinz. Leukozy- ten und Kokken
55	+++	+			
56	+++	+			vereinz. Leukozyt.
57	+++	+			
58	++	-	32-		Kokken
59	++	-		19-	
60	+++	+			
61	+++	+			
62	++	-	42-		
63	++	-		19-	spärl. Leukozyten
64	+++	-	23-		
65	+++	-		19-	
66	+++	-		12-	
67	+++	+			
68	+++	+			
69	+++	+			
70	+++	+			

schen, die klinisch unter dem Bilde einer Typhusseptikämie auftritt, aber zweifellos tuberkulösen Ursprungs ist. Die pathologisch-anatomischen Veränderungen sind dadurch gekennzeichnet, daß keine typischen Tuberkel mit Verkäsung auftreten, dagegen ein akuter Milztumor niemals vermißt wird, so daß Gougerot, ein Schüler Landouzy's, von Tuberkulose ohne Tuberkel spricht, Schottmüller diese Tuberkuloseform aber als perakute Miliartuberkulose ansieht.

Sicher ist wohl, daß es sich hier um eine Tuberkulosebazillämie handelt.

Um ähnliche Fälle richtig bewerten zu können, ist es dringend empfehlenswert, systematisch fortgesetzte Blutuntersuchungen zu Lebzeiten der Rinder auszuführen. Mögen vorstehende Ausführungen hierzu die Anregung geben!

Schließlich möchte ich Ihnen einen Beitrag zur **Lungen- und Eutertuberkulose der Ziege** geben. Wer sich eingehend mit der Tuberkulose der Ziege beschäftigen will, sei auf die umfassende, aus der Bakteriologischen Anstalt der Landwirtschaftskammer für Braunschweig stammende Arbeit von K. Kanike über: „Ziegentuberkulose nach dem Stande des heutigen Wissens“ — Dissertation Hannover 1923 — verwiesen. Meine Ausführungen bezwecken lediglich, einen Beitrag zu dieser Erkrankung zu liefern.

Am 6. Januar 1928 wird dem Institut die Lunge und das Euter einer Ziege zur Feststellung der in diesen Organen vorhandenen Krankheitsprozesse mit folgendem Vorbericht überliefert. Das Tier, eine reinrassige Saanen-Ziege, ist am 19. März 1922 geboren, hat viermal gelammt und insgesamt 11 Lämmer zur Welt gebracht, ist also fast 6 Jahre alt. Im Frühjahr 1927 (2. April 1927) hat das Tier eine Schweregeburt gehabt. Die Ziege wurde geschlachtet, weil sie hustete und trotz guter Fütterung zu wenig Milch gab. Die Milch des Tieres hatte zur Ernährung zweier Kinder, die heute 2½ bzw. 3¾ Jahr alt sind, gedient, um die Tuberkulose-Ansteckungsgefahren der Kuhmilch zu vermeiden. Da der Besitzer die Ziege für tuberkuloseunempfindlich hielt, ist die Abkochung der Milch unterblieben. Das Tier soll z. Zt. der Schlachtung zwar einen sehr kranken Eindruck gemacht haben, aber nicht abgemagert gewesen sein. Die linke Euterhälfte ist erheblich größer als die rechte gewesen, und hat sich auch nach dem Ausmelken bretthart angefühlt. Der Laienfleischbeschauer stellte nach der Schlachtung fest, daß sämtliche Organe der Tuberkulose verdächtig seien, außerdem fiel ihm auf, daß die linke Lungenhälfte mit dem Brustfell fest verwachsen war.

Sektionsbefund: Das Euter besitzt eine Größe von 20:12:9 cm. Die linke Hälfte ist über doppelt so groß als die rechte. Die Oberfläche des ganzen Organs ist glatt, nicht höckerig. Die Haut über dem Euter ist leicht abhebbar und nicht verdickt und zeigt keinerlei Veränderungen. Auf dem Schnitt erweist sich das Eutergewebe der rechten Seite normal, das der linken Seite enthält scharf umschriebene, gelblichweiße Herde mit käsigem, zum Teil bröckligen Inhalt. Kalkeinlagerung und Kapselbildung fehlt. Die Größe schwankt zwischen Stecknadelkopf- bis Kirschengröße. Auf dem Querschnitt durch das frische Organ springen die Herde deutlich über die Oberfläche hervor, weil sich das gesunde Parenchym leicht zurückzieht (Bild 1). Nach der Härtung des Euters bleibt die Schnittfläche glatt und läßt die Gestaltung der käfigen Partien besser erkennen (Bild 2). Trotz der schweren Veränderungen im Euter ist der supramammäre Lymphknoten kaum vergrößert und zeigt nur auffallend wenig und kleine stecknadelfspitzengroße Herde, die sich vornehmlich in der Randzone finden, und bei oberflächlicher Untersuchung leicht zu übersehen sind.

Fast man mit R a n k e die schnell fortschreitende und eine große Ausdehnung gewinnende käfige Nekrose als




Abb. 1. Eutertuberkulose der Ziege. Die tuberkulösen Herde verschiedenster Größe springen über die Schnittfläche deutlich sichtbar hervor. Der supramammäre Lymphknoten ist auffallend wenig erkrankt.

histologischen Ausdruck der Überempfindlichkeit des Gewebes für Tuberkelbazillen auf, so läßt sich der vorliegende Drüsenbefund als Zeichen einer größeren Unempfindlichkeit deuten. Hervorzuheben ist, daß trotz schwerster Lungenerkrankung auch die bronchialen und mediastinalen Lymphknoten nur unverhältnismäßig geringe tuberkulöse Veränderungen zeigten.

Die Lunge ist in ihren Spitzenlappen gut retrahiert und hier elastisch und lufthaltig, die hinteren Lungenabschnitte sind aber beiderseits stark vergrößert und zeigen fluktuierende Geschwülste. An diesen Stellen ist die Lungenpleura schwartig verdickt und an ihrer Oberfläche mit zahlreichen zottigen Anhängen behaftet. Dagegen ist die Pleura an den vorderen Lungenabschnitten durchsichtig, so daß sich die unter derselben liegenden gelblichweißen Herde leicht von dem rosaroten respiratorischen Lungengewebe abheben. Auf dem Längsschnitt der rechten Lunge (Bild 3) sind in den beiden Spitzenlappen nur vereinzelt stecknadelkopfgroße gelbe Herde mit verkästem Zentrum erkennbar; ähnliche Verhältnisse kommen für den mittleren Herz- und den Anhangslappen in Betracht. Im Zwerchfelllappen findet sich in einer Länge von 11 cm, 8 cm Breite und 5 cm Tiefe eine Kaverne, die am scharfen Rande in der Gegend der oberen Ansatzstelle des Zwerchfelles eröffnet war und ihren Inhalt zum größten Teil zu Lebzeiten des Tieres in die Brusthöhle entleert hatte. Auf dem beigegebenen Bilde 3 ist die rechte Lunge durchschnitten und auseinandergeklappt. Im Bereich der Kaverne ist das Lungen-




Abb. 2. Eutertuberkulose der Ziege. Längsschnitt nach der Härtung des Organes. Die Konturen der käsigen Nekroserherde sind leicht erkennbar.



Abb. 3. Lungentuberkulose der Ziege. Die rechte Lunge ist in der Längsrichtung durchschnitten und beide Teile sind nebeneinander gelegt, um die „Kavernenbildung“ zu kennzeichnen.

parenchym vollkommen geschwunden, so daß nur noch die Kapselwand, die an der der Rippenwand zugekehrten Fläche nur noch eine Dicke von 2—3 mm besitzt, übrig geblieben ist. Die dem Zwerchfell aufliegende Lungenfläche hat eine Kapselstärke von 1—1½ cm. In der Wand selbst sind wieder verkäste Herde bemerkbar, dagegen fehlt jegliches lufthaltiges Gewebe. Die Innenwand der Kavernen ist ausgebuchtet, da Fleischspangen in das Lumen hineinragen. Der Höhleninhalt besteht aus einem schmutzig, gelblich-grauen dickflüssigen nekrotischen Brei; und in den vorderen Kavernenpartien sind der Wand anhaftend käsige Zerfallmassen vorhanden. Diese sind auch in den größeren Bronchien in der Nachbarschaft der Kavernen nachweisbar.

Die linke Lunge ist ebenfalls im Spitzenlappen am wenigsten erkrankt und läßt hier nur vereinzelte miliare Herde erkennen. Der Lungenkörper ist im Lobus cardia-




Abb. 4. Submiliare interstitielle Tuberkulose des Euters. Zwei Knötchen mit Epitheloidzellenbildung auch ohne Koagulationsnekrose aber zumal rechts mit Riesenzellen.

cus hepatisiert und dieser durchsetzt mit kleinsten und mittelgroßen Herden, bis zur Größe einer Erbse. Die erkrankten Stellen sind von lufthaltigem Gewebe umgeben. Fast der ganze Lobus diaphragmaticus, also etwa ein Drittel der ganzen linken Lunge, ist in eine Höhle mit ähnlicher Beschaffenheit wie auf der rechten Seite umgewandelt. Auch aus dieser Kaverne ist, und zwar an zwei Stellen, ein Durchbruch in die Brusthöhle erfolgt. Durch die mikroskopische Untersuchung konnten sowohl in Euterlymphknoten wie in den Veränderungen der Milchdrüse Tuberkelbazillen nachgewiesen werden. Die Zahl der Erreger ist in allen Ausstrichen gering.

Die Kinder des Besitzers wurden der Tuberkuloseförförge zugeführt, doch ließ sich hier durch klinische Untersuchung wie Tuberkulinreaktion eine eingetretene Infektion nicht nachweisen.

Interessant sind die pathologisch-histologischen Veränderungen, die ich Ihnen in einigen Mikrophotogrammen vorführen möchte.

Bild 4 zeigt die Entwicklung der submiliaren Herde im Interstitium des Euters. In diesem Fall ist es zur Wucherung von Epitheloidzellen gekommen, während die nekrotisierende Komponente der Tuberkelbazillenwirkung noch vollständig fehlt. Dagegen lassen sich Riefenzellen zumal im Knötchen der rechten Bildseite feststellen.

Bild 5 läßt den Einbruch der Tuberkel in die Milchkanälchen erkennen. Im Zentrum der Herde beginnende Verkäfung und deutlich erkennbare Riefenzellen. In der Umgebung der tuberkulösen Veränderungen Lymphozytenwall und Infiltration mit Leukozyten.

Bild 6*) gibt einen submiliaren Lungentuberkel mit beginnender zentraler Verkäfung wieder. Die Alveolen der Nachbarschaft sind zum Teil stark gebläht, zum Teil mit Leukozyten angefüllt. Die exsudativen Vorgänge sind deutlich ausgeprägt.

Die Exsudationsprozesse scheinen im Gegensatz zur Rindertuberkulose für die Lungentuberkulose der Ziege charakteristisch zu sein und viel Ähnlichkeit mit dem gleichen Prozesse bei der Lungenphthise des Menschen zu haben. Das bestätigen nicht nur die Ausführungen Ranccke's, sondern auch einige Photogramme einer Ziegentuberkulose, die ich der Liebenswürdigkeit des Herrn Obertierarztes Dr. Spiegl verdanke.



Abb. 5. Miliare Eutertuberkulose mit Einbruch der Tuberkel in die Drüsenkanälchen. Im Zentrum der Knötchen beginnende Verkäfung, in der Peripherie Lymphozytenwall.

Im Bild 7*) erkennt man eine käfige Pneumonie mit Vorherrschen der exsudativen Prozesse. Riefenzellen sind überall vorhanden. Die Leukozyteneinwanderung ist so zahlreich, daß sämtliche Alveolen mit diesen Zellen gefüllt und lufthaltige Räume überhaupt nicht mehr vorhanden sind.

Bis zur Lungenphthise (Bild 3) ist es dann nur noch ein Schritt, wie dieses die eitrige Einschmelzung in der Nachbarschaft eines Luftweges im Bild 8*) zeigt. Auch in diesem Leukozyteninfiltration im höchsten Maße, so daß Alveolen als solche nicht mehr erkennbar. Die Kavernenwand ist glattrandig, so daß der Hohlraum wie mit Lochseilen ausgestochen erscheint.

Die Herstellung der Schnitte hat Herr Dr. Spiegl, die Lichtbildarbeiten die technische Assistentin meiner Abteilung, Fräulein Janssen, übernommen; beiden auch an dieser Stelle für ihre mühevollen Arbeit herzlichsten Dank!

*) Von einer Wiedergabe an dieser Stelle ist abgesehen.

Beitrag zur Streptokokkenmastitis der Rinder. *)

Von O. Pröscholdt, Züllchow-Stettin.

Durch die Untersuchung von 46 197 Einzel- bzw. Vierteilmilchproben wurden bei 20,68 Prozent Streptokokken, bei 0,73 Prozent Staphylokokken, bei 0,37 Prozent Pyogenesbakterien und bei 0,34 Prozent Tuberkelbazillen nachgewiesen. Unter Zuhilfenahme der bakteriologischen Untersuchung wurden mindestens noch einmal soviel Streptokokkenausscheider festgestellt als durch die mikroskopische Untersuchung allein.

Der gelbe Galt ist in den einzelnen Gegenden verschieden ausgebreitet. Im allgemeinen kommt die Streptokokken-Mastitis in den größeren Kuhherden häufiger vor als in den kleinen Beständen. In einem Molkereibezirk in Ostpommern mit vorwiegend großen Beständen wurde Galt in 81,7 Prozent der Herden und in einem Molkereibezirk am Haff mit vorherrschend kleinen Kuhhaltungen in 1,6 Prozent derselben festgestellt.

Bei den regelmäßigen Untersuchungen der Bestände wurden in der Mehrzahl der Fälle subakute oder chronische Veränderungen mit Atrophie der ergriffenen Eutervierviertel

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Direktoren der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 10. Juli 1928 in Breslau.

angetroffen. Bei sorgfältigen Beobachtungen wurde zu Beginn der Erkrankung eine bald vorübergehende, etwas vermehrt warme, schmerzhaft Veränderung des Euters bemerkt, welche in den meisten Fällen wegen ihrer Geringgradigkeit übersehen werden dürfte. Verschiedentlich war bei einsetzender Galtinfektion in der unveränderten Milch ein Anstieg des Fettgehaltes zu beobachten. Akute Euterentzündungen durch Galtstreptokokken kamen wesentlich seltener zur Feststellung; es war dann meistens das Allgemeinbefinden gestört. In einigen Beständen setzte die Euterentzündung beim ersten Auftreten sehr akut ein und wurde von schwerer Allgemeinerkrankung und zweimal außerdem von Gelenkschwellungen begleitet. In zahlreichen Fällen wurden Galtstreptokokken in klinisch unveränderten Eutern und in normal aussehender Milch nachgewiesen. Die klinische Untersuchung muß deshalb durch die bakteriologische Prüfung zur Feststellung der Streptokokkenausscheider ergänzt werden.

Von der Galtkrankung wurden in erster Linie die besten Milcherinnen betroffen. Die Erkrankung kommt besonders häufig bei frischmelkenden Kühen vor. Sie befallt vielfach die Kühe in der Zeit der Höchstleistung in der 3. bis 6. Laktation. Galtkrankungen sind beim Landvieh,

das nicht hoch gezüchtet ist und eine mittelmäßige Milchleistung hat, seltener, was auf erhöhte Widerstandskraft zurückzuführen sein dürfte. In Zuchtherden und solchen mit Leistungsfütterung wurden die Galterkrankungen in starker Ausbreitung gefunden. Es ist daraus zu entnehmen, daß durch verminderte natürliche Widerstandskraft des Organismus die Infektion gefördert wird. Bei der Leistungsfütterung ist ein weiterer Grund zu dem vermehrten Umsichgreifen in der vielfach nicht genügend befolgten Absonderung der kranken Kühe von den betreffenden Leistungsgruppen zu suchen. Mangelhafte Sauberkeit, ungenügendes Ausmelken und Nichtbeachtung der ersten Zeichen der Erkrankung leisten der Infektion Vorschub. In der beschränkten Anzahl der angetroffenen Tieffälle, die allerdings reichlich gestreut, sauber und trocken waren, kam die Galterkrankung seltener vor als in den Flachställen, die vorwiegend Kopfstreupflaster hatten. Es dürfte dieses darauf zurückzuführen sein, daß infolge des weichen Lagers Druckschäden der empfindlichen, großen Leistungseuter vorgebeugt wird, während in den Flachställen, in denen täglich die Streu entfernt wird und vielfach nicht sehr reichlich ist, solche viel leichter und häufiger vorkommen, wodurch die Infektion mit Streptokokken begünstigt wird. Auffallend war der Umfang der Erkrankungen in Beständen mit Schlempefütterung und dort, wo das Melken als Knebeln geschah. In drei Herden mit Melkmaschinen war die Verfeuchungsziffer 22,5, 35 und 80 Prozent des Milchviehbestandes. In Beständen mit Abortusinfektion war eine Vermehrung der Galterkrankungen zu bemerken. Begünstigend dürfte außer der Herabsetzung der natürlichen Abwehrkräfte das Mobilwerden schlummernder Streptokokken durch die Impfung gewirkt haben.

Bei der Feststellung von Sekretionsstörungen durch Streptokokken wurde die größte Zahl derselben durch die mikroskopische Untersuchung des Milchbodenatzes auf Leukozyten erfaßt. Beim Vergleich mit den Ergebnissen der übrigen biologischen und chemischen Untersuchungsmethoden, die bei den Milchproben mit Streptokokken Anwendung fanden, ist das Bild dadurch beeinflusst, daß die Entnahme der Proben zu den an zwei getrennten Stellen ausgeführten Untersuchungen nicht gleichzeitig erfolgte und daß nicht Viertel-, sondern Gemelkproben der betreffenden Kühe zur Untersuchung kamen. Den höchsten Ausschlag mit 78 Prozent erbrachte die Katalaseuntersuchung, dann folgte die Trommsdorfprobe mit 69 Prozent, der vermehrte Chlorgehalt mit 48 Prozent und schließlich die Verringerung bzw. Vermehrung des Säuregehaltes mit 38,5 Prozent. Schon in Rücksicht auf die auf andern Ursachen beruhenden Sekretionsstörungen können diese Untersuchungsmethoden für die Diagnose des gelben Galtes nur zur Unterstützung verwendet werden. Entscheidend ist der Nachweis der Streptokokken unter Zuhilfenahme der mikroskopischen und kulturellen Untersuchung.

Säurestreptokokken lassen sich von den Galtstreptokokken gut abtrennen. In Bouillon wachsen sie meistens unter Trübung mit späterer Klärung. Der Einzelkokkus ist mehr rundlich. Auf der Agarplatte bilden sie bei mikroskopischer Betrachtung kleine kegelförmige, stark glänzende, durchsichtige, glatte Kolonien mit scharfem runden Rand. In Lackmusmilch bei 37 Grad tritt innerhalb 24 Stunden vollkommene Entfärbung mit Ausnahme einer schmalen oberen Zone ein. Später folgt von oben einsetzende Rötung mit Gerinnung. Molke wird nicht abgeschieden. In Lackmusmilch bei 10 Grad erfolgt mit Ausnahme der oberen roten bzw. blauvioletten Zone Reduktion, die zuweilen unvollständig ist. Gewöhnlich tritt später Gerinnung ein, die öfters unvollständig bleibt und auch fehlen kann. Methylenblaumilch bei 37 Grad wird

innerhalb 20 Stunden reduziert unter gleichzeitiger bzw. nachfolgender Gerinnung. Später wird der obere Teil vielfach wieder blau. Die Pathogenität für Mäuse und Meerschweinchen war gering. In allen Todesfällen waren Herzblut und Milz steril.

Bei der überwiegenden Mehrzahl der Galtstreptokokken sieht man im Nativausstrich das Einzelkorn zur senkrechten Achse der Kette stark abgeplattet, zumeist sind sie in der Kette als Diplokokken aneinandergereiht. Diese Form haben die Streptokokken in der Regel auch beim Wachstum in Bouillon. Bei der Bildung sehr langer Ketten in Bouillon ist meist eine Herabsetzung der Energie des Wachstums und anderer Funktionen zu bemerken. Im allgemeinen wurden im Nativausstrich gefundene kurze Ketten in Bouillon länger und längere Ketten kürzer. Vielfach ist an den in Bouillon gewachsenen Streptokokken eine Schleimhülle festzustellen, die auch bei den aus Mäusen und Meerschweinchen gezüchteten Stämmen deutlich in Erscheinung tritt. Nicht in allen Fällen haben die Galtstreptokokken die charakteristische Staketenform. Vielfach findet man ovale Diplokokken, aus solchen zusammengesetzte Streptokokken und Streptokokken mit mehr rundlichen bzw. ovalen Einzelgliedern, die sich in der Kultur und biologisch wie Galtstreptokokken verhalten.

Gleichgültig, ob die Streptokokken aus Sekret von veränderten Eutern, aus mehr oder weniger stark von der Norm abweichender Milch, aus normal erscheinenden Eutern und Milchproben selbst ohne Vermehrung des Bodenatzes und der Leukozyten gezüchtet worden waren, zeigte die überwiegende Mehrzahl der Stämme ein einheitliches Verhalten in Lackmusmolke und Methylenblaumilch. In der Bouillon wuchsen die Galtstreptokokken meistens, aber nicht regelmäßig unter Bildung von zu Boden sich setzenden Flocken, so daß die Flüssigkeit klar blieb. Oft war die Bouillon zunächst getrübt und klärte sich erst später unter Bodenatzbildung auf. Auf der Agarplatte schied sich ein großer Teil der Stämme sehr scharf vom Laktiswachstum ab, indem der Rand der Kolonien leicht gezackt bzw. deutlich gewellt war, die Oberfläche im auffallenden Licht matt, rauh und gekörnt oder reliefartig erschien und die Kolonie im durchfallenden Licht mehr fadenartig und besonders am Rande aufgelockert war. Ein Teil war aber auf dem gewöhnlichen Agar im Wachstum von dem des Streptococcus lactis nicht verschieden. Eine scharfe Abtrennung gestattet jedoch die Lackmus- und Methylenblaumilch. Eine Gruppe der Galtstämmen rötete die Lackmusmilch bei 37 Grad innerhalb 24 Stunden und brachte sie zur Gerinnung, ohne daß weitere Veränderungen eintraten. Abweichungen machten sich bei verschiedenen Stämmen dahin bemerkbar, daß die rote Färbung und die Gerinnung nicht ganz vollständig wurden. Diese Stämme erwiesen sich auch sonst in ihrer Wachstumsenergie herabgesetzt. In Lackmusmilch bei 10 Grad trat Wachstum nicht ein, desgleichen fehlte eine Veränderung der Methylenblaumilch bei 37 Grad. Die übergroße Mehrzahl der Stämme verursachte in der Lackmusmilch bei 37 Grad Rötung und Gerinnung mit anschließender Entfärbung von der Kuppe des Röhrchens her, welche Veränderung sich meistens auf das untere Drittel beschränkte. Bei einigen Stämmen kamen Abweichungen vor, indem die Molke nicht vollständig gerann und nicht ganz rot gefärbt wurde. Es waren dieselben Abschwächungen im Wachstum bemerkbar wie bei der ersten Gruppe. In Lackmusmilch bei 10 Grad und Methylenblaumilch bei 37 Grad trat nie eine Veränderung ein. Bei den sich Mäusen und Meerschweinchen gegenüber pathogen verhaltenden Stämmen wurden Kokken, Diplokokken und Streptokokken aus den Organen gezüchtet.

Über die Bekämpfung der Streptokokken-Mastitis und der Euterseuche.

Von Dr. Kiessig, Kiel.

Die Bedeutung der ansteckenden Euterentzündungen der Rinder ist in den letzten Jahren von Seiten der Besitzer von Milchvieh erheblich unterschätzt worden. Die Folge davon ist, daß ein erheblicher Teil der milchproduzierenden Tiere an derartigen Erkrankungen leidet. Die Zahl der erkrankten Tiere wird verschieden hoch angegeben. Es liegt dies daran, daß die Diagnose auf verschiedene Weise gestellt wird. Geschieht dies auf Grund der klinischen Erscheinungen, so können wir auf Grund der in den letzten Jahren vorgenommenen Untersuchungen annehmen, daß ca. 10 Prozent aller Rinder erkrankt sind. Dabei sind große Bestände im allgemeinen stärker verseucht, als kleine. Werden bakteriologische Untersuchungen als Grundlage der Diagnosestellung angenommen, so wird der Prozentsatz der als infiziert anzusehenden Tiere wesentlich höher sein. Wir haben Bestände untersucht, in denen bei der bakteriologischen Untersuchung mehr als die Hälfte der Tiere einen positiven Befund ergab. Wir müssen eben bei dem gelben Galt neben der übrigens sicherlich sehr selten zu beobachtenden akuten und neben der chronischen Erkrankung noch eine Form annehmen, in der Streptokokken ausgeschieden werden, ohne daß äußerlich feststellbare Veränderungen des Euters vorliegen, ja, ohne daß die Milch sinnfällig verändert zu sein braucht. Es muß also bei jeder Galtfeststellung auf die bakteriologische Untersuchung der Hauptwert gelegt werden. Nur durch systematische Untersuchung des Einzelgemelkes aller im Bestand vorhandener Kühe kann die Ausbreitung des Leidens in der Herde sicher ermittelt werden. Dabei ist die mikroskopische Untersuchung nicht nur auf das Vorhandensein von typischen Streptokokken (Staketenform) zu beschränken, sondern auf das Vorkommen von abnormen Zellbestandteilen auszudehnen. Schließlich ist auch der Kulturversuch in gewissen Fällen (keine typischen Streptokokken, jedoch abnorme Zellbestandteile) nicht zu entbehren. Als Hilfsmittel zur bakteriologischen Untersuchung ist die Beurteilung des Bodensatzes der zentrifugierten Milch von Bedeutung. Zeigt auch nur geringer Bodensatz die geringste gelbliche Verfärbung, so ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Streptokokken-Mastitis zu rechnen, die evtl. nur durch den Kulturversuch zu ermitteln ist.

Zur Bekämpfung der Seuche sind zwei Wege möglich: einmal die Behandlung der erkrankten Tiere und zum zweiten der Schutz der gefundenen Tiere vor einer Infektion.

Was die Behandlung erkrankter Tiere anlangt, so sind sowohl chemotherapeutische Präparate, als auch Impfstoffe empfohlen worden. Über die Wirksamkeit der in vielen Fällen angewandten Präparate Rivanol, Ubersan usw. dürfte wohl, wie wir bereits im vorigen Jahre gehört haben und wie es auch in der Literatur niedergelegt ist, ein Zweifel nicht mehr bestehen. Chronisch kranke Tiere sind durch diese Mittel nicht mehr zu retten. Hat man Gelegenheit, die Tiere im ersten Stadium der Erkrankung kurz nach der Infektion zu behandeln, kann mit einem Erfolg gerechnet werden. Wir haben dies ebenfalls feststellen können. Das gleiche Urteil muß über das Selektan gefällt werden, das mit so außerordentlich aufsehenerregenden Versprechungen der Öffentlichkeit übergeben worden ist. Zahlreiche von praktischen Tierärzten gefällte Urteile stimmen darin überein, daß das Selektan nicht mehr leistet, als die bisher angewandten Präparate. Wir haben Selektan zum ersten Male bei einem Rinde anwenden können, das in die Stallungen des Instituts eingestellt wurde. Drei Tage nach der Aufnahme wurden in der unveränderten Milch typische Streptokokken nachgewiesen. Veränderungen am Euter konnten zunächst nicht nachgewiesen werden. Fieber war nicht vorhanden. Kurze Zeit nachher begann sich das Eutersekret in typischer Weise zu verändern, das Euter

zeigte Schwellung und vermehrte Wärme. Trotz viermaliger Behandlung mit Selektan (es wurde intravenös, intraparenchymatös und als Infusion verwandt) gelang es nicht, die Mastitis, die nur kurze Zeit bestand, günstig zu beeinflussen. Streptokokken blieben bis zur Schlachtung, die 4 Wochen später erfolgte, nachweisbar, das Eutersekret wurde nicht wieder normal. In einem großen Milchviehbestande wurde ein Versuch zur Bekämpfung des gelben Galt mit Selektan unternommen. 12 Tiere, die typische Streptokokken-Mastitis aufwiesen und ein Tier, dessen Milch nach dem Zentrifugieren nur viel gelblich-weißen Bodensatz zeigte, ohne daß durch die bakteriologische Untersuchung Streptokokken nachgewiesen werden konnten, erhielten das Mittel teils intravenös, teils intraparenchymatös dreimal in Zwischenräumen von 10 Tagen einverleibt. Bei einer sechs Wochen nach Beginn der Behandlung erfolgten bakteriologischen Untersuchung waren Streptokokken noch bei 7 Tieren vorhanden. Die Milch der übrigen 5 Tiere zeigte nach der Zentrifugierprobe noch einen mäßigen bis reichlichen Bodensatz mit typisch veränderten Zellen. Bei dem 13. Versuchstiere hatte sich 24 Tage nach Beginn der intraparenchymatös durchgeführten Behandlung eine typische Streptokokken-Mastitis entwickelt; es war also trotz der Behandlung mit Selektan eine Verschlechterung des Zustandes eingetreten. Wenn auch die Zahl der behandelten Tiere viel zu klein ist, als daß aus diesem Versuch irgendwelche Schlüsse gezogen werden könnten, so gibt doch das Resultat in Verbindung mit den zahlreichen sonst beobachteten Fehlresultaten erheblich zu denken. Es muß also festgestellt werden, daß die Aussicht auf eine erfolgreiche Behandlung der Streptokokken-Mastitis mit chemotherapeutischen Mitteln vorläufig wenig Aussicht auf Erfolg verspricht.

Wie sind nun die Erfolge der Behandlung mit Impfstoffen? Soweit aus der Literatur festgestellt werden konnte, wird diese Behandlung in der Hauptsache mit stall- bzw. tierispezifischen oder polyvalenten Vakzinen durchgeführt. In dieser Beziehung wird unter andern von L e n t z über glänzende Ergebnisse berichtet. Wir können uns diesem Optimismus nicht anschließen. Wir haben in mehreren verschieden stark befallenen Beständen die erkrankten Tiere (zu den erkrankten sind auch die Streptokokkenausseider gerechnet worden) mit stallspezifischer Vakzine behandelt. Die Tiere wurden durchweg viermal in Zwischenräumen von 8—14 Tagen subkutan geimpft. Die Nachprüfung der behandelten Tiere ca. 14 Tage nach Beendigung der Behandlung ergab nur geringe günstige Erfolge. Es sind bisher 527 Tiere auf diese Weise behandelt worden und die Nachuntersuchung der Patienten ist noch nicht zu Ende geführt, so daß ein endgültiges Urteil noch nicht gefällt werden kann. Jedoch möchte ich mich auf den Standpunkt stellen, daß ein allzu großer Optimismus in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Heilimpfverfahren beim gelben Galt vorläufig noch nicht angebracht ist. Bei der Kontrolle der der Heilimpfung unterworfenen Milchtiere genügt keinesfalls eine klinische Untersuchung, vielmehr muß die Wirkung der Impfung durch umfangreiche bakteriologische Untersuchungen geprüft werden. Erst dann können einwandfrei schlüssige Beweise über den Erfolg dieser Impfungen erbracht werden.

Größere Aussicht auf Erfolg bietet nach unseren Erfahrungen die Schutzimpfung der noch gefundenen Tiere eines infizierten Bestandes. Wir haben sie in der Weise vorgenommen, daß den Rindern in Zwischenräumen von 8 bis 14 Tagen dreimal 10 ccm Streptokokken-Vakzine subkutan injiziert wurde. Es wurden bisher 1150 Tiere auf diese Weise behandelt. Die Nachprüfung erfolgte durchschnittlich 4 Wochen nach Beendigung der Behandlung. Allerdings

konnte sie erst bei einem Bruchteil der behandelten Rinder erfolgen, da die Methode erst in der zweiten Hälfte des Winters in Angriff genommen wurde. Auch ist es klar, daß infolge der kurzen, seit der Impfung vergangenen Zeit, ein umfassendes Urteil noch nicht gefällt werden kann. Die Beobachtung der Tiere muß sich mindestens auf die gesamte Laktationsperiode erstrecken. Immerhin läßt doch die Tatsache, daß bei den geimpften Tieren bisher Erkrankungen nicht festgestellt werden konnten, die Hoffnung aufkommen, daß wir mit systematisch durchgeführten Schutzimpfmethoden der Lösung der Frage der Bekämpfung des gelben Galtes näher kommen können.

Die Frage der Behandlung der Streptokokken-Mastitis ist bereits im vorigen Jahre Gegenstand der Beratung gewesen. Wir haben uns damals auf den Standpunkt gestellt, daß die Frage noch nicht geklärt ist. Wir müssen auch heute zu dem Schluß kommen, daß wir innerhalb des vergangenen Jahres in Bezug auf die Bekämpfung des gelben Galtes noch nicht wesentlich weiter gekommen sind. Wir müssen, ähnlich wie es beim seuchenhaften Verkalben geschieht, das Hauptaugenmerk auf eine strenge Durchführung aller irgendwie möglichen hygienischen Maßnahmen, die hier nicht näher ausgeführt zu werden brauchen, legen und des Weiteren muß das gesamte Melkpersonal über die Ansteckungsfähigkeit, über den Weg der Infektion usw. genauestens Aufklärung erhalten.

Zusammenfassung.

1. Die durch die Streptokokken des gelben Galtes hervorgerufene ansteckende Euterentzündung des Rindes hat sich im Laufe der letzten Jahre erheblich ausgebreitet. In Schleswig-Holstein kann damit gerechnet werden, daß ca. 10 Prozent der milchproduzierenden Rinder von der Seuche befallen sind. Wird die bakteriologische Untersuchung der Milch als Grundlage der Diagnose herangezogen, so ist der Prozentsatz der als infiziert anzusehenden Rinder erheblich höher.

2. Die Heilung hochgradig erkrankter Tiere ist nach dem bisherigen Stand der Versuche weder mit chemischen Mitteln noch mit Hilfe von polyvalenten und stallspezifischen Impfstoffen zu erreichen.

3. Ob zu Beginn der reinen Streptokokken-Mastitis mit Sicherheit auf eine Heilung gerechnet werden kann, darüber sind noch Versuche anzustellen.

4. Über die Wirkung von Schutzimpfungen kann ein endgültiges Urteil noch nicht abgegeben werden, da die Beobachtungszeiten noch zu kurz sind. Auf Grund der bisherigen Ergebnisse kann die Anstellung umfangreicher Untersuchungen befürwortet werden.

5. Das Hauptmoment bei der Bekämpfung der Euterseuchen besteht in der peinlichsten Durchführung von hygie-

nischen Maßnahmen und in der Aufklärung des Melkpersonals.

6. Die Kontrolle der Wirkung evtl. angewendeter Behandlungsmaßnahmen darf nicht lediglich auf Grund des klinischen Befundes durchgeführt werden. Die mikroskopische Untersuchung und der bakteriologische Befund muß hierbei in erster Linie berücksichtigt werden.

Ähnliche Schwierigkeiten bildet die Bekämpfung der Euterseuche. Hier kommt noch hinzu, daß die Ätiologie der Seuche nicht vollständig geklärt ist. Die bisher bestehenden Ansichten hierüber werden von Pfeiler in Zweifel gezogen. Neben dem bisher als Erreger angesehenen *Bac. pyogenes* haben wir in einigen Fällen ebenfalls einen dem Pfeiler'schen Erreger mindestens sehr nahestehenden Mikroorganismus gefunden, dessen Rolle bei der Entstehung der Euterseuche jedoch noch nicht geklärt ist.

Die Versuche zur Bekämpfung der Seuche mittels chemotherapeutischer Mittel sind vollkommen fehlgeschlagen. Als bestes Mittel der Behandlung wird von den Gründern das Öffnen des Zitzenkanals bzw. das Entfernen der Zitze des erkrankten Euterviartels durchgeführt. Ob bereits erkrankte Euter durch andere Behandlungsmethoden, insbesondere durch Impfungen mit Vakzinen, günstig zu beeinflussen sind, erscheint zweifelhaft. Die bisher durchgeführten Versuche lassen in dieser Hinsicht keine Schlüsse zu. Jedoch dürfte eine Heilung der vorgeschrittenen Erkrankung ebenso wenig zu erwarten sein, wie dies beim gelben Galt der Fall ist. Deshalb wird auch hier der Schutz der Tiere vor der Erkrankung das wichtigste Mittel zur Bekämpfung der Seuche darstellen. Da wohl kein Zweifel darüber besteht, daß die Infektion im allgemeinen durch den Zitzenkanal erfolgt, hat man versucht, die Infektion durch Verschließen der Zitzenöffnung zu verhüten. Bei der Schwierigkeit der Erreichung eines dauernden sicheren Verschlusses hat man mit dieser Methode Erfolge nicht erzielt.

Versuche über die Schutzimpfung gegen die Euterseuche sind von Seiten des Institutes im vergangenen Jahre durchgeführt worden, wobei verschiedene Impfstoffe angewendet wurden. Da auf allen zu den Versuchen herangezogenen Weiden weder die geimpften noch die zur Kontrolle ungeimpft gebliebenen Tiere erkrankten, läßt sich ein Urteil noch nicht abgeben. Im laufenden Sommer sollen die Versuche auf breiterer Grundlage wiederholt werden, die allerdings nur dann Erfolge zeitigen können, sobald die Euterseuche in nennenswertem Maße auftritt.

Zusammenfassend ist zu bemerken, daß eine günstige Beeinflussung der an Euterseuche erkrankten Tiere durch Impfung oder chemotherapeutische Präparate kaum zu erwarten ist. Ob die Bekämpfung der Seuche durch Schutzimpfmethoden möglich ist, darüber sind noch Versuche anzustellen.

Die Entwicklung der freiwilligen Milchkontrolle in Schleswig-Holstein.

Von Dr. Kiessig, Kiel.

Die Bestrebungen zur Produktion von Qualitätsware auf dem Gebiete der Landwirtschaft hat im Laufe des vergangenen Jahres weitere Fortschritte gemacht. Hieran ist die Erzeugung von einwandfrei gewonnener Milch wesentlich mit beteiligt. Die Anschlüsse an die im Jahre 1926 von der Landwirtschaftskammer für die Provinz Schleswig-Holstein ins Leben gerufene Amtliche Milchkontrollstelle haben sich nicht unbeträchtlich vermehrt. Die Zahl der Vorzugsmilch produzierenden Betriebe hat sich von drei auf sieben erhöht, dementprechend die Zahl der Kühe von 195 auf 350. Auch die Marken für Rohmilch und pasteurisierte Milch ist in erhöhtem Maße zur Ausgabe gelangt. Im ganzen sind jetzt der Amtlichen Milchkontrolle der Landwirtschaftskammer angeschlossen:

- 1 Bestand mit 24 Kühen zur Produktion von Kindermilch,
- 7 Bestände mit 527 Kühen zur Produktion von Vorzugsmilch,
- 2 Bestände und 2 Meiereien mit 1311 Tieren zur Produktion von roher Vollmilch,
- 3 Meiereien mit 4100 Kühen zur Produktion von pasteurisierter Milch.

Die Dreiteilung in Kindermilch, Vorzugsmilch und gewöhnlicher Vollmilch hat sich auch in diesem Jahre bewährt, sie wird, trotzdem sie von verschiedenen Seiten als unnötig bezeichnet wird, beibehalten.

Den Bestrebungen zur Produktion von Markenmilch hat sich im Laufe des Jahres 1927 das Gesundheitsamt der Stadt

Kiel mit dem Stadtmedizinalrat an der Spitze angeschlossen und es ist eine Amtliche Milchkontrollstelle für den Stadtkreis Kiel gebildet worden. Diese Milchkontrollstelle besteht aus 10 Mitgliedern, von denen je vier von der Landwirtschaftskammer und der Stadt Kiel benannt werden. Darunter müssen sich befinden: von seiten der Landwirtschaftskammer zwei praktische Landwirte und zwei Beamte der Landwirtschaftskammer, von seiten der Stadt Kiel zwei Meiereifachleute und zwei von seiten der Stadt Kiel zu benennende Beamte. Außerdem gehören ein Vertreter der Preussischen Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft und der zuständige Kreistierarzt der Kontrollstelle an. Der Vertreter der Preussischen Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft wird von den übrigen Mitgliedern der Milchkontrollstelle für den Stadtkreis Kiel gewählt. Die Wahlzeit der Mitglieder der Kontrollstelle läuft zwei Jahre.

Die Kontrollstelle hat die Aufgabe, darauf hinzuwirken, daß die Milch für den Frischverzehr in bester Güte in den Handel gebracht wird.

Als Schutzmarke dient die Schutzmarke der Landwirtschaftskammer mit einem Zusatz, der ersehen läßt, daß die Stadt Kiel bei der Kontrolle beteiligt ist. Die Landwirtschaftskammer und die Stadt Kiel verpflichten sich gegenseitig, für den Verkehr von Milch im Stadtbezirk nur diese gemeinsame Schutzmarke von sich aus zu benutzen.

Für die Viehbesitzer und die Meiereien, die sich der Kontrollstelle für den Stadtbezirk anschließen, sind die Bestimmungen der amtlichen Milchkontrolle der Landwirtschaftskammer bindend. Die Viehbesitzer und die Meiereien haben ebenfalls die von der Milchkontrollstelle des Stadtbezirks Kiel herausgegebenen besonderen Bestimmungen anzuerkennen. Die Milchwändler, die sich der Kontrollstelle für den Stadtbezirk Kiel anschließen, übernehmen dieselbe Verpflichtung.

Die Inhaber der angeschlossenen Meiereien sind verpflichtet, jeden Wechsel von Lieferanten an die Kontrollstelle sofort mitzuteilen.

Die auszuübenden Kontrollen werden von dem Tierseucheninstitut der Landwirtschaftskammer und dem Nahrungsmittelunterforschungsamt der Stadt Kiel ausgeführt.

Es obliegt:

a) der Landwirtschaftskammer: die gesamte Stallkontrolle und die volle Meiereikontrolle aller außerhalb des Stadtbezirks Kiel gelegenen Meiereien. Bei den im Stadtbezirk gelegenen Meiereien sind die Proben bei der Milchanlieferung zu entnehmen.

b) der Stadt: die Kontrolle der Milch in den Verarbeitungs- und Verkaufsstätten sowie auch des Handels von Milch in jeder Form innerhalb des Stadtbezirkes.

Die Kontrollen erstrecken sich auf die allgemein hygienische, chemische und bakteriologische Beschaffenheit der Milch und sind im beiderseitigen Einvernehmen durchzuführen und auszuwerten. Wichtige Untersuchungsbefunde sind sofort einander mitzuteilen. Bei abweichenden Ergebnissen ist nötigenfalls die Entscheidung der Milchkontrollstelle für den Stadtbezirk Kiel anzurufen.

Die hygienische, chemische und bakteriologische Milchkontrolle beim Erzeuger bis einschließlich Anlieferung an die Meierei wird von der Landwirtschaftskammer ausgeführt. Die hygienische, chemische und bakteriologische Kontrolle der in dem Stadtbezirk angelieferten und verarbeiteten Milch wird von dem Nahrungsmittelunterforschungsamt Kiel, welches die nötigen Einrichtungen zu schaffen hat, vorgenommen. Die Ermittlung der tier- und bipathogenen Erreger bleiben in jedem Falle dem Tierseucheninstitut vorbehalten.

Die Entnahme der Milchproben geschieht durch Beauftragte der Stadt Kiel.

Der Verkauf der Markenmilch wird nur in Flaschen zugelassen.

Bei Verstößen gegen die von der Kontrollstelle erlassenen Bestimmungen kann die Kontrollstelle Strafen festsetzen. Bei wiederholten Vergehen erfolgt der Ausschluss aus der Kontrollstelle, wodurch dann auch das Recht zur Weiterführung der Schutzmarke verloren geht.

Gegen diese Strafe steht dem Betroffenen unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges Berufung an ein Schiedsgericht zu, das aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern besteht. Einen Beisitzer ernennt die Kontrollstelle, den anderen die angeklagte Partei. Den Vorsitz führt der Veterinär- und Medizinalreferent bei der Regierung in Schleswig abwechselnd. Im übrigen finden die betreffenden Paragraphen der Z.P.O. Anwendung. Dieses Schiedsgericht entscheidet außerdem auch über sämtliche Streitigkeiten irgendwelcher Art, die sich etwa hinsichtlich der vorstehenden bzw. der no zu erlassenden Bestimmungen ergeben.

Es ist also eine wesentliche Erweiterung der Milchkontrolle in Kiel eingetreten, die besonders dadurch erfreulich wirkt, als Landwirtschaftskammer, Stadt, Milchproduzenten und Milchwändler sich erstmalig an einen Tisch gesetzt haben und sich geschlossen für die Verbesserung der den Städten zur Verfügung gestellten Milch bemühen. Der Kontrollstelle haben sich bei der Errichtung sofort neun Meiereien mit 91 Lieferungsbeständen, die insgesamt 5423 Milchkühe umfassen, angeschlossen. Sie bringen zum größten Teil dauerpasteurisierte Milch in den Handel. Die angeschlossenen Meiereien haben zum Teil nicht unerhebliche Kosten für Neueinrichtungen, Umbauten, Anschaffung von Maschinen usw. aufwenden müssen. Sie haben diese pekuniären Opfer im Interesse der Milchkonsumenten auf sich genommen.

Entsprechend der Zunahme der angeschlossenen Bestände und Tiere hat auch die Kontrolltätigkeit des Institutes zugenommen. Die mit den Marken der Landwirtschaftskammer versehene Marktmilch wurde 85mal zur Ermittlung bei einer eventuellen Tuberkuloseinfektion bakteriologisch untersucht. Einmal wurden in einer Vorzugsmilch Tuberkelbazillen nachgewiesen. Durch eine unmittelbar darauffolgende klinische Untersuchung aller Tiere und der bakteriologischen Prüfung der Einzelgemelke aller Milchkühe wurden mehrere verdächtige Tiere aus dem Milchtierbestand entfernt, deren Untersuchung z. Zt. der Berichterstattung noch nicht beendet ist. Eine unmittelbar folgende neuerliche bakteriologische Untersuchung des Gesamtgemelkes verlief negativ.

Die allgemeine Zunahme der Erkrankungen der Rinder an ansteckenden Euterentzündungen hat sich auch im vermehrten Vorkommen von tierpathogenen Streptokokken in der Kontrollmilch ausgewirkt. Während im Vorjahre in 2 Prozent der Markenmilch diese Seuchenerreger ermittelt werden konnten, war dies im Berichtsjahr in 4,6 Proz. der Proben der Fall. Bei der unendlich großen Verbreitung des gelben Galtes ist eben ein Übergreifen der Erkrankung auch auf ständig kontrollierte Milchviehbestände nicht immer zu verhindern. In den allermeisten Fällen handelte es sich um Erkrankungen, die weder zu äußerlich erkennbaren Euterentzündungen, noch zu sichtbaren Veränderungen der Milch Veranlassung gegeben hatten. Es geht dies daraus hervor, daß diejenigen Kühe, in deren Milch Streptokokken festgestellt wurden, in der Hauptsache durch die bakteriologische Untersuchung der Einzelgemelke des gesamten Milchviehstapels, nicht aber durch die klinische Untersuchung ermittelt werden konnten.

Wesentlich höher waren die Zahlen, die in Bezug auf das Vorkommen von tier- und bipathogenen Erregern in gewöhnlicher Marktmilch des Stadtbezirkes Kiel festgestellt werden konnten. Es wurden im Berichtsjahre 102 Proben Marktmilch untersucht, von denen 47 zur Ermittlung von Tuberkelbazillen auf Meerfischweinen verimpft wurden.

Der Impfverfuch war in 7 Fällen = 6,7 Prozent positiv, während in 29 Proben = 28,6 Prozent Galtstreptokokken nachgewiesen wurden.

Die Tätigkeit der Tierärzte, insbesondere die monatliche bzw. vierteljährliche Stallkontrolle hat sich nach den Berichten der beteiligten Tierärzte reibungslos abgewickelt. Bei dieser Stallkontrolle, die auch vom Institut selbst durchgeführt wird, handelt es sich um evtl. Feststellung erkrankter Tiere, als auch um Kontrolle der Haltung und Fütterung der Tiere und um die Gewinnung der Milch. Besonders auf Verbesserung der Milchgewinnung wurde größter Wert gelegt. Die Landwirte werden in Wort und Schrift darüber belehrt, welch große Bedeutung die sorgfältige Behandlung der Milch während und kurz nach dem Melken besitzt und es kann nur immer wieder betont werden, daß trotz der Notlage der Landwirtschaft im Rahmen des Möglichen stets auf die Anregungen des Instituts eingegangen wurde.

Es hat sich im Laufe des Jahres gezeigt, daß die in den Richtlinien niedergelegten Bestimmungen über die Markenmilchkontrolle ohne Zweifel geeignet sind, die Qualität der in den Verkehr gebrachten Milch wesentlich zu verbessern.

Amtliche oder freiwillige Bekämpfung der ansteckenden Euterentzündungen der Kühe?*)

Von Dr. Rautmann, Halle (Saale).

Am 1. Juli 1927 ist eine Polizeiverordnung in Kraft getreten, die den Verkehr mit Milch in der Provinz Sachsen neu regelt und welche unter anderem verbietet, Milch von euterkranken Kühen in den Verkehr zu bringen. Hierdurch wurde der Anstoß zu einer planmäßigen Bekämpfung der Euterleiden gegeben, die wie Ihnen bekannt, in feuchtenartiger Ausbreitung vorhanden sind. Um Mißverständnissen vorzubeugen, muß ich zunächst darauf hinweisen, daß die bisherigen Anordnungen lediglich als Maßnahmen der Nahrungsmittelkontrolle zu betrachten sind, die eine Verbesserung der Handelsmilch bezwecken und die ihren Zweck erfüllt haben, wenn die kranke Milch aus dem Verkehr verschwunden ist. Dieses liegt natürlich in erster Linie im Interesse der Konsumenten, den Produzenten ist aber erst dann gedient, wenn eine planmäßige Bekämpfung der Euterkrankheiten einsetzt.

Die Milchwirte unserer Provinz haben das klar erkannt und hatten daher schon vor Inkrafttreten der Polizeiverordnung die Landwirtschaftskammer um Bekämpfungsmaßnahmen gebeten (5. Oktober 1926). Auf Grund unserer Anregung beschloß dann der Verband der Milchkontrollvereine am 18. Mai 1927 für seine sämtlichen Bestände mit ca. 60 000 Milchkühen die Einführung einer obligatorischen bakteriologischen Milchkontrolle und einer Bekämpfung der eitrigen Euterentzündungen.

Sie wollen hieraus entnehmen, daß in der Provinz Sachsen schon ein freiwilliges Verfahren eingeleitet war, ehe am 1. Juli 1927 die amtlichen Maßnahmen der Nahrungsmittelkontrolle einsetzten.

Wir stellten daher sofort unsere Erfahrungen, Einrichtungen und Mitarbeit für die Milch-Untersuchung und Bekämpfung der Euterentzündung der Kühe in den Dienst der Sache und gingen sogar noch weiter, indem wir gemeinsam mit dem Direktor des Städtischen Nahrungsmittel-Untersuchungsamtes, dem Kreisarzt des Stadtkreises Halle a. S. und den Veterinärärzten des Stadtkreises und des Saalkreises einen Entwurf für die Regierung in Merseburg ausarbeiteten, der ein Hand-in-Hand-arbeiten aller der für die Milchsanierung und Seuchenbekämpfung in Frage kommenden Stellen regelte. Seitens der Regierungen Magdeburg und Merseburg wurde aber zum Ausdruck gebracht, daß

Das ist in Schleswig-Holstein von verschiedenen Seiten anerkannt worden. Die Landwirtschaftskammer ist der Überzeugung, daß sie mit der Einführung der Markenmilch auf der bereits vor zwei Jahren festgelegten Basis auf dem richtigen Wege ist. Die Landwirte haben insofern auch einen direkten Vorteil von dieser Einrichtung, als der Milchhandel in Kiel für die als Markenmilch Verwendung findende Anlieferungsmilch ca. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Pfg. pro Liter mehr bezahlt. Das ist für das Jahr berechnet eine nicht unerhebliche Mehreinnahme für den Besitzer, die die vermehrten Ausgaben bei weitem übersteigen. Der Milchhandel berechnet z. Zt. für die dauerpasteurisierte Markenmilch noch keine höheren Preise. Sie sind auf 32 Pfg. gegenüber 28 Pfg. für offene Milch festgesetzt. Dagegen wird für rohe Markenmilch 34 Pfg., für Vorzugsmilch 38 Pfg. und für Kindermilch 46 Pfg. gefordert.

Zweifellos ist mit der Markenmilch eine Besserung in der Milchversorgung der großen Städte Schleswig-Holsteins erzielt worden. Wir zweifeln nicht daran, daß Markenmilch binnen kurzer Zeit den Gebrauch offener Milch verdrängen wird.

für die amtlichen Untersuchungen das Bakteriologische Institut der Landwirtschaftskammer nicht in Betracht käme, daß es jedoch zu begrüßen sei, wenn sich dieses Institut an der privaten Bekämpfung der Euterkrankheiten der Rinder im Interesse des Allgemeinwohles, an der Gefunderhaltung der Milchviehbestände und an der Besserung der milchhygienischen Verhältnisse im Bezirke mitarbeiten würde. Als amtliche Untersuchungsstellen wurden das Veterinär-Bakteriologische Institut in Merseburg und das Laboratorium des Städtischen Schlachthofs in Quedlinburg und Stendal für den Regierungsbezirk Magdeburg bekanntgegeben. Ob noch weitere Untersuchungsstellen namhaft gemacht sind, wissen wir nicht.

Es ist mir nun die Frage vorgelegt, ob eine amtliche oder freiwillige Bekämpfung der ansteckenden Euterkrankheiten durch unsere Institute anzustreben ist!

Aus meinen bisherigen Ausführungen wollen Sie entnehmen, daß es eine amtliche, d. h. in diesem Falle eine durch Viehseuchengesetzgebung geregelte Mastitisbekämpfung auch in der Provinz Sachsen noch nicht gibt. Die Einführung einer solchen erscheint mir auch durchaus nicht sicher, weil die Voraussetzungen hierfür nicht restlos erfüllt sind. Zwar besitzen die eitrigen Euterentzündungen als Seuche eine große volkswirtschaftliche Bedeutung, doch dürften schon die Kosten für die Durchführung einer rein veterinärpolizeilichen Bekämpfung so erheblich sein, daß sie in keinem angemessenen Verhältnis zu den durch das Leiden bedingten wirtschaftlichen Schäden ständen. Dieses gilt natürlich nur dann, wenn die Bekämpfung nicht nur auf vereinzelte Fälle ausgedehnt würde, sondern in dem Maße, in dem sie zur Erreichung ihres Zweckes praktisch erforderlich ist, zur Durchführung käme. Hier wären mithin die Kosten für Milchmilch und Einzelmilchproben, und zwar sowohl für Entnahme, Versand und bakteriologische Prüfung wie diejenigen zu berücksichtigen, die durch tierärztliche Untersuchungen der Tiere entstünden. Hinzu kämen noch die Kosten für die Überwachungsmaßnahmen sowie die Entschädigungen für eine Milchsperrung bzw. einer veterinärpolizeilich angeordneten Tötung oder Behandlung der Tiere. Vor allem fehlt aber für die gesetzliche Einführung der Bekämpfung die Vorbedingung, daß sich der Tierbesitzer nicht durch eigene Maßnahmen gegen die Schäden der Sache schützen könne. Daß solches möglich ist, haben unsere Erfahrungen gezeigt. Ob sich andernfalls

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 10. Juli 1928 in Breslau.

die Bekämpfung der Mastitis mit gesetzlichen Maßnahmen trotz der erwähnten unvollkommenen Erfüllung der Vorbedingungen durch die Gefährdung der menschlichen Gesundheit begründen läßt, ist eine Frage, die ich noch nicht für spruchreif halte, die meines Wissens aber z. Zt. nachgeprüft wird.

Die Pathogenität der Milch erscheint mir jedenfalls nur minimal, da sonst bei dem langjährigen und regelmäßigen Genuß derselben sicher Gesundheitsstörungen in größerem Ausmaß zur Beobachtung gekommen wären. Die rein amtlichen Maßnahmen der Nahrungsmittelkontrolle geben im übrigen keine oder doch nur eine ungenügende Handhabe zur planmäßigen Bekämpfung der Euterkrankheiten, da von regelmäßigen Stallkontrollen keine Rede ist und zur Aufdeckung der Infektionsquellen nur Stichproben beitragen können. Es werden daher die von der Nahrungsmittelkontrolle für die Milchverbesserung und -Sanierung der Rindviehbestände erwarteten Erfolge ausbleiben, zumal bei der starken Verbreitung der Streptokokken-Mastitis ein Verkaufsverbot von Mischmilch nicht aufrecht zu erhalten ist, wenn nicht ernstlich die Volksernährung in Frage gestellt werden soll. Ein Aufrechterhalten der Milchperre für streptokokkenhaltige Mischmilch ist auch nicht verständlich, solange dieselbe Milch den gleichen Konsumenten als Butter ungehindert zugänglich ist.

Da eine rein veterinärpolizeiliche Bekämpfung der ansteckenden Euterleiden zunächst ausgeschlossen erscheint, auch die amtliche Nahrungsmittelkontrolle hierzu nur ungenügende Handhaben bietet, bleibt zur Erreichung des Zieles nur die Kombination der amtlichen Maßnahmen mit einer freiwilligen Kontrolle durch die Landwirtschaftskammer. Dann dürfte aber auch ein Erfolg garantiert sein! So würde eine Verbindung der Tuberkulosefütterung mit der Mastitisbekämpfung die Kontrolle der Zuchtbestände nach sich ziehen.

Ein Anschluß des Verbandes der Landwirtschaftlichen Genossenschaften, dem z. Zt. allein 277 Molkereien angehören, würde die Aufsicht über einen großen Teil der Abmelkwirtschaften bringen. Es brauchen bei dieser Regelung auch keine Zentralstellen neu organisiert zu werden, sondern die Leitung des Verfahrens könnte ohne Schwierigkeit von den jetzt schon vorhandenen ausgeführt werden.

Neben dem jetzt schon bestehenden freiwilligen Verfahren zur Bekämpfung der ansteckenden Euterleiden müßte also nach dem Vorbild des staatlich anerkannten Tuberkulosefütterungsverfahrens ein Hand-in-Hand-arbeiten

mit der Polizei, allerdings in umgekehrter Reihenfolge, ermöglicht werden, insofern als nach der amtlichen Feststellung von Eitererregern in der Mischmilch die Ermittlung, Behandlung und evtl. Beseitigung der Kühe durch Vertrauens-tierärzte der Landwirtschaftskammern erfolgt.

Ich empfehle Ihnen daher die Annahme folgender Beschlusfassung: „Zur planmäßigen Bekämpfung der ansteckenden, eitrigen Euterentzündungen der Kühe und zu einer wirkungsvollen Verbesserung der Milch ist ähnlich wie bei der Tuberkulosebekämpfung ein freiwilliges Verfahren mit staatlicher Anerkennung und Unterstützung erforderlich, dessen Leitung unter Aufsicht des Landwirtschafts-Ministeriums durch die Bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammern erfolgt.“

Organisation des freiwilligen Bekämpfungsverfahrens der ansteckenden Euterentzündungen:

Mindestens eine jährliche Untersuchung der einzelnen Bestände. Nach Aufforderung des Instituts erfolgt Einlieferung von Mischmilch der einzelnen Bestände durch den Milchkontrollbeamten. Untersuchung von einzelnen Proben nur in solchen Beständen, in deren Mischmilch Streptokokken, Pyogenes-Bakterien oder erhöhter Zellgehalt festgestellt wurde.

Den Besitzern wird außerdem frei gestellt, zur Diagnose „Eutererkrankung“ eine Milchprobe einzelner Tiere zur Untersuchung einzuliefern.

Die Unterweisung der Kontrollbeamten zur Entnahme von Einzel- und Mischmilchproben erfolgt durch besondere Lehrgänge, die von der Landwirtschaftskammer veranstaltet werden.

Über den Untersuchungsbefund wird der Besitzer in Kenntnis gesetzt. Eine Beratung findet durch Merkblätter statt und Behandlungsvorschläge werden von Fall zu Fall gemacht.

Über das Wesen der Euterkrankheiten werden die Interessenten durch Vorträge und Veröffentlichungen aufgeklärt. Die Behandlung übernimmt der ortsansässige Tierarzt, den wir mit unseren Erfahrungen jederzeit unterstützen.

Angeschlossen sind z. Zt. 180 Kontrollvereine mit 4200 Beständen und 60 000 Kühen. Seit 1. Januar untersucht: 16 000 Proben, davon krank 15 Prozent der untersuchten Bestände und 4 Prozent aller Kühe. Den besten Gesundheitszustand zeigen kleinere Bestände im Zuchtgebiet, dagegen sind größere Bestände und Abmelkwirtschaften zum Teil stark verleucht — 30 — 60 Prozent.

Standesangelegenheiten.

Niederschrift

über die Dienstversammlung der Leiter der Bakteriologischen Institute der preussischen Landwirtschaftskammern am 10. und 11. Juli 1928 in Breslau.

Anwesend sind: Graf Baudissin-Berlin (Hauptlandwirtschaftskammer), Berenz-Breslau, v. Bernuth, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederschlesien, Casper-Breslau (Veterinärinstitut der Universität), Ruth Eber-Leipzig, Eickmann-Bonn, Froelich-Breslau, Gerstenberger-Breslau, Grasnick-Breslau, Hobstetter-Jena, Karsten-Hannover, Keiser-Berlin (Hauptlandwirtschaftskammer), Kiessig-Kiel, Knuth-Landsberg, Krage-Königsberg, Lentz-Berlin, Lerche-Breslau, Lührs-Oldenburg, Müller-Breslau, Pallaske-Breslau, Pippert-Breslau, Pröschoidt-Züllchow, Raebiger-Halle, Rautmann-Halle, Reimann-Breslau (Kammerdirektor der Landwirtschaftskammer Niederschlesien), Richter-Breslau (Landwirtschaftskammer Niederschlesien), Schumann-Breslau, Weichlein-Prenzlau, Wiemann-Berlin (Landwirtschaftsministerium), Wolters-Deßau, Zeller-Berlin (Reichsgesundheitsamt). Die Versammlung fand im großen Hörsaal der Landwirtschaftlichen Institute der Universität statt. Sie wurde am 10. Juli, 15 Uhr, durch den Vorsitzenden

der Landwirtschaftskammer Niederschlesien, v. Bernuth, unter Begrüßung der auswärtigen Vertreter und hiesigen Gäste eröffnet.

Keiser berichtet zunächst über die vorjährigen Beschlüsse und ihre Ausführung:

Das Selter'sche Verfahren soll weiter geprüft werden, weil die Verfuhe noch nicht zum Abschluß gekommen sind.

Die Tuberkulosefütterung beim Hausgeflügel soll den Landwirtschaftskammern überlassen werden.

Ein Entscheid über den Antrag, die in den Richtlinien für das Tuberkulosefütterungsverfahren vorgegebene Zahl der Sammelmilchproben in geeigneten Beständen von 3 auf 1 herabzusetzen, wenigstens aber 1 Sammelmilchprobe unter Aufsicht des Vertrauens-tierarztes zu entnehmen, ist vom Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten noch nicht ergangen.

Die erbetene Stellungnahme des Reichsgesundheitsamtes zur Frage, ob die Erhitzung der Milch auf 65 Grad für die Dauer von 30 Minuten der in den §§ 27, 28 BA vorgeschriebenen Hoherhitzung gleichzuachten ist, ist gleichfalls noch nicht erfolgt.

Auf den Antrag beim Ministerium, den Landwirtschaftskammern zur Erforschung der Schweinepest Beihilfen zur Verfügung zu stellen, hat die Hauptlandwirtschaftskammer bis jetzt weder eine zustimmende noch eine ablehnende Antwort erhalten.

Der Beschlusantrag über Bienenfeuchen ist vom Ministerium den

Prof. Armbruster und Koch zur Begutachtung überwiesen worden, doch haben diese sich dahingehend geäußert, daß die Vorschläge der Bakteriologischen Institute betr. Bekämpfung der Nosomaseuche ihnen zur Zeit nicht durchführbar erscheinen. Die Bakteriologischen Institute haben beschloffen, diese Frage in der nächsten Dienstversammlung noch einmal zur Erörterung zu stellen.

Diskussion: Zur Frage der Erforschung der Schweinepest erklärt Ministerialrat Wiemann, daß besondere Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden könnten. Andererseits sind aber die staatlichen Institute in Eystrup und Infel Riems bereit, die Untersuchungen kostenfrei auszuführen.

A. Tuberkulose.

1. Ergebnisse einer längeren Fütterung von Schweinen mit Molken und Buttermilch von dauerpasteurisierter Milch in einer mit entsprechender Einrichtung ausgestatteten Molkerei. Dr. Pröscholdt. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 40, S. 663.)

Dr. Zeller berichtet zusammenfassend über die Ergebnisse der im Reichsgesundheitsamt angestellten Dauerpasteurisierungsversuche wie folgt:

Zeller-Dahlem berichtet über die Ergebnisse der in den letzten Jahren im Reichsgesundheitsamt ausgeführten und nunmehr abgeschlossenen Milchdauerpasteurisierungsversuche. Er schildert kurz die an zwei Dauerpasteurisierungsapparaten (Vierzellendauererhitzer der Firmen Ahlborn-Hildesheim und Bergedorfer Eisenwerke) ausgeführten Untersuchungen und die Befunde, die hinsichtlich des Einflusses der Dauerpasteurisierung auf das chemische, physikalische und biologische Verhalten der Milch sowie auf in der Milch enthaltene Krankheitserreger (Virus der Maul- und Klauenseuche, Bac. Abortus Bang, Bact. Coli, tierische und menschliche Stämme der Paratyphusgruppe, Typhusbazillen, Mastitisstreptokokken und Tuberkelbazillen) erhoben worden sind. Das Endurteil über das Dauerpasteurisierungsverfahren lautet günstig. Zum Schluß wird noch auf die wichtigsten Vorbedingungen hingewiesen, die erfüllt sein müßten, wenn die Dauerpasteurisierung als ausreichende Erhitzung im Sinne der §§ 27 und 28 der Ausführungsvorschriften zum Reichsviehseuchengesetz anerkannt und zugelassen werden sollte. Die ausführliche Arbeit über die im Reichsgesundheitsamt ausgeführten Milchdauerpasteurisierungsversuche wird demnächst als Sonderbeilage zur Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene erscheinen.

Es ist beabsichtigt, die Arbeit den Behörden, die für die Entscheidung der Frage in Betracht kommen, zuzuschicken, um eine allgemeine Durchsprache und Beschlußfassung zu erreichen.

Keiser: Diese Frage ist also nicht nur bei den Bakteriologischen Instituten durchgeprüft worden, sondern auch das Reichsgesundheitsamt hat sich damit eingehend befaßt. Die Technik arbeitet auf diesem Gebiete fleißig mit. Wir werden jetzt noch mehrere neue Verfahren zu prüfen haben, z. B. den englischen Platten-Apparat. Dieser hat den Vorzug, daß die zu pasteurisierende Milch den Apparat im Gegenstrom in sehr kurzer Zeit durchläuft, dabei in $1\frac{1}{2}$ Sekunden auf 100 Grad erhitzt und dann sofort wieder auf die normale Temperatur von 16 bis 18 Grad C zurückgeführt wird. Der ganze Vorgang, also Erhitzung und Wiederabkühlung, vollzieht sich in wenigen Minuten. Die Versuche in England haben ergeben, daß dadurch die Keime der Milch einwandfrei abgetötet werden. Diese Maschinen werden jetzt auch in Deutschland gebaut und schon in diesem Monat in zwei großen Versuchsstationen aufgestellt. Wir stehen also wieder vor einer neuen Sachlage und werden uns deshalb überlegen müssen, ob wir den Antrag so weiter verfolgen oder warten wollen, bis die Versuche mit dem neuen Apparat durchgeführt sind. (Kein Beschlußantrag.)

2. Vorläufiges Ergebnis der im Bakteriologischen Institut in Halle ausgeführten Versuche zur frühzeitigen Feststellung der Eutertuberkulose durch den Lymphozytennachweis. Dr. Rautmann. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 40, S. 664.)

Lerche: Im Breslauer Institut wurden insgesamt 201 Milchproben, die zur Untersuchung auf Tuberkelbazillen eingefandt worden waren, gleichzeitig auf den Gehalt von Lymphozyten geprüft. Tuberkelbazillen konnten in 11 Proben mikroskopisch, in weiteren 13 Proben durch den Tierversuch nachgewiesen werden. Die restlichen 177 Proben waren sowohl mikroskopisch als auch durch den Tierversuch negativ. In 10 (90 Prozent) der mikroskopisch positiven Proben wurden gleichfalls Lymphozyten nachgewiesen. Eine Probe enthielt nur Leukozyten, dagegen keine Lymphozyten. Von den 13 Proben, die durch Tierversuch

positiv waren, enthielten 2 Lymphozyten, also nur 16 Prozent, während 8 Leukozyten und 3 keine Zellen aufwiesen. Von den 177 Proben, bei denen weder mikroskopisch noch durch den Tierversuch Tuberkelbazillen gefunden wurden, enthielten 52 = 30 Prozent Rundzellen, 48 Leukozyten und 77 waren völlig negativ. Man kann daraus folgern, daß der Lymphozytennachweis nicht geeignet ist, einen Hinweis auf Tuberkulose zu geben. — Auch Lührs berichtet über seine Ergebnisse.

3. Der kulturelle Nachweis von Tuberkelbakterien und seine praktische Bedeutung. Dr. Wolters. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 40, S. 666.)

Der Vortragende faßt seine Ausführungen in folgende Schlußsätze zusammen:

1. Die Schwefelsäuremethode nach Hohn zur Reinzüchtung von Tuberkelbazillen des Typus humanus aus Urin, Exsudaten, Sputen und Organen infizierter Versuchstiere ist praktisch verwendbar.
2. Für die Reinzüchtung des Typus bovinus aus Sputum- und Milchproben und Organen tuberkulös erkrankter Tiere (Rind und Schwein) ist sie wegen der zahlreichen bakteriellen Verunreinigungen ohne wesentliche praktische Bedeutung.
3. Die Reinzüchtung des Typus gallinaceus aus Knochenmark erkrankter Hühner gelingt ohne Schwierigkeiten. Die Kulturen von tuberkulösen Organen sind dagegen sehr häufig verunreinigt.
4. Zur Ausschaltung bakterieller Verunreinigungen hat sich die Züchtung aus tuberkulösen Tierorganen und -Sputen nach Vorbehandlung mit Antiformin in Verbindung mit der Schwefelsäure-Methode bewährt.
5. Außer den Eiernährböden nach Lubenau eignet sich auch die Eierbouillon nach Besredka vorzüglich für die Reinzüchtung der Tuberkelbazillen.
6. Die Abgrenzung des Typus humanus vom Typus bovinus ist auf Grund des Wachstums in Eiernährböden nicht möglich. Der Typus gallinaceus zeigt dagegen besonders in Besredka-Bouillon erkennbare Wachstumsunterschiede.

Karsten gibt seine Untersuchungen über den Wert des Säureeinwirkungsverfahrens und der Eiernährböden für die Gewinnung von Reinkulturen von Tuberkelbakterien bekannt, aus denen hervorgeht, daß das Verfahren vorläufig noch nicht geeignet ist, den Meerfischchenversuch entbehrlich zu machen. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 40, S. 668.)

4. Ein Versuch mit dem Weleminski'schen „Tuberculumucin“ zur Heilung von Tuberkulose. Dr. Krage.

An 7 Rindern mit offener Lungentuberkulose wurden Heilveruche mit Tuberculumucin Weleminsky gemacht, einem Impfstoff, dessen Wirksamkeit auf den Stoffwechselprodukten von Tuberkelbakterien des humanen Typus, insbesondere auf deren durch eine eigenartige Züchtungsmethode erzeugten koagulablem Eiweiß und Mucin beruhen sollte. Weder klinisch noch pathologisch-anatomisch war bei den 7 Versuchsrindern gegenüber einem Kontrolltier irgendein Heileinfluß festzustellen.

5. Einige interessante Tuberkulosefälle. Ein Beitrag zur Pathogenese der Tuberkulose. Dr. Rautmann. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 40, S. 669.)

(Forts. folgt.)

Verschiedene Mitteilungen.

Verein ostpreussischer Tierärzte.

Herbstversammlung am Sonntag, den 14. Oktober 1928, vormittags 11½ Uhr s. t. in der Stadthalle zu Königsberg (Pr.). 1. Das tierärztliche Dispensierrecht. Referent: der Vorsitzende. 2. Geschäftliche Mitteilungen. 3. Betsprechung über die Wahlen zur Tierärztekammer, Aufstellung eines gemeinschaftlichen Wahlvorschlages. — Nach der Versammlung gemeinschaftliches Mittagessen. Alle Tierärzte Ostpreußens sind in Anbetracht der Wichtigkeit der vorstehenden Tagesordnung herzlich eingeladen. gez. Dr. Jacobsen, Vors.

Verein der Tierärzte des Reg.-Bezirks Hildesheim.

21. Hauptversammlung am Sonnabend, den 13. Oktober 1928, nachmittags 3 Uhr, im Bahnhofs-Restaurant zu Kreienssen. 1. Geschäftsbericht. 2. Aufnahme neuer Mitglieder. 3. Stellungnahme zu dem vom Tier-

ärzterverband Niederfachsen zur Beratung überwiesenen Vortrag: „Beziehungen zwischen Fleischbeschau und Fleischvergiftungen unter Mitberücksichtigung der Frage der Aufhebung oder Abänderung des § 5 A.G. und § 7 A.B.I.“ 4. Dr. Heinemann: „Fleischbeschaufragen; ist ein besonderer Stempel für notgeschlachtete Tiere notwendig?“ 5. Wahlvorschlag zur Tierärztekammerwahl. 6. Buchführungsstellen. Festsetzung des nächsten Tagungsortes.

Elze (Hann.) und Parensen, im September 1928.

Dr. Machens, Vors. Dr. Heinemann, Schriftf.

Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft.

Sonderauschuß für die Bekämpfung der Tierkrankheiten. 46. Sitzung, Sonntag, den 14. Oktober 1928, 17 Uhr, in Heidelberg, Stadthalle, Eingang IV (Untere Neckar-, Ecke Bienenstraße), Leseaal (4), Oberer Stock.

1. Wahl des Vorsitzenden, stellvertr. Vorsitzenden und Schriftführers. 2. Geschäftliche Mitteilungen. 3. Zuwahl von Mitgliedern. 4. Beratung der Schauordnung und des Preisausschreibens für die 35. Wanderausstellung in München 1929. 5. Herausgabe eines Merkblattes „Heil- und Vorbeugungsmittel gegen Maul- und Klauenfeuche“. Berichterstatter: Geh. Ministerialrat Dr. Edelmann-Dresden und Ministerialdirigent Dr. Müssemeier-Berlin. 6. Geflügelkrankheiten. Berichterstatter: Prof. Dr. Mießner-Hannover.

München, 11. September 1928. gez. Vogel, Vors.

Milchwirtschaftlicher Literaturbericht.

Unter Mitarbeit von Professoren und Assistenten der Preussischen Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft in Kiel wird seit einiger Zeit ein „Milchwirtschaftlicher Literaturbericht“ herausgegeben, der monatlich im Umfang von 50—55 Seiten erscheint und in Referatenform die neuesten Arbeiten aus dem Gesamtgebiete der Milchwirtschaft enthält. Das Heft kostet monatlich 2,50 Mk. Der regelmäßige Bezug kann Tierärzten, die sich auch für Milchhygiene interessieren, empfohlen werden. Bestellungen nimmt die Bücherei der Forschungsanstalt entgegen.

Seelemann.

Tierärzterundfunk.

1. Freitag, den 26. Oktober 1928, 19,20 Uhr: Dr. Hock: „Studien über tierärztliche Nahrungsmittelhygiene“. 2. Freitag, den 23. November, 19,20 Uhr, Dr. Altenstein-Barmen: „Der Tierarzt und die Kontrolle des Verkehrs mit Wild und Geflügel“. 3. Freitag, den 28. Dezember 1928, 19,20 Uhr, Dr. Bantz-Arnsberg i. W.: „Hackfleisch, seine Beurteilung und die für seinen Verkehr erlassenen Verordnungen.“ Anmeldungen weiterer Vorträge sind erwünscht. Dr. Giese.

Fortbildungskursus des Deutschen Veterinärrats über das Gebiet der Geflügelkrankheiten und der Geflügelkunde.

Es ist angeregt worden, im November oder Dezember d. Js. einen Fortbildungskursus über das Gebiet der Geflügelkrankheiten und der Geflügelkunde an der Tierärztlichen Hochschule Berlin abzuhalten. Um einen Überblick über das vorliegende Bedürfnis und das Interesse für einen solchen Kurs zu gewinnen, bitte ich die Herren, die sich daran beteiligen würden, möglichst bald um eine entsprechende Nachricht an die Geschäftsstelle des Deutschen Veterinärats Berlin NW. 6, Luisenstraße 56, damit gegebenenfalls mit der Organisation des Kurses begonnen werden kann.

Stang.

Fortbildungskurse des Deutschen Veterinärates.

Der Deutsche Veterinärat hält auch in diesem Winter eine Reihe von Fortbildungskursen für Tierärzte ab. Die nächsten Kurse finden statt:

In Leipzig (22. Fortb.-Kurs des DVR.) am 21. und 22. Oktober, veranstaltet von der dortigen vet.-medizinischen Fakultät in Verbindung mit dem Deutschen Veterinärat. Die Tagesordnung wird von seiten der Fakultät bekannt gegeben.

In Stettin (23. Fortb.-Kurs des DVR. am 27. und 28. Oktober. Es werden sprechen: Prof. Dr. Mießner-Hannover über Geflügelkrankheiten (mit Demonstrationen), Prof. Dr. Max Müller-München über Verantwortungsfrage bei Fleischvergiftungen; Vorführung der elektrischen Betäubung von Schlachtvieh; Vet.-Rat Dr. Baars-Stettin über Paratyphus Typendifferenzierung in Bezug auf ihre praktische Bedeutung; Prof. Dr. Goetze-Hannover über sporadische und infektiöse Euterkrankheiten, anschließend Demonstrationen aus dem Gebiet der Geburtshilfe; Prof. Dr. Nöller-Berlin über Parasitäre Erkrank-

ungen; Schlachthofdirektor Dr. Heine-Duisburg über Milchkunde und Milchkontrolle (mit Demonstrationen).

In Frankfurt a. Main (24. Fortb.-Kurs) am 27. und 28. Oktober. Es werden sprechen: Geheimrat Prof. Dr. v. Ostertag-Stuttgart über Milchkontrolle; Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Pfeiffer-Gießen über Neuzeitliche Chirurgie (mit Demonstrationen); Prof. Dr. Küst-Gießen über Euterkrankheiten; Dr. Neven-Frankfurt a. M. über Hufbeschlagkunde; Dr. Seifried-Gießen über Geflügelkrankheiten; Dr. Albrecht-Frankfurt a. M. über Chemotherapie.

Näheres über Ort und Zeit der Kurse wird noch bekanntgegeben.

Stang.

Demonstrationskursus über Milchhygiene und Euterkrankheiten in Breslau.

Die Meldungen für den am 13. Oktober 1928 stattfindenden Demonstrationskursus über Milchhygiene und Euterkrankheiten in Breslau, sind so zahlreich eingegangen, daß nicht sämtliche Herren daran teilnehmen können. Es ist daher eine Wiederholung des Demonstrationskurses für Donnerstag, den 18. Oktober 1928, vormittags 11 Uhr, vorgesehen, zu dem besondere Einladungen ergangen sind. Zu diesem letzteren Termin könnten auch noch einige Neuanmeldungen berücksichtigt werden.

Schenkung für die Bücherei der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Von Schlachthofdirektor Dr. Albrecht-Minden i. W. sind der Bücherei der Hochschule eine Anzahl wertvoller älterer Bücher und Zeitschriften überwiesen. Wir danken dem Spender auch an dieser Stelle.

Der Kurator der Bücherei.

Mießner.

Zu unserem Bilde.

Nach dem letzten Willen von Tierarzt Herbert Dormann-Helmsstedt von seinem Bruder, Vet.-Rat Wilhelm Dormann-Hamel, der Burschenschaft Alt Germania geschenkt, der D. T. W. dankbarerweise zur Verfügung gestellt und dem Archiv der Tierärztlichen Hochschule Hannover überwiesen.

Bücherbesprechungen.

Das Klauenbeschneiden der Rinder, ein wichtiger Zweig der Klauenpflege. Von Arthur Fischer, Dr. med. vet. und Dr. phil., Direktor der Staatlichen Lehrschmiede in Dresden. 42 Seiten mit 27 Abb. 4. Auflage. Hannover, Verlag von M. & H. Schaper, 1928. Preis 1,75 Mark.

Seit dem Jahre 1922 erscheint das Büchlein bereits in 4. Auflage. Für den Fachmann bedarf es ja kaum des Hinweises, wie notwendig die Hebung der Klauenpflege ist. Die vorliegende Schrift hat bereits in ihren früheren Auflagen durch die praktische klare Darstellung des Instrumentariums und der Ausführung der Allgäuer Methode des Klauenbeschneidens viel gutes geleistet. Sie verdient aber unter den Tierärzten, die sie wieder Landwirten und geschickten Beschlagfchmieden empfehlen können, weit größere Verbreitung. R. Götz, Hannover.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Tierarzt Karl Trenkler aus Dresden, bisher wissenschaftl. Assistent am bakt. Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Ostpreußen (Königsberg) zum städt. Tierarzt am Schlachthof zu Bautzen (Sa.); Dr. Gimpmann, bisher wissenschaftl. Assistent am hyg. Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover zum wissenschaftl. Assistenten am bakt. Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Ostpreußen (Königsberg).

Verfetzt: Dr. Lüssenhop, Vet.-Rat in Tönning, in die Vet.-Ratstelle in Husum; Vet.-Rat Dr. Leipziger in Wehlau, in die Vet.-Ratstelle in Langenfalza.

In den Ruhestand getreten: Dr. Feldhaus, Vet.-Rat in Burgsteinfurt; Loewel, Vet.-Rat in Langenfalza; Werbter, Vet.-Rat in Ortelsburg; Dr. Tillmann, Vet.-Rat in Lüdinghausen; Wilkens, Vet.-Rat in Warendorf i. W.

Verstorben: Dr. C. Haupt, Direktor des städt. Schlachthofs in Finsterwald; Stadttierarzt Max Goroncy, Berlin.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrzabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Ausperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 41.

Ausgegeben am 13. Oktober 1928.

36. Jahrgang.

(Aus den Staatlichen Forschungsanstalten Insel Riems. — Direktor: Prof. Dr. O. Waldmann.)

Die Rolle des Menschen bei der Verbreitung der Maul- und Klauenseuche.

Von Prof. Dr. O. Waldmann und Privatdozent Dr. K. Trautwein.

Die Prophylaxe beruht bei der Maul- und Klauenseuche wie bei allen Seuchen auf möglichst genauer Kenntnis ihrer Verbreitungsweise. Systematische Forschung und kasuistische Beobachtung haben gerade in den letzten Jahren manch wertvollen Beitrag zur Bereicherung unserer epizootologischen Kenntnisse geliefert. Vieles aber bleibt noch ungeklärt. So kennt z. B. jeder in der Seuchenbekämpfung tätige Tierarzt Fälle, in denen es ihm nicht möglich war, die Ursache des Seuchenausbruches festzustellen. Ganz unmöglich scheint häufig auch die triftige Erklärung für plötzliche Erstaussbrüche in vorher seuchenfreien Gegenden. Die Epizootologie sieht deshalb als Infektionsquellen nicht nur akut m. k. s.-kranke Tiere an, sondern rechnet auch mit Virusträgern und -Ausscheidern, für deren wirkliche Existenz ein experimenteller Beweis bisher allerdings noch nicht sicher erbracht werden konnte.

Die epizootologische Erfahrung lehrt, daß für die Verbreitung der Maul- und Klauenseuche von der Infektionsquelle aus die verschiedensten Momente urfächlich in Frage kommen. Die größte Rolle spielt in der Regel der Tier- und Personenverkehr. Die weitgehende Unterbindung des freien Handels und Verkehrs mit Tieren während des Krieges hat denn auch der Seuchenverbreitung stark entgegen gewirkt.

Bei der Anft eck u n g spielen Zwischenträger, in erster Linie der Mensch, eine Hauptrolle. Dies äußert sich naturgemäß besonders deutlich in Gegenden mit starkem Personenverkehr. Befondere Berufsgruppen, Händler, Kastrierer, landwirtschaftliches Dienstpersonal und andere Personen, die ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen gewohnheitsmäßig Ställe und Gehöfte betreten, sind die Hauptbeteiligten.

Nach der üblichen Ansicht ist die Rolle des Menschen bei der Verschleppung des Maul- und Klauenseuchevirus lediglich eine passive, d. h. der Erreger wird durch Vermittlung des Schuhwerks, anderer Kleidungsstücke usw. von kranken auf empfängliche Tiere übertragen.

Neuerdings ist von den schwedischen Gelehrten Kling und Höjer (1) die Ansicht ausgesprochen worden, daß der Mensch nicht nur als passiver Überträger, sondern auch direkt als Infektionsquelle bei der Verbreitung der Maul- und Klauenseuche in Frage komme. Diese Theorie hat

namentlich im Ausland große Beachtung gefunden, und das mit Recht; denn unsere epizootologischen Anschauungen müßten dadurch eine vollkommene Revision erfahren, die wiederum von großem Einfluß auf die Bekämpfungsmethode sein müßte. Die Angaben von Kling und Höjer forderten deshalb zur Stellungnahme und experimentellen Nachprüfung heraus.

Die Autoren formulierten ihre Theorie dahin, daß der Mensch nicht nur leicht und offensichtlich häufig an Maul- und Klauenseuche erkrankt, sondern daß das Virus auf der menschlichen Mundschleimhaut auch ohne vorausgehende Erkrankung an Maul- und Klauenseuche vegetieren und infektiös verbleiben könne. Eine Passage von Schleimhaut zu Schleimhaut derartiger Menschen sei möglich, und infolge Ausscheidung des Virus käme es zur Infektion von Tieren. Der Mensch wird somit als Virusträger und Dauerausscheider angesprochen.

Kling und Höjer stützen ihre Angaben größtenteils durch statistisch-epizootologische Daten, zum geringeren Teil durch Experimente. Seit 1875 kam es in Schweden zu zwölf Maul- und Klauenseuche-Epizootien, von denen zehn ihren Ausgangspunkt im Südosten in Schonen, der Dänemark benachbarten Provinz, nahmen. Bei neun Epizootien konnten die Autoren nachweisen, daß 90 Prozent der Erstaussbrüche auf den dicht bevölkerten südöstlichen Teil der Provinz und den Umkreis der Städte mit starkem Verkehr nach dem Hinterland entfallen, während der dünn bevölkerte Nordosten, der größtenteils mit Wäldern bedeckt ist, regelmäßig verschont bleibt. Hieraus sowie aus der prozentual viel stärkeren Verteilung der großen Gehöfte gegenüber den Bauernhöfen wird zunächst die Abhängigkeit der Verteilung von den Verkehrsverhältnissen abgeleitet. In 33 Einzelfällen werden Seuchenausbrüche auf den vorangegangenen Personenverkehr mit den stark frequentierten Fremdstädten Helsingborg und Malmö zurückgeführt. Die statistischen Erhebungen über die Beziehungen zwischen Personenverkehr und Seuchenverbreitung ergänzen die Autoren durch ihre Theorie des menschlichen Virusträgers. Nicht nur passiv soll der Mensch die Seuche verschleppen, sondern er soll das Virus auch aufnehmen und in infektionstüchtigen Form wieder ausscheiden können. Als Stütze dieser Theorie wird weiter angeführt, daß Fälle von Maul- und

Klaufenfeuche bei Menschen in Schweden angeblich häufig zur Beobachtung gelangen. Der direkte Nachweis für die Richtigkeit dieser Angaben durch genaue Mitteilung des jeweiligen Krankheitsbefundes und Verimpfung der Krankheitsprodukte auf empfängliche Tiere wird von Kling und Höjer nicht erbracht. Sie glauben aber, den indirekten Beweis geführt zu haben durch die Feststellung virulizider Antikörper im Blut von sechs Menschen, die nach ihrer Ansicht eine Maul- und Klauenfeuche-Infektion durchgemacht haben. In einer neueren Arbeit, in der die Fortsetzung ihrer Versuche beschrieben wird, teilen die Autoren mit, daß es ihnen nicht gelungen ist, die Maul- und Klauenfeuche experimentell bei Menschen sowie bei Affen hervorzurufen. Bei einem infizierten Affen jedoch konnten sie 49 Tage p. i. das Virus im Kot durch Verimpfung auf das Meerfchweinchen nachweisen. Dieser eine Fall erscheint Kling und Höjer beweiskräftig dafür, daß der Affe das Virus während langer Zeit in infektionstüchtiger Form in den Schleimhäuten des Darms beherbergen kann.

Dieser kurze Überblick läßt erkennen, daß die tatsächlichen Unterlagen für eine so weitgehende Theorie, wie die vorliegende, sehr dürftig sind. Die These von Kling und Höjer hat denn auch in der Literatur bereits Widerspruch erfahren. Magnusson und Hermannsson (2) haben auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen und Beobachtungen über die Maul- und Klauenfeuche in Schweden zunächst gezeigt, daß die auf statistischem Wege gefundenen Konstruktionen der Autoren künstlich sind; es gelingt nach Magnusson und Hermannsson in der Regel nicht nur, Personenverbindungen zwischen Verkehrszentren und verseuchten, sondern in gleicher Weise auch mit unverseuchten Gehöften nachzuweisen. Auch ist bei den ersten 30 Seuchenfällen jeder Epizootie nach ihrer Feststellung die stärkste Seuchendichte nicht in den Stadtkreisen, also in nächster Nähe der menschenreichen Verkehrszentren, sondern auf dem platten Lande zu finden. Die Tatsache der häufigeren Verseuchung der großen und größten Gehöfte bringen Magnusson und Hermannsson hauptsächlich mit der größeren Seuchenbereitschaft derartiger mit hoch empfänglichen Tieren belegten Gehöfte in Zusammenhang. Die Möglichkeit einer offensichtlichen Erkrankung des Menschen an Maul- und Klauenfeuche bestreiten die Autoren generell; nach ihrer Ansicht ist bis jetzt der sichere Beweis für eine positive Infektion des Menschen nicht erbracht worden. Auch haben während der letzten Epizootien in Schweden Zehntausende, sowohl Erwachsene wie Kinder, ungekochte Milch genossen, ohne daß Maul- und Klauenfeuchefälle bei Menschen vorgekommen sind. Die viruliziden Versuche, die von Kling und Höjer zur Abtötung von Meerfchweinchenvirus durch das Blut von angeblich rekonvaleszenten Menschen in vitro ausgeführt wurden, halten sie für ungeeignet und vor allem ungenügend zum Beweis für die tatsächliche Existenz von Virusträgern unter den Menschen.

Wir selbst haben uns trotz der von vornherein unwahrscheinlichen Angaben Klings und Höjers eine experimentelle Nachprüfung angelegen sein lassen, denn es müssen unseres Erachtens die experimentell zu erschöpfenden Möglichkeiten, so weit irgend zugänglich, wahrgenommen werden, um die noch ungelösten Rätsel der Maul- und Klauenfeuche-Epizootologie einer Lösung entgegen zu führen. Von dem erneuten Versuch einer künstlichen Infektion von Menschen haben wir abgesehen, da wir einmal derartige Versuche einer Autoinfektion bereits vor Jahren ohne Erfolg vorgenommen haben, und zum andern in der Riemser Anstalt fortwährend reichlich Gelegenheit zu ungewollter Infektion von Menschen gegeben ist. Es arbeiten dauernd 100—150 Personen im Anstaltsbetrieb, von denen der größte Teil fast täglich mit akut kranken Tieren umzugehen hat. Die Infektionsmöglichkeit wird dadurch noch sehr erweitert, daß mit sehr vielen z. T. hochvirulenten Stämmen der drei Virustypen experimentiert wird. Es wird in der Riemser Anstalt ein

System peinlichster Vorbeugungsmaßnahmen durchgeführt, um eine Verschleppung der Maul- und Klauenfeuche aus dem Institut zu vermeiden. Wir gebrauchen jedoch keinerlei Vorsicht, um uns während des Arbeitens im Institut gegen die Möglichkeit einer Selbstinfektion zu schützen, etwa derart, wie es beim Experimentieren mit menschenpathogenen Bakterien üblich ist. Trotzdem hat sich seit Bestehen der Anstalt nur ein einziger Fall von Maul- und Klauenfeuche des Menschen ereignet, und zwar die nach einer ungewollten Verletzung der Hand mit Schweinelymphe erfolgte Infektion von Pape (3), die in der Literatur beschrieben ist. Derselbe zog sich durch das zum Auffangen der Lymphe bestimmte Glas, das zerbrach, eine etwa 2½ cm lange, ziemlich tiefe, stark blutende Fleischwunde zu, in die die Lymphe, ein damals (1920) sehr virulenter Stamm, hineinfloß. Eine Verimpfung des Inhalts der an Händen und Füßen aufgetretenen Blasen auf Meerfchweinchen konnte damals nicht vorgenommen werden. Trotzdem halten wir den Fall auf Grund des Gesamtbefundes sowie des ätiologischen Zusammenhanges einwandfrei für Maul- und Klauenfeuche. Einwandfrei dürfte von den neueren Fällen vor allem auch die 1924 von Gerlach (4) beschriebene Maul- und Klauenfeuche eines 5½-jährigen Mädchens sein. Der klinische Befund eines ausgedehnten Blasenexanthems auf der Mundschleimhaut wird hier durch positive Rückübertragung des Blaseninhaltes auf Meerfchweinchen ergänzt.

Die Möglichkeit einer Infektion des Menschen mit dem Virus der Maul- und Klauenfeuche ist demnach einwandfrei dargetan. Gegenüber der außerordentlich reichhaltigen Kasuistik, wie sie sich namentlich in der älteren Maul- und Klauenfeuche-Literatur findet, ist jedoch größte Reserve angezeigt. Die allermeisten von Tierärzten und Ärzten berichteten Fälle dürften auf Verwechslungen mit andern Stomatitiden, namentlich der Herpesinfektion, beruhen. Bestärkt wurden wir in dieser Ansicht auch durch die Erfahrung, daß alles Material, das uns von verdächtigen Fällen aus human-medizinischen Kliniken sowie von praktischen Ärzten eingesandt wurde, niemals eine Maul- und Klauenfeuche-Infektion beim Meerfchweinchen hervorrief. Die an sich mögliche Erkrankung des Menschen an Maul- und Klauenfeuche gehört demnach zu den nur selten auftretenden Fällen.

Die Annahme der schwedischen Autoren vom latenten Mikrobismus des Maul- und Klauenfeuchevirus auf der Mundschleimhaut suchten wir auf folgende Weise nachzuprüfen. Wir entnahmen Speichelproben von 48 im Institut beschäftigten Personen; 17 dieser Personen waren im Ochsenstall tätig, hatten also ständig Umgang mit schwer verseuchten Tieren. Das Alter der Personen betrug etwa 18 bis 30 Jahre. Zum Teil waren sie erst kurze Zeit, zum Teil schon jahrelang in der Anstalt beschäftigt. Im ganzen kamen 130 derartige Speichelproben zur Verimpfung. Bei den Ochsenwärttern erfolgte mehrmalige Entnahme. Als Testtiere dienten 306 Meerfchweinchen, die acht Tage lang nach der Verimpfung einzeln in sterilisierten Isolierkästen gehalten und täglich beobachtet wurden. Eine positive Reaktion ist bei keinem Tier eingetreten. Der Virusnachweis im Speichel von Menschen ist demnach nicht gelungen.

Die Versuche zum direkten Nachweis des Virus im Speichel wurden ergänzt durch Serumprüfungen, die wir bei 17 der erwählten Personen durchführten, um eventuell vorhandene spezifische Immunstoffe festzustellen. Das Blut wurde aus der Armvene entnommen, das Serum erhielt einen konservierenden Zusatz von 0,5 Prozent Karbol. Die einzelnen Proben verimpften wir in Mengen von 1—2 ccm auf Meerfchweinchen, die gleichzeitig auf einer Planta infiziert wurden, und zwar wurden derartige Prüfungen mit Virusstämmen aller drei Typen durchgeführt, um alle Möglichkeiten zu erschöpfen. Die Meerfchweinchen sind sämtlich generalisiert erkrankt ebenso wie die Kontrollen. Ein

Schutzkörpergehalt war demnach in keinem Serum der untersuchten Personen festzustellen.

Unserer Versuche ergaben also keinen Anhaltspunkt für die Richtigkeit der Ansicht von Kling und Höjer, wonach das Virus der Maul- und Klauenfeuche auf der Mundschleimhaut des Menschen in infektionstüchtiger Form parasiert. Auch können wir den Befund von viruliziden Antikörpern im Blut des Menschen durch die von uns untersuchten Fälle nicht bestätigen.

Wir halten deshalb die Theorie der schwedischen Autoren vom Virusträgertum des Menschen für nicht bewiesen und auf Grund unserer Versuche für sehr unwahrscheinlich. Auch sind wir der Ansicht, daß es derartiger Annahmen für die Maul- und Klauenfeuche-Epizootologie gar nicht bedarf. Die Möglichkeiten einer passiven Verschleppung des Virus sind nach unserer heutigen Kenntnis von der starken Tenazität des Erregers sehr mannigfaltig. Wir wissen, daß sich das Lymphvirus auch in getrocknetem Zustand wochenlang infektiös erhält, während das in den Blaseenden eingeschlossene Virus seine Infektiosität sogar Monate lang bewahrt. Nach den Feststellungen der englischen Maul- und Klauenfeuche-Kommission (5) vermöchte man mit Virus, das an Haaren angetrocknet war, noch nach vier Wochen zu infizieren; Knochen von akut krank gewesenen Schlachtieren enthielten das Virus nachweisbar 76 Tage. W a g e -

ner (6) fand Epithelstückchen nach 103tägiger Aufbewahrung im Abwasser noch infektiös. Angesichts dieser und ähnlicher einwandfrei bewiesener Tatsachen bieten sich der Epizootologie Erklärungsmöglichkeiten für viele kryptogene Seuchenfälle, ohne daß sie die Hilfe bisher unbewiesener Theorien in Anspruch zu nehmen brauchte.

Schrifttum.

1. Kling, C. et Höjer, A.: Recherches sur le mode de propagation de la fièvre aphteuse. Géographie et topographie des épizooties en Suède. C. R. Soc. Biol. 1926, Bd. 94, S. 613. — — — Transmission du contag. Ebenda 1926, Bd. 94, S. 615. — — — Mécanisme de la transmission du contag. par l'homme Ebenda 1926, Bd. 94, S. 618. — — — C. R. hebdom. des séances de l'acad. des sciences, 1928, Bd. 186, S. 1450.
2. Magnusson, H. und Hermansson, K. A.: Einige Beobachtungen über die Maul- und Klauenfeuche in Schweden. Acta pathologica et microbiologica Scandinavica 1927, Bd. 3, S. 737.
3. Pape, J.: Ein Beitrag zur Maul- und Klauenfeuche des Menschen. B. t. Wschr. 1921, S. 354.
4. Gerlach, F.: Maul- und Klauenfeuche beim Menschen und künstliche Übertragung auf Meerschweinchen. D. T. W., Ref. 1924, S. 347.
5. Englische Maul- und Klauenfeuche-Kommission: II. Progress Report, London 1927.
6. Wagener, K.: Experimentelle Untersuchungen über die Tenazität des Virus der Maul- und Klauenfeuche in häuslichen und gewerblichen Abwässern. Arch. für wissenschaftl. und prakt. Tierheilkunde 1927, Bd. 56, S. 481.

Welche Leberegelmittel sind wirksam, relativ ungefährlich und besonders preiswert?*)

Von Prof. Dr. Dr. H. Raebiger, Halle (Saale).

Es befaßten sich z. Zt. 14 Firmen mit der Fabrikation von Leberegelmitteln und bringen insgesamt 26 Präparate in den Handel.

Man kann unterscheiden:

1. Präparate aus Pflanzendrogen, und zwar die Filixprodukte Distol der Chemisch-pharmazeutischen A.-G. Bad Homburg und Filinol der Chemischen Werke Carl Buchner & Sohn in München sowie Kombinationsprodukte von Filixstoffen und Kamala; Hepatol von Tierarzt Dr. Rahne-Schönebeck und Hepadistin der Münchener pharmazeutischen Fabrik.

2. Präparate aus Pflanzendrogen und Chlorkohlenstoffen. Als solche sind zu nennen Egelin der Pharmagans in Oberursel, Ecobol der Chemischen Fabrik Riedel in Berlin und ein kombiniertes Distol-Präparat der schon genannten Homburger A.-G. Weiterhin kombinierte Hexachloraethan-Kapseln der Firma Bengen & Co. in Hannover, die Distex-Präparate der Atarost in Rostock und das Tapeolin der Chem. Werke Andernach (Finzelbergs Nachfolger).

3. Chlorkohlenstoffpräparate aus Hexachloraethan, Tetrachlormethan (= Tetrachlorkohlenstoff) und Tetrachloraethylen.

Sie werden von Buchner & Sohn in München unter dem Namen Distochlor A und Distochlor B, von der Chemischen Fabrik Aubing bei München als Serapis SB 444, Neoserapis, als Hexachloraethan-Kapseln, Hexachloraethan und Perchloraethylen, von Bengen & Co., Hannover, als Hexachloraethan-Kapseln und in flüssiger Form sowie als „Leberegelmittel für Rinder und Schafe“ von der Chemischen Fabrik Prötzel in Trudering b. München als Distomal R und S, von Tierarzt Dr. Kretzschmar-Bautzen als Hepol und Hexachloraethan-Kapseln für Rinder, von der I. G. Farbenindustrie Hoechst als Igitol herausgebracht.

4. kommen Präparate mit anderen chemischen Mitteln als wirksame Grundlage, wie das Distodeath der Chemisch-pharmazeutischen Fabrik Wolfrum-Augsburg in Betracht,

das ein Kombinationsprodukt aus Ochsfengalle und Thy-mol ist.

Bei den Chlorkohlenstoffen ist zu bemerken, daß Tetrachlorkohlenstoff gleichbedeutend ist mit Tetrachlormethan, Hexachloraethan daselbe ist wie Perchloraethan und Carboneum trichloratum und Tetrachloraethylen identisch ist mit Perchloraethylen.

Diese Synonyma sind offenbar bei Benennung der Mittel bzw. bei Angabe ihrer Zusammensetzung zur Verflechtung gewählt worden.

Anscheinend wieder aus dem Handel verschwunden sind Fasciolin, Filikal, Filix, Filix neu, Espro, Espronovin, Trematon, Etronal und Mercks T 53.

Auch das Elcema-Kupferlecksalz der Gräfin von Linden fehlt nicht unter den Leberegelmitteln!

Das Kupferlecksalz hat jedoch, um es vorwegzunehmen, bei der Prüfung in der Veterinär-polizeilichen Anstalt zu Oberschleißheim nicht die geringste Wirkung auf die Leberegel gehabt.

Die Mittel werden entweder als Kapseln oder als Einguß mit kaltem Mehltrank nüchtern vor dem Morgenfutter verabreicht, und zwar sind die Rinder im allgemeinen zweibis fünfmal zu behandeln, nur bei Distodeath, Igitol und Tapeolin soll eine einmalige Behandlung genügen.

Diese drei Präparate sind jedoch wissenschaftlich noch nicht ausreichend nachgeprüft.

Für Schafe kommt eine ein- bis viermalige Behandlung in Betracht.

Während für Distodeath und Igitol eine Einheitsdosis für Rinder und Schafe vorgeschrieben ist, desgleichen für das Gans'sche Egelin für Schafe und das Riedel'sche Ecobol für Schafe, werden alle anderen Mittel nach dem Gewicht der Rinder, Schafe und Ziegen dosiert.

Ebenso verschieden wie die Namen sind auch die Preise für die einzelnen Präparate. Sie schwanken für ein Rind von 10 Ztr. Lebendgewicht zwischen 13,65 Mk. und 1,08 Mk., für Schafe und Ziegen von 1 Ztr. Lebendgewicht zwischen 1,20 Mk. und 21 Pfg.

Am teuersten sind die Präparate aus Pflanzendrogen, am billigsten diejenigen aus Chlorkohlenstoffen, obwohl auch

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 10. Juli 1928 in Breslau.

Die z. Zt. im Handel befindlichen Heilmittel gegen die Leberegelkrankheit.

Zusammengestellt von Obertierarzt Dr. A. Spiegl, Halle (Saale).

Hersteller des Präparates	Lfd. Nr.	Name des Präparates	Zusammensetzung bzw. wirksame Bestandteile des Präparates	Dosierung d. Mittels		Zahl der Behandlungen		Art der Verabreichung		Kosten der Behandlung	
				a) für Rinder	b) für Schafe und Ziegen	a) für Rinder	b) für Schafe und Ziegen	a) bei Rindern	b) bei Schafen und Ziegen	a) für ein Rind von 10 Ztr. Ge- wicht	b) f. ein Schaf, e. Ziege v. 1 Ztr. Gew.
Chemisch-Pharmazeut. A.-G. Bad Homburg, Werk Frankfurt a. M.	1	Distol alt für Rinder und Schafe	Filicinprodukt	Je nach Gewicht		4	2	In Kapseln morgens vor dem Füttern		13,20	1,20
Desgl.	2	Distol kombiniert für Rinder	Filicinprodukt und Hexachloraethan	Je nach Gewicht		4	—	In Kapseln morgens vor dem Füttern		11 60	—
Chemische Werke Karl Buchner & Sohn München-Solln	3	Filinol	Filicinprodukt	Je nach Gewicht		3	2	In Kapseln		13,65	1,20
Desgl.	4	Distochlor A für Schafe	Chlorkohlenstoff- präparate	—	Je nach Gewicht	—	1	In Kapseln		—	0,32
Desgl.	5	Distochlor B für Rinder	Chlorkohlenstoff- präparate	Je nach Gewicht	—	2	—	In Kapseln		6,40	—
Tierarzt Dr. Rahne & Sohn Schönebeck/Elbe	6	Hepatos in Kapseln	Kombinationsprodukt aus Filixstoffen und Kamala	Je nach Gewicht		4	2-3	In Kapseln vor dem Füttern		5,—	0,66
		Hepatos lose (flüssig)				4	2-3	Als Einguß mit kaltem Mehltrank		2,70	0,30
Münchener Pharmazeut. Fabrik, München	7	Hepadistin (flüssig)	Kombinationsprodukt aus Extract. filicis und Kamala	Je nach Alter		4	4	Als Einguß mit warmer Milch, Mehlsuppe vor dem Füttern		1,80	0,40
Pharmagans-Oberursel u. Chem. Fabrik Baß & Keller-Langenargen	8	Egulin flüssig	Kombinationsprodukt aus Filixstoffen und Chlorkohlenstoffen	Je nach Gewicht	Einheits- dosis	5	1	Als Einguß mit kaltem Mehltrank nüchtern		5,15	0,32
		Egulin in Kapseln				5	1	In Kapseln		8,—	0,40
Finzelbergs Nachfolger Chemische Werke Andernach	9	Tapeolin für Rinder, Schafe und Ziegen	Kombinationsprodukt aus Rohfilicin und Tetrachlorkohlenstoff	Je nach Gewicht		1	1	Morgens nüchtern als Schüttelmixtur		2,20	0,30
Chemische Fabrik J. D. Riedel, Berlin-Britz	10	Ecobol für Schafe	Kombinationsprodukt aus Filixstoffen und Chlorkohlenstoffen	—	Einheits- dosis	—	—	In Kapseln		—	0,49
Chemische Fabrik Aubing bei München	11	Neoserapis für Rinder in Kapseln	Chlorkohlenstoff- präparat	Je nach Gewicht	—	2-3	—	In Kapseln		5,—	—
		Neoserapis für Rinder lose (flüssig)	aus Hexachloraethan u. Tetrachloraethylen	—	—	2-3	1	Als Einguß		4,50	—
Desgl.	12	Serapis SB 444 für Schafe	Chlorkohlenstoffpräp., Tetrachlorkohlenstoff	—	Je nach Gewicht	—	1	In Kapseln oder als Einguß		—	0,30 0,22
Desgl.	13	Hexachloraethan- Kapseln für Rinder	Chlorkohlenstoff- präparat	Je nach Gewicht	—	diesbezgl. Angaben fehlen	—	In Kapseln		2,90	—
Desgl.	14	Hexachloraethan und Perchloraethylen flüssig, für Rinder	Chlorkohlenstoff- präparat	Je nach Gewicht	—	"	—	Als Einguß mit kaltem Mehltrank		2,90	—
Bengen & Co., Hannover	15	Hexachloraethan- kapseln für Rinder	Chlorkohlenstoff- präparat	Je nach Gewicht	—	4	—	In Kapseln		4,80	—
Desgl.	16	Hexachloraethan flüssig, für Rinder	Chlorkohlenstoff- präparat, Hexachloraethan u. Tetrachloraethylen	Je nach Gewicht	—	3	—	Als Einguß in kaltem Mehltrank		5-6,—	—
Desgl.	17	Hexachloraethan- kapseln kombiniert für Rinder	Kombinationsprodukt Hexachloraethan u. Filicin	Je nach Gewicht	—	4	—	In Kapseln		6,—	—
Desgl.	18	Leberegelmittel für Schafe	Tetrachlorkohlenstoff in Paraffin. liquid.	—	Je nach Gewicht	—	2-3	In Kapseln		—	0,26
Chemische Fabrik M. Prötzel Trudering b. München	19	Distomal „R“ für Rinder	Chlorkohlenstoff- präparate	Je nach Gewicht	—	3	—	Als Einguß mit kaltem Mehltrank		7,80	—
	20	Distomal „S“ für Schafe	Carboneum trichlorat- um	—	Je nach Gewicht	—	1	Als Einguß mit kaltem Mehltrank		—	0,21
Tierarzt Dr. Kretzschmar Bautzen/Sa.	21	Hepol für Rinder	Hexachloraethan und Tetrachloraethylen	Je nach Gewicht	—	3	—	Als Einguß m. kalt. Mehl- trank nücht.		3,97	—
	22	Hexachloraethan- kapseln für Rinder nach Nöller	Hexachloraethan	Je nach Gewicht	—	4	—	Morgens nüchtern i. Kapseln		3,40	—
Fabrik Chem.-pharma- zeut. Präparate H. Wolfrum-Augsburg	23	Distodeath (schwach und „stark“)	Kombinationsprodukt aus Ochsen- galle und Thymol	Einheits- dosis	Einheits- dosis	1	3	Als Einguß m. 1 l Wasser vor dem Füttern		2,— bis 2,50	0,66 bis 0,75
J. G. Farbenindustrie A. G. Hoechst a. Main	24	Igitol für Schafe und Rinder	Halogenierte Kohlen- wasserstoffe als Emulsion	Je nach Alter	Einheits- dosis	1	1	Als Einguß morgens nüchtern		1,08	0,36
Atarost G. m. b. H. Rostock	25	Distex flüssig für Rinder, Schafe, Ziegen.	Kombinationsprodukt aus Filixstoffen u. halo- gen. Kohlenwasserstoff	Je nach Gewicht		3	1	Als Einguß		4,50	0,15
	26	Distex in Tabletten für Rinder.	Kombinationsprodukt aus Acid. filicis, Car- bon. trichlor., Extr. Kamala, Acid. arsenic.	Je nach Gewicht		4	3	Morgens nüchtern		8,—	—

dafür zum Teil unverhältnismäßig hohe Preise gefordert werden.

Alles Nähere läßt sich aus der Liste entnehmen, die mein Mitarbeiter Herr Obertierarzt Dr. Spiegl in dankenswerter Weise zusammengestellt hat.

Betrachten wir die darin aufgeführten Präparate in Bezug auf ihre Wirksamkeit und Verträglichkeit, so läßt sich nach Nöller*) folgendes sagen:

Tetrachlorkohlenstoff ist zwar schon in kleinster Dosis bei Rindern und Schafen wirksam, zugleich am billigsten, aber nicht ohne Gefahr für die zu behandelnden Tiere.

Die Gefahren sind für Rinder so groß, daß die Anwendung von Tetrachlorkohlenstoff nach den jetzigen Erfahrungen für die Zukunft ausscheidet.

Bei Schafen pflegen sich Vergiftungen in der Regel bei fetten oder gut genährten Tieren zu ereignen, eine Erscheinung, die auf die Lipoidlöslichkeit des Präparates zurückzuführen ist.

Bengen & Co. haben bei ihrem aus Tetrachlorkohlenstoff bestehenden Leberegelmittel für Schafe darauf Rücksicht genommen und geben dasselbe in Paraffinum liquidum heraus, um die Resorption zu verlangsamen.

Die hexachloraethan-haltigen Mittel sind bis jetzt nur bei Rindern zur Anwendung gekommen.

Das Hexachloraethan ist milder als die anderen Chlorkohlenstoffe, weniger wirksam als Tetrachlorkohlenstoff und reine Filixprodukte und muß daher in verhältnismäßig hohen Dosen bzw. wiederholt verabfolgt werden.

Nöller, Flietner und Schmid haben das Hexachloraethan in Kapseln bei der Leberegelfeuche des Rindes nachgeprüft und kommen zu dem Schluß, daß die Wirkung, wenn auf je 1 Ztr. Lebendgewicht zwei Kapseln à 10 Gramm Inhalt verabreicht wurden und die Gesamtdosis auf vier Tage verteilt wurde, voll den Anforderungen genügt, die man an ein gutes, billiges Mittel stellen kann.

Auch die im Anfangstadium der Trächtigkeit stehenden, sowie Milchkühe, haben das Mittel gut vertragen.

Vergiftungen sind trotz des Umfangs der Versuche nicht bekannt geworden, desgleichen keine Schädigungen von Saugkälbern oder Menschen durch die Milch behandelter Kühe.

Diejenigen Mittel, welche das Hexachloraethan in Pulverform enthalten, dürften nach heutiger Erkenntnis die weitestgehende Ungefährlichkeit im Vergleich zu anderen Mitteln zeigen.

Der Preis ist bei dem chemisch reinen Hexachloraethan in Kapseln verhältnismäßig gering, bei dem kombinierten Distol wesentlich höher.

Die Wirksamkeit der gereinigten Filixpräparate bei Schafen und Rindern ist durchaus zufriedenstellend.

Nöller hat bei seinen zahlreichen Prüfungsversuchen, denen eine Reihe von Rinderferien, die sämtlich zur Schlachtung kamen, zugrunde liegt, in keinem einzigen Falle einen Verfälscher gehabt.

Bei der Mehrzahl der behandelten Tiere wurde vollständige Leberegelfreiheit nach der Schlachtung festgestellt.

Bei Schafen ist die Wirkung eine nahezu mathematisch sichere.

Bei schweren fetten Tieren, insbesondere bei Milchschaafen, bei denen die Tetrachlorkohlenstoffmittel wegen der Gefahr der Vergiftung nicht angewendet werden können, dürften die Filixpräparate trotz ihres Preises heute noch nicht zu ersetzen sein.

Im Gegensatz zu dem Tetrachlorkohlenstoff treten bei den Filixpräparaten die Schädigungen mehr bei geschwächten und herabgekommenen Tieren ein.

Diese Fälle sind aber so selten, daß sie praktisch keine Rolle spielen.

Für die Praxis können m. E. nur diejenigen Mittel in

Betracht kommen, die auf ihre Wirksamkeit geprüft sind und die sich dabei als weitgehend unschädlich erwiesen haben.

Unter diesen Gesichtspunkten kommen für leberegelkranke Rinder in erster Linie die in Kapseln abgegebenen Filicinprodukte „Distol alt“ und „Distol kombiniert“ in Frage (viermalige Behandlung, Preis 13,20 bzw. 11,60 Mk.) sowie Filinol (dreimalige Behandlung, Preis 13,65 Mk.). Weiterhin die Chlorkohlenstoffpräparate Distomal R (dreimalige Behandlung als Einguß, Preis 7,80 Mk.), ferner das Egelin in Kapseln und als Einguß (fünfmalige Behandlung, Preis 8,— bzw. 5,15 Mk.), sodann Bengen's Hexachloraethan-Präparate kombiniert, in Kapseln und in flüssiger Form (drei- bis viermalige Behandlung, Preis 6,— bzw. 4,80 bzw. 5,— bis 6,— Mk.).

Da für die Massenbehandlung aber der Preis eine wirtschaftlich sehr wichtige Rolle spielt, hat in dieser Beziehung das Dr. Kretzschmar'sche Hexachloraethan in Kapseln den oben genannten Mitteln gegenüber den Vorzug der größeren Billigkeit, denn es kostet bei viermaliger Behandlung nur 3,40 Mk. für ein 10 Ztr. schweres Rind.

Bei der Behandlung der Schafe hat sich Ecobol bewährt, das in Einheitsdosis in Kapseln nur einmal verabreicht zu werden braucht und 49 Pfg. für 1 Ztr. schweres Schaf (bzw. eine Ziege) kostet.

Zweitens ist Bengen's Leberegelmittel für Schafe hervorzuheben, das allerdings zwei- bis dreimal in Kapseln verabfolgt werden muß und 26 Pfg. kostet.

Am billigsten, dabei als wirksam und relativ unschädlich befunden ist Distomal S, das nur einmal als Einguß gegeben zu werden braucht und 21 Pfg. kostet.

Im allgemeinen läßt sich in Übereinstimmung mit Nöller und seinen Mitarbeitern sagen, daß als wirksames, relativ unschädliches, dabei aber besonders preiswertes Mittel zur Behandlung leberegelkranker Rinder das Hexachloraethan zu bezeichnen ist, während nach Ernst-Schleißheim für Schafe als wirksam, in der Anwendung einfach und billig die tetrachlorkohlenstoffhaltigen Mittel den Vorzug verdienen.

Bei letzteren ist allerdings die Einschränkung zu machen, daß sie bei mästigen und nicht auf der Weide befindlichen Tieren kontraindiziert sind und an ihre Stelle die teureren Filixpräparate treten müssen, gegen die jedoch in ihrem Gefundheitszustand herabgekommene Schafe empfindlich sind.

Literatur.

Bernard: Bericht über die Verbreitung und Bekämpfung der Leberegelfeuche in Ungarn im Zeitabschnitt Herbst 1926 bis Frühjahr 1927. Nr. 17/1928 der Münchener Tierärztl. Wochenschrift. — de Blicke und Baudet: Die Behandlung der Distomatose bei Schafen mittelst Distol. Nr. 17/1922 der D. T. W. — Eberl: Meine Erfahrungen mit Filinol-Buchner. Nr. 7/1927 der Münchener Tierärztl. Wochenschrift. — Ehrlich: Beobachtungen über den Verlauf, die Erscheinungen und die Bekämpfung der Leberegelfeuche des Rindes in der Provinz Hannover mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung mit dem Tetrachlorkohlenstoffmittel T 53 Merck. Nr. 49/1927 der D. T. W. — Ernst: Leberegelheilmittel. Nr. 38/1925 der Münchener Tierärztl. Wochenschrift. — Derselbe: Daselbe. Nr. 50/1925 ebenda. — Derselbe: „Egelin“ gegen Leberfäule der Schafe. Nr. 51/1926 ebenda. — Derselbe: Filinol gegen Leberegelfeuche der Rinder. Nr. 4/1927 ebenda. — Derselbe: Leberegelmittel. Nr. 7/1927 ebenda. — Hilz und Scheuble: Versuche zur Behandlung der Leberegelfeuche bei Schafen und Rindern. I. Mitteilung. Nr. 31 und 32/1928 der Münchener Tierärztl. Wochenschrift. — Hupka: Hexachloraethan, Tetrachloraethylen und Tetrachlorkohlenstoff in der Behandlung der Leberegelfeuche. Nr. 11/1928 der Tierärztl. Rundschau. — Jodlbauer und Hilz: „Filinol“, ein neues Filixpräparat gegen Distomum hepaticum. Nr. 13/1926 der Münchener Tierärztl. Wochenschrift. — Kern: Die Bekämpfung des Leberegels durch den Wurmfarn. Bd. IX, Lief. 3, aus Heil- und Gewürzpflanzen. Verlag: Dr. Datterer & Cie., Freising-München. — Kirsten: Zur Therapie der Leberegelfeuche mit

*) Schriftliche Mitteilung vom 22. Juni 1928.

Neo-Serapis. Nr. 5/1927 der Münchener Tierärztl. Wochenschrift. — Kleemann: Über Heilmittel gegen Leberegel mit besonderer Berücksichtigung des „Filinols“. Nr. 4/1927 ebenda. — Klobouk: Hexachloraethan in der Leberegeltherapie. Zverol. rozpravy., Jahrgang 1, Nr. 19, S. 193—201. — Lang: Erfahrungen mit einzelnen Mitteln gegen die Leberegelfeuche in Bayern. Nr. 48/1927 der Münchener Tierärztl. Wochenschrift. — Lang und Steinert: Das Leberegelmittel „Ecobol“. Nr. 25/1928 ebenda. — Lentz: Ecobol, ein sicher wirkendes Heilmittel gegen die Leberegelfeuche der Schafe. Nr. 23/1927 der Tierärztl. Rundschau. — Machts: Die Leberegelfeuche beim Rinde und ihre Behandlung mit Neo-Serapis. Heft 8/1928 der Wiener Tierärztl. Monatschrift. — Marek: Neuere Beiträge zur Kenntnis der Leberegelkrankheit mit besonderer Berücksichtigung der Infektionsweise, der Entwicklung der Distomen und der Therapie. Nr. 32/1927 der D. T. W. — Derfelbe: Die Bedeutung der Filixstoffe in der Therapie der Leberegelkrankheit. Nr. 53/1927 ebenda. — Münich: Praktische Erfahrungen mit der Leberegelbekämpfung in Bayern. Nr. 33/1927 der Berliner Tierärztl. Wochenschrift. — Nöller und Schmid: Versuche über die Wirksamkeit von Leberegelmitteln. Nr. 50/1926 der Münchener Tierärztl. Wochenschrift. — Nöller, Flietner und Schmid: Über die Wirkung und Verträglichkeit des Hexachloraethans in Kapfeln bei der Leberegelfeuche des Rindes. Nr. 12/1928 der Tierärztl. Rundschau. — Norris: Toxische Wirkung

von Tetrachlorkohlenstoff bei Schaf und Rind. Nr. 4/1928 ebenda. — Oppermann: Lehrbuch der Krankheiten des Schafes. Verlag: M. & H. Schaper, Hannover. 1919. — Payer: Die Bekämpfung der Leberegelkrankheit. Nr. 8/1927 der Deutschösterreichischen tierärztlichen Wochenschrift. — Pfeuffer: Erfahrungen mit Distomal „R“ in der Praxis. Nr. 24/1928 der Münchener Tierärztl. Wochenschrift. — Reisinger: Untersuchungen über die Wirkung des Distols Marek bei der Leberegelkrankheit. Wiener Tierärztl. Monatschrift, Jahrg. V. — Sommer: Meine Erfahrungen mit Distol. Nr. 1/1928 der Berliner Tierärztl. Wochenschrift. — Sonderkamp: Die Behandlung der Distomatosis der Schafe mit „Ecobol“, einem neuen Spezifikum gegen die Leberegelfeuche. Nr. 27/1927 der D. T. W. — Spiegl: Einiges Wissenswertes über den Leberegel und seine Bekämpfung. Heft 45/1925 der Landwirtschaftlichen Wochenschrift für die Provinz Sachsen. — Spieler: Rentabilität der Leberegelbekämpfung und Ergebnisse bei Behandlung mit Neo-Serapis und mit Hepol. Nr. 13/1928 der Tierärztl. Rundschau. — Vet.-pol. Anstalt Oberschleißheim: Leberegelheilmittel. (Distol, NS, Sb, Kupferlecksalz.) Nr. 34/1925 der Münchener Tierärztl. Wochenschrift. — Vollrath: Versuche mit dem Leberegelmittel „Egelin“ der Firma Bass & Keller in Langenargen (Württbg.). Nr. 31/1927 der D. T. W. — Weiss: Die Leberegelkrankheit der Schafe, ihre Entstehung und Bekämpfung nach neueren Gesichtspunkten. Heft 14/1921 der Zeitschrift für Schafzucht.

Über die im Tierseucheninstitut zu Hannover angestellten Versuche zur Lösung der Frage, ob tragende Tiere mit lebenden Abortus-Bang-Kulturen geimpft werden dürfen.*)

(Mit 3 Kurven.)

Von Dr. Karsten, Hannover.

Auf der 3. Jahrestagung der Fachtierärzte zur Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten in München im September 1925 wies ich in meinem Referate „Maßnahmen zur Einschränkung des feuchtenhaften Verkaltens“ auf die evtl. Bedeutung einer Nachimpfung mit lebenden Abortuskulturen bei den tragenden Tieren hin, welche bereits im günstigen Zustande einer solchen Impfung unterzogen sind. Ich führte wörtlich aus: „Sehr viel würde gewonnen sein, wenn man die wieder tragend gewordenen Tiere noch einmal mit lebender Kultur nachimpfen könnte, ohne befürchten zu müssen, einen artifiziellen (künstlichen) Abort herbeizuführen. Diese Gefahr ist nach unsern Erfahrungen im allgemeinen gering, doch wird man nicht eher die Impfungen und Nachimpfungen tragender Tiere mit lebenden Erregern der Seuche allgemein empfehlen können, bis über die Ungefährlichkeit solcher Impfungen hinreichende und genaue Angaben vorliegen. Vorläufig raten wir jedenfalls den Kollegen ab, Tiere, deren Blutuntersuchung gegen eine bereits erfolgte Abortusinfektion spricht und welche länger als 8 Wochen tragend sind, mit lebender Kultur zu impfen.“ In der sich an mein Referat anschließenden Aussprache führte Zeh aus: „Dagegen ist bis heute keinerlei Beweis für die Möglichkeit erbracht, durch die subkutane Anwendung der Kulturen bei Rindern Abortus hervorzurufen. Gelingt es schon Bang, bei der optimalen intravenösen Injektion kaum einen Abort zu erzielen, so ist die Möglichkeit hierzu bei subkutaner Applikation, bei der die Erreger den tryptischen Säften des Körpers unterliegen, noch wesentlich geringer. Von unserem Institut wird längst die Verwendung von Kulturen auch über den dritten Trächtigkeitsmonat hinaus ohne Schaden empfohlen, und ich glaube, daß der strikte Beweis einer Infektiosität der Impfkultur nur schwer zu erbringen sein dürfte.“

Die hier auf der Münchener Tagung hervorgetretenen stark voneinander abweichenden Ansichten über die Zulässigkeit, tragende Rinder mit lebender Kultur zu impfen

oder nachzuimpfen, findet man auch sonst in der Literatur wieder. Einigkeit in der Auffassung besteht heute im großen und ganzen nur darüber, daß die Verimpfung lebender Abortuskulturen an nichttragende Kühe in verfeuchten Beständen unschädlich und die erfolgversprechendste Impfmethode ist. Viele Sachverständige stimmen auch darüber überein, daß man in frisch verfeuchten Beständen tragende Tiere, die auf Grund der Blutuntersuchung als infiziert zu betrachten sind, mit lebender Kultur impfen darf. Die Gründe, welche dafür sprechen, in verfeuchten Beständen tragende Kühe und Rinder mit positiven Blutwerten mit lebender Kultur zu impfen, sind von Zwick (D. T. W. 1924, S. 674/75) des näheren dargelegt worden, worauf hier verwiesen sei.

Die außerordentlich wichtige Frage, ob in verfeuchten Beständen die tragenden Tiere mit negativer serologischer Reaktion, also Tiere, bei denen eine Abortusinfektion noch nicht nachgewiesen ist, mit lebender Kultur geimpft werden dürfen, ist noch strittig, und bei den Sachverständigen, welche diese Impfungen an sich für unschädlich und erfolgreich halten, gehen die Ansichten, bis zu welchem Trächtigkeitstermine sie vorgenommen werden dürfen, weit auseinander. Aus einer von Köster im Februar d. Js. veröffentlichten Zusammenstellung ergibt sich, daß die Bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammern durchweg die Impfungen mit lebender Kultur nur bis zum dritten Trächtigkeitsmonat für empfehlenswert halten. Nach den Ausführungen von Lentz auf der 4. Tagung der Fachtierärzte für die Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten in Jena wurden vom Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg die Impfungen bzw. Nachimpfungen im 4. bis 7. Trächtigkeitsmonate befindlicher Tiere mit lebender Abortuskultur in 200 Beständen an fast 13000 Tieren ausgeführt. Aus den Versuchen zieht zwar Lentz die Folgerung: „Nach unseren Beobachtungen scheinen die Bedenken vieler Kreise vor der Verimpfung lebender Abortuskulturen bei trächtigen Tieren unbegründet, zum mindesten aber zu groß zu sein“, gibt aber zu, daß „einzelne Klagen über angebliches Verfallen der Impfungen selbstverständlich nicht ausgeblieben“

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 11. Juli 1928 in Breslau.

sind. K r a g e ist der Auffassung, „daß Rinder selbst bis zum vierten Monat ihrer Trächtigkeit die Kulturimpfung ohne jede Schädigung vertragen und daß auch die Ausscheidung der Bakterien mit der Milch bei bisher nicht infizierten Tieren eine untergeordnete Rolle spielt.“ Dagegen hält er „die Ungefährlichkeit der lebenden Kulturen für Rinder in den späteren Trächtigkeitsmonaten auch heute noch nicht mit Sicherheit erwiesen.“ K ö s t e r kommt auf Grund seiner Erfahrungen in der Praxis zu dem Schlusse: „Die Impfung trächtiger Rinder und Kühe bis zum vierten Monate einschließlich der Trächtigkeit muß als ungefährlich bezeichnet werden, daselbe läßt sich auch noch für den fünften Monat annehmen. Eine erhöhte Zahl von Abortusfällen bei trächtigen Kühen nach der Impfung mit lebender Kultur ist deshalb als Ausdruck einer entweder mangelhaft erzielten Immunität oder einer schon stattgehabten Infektion des betr. Tieres mit Lokalisation der Erreger in der Gebärmutter aufzufassen und geht deshalb nicht zu Lasten des Impftierarztes.“ K ö s t e r empfiehlt zur Verlängerung und Vertiefung der Immunität die Tiere, welche im günstigen Zustande bereits zweimal im Abstände von 14 Tagen mit lebender Kultur geimpft wurden, einer dritten Impfung mit lebenden Abortusbazillen im vierten bzw. fünften Trächtigkeitsmonate zu unterziehen.

Im Gegensatz hierzu kommt E b e r auf Grund seiner Erfahrungen zu dem Schlusse: „Bei bereits 2 Monate und darüber trächtigen Rindern ruft die Einspritzung lebender Abortusbazillen leicht eine künstliche Fehlgeburt hervor. Doch hat es sich bei unseren Versuchen im allgemeinen als ungefährlich erwiesen, wenn Rinder, die bereits ein- oder zweimal vor dem Deckakte mit lebenden Abortusbazillen immunisiert sind, noch einmal nach dem Deckakte, vorausgesetzt, daß nicht mehr als vier bis höchstens sechs Wochen nach Beginn der Trächtigkeit vergangen sind, mit lebender Kultur gespritzt werden.“

Es erübrigt sich hier weitere auf Grund praktischer Erfahrungen gewonnene Auffassungen über die Frage, ob und bis zu welchem Trächtigkeitstermine es ungefährlich und zweckmäßig erscheint, tragende Tiere mit lebender Kultur zu impfen, wiederzugeben. M. E. wird sich die Frage auf Grund von Erfahrungen bei Impfungen in Beständen, in denen das feuchenhafte Verkalben herrscht, nicht entscheiden lassen. In verseuchten Beständen ist stets damit zu rechnen, daß tragende Tiere sich natürlich infizieren und infolgedessen verkalben und andererseits können in verseuchten Beständen tragende Tiere, ohne positive Blutwerte aufzuweisen, durch eine natürliche Infektion, die nicht zum Abort zu führen braucht, einen gewissen Grad von Immunität erworben haben. Da für Bestände, in denen das feuchenhafte Verkalben nicht herrscht, eine Impfung mit lebender Abortuskultur nicht anwendbar ist, bleibt nur der Weg des Versuchs über, um zu klären, ob durch subkutane Verimpfung lebender Abortuskultur bei tragenden Tieren künstlich ein Verwerfen hervorgerufen werden kann.

Bekannt ist, daß schon M c. F a d y e a n und S t o c k m a n bei drei von fünf tragenden Kühen durch subkutane Impfung mit Reinkulturen des Bang'schen Abortusbazillus und teils mit Material von natürlichen Abortusfällen Verkalben hervorrufen konnten. L e n t z hat einer „gesunden Kuh im fünften Trächtigkeitsmonate zweimal 50 ccm lebende Kulturen subkutan“ injiziert, ohne dadurch die Tragezeit unterbrechen zu können. Diese Kuh erhielt nach dem Abkalben ebenso wie eine zweite nicht trächtige Kuh in einem Zeitraum von 14 Tagen je 225 ccm lebender Kultur subkutan eingespritzt. Bei der sechs Tage nach der letzten Impfung vorgenommenen Schlachtung waren Abortusbazillen im Uterus nicht nachzuweisen. Hierbei muß natürlich berücksichtigt werden, daß es sich bei den letzten Versuchen um nichttragende Tiere gehandelt hat.

Eigene Versuche.

Die von uns angestellten Versuche, die mit Unterstützung des Landwirtschaftsministeriums ausgeführt wurden, bezweckten die Klärung der Frage, ob es mit den zu Impfpurposes benutzten lebenden Abortuskulturen bei subkutaner Applikation möglich ist, tragende Kühe so zu infizieren, daß sie verkalben oder bei der sich anschließenden Geburt die Abortusbazillen mit dem Fruchtwasser und der Nachgeburt ausscheiden und damit einer Seuchenausbreitung Vorhub leisten.

Bei diesen Versuchen war es außerordentlich wichtig, solche tragenden Rinder und Kühe zu erhalten, von denen mit Sicherheit eine bereits erfolgte natürliche Infektion mit den Erregern des feuchenhaften Verkalbens auszuschließen war. Unsere drei Versuchstiere stammten aus einem Bestande einer Heidegegend, in welcher das feuchenhafte Verkalben nach unseren Erfahrungen nicht herrschte, jedenfalls aber keine größere Ausbreitung gefunden haben konnte. Von sämtlichen Kühen und tragenden Stärken des Ursprungsbestandes wurden Blutproben entnommen und durch die Agglutinationsprobe und die Komplementbindungsreaktion auf das Freisein von Abortusantikörpern untersucht. Es wurden drei Tiere, welche der schwarzbunten Niederungsrasse angehörten, für die Versuche ausgewählt, die auf der Weide gedeckt waren und deren Trächtigkeitsgrad durch rektale Untersuchung von uns ermittelt wurde. Auch während der Versuchszeit wurde Vorforge getroffen, daß einer Infektion der Versuchstiere auf natürlichem Wege vorgebeugt wurde. Nach Einstellung der Versuchstiere im Institut wurde vor Anstellung der Versuche nochmals durch Blutuntersuchung das Fehlen spezifischer Antikörper festgestellt.

Sehr wichtig erschien uns ferner das Alter der für die Versuche verwendeten Abortuskulturen. Es braucht nicht besonders begründet zu werden, daß alte Laboratoriumsstämme, die vor Jahren aus abortierten Früchten gezüchtet wurden, für unsere Versuche keine Verwendung finden konnten. Unsere zu den Versuchen verwandten Kulturen waren aus vor kurzem eingefandten Früchten gezüchtet.

S t a m m I wurde aus dem Magen eines am 17. September 1927 eingefandten Kalbsfötus aus dem Kreise Melle gezüchtet. Der Stamm war somit bei der am 4. November 1927 erfolgten ersten Verimpfung an die Versuchstiere 7 Wochen alt.

S t a m m II wurde aus einem am 28. September 1927 eingefandten Kalbsfötus aus dem Kreise Melle gezüchtet, war also bei Anstellung des Versuches fünf Wochen alt.


S t a m m III wurde aus einem am 28. September 1927 eingeschickten Kalbsfötus aus dem Kreise Ulzen gewonnen, der also bei Versuchsbeginn fünf Wochen alt war.

S t a m m IV wurde aus einem am 28. September 1927 eingefandten Magen eines Kalbsfötus aus dem Kreise Jever gezüchtet, war somit bei Beginn des Versuches gleichfalls fünf Wochen alt.

Die vier Stämme waren auf 5prozentigem Glycerinagar isoliert, wiederholt umgezüchtet und wuchsen bei Beginn der Versuche zwar nur zart, doch so, daß die frisch angelegten Kulturen nach viertägiger Bebrütung einen hinreichend kräftigen Rasen bildeten, wie er für die Impfstoffherstellung im Institute Verwendung finden kann. Jeder der vier Stämme wurde mit 15 ccm physiologischer Kochsalzlösung abgeschwemmt, die Kulturabschwemmungen wurden im Erlenmeyerkolben gemischt. Von dem Kulturgemisch wurde jedem Versuchstiere am 4. November 1927 und 11. November 1927 je 15 ccm, also die Abschwemmung von einem Agarkulturröhrchen, eingespritzt. Vom 4. November 1927 ab wurden den Versuchstieren wöchentlich zweimal, also alle drei bis vier Tage, Blutproben entnommen und auf spezifische Antikörper untersucht. Alles Nähere hierüber geht aus den beigegebenen Tabellen hervor. Nach den

Impfungen traten bei keinem der drei Versuchstiere irgendwelche auffälligen Reaktionerscheinungen auf, nur die innere Körperwärme erfuhr eine vorübergehende Steigerung, die Milchmengen blieben unverändert.

Kuh I, etwa 6 Jahre alt, hat anscheinend bereits dreimal gekalbt und befindet sich bei Versuchsbeginn am 4. November 1927 nach der rektalen Untersuchung im 4. Monate der Trächtigkeit. Das Tier war während der ganzen Versuchszeit gesund. Am 16. Januar 1928 wurde bei dem Tiere eine Euteranschwellung und ein Rückgang in der Milch von 8 auf 5 Liter festgestellt, die breiten Beckenbänder fanken ein, jedoch wurde Scheidenausfluß nicht beobachtet. Am 17. Januar morgens 9 Uhr wurde ein etwa 6 Monate alter Kalbsfötus ausgestoßen. Die Fehlgeburt ging ziemlich schnell von statten, doch gelang es, Fruchtwasser im sterilen Glaszylinder aufzufangen. Die Eihäute blieben zum Teil sitzen, es entwickelte sich ein Uteruskatarrh, der mit Carbo medicinal. behandelt wurde und am 27. Januar als abgeheilt gelten konnte.



Kuh I.


An den Eihäuten fanden sich die für das feuchenhafte Verkalben kennzeichnenden Veränderungen. Sie waren teilweise durch Infiltration verdickt und mit Eiterflocken belegt, die Kotyledonen zeigten vielfach auf dunkelrotem Untergrunde eine schmutziggelbe bis gelb-braune Auflagerung von abgestorbenen Chorionzotten, sowie gelbliches Exsudat mit feinen Fibrinbelägen. An der Frucht fiel die fulzige Durchtränkung der Unterhaut und des Nabelstranges, sowie der zähleimige, schmutzigbraune Inhalt des Magens auf. In den Kotyledonen und im Mageninhalt der Frucht wurden die Abortusbazillen bereits im Ausstrichpräparat nachgewiesen. Es wurden außerdem nach der im Tierfeucheninstitute üblichen Leuchtgasmethode aus Kotyledonen, Fruchtwasser und Mageninhalt des Fötus Kulturen angelegt mit dem Ergebnis, daß nach Ablauf von 10 Tagen sich überall Abortuskolonien nachweisen ließen. Außerdem wurden am 18. Jan. 1928 4 Meerf Schweinchen subkutan mit Mageninhalt des Fötus geimpft. Während am 2. Februar 1928 die Blutproben der Meerf Schweinchen noch keine Abortusagglutinine enthielten, agglutinierten am 14. Februar 1928 alle Blutproben die Abortusbazillen bis zu einer Verdünnung von 1:160 mehr oder weniger stark. Durch den Meerf Schweinchenversuch ließen sich die Abortusbazillen auch im Fruchtwasser und den Kotyledonen nachweisen, dagegen nicht in der Milch des Tieres, obwohl diese auf sechs Versuchstiere verimpft wurde.

Kuh 2, die etwa 5 Jahre alt ist, hat anscheinend bereits zweimal


gekalbt und ist nach der rektalen Untersuchung etwa 4 Monate tragend. Das Tier war während der ganzen Versuchszeit gesund. Die nach den Impfungen am 4. November 1927 und 11. November 1927 entstandenen Agglutinationswerte des Blutes ergeben sich aus nebenstehender Tabelle. Am 3. April 1928 wurde ein Einfallen der Beckenbänder bemerkt, eine Euteranschwellung, sowie eine ödematöse Schwellung der Schamlippen. Am 4. April morgens 11 Uhr wurde in kurzer Zeit ein anscheinend ausgewachsenes Bullenkalb geboren, das jedoch nicht auf den Beinen zu stehen vermochte, Atemnot zeigte und 4 Stunden nach der Geburt einging. Die Nachgeburt löste sich innerhalb 6 Stunden nach dem partus, an den Eihäuten und insbesondere an den Kotyledonen wurden irgendwelche Veränderungen nicht nachgewiesen. Weder in den Kotyledonen der Nachgeburt noch in dem bei der Geburt aufgefangenen Fruchtwasser konnten mikroskopisch oder durch die Kultur Abortus-Bangbazillen festgestellt werden. Mit dem Fruchtwasser wurden am 5. April 3 Meerf Schweinchen geimpft, deren Blutserum am 15. April die

Erreger des feuchenhaften Verkalbens bis zur Verdünnung von 1:80 agglutinierten, am 25. April bis zu einer Verdünnung 1:160. Es wurden ferner am 5. April 1928 drei Meerf Schweinchen mit dem Mageninhalt des bald nach der Geburt verendeten Kalbes geimpft. Das Blutserum von zwei der Meerf Schweinchen agglutinierte am 25. April die Abortusbazillen bis zu einer Verdünnung von 1:160 sehr stark, bis zu 1:320 schwach, das Blutserum des dritten Meerf Schweinchens bis zu einer Verdünnung von 1:80 stark.

Rind I. Das 2½ Jahr alte Tier ist nach der rektalen Untersuchung am 4. November etwa 7 Monat tragend. Die nach den beiden Impfungen sich ausbildenden Agglutinationswerte zeigt nebenstehende Tabelle. Am 19. Dezember wurde ein gefundes, ausgetragenes Kalb geboren, das im Alter von 3 Wochen zum Schlachten verkauft wurde. Je eine 1 Tag nach der Geburt und am Tage vor dem Schlachten entnommene Blutprobe des Kalbes enthielten weder Agglutinine noch Komplement ablenkende Substanzen. In den Kotyledonen und im Fruchtwasser wurden mikroskopisch und kulturell die Erreger des feuchenhaften Verkalbens nicht nachgewiesen. Mit dem Fruchtwasser und mit Material der Kotyledonen wurden am 20. Dezember je fünf Meerf Schweinchen geimpft. Von den zehn geimpften Meerf Schweinchen verendeten neun zwei bis fünf Tage nach der Impfung, anscheinend infolge toxischer Wirkung des Impfmateri als. Das Blutserum des letzten mit Fruchtwasser geimpften Meerf Schweinchens agglutinierte



Kuh II.



Rind I.

die Erreger des feuchtenhaften Verkalbens am 29. Dezember 1927 bis zu einer Verdünnung von 1:80 mittelstark, am 10. Januar 1928 bis zu einer Verdünnung von 1:160 stark und von 1:320 schwach.

Aus unseren an drei tragenden unverseuchten Tieren angestellten Versuchen ergibt sich:

1. Eine im vierten Monate tragende Kuh wurde durch die zweimalige subkutane Verimpfung lebender Abortus-bangbakterien in der bei den üblichen Impfungen gebräuchlichen Dosierung so infiziert, daß sie 10 Wochen nach der ersten und 9 Wochen nach der zweiten Impfung in typischer Weise verkalbte.

2. Eine 4 Monate tragende in der gleichen Weise geimpfte Kuh brachte nach anscheinend vollem oder fast vollem Abschluß der Tragezeit ein lebensschwaches Kalb zur Welt, das nach 4 Stunden verendete und in dessen Mageninhalt sich die Abortus Bangbazillen durch den Meerschweinchenversuch nachweisen ließen. Im Fruchtwasser und in den makroskopisch unverändert erscheinenden Kotyledonen der Eihäute wurden die Abortus Bangbakterien gleichfalls durch den Meerschweinchenversuch festgestellt.

3. Eine 7½ Monate tragende, in der gleichen Weise geimpfte Störche brachte nach Abschluß der Tragezeit ein gesundes lebensfähiges Kalb zur Welt. An den Eihäuten einschließlich der Kotyledonen wurden irgendwelche Veränderungen nicht ermittelt. Durch den Meerschweinchenversuch wurde nachgewiesen, daß im Fruchtwasser die Abortus-Bangbazillen enthalten waren.

Komplementb.-Versuch, Kuh I.

Serum-Verdünnung 0,01.

4. 11. 27.	—	18. 2.	+++
11. 11.	+++	25. 2.	+++
18. 11.	+++	3. 3.	+++
25. 11.	+++	10. 3.	+++
2. 12.	+++	17. 3.	+++
8. 12.	+++	24. 3.	+++
16. 12.	+++	31. 3.	+++
22. 12.	+++	7. 4.	+++
29. 12.	+++	14. 4.	+++
7. 1. 28.	+++	21. 4.	+++
14. 1.	+++	28. 4.	+++
21. 1.	+++	5. 5.	+++
28. 1.	+++	12. 5.	+++
4. 2.	+++	19. 5.	+++
11. 2.	+++	26. 5.	+++

Schrifttum.

Eber: Weitere Erfahrungen und Beobachtungen über das feuchtenhafte Verkalben und seine Bekämpfung mit Hilfe virulenter Impfstoffe. Deutsche Tierärztl. Wschr. 1927. — K r a g e: Immunisierungsverfahren

Komplementb.-Versuch, Kuh II.

Serum-Verdünnung 0,01.

4. 11. 27.	—	18. 2.	—
11. 11.	+++	25. 2.	—
18. 11.	+++	3. 3.	—
25. 11.	+++	10. 3.	—
2. 12.	+++	17. 3.	—
9. 12.	+++	24. 3.	—
16. 12.	+++	31. 3.	—
22. 12.	++	7. 4.	++
29. 12.	++	14. 4.	+++
7. 1. 28.	+++	27. 4.	+++
14. 1.	+++	28. 4.	+++
21. 1.	+++	5. 5.	+++
28. 1.	+++	12. 5.	+++
4. 2.	+++	19. 5.	+++
11. 2.	+++	25. 5.	+++

Komplementb.-Versuch, Rind.

Serum-Verdünnung 0,01.

4. 11. 27.	—	25. 3.	+++
11. 11.	—	3. 3.	+++
18. 11.	++	10. 3.	+++
25. 11.	+++	17. 3.	+++
2. 12.	+++	24. 3.	+++
9. 12.	+++	31. 3.	+++
16. 12.	+++	7. 4.	+++
22. 12.	+++	14. 4.	+++
29. 12.	+++	21. 4.	+++
7. 1. 28.	+++	28. 4.	+++
14. 1.	+++	5. 5.	+++
21. 1.	+++	12. 5.	+++
28. 1.	+++	19. 5.	+++
4. 2.	+++	25. 5.	+++
11. 2.	+++		
18. 2.	+++		

gegen den infektiösen Abortus des Rindes. Tierärztl. Rundschau 1926. — Karsten: Maßnahmen zur Einschränkung des feuchtenhaften Verkalbens. D. T. W. 1925. — Köster: Bekämpfung des infektiösen Abortus des Rindes durch einmalige Verimpfung von lebenden Kulturen auch bei trächtigen Kühen. Tierärztl. Rundschau 1928, Nr. 7/8. — Lentz: Die Bekämpfung des feuchtenhaften Verkalbens unter besonderer Berücksichtigung der Impfmethode des Bakteriologischen Instituts der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg und für Berlin. D. T. W. 1928, Nr. 4. — Zwick: Impfungen gegen den infektiösen Abortus des Rindes. B. T. W. 1924. — Zeller: Weitere Untersuchungen über das feuchtenhafte Verkalben des Rindes. Archiv für prakt. Tierheilkunde 1922, Bd. 49. Hier weitere Literatur.

Standesangelegenheiten.

Niederchrift

über die Dienstversammlung der Leiter der Bakteriologischen Institute der preußischen Landwirtschaftskammern am 10. und 11. Juli 1928 in Breslau.
(Fortsetzung.)

B. Streptokokken-Mastitis.

6. Beitrag zur Streptokokken-Mastitis der Kühe. Dr. Pröscholdt. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 40, S. 674.)

Wiemann: Der Streptokokken-Mastitis ist in der letzten Zeit große Bedeutung beigelegt worden, so daß eine besondere Enquete-Kommission zur Ermittlung des Standes der Krankheit eingesetzt worden ist. Durch eine Umfrage bei den Tierärzten ist verlucht worden festzustellen, in welchem Umfange die Streptokokken-Mastitis vorkommt. Die Angaben sind recht verschieden, schwanken doch die Prozentzahlen zwischen 1 und 100. Es würde daher zweckmäßig sein, die Arbeiten über dieses Thema so schnell wie möglich zu veröffentlichen, damit die genannte Kommission die einwandfreien zahlenmäßigen Unterlagen verwerten kann. Besonders wichtig ist die Erforschung der Ursachen dieser Seuche. Es ist auffällig, daß die Streptokokken-Mastitis gerade in Tiefställen so wenig vorgekommen ist, während sie in Flachställen und bei Kühen mit großem, schwerem Euter eine häufige Erscheinung ist. Demnach scheint es so, als ob traumatische Einflüsse ein wesentliches Moment für die Entstehung der Krankheit sind.

Schumann: Bei den Verfeuchungen in Schlesien wurde eine Durchschnittserkrankungsziffer von ca. 35 Prozent festgestellt. Die Behandlungserfolge mittels stallspezifischer Vakzine für Heil- und Schutzimpfungen waren zufriedenstellend. In einer Reihe von Beständen konnte die Seuche in 4—6 Wochen vollständig geheilt werden, wenn die Bekämpfungsmaßnahmen genau nach dem von uns herausgegebenen Merkblatt erfolgten.

7. Über die Bekämpfung der Streptokokken-Mastitis und der Holsteinischen Euterseuche. Dr. Kiessig. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 40, S. 676.)

Die Bekämpfung erstreckt sich auf die Behandlung der erkrankten Tiere und auf die Schutzimpfung der noch gefundenen Tiere. Daneben sind hygienische Maßnahmen genau wie bei seuchenhaftem Verkälben strikte durchzuführen. Schlussfolgerung: Die durch Streptokokken hervorgerufene ansteckende Euterentzündung des Rindes hat sich im letzten Jahre erheblich ausgedehnt. In Schleswig-Holstein sind ca. 10 Prozent der Rinder von der Seuche befallen. Die Heilung hochgradig erkrankter Tiere ist nach den bisherigen Versuchen mit chemischen Mitteln nicht zu erreichen. Die Kontrolle der Behandlungsmaßnahmen ist nicht lediglich auf Grund des klinischen Befundes durchzuführen, sondern die mikroskopische Untersuchung muß hierbei in erster Linie berücksichtigt werden.

8. Weitere Entwicklung der amtlichen Milchkontrolle der Landwirtschaftskammer für die Provinz Schleswig-Holstein. Dr. Kiessig. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 40, S. 677.)

Pröscholdt: Das Tuberkulofetilungsverfahren ist das Sprungbrett für die Einführung einer freiwilligen Milchkontrolle. Die Kontrolle muß von einer Organisation aus erfolgen, die der Landwirt als unparteiisch ansieht. Mit scharfen Polizeiverordnungen ist nicht viel zu erreichen. In Pommern wird diese erweiterte Gesundheitskontrolle in Verbindung mit dem Tuberkulose-Tilgungsverfahren in zwei großen Molkerei-Genossenschaften mit 5000 bzw. 9000 Tieren durchgeführt. Die Gebühren sind, um die Bekämpfung der Streptokokken-Mastitis in diesen Molkereien zur Einführung zu bringen, auf das bescheidenste Maß beschränkt worden. Die klinische Untersuchung findet zweimal im Jahre statt. Beide Parteien, die Molkereien und das Gesundheitsamt der Pommerschen Landwirtschaftskammer als leitende Stelle, haben Wert darauf gelegt, daß eine Untersuchung durch einen Sachverständigen des Instituts und die zweite durch den ortsansässigen Tierarzt geschieht. Ein eingearbeiteter Sachverständiger kann natürlich auf dem Gebiet mehr leisten als jemand, der sich nur gelegentlich damit befaßt. Der Untersuchung unterliegen alle Kühe und die gedeckten Jungtiere. Die wegen Tuberkuloseverdachts entnommenen Milchproben werden gleichzeitig auf Streptokokken untersucht. Einzelmilchproben werden

außerdem von denjenigen Kühen entnommen, bei denen auf Grund der klinischen Untersuchung gelber Galt vermutet wird. Von den klinisch unverdächtigen Tieren werden Gruppenmilchproben entnommen und zwar von je 6—8 Kühen. Durch die Untersuchung dieser Gruppenproben sind noch viele klinisch unverdächtige Tiere herausgefunden worden. Die Gruppen- und Gesamtmilchproben werden dann weiterhin auf Tuberkel- und Abortus-Bang-Bazillen geprüft. — 1 Liter Milch wird durch die Untersuchung mit 0,2 Pfg. belastet. Das ist eine Belastung, die praktisch keine Rolle spielt, und in keinem Verhältnis zu den damit verbundenen großen Vorteilen steht. — Es wäre wertvoll, wenn diese Bestrebungen auf breitere Basis gestellt werden könnten, z. B. durch Hinweise der Hauptlandwirtschaftskammer an die landwirtschaftlichen Korporationen, auf diesem Gebiet etwas zu tun und sich der Einrichtungen zu bedienen, die die Landwirtschaftskammer geschaffen hat. Ebenso wünschenswert wären Anregungen seitens des Landwirtschaftsministeriums an die Molkereien, diese Gesundheitskontrollen im Zusammenhang mit dem Tuberkulofetilungsverfahren durchzuführen.

9. Im Anschluß hieran erstattet Dr. Rautmann das vom Programm des Vortages abgesetzte Referat über: **Amtliche oder freiwillige Bekämpfung der ansteckenden Euterentzündung der Kühe?** (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 40, S. 679.)

Zeller: Die Ergebnisse der in Ostfriesland durchgeführten Versuche sind niedergelegt in einer Arbeit, die demnächst erscheinen wird. Die Frage, ob eine Infektion durch den Zitzenkanal zustande kommt, ist noch nicht geklärt. Die Forschungen über die Holsteinische Euterseuche werden im kommenden Sommer wieder von seiten des Reichsgesundheitsamtes aufgenommen.

Wiemann: Man muß genau unterscheiden zwischen der Bekämpfung der Euterseuchen und der Marktkontrolle der Milch. Die Marktkontrolle geschieht im Interesse der Gesundheitspflege der Humanmedizin. Die Polizeiverordnungen verbieten aus Gesundheitsgründen Milch von Kühen in den Verkehr zu bringen, die mit Euterkrankheiten behaftet sind. Jeder Besitzer, der Milch von euterkranken Kühen in die Milchmilch gibt, macht sich strafbar. Die amtliche Milchkontrolle erstreckt sich auf alle schädlichen Substanzen. Euterkrankte Kühe müssen also von der Marktmilchgewinnung solange ausgeschaltet werden, bis sie gesund sind. Hier würde ohne weiteres als Tierarzt der Vertrauens-tierarzt der Landwirtschaftskammer zugezogen werden können, wenn keine gegenteiligen Bestimmungen bestehen. In Sachsen ist die Kontrolle dem beamteten Tierarzt übertragen. Wenn ein planmäßiges Verfahren zur Bekämpfung der Euterseuchen besteht, wäre der Vertrauens-tierarzt an die Stelle des beamteten Tierarztes zu setzen. Eine veterinärpolizeiliche Bekämpfung der Euterseuchen würde nur erfolgen zum Schutze der Tiere und zum Nutzen des Besitzers. Diese Voraussetzungen sind vorläufig nicht gegeben. Das Gebiet muß zunächst ebenso wie die Tuberkulose auf dem Boden eines freiwilligen Verfahrens bearbeitet werden. Wenn das Verfahren sich bewährt, kann es vielleicht auch staatlich anerkannt werden. Was uns bei der Bekämpfung der Euterseuchen fehlt, ist eine vollständige Aufklärung über die Ursache und über die Behandlung. Der Besitzer ist dann in der Lage, sich selbst zu helfen. Es wäre zu begrüßen, wenn ein Weg gefunden würde, auf dem es möglich ist, die Streptokokken-Mastitis und die übrigen Euterseuchen planmäßig und im Zusammenhang mit dem Tuberkulofetilungsverfahren zu bekämpfen.

Keiser: Es ist dringend erforderlich, daß von den leitenden Stellen für das Tuberkulofetilungsverfahren die Bekämpfung der Streptokokkenmastitis aufgenommen wird. Wenn die Institute die Streptokokkenmastitis als zweiten Teil der Tuberkulosebekämpfung ansehen, dann könnten wir sagen, daß eine freiwillige Bekämpfung der Seuche durch die Landwirte gewünscht wird.

Der Beschlusßantrag Dr. Rautmann's: „Zur planmäßigen Bekämpfung der ansteckenden, eitrigen Euterentzündung der Kühe und zu einer wirkungsvollen Verbesserung der Milch ist ähnlich wie bei der Tuberkulosebekämpfung ein freiwilliges Verfahren mit staatlicher Anerkennung und Unterstützung erforderlich, dessen Leitung unter Aufsicht des Landwirtschaftsministeriums durch die Bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammern erfolgt“ findet allgemeine Zustimmung und wird einstimmig angenommen.

C. Leberegelfeuche.

10. Welche Leberegelmittel sind wirksam, relativ ungefährlich und besonders preiswert? Prof. Raebiger. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 41, S. 685.)

Der Referent schließt seine Ausführungen mit folgenden Worten:

Im allgemeinen läßt sich in Übereinstimmung mit Nöller und seinen Mitarbeitern sagen, daß als wirksames, relativ unschädliches, dabei aber besonders preiswertes Mittel zur Behandlung leberegelkranker Rinder das Hexachloraethan zu bezeichnen ist, während nach Ernst-Schleißheim für Schafe als wirksam, in der Anwendung einfach und billig die tetrachlorkohlenstoffhaltigen Mittel den Vorzug verdienen.

Bei letzteren ist allerdings die Einschränkung zu machen, daß sie bei mastigen und nicht auf der Weide befindlichen Tieren kontraindiziert sind und an ihre Stelle die teureren Filixpräparate treten müssen, gegen die jedoch in ihrem Gefundheitszustand herabgekommene Schafe empfindlich sind.

Karsten: Bei Buchner's „Filinol“ sind Vergiftungsfälle bei Rindern selten. Von 100 behandelten Tieren verendete nur eins. Daneben hat sich „Neo-Serapis“ als gutes Mittel bewährt. Unangenehme Zwischenfälle sind nicht mehr vorgekommen, seitdem die Umhüllung einwandfrei ist. Bei der Anwendung von Kretzschmar's Hexachloraethan-Kapseln ist ein Tier bereits 1 Stunde nach der Verabreichung verendet. Ganz ungefährlich ist kein Mittel. Für Schafe ist „Serapis“ empfehlenswert. Allerdings kommen zuweilen auch bei Schafen Vergiftungen vor. Bei eingehüllten Mitteln ist es für den Erfolg wesentlich, daß die Hüllen reforptionsfähig sind. Eine wiederholte Behandlung ist notwendig, besonders wenn eine starke Verkrustung der Gallengänge besteht. Weiterhin ist zu beachten, daß die Tiere sich neu anstecken können und deshalb nachbehandelt werden müssen. Leberegel wurden auch beobachtet bei Schweinen, bei jungen Kälbern von wenigen Wochen und beim Wilde.

Lührs: Der durch Leberegel verursachte Schaden wird in Oldenburg auf 8 Millionen Mark geschätzt. Im Laufe des Jahres wurden verschiedene Leberegelmittel ausprobiert. Vor Verabfolgung des Mittels wird eine Kotuntersuchung ausgeführt. Die Tiere, die Eier ausscheiden, werden der Behandlung unterworfen. Sechs Wochen nach der Behandlung wird nochmals eine Kotuntersuchung vorgenommen, um den Erfolg zu prüfen. Bei „Filinol“ wiesen nach der Behandlung noch 63,5 Prozent der Proben Leberegeleier auf. Am günstigsten verlief der Versuch mit Distol. Nach der Behandlung wurden nur noch in 0,7 Prozent der Proben Leberegeleier nachgewiesen. Kein Mittel wirkt bei einmaliger Anwendung. Wenn die Tiere auf der Weide behandelt werden, so ist mit einer Neuverfeuchung der Weide zu rechnen. Deshalb ist besonderes Gewicht auf die Entfeuchung der Weide zu legen. Dahingehende Versuche sind in diesem Jahre angestellt worden. Ein Teil der Weiden wurde mit sehr hohen Dosen Thomasmehl und Kupferfulfat gedüngt. Über das Ergebnis dieser Versuche läßt sich ein endgültiges Urteil noch nicht abgeben. Verluste treten verhältnismäßig oft bei Fettchafen auf. Bei der Schlachtung dieser Tiere wurden niemals Leberegel und Veränderungen an den Gallengängen ermittelt. Es muß als ein Nachteil bezeichnet werden, daß die Leberegelmittel bei Schafen nicht nach Gewicht, sondern in bestimmten Dosen gegeben werden. Hierdurch entstehen besonders bei kleinen Schafen (Heidschnucken) große Verluste.

Kiessig: „Serapis“ wurde im vergangenen Jahre bei 3000 Schafen angewandt. Es traten nur zwei Todesfälle auf. In diesem Jahre wurden allerdings schlechte Erfahrungen damit gemacht. Von 45 behandelten Mutterschafen sind innerhalb 24 Stunden 9 eingegangen. Kurze Zeit danach sind in einer mäßig erkrankten Herde mit mäßig genährten Tieren unmittelbar nach der Behandlung 7 Tiere eingegangen. Diese Zahlen geben zu denken. Da andererseits wieder gute Erfolge damit erzielt worden sind, so scheint das „Serapis“ nicht gleichmäßig zu wirken. Es muß deshalb dringend abgeraten werden, es für Massenbehandlungen zu verwenden. Bei der Bekämpfung der Egelfeuche muß noch viel größerer Wert auf die Entwicklungsstadien des Leberegels, die Zerkarie, gelegt werden.

Schluß der Sitzung 20 Uhr. Fortsetzung am 11. Juli, 9 Uhr.

D. Seuchenhaftes Verkalben.

11. Über die im Tierseucheninstitut zu Hannover angestellten Ver-

fuche zur Lösung der Frage, ob tragende Tiere mit lebenden Abortus-Bang-Kulturen geimpft werden dürfen. Dr. Karsten. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 41, S. 688.)

Schumann: Eine Versuchskuh, die im 4. Monat mit lebenden Kulturen infiziert wurde, hat im 8. Monat der Trächtigkeit verworfen. Dabei konnte übrigens durch dauernde Temperaturnahmen festgestellt werden, daß markante Anzeichen für eine Frühgeburt: Lockerwerden eines Beckenbandes, Einsinken beider Beckenbänder, Schwellung der Schamlippen von Temperaturanstiegen begleitet waren. Durch den Ausgang des Versuches bei dieser Kuh wird die schon immer von mir vertretene Ansicht erhärtet, daß nämlich tragende Tiere nicht mit lebenden Abortuskulturen geimpft werden dürfen.

Krage: In Königsberg wurden ähnliche Versuche vorgenommen. Eine hochtragende Kuh im 7. Trächtigkeitsmonat wurde mit 20 ccm Abortuskulturen geimpft. Vier Wochen später trat die Frühgeburt ein. Das Kalb lebte und ist gesund geblieben. In der Milch wurden nach der Geburt Abortusbazillen nachgewiesen. Das Mutterblut hatte einen hohen Agglutinationstiter. Bei dem Kalb wurden, nachdem es getränkt war, ebenfalls hohe Blutwerte ermittelt. Daraus geht hervor, daß durch Verimpfen lebender Abortuskulturen im vorgeschrittenen Trächtigkeitsstadium Frühgeburten bzw. Aborte eintreten können. Die in der Literatur aufgestellte Behauptung, daß die subkutane Verimpfung lebender Kulturen völlig ungefährlich sei, ist nicht ganz richtig. Zwick und Liehr haben durch die im Reichsgesundheitsamt angestellten Versuche mit zwei allerdings nicht trächtigen Ziegen den Nachweis erbracht, daß sowohl subkutan als auch intravenös einverleibte Abortusbazillen bereits nach 24 Stunden mit der Milch ausgeschieden werden. In Ostpreußen sind mehreren Versuchsbullen Abortuskulturen auf dem Verdauungswege zugeführt worden. Bereits nach 24 Stunden wurden Bang-Bazillen mit dem Kot ausgeschieden. Die Ausscheidung hörte auf, als die Verfütterung der Kultur abgebrochen wurde. Diese beiden Beobachtungen sind für die Praxis insofern von Bedeutung, als die Seuche durch die Auktionsbullen verschleppt werden kann, die vorher mit Milch aus Abortusbeständen gefüttert worden sind. Allzugroß scheint die Gefahr indessen nicht zu sein, da die Ausscheidung der Bazillen mit dem Kot nur im unmittelbaren Anschluß an die Verfütterung derselben erfolgt und von der letzten Fütterung im Gehöft bis zur Auktion ein längerer Zeitraum liegt. Außerdem wird Milch an größere Bullen meistens nicht mehr gegeben.

Karsten: In diesem Jahre sind verschiedene Bullen, die noch nicht gedeckt hatten, per os infiziert worden. Es trat Schwellung der Hoden ein. Durch den nach der Schlachtung erhobenen anatomischen und bakteriologischen Befund konnte die stattgehabte Infektion bewiesen werden.

Schumann: Die Gefahr der Übertragung durch Bullen kann nicht erheblich sein. Wir haben jahrelang bei sämtlichen Breslauer Auktionsbullen die Blutuntersuchung durchgeführt und nur dreimal eine positive Reaktion feststellen können, obwohl die Bullen zum Teil aus infizierten Beständen stammten, also reichlich Gelegenheit hatten, Abortusbazillen mit der Milch aufzunehmen.

Pröscholdt: Wir konnten ebenfalls den Beweis erbringen, daß die Verimpfung von lebenden Kulturen im vorgeschrittenen Trächtigkeitsstadium Abortus hervorruft. Im allgemeinen wird wohl jetzt mit Abortuskulturen nur bis zum 3. Trächtigkeitsmonat geimpft. Auf Grund von Beobachtungen in der Praxis werden in Pommern Stärken prinzipiell nicht mehr mit Kultur geimpft, sobald sie aufgenommen haben. Es wäre zu begrüßen, wenn für die Versuche Tiere benutzt würden, die erst 1—2 Monate tragend sind, um zu sehen, ob durch die Kulturinfektion in diesem Trächtigkeitsstadium Verkalben hervorgerufen werden kann.

Eickmann empfiehlt bis zum 3. Monat die Impfung mit lebenden Kulturen, dann mit Extrakten.

Raebiger teilt die Tatsache mit, daß eine Reihe von Praktikern in der Provinz Sachsen lebende Kulturen für tragende Tiere anfordern, weil sie glauben, nur so eine Immunität erzielen zu können.

Lührs: Die Frage, ob die Impfung mit lebender Kultur zum Abortus führt oder nicht, hängt von der Herstellung des Impfstoffes ab. In einem Bestande, in dem Verkalbefälle vorgekommen sind, wurden sämtliche 14 Tiere bis zum 4. Monat mit lebender Kultur ge-

impft. 12 Tiere haben daraufhin verkalbt und 2 normal gekalbt. Das Verkalben ist im 3., 4., 5. und 7. Monat nach der Impfung eingetreten. Diese Verkalbefälle wurden auf die Impfung zurückgeführt. Wir stellen allerdings einen sehr starken Impfstoff von frisch herausgezüchteten, 6–8 Wochen alten Agarplattenkulturen her, weil die Erfahrungen mit Bouillonkulturen schlecht waren. Für die Bekämpfung der Seuche ist es außerordentlich wichtig, die Verhältnisse der Gegend zu berücksichtigen. Bei dauernder Stallhaltung sind die Erfolge günstiger, weil die hygienischen Maßnahmen sich besser durchführen lassen. In Weidegegenden sind gute Erfolge nicht zu beobachten, weil ein einziges Tier, das verkalbt, die ganze Weide verseuchen kann. Den Landwirten wird deshalb geraten, Tiere, bei denen Anzeichen des Verkalbens auftreten, in den Stall zu nehmen und dort zu belassen, bis vollkommene Abheilung eingetreten ist. Vor dem Austrieb werden zur Sicherheit Blutuntersuchungen vorgenommen und nach Möglichkeit eine Weidetrennung durchgeführt. Positiv reagierende Tiere kommen auf eine sogenannte Seuchenweide. Eventuell wird nach einiger Zeit eine zweite Blutuntersuchung und gegebenenfalls eine weitere Trennung vorgenommen. Über den Erfolg dieser Maßnahmen kann vorläufig noch nicht berichtet werden.

Keiser: Die Impfung ist für den Besitzer eine reine Finanzfrage. Es handelt sich für ihn darum, ob der Verlust, der nach der Impfung eintreten kann, größer ist als das Risiko, das er eingeht, wenn er nicht impft. Man sollte dem Besitzer beide Seiten beleuchten und es dann seiner Entscheidung überlassen, ob er impfen lassen will oder nicht.

Krage: In der Provinz Ostpreußen sind umfangreiche Versuche mit der Impfung gegen das seuchenhafte Verkalben angestellt worden. Die zweckmäßigste Impfmethode ist diejenige mit lebenden Kulturen für Kühe im nichtträchtigen Zustand. Die Kulturimpfung kann evtl. bis 6 Wochen nach dem Belegen vorgenommen werden, doch ist die dadurch erzielte Immunität nicht so groß wie bei einer Impfung vor dem Belegen. Vor dem Belegen immunisierte Tiere können bis zum vierten Trächtigkeitsmonat mit Kulturen nachgeimpft werden. Die Impfung trächtiger Tiere mit Vakzine ist im allgemeinen ohne nennenswerten Erfolg. Schon seit Jahren wird auf die große Gefahr hingewiesen, welche die Weiden für die Weiterverbreitung der Seuche bilden. Blutuntersuchungen zum Zwecke der Isolierung infizierter Tiere sind mit dem Erfolge durchgeführt worden, daß tatsächlich ein weiteres Umschlagen des Abortus verhindert werden konnte. Im Interesse der Abortusbekämpfung müßte die Weidehaltung für verseuchte Bestände verboten werden. Die Anordnungen werden von den Landwirten leider nicht immer durchgeführt, so daß am Ende der Weidezeit oder kurz nach dem Aufstallen regelmäßig ein Aufflammen des Abortus, besonders bei Stärken, zu bemerken ist. Die durch die Impfung erzielte Immunität ist nur relativ. Sie wird aufgehoben, sobald eine Neuinfektion eintritt. Ein großer Wert ist daher auf die Bekämpfung der Neuausbrüche zu legen. Schon bei dem ersten Fall ist die ganze Herde einer zweimaligen Blutuntersuchung zu unterziehen. Die infizierten Tiere sind abzufondern und unabhängig vom Trächtigkeitsstadium mit lebenden Kulturen zu impfen. Die übrigen Tiere können, falls hygienische Maßnahmen durchgeführt werden, ungeimpft bleiben. Anders ist es natürlich, wenn die Verseuchung bereits vorgeschritten ist. Dann muß eine Immunisierung des ganzen Bestandes stattfinden. Die durch die Blutuntersuchung als nicht-infiziert ermittelten Tiere sind erst nach dem Abkalben zu impfen. Wenn rechtzeitig vorgegangen wird, können gute Ergebnisse erzielt werden.

Wiemann: Für den Besitzer ist für die Entscheidung, ob die Impfung eingeleitet werden soll oder nicht, die wirtschaftliche Seite maßgebend. Darin ist Oberlandwirtschaftsrat Keiser zuzustimmen. Die von mehreren Instituten angestellten Versuche mit lebenden Abortuskulturen bei nicht infizierten trächtigen Rindern sind sehr wichtig. In der Praxis scheint es aber doch so zu liegen, daß nur in verseuchten Beständen geimpft wird, also Tiere, bei welchen schon eine mehr oder weniger große Immunität vorausgesetzt werden kann. Man kann deshalb wirtschaftliche Schlußfolgerungen erst ziehen, wenn das Experiment, das mit Tieren aus seuchenfreien Beständen angestellt worden ist, an Tieren aus Seuchenbeständen wiederholt wird.

Schumann: Von der allgemeinen Impfung tragender Tiere mit lebenden Abortuskulturen muß dringend abgeraten werden 1. wegen der notorisch festgestellten Fehlschläge und 2. weil wir damit neue Infektionsquellen schaffen würden. Wenn auch einige mit Kultur geimpfte

Tiere das Kalb 9 Monate austragen, so muß man doch mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß deren Eihaut infiziert ist, und daß das betr. Tier Abortuskeime post partum austreut. Es scheint auch so, als ob das vermehrte Kälbersterben in Abortusbeständen auf die Bang-Infektionen zurückzuführen ist. Bei der Durchsicht der Impflisten, die von den Tierärzten bzw. von den Gütern eingefordert wurden, konnte fast regelmäßig festgestellt werden, daß diejenigen Tiere trotz Impfung verkalbt haben, die im niedertragenden Zustande geimpft worden waren. Die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche durch den Weidegang besteht natürlich nur für Genossenschaftsweiden. Im allgemeinen ist die Weide nicht gefährlicher als der Stall. Wenn genügend Obacht gegeben wird, werden auch auf der Weide die Anzeichen der Frühgeburt rechtzeitig bemerkt, so daß die betreffenden Tiere aufgefaßt werden können. Das vermehrte Auftreten von Abortus bei Stärken kurz nach dem Aufstallen ist vor allen Dingen darauf zurückzuführen, daß die Kalben, die bei Beginn des Weideganges tragend wurden, zur Zeit der Aufstallung in den gefährlichen (5. bis 7.) Trächtigkeitsmonaten sich befinden.

Eickmann befreit, daß durch Verimpfung von lebenden Kulturen an trächtige Tiere neue Infektionsquellen geschaffen werden. Es sind Nachforschungen in den geimpften Beständen anzustellen, die Aufschluß darüber geben, ob mehr Tiere wegen der Kultur- oder trotz der Vakzineimpfung verkalbt haben.

Karsten: Es erscheint nicht ratsam, die von **Wiemann** vorgeschlagenen Versuche bei Kühen aus verseuchten Beständen anzustellen, dagegen müßte man versuchen, nichtinfizierte Tiere im günstigen Zustande zu impfen und im tragenden nachzuimpfen.

Keiser richtet an den Vertreter des Ministeriums die Frage, ob Beihilfen für derartige Versuche vermittelt werden könnten.

Wiemann kann diese in Aussicht stellen.

12. Ist es erforderlich, bei der Agglutinationsprüfung auf Abortus Bang Richtlinien aufzustellen? Dr. Schumann. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 42, S. 697.)

Pröscholdt: Die Abweichungen zwischen den einzelnen Instituten sind erfreulicherweise nicht sehr erheblich. Der Vorschlag, eine einheitliche Testflüssigkeit zu verwenden, ist indessen zu begrüßen. Wenigstens sollten die einzelnen Institute diese Standard-Testflüssigkeit zu vergleichenden Untersuchungen benutzen. Daneben können die Institute ihre eigenen bewährten Methoden beibehalten.

Lührs teilt mit, daß die mit Leitungswasser hergestellte Testflüssigkeit besser agglutiniert als die mit destilliertem Wasser. Es wird indessen nicht nötig sein, die gesamte benötigte Testflüssigkeit für alle Institute an einer Stelle herzustellen. Es dürfte genügen, einen Standardtest von Zeit zu Zeit von einer bestimmten Stelle zu beziehen und diesen zu vergleichenden Untersuchungen zu benutzen.

Lerche betont im Gegensatz zu **Lührs** die Zweckmäßigkeit, für Abortus einen einheitlichen Test zu verwenden, der in einem bestimmten Institut hergestellt werden muß, genau so wie dies beim Rotz vorgeschrieben ist. Der Preis spielt dabei keine so wesentliche Rolle, denn jedes Institut muß sich doch die Herstellung seines eigenen Bedarfs auch anrechnen.

Schumann erklärt sich auf eine Anfrage bereit, bis auf weiteres eine Standard-Testflüssigkeit mit Hannover zu Vergleichszwecken auszutauschen. Für den Beschlußantrag **Schumanns**: „Die Agglutination beim infektiösen Abortus der Rinder ist in allen Instituten nach ganz bestimmten Richtlinien anzusetzen unter Verwendung einer einheitlichen Testflüssigkeit“ ergibt sich durch Abstimmung eine Mehrheit. Der Zusatzantrag, daß das Breslauer Institut von Zeit zu Zeit einen Standardtest zur Verfügung stellt, wird ebenfalls angenommen.

(Schluß folgt.)

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Prof. Dr. phil. et med. vet. P. W. Dankwort, ordentl. Professor für Chemie und Direktor des chemischen Instituts der Tierärztlichen Hochschule, Dozent für Lebensmittelchemie und Toxikologie an der Technischen Hochschule Hannover, hat einen Ruf als ordentl. Professor für pharmazeutische Chemie an die Universität Marburg als Nachfolger des verstorbenen Geheimrats Prof. Dr. Gadamers erhalten.

Zum Dekan der Vet.-med. Fakultät der Universität Leipzig für das Studienjahr 1928/29 ist Prof. Dr. med. vet. et phil. Johannes Richter, Direktor des Instituts für Tierzucht und Geburtkunde, gewählt worden. Prof. Dr. Richter wird vom 1. November ab als Dekan amtieren.

Das Ministerium für Volksbildung in Dresden hat den Privatdozenten in der Vet.-med. Fakultät der Universität Leipzig, Dr. med. vet. Paul Cohrs, vom 1. Oktober 1928 ab zum planmäßigen außerordentlichen Professor der Veterinär-Histologie und -Embryologie in dieser Fakultät ernannt und ihn vom gleichen Zeitpunkt an zum Leiter der Histologisch-Embryologischen Abteilung des Veterinär-Anatomischen Instituts bestellt.

Prof. Dr. W. Schauder-Gießen.

Der zum Ordinarius für Anatomie nach Gießen berufene Professor Dr. Wilhelm Schauder ist am 2. November 1884 in Neisse geboren, besuchte die Realgymnasien zu Neisse und Dresden-A., wo er die Reifeprüfung ablegte. Nach Ableistung seines einjährigen Militärdienstes 1905 studierte er vom S.-S. 1906 ab Veterinärmedizin an der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin und erhielt dort 1910 die Approbation. Nach 3/4jährigem Arbeiten in Schlachthöfen und im Vet.-anatomischen Institut der Universität Gießen war er 1911/12 als Assistent bzw. Repetitor am Pathologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule in Berlin angestellt. 1912 ist er in Gießen promoviert worden und legte dort 1913 die Tierzuchtinspektorprüfung ab. Am Vet.-anatomischen Institut der Universität Gießen war Schauder als Assistent vom 1. April 1912 bis zum Beginn des Krieges tätig, an dem er als Veterinär bzw. Oberveterinär d. Res. vom Anfang an bis zum 30. November 1918 im Felde teilnahm. Danach trat er wieder als Assistent am Gießener Vet.-anatomischen Institut ein, habilitierte sich für Veterinäranatomie am 27. März 1920 mit einer Arbeit, betitelt: „Anatomische und metrische Untersuchungen über die Muskeln der Schultergliedmaße des Pferdes“. Schauder wurde am 1. April 1921 zum planmäßigen Prosektor, am 15. März 1923 zum außerplanmäßigen außerordentlichen Professor ernannt. Am 1. Mai 1926 folgte er einem Rufe als planmäßiger außerordentlicher Professor der Veterinär-Histologie und -Embryologie an die Universität Leipzig und wurde zum Leiter der Histologisch-Embryologischen Abteilung des dortigen Veterinär-Anatomischen Institutes ernannt.

Bisherige Veröffentlichungen von W. Schauder: Untersuchungen über die Eihäute und Embryotrophe des Pferdes (Diss.). — Beiträge zur Kenntnis der Embryotrophe der Stute und über die Genese der Hippomanes. — Über Gekröse und Bänder des Hodens vom Pferd, nach ontogenetischen Gesichtspunkten. — Über Urfachen des Ortswechsels der Hoden (Descensus test.) und des Kryptorchismus, unter bes. Berücksichtigung des Pferdes. — Das Lymphgefäßsystem des Pferdes (In: Martin, Lehrb. der Anatomie, II, 2). — Biographie von Prof. der Tiermedizin K. W. Vix. — Über den intraabdominalen Abchnitt der Vasa omphalo-mesenterica des Pferdes. — Über die „Lanzentische“ des Pferdes. — Makroskopische Darstellung des atrioventrikulären Verbindungsbündels im Herzen des Pferdes. — Über die dunkle Streifenzeichnung („Wildzeichnung“) beim Pferd. — Über die oberflächlichen Lymphgefäße der Widerrist-, Schulter-, Oberarmgegend und angrenzenden Brustgegenden des Pferdes nach klinischen Befunden. — Anatomische und metrische Untersuchungen über die Muskeln der Schultergliedmaße (Vorläufige Mitteilung). — Morphologie der embryonalen Ernährung bei den Hausherren. — Über Anatomie an den lebenden Haustieren. — Historisch-kritische Studie über die Bewegungslehre des Pferdes. — Anatomie der Impffäugetiere (Kaninchen, Meerfischweinen, Ratte, Maus), (In: Martin, Lehrbuch der Anatomie, IV). — Anatomie der Hausvögel. (Ebenda.) — Anatomische und metrische Untersuchungen über die Muskeln der Schultergliedmaße des Pferdes. (Hab.-Schrift.). — Die fetale Entwicklung der „Sehnenmuskeln“ des Pferdes. — Anatomische Bemerkungen über die geraden Bänder der Kniefleibe des Pferdes. — Bisher unbekannte Mißbildung der Arteria coronaria sinistra des Rindes. — Zahlreiche Mißbildungen des Verdauungsapparates, des Urogenital- und Skelettsystems bei einem neugeborenen Kalb. — Über Entwicklung und Rückbildung des Musculus pronator quadratus des Pferdes. — Über Anatomie, Histologie und Entwicklung der Embryonalanhänge des Tapirs.

Ministerialrat Dr. Karl Beiling †.

Am 3. Oktober kam aus Darmstadt die traurige Nachricht, daß Dr. Karl Beiling, Vortragender Rat für Veterinärmedizin im Hessischen Ministerium des Innern im 51. Jahre seines tatenreichen Lebens durch den Tod uns entrissen wurde. Uns hessischen Tierärzten ist mit ihm der Beste einer, ein Führer im wahrsten Sinne des Wortes genommen.



Nach seiner Approbation in Dresden, im Jahre 1898, war der Verbliebene in der Praxis, hierauf als Assistent am Tierfeucheninstitut in Leipzig und von 1902—1905 im Ministerium des Innern in Darmstadt als Hilfsarbeiter tätig. Hierauf bekleidete er die II. Beamtenstelle des Kreisveterinäramtes Mainz und wurde 1906 hier zum Kreisveterinärarzt ernannt. Während des Völkerringens tat Beiling Heeresdienst an der Kampffront.

Im Jahre 1919 ist er zum Vortragenden Rat ernannt und mit dem gesamten Referat für Fleischversorgung im Landesernährungsamt in Hessen betraut worden. Hervorzuheben ist, mit welchem Geschick er unter schwierigsten Umständen in dem vom Feindbund besetzten hessischen Gebiet die Fleischverorgungsstelle musterergültig regelte und den Viehhandelsverband als Vorsitzender (von 1916—1919) geleitet hat. In seiner Tätigkeit als Regierungskommissar bei der Kommission für Viehableieferung an den Feindbund hat Ministerialrat Dr. Beiling durch sein Organisationstalent, seinen praktischen Blick, seine umfassende Kenntnis der Gepflogenheiten des Handels und den Einsatz derselben zur rechten Zeit und an der rechten Stelle dem Hessischen Staat und dem Reich außerordentliche Werte an Zuchtmaterial und Geld gerettet.

Das ganze Referat für das Veterinärwesen Hessens hat er umgestaltet und musterergültig organisiert. In aufopfernder Pflichterfüllung war Beiling rastlos tätig; alle an ihn herantretenden Forderungen des Dienstes und selbstgestellte Aufgaben hat er mit seltener Begabung gemeistert. Dabei verlor er sich nie im Unmittelbaren. Sein restloser Drang nach vorwärts war stets mit zielsicherem Blick in die Zukunft verankert und fußte auf tiefgründigem, fachmännischen Wissen. Mit regem Interesse verfolgte er die Fortschritte der Wissenschaft, und mit kritischem Blick verstand er es, die Forschungsergebnisse richtig einzuschätzen und für die Praxis nutzbringend anzuwenden.

An seiner Bahre sind neben den vielen Verdiensten des Verbliebenen auch die um die vet.-medizinische Fakultät der Universität Gießen gewürdigt worden, der er treuliegender Freund und stets hilfsbereiter Gönner war. Eine Tat sei in dieser Hinsicht herausgegriffen. In den Tagen schwerster wirtschaftlicher Not fand Beiling Mittel und Wege zur Beschaffung eines Ordinariats und Instituts für Tierfeuchenforschung. Er betonte damals, daß damit Goldwerte in die Zukunft gerettet und durch die Forschungsergebnisse Ewigkeitswerte geschaffen würden.

Bei der Gründung des Landesvereins Hessischer Tierärzte, dem alle

Fachgruppen angehören, und bei der Schaffung der Tierärztekammer hat Beiling tatkräftig mitgewirkt. Dabei hat er seine Ziele um die Hebung des tierärztlichen Standes nach Möglichkeit gefördert und Reibungsflächen aus dem Wege geräumt. Er vertrat den Standpunkt, die Tierärzte im Staatsdienst sollten nicht Konkurrenten, sondern Berater der Praktiker sein.

Viele Probleme, die sich Beiling als Lebensaufgabe gesteckt hatte, konnte er durch seine allzufrühe Abberufung aus dem Diesseits leider nicht ihrer Lösung entgegenführen.

Wie gegen sich selbst, war Beiling auch gegen andere im Dienste streng, aber stets gerecht. Im Umgang stand er uns allen durch sein gewinnendes Wesen nahe. Wir hessischen Tierärzte waren ihm ohne Ausnahme von Herzen in aufrichtiger Verehrung zugetan und geloben ihm für alle Zeit ein treues Andenken.

Olt.

Paul Ehrhardt †.

Am 26. September verschied im 69. Lebensjahre der Vet.-Rat Paul Ehrhardt in Stendal, wo er den weitaus größten Teil seiner Berufstätigkeit zum Nutzen des Kreises verbracht hat. Seine Tüchtigkeit im Beruf wurde bis in die letzte Zeit weit über seinen eigentlichen Wirkungskreis hinaus geschätzt und in Anspruch genommen, seine Lebensklugheit und Hilfsbereitschaft haben ihn zum Berater und Helfer auch in mancherlei menschlichen Nöten seiner Klientel gemacht. Ein schweres Herzleiden hatte seine Schatten auf die letzten Lebensjahre geworfen, aber mit unerschütterlichem Mut, mit bewundernswerter Willensstärke ihm widerstehend, hat er sein Können verwertet, bis der Tod ihn in seine Arme nahm. Wir denken seiner in Freundschaft.

Die beamteten Tierärzte des Bezirks Magdeburg.

Verein beamteter Tierärzte Preußens.

Wir verweisen auf die im Anzeigenteil der Nr. 40 befindliche Tagesordnung der 26. Vollversammlung des Vereins beamteter Tierärzte Preußens im anatomischen Hörsaal der Tierärztlichen Hochschule Berlin am 20. Oktober 9½ Uhr.

Tierärztliche Hochschule in Budapest.

Für das Studienjahr 1928/29 sind immatrikuliert worden im ersten Jahrgange 104, im zweiten 72, im dritten 49 und im vierten Jahrgange 46 Studierende.

Pilzbefallene amerikanische Futtergerste.

Die Untersuchung der amerikanischen Futtergerste, die, wie bereits mitgeteilt,*) von Schweinen nicht oder nur ungern aufgenommen wird, führte bis jetzt zu folgenden Ergebnissen: Schweine nehmen das Gerstenschrot, durch Hunger gezwungen, auf, jedoch nur zögernd und nicht mehr als höchstens die Hälfte der sonst üblichen Menge. Erbrechen tritt nicht in allen Fällen auf; andere Krankheitserscheinungen sind bisher bei den Versuchen am Tierzuchtinstitut der Tierärztlichen Hochschule Berlin nicht beobachtet worden. Versuche, durch Auslaugen, Dämpfen, Kochen, die Gerste den Schweinen schmackhafter zu machen, haben zu keinem Ergebnis geführt. Auch durch Beigabe von Fischmehl und Verwendung des Schrots als Teilfutter ließ sich keine vermehrte Futteraufnahme erreichen. Gesundem Futter beigemischte kranke Spelzen verringern schon bei einer Beigabe von 1/6 der Gewichtsmenge des Gesamtfutters die Freßlust erheblich; dagegen nehmen die Tiere das von Spelzen freie Mehl anstandslos auf.

Zwei Pferde, vier Rinder, sechs Schafe sowie Laboratoriumstiere fraßen die Gerste in jeder Form, ohne Beeinträchtigung des Appetits und Störungen im Allgemeinbefinden zu zeigen.

Die Ursache für die verminderte Aufnahme der Gerste scheint in dem auf den Körnern zu findenden Pilzbefall zu liegen. Eine nähere Betrachtung der ganzen Gerste zeigt bei vielen Körnern eine bräunliche bis rötliche Verfärbung der Basis des Korns. Bei der mikroskopischen Untersuchung dieser verfärbten Stellen findet man Hyphen und vereinzelte Sporen von *Fusarium roseum*, eines Pilzes, dessen Entwicklungsform als *Giberella Saubinetii* auftritt. Die Daueriporen sind 40 µ große, leicht gebogene segmentierte Gebilde. Das Auffinden der Pilzhypen und -sporen im Gerstenschrot bietet Schwierigkeiten. Es empfiehlt sich daher, in Verdachtsfällen etwa 250 Gramm einer Schrotprobe oder besser noch ganzer Körner den landwirtschaftlichen Untersuchungs-

stellen oder anderen eigens dazu errichteten Untersuchungsstellen zu überfenden.

Stang.

23. Fortbildungskursus des Deutschen Veterinärrats in Stettin

am 27. und 28. Oktober 1928.

Sonnabend, den 27. Oktober, 9 Uhr: Prof. Dr. Goetze-Hannover: „Sporadische und infektiöse Euterkrankheiten“. Anschließend Filmaufnahmen aus Bujatrik und Geburtshilfe. 10½ Uhr: Schlachthofdirektor Dr. Heine-Duisburg: „Milchkunde und Milchkontrolle“ (mit Lichtbildern). 12 Uhr: Vet.-Rat Dr. Baars-Stettin: „Paratyphus-Typendifferenzierung in Bezug auf ihre praktische Bedeutung“. 15 Uhr: Prof. Dr. Mießner-Hannover: „Geflügelkrankheiten“ (mit Demonstrationen).

Sonntag, den 28. Oktober, 10 Uhr: Prof. Dr. Nöller-Berlin: „Parasitäre Erkrankungen“. 11½ Uhr: Prof. Dr. Max Müller-München: „Pathologie und Bakteriologie in der Fleischbeschau und die Verantwortungsfrage bei Fleischvergiftungen“. Anschließend Vorführung der elektrischen Betäubung von Schlachttieren; Prof. Dr. Goetze-Hannover: Demonstrationen aus der Geburtshilfe; Besprechung sämtlicher Vorträge.

Die Vorträge finden am Sonnabend im großen Polytechnischen Saal des Konzerthauses, Augustastraße 48, die Vorträge und Demonstrationen am Sonntag, den 28., auf dem Schlachthofe statt. Die Teilnehmergebühr beträgt für beide Tage 10,— Mk.

24. Fortbildungskursus des Deutschen Veterinärrats in Frankfurt a. M.

am 27. und 28. Oktober 1928.

Sonnabend, den 27. Oktober, 10 Uhr: Dr. Albrecht-Frankfurt a. M.: „Chemotherapie“. 11 Uhr: Geheimrat Prof. Dr. v. Osterreich-Stuttgart: „Milchkontrolle“. 14 Uhr: Geh. Medizinalrat Professor Dr. Pfeiffer-Gießen: „Neuzeitliche Chirurgie“ (mit Demonstrationen). Anschließend: Prof. Dr. Stoss-München: „Euterkrankheiten sowie neues aus dem Gebiet der Geburtshilfe und der Trächtigkeitsdiagnose“ (mit Demonstrationen).

Sonntag, den 28. Oktober, 10 Uhr: Dr. Neven-Frankfurt a. M.: „Hufbeschlag unter Berücksichtigung von Hufkrankheiten“. 11 Uhr: Dr. Seifried-Gießen: „Geflügelkrankheiten“. Anschließend: Besprechung sämtlicher Vorträge.

Mit dem Kursus ist ein Besuch der I. G.-Farbwerke in Hoechst am Main verbunden. Die Abhaltung der Vorträge wird ebendort stattfinden, die Demonstrationen am Sonnabend nachmittag im Schlachthof-Frankfurt a. Main. Die Teilnehmergebühr beträgt für beide Tage 10,— Mk. Die örtliche Organisation hat Herr Dr. Schaaf-Hochheim übernommen, an den erforderlichenfalls Anfragen zu richten sind.

Stang.

Personal-Nachrichten.

Tierärztliche Hochschule Hannover. Ausgeschieden: Assistent am Patholog.-anatom. Institut, Tierarzt Dr. med. vet. Günther Biermann; Assistent am Hygien. Institut, Tierarzt Dr. Wilhelm Gippmann; Oberassistent am Chem. Institut, Dr. phil. Gerhard Siebler; wissenschaftl. Hilfsarbeiter am physikal. Institut Dipl.-Ing. Hans Gußmann. Ernannt: Tierarzt Dr. med. vet. Theodor Hahn zum Oberassistenten an der Chirurg. Klinik; Dr.-Ing. Johannes Böhnekamp zum Oberassistenten am Chem. Institut; wissenschaftl. Hilfsarbeiter Dr. med. vet. Hans Eilmann zum Assistenten am Patholog.-anatom. Institut; Tierarzt Dr. Wilhelm Grube aus Westhofen zum Assistenten an der Chirurg. Klinik; Apotheker und Chemiker Dr. phil. Walter Bredenbeck aus Göttingen zum Assistenten am Chem. Institut; Tierarzt Dr. med. vet. Karl Koebe aus Liegnitz zum Assistenten am Hygien. Institut; Tierarzt Dr. med. vet. Ottomar Gaus aus Bretten zum wissenschaftl. Hilfsarbeiter am Patholog.-anatom. Institut; Dipl.-Ingenieur Waldemar Zettel zum wissenschaftl. Hilfsarbeiter am physikalischen Institut.

Verstorben: Ministerialrat Dr. Karl Beiling, Vortragender Rat im Hessischen Ministerium des Innern in Darmstadt; Vet.-Rat Paul Ehrhardt in Stendal.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 39, S. 662.

Veterinärhistorische Mitteilungen

Herausgegeben von der

Gesellschaft für Geschichte und Literatur der Veterinärmedizin

Schriftleiter:

Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

zwanglos erscheinende Beilage zur „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“
Verlag von M. & H. Schaper in Hannover
Sonderbezugspreis 1,50 Goldmark das Jahr, freibleibend.

Nr. 10.

1928.

8. Jahrgang.

Die Wiener Veterinärfschule um 1812.

Von Dr. Wilhelm Rieck.

In einem Bericht, den Dr. Sydow, Königl. Preuß. Oberstabsarzt und Professor der Berliner Tierarztschule, im Jahre 1812 unmittelbar nach seinem Aufenthalt in Wien über das dortige K. K. Tierarztschul-Institut an das Preuß. Obermarschallamt erstattete, finden sich viele historisch wertvolle Bemerkungen. Durch die Brille eines Humanmediziners schauen wir den damaligen tierärztlichen Lehrbetrieb. Die Schilderung der Wiener Zustände enthält zwischen den Zeilen hier und da eine geschickt eingeflochtene Kritik der Berliner Tierarztschule, die damals wirklich reformbedürftig war. Ferner liefert Sydow einige Nachträge zu meiner Arbeit über „Tierärztliche Berufsverhältnisse vor hundert Jahren“ (Veterinärhistorisches Jahrbuch 1926, S. 99—120), soweit sie Österreich betreffen. Im folgenden gebe ich Sydows Bericht nach den Akten (Repertorium 177, C VIII, 18b), die mir das Brandenburg-Preussische Hausarchiv dankenswerterweise zur Veröffentlichung überließ, wörtlich wieder:

„Die Seuchen und ansteckenden Tierkrankheiten werden für Aerzte und Wundärzte gelehrt, doch die Thierärzte nehmen Antheil daran; diese Vorlesungen werden dieserhalb im Sommer gelesen, weil die Aerzte und Wundärzte dann mehr Zeit haben, sie zu hören. Kein Lehrer darf willkürlich nach seiner Bequemlichkeit die festgesetzten Lehrstunden abändern. Jede Lehrbrande ist in einer bestimmten Zeit, in so und so viel Stunden, festgesetzt zu lesen; der Lehrer darf über keine Lieblingsmaterie sich nicht zu weit ausdehnen, und die andern Branchen schnell überhüpfen, denn die eine Branche wird so wichtig als die andere für den Schüler ansehnlich. Der erste Professor, der das Hospital zu besorgen hat, darf nicht, wenn er verreißt oder krank ist, einem Schüler oder Repetitor das Hospital anvertrauen, sondern ein anderer Professor übernimmt während des Ersteren daselbe, und setzt den Unterricht darin fort. Herbationen werden im Sommer nicht gemacht, sondern die dem Thierärzte nützlichen Kräuter zeigt der Lehrer beym Vortrage vor. Im botanischen Garten werden bloß Futterkräuter, Getreidearten, Giftpflanzen und medizinische Gewächse gezogen; Luxuspflanzen sind daraus verbannt. Alle Operationen muß der Schüler unter Anleitung des dritten Professors an lebenden, rotzigen und wurmigen Pferden zu machen lernen, damit er ein Pferd gehörig zu werfen, vor Gefahr beim schneiden sich zu hüten, das Blut zu stillen und den Verband gehörig anzulegen weiß. Einen praktischen Unter-

87

schmiede jede wichtige Pferdekrankheit bey dem Regimente, wofelbst sie sich befinden, melden, und von diesem gleichzeit alsdann die Ordination. Es ist dieses mit dem zu vergleichen, wie der Regiments-Chirurgus zu seinen Compagnie-Chirurgen stehet. Jedes Regiment Cavallerie reicht alljährlich die Conduiten-Liste der Kurfürsmiede der Schule ein, damit diese weiß, wie der Lebenswandel eines jeden davon ist. Hat sich einer in der Schule durch Fleiß und anständiges Betragen ausgezeichnet, und ist er bey dem Regimente firtlich, anständig und folglam geblieben, so hat er auf eine vacante Oberfchmidtstelle Ansprüche zu machen, weil die Schule die Oberfchmidtstellen zu vergeben hat. Vierzehn Jahre (mit Einschluß der zwey Unterrichtsjahre) muß jeder Kurfürsmied bey dem Regimente dienen, alsdann kann er seinen Abchied von demselben verlangen. Zu den Kaiserlichen Rokärzten in den Geflüten werden die ausgezeichneten Köpfe aus der Masse der Zöglinge herausgehoben.“

Bücherbesprechungen.

Arieß, Dr. L., Wolfegg (Allgäu): Die Tierwelt im Gesetze Mosi. Sonderabdruck aus Deutschöstr. Tierärztl. Wochenschr. 1927.

Auf die hübsche, sachkundige Arbeit sei hingewiesen. — Moses sorgt durch seine Gesetzgebung für die Haustiere und für die wilden Tiere, die rein sind, d. h. genossen werden dürfen. Unter den Haustieren war der Ochse das wichtigste Tier, weil es die Frachtenbeförderung, die Feldbestellung und das Ausdreschen besorgt. Pferde sind selten. Moses verbietet, daß der König eine zu starke Kavallerie halte. Abraham und die andern Patriarchen hatten keine Pferde, dagegen verfügte der Pharaon in Ägypten zu Mosi Zeiten über eine große Reiterei. Unter der Beute im Kriege gegen die Midianiter sind keine Pferde. David erbeutete Pferde, ließ sie aber laufen, nachdem er sie gelähmt hatte, weil er nichts mit ihnen anzufangen wußte. Salomon hat als erster eine kleine Reiterei aufgestellt. Er handelte auch mit Pferden aus Ägypten. Es gab einen einheitlichen Preis für alle Pferde (150 Sekel). Zum Personentransport benutzte man Kamele und Esel. — Den Tieren steht Sabbatruhe zu. Die Kastration von Haustieren ist verboten. Um Bullen anspannen zu können, zog man ihnen Nasenringe ein. Die Juden sollten wenig Fleisch essen, daher wird das Schlachten von Rindern, Schafen und Ziegen nur gestattet, wenn die Schlachtung zugleich Opferung ist. Nachdem das Volk in Palästina ansässig war, fiel diese Einschränkung weg. Wer des Nächsten Tier beschädigt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Verletzt ein Tier einen Menschen, so soll es gesteinigt werden. Ochsen und Esel darf man nicht zusammen anspannen. — Was in jedem siebenten Jahre auf dem Acker wächst, gehört dem Wilde, das niemand vertreiben darf. Hirsch und Reh wurden als rein gegessen.

Das letzte Kapitel befaßt sich mit den Mosaiken Speisegesetzen. Unter den reinen Tieren muß man solche verstehen, die herkömmlicherweise gegessen wurden, unter den unreinen die, deren Genuß nicht üblich war. Die Israeliten durften unreine Tiere im Hofe haben, wie Kamele, Esel, später auch Pferde, sie durften Schweinehandel treiben.

Reinhard Frochner.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Rieck, Berlin-Cöpenick, Kirchstraße 4
Verlag von M. & H. Schaper Hannover. — Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

nicht im Präparieren der Zergliederungskunst erhalten die Schüler nicht, sondern den Körper des Thieres sollen sie bloß aus dem Vortrage und durch die Repetitionen kennen lernen. Daß dieses ein großer Mangel an der Wiener Thierarzneischule ist, wird derjenige leicht einsehen, der mit dem Nutzen, den der Unterricht im Präparieren gewährt, bekannt ist. Auch ein großer Mangel ist noch, daß sich der Lehr-Cursus nicht weiter als aufs Pferd ausdehnt. Die übrigen Haustiere kommen, außer den Seuchen und ansteckenden Krankheiten fast nicht in Betracht, daher die Wiener Vétérinaire-Anstalt, streng genommen, keine Thierarzneischule, sondern nur eine Pferdearzneischule ist. Wenn der Lehrer nach seinen Heften liest, und kein Buch zum Grunde bei seinen Vorlesungen legt, so ist derselbe verpflichtet, dem Repetitor seine Hefte zu leihen, damit dieser das Gelernte danach wiederholen kann. Der Professor der Zoologie darf an den präparierten Theilen nichts in den Vorlesungen zer schneiden, sondern er zeigt die Theile bloß vor, und läßt sie so wie sie ausgearbeitet sind, damit sie in der nemlichen Gestalt und unverändert repetiert werden können.

Die Repetitores müssen so wie die Schüler in jede Vorlesung kommen, sie sind aber im Auditorio von den Schülern durch eigenen Tisch separirt, und sitzen nächst dem Professor; jedoch der Repetitor des ersten Lehrschmidts hört bloß diesen seine Vorlesungen. Der Lehrer trägt die summarische Liste der Zuhörer bey sich, und nach Gefallen ruft derselbe bey dem Eingange in die Stunde diesen oder jenen laut auf; ist der Aufmerksamkeit nicht da, so wird dessen Name mit einem X bemerkt, und nach der Stunde die Strafe über die Abwesenheit des Zöglings verfügt und vollstreckt. Da jede Stunde ihre bestimmte Arbeit hat, so darf kein Lehrer weit über dieselbe wegleiten, dies hat auch auf die Ordinations-Stunde Bezug. Jedes Pferd, was in der Anstalt fällt, wird von den Schülern in Gegenwart der beiden Professoren, die den Stall besorgen, geöffnet. Die Zeit der Zergliederung des gefallenen Thieres wird so gewählt, daß dadurch der Lehrunterricht nicht unterbrochen wird; jedoch das gefallene Thier wird sobald wie möglich geöffnet, weil es sonst in Fäulniß übergethet, und die zurückgebliebenen Abdrücke der Krankheit nicht mehr rein erscheinen. Für jedes Pferd, was in die Anstalt mit einem äußerlichen Uebel kömmt, werden 35 Kreuzer (nach Preussischer Münzfuß ohngefähr 4 Groschen) täglich gezahlt. Leidet das Thier an einer innerlichen Krankheit, so ist die Taxe noch einmal so hoch. Diese Summe ist einmal festgesetzt und weder der Reiche noch der Arme darf mehr geben. Wenn Plus bey der Kur gemacht wird, so theilen die 4 Professoren den Gewinn gemeinschaftlich. Diese Bezahlung der Kurkosten würde ich nicht anrathen einzuführen, denn Ehrlichkeit und Redlichkeit läßt sich nicht bey jedem Professor voraussetzen, und es könnte dadurch ein großer Mißbrauch erwachsen. Der erste Lehrschmidt ist Professor, und muß über den Hufbeschlag im Hörtaale lesen, und in der Schmiede das Eisen, worüber er gelehrt hat, in Gegenwart der Schüler schmieden, und es nachher auf einem abgetheilten Pferdefuß kunstmäßig aufschlagen, und jeder Schüler muß dies einzeln nachmachen. Warum man dem Schmied, und keinem Professor der Medizin und Chirurgie den Hufbeschlag gegeben hat, ist daher gekommen, weil man von dem Grundsatze ausgegangen ist: der Schuster bleibe bei seinem Leisten, und weil man den Hufbeschlag als etwas Bedeutendes ansethet, wodurch dem Staate viele Pferde erhalten werden können.

Der Apotheker trägt die chemischen Gegenstände nicht in der Apotheke vor, sondern im Auditorio und Laboratorio. Die Form beim Vortrage darf nie verletzt werden. Den Schülern ist es nicht freigestellt ob sie in die Schreib- und Rechenstunden gehen wollen oder nicht, sondern sie müssen diese Stunden ebenso wie die andern Lehrstunden besuchen. Bei der Schule stehen 4 junge promovirte Aerzte, die den Cursus, außer den Hufbeschlag so mitmachen müssen, als die Thierärzte, sie bekommen jährlich 400 Gulden Gehalt, und sind dazu bestimmt, nach Verlauf von 2 Jahren in viehreichen Gegenden als Physikus angestellt zu werden; die Aerzte wohnen außerhalb der Schule.

Die Zuhörer im Wiener Thierarzneischule Auditorio sind sehr gemischt: Repetitores, Officiere, Stallmeister, Gutsbesitzer, junge Oekonomen, Aerzte, Wundärzte, Thierärzte, Kurtschmiede, Schmiede, Hirten; alle sitzen in einem Saale durcheinander, bloß die Officiere, Repetitores, Aerzte und Wundärzte haben jeder einen Tisch für sich. Die Schmiede ist kaiserlich. (Näheres siehe „Der Hufschmidt“, Jahrg. 1928, Nr. 11, S. 173.)

Für den öffentlichen Unterricht zahlt kein Zuhörer ein Honorar. Wird ein Lehrer krank, so werden dessen Vorlesungen unter die andern vertheilt; oder hat dessen Repetitor schon die Fähigkeit zu lesen, so werden sie diesem übertragen. Der Unterricht muß fortgesetzt werden, der Schüler soll und kann darunter nicht leiden. Ist daher ein Repetitor krank, so werden dessen Repetitionen von den andern Repetitores mitverlesen. Der Schüler bleibt zwey Jahre in der Anstalt, und hört jede Vorlesung zweymahl, weil alle genannten Vorlesungen alljährlich durchgelesen werden müssen. Alle Jahr im Herbst geht die älteste Section der Schüler zu den Regimentern ab, und alle Jahre kommt eine neue Section im Herbst wieder zu. Beyde Sectionen der Schüler gehen in eine und die nemliche Lehrstunde; nur dieser Unterschied findet statt, daß die erste Section in Hospital und Apotheke, und die zweite in die Schmiede vertheilt ist. Bei jeder Section befindet sich ein Oberschmidt, der die Aufsicht über die Schüler, vorzüglich in der Schmiede hat. In den angezeigten Freistunden des Mitwochs, Sonnabends und Sonntags kann der Schüler, wenn er keine kranken Pferde zu besorgen hat, ausgehen; jedoch des Mitwochs und Sonnabends Nachmittag kann nur die Hälfte der Schüler sich entfernen, die andere Hälfte bleibt zur Arbeit in der Schmiede. Die Ferien der Thierarzneischule richten sich nach denen der Universität. Kein Schüler darf ein krankes Pferd in die Kur nehmen und sich aus der Anstalt ohne erhaltene Erlaubniß entfernen. Das Kurieren außerhalb der Anstalt stehet bloß den Professoren, den Repetitores, und den Ober-Schmieden frey. Der Schüler muß im Sommer um 10 Uhr, und im Winter um 9 Uhr des Abends zu Hause seyn, alsdann wird er von dem Wachmeister visitirt, dieser schließt darauf das Haus zu.

Jeder Schmied ohne Ausnahme, der in den Oesterreichischen Staaten sich niederlassen, und den Hufbeschlag als Meister ausüben will, muß den Cursus über den Hufbeschlag in dem Institute hören. Die bloß Hufschmiedemeister werden wollen, wohnen nicht in der Anstalt, sondern außerhalb derselben, und müssen für ihre Substanz selbst sorgen. Kein Zögling wird in das Institut aufgenommen, der nicht seine gefunden Sinne hat; denn sprechen, sehen und hören muß er können. Bey jedem Regimente Cavallerie steht ein Oberschmidt, der von der Schule dazu ernannt ist. Der Oberschmidt hat 19 Gulden und der Kurtschmidt 15 Gulden monatlich. Die Kurtschmiede müssen dem Ober-

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelman, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zustellung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung fein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inserenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 42.

Ausgegeben am 20. Oktober 1928.

36. Jahrgang.

Ist es erforderlich, bei der Agglutinationsprüfung auf Abortus-Bang Richtlinien aufzustellen?*)

Von Dr. Schumann, Breslau.

Bei verschiedenen Dienstversammlungen der Leiter der Bakteriologischen Institute und auch bei der Versammlung zur Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten in München wurde die Frage erwogen, wie man am zweckmäßigsten die Klagen über den verschiedenen Ausfall der Blutuntersuchung ein und derselben Blutprobe in verschiedenen Instituten abstellen könne. Es wurde damals im Jahre 1925 von mir vorgeschlagen, die Agglutinationsprüfung dadurch einheitlich zu gestalten, daß die fertige Testflüssigkeit durch Seren von bekannter Agglutination in den Instituten regelmäßig nachgeprüft wird. Hiervon ist meines Wissens wenig Gebrauch gemacht worden, denn an Breslau sind die anderen Institute nur in ganz einzelnen Fällen herangetreten, um Seren von bekannten Agglutinationstitern zu erhalten. Später gab Herr Prof. Mießner zu dem gleichen Zweck von der Zentrale zur Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten eine Testflüssigkeit ab, die aber meines Wissens auch nur wenig angefordert worden ist.

Die Frage, wie die Agglutinationsprobe beim Abortus für alle Untersuchungsstellen einheitlich zu gestalten ist, ist in meinem Institut während der letzten Jahre fortlaufend geprüft worden. Es hat sich dabei gezeigt, daß die Agglutinationsprobe ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zur Feststellung des feuchten Verkalbens ist, daß aber für ihre Technik gewisse Richtlinien unbedingt erforderlich sind. Das Ergebnis einer Agglutination ist nämlich abhängig von verschiedenen Momenten und zwar

1. von der Beschaffenheit des Testes,
2. von der Beschaffenheit des Serums,
3. von der Behandlung der fertig angefertigten Agglutination, je nachdem ob die Agglutination im Brutschrank oder in der Zentrifuge stattfindet und je nach der Dauer des Brutschrank-Aufenthaltes,
4. kann das Ergebnis der Agglutination abhängig sein von subjektiven Momenten.

Die Technik der Agglutination wurde bei allen Versuchen in der Weise, wie sie von Zwick und Zeller¹⁾ beschrieben ist, ausgeführt, die Herstellung der Testflüssigkeit geschah mit Karbolkoehlsalzlösung von der Dichte, daß

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 11. Juli 1928 in Breslau.

¹⁾ Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamt Bd. 43, H. 2.

Druckschrift erkennbar ist. Ich erwähne besonders, daß zuerst die Verdünnungen angefertigt werden und daß darauf erst die Testflüssigkeit zugefügt wird. Die Agglutinationsreihen kommen dann in den Brutschrank. Die Agglutinationen in Verdünnungen von 200 ab gelten als positiv; bei 100 als zweifelhaft, bis 50 als negativ.

I. Zunächst wurde bezüglich der Beschaffenheit des Testes die Frage geprüft, ob die Agglutination vom Alter der Stämme abhängig ist. Hierzu wurde daselbe Serum mit mehreren Stämmen verschiedenen Alters ausgewertet und zwar

- a) mit solchen, die über 1 Jahr alt waren,
- b) mit solchen, die 8 Wochen bis 1/2 Jahr alt waren und
- c) mit solchen, die 4 Wochen alt waren.

Es zeigte sich dabei, daß das Alter der Stämme auf die Agglutination ohne Einfluß ist, daß der höchste Titer erreicht wurde mit einem jungen Stamm; andererseits aber wurden wieder zwei andere Jungstämme mit demselben Serum niedrig agglutiniert. Ebenso agglutinierten die alten Stämme teilweise nur bis 100, teilweise bis 200. Das Alter der Stämme an sich scheint demnach keinen wesentlichen Einfluß zu haben.

Es wurde ferner geprüft, ob die Agglutinabilität des Testes größer ist, wenn nicht nur 1 Stamm, sondern mehrere Stämme Verwendung finden. Zur Prüfung dieser Frage wurden dieselben vorhin erwähnten Stämme gruppenweise gemischt und mit demselben Serum geprüft. Bei einer wahllosen Mischung von Stämmen zu einer Testflüssigkeit erreichten wir eine Agglutinationsfähigkeit auf 800. Wenn wir dagegen Stämme z. B. nach dem Alter zusammenstellten, ergaben sich verschiedene Titerhöhen, also bei einer Testflüssigkeit von über 1 Jahr alten Stämmen der Titer 800. Beim Zusammenmischen von Stämmen, die 8 Wochen bis 1/2 Jahr alt waren, wurde der Titer 400 und bei Stämmen unter 4 Wochen gar keine Agglutination erreicht. Man kann daraus folgern, daß gut agglutinable Stämme den Test verbessern, daß andererseits aber schlecht agglutinierte Stämme die Agglutinabilität des Testes auch verschlechtern können. Besonders ist das ersichtlich aus der Testflüssigkeit, die aus 4 Wochen alten Stämmen hergestellt war; in dieser befand sich neben zwei schlecht agglutinierten Stämmen ein sehr gut agglutiniertes; dieser letztere war nicht imstande, die Agglutinabilität des Testes so zu erhöhen, daß er sich als brauchbar für diagnostische Untersuchungen eignete.

Lfd. Nr.	Nummer des Seruns	Stamm 485						Stamm 494					
		50	100	200	400	800	1600	50	100	200	400	800	1600
1	4475	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
2	4476	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
3	4472	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
4	4473	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
5	4474	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
6	4471	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
7	4553	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
8	4554	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
9	4552	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
10	4624	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
11	4606	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
12	4611	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
13	4646	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
14	4642	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
15	4639	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
16	4650	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
17	4651	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
18	4648	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
19	249	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
20	250	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
21	258	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
22	259	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-

Daß die Agglutination der einzelnen Stämme außerordentlich bei Verwendung desselben Serums schwankt, konnte noch erhärtet werden durch Prüfung von 9 Stämmen mit 22 verschiedenen Seren. Aus der Tabelle ist ohne weiteres ersichtlich, daß 9 Stämme von den Seren 1, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ganz verschieden beeinflusst sind.

Um ferner die Abweichung der Wertigkeit des Testes verschiedener Institute zu prüfen, wurden 18 Sera mit Testflüssigkeit von den Bakteriologischen Instituten Breslau, Hannover, Stettin und Königsberg angesetzt. Hierbei wurde mit 14 Seren ein annähernd übereinstimmendes Resultat erzielt, viermal dagegen wich es ab, so daß die Untersuchungsstellen über das Urteil „positiv“ oder „negativ“ unter Umständen verschiedene Resultate dem Einsender mitgeteilt hätten.

Von Wichtigkeit erschien uns ferner festzustellen, wie lange die Testflüssigkeit aufbewahrt werden darf. Nach dieser Richtung hin ist eine Testflüssigkeit geprüft worden mit einer Reihe von verschiedenen Seren in bestimmten Zeitintervallen und zwar zunächst von 1 Monat und später von $\frac{1}{2}$ Monat Differenz, mit dem Ergebnis, daß die einmal als brauchbar befundene Testflüssigkeit an Agglutinabilität nicht verliert, nach unseren Untersuchungen mindestens $\frac{1}{2}$ Jahr lang behält. Die Testflüssigkeit braucht deshalb für die praktischen Verhältnisse nur alle Halbjahre neu hergestellt zu werden.

II. Die Agglutination ist ferner abhängig von der Beschaffenheit des Serums. Wir haben zur Klärung dieser Frage das Blutserum in verschiedenem Aufbewahrungsalter zur Agglutination geprüft und dabei feststellen können, daß das Serum seine Agglutinationsfähigkeit durch das Alter des

Tabelle V.

Agglutination in verschiedenen Instituten mit dortigem Test.

[illegible]

Tabelle II. Agglutinationen in Breslau mit Test von verschiedenen Instituten.

Lfd. Nr.	Nummer des Serums	Test von Stettin	Test v. Königsberg	Test v. Hannover	Gewöhnlich. Test Breslau
1	I	50 100 200 400 800 1600	50 100 200 400 800 1600	50 100 200 400 800 1600	50 100 200 400 800 1600
2	II	+	+	+	+
3	III	+	+	+	+
4	IV	+	+	+	+
5	V	+	+	+	+
6	VI	+	+	+	+
7	2102	+	+	+	+
8	2103	+	+	+	+
9	2104	+	+	+	+
10	2108	+	+	+	+
11	2111	+	+	+	+
12	2100	+	+	+	+
13	2094	+	+	+	+
14	2098	+	+	+	+
15	2092	+	+	+	+
16	2110	+	+	+	+
17	2107	+	+	+	+
18	Valerie	+	+	+	+

Blutes bis zum 8. Tage nicht verliert. Selbst bei Hämolyse bleibt das Agglutinationsergebnis daselbe wie bei normalem Serum. Auch die verschiedenen Aufbewahrungsarten bei warmer und kalter Temperatur ufw., selbst der Zusatz von Karbol haben keine nennenswerten Unterschiede ergeben. Erst nach dem 8. Tage kann sich die Agglutinationsfähigkeit des Serums verändern; wir haben das feststellen können an Serum, das sowohl im Eischrank als auch bei Zimmertemperatur aufbewahrt wurde. Für die praktischen Verhältnisse ergibt sich daraus, daß der Transport des Serums bzw. des Blutes ohne Einfluß auf die Agglutination ist.

Erwähnen möchte ich noch, daß manche positiven Sera sich eigentümlich verhalten insofern, als einzelne Röhrchen in der fortlaufenden Verdünnungsreihe ausfallen und keine Agglutination zeigen. Besonders wichtig ist zu wissen, daß gerade in den unteren Verdünnungen 2—3 Röhrchen ausfallen, und daß dann plötzlich von 2—400 ab wiederum Agglutination eintritt. Diese Ausfallerscheinung muß unbedingt als eine Eigentümlichkeit des Serums angesehen werden, denn sie trat ein, wenn das Serum mit mehreren Stämmen durchgeprüft wurde, z. B. Tabelle I: Serum 14 = 4mal, 15 = 3mal, 16 = 7mal, 18 = 5mal und 22 = 3mal.

Beim Vergleich der Agglutination mit der Komplementbindung konnte ein klares Bild nicht gegeben werden, weil die Komplementbindung einmal positiv, einmal negativ war.

Es ergibt sich daher für die praktischen Verhältnisse, daß man bei jeder einzeln angelegten Agglutination die Verdünnungsreihe bis zur letzten Verdünnung durchzusehen hat, um nicht infolge Ausfallerscheinung die positive Reaktion zu übersehen.

Tabelle III.

Sera, die bei Anfangsverdünnungen teilweise ausfallen und bei stärkeren Verdünnungen stärker agglutinieren.

Serum 1996.

Bezeichnung des Stammes	50	100	200	400	800	1600	3200	6400
Test	—	—	+	+	+++	++	+	+
712	—	—	—	—	—	—	++	++
475	—	—	—	—	—	++	++	+
614	—	—	—	+	++	++	++	++
676	—	—	—	+	+	++	+	++
704	—	—	—	—	—	++	++	++
381	—	—	—	—	+	+	+	+
734	—	—	—	+	+++	+	+	—
437	—	—	—	+	+	++	+	+
Komplementbindung 0,2 +++								

Serum 483:

Test	+	—	+	++	++	+	
489	+++	++	+	+	+	+	
592	+++	++	—	+++	+++	—	
607	++	+	+	++	+	+	
229	++	—	—	—	+	+	
603	+++	—	+	+	++	++	
590	+++	—	—	—	+	—	
597	+++	+	+	+	+	+	

III. Inwiefern die Behandlung der fertig angelegten Agglutination von Einfluß auf den Ausfall derselben ist, wurde geprüft hinsichtlich des Brutfrankaufenthaltes und der Zentrifugenbenutzung. So zeigte sich z. B. bei einem Vergleich der Agglutinationsröhrchen, die einerseits bei Zimmertemperatur, andererseits im Brutfrank aufbewahrt wurden, daß eine deutlichere Reaktion bei den Brutfrankröhrchen eingetreten war. In der gleichen Richtung konnten wir feststellen, daß, je länger die Unterbringung im Brut-

frank dauert, die Agglutination an Stärke bis zum Zeitpunkt von 22 Stunden zunimmt.

In Verbindung hiermit haben wir die Frage geprüft, ob man die Agglutination bereits nach 7—8 Stunden ablesen kann, da zuweilen die Praxis verlangt, daß noch am Abend deselben Tages das Agglutinationsergebnis bekanntgegeben wird. Die Frage kann man auf Grund der angelegten Versuche dahin beantworten, daß agglutinierende Sera bereits nach 7 Stunden einen Ausschlag geben, daß man es aber nicht wagen darf, eine bis dahin negative Reaktion zu dieser Zeit schon als endgültig negativ herauszugeben. Wenn unbedingt ein schnelles Resultat erforderlich ist, empfiehlt es sich, die Zentrifuge zu Hilfe zu nehmen, die Röhrchen 2 Stunden im Brutfrank zu lassen und dann $\frac{1}{4}$ Stunde lang zu zentrifugieren. Auf diese Weise gelingt es, die Agglutination bereits mit 3 Stunden abzulesen. Wir haben gefunden, daß das Ergebnis bei Anwendung der Zentrifuge manchmal sogar deutlicher ist als bei einem 24stündigen Aufenthalt der Röhrchen im Brutfrank.

Tabelle IV.

Ablefen der Agglutination nach verschiedenen Zeitpunkten.

Nr. d. Serums	Titer	Zeit	50	100	200	400	800	1600
3	1600	7 Std.	+	+	—	—	—	—
3	"	9 Std.	+	+	—	—	—	—
3	"	12 Std.	+	+	—	+	—	—
3	"	14 Std.	+	+	+	+	—	—
3	"	16 Std.	+++	+	+	—	—	—
3	"	18 Std.	+	+	+	+	—	—
3	"	20 Std.	+++	++	+++	+	+	+
3	"	22 Std.	++	++	++	+	+	—
3	"	24 Std.	+++	+++	+++	++	+	+
4	1600	7 Std.	+	+	+	+	—	—
4	"	9 Std.	+	+	+	+	—	—
4	"	12 Std.	+	+	+	+	—	—
4	"	14 Std.	++	++	+	+	+	—
4	"	16 Std.	+	+	+	+	+	—
4	"	18 Std.	++	++	+	—	—	—
4	"	20 Std.	+++	+	+	+	+	—
4	"	22 Std.	++	+++	+++	+++	+	+
4	"	24 Std.	+++	+++	+++	+++	+	+

IV. Die Abhängigkeit des Ausfalles von subjektiven Momenten wurde nach zwei Richtungen hin geprüft:

1. im selben Institut wurden von verschiedenen Personen nach denselben Gesichtspunkten die Agglutination abgelesen,
2. wurden 12 Sera außer im Breslauer Institut auch in drei anderen Landwirtschaftskammerinstituten zu gleicher Zeit beurteilt.

Vergleicht man das Ablefen der Agglutinationen durch verschiedene Personen des hiesigen Instituts miteinander, so kann man nennenswerte Unterschiede überhaupt nicht feststellen. Aus den vergleichenden Prüfungen in den verschiedenen Instituten geht aber hervor (Tabelle V), daß das Ablefen einige Abweichungen in der Beurteilung zeigt, trotzdem die Agglutinationsprüfung auf ein und derselben Testflüssigkeit basiert.

Diese Unterschiede zeigen wiederum deutlich, wie wichtig es ist, daß alle Institute auf einheitliche Richtlinien und auf eine einheitliche Testflüssigkeit abkommen.

In sämtlichen Versuchen wurde noch die Frage mit eingeschaltet, ob durch das Agglutinoskop besser als durch die bloße Betrachtung die Agglutination abzulesen ist. Es zeigte sich, daß wesentliche Unterschiede zwischen Beobachtung durch das Agglutinoskop und einfachem Ablefen nicht vorhanden sind; nur in Grenzfällen kann es sich empfehlen, das Agglutinoskop zu Hilfe zu nehmen. — Ebenso wurden in einigen Vergleichsversuchen Agglutination und Komplement-

mentbindung gegeneinander ausgewertet. Wir konnten dabei die Angaben von Lentz und von Karsten bestätigen, daß durch die gleichzeitige Anwendung beider Untersuchungsmethoden mehr positive Resultate herausgeholt werden. In Zweifelsfällen empfiehlt es sich daher, außer der Agglutinationsprüfung auch die Komplementbindungsmethode auszuführen.

Aus den Versuchen lassen sich folgende Schlußsätze aufstellen:

1. Es dürfen nur gut agglutinable Stämme, die besonders ausgewertet werden müssen, zur Herstellung von Testflüssigkeit Verwendung finden, und zwar ist es erforderlich, mehrere Stämme (mindestens drei) zu einer Testflüssigkeit zu mischen. Die Testflüssigkeit ist mindestens $\frac{1}{2}$ Jahr lang haltbar.
2. Die Transportdauer der Blutprobe ist ohne Einfluß auf die Agglutinationsfähigkeit des Serums.
3. Auch hämolytische Sera agglutinieren wie normal gewonnene.
4. Infolge der zuweilen auftretenden Ausfallerscheinungen sind bei der Agglutinationsprobe fäktliche Verdünnungen auf die Agglutination hin nachzusehen.
5. Die Agglutination ist am deutlichsten nach 22 bis 24 Stunden der Unterbringung der Agglutinations-

röhrchen im Brutschrank. Aber auch nach 3 Stunden läßt sich schon ein brauchbares Ergebnis erzielen, wenn man die Zentrifuge zu Hilfe nimmt und die Röhrchen 2 Stunden in den Brutschrank setzt. Man kommt dann in der Regel zu demselben Ergebnis wie bei 22stündigem Aufenthalt im Brutschrank.

Um die Einheitlichkeit der Auswertung zu gewährleisten, ist zu empfehlen, daß man die Grenze für die Dauer und Aufbewahrung der Agglutination in dieser Weise richtunggebend fest läßt.

6. Bei geschultem Personal kommen Unterschiede im Ablefen der Agglutination in dem betr. Institut kaum vor.

Aus diesen Untersuchungsbefunden ergibt sich als Nutzanwendung, daß alle Abweichungen verschiedener Beurteilungen in den einzelnen Instituten sich hauptsächlich erklären durch die Verschiedenheit des Testes. Infolgedessen ist es zweckmäßig, eine einheitliche Testflüssigkeit herzustellen, die sich alle Institute in mindestens halbjährlichem Turnus beschaffen. Es empfiehlt sich ferner, die Agglutination genau nach bestimmten Richtlinien anzusetzen in der Weise, wie ich es eingangs vorgeschlagen habe. Bei dieser Vereinheitlichung wird man die Klagen aus der Praxis über verschiedene Resultate ein- und derselben Blutprobe mit großer Wahrscheinlichkeit ausschalten können.

Weitere Untersuchungen über die Geflügeltuberkulose. Infektionsversuche an Schweinen und Hühnern. Prüfung von Desinfektionsmitteln. *)

Von Prof. Dr. Dr. Raebiger, Halle (Saale).

Unsere weiteren Untersuchungen über die Geflügeltuberkulose erstreckten sich auf Infektionsversuche an Schweinen und Hühnern sowie auf die Prüfung verschiedener Desinfektionsmittel hinsichtlich ihrer bakteriziden Wirkung gegenüber Geflügeltuberkelbazillen.

I. Infektionsversuche an Schweinen.

Da sich in Deutschland im Vergleich zu Nordamerika und Dänemark nur wenige Forscher mit Untersuchungen über die Beziehungen der Geflügel- zur Schweinetuberkulose beschäftigt haben und die meisten Quellenangaben über diese Frage dem Auslande zu verdanken sind, haben wir in Fortsetzung der seit dem Jahre 1923 im Laboratorium und in der Praxis durchgeführten Studien über die Geflügeltuberkulose und ihre Bekämpfung im Juli v. Js., also bald nach unserer Stettiner Dienstverammlung, Infektionsversuche an Schweinen angestellt, um die Entwicklung der Krankheit kennen zu lernen und in Bezug auf evtl. wirtschaftliche Auswirkungen verfolgen zu können.

Über die mit meinen Mitarbeitern, Obertierarzt Dr. Spiegl und Privatdozent Dr. Schmidt ausgeführten Versuche zur Übertragung von Geflügeltuberkelbakterien auf Ferkel haben wir bereits in der Festschrift zum 50jähr. Bestehen des Leipziger Tierseucheninstituts berichtet.

Es handelte sich um 4 Tiere, von denen eines intravenös und ein zweites mittels Schlundsonde mit Kulturäufschwemmung infiziert wurde, während die beiden anderen einer den natürlichen Verhältnissen angepaßten Ansteckung ausgesetzt wurden.

Wie leicht im Schweinekörper die Geflügeltuberkelbakterien haften, geht daraus hervor, daß die Infektion bei fäktlichen Ferkeln Erfolg hatte.

Trotzdem haben sowohl das intravenös behandelte Ferkel wie die beiden per os infizierten Tiere keinerlei Krankheiterscheinungen gezeigt und nahmen an Gewicht zu. Be-

sonders gut entwickelten sich die einer natürlichen Infektion ausgesetzten beiden Schweine.

Lediglich Ferkel 2 begann 1 $\frac{1}{2}$ Monate nach der Ansteckung zu kränkeln, hustete häufig, ging annähernd 2 $\frac{1}{2}$ Monate nach der Ansteckung im Gewicht zurück und bekam den typischen Habitus des Kümmerers.

Der Zustand dieses Tieres im Vergleich zu einem fast gleichaltrigen Stallgenossen läßt sich am besten aus dem Lichtbild ersehen, das ich am Ende meines Referates zeigen werde.

Das Ferkel 2 war im Verlauf des Versuches an einer Erkältungspneumonie (Zementfall) erkrankt.

Die Diagnose wurde durch den Zerlegungsbefund bestätigt.

Die Sektion zeigte uns aber außerdem noch, daß Schweinepest vorlag.

Veränderungen, die mit Sicherheit auf Tuberkulose zurückgeführt werden konnten, waren nicht vorhanden. Nur die erhebliche Schwellung fäktlicher Lymphknoten, die weder stark durchfeuchtet noch regressiv verändert waren, war auffällig.

Im übrigen beherrschten die Veränderungen der chronischen Schweinepest das Sektionsbild.

Besonders interessant sind die von meinem Mitarbeiter Dr. Spiegl erhobenen histologischen Befunde des an Viruspest erkrankten Ferkels.

Eine allen Präparaten gemeinsame und bereits bei einem flüchtigen Vergleich auffallende Erscheinung ist der ungeheure Reichtum der Gewebe an Tuberkelbakterien. Sie finden sich sowohl, und zwar fast ausschließlich intrazellulär in der Propria und Submukosa des Dünn- und Dickdarmes, ohne daß es dabei zu geschwürigen Veränderungen der Darmschleimhaut gekommen ist, als auch in den Mesenteriallymphknoten, den Darmbeinlymphknoten, Leberlymphknoten und Bronchiallymphknoten, die fäktlich das histologische Bild der großzelligen tuberkulösen Hyperplasie bei gleichzeitigem Schwund des lymphatischen Gewebes aufweisen.

*) Vortrag, gehalten in der Dienstversammlung der Vertreter der Bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammern am 11. Juli 1928 in Breslau.

Kleine verstreute tuberkulöse Nester von Epithelioid- und Riesenzellen mit zahlreichen Tuberkelbakterien finden sich weiterhin auch in den entzündlich veränderten Lungenabschnitten.

Man sieht hieraus, daß, wenn die Widerstandsfähigkeit eines Schweines durch eine andere schwere Erkrankung, in diesem Falle durch Schweinepest, geschwächt ist, der Ausbreitung der Tuberkelbakterien im Organismus Tür und Tor geöffnet wird, und dann die Fütterungsinfektion mit Tuberkelbakterien vom Typus avium zu einer generalisierten Tuberkulose führen kann, die unter Umständen eine Gefahrenquelle für andere Jungtiere bedeutet.

Da die in Ferkelbeständen weit verbreitete enzootische Pneumonie sowie Darmkatarrhe parasitärer und nicht parasitärer Art unter Umständen eine ähnliche Disposition für die Generalisation einer Fütterungsinfektion mit Bakterien des Typus avium schaffen, sollte man stets bei der bakteriologischen Untersuchung derartiger Tiere auch auf Tuberkelbakterien fahnden, um nähere Hinweise über die Verbreitung versteckter, d. h. makroskopisch nicht sichtbarer tuberkulöser Infektionen bei Jungtieren zu erhalten.

Ganz anders als Ferkel 2 verhielten sich die in der Zeit nach der Infektion von anderen Krankheiten verschont gebliebenen Ferkel.

Bei Ferkel 1 lag nach dem histologischen Befund, insbesondere mit Rücksicht auf die Kleinheit der Herde und den spärlichen Gehalt an Tuberkelbakterien in diesen Herden, trotz der massiven intravenösen Infektion die Möglichkeit zur Ausheilung vor.

Bei den Ferkeln 3 und 4, die sich durch Aufnahme eines Stückes einer tuberkulösen Hühnerlunge bzw. des mit tuberkelbakterienhaltigem Hühnerkot verunreinigten Futters selbst infiziert hatten, lagen aber die Verhältnisse nach den histologischen Ermittlungen noch viel günstiger.

Bei Ferkel 3 bestand nur eine durch bindegewebige Induration und Verkalkung in Ausheilung begriffene Tuberkulose bei mäßigem Gehalt an Tuberkelbakterien der Dünndarmlymphknoten, während in den Leberlymphknoten nur vereinzelte kleine Epithelioid- und Riesenzellennester, jedoch kleine Tuberkelbakterien nachweisbar waren.

Ebenso wurden bei Ferkel 4 nur lokale Veränderungen in Form von Verkäsungsherden einiger Gekröslymphknoten festgestellt.

M. E. können nur diese beiden Tiere für die praktische Beurteilung der Beziehungen zwischen der Geflügel- und Schweinetuberkulose in Betracht gezogen werden.

Sie haben sich trotz der Infektion, der besonders das Ferkel 4 fast 4 Monate hindurch täglich ausgesetzt war, überraschend gut entwickelt, starken Fettansatz und seit Beginn des Versuches Gewichtszunahmen von 44 bzw. 37 kg gezeigt.

Die Tiere haben nach der Schlachtung bei der nach den Bestimmungen des Reichsfleischbeschaugesetzes ausgeführten Fleischschau außer an den Gekröslymphknoten zu keinerlei Beanstandungen Veranlassung gegeben.

Aus unseren Versuchsergebnissen läßt sich erfreulicherweise schließen, daß die Geflügeltuberkelbakterien für gesunde Schweine bei Infektionen, wie sie in der Praxis vorkommen, keine Bedeutung haben.

Diese Folgerung scheint umso berechtigter, wenn man die Feststellungen anderer Autoren in Betracht zieht. So läßt sich einer Abhandlung von van Es und Martin entnehmen, daß in Beständen, die frei von Rindertuberkulose waren, in denen jedoch die Geflügeltuberkulose herrschte, von 1246 tuberkulinisierten Hühnern 9,5 Prozent und von 194 Schweinen 11,3 Prozent tuberkulös waren.

Trotz der leichten Empfänglichkeit der Schweine für die Ansteckung mit Geflügeltuberkelbakterien konnte aber von einer gesundheitlichen Schädigung der Schweinebestände durch die Geflügeltuberkulose nicht gesprochen werden.

Schon Tietze wies 1907 darauf hin, daß eine wirtschaftliche Bedeutung einer Infektion der Schweine mit Hühnertuberkelbakterien nicht beizumessen ist.

In Nordamerika ist seit demselben Jahre ein ständiges Ansteigen der Fälle von Schweinetuberkulose festgestellt worden, ohne daß die Zahl der Schweine, die infolge Tuberkulose vom menschlichen Genuß ausgeschlossen werden mußten, eine Zunahme erfahren hätte.

Es haben also die wirtschaftlichen Schäden mit der Steigerung der Tuberkulosefälle in keiner Weise Schritt gehalten.

Auch Junack vertritt den Standpunkt, daß bei der Fleischuntersuchung die Infektion mit Geflügeltuberkelbakterien bei ihrem meist ausgesprochen lokalen Charakter von geringer Bedeutung ist.

In Übereinstimmung hiermit möchte ich betonen, daß auch wir auf Grund unserer Beobachtungen seit dem Jahre 1925, in dem wir mit umfangreichen Tuberkulinisierungen in den Geflügelbeständen begonnen haben, bestätigen können, daß Klagen über Gesundheitschädigungen in den Schweinebeständen auf ausdrückliches Befragen der Besitzer selbst in solchen ländlichen Betrieben nicht laut geworden sind, in denen ein hoher Prozentsatz der Hühner tuberkulös war.

Diese Tatsache deckt sich weiterhin vollkommen mit den auf den Schlachthöfen gemachten Feststellungen, wonach mit lokalisiert gebliebener Kehlgangs- und Gekröslymphknotentuberkulose geschlachtete Schweine gut genährt zu sein pflegen.

Ungeachtet dessen ist die Verhütung der Schweinetuberkulose allein aus hygienischen Gründen angezeigt.

Die Vorbeuge ist leicht und wirksam in der Weise durchzuführen, daß man, wie es nach Oberlandwirtschaftsrat K e i s e r bereits in Dänemark geschieht, eine Aufnahme von Geflügelkot durch Schweine bzw. die Berührung der Geflügel mit den Schweinebeständen verhütet, um eine Ansteckung der Schweine auszuschalten.

Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, die Geflügelställe nicht mehr über den Schweineställen anzubringen, sondern das Geflügel in nach modernen Grundsätzen erbauten Ställen, wie sie in erster Linie Landwirtschaftsrat R ö m e r angegeben hat, unter besseren Bedingungen als bisher zu halten.

II. Infektionsversuche an Hühnern.

Zur künstlichen Übertragung von Tuberkelbakterien des Typus avium auf Hühner haben mich verschiedene Befunde veranlaßt, die R i c h t e r s in seiner Abhandlung über „Die Empfänglichkeit des Huhnes für humane und bovine Tuberkelbazillen“ niedergelegt hat.

Unter diesen interessierte mich besonders ein zufälliger Nachweis zahlreicher Tuberkelbakterien in Blutausschpräparaten vom Huhn 2—3 Tage nach der Infektion und das weitere Ergebnis seiner Versuche, nach denen bei künstlich infizierten Hühnern Tuberkelbakterien im strömenden Blute durch Kulturverfahren vom 2.—7. Tage, also im Frühstadium der Tuberkulose, zu ermitteln sind; ferner die Tatsache, daß es R i c h t e r s in einigen Eiern zweier Hühner im ersten Stadium der tuberkulösen Erkrankung gelungen ist, Tuberkelbakterien in großer Menge nachzuweisen.

Bereits im Jahre 1895 hat A r t a u l t in im Handel befindlichen Hühnereiern Tuberkelbakterien dadurch nachgewiesen, daß er durch subkutane Verimpfung von etwas Inhalt solcher Eier Kaninchen tuberkulös machte.

1907 haben K o c h und R a b i n o w i t s c h gefunden, daß das Ei bei spontaner Vogeltuberkulose infiziert sein kann.

Im Jahre 1924/25 veröffentlichten F i t c h, L u b b e h u s e n und D i k m a n s das Ergebnis der Untersuchung von 676 Eiern tuberkulöser Hühner, von denen annähernd 1 Prozent virulente Tuberkelbakterien enthielt.

Auf Grund seiner 1913 erhobenen Tuberkelbakterienbefunde in jungen Eiern spontan erkrankter Hühner hat Löwenstein als erster die Vermutung ausgesprochen, daß durch die ausgetragenen Eier die Gelegenheit zur Nahrungsinfektion bei Menschen gegeben ist, um so mehr, als die Bakterien eine höhere Wärmereistenz besitzen, als man bisher angenommen hat.

Hierdurch ist eine sowohl hygienisch wie wirtschaftlich außerordentlich wichtige Frage aufgeworfen worden, die wir in Fortsetzung unserer bisherigen Untersuchungen über die Geflügeltuberkulose nach zwei Richtungen hin zu lösen versucht haben.

In erster Linie sollte festgestellt werden, in welchen Stadien die von tuberkulösen Hühnern gelegten Eier Tuberkelbakterien enthalten, und zweitens, wie lange solche Eier gekocht werden müssen, um sie für den Genuß tauglich zu machen.

Zur Durchführung dieser Versuche haben wir am 25. April d. Js. 3 klinisch gesunde und nach dem Ausfall der Tuberkulinreaktion als tuberkulosefrei ermittelte Legehennen in der Weise künstlich infiziert, daß wir ihnen je 8 ccm einer starken Aufschwemmung von Reinkulturen von verschiedenen Stämmen des Typus avium, die im Laufe des letzten Jahres aus tuberkulösen Hühnern gezüchtet waren, mittels Pipette in den Kropf verabfolgten und ferner mit einem Platinspatel je ein fast erbsengroßes Klümpchen Reinkultur auf der Schleimhaut des Rachens und der Zunge verrieben.

Außerdem wurde diesen Hühnern ganz frisches tuberkulöses Material in Form zweier stark tuberkulösen Hühnerlebern, in Stückchen geschnitten, im Zwischenraum von acht Tagen zum Fressen vorgelegt. Das Infektionsmaterial wurde bis auf 2 Stückchen mit Begier aufgenommen.

Wir setzten diese Tiere einer besonderen kräftigen Infektion aus, um sicher und ohne Zeitverlust zum Ziele zu kommen.

Daß die Ansteckung gut vertragen wurde, bewies die ununterbrochene Fortsetzung der Legetätigkeit und das sonstige anhaltende Wohlbefinden der Tiere.

Da von den verschiedensten Autoren, insbesondere auch von A. Eber und meinem Mitarbeiter F. Schmidt, in einem sehr hohen Prozentsatz das Knochenmark erkrankt gefunden wurde, mußte angenommen werden, daß im Gegensatz zu den Verhältnissen beim Säugetier beim Geflügel die Blutbahn eine wichtige Rolle für die Pathogenese der Tuberkulose spielt.

Im Hinblick darauf ist bei den Infektionsversuchen der Fütterungsweg gewählt worden, um zu sehen, ob danach die Krankheitserreger im Blute auftreten, wie es Richters vom 2.—7. Tage nach der Infektion beobachtet hat.

Bereits am 27. April, also 2 Tage, und ebenso am 28. April, also 3 Tage nach der ersten Infektion per os, wurde den 3 Hennen aus der Flügelvene Blut entnommen und auf das Vorhandensein von Geflügeltuberkelbakterien sowohl mikroskopisch als auch im Kulturversuch auf Lubenau- und Petroffnährböden geprüft.

Es gelang zwar in den Blutaustriichen in keinem Falle mikroskopisch Tuberkelbakterien nachzuweisen, wohl aber konnten in sämtlichen Kulturen aus dem Blute der drei Versuchshühner nach zweimonatiger Bebrütung bei 37 und 45 Grad C im mikroskopischen Ausstrich Tuberkelbakterien nachgewiesen werden, obgleich ein makroskopisch sichtbares Wachstum noch nicht eingetreten war.

Zu einer Lokalisation und nachträglichen Verbreitung der Tuberkelbakterien im Blut der Hühner konnte es zur Zeit der Blutentnahme noch nicht gekommen sein, es muß sich vielmehr um einen natürlichen Einbruch von Tuberkelbakterien in die Blutbahn kurz nach der Infektion gehandelt haben.

Daraus schließen wir mit Richters, daß die Geflügel-

tuberkulose, wie die meisten anderen bakteriellen Krankheiten, in ihrem Frühstadium als Bakteriämie verläuft.

Nach diesen Untersuchungen gingen wir dazu über, nachzuprüfen, am wievielen Tagen nach der Infektion der Hühner die ersten Tuberkelbakterien in den Eiern aufzufinden waren.

Da Richters die ersten Tuberkelbakterien im Ei 11 Tage nach erfolgter Infektion beobachtet hatte und wir durch orientierende Vorversuche ermitteln konnten, daß am 7. und 8. Tage nach der künstlichen Ansteckung die Eier noch frei von Tuberkelbakterien waren, begannen wir vom 10. Tage ab mit der systematischen Durchprüfung der Eier der tuberkulösen Hennen, denen am 1. Mai noch ein viertes, uns zu Versuchszwecken eingeliefertes, aus einem kranken Bestande stammendes tuberkulöses Huhn zugefellt war.

Die Untersuchung der ersten 12 Eier, die in der Zeit vom 5.—9. Mai, also 10—14 Tage nach der Infektion, gelegt waren, erfolgte mikroskopisch und kulturell, während 52 in der Zeit vom 12. Mai bis 24. Juni, also 17—60 Tage nach der Infektion, gelegte Eier lediglich mikroskopisch auf das Vorhandensein von Tuberkelbakterien geprüft wurden.

Da durch das Sedimentierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Antiformin und Schwefelsäure zur Einengung der etwa im Eidotter oder Eiweiß befindlichen Tuberkelbakterien eine Anreicherung nicht erfolgte — Versuche, die noch fortgesetzt werden sollen — haben wir sowohl zur mikroskopischen als auch kulturellen Untersuchung mit der Platinöse Material direkt aus Eiweiß und Eigelb entnommen, nachdem die Eier in folgender Weise vorbehandelt waren:

Die von anhaftendem Schmutz durch Abbürsten in lauwarmem Wasser befreiten Eier wurden auf mindestens 1/2 Stunde in 70proz. Alkohol gelegt, danach leicht abgebrannt, mit sterilem Messer ange schlagen, das Eiweiß und Eigelb getrennt in sterile Petrischalen gebracht und zunächst mehrere Ösen mit Eigelb und Eiweiß auf Petroff- und Lubenau-nährböden übertragen, die bei 37 und 45 Grad bebrütet wurden.

Im Anschluß daran wurden aus demselben Material mikroskopische Ausstriche angefertigt.

Der erste mikroskopische Nachweis von Tuberkelbakterien im Ei gelang uns ebenso wie Richters am 11. Tage nach der künstlichen Infektion der Hennen, und zwar waren die Erreger sowohl im Eiweiß wie im Eigelb enthalten.

Von in der Zeit vom 5. bis 9. Mai, 10—14 Tage nach der Infektion gelegten 12 Eiern, konnten bei 8 Eiern im Eiweiß und bei 5 von diesen auch im Eigelb Tuberkelbakterien nachgewiesen werden. Bei den restlichen 4 am 10., 13. und 14. Tage nach der Infektion gelegten Eiern verlief die mikroskopische Untersuchung negativ.

Das Ergebnis des Kulturversuches deckte sich nicht ganz mit dem der mikroskopischen Untersuchung. So ist es interessant, daß der erste kulturelle Nachweis von Tuberkelbakterien uns bereits in einem am 10. Tage nach der Infektion gelegten Ei möglich war.

Auch in den weiteren 3 mikroskopisch frei von Tuberkelbakterien gefundenen Eiern gelang es durch den Kulturversuch, Tuberkelbakterien nachzuweisen. Hingegen versagte der Kulturversuch in zwei Fällen mit mikroskopisch positiven Ausstrichpräparaten.

Hervorheben möchte ich, daß nur in einem Falle ein makroskopisch sichtbares Wachstum auf einer 6—7 Wochen bei 37 Grad bebrüteten Lubenaukultur zu verzeichnen war und in den übrigen Fällen die Feststellung nur durch systematische mikroskopische Untersuchung von Kulturausstrichen, und zwar unter Zuhilfenahme des Kreuztisches erfolgte.

Diese Versuche zeigen, eine wie wertvolle Ergänzung des mikroskopischen Befundes das Kulturverfahren darstellt, denn es wurden durch diese kombinierte Methode in sämtlichen vom 10.—14. Tage gelegten Eiern, also in 100 Prozent, Tuberkelbakterien ermittelt.

Aus äußeren Gründen mußte sich die weitere Untersuchung von 52 in der Zeit vom 12. Mai bis 24. Juni, also $2\frac{1}{2}$ — $8\frac{1}{2}$ Wochen nach der Infektion unserer Versuchshennen, gelegten Eiern auf den mikroskopischen Nachweis beschränken.

Nach einer negativen Phase vom 12. bis etwa 18. Mai konnten erneut Tuberkelbakterien am 25., 26., 29., 33. und 35. Tage festgestellt werden, und zwar davon sechsmal im Eiweiß und nur einmal am 35. Tage im Eigelb.

Weitere Befunde von Tuberkelbakterien wurden am 38., 41., 42., 48., 50., 51. und 60. Tage im Eiweiß, am 44., 51., 58. und 59. Tage im Eigelb erhoben.

Im ganzen wurden jedenfalls unter 52 mikroskopisch untersuchten Eiern, die innerhalb von 2 Monaten nach der Infektion gelegt waren, 19, d. h. 36,5 Prozent, mit Tuberkelbakterien behaftet gefunden, davon das Eiweiß 15mal und das Eigelb sechsmal, doch nur bei 2 von diesen 19 Eiern erwiesen sich gleichzeitig Eiweiß und Eigelb infiziert.

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daß auch im späteren Stadium der tuberkulösen Erkrankung bakterienhaltige Eier gelegt werden, die zahlreiche Tuberkelbakterien beherbergen, denn andernfalls wäre uns der mikroskopische Nachweis in Ausstrichpräparaten kaum gelungen.

Im Anschluß daran gingen wir zu Kochversuchen über. Nach Löwenstein's Untersuchungen sind die Tuberkelbakterien im Ei durch das Weichkochen bis an die Grenze des Hartwerdens nicht abzutöten. Setzte er das Kochen länger als üblich fort, so gelang die Reinkultur aus dem krümelig hart gewordenen Eidotter nicht mehr.

Durch einen orientierenden Vorversuch konnten wir bald feststellen, daß bei frischen Trinkeiern ebenso wie bei älteren Eiern nach 5 Minuten langem Kochen das Eiweiß geronnen und das Eigelb mit Ausnahme einer ca. 2 mm starken Randzone flüssig, nach 10 Minuten langem Kochen Eiweiß wie Eigelb vollkommen geronnen waren.

Da durch den Kulturversuch zum Nachweis von Tuberkelbakterien im natürlich infizierten Hühnerei nur in einem Falle, wie bereits erwähnt, makroskopisch sichtbares Wachstum festzustellen war, wir bei den Kochversuchen zur Ermittlung lebens- und vermehrungsfähiger Tuberkelbakterien aber auf den makroskopischen Befund im Reagenzglas angewiesen waren, verwendeten wir, um Fehlschläge und Zeitverluste bei den ohnehin langwierigen Züchtungsversuchen auszuschalten, Hühnereier, die künstlich einer verhältnismäßig kräftigen Infektion mit Geflügelbakterien ausgesetzt wurden.

Die Schale der Eier wurde mit warmem Wasser gereinigt, am abgerundeten Pol mit Alkohol und Äther desinfiziert, darauf flambiert und an diesem Pol mittels sterilen Drillbohrers eine feine Öffnung gemacht. Durch diese wurde je 0,1 ccm einer mit Tusche gefärbten Abchwemmung von einer 2 Wochen alten aus einem Kranich gezüchteten Reinkultur zweiter Generation mittels Rekordspritze in das Weiße und Gelbe von 18 Hühnereiern gespritzt.

Die Eier wurden nun in kochendes Wasser mit starkem Salzzusatz gebracht, da hierdurch das Auskochen der verletzten Schale verhindert wird.

Von diesen 18 Eiern wurden drei Stück 3 Minuten, zwei 4 Minuten, drei 5 Minuten, je zwei 6, 7, 8, 9 und 10 Minuten lang gekocht.

Die Eier wurden hierauf mit ausgekochtem Löffel dem Kochwasser entnommen und in sterilem Mörser mit steriler Kochsalzlösung abgeschreckt, darauf mit sterilen Instrumenten gehäut, halbiert und von den durch die Tusche gekennzeichneten Stellen mit der Platinöse bzw. -spatel, Infektionsmaterial entnommen und auf Lubenau- und Petroffnährböden übertragen.

In einem Doppelversuch bei 37 und 45grädiger Bebrütungstemperatur war gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, die Helm'schen Angaben bezüglich des schnelleren

und kräftigeren Wachstums bei höheren Temperaturen nachzuprüfen.

Bei den 3 Minuten lang gekochten Eiern war das Eiweiß zum größten Teil, das Eigelb vollkommen flüssig. Bei den höheren Kochzeiten von 4 Minuten ab war das Eiweiß geronnen, das Eigelb vom Rande aus nach dem Zentrum zu fester werdend, bis schließlich nach einer 9 Minuten langen Kochzeit eine vollkommene Gerinnung eingetreten war.

Wir haben 146 Kulturversuche ausgeführt und hierbei festgestellt, daß wesentlich günstigere Ergebnisse bei einer Bebrütungstemperatur von 37 Grad erzielt wurden als bei der von Helm angegebenen Temperatur von 45 bis 47 Grad C.

Bei einer Beobachtungsdauer von insgesamt 6 Wochen gelang der Nachweis von lebenden Tuberkelbakterien im Eiweiß lediglich nach 3 Minuten, im Eigelb dagegen bis zu 5 Minuten langer Kochzeit, nach 6 Minuten nicht mehr.

Fassen wir unsere Versuchsergebnisse zusammen, so läßt sich sagen, daß sich in den Eiern tuberkulöser Hühner sowohl im ersten wie im späteren Stadium der Erkrankung Tuberkelbakterien in mehr oder weniger großer Zahl feststellen lassen, daß aber solche Eier durch länger als 5 Minuten währendes Erhitzen für den Genuß mit Sicherheit unschädlich gemacht werden können. Da, wo harte Eier gut vertragen werden, steht dem Kochen bis zum Hartwerden nichts im Wege, denn Scheunert und Wagner haben nachgewiesen, daß Weich- und Hartei in ihrem Nährwert sich nicht voneinander unterscheiden und sogar durch ein 10 Minuten langes Erhitzen keine Zerstörung der Eiweißkörper herbeigeführt wird.

Für die Beurteilung der von tuberkulösen Hühnern ausgehenden Gefahr ist m. E. zunächst in Betracht zu ziehen, daß trotz der großen Verbreitung der Geflügeltuberkulose und der allgemeinen Gewohnheit, rohe bzw. weich gekochte Eier zu essen, seit 1893 nur 21 Einzelfälle von spontaner Hühnertuberkulose beim Menschen, und zwar erstmalig von Kruse, darauf 1894 von Pansini, 1898 von Nocard, 1905 und 1913 von Löwenstein, 1907 von Koch und Rabinowitsch, 1911 von Jansco und Elfer, 1913 von Lipschütz, ferner 1922 von Rennen, 1923 von Lederer sowie von Joannovic, 1925 von Neumann, Behr und Deutsch beschrieben worden sind.

Von diesen wenigen Fällen halten nicht einmal alle einer scharfen Kritik stand, denn es können von den aufgezählten Fällen nur 7 (Löwenstein 1905, Koch und Rabinowitsch 1907, Löwenstein 1913 mit 3 Fällen und Joannovic 1923 mit 2 Fällen) auf Grund des Tierversuches eindeutig als Geflügeltuberkulose beim Menschen angesprochen werden.

Auch nach Fitch, Lubbehusen und Dikmans wird man die Ansteckungsfähigkeit nicht allzu groß einzuschätzen haben, da sie bei der Untersuchung von 676 Eiern in weniger als 1 Prozent virulente Tuberkelbakterien gefunden haben.

Hierzu kommt, daß in keinem Falle einwandfrei ermittelt wurde, auf welchem Wege die Ansteckung beim Menschen zustande gekommen ist, ob beim Umgang mit krankem Geflügel oder durch den Genuß infizierter Eier, eine Möglichkeit, die allerdings die nächstliegende ist.

Wenn diese Annahme zutrifft, können die außerordentlich wenigen Fälle bei unserer heutigen Kenntnis der Verhältnisse wohl nur so erklärt werden, daß die erkrankten Menschen zufällig fortgesetzt große Mengen roher oder nicht genügend gekochter Eier tuberkulöser Hühner gegessen haben, oder aber eine besondere Disposition für die Ansteckung besaßen, oder es trafen beide Voraussetzungen zusammen.

Bekanntlich hat im Jahre 1924 Löwenstein Veranlassung genommen, das Krankheitsbild der Hühnertuber-

kulose beim Menschen pathologisch, anatomisch, bakterio-
logisch, biologisch und klinisch eingehend zu kennzeichnen.

Klinisch hat die Hühnertuberkulose des Menschen eine ausgesprochene Tendenz zur Septikämie-Erzeugung. Immer ist ein Milztumor vorhanden, als Prädilektionsstellen gelten Knochenmark und Nieren. Es kommt zu Fieberperioden, die monatelang bestehen können. Dazwischen treten fieberfreie Intervalle auf. Der Fiebertypus ist durch niedrige Morgen- und hohe Abendtemperaturen charakterisiert. Gegen das Lebensende kommt es zu einer durch Antipyretica nicht zu beeinflussenden Continua. Lediglich sehr starke Nachtschweisse lenken den Verdacht auf Tuberkulose hin.

Liegen derartige Verdachtsfälle vor, wird es Sache des behandelnden Arztes sein, einen genauen Vorbericht darüber aufzunehmen, ob der Patient sich viel mit tuberkulösem Geflügel beschäftigt oder ob er längere Zeit hindurch Eier aus tuberkulösen Geflügelbeständen genossen hat.

Solche Ermittlungen werden sich sowohl auf dem Lande als auch in der Stadt anstellen lassen, falls dort die Eier von Geschäften bestimmter Lieferanten bezogen wurden.

Hierzu kommt, daß vielfach größere eierproduzierende Betriebe ihre Ware abgestempelt in den Verkehr bringen.

Es könnte dann der Infektionsquelle unschwer nachgegangen und eine Sanierung der Bestände veranlaßt werden.

Ferner sollte es in Verdachtsfällen von Hühnertuberkulose bei Menschen niemals unterlassen werden, eine Klarstellung dadurch herbeizuführen, daß eine Tuberkulinsierung sowohl mit Säuger- als auch ganz besonders mit dem in der Humanmedizin wohl nur ausnahmsweise angewandten Geflügeltuberkulin vorgenommen wird. Auch müßte eine eingehende bakteriologische Untersuchung der Sekrete und Exkrete bzw. nach Todesfällen der in Betracht kommenden Organe durch Kultur- und Tierversuch veranlaßt werden.

Da nach Löwenstein mehr Fällen von Tuberkulose-septikämie, als man bisher annimmt, Infektionen mit Hühnertuberkelbakterien zugrunde zu liegen scheinen, dürfte es für die Human- und Veterinärmedizin eine dankenswerte Aufgabe sein, zur völligen Klarstellung dieser wichtigen Frage beizutragen.

Nach Helm herrscht „Übereinstimmung darüber, daß Bazillen des humanen und bovinen Typs bei Temperaturen über 40 Grad nicht mehr angehen, während der Geflügelbazillus gerade bei 45 Grad und sogar noch darüber üppig gedeiht“. Bei der Durchführung unserer Versuche bot sich Gelegenheit, auch dieser Frage nachzugehen, und zwar nach der Richtung, daß wir festzustellen versuchten, ob die oft sehr langwierigen Züchtungsversuche von Geflügeltuberkelbakterien, z. B. bei der Prüfung von Desinfektionsmitteln, durch höhere Bebrütungstemperaturen abgekürzt werden können.

Um die Vorteile der Methode einwandfrei festzustellen, wurden vergleichende Versuche bei 37 und zunächst 47 Grad C angesetzt.

In jedem Falle wurden frische Eiernährböden nach Lubenau, nach der Modifikation von Hohn, nach Petroff und nach Besredka verwandt.

Ein Desinfektionsversuch, in dem der Einfluß verschieden prozentiger Lösungen von Lysoform und Sagrotan auf Geflügeltuberkelbakterien unter Verwendung von 50 Kulturen geprüft wurde, zeitigte einschließlich der Kontrollen innerhalb 14 Tagen ein negatives Ergebnis, und zwar sowohl bei 37 als auch bei 47 Grad.

Die 47grädigen Kulturen wurden darauf weitere drei Wochen bei 45 Grad beobachtet, ohne daß sich das Ergebnis änderte. Nach dieser Zeit wurde die Temperatur auf 42 Grad herabgesetzt und die Kulturen nochmals 3 Wochen bei dieser Temperatur bebrütet.

Es zeigte sich aber auch jetzt, also nach 8 Wochen, noch kein makroskopisch sichtbares Wachstum, während im Kontrollversuch bei 37 Grad C von der vierten Woche ab eine

makroskopisch sichtbare Entwicklung der Tuberkelbakterien stattfand.

Hätte man im Vertrauen auf die Helm'schen Feststellungen sich lediglich auf die höheren Temperaturen von 42—47 Grad verlassen, so hätte man hinsichtlich der Wirksamkeit der Desinfektionsmittel eine Täuschung erlebt.

Des weiteren wurde ein vergleichender Züchtungsversuch aus tuberkulösen Hühnerorganen nach der Hohn'schen Methode bei 37 und 47 Grad C angestellt.

Innerhalb 5 Tagen wies von 4 bei 47 Grad gezüchteten Besredka-Kulturen nur eine einen geringen Gehalt an Tuberkelbakterien auf, während von 4 gleichaltrigen 37grädigen Besredka-Röhrchen 3 Tuberkelbakterien in größerer Anzahl enthielten.

Der Ausfall der mit dem gleichen Material besickten Lubenaukulturen mußte ebenfalls zugunsten der Bebrütungstemperatur von 37 Grad entschieden werden.

Übertragungsversuche von Laboratoriumstämmen schienen zunächst auf eine Bestätigung der Helm'schen Befunde hinzudeuten, denn bei 2 der Reinkulturen ließ sich bereits nach 3 Tagen deutliches Wachstum auf Petroffnährböden feststellen.

Auffallenderweise blieb im Verlauf einer im ganzen 14 Tage dauernden Bebrütungszeit bei 47 Grad C eine Weiterentwicklung dieser Kulturen aus.

Auch die übrigen Reinkulturen zeigten in diesem Zeitraum geringes oder überhaupt kein Wachstum und standen damit hinter dem Ergebnis der Versuche bei 37 Grad C mehr oder weniger erheblich zurück.

Da hiernach angenommen werden mußte, daß die Temperaturen von 47 Grad über dem Wachstumsoptimum der Geflügeltuberkelbakterien liegen, wurden die Versuche auf die Dauer von 3 Wochen zunächst bei 45 Grad fortgesetzt.

Verschiedene im Laufe des letzten Jahres aus dem Tierkörper gezüchtete und auf Lubenau gebrachte Reinkulturen von Geflügeltuberkelbakterien zeigten innerhalb 24 Tagen ein durchschnittlich sehr gutes Wachstum bei 37 Grad, ein weniger günstiges bei 45 Grad C.

Eine Abimpfung (2. Generation) einer aus einem Kranich unseres Zoologischen Gartens frisch gezüchteten Geflügeltuberkelbakterienkultur auf Lubenau und Petroff zeitigte während einer Bebrütungszeit von 19 Tagen ebenfalls bei 37 Grad C ein besseres Resultat als bei 45 Grad.

In zwei Fällen von direkt aus dem Tierkörper, und zwar einmal mit und einmal ohne Anwendung der Hohn'schen Methode angestellten Züchtungsversuchen von Geflügeltuberkelbakterien waren nach 16- bzw. 18tägiger Bebrütung nennenswerte Unterschiede im Wachstum bei 37 und 45 Grad C nicht zu beobachten.

Die gleich im Anfang der Nachprüfung der Helm'schen Versuche gemachte Feststellung, daß das Wachstum von Geflügeltuberkelbakterien bei 47 Grad hinter dem bei 37 Grad zurückstand, war der Anlaß, uns an Helm mit der Bitte um eine Aufklärung zu wenden.

Er stellte uns daraufhin 9 zu seinen damaligen Versuchen benutzte Geflügeltuberkulosestämmen zur Verfügung und teilte uns mit, daß das von ihm erzielte Resultat einem einmaligen Versuch entstammte, den zu wiederholen er keine Veranlassung hatte, weil das Ergebnis sich mit den übrigen deckte und für ihn der Zweck des Versuches, die Differenzierung von Geflügeltuberkelbakterien vom humanen und bovinen Typ, erreicht war, und weil außerdem der Fortsetzung der Versuche technische Schwierigkeiten im Wege standen.

Auch er hat allerdings die Beobachtung gemacht, daß einige Stämme erst nach 14 Tagen Wachstum zeigten.

Abimpfungen der Helm'schen Kulturen auf Lubenau und Petroff letzten wir in getrennten Versuchen Temperaturen von 45 und 42 Grad C aus, daneben liefen Parallelversuche bei 37 Grad.

Mit Ausnahme der Kultur Huhn 21 zeigten fähtliche Kulturen bereits innerhalb dreier Tage deutlich wahrnehmbares, zum Teil sogar gutes Wachstum auf Petroff, das bei 45 Grad zunächst als wesentlich günstiger als bei 37 Grad zu bezeichnen war.

Auf Lubenau trat sichtbares Wachstum erst nach etwa 12 Tagen ein, war dann aber etwas günstiger bei 37 Grad als bei 45 Grad, an welchem Ergebnis auch das Herabsetzen der Bebrütungstemperatur von 45 auf ca. 42 Grad nach etwa 3 Wochen nichts zu ändern vermochte.

Ein zweiter von vornherein bei 42 Grad mit Helmschen Kulturen angestellter Zuchtungsversuch erzielte schon nach zweitägiger Bebrütung sowohl auf Lubenau als auch besonders auf Petroff zum Teil sehr gutes Wachstum.

Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen bei der Zucht unserer Kulturen und der Helmschen Stämme läßt sich sagen, daß auch für die Geflügeltuberkelbakterien eine Zuchtungstemperatur von 37 Grad die günstigere sein dürfte.

Das wird noch durch die Beobachtung bestätigt, daß zunächst bei 37 Grad bebrütete und im makroskopisch sichtbarem Wachstum befindliche Geflügeltuberkulosekulturen sich bei Zimmertemperatur vorzüglich weiter entwickeln, was bei den Bakterien vom Typus humanus und bovinus nicht der Fall ist.

III. Prüfung von Desinfektionsmitteln.

Die Tatsache, daß die Schutzimpfung bisher keine für die Praxis brauchbaren Ergebnisse gezeitigt hat und daher die Desinfektion eine ganz besonders große Rolle bei der Bekämpfung der Geflügeltuberkulose spielt, hat uns veranlaßt, die Prüfung von Desinfektionsmitteln auf ihre bakterizide Wirkung gegenüber den Geflügeltuberkelbakterien fortzusetzen, zumal die Tenazität der Geflügeltuberkelbakterien eine größere ist als diejenige der Säugerbakterien.

Nach Maffucci's Untersuchungen vom Jahre 1890 sind die Geflügeltuberkelbakterien wesentlich hitzeresistenter als Säugertuberkelbakterien.

Kitt gibt an, daß ein Umstechen von zweijährigen Reinkulturen von Geflügeltuberkelbakterien im Gegensatz zu menschlichen und Rindertuberkelbakterien unschwer gelingt und Löwenstein fand eine Reinkultur von Geflügeltuberkelbakterien sogar noch nach 10 Jahren lebend.

Auch Koch und Rabinowitsch betonen die längere Lebensdauer der Geflügeltuberkelbakterien.

Unsere Untersuchungen erstreckten sich auf Rohchloramin und Sputamin, Mianin, T-B-Bacillol, Desintol, Tuspitol, chemisch reine Karbolsäure, Sagrotan und Lysoform.

Zur Anwendung gelangte die Koch'sche Seidenfadenmethode mit nachfolgender Entgiftung durch 1/2prozentige Lösungen von Ammoniak bei Chlor- und Formalinpräparaten, von Kali- oder Natronlauge bei Phenolen und Kresolen.

Zu den ersten Versuchen zogen wir vergleichsweise Batiststoffstückchen als Keimträger heran, von deren Anwendung wir aber abfahen, als Unterschiede in den Ergebnissen nicht zu beobachten waren.

Ohne Ausnahme benutzten wir jedoch zum Imprägnieren der Fäden Kulturaufschwemmungen mit und ohne Serumzusatz (1 Stunde bei 56 Grad C im Wasserbade inaktiviertes Pferdeserum).

Vorweg sei hier bemerkt, daß Abweichungen im Wachstum der Kulturen von mit und ohne Serumzusatz behandelten Fäden nicht ermittelt wurden.

Um zu einwandfreien Ergebnissen zu gelangen, wechselten wir mit den Kulturen und verwandten, nachdem wir unsere ersten im Jahre 1926 begonnenen Untersuchungen mit dem zweijährigen Laboratoriumstamm L 1064/24 angestellt hatten, in sechs späteren, in der Zeit vom 5. November 1927 bis 25. Mai 1928 durchgeführten Versuchen 5 zum Teil ganz

frisch aus dem Tierkörper gezüchtete Geflügeltuberkelbakterienstämme.

Die Übertragung der desinfizierten Fäden erfolgte auf möglichst frisch hergestellte, feste und flüssige Eiernährböden (Lubenau, Petroff, Besredka).

In allen Fällen von makroskopisch nicht erkennbarem Wachstum in Besredka-Röhrchen, was bei gutem Gelingen des durchsichtigen Nährbodens unschwer möglich ist — in positiven Kulturen tritt ein deutlich sichtbares Wachstum an den Fäden selbst und auf dem Boden des Kulturröhrchens ein — wurden entweder direkt aus dem Bodensatz oder vom Sediment des Zentrifugates Übertragungen auf Lubenau oder Petroff zur Nachkontrolle des Befundes vorgenommen.

Das Ergebnis unserer an einem Kulturmaterial von etwa 800 Röhrchen angestellten Versuche läßt sich dahingehend zusammenfassen, daß die Chlorpräparate Rohchloramin und Mianin zur Abtötung von Geflügeltuberkelbakterien ungeeignet sind, da selbst 6prozentige Lösungen nach sechsstündiger Einwirkungszeit die Keime ausnahmslos zur Entwicklung kommen ließen.

Auch das speziell zur Sputumdesinfektion bestimmte, durch einen Farbstoffzusatz gekennzeichnete und in 6prozentiger Lösung anzuwendende Chloramin-Präparat „Sputamin“ verlagte noch in 7prozentiger Lösung bei sechsstündiger Einwirkungszeit.

Eindeutig in seiner günstigen Wirkung zeigte sich in sämtlichen Versuchen unter Anwendung der vorgeschriebenen 5prozentigen Lösungen das T-B-Bacillol.

Eine Abtötung der Geflügeltuberkelbakterien trat regelmäßig bereits nach 15 Minuten ein.

Als etwa gleichwertig dürften ihm nach unseren bisherigen Versuchen 5prozentige Lösungen von Karbolsäure und evtl. auch von Tuspitol, dessen Prüfung allerdings noch nicht ganz abgeschlossen ist, zur Seite zu stellen sein.

5prozentige „Desintol“-Lösungen vermochten Geflügeltuberkelbakterien innerhalb 30 Minuten dagegen noch nicht abzutöten.

Als gänzlich ungeeignet zur Abtötung von Geflügeltuberkelbakterien mußte aber nach unseren Versuchen außer den Chlorpräparaten auch Lysoform bezeichnet werden, da 1-, 2-, 3- und 5prozent. Lösungen bis zu fünfstündiger Einwirkung die Keime in keinerlei Weise zu beeinflussen vermochten.

Auch die Wirkung von Sagrotan in 2-, 3- und 5prozentigen Lösungen ist für Geflügeltuberkelbakterien eine beschränkte, da bis zu einer 60 Minuten dauernden Behandlung die Erreger noch zur Entwicklung gelangen.

Hier ist zu ergänzen, daß Unterschiede zwischen den Ergebnissen mit frisch aus dem Tierkörper gezüchteten Geflügeltuberkelbakterien und dem älteren Laboratoriumstamme nicht beobachtet werden konnten.

Man wird also aus vorstehenden Ergebnissen die Schlußfolgerung ziehen, daß von der Anwendung von Chlorpräparaten zur Desinfektion von Geflügeltuberkelbakterien abzusehen ist.

Daselbe trifft für Lysoform zu und ebenso würde, da an besser wirkenden Mitteln kein Mangel ist, auch Sagrotan auszuschließen sein. Von den aus der Gruppe der Phenole und Kresole geprüften 4 Präparaten, die mit einer gewissen Einschränkung für Desintol durchweg eine gute Desinfektionswirkung zeigten, ist der Vorzug dem T-B-Bacillol und der Karbolsäure zu geben.

Bezüglich der Karbolsäure ist zu bemerken, daß unsere Feststellungen eine gute Bestätigung der Desinfektionsmethode der Amerikaner sind, die heute noch zur Desinfektion von Geflügelställen Karbol in 5prozentiger Lösung empfehlen.

Da bei der Wahl eines Desinfektionsmittels nicht nur seine zuverlässige Wirkung, sondern auch der Preis eine ent-

scheidende Rolle spielt, dürfte im Hinblick darauf die Karbolfäure noch das T-B-Bacillol übertreffen.*)

Bei den bakteriologischen Arbeiten hat mich die technische Assistentin, Frl. E. Wiegert, in dankenswerter Weise unterstützt.

Literatur.

Eber (1924): „Die Tuberkulose des Hausgeflügels“. Zeitschrift für Infektionskrankheiten der Haustiere, Bd. 25. — van Es und Martin (1925): „An Inquiry into the cause of the Increase of Tuberculosis of Swine.“ Research Bulletin 30 Agricultural Experiment Station University of Nebraska. — Helm (1928): „Das Vorkommen von Geflügeltuberkulose beim Schwein. Zugleich ein Beitrag zur Züchtung der Tuberkelbazillen nach der Methode von Hohn.“ Archiv für wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde, Heft 3, Band 57. — Junack (1913): „Über das Vorkommen von Geflügeltuberkelbazillen beim Schweine.“ Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene, 23. — Keiser (1927): Diskussionsbemerkung. D. T. W., Nr. 12, S. 193. — Kitt (1908): „Bakterienkunde und pathologische Mikroskopie.“ 5. Auflage. Verlag: Moritz Perles, Wien. — Koch und Rabinowitsch (1907): „Die Tuberkulose der Vögel und ihre Beziehungen zur Säugetiertuberkulose.“

*) Nach einem in Nr. 29 der Tierärztlichen Rundschau vom 15. Juli 1928 erschienenen Referat Breithor's über „Fortschritte in der Tierseuchenbekämpfung in den Vereinigten Staaten“ wird unter dem Abschnitt über die Bekämpfung der Geflügeltuberkulose gesagt, daß die Geflügeltuberkelbazillen auch strenger Winterkälte gegenüber Widerstand leisten, denn in einem infizierten Stall, der vom 1. November bis 1. April ohne Desinfektion leer gestanden hat, erkrankten die hineingebrachten jungen Hühner und jungen Schweine an Geflügeltuberkulose.

kulose.“ Virchows Archiv, Bd. 190, Beiheft. — Koizumi (1925): „Knochenmark und Tuberkulose.“ Zentralblatt für Bakteriologie, Abteilung Referate, Bd. 81, Heft 1/2. — Löwenstein (1926): „Das Krankheitsbild der Hühnertuberkulose beim Menschen.“ D. T. W., Nr. 36. — Maffucci (1890): „Beitrag zur Ätiologie der Tuberkulose (Hühnertuberkulose).“ Zentralblatt für allgemeine Pathologie, Bd. 1, Nr. 13. — Plum (1925): „Geflügeltuberkulose bei Säugetieren.“ Veröffentlichung des Serumlaboratoriums der Kgl. Tierärztlichen und Landwirtschaftlichen Hochschule. Verlag: Kandrups & Wunsch, Kopenhagen. — Raebiger (1927): „Der derzeitige Stand der Bekämpfung der Tuberkulose des Hausgeflügels.“ D. T. W., Nr. 48. — Raebiger, Spiegl und Schmidt-Hoensdorf (1928): „Versuche zur Übertragung von Geflügeltuberkelbazillen auf Schweine.“ Zeitschrift für Infektionskrankheiten, parasitäre Krankheiten und Hygiene der Haustiere, Bd. 33, Heft 1—3. — Richters (1927): „Die Empfänglichkeit des Huhnes für humane und bovine Tuberkelbazillen.“ Zeitschrift für Veterinärkunde, Heft 4. — Römer (1926): „25 Jahre Lehr- und Versuchsanstalt für Geflügelzucht Halle a. S.-Cröllwitz.“ Arbeiten der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen, Heft 47. — Scheunert und Wagner (1928): „Über den Einfluß des Kochens auf den Nährwert des Hühnerfleisch.“ Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene, Heft 16. — Schmidt (1928): „Beiträge zur Kenntnis der Geflügeltuberkulose, ihre Verbreitung, Feststellung und Bekämpfung.“ Habilitationsschrift. Verlag: Walter Kersten, Halle a. S. — Titze (1907): „Fütterungsversuche mit Hühnertuberkelbazillen an Schweinen und an einem Fohlen.“ Tuberkulosearbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamt, Heft 6. — Weber und Bofinger (1904): „Die Hühnertuberkulose und ihre Beziehungen zur Säugetiertuberkulose usw.“ Tuberkulosearbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamt, Heft 1.

Weitere Untersuchungsergebnisse über das Vorkommen von Geflügeltuberkelbazillen beim Schwein. *)

Von Dr. W. Lentz, Berlin.

Die von mir im Vorjahre gebrachte Literaturübersicht über die Beziehungen zwischen der Geflügel- und Schweinetuberkulose muß eine Ergänzung erfahren, da inzwischen ein weiterer Beitrag von Helm über das Vorkommen von Geflügeltuberkulose beim Schwein erschienen ist. Die Untersuchungen Helms setzen sich zusammen aus einer bakterioskopischen Prüfung des Organmaterials, der Einleitung von Impfversuchen bei Ratten, Meerschweinchen und Hühnern und einer kulturellen und späteren histologischen Prüfung des Untersuchungsmaterials. Helm hält es nicht für möglich, durch die bakterioskopische Prüfung oder histologische Untersuchung die tuberkulösen Veränderungen beim Schwein zu differenzieren, dagegen hält er den Tierversuch und die kulturelle Prüfung geeignet für diesen Zweck.

In unserem Institut gelangten durch den wissenschaftlichen Assistenten Dr. Fleischhauer im verflossenen Berichtsjahr 59 Fälle von Tuberkulose beim Schwein zur Verarbeitung und zwar 13 Fälle von generalisierter und 46 von lokaler Tuberkulose. Die Verarbeitung bestand in einer mikroskopischen und kulturellen Prüfung des Organmaterials und der Einleitung von Impfversuchen bei Meerschweinchen. Im mikroskopischen Ausstrich des Ausgangsmaterials konnten nur in 27 von 59 Fällen Tuberkelbazillen ermittelt werden und zwar nur in sechs Fällen, in denen es sich nach den weiteren Ermittlungen um Geflügeltuberkulose handelte. Im Gegensatz zu den Feststellungen anderer Autoren, die verhältnismäßig leicht im Ausstrich Tuberkelbazillen ermittelt haben wollen und häufig Lagerung der Bazillen in Verbänden festgestellt haben, waren die Tuberkelbazillen nur vereinzelt nachzuweisen, selten zu zweit parallel oder in spitzem Winkel zueinander ge-

lagert. Nur in einem Falle waren sie nesterweise gelagert und sehr leicht feststellbar. Diese Befunde decken sich mit denjenigen von Helm, dem es in Ausstrichen aus Untersuchungsmaterial auch erst nach langem Suchen gelang, einzelne oder höchstens zu zweien gelagerte Tuberkelbazillen zu ermitteln.

Zur kulturellen Prüfung des Materials fanden Eiernährböden nach William und Durdick, Glycerinagar, naturfaure Bouillon und Glycerinbouillon Verwendung. Beim Vorhandensein von genügendem Untersuchungsmaterial erfolgte die Übertragung auf die Nährböden ohne besondere Vorbehandlung, in allen anderen Fällen nach der Hohn'schen Methode. Die Geflügeltuberkelbazillen gingen in der Regel nach durchschnittlich drei Wochen an, wenn die Kulturen bei 38 Grad gehalten wurden. Die kürzeste Entwicklungsdauer betrug zehn Tage, die längste 34 Tage. Die ersten Wachstumsercheinungen waren in der Mehrzahl der Fälle in Glycerinbouillon nachzuweisen. Auf den festen Nährböden wuchsen die Bazillen in Form eines weißlichen, mattglänzenden Rasens, der eine schleimige Beschaffenheit hatte. Bei der mikroskopischen Prüfung der Kulturen konnte festgestellt werden, daß die Bazillen mehrfach keine ausgesprochene Säurefestigkeit besaßen, die sie vielmehr erst nach häufigem Überimpfen erlangten. Bei den Rindertuberkelbazillen war ein Wachstum unter 4 Wochen nicht festzustellen.

Zur Ergänzung und Sicherung der kulturellen Prüfungsergebnisse wurde das Ausgangsmaterial an Meerschweinchen verimpft. Auf die Impfung von Hühnern wurde verzichtet, da trotz mehrfacher anders lautender Untersuchungsergebnisse unserer Ansicht nach die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß Hühner auch für den bovinen Typus empfänglich sind. Hierfür sprechen die Befunde von Cadiot, Gilbert und Roger, Courmont und Dor, O. Bang und anderer Autoren. Auch eigene, noch nicht restlos zum Abschluß gekommene Infektionsver-

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 11. Juli 1928 in Breslau.

fuche, lassen gleichfalls eine Empfänglichkeit der Hühner für Tuberkelbazillen vom Typus bovinus nicht ausgeschlossen erscheinen. Sicher spielen Virulenzunterschiede bei der Übertragung eine große Rolle, auch Rasse, Alter, Haltung und Wartung der Versuchshühner sind von nicht zu unterschätzender Bedeutung. In der Summe dieser Umstände liegt vielleicht die Erklärung für die sich widersprechenden Prüfungsergebnisse der einzelnen Versuchsansteller, sofern es sich um die Verimpfung von Kulturmateriale handelt. Bei der Verimpfung von infektiösem Organismen muß noch die Möglichkeit des Vorliegens einer Mischinfektion, wie sie auch bei anderen Infektionskrankheiten häufig zu beobachten ist, in Erwägung gezogen werden. Es ist sehr wohl möglich, daß beim Vorliegen einer Mischinfektion zwischen dem Typ. bovinus und gallinaceus, bei dem schnelleren Wachstum der Geflügeltuberkelbazillen in der Kultur, der bovine Typus überwuchert wird und die Kultur das ausgesprochene Gepräge einer Geflügeltuberkelbazillenkultur zeigt. Der Meerfischweinenimpfversuch würde in einem solchen Falle durch die Einwirkung des bovinen Typus positiv ausfallen und auch die aus dem Meerfischweinen gezüchteten Kulturen würden bovinen Charakter zeigen. Ein Fall einer derartigen Mischinfektion konnte bei unseren Untersuchungen beobachtet werden.

Durch den Meerfischweinenimpfversuch konnte in 13 Fällen generalisierter Tuberkulose beim Schwein in 7 Fällen der Typus bovinus, in einem Falle eine Mischinfektion (Typ. bovinus und gallinaceus), in drei Fällen Typ. gallinaceus festgestellt werden, während zwei Fälle nicht einwandfrei zu klären waren.

Bei den 46 Fällen lokaler Tuberkulose des Schweines handelte es sich in 26 Fällen um Tuberkulose der Retropharyngeallymphknoten, 19mal waren die Darmlymphknoten erkrankt und einmal die Portaldrüsen. In 18 der 46 Fälle lokaler Tuberkulose war eine Infektion mit dem Typus bovinus festzustellen und in 20 Fällen lag eine Geflügeltuberkelbazilleninfektion vor. In fünf Fällen fiel in Übereinstimmung mit dem Kulturversuch der Tierversuch negativ aus, während drei Fälle nicht restlos geklärt werden konnten. In zwei von diesen Fällen verendeten die Meerfischweinen bei negativem Kulturergebnis vorzeitig, im dritten Fall zeigte das Versuchstier bei der Tötung und Zerlegung nach einer Beobachtungszeit von 3 Monaten Miliartuberkulose der Lungen. Eine weitere Verimpfung von Lungenmaterial dieses Tieres fiel im Tier- und Kulturversuch negativ aus.

Bei der makroskopischen Prüfung der Lymphknoten, die sich bei der späteren Prüfung als Infektionen mit Geflügeltuberkelbazillen erwiesen, lag in sechs Fällen keine, in fünf Fällen nur eine mäßige Schwellung vor. In drei

Fällen mit hochgradiger Schwellung war zweimal gleichzeitig eine strahlige Verkäsung nachzuweisen. Teilweise Verkalkung der veränderten Lymphknoten bestand in sieben der untersuchten Fälle.

Bei sechs an einem Schlachttag von Schweinen eines Schlächters entnommenen tuberkulösen Darm- bzw. Retropharyngeallymphdrüsen waren 5 Fälle von Geflügeltuberkulose nachzuweisen, an zwei weiteren Tagen bei je fünf Proben je drei Fälle, in denen es sich ebenfalls um lokale Tuberkulose, hervorgerufen durch Geflügeltuberkelbazillen handelte. Die Annahme ist nicht unberechtigt, daß diese Tiere sämtlich aus einem Bestande stammen, in dem gleichzeitig Tuberkulose des Geflügels vorlag. In dieser Richtung angestellte Nachforschungen blieben ergebnislos. Ganz allgemein werden derartige Erhebungen sich wohl nur an kleineren Schlachthöfen, nicht aber in Berlin ermöglichen lassen. Mit Rücksicht auf den Wert einer restlosen Klärung der Zusammenhänge zwischen der Geflügeltuberkulose und der Tuberkulose des Schweines wären derartige Erhebungen wünschenswert.

Eine prozentuale Berechnung der Infektionen mit dem Typus gallinaceus ist zwecklos, da diese Feststellungen bei kürzeren Beobachtungszeiten sehr großen zufälligen Schwankungen unterliegen werden. So können z. B. durch gehäufte vorübergehende Schlachtungen von Schweinen aus Beständen, in denen Infektionen mit Geflügeltuberkelbazillen vorliegen, sehr hohe Prozentätze bewirkt werden, die sich mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht decken. Zur Einleitung wirksamer Gegenmaßnahmen müßte vielmehr die Tatsache genügen, daß der Geflügeltuberkelbazillus in der Lage ist, tuberkulöse Infektionen beim Schwein zu bewirken, die wiederum, selbst wenn sie in der Regel nicht zum Tode führen, eine Wertminderung bedingen und andererseits durch Schwächung des Gesamtorganismus die Grundlage für andere Infektionskrankheiten abgeben können.

Zusammenfassung.

1. Eine Differenzierung der tuberkulösen Prozesse durch die bakterioskopische Prüfung war nicht möglich.
2. Wertvolle Dienste leisten dagegen das Kulturverfahren und der Meerfischweinenimpfversuch.
3. Der Typus gallinaceus findet sich sowohl bei lokaler wie auch bei generalisierter Schweinetuberkulose.
4. Eine Differenzierung auf Grund des makroskopischen Befundes war nicht möglich, da alle Stadien der tuberkulösen Prozesse zur Beobachtung kamen.

Literatur.

1. Lentz, W.: D. T. W. 1927, Nr. 47, S. 758/759.
2. Helm, R.: Archiv für wiss. und praktische Tierheilkunde Bd. 57, H. 3.

Beobachtungen über die bakterielle Kükenruhr in Schlesien. *)

Von Abteilungsvorsteher Dr. Lerche, Breslau.

Mit allen Kräften ist man heute bestrebt, die Geflügelzucht in Deutschland zu heben und in der Gewinnung von Eiern und Schlachtgeflügel uns unabhängig vom Auslande zu machen. Wie ein Hemmschuh wirkt aber auf die zuversichtlich vorwärts strebenden Geflügelzüchter die bakterielle weiße Kükenruhr, eine Krankheit, auf welche heute alle mit Bangen und Sorge blicken. Seit die künstliche Brut mit Apparaten im Großen einsetzte und ein lebhafter Handel mit Eintagsküken Platz griff, hat sich diese bis vor wenigen Jahren nur im Ausland bekannte Seuche auch in Deutschland verlustbringend ausgedehnt. — Heute kennen wir die bakterielle Ruhr in fast allen deut-

schen Provinzen und auch in Schlesien haben wir in reichem Maße mit ihr Bekanntschaft schließen müssen. — Seit 1925 wurde sie durch das Bakteriologische Institut der Landwirtschaftskammer in 58 Geflügelbeständen festgestellt. Während dieser drei Jahre gelangten 190 Hühnerküken, 42 erwachsene Hühner und 4 Entenküken mit einer Pullorum-Infektion zur Einföndung. In sechs Beständen konnten außerdem zahlreiche Blut- und Eieruntersuchungen vorgenommen werden.

Es wird Sie Wunder nehmen, daß sich unter den aufgezählten Tierarten auch Enten befinden. Bisher waren wir der Ansicht, daß die Kükenruhr eine spezifische Erkrankung des Huhnes ist. Dem scheint aber nicht so zu sein. In beiden Beständen, aus denen mir Entenküken vorlagen, waren die Eier maschinell erbrütet, und in einem Falle erkrankten gleichzeitig mit den Enten auch Hühner-

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 11. Juli 1928 in Breslau.

küken. Wenn die Entenerkrankungen sich bisher auch nur auf einzelne Fälle beschränken, müssen wir damit rechnen, daß auch die bakterielle weiße Ruhr unter diesen Tieren mehr um sich greift, sobald Enten mehr als bisher künstlich erbrütet werden und sobald ihre Zucht umfangreicher wird. Die Verluste, welche in den Entenkükenbeständen durch die Kükenruhr bewirkt wurden, betrugen 10—20 Prozent. Auch unter den Hühnerküken sind die Verluste durch die Pulloruminfektion vielfach nicht höher. So gingen sie in manchen Farmen nicht über 8—10 Prozent hinaus, obwohl die erwachsenen Hühner schwer verfeuchtet waren; in einigen Geflügelzuchten starben 14—18 Prozent Küken und in der Hälfte infizierter Herden gingen 20—30 Prozent zugrunde. Nur in einem Drittel aller Kükenruhrbestände belief sich die Mortalität auf 50—100 Prozent. Nicht unbedeutend kann auch die Sterblichkeit unter den erwachsenen Hühnern sein. In zwei Beständen starben durchschnittlich 10 Prozent.

Bei der Untersuchung erwachsener Hühner stößt man vielfach auf Schwierigkeiten, wenn man festlegen will, ob man als Erreger der jeweils herrschenden Seuche das *Bacterium pullorum* oder *gallinarum* vor sich hat, oder anders gesprochen, ob die weiße bakterielle Kükenruhr oder ob Hühnertyphus vorliegt. Mit der Differenzierung dieser beiden Krankheiten haben sich schon viele Autoren beschäftigt und auch mir hat sie viele Schwierigkeiten bereitet. Um zu einem verwertbaren Ergebnis zu kommen, beschränkte ich mich nicht, wie es die meisten Versuchsansteller zu tun pflegten, auf die Untersuchung weniger Stämme, sondern ich prüfte eine möglichst große Zahl solcher Stämme aus Hühnern, Küken und Eiern bezüglich ihres kulturellen, biochemischen und serologischen Verhaltens. Auch berücksichtigte ich den klinischen und pathologischen Befund sowie den Verlauf der Seuche. Die Untersuchung von 207 Stämmen zeigte mir, daß sich eine feste Grenze zwischen beiden Bakterienarten nicht ziehen läßt. Keines der bisher angegebenen Hilfsmittel war geeignet, eine sichere Unterscheidung herbeizuführen. So ist nicht maßgebend die Größe der Kolonien, nicht das Wallbildungsvermögen, nicht die Spaltung von Maltose, Dulzit und Dextrin. Auch die Methylrotprobe nach Rettger und Koser schlägt verschieden aus. Am ehesten könnte noch das Gasbildungsvermögen in Dextrose und Arabinose zur Unterscheidung der beiden Bakterienarten Verwendung finden. Aber auch hierbei stellen sich unüberwindliche Hindernisse in den Weg, denn wir haben unter den Kükenruhrerregern aerogene und anaerogene Stämme. Von meinen untersuchten Stämmen aus Küken und Eiern waren allerdings nur 18 Proz. anaerogen, alle übrigen bildeten Gas. Gasbildner und gaslose Stämme kommen aber auch in denselben Geflügelbeständen sowohl bei Küken als auch bei erwachsenen Hühnern nebeneinander vor. Bei den aus Hühnern herausgezüchteten Stämmen fiel auf, daß sie bei gleichzeitigem Auftreten von Kükenverlusten stets aerogen waren. Gasbildende Stämme fanden sich aber auch in Geflügelbeständen ohne Kükensterben. — Auch der Fundort des *Bacterium pullorum* bzw. *gallinarum* in den einzelnen Organen ermöglicht keine bestimmte Unterscheidung, denn wir finden das *Bacterium pullorum* in allen Organen und im Eierstock, häufig allerdings allein in den Follikeln des Ovariums. Aber auch bei Entzootien, die wir sonst als Hühnertyphus anzupprechen pflegten, konnte ich die Erreger in denselben Organen ermitteln, bei zwei Hühnern fanden sie sich in den Hoden. Demnach besitzen wir gegenwärtig kein Unterscheidungsmittel zwischen *Gallinarum*- und *Pulloruminfektion* und der Vorschlag von Haupt, beide Krankheiten einem Begriff zu subsumieren und für beide Krankheitserreger als einheitliche Bezeichnung den älteren Namen „*Bacterium gallinarum* Klein“ einzuführen, ist durchaus beachtenswert.

Die Bekämpfung der Kükenruhr richtete sich bisher auch

gleichzeitig gegen den Hühnertyphus, indem man mittels der Blutuntersuchung alle positiv agglutinierenden Hühner herausfuchte und als Bakterienträger ausmerzte. Dadurch, daß *Bacterium pullorum* und *gallinarum* in gleicher Weise serologisch reagieren, erfaßte man beide Krankheiten.

Die Agglutinationsmethode zum Nachweis infizierter Hühner ist nicht neu, und sie ist nicht in Deutschland erarbeitet. Als erste verwandten sie die Amerikaner, nachdem durch Rettger festgestellt war, daß Küken, welche die Kükenruhr überstehen, während ihres späteren Lebens Bakterienträger bleiben, und nachdem Jones fand, daß solche Tiere in ihrem Blute spezifische Agglutinine enthalten. Seit diesen grundlegenden Forschungsergebnissen wurde die Agglutination zum Nachweis der Infektion in Amerika von vielen Autoren verwandt und es wurden darauf regelrechte Bekämpfungssysteme aufgebaut. Auch andere Staaten schlossen sich diesen Verfahren an, so z. B. Holland und Belgien. — In Deutschland ist diese Bekämpfungsmethode übernommen und während der vergangenen Jahre in einer ganzen Reihe von Beständen zur Anwendung gebracht worden. Besonders treten für die Kükenruhrtilgung mittels Agglutination Beller, Schmidt-Hoehnsdorf, Mießner und Wagener ein. Nachprüfungen der Untersuchungsmethode fanden in Deutschland kaum statt. Nur Mießner tötete 16 positiv und 4 negativ reagierende Hühner und untersuchte sie nach der Schlachtung auch bakteriologisch; hierbei wurde bei den positiv reagierenden Hühnern in 50 Prozent das *Bacterium pullorum* ermittelt. Wagener gelang es, durch Ausmerzungen der positiv agglutinierenden Hühner die Verluste erheblich herabzudrücken.

Was heißt aber positiv reagierende Hühner? Will man diese Frage beantworten, so muß man unbedingt den Agglutinationstiter infizierter und gesunder Hühner kennen. Der positive Titer wird aber von den einzelnen Autoren recht verschieden angegeben. Gelegentlich einer Rundfrage bei den einzelnen Instituten, welche sich mit der Kükenruhrbekämpfung befassen, erfuhr ich, daß sechs Institute eine Agglutination erst bei einer Verdünnung von 1:100 als positiv ansehen, zwei Institute bei 1:80, drei Institute bei 1:50 und eins bei 1:25. Wie außerordentlich verschieden sich die Bekämpfung der Pulloruminfektion unter solchen Voraussetzungen gestalten muß, wird jeder ohne weiteres einsehen.

Ich untersuchte insgesamt 2093 Blutproben, von diesen waren 1313 bei der Agglutination negativ, 71 reagierten bei einer Verdünnung von 1:10, 72 bei 1:20, 114 bei 1:40, 110 bei 1:80 und 413 bei 1:160 und darüber. — Demnach mußten nach Ansicht der einen 413 Hühner ausgemerzt werden, nach anderen 523 und nach wieder anderen 637. Wenn wir bei einer derartig verschiedenen Beurteilung die Züchter kopfscheu machen, so ist das nicht zu verwundern, denn wir können unmöglich annehmen, daß es auf 200 Hühner mehr oder weniger nicht ankommt. Die genannten Zahlen erstrecken sich auf alle Bestände zusammen. Viel krasser wirkt sich das Mißverhältnis aus, wenn ich an eine einzelne Farm denke, in welcher von 269 Hühnern nur 69 negativ reagierten, während sechs bei 1:20, 18 bei 1:40, 38 bei 1:80 und 165 bei 1:160 und darüber positiv waren.

Bevor ich an die Ausmerzungen agglutinierender Hühner heranging, machte ich es mir daher zur Aufgabe, den richtigen Titer festzulegen und nachzuprüfen, ob wir durch die serologische Untersuchung auch alle bzw. nur Bakterienträger erfassen können.

Für diese Untersuchungen standen mir nicht viele Hühner zum Töten und zur bakteriologischen Nachkontrolle zur Verfügung. Daher prüfte ich die beim Schieren ausgefonderten und die nicht schlüpfenden Eier. Die Zahl der bei meinen Untersuchungen infiziert gefundenen Eier schwankt in den einzelnen Beständen außerordentlich. In

vier unter sieben Beständen fand ich niemals Kükenruhrbakterien. Dagegen konnte ich sie in drei Beständen mit Regelmäßigkeit feststellen. In einer Farm waren unter den jedesmal eingefandten Eiern 18—89 Prozent infiziert, in einer zweiten 35 Prozent und in einer dritten 9—12 Prozent. In zwei von diesen Geflügelbeständen konnte ich eine größere Anzahl Blut- und Eieruntersuchungsergebnisse vergleichen.

Betrachten wir zunächst den Bestand A, so lagen von den Hühnern mit einer Agglutination von 1 : 160 83,4 Prozent infizierte Eier, von den 1 : 80 reagierenden Tieren 85 Prozent, von den 1 : 40 reagierenden Hühnern 80 Prozent, von den 1 : 20 reagierenden 100 Prozent und von den negativ reagierenden 51,5 Prozent infizierte Eier vor. Nicht ganz so schlimm ist das Ergebnis in dem etwas weniger verseuchten Bestande B. In ihm belief sich die Zahl der infizierten Bruteier bei Hühnern mit dem Titer 1 : 160 auf 11,3 Prozent, mit dem Titer 1 : 80 und 1 : 40 auf 0 Prozent, mit dem Titer 1 : 20 und 1 : 10 auf je 20 Prozent und mit negativer Agglutination auf 6,7 Prozent.

Dies Ergebnis wird Sie überraschen, da es die ganzen bisherigen Ansichten über den Wert der Agglutination bei der Kükenruhrbekämpfung über den Haufen werfen kann. Selbst negativ reagierende Hühner können demnach positive Eier legen, aber auch bei einem Titer unter 1 : 100 findet sich eine große Zahl von Tieren mit pullorumhaltigen Eiern. Wie viele Hühner, die infiziert sind und infizierte Eier legen, läßt man demnach bei alleiniger Agglutination in Verdünnungen von 1 : 100 laufen! Und selbst bei Annahme des niedrigsten Titers von 1 : 10 oder 1 : 20 schlüpft noch ein erheblicher Prozentsatz kranker Hühner durch. — Aber auch das Umgekehrte ist nicht selten der Fall, nämlich daß wir eine beachtenswerte Anzahl positiv agglutinierender Hühner haben, die stets keimfreie Eier legen.

Es mag sein, daß manche Hühner einen wechselnden Titer aufweisen und sich daher eine mehrmalige serologische Untersuchung erforderlich macht. Diese Wiederholung der Blutuntersuchung ist auch bereits empfohlen, auch W a g e n e r tritt dafür ein. Wir müssen uns aber darüber klar sein, daß im Jahre zwei- bis dreimal wiederholte Blutuntersuchungen mit ganz erheblichen Kosten für den Besitzer verbunden sind. Allzuviel verspreche ich mir deshalb nicht davon, weil ich auch bei dreimaliger negativer Reaktion noch Hühner mit infizierten Eiern hatte.

Auf Grund meiner Untersuchungsergebnisse können wir z. Zt. unmöglich die allgemeine Bekämpfung der bakteriellen Kükenruhr auf der serologischen Untersuchung aufbauen und alles töten, was positiv reagiert. Bisher haben wir immer nur etwas empfohlen, das uns aus amerikanischen Methoden bekannt war. Die amerikanischen Maßnahmen lassen sich jedoch nicht ohne weiteres auf unsere Verhältnisse übertragen. Wir kennen ja ähnliche Methoden der Amerikaner auch bei Großtieren. Denken wir nur an den infektiösen Abortus des Rindes, der eine große Ähnlichkeit mit der Pulloruminfektion besitzt. Auch ihn tilgen die Amerikaner durch Ausmerzen positiv reagierender Kühe. Wir denken gar nicht daran, diesem Vorgehen zu folgen, weil wir wissen, daß die positive Agglutination beim Rind kein Zeichen für einen bevorstehenden Abortus ist und daß eine negative Agglutination keine Sicherheit für ein normales Abkalben bietet. Außerdem können wir uns den Luxus, alles zu töten, nicht leisten. — Vielleicht liegen die Verhältnisse bei der Pulloruminfektion serologisch ähnlich wie beim Abortus. Rein wirtschaftlich sind sie freilich etwas anders, weil die kurze Lebensdauer des Huhnes einen raschen Ersatz eines Bestandes ermöglicht und weil der Wert eines einzelnen Huhnes nicht so erheblich ist.

Meiner Skepsis gegenüber dem Wert einer Ausmerzungen widersprechen scheinbar die günstigen aus Amerika berichteten Resultate und die von W a g e n e r berichteten guten

Ergebnisse. — Es ist gar kein Zweifel, daß wir durch die Agglutination eine ganze Anzahl infizierter Hühner erfassen und daß sich durch ihre Ausmerzungen die Zahl der Bakterienträger verringert. Aber wir müssen von einer allgemein durchgeführten Maßnahme verlangen, daß sie mit hoher Sicherheit arbeitet. — Daß sie es nicht tut, zeigten meine Eierbefunde, das lehrte mich aber auch die Einfuhr von ruhrkranken Eintagsküken aus einer holländischen Farm, die staatlich mittels der Agglutination regelmäßig untersucht wird, und schließlich das Auftreten von Pulloruminfektionen bei Hühnern, die beim Wettlegen serologisch geprüft und für gesund erklärt waren.

Im übrigen ist das günstige Resultat bei der Kükenaufzucht sehr von der Sorgfalt des Züchters abhängig. So konnte ich beobachten, daß in dem schwer verseuchten Bestande A, in welchem die meisten Hühner positiv agglutinierten, nur 10 Prozent Küken zugrunde gingen. Würden dort Hühner auf Grund der Agglutination ausgemerzt worden sein, so würde man den Erfolg der guten Aufzucht fälschlich dem Bekämpfungsverfahren zuschreiben.

Die sich auf der serologischen Untersuchung aufbauende Tilgung der bakteriellen weißen Kükenruhr ist also nicht zuverlässig, aber mindestens noch nicht spruchreif. Ich halte es daher für notwendig, daß vor einer allgemeinen Einführung dieser Methode noch genaue Nachprüfungen vorgenommen werden. Derartige sorgfältige Untersuchungen, bei denen das sämtliche in den Farmen anfallende Material eingehend zu untersuchen ist und bei denen die Geflügelbestände, die Brut und die Aufzucht regelmäßig beobachtet werden müssen, lassen sich nicht allein im Laboratorium oder von einem entfernt gelegenen Institut aus machen. Hierzu ist es erforderlich, daß ein spezialistisch vorgebildeter Tierarzt in einer Farm stationiert wird und an Ort und Stelle seine klinischen, pathologisch-anatomischen und bakteriologischen Untersuchungen vornimmt. Es wäre eine dankenswerte Aufgabe des Staates, die Klärung der Kükenruhrfrage in dieser Weise in die Wege zu leiten. Die Blutuntersuchung könnte außerdem versuchsweise in einigen stark verseuchten Farmen durchgeführt werden. Solche Untersuchungen müßte der Staat pekuniär unterstützen, vielleicht auch die getöteten Tiere teilweise entschädigen. Hierfür wären die Besitzer verpflichtet, die getöteten positiv reagierenden Hühner zerlegen und bakteriologisch untersuchen zu lassen. Auch negativ reagierende Hühner verseuchter Bestände müßten einmal in möglichst großer Anzahl getötet werden, um die Sicherheit der Agglutinationsmethode nachprüfen zu können. Daneben müßte auch der Wert der Eieruntersuchungen ergründet werden; vielleicht vermag die Eieruntersuchung die serologische Prüfung mit Erfolg zu ergänzen. — Derartige Untersuchungen würden sich, wenn sie ein brauchbares Ergebnis bringen sollen, über mehrere Jahre zu erstrecken haben.

Es ist kein Zweifel, daß die Entstehung der Kükenruhr wie jede andere Seuche auch durch prädisponierende Einflüsse begünstigt wird. Die Massenbrut in Apparaten, die Haltung großer Kükenmengen in verhältnismäßig kleinen oder zugigen Räumen oder auf engem Auslauf, die künstliche Glücke, die oft nicht zuträgliches Futter, die Witterungseinflüsse und schließlich der Transport der Eintagsküken sind alles Momente, welche den Organismus schwächen und die Infektion zum Haften bringen. Daher ist auch auf möglichst hygienische Haltung der Küken hinzuwirken.

Auf Grund meiner Ausführungen komme ich zu folgenden Schlusssätzen:

1. Die bakterielle (weiße) Kükenruhr kommt auch bei Enten vor.
2. Das Bacterium pullorum und gallinarum lassen sich kulturell, biochemisch und serologisch nicht voneinander trennen.

3. Auch eine Trennung des Hühnertyphus von der Kükenruhr ist klinisch oder pathologisch-anatomisch nicht möglich. Beide Krankheiten sind als identisch anzusehen.
4. Die Blutuntersuchung erwachsener Hühner zeigt uns nicht mit Sicherheit die Bakterienträger an. Eine positive Agglutination ist nur das Zeichen einer stattgehabten Infektion mit dem Bacterium pullorum. — Aber auch negativ reagierende Hühner können infiziert sein und infizierte Eier legen.

5. Die bisher bei der Agglutination als positiv angesehenen Titer sind unhaltbar.
6. Die Tötung positiv reagierender Hühner kann z. Zt. noch nicht allgemein zur Bekämpfung der Kükenruhr empfohlen werden.
7. Der Staat muß sich die weitere Erforschung der Kükenruhr angelegen sein lassen, indem er einige verseuchte Farmen unter völlige Kontrolle stellt und indem er die Stationierung eines Tierarztes in mindestens einer Farm ermöglicht.

Immunisierungsversuche gegen Pocken und Diphtherie der Hühner. *)

Von Prof. Dr. Dr. Raebiger, Halle (Saale).

Geflügel-Diphtherie und -Pocken, bekanntlich eine ätiologische Einheit, sind weit verbreitet. Sie gehören wegen der großen Verluste, die sie besonders in der kalten Jahreszeit in den Geflügelbeständen hervorrufen, und ihres hartnäckigen Charakters wegen zu den gefürchtetsten Geflügel-seuchen. In erster Linie gefährdet ist das Junggeflügel. Die Mortalitätsziffer beträgt nach Reinhardt 50—70 Prozent und mehr.

Es hat daher nicht an Versuchen gefehlt, einen wirksamen Impfstoff gegen die Seuche herzustellen. Der nach der Anweisung amerikanischer Forscher, in erster Linie Beach, gewonnene Impfstoff hat sich in Deutschland nicht einbürgern können, da er teuer war und die Erfolge wechselnd waren.

Allgemeine Aufnahme fanden die Impfungen erst, als sich auch die Holländer dem Studium der Bekämpfung der Diphtherie und Pocken durch eine Schutzimpfung widmeten und einen Impfstoff herausbrachten, der verhältnismäßig billig, leicht anwendbar und vor allem, wie sich bei den nach Hunderttausenden zählenden Geflügelimpfungen in Holland gezeigt hatte, befriedigende Resultate ergab.

Wir haben im Jahre 1925, nachdem in den vorangegangenen Jahren das gehäufte Auftreten von Geflügel-Diphtherie und -Pocken in zahlreichen Beständen unserer Provinz festgestellt worden war und besonders von den größeren Züchtern der Wunsch nach einer wirksamen Bekämpfung der Seuche laut wurde, wiederholt mit günstigem Ergebnis Impfungen mit einer Vakzine ausgeführt, die uns von dem Reichseruminstitut in Rotterdam überlassen wurde.

Bedauerlicherweise konnte die Vakzine aber nur in kleinen Mengen abgegeben werden, weil die Anforderung seitens der niederländischen Tierärzte so groß war, daß der Vorrat des Rotterdamer Instituts kaum mehr ausreichte.

Die Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen wandte sich daher Anfang Oktober 1925 an das Landwirtschaftsministerium mit der Bitte, in einem der ihm unterstellten staatlichen Institute einen Schutzimpfstoff herstellen zu lassen.

Das Ministerium entsprach unserem Antrage in dankenswerter Weise sehr schnell und hat noch im November desselben Jahres die Serumabteilung des Hygienischen Instituts der Berliner Tierärztlichen Hochschule mit Versuchen zur Herstellung eines Impfstoffes gegen Geflügel-Pocken und -Diphtherie beauftragt.

Als das holländische Antidiphtherin-Laboratorium in Zeist eine nach der Methode des Prof. de Blicke und Dr. van Heelsbergen hergestellte Lymphe herausbrachte, haben wir in der Zwischenzeit unseren Impfstoffbedarf von dort und seit der Übertragung des Generalvertriebes des Antidiphtherins für Deutschland an das Serum-

institut Dr. Schreiber Ende Oktober 1926 von Landsberg bezogen.

Wir haben das Antidiphtherin in solchen Beständen angewandt, in denen Todesfälle infolge Geflügel-Diphtherie und -Pocken vorgekommen waren, und stets gute Erfolge erzielt.

Mitte September 1927 teilte uns die Serumabteilung des Berliner Hygienischen Instituts mit, daß die Arbeiten zur Gewinnung eines Impfstoffes gegen Geflügel-Pocken und -Diphtherie so weit abgeschlossen sind, daß die Erprobung desselben in der Praxis in größerem Umfange erwünscht ist.

Wir wandten uns daher sofort an das Landwirtschaftsministerium mit der Bitte, uns im Hinblick auf die große wirtschaftliche Bedeutung der Bekämpfung der Geflügel-Diphtherie und -Pocken eine staatliche Beihilfe zur Durchführung umfangreicher Versuchsimpfungen in der Praxis zu gewähren. Es sollte bei diesen Impfungen nicht nur die Wirksamkeit des Berliner Impfstoffes erprobt, sondern auch festgestellt werden, ob er dem holländischen gleichwertig ist.

Mit Genehmigung des Ministeriums haben wir sodann seit Anfang d. Js. mit dem uns vom Hygienischen Institut in flüssiger Form zur Verfügung gestellten Impfstoff folgende Impfversuche ausgeführt:

1. Am 3. Januar 1928 wurde uns aus dem Bestande O. in Annaburg, Bez. Halle, ein verendetes Huhn zur Untersuchung eingefandt, bei welchem als Todesursache Geflügel-Diphtherie, und zwar Kehlkopf-Diphtherie, festgestellt werden konnte.

Am 11. Januar 1928 wurden die restlichen 38 Hühner (Sulmtaler) dieses Bestandes mit dem vom Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule in Berlin (im Folgenden kurz „Berliner Impfstoff“ genannt) nach der Vorschrift, die auch für den holländischen Impfstoff gilt, mittels einer Trephine vakzinieren. Bei der vorhergehenden klinischen Untersuchung erwiesen sich sämtliche Hühner als frei von Diphtherie und Pocken.

An Versuchshühnern wurde eine Kontrolle des Impfstoffes vorgenommen, um zu sehen, ob sich Reaktionen, wie sie nach Anwendung des holländischen Impfstoffes auftreten, zeigen. Das war nach 7—10 Tagen der Fall.

Die weitere Beobachtung des Bestandes ergab, daß keine weiteren Erkrankungen oder Todesfälle auftraten.

2. Am 11. Januar 1928 wurde uns aus dem Bestande O. in Halle ein lebendes Huhn zur Untersuchung eingeliefert, bei dem klinisch diphtherische Veränderungen der Schleimhaut der Schnabelhöhle festgestellt wurden.

Am 12. Januar 1928 wurden die restlichen 11 Hühner des Bestandes mit dem Berliner Impfstoff vorschriftsmäßig geimpft. Klinisch konnte bei keinem der Tiere Geflügel-diphtherie festgestellt werden. Bis zum 21. Februar 1928, aber auch weiterhin, sind Krankheits- oder Todesfälle nicht eingetreten.

3. Am 3. Januar 1928 wurden wir von der Farm R. in V. gebeten, die etwa 1700 Tiere des Bestandes gegen Diphtherie

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 11. Juli 1928 in Breslau.

zu impfen. Die Impfung ist am 16. und 17. desselben Monats durchgeführt worden. Die Zahl der Hühner betrug 1650, es handelte sich um Leghorniere. Während des Winters war eine erhebliche Anzahl von Todesfällen vorgekommen, die aber nicht alle auf Geflügel-Diphtherie zurückzuführen sein dürften, da die Untersuchung eingegangener Tiere die Verbreitung von Leukomyelose sowie von Kükenruhr, ferner auch der Marek'schen Geflügellähme, ergab. Besonders hervorzuheben ist, daß z. Zt. der Vornahme der Impfung 4 Tiere mit Kehlkopf-Diphtherie, 2 Tiere mit Diphtherie der Lidbindehaut und etwa 40 Hühner mit Pocken behaftet vorgefunden wurden. Es handelt sich also um eine beginnende Verseuchung des Bestandes mit Geflügel-Diphtherie. Sämtliche erkrankten Tiere befanden sich in einem etwa 500 Tiere enthaltenden, großen Stallabteil.

Alle, auch die erkrankten Tiere, letztere selbstverständlich zum Schluß, wurden vorschriftsmäßig mit dem Berliner Impfstoff geimpft. Eine Kontrollimpfung bei Versuchshühnern, die erst zwei Tage nach Abschluß der Impfungen auf der Farm vorgenommen werden konnte, ergab eine stark positive Impfreaktion nach 6—8 Tagen.

Gemäß unserer Vereinbarung wurden alle getöteten oder verendeten Tiere dieser Farm uns zur Untersuchung zugesandt. Am 7. Februar 1928 stellten wir bei einem verendeten Huhn Kehlkopf-Diphtherie fest. Die Impfstelle erwies sich bei diesem Tier als frei von charakteristischen Schwellungen der Federfollikel. Es dürfte demnach ein Nichtangehen der Impfung vorgelegen haben. Dieselbe Feststellung erhoben wir bei einem uns am 23. März 1928 eingelieferten Huhn. Auch bei diesem war die Impfstelle vollkommen frei von der lange sichtbaren Impfreaktion.

Auf Grund obiger Versuche glauben wir nach den früher mit dem holländischen Impfstoff gemachten Erfahrungen, daß es sich bei dem neuen Impfstoff des Hygienischen Instituts der Berliner Tierärztlichen Hochschule um ein dem Antidiphtherin gleichwertiges Präparat handelt. Wir sind in den beiden ersten Fällen in der Lage gewesen, die Seuche vollständig zum Erlöschen zu bringen und haben in dem dritten Bestand, was besonders hervorgehoben zu werden verdient, einen sich entwickelnden Seuchengang prompt zum Stehen gebracht. Von Seiten der Farmleitung wurde außerdem auf die nach der Impfung eingetretene Besserung des Eiertrages hingewiesen.

Prof. Bierbaum, der Leiter der Serumabteilung des Berliner Instituts, teilte mir auf meine Anfrage nach seinen Erfahrungen in der Praxis am 12. April d. Js. mit, daß seine Abteilung im Vorjahre in einer größeren Geflügelfarm, in der in früheren Jahren stets Geflügelpocken geherrscht hatten, mit seinem Impfstoff über 500 Hühner prophylaktisch geimpft und eine gleiche Anzahl mit Antidiphtherin behandelt hat. Irgendwelche Unterschiede haben sich dabei nicht ergeben.

Am 2. Mai d. Js. bot sich meinem Institut wiederum Gelegenheit zu Versuchsimpfungen. Es handelte sich um einen Bestand von 18 Hühnern, in dem innerhalb der vorangegangenen beiden Wochen 3 diphtheriekrankte Tiere unter Erstickungsercheinungen eingegangen waren. Bei der Mitte Juni d. Js. vorgenommenen Kontrolle konnte festgestellt werden, daß in dem Bestande keine weiteren Erkrankungen oder Verluste vorgekommen waren. Der Besitzer bezeichnete die Impfung als einen vollen Erfolg.

Bei keinem unserer Versuche sind irgendwelche Gefundheitschädigungen der Impflinge infolge der Vakzination beobachtet worden. Wir glauben daher, den Impfstoff zur prophylaktischen Impfung rückhaltlos empfehlen zu können.

Wie das Landwirtschaftsministerium unterm 5. Mai d. Js. bekanntgab, ist der Serumabteilung des Berliner Hygienischen Instituts nunmehr auch die Herstellung eines Trockenpräparates gelungen, so daß in nächster Zeit auch

hiermit Versuche angestellt werden können. (Das Präparat wird vorgelegt.)

Am 30. Juni d. Js. fand unter dem Vorsitz des Ministerialrats Dr. Wiemann im Landwirtschaftsministerium über die Herstellung und den Vertrieb des von der Serumabteilung des Hygienischen Instituts der Berliner Tierärztlichen Hochschule hergestellten Impfstoffes gegen Geflügel-Diphtherie und -Pocken eine Bepflichtung statt, an der in Vertretung des Herrn Prof. Dr. Bierbaum Herr Dr. Eberbeck vom Hygienischen Institut Berlin und Herr Prof. Dr. Dahmen, Direktor des Instituts für Tierseuchenforschung und -therapie in Kl.-Ziethen, sowie meine Person teilnahmen.

Herr Dr. Eberbeck führte aus, daß die Versuche zur Gewinnung des Impfstoffes gegen Geflügeldiphtherie so weit gefördert seien, daß nunmehr der erarbeitete Impfstoff im großen hergestellt werden könne. Die Herstellung des Impfstoffes soll im Institut für Tierseuchenforschung und -therapie in Kl.-Ziethen erfolgen, und zwar unter ständiger Kontrolle der Serumabteilung des Hygienischen Instituts, wo auch die einzelnen Operationsnummern nach einem dort ausgearbeiteten Verfahren geprüft werden sollen. Der Impfstoff kann nach den neuen Untersuchungen über seine Wirkung als verhältnismäßig sehr wirksam bezeichnet werden, jedenfalls dem holländischen Impfstoff vollkommen gleichwertig.

Zur Erleichterung des Impfens hat Herr Dr. Rasch vom Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule in Berlin bei der Firma Hauptner eine Impfraspel herstellen lassen, die die Ausführung der Impfung erheblich erleichtert. (Das Instrument wird gezeigt.)

Herr Prof. Dahmen schätzt den voraussichtlichen Kleinverkaufspreis auf etwa 0,80 Mk. je Kubikzentimeter für 15 Hühner. Dabei ist allerdings von dem Gedanken ausgegangen, daß der Impfstoff so billig wie möglich hergestellt wird, und daß für sein Institut im wesentlichen nur die Herstellungskosten gedeckt werden sollen.

Der Impfstoff wird an die Tierärzte in flüssiger Form gebrauchsfertig abgegeben. Zur Erleichterung des Vertriebes durch die Landwirtschaftskammern wird aber Prof. Dahmen den Impfstoff in getrocknetem Zustande in geschmolzenen Ampullen an die Bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammern liefern. Die Bakteriologischen Institute sollen sich verpflichten, in ihren Laboratorien die gebrauchsfertige Lösung herzustellen und an die Tierärzte abzugeben.

Da die Herstellung des Impfstoffes im großen zu dem angegebenen Preise nur bei erheblichem Absatz möglich ist, ein tunlichst niedriger Verkaufspreis aber im Interesse der geflügelhaltenden Landwirtschaft angestrebt werden muß, bitte ich die Vertreter unserer Verbandsinstitute, als der in erster Linie hierzu berufenen Stellen, sich der Einführung des Impfstoffes sobald als möglich anzunehmen, damit die Monate Juli, August und September noch für die Bekämpfung der Diphtherie und Pocken ausgenutzt werden können. Falls ich Ihre Zustimmung finde, stelle ich folgenden Antrag zur Beschlußfassung:

Die Hauptlandwirtschaftskammer wird gebeten, dem Herrn Minister die Bitte vorzutragen, den in einem Verbands vereinigten Bakteriologischen Instituten der preussischen und außerpreussischen Landwirtschaftskammern das Alleinvertriebsrecht des Berliner Impfstoffes gegen Geflügel-Diphtherie und -Pocken zu verleihen und den Instituten zu gestatten, das im Kl.-Ziethener Institut für Tierseuchenforschung und -therapie hergestellte Trockenpräparat in gebrauchsfertiger Lösung herzustellen und an die praktizierenden Tierärzte abzugeben.

Die Institute verpflichten sich, andere Impfstoffe gegen Geflügeldiphtherie und -Pocken nicht zu vertreiben.

Über Immunisierungsversuche gegen die Pocken und Diphtherie der Hühner. *)

Von Dr. Karsten und Dr. Lüttschwager, Hannover.

Wie der eine von uns gelegentlich eines vom deutschen Veterinärat veranstalteten Fortbildungskurses in Düsseldorf hervorhob, haben wir des öfteren in Hühnerbeständen, in denen die Geflügelpocken oder Diphtherie ausgebrochen waren, die noch gefunden und auch die leicht erkrankten Tiere in der Weise einer Notimpfung unterzogen, daß wir Pocken- oder Diphtheriematerial von den ergriffenen Hühnern des Bestandes sammelten, im Mörser mit gewöhnlichem Brunnenwasser oder mit Glycerinwasser zu einem milchigen Brei verrührten und nun etwas Material deselben in die von Federn entblößten und mit einem scharfen Löffel oder stumpfen Messer schwach skarifizierten Follikel des Brustmuskels einrieb. Man erreicht dann eine spezifische Pockenerkrankung der Follikel, die nach etwa 5—6 Tagen beginnt, nach Ablauf etwa einer Woche ihren Höhepunkt erreicht, um dann abzuheilen. Auf der Höhe der Schwellung erhalten die Follikel ein reibeisenähnliches Aussehen. Wird von dieser einfachen und etwas primitiv erscheinenden Notimpfung zu Beginn eines Pocken- oder Diphtherieausbruches in einem Bestande Gebrauch gemacht, so sind die Erfolge zumeist recht befriedigend. Der Krankheitsprozeß spielt sich gewissermaßen auf der widerstandsfähigeren Körperhaut ab und erzeugt von hieraus Immunität, während die empfindlicheren Schleimhäute des Kopfes weniger ergriffen werden, wodurch schwere Erkrankungen (Atemnot infolge starker Beläge in der Schnabelhöhle und am Kehlkopf, Sehstörungen infolge Erkrankung der zella infra-orbitalis) seltener zur Ausbildung kommen. Für diese Impfungen verwendet man möglichst das Pockenmaterial des Bestandes, weil mit diesem die Erkrankung der Follikel viel sicherer erreicht wird als mit den diphtherischen Belägen der Schleimhäute, durch welche eine Infektion der Follikel nicht immer gelingt.

Wir haben von dieser Notimpfung auch in einigen gefunden Hühnerbeständen, welche wegen Diphtherieerkrankung der Hühner benachbarter Gehöfte stark gefährdet waren, Gebrauch gemacht, wobei sich allerdings zeigte, daß der Krankheitsprozeß nicht immer auf die infizierten Follikel der Haut beschränkt blieb, sondern auch auf die Schleimhäute des Kopfes, insbesondere der Schnabelhöhle übergriff. Wenn auch diese Schleimhauterkrankungen zumeist nur aus stecknadelkopfgroßen und auch etwas größeren gelben Belägen bestanden, welche das Wohlbefinden der Tiere, insbesondere die Futter- und Getränkeaufnahme nicht störten, so kommt es doch, wenn auch nicht in dem sonst üblichen Umfange, zu schweren Schleimhautveränderungen mit starker Störung des Allgemeinbefindens und selbst zu Todesfällen. Die Empfänglichkeit der Impflinge und die Virulenz des für die Notimpfung verwendeten Virus sind hierbei naturgemäß von ausschlaggebender Bedeutung. Wahrscheinlich ist das Übergreifen des Krankheitsprozesses auf die Schnabelhöhle hauptsächlich als eine Kontaktinfektion aufzufassen, welche durch Berühren der Impfstellen mit dem Schnabel zustande kommt und weniger als eine von der Impfstelle ausgehende durch die Blutbahn vermittelte Generalisation. Dies Übergreifen des Krankheitsprozesses auf die Schleimhäute und die eingetretenen Todesfälle lassen diese Impfungen mit dem natürlichen Virus der Geflügelpocken für gesunde Bestände im allgemeinen als unanwendbar erscheinen, sie kommen als reine Schutzimpfungen für gesunde Hühnerbestände nicht in Betracht.

Mit abgetötetem Virus der Geflügelpocken läßt sich

nach Burnet, Liepschütz, Uhlenhuth und Manteufel u. a. eine Immunität gegen die Krankheit überhaupt nicht hervorrufen, nach van Heelsbergen nur eine geringe. Dagegen gelingt es mit abgeschwächtem lebenden Virus eine gewisse Immunität zu erzielen. Manteufel konnte durch Einwirkung von Kaninchengalle auf das Geflügelpockenvirus es so abschwächen, daß es bei subkutaner Einspritzung die Krankheit nicht erzeugte, wohl aber eine begrenzte Immunität. Während aber von dem von Verge und Panisset hergestellten durch Phenol abgeschwächten und intradermal einzuspritzendem Pockenvirus abgesehen, in der Praxis anscheinend ein auf chemischem Wege abgeschwächtes Virus in größeren Maßstabe nicht verwandt wurde, fanden Impfstoffe, in denen das Virus auf thermischem Wege mitigiert ist, in größerem Umfange in der Praxis Verwendung, namentlich in Amerika. Hierbei verfährt man hauptsächlich in der Weise, daß man künstlich bei Versuchshühnern am Kamm und an den Kehllappen Pocken hervorrufen, die 2—3 Wochen nach der Infektion abgekratzt und im Exsiccator getrocknet und dann zu einem Pulver verrieben werden. Je 1 Gramm des Pulvers wird in 100 ccm physiologischer Kochsalzlösung aufgelöst, die Emulsion 60 Minuten im Wasserbade gehalten, worauf sie einen 0,5prozentigen Phenolzusatz erhält (Kaup: Poultry diseases Seite 248/49). Von diesem Impfstoff, der subkutan, aber nicht intramuskulär anzuwenden ist, spritzt man je Huhn 1 ccm ein, erkrankten Hühnern wiederholt. Von der Anwendung dieses Impfstoffes, dessen Haltbarkeit beschränkt ist, wollen in gefunden und besonders in verfeuchten Beständen viele Sachverständige gute Ergebnisse beobachtet haben, während andere keine Erfolge sahen und daher, wie z. B. Wellemann seiner Anwendung nicht das Wort reden könne. Die Nachteile dieses Impfstoffes bestehen außerdem in den in ihm durch die Erwärmung auf 60 Grad nicht abgetöteten Begleitbakterien, welche nicht selten, selbst bei subkutaner Einspritzung zu lokalen Nekrosen Anlaß geben, außerdem aber auch zu Abmagerung und Erschöpfungszuständen der Impflinge führen können. Wie de Blieck und van Heelsbergen die Abschwächung ihres „Antidiphtherin“ genannten Impfstoffes bewerkstelligt haben, geht aus ihren Veröffentlichungen nicht hervor, die nur besagen, daß es sich um einen lebenden Impfstoff handelt, der nicht auf physikalischem oder chemischem Wege lädiert ist, der immer eine örtliche Pockeneruption hervorruft und nicht zur Generalisierung führt. Nach den meisten Veröffentlichungen in der deutschen Literatur hat das Antidiphtherin sich zur Vorbeuge der Pocken und Diphtherie der Hühner durchaus bewährt.

Der nach dem Vorbilde der Jennerschen Schutzimpfung gegen die Variola sehr naheliegende Versuch, eine Mitigierung des Geflügelpockenvirus durch Passage durch ein anderes Wirtstier, wie z. B. das Kaninchen, zu erreichen, ist wiederholt gemacht worden. Solche Tierpassagen haben aber bisher bei den Geflügelpocken zu keinen praktisch brauchbaren Ergebnissen geführt.

Aus bereits im Jahre 1911 von einem von uns im hygienischen Institute der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover angestellten Versuchen über die Taubenpocken war uns bekannt, daß Hühner- und Taubenpocken nicht völlig miteinander als identisch zu betrachten sind. Schon Marx und Sticker, welche zuerst die Filtrierbarkeit des Geflügelpockenvirus nachwiesen, machten 1902 hierauf aufmerksam, wenn sie schrieben: „Das Virus der Taubenpocken erleidet schon nach einmaliger Passage durch das Huhn, auf welches es sich anstandslos übertragen läßt, eine derartige Veränderung, daß es nicht mehr auf Tauben über-

*) Referat, erstattet in der Dienstversammlung der Vertreter der Bakteriologischen Landwirtschaftskammerinstitute am 11. Juli 1928 in Breslau.

impfbar ist, entsprechend dem Verhalten der originären Hühnerpocke.“ Saito wies nach, daß die Hühnerpocke bei der Taube nur schwer haftet, sich jedoch dieser Tierart gut anpaßt, und daß die Virulenz des Hühnervirus durch weitere Fortzüchtung auf der Taube für das Huhn sehr erheblich vermindert wird, während die Taubenpocke sich zwar leicht auf das Huhn übertragen läßt, hier jedoch nur geringgradigere Läsionen hervorruft. Diese Feststellungen, in denen wir eine Bestätigung unserer aus dem Jahre 1911 stammenden Erfahrungen fanden, wiesen auf die Möglichkeit hin, gegen die Hühnerpocken mit von der Taube stammendem Virus unmittelbar oder nach Hühnerpassage zu immunisieren. Aus unseren Versuchen von 1911 her wußten wir ferner, daß man mit gewissen Taubenvirusstämmen 30 Taubenpassagen und mehr nacheinander vornehmen kann, ohne daß die Virulenz des Virus oder das Krankheitsbild bei den Tauben eine Änderung erfährt.

Nach anfänglichen Versuchen, ein durch Hühnerpassage mitigiertes Taubenpockenvirus für die Immunisierung der Hühner zu verwenden und nachdem die subkutane und intravenöse Einspritzung von Hühner- und Taubenpockenvirus, das durch Berkefeld- und Seitzfilter geschickt war, sich zur Immunisierung von Hühnern als unsicher und nicht immer als ungefährlich erwies, kamen wir auf unsere eingangs mitgeteilte primitive Impfmethode zurück, nur mit dem Unterschiede, daß wir statt des Hühnerpockenvirus des Bestandes Taubenpockenvirus verwendeten. Wir überzeugten uns, daß die Verreibung frischen Taubenpockematerials in die Follikel der Brust bei Hühnern eine lokale Pockeneruption hervorruft, der sich Schleimhauterkrankungen und schwere Allgemeinerkrankungen nicht anschließen, dagegen eine Immunität, wie sich bei späteren Nachimpfungen zeigte. Da frisches Taubenpockenvirus den Instituten nicht zu jeder Zeit zur Verfügung steht, mußten wir gleichzeitig auf eine sichere Konservierung desselben bedacht sein. Auch diese Frage ließ sich ohne besondere Schwierigkeiten lösen. Wir gingen schließlich in der Weise vor, daß wir Pockematerial eingefandter Tauben auf mehrere Tauben nacheinander verimpften, um uns von der gleichmäßigen, guten Virulenz des Virus zu überzeugen. Mit den diphtherischen Schleimhautbelägen eingefandter Tauben, die Epitheliome nicht aufwiesen, ist eine Übertragung der Krankheit nicht immer möglich. Nachdem die Konstanz in der Virulenz des betreffenden Taubenpockenvirusstammes feststand, rieben wir das Pockenvirus in die von Federn entblößten Follikel der Brust junger Tauben ein. Nach etwa 2 Wochen hat dann die Pockeneruption der Federfollikel ihren Höhepunkt erreicht. Nun kratzt man beim lebenden Tier die Follikel mit einem scharfen Löffel aus, trocknet das erhaltene Material im Faust-Heimschen Apparat in wenigen Stunden und verreibt es im Mörser zu einem Pulver, oder man tötet die Tauben, zieht die Brusthaut in toto ab, trocknet sie gleichfalls im Faust-Heimschen Apparat, wobei allerdings 24 Stunden und längere Zeit nötig ist, schabt den Follikelinhalt heraus und verreibt ihn gleichfalls zu einem Pulver, das im Faust-Heimschen Apparat für kurze Zeit nachgetrocknet wird. In dem so erhaltenen Pulver hält sich das Virus, im Kühlschrank aufbewahrt, wochenlang und ist nur etwas abgeschwächt. Zur Ausführung der Schutzimpfung bei Hühnern verrührt man 1 Gramm des Pulvers mit 10–15 ccm 80prozentigem Glycerinwasser im Mörser zu einer Emulsion, von der man

etwas Material in die entfederten und schwach skarifizierten Follikel der Brust oder des Oberchenkels langsam einreibt. Den sich nach etwa 1 Woche entwickelnden Impfpocken schließt sich etwa 2 Wochen später die Immunität an, welche wir nach 3 Wochen durch Nachimpfung mit einem uns zur Verfügung stehenden Hühnerpockenvirus auf dem Kamm der Tiere nachprüften. Wir haben diese Impfmethode in einer Reihe von Hühnerbeständen angewandt, die Impfungen wurden gut vertragen, fast immer traten die typischen Impfpocken der Follikel ein, während eine Generalisierung des Krankheitsprozesses, insbesondere eine Erkrankung der Schleimhäute oder eine Störung des Allgemeinbefindens der Tiere unterblieben. Ob die so erzeugte Immunität den praktischen Bedürfnissen stets genügt, bleibt abzuwarten. Darüber sind wir uns von vornherein klar, daß der auf diese Weise erzielte Schutz nur ein relativer sein kann, womit aber schon viel erreicht sein dürfte.¹⁾



Taubenbrust mit reifen Impfpocken, kurz vor der Entnahme zur Gewinnung des Impfstoffes.

Nach einer vor wenigen Wochen erschienenen Arbeit von Baumann stellt das Antidiphtherin von de Blicck und van Heelsbergen gleichfalls Taubenvirus dar, das auch Baumann zur Immunisierung von Hühnern gegen die Pocken und Diphtherie für geeignet hält.

Literatur.

Siegwart: Experimentelle Beiträge zur Frage der Identität von Geflügeldiphtherie und Geflügelpocken. Zentralblatt für Bakt., Orig., Bd. 56. — Dort Literaturangaben bis zum Jahre 1910. — Baumann: Beitrag zur aktiven Immunisierung gegen Pocken und Diphtherie der Hühner. Archiv für wissenschaftl. und praktische Tierheilkunde Bd. 57, H. 4. Dort weitere Literaturangaben.

¹⁾ Inzwischen haben wir in zahlreichen Beständen an ca. 3000 Hühnern unseren Impfstoff angewandt. In allen Fällen war eine typische Impfreaktion ohne Generalisierung zu verzeichnen.

Standesangelegenheiten.

Niederchrift

über die Dienstversammlung der Leiter der Bakteriologischen Institute der preußischen Landwirtschaftskammern am 10. und 11. Juli 1928 in Breslau. (Schluß.)

E. Geflügelkrankheiten.

13. Weitere Untersuchungen über Geflügeltuberkulose. Infektions-

versuche an Hühnern und Schweinen. Mit Lichtbildern und Vorweisung histologischer Präparate. Prof. Dr. Raebiger. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 42, S. 701.)

14. Weitere Untersuchungsergebnisse über das Vorkommen von Geflügeltuberkelbazillen beim Schwein. Dr. Lentz. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 42, S. 707.)

Graf v. Baudissin: Es dürfte sich empfehlen, weitere Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbazillen in den Eiern

tuberkulöser Hühner zunächst möglichst still vorzunehmen und die bisherigen Ergebnisse nicht zu veröffentlichen, da sonst leicht eine starke und vielleicht auch unnötige Beunruhigung in den Kreisen der Verbraucher entstehen könnte. Denselben Wunsch drückt Keiser aus.

Lerche: Der Nachweis der Tuberkelbakterien im Ei ist von außerordentlich weittragender Bedeutung. Bevor wir dazu Stellung nehmen, müssen wir uns unbedingt mit den Ärzten in Verbindung setzen. Trifft es zu, daß der Mensch, wie Löwenstein behauptet, an Geflügeltuberkulose erkranken kann, so haben wir dafür zu sorgen, daß diese Ansteckungsquelle beseitigt wird. Die Tuberkelbakterien werden zwar durch das Kochen abgetötet, doch ist ein gekochtes Ei nicht mehr zu allem zu verwenden und ein hart gekochtes weniger bekömmlich als ein weich gekochtes. Von den Beständen, die hauptsächlich Trink-eier liefern, ist deshalb unbedingt zu verlangen, daß sie einem Geflügeltuberkulosebekämpfungsverfahren unterstehen und keine Trink-eier verkaufen, die unter Umständen von tuberkulösen Hühnern her-rühren. Die maßgeblichen ärztlichen Stellen vertreten allerdings nicht die Ansicht Löwensteins. Es muß deshalb Verbindung mit den Ärzten aufgenommen werden, damit bei der nächsten oder übernächsten Verammlung diese Frage erörtert werden kann.

Kiessig: Diese Frage kann nur durch groß angelegte Versuche geklärt werden. Immerhin kann man aus den Laboratoriumsversuchen gewisse Schlüsse ziehen. Im Laufe des letzten Jahres wurden in Kiel mehrere Übertragungsversuche von Hühnertuberkelbakterien bei Schweinen durchgeführt. Sowohl bei geringgradiger als auch bei massiver intravenöser Infektion konnten nach der 8—9 Monate später erfolgten Schlachtung keine für Tuberkulose typischen Veränderungen festgestellt werden, dagegen zahlreiche Tuberkelbakterien in sämtlichen inneren Organen. Die histologischen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Was die Infektionsversuche per os anlangt, so sind diese natürlich vorläufig nicht ganz den Verhältnissen der Praxis angepaßt. Zwei Schweine wurden mit tuberkulösen Putenlebern gefüttert und das eine 9 Monate nach der Fütterung geschlachtet. Makroskopisch konnten tuberkulöse Veränderungen weder im Magen-Darmkanal noch im Körper festgestellt werden. Die gute Entwicklung des anderen Tieres spricht nicht dafür, daß eine Infektion stattgefunden hat. Die Versuche müßten der Praxis angepaßt werden insofern, als den Schweinen Gelegenheit gegeben wird, Tuberkelbakterien aufzunehmen. Daraus wird sich dann ergeben, wie die Infektion bei diesen Tieren verläuft. Aus den Versuchen, die jetzt von mehreren Seiten angestellt worden sind, kann nicht geschlossen werden, daß Geflügeltuberkelbakterien für Schweine so gefährlich sind, wie es bisher den Anschein hatte und wie es im vorigen Jahre hingestellt wurde.

Raebiger: Der Nachweis der Geflügeltuberkelbazillen im Ei ist von mehreren Autoren geführt worden. Eine Mitteilung an die breite Öffentlichkeit wird nicht erfolgen, jedoch könnte ein Hinweis in der humanmedizinischen Presse gebracht werden, daß Eier aus tuberkulösen Hühnerbeständen für kranke Menschen, besonders Kinder, vorsichtig zu verwenden sind.

Hobstetter hält es nicht für richtig, den Humanmedizinern diesen Hinweis zu geben, da die Gefährlichkeit der Geflügeltuberkelbakterien für den Menschen seiner Ansicht nach recht minimal ist.

Wiemann: Die Arbeit von Raebiger zeigt, daß die Übertragungsmöglichkeit von Geflügeltuberkelbakterien auf das Schwein nicht so groß ist, wie man es bisher angenommen hat. Bei gefundenen Schweinen ist selbst die massive Infektion erfolglos geblieben. Eine Gefahr für den Menschen scheint kaum oder überhaupt nicht zu bestehen. Zur Klärung dieser Frage wäre es notwendig festzustellen, bei wieviel Prozent der Markteier Tuberkelbakterien vorkommen. Dem erwachsenen Menschen dürfte kein Nachteil entstehen, wenn er ab und an ein tuberkelbazillenhaltiges Ei genießt. Auch den Kindern droht keine nennenswerte Gefahr, da diese Eier meistens gekocht zu sich nehmen und die Tuberkelbazillen durch 7 Minuten langes Kochen abgetötet werden. Die Arbeit läßt sich als reinwissenschaftliche Abhandlung veröffentlichen.

Keiser: Um nicht unnötig Unruhe in das Publikum durch nicht einwandfrei erwiesene Tatsachen zu bringen, muß die Aufklärung mit allergrößter Vorsicht vorgenommen werden. Die deutsche Frischebewegung würde durch die Kontrolle, den Anschluß an das Geflügel-Tuberkulose-Tilgungsverfahren und dergl. hinfällig werden. Die Frage muß auch von der landwirtschaftlichen Seite betrachtet werden. Es

dürfte einstweilen genügen, wenn den Landwirten geraten wird, bei der Aufzucht von Jungbullen und Kälbern nicht Eier von verdächtigen Hühnern zu verwenden.

15. Beobachtungen über Kükenruhr in Schlesien. Dr. Lerche. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 42, S. 708.)

Es wird folgender Beschlusantrag vorgelegt:

„Die Tötung bei der Agglutination positiv reagierender Hühner kann z. Zt. noch nicht allgemein zur Bekämpfung der Kükenruhr empfohlen werden. Das preussische Landwirtschaftsministerium ist zu bitten, die weitere Erforschung der Bekämpfungsmöglichkeiten durch Stationierung eines Tierarztes in einer Geflügelfarm zu unterstützen.“

Karsten: Vom Hannoverischen Institut wurden 15 Bestände blut-untersucht. In manchen Beständen ist die Zahl der positiv reagierenden Tiere recht gering gewesen. Als positiv wird ein Titer von 1:50 angenommen. Aus Eiern von Hühnern, die positiv reagiert hatten, konnten lebensfähige Küken erbrütet werden. Sehr wertvolle Hühner mit positivem Blutbefund brauchen deshalb nicht ohne weiteres ausgemerzt zu werden. Sie können unter Vorichtsmaßnahmen weiter gehalten werden. Durch Blutuntersuchung werden nicht alle infizierten Tiere erfaßt.

Lentz: Im Berliner Institut wurde Pullorum-Infektion auch bei Fasanenküken festgestellt.

Eickmann: Die amerikanischen Erfahrungen können nicht einfach auf unsere Verhältnisse übernommen werden. Eigene Forschungen sind unbedingt notwendig. Die Verluste sind in den rheinischen Farmen keineswegs größer als bei der Kokzidiose der Küken.

Ruth Eber: Im Tierfeucheninstitut Leipzig konnte auch bei Entenküken eine Infektion mit dem Bacterium pullorum nachgewiesen werden.

Krage: In Ostpreußen ist die weiße Kükenruhr erst in diesem Frühjahr aufgetreten. Besondere Maßnahmen sind wegen der geringen Verbreitung nicht nötig gewesen. Es wurden lediglich hygienische Maßnahmen ohne Tötung vorgeschlagen.

Schumann glaubt die Einstimmigkeit der Verammlung darüber feststellen zu dürfen, daß die Tötung der bei der Agglutination positiv reagierenden Hühner z. Zt. noch nicht allgemein zur Bekämpfung der Kükenruhr empfohlen werden kann. Über den zweiten Vorschlag des Berichterstatters: Stationierung eines Tierarztes in einer Geflügelfarm zwecks Erforschung der Bekämpfungsmöglichkeiten ist noch nicht diskutiert worden. Ich selbst halte diese Stationierung für den einzig brauchbaren Weg, besonders mit Rücksicht auf die Sicherheit einwandfreier Materialbeschaffung. Auch soll dieser Spezialist die Bekämpfungsmöglichkeiten praktisch ausprobieren.

Keiser möchte diesen Antrag auf mehrere Geflügelfarmen erweitern wissen oder aber eine regelmäßige Überwachung der Farmen durch einen dort ansässigen Tierarzt herbeiführen lassen.

Wiemann: Das Ministerium hat den Geflügelkrankheiten seit Jahren größte Aufmerksamkeit gewidmet. Bei der Stationierung eines Tierarztes in einer Geflügelfarm wird nicht viel herauskommen, da der betreffende einige Zeit braucht, um sich mit dem Problem und den bisherigen Ergebnissen vertraut zu machen. Der von verschiedenen Instituten beschrittene Weg, ihre Wissenschaftler mit den Farmen arbeiten zu lassen, wird zweckmäßigerweise weiter verfolgt. Jedes Institut muß versuchen, einige Geflügelfarmen in die Hand zu bekommen, die das gesamte Material zur Verfügung stellen. Die Farmen werden gern dazu bereit sein, wenn die Untersuchungen kostenfrei ausgeführt werden. Vielleicht stellt die Landwirtschaftskammer in Schlesien einen Antrag auf Gewährung von Mitteln und macht einen Versuchsplan und Kostenanschläge für die Durchführung der Untersuchungen; das Landwirtschaftsministerium wird dann sicher gern bereit sein, Mittel hierfür zur Verfügung zu stellen. Die Ausführungen des Berichterstatters haben den z. Zt. gangbarsten Weg gezeigt, die Krankheit zu erforschen und zu bekämpfen, sie haben auch diejenigen beruhigt, die von der Geflügel-tagung in Köln etwas betrübt waren.

16. Immunisierungsversuche gegen Pocken und Diphtherie der Hühner. Prof. Dr. Raebiger und Dr. Karsten. (Bericht siehe D. T. W. 1928, Nr. 42 S. 711 und 713.)

Raebiger legt folgenden Beschlusantrag vor: „Die Hauptlandwirtschaftskammer wird gebeten, dem Herrn Minister die Bitte vorzutragen, den in einem Verbands vereinigten Bakteriologischen Instituten der preussischen und außerpreussischen Landwirtschaftskammern

das Alleinvertriebsrecht des Berliner Impfstoffes gegen Geflügel-Diphtherie und -Pocken zu verleihen und den Instituten zu gestatten, das im Kl.-Ziethener Institut für Tierfeuchenforschung und Therapie hergestellte Trockenpräparat in gebrauchsfertiger Lösung herzustellen und an die praktizierenden Tierärzte abzugeben.“

Raebiger weist darauf hin, daß die Inangriffnahme der Geflügeldiphtherieimpfungen drängt, um die nächsten Monate für die Schutzimpfungen noch ausnutzen zu können.

Wiemann: Das Verfahren kann abgekürzt werden unter der Voraussetzung, daß sogleich ein Beschluß gefaßt wird, wonach sich alle Institute beteiligen. Jedes Institut setzt sich dann direkt mit Klein-Ziethen in Verbindung, das vom Ministerium aus die nötigen Anweisungen erhalten wird. Um das Alleinvertriebsrecht zu bekommen, müßten sich die Institute weiterhin verpflichten, keine anderen Impfstoffe mehr zu verwenden.

Es wird sowohl der Beschlußantrag Raebigers wie der Zusatzantrag von Wiemann einstimmig angenommen.

17. Der Film über die Krankheiten der Honigbiene konnte nicht abgerollt werden, da der Vortragende, Herr Prof. Dr. Borchert von der Biologischen Reichsanstalt, in letzter Stunde sein Erscheinen absagen mußte.

Im Anschluß an die Sitzung nahmen alle Teilnehmer der Versammlung eine Besichtigung der Preussischen Versuchs- und Forschungsanstalt für Tierzucht in Tischebnitz vor unter der Leitung des Direktors, Prof. Dr. Zorn. Es wurden insbesondere gezeigt die Einrichtungen des Vorzugsmilchfalles, die Kühl- und Erhitzungsanlage, die Kälberställe, die Melkanlagen auf der Weide und die verschiedenen Arten von Siloeinrichtungen. — Die Besichtigungsfahrt wurde fortgesetzt nach dem Versuchs- und Lehrgut der Landwirtschaftskammer in Ohlau-Baumgarten, wo insbesondere die Molkerei- und die Stalleinrichtungen gezeigt wurden. — Mit einer Autofahrt durch den Oderwald und einem gemeinsamen Essen in Ohlau fand die Tagung ihren Abschluß.

Dr. Schumann. Oberlandwirtschaftsrat Keiser.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Prof. Dr. phil. et med. vet. P. W. Danckwortt, ordentl. Professor für Chemie und Direktor des Chemischen Instituts der Tierärztlichen Hochschule, Dozent für Lebensmittelchemie und Toxikologie an der Technischen Hochschule Hannover, hat den an ihn ergangenen Ruf als ordentl. Professor für pharmazeutische Chemie an die Universität Marburg als Nachfolger des verstorbenen Geheimrats Professor Dr. Gadamers nicht angenommen.* Es ist dies der erste Fall, daß der Ordinarius einer Hilfswissenschaft an einer Tierärztlichen Hochschule den in diesem Fall besonders ehrenvollen Ruf auf ein Ordinariat einer Universität ablehnt. Dafür können dem Kollegen nicht nur die Hochschule, sondern der ganze tierärztliche Stand dankbar sein. Das nachahmenswerte Beispiel zeigt der Außenwelt zur Genüge, nicht nur die Bedeutung der Chemie für das Veterinärstudium, sondern auch, daß ein Dozent volle Befriedigung in der Ausbildung von Veterinärmedizinern und in der Ausführung wissenschaftlicher Arbeiten an einer Tierärztlichen Hochschule finden kann. Nicht zuletzt gebührt auch Dank dem Preuß. Landwirtschaftsministerium für das der Sache entgegengebrachte Verständnis und dafür, daß es den Wünschen bezüglich des weiteren Ausbaues des Chemischen Instituts in jeder Weise Rechnung getragen hat.

Der ordentl. Professor für Hygiene und Bakteriologie und Direktor des Hygienischen Instituts der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Dr. phil. et med. vet. et med. h. c. Hermann Mießner, ist zum außerordentlichen Mitgliede des Landesveterinäramts und zum Mitgliede der Prüfungskommission für Veterinärärzte ernannt worden.

In eigener Sache.

In einem Referat der Tierärztlichen Rundschau 1928, Nr. 39, S. 726 über „Chemische Fabrik Aubing (1928): Ein Einblick in das Gebiet der Leberegelmittel. Erwiderung auf den Aufsatz von Herrn Prof. Dr. Wilhelm Nöller in D. T. W. 1928, Nr. 6, S. 84. D. T. W. Jahrg. 36, Nr. 8, S. 123“, hat Herr Prof. Dr. Nöller seine Stellung als Schrift-

leiter dazu benutzt, um meine Tätigkeit als Schriftleiter der D. T. W. in einer unfachlichen und taktlosen Weise zu kritisieren. Ich halte es für unter meiner Würde, hierauf einzugehen und die Lefer der D. T. W. mit persönlichen und völlig zwecklosen Auseinandersetzungen zu belästigen, zumal die Einstellung des Herrn Nöller auch aus anderen Artikeln tierärztlicher Wochenschriften genügend bekannt sein dürfte.

Mießner.

Verein der Tierärzte des Reg.-Bez. Aachen.

Herbstgeneralversammlung Sonntag, den 28. Oktober 1928, 11 Uhr im Hotel „Großer Monarch“, Aachen, Büchel 51. 1. Vereinsangelegenheiten, Eingänge und Mitteilungen, Kassenbericht, Wahlen zur Tierärztekammer. 2. Vortrag des Herrn Dr. Meyer-Aachen: Die fleischbeschauliche Beurteilung der Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankung der Fleischlymphknoten. 3. Vortrag des Herrn Dr. Billig-Düren: Das Koppen des Pferdes, eine vet.-med. und forensische Betrachtung. 4. Mitteilungen aus der Praxis. — Nach der Versammlung im Hotel „Großer Monarch“ gemeinsames Essen und gefelliges Zusammensein.

I. A.: Dr. Bolle, Schriftf.

Fortbildungskursus des Deutschen Veterinärrats in Stettin

am 27. und 28. Oktober 1928.

Die bekanntgegebene Tagesordnung*) mußte folgende Änderung erfahren: Es wird sprechen am Sonnabend, d. 27. Oktober, 9—10,30 Uhr: Prof. Dr. Nöller-Berlin, 15—17 Uhr: Prof. Dr. Mießner-Hannover und Sonntag, den 28. Oktober, 10—11,30 Uhr: Professor Dr. Goetze-Hannover.

Die übrige Tagesordnung bleibt unverändert.

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 41, S. 696.

Fortbildungskurse des Deutschen Veterinärrats.*

Der Fortbildungskursus für praktische Tierärzte an der vet.-med. Fakultät der Universität Leipzig findet vom Freitag, den 19. (nachmittags) bis Sonntag, den 21. Oktober 1928 (mittags) statt.

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 40, S. 682.

Personal-Nachrichten.

Personalveränderungen im Vet.-Offizierkorps.

Befördert (1. Oktober 1928): Generaloberveterinär Dr. Bauer (Otto), Vorstand der Militär-Lehrschmiede in Berlin, zum Generalveterinär; die Oberstabsveterinäre Dr. Rühl, 7. Reiter-Regt. und Dr. Immendorf, 13. Reit-Regt., zu Generaloberveterinären; die Stabsveterinäre Dr. Gärtner, 17. Inf.-Regt. und Dr. Boenisch, Militär-Lehrschmiede in Berlin, zu Oberstabsveterinären; die Oberveterinäre Dr. Moll, 15. Reiter-Regt. und Dr. Priebus, Stab der 2. Kav.-Div., zu Stabsveterinären; die Veterinäre Dr. Müller, 4. Reiter-Regt. und Dr. Reinhold, 12. Reiter-Regt., zu Oberveterinären; Unterveterinär Dr. Christnach, 9. Reiter-Regt., zum Veterinär.

Veretzt (1. November 1928): die Generaloberveterinäre Külper, 2. Inf.-Regt., als Vorstand zur Veterinärmittel-Abteilung des Zeugamts Spandau, Dr. Thieme, 4. Reiter-Regt., als Divisions-Veterinär zur 1. Division; Oberstabsveterinär Dr. Boenisch, Militär-Lehrschmiede in Berlin, zum 4. Reiter-Regt.; die Stabsveterinäre Dr. Bartsch, Stab Gr. Kds. 1, zum 3. Art.-Regt.; Dr. Weiß, Stab 6. Div., zum 1. Art.-Regt.; Dr. Priebus, Stab 2. Kav.-Div., zum Stabe des Gr. Kds. 1; Dr. Richter (Walter), 12. Reiter-Regt., zur Militär-Lehrschmiede in München; Dr. Gregor, beim 1. Art.-Regt., zum 2. Inf.-Regt.; Dr. Zoeger, 3. Art.-Regt., zum 7. Inf.-Regt.; Dr. Ohl, 7. Fahr.-Abt., zum 6. Art.-Regt.; Dr. Bauer (Theodor), Militär-Lehrschmiede in München, zur Militär-Lehrschmiede in Berlin; die Oberveterinäre Dr. Gomolka, 3. Reiter-Regt., zum 6. Art.-Regt.; Dr. Meyer (Alfred), 10. Reiter-Regt., zum 12. Reiter-Regt.; Dr. Reinhold, 12. Reiter-Regt., zum Stabe der 2. Kav.-Div.; Dr. Steinacker, 6. Artl.-Regt., z. Stabe der 6. Div.; Dr. Frischbier, 3. Fahr.-Abt., zum Heeres-Veterinär-Untersuchungsamt.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 41, S. 694.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Ausperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 43.

Ausgegeben am 27. Oktober 1928.

36. Jahrgang.

(Aus dem Staatlichen Veterinär-Untersuchungsamt Hannover-Linden. — Leiter: Prof. Dr. Oppermann.)

Der weitere Ausbau der Diagnostik der infektiösen Anämie der Einhufer mit Hilfe der Serologie und des Kleinterversuches.

Von Prof. Dr. Oppermann und Dr. Lauterbach.

III. Diagnose der infektiösen Anämie mit Hilfe des Taubenversuches.

Nachdem die Erkenntnis gewonnen war, daß der Erreger der ansteckenden Blutarmut der Einhufer in dem Serum des befallenen Tieres Hämagglutinine zu bilden vermag, lag der Gedanke nahe, zu ermitteln, ob nicht auch bei einem für die ansteckende Blutarmut empfänglichen Versuchstier ebenfalls das Phänomen der Hämagglutination diagnostisch verwertbar gemacht werden konnte.

Nachdem von Oppermann festgestellt war, daß das Kaninchen ein solch empfängliches Versuchstier ist, hätten sich die Versuche auf dieses beziehen sollen. Als Indikator für die Hämagglutination wären die Blutkörperchen des Pferdes in Frage gekommen.

Da nun bekanntlich die Beimischung nicht nur von Blutkörperchen, sondern auch von Hämoglobin zum Infektionsmaterial beim Kaninchen bereits eine blutkörperchenpezifische Hämagglutination auslöst, wäre die Verimpfung eines von den Bestandteilen der roten Blutkörperchen absolut freien Infektionsmaterials bei subkutaner Injektion unerlässliche Voraussetzung gewesen. Daß sie generell nicht zu erfüllen ist, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden. Es hätte daher der subkutane Infektionsweg etwa durch den enteralen oder konjunktivalen umgangen werden müssen. Auf diesen Wegen gelang es tatsächlich, auch theoretisch Erfolge zu erzielen, die jedoch nicht zu einem praktisch brauchbaren Resultat führten, da die Infektion zu unsicher haftet. Es galt daher ein anderes Versuchstier zu ermitteln, daß ebenfalls für die ansteckende Blutarmut empfänglich ist, die Blutkörperchen des Kaninchens über einen bestimmten Titer normaliter nicht zusammenballt und auf den Keim der ansteckenden Blutarmut mit einer kräftigen Hämagglutininbildung reagiert. Als solch geeignetes Versuchstier haben wir nach mancherlei Bemühungen die Taube ermittelt.

Zunächst sei nun die Technik der Taubenversuche beschrieben:

Die Gewinnung des erforderlichen Serums geschieht in folgender Weise: Von der linken Brustseite her wird eine feine, flach abgechliffene Kanüle in das Herz der Taube eingestochen (wir benutzen die nicht rostende, in der Humanmedizin gebräuchliche Esko-Kanüle Nr. 1). Auf die Kanüle wird eine Pravazspritze gesetzt, mit der man aus dem Herzen leicht die erforderliche Menge Blut, ca. 4 ccm, gewinnen kann.

Die Tauben überstehen diesen Eingriff gut; der geübte Operateur vermag in einer Stunde bis 60 Tauben zu punktieren. Das herausgezogene Blut wird in einem A-Röhrchen aufgefangen, der sich bald bildende Blutkuchen mit einer Platinöse vom Glase gelöst. Die Proben werden bei Zimmertemperatur bis zum folgenden Tage aufbewahrt. Es hat sich dann in der Regel die erforderliche Menge Serum abgesetzt, andernfalls kann durch Zentrifugieren nachgeholfen werden.

Die eigentliche Technik der Hämagglutination ist bei der Taube erheblich umständlicher als beim Pferde und zwar deshalb, weil das Tauben Serum einen hohen Gehalt an Globulinen aufweist, die während der Sedimentationsdauer ausfallen und die Reaktion verdecken oder zum mindesten unübersichtlich machen. Diesem Gehalt an Globulinen muß daher durch eine besondere Versuchsanordnung Rechnung getragen werden und zwar derart, daß durch verdünnte Salzsäure diese störenden Eiweißkörper ausgeflockt und entfernt werden. Die Salzsäureverdünnung muß nun sorgfältig eingestellt werden. Es geschieht auf folgende Weise: Von einer $\frac{1}{10}$ norm. Salzsäure werden verschiedene Verdünnungen zwischen 2 Prozent und 6 Prozent mit Abstufungen von $\frac{1}{2}$ Prozent hergestellt. (Wir stellen also eine $\frac{1}{500}$ norm. Salzsäure ufw. in steigender Konzentration her.) Diese Säureverdünnungen werden im Verhältnis 4,1 ccm Salzsäurelösung mit 0,5 ccm inaktiviertem Tauben Serum versetzt und diejenige Säureverdünnung gewählt, die nach einer halben Stunde die stärkste Ausflockung ergeben hat. Bei Verwendung frisch bereiteter $\frac{1}{10}$ norm. Salzsäure muß die Auswertung häufiger vorgenommen werden, da sich nach unseren Erfahrungen die Lösungen mit der Zeit verändern. Sind sie bereits 3—4 Wochen alt, so sind sie in der Regel konstant, so daß neue Auswertungen nicht mehr erforderlich werden. Bedeutungsvoll ist jedenfalls diese Veränderungsmöglichkeit, da die Flockung bei zu schwacher Lösung nicht genügend ergiebig ist, bei zu starker Lösung aber vollständig verlagert. So kann z. B. bei 4,5prozent. $\frac{1}{10}$ norm. Lösung die optimale Flockung liegen, bei 5prozent. $\frac{1}{10}$ norm. Lösung jede Flockung vermisst werden.

Im Versuch werden nun zunächst 0,5 ccm Serum der zu untersuchenden Taube im Wasserbade bei 56 Grad eine halbe Stunde inaktiviert. Sodann werden 4,1 ccm der ermittelten Salzsäureverdünnung hinzugefügt. Das Gemisch wird zur Begünstigung der Ausflockung eine halbe Stunde im Wasserbade bei 37 Grad gehalten und sodann zentrifugiert. Die über den zusammengeflochtenen Flocken stehende klare Flüssigkeit wird abgegossen und mit 0,4 ccm einer 10prozentigen NaCl-Lösung versetzt. In dem gefalzenen Gemisch ist damit das Tauben Serum im Verhältnis 1:10 verdünnt, diese Ver-

dünnung bildet die Stammlösung I, aus der die für die Unterfuchung erforderlichen Verdünnungen von 1:40 und 1:100 angesetzt werden. Für die Verdünnungen 1:200, 1:400 und 1:1000 stellen wir uns die Stammlösung II in der Art her, daß die Stammlösung I weiter im Verhältnis 1:10 verdünnt wird. Zur Herstellung der Stammlösung II und zum Auffüllen der Röhrchen auf 1 ccm wird, wie bei der Hämagglutination des Pferdeferums, zur Tyrodelösung ebenfalls ein Zusatz von inaktiviertem Serum gesunder Pferde im Verhältnis 1:10 beigegeben. Nachdem jedes Röhrchen auf 1 ccm aufgefüllt ist, wird 1 ccm einer Aufschwemmung von Erythrozyten eines anämiekranken Kaninchens hinzupipettiert. Das Kaninchen wird in derselben Weise vorbereitet, wie dies für die Hämagglutination beim Pferd bereits beschrieben ist. Die Blutaufschwemmung soll auch hier möglichst dünn gewählt werden. Bevor die Blutkörperchen in die Tyrodeflüssigkeit hineingebracht werden, wird letztere auf 41—42 Grad erwärmt.

Die Taubenversuche werden also nach folgendem Schema angesetzt:

	1:40	1:100	1:200	1:400	1:1000
Stammlösung I (0,5 ccm Tb.-Serum 4,1 ccm HCl-Lösung 0,4 ccm 10% NaCl.)	0,5	0,2			
Stammlösung II (0,5 ccm Stammlösung I 4,5 ccm Serum-Tyrode)			1,0	0,5	0,2
Serum-Tyrode (Gemisch)	0,5	0,8	0,0	0,5	0,8
Blutkörperchenaufschwemmung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Ebenso wie beim Pferd lassen wir die Blutkörperchen 3—4 Stunden in: Wasserbade sedimentieren. Auch hier ist die Einhaltung der Isothermie von weittragender Bedeutung. Da die Tauben eine Eigenwärme von 41—42 Grad C haben, müssen die Proben in einem Wasserbade von ca. 42 Grad bis zum Ablauf der Reaktion aufbewahrt werden. Die Beurteilung erfolgt dann in der früher beschriebenen Weise.

Die in die Versuche einzustellenden Tauben werden zunächst einer Voruntersuchung unterzogen. Diese Voruntersuchung erstreckt sich auf die Ermittlung, ob die Tiere nicht bereits normaliter einen Agglutinationswert von 1:40 aufweisen. Wir setzen also die Verdünnung 1:40, der wir noch eine solche von 1:100 beifügen, für die Voruntersuchung an. Ist die Reaktion bei 1:40 positiv, so wird das Versuchstier für den Hauptversuch verworfen, auch wenn die Verdünnung 1:100 keine Hämagglutination erkennen läßt.

Im Hauptversuch beginnen wir sodann mit der Verdünnung von 1:100, die nach unseren Erfahrungen beim Vorliegen der ansteckenden Blutarmut erreicht wird und stufen, wie im Schema angegeben, bis 1:1000.

Zur Durchführung der Versuche war es zunächst erforderlich, einen Tag zu ermitteln, an dem möglichst sämtliche reagierenden Tiere das Phänomen der Hämagglutination aufwiesen, da eine zu häufige Punktierung nicht tunlich erschien. An einer großen Anzahl von Versuchen haben wir feststellen können, daß das Taubenferum am 9. Tage p. inf. mit geringen Ausnahmen die Hämagglutinine aufweist, und nur in ganz vereinzelt Fällen erst ein oder zwei Tage später die Antikörperbildung ausgeprägt ist. Demgemäß untersuchen wir die Versuchstiere zunächst am 9. Tage, ist das Resultat ein positives, so wird der Versuch abgeschlossen, ist das Resultat negativ, so wird eine erneute Untersuchung am 11. Tage vorgenommen. Ist in Ausnahmefällen die Reaktion am 11. Tage noch positiv geworden, so wird dieses Resultat der endgültigen Beurteilung zugrunde gelegt. Ist die Reaktion am 11. Tage wiederum negativ, so schließen wir damit das Vorliegen der ansteckenden Blutarmut aus.

Nachdem wir in orientierenden Versuchen festgestellt hatten, daß die Taube auf den Keim der ansteckenden Blutarmut mit der Bildung von Hämagglutininen reagiert, schien es zunächst erforderlich, durch Einverleibung gefunden Pferdeferums den Beweis zu erbringen, daß diese Hämagglutination nicht etwa auf der Wirkung des artfremden Eiweißes beruht. Zu diesem Zweck wurden von dem im Untersuchungsamt untergebrachten Pferde „Stelzfuß“ 18 in der Voruntersuchung tauglich befundene Tauben mit 2 ccm Serum intramuskulär injiziert. Bei der Untersuchung am 9. und 11. Tage ließen die Versuchstiere keinerlei hämagglutinierende Eigenschaften erkennen. Von einem weiteren Pferde „Rappstute“, das sich klinisch und im Tierversuch als gesund erwiesen hatte und von uns zu Infektionsversuchen angekauft worden war, wurde einer weiteren Gruppe von sechs Tauben je 2 ccm Serum subkutan injiziert, die gleich der ersten ein negatives Resultat ergaben. Eine Gruppe von acht Tauben, denen 2 ccm Schüttelblut von Rindern intramuskulär injiziert waren, ergab ebenfalls keine Hämagglutination. Auch Bakterieneiweiß wurde einer Reihe von Versuchstauben einverleibt, um festzustellen, ob nicht durch dieses etwa eine Hämagglutination ausgelöst wird. So wurden neun Tauben mit 1 ccm einer Tuberkelbakterienaufschwemmung intramuskulär infiziert. Das Untersuchungsergebnis bei diesen Tieren war ein vollständig negatives (durch einen Meerfischweinchenversuch wurde die Virulenz der Kultur nachgewiesen). Auch die intramuskuläre Einverleibung von 0,5 ccm Ophthalmotuberkulin bei 10 Tauben und von 5 ccm Tuberkulin zur subkutanen Tuberkulinprobe bei ebenfalls 10 Tauben ergab bei allen Versuchstieren ein negatives Resultat. Desgleichen reagierten acht Tauben, denen 2 ccm Geflügelcholeraavakzine injiziert wurde, negativ. Damit kann gesagt werden, daß durch artfremdes Eiweiß dem Taubenferum hämagglutinierende Eigenschaften nicht verliehen werden.

In einem weiteren umfangreichen Versuche mußten wir nun die Frage klären, wie groß der Prozentsatz der für die ansteckende Blutarmut empfänglichen Tauben ist, und welche Menge Infektionsmaterial tunlichst zur Verwendung kommen muß. Zu diesem Zweck wurden 70 Tauben mit Milchferum bzw. Mischblut von verschiedenen bestimmt anämiekranken Pferden verwandt. Die Menge des Infektionsmaterials wurde bei intramuskulärer Infektionsart variiert.

	1/2 ccm	1 ccm	2 ccm	4 ccm	Infiziert mit
Anzahl der positiv	8	8	7	8	Serum
negativ	1	1	2	1	
Anzahl der positiv	7	8	7	7	Schüttelblut
negativ	2	0	1	2	
Mithin positiv	15	16	14	15	= 60
negativ	3	1	3	3	= 10

Aus diesem Versuch schließen wir, daß ca. 15 Prozent der Tauben für die ansteckende Blutarmut unempfindlich sind oder die Empfänglichkeit nicht durch Hämagglutininbildung kennzeichnen. Wenn dieser Prozentsatz auch verhältnismäßig gering, so macht er es doch erforderlich, für jeden Versuch zwei Versuchstiere zu verwenden. Im übrigen glauben wir, wenn auch geringe Unterschiede nach der Menge und der Art des Infektionsmaterials vorhanden zu sein scheinen, daß diesen Faktoren eine ausschlaggebende Bedeutung nicht zukommt.

Weiter wurde der intrakutane Infektionsweg versucht. Zu diesem Zweck wurde mit einem scharfen Skalpell an der

linken Brustseite nach Entfernung der Federn die Haut des Versuchstieres skarifiziert und mit einem Wattetampon das Infektionsmaterial in die Wunden verrieben. Bei diesen Versuchen stellte sich heraus, daß auch bei der intrakutanen Infektion die Ansteckung mit derselben Sicherheit wie bei der intramuskulären Infektion haftet. Wir sind daher dazu übergegangen, bei der praktischen Durchführung der Taubenversuche sämtliche Versuchstiere intrakutan zu infizieren.

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß für die Durchführung der Versuche alte ausgewachsene Tauben erforderlich sind, da junge Tiere eine weit größere Resistenz, ebenso wie wir das auch beim Huhn festgestellt haben, aufweisen.

Endlich haben wir die Frage zu klären versucht, ob Tauben, die, ohne künstlich infiziert zu sein, bereits ein positives Resultat ergaben, mit dem Keim der ansteckenden Blutarmut behaftet waren, oder ob es sich hier um eine unspezifische Hämagglutination handelt. Von solchen Tauben wurden zahlreiche Kaninchenversuche eingeleitet, die regelmäßig ein ausgesprochen positives Hämogramm aufwiesen. Normales Tauben Serum dagegen wirkt sich beim Kaninchen, wie ebenfalls festgestellt wurde, nicht in dieser Weise aus. Damit müssen wir annehmen, daß die Tauben tatsächlich sich aus infektiösem Material, das in verseuchten Gehöften in hinreichender Menge auf den Dunghaufen zur Verfügung steht, infiziert haben.

Zusammenfassung.

1. Die Taube ist für das Virus der ansteckenden Blutarmut der Einhufer empfänglich.
2. Im Tauben Serum treten durch den Einfluß des Virus der infektiösen Anämie ebenso wie im Pferde Serum Agglutinine auf, die die Blutkörperchen von Kaninchen zusammenzuballen vermögen.
3. Ein Agglutinationswert von 1 : 100 ist als spezifisch anzusehen.
4. Die Hämagglutination ist am 9. bzw. 11. Tage p. inf. bei allen reagierenden Tieren zu finden.
5. Die Menge des Infektionsmaterials, ebenso die Art der Einverleibung, ob intrakutan oder intramuskulär, ist für das Haften der Infektion gleichgültig. Der intrakutane Infektionsweg ist vorzuziehen, da Verluste an Versuchstieren durch verdorbenes Serum usw. leicht vermieden werden.
6. Es kann mit einer Empfänglichkeit von ca. 85 Prozent der Versuchstiere gerechnet werden, daher sind zwei Tiere zu diagnostischen Versuchen zu verwenden.
7. Durch artfremdes Eiweiß wird die Bildung von Hämagglutininen nicht hervorgerufen.

(Aus dem Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover. — Direktor: Prof. Dr. Mießner.)

Zur pathogenen Wirkung von *Strongylus equinus*, *edentatus* und *vulgaris* auf die Dickdarmschleimhaut des Pferdes.

(Mit 4 Abbildungen.)

Von Oberassistent Dr. R. Wetzel, Hannover.

Die im Caecum und ventralen Colon der Pferde schmarotzenden *Strongylus*-Arten, *S. equinus*, *edentatus* und *vulgaris* haften bekanntlich beim Öffnen des noch lebenswarmen Darmes fast immer mit ihrem Kopfende der Schleimhaut fest an. Sie befestigen sich durch Einfaugen eines Schleimhautpfropfes in die gut entwickelte Mundkapfel, und es bedarf oft eines relativ kräftigen Zuges, um die Würmer zu entfernen. Erkalte der Darm, beginnen die Parasiten sehr bald sich von selbst von der Schleimhaut zu lösen. Die Anheftungsstellen erscheinen als kleine, meist leicht rötliche, $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ mm breite und ebenso hohe knopfförmige Erhebungen der Schleimhaut.

Nach Joest (1926, S. 791), erzeugt *S. vulgaris* durch sein Anfaugen keine erheblichen Veränderungen der Darmschleimhaut. Vallillo (1908, S. 518) fand bei seinen histologischen Untersuchungen von Anheftungsstellen dieses Wurmes in der Mukosa einen rundlichen Entzündungsherd, an dessen Oberfläche die Drüsen geschwunden waren. Die Muscularis mucosae war durchbrochen, doch erwiesen sich die tieferen Schichten der Schleimhaut nicht verändert. Die Herde zeigten starke zellige Infiltration, an der vornehmlich polynukleäre, eosinophile Leukozyten beteiligt waren. In den Schnitten von Hummel (1908, S. 569) durch eine Anheftungsstelle von *S. vulgaris* fehlten die Drüsen ebenfalls. Die knopfförmige, in der Mundkapfel befindliche Erhebung bestand aus gewuchertem submukösem Bindegewebe. Auch Höppli (1927, S. 30) sah im Bereich der Anheftungsstelle eines *S. vulgaris* keine Drüsenepithelien mehr. Im Grunde der Mundkapfel fand er Reste von Epithelien und schollige Massen, die im Hinblick auf den anatomischen Bau des Vorderendes des Wurmes auf die Einwirkung eines Drüsensekretes schließen lassen.

Über die Pathogenese der Schleimhautveränderungen sowie über Untersuchungen der Anheftungsstellen von *S. equinus* und *S. edentatus* liegen in der mir zur Verfügung stehenden Literatur keine Angaben vor. Es erschien mir daher angebracht, eine größere Anzahl an der Darmschleimhaut haftender Exemplare von *S. equinus*, *S. edentatus* und *S. vulgaris* zu schneiden. Das Gesamtmaterial umfaßt 25 Schnittserien, von denen 12 auf *S. equinus*, 6 auf

S. edentatus und 7 auf *S. vulgaris* entfallen. Um bessere Vergleichsmöglichkeiten zu haben, wurde nur Material aus dem Caecum genommen und noch körperwarm in 70prozentigem Alkohol fixiert. Die Einbettung geschah in Paraffin. Es wurden Längs- und Querschnitte angefertigt und mit Haematoxylin-Eosin gefärbt.

Zum besseren Verständnis der Schleimhautveränderungen und ihrer Pathogenese sei zunächst eine kurze Betrachtung über den Bau des Kopfendes der drei *Strongylus*-Arten eingefügt.

Die Mundöffnung befindet sich bei den *Strongylus*-Arten am vorderen Körperende und steht senkrecht zur Längsachse des Körpers. Sie ist rund und wird von einer ringförmigen Verdickung der Haut, dem Mundwall, begrenzt, der sich an seiner Basis durch eine leichte Einschnürung von der übrigen Kutikula absetzt (Abb. 1 Mw.). Der scharfe freie Rand des verhältnismäßig hohen Mundwalles ist in zahlreiche feine Spitze Blättchen gespalten. Sie bilden den äußeren Blätterkranz (Corona radiata) und sind axial und leicht vorwärts gerichtet (Abb. 1 Blk.). Während die Elemente des Blätterkranzes bei *S. equinus* und *S. edentatus* einfach erscheinen, sind sie bei *S. vulgaris* gefranzt (Cram 1921, S. 188, Imminck 1921, S. 291). Die Mundöffnung wird nicht vom Mundwall verschlossen. Obwohl der Mundwall eigener Muskulatur entbehrt, kann er doch indirekt erweitert und wieder verengt werden. Dabei erfährt auch die Stellung der Elemente des äußeren Blätterkranzes eine Änderung. Die Weite der Mundöffnung an der Basis des Blätterkranzes gemessen, beträgt bei in heißem Alkohol fixierten Individuen von *S. equinus* 580—740, bei *S. edentatus* 570—720 und bei *S. vulgaris* 290—400 μ , wobei die kleineren Werte stets bei den Männchen ermittelt wurden. Auf seiner Außenfläche trägt der Mundwall sechs kleine Kopfpapillen, von denen zwei lateral und vier submedian angeordnet sind (Abb. 1, s. P.). Die lateralen Papillen treten kaum hervor, während die submedianen als kleine Spitzchen an der Basis des

äußeren Blätterkranzes erscheinen. Die Kopfpapillen enthalten die Enden feiner Nervenfasern und dienen den Würmern augenscheinlich als Tastorgane. In den lateralen Papillen münden außerdem die „Kopfdrüsen“ aus, langgestreckte Drüsenzellen, die bei den *Strongylus*-Arten jederseits in der Substanz der Seitenbänder eingebettet sind (L o o s s 5 1901, S. 51, 61).




Abb. 1. Kopfbefunde von *S. equinus* lateral, halbchematisch.

Die Mundöffnung führt in die Mundhöhle, die von der mächtig entwickelten chitinösen Mundkapfel gebildet wird (Abb. 1, Mk.). Sie hat bei *S. equinus* regelmäßige ellipsoide Gestalt, eine annähernd kreisrunde, etwa 700 μ weite orale Öffnung und ist 1—1,1 mm tief und 0,8 bis 0,9 mm breit. Die Mundkapfel von *S. edentatus* ist ausgesprochen becherförmig und hat eine Tiefe von etwa 1 mm. Ihr maximaler Breitendurchmesser, dicht hinter der ebenfalls kreisrunden oralen Öffnung gelegen, beträgt 0,85—1 mm. Die Mundkapfel von *S. vulgaris* ist auch annähernd becherförmig, doch erscheint die dorsale Hälfte stärker gewölbt und etwas kürzer als die ventrale. Der größte Breitendurchmesser findet sich nahe dem vorderen Rande und ist 0,56—0,6 mm, während die Tiefe durchschnittlich 0,46—0,53 mm beträgt. Bei allen drei Arten zeigt die Mundkapfel an ihrer Außenfläche, dicht hinter dem vorderen Rande eine ringförmige Verdickung, die von den sechs Kopfpapillen unterbrochen wird. Der vordere Rand der Mundkapfel ist nach innen umgebogen und bildet eine feichte Rinne, die schon von J ä g e r s k j ö l d (1897, S. 3) erwähnt wird. Dorsal zieht von hinten nach vorn eine in die Mundhöhle leicht vorpringende Rinne. Sie enthält den Ausführungsgang der dorsalen Ösophagusdrüse, der dicht am vorderen Rand in die Mundkapfel mündet (Abb. 1, Dr.). *S. equinus* und *S. vulgaris* haben an der Basis der Dorsalrinne je einen in die Mundkapfel vorpringenden Anhang, der sich in zwei oralwärts gerichtete Fortsätze, „Zähne“ genannt, spaltet. Hierzu gesellen sich bei *S. equinus* im Grunde der Mundkapfel noch zwei weitere kleine über den subventralen Ösophagussektoren stehende „Zähne“ (Abb. 1, svz und dz).

An die Mundkapfel schließt sich ein äußerst kräftig entwickelter Ösophagus. Kranial mit einer leichten Erweiterung beginnend, verjüngt er sich bis zum Nervenring etwas, um kaudal allmählich bulbosförmig anzuschwellen. Seine maximale Breite erreicht er kurz vor dem Übergang in den Darm. Die Länge des Organs beträgt bei *S. equinus* etwa 1,5—2, bei *S. edentatus* etwa 1,3—1,8 und bei *S. vulgaris* 0,8—1,3 mm. Die Wand des Ösophagus besteht hauptsächlich aus radiärer Muskulatur, die in drei Sektoren, einem dorsalen und zwei subventralen, angeordnet ist. Das von ihm begrenzte dreispitzige Ösophaguslumen hat einen kräf-

tigen Chitinbelag, der kranial eine trichterförmige Erweiterung bildend, mit der Mundkapfel in Verbindung steht. Im dorsalen Segment findet sich die dorsale Ösophagusdrüse, die besonders gut in dem oralen Abschnitt entwickelt ist (Abb. 1, Oes D.). Ihr Ausführungsgang verläuft in der oben erwähnten Dorsalrinne der Mundkapfel und mündet dicht am vorderen Rande in die Mundhöhle. Der Ösophagus ist mit Schneider, Martin, Imminck u. a. als ein ausgesprochenes Saugorgan aufzufassen.

Am vorderen Körperende findet sich auch noch die Ausmündung des Exkretionsystems und der mit ihm verbundenen Halsdrüsen. Sie liegt ventral in der Medianlinie und zwar bei *S. equinus* und *S. edentatus* dicht kaudal vom Mundwall, bei *S. vulgaris* dagegen etwa auf der Höhe des Nervenringes.

Histologischer Befund: Die Anheftungsstellen der drei *Strongylus*-Arten haben mit Ausnahme eines Falles von *S. vulgaris* bei Lupenvergrößerung grundsätzlich das gleiche Aussehen. Das in die becherförmige Mundkapfel eingefogene Schleimhautstück reicht etwa bis zur halben Kapfelhöhe. Es ist an seiner Oberfläche mehr oder weniger abgerundet, liegt seitlich der Kapfelwand dicht an und wird vom vorderen Mundkapfelrand und dem Mundwall stark eingeschnürt. Die eingezogene Schleimhautpartie besteht aus dem Stratum glandulare, der Muscularis mucosae und Teilen der Submukosa (Abb. 2, 3). In einem Falle von *S. vulgaris* ist nur das Stratum glandulare in die Mundkapfel eingezogen (Abb. 4). Die untere Mundkapfelhälfte erscheint mit einer sich rosa färbenden, scholligen Masse erfüllt, die stellenweise dunkelviolette Pünktchen enthält.




Abb. 2. Längsschnitt durch das Kopfende von *S. equinus* an der Schleimhaut haftend. Photo. „Mikam“ Leitz Periplan. Ok. 4 $\times$, Obj. 3.

Die der Anheftungsstelle benachbarte, nicht in die Mundkapfel eingezogene Schleimhaut zeigt bei starker Vergrößerung mit Ausnahme eines Falles von *S. vulgaris* (Fall X) normale Struktur. Bei der in der Mundkapfel befindlichen Schleimhaut dagegen ist das Stratum glandulare in mehr oder weniger großer Ausdehnung zerstört. Es fehlt stets an der halsförmigen Einschnürungsstelle. Häufig ist die Drüschicht auch an den übrigen Teilen des Schleimhautpfropfes völlig verschwunden (Abb. 3). In anderen Präparaten lassen sich noch deutlich einzelne Tubuli mit ihren Epithelzellen erkennen (Abb. 2, 4). Die Zerstörung des Stratum glandulare ist in den einzelnen Fällen verschieden weit vorgeschritten. In den scholligen, rosa gefärbten Massen, die die aborale Hälfte der Mundkapfel erfüllen, finden sich in der Nähe des Schleimhautpfropfes vereinzelte Epithelzellen mit noch gut färbbarem Kern. Manchmal liegen dieselben in Verbänden von 2—3, was auf einen Tubulusrest hindeutet. Daneben sind Zellkerntrümmer,

Kernschatten, sowie vereinzelte Lymphozyten festzustellen. Gelegentlich werden in geeigneten Schnitten auch im Lumen des Ösophagus solche Zellreste angetroffen. Die Muscularis mucosae erscheint unverändert.




Abb. 3. Längsschnitt durch das Kopfende von *S. vulgaris* an der Schleimhaut haftend. Photo. „Mikam“ Leitz Periplan. Ok. 4×, Obj. 3.

Den Hauptbestandteil des in die Mundkapfel eingefogenen Schleimhautpfropfes bildet die bindegewebige Submukosa. An der Einschnürungsstelle sind die Bindegewebsfibrillen zusammengepreßt. Sie erscheinen kernarm und ihre Kerne haben längliche Gestalt. In dem in der Mundkapfel befindlichen Teil liegen die Bindegewebsfasern lockerer. Die Kerne sind meistens kürzer und dicker und einzelne zeigen Fibroblasten-Charakter. Die in dem eingezogenen Teil der Submukosa vorhandenen Blutgefäße erscheinen in manchen Fällen reichlich mit Blut gefüllt, während in anderen Schnitten wieder Blutkörperchen kaum in Erscheinung treten. Bei einigen Fällen (vier *S. equinus*, zwei *S. edentatus*, 2 *S. vulgaris*) ist der Schleimhautpfropf sowie das Gewebe in der näheren und weiteren Umgebung der Anheftungsstelle reichlich mit eosinophilen Leukozyten durchsetzt. Die übrigen Fälle lassen keine Eosinophilie erkennen. Unter der Anheftungsstelle ist die Submukosa infolge des vom Wurm ausgeübten Zuges stark aufgelockert (Abb. 3). Die Lücken sind z. T. mit einer sich homogen rosa färbenden Masse angefüllt.

Der vordere Mundkapfelrand drückt sich mit der von ihm gebildeten Rinne an der Einschnürung der eingefogenen Schleimhautpartien scharf in die Mukosa ein. Die Verhältnisse werden am deutlichsten durch Abb. 2 veranschaulicht, die zwei derartige Druckstellen zeigt. Der Mundwall schmiegt sich mit dem Blätterkranz der Schleimhaut innig an, wobei in allen Fällen die Elemente des Blätterkranzes kelchblattartig nach außen umgeklagen sind (Abb. 3, 4). Der Blätterkranz dient demnach nicht zum Anheften der Würmer an die Schleimhaut, wie man vielfach meint und wie es auch von Imminck (1921, S. 14) und Ihle (1922, S. 14) angegeben wird. Die Schnitte ergeben bei den „Zähne“ tragenden Arten *S. equinus* und *S. vulgaris* keine Anhaltspunkte für die Funktion bzw. pathogene Wirkung dieser Gebilde.

Pathogenese: Die histologischen Befunde an den Anheftungsstellen deuten darauf hin, daß die Schleimhautveränderungen durch das Zusammenwirken zweier Faktoren, den mechanischen Reiz des Anfaugens und die Wirkung des Sekretes der dorsalen Ösophagusdrüse, bedingt werden. Zum Anfaugen preßt der Wurm seine Mundöffnung gegen die Schleimhaut. Durch wiederholtes Erweitern des muskulösen Ösophagus und Abschlucken des vorherigen Mund-

höhleninhaltes wird in der Mundkapfel ein relativer starker negativer Druck erzeugt, der zum Anfaugen und allmählichen Einziehen der vorliegenden Schleimhautpartie führt. Sie wölbt sich dabei halbkugelig vor und wird durch die




Abb. 4. Längsschnitt durch das Kopfende von *S. vulgaris* an der Schleimhaut haftend. Photo. „Mikam“ Leitz Periplan. Ok. 4×, Obj. 3.

relativ enge vordere Mundkapfelöffnung sowie durch den Mundwall halsförmig eingeschnürt. Auf diese Weise erreicht der Parasit eine innige Befestigung an die Schleimhaut. Bei dem Vorgang des Anfaugens erfährt das Schleimhautgewebe durch Lockern und Dehnen der Zellverbände, wobei es auch zur Eröffnung von Blutgefäßen kommt, einen Entzündungsreiz.

Der in der Mundkapfel befindliche durch den wiederholten Saugreiz an seiner Oberfläche aufgelockerten Schleimhautpfropf ist weiterhin der Wirkung des Sekretes der dorsalen Ösophagusdrüse ausgesetzt. Dafür sprechen neben dem anatomischen Bau des Vorderendes der *Strongylus*-Arten, auf den schon Looss (1901, S. 29) und Höppli (1928, S. 31) hinweisen, die Zellreste und Kerntrümmer in der unteren Hälfte der Mundkapfel. Die losgelösten Gewebelemente erfahren also in der Mundhöhle eine Art Vorverdauung und dienen den Würmern mit dem bei der allmählichen Zerstörung des Stratum glandulare aus dem periglandulären Kapillarnetz ausfließenden Blut als Nahrung. Imminck (1921, S. 14) konnte im Darmkanal von *S. edentatus* solche Darmschleimhautzellen nachweisen, während Verspyck Mijnsen (Ihle 1922, S. 15) nur Reste von roten Blutkörperchen fand. Die Verhältnisse sind demnach für die *Strongylus*-Arten des Pferdes grundsätzlich die gleichen, wie sie Looss für *A. duodenale* (1905 S. 98) und Höppli (1927 S. 31) für eine Reihe anderer mit Mundkapfel versehener Strongyliden angeben.

Das völlige Verschwinden des Stratum glandulare sowie vereinzelte in der Submukosa des eingefogenen Schleimhautpfropfes beobachtete Kerne mit Fibroblasten-Charakter deuten auf eine längere Einwirkung des Reizes, also auf ein längeres Haften der Würmer an ein und derselben Stelle.

Nach Looss (1901, S. 29, Fußnote) nähren sich die *Strongylus*-Arten, wenn sie sich zum Auffuchen einer neuen Haftstelle von der Darmschleimhaut losgelöst haben, auch vom Darminhalt ihrer Wirte. Er schließt das aus den gelegentlichen Funden von Ingestapartikelchen und Wurmeiern im Darmkanal der Würmer. Doch sprechen der anatomische Bau des vorderen Körperendes sowie besonders der histologische Befund an den Anheftungsstellen für ein ausschließliches Abgestimmtsein der Parasiten auf eiweißreiche tierische Nahrung (Schleimhautzellen und Blut). Weiterhin scheint der äußere Blätterkranz bei den von der Schleimhaut ge-

löften Würmern gerade die Funktion zu haben, das Eindringen von korpuskulären Elementen der Ingesta in die Mundhöhle zu verhüten. Ihr gelegentliches Vorhandensein im Darmkanal der Würmer läßt sich zwanglos dadurch erklären, daß sie beim Anfaugen bzw. bei Anfaugeversuchen an der Schleimhaut mit eingefogen worden sind.

Zusammenfassung.

1. Die Befestigung von *S. equinus*, *edentatus* und *vulgaris* an die Darmschleimhaut schützt die Würmer vor passiver Entfernung aus dem Darm und vermittelt ihnen gleichzeitig die Nahrung.

2. An der Anheftungsstelle erzeugen die Würmer bestimmte Schleimhautveränderungen, die bei den drei *Strongylus*-Arten grundsätzlich übereinstimmen.

3. Es kommt an der Anheftungsstelle zur völligen Zerstörung des Stratum glandulare. Sie deutet in Verbindung mit vereinzelt auftretenden Fibroblasten in der Submukosa des eingezogenen Schleimhautpfropfes auf ein längeres Haften der Würmer an ein und derselben Stelle.

4. Die zerstörten Schleimhautzelemente und die dabei freiwerdenden Blutkörperchen dienen den Würmern als Nahrung.

5. Die Elemente des äusseren Blätterkranzes dienen nicht zur Anheftung an die Schleimhaut.

Literatur.

- Cram, M.: „A Case of Nanism in *Strongylus vulgaris* and Observations on the Leaf-crowns in Species of *Strongylus*.“ Journ. parasit. 1921, 7, S. 188. — Hoeppli, R.: „Über Beziehungen zwischen dem biologischen Verhalten parasitischer Nematoden und histologischer Reaktionen des Wirtstierkörpers.“ Arch. für Schiffs- und Trop.-Hyg. 1927, 31, Beiheft 3. — Hummel, P.: „Vergleichende Untersuchungen über die im Darm des Pferdes vorkommenden Knoten und geschwürartigen Veränderungen mit besonderer Berücksichtigung der Rotzkrankheit.“ Arch. wiss. Tierheilkunde 1908, 34, S. 550. — Ihle, J. E. W.: „De in den dikken darm van het paard levende volwassen *Strongyliden* (Sklerostomen).“ Rapport der Commissie voor het Sclerostomiasis-oonderzoek in Nederland. I. Zoolog. Gedeelte. s'Gravenhage 1922. — Immink, B. C. M.: „Bijdrage tot de Kennis van den bouw van den voordarm van *Sclerostomum edentatum* Looss.“ Proefschrift Leiden, 1921. — Dieselbe: „On the microscopical Anatomy of the Digestive System of *Strongylus edentatus* Looss.“ Arch. d'anat. d'hist. et d'embr. 1924, S. 281. — Joest, E.: „Spezielle pathologische Anatomie der Haustiere.“ 2. Aufl. Berlin 1926, I. Bd. — Jägerskiöld, L. A.: „Über den Ösophagus der Nematoden.“ Bihang till K. Svenska Vet. Akad. Handlingar. 1897, 23, Afd. IV; Nr. 5. — Looss, A.: „The Sclerostomidae of Horses and Donkeys in Egypt.“ Rec. Egypt. Govern. School of Med. 1901. — Dieselbe: „The Anatomy and Life-history of *Agchylostoma duodenale* Dub.“ Ebenda 1905, Bd. III. — Mijnsen, V., siehe Ihle. — Vallillo, G.: „Die positive chemotaktische Wirkung des Extraktes von *Sclerostomum bidentatum* und dessen Larven auf die polymorphkernigen eosinophilen Leukozyten.“ Arch. wiss. Tierheilkunde 1908, 34, S. 505.

Eine einfache Spreize für die Schweineschlachtungen.

(Mit 2 Abbildungen.)


Von Dr. Rieken, Schlachthofdirektor in Göttingen.

Der Schlachthof Göttingen hat in seiner Schweineschlachthalle eine Umänderung erfahren: erhöhte Tötebucht, Brühbottiche mit Gleitrollen, geschweifte Enthaarungstische und eine besonders einfache, auf der Hochtransportbahn fahrbare Spreize.

Inwieweit an anderen Schlachthöfen schon ähnliche ein-

tungen, die sich mit dem Gedanken einer Veränderung besonders in der Schweineschlachthalle tragen, ihre Aufmerksamkeit auf diese einfache Spreize zu lenken.

An der Laufkatze sind die beiden Schenkel der Spreize befestigt, diese verbindet ein dritter Schenkel, so daß die Spreize ein geschlossenes, unveränderliches Dreieck darstellt.



fache Spreizen bestehen, entzieht sich unserer Kenntnis und es soll auch mit diesem Artikel durchaus nicht ein Anspruch auf eine „Neuheit“ gemacht werden. Wir beabsichtigen mit dieser Veröffentlichung nur, die Schlachthofverwal-

An jeder Verbindungsstelle befindet sich ein Haken. In diesen Haken wird jederseits eine Kette eingehängt, die am unteren Ende einen Haken trägt, der vom Schlachter auf dem Enthaarungstisch zwischen Knochen und Sehne des

Schweines gestoßen wird. Der Schlachter wählt je nach der Länge des Schweines den Ring der Kette, um eine Berührung des Kopfes des Schweines mit dem Fußboden beim Abfahren auf der Hochtransportbahn zu verhindern. An der Ausflachtstelle hängt dann das Schwein in Spreizstellung (Fig. 1). Beim Durchhacken der Wirbelsäule wird das Schwein automatisch durch den Zug des Kettenringhakens weiter gespreizt (Fig. 2). Ein in der Mitte der Spreize angebrachter Haken kann zum Aufhängen der Organe dienen.

Anatomie und Physiologie.

Andres, J.: Über die Mägen der Wiederkäuer. (Schweizer Arch. für Tierheilkunde 1928, S. 225.)

Die Einrichtung der Vormägen erklärt sich aus deren spezieller Funktion, die schwerverdaulichen pflanzlichen Stoffe auf mechanischem und auch fermentativem Wege zur Aufschlüsselung im eigentlichen Verdauungsapparat vorzubereiten. Fleischfresser haben einen viel einfacheren Verdauungsapparat, ihre Nahrung ist leichter zu resorbierbaren und assimilierbaren Zerfallsprodukten zu verändern; sie weisen daher auch einen viel kürzeren Darm auf, als die Pflanzenfresser allgemein. Auch in der Anordnung des Gebisses zeigen die beiden Haustiergruppen charakteristische Merkmale. Die für den großen Körper der Pflanzenfresser notwendige Futtermenge würde ohne die Einordnung eines als Speicherraum dienenden Systemes im Verdauungsschlauch schwer zu erlangen sein, wenn die Tiere das jedesmal nötige Quantum vorweg aufnehmen müßten. Diese physiologische Einrichtung der Speicherung zwecks Vorverarbeitung bedingt eine Reihe von besonderen Funktionen in dem Gebiet der Speicherung, z. B. das Wiederkauen, Rülpsen usw. Bereits der anatomische und histologische Bau der Vormägen gibt Anhaltspunkte über deren Zweck, wenn sich auch bis heute experimentell begründete Tatsachen, Analysen der Vorgänge noch nicht in allen Fällen haben beibringen lassen. Die anatomische Kenntnis der Vormägen darf vorausgesetzt werden, so daß nur einzelne Feststellungen ihrer Funktion, wie wir sie heute kennen, kurz anzuführen sind. Das erstmals aufgenommene Futter unterliegt im Pansen einer teilweisen Gärung oder Mazeration (Bakterien, Nachwirkung der Pflanzenfermente); daher hat v. Süssdorf diesen Magen Mazerationsmagen genannt. Die funktionelle Bezeichnung dieses und der übrigen Mägen sollte beibehalten werden. Der zweite Magen, die Haube, ist der Rejektionsmagen: ihre eigentliche Schleimhautmuskulatur befähigt sie, bei der Rejektion des Inhaltes zum Wiederkauen tatkräftig mitzuwirken. Der Psalter ist ein Exsikkations- und Triturationsmagen: er trocknet den Inhalt und zerreibt ihn. Dieser Magen fehlt den primitivsten Wiederkäuern, oder ist nur angedeutet. Man kann dies dadurch erklären, daß diese Tiere nur wenig zellulose- und ligninreiche Nahrung aufnehmen. Der eigentliche Magen ist der Labmagen, Drüsenmagen. Die eigenartige Schlundrinne verbindet alle vier Mägen, auch die einzelnen unter sich. — Die Innervation geschieht durch den Vagus und den Sympathikus. Der rechte Vagus versorgt allgemein, oft mit Fasern des linken vermischt, Haube, Psalter und Labmagen, der linke hat ebenfalls Fasern aus beiden Stämmen. Dadurch wird eine sichere Steuerung der Funktion der Mägen erreicht. Besonders lebenswichtig ist der rechtsseitige Vagusstamm. Die Automatie ist auf der Tätigkeit des linken oder eines Teiles des rechten Bauchvagus begründet; der Sympathikus reicht allein nicht aus. — Die flüchtig aufgenommene Futtermasse fällt in die Haube, von da in den Pansen oder aber direkt in den Pansen. Die Milch gelangt unmittelbar in den Labmagen; auch eßlöffelweise verabreichte Flüssigkeit gelangt unmittelbar dorthin. Nach anderer Ansicht können sich nach Aufnahme festen Futters

Jedes Hebwerkzeug: Flaschenzug usw. oder Streckvorrichtung und Nachspreizen ist überflüssig.

Berichtigung. Die in dem Artikel „Einige interessante Tuberkulosefälle“ Nr. 40, 1928, S. 672 wiedergegebene Tabelle gehört zu dem Artikel „Vorläufiges Ergebnis der im Bakteriologischen Institut in Halle a. Saale ausgeführten Versuche zur Frühdiagnose der Eutertuberkulose durch den Lymphozytennachweis in der Milch“ auf S. 664, Nr. 40.

die Schlundrandlippen nicht mehr ganz schließen, daher kommen auch kleine Flüssigkeitsmengen in die ersten Vormägen. In den ersten Vormägen findet die Vormazeration statt, die Zellhüllen des Futters werden gelockert. $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde nach der Futteraufnahme beginnt der Wiederkauakt, der weitgehend dem Willen unterliegt. Reflektorisch bildet sich an der Einpflanzungsstelle der Speiseröhre ein Trichter, während von oben die Zwerchfellschleife drückt. Die Haube zieht sich zusammen und drückt den Inhalt gegen den Trichter; dazu kommt eine von diesem ausgehende Saugwirkung. Durch reflektorischen Schluß der Trichterbasis wird der Bissen abgeteilt und steigt nach Erschlaffung der Zwerchfellschleife und durch die Kraft der nach vorn gerichteten Bewegungswelle der Speiseröhre in die Maulhöhle auf. Die Flüssigkeit sinkt nach der Bissenbildung in die erschlaffte Haube zurück. Während dem Wiederkauen tritt reflektorisch der Schluckakt ein und der Bissen fällt wieder in die beiden Vormägen. Während der Kauperiode wiederholt sich dieses Spiel. Unterdessen ziehen sich die Vormägen zusammen und befördern ihren, nun ein- oder mehrmal gekauten Inhalt durch die Haubenpsalteröffnung in den Psalter. Die etwa dreimal in 2 Minuten erfolgenden Bewegungen des Pansens sind in der linken Hungergrube fühlbar, werden „Pansenpuls“ genannt. Durch die Vormägenbewegung gelangt die Flüssigkeit entlang der Psalterrinne in den Labmagen, während die festen Futtermassen zwischen die Psalterblätter gedrückt werden. Von da wird es durch dessen Kontraktionen langsam und schubweise in den Labmagen gepreßt. Aus dem Wege, den die Futter- und Flüssigkeitsmengen in verschiedener Größe nehmen, ergeben sich auch Anhaltspunkte für die Therapie. Man wird je nach der verabreichten Menge im Pansen oder der Haube, besonders bei in kleinen Mengen verabreichten Medikamenten vom Labmagen aus wirken, wo die Resorption schneller stattfindet. Gasbindende Drogen müssen daher in fester Form und in großen Mengen gegeben werden. G.

Innere Medizin und Chirurgie.

Barth, W.: Versuche mit kolloidalen Metallgemischen „Cuprocollargol“ bei septischen Erkrankungen in der Veterinärmedizin. (In.-Diss. Leipzig 1928.)

Das Cuprocollargol ist die Kombination einer elektrokolloiden Silberlösung mit einer elektrokolloiden Kupferlösung (Chemische Fabrik von Heyden). Verf. kommt auf Grund seiner Versuche zu dem Ergebnis, daß das Präparat als sehr brauchbares Mittel bei der Sepsistherapie der Haustiere eine weite Verbreitung verdient. Als Hauptdomäne gelten die puerperalen Erkrankungen, aber auch bei anderen septischen Erkrankungen, insbesondere beim bösartigen Katarrhalfieber. Es genügen meist 1 bis 2 Injektionen, um ein Sinken der Temperatur herbeizuführen. Nach einem späteren Wiederanstieg des Fiebers gelang es, durch eine erneute Injektion Entfieberung und Besserung herbeizuführen. Das kolloide Kupfer Silber ist ein unschädliches Präparat, welches selbst in größeren Dosen und bei wiederholter Applikation an derselben Stelle gut

vertragen wird. Während man bei den Rindern meist kaum Reaktionsercheinungen feststellen konnte, zeigten sie sich stärker bei Pferden. Die Temperatur stieg oft wenige Stunden nach der Injektion um 1—2 Grad an, auch Puls und Atemfrequenz waren gesteigert, dabei zeigten die Tiere mehr oder weniger Unruheerscheinungen und Schweißausbruch, Kollapsähnliche Zustände hat B. bei feinen Versuchen nie beobachtet. Wenn die Mortalitätsziffer bei den Versuchen eine ziemlich hohe ist, so hat das seinen Grund darin, daß in den meisten Fällen schon von vornherein die Prognose ungünstig gestellt werden mußte, und demnach von einem Versagen des Cuprocollargols nicht gesprochen werden kann. Es wäre natürlich ganz verkehrt, in dem Cuprocollargol ein Alleinheilmittel erblicken zu wollen, das nie versagt und das selbst einen an schwerster Sepsis erkrankten Organismus zu heilen imstande wäre. In der Humanmedizin hat sich in neuerer Zeit mehr und mehr die Überzeugung Bahn gebrochen, daß die kolloiden Metalllösungen ihre Wirkung am besten entfalten, wenn sie nicht erst zur Anwendung gelangen, nachdem die Erkrankung bereits ihren Höhepunkt erreicht hat, sondern wenn sie prophylaktisch oder mindestens in den ersten Krankheitsstadien injiziert werden, daselbe dürfte auch für die Veterinärmedizin Geltung haben. A.

Mempel, S.: Klinisch-experimentelle Untersuchungen über die therapeutische Verwendung der Hochfrequenzströme in der Veterinärmedizin unter Berücksichtigung der Erfahrungen in der Humanmedizin. (In.-Diss. Leipzig 1927.)

Die Erfolge decken sich im wesentlichen mit denen in der Humanmedizin, daher ist die Hochfrequenztherapie wert, in der Vet.-Medizin dieselbe Würdigung zu finden. Die Erfolge an Tieren konnten den Beweis erbringen, daß die Behauptung einzelner Forscher, die die Erfolge beim Menschen als eine subjektive Wirkung betrachten, nicht zu Recht besteht. Besonders gilt dies in Bezug auf die Anwendung bei den verschiedenen Ekzemformen, wo die auch von Humanmedizinern überall in den Vordergrund gestellte schmerzstillende, juckreizmildernde und zirkulationsbefördernde Wirkung auch am Tiere objektiv bestätigt werden konnte. Die Elektrotherapie bedeutet daher für die Veterinärmedizin eine wertvolle Behandlungsmethode. Wenn man die Ergebnisse von Jöhrcke und von Eckert mit in Betracht zieht, so lassen sich folgende Indikationsgebiete für die Tierheilkunde aufstellen: Nervenerkrankungen, insbesondere Paralyse, Parese der Nachhand, spinale Ataxie, klonische Krämpfe und Nervenquetschung; Hautkrankheiten, namentlich die verschiedenen Arten der Ekzeme, Acanthosis nigricans und Haarausfall; Flächenwunden und Fisteln, Entfernung von Neubildungen (z. B. von Fibromen und Warzen), Lahmheiten infolge Muskelzerrungen und Distorsionen; Phlegmonen; Atrophie der Muskulatur. Bei nässenden Ekzemen wirken die Hochfrequenzströme geradezu fast spezifisch. Kontraindiziert sind sie bei Hauterkrankungen, die durch Milben hervorgerufen worden sind. In der ambulanten Praxis, im Hause des Besitzers wären sie jedoch nur nach reiflicher Überlegung anzuwenden (Abschrecken wegen umständlicher Behandlung, Kosten, Kurpfuschertum usw.). Zweifellos wird es der Technik noch gelingen, die Apparate zu vervollkommen, daß die Methode auch vom Tierarzt auf dem Lande voll ausgenutzt werden kann, zumal die Verwendungsart sehr mannigfaltig ist. A.

Janakieff, A.: Klinische Untersuchungen über die Wirkung einiger parenteral applizierbarer Laxantien beim Hunde. (In.-Diss. Leipzig 1927.)

Beim Hunde führen große Dosen von Chlorbaryum — über 0,001—0,003 Gramm pro Kilogramm Lebendgewicht — toxische Wirkungen herbei, zumal das Mittel nur intravenös angewendet werden kann. Aus diesen Gründen eignet sich das Mittel im allgemeinen nicht für die

Praxis beim Hunde. Pilokarpin könnte als subkutan anzuwendendes Mittel eher in Betracht kommen, wenn seine therapeutischen, toxischen Dosen etwas weiter auseinander liegen würden. Sehr geeignet für die subkutane Einverleibung ist Sennatin; es ruft eine milde Abführwirkung hervor und hat sich völlig ungefährlich gezeigt. In Fällen allerdings, wo man eine rasche Abführwirkung haben will, wird man dem Sennatin Neu-Cesol vorziehen; denn dieses besitzt neben seiner milden Wirkung und Ungefährlichkeit noch den Vorzug, schon nach 20—30 Minuten den gewünschten Erfolg herbeizuführen. Die therapeutische Dosis bei subkutaner Anwendung beträgt für Pilokarpin 0,0005 bis 0,011 Gramm, bei Sennatin 0,1—0,45, bei Neu-Cesol 0,001—0,005 pro Kilogramm Lebendgewicht (Wirkung meist in 10—30 Minuten, bei Sennatin in 2—3 Stunden). A.

Naumann, O.: Über die therapeutische Verwendbarkeit von Kamillosan-Präparaten. (In.-Diss. Leipzig 1927.)

Die mitgeteilten Fälle umfassen 19 Ekzeme, von denen elf als Ekzema madidans seu rubrum; vier als E. crustosum, zwei als E. squamo-crustosum, ein Fall je als Ekzema papulosum und E. chronicum verliefen; dazu kommt ein Fall von Furunkulose und Dermatophagus auricularis, einer mit Verbrennung 2. und 3. Grades und drei mit Wunden. Die Anwendung des Kamillosans geschah in zwei Formen: als Salbe und Puder. Die Salbe läßt sich infolge ihrer weichen Beschaffenheit sehr leicht verstreichen, dringt gut in die Haut ein, macht dieselbe geschmeidig und schädigt nicht. Innerlich hat Verf. das Präparat nicht verwendet, wohl aber konnte er des öfteren beobachten, daß gerade Hunde, die die Salbe durch fortgesetztes Lecken in größeren Mengen zu sich nehmen, keinerlei Schädigungen davongetragen haben. Im speziellen ist nun folgendes zu sagen: Die Kamillosan-salbe sowohl, wie der -Puder leisten bei Ekzemen, die sich im Stadium rubrum seu madidans, crustosum, squamo-crustosum befinden, gute Dienste und haben sich in diesen Fällen als juckreiz- und schmerzstillendes Mittel bewährt und resorptionsbefördernd, sekretionsbeschränkend und austrocknend gewirkt. Für chronische Ekzeme ist die Salbe viel zu mild. Bei Brandwunden, besonders solchen 2. und 3. Grades und denen, die eine große Ausdehnung aufweisen, ferner bei Furunkulose kommt dieses Präparat wohl kaum in Frage. Gute Erfolge hat Verf. jedoch bei Wunden, speziell traumatischer Art in beiden Anwendungsformen beobachtet. Die Wirkung bestand in einer schmerzstillenden, adstringierenden, antiseptischen, austrocknenden Eigenschaft und völliger Reizlosigkeit. — Auf Grund dieser genannten Eigenschaften ist das Kamillosan wohl geeignet, auch der Veterinärmedizin, im besonderen in der Klein-Chirurgie, gute Dienste zu leisten und von der rein wirtschaftlichen Seite betrachtet, andere bedeutend teure Mittel dieser Art in manchen Fällen zu ersetzen. A.

Gaedke: Ein neues Hufkrebsmittel. (T. R. 1928, S. 150.)

Verf. berichtet über gute Erfolge mit einem Hufkrebsmittel „Atarost“ der Zusammensetzung Plumb. nitric., Zinc. sulfuric., Cupr. acetic, selbst in Fällen, wo die gebräuchlichsten Behandlungsmethoden ihn im Stiche ließen.

K. H. Meyer.

Liebetanz: Zur Differentialdiagnose des Koppens. (T. R. 1928, S. 308.)

L. beschreibt einen Fall von Koppen, bei welchem nicht nur die Kontraktion der Brustzungenbein-, Brustschild- und Brustkiefermuskeln, sondern auch eine solche der seitlichen Halsmuskeln, besonders des Halsteiles des Musc. serratus ventralis sive anterior beobachtet wurde. K. H. Meyer.

Lehmann: Beiträge zur Kolikbehandlung mit Bariomyl. (T. R. 1928, S. 296.)

Von 86 mit Bariomyl behandelten Pferden gingen sechs ein, bei welchen Darmverfälschung nachgewiesen wurde. Ungünstige Nebenwirkungen des Bariomyls wurden nicht beobachtet. Eine Wiederholung der Behandlung in den

nächsten Tagen war nur in einem Falle notwendig. Bei hartnäckigen Verstopfungen wurde gleichzeitig Istin. vet. 15,0 per os verabreicht. Fohlen vertrugen das Bario-myl gleichfalls gut. Bei diesen genügte meist ein Drittel einer Ampulle.

K. H. Meyer.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Bekämpfung der Räude der Schafe in Preußen.

Min. f. L., D. u. F. V. 3499 vom 25. September 1928.

Im Jahre 1927 wurden in Preußen zur Tilgung der Schafräude in 17 Regierungsbezirken und 43 Kreisen Heilverfahren zur Anwendung gebracht. Dabei wurden 177 Bestände mit 14 373 Schafen (gegenüber 384 Beständen mit 19 713 Schafen) behandelt. Es ist demnach ein weiterer Rückgang der Schafräude festzustellen, obwohl, wie weiter unten angeführt, die unvermuteten Revisionen der Schafbestände in vermehrtem Umfange durchgeführt worden sind. Das Nähere über die Ergebnisse der Behandlung ergibt sich aus nachfolgender Übersicht.

Gesamtübersicht

über die Tilgung der Schafräude im Jahre 1927.

Nummer	Art der Behandlung	Zahl der Behandlung unterworfenen		Erfolg der Behandlung				Vor Tilgung d. Räude als Schlachtvieh verkauft u. geschlachtet		Ohne Erfolg der Behandlung unterworfenen	
		Be-stände	Schafe	Be-stände	Schafe	Be-stände	Schafe	Be-stände	Schafe	Be-stände	Schafe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bade- (1927	121	9504	78	8259	7	1001	35	204	1	40
	kur (1926	224	7692	82	4954	77	1129	63	1069	2	500
2	Schmier- (1927	22	2467	18	1844	3	548	—	71	1 ¹⁾	4 ¹⁾
	kur (1926	64	4353	37	2615	6	730	14	616	7	391
3	Be- (1927	34	2402	32	2202 ²⁾	1	32	—	24	1 ³⁾	116 ³⁾
	gasung (1926	96	7668	83	6496	5	877	8	277	.	.

Hieraus ist zu ersehen, daß in diesem Berichtsjahre das Badever-fahren am häufigsten zur Anwendung gelangt ist. Besonders hervor-zuheben ist, daß die inzwischen eingeführten Schwefelkalkbäder bei 28 Beständen mit 4831 Schafen — insbesondere in den Reg.-Bezirken Osnabrück, Kassel, Stade und Schleswig — zur Anwendung gelangten. Hiervon sind 26 Bestände mit 4631 Schafen geheilt worden. Bei 1 Be-stände mit 160 Schafen war die Beobachtungszeit z. Zt. der Bericht-erstattung noch nicht abgelaufen und nur 1 Bestand mit 40 Schafen wurde ohne Erfolg gebadet. Dieser Mißerfolg wird darauf zurück-geführt, daß das Baden in zu kleinen Gefäßen vorgenommen worden ist, so daß eine eigentliche Badekur in diesem Falle nicht vorgenommen worden ist. Mit Kreolinbädern sind 39 Bestände behandelt worden. Hiervon entfallen auf eine Gemeindeherde des Reg.-Bezirks Wiesbaden 32 Bestände mit insgesamt nur 150 Schafen. Es hat sich also in Wirk-lichkeit anscheinend nur um eine Sammelherde gehandelt. Sie wurde geheilt. Von den übrigen 7 Herden sind 4 geheilt, 3 waren noch nicht geheilt. Außer Schwefelkalk- und Kreolinbädern gelangten noch Kar-boxol-, Kresol-, Kremulsion-, Nördlinger-, Sulfoliquid- und Lysol-Bäder in geringem Umfange und mit wechselndem Erfolge zur Anwendung.

Die Gasbehandlung gelangte im Berichtsjahre nur noch in der Provinz Ostpreußen und im Reg.-Bezirk Stettin zur Anwendung. Insgesamt wurden der Gasbehandlung 34 Bestände mit 2402 Schafen unterworfen, von denen 32 Bestände mit 2202 Schafen geheilt worden sind. In 1 Bestände mit 32 Schafen war die Behandlung noch nicht ab-geschlossen. 1 Bestand mit 116 Schafen wurde nach zweimaliger erfolg-loßer Begasung mit Schwefelkalkbrühe behandelt; darauf erfolgte Hei-

lung. 28 Schafe sind infolge der Begasung verendet und 24 Schafe wurden vor Tilgung der Räude als Schlachtvieh verkauft und ge-schlachtet.

Von Schmierkuren wurde im Berichtsjahre noch in 22 Be-ständen mit 2467 Schafen Gebrauch gemacht. Davon waren 18 Be-stände mit 1844 Schafen zur Berichtszeit geheilt und 3 Bestände mit 548 Schafen noch nicht geheilt. In 1 Bestände mit 18 Schafen wurden nach der erfolglosen Schmierkur 4 Schafe der Badekur — Schwefelkalk-bäder — unterworfen. Dadurch wurde die Räude getilgt. Die übrigen 14 Schafe sind vor Beendigung der Behandlung geschlachtet worden. Als Schmiermittel wurden gebraucht Tabaklauge, graue Quecksilberfalbe, Kreoliniment, Kreolinseifenspiritus, Rädeliniment Fröhner, Räde-liniment Bengen, Kresol mit Schmierseife und Therapogen.

Eine unvermutete Unterfuchung der Schafhaltungen auf Räude fand in 25 (1926: 24) Reg.-Bezirken, 178 (142) Kreisen und 2310 (1842) Ge-meinden bei 5044 (4524) Beständen mit 512 481 (338 539) Schafen statt. Es wurden dabei 134 (246) Bestände als rädig ermittelt, darunter 72 im Reg.-Bezirk Wiesbaden — Gemeindeherden —, 15 im Reg.-Bezirk Osnabrück, 14 im Reg.-Bezirk Kassel und 11 im Reg.-Bez. Arnberg.

Ich erfuhe ergebenst, die Bekämpfung der Schafräude durch ver-mehrte Anwendung der Schwefelkalkbäder und durch umfangreiche Unterfuchungen der Schafbestände im Sinne des § 247 V.A.V.G. zu unterstützen.

I. A.: Wiemann.

Olitsky, Peter K. and Louis Boëz: Studies on the physical and chemical properties of the virus foot-and-mouth disease. I. Description of the strain of virus used. Titration and centrifugation experiments. (Unter-fuchungen über die physikalischen und chemischen Eigen-schaften des Maul- und Klauenfeuche-Virus. I. Beifchrei-bung des benutzten Virusstammes. Versuche zur Titra-tion und Zentrifugierung.) (Commission to study foot-and-mouth dis. inst. of hyg. a. bacteriol., Strasbourg.) (Journ. of exp. med. 1927, Bd. 45, Nr. 4, S. 673—683.)

Die amerikanische Maul- und Klauenfeuche-Kommission übertrug Virusmaterial, das aus einem spontanen Seuchen-ausbruch in der Nähe Straßburgs stammte, fortlaufend bis zur 261. Meerfchweinchenpassage. Der Erregertyp war mit dem Vallée'schen Stamm „O“ identisch. Das angezüchtete Virusmaterial wurde vom Meerfchweinchen auf spontan empfängliche Tiere (Rind und Schwein) und von diesem zurück auf das Meerfchweinchen übertragen. Die epithelio-tropen Eigenschaften des Virus traten besonders hervor. Der erfolgreichste Infektionsmodus ist die intrakutane Virus-applikation. Für den Ablauf der Infektion erfordert die Virusdosierung besondere Beachtung. Anwendung größerer Virusverdünnungen hat eine Verzögerung des Infektions-ausbruches zur Folge. In diesem Zusammenhange wird auf einen Unterschied zwischen Virus und Enzymen hingewiesen. Meerfchweinchenaphthenlymphe bewahrte ihre In-fektiosität bis zu einer Verdünnung von 1 : 10 000 000, in einem andern Fall nur bis 1 : 400 000. Ein Auszentrifugieren des Virus konnte bei 3000 Umdrehungen in der Minute auf die Dauer von 2 Stunden nicht erreicht werden. Dies Er-gebnis wird als Anhaltspunkt für die ungewöhnliche Klein-heit des Erregers betrachtet. Ein lytisches Agens, das nach Frosch und Dahmen in der Lymphe vorhanden sein soll, konnte durch Zentrifugieren nicht isoliert werden.

H.

Olitsky, Peter K. and Louis Boëz: Studies on the physical and chemical properties of the virus of the foot-and-mouth disease. II. Cataphoresis and filtration. (Unterfuchungen über die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Maul- und Klauenfeuchevirus. II. Cata-phorese und Filtration.) (Commission to study foot-and-mouth disease, inst. of hyg. a. bacteriol., Strasbourg.) (Journ. of exp. med. 1927, Bd. 45, Nr. 4, S. 685—699.)

Die elektrischen Ladungs- und auch die Filtrationsver-hältnisse des Maul- und Klauenfeuche-Virus werden von den verschiedenen Seiten betrachtet. Bakterien haben negative elektrische Ladung; das Maul- und Klauenfeuche-Virus ist aber elektropositiv, solange sein Milieu einen pH unter 8,0

¹⁾ Der Bestand mit 4 Schafen wurde nach der erfolglosen Schmierkur noch der Badekur — Schwefelkalkbäder — unterworfen. Dadurch wurde die Räude getilgt.

²⁾ 28 Schafe sind infolge der Begasung verendet.

³⁾ Der Bestand mit 116 Schafen wurde nach zweimaliger erfolgloßer Begasung noch der Badekur — Schwefelkalkbäder — unterworfen. Da-durch erfolgte Heilung.

hat. Liegt der p_H aber über 8,0, so ist das Virus elektro-negativ. Der isoelektrische Punkt des Virus liegt bei $p_H = 8,0$. — Eine Trennung des Lymphavirus von den Eiweiß-körpern ist kataphoretisch möglich. Die Befunde über die elektrische Ladung des Virus geben auch für die Lebensbedingungen des Virus gewisse Anhaltspunkte. — Seitz-Laboratoriumsfilter, Berkefeldkerzen V und N, Chamberlandkerzen L_1 , L_2 , L_3 , L_5 (F), L_7 (B), L_9 , L_{11} und L_{13} sind für das Maul- und Klauenfeuche-Virus durchlässig. Das Virus passiert jedoch nur bei künstlich erzeugter negativer Ladung die engporige Chamberlandkerze L_{11} . Elektronegative Kollodiumfilter, für Kristalloide durchlässig, halten das Virus bei Benutzung einer Lympheverdünnung von 1:50 bis 1:100 ($p_H = 7,5$ bis 8,5) zurück. Demnach ist das Virus nicht kristalloid. In weiteren Versuchen mit Bechhold-Ultrafiltern (1½ Prozent) passierte das Virus in vier Fällen, mit 3 Prozent Filtern wurde es in drei Fällen und mit 4½—7½ Filtern immer zurückgehalten. Benutzt wurde ein 24-stündiges Lymphavirus von einer Verdünnung 1:100 und $p_H = 8,5$. Die Verf. glauben, daß die Größe des Maul- und Klauenfeuche-Virus zwischen 20 und 100 $\mu\mu$ liegt, also der des Kollargols oder der des kolloidalen Arfentrisulfids etwa gleichkommt. H.

Olitsky, Peter K. and Louis Boëz: Studies on the physical and chemical properties of the virus foot-and-mouth disease. III. Resistance to chemicals. (Untersuchungen über die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Maul- und Klauenfeuche-Virus. III. Chemo-resistenz.) (Inst. d'hyg. et bactériol., univ., Strasbourg.) (Journ. of exp. med. 1927, Bd. 45, Nr. 5, S. 815—831.)

Die desinfizierende Wirkung der bekannten Mittel (Alkohol, Äther, Chloroform und Phenol, Sublimat, Kresol) auf das Virus der Maul- und Klauenfeuche verlagert zunächst vollständig, da sie das Eiweiß in der Umgebung des Virus koagulieren und den von den Koagula umhüllten Erreger vor der direkten Schädigung abschließen. Wird die Koagulation aufgehoben, so nehmen die Desinfizienten dem Virus sofort die Lebenskraft. Mittel, die Eiweiß nicht zur Gerinnung bringen, wirken direkt auf das Virus abtötend. Wird 60prozent. und auch 40prozent. Alkohol durch Zusatz von 0,5prozent. Natronlauge die Fähigkeit zu koagulieren genommen, so wird der Eintritt ihrer desinfizierenden Wirkung beim Virus von der 26. Stunde (normal) auf 1 Minute verkürzt. Ebenso intensiv wirkt Antiform und 2prozent. Natronlauge, die letztere auch bei Einschluß von Lymphavirus und Aphthendeckenemulsion in Harn, Kot und Erde. Für die Durchführung der Desinfektion bei Maul- und Klauenfeuche in der Praxis wird die Benutzung von Natronlauge angeraten. H.

Olitsky, Peter K. and Louis Boëz: Studies on the physical and chemical properties of the virus of foot-and-mouth disease. IV. Cultivation experiments. (Untersuchungen über die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Maul- und Klauenfeuche-Virus. IV. Züchtungsversuche.) (Inst. d'hyg. et bactériol., univ. Strasbourg.) Journ. of exp. med. 1927, Bd. 45, Nr. 5, S. 833—848.)

Die Verf. versuchten, das Virus der Maul- und Klauenfeuche in vitro zu züchten. Ein positives Ergebnis erzielten sie dabei nicht. Auf Grund ihrer Erfahrungen und Nachprüfungen lehnen sie die Viruszüchtung von Frosch und Dahmen ab. Nach Angabe der Verf. beträgt die Lebensdauer des Maul- und Klauenfeuche-Virus auf dem Nährboden nach Dahmen nicht mehr als drei Tage. — Konservierungsversuche der Verf. verliefen zufriedenstellend. Benutzt wurden Substrate von verschiedener Zusammensetzung. Die Lebensfähigkeit des Virus wurde in diesen Medien bei Aufbewahrung im Brutschrank bis zu sechs Tagen, bei 33—34 Grad C bis zu zehn Tagen und bei 18 bis 20 Grad C zwei Wochen bis zu zwei Monaten erhalten. Im Gegensatz zur aeroben Haltung des Virus verdoppelt die anaerobe Aufbewahrung die Lebensdauer des Erregers. Die

einfachsten Nährmedien sind die günstigsten. An erster Stelle wird hier der 10prozentige halbstarre Gelatinenährboden nach Loeb genannt. Auf diesem konnte bei Zimmertemperatur (10—20 Grad C) das Virus 69 bis zu 100 Tage lang gehalten werden. Drei Subkulturen gelangen dem Verf. Es handelt sich um Konservierung und Verdünnung, nicht um Vermehrung des Virus. Schädlich für das Virus sind flüssige Substrate wie Pepton, Serum, Ascitesflüssigkeit. Versuche mit dem Nährboden nach Smith-Noguchi erzielten nur 1 Subkultur und die Erhaltungsdauer des Virus bis zu drei Tagen. In Gewebskulturen nach Borrel blieb das Virus bis zum vierten Tage und bis zu 2 Subkulturen infektiös. Das Maul- und Klauenfeuche-Virus weicht in seinen Eigenschaften von den bekannten pathogenen Bakterien zwar sehr stark ab, kann aber als Contagium vivum fluidum nicht angesprochen werden. H.

Greve, Wilh.: Die Verbreitung der Maul- und Klauenfeuche im Reg.-Bezirk Düsseldorf in den Jahren 1918 bis 1924 unter besonderer Berücksichtigung des großen Seuchenzuges 1919—1921. (Hyg. Inst., Med. Akad., Düsseldorf.) (Dissertation: Hannover 1927.)

Aus der dem Verf. vorgelegten Statistik wurde ersichtlich, daß in den Jahren 1918—1924 die Maul- und Klauenfeuche in der Rheinprovinz im wesentlichen den Reg.-Bezirk Düsseldorf betroffen hat. Es lassen sich zwei in ihrer Auswirkung stark von einander abweichende Seuchenzüge erkennen. Im Spätherbst 1918 kam der erste, im ganzen milde verlaufene Seuchenzug durch Klauenvieh, das von deutschen Truppen aus Frankreich und Belgien mitgeführt wurde, zum Ausbruch, um im Frühjahr 1919 fast gänzlich abzuflauen. Im Herbst desselben Jahres verbreitete sich die Seuche stärker wie zuvor und erreichte im Herbst 1920 ihren Höhepunkt. Von diesem Zeitpunkt ab geht sie allmählich wieder zurück und erlischt im Laufe des Jahres 1921 ganz. Dieser zweite Seuchengang ist durch Übertragung auf Weidevieh in den Grenzweiden und auch durch Ferkelschmuggel veranlaßt. Diese Auffassung wird außer durch die Ermittlungen der zuständigen Kreistierärzte durch die Tatsache begründet, daß die Erstausbrüche in den an Holland angrenzenden Bezirken auftraten. Auch im Jahre 1924 kam es durch Einschleppung von Holland zu Seuchenausbrüchen, deren Entwicklung und Ausdehnung vom Verf. näher untersucht ist. H.

Olitsky, Peter K., Jacob Traum and Harry W. Schoening: Comparative studies on vesicular stomatitis and foot-and-mouth disease. (Vergleichende Untersuchungen über Stomatitis vesicularis und Maul- und Klauenfeuche.) (Rockefeller inst. f. med. research, New-York a. U. S. bureau of animal industry, Washington.) (Journ. of the Americ. veter. med. assoc. 1926, Bd. 70, Nr. 2, S. 147—167.)

Nach den Versuchen von Cotton läßt sich auch das Virus der Stomatitis vesicularis auf das Meerschweinchen übertragen. Die Stomatitis vesicularis und die Maul- und Klauenfeuche geben, wie die Verf. bestätigen, beim Meerschweinchen fast daselbe Krankheitsbild. Eine Trennung der beiden Virusarten gelang ihnen durch überkreuz erfolgte Immunisierung der Versuchstiere; bei Anwendung heterologer Sera erzielten sie beim Meerschweinchen keine passive Immunität. Diese Versuche wurden weiterhin auf das Rind, Schwein und Pferd ausgedehnt. Beim Rind und Schwein läßt sich wegen der fast gleichen klinischen Krankheitsercheinungen eine sichere Differentialdiagnose nicht stellen, es sei denn nach Anwendung des Immunitätsversuches. Bei intravenöser und intramuskulärer Virusapplikation jedoch erkrankt das Rind bei der Maul- und Klauenfeuche regelmäßig, während die Stomatitis vesicularis auf diesem Infektionswege selten in Erscheinung tritt. Da das Pferd eine große Empfänglichkeit für die Stomatitis vesicularis — ganz im Gegensatz zur Maul- und Klauenfeuche — besitzt, so gilt es zur Aufstellung einer einwandfreien Differentialdiagnose als das beste Versuchstier. — Da sich

verschiedene mit beiden Virusarten vorgenommene Filtrationsversuche in ihren Ergebnissen ziemlich gleichkommen, glauben die Verff. daraus auch auf das Vorhandensein der gleichen Virusgrößen schließen zu dürfen. H.

Wintersberger: Ein Fall von Meningitis bei einer Kuh. (W. t. Mschr. 1928, Jahrg. XV, S. 405.)

Fünfjährige Montafonerkuh erlitt an dem Tage, als ihr das Kalb genommen wurde, nach kurzem Aufregungsstadium einen Ohnmachtsanfall. Nach Schlachtung in histologischen Schnittpräparaten vom Hirn entzündliche Veränderungen an den weichen Hirnhäuten, der äußersten Rindenschicht. An einzelnen Stellen zerfallene Leukozyten in einer homogenen Masse eingebettet, kleine thrombosierte Gefäße, Tuberkulose lag jedoch nicht vor. Berge.

Standesangelegenheiten.

Tagung des Reichsverbandes der Deutschen Gemeindetierärzte in Karlsruhe vom 11. bis 13. Oktober 1928.

Die Tagung wurde am 11. Oktober im Stadtgarten mit einem Empfangsabend eröffnet, an dem der Vors. Stadt-Vet.-Rat Dr. Haffemann-Dessau die zahlreich erschienenen Teilnehmer, unter denen Geheimrat Prof. Dr. von Ostertag-Stuttgart, Regierungsrat Dr. Meyer-Berlin und Oberregierungsrat Dr. Klimmeck-Berlin vertreten sind, begrüßte. Bei Beginn der Hauptsitzung am 12. Oktober widmete der Vorsitzende einen warmherzigen Nachruf den verstorbenen Schlachthofdirektoren Dr. Bayersdörfer-Karlsruhe, Oberregierungsrat Dr. Matschke-Arnberg und Schlachthofdirektor Dr. Haupt-Finsterwalde. Er begrüßte danach die Vertreter der Reichs- und staatlichen Behörden, der Kommunalverwaltungen, der Tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten, der tierärztlichen Organisationen und der Presse. Regierungsrat Dr. Meyer-Berlin antwortet namens des Reichsministeriums des Innern und des Reichsgesundheitsamtes, ferner antworten ein Vertreter des Badischen Innenministeriums, Oberrechtsrat Hermann als Vertreter der Stadt Karlsruhe, der Verkehrsdirektor der Stadt Karlsruhe, der Vertreter der Badischen Tierärztekammer und der Landesgruppe Baden und der Vertreter des Deutschen Veterinärrats. In feinen Dankesworten verweist der Vorsitzende auf das 25jährige Bestehen des Reichsfleischbeschaugesetzes und dankt dem Meister und Schöpfer des Werkes, Geheimrat von Ostertag, den die Versammlung einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. von Ostertag dankt mit warmen Worten für die ihm zuteil gewordene Ehrung und mahnt, nicht zu glauben, die Fleischbeschau sei unfer selbstverständlicher Besitz. Sie müsse mit größter Pflichttreue und Sachkenntnis ausgeübt werden. „Nur der verdient sich Freiheit und das Leben, der täglich sie erobern muß!“ Aus dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden sind hervorzuheben Eingaben über den Ausbau und die Vermehrung der bakteriologischen Institute an den Schlachthöfen, eine Eingabe an den deutschen Städtetag wegen Befetzung der Schlachthofdirektorstellen, die Teilnahme des Vorstandes an der Jubiläumsfeier der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, die Einleitung von Schritten zur Erzielung einer einheitlichen Amtsbezeichnung für die Schlachthoftierärzte und die Organisationsarbeiten. Obertierarzt Dr. Tiede-Köln spricht über die nach dem Lebensmittelgesetz vom 5. Juni 1927 erforderliche Organisation der Milchkontrolle durch die Stadtverwaltungen unter besonderer Berücksichtigung der Zuständigkeitsabgrenzung der behördlichen Sachverständigen. Die hygienische Seite der Milchkontrolle ist wichtiger wie die heutige polizeiliche Milchkontrolle. Einheitliche Organisationsmaßnahmen gegen die beklagenswerte Zunahme der Euterkrankheiten haben den Schwerpunkt zu bilden, damit die deutsche Milchwirtschaft gegenüber den qualitativ hochwertigen Standardmarken konkurrenzfähig und die Milchleistung erhöht wird. Jahrelange, ständige Gemeinschaftsarbeit auch mit den Organisationen ist zur Erreichung des Zieles erforderlich, das der Vortragende in der klinischen Untersuchung der Milchtiere und der hygienischen Kontrolle der Milch vom Stall bis zum Verbraucher erblickt. Hingewiesen wird auf die Kontrollmaßnahmen in Hamburg und Leipzig. Der Vortragende formuliert eine Entschliebung an den deutschen Städtetag, die nach längerer Diskussion auf Vorschlag von Ostertag's dem deutschen Veterinärat zugeleitet werden soll. Dieser soll gebeten werden, eine Milchkommission einzusetzen, die das gesamte

Material zu einheitlichen Richtlinien verarbeitet und den zuständigen Stellen übergibt. Prof. Max Müller-München referiert über Fleischbeschau und bakteriologische Fleischuntersuchung sowie Kennzeichnung der ordentlichen Schlachtungen und Notfischlachtungen. Neben die ordentliche Fleischbeschau ist die Trichinenschau getreten; hinzu kommen muß weiter die bakteriologische Prüfung des Fleisches. Der Glaube, man kann alle Schädlichkeiten im Fleische durch die pathologisch-anatomische Prüfung feststellen, ist nicht zutreffend. Man muß ausgehen von der Latenz gewisser Schädlichkeiten. Eine allgemeine bakteriologische Untersuchung des Fleisches aller Schlachttiere ist undurchführbar, die Feststellung der Paratyphusfreiheit bleibt nur für besondere Fälle übrig. Aber auch durch die bakteriologische Untersuchung des Fleisches aller notgeschlachteten Tiere werden nicht sämtliche, wohl aber die meisten Paratyphusfälle erfaßt. Das Verhüten des Auftretens der Fleischvergiftungen ist nur in dem Maße möglich, als die bakteriologische Untersuchung stattfinden kann. Es ist ein Fehler, daß das Fleisch notgeschlachteter Tiere nicht generell als solches kenntlich gemacht werden muß. Der Konsument will kein Fleisch notgeschlachteter Tiere im Metzgerladen kaufen; er ist empört darüber, daß mit dem Tauglichkeitsstempel solches Fleisch versehen werden kann, das im Falle der Genußuntauglichkeit nur auf die Freibank gehört. Wird der § 40 der B.B.A. dahin geändert, daß alles Fleisch notgeschlachteter Tiere der Freibank überwiesen werden muß, dann ergibt sich auch eine einheitliche Richtlinie für die praktischen Tierärzte bei der Fleischbeurteilung, die zweifellos auch dazu führen wird, daß erkrankte Tiere der Behandlung in vermehrtem Umfange zugeführt werden. Der Schutz des Konsumenten ist dadurch gegeben, daß das auf der Freibank gekaufte Fleisch vorsichtiger im Haushalt behandelt wird. Sofern man keinen besonderen Stempel schaffen will, muß der vorgenannte § 40 dahin erweitert werden, daß alles Fleisch notgeschlachteter Tiere, von einigen besonders zu bezeichnenden Ausnahmen abgesehen, als im Nahrungs- und Genußwert herabgesetzt bezeichnet wird. Nachdem von Ostertag darauf hingewiesen hat, daß der § 40 B.B.A. Gelegenheit gibt, das Fleisch notgeschlachteter Tiere, das doch fast immer weniger gut ausgeblutet oder ungenügend haltbar sei, der Freibank zuzuführen, wird beschlossen, die Ausführungen des Vortragenden dem Deutschen Veterinärat zuzuleiten. Frickinger-Bochum weist eingangs seines Vortrages auf die Notwendigkeit hin, das tierärztliche Untersuchungsgebiet zu sichern. Er führt als Diapositive zahlreiche Schnittpräparate von Fleischgemengen und Würften bei Gegenüberstellung von Schnitten normaler Organe vor. Die Bilder zeigen, daß z. B. Leber, Nieren, Lunge, Hoden, Haut, Euter, Muskelfasern, sehr gut in Würften erkennbar sind, daß fibrilläres Bindegewebe beim Kochen vollständig seine Struktur verliert, während geformtes Bindegewebe sich wenig verändert, ebenso das Knorpelgewebe. Blut zeigt sich als graurote, schollige, zerklüftete Masse; im Gegensatz zu den völlig verschwindenden roten Blutkörperchen sind die Leukozyten noch nachzuweisen. Die sehr interessanten Vorführungen geben einen bedeutungsvollen Einblick in die modernen Methoden der Untersuchung der von Tieren stammenden Nahrungsmittel. Über die Ausführung der Sanitäts- und Veterinärpolizei an den Schlacht- und Viehhöfen und der Lebensmittelkontrolle in den Städten sollten referieren Kuppelmayr-Frankfurt (durch Krankheit verhindert), Fries-Mannheim, Carl-Bamberg und Schmidt-Dresden. Das Referat Kuppelmayr wird von Laux verlesen. Soweit sich eine Übertragung der Veterinärpolizei an den Schlachtviehhöfen auf die Schlachthofdirektoren nicht durchführen läßt, hält es Referent für erforderlich, die Leiter der Schlacht- und Viehhöfe auf die Durchführung der feuchenpolizeilichen Maßnahmen zu verpflichten, damit sie in geeigneten Fällen als Vertreter der Veterinäräte fungieren können. Die Zuständigkeit der Gemeindetierärzte sowohl hinsichtlich der ordentlichen als auch der außerordentlichen Fleischbeschau sowohl innerhalb wie außerhalb der Schlachthöfe ist sicherzustellen. Mit der Kontrolle der Lebensmittel tierischer Herkunft sind in erster Linie die Gemeindetierärzte zu beauftragen. Fries-Mannheim stellt seine Forderungen weiter; die Gemeindetierärzte sollen den gesamten veterinärpolizeilichen Dienst auf den Schlachtviehhöfen übernehmen. Er verweist auf die verschiedentlichen Verhandlungen gelegentlich der Tagungen des Vereins preußischer Schlachthoftierärzte und des Reichsverbandes hin. Die Rechte und Pflichten der städtischen und staatlichen Tierärzte sind nicht scharf getrennt, was leicht zu Mißverständnissen und Unzutraglichkeiten führt. Das Streben der Ge-

meindetierärzte entspricht einem Idealismus; es ist dringend notwendig, daß sie ihren Spezialberuf ganz ausfüllen können. Carl schildert die bayrischen Verhältnisse. Den Schlachthofleitern in Bayern ist nicht allein die Ausübung der Veterinärpolizei an den Schlachthöfen, sondern auch in den Städten übertragen. Schmidt-Dresden erwähnt, daß in fünf großen Schlachtviehhöfen des Freistaates Sachsen die veterinärpolizeilichen Dienstgeschäfte den Schlachthofleitern übertragen sind. Es wird beschloffen, die Preußengruppe zu einer Stellungnahme gegebenenfalls nach einer Besprechung im Landwirtschaftsministerium zu veranlassen. — Am zweiten Verhandlungstage spricht Privatdozent Dipl.-Ingenieur Tammn über seine Beobachtungen auf dem Gebiet der Kühlung und Kaltlagerung von Fleisch. Er hat eingehende Versuche über das Eindringen der Kühltemperatur in das Fleisch vorgenommen und ist dabei zu dem Schluß gekommen, daß für Vorkühlräume hoher Luftfeuchtigkeitsgehalt und schnelle Umwälzung der Luft zweckmäßig sind, möglichst unter Verwendung einer eigenen Luftkühlanlage, da es verkehrt ist, die Luft des Vorkühlraumes durch den Kühlraum zu schicken. Gerade im Vorkühlraum sind die Gewichtsverhältnisse des Fleisches am meisten zu beeinflussen. Raschke-Chemnitz spricht über die Gefahr des Unterfrierens der Gebäudefundamente in Gefrierhäusern und führt verschiedene Fälle an, wo bei feuchtem Erdreich durch Unterfrieren schwere Gebäudeschädigungen entstanden sind. — Nachdem im Schlachthof der Ingenieur Weinberger in Gemeinschaft mit Prof. Müller die elektrische Betäubung bei Schweinen und Rindern vorgeführt hat, hält den Schlußvortrag Facharchitekt Hennings-Stuttgart über Bau und Inneneinrichtung von Schlachthöfen. Er führt zahlreiche Lichtbilder von Aufnahmen aus den amerikanischen Großschlachthäusern, unterstützt durch ein reiches Zahlenmaterial vor. — Die Tagung war außerordentlich zahlreich besucht. Sie gab mit ihrem reichen fachwissenschaftlichen und fachtechnischen Inhalt den Zuhörern ungemein viel Anregung. Nach arbeitsreichen Verhandlungen, für deren straffe und geschickte Leitung dem Vorsitzenden alle Anerkennung gebührt, war den Teilnehmern die Erholung bei den gesellschaftlichen Veranstaltungen und dem Ausflug in den Schwarzwald wohl zu gönnen.

Dr. Heine.

Tierärzte-Verein für Schleswig-Holstein.

60jähriges Jubiläum.

Anlässlich seines 60jährigen Bestehens veranstaltete der Tierärzteverein für Schleswig-Holstein im Anschluß an die Tagung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Kiel, Holst's Hotel, eine Jubiläumstagung, die Sonnabend, den 22. September 1928, abends 7½ Uhr, mit einer Generalversammlung begann. Anwesend waren 65 Kollegen. In der Eröffnungsrede begrüßte Vet.-Rat Dr. Stietenroth-Malente die zahlreich erschienenen Gäste und gedenkt dann der drei Toten, die der Verein im letzten Jahr zu beklagen hatte, Dr. Franzenburg sen.-Altona, Nissen-Heringsdorf und Dr. Koops-Kaltenkirchen. Nachdem der Geschäftsbericht und der Kassenbericht verlesen waren und dem Kassenführer durch die von den Kollegen Timm und v. d. Föhr vorgenommene Prüfung Entlastung erteilt war, wurde als Jahresbeitrag wieder 10,— RM. festgesetzt und bestimmt, daß für notwendige Mehrausgaben der Vorstand die Ermächtigung hätte, eine Umlage zu erheben. Beim Punkt „Wahlen“ wurden zum II. Vors. der Kollege Dr. Martens-Hamburg und zum Kassenführer der Kollege von Pein-Oldenburg wiedergewählt. Sodann wurden die Kollegen Prof. Dr. Stang-Berlin und Friese-Hannover zu Ehrenmitgliedern des Vereins vorgeschlagen und einstimmig ernannt.

Auf Vorschlag des Vorstandes erhält derselbe die Ermächtigung, für Unterstützungen zu Weihnachten 300,— RM. zu verteilen.

Als erster Referent hielt dann Prof. Dr. Goetze-Hannover einen Vortrag über das hannoversche Drahtlägen-Embryotom und führte die Anwendungs- und Wirkungsweise des Apparates an toten Früchten vor. In einer ausgedehnten Aussprache, die das vielseitige Interesse diesem Apparat gegenüber zeigte, nahm man Anlaß, sich eingehend über Geburtshilfe, insbesondere über die Epiduralnarkose bei Rindern zu unterhalten. „Über den Stand des Buch- und Verrechnungswesens unter Berücksichtigung der daraus hervorgegangenen Versorgungseinrichtungen für die deutsche Tierärzteschaft“ sprach darauf Dr. Holzhausen-Gr. Ammensleben. Er wies auf die großen Vorteile für den Zusammenschluß und die Sicherung resp. Besserung der wirtschaftlichen

Lage in der Tierärzteschaft hin, den die lediglich von der Tierärzteschaft unterhaltenen Buchführungsstellen haben, die keinerlei Belastung für die Allgemeinheit bedingen und empfahl dringend, die in Schleswig-Holstein mit ca. 60 Mitgliedern bereits bestehende Buchführungsstelle durch weitere Beitritte der Kollegen zu stärken.

In seinem Vortrage über „Die Erweiterung der wissenschaftlichen Fortbildung in der Provinz Schleswig-Holstein durch den Tierärzteverein“ führte der dritte Redner des Abends, Dr. Weyl-Kiel, aus, daß selbst bei bester Ausbildung Lücken bleiben. Diese Lücken auszufüllen sei Aufgabe der Fortbildung. Der Tierärzteverein für Schleswig-Holstein will es übernehmen, für die Fortbildung seiner Mitglieder zu sorgen durch Heranziehung der hierfür geeigneten Institute in Kiel, nämlich des Tierleicheninstituts der Landwirtschaftskammer, der staatlichen Forschungsanstalt für Milchwirtschaft und des Schlachthofs, ferner durch Wanderkurse in den verschiedenen Bezirken der Provinz und schließlich durch lose Verbindung mit beruflich verwandten Vereinen und der Kieler Universität. Prof. Dr. Knuth, Vet.-Rat Dr. Kurzwig und Prof. Dr. Goetze gaben wertvolle Ergänzungen zu dem Vortrage des Referenten. Es wurde betont, daß die Fortbildungskurse der Hochschulen und des D.V.R. zwar immer gut besucht wären, daß es aber fast immer dieselben Teilnehmer seien, die man dort sähe. Das Gros der Kollegen könne sich offenbar den Besuch dieser Kurse nicht leisten und deshalb sei die Idee einer weiteren Dezentralisierung des Fortbildungswesens aufs wärmste zu begrüßen. Nachdem dann festgestellt worden war, daß der Verein auch weiterhin korporatives Mitglied der Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums bleiben soll, nahm die Generalversammlung mit mannigfachen Mitteilungen aus der Praxis und einer angeregten Aussprache über Euterkrankheiten ihren Abschluß.

Die eigentliche Jubiläumstagung fand Sonntag, den 23. September, vormittags statt. In seiner Begrüßungsansprache entwarf der 1. Vors. ein anschauliches Bild von der wechselvollen und beachtenswerten Geschichte des Tierärztevereins für Schleswig-Holstein. Solange die drei Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg unter Dänischer Regierung standen, beherrschte der tierärztliche Verein in Kopenhagen, der seit 1849 bestand und sehr florierende, die Lage und ließ in den Herzogtümern eine tierärztliche Vereinstätigkeit nicht aufkommen. Zwar machte 1854 Hansen-Flensburg einen Versuch zu einer tierärztlichen Zusammenkunft, aber dieser Versuch scheiterte und erst 1860 gelang in Flensburg eine Gründung, aber nicht als selbständiger Verein, sondern die Gründung war eine Filiale von Kopenhagen. Erst in den Jahren 1867 und 1868 gelang es Fock-Ahrensböck, einen von Kopenhagen unabhängigen Tierärztlichen Verein in Schleswig-Holstein zu gründen. Die eigentliche Gründungsversammlung fand am 18. August 1868 in Neumünster statt; es schlossen sich 33 Kollegen zusammen; der 1. Vors. wurde Mörtensen-Borby. Seitdem fanden alljährlich regelmäßige Versammlungen statt und zwar 18mal in Neumünster, 23mal in Kiel, 4mal in Flensburg, 3 in Altona, in Schleswig und Lübeck je 2 und je 1 in Hamburg, Rendsburg, Heide und Eutin. 1897 wurden neue Statuten aufgestellt und der Verein erhielt die Bezeichnung „Tierärztlicher Verein in Schleswig-Holstein“. Als Sitz des Vereins wurde endgiltig Kiel bezeichnet. Schon früh wurde das Unterstützungswesen gepflegt. Bereits 1871 wurde die Errichtung einer Unterstützungskasse beschloffen. Der Bestand dieser Kasse war 1914 auf die beachtenswerte Höhe von über 11 000,— Mk. angewachsen, die während des Krieges zur Hauptsache in Kriegsanleihe angelegt wurden. Anlässlich des 50jährigen Bestehens des Vereins wurden 1918 außerdem 3000,— Mk. dem D.V.R. als Jubiläumsspende-zugeführt zur Unterstützung bedürftiger aus dem Felde zurückgekehrter Kollegen zwecks Wiederaufbaus ihrer Berufstätigkeit. Während seines ganzen Bestehens hat der Verein sich um die Hebung des Tierärztestandes, sowie durch Klärung wissenschaftlicher Fragen, durch seinen unablässigen Kampf gegen das Kurpfuschertum, durch sein Bemühen um veterinärpolizeiliche Verordnungen und durch Forderung des Reifezeugnisses für die Tierärzte große Verdienste erworben. Manche Neuerungen, manch wichtige Anregung, die der gesamten Tierärzteschaft zugute gekommen ist, entstammt den Initiativen gerade des Schleswig-Holsteinischen Tierärztevereins. Den Gründern dieses Vereins sind wir es schuldig, daß wir am Jubiläumstage einmal wieder kurz bis zu ihnen zurückblicken. Ihnen und ihren Nachfolgern haben wir es zu einem ganz großen Teil mit zu verdanken, daß unser Stand allmählich zu der jetzigen Höhe empor-

gestiegen ist. Viele von uns nehmen das in unserer Standesentwicklung Erreichte heute aber als ganz etwas Selbstverständliches hin; sie vergessen die zähe und sehr oft uneigennützigte Arbeit, die von unseren Vorfahren geleistet ist. Wir dürfen uns nicht anmaßen, daß wir von der Höhe, auf der wir stehen, nicht auch einmal wieder herunterkommen können, oder was noch schlimmer ist, daß wir es nicht nötig hätten, immer noch mehr uns zu vervollkommen und zu streben, noch höher zu steigen. Unserem Berufe drohen Gefahren überall, man möchte sagen, heute fast mehr als je, und ihnen zu begegnen muß sich jeder bemühen. Wir erleichtern uns das wesentlich, wenn wir zusammenhalten und Schulter an Schulter stehen. Die Entwicklung unseres Standes hat es mit sich gebracht, daß sich Sondergruppen zusammengeschlossen haben, um ihre Spezialinteressen zu verfolgen. Das mag seine Berechtigung haben, aber es darf nicht dahin kommen, daß wir vergessen, daß wir doch schließlich einer Mutter Kind, daß wir „Kollegen“ sind. Deshalb müssen wir solche Stellen hoch halten, wo wir uns lediglich als „Tierärzte“ fühlen, wo uns nichts trennt, wo uns vielmehr alles einen und zusammenschweißen soll. Eine solche Stätte aber ist unser Tierärzterverein und jeder von uns muß dazu mithelfen, daß er weiter blüht und gedeiht zum Segen unserer selbst und unseres ganzen Standes.

Nach den Begrüßungsworten hielt Prof. Dr. Müller-München den Festvortrag über „Die Fleischbeschau in ihrer Beziehung zur Pathologie und Bakteriologie“. Die Fleischbeschau als Wille zur Erkenntnis der Reinheit des Fleisches ist eine überaus alte Wissenschaft, deren Zurückverfolgen auf ihre Entstehung durch die Kulturgeschichte der Menschheit führt. Die Fleischbeschau hat ihren Charakter als Wissenschaft in dem Maße verändert, als der Mensch die wahrnehmbaren Tatsachen in anderer Weise deutete. Urfprünglich eine priesterliche Wissenschaft, wird sie später eine handwerkliche, marktpolizeiliche und selbst staatliche Angelegenheit. Erst mit der Entwicklung der Solidar- und Zellulärpathologie aus der Humoralpathologie, d. h., seitdem man den festen Teilen des Körpers, in erster Linie den Nerven, und der Tätigkeit der Zellen des Organismus einen Einfluß auf die Entstehung und Verbreitung der Krankheiten zuerkannte und nicht mehr die Flüssigkeiten und Säfte des Körpers, insbesondere das Blut, als Ausgangspunkt, Sitz und Verbreitungsmittel der Krankheiten betrachtete, rückte die Fleischbeschau in das Gebiet der Medizin ein. Aus dem Feststellen krankhafter Veränderungen an den Organen als sedes morbi deutete die pathologische Anatomie das Wesen der Krankheit. Das nicht krankhaft veränderte Organ war in der Medizin gesund, und wenn das allgemein der Fall war, war der ganze Tierkörper gesund. Dieser pathologisch-anatomische Grundgedanke durchzieht auch die Fleischbeschau bis in unsere Tage. Aus den feststellbaren und erkennbaren Veränderungen sollte das beim Genuß schädliche Fleisch erkannt werden. Je höher der Grad der Veränderungen, um so gefährlicher sollte das Fleisch beim Genuß für den Menschen sein. So sollte aus der eitrig-jauchigen Blutvergiftung der Schlachttiere die Fleischvergiftung des Menschen entstehen. Die anatomische Pathologie reicht aber für die Fleischbeschau mit ihren Krankheitserkennungsmitteln nicht aus. Gerade die für den Menschen gefährlichsten Krankheiten der Schlachttiere, die Trichinosis und der tierische Paratyphus, sind anatomisch verborgen und nur durch mikroskopische und bakteriologische Untersuchung erkennbar. Zu ihrer Erfassung bedarf es daher besonderer Prüfungen. Die pathologisch-anatomische Betrachtungsweise deckt die Folgen von Erkrankungen auf, nicht aber deren Ursache. Die Tatsache, daß fehlerfrei und in ihrer Gestalt einwandfrei erscheinende Tierkörper in einzelnen Fällen doch schädlich beim Fleischgenuß sein können, überschreitet den Rahmen der alten pathologisch-anatomischen Denkweise. Aber auch das neuerschlossene Gebiet der Infektionskrankheiten und die Infektionslehre erwies sich verwickelter, als es anfänglich schien. Nach der ursprünglichen Ansicht sollte das Eindringen der spezifischen Ansteckungserreger die betreffende Infektionskrankheit auslösen. Auch hier ergab sich wieder die überraschende Tatsache, daß die Zahl der angesteckten Tierkörper größer war als die Zahl der erkrankten. Der Umstand, daß Tiere klinisch und pathologisch-anatomisch verborgen (latent) infiziert sein können, macht das Erfassen der verborgenen Ansteckungen besonders schwierig, so schwierig, daß für das Erfassen der Trichinosis der Schweine alle Tiere auf Trichinenfreiheit untersucht werden müssen. Noch schwieriger ist das Erfassen aller verborgen mit Paratyphusbakterien infizierten Tiere, weil man nicht alle Tierkörper

auf Paratyphusfreiheit, wie die Schweine auf Trichinenfreiheit, untersuchen kann. Obwohl man sagen kann, daß man alle Schädlichkeiten des Fleisches kennt, die auf den Menschen übertragbar sind, so hat das Beurteilen des Fleisches auf eine völlige Reinheit in der Praxis doch noch eine gewisse Schwierigkeit, weil das reiflose Erfassen der verborgenen Ansteckungen nicht auf der Grundlage der mit bloßem Auge vorgenommenen Beschau allein möglich ist, sondern auch der mikroskopischen und bakteriologischen Untersuchung bedarf. Das Erfassen der verborgenen Schädlichkeiten des Fleisches ist daher in dem Umfange möglich, als sich die mikroskopische und bakteriologische Untersuchung der Fleischbeschau dienstbar machen läßt.

Die Tagung endete mit folgender Beschlusfassung über den weiteren Ausbau des Tierärztervereins in wissenschaftlicher Beziehung: Der Tierärzterverein beschließt, nach dem Vorschlage Dr. Weyls-Kiel, das wissenschaftliche Fortbildungswesen in der Provinz Schleswig-Holstein zu organisieren. Zu diesem Zweck wird die Provinz in eine noch näher zu bestimmende, nicht zu große Anzahl von Bezirken eingeteilt, in denen in möglichst regelmäßigen Abständen Kurse stattfinden sollen. Der Vorstand wird beauftragt, die Organisation durchzuführen unter ständiger Hinzuziehung der Kieler Tierärzte Dr. Weyl, Dr. Kiessig und Dr. Seelmann sowie des Kieler Schlachthofdirektors Dr. Hofmann.

gez. Dr. Sieg, Schriftf.

gez. Dr. Stietenroth, 1. Vors.

Tierärzte-Verein der Provinz Westfalen.

54. Hauptversammlung am 7. Oktober 1928 in Hamm.

Die Versammlung ehrt die verstorbenen Kollegen durch Erheben von den Plätzen. Der Vors. bittet, Sterbefälle baldigst Kollegen Berg-Hamm oder Schiebel-Herford mitzuteilen, damit rechtzeitig eine Kranzspende beschafft werden kann. Der T.-V. ist der Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums beigetreten; es wird ein jährlicher Beitrag von Mk. 100,— bewilligt. Die Einrichtung einer Buchführungsstelle wird der Praktikerguppe überlassen. Die Kasse wird geprüft und für richtig befunden, sie schließt mit einem Überschuss von Mk. 1037,—. Kollege Dr. Wulf berichtet über die Tierärztekammerwahlen und schlägt eine Einheitsliste vor, die nach kurzer Pause aufgestellt und einstimmig angenommen wird. Prof. Dr. Stang läßt uns in das Gebiet der Vererbung schauen und führt uns über die Lehren von Darwin, Lamarck, Weissman, Mendel u. a. zu den durch Mutation entstandenen neuen Rassen der Ankonische und hornlosen Kühe usw. Dann zeigt er durch Erklärung der Genotypen und Phänotypen, daß viele Tierzüchter sich viel Geld und Ärger sparen könnten, wenn sie sich mit neueren Forschungsergebnissen über Vererbung erworbener Eigenschaften bekannt machten. Die Versuche, durch Kreuzung neue Rassen zu züchten, würde dann im Hinblick auf den Mendelismus bei unseren Haustieren wohl aufhören. Der Vortrag löste großen Beifall aus und man bedauerte sehr, dem Redner nicht einige Stunden länger zuhören zu können. Ob.-Reg.- und Geh. Vet.-Rat Dr. Foth sprach über die unschädliche Beseitigung der Tierkadaver und über das neue Ergänzungsgegesetz 1928. Es schloß sich eine lebhafte Aussprache an diesen Vortrag an. Dr. Schultz-Grebenstein gab einen Überblick über die Vitaminforschung. Mit großem Interesse folgte die Versammlung seinen Ausführungen trotz vorgerückter Zeit. Leider ließ sich der Saal nicht hinreichend abdunkeln, um die Lichtbilder der Mikrophotographien voll zur Geltung zu bringen.

Dr. Vossage, Vors.

Dr. Schiebel, Schriftf.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Prof. Dr. Paechter ist für die Zeit vom 16. Oktober 1928 bis 15. Oktober 1929 zum Dekan der Tierärztlichen Fakultät der Universität München gewählt.

Ehrenbürger der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Der Präsident der Handwerkskammer, Herr Harry Plate-Hannover, Ehrenmeister des Deutschen Handwerks, wurde anlässlich seines 75. Geburtstages, in Würdigung der erfolgreichen Zusammenarbeit von Handwerk und Wissenschaft, zum Ehrenbürger der Tierärztlichen Hochschule Hannover ernannt.

Zum Gedächtnis Albrecht Thaer's.

Wenn die Landwirtschaft am 26. Oktober 1928 den 100. Todestag von Albrecht Thaer in festlichem Gedenken begeht, so hat auch die Tierarzneikunde alle Veranlassung, des großen Mannes sich zu erinnern und dessen, was er für unsere Wissenschaft bedeutet. Albrecht Thaer war am 14. Mai 1752 als Sohn eines Arztes in Celle geboren und ergriff ursprünglich selbst den ärztlichen Beruf. Er hat seinen merkwürdigen Entwicklungsgang bis zu seinem 33. Lebensjahre in einer autobiographischen Skizze und Lebensbeichte geschildert. Danach hatte Thaer eine entschiedene Abneigung gegen die Chirurgie. Die Anatomie schreckte ihn nicht, dagegen jeder Eingriff in den lebendigen Körper. Die beiden berühmten Göttinger Kliniker, Prof. Schröder, sowie dessen Nachfolger, Prof. Baldinger, waren Thaers spezielle Lehrer. Beide erkannten die außerordentliche Begabung des jungen Mannes, der schon als Knabe gelernt hatte, sich selbst aus der Literatur zu belehren und der schon früh ein großes Interesse für die Naturwissenschaften und besonders die Medizin bekundet hatte. Baldinger, welcher in Göttingen die erste Poliklinik eröffnete, überließ dem hochbegabten Schüler die Leitung dieses Institutes ziemlich selbständig, so daß wir Thaer als den ersten Assistenten der ersten Poliklinik Göttingens bezeichnen dürfen.



Das Geburtshaus Albrecht Thaers in Celle.

Mit einer hervorragenden Dissertation „De actione systematis nervosi in febris“ schloß Thaer seine Studien ab, um in Celle als Mitarbeiter und Nachfolger in der väterlichen Praxis bald einer der angesehensten Ärzte zu werden. Aber obwohl ihm volle Anerkennung von Seiten seiner Patienten sowie durch seinen königlichen Landesherrn zuteil wurde — er wurde 1796 Leibmedicus — griff ihn der ärztliche Beruf zu sehr an. Er äußert sich selbst einmal darüber: „Ich war ein sehr gefuchter, ein sehr glücklicher Arzt“ . . . „Aber mein Mitgefühl beim Krankenbette war von jeher zu stark für einen Arzt“. Thaer fand mehr innere Befriedigung in der Beobachtung und in dem Studium der Pflanzen- und Tierwelt, das ihm gleichzeitig eine umfangreiche experimentelle Tätigkeit eröffnete. So wandte er sich der Blumenzucht, bald der Gärtnerei und der Landwirtschaft zu. Sein großer und vorwärtstrebender Geist sehnte sich nach einem reichen Felde für wissenschaftliche Forschung mit praktischem wirtschaftlichen Endzweck.

Nun entfaltete Thaer eine außerordentlich vielfeitige Tätigkeit als Landwirt und Schriftsteller. Wie er alle Zweige des landwirtschaftlichen Gewerbes in seinem rationellen System vereinigte, so stellte er auch die Pflanzen- und Tierzüchtung unter diesen Gedanken. Er brachte sie in klare Verbindung mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der damaligen Zeit. Grundlegend und umwälzend war die Ausgestaltung des Ackerbaues. Zu seiner Zeit herrschte noch die Dreifelderwirtschaft, die bei steigender Bevölkerung und vermehrtem Umbruch von Futterflächen zum Kornbau die Urfache geringerer Erträge und zunehmender Verunkrautung war. Bei der herrschenden Flachfolge, 1. Brache, 2. Winterhalmfrucht, 3. Sommerhalmfrucht, konnte die Brache nicht mehr genügend mit Dünger verlesen werden. Thaer machte es sich zur Aufgabe, den ausgefogenen und stark verunkrauteten Boden zu kultivieren. Der Reformator der Landwirtschaftslehre führte die Drillkultur und den Hackfrüchtebau, insbesondere den Kartoffelbau ein. Anstelle der alten Dreifelderwirtschaft trat die Fruchtwechselwirtschaft mit Wechsel von Halmfrüchten und Blattfrüchten, insbesondere Klee, Hülsenfrüchte und Wurzel-Knollengewächsen ein. Seine ärztliche Vergangenheit ließ ihn die Bedeutung der Tierernährung erkennen und das Problem der quantitativen und qualitativen Verdauung hat Thaer bereits beschäftigt, wenn er als Staatsrat im preußischen Ministerium des Innern später den Satz aufstellte: daß der Verpächter gegen Verschlechterung des Düngerzustandes seiner Äcker nicht dadurch geschützt werden könne, daß der Pächter verpflichtet werde, stets die gleiche Stückzahl an Vieh zu halten; vielmehr komme es auf den Nachweis an, daß von dem Vieh die gleiche Menge des Futters in der gleichen Güte nachweislich konsumiert werde. Thaer erkannte bereits, daß es zu berücksichtigen gelte, welcher Anteil des Futters vom Vieh wirklich verdaut werde. In enger Verbindung mit diesen physiologischen Fragen standen naturgemäß für ihn auch die Probleme der Bekämpfung und Verhütung tierischer Krankheiten. Viele Artikel in seinen seit 1799 mit einer kurzen Unterbrechung bis zu seinem Tode von ihm herausgegebenen Annalen beschäftigen sich mit tierärztlichen Fragen und mancher Beitrag aus seiner eigenen Feder verrät noch den bedeutenden Arzt. Immer wieder nimmt Thaer Veranlassung, für die damals erst in Aufnahme kommende Schafpockenimpfung einzutreten. Er stellt in der eigenen Herde Verluste darüber an, wie man die wirkfamste Lymphe gewinne, an welcher Körperstelle man am zweckmäßigsten impfen solle, wie die Impfung selbst am besten vorzunehmen sei.

Als die Rinderpest die preußischen Staaten bedrohte, tat Thaer alles, um auf die furchtbare Gefahr aufmerksam zu machen. Er empfahl rücksichtslose Tötung des befallenen Viehs, strenge Isolierung des betroffenen Stalles und Desinfektion mit Säuredämpfen, wobei er der Salzsäure vor der Salpeter- und Schwefelsäure den Vorzug gab. Auch dem Milzbrand widmete Thaer große Aufmerksamkeit. Er erkannte, daß vornehmlich solches Vieh von der Krankheit befallen werde, welches in trockenen Jahren an sumpfigen Stellen weidete. Wenn man auch damals von den Erregern der einzelnen Krankheiten nichts wußte, und sich über die Natur des „Ansteckungsstoffes“ nicht klar war, so trat Thaer doch den abenteuerlichen und uns geradezu phantastisch anmutenden Erklärungen auf das entschiedenste entgegen. „Worte ohne klare, helle Begriffe haben keine Wirkung auf mich“, so äußerte sich Thaer schon in jungen Jahren. Und gerade weil Thaer ahnte, daß es auch für die Krankheiten völlig natürliche Erklärungen geben müsse, hielt er die Vorbeugung für die wichtigste Kampfesart gegen diesen Feind. Waren die Krankheiten aber einmal da, so suchte sie Thaer entsprechend dem damaligen Stande der Wissenschaft mit allen Mitteln zu heilen. Seine Vorliebe für die Chemie, die ihn Zeit seines Lebens stark beschäftigt hat, ließ ihn selber die verschiedenen Arzneimittel nachprüfen. Immer arbeitete er in enger Fühlung mit den Tierärzten, für welche er bereitwillig die Spalten seiner Annalen öffnete.

In seinem Lehrinstitut in Möglin las er selbst über die Krankheiten der verschiedenen Haustiere in Verbindung mit seinen tierzüchterischen Vorträgen. Als er i. J. 1816 zum Oberaufseher der Königl. Stammschäfereien ernannt wurde, wandte sich sein Interesse naturgemäß besonders den Krankheiten des Schafes zu. Die aus Frankreich importierten Merinos wurden von der Klauenfeuche befallen. Da übernahm die Sorge für die erkrankte Herde Thaer in Verbindung mit dem rühmlich bekannten Tierarzt Prof. Sick, dessen Verdienst um die Bekämpfung der Rinderpest Thaer schon i. J. 1809 dem Minister Dohna gegenüber

warmherzig vertreten hatte. Überhaupt verdient der Erwähnung, daß Thaer, welcher von der menschlichen Heilkunde her sehr leicht sich auch in dem Gebiet der Tierärzneykunde zurecht fand, doch stets die Fachtierärzte zu Rate zog. Aber er folgte ihnen nicht blindlings. Wie überall, so suchte er Klarheit auch hier beim Experimentieren. Musterhaft und noch heute vorbildlich ist diese Einstellung, ja wir haben vielleicht in ihr das bedeutendste Moment dieser großen Persönlichkeit zu erblicken. Für Thaer war nichts zu gering, kein Umstand zu unbedeutend, als daß er ihn nicht mit wissenschaftlichem Ernst und Verantwortungsbewußtsein beachtet hätte. Vorgefaßte Meinungen waren ihm ein Greuel und nichts lag ihm ferner, als mit seinen Lehren einen „Leisten“ liefern zu wollen für die geistig Trägen. So lebt er fort, ein Führer und Vorbild, ein Systematiker und Organisator, wie die deutsche Landwirtschaftswissenschaft keinen zweiten aufzuweisen hat.

Diplomlandwirt Simons,

Göttingen.



Das Denkmal Albrecht Thaers in Celle.

Gemeinschaftsarbeit zwischen Landwirtschaft und fleischverarbeitenden Gewerben. — Sonderauschuß für Schlachtbeobachtungen bei der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft.

Vom Reichsverband der deutschen Fleischwaren-Industrie wird uns mitgeteilt:

Bei der Herbsttagung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft wurden innerhalb der Tierzucht-Abteilung wichtige Fragen für den inneren Ausbau der Zuchten zur Steigerung und Vereinheitlichung der Nutzleistungen behandelt. Gemäß einer Entschliessung bei der letzten Haupttagung des Reichsverbandes der deutschen Fleischwaren-Industrie E. V., die in mehreren Sonderauschüssen (z. B. für Schweineleistungsprüfungen, für das veredelte Landschwein, für das Edelschwein) von Dr. Schwerdt referierend vertreten wurde, fand die beantragte Gemeinschaftsarbeit zwischen Erzeugern und Verarbeitern zur Standardisierung der Schweinezucht allgemeine Billigung. Es wurde nach einstimmiger Annahme in den Sonder-Auschnüssen durch die Tierzucht-Abteilung beschlossen, einen **Sonderauschuß für Schlachtbeobachtungen bei der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft** einzurichten, dessen Grundstock sich zusammensetzen soll aus je zwei Vertretern der Fleischwaren-Industrie, des Fleischerhandwerks, der Vereinigung deutscher Schweinemäster und -Züchter, der praktischen Landwirte und der Wissenschaft. Da an der Zustimmung des Vorstandes der D. L. G. nicht zu zweifeln ist, ist damit zu rechnen, daß der neue Auschuß sich noch Ende d. Js. konstituiert und bereits während der nächsten D. L. G.-Tagung tagt.

Pathologisch-chemische Blutdiagnostik bei Ernährungsstörungen.

Die Arbeiten in den letzten Jahren haben gezeigt, daß eine Reihe von Krankheiten, die bisher unter symptomatologischer Bezeichnung in der Literatur verstreut war, gemeinsam zur Gruppe der Avitaminosen gehört. Es kommt hierfür in Frage:

1. die echte Rachitis und Osteomalazie, dazu gehört die Kleinkrankheit oder Krüschkrankheit der Fohlen,
2. Fohlendarre,
3. der Ruß der Ferkel,
4. das Festliegen vor und nach der Geburt bei Rindern, Ziegen und dergl.,
5. Lecksucht,
6. Wollfressen der Schafe,
7. Federfressen der Vögel.

Ferner hat sich gezeigt, daß die Jungtierpneumonie zu einem ge-

wissen Teil auf avitaminotischer Basis beruht insofern, als durch den Mangel an D-Vitamin der Brustkorb schwere anatomische Veränderungen erfährt, so daß die Funktion der Lunge beeinträchtigt wird und sekundäre Erreger virulent werden. Infolgedessen ist der Gruppe der Avitaminosen noch hinzuzufügen die nicht ansteckende enzootische poly-bakterielle Bronchopneumonie der Jungtiere. Weiterhin beruht auf avitaminotischer Basis die Tetanie, die vielfach im Anschluß an Geburten auftritt. Endlich ist es möglich, mit Hilfe der pathologisch-chemischen Diagnostik die alimentäre Anämie von Anämien anderer Art zu trennen, und diese Tiere, wie andere, die an den oben geschilderten Krankheiten leiden, der spezifischen Therapie zuzuführen. Alle diese Erkrankungen lassen sich nun mit Hilfe der pathologisch-chemischen Diagnostik erkennen und damit eine sichere Therapie einleiten. Es ist weiterhin zu beachten, daß es im Interesse der Züchter liegt, dieses diagnostische Hilfsmittel zu Beginn des Winters generell heranzuziehen, um frühzeitig die Tiere zu ermitteln, bei denen eine Disposition zu den beschriebenen Krankheiten vorliegt, so daß also die Tiere prophylaktisch durch rechtzeitige Vitaminzufuhr vor dem Ausbruch der Erkrankung bzw. Kümmern bewahrt und damit der Zucht und Volkswirtschaft erhalten bleiben.

Die Untersuchungen werden vorläufig, um die Methode bekannt zu machen, zu einem Preis von

1,50 Mk. für die Einzeluntersuchung,

1,— Mk. für die Reihenuntersuchungen über 25 Stück ausgeführt.

Überfendung von Proberöhrchen erfolgt gegen geringe Gebühren.

Bezüglich der Technik sowie der Einwendungen haben wir eine Postkarte herausgegeben, deren Wortlaut kurz angegeben sein möge.

Befundaufnahme:

Art des Tieres,

Alter des Tieres,

Name und Herkunft des Tieres,

Besitzer des Tieres,

Klinischer Befund,

Es besteht somit Verdacht auf Rachitis, Osteomalazie, Tetanie

Technik der Blutentnahme: Man entnehme das zu analytischen Zwecken bestimmte Blut nur aus den nüchternen Tieren, veranlasse somit den Besitzer am Tage der Blutentnahme, die tunlichst frühmorgens vorzunehmen ist, dem Tier vorher keine Nahrung zu geben. Pferden, Rindern und anderen Großtieren entnehme man etwa 20—30 ccm Blut aus der Jugularis. Man sende entweder 1 Probegläschen von 20 bis 30 ccm Vollblut oder 3—4 ccm Serum ein. Für den Fall, daß eine Zentrifuge zur Hand ist, empfiehlt es sich, das Blut in Zentrifugieröhrchen aufzufangen, ½ Stunde stehen zu lassen, den Blutkuchen mit einem Draht aufzulockern und 10—15 Minuten scharf zu zentrifugieren. Das abgesetzte Serum pipettiere man ab in die Probegläser und bringe es darin zum Verland. Handelt es sich um Hunde oder andere Haustiere im Säuglingsalter, so genügen 4—5 ccm Vollblut bzw. 1—2 ccm Serum. Dr. Ottokar Schultz, Leiter des Milchwirtschaftl. Laboratoriums Grebenstein. Abt.: Medizinische mikrochemische Blutuntersuchungen.

Überweisung von trichinösem Fleisch an das Institut für Nahrungsmittelkunde der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin.

Wie allgemein bekannt sein dürfte, ist durch Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft (M.Bl. des MfL. 1906, S. 102) verfügt worden, daß von allen Schweinen, die in mittlerem Grade mit Trichinen behaftet sind, ein knochenfreies, aus der Keule zu entnehmendes Fleischstück von etwa 1 kg Gewicht durch die ortspolizeiliche Behörde oder die mit deren Obliegenheiten in Bezug auf die Durchführung des Fleischbeschaugesetzes betrauten Beamten früher an das Hygienische Institut, jetzt an das Institut für Nahrungsmittelkunde der tierärztlichen Hochschule zu Berlin einzufenden ist. Wenn ich schon früher, vor der 1922 erfolgten Abänderung des B.B.A., darüber Klage führen mußte, daß dieser ministeriellen Anweisung nicht Folge gegeben wurde, wird in den letzten Jahren, nachdem ein Unterschied zwischen stark und schwach trichinösem Fleisch nicht mehr gemacht wird, trichinöses Fleisch zum Zwecke der Aufbewahrung für Unterweisung, Prüfung und Nachprüfung der Trichinenschauer überhaupt nicht mehr überwiesen. Wenn die interessierten Stellen nicht selbst dafür Sorge tragen, daß dem Nahrungsmittelinstitut geeignetes, trichinöses Fleisch überwiesen wird, ist es nicht möglich, den

vielen Anforderungen von trichinösem Fleisch zum Zwecke der Ausbildung und Prüfung der Trichinenschauer nachzukommen. Ich bitte daher die Schlachthofverwaltungen und auch die Kreistierärzte, denen die Ausbildung und Prüfung der Trichinenschauer obliegt, dafür Sorge zu tragen, daß dem mir unterstellten Institut von jedem trichinösen Schwein Zwerchfellpfeiler und der muskulöse Teil des Zwerchfells überfandt werden.

gez. Bongert, Institutsdirektor.

Niederfachengruppe des Reichsverbandes prakt. Tierärzte e. V.

24. Hauptversammlung am 3. November 1928, 15 Uhr, im Gildezimmer des Brauergildehauses zu Hannover, Große Aegidienstraße 34. 1. Geschäftsbericht. 2. Aufnahme neuer Mitglieder. 3. Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden. 4. Tierärztekammerwahl. Evtl. Aufstellung einer Sonderliste der prakt. Tierärzte. 5. Fleischbefehaufragen. 6. Buchführungsstelle. Vor der Versammlung, um 14 Uhr, findet in demselben Raume eine Versammlung der der Buchführungsstelle Niederfachien angeschlossenen Kollegen statt, zu der das Erscheinen sämtlicher Mitglieder nötig ist. Tagesordnung: Beschlusfassung über die Bevorschussung der eingereichten Rechnungen. — Die Mitglieder werden gebeten, mit Rücksicht auf Punkt 4 der Tagesordnung, möglichst zahlreich zu erscheinen.

Elze und Parensen, den 20. Oktober 1928.

Dr. Mächens, Vors.

Dr. Heinemann, Schriftf.

Verein Schlesischer Tierärzte.

Sonntag, den 4. November 1928, 10 Uhr pünktlich, in der Schlachthofbörse zu Breslau, Frankfurter Straße 102—110. 1. Vereinsangelegenheiten: a) Eingänge und Mitteilungen; b) Abgang und Aufnahme von Mitgliedern. 2. Neuwahl des Vorstandes. 3. Direktor Dr. Scheel-Breslau: Bakteriologische Fleischuntersuchung. Beurteilung und Kennzeichnung des Fleisches notgeschlachteter Tiere. 4. Befichtigung des Schlacht- und Viehhofes mit Demonstrationen. Nach der Befichtigung Gruppensitzung der beamteten Tierärzte. Gegen 13½ Uhr gemeinsames Mittagessen ohne Damen in der Schlachthofbörse, nachher zwangloses Beisammenfein. Vorherige schriftliche Anmeldung bis zum 1. November dringend erbeten. Es wird dringend gebeten, den Vereinsbeitrag für 1928 (8 RM.) an die Kommunalbank Liegnitz, Bankkonto 174, Postcheckkonto Breslau Nr. 52321, baldigst zu überweisen oder spätestens während der Sitzung an den Kassierer zu zahlen. Nach dem Schlachthof fahren die Straßenbahnlinien 5 und 6.

Der Vorstand. I. A.: Prof. Dr. M. Casper.

8. wissenschaftlicher Referierabend an der Tierärztl. Hochschule Hannover.

Montag, den 5. November 1928, 20 Uhr: Prof. Dr. Dankwort über: „Die Hanauer Analysen-Quarzlampe und ihre Anwendung in Chemie und Medizin.“ Mit Experimenten und Lichtbildern. Hörsaal des pathol.-anat. Instituts. Zietzschmann.

Kraftfahrer-Vereinigung Deutscher Ärzte e. V. Gau IX, Hessen, Hessen-Nassau und Waldeck.

Herbst-Gaufahrt nach Mainz und Königstein i. T. am Mittwoch, den 31. Oktober 1928. Treffpunkt I: Mainz 3 Uhr nachm. in der Sektellerei Kupferberg & Co. Treffpunkt II: Königstein i. T. „Königsteiner Hof“ 5 Uhr nachm. Ab 5 Uhr Tee mit Tanz. Abendessen nach Belieben. Eigener Saal und Tanzkapelle stehen zur Verfügung. Gäste auch mit Damen willkommen! Jedoch Angabe über Personenzahl der teilnehmenden Gäste bis spätestens zum 27. d. Mts. an Dr. Schüttler, Frankfurt a. M., Querstraße 7, erbeten.

Der Fahrtenauschuß des Gau IX:

Dr. Greger, Prof. Dr. Krusius, Dr. Schüttler.

Zu unserem Bilde der Umschlagseite von D. T. W. 1928, Nr. 40.

Es handelt sich um die Einladung zum Festkommers, welcher anlässlich der Säkularfeier der Tierarztschule zu Dresden in Meinholds-Festfälen (in der Moritzstraße) am 7. Oktober 1880 stattfand. Der Anatomie-Professor in der Mitte des Bildes ist Leisering, welcher damals Direktor der Tierarztschule war. Er pflegte im Präparierfaal mit langer Wachleinwandfchürze und Wachleinwandärmeln von Tisch zu Tisch zu gehen. Die lange Pfeife war hierbei sein ständiger Begleiter, und wenn er sich über schlechte Präparierarbeit ärgerte, dann blies er gewöhnlich dichte Rauchschwaden auf den Präpariertisch. Da

es mehrmals vorgekommen war, daß bei dem Wandern von Tisch zu Tisch gelegentlich Fett, Hautteile oder Bindegewebe in den offenen Pfeifenkopf hineingelangt waren — wer weiß, durch wen! — so benutzte er als Ersatz für einen Pfeifenkopfdeckel unbrauchbar gewordene Drahtsiebe von den Bunfenbrenner-Dreifüßen im chemischen Laboratorium des Prof. Dr. Hofmeister. Ein solches Sieb verschloß dann einwurflicher das Lumen des Pfeifenkopfes. — Eine Beschreibung des Festes findet sich in dem Bericht über das Veterinärwesen im Königreich Sachsen für das Jahr 1880, S. 163. Säkularfeier der Tierarztschule betreffend. R ö d e r, Leipzig.

Bücherbesprechungen.

Jahrbuch für wissenschaftliche und praktische Tierzucht einschließlich der Züchtungsbiologie. Zweiter Teil: Kleintierzucht. Verlag von M. & H. Schaper, Hannover 1928. Preis Mk. 11.—, für Mitglieder d. D.G.F.Z. Mk. 8.25.

Der zweite Teil des Jahrbuches behandelt die Kleintierzucht. Machens-Braunschweig berichtet über Ziegenzucht und weist u. a. auf die große Bedeutung der einwandfreien Klärung der sog. Ziegenmilchanämie bei Säuglingen hin, während v. Otto-Bensheim sich bemüht, die Errungenschaften der modernen Tierzucht- und Vererbungsforchung in die noch besonders stark formalistisch eingestellten Kreise der Hundezüchter hineinzutragen. In der kurzen Abhandlung über Kaninchenzucht teilt Kösswig u. a. mit, daß das Kastorrexkaninchen die vielen auf es gesetzten Hoffnungen in keiner Weise zu rechtfertigen vermochte. Stakemann-Allenstein referiert auf wenigen Seiten über Pelztierzucht. Ausführlich behandelt Römer-Halle die brennenden Fragen auf dem Gebiete der Geflügelzucht. Den Übersichtsreferaten über Fischzucht und Bienenzucht haben Lehmann-Münster und Armbruster-Berlin ihre fachkundige Feder geliehen. Tänzers Ausführungen über Seidenraupenzucht zeigen, daß der praktischen und technischen Durchführung der Seidenraupenzucht in Deutschland nichts im Wege steht, während die wirtschaftliche Einträglichkeit vorerst noch als problematisch bezeichnet werden muß. Einwandfreie Rentabilitätsnachweise für deutsche Verhältnisse konnten bisher noch nicht in genügendem Umfange beobachtet werden. — Auch der zweite Teil des Jahrbuches enthält ein ausführliches Titelverzeichnis der in der Berichtszeit erschienenen Arbeiten, sowie Autoren- und Sachregister, wofür den Referenten und der Schriftleitung der Dank der interessierten Kreise gewiß ist. W. Schäper, Hannover.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: zu ordentlichen Mitgliedern des Landesveterinäramts Prof. Dr. Stang in Berlin und Prof. Dr. Neumann-Kleinpaul in Berlin, Tierärztl. Hochsch., zum außerordentlichen Mitglied Prof. Dr. Mießner an der Tierärztl. Hochsch. Hannover; Vet.-Assessor Dr. Becker zum Veterinärat mit Übertragung der Veterinäratstelle Minden II; Tierarzt Dr. Engler in Marienwerder zum Veterinärat mit Übertragung der Veterinäratstelle in Marienwerder II; Dr. Ketz in Gartow (Kr. Lüchow) zum Direktor des städt. Schlachthofs in Waren (Mecklbg.); Tierarzt Dr. Karl Knoerzer in Uffenheim zum Geflügel-tierarzt in Schwaiganger.

Verliehen: dem Vorstand des städt. Fleischbeschauamts am Schlachthof in Mannheim, Stadtveterinärat Dr. Otto Remmele, die Amtsbezeichnung Oberstadtveterinärat, dem Stadttierarzt Dr. Rudolf Schenk die Amtsbezeichnung Stadtveterinärat.

Niedergelassen: Tierarzt P. Henning aus Eisleben in Gartow; Tierarzt Rudolf Lucas in Fulda.

Personalveränderungen im Vet.-Offizierkorps.

Mit dem 31. Oktober 1928 scheiden aus dem Heeresdienst aus: Generalveterinär Dr. Simon; Div.-Vet. der 1. Div.; Generaloberveterinär Dr. Taubitz, Vorstand der Veterinärmittel-Abteilung des Zeugamts Spandau, mit dem Charakter als Generalveterinär; die Oberstabsveterinäre Grünert, 7. Inf.-Regt., Dr. Meißner, 6. Art.-Regt., diese beiden mit dem Charakter als Generaloberveterinär sowie alle vier mit der Berechtigung zum Tragen ihrer bisherigen Uniform.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelman, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechter, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrzabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Ausperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 44.

Ausgegeben am 3. November 1928.

36. Jahrgang.

Zur gefl. Beachtung! Der Bezugspreis für das 4. Vierteljahr 1928 wird für die beim Verlag direkt bestellten Abonnements durch Nachnahme erhoben, wenn derselbe nicht bis zum 25. ds. Mts. in unseren Händen ist. — Wir bitten ev. für Einlösung der Nachnahme besorgt zu sein.

M. & H. Schaper, Verlag der „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“.

Die Beseitigung der Tierkadaver.*)

Von Geheimrat Dr. Foth in Münster (Westf.).

Meine Herren! Eine geordnete allgemeine unschädliche Beseitigung der Tierkadaver ist natürlich eine veterinärpolizeiliche Selbstverständlichkeit. Weit darüber hinaus aber ist sie eines der wesentlichsten Postulate der Veterinärhygiene nicht nur, sondern zusammen mit der unschädlichen Beseitigung der menschlichen Leichen eines der Kernstücke der gesamten Hygiene überhaupt.

Man wird nicht sagen können, daß die Erkenntnis dieser Tatsache bisher Gemeingut der Bevölkerung geworden sei, und daß die unmittelbar interessierten breiten Schichten der Tierbesitzer ihr ausreichend Rechnung getragen hätten. Wohl gelang es der Friederizianischen Regierung durch Schaffung von Abdeckereiprivilegien die Hemmungen jener Zeit zu überwinden und die Kadaverbeseitigung überhaupt in die Wege zu leiten. Die Reichsviehseuchengesetzgebung aber ließ noch im Gesetz vom 23. Juni 1880 diese Materie ohne besondere Regelung. Jedoch schon damals waren es führende Männer der Landwirtschaft, war es der Deutsche Landwirtschaftsrat, der auf diesen Mangel hinwies und später in wiederholten Entschlüssen die einheitliche Regelung des Abdeckereiwesens aus sanitätspolizeilichen, veterinärpolizeilichen und wirtschaftlichen Gründen für ein dringendes Bedürfnis erklärte, sowie bestimmte ausgezeichnete Vorschläge für die künftige gesetzliche Ordnung der Materie machte. Der Deutsche Landwirtschaftsrat ging von der Erwägung aus, daß der Zustand des Abdeckereiwesens völlig unbefriedigend sei und zu den ernstesten Befürchtungen Anlaß gäbe. Vielfach gäbe es weder Abdeckereien noch Wasenplätze; jeder vergrübe die Tierkadaver wo er wolle; meistens nur oberflächlich, hierdurch finde eine gesundheitswidrige Verpestung der Luft und Verunreinigung des Bodens und der Wasserläufe sowie bei ansteckenden Viehseuchen vielfach deren Verbreitung statt; die vorhandenen Wasenplätze und Abdeckereien seien meistens in einem völlig ungenügenden Zustand und leisteten ebenfalls

der Verbreitung der Seuchen Vorschub; die Abdecker seien teilweise zweifelhafte Elemente und meistens nicht Fachleute.

Ausdrücklich betonte hiernach der Deutsche Landwirtschaftsrat: in erster Linie sei die Anzeigepflicht zu fordern. Diese dürfe sich aber nicht etwa nur auf Seuchekadaver beschränken, sondern müsse sich auf alle Haustierkadaver erstrecken; das abgehende Vieh müsse natürlich eine möglichst hohe Verwertung im Interesse der Besitzer finden. Zur Durchführung müßten zwar die Gemeinden zur Einrichtung von geeigneten Wasenplätzen und zur Anstellung von Abdeckern für diese Plätze gehalten sein, wo es aber möglich sei, sollten die Kreise oder entsprechende Verwaltungskörper allein oder zusammen mit anderen ordnungsmäßig eingerichtete und betriebene thermochemische Kadaververwertungsanlagen zur unschädlichen Beseitigung aller Kadaver und aller bei der Fleischschau beschlagnahmten Tierkörper oder Fleischteile bereitstellen, die eine vollständige Zerstörung aller schädlichen Krankheitskeime gewährleisten und die bei genügendem Anfall auch rentabel seien!

M. H.! Es ist bekannt, daß diese Entschlüsse im Reichsviehseuchengesetz vom 26. Juni 1909 sowie im Gesetz über die Beseitigung von Tierkadavern vom 17. Juni 1911 sowie in den bundesrätlichen und einzelstaatlichen Ausführungsbestimmungen ihren Ausdruck gefunden haben. Es ist auch bekannt, daß die Entschlüsse des Deutschen Landwirtschaftsrats und ähnliche Resolutionen des Preussischen Landesökonomie-Kollegiums bereits die Einrichtung einer großen Zahl von ordnungsmäßig betriebenen Kadaververwertungsanstalten zur Folge hatten und daß Aussicht bestand, daß sich allmählich das Land mit einem Netz solcher Anlagen überziehen würde. Denn mehr und mehr wurde das Vergraben der Tierkörper als ein nicht ungefährlicher und selbst auf Wasenplätzen als ein sehr unerfreulicher veterinär- und sanitätspolizeilich nicht unbedenklicher und zudem kostspieliger Notbehelf erkannt; zudem entsprach dieser Notbehelf der Forderung einer möglichst hohen Verwertung der Kadaver im Interesse der Tierbesitzer nur höchst unvollkommen.

*) Vortrag, gehalten auf der 90. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte (Abteilung 34) in Hamburg, 16. bis 22. September 1928, und der General-Versammlung des Provinzialvereins der Tierärzte Westfalens am 7. Oktober 1928.

Diese erfreuliche Entwicklung wurde aber durch den Krieg gehemmt und durch die folgende Revolutions- und Inflationsperiode gründlich unterbrochen. Die hohen Häutepreise jener Zeit boten den Anreiz, die Kadaver der Ablieferung an die Anstalten weitgehend zu entziehen. Andererseits waren die Betriebskosten damals wie bekannt, ungewöhnlich hoch. Die Folge war, daß zahlreiche Anstalten nicht lange mehr lebensfähig bleiben konnten und den Betrieb einstellen mußten. An den Bau neuer Anlagen war natürlich erst recht nicht zu denken. Obwohl damit der Verlust beträchtlicher Mengen der damals äußerst knappen hochwertigen Verarbeitungsprodukte, wie Fett, Fleischmehl, Leimgallerte, Knochenmehl, Klauenfchuhe, Klauenöl usw. verbunden war, blieben die Bemühungen der Behörden, ihren Polizeiverordnungen Geltung zu verschaffen, sei es durch Belehrungen in Wort und Schrift, sei es durch polizeiliche Kontrollen, erfolglos.

Zu allem Unglück brachte der schwere Maul- und Klauenfeuchezug 1920/21 mit seiner nie dagewesenen hohen Sterblichkeit eine plötzliche gewaltige Belastung der Anstalten. Jetzt erinnerten sich die Landwirte plötzlich der Ablieferungspflicht, um der Entschädigung nicht verlustig zu gehen, die die Sektion durch den beamteten Tierarzt in den Abdeckereien voraussetzte. Diesen Ansturm konnten sie einfach nicht bewältigen. Einrichtung und Betrieb, jahrelang auf mangelhafteste Kadaverablieferung eingestellt, konnten nicht im Handumdrehen und am wenigsten in jener wirtschaftlich schweren Zeit einer weit über jedes normale Maß hinausgehenden Inanspruchnahme angepaßt werden.

Mangelhafte verspätete Abholung der Kadaver, unklare Sektionsergebnisse bei den halb oder ganz verfaulten Kadavern, Zweifel über die Berechtigung der Entschädigungsansprüche, verspätete Auszahlung der inzwischen entwerteten Entschädigungsbeträge waren die unvermeidlichen Folgen. Lärmvolle landwirtschaftliche Protestversammlungen ließen kaum ruhige und sachliche Besprechung von Ursache und Wirkung und von Besserungsvorschlägen mehr aufkommen. Hinweise darauf, daß die berufene Vertretung der Landwirtschaft selbst aus sich heraus die Anregung zu dem Gesetze gegeben habe, verhallten ungehört. Selbst ruhig denkende Landwirte wurden von der allgemeinen Aufregung und Verärgerung ergriffen. Kein Wunder, daß der Widerstand gegen die Anstalten und den Ablieferungszwang wuchs. Nach der ganzen Entwicklung dieser Angelegenheit und unserer Gesamtwirtschaft war es klar, daß die Durchführung des Gesetzes in dem beabsichtigten Sinne ohne die Bereitstellung öffentlicher Mittel nicht erreichbar war. Ich war schon damals der Auffassung, daß in erster Linie die Landwirtschaft selbst durch Heranziehung zur Kostentragung unmittelbar an der sachgemäßen Durchführung des Gesetzes interessiert werden müsse und in zweiter Linie auch Staatsgelder in Wahrung des allgemeinen hygienischen Interesses in Betracht kämen. Zeitungsnachrichten zufolge bereitete auch das preußische Landwirtschaftsministerium bereits einen Gesetzentwurf im Sinne einer Heranziehung öffentlicher Mittel vor, der aber dem Vernehmen infolge des Widerstandes maßgebender landwirtschaftlicher Kreise zurückgezogen wurde. Mit zunehmender Festigung der Wirtschaftslage aber änderten sich die Voraussetzungen für den Widerstand der Tierbesitzer. Die Selbstabdeckerei hat für den Landwirt schon längst keinen Sinn mehr. Die meistens beschädigten Abdeckereihäute stehen ohnehin schlecht im Preise und sind, wenn sie nicht faul abgezogen, gut behandelt usw. sind, kaum los zu werden. Es ist bekannt, daß im verlustreichen letzten Maul- und Klauenfeuchezuge 1926 die Kadaver, als sie wegen Betriebseinstellung vieler Anstalten wieder am Fallort zerlegt werden mußten, zum sehr großen Teil mit der Haut vergraben wurden, weil die Landwirte trotz der Anrechnung des Hautwertes auf die Entschädigung

kaum Wert auf die mühevolle und unlohnende Arbeit des Abhäutens und des Selbstverwertens legten.

Trotzdem verharren unbegreiflicherweise die meist landwirtschaftlich orientierten Selbstverwaltungskörper der Landkreise vielfach noch grundsätzlich auf ihrem Widerstande, wenn auch in den noch betriebenen Anstalten die Ablieferung durchweg etwas besser geworden ist.

Es ist daher auf das lebhafteste zu begrüßen, daß das Preussische Landwirtschaftsministerium seinen vorhin erwähnten Gedanken erneut aufgenommen hat und den Erfolg hatte, daß ein neuer Entwurf vom Landtage angenommen wurde. Dieses Ergänzungsgesetz vom 28. März 1928 zum Preuß. Ausführungsgesetz zum Reichsviehseuchengesetze bestimmt, daß die Provinzialverbände beschließen können, daß die durch Umlagen auf die Viehbestände gebildeten Viehseuchen-Entschädigungsfonds zur Kostentragung bei der Verarbeitung und Verwertung der an ordnungsmäßig betriebene Kadaververwertungsanstalten abgelieferten Tierkadaver herangezogen werden. Zugleich bestimmt es, daß solchen Verbänden Zuschüsse aus der Staatskasse zu gewähren sind. Die Verwendung dieser Mittel ist nicht nur darauf beschränkt, daß den Landwirten der volle Hautwert anstatt wie bisher im Durchschnitt nur ein Drittel davon den Anstalten ausbezahlt werden kann, sondern daß in dringenden Bedürfnissen auch zur Errichtung neuer und zur Erhaltung bestehender Anlagen Beihilfen daraus gewährt werden können.

Zu beachten ist vor allem die Bezahlung des vollen Häutewertes — den der Tierbesitzer bei Selbstverwertung nie auch nur annähernd erhält —, sowie die werbende grundsätzliche Beschränkung dieser Bezahlung auf Kadaver, die an Abdeckereien oder sonstigen Verwertungsanstalten abgeliefert werden.

Damit finden endlich die Voraussetzungen für eine durchgreifende allgemeine Regelung der viehseuchen- und gesundheitspolizeilich so außerordentlich bedeutungsvollen Kadaverbeseitigung gegeben und die bald zu erwartenden ministeriellen Ausführungsbestimmungen werden die Richtlinien für die Durchführung des Gesetzes geben.

Trotzdem wäre nach den bisherigen Erfahrungen allzu großer Optimismus verfrüht. Denn zunächst ist es der Zwang, den die Landwirte ablehnen, wie wiederholt in den Kreistagen offen zum Ausdruck gebracht wurde. Ferner ist der Glaube nicht auszurotten, daß die Kadaververwertungsanstalten gewinnbringende Unternehmungen seien, die nicht nur aus den Häuten, sondern vor allem aus den Verarbeitungsprodukten der Kadaver so hohe Gewinne erzielen, daß sie hohe Entschädigungen für die abgelieferten Kadaver zu zahlen in der Lage wären. Das ist ein Irrtum. Die Häutepreise liegen zum Teil unter den Vorkriegspreisen und das Hauptverarbeitungsprodukt, das Tierkörpermehl, muß wegen der ungerechtfertigten Bevorzugung der ausländischen Fleischmehle durch die Landwirte zu erheblich niedrigeren Preisen abgegeben werden. Andererseits sind die maschinellen und sonstigen technischen sowie die personellen Betriebskosten weit höher als vor dem Kriege. Wenn die Anstalten heute durchschnittlich die Kadaver etwa mit einem Drittel des Hautwertes vergüten, so dürfte damit das Höchstmaß ihrer Leistungsfähigkeit erreicht sein und eine Steigerung nur durch verstärkte Ablieferung der Kadaver möglich sein. Damit zugleich können die Beihilfen aus öffentlichen Mitteln sich ermäßigen. Zu beachten ist aber hierbei, daß die Anstalten so angelegt und eingerichtet sein müssen, daß sie einem plötzlich eintretenden Massensterben nicht wieder hilflos gegenüber stehen. Das ist aber totes Kapital, das in normalen Zeiten nur Geld kostet und dessen Zinsen in schweren Seuchenzeiten durch die plötzlich gewaltig anschwellenden Betriebskosten kaum wieder eingebracht werden können.

M. H.! Wir stehen hier an dem Wendepunkt einer hygienisch hochbedeutsamen Entwicklung. An den Tierärzten liegt es, nicht etwa nur den beamteten, nein in hervorragendem Maße auch an den Freiberufstierärzten, im öffentlichen sowie nicht zuletzt in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse durch Belehrung die Tierbesitzer in Wort und Schrift aufzuklären und einer der wichtigsten Forderungen der Hygiene endlich zum Siege zu verhelfen. Weit mehr als es bisher geschehen ist, muß den Tierbesitzern durch Vorträge in großen und kleinen landwirtschaftlichen Vereinen, durch aufklärende Arbeit in Wort und Schrift das Verständnis für die weittragende Bedeutung einer sachgemäßen unschädlichen Beseitigung aller Kadaver nahegebracht werden. Es ist doch kein Zufall, daß überall dort, wo sie bereits richtig durchgeführt wird, der Seuchenstand sich bessert, daß insbesondere die eigentlichen Bodenseuchen zusehends zurückgehen, daß beispielsweise in Württemberg, wo die Kadaverbeseitigung am vollendesten durchgeführt wird, der früher dort viele Opfer fordernde Milzbrand nunmehr gänzlich getilgt ist. Zugleich muß den Landwirten aber auch immer wieder gesagt werden, welchen unmittelbaren Nutzen sie von einer solchen Kadaverbeseitigung in richtig betriebenen modernen Kadaververwertungsanlagen haben; daß sie nichts weiter zu tun haben, als die Kadaver — und zwar alle, nicht nur die Seuchenkadaver — der Anstalt zu melden, die sie sofort kostenlos abholt und künftig auch anständig, d. h. mit dem vollen Häuterwert, der periodisch nach den Auktionspreisen für Kadaverhäute vom Landwirtschaftsministerium bekannt gegeben wird, bezahlt, weit höher also, als was der Landwirt bei etwaiger Selbstverwertung erzielen kann. Klar gestellt muß aber auch werden, daß Bau, Einrichtung und exakter, allen Vorschriften entsprechender Betrieb solcher Anlagen heutzutage so kostspielig sind, daß hohe Vergütungen für die Kadaver nur mit Zuschüssen aus öffentlichen Mitteln (Provinz, Staat, Kreis) gezahlt werden können, und daß der Zuschußbedarf um so kleiner wird, je mehr Kadaver abgeliefert werden.

Aber auch bei reiflicher Ablieferung der Kadaver kann

von einer Rentabilität keine Rede sein, wenn die Anstalt, wie es häufig geschieht, aus übertriebener Angst vor Seuchenverschleppungen und Geruchsbelästigung in entlegene Gebiete mit überdies schlechten Straßenverbindungen gelegt wird. Seuchenverschleppungen sind bei der Beschaffenheit der Fuhrwerke und genügender Kontrolle sicher auszuschließen. Mir ist noch kein Fall bekannt geworden. Wohl aber sind mir mehrere Fälle bekannt, wo in den schweren und verlustreichen Maul- und Klauenfeuchezügen 1920/21 und 1925/26 das eigene Vieh der Fuhrstellenleute, die die Kadaver abholten, von der Seuche verschont blieb. Die Geruchsbelästigungen sind bei der heutigen Vollkommenheit der Apparate und Betriebseinrichtungen völlig unerheblich und stehen weit hinter denen vieler anderer Fabriken zurück.

Eine besonders starke Belastung des Unkostenfonds liegt in den Reparaturen der Automobile. Soweit es irgend angängig ist, wird daher für größere Anlagen oder gemeinsam für eine Anzahl solcher Anstalten nach Württembergischen Vorbilde die Einrichtung einer eigenen Reparaturwerkstatt anzustreben sein.

Im übrigen kann ich nach meinen Erfahrungen nicht dringend genug empfehlen, beim Neubau von Kadaververwertungsanlagen Bedacht darauf zu nehmen, daß reichlich landwirtschaftlich gut nutzbares Gelände dazu gehört und daß der Besitzer oder Pächter oder Betriebsleiter recht viel von der Landwirtschaft versteht. Eine solche Kombination vermindert nicht nur mancherlei Schwierigkeiten, sondern ist vor allem in besonderem Maße geeignet, die Rentabilität der Anlage zu sichern.

M. H.! Wenn im Sinne dieser Ausführungen von allen berufenen Seiten recht ausgiebige aufklärende Kleinarbeit geleistet wird, dann kann es nicht zweifelhaft sein, daß das neue Ermächtigungsgesetz in den Provinziallandtagen einen wohl vorbereiteten Boden für die erforderliche Beschlußfassung finden wird und daß die Kreistage alsdann bald ohne Ausnahme die Beseitigung aller Tierkadaver in modernen Kadaververwertungsanlagen zu einer Kreisangelegenheit erheben und mit Nachdruck zur Durchführung bringen werden.

(Aus dem Staatlichen Veterinär-Untersuchungsamt Hannover-Linden. — Leiter: Prof. Dr. Oppermann.)

Weitere Beiträge zur Diagnose der infektiösen Anämie des Pferdes mit Hilfe des Hühnerversuchs.

Von Prof. Dr. Oppermann und Dr. Lauterbach.

Tabelle I.

Kennzeichen der Hühner	Leberbefunde		Urteil	Bemerkungen
	Rundzellen	Hämo-siderin		
M. L. 461/7	—	—	negativ	5 ccm Milz- und
M. L. 462/7	—	—	negativ	Leberbrei-
M. L. 463/7	—	—	negativ	aufschwemmung in
M. L. 464/7	—	—	negativ	Tyrolerlösung intra-
M. L. 465/7	—	—	negativ	muskulär injiziert
M. L. 466/7	—	—	negativ	

In einem weiteren Versuch war nun die Frage zu klären, ob sich bei Anämiepferden Leber und Milz ebenfalls infektionstüchtig erwiesen.

Zu dieser Feststellung wurden je fünf Hühner mit Milz- bzw. Leberbreiaufschwemmung eines Pferdes infiziert, dessen Leber histologisch die für Anämie charakteristischen Veränderungen zeigte.

Unsere bisherigen Infektionsversuche stützen sich auf die Verimpfung von Serum oder Blut erkrankter Pferde. Da nun in nicht all zu seltenen Fällen die Diagnose während des Lebens nicht gestellt wird, und erst bei der Obduktion der Verdacht auf Vorliegen der ansteckenden Blutarmut auftaucht, sind wir häufig vor die Erfordernis gestellt, aus Organanteilen, von denen vor allen Dingen Milz und Leber in Frage kommt, die Diagnose mittels Tierversuchs stellen zu müssen.

In einem kurzen Vorversuch haben wir zunächst wieder zu ermitteln versucht, ob nicht der Verimpfung von Milz- und Leberbrei das artfremde Eiweiß dieser Organe etwa Veränderungen in der Leber, wie wir sie bei ansteckender Blutarmut finden, bewirkt. Zu diesem Zweck wurden sechs Hühner mit Mischbrei aus Leber und Milz eines gefunden Pferdes (histologische und serologische Untersuchung) injiziert.

Aus diesem Versuch (Tab. I) glauben wir uns zu dem Schluß berechtigt, daß das in Leber und Milz enthaltene artfremde Eiweiß keinerlei Veränderungen im Sinne der ansteckenden Blutarmut in der Leber der Versuchshühner auslöst.

Tabelle II.

Kennzeichen der Hühner	Leberbefunde		Urteil	Bemerkungen
	Rundzellen	Hämo- siderin		
L. 469/7	++	—	positiv	5 ccm Leberbrei- aufschwemmung in- tramuskulär
L. 470/7	+++	+	positiv	
L. 471/7	+	—	positiv	
L. 472/7	+	—	positiv	
L. 473/7	+	—	positiv	
M. 474/7	+++	—	positiv	5 ccm Milzbrei- aufschwemmung intra- muskulär.
M. 475/7	+++	+	positiv	
M. 476/7	++	—	positiv	
M. 477/7	+	—	positiv	
M. 478/7	++	—	positiv	

Aus dem Ergebnis dieses Versuches sehen wir, daß sich Organteile ebenso gut zum diagnostischen Tierversuch eignen wie die Blutbestandteile erkrankter Tiere.

Inzwischen haben wir auch, wie s. Zt. bereits angekündigt, Versuche angestellt, um die Wirkung von Eiweiß, das nicht vom Pferd stammt, auf die Hühnerleber kennen zu lernen. Wir haben zu diesem Zweck eine Reihe Hühner mit Blut von Schweinen infiziert und zwar haben wir folches Blut genommen, daß das Virus der Schweinepest enthielt.* Wir haben derartiges Infektionsmaterial gewählt, um gleichzeitig neben der Eiweißwirkung die Wirkung anderer Viruserkrankungen zu studieren. Es war aus diesem Grunde auch erforderlich, die Versuchstiere nicht an einem Tage zu töten, sondern, wie wir das auch bei den Anämieversuchen getan haben, verschiedene Zeiten nach der Infektion.

Tabelle III.

Kennzeichen der Hühner	Tage p. inf. ge- tötet	Leberbefunde		Urteil	Bemerkungen
		Rundzellen	Hämo- siderin		
Sw. 398/3	3	—	—	negativ	1½ ccm Schweineblut intramuskulär
Sw. 399/3	3	—	—	negativ	
Sw. 400/5	5	—	—	negativ	
Sw. 401/5	5	—	—	negativ	
Sw. 402/7	7	—	—	negativ	
Sw. 403/7	7	—	—	negativ	
Sw. 404/9	9	—	—	negativ	
Sw. 405/9	9	—	—	negativ	
Sw. 406/11	11	—	—	negativ	
Sw. 407/11	11	—	—	negativ	
Sw. 408/13	13	—	—	negativ	
Sw. 409/13	13	—	—	negativ	
Sw. 410/15	15	—	—	negativ	

*) Für die freundliche Überlassung von Viruspestblut danken wir auch an dieser Stelle dem Seruminstitut Eystrup verbindlichst.

(Aus dem anatomischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover. — Direktor: Prof. Dr. Zietzschmann.)

Über einige Methoden zur Prüfung der Funktion von Sehnen und Muskeln.

(Mit 2 Abbildungen.)

Von Dr. Wilhelm Krüger, Assistent.

In den Lehrbüchern der Anatomie Ellenberger und Baum (1), Martin (5), Schmaltz (11), finden sich

(Bei den Versuchstieren 405/9, 406/11, 408/13, 409/13, sind unter den serösen Häuten des Herzens punktförmige Blutungen vorhanden.)

Aus dem Versuch erhellt, daß das für die Hühner artfremde Blut von Schweinen keine Veränderungen im Sinne der ansteckenden Blutarmut auszulösen vermag. Weiter ergibt sich die interessante Tatsache, daß das Virus der Schweinepest ebenfalls keine Wirkung auf die Leber der Hühner auszuüben vermag.

Endlich haben wir noch die Frage zu klären versucht, ob und wann bei spontan erkrankten Hühnern die histologischen Erscheinungen verschwinden. Eine Reihe von Versuchshühnern, die aus Anämiebeständen stammten und die in der histologischen Leberuntersuchung ein positives Resultat ergaben, haben wir verschieden lange Zeit, nachdem ihnen die Infektionsmöglichkeit genommen war, getötet und einer abermaligen histologischen Untersuchung unterzogen.

Tabelle IV.

Huhn Op. Nr.	Leberbefunde		Urteil	Getötet Woch. n. Op.	Leberbefunde		Urteil
	Zell- wuch.	Hämo- sid.			Zell- wuch.	Hämo- wuch.	
51	++	++	positiv	9	+	+++	positiv
53	+	+	positiv	9	+	+	positiv
69	+	++	positiv	9	+	++	positiv
114	++	—	positiv	8	—	+	fraglich
115	++	+	positiv	8	+	+++	positiv
128	++	—	positiv	7	++	—	positiv
131	++	+	positiv	7	++	+	positiv
151	+	—	fraglich	6	+	—	fraglich
154	++++	—	positiv	6	+	++	positiv
159	+	+	positiv	5	+	+++	positiv
160	+	++	positiv	5	+	+++	positiv
211	++	+++	positiv	4	+	++	positiv

Aus diesem Versuch ergibt sich, daß sich das histologische Leberbild einmal erkrankter Hühner im Laufe von 9 Wochen nur geringfügig ändert und daß nicht damit gerechnet werden kann, daß derartige zunächst unbrauchbar befundene Tiere in absehbarer Zeit doch noch für Versuche geeignet sind.

Zusammenstellung.

1. Leber- und Milzbrei vom gefundenen Pferd lösen in der Hühnerleber histologisch keine Veränderungen im Sinne der Anämie aus.
2. Leber und Milz anämiekranker Pferde eignen sich zu diagnostischen Hühnerimpfversuchen.
3. Blut von Schweinen hat als artfremdes Eiweiß ebenfalls keine Wirkung auf die Leber der Versuchstiere.
4. Das Virus der Schweinepest vermag keinen Reiz auf das retikuloendotheliale System der Hühnerleber auszulösen.
5. Bei spontan erkrankten Hühnern bilden sich im Verlauf von neun Wochen die histologischen Veränderungen nur unerheblich zurück.

in hippologischen Arbeiten und physiologischen Werken findet die Funktion der Muskeln häufig ausführliche Besprechung. Diese Auseinandersetzungen sind außerordentlich wichtig, heben sie doch die Anatomie aus dem rein Deskriptiven heraus, indem sie funktionelle Erklärungen zu bringen versuchen für den anatomischen Bau der tierischen Lebewesen. In den meisten Fällen beruhen jedoch diese Angaben nicht auf experimentellen Untersuchungen oder auf Beobachtungen, sondern sie entspringen theoretischen Erwägungen der Autoren und gründen sich auf Feststellungen über die Ansatzpunkte der Muskeln am Skelett und über deren Lage zu den Gelenken. Durch die Untersuchungen von Stoß (12), Zschokke (16) und Schauder (10), wurde in die funktionelle Betrachtung der feinere Bau der Knochen und Muskeln eingeführt. Besonders Schauder verdanken wir eingehende Untersuchungen über die Anordnung der Muskelfasern in den Skelettmuskeln des Pferdes, den anatomischen und physiologischen Querschnitt usw. So sehr auch hierdurch die Erforschung der Muskeltätigkeit gefördert sein mag — denn die Funktion bestimmt die Form — so erscheint eine vollkommen exakte Lösung dieser Fragen doch nur durch das Experiment am lebenden Tier zu erwarten. Es soll im folgenden meine Aufgabe sein, die bisher angewandten experimentellen Methoden einer kurzen Besprechung zu unterziehen.

Gewissermaßen als Überleitung dazu sei einer von Mehrle (6) angewandten Methode Erwähnung getan. Mehrle benutzte nämlich zur Feststellung der wechselnden Anspannung der Beuge Sehnen und des M. interosseus medius beim Pferde den sog. Sehnenspannapparat nach Moser; die Untersuchungen erfolgten am toten Objekt und wurden dann durch theoretische Erwägungen und Beobachtungen am lebenden Tier zu ergänzen versucht.

Die erste rein experimentelle Methode beschreibt Kadelitz (1926) (3). Er benutzte nach einem von Schauder (1922) (9) gemachten Vorschlag den Film, indem er an den Filmbildern eines sich bewegenden Pferdes genau den durch die aufeinander folgende Kontraktion der Muskeln sich ergebenden Formenwechsel der Körperoberfläche zu erfassen und zu analysieren versuchte. Die Untersuchungen sind bis jetzt nur an der Hintergliedmaße ausgeführt worden. Die Ergebnisse sind aber so interessant und eindeutig — natürlich nur für die oberflächlich gelegenen Muskeln, daß weitere Arbeiten nach dieser Methode lohnend erscheinen.

Eine von Strubelt (1928) (14) auf Anregung von Prof. Zietzschmann durchgeführte Methode versucht die Funktion fehniger Apparate mittels der Durchschneidung zu ergründen; d. h. der auf seine Funktion zu prüfende Sehnenstrang wird am lebenden Tier durchgeschnitten — es fanden nur zur Tötung bestimmte Tiere Verwendung — und die sich dann ergebenden Änderungen der Bewegung werden funktionell zu deuten versucht. Die Methode ist verwendet worden bei der Prüfung der Funktion des Lacertus fibrosus (Tendo metacarpalis) und des Tendo femorotarsus und hat gezeigt, daß diesen beiden Sehnenzügen eine entscheidende Bedeutung für das Stehen und die Bewegung nicht zukommt. Inwiefern die Methode für die Untersuchung anderer Sehnen, Muskeln und Bänder sich eignet, muß dahingestellt bleiben. An sich ist ja die Durchschneidung von Sehnen und Bändern zu therapeutischen Zwecken in der tierärztlichen Operationstechnik nichts neues. Zu funktionellen Studien sind aber meines Wissens die sich dabei ergebenden Erscheinungen bisher nicht verwandt worden.

Es läßt sich dann weiter für die Erforschung der Muskelfunktion das Galvanometer verwenden. Bei jeder Muskelkontraktion entsteht nämlich in dem sich kontrahierenden Muskel — sei es das Herz, die Muskelmasse des Pensens oder auch ein Skelettmuskel — ein elektrischer Strom, der sog. Aktionsstrom, der durch ein empfindliches Galvanometer, wenn es durch eine gut isolierte Leitung und durch eine empfindliche Abnahmevorrichtung mit dem Muskel ver-

bunden ist, registriert wird. Bekannt sind die Herzaktionsströme, Nörr (7), die fortlaufend registriert in einem Elektrokardiographen — einem besonders für die Abnahme der Herzaktionsströme bestimmten, mit einem empfindlichen Spiegelgalvanometer ausgestatteten Apparat — die sog. Aktionsstromkurve ergeben, über deren einzelne Phasen eine ganze Anzahl ausführlicher Arbeiten vorliegen. Erwähnung findet bereits bei Nörr der Hinweis, daß die Tiere bei der Abnahme der Herzstromkurve sich absolut ruhig verhalten müssen, weil Kontraktionen von in der Nähe der Abnahmestelle gelegenen Skelettmuskeln ebenfalls Ströme dem Galvanometer mitteilen, die dann die Herzaktionsstromkurve stören.

Die ersten Untersuchungen über die Aktionsströme von Skelettmuskeln stammen von Piper (8). Als Stromabnahmeinstrumente benutzte er sog. unpolarisierbare Trichterelektroden, bezüglich deren genauer Einrichtung auf die Originalarbeit verwiesen werden muß. Die Elektroden wurden — je eine — in der Nähe des Ursprungs und des Ansatzes der zu untersuchenden Muskelgruppe auf der Haut befestigt, worauf die Muskeln — die Versuche wurden am Menschen ausgeführt — in Kontraktion versetzt wurden. Durch Aufzeichnung der Galvanometerauschläge ergab sich die den Muskeln eigene Aktionsstromkurve. Piper stellte fest, daß der Muskelaktionsstrom auf dem Papierstreifen eine fortlaufende Wellenlinie erzeugt mit etwa 50 Erhebungen und Vertiefungen in der Sekunde. Weitergehende Untersuchungen von Haas (2) über dieses Phänomen führten dann zu der Erkenntnis, daß die Größe der Ausschläge proportional ist der bei der Kontraktion angewandten Muskelkraft.

Hierauf fußend ist von Thur und mir versucht worden, die Methode für die Prüfung der Tätigkeit der Muskeln bei Tieren nutzbar zu machen. — Die ausführliche Arbeit über diese Versuche findet sich in Pflügers Archiv für Physiologie Bd. 218, S. 677—689. — Untere Untersuchungen erstreckten sich zunächst auf die Tätigkeit der Muskeln beim ruhigen Stehen. Dabei war der Gedanke leitend, daß die Gliedmaßen von Mensch und Haustieren insofern in ihrem groben Bau einen wesentlichen Unterschied aufweisen, als die großen als Stütze dienenden Knochen der Beckengliedmaße (Femur und Tibia) beim Menschen einen Gelenkwinkel von etwa 180 Grad bilden, während bei den Tieren im allgemeinen kleinere Gelenkwinkel angetroffen werden. Während also der Mensch die Last seines Körpers mehr oder weniger nur auf den senkrechten Säulen seiner Gliedmaßenknochen zu balancieren braucht, macht sich bei den Tieren mit kleineren Gelenkwinkeln der Gliedmaßenknochen die Last des Körpers an den Streckseiten dieser Gelenke in stärkerem Maße bemerkbar. Es schien uns nun nicht ausgeschlossen, daß zum Tragen der so gestellten Gelenke Muskeln ähnlich wie bei dem in Kniebeuge stehenden Menschen verwendet werden. Ihre Brauchbarkeit erwies uns die Methode zunächst am Menschen. Wir befestigten nämlich über dem M. quadriceps eines Schenkels des einen von uns Nadelelektroden, die sich uns als empfindlicher erwiesen als die Piperschen Trichterelektroden, in der von Piper beschriebenen Anordnung durch Einstich in die Haut. Beim ruhigen aufrechten Stehen zeigte das angeschlossene Galvanometer eines Elektrokardiographen nach Siemens & Halske keine Schwankungen (siehe Abb. 1a), bei Einnahme der Kniebeugestellung machte sich sofort ein Strom bemerkbar (siehe Abb. 1b) und zwar steigend mit der Vertiefung der Beugstellung.

Die Untersuchungen nun, die in der Folge an Tieren (Pferden, Rindern, Ziegen und Hunden) an allen für das Stehen nach ihrer Lage evtl. in Betracht kommenden Muskeln mittels des oben genannten Instrumentariums durchgeführt wurden, ergaben, daß bei diesen Tieren ganz allgemein, trotz der winkligen Stellung der Knochen, nur relativ geringe Aktionsströme in den erwähnten Muskeln




Abb. 1a. Aktionsstromkurve des M. quadriceps femoris des Menschen beim aufrechten Stehen.




Abb. 1b. Aktionsstromkurve des M. quadriceps femoris des Menschen in Kniebeugestellung. (Kniegelenkwinkel 140 Grad.)

nachzuweisen sind. Verhältnismäßig die stärksten Ausschläge zeigten Hund und Ziege, geringere das Rind und nur ganz minimale Erhebungen aus der Nulllinie zeigten die Kurven der Muskeln des Pferdes. Da nun nachweislich beim Pferde die winkligen Gelenke im wesentlichen durch passive (fehnige) Trageapparate gehalten werden (durchgehende Sehne des M. biceps brachii, fehniger M. interosseus medius, Kniescheibenbandapparat, stark fehniger M. flexor digit. ped. superficialis), so führen diese Untersuchungen zu der Vermutung, daß auch bei den übrigen untersuchten Vierfüßlern, über die anatomische Untersuchungen bisher noch nicht vorliegen, fehnige Apparate (in der Ausbildung etwa umgekehrt proportional den registrierten Aktionsströmen) vorhanden sein müssen.

Interessant dürften vielleicht die bezüglich der Fixation des Kniegelenks beim Pferde erhobenen Befunde sein, ist doch dieser Punkt Gegenstand häufiger Untersuchungen mit scheinbar sich widersprechenden Resultaten gewesen. So wurde von Zschokke (15) und anderen die Anschauung vertreten, daß die Kniescheibe des Pferdes auf dem medialen etwas vorspringenden Rollhöcker des Femur beim Stehen festhake, und daß dann das Kniegelenk lediglich durch die drei kräftigen geraden Kniescheibenbänder ohne Beteiligung des M. quadriceps femoris oder anderer Muskeln getragen werde. Demgegenüber wiesen Stoß (13) und Schauder nach, daß ein eigentliches Heraufziehen der Kniescheibe auf den medialen Rollhöcker nur beim Schildern, also bei Belastung nur einer Hintergliedmaße eintrete. Damit schien die Richtigkeit der alten Anschauung in Frage gestellt. Die mit dem Elektrokardiographen durchgeführten Versuche haben jedoch ergeben, daß beim normalen Stehen und bei gleichmäßiger Belastung beider Gliedmaßen im M. quadriceps femoris des Pferdes keine Aktionsströme (s. Abb. 2), nachzuweisen sind. Danach darf man nun also doch mit den älteren Forschern annehmen, daß für die Fixation des Knie-

gelenks die drei geraden Kniescheibenbänder und eine Befestigung der Kniescheibe auf dem medialen Rollhöcker erforderlich sind. Da jedoch ein vollkommenes Heraufziehen der Kniescheibe auf diesen Höcker nachweislich erst bei stärkerer Belastung eintritt, so gewinnt es den Anschein, daß bereits bei einem teilweisen Heraufgezogensein, sofern nur die Kniescheibe mit ihrem Knorpelfortsatz irgendwie auf dem etwa 3 cm langen oberen Teil des medialen Rollhöckers reitet, die Fixation durch die Bänder und den bloßen Tonus der Muskeln gegeben ist.

a

b




Abb. 2. Aktionsstromkurve des M. quadriceps eines Pferdes bei gleichmäßiger Belastung beider Gliedmaßen. (Die Empfindlichkeit des Galvanometers ist bei allen 3 Kurven die gleiche [1 mm = 0,009 MV.], Zeitregistrierung in 1/40 Sekunde].

Einen großen Fortschritt in der experimentellen Erforschung der Muskelfunktionen würde es m. E. bedeuten, wenn es gelänge, diese Methode auch an sich bewegenden Tieren anzuwenden. Die dem heute noch entgegenstehenden Schwierigkeiten liegen in der Hauptsache in einer für diese Arbeiten unbedingt erforderlichen teuren und umständlichen Apparatur begründet. Versuche zur Beseitigung dieser Hindernisse sollten jedoch gemacht werden im Interesse einer Erweiterung unserer Kenntnisse über den Bewegungsvorgang bei den Haustieren.

Literaturverzeichnis.

1. Ellenberger und Baum (1926): Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere. 16. Aufl. Verlag J. Springer, Berlin.
2. Haas, E. (1926): Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 212, S. 651.
3. Kadletz, M. (1926): Wiener Tierärztl. Monatsschr. S. 185—198.
4. Krüger, W. und Thur, Th. (1928): Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 218, S. 677—689.
5. Martin, P. (1919): Anat. der Haustiere Bd. IV, 2. Aufl. Verlag von Schickhardt & Ebner, Stuttgart.
6. Mehrle, F. (1926): Münch. Tierärztl. Wschr. Jahrg. 77, S. 345 bis 348.
7. Nörr, J. (1925): Der Blutkreislauf. In Ellenberger-Scheunert, Vergl. Physiologie der Haustiere. 3. Aufl. Verlag P. Parey, Berlin.
8. Piper, H. (1907): Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol., Bd. 109, S. 301.
9. Schauder, W. (1922): Berliner Tierärztliche Wschr. Bd. 38, S. 157—160.
10. Derselbe (1924): Arch. für Anatomie und Entwicklungsgeichte Bd. 71, S. 559.
11. Schmaltz, R. (1928): Anat. d. Pferd. 2. Aufl. Verlag R. Schoetz, Berlin.
12. Stoß, A. (1887): Deutsche Zeitschr. für Tiermedizin und vergl. Pathologie Bd. 13.
13. Stoß, A. O. (1923): Zeitschr. für Anat. und Entwicklungsgeichte Bd. 69, S. 5.
14. Strubelt, H. (1928): Arch. für wissenschaftl. und prakt. Tierheilkunde Bd. 57, S. 575—585.
15. Zietzschmann, O.: Die spezielle Bewegungslehre. In Ellenberger-Scheunert, Lehrbuch der vergl. Physiologie der Hausäugetiere. Berlin 1928. S. 400—424.
16. Zschokke, E. (1892): Weitere Untersuchungen über das Verhältnis der Knochenbildung zur Statik und Mechanik des Vertebraten skeletts. Zürich.

Ein eigenartiges Bewegungshindernis.

Von Generaloberveterinär a. Dr. Dr. Vogt, Heidingsfeld.

Schon vor etwa Jahresfrist wurde mir von einem Bauern eine Kuh gezeigt, die eine Schwellung der Zwischenklauenhaut an beiden Hinterbeinen aufwies. Der Besitzer verlangte damals eine Behandlung des Zustandes mit Salbe. Ich aber beschied ihn dahin, daß mit einer Salbenbehandlung nichts zu erreichen sei und daß höchstens ein operativer Eingriff in Betracht käme, wenn sich die Wulst noch weiter vergrößern und Arbeitsbeschränkung sich einstellen sollte.

Am 7. Juni d. Js. sprach der Mann wieder bei mir vor und erzählte mir, daß die Schwellung bedeutend an Umfang zugenommen habe und die Gebrauchsfähigkeit der hinteren Gliedmaßen gestört sei. Daraufhin stellte ich meinen Besuch für den nächsten Tag in Aussicht und bedeutete zugleich dem Besitzer, daß ich sofort eine Operation vornehmen würde, wenn die Notwendigkeit und Möglichkeit dazu bestände, er möge sich einstweilen mit seiner Arbeit darauf einrichten.

Als ich am nächsten Tag die Kuh besichtigte, zeigte sich, daß im Stande der Ruhe die beiden Beckenextremitäten etwas unter den Leib geschoben waren, so daß die Ballen der Klauen mehr als normal belastet, die Zehen dagegen im Verhältnis dazu entlastet waren. Die Klauen standen gespreizt auseinander. Im Klauenspalz befand sich jederseits eine wurstförmige, 3 cm in den Klauenspalz hinab- und bis zur Hälfte des Spaltes nach rückwärts reichende Geschwulst mit normalem Hautüberzug. An ihrer Basis war die Schwellung etwa 4 cm breit. Das Horn an der Zehe zeigte Ringe wie bei der chronischen Hufrehe des Pferdes, die Zehenspitze war leicht aufgeworfen. Ließ man das Tier anführen, so war der Gang verändert. Die Hinterbeine wurden zögernd vorgeführt und weit unter den Leib gesetzt, so daß die hinteren Klauenpartien stärker als normal

belastet wurden. Nach Angabe des Besitzers stand die Kuh zögernd, unter 3—4maligem Ansetzen auf, was in früheren Zeiten rascher geschehen war. Nach dieser Befundaufnahme und der mir gewordenen Mitteilung wurde die Kuh zur operativen Behandlung niedergefnürt und die Hinterbeine in Seitenlage des Tieres nacheinander zweckentsprechend ausgebunden. Die Geschwülste wurden herausgeschnitten und die Operationsstellen mit dem Glüheisen nachgebrannt, um einesteils stehengebliebene Reste der Wucherungen noch zu zerstören, andererseits um die aufgetretene Blutung zu stillen und neue hintanzuhalten. Operationsfeld und Umgebung wurden noch dick mit Teer überstrichen und Patient seiner Fesseln entledigt, worauf er sich sofort erhob. Die Belastung der operierten Beine war eine gute; der Klauenspalz wurde mehr geschlossen als vor der Operation, auch im Gange zeigte sich eine wesentliche Besserung.

Nach etwas über 4 Wochen war der Ausheilungsprozeß vollendet. Während am rechten Hinterbein nahezu kein Eiter aufgetreten war, machte sich solcher hinten links bemerklich. Die eiternde Stelle wurde mit Kamillentee, dem etwas Lysol zugefetzt war, behandelt. Die Kuh kann jetzt wie jede andere benützt werden und springt, was der Eigentümer besonders freudig hervorhob, mit einem Satz auf, was sie vor der Operation nicht mehr getan hatte.

Die herausgeschnittenen wurstförmigen Wucherungen zeigten an ihrem Hautüberzuge nicht die leiseste Veränderung, die den Wucherungsprozeß hätte erklären können. Höchstens daß die Haut auf dem Durchschnitt etwas dicker als normal war. Die übrige Geschwulstmasse machte einen mehr speckigen Eindruck. Sonst ließ sich makroskopisch weiter nichts feststellen.

Innere Medizin und Chirurgie.

Meyer, P.: Beitrag zu den vergleichenden Untersuchungen des Gehirns von Rindern mit zentralen nervösen Störungen. (In.-Diss. Leipzig 1927.)

In neuerer Zeit haben jene Leiden unserer Haustiere, die auf Störungen des Nervensystems beruhen, eine erhöhte Beachtung gefunden, indem auch besonders die histologische Untersuchung der Gehirne zur Klärung dieser Leiden herangezogen wurde. Verf. bespricht die bei Tieren vorkommenden Gehirnleiden (u. a. Bornakrankheit, Tollwut, Hühnerpest, nervöse Staupe usw.) und die dabei gefundenen Einschlusskörperchen; er unterscheidet danach Ganglienzelleneinschlusskrankheiten und Ganglienzellkerneinschlusskrankheiten. Ernst und Hahn beschreiben einen selbst untersuchten Fall von Gehirnrückenmarksentzündung beim Rinde (Einschlusskörperchen bei den Impftieren). Beck und Meißner gelang der Nachweis von Ganglienzellkerneinschlüssen bei einer Gehirnrückenmarkskrankheit beim Schafe. — In den beiden von Meyer untersuchten Rindergehirnen war zu Lebzeiten die Diagnose akute Meningitis, vielleicht auf tuberkulöser Grundlage bzw. akute Cerebrospinalmeningitis gestellt worden. Die Zerlegung ergab weder Anhaltspunkte für Coenurosis noch für Gehirntuberkulose, noch für irgendwelche sekundären oder symptomatischen Entzündungen des Gehirns und seiner Häute. Das bösartige Katarrhalfieber kam schon auf Grund des klinischen Befundes nicht in Frage. Es wurden neben den nervösen Erscheinungen keine anderen krankhaften Veränderungen beobachtet. Die Ganglienzellen zeigten keine Schädigungen. In dem einen Falle wurde schon makroskopisch eine starke Füllung der Gefäße der Pia mater festgestellt, histologisch auch daselbe für das Gehirn nachgewiesen (akute Hyperämie als Zeichen der einsetzenden akuten

Meningitis). Im zweiten Falle wurde die Diagnose akute Cerebrospinalmeningitis durch die histologische Untersuchung bestätigt (Hyperämie, vaskuläre, perivaskuläre Infiltrate). In beiden Fällen erkrankte nur ein Rind. Weitere Untersuchungen müssen zur Klärung solcher und ähnlicher Krankheiten beim Rinde beitragen, zumal hier Anzeichen einer Gastroenteritis bzw. Futtervergiftung ebenfalls nicht festzustellen waren. Es kann demnach nur ein unbekanntes Agens sein, das jene Veränderungen bedingte; ob es dem Erreger der feuchten Gehirnmarksentzündung entspricht, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. (Impfversuche konnten wegen Formalinhärtung des eingefandten Materials nicht ausgeführt werden.) A.

Schmid, F. F.: Magenlastuntersuchungen bei gefundenen und kranken Hunden sowie nach Kohlebehandlung. (In.-Diss. Leipzig 1927.)

Von den Methoden, die zur Prüfung der Funktion des Magens dienen, hat die Feststellung der Sekretionsgröße die hervorragendste praktische Bedeutung. Um diese zu ermitteln, sind von einer Reihe von Autoren Probefrühstücke verschiedener Zusammensetzung angegeben, die nüchtern eingegeben, nach einer bestimmten Zeit wieder ausgehebert und einer chemischen Untersuchung auf das Vorhandensein von HCl unterworfen werden. Die letztere wird durch Titration mit $n/10$ NaOH ausgeführt. Als Indikatoren werden herkömmlich das Dimethylgelb und das Phenolphthalein verwendet. Der erste Indikator zeigt, sofern die Wasserstoffionenkonzentration größer ist als $\text{ph} = 3$, blaurote Farbe und schlägt bei dieser Zahl in lachsrot um. Durch die Zahl der $\text{ccm } n/10$ NaOH, die verbraucht werden, um diesen Umschlagpunkt zu erreichen, wird die sog. „freie HCl“ bezeichnet. Nach dem Vorschlage von Citron multipliziert man diese Zahl der Kubikzentimeter mit 10 und bezeichnet diese Maßzahl als „Säuregrad“. Verf. ver-

wandte das Probefrühstück nach D a s c h (200 Gramm einer 5prozentigen Aethylalkohollösung zusammen mit 0,05proz. Natr. salicyl.). Der Magen saft wurde durch Magenschlauch unter Verwendung eines Gefäßes, in dem mittels einer Wasserstrahlpumpe ein Vakuum erzeugt war, gewonnen. Die Versuche gliedern sich in drei Gruppen. Bei gefundenen Hunden wurde die Wirkung des Probefrühstückes nach D a s c h und A. P. F. festgestellt. Die Verabreichung von Kohle (carbo medic. Merck) übt auf die HCl-Sekretion einen verminderten Einfluß aus, wahrscheinlich durch Beeinflussung der Tätigkeit der Magendrüsen, nicht etwa durch Adsorption. Für normale Hunde wurde eine Normalkurve aufgestellt: nach 15 Minuten freie HCl 0,8, Ges. Acid. 1,2; nach 30 Minuten 1,05 bzw. 1,4; nach 50 Minuten 2,5 bzw. 3,1; nach 70 Minuten 3,45 bzw. 4,0; nach 90 Minuten 2,85 bzw. 3,3; nach 120 Minuten 1,3 bzw. 1,9. Zwei Fälle von Achylia gastrica zeigten ein HCl-Defizit. Bei vier Fällen mit gastritis acuta zeigten F. 3,5 und sechs freie HCl und verhältnismäßig wenig gebundene HCl. Bei der gastritis chronica wurde bei der ersten Untersuchung ein starkes HCl-Defizit festgestellt, das unter dem Einfluß des A. P. F. geringer wurde und die anfänglich starke Pufferung nahm allmählich ab. Drei Fälle von gastritis haemorrhagica (Stuttgarter Hundeseuche) zeigten stets ein HCl-Defizit und überaus starke Pufferung. In der Untersuchung des Magensaftes in der vom Verf. geschilderten Weise haben wir ein wichtiges, für die Behandlung der Magenkrankungen bedeutungsvolles Hilfsmittel, das mehr als bislang in der Praxis Anwendung finden sollte. A.

L i n d e: Wie weit reicht die Anästhesie bei der Kokain-Injektion in die Volarnerven. (T. R. 1928, S. 339.)

Durch die diagnostische Impfung mit einer Chemocain-Nephritinlösung in die Volarnerven am Fesselkopf konnte Verf. eine 2½stündige Anästhesie, die bis zur Mitte des Metakarpus reichte, erzielen. Diese Feststellung, daß auch die Teile, die sich etwa 10 cm oberhalb der Injektionsstelle befinden, ausgeschaltet werden, ist in diagnostischer und operativer Hinsicht von besonderer Bedeutung. Deshalb hält L. genaue Untersuchungen für wünschenswert, um festzustellen, ob diese Verhältnisse in allen Fällen zutreffen.

K. H. Meyer.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

B a s t a i, P.: Über die Frage der Banginfektion beim Menschen. Abortusinfektion beim Menschen oder Melitensisinfektion beim Rind? (Aus der medizinischen Universitätsklinik Turin.) (M. m. W. 1927, S. 2141—2142.)

Zur Entscheidung der vorliegenden Frage macht Verf. zunächst geltend, daß nach neueren Beobachtungen viele Einzelfälle und Epidemien von Maltafieber auf eine Infektion vom Rinde und Schafe her zurückzuführen seien. Abgesehen von den von B o v a n in Rhodesia gemachten diesbezüglichen Beobachtungen ist in Italien öfters festgestellt worden, daß die Melitensisinfektion häufig durch Berührung mit an Abortus erkrankten Kühen bzw. Schafen oder durch den Genuß von Milchspeisen entsteht. In der Umgebung von Turin infizierte beispielsweise eine von infektiösem Abortus befallene Schafherde, die wahrscheinlich von mit ihr ziehenden Ziegen angesteckt worden war, verschiedene Kuhherden, so daß sich auch bei diesen mehrere Abortusfälle zeigten. Das Maltafieber verbreitete sich aber auch auf die Bauern, die die Tiere hüteten und meist in den betreffenden Ställen schliefen. Ähnliche Vorkommnisse werden auch aus Toskana gemeldet. Verf. ist der Ansicht, daß es sich in diesen Fällen um Maltafieber beim Rinde gehandelt habe. Da es zur Zeit unmöglich ist, den Bac. Bang vom Bac. Bruce bakteriologisch zu unterscheiden, so kann die vorliegende Streitfrage nur auf dem Wege epidemiologischer Erwägungen

entschieden werden. Wichtig ist in dieser Beziehung zunächst die Tatsache, daß im Institut Pasteur in Tunis unter dem in der Abteilung für Maltafieber arbeitenden Personale zahlreiche Laboratoriumsinfektionen vorkamen, so daß die präventive Schutzimpfung obligatorisch eingeführt wurde. Dagegen hat man bis jetzt in tierärztlichen Untersuchungsanstalten, wo täglich Föten und Eihäute von Abortuskühen bakteriologisch verarbeitet werden, noch nie etwas von derartigen Übertragungen gehört. Ebenfalls wäre es zu begreifen, daß Tierärzte bei Impfungen der Tiere mit lebenden Bangbazillen nie angesteckt werden. Gegen die Pathogenität des B. Bang für den Menschen spricht nach Ansicht des Verf. weiter die Tatsache, daß in Gegenden, wo der infektiöse Abortus am meisten auftritt, das Maltafieber nicht vorhanden ist. Die in Deutschland von Steinerts, Kreuterts, Veilchenblau und Dietels beobachteten Übertragungen des Bang-Bazillus auf den Menschen betrachtet Verf. auf Grund der obigen Erwägungen als Maltafieberfälle und er nimmt zu ihrer Erklärung an, daß entweder eine direkte Einschleppung aus fremden Ländern durch Maltafieberkranke bzw. Bazillenträger oder durch importierte Sahne, Orangen usw. auf Tiere und Menschen stattgefunden habe. Wenn man andererseits die krankheitserregende Wirkung des Bazillus Bang gegenüber dem Menschen anerkennt, dann würde der letzte Stützpunkt, auf den sich bisher der Unterschied zwischen jenem Erreger und dem B. Bruce gegründet hat, zusammenbrechen.

Referent glaubte die vorstehenden Gedankengänge, die italienischen Verhältnissen ihren Ursprung verdanken, hier wiedergeben zu sollen, obwohl dieselben mit den gleichzeitig referierten neueren beiden Arbeiten von H a b s und K r i s t e n s e n im Widerspruch stehen. Carl.

H a b s, H.: Bact. abortus Bang als Erreger septischer Erkrankungen beim Menschen. (Zschr. für klin. Medizin 1928, Bd. 108, S. 445.)

Von Übertragungen des vorliegenden Bakteriums auf den Menschen sind in letzter Zeit fünf Fälle in Deutschland bekannt geworden. Es handelte sich dabei regelmäßig um Tierärzte, bei denen eine kutane Infektion gelegentlich des Ausräumens der Plazenta nach infektiösem Abortus angenommen wird. Die vom Verf. beschriebenen vier Fälle des Leidens unterscheiden sich von den seither bekannt gewordenen dadurch, daß die Aufnahme von Milch, die, soweit sie von abortuskranken Tieren stammt, sehr häufig den Erreger enthält, ätiologisch in Betracht kommt. Die Patienten (ein landwirtschaftlicher Verwalter, ein 13jähriges Mädchen, ein landwirtschaftlicher Arbeiter und ein Stahlrundscheifer) hatten nachweislich fortgesetzt rohe Milch, zum Teil in größeren Mengen zu sich genommen. In drei Fällen konnte festgestellt werden, daß in den betr. Milchviehbeständen der infektiöse Abortus herrschte. Der erste Fall wurde ursprünglich für Typhus gehalten, bis der negative bakteriologische und der abweichende klinische Befund die Vermutung einer Infektion mit einem Tierseuchenerreger, namentlich im Hinblick auf die Beschäftigung der Patienten nahe legten.

Das klinische Bild war sehr charakteristisch. Lang anhaltendes intermittierendes Fieber, kein typischer Schüttelfrost während des Temperaturanstiegs, geringe Erhöhung der Pulsfrequenz. Keine starke Störung des Allgemeinbefindens, bei gutem Appetit kaum Gewichtsabnahme. Völlig freies Sensorium, leichter Milztumor, sonst keine Organerscheinungen. Das Typische des ersten Falles machte die Erkennung der weiteren Fälle leicht. Eine Ähnlichkeit im Verlauf mit dem klassischen Maltafieber war unverkennbar. Sämtliche vier Patienten genasen. Bei dem einen gingen die Temperaturen spontan zurück, die übrigen scheint die Therapie mit Neosalvarsan und Salizyl bzw. Chinin in abkürzender Weise günstig beeinflusst zu haben.

Die Sicherung der Diagnose erfolgte hauptsächlich durch

die Agglutination. Das Blutserum der Patienten hatte gegenüber dem Bangschen Erreger einen Titer von mindestens 1:1000, in andern Fällen von 1:3000 sogar bis 1:10 000. Außerordentlich wichtig ist die zum ersten Male festgestellte Tatsache, daß im Falle 3 das Ergebnis der Agglutination durch den Kulturversuch bestätigt werden konnte. Verf. brachte das Blut des fiebernden Patienten behufs Anreicherung zuerst in Traubenzuckerbouillon und verarbeitete diese Kultur nach Bebrütung zu Agarplatten, die nach dem bekannten Verfahren (gleichzeitige Züchtung von Coli) in einem sauerstoffarmen Raume aufgestellt wurden. Nach einigen Tagen trat auf diese Weise deutliches Wachstum ein, und es gelang nach vielfacher Umzüchtung auch die Weiterübertragung in aeroben Kulturen. Der isolierte Menschenstamm (1142) erwies sich mit den von verschiedenen Instituten zur Verfügung gestellten Laboratoriumstämmen des Bact. abortus völlig identisch. Wichtig ist, daß derselbe Menschenstamm sowohl von den Seren der drei andern Kranken als auch von einem Testserum des Tierfeucheninstituts in Kiel bis zum Endtiter agglutiniert wurde. Agglutinationsversuche mit Melitensisserum ergaben, daß der Stamm 1142 serologisch dem untersuchten Abortusstamm näher stand als dem Melitensisstamm. Auf Grund dieser Ergebnisse mußte der aus dem Menschen gezüchtete Erreger als das Bact. abortus infectiosi Bang angesprochen werden.

Verf. bespricht des weiteren die Beziehungen des Bact. abortus Bang zum Erreger des Maltafiebers, dem Bact. melitense Bruce. Beide Bakterienarten sind weder morphologisch noch kulturell und serologisch noch durch den Tierversuch zu unterscheiden. Am verbreitetsten ist die Annahme, daß die Stellung der beiden Krankheitserreger zu einander sich noch am ehesten mit dem Verhalten der beiden Typen des Tuberkelbazillus vergleichen läßt. Für die Einreihung der beobachteten vier Fälle unter den Begriff „Bang-Infektion“ und nicht unter den „Maltafieber“ sprechen hauptsächlich epidemiologische Gründe. Echtes Maltafieber ist bis jetzt in Deutschland nur in Form von Laboratoriumsinfektionen ohne Weiterverbreitung beobachtet worden, außerdem sind unsere Ziegenbestände frei von diesem Krankheitskeim. Die in Deutschland beobachteten hierher gehörigen Krankheitsfälle müssen als durch das Bact. Bang verursacht angesehen werden. Es ist nicht ausgeschlossen, daß besonders auf dem Lande und bei Kindern häufiger derartige leichte Infektionen vorkommen, die infolge des gutartigen Verlaufs und der geringen Beschwerden nicht erkannt werden. Carl.

Kristensen, M.: Untersuchungen über die Rolle des Bangschen Abortbazillus als menschenpathogenen Mikroben. (Aus dem Statens Seruminstitut Kopenhagen.) (C. f. B. 1928, I. Abt., Orig., Bd. 108, S. 89—102.)

Die Ansichten über die Rolle, die der Abortusbazillus in der menschlichen Pathologie spielt, sind geteilt. Nach der einen Annahme sind Kühe, von denen aus Menschen angesteckt wurden, nicht mit dem apathogenen Bangschen Erreger, sondern mit dem nahe verwandten Bacillus melitensis Bruce infiziert. Andere Autoren, darunter auch Verf., stehen auf dem Standpunkte, daß der typische Abortuserreger gelegentlich im Stande ist, den Organismus des Menschen krankhaft zu beeinflussen. Dies gilt namentlich für solche Länder, wo das Maltafieber überhaupt nicht heimisch ist. In den Vereinigten Staaten und in Rhodesia wurden bis jetzt 20—30 derartige Fälle beobachtet, in Deutschland 5—6.

Verf. kam nun auf den Gedanken, die seinem Institute behufs Vornahme der Widal-Probe auf Typhus und Paratyphus eingesendeten Blutproben mittelst der Agglutination auch gegenüber dem Bacillus Bang zu prüfen. Bei Verwendung eines vom veterinärmedizinischen Serumlaboratorium überlassenen derartigen Stammes ergab es sich überraschenderweise, daß 89 Seren von den 1188 in Betracht kommenden Patienten positiv reagierten und zwar mit einem Titer

von 1:100 bis 1:1600. Die bei diesen Seren gleichzeitig angewandte Komplementbindung fiel regelmäßig positiv aus, wenn auch die Reaktion in einzelnen Fällen nur ganz schwach war. Wie sich später herausstellte, hängt dies damit zusammen, daß bei frischen Infektionen mehr die Agglutination, bei älteren mehr die Komplementbindung kräftigere Ausschläge gibt. Bei 20 im fieberhaften Stadium befindlichen Patienten wurden Kulturversuche mit Blut angestellt, wobei in 13 Fällen der typische Bacillus abortus Bang isoliert werden konnte. Aus vier Patienten gezüchtete Stämme wurden von Prof. O. Bang auf je zwei Meerfischweinchchen subkutan verimpft. Letztere reagierten darauf mit folgenden Veränderungen an den inneren Organen: starke Milzschwellung, in der Leber zerstreute kleine Nekrosen, Schwellung der Drüsen. Bei fünf vom Verf. geimpften Meerfischweinchchen ähnliche Erscheinungen. Der Erreger konnte aus sämtlichen Impftieren gezüchtet werden, und deren Blut reagierte bei der Agglutination positiv. Mit zwei aus Patientenblut gezüchteten Stämmen wurde sodann je eine 6 Monate trächtige Kuh intravenös infiziert. Beide Tiere verkalbten, und es war namentlich der zweite Versuch sehr beweisend: Im Plazentaexsudat typische Abortbazillenhäufchen, am Fötus starkes Ödem der Subkutis, Milz zerfließlich, Leber breiig, im Mageninhalt und in der Milz Abortusbazillen. Auf Grund der Gesamtuntersuchung kann als festgestellt angesehen werden, daß die aus den dreizehn Patienten gezüchteten Kulturen mit dem Bacillus abortus Bang identisch sind.

Verf. gibt sodann fünf Krankheitsberichte wieder und entwirft auf Grund des gesamten Beobachtungsmaterials folgendes klinische Bild: Die Infektion mit Abortus Bang verläuft beim Menschen unter den Erscheinungen des Febris undulans. Nach einigen Wochen oft etwas unregelmäßigen Fiebers folgt meist typischer Abfall, der jedoch bald wieder einer wellenförmig verlaufenden Temperatursteigerung Platz macht. Nach 2—4 Monaten ist die Temperatur wieder normal. Bei auffallend gutem Allgemeinbefinden oft starker Schweißausbruch. Puls verhältnismäßig langsam, Milzschwellung oft vorhanden, Roseolae aber nie. Initialerscheinung war manchmal eine katarrhalische Angina, als Begleiterscheinungen während des Verlaufs wurden beobachtet ein vesikulöser Ausbruch in der Mundhöhle, Bronchitis, Diarrhöe, Nasen- und Darmblutungen, Blutungen der Mundschleimhaut und der Nieren. Zwei von den 89 Fällen verliefen letal. Klinisch verhält sich die Infektion mit dem Bacillus Bang, namentlich auch in Bezug auf die vielen verschiedenen Variationen des Fiebertverlaufs ganz wie ein gutartiges Maltafieber. Irgend welche Beziehungen der Krankheit zum Abort der Frauen konnten nicht nachgewiesen werden. Als Hauptmittel der Behandlung gibt Verf. Bettruhe und leicht verdauliche, nahrhafte Kost an. Septrakrol, Omnadin und Milchinjektionen waren kaum wirksam. Maltafieberserum scheint mitunter wirksam zu sein. Durch Immunisierung eines Pferdes soll jetzt in Kopenhagen ein wirksames Serum hergestellt werden. Prophylaktische Maßnahmen sind hauptsächlich in Rinderbeständen, in denen der infektiöse Abortus herrscht, am Platze. Eine allgemeine Verbreitung des Leidens unter den Menschen ist deshalb sehr unwahrscheinlich, weil bei der jetzt allgemein üblichen Erhitzung der Milch auf etwa 60 Grad vor dem Verkaufe mit der Abtötung des Krankheitserregers gerechnet werden kann. Carl.

Olitsky, Peter K.: Summary of observations of the commission to study foot-and-mouth disease. (Zusammenfassung der von der Kommission für Maul- und Klauenseucheforschung angestellten Beobachtungen.) (Rockefeller inst. f. med. research, New-York.) (30. ann. meet. of the United States live stock sanit. assoc., Chicago, 1.—3. XII. 1926.) (Journ. of the Americ. veter. med. assoc. 1927, Bd. 70, Nr. 6, S. 926 bis 935.)

Die amerikanische Kommission, zu der Schoening,

Traum und Olitsky gehören, gibt eine vorläufige Übersicht über die von ihr angestellten Nachprüfungen und Forschungen auf dem Gebiete der Maul- und Klauenfeuche. Die Meerf Schweinchenexperimente deutscher Forscher, die Pluralitätslehre Vallées (Virusstämme A und O) werden bestätigt. Das Virus kann im Speichel von infizierten Kühen vor Ausbruch der Primäraphthe festgestellt werden. Nach dem Auftreten der ersten Blase hält die Infektiosität des Aphthenmaterials bei Kühen und Schweinen 4—7 Tage an. Der Harn von zwei infizierten Kühen wird als nicht infektiös befunden. Das Virus besitzt ferner bedeutende Tenazität, ist in 50 Prozent Glycerinlösung sehr lange haltbar, bei Zimmertemperatur 69 Tage, im Heu oder in Gartenerde 25—30 Tage, im Brutschrank 24—48 Stunden. Klauenfahmaterial, das von 22 Rindern und 1 Schwein stammte, war nur in einem Fall (Rind) virushaltig. Die von deutschen Forschern gefundene Dauer der Maul- und Klauenfeuchimmunität wird bestätigt. Aktive Immunisierung ohne sichtbare Blasenbildung ist nicht möglich. Hyperimmunisierung ist bei Meerf Schweinchen und Kaninchen durchzuführen, aber nicht beim Pferd und Rind. Ergebnislos verliefen Komplementablenkungsversuche wie auch die Erzielung intradermaler Testreaktionen. Eine sichere Differentialdiagnose bei Maul- und Klauenfeuche und Stomatitis vesicularis ist nur am Pferd als Versuchstier zu stellen. Bis zu einer Verdünnung von 1 : 10 000 000 bleibt die Infektiosität des Maul- und Klauenfeuche-Virus erhalten. — Durch vergleichende Filtrationsversuche wird die Größe des Virus mit 20—100 $\mu\mu$ berechnet, die elektrische Ladung ist positiv, der isoelektrische Punkt liegt bei $p_H = 8,0$. — Zentrifugationsversuche erzielten keine Ausschleuderung des Virus. Die verschiedensten Filterarten waren für das Virus durchlässig, nur Chamberland L_{11} absorbierte den Erreger, wenn die elektropositive Ladung des Virus nicht künstlich negativ gemacht war. Die porösesten Ultrafilter nach Bechhold lassen das Virus durch, während Kollodiummembranen es zurückhalten. Über Einwirkung von Desinfektionsmitteln auf das Virus wird mitgeteilt, daß Alkohol (60 Prozent), Aceton, Sublimat, Kresol erst nach 26 Stunden den Erreger abtöten, während z. B. Staphylokokken durch dieselben Mittel bereits nach 1 Minute vernichtet sind. In dieser kurzen Zeit wirkt auf das Virus sicher abtötend dagegen 1—2prozentige Natronlauge und 1 Prozent Antiformin. Auf halbstarren Gelatinenährböden (nach Loebl) wurde eine Viruskonservierung über 69 Tage, doch keine Vermehrung, erreicht. H.

Olitsky, Peter K.: Physical, chemical and biological studies on the virus of vesicular stomatitis of horses. Comparison with the virus of foot-and-mouth disease. (Physikalische, chemische und biologische Versuche mit dem Virus der Stomatitis vesicularis der Pferde. Vergleich mit dem Virus der Maul- und Klauenfeuche.) (Rockefeller inst. f. med. research, New-York.) (Journ. of exp. med. 1927, Bd. 45, Nr. 6, S. 969—981.)

Das Virus der Stomatitis vesicularis wurde auf Meerf Schweinchen bis zur 90. Passage übertragen. 50 Prozent der Versuchstiere generalisierten. Von 450 Meerf Schweinchen starben nur 1 Prozent vorzeitig. Die klinischen Merkmale der Stomatitis- und der Maul- und Klauenfeuchinfektion gleichen sich am Versuchstier vollständig. Dem Stomatitisvirus ist eine 18—48stündige Inkubation eigen. Die Virulenz des Blaseninhaltes ist 24 Stunden p. i. am höchsten. Durchfeuchte Meerf Schweinchen bleiben mindestens 4½ Monate immun. — Am Versuchskaninchen wurden klinische Unterschiede zwischen den beiden Virusinfektionen nicht bemerkt. Bei intrazerebraler Applikation beider Virusarten machten sich Einflüsse auf das zentrale Nervensystem — im Gegensatz zum Herpesvirus — nicht geltend. Nach Skarifikation der Kaninchenkornea und Infizierung mit Stomatitisvirus bildeten sich innerhalb 2—4 Tagen kleine Bläschen. Durch Zusammenfließen vergrößerten sie sich. Innerhalb

14 Tagen waren sie ohne Narbenbildung abgeheilt. Enzephalitis wurde bisher ebenfalls nicht beobachtet. Ein Übergreifen der durch Stomatitis vesicularis und Maul- und Klauenfeuche erzielten Immunität bei Infizierungen mit Herpesvirus kam nicht vor. Die histologischen Befunde über pathologische Veränderungen sowohl bei Stomatitis vesicularis wie bei Maul- und Klauenfeuche stimmen überein. — Die von Gins zuerst an Meerf Schweinchenzungen bei Maul- und Klauenfeuche gefundenen Einschlusskörperchen sind auch bei der Stomatitis vesicularis vom Verf. festgestellt und in bestimmte Verbindung mit der Erkrankung gebracht. — Chemisch und physikalisch weichen die beiden Virusarten nicht von einander ab. Bei einem Verdünnungsverhältnis von 1 : 10 000 000 ist die äußerste Grenze der Infektiosität erreicht. Wurde Virus zwei Stunden lang bei 3700 Umdrehungen pro Minute zentrifugiert, so war eine Ausschleuderung des Virus nicht zu erzielen. Die Filtrationsergebnisse laufen für beide Virusarten parallel. Berkefeld V- und Chamberland- L_3 und L_7 -Kerzen sind durchlässig. Berkefeld N-Kerzen halten das Virus gelegentlich zurück, Chamberland L_{11} -Filter nur dann, wenn die normale positive elektrische Ladung des Virus negativ geworden ist, so daß eine elektrische Bindung des Virus an den negativ geladenen Filter ausfällt. — Die normale $p_H = 7,5$ — $7,6$ ist für die beiden Erregerarten gleich. Geringe Abweichungen sind nachteilig. Desinfektionsmittel, wie 60proz. Alkohol, 1proz. Sublimat, 3 promill. Kresol und 1proz. Phenol wirkten sechs Stunden lang ohne Abtötungsergebnis auf die Erreger ein. Bei Anwendung 1—2 proz. Natronlauge genügte 1 Minute, um die Infektiosität zu beseitigen. Virulenz von Meerf Schweinchenaphthendecken blieb bei Aufbewahrung in Gartenerde bei 4—5 Grad C 31 Tage lang erhalten. Verf. kommt auf Grund gleicher Abtötungsergebnisse mit ultravioletten Strahlen zu der Ansicht, daß das Protoplasma des Stomatitisvirus und des Maul- und Klauenfeuche-Virus die gleiche chemische Struktur besitzt. Zur Differentialdiagnose im Tierversuch eignet sich das Pferd, da es an Stomatitis vesicularis leicht erkrankt, während es gegen Maul- und Klauenfeuche refraktär ist. H.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Höchstleistung einer ostpreussischen Edelschweinsau in Form des Ferkelgewichts.

Wie Dahlander-Königsberg in Nr. 28 der Deutschen Landw. Tierzucht d. Js. berichtet, hat die nicht besonders große, aber gut gebaute Sau „Illa“ Nr. 5642 des Rittergutsbesitzers Schümann-Reichau ihre 12 Ferkel nach vier Wochen lediglich mit der Muttermilch auf ein Gewicht von 133 kg (je Ferkel 11,08 kg) gebracht. Die bisherige vier Wochen-Höchstleistung verzeichnete die Sau „Römerin“ Nr. 4889, Züchter Zerrath-Jaeger-Tactau, mit 102,2 kg Ferkelgewicht. Der bezügliche Landesdurchschnitt soll nur 44—45 kg betragen. A. Hink.

Hornyasek: Beobachtungen über Retentio secundinarum im rechten und linken Uterushorn. (W. t. Mschr. 1928, Jahrg. XV., S. 354.)

Verf. stellte Untersuchungen über die Beteiligung der Hörner bei der abgelaufenen Gravidität beim Rinde an. Das Verhältnis, das sich ergab, war, daß die Nachgeburt nach Linkstrichtigkeit weitaus häufiger zurückbleibt als bei Rechtsstrichtigkeit. Für die Bestimmung, ob Links- oder Rechtsgravidität bestanden hatte, war das Größenverhältnis der beiden Uterushörner zueinander maßgebend. Am leichtesten ist die Frage zu entscheiden, wenn die Nachgeburt aus beiden Hörnern nacheinander herausgelöst wird und die Nachgeburtsteile miteinander verglichen werden können. Die Größe des gravid gewesenen Horns ist oft ganz auffallend dem Nichtgraviden gegenüber. Die sich bei den Untersuchungen ergebende Verhältniszahl der Links- zu den Rechtsgravidan betrug 17 : 22. Berge.

Poppe, K.: Der Wert der Schutzimpfung gegen den infektiösen Abortus (Bang-Infektion) des Rindes. (Aus dem Landestierseuchenamt zu Rostock. — Direktor: Prof. Dr. Poppe.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 1/3, S. 87.)

Poppe hebt am Schluß seiner Ausführungen zusammenfassend hervor, daß die Impfung in dem Problem der Bekämpfung des infektiösen Abortus des Rindes den Kernpunkt darstellt. Wenn die Frage — auf der einen Seite hygienische Maßnahmen, auf der anderen Seite die Impfung — auch noch nicht endgültig entschieden ist, so wird in Deutschland und in Ländern mit ähnlichen wirtschaftlichen Verhältnissen die ausschließliche Durchführung von hygienischen Maßnahmen nur unter ganz besonderen Umständen möglich sein. Soweit es sich bis jetzt übersehen läßt, ist für die Bekämpfung des infektiösen Abortus des Rindes in Deutschland die Impfung in Verbindung mit hygienischen Maßnahmen das brauchbarste Verfahren. Nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte ist die Verwendung lebender Abortusbazillen die Methode der Wahl. Die Gefahr der Verbreitung des Abortus ist dabei als gering anzusehen. Die Impfung soll in der Regel bei nichttragenden Rindern vor der Begattung vorgenommen werden; auf die Impfung der Färsen ist besonderer Wert zu legen. Impfung mit lebender Kultur in den ersten Trächtigkeitsmonaten ist unbedenklich, größere zahlenmäßig belegte Ergebnisse liegen über diese Art der Impfung aber noch nicht vor. Um die Gewähr zu haben, daß eine gewisse Immunität eingetreten ist, sollen die mit lebender Kultur geimpften Rinder nicht vor Ablauf von sechs Wochen nach der letzten Impfung gedeckt werden. Die Impfung mit abgetöteter Kultur hat geringere Aussicht auf Erfolg, ist aber für die Impfung der tragenden Tiere vorläufig nicht zu entbehren. Über den Wert der kombinierten Methode (bei tragenden Tieren zunächst abgetötete, dann lebende Kultur), die eine Abkürzung und Vereinfachung der Impfung darstellt, müssen weitere Erfahrungen abgewartet werden. Eine zwingende Notwendigkeit für den Erfolg ist, daß die Impfungen in Abortusbeständen über zwei Trächtigkeitsperioden (zwei Jahre) fortgesetzt werden, so daß jedes Tier wenigstens einmal der zweimaligen Impfung mit lebender Kultur unterzogen wird. Die Voraussetzung für die Impfung gegen den infektiösen Abortus des Rindes ist erfüllt, wenn durch Blutuntersuchung oder durch bakteriologische Untersuchung festgestellt ist, daß eine Banginfektion in Frage kommt. Bei mehr als 10 Prozent bei der Blutuntersuchung reagierenden Tieren ist die Anwendung der lebenden Kultur gerechtfertigt. Bei einer geringgradigeren Infektion (unter 10 Prozent reagierende Tiere) kann der Versuch gemacht werden, die Infektion durch Ausmerzen der reagierenden Tiere und wiederholte Stalldesinfektion zum Stillstand zu bringen. Bei einer planmäßigen Durchführung der Impfung können die hygienischen Maßnahmen auf die Einrichtung eines Verkalbestalles beschränkt werden. In diesen Abfonderungsstall sind alle Rinder zu überführen, bei denen sich Anzeichen des Verkalbens bemerkbar machen. Solche Rinder, die abortiert haben, sind nicht vor Ablauf von sechs Wochen nach dem Verkalben und erst nach Beseitigung jeglichen Ausflusses in den Zuchtbestand zurückzubringen. Die laufende Desinfektion des Zuchtstalles und des Verkalbestalles ist notwendig. Die Durchführung der Impfung und der Bekämpfung des infektiösen Abortus des Rindes stellt an den Tierarzt und an die Institute, die die Leitung der Bekämpfung übernommen haben, ganz besondere Anforderungen. Ohne genaue Kontrolle der Bestände mit Listenführung ist ein Erfolg der Impfung in Frage gestellt. Ziegler.

Abelein: Frühdiagnose der Gravidität beim Rind. (M. t. W. 1928, S. 4.)

Mittels eines besonderen Griffes, vom Verf. Auschnell-

griff genannt, soll eine sichere Frühdiagnose der Trächtigkeit möglich sein. Bezüglich der Einzelheiten muß auf die Originalarbeit verwiesen werden. Schoop.

Außerordentliche Milchleistung einer Kuh.

Nach einer Mitteilung in Nr. 25 der Deutschen Landw. Tierzucht d. Js. gab die Kuh Leni 4525 des Domänenpächters Refardt in Hienhagen (Hann.), die am 22. April d. Js. gekalbt hatte, am 14. Mai d. Js. 63,9 kg Milch mit 3,1 Prozent Fett und am 15. Mai 63,9 kg Milch mit 3,2 Prozent Fett. In der gesamten Laktationszeit vom 9. März 1927 bis 9. März 1928 berechnete sich die Milchleistung dieser Kuh auf 12 387 kg mit 2,99 Prozent = 361,4 kg Fett. Die sehr gesunde Kuh wiegt z. Zt. 12,5 Zentner und nimmt neben bestem Weidefutter täglich noch 15 kg Sauerfutter und 14 kg Kraftfutter zu sich. A. Hink.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Sartorius, Fr.: Neue Farbstoffnährböden zur Elektivzucht von Typhus- und Paratyphusbazillen. (Aus dem Hygienischen Institut der Westf. Wilhelms-Universität Münster i. W. — Direktor: Prof. Dr. K. W. Jöten.) (Zschr. für Hygiene 1928, 108, H. 4, S. 637.)

Experimentelle Versuche des Verf. mit den verschiedensten Grünfarbstoffen (Malachitgrün und Brillantgrünmarken) zeigten, daß diese Farbstoffe für die Typhuselektivzucht als ziemlich ungeeignet, für die Paratyphuselektivzucht als unzulänglich angesehen werden müssen. Bei einigermaßen völliger Unterdrückung verschiedener Colistämme wird ein gewisser Prozentsatz von Paratyphustämmen ebenfalls mit unterdrückt. Die Farbstoffe der Grünreihe bedingen große individuelle Resistenzschwankungen unter den Paratyphustämmen. Die Bedingung, daß ein großer und reinlicher Resistenzabstand zwischen den zu unterdrückenden und elektiv zu züchtenden Keimarten vorhanden sein soll, wird von einigen anderen Farbstoffen, wie z. B. Türkisblau, Dahlia, Resorcin-schwarz, Acridinrot, Trypaflavin, Methylengelb H besser erfüllt. Außerdem sind die vier ersten dieser Farbstoffe im Gegensatz zu den Grünfarbstoffen auch für die schnelle Typhuselektivzucht und Anreicherung geeignet. Es scheint daher angebracht, diese vier Farbstoffe allein oder kombiniert in die Praxis der Typhus- und Paratyphusdiagnostik einzuführen. Verf. hat ein einheitliches einfaches Verfahren ausgearbeitet und angegeben, in welcher Konzentration und mit welchen Hilfsmitteln diese Farbstoffe in der Praxis angewandt werden sollen. Ziegler.

Nahrungsmittelhygiene.

Böhm, Jos.: Projektion auf Schlachthöfen. (Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene, 38. Jahrg., S. 353/54.)

Seit dem Jahre 1910 wird im Trichinenschauamt Nürnberg das Trichinoskop zur Untersuchung verwendet. Auf Grund der nun fast 20jährigen Erfahrungen ist das ursprüngliche Trichinoskop verbessert worden und wird als neues Modell Dr. Böhm 1928 vom technischen Institut des Ingenieurs A. Muth, Wodanstraße 47 in Nürnberg hergestellt. Es arbeitet mit 10 Ampère und 60 Volt Spannung Gleichstrom; ein Kohlenpaar hält 8 Stunden, die Vergrößerung ist eine 70fache, das Projektionsfeld besitzt 1,10 m Durchmesser. Die Lampe ist so konstruiert, daß sie durch Umwechslung der optischen Teile mit wenigen Handgriffen in eine Projektionslampe für Diapositive umgewandelt werden kann. Apparate mit Glühlampenlicht hält Böhm wegen ihrer geringeren Helligkeit und Kontrastwirkung für größere Betriebe nicht für empfehlenswert. Für kleinere Schlachthöfe, an denen die tägliche Untersuchung nicht zu sehr drängt, eignen sich insbesondere Leitz-Trichinoskope. Bei Wechsel-

strombenutzung stört das summende Geräusch des Lichtbogens und die strahlende Hitze, wenn der Beschauer unmittelbar neben die Lampe oder in deren Nähe zu sitzen kommt. Edelmann.

Dack, G. M. and Willard, L. W.: **Serum therapy of botulism in monkeys.** (Journal of infect. diseases 1928, Bd. 42, S. 209.)

Bei Affen wurde durch Verfüttern von Botulinustoxin Botulismus erzeugt. Intravenöse Gaben von Antiserum nach Auftreten der ersten Krankheitsercheinungen konnten den tödlichen Ausgang nicht verhindern. Schoop.

Zeller, H., W. Wedemann, L. Lange und E. Gildemeister: **Über die sog. Dauerpasteurisierung der Milch mit besonderer Berücksichtigung der Abtötung von Seuchenerregern.** (Sonderheft der Zschr. f. Fleisch- und Milchhygiene, Jahrg. XXXVIII.) (Mit 5 Abb.)

In der Zweigstätte Dahlem des Reichsgesundheitsamtes ist von den genannten Verff. eine für die Milchhygiene und die Seuchentilgung außerordentlich wichtige und auch sonst wissenschaftlich und technisch bedeutungsvolle Arbeit geleistet worden, die auf 72 Seiten der Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene folgende Kapitel behandelt: I. Einleitung mit Literaturübersicht. — II. Pasteurisierungsapparate. — III. Chemische, physikalische und biologische Veränderungen der Milch bei der Pasteurisierung. — IV. Einwirkung der Dauerpasteurisierung auf in der Milch enthaltene Seuchenerreger (Maul- und Klauenseuche, Bac. Abortus Bang, Bact. Coli, Bakterien der Paratyphusgruppe, Typhusbazillen, Mastitis-Streptokokken, Tuberkelbazillen). — V. Allgemeine Zusammenfassung. — VI. Beurteilung und Vorschläge. In den letzten beiden Kapiteln wird von den Verff. folgendes hervorgehoben:

Unter an zwei Dauerpasteurisierungsapparaten (Vierzellen-Dauererhitzer der Firmen Ahlborn-Hildesheim und Bergedorfer Eisenwerke) ausgeführten Untersuchungen haben bei halbstündiger Erhitzung auf 60 bis 63 Grad C folgende Ergebnisse geliefert:

I. Einfluß der Dauerpasteurisierung auf das chemische, physikalische und biologische Verhalten der Milch.

Die Dauerpasteurisierung bewirkt in der Milch folgende Veränderungen:

Der Säuregrad wird erniedrigt; die Säuerung wird infolge der weitgehenden Vernichtung der Milchsäurebildner verzögert; sie ist nicht immer ganz normal. Die Gärprobe bei 37 Grad C, d. h. die Gerinnung der Milch tritt verzögert ein. Die Haltbarkeit ist um mindestens 24 Stunden verlängert. Die Aufrahmung wird beschleunigt; der Rahm ist fettreicher als derjenige der Rohmilch. Das Albumin bzw. Globulin gerinnt teilweise. Das Kasein wird verändert, was an einer verzögerten und weniger festen Gerinnung der Milch nach Labzufatz erkennbar ist. Von den Fermenten bleibt die Peroxydase unbeeinflusst. Die Katalase wird geschwächt. Die Schardinger'sche Reaktion tritt verzögert auf. Die Diastase wird vernichtet.

Der Geschmack dauerpasteurisierter Milch wurde als vortüglich befunden.

Eine hinreichend einfache Methode zum Nachweis von dauerpasteurisierter Milch konnte nicht gefunden werden. Die von Hock angegebenen, hier nicht nachgeprüften Methoden zum Nachweis unter 70 Grad C erhitzter Milch dürften wegen ihrer nicht ganz einfachen Ausführbarkeit für die Praxis kaum in Frage kommen.

II. Einfluß der Dauerpasteurisierung auf die in der Milch enthaltenen Krankheitserreger.

Durch die Dauerpasteurisierung erfolgte

1. eine sichere Abtötung für
 - a) das Virus der Maul- und Klauenseuche,
 - b) den Bac. Abortus Bang (seuchenhafte Verkälbung),
 - c) das Bact. Coli (Kälberruhr),

d) tierische und menschliche Stämme aus der Paratyphusgruppe (von den verschiedensten Infektionen herrührend),

e) Typhusbazillen;

2. eine starke Minderung der Zahl, aber keine restlose Abtötung der Mastitis-Streptokokken;
3. eine Abtötung der Tuberkelbazillen zum weitaus größten Teil trotz sehr schwerer Versuchsbedingungen.

III. Beurteilung und Vorschläge.

Daß die Milch durch die Dauerpasteurisierung gewisse Veränderungen erleidet, die sie von der Rohmilch unterscheiden, ist verständlich. Diese Veränderungen sind aber verhältnismäßig gering gegenüber denjenigen, die bei der Hochpasteurisierung der Milch auftreten.

Was die chemischen, physikalischen und biologischen Veränderungen der Milch betrifft, so hat die Dauerpasteurisierung gegenüber der Hochpasteurisierung unbestreitbare Vorzüge, auf die bereits in der Einleitung hingewiesen wurde und die sich auch bei unseren Untersuchungen herausgestellt haben.

Faßt man die Einwirkung der Dauerpasteurisierung auf Krankheitserreger ins Auge, so ist gegenüber der Mehrzahl der geprüften Arten von pathogenen Keimen und gegenüber dem Virus der Maul- und Klauenseuche ein durchaus befriedigendes Ergebnis festzustellen. Hinsichtlich der beiden Arten von Krankheitserregern, bei denen keine volle Abtötung erzielt wurde (Mastitis-Streptokokken) oder bei denen sich vereinzelt Ausnahmen in der Wirkung gezeigt haben (Tuberkelbazillen), kann kein Nachteil der Dauerpasteurisierung gegenüber der Hochpasteurisierung festgestellt werden, da aus dem Schrifttum sowohl wie aus neueren Untersuchungen bekannt ist, daß Mastitis-Streptokokken wie Tuberkelbazillen durch die Hochpasteurisierung nicht regelmäßig und ausnahmslos abgetötet werden.

Wir fassen demnach unser Gesamturteil dahin zusammen, daß der Dauerpasteurisierung gegenüber der Hochpasteurisierung wohl eine Reihe von Vorteilen, aber keine Nachteile zuzuschreiben sind.

Wenn die Dauerpasteurisierung als ausreichendes Erhitzungsverfahren im Sinne der §§ 27 und 28 der Ausführungsvorschriften zum Reichsviehseuchengesetz anerkannt und zugelassen werden soll, muß allerdings eine Reihe von Vorbedingungen erfüllt sein, deren wichtigste noch kurz angedeutet seien.

1. Da für die Sicherheit der keimtötenden Wirkung des Dauerpasteurisierungsverfahrens eine sorgfältige Konstruktion der Pasteurisierungsapparate die erste Voraussetzung ist, und da wir wissen, daß verschiedene sog. Dauerpasteurisierungsapparate technische Fehler in ihrem Bau aufweisen, werden von Fall zu Fall nur solche Apparate zugelassen werden können, deren System zuvor von einer verantwortlichen Stelle in eingehendster Weise auf ihre Leistungsfähigkeit geprüft worden ist.

Apparate, die nach dem Durchflußsystem arbeiten, sind auf Grund der an mehreren Stellen unserer Arbeit erwähnten Überlegungen sowie auf Grund von Untersuchungen, die an anderen Orten ausgeführt worden sind, abzulehnen.

2. Die für eine behördliche Zulassung in Frage kommenden Apparate müssen mit selbsttätigen Aufschreibevorrichtungen für Temperatur, Zeitdauer und Milchmenge versehen sein, deren Diagramme sowohl dem Bedienungspersonal Störungen im Verlauf der Dauerpasteurisierung anzeigen, als auch für spätere Kontrollen (f. u.) als Urkunde dienen.

Sollte die Aufschreibung bei einem Pasteurisierungsgang Störungen in der Wärmeeinwirkung erkennen lassen, so

muß die betreffende Milch ein zweites Mal durch den Apparat geschickt werden.

Selbstverständlich muß das Bedienungspersonal für seine Aufgabe sorgfältig vorgebildet und gut eingearbeitet sein. Ob zur Bedienung von Dauerpasteurierungsapparaten ähnlich wie bei bestimmten Desinfektionsapparaten etwa nur geprüftes Personal zugelassen werden soll, würde zu erwägen sein.

3. Wie dies bei jedem Desinfektionsapparat erwünscht ist, müßte bei den Dauerpasteurierungsapparaten eine fortlaufende Kontrolle durchgeführt werden. Sie wäre ungefähr in folgender Weise einzurichten: Der beamtete Tierarzt hätte sich durch regelmäßige, etwa alle 3 Monate auszuführende und dazwischenhinein auch unvermutet erfolgende Besuche in der Molkerei von der technisch einwandfreien Durchführung der Dauerpasteurisierung zu überzeugen. Die von jedem Pasteurisierungsvorgang sorgfältig aufgehobenen und zeitlich geordneten selbsttätigen Aufzeichnungen (Diagramme) wären ihm vorzulegen; durch Befragen des Personals hätte er festzustellen, ob bei diesem das nötige Verständnis für die Bedienung des Apparates vorhanden ist.

Zwei- bis dreimal jährlich wären durch den beamteten Tierarzt Proben von pasteurisierter Milch in vorher sterilisierte Gefäße zu entnehmen und an das zuständige bakteriologische Untersuchungsinstitut einzufenden. Dort wären diese Proben auf Keimgehalt und Keimarten zu untersuchen und auf Meerschweinchen zu verimpfen. Diese würden, soweit sie nicht vorher spontan gestorben sind, frühestens nach 2—3 Monaten zu töten und zu untersuchen sein.

Die für die Dauerpasteurisierung vorgeschlagenen Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen haben auch gegenüber der Hochpasteurisierung volle Berechtigung, denn auch bei Hochpasteurierungsapparaten können durch technische Mängel (starke Schaumbildung, unzureichende Erwärmung und dergl.) Gefahrenquellen entstehen.

Wenn die von uns vorgeschlagenen Sicherheitsmaßnahmen zur Durchführung gelangen, können die Vorteile der Dauerpasteurisierung nutzbar gemacht werden, ohne daß gesundheitsschädliche Gefährdung für Mensch und Tier zu befürchten sind.

Ein Literaturverzeichnis von 165 Nummern vervollständigt die ausgezeichnete Arbeit, deren Einzelheiten für jedermann von Wichtigkeit sind, der in der Milchhygiene, bei der Verforgung mit Milch und bei der Überwachung des Milchverkehrs mitzuwirken hat.

Edelmann.

Geflügelkrankheiten.

Haupt, H.: *Bact. gallinarum* Klein und *Gallinarum-bazillose*. Ein Beitrag zur Benennung von Bakterien und Infektionskrankheiten. (Aus d. Vet.-Hygien. Institut der Universität Leipzig.) (B. t. W. 1928, S. 437—439.)

Auf Grund eingehender Literaturstudien gelangt Verf. zu nachstehenden diesbezüglichen Schlußfolgerungen:

1. Nach den Regeln der botanischen Namensgebung haben alle nach Klein (1889) dem Erreger des sog. Hühnertyphus gegebenen Benennungen, soweit sie den Artnamen betreffen, keine Berechtigung; die einzig berechtigte Artbezeichnung ist „*gallinarum*“.

2. Da das *Bact. pullorum* Rettger mit dem *Bact. gallinarum* identisch ist und nur eine labile Variante des *Bact. gallinarum* darstellt, weicht die Artbezeichnung *pullorum* Rettger der älteren *gallinarum* Klein.

3. Da seit 1889 die Gattungsnamen „Bazillus“ und „Bakterium“ fester definiert sind, empfiehlt es sich, anstelle des von Klein gegebenen Gattungsnamens „Bazillus“ den Gattungsnamen „Bakterium“ zu setzen. Als vollständige Bezeichnung des Erregers des sog. Hühnertyphus ist *Bact. gallinarum* (Klein 1889), em. Moore 1895, em. Rett-

ger 1909, em. Pfeiler und Rehse 1913), Klimmer und Haupt 1927 oder abgekürzt „*Bact. gallinarum* Klein 1889“ zu empfehlen.

4. Die durch das *Bact. gallinarum* Klein verursachte Infektionskrankheit ist als *Gallinarumbazillose* zu benennen; die Bezeichnung Hühnertyphus und weiße bazilläre Ruhr der Küken ist klinisch und anatomisch zu eng gefaßt und ätiologisch nebeneinander unberechtigt.

Carl.

Ruth Eber: Ein Beitrag zur Empfänglichkeit der Hühner und Tauben für Säugetiertuberkelbazillen. (Aus dem Tierseucheninstitut der Universität Leipzig. — Direktor: Professor Dr. A. Eber.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 1/3, S. 59.)

Ruth Eber berichtet in vorliegender Mitteilung über ihre Versuche, Hühner und Tauben mit Reinkulturen von Säugetiertuberkelbazillen (Typus humanus, Typus bovinus) und (in 3 Fällen auch) mit Typus gallinaceus zu infizieren. Für die Infektionsversuche standen insgesamt 30 Hühner und 20 Tauben im Alter von etwa 1—2 Jahren zur Verfügung. Die Hühner wurden vor dem Beginn der Versuche zweimal im Abstand von 14 Tagen einer intrakutanen Tuberkulin-Kehllappenprobe unterworfen und nur die völlig negativ reagierenden Tiere für die Übertragungsversuche ausgewählt. Die Tauben wurden aus gefunden Beständen ausgewählt, da die Gefahr, daß Tauben tuberkulös sind, im allgemeinen nicht groß ist. Aus den Infektionsversuchen mit Säugetiertuberkelbazillen geht nun hervor, daß Hühner und Tauben eine große Widerstandsfähigkeit gegenüber den Säugetiertuberkelbazillen zeigen. Zu einer generalisierten Tuberkulose kam es weder bei Hühnern noch bei Tauben. Die tuberkulösen Prozesse blieben auf einzelne Organe oder auf die Impfstelle beschränkt. Tuberkelbazillen, die der zur Infektion verwendeten Ausgangskultur (einmal Typus humanus, dreimal Typus bovinus) glichen, wurden einmal bei einem per os infizierten Huhn aus kleinen käsigen Herden im Schlund, dreimal jeweils aus der Milz einer per os, aus der Impfstelle einer subkutan und aus einem tuberkulösen Herde in der Lunge einer intracheal infizierten Taube gezüchtet. Bei zwei gefütterten Hühnern, die geringe tuberkulöse Veränderungen in der Milz, bezw. Lunge aufwiesen, sowie bei einer subkutan infizierten Taube mit käsigem Herd an der Impfstelle konnten in den veränderten Stellen mikroskopisch Tuberkelbazillen nachgewiesen werden. Die Züchtung und Meerschweinchenimpfung fielen jedoch negativ aus. Dagegen haben die Versuche wiederum gezeigt, daß Hühner und Tauben für Geflügeltuberkelbazillen sehr empfänglich sind. Alle mit Geflügeltuberkelbazillen infizierten Hühner und Tauben starben an generalisierter Tuberkulose. Erkrankten auch andere Hühner und Tauben an Geflügeltuberkulose, die in demselben Stall wie die mit Geflügeltuberkelbazillen infizierten Tiere untergebracht waren.

Ziegler.

Picard, W. K.: Pseudo-Fowlpest. (Pseudohühnerpest.) (Vet. Bulletin Nr. 65. Department de Agriculture, Industry and Cornwall in the Dutch East-Indias.)

Verf. beschreibt eine Seuche bei Hühnern, die der Geflügelpest äußerst ähnlich war, jedoch auf Grund des klinischen Verlaufs sowie auch der angestellten künstlichen Infektionsversuche von ihm als Pseudo-Fowlpest bezeichnet wurde. Es werden drei verschiedene Krankheitsstadien unterschieden: 1. Traurigkeit, Schwellung des Kopfes und Halses, 2. Bewegungsstörungen, 3. totale Lähmung mit anschließendem Exitus letalis. Die Mortalität betrug 90 bis 100 Prozent. Außer den bereits genannten klinischen Symptomen wurden noch dunkelblauer Kamm, starke Schleimabsonderung, Atembeschwerden, offener Schnabel sowie auch Diarrhöe beobachtet. Die pathologisch-anatomischen Veränderungen bei der Zerlegung entsprachen vollständig denen bei Geflügelpest. Die bakteriologische Untersuchung ergab,

daß es sich um ein filtrierbares Virus handelte, welches sich hauptsächlich im Rachen Schleim und den Fäzes vorfand. Mit beiden konnte eine künstliche Infektion bei gefundenen Hühnern (subkutan, intravenös) hervorgerufen werden. Am leichtesten gelang die Kontaktinfektion. Das Virus fand sich ferner im Gehirn und Eidotterflüssigkeit lebender Hennen, nicht dagegen im Blut kranker Tiere. Enten, Gänse und Tauben ließen sich ebenfalls infizieren, erkrankten aber in geringerem Grade als Hühner. Hühner, die eine künstliche oder natürliche Infektion überstanden hatten, erwiesen sich bis zu 190 Tagen immun; jedoch waren sie empfänglich gegenüber einem aus Holland stammenden Geflügelpestvirus. Die Krankheitsdauer betrug 3—10 Tage, die Inkubationszeit 3—6 Tage. Verf. stellte Vergleichsversuche mit einem holländischen Geflügelpestvirus an. Seine Versuche veranlaßten ihn, die Seuche von der Geflügelpest zu unterscheiden und als Pseudofowlpest zu bezeichnen auf Grund folgender Versuchsergebnisse: Längere Inkubationszeit, längere Krankheitsdauer und Nichtinfektiosität des Blutes. Berge.

Helm: Das Vorkommen von Geflügeltuberkulose beim Schwein. Zugleich ein Beitrag zur Züchtung der Tuberkelbazillen nach der Methode von Hohn. (Aus der Vet.-Abteilung des Reichsgesundheitsamtes.) (Arch. f. wiss. Tierheilkunde 1928, 57, S. 230.)

Verf. untersuchte 117 tuberkulös veränderte Organe von Schweinen. Durch bakterioskopische Prüfung war es nicht möglich, zu ermitteln, ob die tuberkulösen Veränderungen durch den Typ. bovinus oder gallinaceus verursacht waren. Dagegen gelang die Differenzierung sicher durch den Tierversuch an Hühnern, Ratten und Meerschweinchen. In 38,9 Prozent wurde so Typ. gallinaceus nachgewiesen. Das Kulturverfahren nach Hohn erwies sich als sehr wertvolle Bereicherung der Kulturmethode, indem es in fast 90 Prozent gelang, aus verunreinigtem Material Tb.-Bakterien rein zu züchten. Durch den Hruska'schen Versuch gelang die Differenzierung nicht. Ebenfalls erwies sich eine Unterscheidung durch histologische Untersuchung als möglich. Geiger.

Standesangelegenheiten.

Fortbildungskursus des Deutschen Veterinärrats.*)

Der in Verbindung mit der Vet.-med. Fakultät der Universität Leipzig vom 19. bis 21. Oktober abgehaltene Fortbildungskursus für praktische Tierärzte war von 98 Tierärzten aus allen Teilen Deutschlands und dem Auslande besucht.

Niederschrift über die Dienstverfammlungen der Leiter der Bakteriologischen Institute in Breslau.

In D. T. W. 1928, Nr. 42, S. 715 rechte Spalte muß es in dem Abtatz: Ruth Eber heißen: Im Tierseucheninstitut Leipzig konnte auch bei Putenküken eine Infektion mit dem Bacterium pullorum nachgewiesen werden.

Verschiedene Mitteilungen.

Theodor Kitt 70 Jahre alt!

Ein Glückwunsch von Prof. Dr. Wilhelm Ernst-München.

Unser allverehrter Lehrer der pathologischen Anatomie, Bakteriologie und Seuchenlehre, Herr Geheimer Veterinärarzt Dr. Theodor Kitt vollendet am 2. November sein 70. Lebensjahr. Friedberger und Hahn, Bonnet, Frank, Bollinger und Feser waren seine Lehrer, seine Vorbilder. Nach der Approbation im Jahre 1879 wirkte Kitt als praktischer Tierarzt in Seefeld in Oberbayern. Seinem Schaffensdrang konnte die Praxis nicht genügen und schon am 1. August 1880 trat er daher als Assistent für pathologische Anatomie bei Bollinger ein. Am 1. April 1881 bis Oktober 1884 war er als Pro-

sektor am tieranatomischen Institut unter Frank tätig. Der 1. November 1884 sah Kitt bereits als Dozenten, der 22. August 1886 als Professor für allgemeine Pathologie, pathologische Anatomie, Seuchenlehre und Geschichte der Tierheilkunde. Es war dies die Zeit, in der die ätiologische Erforschung der Seuchen durch Pasteur und Koch zu nie vorher geahntem Aufschwung geführt wurde. 10 Jahre vorher war Kochs erste Abhandlung über Milzbrand erschienen, die neue Färbetechnik mit Anilinfarben am getrockneten und fixierten Präparat war gerade erfunden, die Züchtung des Tuberkelbazillus und die Ansteckung von Kleintieren durch Kulturen waren geglückt. Das war der Boden, den Kitt als Bakteriologe vorfand. Und er baute auf. Das kleine und unscheinbare Institut, dazu eine Seuchenversuchsstation in Lenggries für die Erforschung der Milzbrandformen, zu denen vor Fesers, Bollingers und Kitts Arbeiten ab 1876 auch Raufchbrand und sonstige Gasödeme der Tiere gezählt wurden, bargen vorerst die Hilfsmittel. Die Seuchenversuchsstation wurde später nach München überführt und mit dem Institut für pathologische Anatomie unter Kitts Leitung vereinigt. Die Mittel des Instituts waren dürftig, aber es war der bewußte Wille da zum Ziel. Und der hob das Institut, dessen Leistungen in aller Welt anerkannt wurden. Die Arbeiten Kitts sind bekannt. Seine Lehrbücher über Bakterienkunde und pathologische Mikroskopie, sein Lehrbuch der pathologischen Anatomie, der allgemeinen Pathologie waren Jahrzehnte hindurch die einzigen und in der ganzen wissenschaftlichen Welt anerkannten, grundlegenden Lehrbücher ihrer Art. Kitts Spezialarbeiten umfassen die pathologische Anatomie, Histologie, Ätiologie und Genese sowie Prophylaxe fast aller Tierseuchen. Unser Jubilar ist nicht nur Wissenschaftler, nicht nur Fachspezialist. Er liebt die schönen Künste, malt nicht nur Bazillen und ähnliches, sondern auch wundervoll leuchtende Landschaften mit feiner Technik, er liebt Musik, übt sie aus, liebt klassische und heitere Kunst in Theater und Literatur. Ein Genie hat ihn in der Wiege segnet. Ehren sind ihm manche geworden: Er ist außerordentliches Mitglied des bayerischen Obermedizinalausschusses seit 1901, Ehrendoktor der medizinischen Fakultät München (1897), Ehrendoktor der tierärztlichen Hochschule Berlin (1912), Honorarprofessor der Technischen Hochschule München (1914), Geheimer Veterinärarzt seit 1925. Wo so viel Licht, da sind auch Schatten, sonst wäre das nicht natürlich, nicht so wirkungsvoll. Kitt hat nicht nur Freunde, dazu ist er zu „virulent“, er hat sich manchen Neider und Widersacher erworben. Seine Schüler aber, zu denen auch ich zähle, die in ihm den Lehrer, den Meister seines Faches bewundern, die sehen nur das lichte Bild seiner großen Persönlichkeit, der wir dankerfüllt für Alles, was er den Tierärzten gegeben hat, unsere Glückwünsche darbringen.

Zum Geleit.

Dem Wunsche meines Freundes Mießner, ein Geleitwort dem Bilde unserer Jubilare beizugeben, komme ich herzlich gerne nach; ich betrachte darin die charakteristischen Gelehrtenköpfe von ihrer rein menschlichen Seite.

Als heute vor 70 Jahren Kitt das Licht der Welt erblickte, hatte Stoss bereits einen Vorsprung von 39 Tagen. Im späteren Leben hielten beide gleichen Schritt, treue Freundschaft und entfalteten ein halbes Jahrhundert hindurch in mustergültiger Harmonie ihre Forscher- und Lehrtätigkeit in einem Bau, an den sich die Namen Frank, Bollinger und Bonnet heften. Für die beiden darin untergebrachten Institute ist der Bau, den seine langjährigen Bewohner mit vielem Recht „Tempel der Eintracht“ nennen, längst zu eng geworden. Jahrzehntelang haben Stoss und Kitt auf die Bewilligung neuzeitlicher Institute vergeblich gehofft. Die tapferen bemoosten Häupter haben sich offenbar mit Humor in ihre Lage gefunden und streben in ungechwächter Forscherkraft und körperlicher Rüstigkeit ihrem hohen Lebensziele unentwegt entgegen. Die fesselnden Gesichtszüge der beiden 70jährigen habe ich jüngst schärfer geprüft, als beide ahnten, und das sonst der Fall zu sein pflegt. Auch nicht die geringste Furche der Verbitterung war zu entdecken; jedes Fältchen war Teilstück eines harmonischen Bildes, aus dem Glückseligkeit und innerer Friede sprechen. Ich habe versucht, das mit dem Griffel zum Ausdruck zu bringen.

Als ich kürzlich das Glück hatte, von dem Jubilar Kitt im „Tempel der Eintracht“ geführt zu werden, packte mich ein Gefühl der Weihestimmung. Dort reden zum Fachmann die zahlreich aufgetapelten Präparate, deren Studium die Grundlage für die Niederschrift einer

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 40, S. 682.

pathologischen Anatomie der Haustiere gab. In Dankbarkeit wollen wir heute eingedenk sein, daß uns Kitt das erste umfassende Werk auf diesem Gebiete geschenkt hat. Gar viel wäre noch über sein Walten in dem Institut am Englischen Garten zu sagen. Ich will nur erwähnen, daß Kitt mit seinem ersten Bakterienbrutkrank, dessen er sich bei seinen erfolgreichen mikrobiologischen Studien bedient hat, noch heute arbeitet.

In gleicher Weise, wie Kitt's Arbeitsräume, sind auch die seines Kameraden Stoß mit Studienmaterial überladen. Die hier herausgegangenen, durchweg wertvollen Arbeiten, gaben jüngst der vet.-med. Fakultät der Universität Gießen Anlaß, Dr. phil. Anton Stoß, „der unverzagt und in unermüdlicher Arbeit unter schwierigen Verhältnissen es verstanden hat, seine Gedanken zum Ziele zu führen, den trefflichen Lehrer und väterlichen Freund seiner Schüler“ ehrenhalber zum Doktor der Veterinärmedizin zu ernennen.

Selbst auf die Gefahr hin, langatmig zu werden, sei noch umständlich verraten, wie das Bild der Jubiläumsnummer entstanden ist. Als ich Zeuge war, mit welcher Herzlichkeit Kitt am 24. September seinem lieben, alten, treuen Freunde Stoß zum 70. Geburtstag und zur Ehrenpromotion die Hand drückte, war ich entschlossen, beide Köpfe in gemeinsamem Bilde für die Zukunft festzuhalten. Dazu mußten Lichtbilder dienen, aber beide Herren sind chronisch kammerascheu — unheilbar wird behauptet. Kollege Demeter hat aber einmal in günstigen Sekunden Kitt geknipst. Das war seltenes Glück, denn auch vor die Staffelei hätte sich der Widerpenstige nicht bittend lassen. Todsficher wäre er mit der Angelrute ausgerissen, um Petriheil zu fuchen. Stundenlang hält er diesen Sport noch aus; hierauf erfreut er abends seine hochverehrte Frau Gemahlin mit Forellen und regelmäßigem Vorlesen aus schöngestiger Literatur. Weilt der Rührige in der Sommerfrische, dann füllt sich die Mappe mit flott hingeworfenen und gut gestimmten Aquarellen, die feines Empfinden für malerische Landschaftsreize verraten.


Der Jubilar Stoß betätigt sich in den Ferien vielseitig mit seiner tapferen Familie in einem paradiesischen Sommerheim, das in Dachau abseits der Verkehrsstraßen in einem lauschigen Garten versteckt liegt. Als Jäger mutete es mich wie Birich auf den Rehbock an, als ich das Glück hatte, von dem Jubilar an seinem Wiegenfeste durch Tannengruppen des Gartens geführt zu werden, und Fräulein Prof. Dr. Stoß — Zoologie ist ihr Fach — mit der Kammera nachsichtlich. Als der ehrenwürdige alte Herr auf einer von ihm und seinem Sohne, Prof. Dr. Anton Stoß, eigenhändig gebauten Betonbrücke in einen Zwangswechsel geriet, hatte die Tochter Weidmannsheil. Wenn bei der Birich auch nur ein kleines flauies Bildchen zur Strecke kam, es genügte mir, den urwüchsigen, strotzende Kraft verratenden Gelehrtenkopf so wiederzugeben, wie ich ihn in Erinnerung habe — die Liebe zum Gegenstand hat den Griffel gelenkt —.

Olt.

Zum Wechsel in der Leitung der Preuß. Gestütverwaltung.

Am 1. November d. Js. tritt der bisherige preußische Oberlandstallmeister Groscurth wegen Erreichung der Altersgrenze in den Ruhestand. Groscurth übernahm nach dem unglücklichen Ausgange des Krieges 1920 das Erbe v. Oettingens unter den schwierigsten Verhältnissen. Es war damals nicht leicht, die durch den Krieg mehr oder weniger schwer geschädigten Zuchten den veränderten Verhältnissen entsprechend wirtschaftlich einzustellen und wiederaufzubauen. Die Pferdezucht hatte schon in den letzten Kriegsjahren zahlenmäßig erheblich zugenommen unter sichtbarem Rückgange der Qualität. Die preußischen Zucht- und Landgestüte waren infolge direkter oder indirekter Einwirkungen des Krieges zurückgeblieben, es fehlte an Ersatz der Befähler, den immer größer werdenden Anforderungen gegenüber. Die Geldentwertung erschwerte den Wiederaufbau. Dazu kamen der Verlust und die Abtretung großer Gebietsteile im Osten, die feindliche Besetzung im Westen und die Pferdeablieferungen an die Feindbundesstaaten. Groscurth zeigte sich den Verhältnissen in seiner ruhigen und klaren Art gewachsen und steuerte die Verwaltung sicher dem Wiederaufbau der preußischen Pferdezuchten zu. Die Pferdezuchtverbände waren in den Nachkriegsjahren zu besonderer Bedeutung gelangt, die Privathengsthaltung blühte, ihre Macht wuchs täglich. Es gelang der Gestütverwaltung, das Vertrauen der Züchter zu erlangen, und das Zusammenarbeiten zwischen der staatlichen Leitung der

Zuchten und den Züchterverbänden wieder herzustellen, die Zuchten durch Einigkeit aller dazu berufenen Organe so zu vermehren und zu heben, daß sie den folgenden Anstürmen gewachsen waren. Der Motorisierungsrummel — ein Kind der Inflation — stürzte sich bald auf die Landwirtschaft, mit dem Ziele der Vernichtung unserer Pferdezuchten. Das Pferd wurde schon in naher Zukunft als Museumstier lächerlich zu machen versucht. Zum Unglück für unsere Pferdezuchten konnte die Einfuhr von Pferden aus dem Auslande zu unerhört billigen Zollsätzen nicht verhindert werden. Groscurth gelang es in engster Zusammenarbeit mit den Züchterverbänden, die Gefahren abzuschwächen, die Pferdezuchten zu erhalten und ihrer qualitativen Verbesserung entgegenzuführen. Diese Arbeit ist noch nicht beendet — sie erfordert Maßnahmen, welche die Zuchten den heutigen rein wirtschaftlichen Verhältnissen anpassen und rentabel gestalten. Hierzu reichten die wenigen, Groscurth bechiedenen Jahre nicht aus; ihm blieb nur die Möglichkeit der vorbereitenden Maßnahmen und dazu vor allem die Erhaltung des derzeitigen Bestandes der Gestütverwaltung. Mit großem Geschick und unterstützt von dem Vertrauen der Züchterverbände hat



Groscurth erfolgreich um die Erhaltung der Gestütverwaltung gekämpft. Ein besonderes Verdienst hat er sich durch Herausgabe des bedeutenden Werkes „Die Preussische Gestütverwaltung“ erworben. In der Geschichte der Gestütverwaltung wird die Persönlichkeit Groscurth's nicht die schlechteste Rolle spielen, sein Andenken wird in Züchtereisen fortleben. Seine Mission für den Wiederaufbau der preussischen Pferdezuchten und der Erhaltung des übernommenen Bestandes, um seinem Nachfolger die Freiheit für die notwendigen Neuorganisationen zu lassen, hat er erfüllt.

Zu seinem Nachfolger ist der Referent der Gestüt- und Tierzucht-Abteilung im Preussischen Landwirtschaftsministerium, Ministerialrat Gatermann, zum 1. November d. Js. ernannt worden. Der neue Oberlandstallmeister Gatermann ist den Pferdezüchtern schon lange bekannt; 1920 wurde er als Tierzuchtreferent in das Ministerium berufen, seit 1924 verwaltete er daneben das Gestütsreferat. Oberlandstallmeister Gatermann hat in Bonn, Jena und Königsberg Landwirtschaft studiert und war danach praktisch in der Rheinprovinz, in Schleswig-Holstein und Brandenburg tätig. In Gatermann können die Züchter den erfahrenen Verwaltungsbeamten und den akademisch-wissenschaftlich vorgebildeten Leiter begrüßen, den die Preussische Gestütverwaltung für die bevorstehenden Aufgaben braucht. Die Gestütverwaltung wird sich den eingetretenen Verhältnissen anpassen und Maßnahmen treffen müssen, um die Pferdezuchten den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen und rentabel zu gestalten. Das ist nicht ohne einschneidende Veränderungen in der Gestütverwaltung möglich; aber unter den heutigen und künftigen Verhältnissen hat nur die Zucht Existenzberechtigung, kann gedeihen und den Züchtern eine Rente abwerfen, die wirtschaftlich eingestellt ist und Pferde produziert, die sowohl in der Landwirtschaft wie auch im Handel brauch- und gang-

bar sind. Kostspielige Hoch- und Sportzuchten ohne wirtschaftliche Bedeutung müssen der privaten Initiative überlassen bleiben, soweit nicht der Staat Sonderzwecke damit verfolgt und sich selbst als Züchter betätigen kann. Wenige, den Verhältnissen der Landesteile angepasste Zuchten mit einheitlichem Typ und von wirtschaftlicher Bedeutung — ganz gleich ob Warm- oder Kaltzucht — über möglichst weite Landesteile zusammengefaßt und für deren Förderung alle verfügbaren Mittel bereitgestellt, kann allein eine Zukunft für die Pferdezucht bieten. Jede Zersplitterung für Erhaltung unwirtschaftlicher Zuchten von nur geschichtlicher Bedeutung hindert den Aufschwung der Pferdezucht, würde eine zwecklose Vergeudung von Staatsmitteln sein. Es ist zu erwarten, daß Gättermann die Erfordernisse für die Neugestaltung der Gestütverwaltung und für den einheitlichen Aufbau unserer Pferdezuchten erkennt und die drängende Ausgestaltung durchführt. Mögen die Führer beider Zuchtrichtungen ihm das zu dieser wichtigen Lebensaufgabe nötige Vertrauen und die Bereitwilligkeit zur Mitarbeit entgegenbringen. Dann wird der in den letzten Jahren hin und wieder aufflackernde Kampf zwischen Warm- und Kaltblut beendet werden und die gesamte Arbeit der Gestütverwaltung und der großen Züchterverbände dem Ausbau und der Neugestaltung zu Gute kommen und unsere gesamten Pferdezuchten einer neuen Zukunft entgegenführen. So.

Nobelpreis für Medizin.

Die Konferenz des Karolinischen Instituts zu Stockholm erteilte den diesjährigen Nobelpreis in Medizin dem Direktor des Pasteur-Instituts in Tunis, Prof. Charles Nicolle, für seine Arbeit über das Fleckfieber.

Zu dem Bilde auf dem Umschlage der Nr. 41, 1928, Caesars Pferd.

Der Buchzeichner G. S. Winter's v. Adlerflügel hat sein Bild von Caesars Pferd dem Werke entnommen: *Lycosthenes, Konrad, Rufacensis Prodigiorum ac ostentorum chronicon, quae praeter naturae ordinem, motum et operationem... acciderunt Basileae 1557* durch Johann Herold ufs treüwlichst inn 4 Bücher gezogen vnd vertütscht, 1575, Bl. CCXIII. Der Verfasser dieses Wunderbuches hieß in seinem bürgerlichen Leben Konrad Wolfhardt und lebte in Rufach bei Basel. In Herolds Phantasia sieht das Pferd so aus, wie das Bild hier zeigt. Man sieht, Winters Mitarbeiter hat es erheblich idealisiert. *Lycosthenes* und Herold haben wohl noch an das Fabeltier geglaubt, Winter v. Adlerflügel hätte im Jahre 1703 das Bild nicht mehr bringen dürfen. Die Unterschrift bei *Lycosthenes-Herold* lautet:

CAIUS Julius Cesar / der war Oberster jnn Portugall / hat ein wunderbar pferd woellichs vornen gespaltnen hueff eben wie finger hatt es war gar fröudig vnnnd wild / darzuo gäntz schmaech vnd hochfärtig. Die wharsager do es gworffen wardt / sagten. Der dises pferdt ryten der wurd auch die Welt herrschen. Also ließ man 'es mitt grossen sorgen / vnn gar wohl auffziehen. Niemand kont es ye übersch reiten / dan eben den Cesar ließ es aufsitzen. Dem selben roß stalt er ein bildtnuß auff vor dem Tempel Veneris syner gepärerin. Vnd eben auff diß pferd / verließ sich Cesar vil do er es bekommen / hatt auch grosse hoffnung zuo dem do er es letzsts hin kommen / zoch also vß Portugall heym, macht satzung die der Gmeinde gantz angenäm.

Reinhardt Froehner.

Bücherbesprechungen.

Hammer: Geschichte der Erkennung und Heilung von Geistes- und Seelenkrankheiten bei Tieren. 2. Aufl. 214 S. 8 Abb. auf Tafeln. Preis 12 Mk. Verlag von Dr. Madeus & Co., Berlin.

Verf. will im Rahmen seines Werkes unter Seelenheilkunde (Psychiatrie) die Wissenschaft von krankhaften Störungen des Empfindens, Wollens, Handelns und Denkens bei Mensch und Tier verstehen. Eine ausführliche Darstellung der Geschichte der Tierpsychiatrie von den Anfängen heraus bis zu ihrem jetzigen Stande zu entwickeln, lag nicht in der Absicht des Verfassers, zumal dazu bei den bisher vorliegenden spärlichen Vorarbeiten die Arbeitskraft eines einzelnen Forschers kaum ausreichen würde. Verfasser will nur einen zusammenfassenden Überblick über die ihm zugängliche Literatur geben. Der erste Teil des Werkes behandelt allgemein menschliche Grundgedanken (Lehrmeinungen über die Tierseele, Suchen nach körperlichen Grundlagen seelischer Vorgänge,

Ergebnisse der Seelenkunde der Tierdressur usw.), im zweiten werden Beiträge zur Geschichte der speziellen Tier-Irrenheilkunde einzelner Leiden (Kastration, Tollwut, Staupe, Epilepsie, Gebärlähmung, akute Hirnrückenmarksentzündung, Hitzschlag, Drehkrankheit, Traberkrankheit u. a. m.) geliefert. Auch Beiträge zur Geschichte noch jetzt gebräuchlicher beruhigender und erregender Nervenmittel sowie Ausführungen über die in der Literatur vorhandenen Abbildungen über das seelisch kranke Tier bringt Verfasser in einzelnen Kapiteln. Am Schlusse des Werkes äußert sich Verfasser über die Zukunft der Tierseelenheilkunde und über die Forschungsweise, die die besten Ausichten, zu günstigen Ergebnissen zu kommen liefert. Mit allen Darlegungen wird man sich nicht ohne weiteres einverstanden erklären können. Die teilweise allzu laienhaft dargestellten Ausführungen enthalten zweifellos viel des Interessanten. Vor allem scheinen mir für den Veterinärmediziner im speziellen Teil die geschichtlichen Mitteilungen über die oben genannten Krankheiten, die sich vornehmlich mit der älteren Literatur befassen, wertvoll. Hingewiesen sei noch auf das umfangreiche Literaturverzeichnis und die interessanten Reproduktionen alter Bilder kranker Pferde am Schlusse des Werkes. Trautmann.

Grundriß der klinischen Diagnostik der inneren Krankheiten der Haustiere. Von Prof. Dr. B. Malkmus. 10. Aufl. bearbeitet von Prof. Dr. Th. Oppermann. 243. Seiten mit 66 in den Text gedruckten, zum Teil farbigen Abbildungen und 1 farb. Tafel. Leipzig 1928. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung. Preis geh. 8,60 RM., gebunden 9,50 RM.

Das meisterhaft angelegte, für den Lernenden geradezu ideale, knappe aber inhaltsreiche Buch ist nach dem Wunsche des dahingegangenen Verfassers zur Neubearbeitung Oppermann übertragen worden. Dieser Name bietet die Gewähr dafür, daß es auch in seinen Neuauflagen stets ein gern benutzter Lehrmeister und Führer bleiben wird.

Die Einteilung des Stoffes sowie der Charakter des Buches als „Grundriß“ sind beibehalten worden. Die Abschnitte: Tierversuch bei Tuberkulose und Rotz, serologische Untersuchungsmethoden, die Spezialdiagnose des Milzbrandes, Rauschbrandes, Malignen Ödems, der Wild- und Rinderseuche und der Tollwut sind unter Hinweis auf die Speziallehrbücher für Infektionskrankheiten mit Recht aus dieser klinischen Diagnostik gestrichen worden. Die übrigen Kapitel, insbesondere der Abschnitt Blut, sind entsprechend der Fortschritte in der Diagnostik ergänzt, teilweise auch umgearbeitet worden. — Für weitere Auflagen wäre vielleicht die Aufnahme der Schmerzperkussion neben der Schallperkussion (S. 14) zu empfehlen, ferner ebenso die Untersuchung der Scheide mit dem Spekulum. Die allein erwähnte manuelle vaginale Untersuchung mit der eingöhlten Hand (S. 189) führt oft zu Fehlresultaten dadurch, daß die entstandene Ölemlution mit Eiter oder leukorrhöischem Exsudat verwechselt wird. Bei Besprechung der Untersuchung des Euters heißt es (S. 191): „Eine mikroskopische Untersuchung der krankhaft veränderten Milch ist nicht notwendig, aber oft zweckmäßig“. Es erscheint mir richtiger, die mikroskopische Untersuchung als unbedingt erforderlich hinzustellen, denn erst daraus ergeben sich im Zusammenhang mit dem klinischen Befund endgültige Diagnosen und Prognosen. R. Götz, Hannover.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Tierarzt Dr. Meyer in Bleckede zum Vet.-Rat unter Übertragung der Veterinärstelle in Bleckede (Bez. Lüneburg); wissenschaftl. Assistent Dr. Walter Bolz zum Oberassistenten; Tierarzt Dr. Karl Dietrich aus Halle (Saale) zum Assistenten an der Chir. Klinik der Tierärztlichen Hochschule Berlin.

Verletzt: Vet.-Rat Dr. Leipziger in Wehlau (Bez. Königsberg) in die Veterinärstelle in Langensalza (Bez. Erfurt).

Ausgeschieden: Dr. Lück, Oberassistent an der Chirurg. Klinik der Tierärztlichen Hochschule Berlin zum 1. November 1928.

Verstorben: Tierarzt Fritz Bauer, Stabsveterinär a. D. in Niederoderwitz; Vet.-Rat Dr. Karl Bettkober in Görlitz; Vet.-Rat Ehrhardt in Stendal.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung fein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 45.

Ausgegeben am 10. November 1928.

36. Jahrgang.

Zur gefl. Beachtung! Der Bezugspreis für das 4. Vierteljahr 1928 wird für die beim Verlag direkt bestellten Abonnements durch Nachnahme erhoben, wenn derselbe nicht bis zum 25. ds. Mts. in unseren Händen ist. — Wir bitten ev. für Einlösung der Nachnahme besorgt zu sein.

M. & H. Schaper, Verlag der „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“.

(Aus dem Institut für Seuchenlehre der Tierärztlichen Hochschule in Budapest.)

Über die Ursachen der Ruhr der neugeborenen Tiere. *)

Von Prof. Dr. R. Manninger.

Überblickt man die Geschichte jener Infektionskrankheiten, die durch nicht obligate Parasiten bedingt werden, so gelangt man zu dem Schluß, daß der Werdegang der Ansichten über ihre Entstehung eine eigentümliche Kreisbahn beschreibt: unsere heutigen Anschauungen über die Ursachen mancher solcher Krankheiten gleicht nämlich — von gewissen Abänderungen abgesehen — auffallend jenen Ansichten, die vor der Entwicklung der bakteriologisch-ätiologischen Richtung herrschten. Dies gilt, wie wir sehen werden, auch für die Ätiologie der Ruhr der neugeborenen Tiere.

Die Ursache der Ruhr der neugeborenen Tiere erblickte man vor der bakteriologischen Ära ganz allgemein in Haltungsfehlern. Als dann auf Grund der epochemachenden Entdeckungen von Pasteur und R. Koch die Erforschung der Ätiologie der Infektionskrankheiten mit bakteriologischen Methoden einsetzte, sind verschiedene Mikroorganismen beschrieben worden, in denen man die Ursache der Ruhr der neugeborenen Tiere erblicken zu dürfen glaubte. Während jedoch anfänglich die Forscher, in erster Linie Jensen, die Wichtigkeit prädisponierender Momente hinlänglich betonten, wurde später die Auffassung über die Ätiologie der Ruhr immer einseitiger, so daß man heutzutage Zusammenfassungen zu Gesicht bekommt, in denen nur bakteriologisch-ätiologische Gesichtspunkte zum Ausdruck gelangen, über die Wichtigkeit der Disposition hingegen kein Wort verloren wird.

Diese immer einseitiger werdende Betonung des bakteriologisch-ätiologischen Standpunktes wirkte sich natürlich auch in der Richtung der Krankheitsverhütung aus, indem bis in die neueste Zeit die ebenfalls einseitige Bestrebung stetig an Boden gewonnen hat, zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit der neugeborenen Tiere spezifische Impfverfahren heranzuziehen. Anfänglich hat man mit mono- und polyvalenten Immunseris, später mit Vakzinen, ge-

gebenenfalls auch mit stallspezifischen Impfstoffen, versucht, dem Übel vorzubeugen, man muß sich jedoch eingestehen, daß die diesbezüglichen Bestrebungen von wenig oder gar keinem Erfolg begleitet waren. Man muß sich daher m. E. mit dem Gedanken abfinden, daß in den Fällen, wo nach der Anwendung irgendeines Impfverfahrens die Zahl der Erkrankungen abgenommen hat, die Besserung durch gleichzeitig erfolgte Wandlung anderer Umstände bedingt war.

Die Fehlergebnisse, die ich nach derartigen Impfungen zu verzeichnen hatte, veranlaßten mich bereits vor Jahren, die Umstände näher zu erforschen, unter denen die Ruhrerkrankungen bei neugeborenen Tieren auftreten. Meine diesbezüglichen Bestrebungen haben nun hinreichendes Material geliefert, um mich in den Stand zu setzen, die wichtigsten Momente kurz zusammenzufassen.

Überblickt man die Reihe der Mikroorganismen, die als Erreger der Ruhr der neugeborenen Tiere beschrieben worden sind (Bacillus coli, aërogenes, pyocyaneus, verschiedene Paratyphusarten, Diplostreptokokken, B. necroseos, Fränkel'sche Gasbranderreger, B. abortus Bang usw.), dann findet man, daß sämtliche Keime, mit der alleinigen Ausnahme des Bangschen Abortusbazillus, fakultativ pathogene Mikroorganismen sind, von denen man schon von vornherein voraussetzen muß, daß sie nur unter der Mitwirkung gewisser prädisponierender Momente imstande sind, pathogene Wirkung zu entfalten. Hiervon macht auch der von Detry und Rohonyi neuerdings entdeckte Bacillus zoodysenteriae Hungaricus keine Ausnahme, der übrigens allem Anschein nach mit dem Fränkel'schen Gasbranderreger identisch ist, dessen Rolle in der Ätiologie der Lämmerruhr von Dalling, Mason und Paul bereits festgestellt worden ist. (Über die Ausnahmestellung des Bang'schen Abortusbazillus werden wir weiter unten noch zu sprechen kommen.)

Fakultativ pathogene Keime vermögen, wie bereits erwähnt, nur unter gewissen prädisponierenden Umständen eine Krankheit hervorzurufen. Die Schwierigkeiten, die hieraus für die Erklärung der epidemiologischen Rolle dieser

*) Vorgetragen auf der 90. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg 1928.

Keimarten erwachsen, versuchte man durch die Annahme auszuschalten, daß fakultativ pathogene Mikroorganismen während Tierpassagen an Virulenz zunehmen können. Ist daher nach dieser Auffassung beim ersten Krankheitsfall eine gewisse Disposition vielleicht auch nötig, so können in der Folge dann auch Tiere erkranken, für die eine besondere Disposition nicht mehr vorausgesetzt werden muß. Faßt man jedoch diese Auffassung etwas näher ins Auge, dann ist man genötigt zuzugeben, daß bisher keine objektiven Beweise dafür vorliegen, wonach die Virulenz der hier in Rede stehenden Keime während der Tierpassagen tatsächlich zunimmt, da bisher noch Niemandem der Nachweis gelungen ist, daß die letale Dosis dieser Mikroorganismen während Tierpassagen geringer geworden ist. Tatsächlich pflegen sich jedoch, namentlich in Kälberbeständen, wo die Ruhr aufgetreten ist, in der Folge die Erkrankungen zu häufen, wodurch der Anschein erweckt wird, als wenn der Infektionsstoff an Virulenz zugenommen hätte; diese Beobachtung läßt sich jedoch hinreichend mit der feststehenden Tatsache erklären, daß in Stallungen, wo bereits mehrere Krankheitsfälle vorgekommen waren, die Menge des ausgeschiedenen Ansteckungstoffes beträchtlich zunimmt. Es ist nun klar, daß die Menge der wenigstens nur fakultativ pathogenen Keime für die neugeborenen Tiere durchaus nicht gleichgültig sein kann. Gelangen nämlich solche Keime nur in geringer Anzahl in den Darmkanal neugeborener Tiere, wie dies in gefunden Beständen vorzukommen pflegt, dann verursachen sie nur ausnahmsweise Erkrankungen und zwar bei Tieren, deren Widerstandsfähigkeit durch irgendeine Ursache auffallend herabgesetzt ist, während sie in großen Mengen bei sonst unveränderter Virulenz auch bei solchen Tieren Gesundheitsstörungen veranlassen können, deren Widerstandsfähigkeit nur wenig vermindert ist.

Die Annahme, wonach die erwähnten Mikroorganismen tatsächlich fakultativ pathogene Keime sind, deren Virulenz durch Tierpassagen nicht erhöht wird, gewinnt übrigens noch an Wahrscheinlichkeit, wenn man die Erfahrung berücksichtigt, wonach die Ruhr der neugeborenen Tiere keine kontagiöse Krankheit im wahren Sinne des Wortes ist, da sie von einem Bestande in andere nicht verschleppt wird, ja sehr oft sogar in einem und demselben Bestande nur auf gewisse Tiergruppen, beispielsweise in Schweinezuchten auf gewisse Buchten, beschränkt bleibt.

Bei näherer Untersuchung zeigt sich tatsächlich, daß bei den erkrankten Tieren eine besondere Disposition nachgewiesen werden kann, die entweder durch angeborene konstitutionelle Schwäche oder durch die Lebensverhältnisse bedingt wird, in die die neugeborenen Tiere gelangen.

I. Die angeborene konstitutionelle Schwäche wird bestimmt durch das Schicksal des Organismus im Mutterleibe. Diesbezüglich sind folgende Gesichtspunkte zu beachten.

1. Eine sehr häufige Ursache der Schwäche des neugeborenen Organismus ist eine Infektion mit den Erregern des feuchten Verwerfens. Hierauf hat bereits Jensen die Aufmerksamkeit gelenkt und besonders eingehend hat sich mit dieser Frage kürzlich Dahmen befaßt. Ich kann mich daher hier kurz fassen, zumal mit den diesbezüglichen Erfahrungen des Instituts Privatdozent Marcis in einer demnächst erscheinenden Arbeit sich eingehend befassen wird, aus der hervorgeht, daß in der Ätiologie der Ruhr der Kälber die größte Rolle jedenfalls das feuchthafte Verwerfen spielt. Aber auch bei Ferkeln bestehen innige Beziehungen zwischen Ruhr und ansteckendem Verwerfen. Bei diesen beiden Tierarten ist daher in vielen Fällen der Bang'sche Abortusbazillus der unmittelbare oder mittelbare Erreger der Säuglingsruhr. Es darf als allgemein bekannt vorausgesetzt werden, daß bei längerem Bestehen des feuchthaften Verwerfens in einem Bestande die infizierten Muttertiere ihre Frucht nicht vor der Zeit verwerfen, sondern ihre Nachkommen anscheinend

normal zur Welt bringen. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch in manchen solcher Fälle um sogenannte protrahierte Aborte, wo die neugeborenen Tiere mit den Bang'schen Bazillen infiziert zur Welt kommen. Solche Säuglinge gehen dann entweder infolge einer durch die Abortusinfektion bedingten Schwäche oder an Durchfall ein, die ebenfalls durch Abortusbazillen bedingt ist, oder es siedelt sich in ihrem Darmkanal die eine oder die andere der oben erwähnten Mikrobenarten an, die dann in dem ohnehin geschwächten Organismus eine zum Tode führende Darmentzündung hervorruft.

Daselbe gilt auch für die Fohlen von Stuten, die mit dem *Bacillus abortivo-equinus* infiziert sind, trotzdem aber zu normaler Zeit ihre Fohlen zur Welt bringen.

Selbstverständlich können mitunter auch andersartige Krankheiten der Muttertiere zur Folge haben, daß ihre Nachkommen mit einer verminderten Widerstandsfähigkeit ins Leben gesetzt werden.

2. Ebenfalls wichtig und namentlich bei Ferkeln vielleicht die häufigste Ursache der konstitutionellen Schwäche ist die unzweckmäßige Ernährung des Muttertieres während der Trächtigkeit. Bald muß dieser, bald wieder ein anderer Fehler in der Ernährung der Muttertiere für die Verminderung der Widerstandsfähigkeit der sich in ihnen entwickelnden Frucht verantwortlich gemacht werden. Manchmal — dies ist wohl der seltenste Fall — liegt der Fehler in der ungenügenden Eiweißzufuhr, in anderen Fällen — dies kommt sehr häufig vor — genügt zwar die Menge der energieispendenden Stoffe in der Nahrung, dagegen ist die Menge der mineralischen Bestandteile, insbesondere der Kalksalze, oder der Vitamine zu gering. Dies ist z. B. der Grund dafür, daß Ruhrerkrankungen sehr häufig vorkommen bei Lämmern von Schafen, die während der Winterszeit nur karge Nahrung erhielten, und daß ferner in weidearmen Wirtschaften, wo die Ernährung der Muttertiere allzu einseitig erfolgt, die Ruhr ebenfalls nicht zu den Seltenheiten gehört. In der Tatsache eben, daß der intensive Wirtschaftsbetrieb an vielen Orten eine einseitige, von den natürlichen Verhältnissen wesentlich abweichende Ernährung der Muttertiere, namentlich der Säue, zur Folge hat, liegt z. T. die Erklärung dafür, daß mit dem Intensiverwerden des landwirtschaftlichen Betriebs auch die Ruhr der neugeborenen Tiere um sich greift, so daß man mit Recht von einer Kulturkrankheit sprechen kann. Nicht nur anatomische Gründe, der Nachweis von Osteomalazie, Rhachitis, Leckfucht, Osteoporose usw. drängen zu dieser Ansicht, sondern auch die von mir zu wiederholten Malen gemachte Beobachtung, wonach in denselben Schweinezuchten die Nachkommen von jungen Säuen häufig vollkommen gesund sind und gut gedeihen, während solche von älteren oder alten Mutterfühen in großer Anzahl an der Ruhr zugrunde gehen. Diese Erfahrung wird verständlich, wenn man bedenkt, daß die Muttertiere, insbesondere in Beständen, wo die Säue jährlich zweimal abferkeln, bei qualitativ und quantitativ unzureichender Ernährung mit der Zeit an gewissen Verbindungen verarmen und daher nach mehreren Geburten die in ihnen heranreifenden Früchte nicht mehr mit den nötigen Stoffen versehen können. In den Embryonen entstehen auf diese Weise Stoffwechselstörungen, die sich dann nach der Geburt in einer gesteigerten Disposition offenbaren.

3. Die Frage, ob und wie weit auch die Inzucht zu einer konstitutionellen Schwäche der neugeborenen Tiere führt, läßt sich vorläufig noch nicht mit Entschiedenheit beantworten und setzt daher noch weitere Untersuchungen voraus.

II. Im extrauterinen Leben sind nach meinen Erfahrungen folgende Faktoren von schädlichem Einfluß auf die Widerstandsfähigkeit der neugeborenen Tiere.

4. Nicht selten sind es Diätfehler, die in Magen und Dünndarm der neugeborenen Tiere die Vermehrung verschiedener Bakterienarten ermöglichen, wodurch die abnorme Gärung der Milch, somit die Entstehung von chemischen Produkten bedingt wird, die dann durch die Reizung der Schleimhaut Eingangspforten für das Eindringen von Mikroorganismen in die Darmwand schaffen. Auf diese Weise kommen

a) sporadische Ruhrerkrankungen zustande, wenn neugeborene Tiere mit der Milch euterkranker Muttertiere ernährt werden. Viel häufiger noch kommen derartige Erkrankungen vor, wo

β) Kälber künstlich ernährt werden unter Außerachtlassen der Regeln der Aseptik. Falls sich nämlich in der Milch, die den Kälbern verabreicht wird, infolge der Unwissenheit des Pflegepersonals oder der Vernachlässigung der Stallhygiene überhaupt, fakultativ pathogene Bakterien zu vermehren vermögen, entstehen in den mit der Milch getränkten Kälbern im Darmkanal entzündliche Veränderungen. Es ist ja hinlänglich bekannt, daß in manchen Wirtschaften, wo die nötige Sauberkeit nicht gewährleistet werden kann, die künstliche Aufzucht eben aus dem Grunde aufgegeben werden muß, weil infolge gehäufte Ruhrerkrankungen schwere Verluste entstehen.

5. Von wesentlichem Einfluß auf die Widerstandsfähigkeit der neugeborenen Tiere ist ferner auch die Beschaffenheit des Stalles. In dieser Hinsicht sind nach meinen Erfahrungen solche Stallungen schädlich, deren Luft feuchtkalt oder schwül ist. In beiden Fällen ist fomit der allzu hohe Grad der relativen Feuchtigkeit das prädisponierende Moment. Die Erhöhung der Disposition wird im ersteren Falle durch Erkältung, im letzteren durch hyperthermische Zustände bedingt. Besonders häufig läßt sich die Krankheit in feuchtkalten Ställen nachweisen. Damit offenbar hängt auch zusammen die Häufigkeit der Krankheit im Frühling und im Herbst. Auch die Erfahrung, wonach durch das Verlegen der Geburten ins Freie oder in andere, zweckmäßiger gebaute Ställe, oft weitere Erkrankungen fast allfögleich verhindert werden, hat z. T. hierin ihre Erklärung.

Bisher ist es mir in jedem genauer untersuchten Falle gelungen, irgendeine der angeführten Ursachen als krankheitsauslösenden Faktor festzustellen. Es ist freilich möglich, daß sich gegebenenfalls vielleicht noch weitere Umstände entdecken lassen, die am Entstehen der Ruhr der neugeborenen Tiere Schuld tragen. Für wichtig erachte ich augenblicklich die Erkenntnis, daß die Ruhr der neugeborenen Tiere nur bei dem Vorliegen einer durch schwächende Einflüsse bedingten Disposition zustandekommt. Die Krankheit kann unter solchen Umständen umso leichter zur Entwicklung gelangen, als

III. bei neugeborenen Tieren die Dünndarmschleimhaut noch keine Schleimzone besitzt und daher die Tiere in den ersten Tagen ihres Lebens schon aus anatomischen Gründen bedeutend empfindlicher sind, als im späteren Laufe ihrer Entwicklung.

Nach dem Gefagten ist die Ruhr der neu-

geborenen Tiere wohl eine auf infektiöser Grundlage entstehende Krankheit, zu ihrem Zustandekommen ist jedoch die Mitwirkung prädisponierender Momente unbedingt erforderlich. Es wird hierdurch auch verständlich, warum man bei dieser Krankheit mit Impfungen nicht zum Ziele gelangt. Bei der Bekämpfung ist daher nicht die Erhöhung der spezifischen Widerstandsfähigkeit unter Verwendung verschiedener Impfstoffe zu erstreben, sondern man muß vielmehr trachten, die besondere Disposition der neugeborenen Tiere auszuschalten. Mit anderen Worten, man muß durch die Bekämpfung des feuchtenhaften Verwerfens und durch entsprechende Haltung der Muttertiere, sowie durch Schaffung geeigneter Lebensbedingungen für die neugeborenen Tiere deren Widerstandsfähigkeit erhöhen. Im gegebenen Falle ist es somit die Aufgabe des Tierarztes festzustellen, welcher Umstand oder welche Kombination von Umständen an der Empfänglichkeit der neugeborenen Tiere für die Wirkung der bereits öfter erwähnten fakultativ pathogenen Mikroorganismen Schuld trägt. Die weitere Aufgabe besteht dann in der Ausschaltung der prädisponierenden Ursache. Von einer näheren Besprechung der diesbezüglichen Vorkehrungen kann hier abgesehen werden, da sich ja die von Fall zu Fall erforderlichen Vorbeugungsmaßnahmen aus dem über die prädisponierenden Ursachen mitgeteilten von selbst ergeben. Mit Nachdruck muß indessen noch hervorgehoben werden, daß auch dafür Sorge zu tragen ist, daß die neugeborenen Tiere von übermäßigen Infektionen verschont bleiben, da es nach dem oben bereits Gefagten durchaus nicht gleichgültig ist, in welcher Menge fakultativ pathogene Keime in den Darmkanal neugeborener Tiere gelangen. In dieser Hinsicht kommt neben der Isolierung der kranken Tiere, sowie der Reinhaltung und Desinfektion des Stalles gegebenenfalls das Verlegen des gefunden Bestandes in einen reinen Stall oder bei entsprechender Witterung auch ins Freie in Frage. Daselbe bezweckt auch das Auflaffen gemeinsamer Kälber- und Fohlenstände, das Vermeiden der Überfüllung von Ställen sowie das Anlegen von Maulkörben. In Schweinezuchten soll wenigstens der Verkehr zwischen den einzelnen Buchten unmöglich gemacht werden.

Ich habe im Vorgehenden versucht, meine Auffassung über die Ätiologie der Ruhr der neugeborenen Tiere kurz zu entwickeln, wie sie sich mir im Laufe der Jahre gelegentlich praktischer Untersuchungen aufgedrängt hat. Ich bin mir dessen vollkommen im klaren, daß diese Auffassung durch künftige Erhebungen noch so manche Wandlungen erfahren kann, davon jedoch bin ich überzeugt, daß die Feststellung, wonach in der Ätiologie der Ruhr der neugeborenen Tiere die ausschlaggebende Rolle der erhöhten Disposition der betroffenen Tiere zukommt, zutrifft. Ich schließe dies insbesondere daraus, daß es mir bereits in mehreren Beständen gelungen ist, die Krankheit durch Verbesserung der hygienischen Verhältnisse dauernd zum Stillstand zu bringen, z. T. auch in Zuchten, wo vordem durch die ledigliche Anwendung von spezifischen Impfstoffen überhaupt keine Erfolge erzielt werden konnten.

Die Derrengadera und ihre Bekämpfung.

Von W. A. Collier, z. Zt. Mitarbeiter am Institut Robert Koch.

Die Derrengadera herrscht in Venezuela seit etwa hundert Jahren, doch wurde erst 1905 durch Rangel der Erreger, das *Trypanosoma venezolense*, entdeckt. Dieses unterscheidet sich durch feinen Blepharoblasten deutlich vom *Trypanosoma equinum*, dem Erreger des Mal de Caderas des südlichen Südamerikas. Dagegen zeigt es eine merkliche morphologische Übereinstimmung mit dem in der Panama-

zone beobachteten *Trypanosoma hippicum*, dem Erreger der Murrina, obwohl es sich mit Sicherheit um zwei verschiedene Formen handelt. Die Derrengadera kommt in Venezuela in mehreren klinischen Formen vor. Die wichtigste ist die Derrengadera (im engeren Sinne) und die Peste boba.

Die Derrengadera ist durch die große Schnelligkeit

charakterisiert, mit der die Lähmungsercheinungen der Hinterhand beginnen. In der Regel handelt es sich um asymmetrische Paresen, doch kommen auch vollkommene Paralyse des hinteren Körperteils zur Beobachtung. Bei Beginn der Erkrankung, wenn mikroskopisch bei genauester Untersuchung noch keine Trypanosomen nachgewiesen werden können, dokumentiert sich das Leiden durch Schwanken beim Gehen, das im Verlauf weniger Tage immer mehr zunimmt. Auch im Stehen schwankt das Tier leicht hin und her, und man hat fast den Eindruck, als ob nicht nur motorische Störungen in der Hinterhand bestehen, sondern auch leichte Störungen des Gleichgewichtsempfindens. Um nicht zu stürzen, stellt sich das Tier breitbeinig hin. In den späteren Perioden kann man dann deutlich bemerken, wie die Muskeln nur schwer oder gar nicht den motorischen Antrieben gehorchen und nicht mehr zur vollen Arbeitsleistung getrieben werden können. Man merkt dies daran, daß es dem Tiere große Mühe macht, in gerader Linie zu laufen. Meist schwankt es nach der einen oder anderen Seite und beschreibt halbkreisförmige Bewegungen. Endlich legt es sich nieder und kann sich nicht mehr erheben. Nach etwa 24 Stunden beginnen Konvulsionen, die Atmung wird sterbtorös, der Puls unregelmäßig, und das Tier stirbt.

Spontanheilungen sind nur bei der als *Peste boba* bezeichneten Form der Fall, wo nach einem Krankheitsverlauf von 15–60 Tagen in etwa 20 Prozent der Fälle eine Heilung zu verzeichnen ist.

Die *Peste boba* beginnt mit Fieber von 40–41 Grad, Trockenwerden der Haut und Konjunktivitis mit starkem Tränenfluß. Hierauf setzt eine Art Latenzperiode ein, die durch stellenweisen Haarausfall charakterisiert ist. Die Schleimhäute sind hochgradig anämisch. Nunmehr entwickeln sich Ödeme an den verschiedensten Körperstellen, ganz besonders am Abdomen, wo sie eine eng umschriebene elliptische Form annehmen. Ist das Ödem am Abdomen besonders stark entwickelt, so spricht man von der *Peste de buda re*. Gleichzeitig finden sich auch mehr oder weniger stark ausgesprochene Veränderungen am Auge. Es treten Iritis und vielfach Blutungen in die hintere Augenkammer auf. Auch kann man Augenveränderungen sehen, die fast vollkommen der syphilitischen Augenerkrankung des Kaninchens entsprechen. Eine derartige Veränderung ließ sich ebenfalls an einem *Derrengadera* im engeren Sinne leidenden Tier erkennen.

Erwähnt man außerdem noch die in fast allen Fällen bestehende Tachykardie und die beschleunigte Respiration, dazu die ungemein heftige Nephritis (Albuminurie bis Anurie!), so ist das Bild der *Peste boba* gezeichnet.

Beiden Formen ist gemeinsam, daß der Nachweis der Trypanosomen schwer gelingt und in manchen Fällen überhaupt unmöglich ist. In solchen Fällen kann durch Verimpfung größerer Blutquantitäten auf empfängliche Versuchstiere der Nachweis erbracht werden, daß es sich in der Tat um *Trypanosoma venezolense* handelt. Sonst ist es oft nötig, etwa 20 Präparate durchzusehen (im dicken Tropfen), ehe man ein einziges Trypanosoma entdeckt. Etwas schneller geht die Diagnose im Dunkelfeld, das sich bei Verwendung von Spiegeln, mit deren Hilfe direktes Sonnenlicht zum Kondensor geleitet wird, auch in jenen Gegenden anwenden läßt. Wenn man dann zu verschiedenen Zeiten eine größere Serie von Präparaten durchmustert, kann man schließlich bei fast jedem erkrankten Tier den Erreger nachweisen.

Das *Trypanosoma venezolense* findet sich in Pferden, Maultieren, Mauleseln und Eseln, ohne eine bestimmte Art besonders zu bevorzugen oder zu verschonen. Unter natürlichen Verhältnissen sind auch zuweilen Hunde infiziert, die besonders empfänglich zu sein scheinen, und ebenso der Zorro (*Canis azarae*), der in den Llanos weit verbreitet ist. Ferner finden sich die spezifischen Parasiten gelegentlich in Affen und zwar in den Araguatos (*Mycetes ursinus*) und

recht häufig in den Wassertschweinen oder Chiguirens (*Hydrochoerus capybarus*). Letztere werden als natürliches Infektionsreservoir angesehen und aus diesem Grunde rücksichtslos verfolgt. (In diesen Wassertschweinen, die in Argentinien und Paraguay Carpincho genannt werden, ist auch höchstwahrscheinlich das Reservoir des *Trypanosoma equinum* zu suchen.) Experimentell infizierbar sind außerdem noch Maus, Ratte, Kaninchen und Meerfischchen.

Da Iturbe nachweisen konnte, daß es leicht gelingt, mit dem Darminhalt von *Tabanus importunus* Wied. die *Derrengadera* auf kleine Versuchstiere zu übertragen, nimmt man nunmehr allgemein an, daß auch die natürliche Infektion (mechanisch) durch diese Tabanidenart verursacht wird. Die Annahme scheint zu Recht zu bestehen, denn die epidemiologischen Verhältnisse rechtfertigen sie im Allgemeinen.

Nuñez Továr glaubt, daß auch *Stomoxys calcitrans* L. bei der Übertragung der *Derrengadera* eine gewisse Rolle spielt. Dieser Gedanke liegt nahe, wenn man die zeitweilig ungeheure Verbreitung dieser Fliege (Juni bis August) in den Llanosgegenden beobachtet. Man kann sich kaum einen Begriff davon machen, in welcher Menge diese Fliegen in der Nähe menschlicher Ansiedlungen vorkommen. Bei der Lecheria (Molkerei) im Süden von San Fernando de Apure konnte man sich kaum vor ihnen retten. Sie sollen auch die Pferdefilarose übertragen, doch waren nähere Anhaltspunkte hierfür nicht zu erhalten.

Vielleicht spielen diese Blutsauger wirklich eine gewisse Rolle bei der Übertragung der *Derrengadera*, wenn auch als wichtigster Überträger *Tabanus importunus* in Frage kommen mag.

Eine ähnliche Rolle kann möglicherweise gleichfalls die Gattung *Lyperosia* spielen, wenn ihre beiden Vertreter *Lyperosia irritans* L. und *L. minuta* Bezzi auch in vielen Teilen Venezuelas selten sind. Bei der Stechlust dieser Dipteren ist eine rein mechanische Verschleppung nicht ganz von der Hand zu weisen.

Bei der Bekämpfung der *Derrengadera* hatte man in Venezuela große Hoffnung auf das Naganol (Bayer 205) gesetzt. Trotzdem trat schnell eine gewisse Ernüchterung ein, denn es zeigte sich, daß das Präparat zwar bei der Behandlung der menschlichen Schlafkrankheit weit günstigere Erfolge zeitigte, als man je zu erwarten hoffte, daß es aber bei der Behandlung der Tierfeuchen stark enttäuschte. Der Grund liegt darin, daß das Präparat für den Menschen viel weniger giftig ist als für das Pferd. Bei den kleinen Laboratoriumstieren liegt der chemotherapeutische Quotient so günstig wie bei keinem anderen Präparat. Auch beim Menschen ist das Verhältnis der Dosis curativa zur Dosis tolerata ein gutes. Bei dem Pferd aber liegen diese beiden Werte so nah beieinander, daß die Heildosis oft schon schwere Vergiftungsercheinungen verursachen kann.

Man hat beim Pferde die Wahl zwischen einer einmaligen ausreichenden Dosis (2,0 bis 2,5 Gramm pro 100 kg Körpergewicht) oder aber nach dem Vorschlage von Rodenwaldt und Douwes einer fraktionierten Behandlung. Diese kann aber unter Umständen auch zu einer schädlichen Akkumulation führen. Wählt man letztere Applikationsweise, so gibt man 0,2 bis 0,3 Gramm pro 100 kg Körpergewicht einen Tag um den andern, bis schließlich eine Gesamtdosis von etwa 10 bis 15 Gramm erreicht ist. Hierbei sind Verluste nicht auszuschließen, wenn man auch bei einer derartig fraktionierten Behandlung dem Organismus Dosen einverleiben kann, die bei einer einmaligen Gabe tödlich wirken würden. Kann man die Pferde in Ställen halten, so ist diese Behandlungsweise zu versuchen, da immerhin ein erheblicher Teil der Tiere dauernd geheilt werden kann. In den Llanos (Steppe) muß man aber davon Abstand nehmen. Hier liegen die Verhältnisse viel schwieriger, denn auf den Hatos (Pferdezüchtereien) sind die Pferde nicht ständig an der gleichen Stelle, sondern laufen frei auf der Steppe her-

um. Nur bei besonders wertvollen Tieren ist die fraktionierte Behandlung anwendbar. Hierbei ist man gleichzeitig auch in der Lage, das erkrankte Pferd ganz zu überwachen und ihm zur Kräftigung der unspezifischen Abwehrkräfte des Organismus gleichzeitig ein stärkendes Mittel zu geben. Auf diese Weise wird es gelingen, besonders wertvolle Tiere zu retten, bei denen die Mehrkosten einer solchen Behandlung keine erhebliche Rolle spielen.

Anders muß man aus äußeren Gründen vorgehen, wenn es sich um frei herumlaufende Tiere handelt. Hier muß eine „Routinebehandlung“ einsetzen. In diesem Fall ist es bei der Zahl der Tiere nicht möglich, jedes einzelne Pferd durch ständige mikroskopische Kontrolle zu überwachen, vielmehr muß sich der behandelnde Arzt auf eine klinische Diagnose verlassen. Bei dieser Routinebehandlung werden die erkrankten Tiere mit größeren Dosen behandelt, die noch nicht erkrankten mit geringeren.

Die Schutzwirkung beruht bekanntlich darauf, daß das Naganol lange Zeit im Körper kreist, worauf Mayer und Zeiss als erste hinwiesen. Die gleichen Autoren fanden auch, daß nach einmaliger Injektion des Präparates ein so langdauernder Schutz zustande kommt, wie er bisher durch kein anderes Chemikal, sondern nur durch spezifische Immunisierung erreicht worden war. Das Naganol ist noch monatelang nach der Infektion im Blute und den Organzellen nachweisbar. Im kreisenden Blute ist es größtenteils an die Globuline gebunden, in den Nieren, der Leber, der Milz, der Lunge und den Nebennieren wahrscheinlich auch an die gleichen Eiweißkörper gekettet.

Diese Eigenschaft, lange Zeit im Körper in wirksamer Form zu kreisen, macht das Mittel als Prophylaktikum geeignet. Die gleiche Eigenschaft birgt aber auch eine Gefahr in sich, die darin besteht, daß einige Zeit nach der Injektion das Präparat nicht mehr in einer solchen Konzentration im Körper vorhanden ist, die alle Trypanosomen abzutöten vermag. Die Parasiten werden nur leicht in ihrer Vitalität geschädigt. Solche geringe Schädigung kann von den Parasiten überwunden werden, und es bildet sich unter Umständen ein naganolresistenter Stamm des *Trypanosoma venezolense* aus, der bei einer Übertragung auf frische Tiere eine gewisse Festigkeit gegen das Chemikal aufweist. Die Prophylaxe der Derrengadera, ebenso die Prophylaxe aller anderen tierischen Trypanosomenkrankheiten muß also derart durchgeführt werden, daß sie nicht nach Jahren infolge einer Naganolfestigkeit zwecklos wird.

Die Möglichkeit einer Festigung war von Mayer und Zeiss zunächst geleugnet worden, später wurde sie von Mayer zugegeben. Auf Grund von Beobachtungen und Behandlungsversuchen war auch Pfeiler auf die Vermutung gekommen, daß eine Resistenzhöhung möglich sei, experimentelle Beweise hierfür konnte er indessen noch nicht erbringen. Kleine und Fischer haben sich auf Grund ihrer Befunde in Afrika in der gleichen Weise geäußert. Von besonderem Interesse sind aber die Untersuchungen von Rodenwaldt und Douwes an Pferden, die an Surra litten. Diese Autoren verimpften Trypanosomen aus dem erkrankten Pferd vor der Behandlung auf Ratten und Meerschweinchen und bestimmten die Heildosis. Hierauf behandelten sie das Pferd mit einer ziemlich starken Dosis Naganol, die aber doch nicht ein Rezidiv verhütete. Das entstandene Rezidiv wurde wieder mit Naganol behandelt und ebenso ein weiteres. Von dem dritten Rezidiv wurde wiederum auf Ratten und Meerschweinchen Blut verimpft und die Heildosis des Naganols bestimmt. Es zeigte sich, daß eine viel größere Dosis nötig war als bei dem Ausgangsstamm. Die Trypanosomen hatten durch eine Behandlung, die den Körper nicht sterilisierte, eine Festigung gegen das Heilmittel erfahren.

Noch wichtiger sind andere Beobachtungen der gleichen Autoren. Sie impften von einem erkrankten Pferd ab und bestimmten die Heildosis des Naganols. Hierauf behandelten sie das Tier mit 5 Gramm des gleichen Präparates und impften nach 10–15 Minuten wieder ab. Bei der Bestimmung der Heildosis des Naganols bei diesem Stamm

zeigte es sich, daß bereits eine leichte Festigkeit eingetreten war. Durch diese Versuche ließ sich der Beweis erbringen, daß bereits eine 10 bis 15 Minuten lange Einwirkung des Naganols im Organismus des Pferdes ausreicht, um eine gewisse Festigkeit zu verursachen.

Während die von Rodenwaldt und Douwes festgestellte Festigkeit der Rezidivtrypanosomen auch bei Mäusen zu beobachten ist, wie Morgenroth und Freund fahen, ist die Erhöhung der Resistenz nach 10–15 Minuten langer Einwirkung wahrscheinlich nur auf das Pferd beschränkt, vielleicht auch auf andere Pflanzenfresser. Ich konnte in Versuchen an Mäusen nachweisen, daß die Trypanosomen, die noch eine Stunde nach intraperitonealer, subkutaner oder intravenöser Behandlung mit Naganol auf neue Tiere abgeimpft waren, eine unveränderte Empfindlichkeit gegen Naganol befaßen. Hier verhält sich die Maus anders als das Pferd.

Aus zahlreichen Laboratoriumsversuchen geht hervor, daß eine Festigkeit der Trypanosomen gegen Naganol relativ leicht eintritt, und in der Praxis muß man mit dieser Möglichkeit rechnen, die schwere Gefahren in sich birgt.

Man darf nicht vergessen, daß Trypanosomen eine einmal erworbene Festigkeit gegen ein bestimmtes Chemikal leicht bewahren. Auf diese Weise können bei falscher Anwendung des Naganols im Laufe der Jahre naganolfeste Trypanosomenstämme zur Ausbildung kommen, die schließlich die Anwendung des Mittels unmöglich machen würden. Eine weitere Gefahr liegt darin, daß diese naganolfesten Trypanosomen gleichzeitig auch gegen andere Heilmittel refraktär werden können. Wenn auch nicht zu erwarten ist, daß eine solche Festigung in kurzer Zeit eintritt, so muß man doch mit ihr rechnen. Es sei als Analogie nur daran erinnert, daß sich in der letzten Zeit die Fälle salvarsanresistenter Syphilis zu häufen scheinen, vielleicht eine Folge der weitverbreiteten Behandlung mit zu geringen Salvarsandosen. Auch die chininresistente Malaria im Matto-Grosso Hochland und in Mazedonien sei hier erwähnt.

Um bei einer Anwendung des Naganols die Ausbildung fester Trypanosomenrassen zu vermeiden, muß man zweckmäßigerweise folgende Punkte beachten:

Ist die Derrengadera weit fortgeschritten, so reicht das Naganol erfahrungsgemäß nicht aus, die Pferde zu sterilisieren. Früher oder später kommt es doch zu einem Trypanosomenrezidiv und die Tiere gehen ein. Außerdem gehen bei fortgeschrittener Erkrankung die einmal eingetretenen Lähmungsercheinungen nicht oder nur teilweise zurück. Bei einer solchen weit vorgeschrittenen Erkrankung werden nicht mehr alle Trypanosomen abgetötet, sondern allenfalls in ihrer Vitalität auf kurze Zeit geschwächt. Sie passen sich schnell dem Naganol an und bilden einen etwas festeren Stamm. Dieser läßt bei weiterer Übertragung auf gesunde Tiere eine Infektion entstehen, die durch die gewöhnlichen Dosen schon etwas schwerer beeinflusst wird. Das künstlich am Leben erhaltene, aber nicht sterilisierte Pferd stellt eine Infektionsquelle dar, die schwach gefestigte Trypanosomen beherbergt. Um die Heranzüchtung fester Stämme zu vermeiden, ist es also angebracht, die Pferde mit schweren klinischen Erscheinungen ohne Ausnahme zu töten. Eine Sterilisierung des Organismus bei Routinebehandlung ist hier mit nichttoxischen Dosen in den seltensten Fällen zu erzielen.

Anders geht man bei leicht erkrankten Tieren vor. Diese sind mit einer ausreichend hohen Dosis zu behandeln und weiter zu beobachten. Tritt bei einem solchen Tier ein Rezidiv ein, so ist dieses durch Naganol etwas weniger zu beeinflussen, da ja die Rezidivtrypanosomen schon eine schwache Festigkeit besitzen. Auch hier stellen die Tiere eine gefährliche Infektionsquelle dar und sind zu töten.

Endlich muß die Prophylaxe in vorsichtiger Form gehandhabt werden. Die Sanidad Nacional (Gesundheitsamt) in Venezuela schreibt vor, alle gefunden Tiere prophylaktisch mit 2 Gramm Naganol zu behandeln. Diese Dosis reicht vollkommen aus, um einen gewissen Schutz gegen die Infektion zu erzielen. Die so behandelten gefunden Tiere

werden überwacht, und alle nach 3 Monaten gefund gebliebenen erhalten die gleiche prophylaktische Dosis. Diese dreimonatlichen Injektionen sind solange durchzuführen, wie sich die Tiere in einer Gefahrenzone befinden.

Erkrankt eines dieser prophylaktisch behandelten Tiere in den ersten 4 Wochen nach der Injektion, so muß es sofort getötet werden. Erkrankt es später, so wird es behan-

delt (4—5 Gramm), und erst beim Auftreten eines Rezidives ist es ebenfalls zu töten.

Es sind somit alle Tiere mit Rezidiven zu töten, da sie in jedem Fall gefestigte Parasiten beherbergen. Die Ausbildung solcher gefestigten Stämme muß aber mit allen Mitteln verhindert werden, wenn das Naganol seine Bedeutung als spezifisches Prophylaktikum bewahren soll.

Gesundheitsschädliche amerikanische Futtergerste.

Von Dr. Elsässer, Landestierarzt, Bremen.

Das Dunkel über die Ursache der Schädlichkeit der amerikanischen Futtergerste hat sich bis jetzt nur wenig gelichtet.

Bis jetzt wissen wir über die bei der Fütterung auftretenden Krankheitsercheinungen nur, daß die verabreichte Gerste, sofern sie überhaupt aufgenommen wurde, Erbrechen verursacht hat.

Ich selbst habe bei den 100 Versuchsschweinen, die ich für die bremische staatliche Gerstenuntersuchungsstelle beschafft habe, nur zweimal Erbrechen beobachten können. Es mag dies wohl daher kommen, daß unsere Tiere von der vorgefetzten und verdorbenen Gerste nur sehr wenig oder gar nichts aufgenommen haben, so daß die in der Gerste enthaltenen schädlichen Stoffe gar nicht zur Wirkung kommen konnten.

Einige Mäster wollen neben Erbrechen auch Durchfall und bei tragenden Sauen sogar Verferkeln beobachtet haben.

Einen weiteren Beitrag zum Krankheitsbild möchte ich in folgendem geben:

Es ist durchaus verständlich, daß mit dem Auftauchen der Kunde über die Schädlichkeit der Gerste kluge Leute sich einstellten, die ihre Erfindungen zur Brauchbarmachung der Gerste in überschwenglichem Maße schilderten und ihre Dienste zur Brauchbarmachung der Gerste anboten. Unsere staatliche Gerstenuntersuchungsstelle wurde mit solchen Anträgen geradezu überlaufen. Bis jetzt kann gesagt werden, daß alle uns angebotenen Methoden zur Brauchbarmachung der Gerste versagt haben. Daß es allerdings gelingt, die Gerste in hohem Grade für die Schweine schmackhaft zu machen, soll nicht bestritten werden. Von der Gerste eines Dampfers, deren Probefütterung die gänzliche Unbrauchbarkeit der Ware ergeben hat, wurden einige Säcke zu Kuchen verbacken. Die Verfütterung dieser Kuchen ergab nun, daß die Schweine gierig darüber herfielen. Der Kuchen schien so schmackhaft zu sein, daß den Tieren bei der ersten Fütterung mehrmals davon gereicht werden konnte. Allerdings fiel auf, daß die Schweine in der Bucht 1, die auch sonst gegen verdächtige Gerste etwas wählerischer waren als die übrigen Tiere, von dem Futter nichts aufnahmen. Die gierige Aufnahme der Kuchen durch die Mehrzahl der Versuchstiere gab also Veranlassung zu den aussichtsreichsten Hoffnungen über die weitere Verwendbarkeit der Gerste.

Unser Erstaunen war aber groß, als wir bei der zweiten Fütterung bemerkten, daß die Tiere nur zögernd an den Trog kamen und beim dritten Versuch die Aufnahme der Kuchen überhaupt verweigerten.

Schon bei dem ersten Versuch fiel auf, daß die Schweine sich nach etwa 1½ bis 2 Stunden nach der Aufnahme des Futters nicht etwa in die weiche warme Streu, sondern flach auf den nackten Zementfußboden legten, wie wenn sie sich den Bauch kühlen wollten. Die erste Fütterung mit dem Kuchen erfolgte nachmittags etwa um 16 Uhr. Am andern Morgen stellte sich bei den Tieren mit Ausnahme derjenigen in Bucht 1 ein stinkender Durchfall ein.

Der Kot wurde bei einigen Tieren im Strahl abgesetzt.

Gleichzeitig konnte beobachtet werden, daß sich einige Tiere mehr oder weniger heftig zu scheuern begannen. Am Nachmittag desselben Tages, also ungefähr 24 Stunden nach der ersten Fütterung, wurde weiter festgestellt, daß bei den weißen Schweinen an den Seiten des Körpers, am Unterbauch, an den Innenflächen der Schenkel bis etwas unter die Sprunggelenke ein Ausschlag auftrat, der so heftig war, daß die Tiere sich stundenlang scheuerten. Dabei ist besonders bemerkenswert, daß die Tiere sich nicht nur an den Wänden scheuerten, sondern sich zu diesem Zweck quer über die Tröge legten und sich in dieser Lage über dieselben hin und her bewegten. Der Hautausschlag bestand in kleinen, etwa stecknadelkopfgroßen Bläschen mit zum Teil hellem, zum Teil auch schon trübem gelblichem Inhalt. Außerdem waren die Bläschen mit einem roten Hof umgeben.

Besonders aber fiel auf, daß schwarze Schweine wohl Durchfall zeigten, aber wie schon angedeutet, von dem beschriebenen Hautausschlag gänzlich verschont blieben. Nach der nicht anzuzweifelnden Mitteilung der Fabrik, die die Kuchen herstellte, hat sie bei der Verarbeitung der Gerste zu Kuchen nur etwas Fischmehl zugesetzt. Es muß deshalb angenommen werden, daß die oben beschriebenen Krankheitsercheinungen einzig und allein auf die Schädlichkeit der Gerste zurückzuführen sind.

Es kann, da die Herstellung der Kuchen bei einer Temperatur von 80—90 Grad C erfolgte, weiter geschlossen werden, daß es sich bei der Gerste um ein thermostabiles Gift handeln muß und es deshalb auch nicht so leicht gelingen wird, der Gerste ihre Schädlichkeit zu nehmen.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Karett: Ein Fall von beiderseitiger Doppelnieren beim Schwein. (W. t. Mschr. 1928, Jahrg. XV, S. 403.)

Beiderseitige Zweiteilung der Nieren, also anscheinend vier Nieren vorhanden. Die beiden kranialen Nierenteile sind größer als die kaudalen. Histologisch keine Abweichungen der vier Nierenabschnitte von der Norm. Berge.

Nieberle: Zur pathologischen Anatomie des Paratyphus der Kälber. (Aus dem Vet.-pathologischen Institut der Universität Leipzig.) (Arch. f. wiss. Tierheilkunde 1928, S. 521.)

Im Ablauf der paratyphösen Erkrankung der Kälber unterscheidet man zwei Arten von Reaktionen: diffuse und

herdförmige. Während die ersteren auch bei anderen infektiös-toxischen Prozessen vorkommen und deshalb keine diagnostische Bedeutung haben, sind die herdförmigen deutlich charakterisiert. Die bisher fälschlich als „miliare Organnekrosen“ beschriebenen Herde sind entweder örtliche Zellwucherungen mit nachfolgenden nekrobiotischen Prozessen oder von vornherein reine Nekrosen. Besondere Bedeutung kommt hierbei dem einen zu Grunde liegenden, dem granulierenden Prozesse, zu. Es handelt sich hier um einen Wucherungsvorgang der Retikulo-Endothelien. Diese histiozytäre Reaktion kommt am stärksten in der Leber, dann in der Milz und in den Lymphknoten zur Ausbildung. Die knotenförmigen Wucherungsherde sind spezifisch für den Paratyphus und müssen deshalb als Paratyphusknoten

bezeichnet werden. Die durch sie bedingten Gefäßveränderungen sind als Endophlebitis paratyphosa zu bezeichnen. Der Paratyphus des Kalbes gehört damit in das Gebiet der infektiösen Granulome. Die beschriebenen Veränderungen werden im wesentlichen von Toxinen der Paratyphus-Bakterien verursacht. Die von verschiedenen Autoren beschriebenen zirrroseähnlichen Leberveränderungen stehen sicher mit dem Paratyphus im Zusammenhang. Geiger.

van Diermen: Beitrag zur Kenntnis der pathologisch-anatomischen Veränderungen der Lungen bei infektiösen Schweinekrankheiten. (Aus dem path.-anat. Institut der Tierärztlichen Hochschule Utrecht.) (Arch. Tierheilk. 1928, 58, S. 180.)

Bei 60 Schweinen mit Pneumonie fand Verf. 34 Fälle von katarrhalischer Bronchopneumonie (davon 11mal mit Nekrose), 5 Fälle von katarrhal-fibrinöser Bronchopneumonie (davon dreimal mit Nekrose) und 21 Fälle von katarrhal-eitriger Bronchopneumonie (davon viermal mit fibrinöser Pleuritis, einmal kompliziert mit Nekrose). Typische Formen einer fibrinösen Pneumonie wurden nicht gefunden. Das Exsudat war meist von zelligem Charakter. Das häufige Vorkommen von lobulären Pneumonien und der ältesten Veränderungen in und um die Bronchioli weisen auf peri-, evtl. endobronchiale Ausbreitung hin. Die Pneumonien verliefen alle schleichend. Aus den pathologisch-anatomischen Veränderungen ließen sich keinerlei Rückschlüsse auf die Ätiologie der Erkrankungen ziehen. Am häufigsten wurde das Bact. suisepitum, dann coli und suisepitum, ferner Staphylo- und Streptokokken, endlich noch Bact. pyocyaneum und Rotlaufbakterien ermittelt. Geiger.

Machts: Die Leberegelsteine beim Rinde und ihre Behandlung mit Neoserapis. (W. t. Mschr. 1928, Jahrgang XV, S. 345.)

Verf. hält Neoserapis für ein sicher wirkendes, bei entsprechender Anwendungsform für das Rind ungefährliches Heilmittel. Das Mittel hält sich chemisch konstant. Die Verabreichung als Einguß erscheint Verf. als Vorteil gegenüber Kapseln. Der Preis stellt sich pro Tier um ca. 50 Prozent billiger als Distol. Berge

Baudet, E. A. R. F.: Trichostrongylose beim Hasen. (Mit 3 Abbildungen.) (Tijdschr. v. Diergeneesk. 1928, S. 275—278.)

Bei einem Kadaver eines Hasen waren die Gefäße an der Außenfläche des Darmes stark infiziert, die Schleimhaut erschien sehr rot und anscheinend verdickt. Im mikroskopischen Präparat wurden unzählige kleine Nematoden, Trichostrongylus retortaeformis (Zeder) gefunden. Andere Parasiten wurden nicht entdeckt. Der Trichostrongylus retortaeformis kann Krankheit und Tod bei Hasen und Kaninchen verursachen, war aber bisher in Holland noch nicht beobachtet worden.




Fig. 1. Trichostrongylus retortaeformis ♂; v. r. = ventroventrale Rippe; l. v. = lateroventrale Rippe; e. l. = externolaterale Rippe; m. l. = mediolaterale Rippe; p. l. = posterolaterale Rippe; e. d. = externodorsale Rippe; d. = dorsale Rippe.

Das Männchen ist im Durchschnitt 6,5 mm, das Weibchen 6—8 mm lang. Wird die Bursa des Männchens in der Seitenlage betrachtet, so erscheint die lateroventrale Rippe breiter als die übrigen Rippen (Fig. 1 l. o.). In dieser Zeichnung sind die lateralen Rippen nicht vollständig wiedergegeben worden; die Enden biegen sich nach innen um. Die Enden der posterolateralen und der externodorsalen Rippe (Fig. 1 p. l. und e. d.) sind nach hinten gerichtet. Die dorsale Rippe (Fig. 1 d.) ist am Ende gespalten. Die Spikula sind 122—140 μ lang. Sie sind gelbbraun und in der Zeichnung (Fig. 2) in der Seitenlage abgebildet. Sie sind stark gedreht und zeigen Erhabenheiten, von denen eine in einen freiliegenden Vorsprung übergeht. Das distale Ende der Spikula zeigt eine deutliche scharfe Einbiegung. Zwischen beiden Spikula liegt das 63—68 μ lange Gubernakulum, welches die Spikula stützt. Erst spindelförmig und besitzt an der Seitenkante einen mehr oder weniger hervorragenden Rand. Er ist nicht immer deutlich wahrzunehmen und ist in der Zeichnung weggelassen worden (Fig. 2).




Fig. 2. Spikula und Gubernakulum von Trichostrongylus retortaeformis- Spikula in Seitenlage.

Das Kopfende des Parasiten läuft sehr dünn aus und ist 10 μ breit. Der Mund ist mit drei kleinen Lippen ausgestattet. Eine flügelartige Verbreiterung der Kutikula war nie zu beobachten. Der im Durchschnitt 700 μ lange Ösophagus geht mit einer geringen Verbreiterung in den Darm über, der in dem Anus endet. Dieser ist im Durchschnitt 87—95 μ vom Ende des Körpers entfernt.

Beim Weibchen bildet die Vulva eine längliche Spalte von 52 μ und liegt 1,5—1,6 mm vom Körperende entfernt. Die gemeinschaftlichen



Fig. 3. Graphidium strigosum ♂; Bursa mit der langen Spikula.

Ovejektoren sind 600—650 μ lang, die Eier im Uterus sind 66—75 μ lang. Die Kutikula dieses Parasiten ist nicht längsgestreift. Graphidium strigosum, mit dem Trichostrongylus retortaeformis gewöhnlich zusammen angetroffen wird, wurde in diesem Fall nicht gefunden. Baß.

Schmötzer, B.: Krankmachende Wirkung und Abtreibung der Gastrophiluslarven. (Allatorvosi Lapok, 1928, Nr. 3, S. 27.)

Nach Beobachtungen des Verf. rufen bei jungen Fohlen schon 50—80 Gastrophiluslarven Erscheinungen hervor, die aber nichts charakteristisches darbieten, sondern bloß in unzureichender Ernährung und Entwicklung, ferner in Struppigsein des Haarkleides bestehen. Wenn auch diese Erscheinungen bei entsprechender Fütterung und dem mikroskopisch möglichen Ausschluß von Askariden oder Sklerostomen im Darne mit großer Wahrscheinlichkeit für Gastrophilose sprechen, zur Sicherstellung der Diagnose ist dennoch die Probebehandlung einiger Tiere anzuraten. In Verf. zahlreichen Beobachtungsfällen hat sich zur Abtreibung der Gastrophiluslarven die Verabfolgung von Gastin (ein spezielles Holzteermittel in Gelatinekapfeln) erwiesen, worauf der Abgang der Larven schon nach 24 Stunden beginnt und gewöhnlich über 24 Stunden andauert. Eine Wiederholung der Behandlung nach einigen Wochen erscheint empfehlenswert in erster Linie bei solchen Tieren, von denen nur wenige Larven abgegangen sind und der Abgang innerhalb von 24 Stunden zum Abschluß kam. Die Behandlung erweist sich in der ganzen Zeitdauer vom November bis zum April als erfolgreich, doch sollte sie schon beim Beginn der Stallfütterung vorgenommen werden, um das Auftreten von merklichen Gesundheitsstörungen, die sich schon im Monate Februar einzustellen pflegen, zu verhindern. Marek.

Vajda, Th.: Über die Magenwurmkrankheit der Schweine. (Allatégoréségügy. 1928, Nr. 3, S. 56.)

Die vor kurzem noch wenig beachtete Krankheit verursacht an vielen Orten massenhafte Erkrankungen und Todesfälle. Insbesondere nasse, fumpfige Weiden, ferner der Aufenthalt in nassen Stallungen bieten reichliche Gelegenheit zur Aufnahme der Wurmbrut. Die Tiere erkranken ohne Altersunterschied, doch wird der Grad der Krankheitserscheinungen durch verschiedene begünstigende Umstände beeinflusst. Am gefährlichsten unter den Magenwürmern des Schweines zeigt sich der Hyostrongylus rubidus, neben dem aber häufig auch Arduenna strongylina sowie Physcephalus sexalatus vorkommt. Die durch die Würmer angeregten krankhaften Veränderungen der Magenschleimhaut sind aus der Literatur genügend bekannt. Zur Abtreibung der Magenwürmer erwiesen sich Terpentinöl, Santonin mit Kalomel, Chenopodiumöl, Kébal, desgleichen eine Mischung von Kupfersulfat mit Natrium arsenicosum wie 4:1 als unwirksam. Die Behandlung mit Kupfersulfat und Natriumarsenit in Lösung gab ferner Anlaß zum Auftreten von Vergiftungen und von Aspirations-Bronchitiden bzw. Pneumonien mit 20 Prozent Todesfällen; bei der Zerlegung solcher Tiere fanden sich die Würmer trotzdem als lebend erhalten. Hingegen ergab die Einverleibung von schwer resorbierbaren Jodverbindungen bei etwa 100 magenwurmkranken Schweinen durchweg sehr gute Heilerfolge. Marek.

Seuchenlehre und Seuchenbekämpfung

Schultze, A.: Beitrag zur Paratyphusinfektion des Rindes und ihre Behandlung. (B. t. W. 1928, S. 435—437.)

Interessanter Bericht über das Auftreten der Krankheit in einem Bestande von etwa 120 Rindern und Kälbern. Es handelte sich zunächst um eine fieberhaft erkrankte, gut genährte Kuh, bei der außerdem Appetitlosigkeit und Durchfall (schwarze, stinkende Kotmassen) vorhanden waren. Nach der Schlachtung fand sich eine schwere hämorrhagische

Gastro-Enteritis (Labmagen und Dünndarm), Schwellung der mesenterialen Lymphknoten, verbunden mit ödematöser Durchtränkung des umgebenden Gewebes, Hepatitis parenchymatosa, Nephritis haemorrhagica und starke, teilweise blutige Schwellung der Fleischlymphdrüsen. Die Milz und das Fleisch waren nicht verändert. Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung: Bac. enteritidis Gärtner.

13 Tage nachher Erkrankung einer weiteren Kuh desselben Bestandes: Hinfälligkeit, matter Blick, Schüttelfrost, Temperatur 41,7, schneller, schwacher Puls, pochender Herzschlag, Bauch eingefallen, starker, stinkender, teilweise blutiger Durchfall. In der Kotprobe zahlreiche Gärtnerbazillen nachweisbar, dagegen nicht in der Milch- und Blutprobe. Agglutinationstiter in Bezug auf Gärtner 1:200, auf den Erreger des ersten Falles 1:800. Bei entsprechender Behandlung (siehe unten) war nach etwa 10 Tagen klinisch Heilung eingetreten. Am 15. Tage noch Enteritidisbazillen, jedoch wenig zahlreich im Kote vorhanden, am 26. Tage nach der Erkrankung auch bei Anreicherung keine Erreger mehr feststellbar. Von drei Kotproben, die von an leichtem Durchfall leidenden Kühen entnommen worden waren, enthielt die eine ebenfalls Gärtnerbazillen. Verf. nimmt an, daß derartige, gut verlaufende Fälle ihrer Natur nach oft nicht erkannt werden.

In Bezug auf die Fleischbeschau ist es nach den gemachten Erfahrungen dringend notwendig, alle Fälle von Durchfall und Magen-Darmentzündung der bakteriologischen Fleischbeschau zuzuführen ohne Rücksicht auf den Grad der Erkrankung, letzteres aus dem Grunde, weil paratyphöse Darmerkrankungen auch ohne Fieber verlaufen können. Nötigenfalls kann in solchen Fällen schon intra vitam eine Kotuntersuchung vorgenommen werden. Bei nachgewiesenem Paratyphus wären veterinärpolizeiliche Maßnahmen sehr am Platze.

Der vom Verf. aufgestellte und angewandte Heilplan bezweckt zunächst die Abtötung und Schädigung der Krankheitskeime im Magen-Darmkanal, was durch Gaben von Kreolin erreichbar ist. Verabreichung des Mittels in den ersten beiden Tagen dreimal täglich in Dosen von je fünfzehn Gramm mit 2—3 Liter Leinsamenschleim. Bei eintretender Besserung Verminderung der Kreolindosen. Das Eingeben der Arznei mittelst eines Gummischlauches ist deshalb vorteilhaft, weil diese zum größten Teil direkt durch die Schlundrinne in den erkrankten Labmagen und Darm gelangt. Der eingetretene Wasserverlust wird durch Eingeben von leichtem Kamillentee in größeren Mengen mit der Flasche günstig beeinflusst. Zur Hebung der Herzaktivität verwendet Verf. eine Abkochung von Bohnenkaffee (250 Gramm auf 3 Liter Wasser). Ähnlich verläuft die Behandlung von Kälbern. Hierbei ist wichtig die Entziehung der Milch, damit den Krankheitskeimen kein neuer hochwertiger Nährboden zugeführt wird.

Zum Schlusse berichtet Verf. über die hygienischen Maßnahmen, die er in derartigen Fällen behufs Verhinderung einer Übertragung des Krankheitserregers mit der Milch auf den Menschen durchführte, außerdem über das von ihm eingeleitete Verfahren zur Isolierung der Krankheit auf die infizierten Tiere. Carl.

Flückiger, G.: Zur Frage der Verbreitung des Maul- und Klauenfeuchvirus durch Flußwasser. (Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1928, S. 1239.)

Die Frage, ob das Virus auch durch fließendes Wasser verbreitet werden könne, hat großes seuchenpolizeiliches Interesse, weil Neuansteckungen auf Weiden zu befürchten wären, welche von solchem Wasser gewässert werden. Speziell gilt dies von Abwässern, die von Schlachthäusern kommen. Zwei Gesichtspunkte sind hier bestimmend: 1. Die Grenze der Verdünnung des Virus mit Wasser, die auf dem natürlichen Wege noch ansteckend ist. 2. Die

Haltbarkeit des ansteckungsfähigen Virus in Wasserläufen und Wasseransammlungen. Verf. gibt eine Übersicht über diejenigen Untersuchungen, welche mit diesen Fragen zusammenhängen. In Bezug auf die Verdünnungsgrenze wird ein Wert von 1:72 900 für hochvirulente konzentrierte Aphthenlymphe und physiologische Kochsalzlösung angegeben. Die Verdünnungsgrenze hängt naturgemäß sehr ab von der Stärke der Virulenz. Im weiteren hat Verf. unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Flußmenge einzelner schweizerischer Flüsse und eines angenommenen Lymphquantums Verdünnungen berechnet, die nicht mehr pathogen sein können. Allerdings bei kleineren Wasserläufen ergeben sich höhere Werte; wird z. B. pro Minute 10 ccm Lymphe in einen Bach abgegeben, so würde in diesem schon bei 20 Sekundenlitern eine ungefährliche Verdünnung enthalten sein. Befindet sich aber der Ansteckungsstoff an Gewebsteilen, dann müßten noch andere Momente hinzugenommen werden (biologische und chemische Einwirkungen an diesen von seiten des Wassers). Solche sind hinreichend für andere Infektionskrankheiten bekannt. Primär besteht die Möglichkeit, daß bei der Auflösung solcher Gewebsteile das Virus in das umgebende Wasser übertritt. Was die Dauerhaftigkeit des Virus in Abwässern anbelangt, wurden verschiedene Zeiten für den Sommer und Winter erhalten. Die Dauerhaftigkeit steht in umgekehrtem Verhältnis zur Außen-, d. h. Wassertemperatur. Von Bedeutung für das Schicksal des im Wasser fließenden oder ruhenden Oberflächenwasser befindlichen Virus scheinen die Bakteriophagen zu sein. Flußwasser hat die Fähigkeit Mikroorganismen zu vernichten (Selbstreinigung). Dieser Selbstreinigungsprozeß ist sehr kompliziert (mechanische, chemische, biologische und bakteriologische Prozesse). Ob für das Aphthenvirus auch eine solche Phag.-Wirkung besteht, ist heute noch nicht völlig nachgewiesen. Die Möglichkeit liegt aber vor, in Analogie zu anderen pathogenen Mikroben. Zu einer wirkungsvollen Desinfektion, mittels Desinfizientien sind für fließendes Wasser große Mengen nötig. Ob in allen Fällen damit eine Abtötung der Mikroben erzielt wird, ist nur dann zu bejahen, wenn das Mittel genügende Konzentration besitzt, was etwa durch Desinfektionsgruben ermöglicht werden kann. Die Selbstreinigungsprozesse, d. h. die Bakteriophagie, scheint durch Desinfektionsmittel eher gefährdet zu werden. Es wurde zudem in der Schweiz, wo vielfach Keulungen vorgenommen werden mußten, nicht festgestellt, daß die Neuausbrüche der Seuche im Verlaufe von Bächen oder Flüssen häufiger gewesen wären. Das trifft besonders für die Gebirgsgegenden zu, wo die Möglichkeit eher gegeben wäre, insbesondere als die biologischen Komponenten des Selbstreinigungsprozesses im Wasser der Gebirgsbäche sich weniger geltend machen sollen. Auch besteht nach den neuesten Ansichten eine Ausscheidung des Virus, bevor sich die klinischen Erscheinungen der Seuche zeigen, so daß in den Wässern, die mit den entsprechenden Tieren in Berührung gekommen sind, der Ansteckungsstoff in aktiver Form vorhanden sein müßte, wodurch eine weitere Verbreitung möglich sein sollte. So müßte es nicht möglich sein, die Erstaussbrüche erfolgreich im ersten Gehöft zu bekämpfen. Es besteht demnach nur eine geringe Wahrscheinlichkeit der Verbreitung durch fließendes Wasser. Eine andere Tatsache scheint hier von größerer Tragweite zu sein: Frösche können das Virus konservieren (Klobouk) bis zu 15 Tagen in unveränderter Form. Ob andere Wassertiere ähnliche Fähigkeiten besitzen, ist offenbar noch nicht nachgewiesen. Wenn solche Tiere mit den Weidetieren in Berührung kommen, ist eine Infektion möglich. Einzelne Autoren nehmen auch den Menschen als latenten Infektionsträger an, indem sie eine Konservierung des Virus in den Schleimhäuten vermuten. Jedenfalls sind die Probleme der Verbreitung der Krankheit noch nicht erschöpfend geklärt. G.

A u j e s z k y, A.: Schutzimpfung der Haustiere gegen die Wutkrankheit im Jahre 1926. (Allatorvosi Lapok, 1928, Nr. 6, S. 67.)

Ergänzend zu seiner schon veröffentlichten Zusammenstellung der Ergebnisse der Wutschutzimpfung bis zum Schluß des Jahres 1925 (D. T. W. 1927, Nr. 25), berichtet der Verf. über das Schutzimpfungsergebnis bei 1044 geimpften Tieren (541 Rinder, 113 Pferde, 19 Efel, 163 Schweine, 205 Schafe und 3 Ziegen), die alle nach der Högyes'schen Verdünnungsmethode Schutzgeimpft worden sind. Nach den nach Ablauf eines Jahres eingelangten Berichten erkrankten an Wut von den Schutzgeimpften Tieren 20 Rinder und 2 Schweine, somit 2,1 Prozent der Tiere. Wenn man aber 18 solche Tiere in Abzug bringt, die schon während der Dauer der Schutzimpfung (im Verlaufe von 10—13 Tagen 8—9 Injektionen) oder innerhalb von 2 Wochen danach der Wutkrankheit erlagen, so kommt man zu einer Sterblichkeitsziffer von nur 0,38 Prozent.

M a r e k.

A u j e s z k y, A. und C s o n t o s, J.: Beiträge zur Wutschutzimpfung bei Hunden. (Allatorvosi Lapok, 1928, Nr. 10 bis 11, S. 121.)

Trotzdem sich beim Kaninchen schwer eine Immunität gegen die Wutkrankheit erreichen läßt, ist es den Verff. gelungen, mit einem nach U m e n o und D o i hergestellten und bei Zimmertemperatur 14—28 Tage lang aufbewahrten Impfstoff bei 66,6 Proz. der Schutzgeimpften 15 Kaninchen Immunität zu erzeugen; ein Kaninchen starb infolge von Impfwutkrankheit. Durch Verminderung des Karbolgehaltes in dem Impfstoff von 1,25 Prozent auf 0,25 Prozent wurde keine Änderung der Wirksamkeit beobachtet. Mit einem nach K o n d e verfertigten und bei Zimmertemperatur 10—28 Tage lang aufbewahrten Impfstoff wurde bei 70 Prozent der Kaninchen Immunität erzielt. Von acht Hunden, die subkutan 5 ccm eines nach U m e n o und D o i hergestellten, nur 0,25 Prozent Karbolsäure enthaltenden und bei Zimmertemperatur 16—23 Tage lang aufbewahrten Impfstoffes erhielten und 137—173 Tage später teils künstlich mit Straßenvirus (2 Tiere), teils natürlich durch Zusammenbringen mit beißenden wutkranken Hunden infiziert wurden, erwiesen sich 87,5 Prozent als immun. Von 20 Hunden, denen je 5 ccm eines nach K o n d e hergestellten und bei 37 Grad C 3 Tage lang aufbewahrten Impfstoffes subkutan gespritzt und welche Tiere 126 bis 262 Tage später künstlich mit Straßenvirus infiziert wurden, erwiesen sich 71,4 Prozent als immun.

M a r e k.

H e g y e l i, Z.: Simultane Schutzimpfungen gegen Schweinepest. (Allatorvosi Lapok, 1928, Nr. 13, S. 161.)

Nach den während der im Seruminstitut Phylaxia in Budapest vorgenommenen Laboratoriumsverfuchen sowie nach den im Laufe von 10 Jahren in der Praxis gesammelten Erfahrungen, ergibt das Vorhandensein einer nur leichten, 5 Prozent des Bestandes nicht übersteigenden Schweinepestinfektion keine Kontraindikation zur Vornahme einer Simultanimpfung in dem betreffenden Bestande. Der Impferfolg gestaltet sich nämlich in solchen Beständen nicht ungünstiger als nach einfacher Serumimpfung. Die Feststellung einer nur leichten Infektion soll jedoch mit großer Umsicht, namentlich durch Beobachtung des Bestandes während der Fütterung oder noch zweckmäßiger durch einmalige Temperaturmessung bei sämtlichen Tieren geschehen, ein Verfahren, dessen Ausführung bei gehöriger Hilfe mit einer größeren Anzahl von Thermometern nicht auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt. In sehr großen Beständen kann man sich einstweilen begnügen mit einer Temperaturmessung bei 50—100 Tieren. Mit Rücksicht auf die hierbei unvermeidliche Beunruhigung der Tiere sollen nur 40 Grad C übersteigende Temperaturen als fieberhaft erachtet werden. Eine Simultanimpfung in stärker infizierten Beständen sollte nur auf besonderen Wunsch des Besitzers

vorgenommen werden, da bedeutendere Impfverluste nicht ausgeschlossen sind. Die nach einer vorschriftsmäßigen Simultanimpfung in 9—12 Tagen auftretenden Erkrankungen hören 17—18 Tage nach der Impfung auf, worauf zur Steigerung der aktiven Immunität die Vornahme einer Impfung mit Virus allein am 20. bis 21. Tage nach der Simultanimpfung empfehlenswert erscheint. Sollten aber vom 18. Tage nach der Simultanimpfung noch weitere Erkrankungsfälle zur Schau kommen, so muß man von einer Virus-Impfung unbedingt Abstand nehmen.

Wie bekannt, zieht die Simultanimpfung in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle kaum irgendwelche Verluste nach sich. Ausnahmsweise stellen sich aber gegen Ende der dritten oder beim Beginn der vierten Woche nach der Simultanimpfung neuere Erkrankungen ein und können beim Unterlassen einer Serumimpfung recht viele Todesfälle zur Folge haben. Die Ursache einer solchen Nach- und Sekundärreaktion ist noch wenig bekannt. In einem Teil der Fälle dürfte es sich um die Wirkung einer der Impfung folgenden außerordentlich starken Infektion handeln, wenn man die simultan geimpften Tiere nach 20 bis 21 Tagen nicht noch mit reinem Virus nachgeimpft hat. Nach dem Auftreten von Nach- und Sekundärreaktionen soll eine reine Virusimpfung vorgenommen werden, falls die Zahl der Erkrankungsfälle nicht 5 Prozent des Bestandes übertrifft, während man bei zahlreicheren Erkrankungen die Serumimpfung vornehmen wird. Marek.

Bourmer und Doetsch: Über eine durch den *Bacillus enteritidis* Gärtner hervorgerufene feuchthafte Erkrankung in dem Rinderbestande des Gutes Karthäuserhof bei Koblenz und eine durch Käse verurfachte Übertragung auf den Menschen. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene 1928, Bd. 38, S. 389.)

Bourmer und Doetsch berichten über mehrere Fälle von Gärtner-Infektion bei Kühen und Kälbern des genannten Bestandes, die zu Notchlachtungen geführt hatten. Hierbei wurden durch die bakteriologische Untersuchung Gärtner-Bakterien auch im Euter und der Milch einwandfrei festgestellt. Im Anschluß an die Erkrankungen der Kühe traten alsbald etwa 80 Gärtner-Infektionen bei Menschen nach dem Genuß von Klatschkäse auf, die indeffen keine Todesfälle zur Folge hatten. Die Seuche wurde durch ein aus dem Karthäuserhof stammendes Kalb in das Kloftergut Maria-Laach verschleppt, wo ebenfalls mehrere Kälber der Gärtner-Infektion zum Opfer fielen.

Bourmer und Doetsch fassen die Ergebnisse ihrer Untersuchungen und Beobachtungen, wie folgt zusammen:

1. Die geschilderte Seuche mit anschließenden Erkrankungen zeigt zunächst, wie außerordentlich wichtig die durch einen Fachtierarzt vorgenommene bakteriologische Untersuchung der Milch ist.

2. Der Fleischbeschaubefund beweist, daß der pathologische Befund bei Enteritis-Infektion sehr verschieden sein kann. Im allgemeinen werden neben der Gastro-Enteritis fester Milztumor, Schwellung der Leber mit Miliar-Nekrose, Veränderung der Niere und leichter Ikterus festgestellt. Die Veränderungen in der Leber können so gering sein, daß sie ohne Zuhilfenahme der Lupe bei der Fleischbeschau leicht übersehen werden können. Im Schlachthof Koblenz wird deshalb in Zukunft jede geschwollene Kälberleber unter Zuhilfenahme einer Lupe untersucht. Der meistens vorhandene Milztumor kann fehlen.

3. Für die bakteriologische Untersuchung ist wichtig, daß auch die Leber mit eingedickt wird; denn in mehreren hier beobachteten Fällen wurden Gärtnerkeime nur in diesem Organ festgestellt.

Aus diesem Grunde fügen wir dem von dem die Untersuchung beantragenden Tierarzt gemäß Verfügung des Herrn Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom 24. Dezember 1926, Nr. V 12023, einzufendenden An-

tragsformular für die bakteriologische Fleischbeschau neben den angegebenen Proben noch bei: „und 1 Stück Leber, Spiegelscher Lappen“. Edelmann.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Krallinger, H. F.: 1. Über die Chromosomenzahl beim Rinde, sowie einige allgemeine Bemerkungen über die Chromosomenforschung in der Säugetierklasse. (Anatom.

Anzeiger 1927, Bd. 63, Erg.-Heft S. 209—214); 2. Chromosomen der Haustiere. (Züchtungskunde 1927, Bd. 2, H. 9, S. 441—446.) Ref. von v. Patow in Zeitschr. für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie 1928, Bd. XI, H. 3, S. 456 folg.

Nach den neuesten Forschungen beträgt die diploide (jeweils ein Paar) oder haploide (nur ein Paarling) Zahl der Chromosomen: beim Pferd (Painter 1924) 57—60 ♂ (30 ♂), Rind (Krallinger 1927) ca. 60 ♂ (30 ♂); Schwein (Hange 1917) 40 (20), Hund (Painter 1925) 50—52, Katze (Winnawater 1920) 30 ♀, 35 ♂ (17 und 18 ♂), Kaninchen (Painter 1927) 44 ♂, Meerschweinchen (Stevens 1911) 56 ♂ (28 ♂), Huhn (Akkinga 1927) 32 ♀, Taube (Oguma 1927) 62 (31). Für Schaf und Ziege fehlen bestimmte Angaben. Dabei fanden sich Heterochromosomen, d. h. nach Größe, Form und Färbbarkeit unterscheidbare Geschlechtschromosomen beim Pferd Xy ♂ (?), Schaf (Jordan) X, Hund X ♂ (Malone 1918, Harvey, Wilson), Katze X ♂, XX ♀, Kaninchen Xy ♂, Meerschweinchen Xy ♂, Huhn Xy ♀, XX ♂, Taube XX ♂, X ♀ (bei Vögeln also umgekehrt wie bei Säugetieren). Die Verklumpung der Chromosomen erschwert die Arbeit sehr, weshalb die Chromosomenzahl bei jeder Haustierart mit jeder neuen Untersuchungsarbeit stieg. Die Spermatogenese bot bisher das beste Material. Die Oogonie ist, besonders beim Rinde, im embryonalen Leben so früh abgeschlossen, Nachschübe an Keimmateriale sind so spärlich oder so rasch verlaufend, daß Krallinger oogoniale Zählungen nicht glückten. Ein sicherer Nachweis von Heterochromosomen gelang bei den größeren Haustieren bis jetzt noch nicht. Doch liegt nach Ansicht des Referenten v. Patow kein Grund vor, daran zu zweifeln, daß diese Haustiere sich diesbezüglich anders verhalten als ihre Verwandten. Die geschlechtsgebundene Vererbung zeigt uns, daß bei den Säugern das männliche Geschlecht, bei den Vögeln das weibliche Geschlecht heterogametisch ist. A. Hink.

Mangold, E.: Neue Untersuchungen über die Verdauung der Wiederkäuer. (Aus „Naturwissenschaften“ 1928, 16. Jahrgang, H. 5, S. 65—73; ref. von v. Patow in Zeitschr. für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie Bd. XI, H. 3, S. 481.)

Neben den mechanischen Hilfsmitteln (Mahlzähnen, Wiederkauen) dienen Bakterien der Aufschließung der Zellulose und deren Zerlegung in Kohlensäure, Methan, organische Säuren und allenfalls auch Wasserstoff. Für das Tier nutzbar sind nur die organischen Säuren. Der Hauptwert der bakteriellen Zelluloseauflösung besteht nicht in der Nutzbarmachung der Rohfaser selbst, sondern in der Zugänglichmachung des Eiweißes in den Pflanzenzellen. Im Panfen werden die Kleberzellen vom Hafer in 16 bis 18 Stunden, die von Weizen und Roggen in 22—24 Stunden, die von Gerste in 30—32 Stunden von Bakterien aufgelöst. Für die Eiweißzufuhr kommen die Bakterien kaum in Betracht; ihre Menge beträgt nur 10—11 Prozent des Panfeneiweißes. Die Synthese von Eiweiß aus Amidinen durch Bakterien ist nach Mangold zweifelhaft. Die im Panfen lebenden Infusorien (nach neuen Untersuchungen 20 Prozent des Panfeneiweißes), die zur Verdauung offenbar die Hilfe der Bakterien beanspruchen, zeigen einen lebhaften Kohlehydratstoffwechsel (Stärke, Zucker und grüne Pflanzenteile), während der Eiweißstoffwechsel noch der Klärung bedarf. Das Infusorieneiweiß hat aber offenbar keinen merklichen Anteil am Gesamt-Panfeneiweiß. Versuche an Hammeln und Ziegen ergaben, daß dem Hauben-Panfen-

vorhof die Bedeutung einer selbständigen Magenabteilung zukommt, daß der linke Bauchvagusstamm der motorische Nerv für den Pansen, der rechte für die vier anderen Magenabteilungen und für den Pylorus ist. Das Wiederkauen ist weniger ein willkürlicher Akt als eine Folge der Übertragung mechanischer Erregungen vom vollen Magen aus auf die Lungen — Magennerven — Gehirn — Kau-muskulatur und wird auch ähnlich beendet. A. Hink.

van Gelder, R. H.: **Blutbeschaffenheit und Körperbau bei Hochgebirgs- und Niederungsvieh.** (Inaugural-Dissertat.

Utrecht 1927.) (Ref. von W. Schäper in Zschr. für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie 1928, Bd. XI, H. 3, S. 470.)

Bei Schweizer Braunvieh im Hochgebirge (Engadin) ist der Hämoglobingehalt des Blutes im Sommer beträchtlich höher als im Winter, während bei schwarzbunten Holländern die Januar-Februar- und August-September-Untersuchungen nur geringe Unterschiede in den Hämoglobinwerten ergaben. Die jungen Rinder weisen hohe Hämoglobinwerte auf, die mit dem Alter werden fallen, um im Alter von 9 Jahren wieder anzusteigen und bei der dann erreichten Höhe zu verbleiben. Die Erythrozyten zeigten kein ähnliches Verhalten, auch war kein Zusammenhang zwischen Hämoglobingehalt und Erythrozytenzahl zu ermitteln. Dagegen zeigten spezifisches Gewicht und Eiweißgehalt des Blutes eine positive Korrelation. Zwischen den ermittelten Blutwerten und den Körpermaßen (Länge, Brusttiefe, Brustbreite) bestehen korrelative Beziehungen; die Korrelationskoeffizienten sind aber so klein, daß sie für die praktische Zucht nicht verwertbar sind. A. Hink.

Yamane, J.: **Über die Atresia coli, eine letale, erbliche Darmmißbildung beim Pferde und ihre Verbindung mit Gehirngliomen.** (Aus Zeitschr. für indukt. Abstammungs- und Vererbungslehre 1927, Bd. XLVI, H. 2, S. 188—207, ref. von v. Patow

in Zeitschr. für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie 1928, Bd. XI, Heft 3, S. 463.)

Y. hat in einer japanischen Provinz bei Fohlen 25 Fälle einer Mißbildung festgestellt, die in einer Unterbrechung des Kanals des Colon ascendens bestand und immer zum Tode führte. In allen Fällen, mit Ausnahme eines (aus der Literatur) waren gleichzeitig Hirngliome, häufig verbunden mit Wasserkopfbildung, vorhanden. Alle Fälle waren erblich biologisch zurückzuführen auf einen 1886 aus Amerika eingeführten Percheronhengst. Es handelte sich also um einen rezessiven Letalfaktor, der mit einem andern, die Hirnmißbildung verursachenden Rezessivfaktor gekoppelt war. A. Hink.

Knuth, P. und W. David: **Beobachtungen und Untersuchungen über Spirillen als Ursache ansteckenden Verwerfens beim Rind und Schaf.** (Aus dem Institut für Tierhygiene der Preuß. landwirtschaftlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Landsberg a. W.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten d. Haustiere 1928, 33, S. 19.)

Knuth und David konnten zwei sporadische Fälle von Vibrionenabortus beim Rind in der nördlichen Grenzmark und in der Neumark in den Jahren 1924 und 1927 beobachten. Als gemeinsames hervorstechendes Merkmal wurden bei den beiden untersuchten Feten starke Fibrinausscheidungen in der Bauch- und Brusthöhle in Form von Flocken, Fetzen und zusammenhängenden Häuten vorgefunden. Die Züchtung des Erregers (Vibrio fetus) gelang in beiden Fällen auf Agar mit Zusatz von Kaninchenblut zum Kondenswasser bzw. auf Blutagar (Schafblut). In drei größeren Schafherden der südlichen und nördlichen Grenzmark und der Neumark wurden Spirillen als Ursache ansteckenden Verwerfens in den Jahren 1926 und 1927 festgestellt. Es verlammen 7 bis 10 Prozent der Mutterstafeln, in der Mehrzahl jüngere Tiere. Das Verlammen wiederholte sich bei der 1926 befallenen Herde in der nächsten Trächtigkeitsperiode nicht; in zwei Herden hörte das Verlammen ohne Behandlung von selbst auf. Der Befund an den Eihäuten und an den Feten ist nicht besonders charakteristisch. Die Züchtung des Er-

regers gelang in jedem Falle auf Blutagar, mehrere Male auch auf Serumagar und dem gebräuchlichsten Peptonagar. Ein Übertragungsversuch auf ein hochtragendes Schaf mißlang, Meerschweinchen ließen sich sowohl subkutan als auch intraperitoneal infizieren und verwarfen. Einer der beiden zur Verfügung stehenden Spirillensämme (Stamm 2) zeigte im Gegenlatz zu dem zweiten Stamm (Stamm 3) in den Übertragungsversuchen eine geringe Virulenz. Bei natürlich infizierten Schafen ließen sich noch 3—4 Wochen nach dem Verlammen Agglutinine im Blut nachweisen. Ziegler.

Raebiger, Spiegl und F. Schmidt - Hoensdorf: **Versuche zur Übertragung von Geflügeltuberkelbakterien auf Schweine.** (Aus dem Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen in Halle a. Saale.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, S. 35.)

Verff. berichten über Infektionsversuche mit Geflügeltuberkelbakterien auf vier Ferkel. Sowohl durch Injektion von Geflügeltuberkelbakterien in die Ohrvene als auch durch Einführung per os gelang die Übertragung auf zwei Ferkel, ebenso konnten durch Verfütterung einer tuberkulösen Geflügellunge sowie durch Zusammenbringen mit tuberkuloseinfizierten Tieren zwei weitere Ferkel ohne Schwierigkeit infiziert werden. Auch in diesen Versuchen konnte bestätigt werden, daß die Tiere trotz der Infektion mit Geflügeltuberkelbakterien sich gut entwickelten und starken Futteranatz zeigten. Die tuberkulösen Veränderungen blieben, abgesehen von submiliaren Herden in Lunge und Leber bei Ferkel 1, in der Hauptfläche auf die Gekröslymphknoten beschränkt. In Übereinstimmung mit den Feststellungen aus Nordamerika heben die Verff. hervor, daß Klagen über Gesundheitschädigungen in den Schweinebeständen auf ausdrückliches Befragen selbst in solchen ländlichen Betrieben nicht angegeben werden konnten, in denen erhebliche Prozentsätze des Geflügels tuberkulös waren. Diese Tatsache deckt sich weiterhin vollkommen mit den auf den Schlachthöfen gemachten Feststellungen, wonach mit lokalisiert gebliebener Kehlgangs- und Gekröslymphknotentuberkulose geschlachtete Schweine gut genährt zu sein pflegen. Ungeachtet dessen ist eine Verhütung der Schweinetuberkulose allein aus hygienischen Gründen angezeigt. Die Vorbeugung ist leicht und wirksam in der Weise durchzuführen, daß man eine Aufnahme von Geflügelkot durch Schweine bzw. die Berührung der Geflügel mit den Schweinebeständen verhütet, um eine Ansteckung der letzteren auszuschalten. Anschließend folgt eine eingehende Darstellung des histologischen Befundes der in der obigen angetroffenen pathologisch-anatomischen Veränderungen. Bei der Untersuchung des ersten Ferkels zeigte sich, daß die submiliaren Herde in der Lunge und Leber des intravenös infizierten Ferkels vorwiegend aus epitheloiden Zellen bestehen, denen keine bzw. nur wenige Riesenzellen sowie Lymphozyten beigemischt sind. Die Tuberkulose der Lymphknoten erweist sich als infiltrierende Epithelioid-Zellwucherung unter mäßiger Beteiligung von Riesenzellen. Das Auftreten dieser Zellformen ist im wesentlichen an den Verlauf der Lymphbahnen gebunden, von deren Retikulum die Zellwucherung ausgeht. Das lymphatische Gewebe wird durch die allseitig vordringenden epitheloiden Zellen verdrängt, zeigt aber selbst keinerlei Reaktion (Plasmazellenwucherung). An verschiedenen Stellen sieht man Verkäsungsherde. Tuberkelbazillen sind durchweg nur in sehr geringer Anzahl vorhanden. Bei den unter Bedingungen, wie sie der natürlichen Ansteckung entsprechen, infizierten Versuchsferkeln 3 und 4 finden sich vorwiegend regressive Veränderungen von erheblicher Ausdehnung in den Mesenteriallymphknoten. Tuberkelbazillen sind auch in diesen Fällen nur spärlich vorhanden. Dieser geringe Gehalt an Tuberkelbakterien ist demnach anscheinend auch bei

der durch den Typus avium verursachten Form der Schweinetuberkulose die Regel, wenigstens soweit es sich um sonst gesunde Tiere handelt. Jedenfalls spricht das Fehlen bzw. seltene Vorkommen von Tuberkelbazillen keineswegs gegen eine Infektion mit dem Erreger der Geflügeltuberkulose. Einer besonderen Erörterung bedürfen die histologischen Befunde bei dem während der Versuchsdauer an Viruspest erkrankten Ferkel 2. Eine allen Bildern gemeinsame und bereits bei einem flüchtigen Vergleich der Präparate auffallende Erscheinung ist in diesem Falle der auffallende Reichtum der Gewebe an Tuberkelbakterien. Daraus geht hervor, daß die einmalige intestinale Infektion mit Tuberkelbakterien unter dem Einfluß einer anderen schweren Infektionskrankheit (Viruspest) zu einer ungeheuren Vermehrung der Krankheitserreger in den Organen und dabei zu einer tuberkulösen Allgemeininfektion schwerster Art führen kann, ohne daß es zu auffallenden, makroskopisch als Tuberkulose erkennbaren Veränderungen kommt. Diese Erkenntnis legt die Frage nahe, ob nicht auch andere Krankheiten, insbesondere solche des Intestinaltraktes (Darmkatarrhe nichtinfektiöser, infektiöser und parasitärer Natur), ferner die als Haltungskrankheit weitverbreitete enzootische Pneumonie und die daran sich anschließende bakterielle Infektion in gleicher Weise der Ausbreitung einer Fütterungsinfektion mit Tuberkelbazillen des Typus avium, besonders wenn dieselbe wiederholt stattfindet, den Weg bereiten könnte und ob der unter diesen Umständen an die Lebensweise im Körper des Schweines angepaßte Erreger dadurch — hauptsächlich für Jungtiere — nicht zu einer größeren Gefahrenquelle wird, als er es bei der direkten Übertragung vom Geflügel auf das gesunde Schwein anscheinend ist.

Ziegler.

v. W e n d t, Georg: Zur Frage der physiologischen Bedeutung des Jods. (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 1/3, S. 129.)

Schilddrüse, Nebenniere und Eierstock gehören zu dem sog. Adrenalfsystem. Die Schilddrüse enthält etwa roomal soviel Jod, die Ovarien etwa zehnmal mehr als die anderen Drüsen. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, daß dieser erhöhte Jodgehalt eine große Bedeutung für die Funktion dieser Organe besitzt. W e n d t geht auf diese Frage hinsichtlich der Eierstöcke noch etwas näher ein. Dabei verweist er zunächst auf die Tatsache, daß bei beträchtlicher Zuführung von eiweißreichem Kraftfutter, wie dies meist in Stallungen mit hoher Milchleistung der Fall ist, erhebliche Überschüsse von nicht verwendbaren Aminofäuren im Organismus entstehen, die die Hormonsekretion der Nebenniere herabsetzen und damit auf dem Wege über die Schilddrüse auch die Tätigkeit der Ovarien stören können. Außerdem scheint es nicht völlig ausgeschlossen, daß der Aminofäureüberschuß auch direkt hemmend auf die Ovarienarbeit einwirken kann. Auf diese Weise würde sich dann die längst bekannte Tatsache erklären lassen, daß bei Milchkühen mit großer Milchleistung häufig Störungen der Geschlechtsarbeit sowie Sterilität auftreten. Da nun Jod in sehr kleinen Dosen stimulierend auf die Tätigkeit der Schilddrüse und damit auch der Eierstöcke einwirkt, wurde der Versuch gemacht, durch Verfütterung einer geeigneten jodierten Mineralfalzmischung die Sterilität zu bekämpfen. Verf. berichtet von sehr guten Erfolgen in dieser Beziehung in Finnland und regt zu weiteren Versuchen an. Ziegler.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

K e l l e r, F.: Das Verhalten tuberkulöser Meerschweinchen gegenüber einer Superinfektion mit sogenannten tierischen Tuberkelbazillen und mit Kulturbazillen. (Aus der Seuchenabteilung des Instituts „Robert Koch“. — Leiter: Prof. B. Lange.) (Zschr. für Hygiene 1928, 108, S. 605.)

Der Verf. versuchte bei der Nachprüfung der Untersuchungen von Toyoda und Yung-nen-Yang festzustellen, ob überhaupt bei Verwendung von Kulturbazillen, andererseits von tierischen Bazillen zur Superinfektion Unterschiede irgendwelcher Art hervortreten. Entgegen den Befunden von Toyoda und Yang ist es ihm mit der von diesen Autoren angegebenen Versuchsanordnung nicht gelungen, gesetzmäßige Unterschiede in der Reaktion tuberkulöser Meerschweinchen gegenüber Kulturbazillen einerseits, tierischen Bazillen andererseits, aufzufinden; die gleichzeitig an demselben Tier erfolgte intrakutane Verimpfung von Tuberkelbazillen aus Organ und Kultur ließ beachtenswerte Unterschiede überhaupt niemals erkennen. Wenn in den Versuchen eine stärkere Reaktion auf tierische Bazillen zum Teil vorhanden war, zum Teil umgekehrt eine stärkere auf Kulturbazillen, so müssen diese wechselnden Befunde als Zufälligkeiten erklärt werden, die ihre Ursachen haben in der niemals ganz gleichmäßig ausfallenden subkutanen Verimpfung und vor allem in den Verschiedenheiten der individuellen Resistenz der Tiere. Auch die Befunde von Toyoda und Yang glauben die Verf. hierauf zurückführen zu müssen. Schließlich weisen die Verf. noch darauf hin, daß nähere Untersuchungen von B. Lange und Lydtin über die Virulenz von Tuberkelbazillen in tierischen Organen und von Kulturbazillen, die zur Zeit noch nicht abgeschlossen sind, bei der Infektion gesunder Meerschweinchen bisher keine Virulenzunterschiede zwischen tierischen und Kulturbazillen haben erkennen lassen. Man muß nach allen Erfahrungen über die experimentelle Superinfektion doch wohl annehmen, daß solche Unterschiede sich auch bei der Erstinfektion hätten nachweisen lassen, falls eine stärkere Wirkung tierischer Bazillen bei der Superinfektion vorhanden wäre.

Ziegler.

H u c k, W. und W. K r a m e r: Die Kultur der Tuberkelbazillen (Typ. bov.) und ihre diagnostische Bedeutung in der pathologischen Anatomie. (Aus dem Laboratorium des Schlacht- und Viehhofes der Stadt Magdeburg.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 1/3, S. 77.)

Die sehr günstigen Ergebnisse, die H o h n u. a. mit der Kultur des Tuberkelbazillus (Typ. hum.) erzielten, veranlaßten die Verf., auch die Züchtung des Typus bovinus an umfangreichem Material zu versuchen. Neben dem Schwefelsäureverfahren wurde das Antiforminverfahren zu vergleichenden Untersuchungen herangezogen. Entsprechend den Angaben Meyers wurde nicht erst die makroskopische Kultur abgewartet, sondern Verf. versuchten, durch mehrfache mikroskopische Ausstriche aus der angelegten Kultur zur schnelleren Diagnose zu gelangen. Es wurden nur Organe verwendet, die mit frischer Tuberkulose behaftet waren, außerdem erweichte Herde und die in den Bronchioli befindliche schleimig-eitrig-sekretartige Menge. Daneben wurden Teile von tuberkulösen Uteri verarbeitet. Bei diesen handelte es sich um stecknadelkopfgroße, grauweiße oder gelbliche Herde in der Gebärmutterflohnhaut, die mittels Schere und Pinzette sorgsam herausgehoben wurden. Die Ergebnisse waren folgende: Das Schwefelsäureverfahren zwecks Vorbehandlung von Organmaterial zur Züchtung von Tuberkelbazillen übertrifft in seinen Ergebnissen die Antiformin- und Chromsäuremethode. Doch wird durch das Säureverfahren die Bedeutung des Meerschweinchenversuchs nicht herabgesetzt. Zwecks praktischer Auswertung der Tuberkelbazillenzüchtung ist es empfehlenswert, den mikroskopischen Nachweis nach Meyer zu führen. Die Zeit bis zum makroskopisch sichtbaren Wachstum des Typ. bov. ist zu lang, als daß eine praktische Anwendung für diagnostische Zwecke in Frage kommt.

Ziegler.

v. Darányi, J.: **Haltbare Modifikation des Fuchsinährbodens nach Endo.** (M. m. W. 1928, S. 1001.)

Endo-Agar ist wegen des guten Wachstums der Bakterien und wegen des lebhaften Farbenunterschiedes zwischen Coli- und Typhuskolonien besonders beliebt. Außerdem ist er auch bei künstlicher Beleuchtung verwendbar. Der Nährboden hat nur den einen Nachteil, nämlich, daß er immer frisch bereitet werden muß, da die anfängliche Farblosigkeit schon nach einigen Tagen in Rot übergeht. Dies veranlaßte den Verf., anstatt des gewöhnlichen Fuchsin, Fuchsin S in reduzierter Form zu verwenden. Als komplementäre Farbe wurde noch Chrysoidin hinzugefügt. Bei der praktischen Herstellung des Nährbodens geht man am besten von einer Stammlösung aus, die sich folgendermaßen zusammensetzt: In ein Glas gibt man zu 8 ccm 10prozent. Natriumkarbonatlösung 2 ccm gefättigte (ca. 1prozentige) alkoholische Chrysoidinlösung, 0,3 Gramm Natriumsulfit und 1,2 Gramm Fuchsin S Grüber. Nach dem Vermischen reduziert das Natriumsulfit das Fuchsin S schon kalt. Man gibt sodann 12 Gramm wasserfreie, chemisch reine Laktose (Merck) und 80 ccm destilliertes Wasser hinzu, worauf das Ganze durch 1—2 Minuten langes Kochen gelöst wird. Von dieser Stammlösung mischt man einen Teil mit 10 Teilen siedenden Agarnährbodens, der sofort zu Platten ausgegossen wird. Die anfänglich rötliche Farbe verschwindet beim Abkühlen vollständig. Nur wenn der Agar nicht die entsprechende Alkalität besaß, macht sich nach dem Erkalten eine rötliche Farbe bemerkbar. Ebenso ist eine längere Erhitzung sowohl der Stammlösung wie des fertigen Nährbodens zu vermeiden. Colibazillen wachsen auf diesem Nährsubstrat in lebhaft roten Kolonien, Typhus und Dysenterie nehmen eine gelblichgrüne Farbe an. Infolge seines hohen Zuckergehaltes gedeihen Typhusbazillen auf dem Nährboden sehr gut. Er wurde von J. Csontos, Dozent an der Tierärztlichen Hochschule in Budapest mit Vorteil zur Feststellung der weißen Geflügelruhr benutzt. Wegen der Einfachheit seiner Bereitung und wegen der Haltbarkeit der Stammlösung eignet sich diese Modifikation des Endo-Agars ganz besonders für kleinere Laboratorien. Carl.

Yakimoff, W. L.: **Der Kampf gegen die Piroplasmose der Rinder im Petrograder (Leningrader) Gouvernement im Jahre 1926.** (Artikel 4.) (Aus der Protozoologischen Abteilung des Veterinär-Bakteriologischen Institutes zu Petrograd Leningrad. — Leiter der Abteilung: Prof. W. L. Yakimoff.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 4, S. 247.)

Yakimoff berichtet über die weiteren Ergebnisse des Kampfes gegen die Piroplasmose im Leningrader Gouvernement. Es wurde mit folgenden Präparaten gearbeitet: mit Salzen des Silbers (Ichthargan, Protargol und Albargin), mit Salzen des Arsens (Arrhenal) und mit Salzen des Silbers und Arsens (Silbernovoarselan) sowie mit einer Verbindung von Silber und Tripoflavin (Argoflavin). Am meisten wurde angewandt: Ichthargol (46,2 Prozent), ihm folgen Arrhenal (32,5 Prozent) und Protargol (17,6 Prozent). Als bestes Präparat erwies sich Ichthargol (7,1 Prozent Sterblichkeit), ihm folgt Arrhenal (9,6 Prozent Sterblichkeit); Protargol ergab 13,0 Sterblichkeit. Was Albargin und Argoflavin anbelangt, so sind weitere Beobachtungen über die Wirkung dieser Präparate wünschenswert. Aus den Feststellungen des Verf. ergibt sich, daß die früher ausgesprochene Vermutung, daß die Salze des Silbers bei der Behandlung der Piroplasmose spezifisch sein müssen, richtig ist. Die beste Methode der Anwendung der genannten Mittel ist die Einspritzung unter die Haut und noch besser diejenige in das Blut. Die letztere Methode ist vorzuziehen, weil das Präparat dort eingeführt wird, wo die Parasiten leben, d. h. die Piroplasmen und es kommt deshalb die Wirkung schneller zur Geltung. Da die Silbersalze usw. örtlich stark reizend wirken, müssen sie intravenös injiziert werden, Arrhenal

dagegen kann man subkutan schmerzlos einspritzen. Deshalb kann die Behandlung mit Arrhenal auch dem Hilfspersonal überlassen werden. Das billigste Mittel ist das Ichthargan. Schließlich stellt Verf. noch fest, daß die im September 1926 in Moskau abgehaltene Allrussische Veterinärwissenschaftliche Organisationskonferenz die Erfolge seines Kampfes gegen die Piroplasmose bestätigte und daß dieselbe, nachdem sie die mit der Anwendung der chemotherapeutischen Präparate Trypanblau, Ichthargan und Arrhenal erzielten Resultate geprüft haben, dieselben als die gegenwärtigen Heilmittel im Kampfe mit den russischen Piroplasmen empfiehlt. Ziegler.

Turandin, F. A.: **„Bacterium paraviscosum equi.“**

(Aus dem Militär-veterinär-Mikrobiologischen Institut Leningrad. — Leiter: Prof. B. L. Patzewitsch.) (Zschr. für Infekt.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 4, S. 266.)

Bei den Versuchen, eine Reinkultur des Erregers der Lymphangitis epizootica zu erhalten, gelang es dem Verf. in einem Fall, die Kultur eines Schleimmikroben, dessen Form bisher unbekannt war, auszufcheiden. Die weitere Untersuchung zeigte, daß dieser Mikroorganismus dem Bact. viscosum equi nahesteht, so daß Verf. ihn deshalb Bact. paraviscosum equi nannte. Er unterscheidet sich von letzterem hauptsächlich durch die starke Vergärung von Kohlehydraten. Das Bact. paraviscosum equi ist der Erreger eines eitrigen Prozesses beim Pferde, worauf de Blieck auch betreffs des B. viscosum equi hinweist. Es ist möglich, daß viele sekundäre Veränderungen, die bei der epizootischen Lymphangitis vorkommen, durch diesen Mikroben verursacht werden. Dafür spricht auch die Tatsache, daß man ihn im Eiter von an Lymphangitis epizootica erkrankten Pferden findet. Nach Analogie mit dem B. viscosum muß ferner die Möglichkeit angenommen werden, daß auch das B. paraviscosum equi eine Rolle bei der Pathogenese des enzootischen Aborts der Stute und der Polyarthrititis beim Fohlen spielt. Ziegler.

Geflügelkrankheiten.

Hartwig, H.: **Zur Bekämpfung der Mallophagen (fog. Läufe) beim Huhn mit Natriumfluorid.** (Aus dem Veterinär-Hygienischen Institut der Universität Leipzig.) (B. t. W. 1928, S. 521 bis 522.)

Die Mallophagen des Hausgeflügels sind insofern nicht bedeutungslos, als sie die Tiere beunruhigen und einen Rückgang des Nährzustandes und der Leistung verursachen. Die Parasiten gehen leicht auf den Menschen über und belästigen ihn durch Juckreiz. Im Institut des Verf. war der ganze Hühnerbestand durch Einschleppung von Federlingen befallen, was außerdem an dem unordentlichen Federkleid und an den von Federn entblößten Stellen am Rücken und an der Brust erkennbar war. Bei näherer Untersuchung konnten die Parasiten und deren Eier an allen Stellen des Körpers festgestellt werden. Es waren zwei Arten vertreten: Meopon biscriptum und M. pallidum. Das Vorkommen bot dem Verf. erwünschte Gelegenheit die von amerikanischen Autoren angegebene, früher bei Tauben erprobte Behandlung mit Natriumfluorid zu versuchen. Zu diesem Zwecke wurde in einem geheizten Raume durch Auflösen von 75 Gramm technischen Natriumfluorids in 15 Ltr. Wasser von 40—45 Grad ein 0,5prozentiges Bad hergestellt, in das man die Hühner eintauchte, so daß zunächst der Kopf und ein Teil des Halses aus dem Wasser herausragte. Durch Reiben mit der Hand wurde für eine gute Durchfeuchtung der Federn des ganzen Körpers gesorgt. Schließlich fand zweimaliges Untertauchen des Kopfes und Einreiben der Lösung in die Kopf- und Halsfedern statt. Dauer des Bades bei jedem Tier 40—45 Sekunden. Nachdem das Federkleid getrocknet war, konnten keine lebenden Federlinge mehr

festgestellt werden, und die Hühner akquirierten auch keine neuen Mallophagen, trotzdem sie in ihren undesinfizierten Stall zurückgebracht wurden. Am 70. Tage nach dem Bade waren die Tiere immer noch parasitenfrei. Irgend welcher Schaden infolge der Behandlung war nicht eingetreten. Verff. gelangt zu dem Ergebnis, daß das Natriumfluorid als ein stark und sicher wirksames Mittel zur Bekämpfung federfressender Arachnoiden und Hexapoden angesehen werden muß. Carl.

Zwick, W., O. Seifried und J. Schaaf: **Zur Frage der Schutzimpfung gegen Hühnerpocken und Hühnerdiphtherie.** (Aus dem Vet.-Hygienischen und Tierseuchen-Institut der Landesuniversität Gießen.) (B. t. W. 1928, S. 433—435.)

Verff. sind seit 2½ Jahren damit beschäftigt, einen wirksamen Impfstoff gegen die vorliegende Krankheit zu gewinnen. Nachdem diese Arbeiten nunmehr und zwar zu einem günstigen Abschlusse gelangt sind, werden die Untersuchungsergebnisse bekannt gegeben.

1. Versuche, die immunisatorischen Eigenschaften der Säugetierpocken (Vakzine und Ovine) dem vorliegenden Zwecke dienstbar zu machen, führten zu keinen praktisch verwertbaren Ergebnissen.

2. Durch wechselweise Passagen des Hühnerpockenvirus zwischen Kaninchen und Hühnern (12 Wiederholungen) gelang es zwar, einen wirksamen Schutz gegen eine experimentelle Nachimpfung an Kamm, Kehllappen und Mundschleimhaut mit Hühnerpocken zu erreichen. Einen Erfolg bedeutete dieses Verfahren jedoch nicht, weil die immunisatorische Follikelimpfung eine, wenn auch milde und schnell verlaufende Impfdiphtherie zur Folge hatte. Ununterbrochene Dauerpassagen unter Verwendung von Kaninchen lieferten Material, mit dem ein zwar deutlicher, für praktische Zwecke jedoch nicht ausreichender Impfschutz erzielt werden konnte. Ebenso wenig sicher war der Erfolg bei Übertragung von Hühnerpockenvirus auf Kälber nach vorheriger Passage über das Schaf bzw. das Kaninchen (vakzinisierte Galline), obwohl der Schutz bei der Prüfung unter natürlichen Verhältnissen genügend war.

3. Behufs Gewinnung eines wirksamen Impfstoffes wurde ein neuer, ungewöhnlicher Weg beschritten, nämlich die Züchtung des Hühnerpockenvirus in Symbiose mit Vakzine auf dem Kalbe. Ein Gemisch der beiden Virusarten, auf die Bauchhaut von Kälbern gebracht, führte zur Entstehung von typischen Papeln und Pusteln. Deren Inhalt wurde wiederum mit Hühnerpockenvirus gemischt, auf weitere Kälber verimpft, worauf vom sechsten Kalbe ab der Pustelinhalt für sich weiter übertragen wurde. Mit Material von den Kälbern 1—8 wurden an 47 Hühnern Immunisierungsversuche vorgenommen mit dem Ergebnis, daß nach 3—4 Wochen eine hochgradige Schutzwirkung hervortrat, die in einem eigens dazu hergerichteten Seuchenstalle erprobt wurde.

4. Schließlich versuchten die Autoren noch durch Verimpfung von Taubenpocken eine Immunität gegen Hühnerpocken herbeizuführen. Zehn derartig behandelte Hühner blieben mit kranken Tieren im Seuchenstalle zusammengebracht gesund, während von acht gefunden nicht geimpften Kontrollhühnern sieben an schwerer Diphtherie teilweise auch an Pocken erkrankten und vier Hühner an der Seuche verendeten. Das Taubenpockenvirus stellt also einen zur follikulären Schutzimpfung gegen Hühnerpocken geeigneten Impfstoff dar, der unter natürlichen Verhältnissen einen ausgezeichneten Impfschutz verspricht.

Die in der Praxis mit der vakzinisierten Galline, mit dem Doppelvirus und dem Taubenpockenimpfstoff angestellten Notimpfungsversuche erstreckten sich auf zehn mehr oder weniger stark verseuchte Bestände mit zusammen 1200 Hühnern. Es gelang auf diese Weise, der Seuche in kurzer Zeit Herr zu werden und die Verluste auf ein Minimum herabzudrücken. Ein noch besserer Erfolg läßt sich zweifellos durch eine prophylaktische Impfung gesunder Bestände

am besten in den Monaten Juni, Juli und August erzielen. Die Schutzwirkung beläuft sich wahrscheinlich auf mehrere Monate, vielleicht auch auf ein ganzes Jahr. Carl.

Standesangelegenheiten.

Gruppe Magdeburg-Anhalt im R. p. T.

9. Versammlung am 12. August 1928 in Magdeburg.

Um 10 Uhr eröffnete der Vors. die Versammlung. Es lag ein Antrag der Tierärztlichen Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurfürstentums vor, worin die Gruppe aufgefordert wurde, der T.G.B.K. geschlossen beizutreten; es wurde beschlossen, diesem Ersuchen nicht Folge zu leisten, da die meisten Mitglieder schon durch ihre Zugehörigkeit zum Tierärztlichen Zentralverein für die Provinz Sachsen, Thüringen und Anhalt Mitglieder der T.G.B.K. seien und wahrscheinlich auch unsere neue T.K. in corpore beitreten werde. **Vorbereitung zur Wahl zur Tierärztekammer.** Nach längerer Aussprache kam die Versammlung darin überein, diejenigen Kollegen, die bisher der T.K. angehört haben, wieder zur Wahl in Vorschlag zu bringen, es sind dies die Kollegen Dr. Holzhausen - Gr. Ammensleben, Schulze - Vathen, Rietzsch-Barby, Dr. Borchert-Calbe a. d. Milde und als Stellvertreter Dr. Stettin-Stendal, Dr. Dreisörner-Seehausen (Altmark); Dr. Notz-Förderstedt, Dr. Schmidt-Erxleben. Der Vors. bringt sodann zur Kenntnis, daß mit Wahrscheinlichkeit eine Gemeinschaftsliste für den Reg.-Bezirk resp. die Provinz aufgestellt werden wird und macht den Vorschlag, falls es zur Aufstellung einer solchen Gemeinschaftsliste kommt, für diese einzutreten; dieser Vorschlag findet allseitige Zustimmung. Ein Kollege schildert die Mißstände, die sich aus dem Vorgehen der bakteriologischen Institute auf dem Gebiete der Sterilitäts- und Tuberkulosebekämpfung für die prakt. Tierärzte ergeben hätten; es schloß sich eine längere Aussprache an, bei der auch ein anwesender Vertreter eines Institutes zu Worte kam. Die angeführten Unzuträglichkeiten wurden noch von verschiedenen Seiten mit Nachdruck bestätigt. Schließlich kam man darin überein, sich mit einem Vorschlag an den Reichsverband zu wenden, in dem dieser gebeten werden soll, eine allgemeine Umfrage bei den Tierärzten zu veranlassen, worin die Kollegen, die sich mit der Sterilitätsbekämpfung befassen wollen, aufgefordert werden, sich zu nennen. Die sich aus dieser Umfrage ergebende Liste soll dann den Instituten ausgehändigt werden. Seitens des Kassierers wurde Klage darüber geführt, daß noch viele Mitglieder mit Bezahlung ihrer Beiträge im Rückstande seien, es sei häufig mit großen Schwierigkeiten verbunden, die an die Körperschaften zu leistenden Beiträge rechtzeitig abzuführen. Dr. Kranich, tierärztlicher Berater der Firma E. Merck-Darmstadt, erhält das Wort zu seinem mit Spannung erwarteten Lichtbildervortrag über: **D-Vitamine, ihre Herstellung, Wirkung und Anwendung.** Der überaus interessante und in seinem Inhalt wichtige Vortrag wurde von sehr instruktiven und anschaulichen Lichtbildern begleitet; mitgebrachte Präparate, die das D-Vitamin in seiner Entstehung und Herstellung zeigten, fanden volle Beachtung, auch hatte es sich der Vortragende nicht nehmen lassen, eine Anzahl fertiger Präparate den interessierten Kollegen zur Verfügung zu stellen; eine lebhafte Diskussion schloß den mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag.

Verein Thüringer Tierärzte.

106. Versammlung am Sonntag, den 30. September 1928 in Erfurt.

Anwesend 34 Mitglieder und 7 Gäste. 1. Nach Begrüßung der Versammlung durch den Vors. wurde auf eine Zuschrift der Tierärztlichen Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurfürstentums beschlossen, dieser Gesellschaft als korporatives Mitglied mit einem jährlichen Beitrag von 0,25 RM. für jedes Mitglied beizutreten. 2. Schlachthofdirektor Klaber-Gotha hat seinen Austritt aus dem Vereine angezeigt. Tierarzt Wilken-Geisa (Rhön) wird in den Verein aufgenommen. Es liegt eine Neuanmeldung von Tierarzt Dr. Goedicke, dem Sohne unseres Mitgliedes, vor. Satzungsgemäß kann über die Aufnahme erst in der nächsten Versammlung abgestimmt werden. Unser langjähriges Mitglied, Vet.-Rat Otto-Stotternheim, wird einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. Der Vors. beglückwünscht den Kollegen Otto in einer längeren Ansprache, wobei besonders hervorgehoben wurde, daß Kollege Otto wohl als einziger Praktiker schon lange vor dem Kriege von der damaligen Großherzoglichen Regierung Sachsen-Weimar-Eisenach zum

Vet.-Rat ernannt worden sei. 3. Es wurde folgender Wahlvorschlag für die Tierärztekammer der Provinz Sachsen seitens der Tierärzte des Reg.-Bezirks Erfurt aufgestellt und von der Versammlung einstimmig gutgeheißen: Dr. Schnitzki, prakt. Tierarzt in Nordhausen, Dr. Klauer, prakt. Tierarzt in Kl.-Furra; als Stellvertreter Träger, Ob.-Reg.- und Vet.-Rat bei der Regierung in Erfurt, Rettig, Schlachthof-Direktor in Nordhausen, als Stellvertreter. Alle Herren nahmen die auf sie gefallene Wahl an. 4. Dr. Rautmann: „Die Entwicklung, die Erfolge und die Ausichten der Sterilitätsbekämpfung bei unseren Haustieren.“ Der Vortragende verbreitet sich erst an der Hand von Lichtbildern über die Anatomie und die Physiologie der Geschlechtsorgane des Rindes und kam dann auf die Ursachen für die Störungen im Geschlechtsleben zu sprechen. Redner besprach zuerst das feuchthafte Verkalben, welches u. a. durch den von Bang entdeckten Abortus-Bazillus mit allen seinen Begleitererscheinungen hervorgerufen wird, wie Zurückhalten der Nachgeburt nach Erkrankung der Gebärmutterflehnhaut, des Muttermundes und der Scheidenschleimhaut. Ferner erkrankten der Eileiter und die Eierstöcke mit Bildung von Zysten usw. Dann besprach der Redner die Behandlung dieser Erkrankungen und der Folgeleiden. Die Behandlung hat zunächst die örtlichen Veränderungen im Geschlechtsapparate zu berücksichtigen und sich daher auf lokale Eingriffe zu erstrecken. Hand in Hand mit dieser Therapie muß eine planmäßige Schutzimpfung vorgenommen werden, die jedoch nur unter der Voraussetzung wirklich befriedigende Erfolge zeitigt, daß gleichzeitig Maßnahmen zur Vermeidung einer Neuinfektion zur Durchführung gelangen. Als sehr zweckmäßig zum Herausfinden kranker Tiere hat sich die Blutuntersuchung erwiesen. Ferner wurden der ansteckende Scheidenkatarrh und vor allen Dingen die Tuberkulose an der Hand recht instruktiver Lichtbilder besprochen. Eine besondere Besprechung wurde der mangelhaften Begattung zu teil, welche in Fehlern des Bullen oder auch der Kuh zu suchen sind. Zum Schlusse besprach der Vortragende noch die außerhalb der Geschlechtsorgane befindlichen Ursachen für die Unfruchtbarkeit. Es seien nur genannt zu hohes Alter, Zwillinggeburten, Domestikation, Haltung, Ernährung, Behausung, Bewegung und Überzüchtung. Eine recht lebhafte und interessante Diskussion setzte jetzt ein, an der sich beteiligten: Dr. Pröger, Träger, Dr. Großclaus, Dr. Bierbach, Dr. Schotte, Dr. Bushoff, Goedicke. Das Schlußwort hatten Dr. Rautmann und Dr. Pröger. Wegen schon vorgerückter Zeit mußte die so interessante Diskussion abgebrochen werden.

Der Vorstand:

Träger, Vors. Dr. Loeb, Schriftf.

Verein Kurhessischer Tierärzte.

Herbstversammlung am 8. September 1928 in Kassel.

Der Vors., Ob.-Reg.- und Vet.-Rat Oellerich begrüßt die in der Zahl von 50 erschienenen Mitglieder. Zu Ehren des verunglückten und verstorbenen Kollegen Fritz-Fronhausen erheben sich die Versammelten von ihren Plätzen. Die unter den Kollegen zur Unterstützung seiner Witwe veranstaltete Sammlung hat einen Betrag von 672 Mark ergeben. Der Vors. berichtet, daß die Jubiläumsspende für die Tierärztliche Hochschule Hannover, die sich aus freiwilligen Beiträgen der Mitglieder zusammensetzt, den Betrag von 253 Mark ergeben hat, die er am Festtage dem Rektor der Hochschule überreicht hat. Ferner teilt er mit, daß der Landesverband Kassel für dieselbe Hochschule anlässlich des Jubiläums ein Stipendium von 500 Mark für einen Studierenden aus Hessen-Kassel gestiftet habe. Der Vors. verliest dann ein Dankschreiben des Geheimrats Ellenberger für die überfandten Glückwünsche zu seinem 80. Geburtstag und für die anlässlich seines Ehrentages veranstalteten Sammlungen. Dem Dankschreiben war ein Bild des Jubilars beigegeben. Es wird auf das Rundschreiben der Tierärztekammer hingewiesen, worin die Tierärzte ermahnt werden, ihre Apotheken ordnungsmäßig und sauber zu halten. Auch die Landwirte hätten sich auf Anfrage der Apotheker für das Dispensierrecht der Tierärzte ausgesprochen. Die Gebührenordnung für die Provinz soll von der neuen T.K. festgesetzt werden. Vorläufig wird sie von einer Kommission der jetzigen T.K. vorbereitet. Der Vors. weist dann auf die Einladung zur Versammlung der Naturforscher und Ärzte in Hamburg hin. Als neues Mitglied des Vereins wird Vet.-Rat Dr. Schlote-Hünfeld aufgenommen. Wahlvorschläge für die T.K. verursachen eine lebhafte Diskussion, nachdem der Referent Vet.-Rat Dr. Mench-

Homburg die einschlägigen Bestimmungen des Tierärztekammer-Gesetzes erläutert hatte. Für 255 Mitglieder sind 9 für die Kammer abzuordnen. Von diesen hat der Reg.-Bezirk Kassel 5 Mitglieder zu stellen und zwar 4 Praktiker und einen beamteten Tierarzt. Den Vertreter der Schlachthoftierärzte stellt der Reg.-Bezirk Wiesbaden. Nach dem Vorschläge werden als ordentliche Kammermitglieder gewählt: Dr. Beier-Niederaula, Dr. Lucas-Fulda, Jaehne-Hofgeismar, Dr. Pfanzelt-Guxhagen und Vet.-Rat Dr. Grimme-Kassel. Als Stellvertreter: Dr. Burkhardt-Sontra, Dr. Borchert-Langendiebach, Dr. Feustel-Heinebach, Dr. Güldenhaupt-Neukirchen und Vet.-Rat Dr. Günther-Rothenburg/F. Dr. Karsten spricht sodann über die Streptokokken-Mastitis. Der Vortragende führt etwa folgendes aus: Die durch Euterleiden der deutschen Landwirtschaft jährlich verursachten Schäden werden auf mindestens 250 Millionen Goldmark geschätzt. Während aber die akuten Euterentzündungen, wie sie hauptsächlich durch Keime der Coli-aerogenesgruppe und der Paratyphusgruppe hervorgerufen werden, selten vorkommen und die Euter-tuberkulose trotz ihrer großen Gefahr für die Aufzucht des Jungviehes und für die menschliche Gesundheit den Milchproduzenten nur wenig schädigt, herrschen die durch Streptokokken hervorgerufenen Euterleiden, der gelbe Galt, überall in Deutschland. Die kleinen Bestände sind allerdings weit weniger, nach des Redners Erfahrung zu etwa 3 bis 5 Prozent verfeuchtet als die größeren, wo durchschnittlich 10—30 Prozent der vorhandenen Milchkühe am gelben Galt leiden. Die Infektiosität der Erreger des gelben Galt ist recht verschieden; denn einmal greift das Leiden in den Beständen gar nicht um sich, und andererseits genügt das Einstellen von nur wenigen oder einer galtkranken Kuh in einen bislang unverfeuchten Bestand, um in wenigen Wochen einen hohen Prozentsatz der Milchkühe anzustecken. Akute Fälle der Streptokokken-Mastitis kommen vor, doch überwiegen die scheinend einsetzenden und ebenso verlaufenden bei weitem. Redner ging dann auf das klinische Bild und den Verlauf der Krankheit ein, sowie auf die Veränderungen, welche die Milch erfährt. Beim Ausmelken des ersten Strahles Milch jeden Viertels auf die flache Hand oder besser auf eine schwarze Schale (zur Not auch eine Schiefertafel), wobei insbesondere auf das Vorhandensein feiner Flöckchen zu achten ist, gelingt es, selbst viele leichte Fälle des gelben Galt zu ermitteln. Stets wird das Leiden, auch in den leichtesten, klinisch nicht erfassbaren Fällen durch die Trommsdorffsche Probe erkannt, gegen welche die Chlorfalsbestimmung und die Katalaseprobe an Bedeutung zurückstehen, die aber im Verein mit der Trommsdorffschen Probe recht gutes zu leisten vermögen. In Beständen, in denen der gelbe Galt herrscht, werden fast immer auch Kühe angetroffen, deren Euter sekretionsgestört ist. Die Milch aus sekretionsgestörten Eutervierteln zeigt bei Anwendung der Zentrifugierprobe gleichfalls einen vermehrten, hauptsächlich aus Leukozyten bestehenden Bodensatz, sowie einen vergrößerten Chlorfals- und Katalasegehalt, während sie Galtstreptokokken nicht enthält. Nach des Redners Auffassung stehen die sekretionsgestörten Euterviertel in vielen Fällen mit dem gelben Galt in Beziehung; sie sind einmal der Vorläufer des gelben Galt, in anderen Fällen anscheinend dessen Folge. Die Therapie des gelben Galt ist auch heute noch unbefriedigend. Die großen Erwartungen, welche man auf die Chemotherapie gesetzt hat (Rivanol, Ubersan, Parenchymatol, Selektan usw.) haben sich nicht erfüllt. Die Vakzinetherapie läßt bei bereits erkrankten Vierteln gleichfalls oft im Stich, sodaß von der mechanischen Heilmethode, die in der Hauptsache im fleißigen Ausmelken der frisch erkrankten Viertel besteht, noch die besten Erfolge gesehen werden. Über den Wert der Schutzimpfungen mit Vakzinen läßt sich ein endgültiges Urteil noch nicht fällen, doch tut man gut, sich auch hier keinen überschwenglichen Hoffnungen hinzugeben. Bei dieser Sachlage sind die prophylaktischen Maßnahmen für noch gesunde Bestände, sowie für die noch gefundenen Milchkühe verfeuchter Bestände von besonderer Wichtigkeit. Die Vorbeugungsmaßnahmen sind auf einem vom Tierfeucheninstitut zu Hannover herausgegebenen Merkblatte angegeben, das jedem Tierarzt auf Wunsch kostenlos übersandt wird. Wenn in einer von den Molkereien eingefandten Gesamtmilchprobe eines Bestandes Galtstreptokokken oder vermehrter Leukozytengehalt nachgewiesen werden, erfolgt durch den zuständigen Vertrauens-tierarzt die klinische Euteruntersuchung aller Milchkühe. Schon dadurch, daß die Milch aus den klinisch kranken oder verdächtig erkrankten Vierteln der Marktmilch nicht beigegeben wird, tritt eine ganz wesentliche Besserung der Konsummilch ein. Um eine genaue

Überficht über die Gefundheit der Euter galtverfeuchter Bestände zu gewinnen, bleibt nichts weiter übrig, als von jeder Kuh eine aus allen vier Strichen genomene Probe zur Unterfuchung einzufenden. Die starkveränderte Milch darf natürlich höchstens als Futter für Schweine und Kälber, allenfalls nach dem Kochen, Verwendung finden. Die leicht veränderte oder nur verdächtige Milch wird nach Entfernung der ersten Strahlen aus jedem Viertel in befonderen Gefäßen an die Molkerei geliefert, wo sie nach Erhitzung oder Hochpasteurisierung für die Verbutterung Verwendung finden kann. Sobald die Landwirte die wenig veränderte Galmilch noch zur Verbutterung verwenden können, finden sie sich mit der tierärztlichen Kontrolle leicht ab. Wichtig ist, die Milchviehbesitzer, welche Vorzugsmilch herstellen wollen, darauf hinzuweisen, von jeder Kuh eine Milchprobe bakteriologisch unterfuchen zu lassen, ehe sie der Produktion von Vorzugsmilch näher treten, insbesondere, bevor teure Kühlanlagen, Flaschenfüllmaschinen usw. angeschafft werden. Zum Schluß ging der Redner noch kurz auf die Ausführung der tierärztlichen Stallkontrolle ein. Der Vors. dankte im Namen des Vereins für den klaren und verständlichen Vortrag, der lebhaften Beifall der Versammlung erntete. An den Vortrag schließt sich eine rege Diskussion, an der sich die Kollegen Beier, Friedrich, Schultz jun., Oelrich, Schlote und Lucas beteiligen.

I. A.: Dr. Rathje, Schriftf.

Verschiedene Mitteilungen.

50jähriges Doktor-Jubiläum von Geheimrat Arnold.

Es ist im Leben eines Gelehrten ein feltenes Ereignis, wenn er die 50. Wiederkehr des Tages erleben kann, an dem er die erste akademische Würde, den Doktorgrad, sich durch eigene wissenschaftliche Arbeit erworben hat. Am 8. November d. Js. werden es 50 Jahre, daß Carl Arnold als Schüler des berühmten Chemikers Bunsen in Heidelberg zum Dr. phil. promoviert wurde. Diefem hervorragenden Lehrer verdankt Arnold die glänzende experimentelle Geschicklichkeit, die er in feinen Kollegs jahrzehntelang zum Ausdruck brachte. Diefem feinem Lehrer verdankt er vielleicht auch die außergewöhnliche Klarheit und die Logik des Aufbaues in feinen Lehrbüchern. Wäre es sonst eingetreten, daß jahrzehntelang Taufende von studierenden Chemikern, Apothekern, Medizinnern und anderen Naturwissenschaftlern sich ihre ersten chemischen Kenntnisse aus dem „Repetitorium“ von Arnold erworben hätten? So ist es eine größere Schülerfchar als bei manchem anderen Gelehrten, die die Pflicht hat, ihren Dank und ihre Verehrung dem Doktor-Jubilar zum Ausdruck zu bringen. Besonders aber für die Tierärztliche Hochschule zu Hannover wird der 8. November ein Tag der Freude fein, weil Carl Arnold seit dem 1. Mai 1880 ununterbrochen als Lehrer an der Hochschule tätig war, zuerst als Dozent für Chemie, Physik und Pharmakognosie sowie als Vorstand der Apotheke der damaligen Tierarzneifchule, dann 41 Jahre lang als Professor für Chemie und Direktor des chemischen Instituts. Auf seine Doktorarbeit hat Carl Arnold noch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten in den verschiedensten Fachzeitschriften folgen lassen und mehrere Bücher herausgegeben, die eine große Verbreitung auch in tierärztlichen Kreisen gefunden haben. Als Dank für diese Arbeit am tierärztlichen Stande wurde ihm am 20. März 1920 von der tierärztlichen Fakultät der Universität München Titel und Würde eines Ehrendoktors der Tiermedizin verliehen.

Wenn die Universität Heidelberg in diesen Tagen das Doktor-Diplom von Carl Arnold erneuert, dann wird die Tierärztliche Hochschule zu Hannover mit ihren ehemaligen Schülern stolz darauf fein, daß der Doktor-Jubilar fast seine ganze wissenschaftliche Kraft ihr gewidmet. Möchte ihm die geistige und körperliche Frische noch lange erhalten bleiben: ad multos annos!

Thaer-Feier an der Landwirtschaftl. Hochschule Bonn-Poppelsdorf.

Im festlich geschmückten großen Saale des Bonner Bürgervereins hatte sich am Samstag eine festliche Gefellschafft eingefunden, um die Feier des 100. Todestages Thaers in würdiger Weise zu begehen. Eingeladen dazu, hatte die Landwirtschaftliche Hochschule Bonn-Poppelsdorf, deren Lehrkörper vollzählig erschienen war. Weiter nahm eine stattliche Zahl von Ehrengästen teil, darunter die Spitzen der Reichs-, Staats-, Pro-

vinzial- und Kommunalbehörden der Rheinprovinz, die Vertreter der verschiedenen landwirtschaftlichen Berufsverbände, die Bonner studentischen Korporationen, zahlreiche Studierende und ehemalige Studierende der Landwirtschaftlichen Hochschule. Magnifizenz Dr. Heimerle schilderte das Leben und Wirken Thaers. Nach ihm ergriff der Landwirtschaftsminister Dr. Steiger das Wort und brachte der Hochschule verschiedene Gaben dar: „Eine Grünlandwirtschaft mit einer Grünlandbeifpielsdomäne“. Ferner sind Erwägungen im Gange, der Landw. Hochschule weitere Versuchsfelder anzugliedern, endlich stellte er Mk. 10000.— als Thaer-Spende für unterstützungsbedürftige Studierende der Landw. Hochschule zur Verfügung (die gleiche Summe auch der Landw. Hochschule in Berlin aus dem gleichen Anlaß). Die Festrede hielt Prof. Dr. Beckmann über „Einhundert Jahre westdeutsches Bauernum“. Anlässlich des Tages wurde folgenden Persönlichkeiten die Würde eines Ehrendoktors der Landwirtschaft verliehen: Dem Preußischen Staatsminister und Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Dr. h. c. Steiger, dem preußischen Staatsminister und Ministerpräsidenten Dr. h. c. Braun, dem Reichsernährungsminister a. D. Rittergutspächter zu Schollene bei Perleburg a. Elbe, K. Schiele, dem Geh. Justizrat Prof. Dr. J. Schumacher zu Köln, dem Landesökonomierat Krewel (im Schmucke des Bandes und der Denkmünze des Ehrenbürgers von Hannover) zu Burg Zievel, dem Rittergutsbesitzer Freiherrn von Loë zu Burg Bergerhausen, dem Universitätsprofessor Dr. Diehl zu Freiburg i. Breisgau, dem Präsidenten des Reichsverbandes der deutschen landwirtschaftl. Genossenschaften, Landesökonomierat Johannsen zu Hannover, dem Prof. Dr. Klebahn zu Hamburg, dem Geheimen Regierungsrat Prof. Dr. Koenig zu Münster i. W., dem Direktor der Moor-Versuchs-Station in Bremen, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Tacke zu Bremen. Landesökonomierat Dr. Krewel teilte beim folgenden Festessen mit, daß man eine Gefellschafft von Freunden und Förderern der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Bonn-Poppelsdorf gegründet habe.

Akademische Nachrichten.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Hans Schmitt, Direktor der med. Tierklinik der Universität München, ist am 3. November 1928 gestorben.

Langemarck-Gedächtnisfeier der Studierenden der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Am Sonntag, den 11. November 1928, 11 h. c. t., findet in der Aula der Hochschule eine Gedächtnisfeier anlässlich der Übernahme der Patenschaft über die Kriegergräber bei Langemarck statt, zu der wir herzlich einladen.

Hannover, den 3. November 1928.

Im Auftrage der Studierenden: A. Thiele.

Ärztlicher Verein Hannover.

Dienstag, den 13. November 1928, 20 Uhr, im großen Saale des Ärztehauses Hildesheimer Straße 23/24, Dr. Riehn: „Erfahrungen mit Vigantol“.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Dr. Eggeling zum Schlachthofdirektor in Parchim (Mecklbg.); Dr. Bruno Böhm in Schwerin zum Obertierarzt am Grenzfchlachthof in Wismar.

Übertragen: Polizeitierarzt Dr. Schömmel in Berlin die kommissarische Verwaltung der Veterinärarztstelle in Warendorf (Bezirk Münster); Tierarzt Dr. Kurth in Harff (Bez. Köln) die kommissarische Verwaltung der Veterinärarztstelle in Lüdinghausen (Bez. Münster); Tierarzt Dr. Ullrich in Münster i. W. die kommissarische Verwaltung der Veterinärarztstelle des Kreises Steinfurt (Bez. Münster).

Verletzt: Veterinärarzt Dr. Suckrow in Niedersessmar, Kreis Gumbrecht (Bezirk Köln) in die Veterinärarztstelle in Waldbroel (Bez. Köln).

Verstorben: Kreistierarzt a. D. Dr. Behm in Gnoien (Mecklenburg); Schlachthofdirektor Geitmann in Parchim (Mecklbg.); Vet.-Rat Schlachthofdirektor a. D. Otto Clausnitzer in Dortmund.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtnr, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung fein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Erstattungsansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 46.

Ausgegeben am 17. November 1928.

36. Jahrgang.

Zur gefl. Beachtung! Der Bezugspreis für das 4. Vierteljahr 1928 wird für die beim Verlag direkt bestellten Abonnements durch Nachnahme erhoben, wenn derselbe nicht bis zum 25. ds. Mts. in unseren Händen ist. — Wir bitten ev. für Einlösung der Nachnahme besorgt zu sein.

M. & H. Schaper, Verlag der „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“.

Die wichtigsten tierischen Parasiten unserer Pelztiere.

Von Privatdozent Dr. C. Sprehn, Leipzig.

Die wichtigsten in Deutschland heimischen Pelztiere sind aus der Gruppe der Insektivoren: Maulwurf (*Talpa europaea*); aus der Gruppe der Rodentien: Biber (*Castor fiber*), Kaninchen (*Oryctolagus cuniculus*), Hamster (*Cricetus cricetus*), Eichhörnchen (*Sciurus vulgaris*) und in einigen Bezirken Deutschlands seit einigen Jahren die Bisamratte (*Ondatra zibethicus*); aus der Gruppe der Carnivoren: Katze (*Felis catus*), Fuchs (*Vulpes vulpes*), Fischotter (*Lutra lutra*), nach einigen Angaben auch noch der Nerz (*Lutreola lutreola*), ferner Dachs (*Meles meles*), Baumarder oder Edelmarder (*Martes martes*), Steinmarder oder Hausmarder (*Martes foina*), Iltis (*Putorius putorius*), Hermelin oder großes Wiesel (*Mustela erminea*) und das kleine Wiesel (*Mustela nivalis*). Als wirtschaftlich wichtig kommen zu dieser Liste noch einige nur in Rußland bzw. Skandinavien oder in außereuropäischen Erdteilen vorkommende geschätzte Pelzträger, zum Beispiel: Wolf (*Lupus lupus*) (Rußland, Asien, Amerika), Luchs (*Lynx lynx*) (Skandinavien, Rußland usw.), Skunk (*Mephitis mephitis*) (Amerika), Zobel (*Mustela zibellina*) (Sibirien), Waschbär (*Procyon lotor*) (Amerika) und das Karakulschaf (Asien).

Ihres kostbaren Pelzes wegen ist diesen Tieren naturgemäß überaus eifrig nachgestellt worden und so gehen viele und gerade die wertvollsten von ihnen langsam dem sicheren Aussterben entgegen. In Erkenntnis dieser Tatsache entstand schon anfangs der achtziger Jahre vorigen Jahrhunderts in Amerika und zwar zuerst in Kanada eine Industrie, die es sich zur Aufgabe stellte, durch planmäßige Gehegezucht diese Tiere vor dem Aussterben zu schützen und durch Weiterzucht in Gefangenschaft die kostbaren Pelze zu gewinnen. Zunächst wurden diese Zuchtversuche am kanadischen Silberfuchs durchgeführt, später zog man in die Zucht andere edle Pelztiere, z. B. Blaufuchs, Nerz, Waschbär, Skunk usw. ein.

Die Edelpelztierzucht in Kanada entwickelte sich schnell zu einer blühenden Industrie. Sie umfaßte nach Schöps (1927) im Jahre 1924 außer 1426 Silberfuchszuchten noch 84 andere Pelztierfarmen. Allein im Jahre 1924 wurden

nach demselben Autor 23 350 Silberfüchse auf den Farmen geworfen, was einen Wert von 2 479 966 Dollar darstellt. Auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika wurde die Edelpelztierzucht bald zu einer blühenden Industrie und 1913 griff die Bewegung auch auf den europäischen Kontinent über. Als erster Staat führte Norwegen Silberfüchse aus Nordamerika ein.

Im Jahre 1921 griff auch Deutschland die Gehegezucht edler Pelztiere auf und zwar wurde als erste deutsche Edelpelztierfarm die Farm Hirschegg-Riezler bei Oberstdorf im Allgäu von der deutschen Versuchszüchterei edler Pelztiere in München, mit ihrem späteren Sitz in Leipzig gegründet. Auch in Deutschland wurden bald außer dem Silberfuchs andere Pelztiere in Zucht genommen, besonders Blau- und Weißfuchs, Nerz, Skunk, Waschbär, gute Pelzkaninchenrassen, neuerdings Biber und Iltis und bisher allerdings mit noch wenig Erfolg die deutschen Marderarten.

Auf diese wegweisende Erstgründung folgten bald weitere kleinere und größere Unternehmungen und heute bestehen nach Angabe der Reichs-Zentrale für Pelztier- und Rauchwaren-Forschung in Leipzig in Deutschland ca. 150 Farmen mit allein annähernd 2000 Silberfüchsen. Die Mehrzahl dieser Pelzfarmen ist im Süden Deutschlands, also im Gebirge oder im Norden an der Küste eingerichtet, weil man hier die günstigsten klimatischen Verhältnisse vermutete. In der inneren norddeutschen Tiefebene gibt es verhältnismäßig wenig Farmen. Meist sind es kleinere Betriebe, die größten umfassen ca. 150—200 Silberfüchse.

Die deutsche Pelztierzuchtbewegung hat sehr früh Anschluß an die Wissenschaft gesucht, um so ein sicheres Fundament für die Zucht zu schaffen. Wie Tänzler (1927) ausführt, muß es Aufgabe der Wissenschaft sein, „die deutsche Pelztierzucht auf sichere Grundlagen zu stellen, um einmal Verluste des Nationalvermögens zu vermeiden, andererseits aber die Pelzproduktion auf eine vom Ausland so weit als möglich unabhängige Basis zu stellen. Wie Deutschland in der Pelzveredlung führend ist, so muß auch Deutschland auf dem Gebiete der Pelztierzucht Mustergültiges leisten.“

Eine Reihe von Problemen harren noch auf den Ge-

Überficht über die Gefundheit der Euter galtverfleuchter Bestände zu gewinnen, bleibt nichts weiter übrig, als von jeder Kuh eine aus allen vier Strichen genommene Probe zur Unterfuchung einzufenden. Die starkveränderte Milch darf natürlich höchstens als Futter für Schweine und Kälber, allenfalls nach dem Kochen, Verwendung finden. Die leicht veränderte oder nur verdächtige Milch wird nach Entfernung der ersten Strahlen aus jedem Viertel in besonderen Gefäßen an die Molkerei geliefert, wo sie nach Erhitzung oder Hochpasteurisierung für die Verbutterung Verwendung finden kann. Sobald die Landwirte die wenig veränderte Galtmilch noch zur Verbutterung verwenden können, finden sie sich mit der tierärztlichen Kontrolle leicht ab. Wichtig ist, die Milchviehbesitzer, welche Vorzugsmilch herstellen wollen, darauf hinzuweisen, von jeder Kuh eine Milchprobe bakteriologisch unterfuchen zu lassen, ehe sie der Produktion von Vorzugsmilch näher treten, insbesondere, bevor teure Kühlanlagen, Flaschenpülmaschinen usw. angeschafft werden. Zum Schluß ging der Redner noch kurz auf die Ausführung der tierärztlichen Stallkontrolle ein. Der Vors. dankte im Namen des Vereins für den klaren und verständlichen Vortrag, der lebhaften Beifall der Versammlung erntete. An den Vortrag schließt sich eine rege Diskussion, an der sich die Kollegen Beier, Friedrich, Schultz jun., Oelrich, Schlote und Lucas beteiligen.

I. A.: Dr. Rathje, Schriftf.

Verschiedene Mitteilungen.

50jähriges Doktor-Jubiläum von Geheimrat Arnold.

Es ist im Leben eines Gelehrten ein seltenes Ereignis, wenn er die 50. Wiederkehr des Tages erleben kann, an dem er die erste akademische Würde, den Doktorgrad, sich durch eigene wissenschaftliche Arbeit erworben hat. Am 8. November d. Js. werden es 50 Jahre, daß Carl Arnold als Schüler des berühmten Chemikers Bunsen in Heidelberg zum Dr. phil. promoviert wurde. Diefem hervorragenden Lehrer verdankt Arnold die glänzende experimentelle Geschicklichkeit, die er in feinen Kollegs jahrzehntelang zum Ausdruck brachte. Diefem feinem Lehrer verdankt er vielleicht auch die außergewöhnliche Klarheit und die Logik des Aufbaues in feinen Lehrbüchern. Wäre es sonst eingetreten, daß jahrzehntelang Taufende von studierenden Chemikern, Apothekern, Medizinnern und anderen Naturwissenschaftlern sich ihre ersten chemischen Kenntnisse aus dem „Repetitorium“ von Arnold erworben hätten? So ist es eine größere Schülerfchar als bei manchem anderen Gelehrten, die die Pflicht hat, ihren Dank und ihre Verehrung dem Doktor-Jubilar zum Ausdruck zu bringen. Besonders aber für die Tierärztliche Hochschule zu Hannover wird der 8. November ein Tag der Freude fein, weil Carl Arnold seit dem 1. Mai 1880 ununterbrochen als Lehrer an der Hochschule tätig war, zuerst als Dozent für Chemie, Physik und Pharmakognosie sowie als Vorstand der Apotheke der damaligen Tierarztschule, dann 41 Jahre lang als Professor für Chemie und Direktor des chemischen Instituts. Auf seine Doktorarbeit hat Carl Arnold noch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten in den verschiedensten Fachzeitschriften folgen lassen und mehrere Bücher herausgegeben, die eine große Verbreitung auch in tierärztlichen Kreisen gefunden haben. Als Dank für diese Arbeit am tierärztlichen Stande wurde ihm am 20. März 1920 von der tierärztlichen Fakultät der Universität München Titel und Würde eines Ehrendoktors der Tiermedizin verliehen.

Wenn die Universität Heidelberg in diesen Tagen das Doktor-Diplom von Carl Arnold erneuert, dann wird die Tierärztliche Hochschule zu Hannover mit ihren ehemaligen Schülern stolz darauf fein, daß der Doktor-Jubilar fast seine ganze wissenschaftliche Kraft ihr gewidmet. Möchte ihm die geistige und körperliche Frische noch lange erhalten bleiben: ad multos annos!

Thaer-Feier an der Landwirtschaftl. Hochschule Bonn-Poppelsdorf.

Im festlich geschmückten großen Saale des Bonner Bürgervereins hatte sich am Samstag eine festliche Gesellschaft eingefunden, um die Feier des 100. Todestages Thaers in würdiger Weise zu begehen. Eingeladen dazu, hatte die Landwirtschaftliche Hochschule Bonn-Poppelsdorf, deren Lehrkörper vollzählig erschienen war. Weiter nahm eine stattliche Zahl von Ehrengästen teil, darunter die Spitzen der Reichs-, Staats-, Pro-

vinzial- und Kommunalbehörden der Rheinprovinz, die Vertreter der verschiedenen landwirtschaftlichen Berufsverbände, die Bonner studentischen Korporationen, zahlreiche Studierende und ehemalige Studierende der Landwirtschaftlichen Hochschule. Magnifizenz Dr. Heimerle schilderte das Leben und Wirken Thaers. Nach ihm ergriff der Landwirtschaftsminister Dr. Steiger das Wort und brachte der Hochschule verschiedene Gaben dar: „Eine Grünlandwirtschaft mit einer Grünlandbeispielsdomäne“. Ferner sind Erwägungen im Gange, der Landw. Hochschule weitere Versuchsfelder anzugliedern, endlich stellte er Mk. 10000.— als Thaer-Spende für unterstützungsbedürftige Studierende der Landw. Hochschule zur Verfügung (die gleiche Summe auch der Landw. Hochschule in Berlin aus dem gleichen Anlaß). Die Festrede hielt Prof. Dr. Beckmann über „Einhundert Jahre westdeutsches Bauerntum“. Anlässlich des Tages wurde folgenden Persönlichkeiten die Würde eines Ehrendoktors der Landwirtschaft verliehen: Dem Preussischen Staatsminister und Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Dr. h. c. Steiger, dem preussischen Staatsminister und Ministerpräsidenten Dr. h. c. Braun, dem Reichsernährungsminister a. D. Rittergutspräsident zu Schollene bei Perleburg a. Elbe, K. Schiele, dem Geh. Justizrat Prof. Dr. J. Schumacher zu Köln, dem Landesökonomierat Krewel (im Schmucke des Bandes und der Denkmünze des Ehrenbürgers von Hannover) zu Burg Zievel, dem Rittergutsbesitzer Freiherrn von Loë zu Burg Bergerhausen, dem Universitätsprofessor Dr. Diehl zu Freiburg i. Breisgau, dem Präsidenten des Reichsverbandes der deutschen landwirtschaftl. Genossenschaften, Landesökonomierat Johannissen zu Hannover, dem Prof. Dr. Klebahn zu Hamburg, dem Geheimen Regierungsrat Prof. Dr. Koenig zu Münster i. W., dem Direktor der Moor-Verfuchs-Station in Bremen, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Tacke zu Bremen. Landesökonomierat Dr. Krewel teilte beim folgenden Festessen mit, daß man eine Gesellschaft von Freunden und Förderern der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Bonn-Poppelsdorf gegründet habe.

Akademische Nachrichten.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Hans Schmitt, Direktor der med. Tierklinik der Universität München, ist am 3. November 1928 gestorben.

Langemarck-Gedächtnisfeier der Studierenden der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Am Sonntag, den 11. November 1928, 11 h. c. t., findet in der Aula der Hochschule eine Gedächtnisfeier anlässlich der Übernahme der Patenschaft über die Kriegergräber bei Langemarck statt, zu der wir herzlich einladen.

Hannover, den 3. November 1928.

Im Auftrage der Studierenden: A. Thiele.

Ärztlicher Verein Hannover.

Dienstag, den 13. November 1928, 20 Uhr, im großen Saale des Ärztehauses Hildesheimer Straße 23/24, Dr. Riehn: „Erfahrungen mit Vigantol“.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Dr. Eggeling zum Schlachthofdirektor in Parchim (Mecklbg.); Dr. Bruno Böhm in Schwerin zum Obertierarzt am Grenzschlachthof in Wismar.

Übertragen: Polizeitierarzt Dr. Schömmel in Berlin die kommissarische Verwaltung der Veterinärstelle in Warendorf (Bezirk Münster); Tierarzt Dr. Kurth in Harff (Bez. Köln) die kommissarische Verwaltung der Veterinärstelle in Lüdinghausen (Bez. Münster); Tierarzt Dr. Ullrich in Münster i. W. die kommissarische Verwaltung der Veterinärstelle des Kreises Steinfurt (Bez. Münster).

Versetzt: Veterinär Dr. Suckrow in Niedersessmar, Kreis Gummersbach (Bezirk Köln) in die Veterinärstelle in Waldbroel (Bez. Köln).

Verstorben: Kreistierarzt a. D. Dr. Behm in Gnoien (Mecklenburg); Schlachthofdirektor Geitmann in Parchim (Mecklbg.); Vet.-Rat Schlachthofdirektor a. D. Otto Clausnitzer in Dortmund.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edlmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 46.

Ausgegeben am 17. November 1928.

36. Jahrgang.

Zur gefl. Beachtung! Der Bezugspreis für das 4. Vierteljahr 1928 wird für die beim Verlag direkt bestellten Abonnements durch Nachnahme erhoben, wenn derselbe nicht bis zum 25. ds. Mts. in unseren Händen ist. — Wir bitten ev. für Einlösung der Nachnahme besorgt zu sein.

M. & H. Schaper, Verlag der „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“.

Die wichtigsten tierischen Parasiten unserer Pelztiere.

Von Privatdozent Dr. C. Sprehn, Leipzig.

Die wichtigsten in Deutschland heimischen Pelztiere sind aus der Gruppe der Insektivoren: Maulwurf (*Talpa europaea*); aus der Gruppe der Rodentien: Biber (*Castor fiber*), Kaninchen (*Oryctolagus cuniculus*), Hamster (*Cricetus cricetus*), Eichhörnchen (*Sciurus vulgaris*) und in einigen Bezirken Deutschlands seit einigen Jahren die Bisamratte (*Ondatra zibethicus*); aus der Gruppe der Carnivoren: Katze (*Felis catus*), Fuchs (*Vulpes vulpes*), Fischotter (*Lutra lutra*), nach einigen Angaben auch noch der Nerz (*Lutreola lutreola*), ferner Dachs (*Meles meles*), Baumarder oder Edelmarder (*Martes martes*), Steinmarder oder Hausmarder (*Martes foina*), Iltis (*Putorius putorius*), Hermelin oder großes Wiesel (*Mustela erminea*) und das kleine Wiesel (*Mustela nivalis*). Als wirtschaftlich wichtig kommen zu dieser Liste noch einige nur in Rußland bzw. Skandinavien oder in außereuropäischen Erdteilen vorkommende geschätzte Pelzträger, zum Beispiel: Wolf (*Lupus lupus*) (Rußland, Asien, Amerika), Luchs (*Lynx lynx*) (Skandinavien, Rußland usw.), Skunk (*Mephitis mephitis*) (Amerika), Zobel (*Mustela zibellina*) (Sibirien), Waschbär (*Procyon lotor*) (Amerika) und das Karakulschaf (Asien).

Ihres kostbaren Pelzes wegen ist diesen Tieren naturgemäß überaus eifrig nachgestellt worden und so gehen viele und gerade die wertvollsten von ihnen langsam dem sicheren Aussterben entgegen. In Erkenntnis dieser Tatsache entstand schon anfangs der achtziger Jahre vorigen Jahrhunderts in Amerika und zwar zuerst in Kanada eine Industrie, die es sich zur Aufgabe stellte, durch planmäßige Gehegezucht diese Tiere vor dem Aussterben zu schützen und durch Weiterzucht in Gefangenschaft die kostbaren Pelze zu gewinnen. Zunächst wurden diese Zuchtversuche am kanadischen Silberfuchs durchgeführt, später zog man in die Zucht andere edle Pelztiere, z. B. Blaufuchs, Nerz, Waschbär, Skunk usw. ein.

Die Edelpelztierzucht in Kanada entwickelte sich schnell zu einer blühenden Industrie. Sie umfaßte nach Schöps (1927) im Jahre 1924 außer 1426 Silberfuchszuchten noch 84 andere Pelztierfarmen. Allein im Jahre 1924 wurden

nach demselben Autor 23 350 Silberfuchse auf den Farmen geworfen, was einen Wert von 2 479 966 Dollar darstellt. Auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika wurde die Edelpelztierzucht bald zu einer blühenden Industrie und 1913 griff die Bewegung auch auf den europäischen Kontinent über. Als erster Staat führte Norwegen Silberfuchse aus Nordamerika ein.

Im Jahre 1921 griff auch Deutschland die Gehegezucht edler Pelztiere auf und zwar wurde als erste deutsche Edelpelztierfarm die Farm Hirfcheeg-Riezlern bei Oberstdorf im Allgäu von der deutschen Versuchszüchterei edler Pelztiere in München, mit ihrem späteren Sitz in Leipzig gegründet. Auch in Deutschland wurden bald außer dem Silberfuchs andere Pelztiere in Zucht genommen, besonders Blau- und Weißfuchs, Nerz, Skunk, Waschbär, gute Pelzkaninchenrasen, neuerdings Biber und Iltis und bisher allerdings mit noch wenig Erfolg die deutschen Marderarten.

Auf diese wegweisende Erstgründung folgten bald weitere kleinere und größere Unternehmungen und heute bestehen nach Angabe der Reichs-Zentrale für Pelztier- und Rauchwaren-Forschung in Leipzig in Deutschland ca. 150 Farmen mit allein annähernd 2000 Silberfuchsen. Die Mehrzahl dieser Pelzfarmen ist im Süden Deutschlands, also im Gebirge oder im Norden an der Küste eingerichtet, weil man hier die günstigsten klimatischen Verhältnisse vermutete. In der inneren norddeutschen Tiefebene gibt es verhältnismäßig wenig Farmen. Meist sind es kleinere Betriebe, die größten umfassen ca. 150—200 Silberfuchse.

Die deutsche Pelztierzuchtbewegung hat sehr früh Anschluß an die Wissenschaft gesucht, um so ein sicheres Fundament für die Zucht zu schaffen. Wie Tänzer (1927) ausführt, muß es Aufgabe der Wissenschaft sein, „die deutsche Pelztierzucht auf sichere Grundlagen zu stellen, um einmal Verluste des Nationalvermögens zu vermeiden, andererseits aber die Pelzproduktion auf eine vom Ausland so weit als möglich unabhängige Basis zu stellen. Wie Deutschland in der Pelzveredlung führend ist, so muß auch Deutschland auf dem Gebiete der Pelztierzucht Mustergültiges leisten.“

Eine Reihe von Problemen harren noch auf den Ge-

bieten der Pelztierforschung und der Pelztierzucht der Lösung. Namhafte zoologische Forscher haben sich mit Interesse in den Dienst der Sache gestellt, aber zur Lösung vieler praktisch höchst wichtiger noch ungelöster Fragen ist gerade die Mitarbeit der deutschen Tierärzteschaft dringend notwendig. Ein reiches und überaus interessantes Arbeitsgebiet tut sich hier für den Wissenschaftler und Praktiker auf.

Neben den wichtigen Fragen der Akklimatisationsfähigkeit der Pelztiere, neben den überaus wichtigen und noch wenig wissenschaftlich geklärten Ernährungsfragen, neben den für die Züchtung besonders bedeutamen Fragen über die Fortpflanzung, Aufzucht der Jungtiere usw., interessieren uns naturgemäß besonders die Krankheiten der Pelztiere. Ich kann hier leider auf diese Fragen nicht näher eingehen, sondern muß mich auf das beschränken, was mein eigentliches Thema umfaßt, die tierischen Parasiten der Pelztiere. Und auch hierbei werde ich mich im allgemeinen auf die Pelztiere beschränken, die für unsere deutschen Verhältnisse von besonderer Wichtigkeit sind: den Fuchs, den Nerz, den Marder und das Kaninchen.

In der Pelztierzucht spielen tierische Parasiten als Krankheitserreger genau solche große Rolle, wie sie es in der landwirtschaftlichen Tierzucht Deutschlands tun. Man unterschätzt im allgemeinen immer noch zu sehr die große Bedeutung, die den tierischen Parasiten auch in unserem gemäßigten Klima als Krankheitserreger bei den Tieren zukommt. Natürlich sind die Tropen und Subtropen die eigentliche Domäne zooparasitärer Erkrankungen bei Mensch und Tier. Aber wenn man den Menschen in dem gemäßigten Klima Deutschlands im großen und ganzen frei von Parasiten halten kann, so liegt das in erster Linie an den günstigen hygienischen Verhältnissen, unter denen er lebt. Bei unseren Haustieren und ebenso bei den Zuchtpelztieren sind diese aber in der Regel nicht in dem gewünschten Maße durchführbar. In der Pelztierzucht ist außerdem noch ein Faktor zu berücksichtigen. Hier werden ja die Tiere nur gehalten, um ein vollwertiges Pelzwerk zu erlangen und um dies zu erreichen, muß angestrebt werden, die Tiere möglichst parasitenfrei zu halten. Jeder Befall mit Parasiten, auch wenn diese nur in geringer Zahl vorhanden sein sollten, wird die Qualität des Fells im negativen Sinne beeinflussen. Zudem wird jeder auch nur geringgradige Befall der Zuchttiere mit Parasiten die Nachzucht gefährden, denn gerade die parasitären Erkrankungen stellen ja einen großen Anteil der wichtigsten Aufzuchtkrankheiten dar. Ganz abgesehen sei davon, daß jedes parasitenbehaftete Tier in seiner natürlichen Widerstandskraft gegen andere Krankheitsnoxen naturgemäß geschwächt ist.

Auch in der freien Wildbahn sind unsere Pelztiere mit tierischen Parasiten behaftet. Aber die biologischen und besonders entwicklungsgeschichtlichen Eigentümlichkeiten der tierischen Parasiten bringen es mit sich, daß hier im allgemeinen eine Masseninvasion nur selten zu beobachten ist. Bei der Gehegezucht sind aber alle Vorbedingungen zur Masseninvasion für die Mehrzahl der Parasiten gegeben. Besonders auffallend tritt dies bei den Endoparasiten in Erscheinung, die keinen Zwischenwirt zu ihrer Weiterentwicklung benötigen. Diese verbreiten sich alle dadurch, daß ihre „Brut“ mit dem Kot der befallenen Tiere abgeht und nach einiger Zeit der Weiterentwicklung im Freien in der Lage ist, neue Wirtstiere zu infizieren. So kommt es sehr bald zu einer gewissen natürlichen Anreicherung der Parasiten im Erdboden der Gehege und damit ist die Gefahr einer Masseninvasion, besonders der leicht empfänglichen Jungtiere gegeben. Die Aufnahme invasionsfähiger Parasitenjugendstadien, die in der freien Wildbahn immer mehr oder weniger Zufall sein wird, wird hier bei der Gehegehaltung eine natürliche Notwendigkeit.

Von den Protozoa spielen nur einige Kokzidienarten

bei Pelztieren eine Rolle. Zunächst sind die aus Kaninchen bekannten Arten [*Eimeria stiedae* (Lindemann, 1865) usw.] zu erwähnen, die bei ihrem Wirt die bekannte Darm- oder Leberkokzidiose hervorrufen. Auch Silberfüchse und besonders Blaufüchse sind nicht selten Kokzidienträger. Jungtieren können diese Einzeller, wie ich mich selbst habe überzeugen können, sehr gefährlich werden. Ältere Tiere scheinen nicht akut zu erkranken, sind aber häufig Parasitenträger. Die Parasiten schmarotzen im Dünndarm ihrer Wirte. Es handelt sich um Formen, die der aus anderen Carnivoren (Hund, Katze, Iltis) bekannten *Isospora bigemina* (Stiles, 1892) sehr ähnlich sind. Eine nähere Bearbeitung haben meines Wissens diese Parasiten noch nicht erfahren.

Die Gruppe der Helminthen, der Eingeweidewürmer, stellt ein ganzes Heer von Schmarotzern unserer Pelztiere, unter denen sich auch eine Reihe höchst beachtlicher Krankheitserreger befinden. Für unsere Verhältnisse am wenigsten gefährlich sind noch die Vertreter der Trematoda, der Saugwürmer. Sie benötigen alle zur Weiterentwicklung bekanntlich einen Zwischenwirt und in der Regel auch noch einen Hilfwirt. Von den Trematoden ohne besonderen Hilfwirt ist der bekannteste der gemeine Leberegel *Fasciola hepatica* (Linnaeus, 1758). Dieser Parasit kann hier und da durch zystenhaltiges Gras eingeschleppt auch in Pelztierfarmen, besonders Kaninchenbeständen, massenhaft auftreten.

Beliebte Hilfwirte für Trematoden der Carnivoren sind bekanntlich Fische und so kann Fischnahrung leicht carnivoren Pelztieren gefährlich werden. Aus der Leber des Fuchses kennt man *Opisthorchis conjunctus* (Cobbold, 1860) und *Opisthorchis felineus* (Rivolta, 1884), der als Hilfwirt erwiesenermaßen verschiedene Fische (*Rutilus rutilus*, *Tinca tinca* und *Idus melanicus*) benutzt, ferner *Metorchis albidus* (Braun, 1893) und *Pseudamphistomum truncatum* (Rudolphi, 1819). Aus dem Darm des Fuchses sind bekannt: *Euparyphium melis* (Schrank, 1788), *Heterophyes heterophyes* (Siebold, 1853), für den ebenfalls Fische (*Mugil cephalicus* u. a.) als Zwischenwirt nachgewiesen sind, *Cryptocotyle lingua* (Creplin, 1825), den Prell (1928) im Dünndarm eines aus Kanada importierten Silberfuchses gefunden hat und *Alaria alata* (Goeze, 1782). Nach Riley (1921) kommen hierzu noch: *Ascocotyle longa* Ransom, 1920, *A. nana* Ransom, 1920 und *Cotyllophallus venustus* Ransom, 1920.

Aus unseren Mardern ist bisher nur *Euparyphium melis* (Schrank, 1788) bekannt. Ich habe ferner einmal in einem Steinmarder einige Exemplare von einem nicht zu den Echinostomiden gehörigen Trematoden gefunden, der z. Zt. in meinem Laboratorium systematisch bearbeitet wird.

Im Darm unseres Nerzes hat man bisher ebenfalls nur *Euparyphium melis* (Schrank, 1788) festgestellt. Frisch aus Amerika importierte Exemplare des amerikanischen Nerzes (Mink) zeigten sich, was von verschiedenen Seiten gleichzeitig beobachtet wurde, sehr stark mit einem Trematoden der Gattung *Alaria* infiziert. Auch diese Art, die nicht mit den bisher bekannten Arten ohne weiteres zu identifizieren ist und über die sonderbarerweise keine nordamerikanische Literatur vorliegt, wird in meinem Laboratorium z. Zt. näher untersucht. In der Lunge von aus Amerika importierten Nerzen habe ich ferner *Paragonimus kellicotti* Ward, 1908, feststellen können, einen Trematoden, den Henry, 1927, bei diesem Wirt schon gefunden hatte.

Als Krankheitserreger ebenfalls wenig gefürchtet sind auch im allgemeinen die Vertreter der Cestoda. Auch sie brauchen zu ihrer Entwicklung bekanntlich die Einschaltung eines Zwischenwirtes, was ihre Bekämpfung naturgemäß wesentlich erleichtert.

Aus dem Fuchs sind bisher folgende Cestoden bekannt: *Diphyllobothrium latum* (Linnaeus, 1758), der durch

Fische übertragen wird; *Dipylidium echinorhynchoides* (Sonsino, 1889), *Echinococcus granulosus* Batsch, 1786), von Cameron u. a. im Rotfuchs von England gefunden; *Mesocestoides lineatus* (Goeze, 1782), der Reptilien als Zwischenwirt benutzt; *Multiceps multiceps* (Leske, 1780, dessen Finne ja bekanntlich der Drehwurm im Gehirn der Schafe ist. *Multiceps serialis* (Gervais, 1847), dessen Finne im Bindegewebe der Muskulatur verschiedener Tiere, darunter des Hasen und des Kaninchens schmarotzt; *Taenia crassiceps* (Zeder, 1800), dessen Finne subkutan oft in großen Säcken bei Maus, Maulwurf, und wie ein kürzlich von Geheimrat Kitt in München entdeckter Fund zeigt (schriftliche Mitteilung und Materialübersendung) auch bei unserem Eichhörnchen zu finden ist; *Taenia pisiformis* (Bloch, 1780), mit der Finne in Hasen, Kaninchen und Maus; endlich die in ihrer Entwicklung noch unbekannte *Taenia ovata* Molin, 1858; *T. polycantha* Leuckart, 1856; *Tetrabothrius vulpis* Blainville, 1828 und endlich *Bothriocephalus similis* Krabbe, 1865 aus *Vulpes lagopus*, *Taenia hyperborea* Linstow, 1905, die vielleicht identisch mit *Multiceps multiceps* ist sowie die Finne von *Dithyridium elongatum* (Blumberg, 1882), deren adulte Form noch nicht bekannt ist.

Aus dem Marder kennt man: *Mesocestoides lineatus* (Goeze, 1782); *Taenia foinea* E. Blanchard, 1848; *T. intermedia* Rudolphi, 1810; *T. mustellae* Gmelin, 1790 und *T. hydatigena* (Pallas, 1766), dessen Finne ja der bei vielen Tieren schmarotzende bekannte *Cysticercus tenuicollis* ist. Neben diesen adulten Formen kommen noch drei Finnen im Marder vor; deren geschlechtsreife Stadien bisher unbekannt sind: *Spargamum ellipticum* (Molin, 1858), *Taenia cordatus* (Tschudi, 1837), *Dithyridium martis* (Diesing, 1850).

Aus dem Kaninchen kennt man die Bandwürmer: *Cittotaenia ctenoides* (Railliet, 1890), *C. pectinata* (Goeze, 1782), beide in ihrer Entwicklung noch unerforscht und drei Finnen: *Multiceps serialis* (Gervais, 1847), eine besondere *M. spec.* (Railliet, 1863) und *Taenia pisiformis* (Bloch, 1780).

Die Rundwürmer, Nematoda, stellen entgegen den eben genannten Plattwürmern einige der wichtigsten und gefährlichsten Krankheitserreger. Beim Fuchs sind bekannt: *Toxocara canis* (Werner, 1782), der häufigste Spulwurm unseres Fuchses, der besonders bei der Aufzucht der Jungtiere schwere Schäden verursachen kann; *Toxocara cati* (Schrank, 1788), nach Allen in Kanada sehr verbreitet, scheint bei uns selten zu sein, ebenso wie der dritte Fuchspulwurm *Toxascaris leonina* (Linstow, 1902). Beobachtet ist beim Fuchs in Rußland auch eine Strongyloides-Art, die als *Str. longus* (Grassi, 1835), von Romanovic, 1914, beschrieben ist. Aus der Gruppe der Filarien sind folgende Vertreter gefunden worden: *Spirura rytipleuritis* (Deslongschamps, 1824), *Spirura gastrophila* (Müller, 1894), *Spirocercia sanguinolenta* (Rudolphi, 1819), *S. subaequalis* Seurat, 1915, *Habronema grimaldiae* Seurat, 1913, *Rictularia affinis* Jaegerskiöld, 1904 und *Dirofilaria immitis* (Leidy, 1856), dem Hauptverbreitungsgebiet der Filarien entsprechend, fast immer in wärmeren Gegenden, hauptsächlich Ägypten und Algier. Von Hakenwürmern schmarotzen *Ancylostoma caninum* (Ercolani, 1859) und *Uncinaria stenocephala* (Railliet, 1884) beim Fuchs, von denen der zuletzt genannte Wurm der bei weitem häufigere bei uns ist. Ich habe unter 21 eigenen Sektionen mit Hakenwurmbefall nur ein einziges Mal einige echte *Ancylostoma* neben vielen *Uncinaria*-Exemplaren gefunden. Von Trichostrongyliden ist nur *Ollulanus tricuspis* Leuckart, 1865 in der Literatur als beim Fuchs vorkommend angegeben. Gefährlich ist ein Metastrongylide *Crenosoma vulpis* (Dujardin, 1845), der Haupterreger der Lungenwurmkrankheit. Auch von *Diectophyme*

renalis wird der Fuchs als Wirt angegeben. Von Trichinellen schmarotzen im Fuchs: *Trichuris vulpis* (Froelich, 1789) im Dickdarm, *Capillaria plica* (Rudolphi, 1819) in der Harnblase, *Eucoleus aerophilus* (Creplin, 1839) in den Bronchien und *Trichinella spiralis* (Owen, 1835) im Darm bzw. in der Muskulatur.

Nematoden des Marders sind *Ascaris mustelarum* Rudolphi, 1819, wahrscheinlich identisch mit *Toxocara cati* (Rudolphi, 1819), *Diectophyme renalis* (Goeze, 1782), *Filaria martis* Gelin, 1790 (subc.), *Filaroides mustelarum* (Rudolphi, 1819) (Lunge), *Trichocephalus nitzschi* Giebel, 1866, *Capillaria entomelas* (Dujardin, 1845) (im Darm), *C. mucronata* (Molin, 1858) (Harnblase) und *Trichinella spiralis* (Owen, 1835).

Aus dem Nerz sind folgende Nematoden bekannt: ein von mir einmal gefundener neuer Trichostrongylide *Molineus spec.* Sprehn, 1829; *Diectophyme renalis* (Goeze, 1782) und *Gnathostoma spinigerum* Owen, 1836.

Im Kaninchen sind festgestellt: *Passalurus ambiguus* (Rudolphi, 1819), *Strongyloides papillosus* (Wedl, 1856), *Trichostrongylus retortaeformis* (Zeder, 1800), *T. affinis* Graybill, 1924, *Obeliscoides cuniculi* (Graybill, 1923), *Graphidium strigosum* (Dujardin, 1845), *Nematodirus leporis* Chandler, 1924, *Protostrongylus commutatus* (Diesing, 1851), *P. rufescens* (Leuckart, 1865), *Gongylonema neoplasticum* Ficbiger und Ditlevsen, 1914.

Auch einige Acanthocephala sind aus Pelztieren bekannt, so *Liorhynchus vulpis* Dujardin, 1845 aus dem Fuchs, *Echinorhynchus depressus* Nitzsch in Giebel 1866 aus dem Hausmarder, *E. cuniculi* Diesing, 1851 aus dem Kaninchen.

Ein eigener kürzlicher Fund gibt mir Veranlassung auch auf das Vorkommen von Pentastomida bei Pelztieren hinzuweisen. In der Lunge eines zufällig zur Sektion kommenden Kaninchens fand ich eine große Anzahl ca. 5 mm langer Larven von *Linguatula serrata* Frölich, 1779, dessen adulte Formen bekanntlich in der Nasenhöhle von Carnivoren schmarotzt. Bei der augenscheinlichen Seltenheit der Zungenwürmer in Deutschland ist der Befund recht beachtlich. Ich konnte mit den lebenden Larven mit Erfolg eine Katze infizieren.

Auf die ektoparasitisch lebenden Arthropoden der Pelztiere soll nur ganz kurz hingewiesen werden: Als eventuelle Zwischenwirte von Bandwürmern verdienen die Flöhe und Haarlinge besondere Beachtung. Mit Recht gefürchtet sind die zu den Milben gehörenden Räudeerreger der Pelztiere und zwar *Otodectes cynotes* (Hering, 1838), der Ohrräudeerreger des Fuchses, *Psoroptes communis* (Fürstenberg, 1861) der des Kaninchens und der Scabies-Erreger *Acarus siro* Linnaeus, 1858 bei Fuchs, Marder und Kaninchen und *Notoedres cati* (Hering, 1838) beim Kaninchen.

Auf die parasitären Erkrankungen der Pelztiere selbst kann ich hier nicht näher eingehen, ganz kurz soll aber die Diagnostik und Bekämpfung der Schmarotzer referiert werden.

Bei den unbestimmten Krankheitsbild, das ja allen parasitären Erkrankungen im allgemeinen eigentümlich ist und unter Berücksichtigung des Umstandes, daß bei Pelztieren ja nicht nur parasitäre Erkrankungen zu behandeln, sondern jeder Befall mit Parasiten zu bekämpfen ist, muß zur Feststellung des Vorliegens eines Parasitenbefalls der Parasit selbst direkt nachgewiesen werden.

Ektoparasiten werden durch Abfammeln oder durch mikroskopische Untersuchung eines Hautstückes festzustellen sein. Die in den natürlichen Körperhöhlen, dem Verdauungs-, dem Atmungs- oder dem Harnkanal lebenden Endoparasiten werden durch Untersuchung der Aus-

scheidungen dieser Organe nachgewiesen. Wenn auch gewöhnlich die Parasiten selbst nicht zu finden sein werden, so kann man doch Teile von ihnen oder ihre Eier bzw. ihre Larven nachweisen. Hierbei ist zu beachten, daß Parasiten der Luftwege in der Regel auch im Kot zu finden sind. Schwieriger gestaltet sich der Nachweis von Gewebeparasiten, also solcher Schmarotzer, die in dem Parenchym der Organe leben, wie z. B. die Trichinellidenlarven oder die Finnen. Hier müssen, wenn die üblichen physikalischen Untersuchungsmethoden versagen, Röntgenstrahlen oder operative Eingriffe herangezogen werden. In neuerer Zeit ist auch versucht worden, die biologischen Reaktionen der Helminthen zur Stellung der Diagnose auszuwerten. Die in dieser Richtung hin unternommenen Untersuchungen sind aber noch so widersprechend, daß eine praktische Verwertung ihrer Resultate noch nicht möglich ist.

Die Bekämpfung der Parasiten kann auf zwei verschiedenen Wegen vor sich gehen. Einmal kann das mit Parasiten behaftete Tier selbst mit Medikamenten behandelt und andererseits können die Parasiten außerhalb des Wirtstierkörpers gefaßt und vernichtet werden. Die Kenntnis der jeweilig vorliegenden biologischen Verhältnisse gibt uns ein Mittel in die Hand, zu entscheiden, welcher von beiden Wegen den Vorzug verdient oder ob zweckmäßig etwa beide Methoden gleichzeitig anzuwenden sein werden.

Größere Erfahrungen, in der Literatur festgelegte wie eigene, liegen in Bezug auf die Bekämpfung von Pelztierparasiten fast nur für die Parasiten des Fuchses und des Kaninchens vor.

Die Kokzidiose, die ja in Kaninchenbeständen unter den Jungtieren oft verheerend auftritt, ist bisher durch keine arzneiliche Behandlung wirklich erfolgreich zu beeinflussen. Man ist hier ganz auf hygienische Maßnahmen angewiesen, die verhindern sollen, daß eine Neuinvasion der Tiere stattfindet. Also peinlichste Säuberung und Reinhaltung der Unterkunftsräume der Tiere usw. In neuester Zeit habe ich sehr vielversprechende Behandlungserfolge mit einem, mir von der Chemischen Fabrik E. Merck, Darmstadt, zu Versuchszwecken hergestellten Mittel erzielt, das ich noch im Versuch habe. Nach den bisherigen Ergebnissen bewährt sich dieses neue Präparat sowohl bei Darm- als auch bei Leberkokzidiose des Kaninchens (übrigens auch bei Kokzidiose des Geflügels). Ich hoffe, diese Versuche in kürzerer Zeit abschließen zu können.

Darmtrematoden sind wie erwähnt, bei uns bisher nicht in bedrohlichem Maße beobachtet worden, es fehlt daher auch noch an exakten Behandlungsverfahren. Gegen Leberdistomatose, verursacht durch *Fasciola hepatica* der Kaninchen, ist Tetrachlorkohlenstoff in der Dosierung 0,3 ccm pro kg Körpergewicht, am besten mit Paraffin liquidum verabreicht, gut wirksam.

Cestoden der Füchse werden, wenn es einmal notwendig sein sollte, mit den üblichen für Hunde erprobten Bandwurmmitteln bekämpft. Mir hat sich Extractum filicis maris in der Dosis von 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gut bewährt. In der Regel wurde 10–15 ccm Rhizinusöl nachgegeben.

Ein Befall mit Trematoden und Cestoden wird sich naturgemäß fast immer durch eine zweckentsprechende Gehege- und Fütterungshygiene, die die Aufnahme der Jugendstadien der Parasiten verhindert, vermeiden lassen.

Von den oben angeführten Nematoden ist nur eine beschränkte Anzahl wegen ihrer Häufigkeit und Gefährlichkeit Gegenstand einer planmäßigen Bekämpfung. Es sind dies Vertreter der Familie Ascaridae, Ancylostomidae, Trichostrongylidae, Metastrongylidae und Trichinellidae.

Gegen die im Dünndarm schmarotzenden Spulwürmer und Hakenwürmer des Fuchses gibt es im Handel eine stattliche Reihe von Medikamenten, die in der Hauptsache auf der Wirkung von Tetrachlorkohlenstoff

oder anderen gechlorten Kohlenwasserstoffen, von Oleum chenopodii, Santonin oder Jod beruhen. Über das Jodpräparat, daß von Chandler in Amerika viel empfohlen wird, liegen bei uns noch zu wenig Erfahrungen vor, um ein abschließendes Urteil fällen zu können. Ol. chenopodii und Santonin sind wegen ihrer Giftigkeit besonders für jugendliche Tiere nicht ideal. Tetrachlorkohlenstoff und andere gechlorte Kohlenwasserstoffe, besonders Tetrachloräthylen entfalten schon in geringen Dosen eine hervorragende Wirkung. Die Anwendung der reinen Substanz, auch in Gelatinekapfeln, ist aber nicht zu empfehlen, da diese Stoffe sehr stark toxisch wirken, wenn sie vom Respirationsapparat zur Resorption gelangen. Diese Aspirationsgefahr wird schon erheblich eingeschränkt, wenn die Mittel nach dem Vorschlage englischer Autoren in Paraffinum liquidum gelöst verabreicht werden. Aber auch durch diese Methode ist die Gefahr nicht absolut beseitigt, dazu kommt, daß die Mittel durch Resorption vom Darmkanal aus, die offenbar nicht nur mit der individuellen Disposition schwankt, sondern auch von der Art der Nahrung abhängig ist, schwere Schäden in den inneren Organen, vor allem der Leber, verursachen kann.

Auch für die Bekämpfung dieser Parasiten hat die Chemische Fabrik E. Merck mir ein Mittel zu Versuchszwecken hergestellt, bei dem die Aspirationsgefahr völlig ausgeschaltet ist und bei dem darüber hinaus durch geeignete chemische Verfahren auch die Resorption des Mittels im Darm wenn nicht aufgehoben, so doch auf ein Minimum beschränkt ist. Ich habe mit diesem neuen Mittel in dem laufenden Jahre mehrere Hundert Silber- und Blaufüchse mit bestem Erfolg behandeln können. Toxische Versuche an Rotfüchsen zeigten, daß das sechsfache der therapeutischen Dosis reaktionslos vertragen wird. Auch über dieses Mittel will ich eingehender berichten, sobald die noch ausstehenden toxischen Versuche an Silber- und Blaufüchsen vorliegen. Bisher war es mir leider nicht möglich, die notwendigen Versuchstiere aufzutreiben.

Zur Behandlung der heimtückischen und besonders gefürchteten Lungenwurmkrankheit der Füchse, fehlt bisher noch jedes wirksame Medikament. Kalium picronitricum hat sich in meinen Versuchen nicht bewährt. Wir sind heute bei der Bekämpfung der Lungenwürmer des Fuchses ganz auf die prophylaktischen Maßnahmen angewiesen, also auf eine geeignete Gehegehygiene. Den gefürchtetsten der beiden Lungenwürmer des Fuchses, den Metastrongylen *Crenosoma vulpis*, kann man wenigstens einigermaßen erfolgreich durch gewisse chemische Mittel während seiner freilebenden Entwicklungsstadien im Gehegeboden bekämpfen. 3–5prozentige Rohchloramin-Heydenlöfung tötet z. B., wie mir Versuche gezeigt haben, die Larven dieses Wurmes im Erdboden in kurzer Zeit ab.

Im Laboratoriumsversuch mit diesem Mittel wurden auf Agar gezüchtete Erdnematoden von 1 ccm einer 5prozent. oder von 10 ccm einer 1prozent. Lösung abgetötet. In großen Blumentöpfen, die mit Kultur-nematoden besäht waren, vermochten 145 ccm einer 3prozent. und 100 ccm einer 5prozent. Lösung alle Nematoden abzutöten. Ebenso wurden Strongyloideslarven, Larven von *Uncinaria stenocephala* und von *Crenosoma vulpis* in dem Kulturmedium von einer 3prozent. Rohchloraminlösung abgetötet. Die im großen durchgeführten Versuche in drei Edel-fuchsfarmen sind ebenfalls zur vollsten Zufriedenheit ausgefallen.

Eine regelmäßige Durchtränkung des Gehegebodens mit dem angegebenen Mittel, besonders während der warmen Jahreszeit, ist jedenfalls in der Lage, bei sonstiger Beachtung der notwendigen Gehegehygiene die Lungenwurminvasion auf ein Minimum zu beschränken, und sie beeinflusst naturgemäß ebenfalls günstig die Bekämpfung der Fuchshakenwürmer.

Gegen den Harnblasenwurm des Fuchses, *Capillaria plica*, sind bisher keine wirkfamen Medikamente bekannt.

Zusammenfassung.

Kurze Schilderung der Entwicklung der Pelztierzucht. Hinweis auf tierärztliche Probleme und Arbeitsgebiete in der Pelztierzucht. Anführung der Zooparasiten der wichtigsten Pelztiere (Fuchs, Nerz, Marder und Kaninchen) und Hinweis auf die durch sie gesetzte Schäden. Diagnostik und Bekämpfung der wichtigsten Pelztierparasiten, insbesondere kurze Mitteilung über ein neues Mittel zur Bekämpfung der Kokzidiose bei Kaninchen und über prophylaktische Maßnahmen zur Bekämpfung der Lungenwürmer der Füchse.

Literatur.

Bittner, H. und C. Sprehn (1928): Trematoden. Biologie der Tiere Deutschlands. 27. Lieferung, Teil 5. Freund, L. (1927): Pelztierkrankheiten. Münch. Tierärztl. Wschr. Jahrg. 78, Nr. 47, S. 629—632; Nr. 48, S. 649—652. (Sammelreferat mit Literaturangaben. Derfelbe (1928): Bemerkungen über Pelztierparasiten. Münch. Tierärztl. Wschr. Jahrg. 79, Nr. 16, S. 201—203. Hall, M. C. (1920): Intestinal parasites found in eighteen Alaskan foxes. North Americ. Veter. Bd. 1, S. 123—124. Nicoll, W. (1923): A reference of the

trematode parasites of British mammals. Parasitology Bd. 15, S. 236 bis 252. Riley, W. A. (1921): An annotated list of the animal parasites of foxes. Parasitology Bd. 13, S. 86—96. Schöps, P. und Tänzer, E. (1927): Entstehung und Grundlagen der Pelztierzucht in Deutschland. Schriften der Reichs-Zentrale für Pelztier- und Rauchwaren-Forschung Heft 3. Sprehn, C. (1927): Einige wichtige Helminthenerkrankungen der Pelztiere und ihre Bekämpfung. — Arbeiten der Reichs-Zentrale für Pelztier- und Rauchwaren-Forschung Heft 5. Derfelbe (1927): Nematoden in Säugetieren. Zschr. für Säugetierkunde II. Bd., Heft 1, S. 38—67. Derfelbe (1928): Endoparasiten und die durch sie hervorgerufenen Erkrankungen bei Pelztieren. — Vorträge der Reichs-Zentrale für Pelztier- und Rauchwaren-Forschung Heft 2. Derfelbe (1928): Pentastomida (Linguatulida) Zungenwürmer. Die Tierwelt Deutschlands Teil 8. Derfelbe (1928): Bericht über im Jahre 1927 durchgeführten Veruche zur Bekämpfung der Invasionskrankheiten der Pelztiere. Tätigkeitsbericht für die Jahre 1926 und 1927. Reichs-Zentrale für Pelztier- und Rauchwaren-Forschung, Leipzig 1928. Derfelbe (1928): Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft auf der 32. Jahresversammlung zu München. Zoolog. Anz. 1. Supplementbd., Leipzig. Vitzthum, H. Graf (1928): Über parasitische Milben der Pelztiere und ihre pathogene Bedeutung. — Vorträge der Reichs-Zentrale für Pelztier- und Rauchwaren-Forschung Heft 3.

(Aus dem Landestierfeuchenamt in Rostock. — Direktor: Professor Dr. P o p p e.)

Über das Vorkommen von Fleischvergiftungsbakterien im Darminhalt notgeschlachteter Tiere. *)

Von Dr. med. vet. et phil. M. Knoth, Assistent.

Uhlenhuth hat in dem Referat über Paratyphus auf der Tagung der Vereinigung für Mikrobiologie in Frankfurt a. M. 1925 darauf hingewiesen, daß hinsichtlich der Entstehung von Fleischvergiftungen Untersuchungen über das Vorkommen von fog. Fleischvergiftungsbakterien im Darminhalt notgeschlachteter Tiere notwendig sind. Als Fleischvergiftungsbakterien kommen hier nur die Bakterien der Enteritisgruppe in Frage, das *B. enteritidis* Gärtner und das *B. enteritidis* Breslau; das *B. paratyphi* B-Schottmüller kann sich im Tierkörper ansiedeln (Trawinski, Jordan, Uhlenhuth und Seiffert, Lehr), hat aber keine praktische Bedeutung. Die im Darminhalt der Schlachttiere gelegentlich vorkommenden Enteritisbakterien können bei Herabsetzung der Widerstandskräfte des Körpers durch Schädigungen irgendwelcher Art sich vermehren und auf dem Wege der Lymphbahnen in den Körper eindringen. Enteritisbakterien sind sowohl im Darminhalt gesunder Schlacht- und Versuchstiere, als auch im Darminhalt bei Magendarm- und anderen Erkrankungen der Tiere nachgewiesen worden. Die Entscheidung der Frage, ob die Enteritisbakterien im Darm kranker Tiere in jedem Falle krankmachende Eigenschaften haben und tierpathogen sind, bietet große Schwierigkeiten. Der Krankheitsverlauf wird nicht immer von der Pathogenität der Keime abhängig sein, sondern zunächst von der Menge der Bakterien und der gebildeten Toxine, ferner von der Veränderlichkeit, von den Schwankungen der Virulenz der Keime, von der Konstitution und der Krankheitsbereitschaft des tierischen Organismus, möglicherweise auch von der verschiedenen Empfänglichkeit junger und erwachsener Individuen. Das verhältnismäßig häufige Vorkommen von Gärtnerbakterien beim Kalb im Gegensatz zum erwachsenen Rind spricht für diese Annahme. Eine experimentelle Stütze findet diese Auffassung auch durch Versuche von Neufeld und Eguchi; daß die Abwehrkräfte, die in den Schleimhäuten und in den Lymphwegen tätig sind und denen die Aufgabe zufällt, die auf diesem Wege in den Körper eindringenden Keime unschädlich zu machen, im jugendlichen Organismus nicht in dem Maße ausgebildet sind wie im erwachsenen.

Die Untersuchungen, über die berichtet werden soll, wurden an einem Material von 170 notgeschlachteten Tieren ausgeführt. In jedem Falle wurden Fleischproben, Körperlymphknoten, Organe, Darminhalt hauptsächlich aus dem Jejunum und dem Ileum und nach Möglichkeit auch Darmlymphknoten verarbeitet. Ferner wurde die Darmfleischhaut mitunterfucht in der Annahme, daß die Keime bereits in die tieferen Schichten des Darmes eingedrungen sein könnten.

Die Untersuchungen wurden derart ausgeführt, daß der Darminhalt und die mit steriler physiologischer Kochsalzlösung abgspülte Schleimhaut sowohl direkt als auch nach 24stündiger Anreicherung in Gallenbouillon auf Drigalski- und Gassernährboden ausgestrichen wurden. Fleischproben, Organe und Lymphknoten wurden in der für die bakteriologische Fleischuntersuchung vorgeschriebenen Weise verarbeitet.

Unterfucht wurde das Material von 128 Rindern, 26 Kälbern, 13 Pferden und 3 Schweinen. In diesen 170 Fällen wurden 17mal verdächtige Bakterienstämme ermittelt; 6 von diesen Stämmen waren der von Standfuss bezeichneten Gruppe des *B. coli* intermedium zuzurechnen. Die 11 anderen Stämme, von denen 4 durch Gallenreicherung ermittelt wurden, waren auf Grund der Kulturprüfung, des biochemischen Verhaltens, des Mäusefütterungsverfuches und nach dem Ergebnis der Agglutination der Enteritisgruppe zuzuzählen, und zwar 9 Stämme (Rind 6, Kalb 3) dem *B. enteritidis* Gärtner und 2 Stämme (Pferd) dem *B. enteritidis* Breslau. Die Keime wurden 4mal auch in Organen (dreimal beim Kalb, einmal beim Rind) und zweimal auch im Fleisch (Pferd und Kalb) nachgewiesen. Zu erwähnen ist, daß Enteritisbakterien auch zweimal in Organen und einmal in Organen und im Fleisch, jedoch in keinem Falle im Darminhalt festgestellt wurden.

	Rind	Kalb	Pferd
Enteritisbakterien im Darminhalt	6	3	2
Enteritisbakterien gleichzeitig in			
Milz	1)	2	—
Niere	1)	3	—
Fleisch	—	1)	1
Fleischlymphknoten	—	1)	—

In 8 von diesen 11 Fällen waren die Tiere wegen Krankheiten notgeschlachtet worden, die Standfuss dem fog.

*) Vortrag, gehalten auf der 90. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte zu Hamburg 1928. Abt. 33: Theoretische und experimentelle Veterinärmedizin.

engeren Gefahrenbereich der Fleischvergiftungen zuzählt. Es handelt sich 7mal um Darmerkrankungen (Rind 5, Pferd 2) und einmal um eine Erkrankung im Anschluß an eine Geburt (Rind); die übrigen 3 Fälle verteilen sich auf 2 von Pneumonie und 1 von gestörtem Allgemeinbefinden beim Kalb.

Daß bei den 2 Pferden die Breslaubakterien ursächlich nicht an der Krankheit beteiligt gewesen sind, erhellt daraus, daß die Tiere wegen Volvulus und wegen Kolik notgeschlachtet worden waren. Ob die Enteritisbakterien für die Darmerkrankungen bei den 5 Rindern von ursächlicher Bedeutung gewesen sind, ist schwer zu entscheiden.

Wenn der trotz sorgfältiger Verarbeitung oft schwierige Nachweis von Enteritisbakterien im Darminhalt bei den vorliegenden Untersuchungen allein in 7 Fällen von Darmerkrankungen möglich gewesen ist, so könnte dieser Umstand damit erklärt werden, daß besonders die Schutzkräfte des Darmes infolge der Erkrankungen herabgesetzt gewesen sind und somit keine Entledigung, sondern eine Ausbreitung und Vermehrung der Keime hat stattfinden können.

Der Nachweis von Enteritisbakterien einerseits im Darminhalt, andererseits in den Darmlymphknoten, im Fleisch und in den Organen von Tieren, die wegen verschiedener Ursachen notgeschlachtet worden sind, zeigt, daß die Keime vom Darm aus in den Körper eingedrungen sind. Der Nachweis von Enteritisbakterien nur im Darminhalt kranker, notgeschlachteter Tiere läßt die Vermutung zu, ohne jedoch andere Erklärungen auszuschließen, daß die Darmabwehrkräfte dem Eindringen der Keime noch Widerstand zu leisten vermochten. Nach Untersuchungen von Ganter und van der Reis sowie von Löwenberg ist es wahrscheinlich, daß der gesunde menschliche Organismus außer durch die Salzsäure des Magens auch durch Schutzkräfte im Dünndarm bis zu einem gewissen Grade gegen das Eindringen von Keimen geschützt ist. Die gleichen Verhältnisse liegen vielleicht auch im tierischen Organismus vor. Der Dünndarm bildet, solange er funktionstüchtig ist, einen starken Wall gegen eine Infektion mit der Nahrung (Löwenberg). Nach Versuchen von Prausnitz und van der Reis am Menschen, von Dimtza bei Tieren scheinen Bakteriophagen als bakterienhemmende Kräfte dabei keine Rolle zu spielen. Bogendorfer will für die keimtötende Wirkung der oberen Darmabschnitte besondere aus den Dünndarmepithelien stammende und im Darmsaft enthaltene Hemmstoffe (Bakteriostanine) verantwortlich machen, doch wird das Vorkommen solcher Stoffe von anderer Seite in Frage gestellt (Radel). Die Ansiedlung von Keimen scheint dann gegeben zu sein, worauf Löwenberg hinweist, wenn aus irgendeinem Grunde die keimtötende Schutzkraft der Darmschleimhaut darniederliegt (Hahn, Klocman und Moro, Bernheim-Karrer u. a.).

Die Ergebnisse vorliegender Untersuchungen, die fortgeführt werden, dürften die Ansicht stützen, daß das kranke notgeschlachtete Tier als Infektionsquelle für die Fleischvergiftungen in erster Linie in Frage kommt. Zur Klärung sind weitere Untersuchungen über das Vorkommen von Enteritis-

bakterien im Darm bei solchen Tieren angezeigt, die wegen Erkrankungen des Magens und des Darmes, einschließlich der Kolik der Pferde, wegen Erkrankungen, die mit der Geburt im Zusammenhang stehen, notgeschlachtet worden sind, sowie bei Tieren, bei denen eine verminderte Widerstandskraft des Organismus anzunehmen ist. Solche Untersuchungen werden bei Berücksichtigung der die Notchlachtung veranlassenden Krankheit dazu beitragen, den Zusammenhang von Enteritisbakterien im Darm einerseits und andererseits in den Darmlymphknoten, im Fleisch und in den Organen notgeschlachteter Tiere hinsichtlich der Entstehung von Fleischvergiftungen näher aufzuklären.

Literatur.

Bogendorfer, L.: Über Bakteriostanine, lipoidartige, bakterienhemmende Stoffe im Dünndarmsaft und in den Dünndarmepithelien. Zschr. für die ges. exp. Med. 1924, Bd. 41, S. 637. — Bernheim-Karrer, J.: Experimentelle Beiträge zur Coliinfektion des Dünndarms. Monatschrift für Kinderheilkunde 1923, Bd. 25, S. 6. — Dimtza, A.: Keimarmut im Dünndarm und Bakteriophage. Schw. m. Wschr. 1926, S. 1185. — Eguchi, Ch.: Über die versch. Empfänglichkeit junger und erwachsener Individuen f. Infektion. II. Mitt. Versuche mit Mäusetyphus u. Amöbenruhr. Zschr. f. Hyg. 1925, Bd. 104, S. 241. — Ganter und van der Reis: Die bacterizide Funktion des Dünndarmes. D. Arch. für klin. Med. 1921, Bd. 137, S. 348. — Hahn, H., Klocman, L. und Moro, E.: Experimentelle Untersuchungen zur endogenen Infektion des Dünndarms. Jahrb. für Kinderheilkunde 1926, Bd. 84, S. 10. — Jordan, E. O.: The differentiation of the paratyphoid enteritidis group. J. of inf. dis. 1925, Bd. 36, S. 309. — Löwenberg, W.: Die baktericiden Kräfte des Darmes in ihrer Bedeutung für die Typhusinfektion. Zschr. für Hyg. 1928, Bd. 108, S. 69. — Lehr, E.: Über das Vorkommen von echten Paratyphus B-Schottmüller-Bazillen bei Tieren. Zentralbl. für Bakt. 1928, Orig., Bd. 107, S. 69. — Neufeld, F.: Über die verschiedene Empfänglichkeit junger und erwachsener Individuen für Infektion und ihre Ursachen. Zschr. für Hyg. 1924, Bd. 103, S. 471. — Prausnitz, C. und van der Reis: Untersuchungen des menschlichen Dünndarminhaltes auf Bakteriophagen. D. m. W. 1925, S. 304. — Radel, F. W.: Sin in der Dünndarmschleimhaut Bakterienwachstum hemmende Stoffe („Bakteriostanine“) nachweisbar? Zschr. für die ges. exp. Med. 1926, Bd. 48, S. 658. — van der Reis, V.: Die Bakterienflora des Dünndarms und des Coecums bei Erwachsenen unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Klin. Wschr. 1922, S. 950. — Standfuss, R.: Erfahrungen über das Vorkommen von Keimen aus der Paratyphus-Enteritisgruppe bei notgeschlachteten Tieren. B. T. Wschr. 1924, S. 739. — Derselbe: Über die ursächlichen Verhältnisse beim Zustandekommen von Fleischvergiftungen. Tierärztl. Rundschau 1926, S. 753. — Derselbe: Bakteriologische Fleischschau. 2. Aufl., 1928, Schoetz-Berlin. — Derselbe und Lehr, E.: Zur Erkennung und Unterscheidung der Keime der Paratyphus-Enteritisgruppe. Berl. T. Wschr. 1928, S. 533. — Trawinski, A.: Ein Fall septischer Paratyphus B-Erkrankung einer Kuh infolge sekundärer Infektion der Gebärmutter durch das Hantieren eines Laiengeburtshelfers beim Entfernen der Nachgeburt. Zschr. für Fleischhyg. 1925/26, Bd. 36, S. 65. — Uhlenhuth: Paratyphus. Zentralbl. für Bakt. 1925, Orig., Bd. 97, Beiheft, S. 219. — Uhlenhuth und Seiffert, W.: Der gegenwärtige Stand des Paratyphusproblems. D. m. Wschr. 1926, S. 649, 689, 737.

(Aus dem Serumlaboratorium der Königlichen Tierärztlichen und Landwirtschaftlichen Hochschule zu Kopenhagen. — Direktor: Prof. Dr. C. O. Jensen.)

Über die Bekämpfung des seuchenhaften Verwerfens durch systematische Blutuntersuchungen in Verbindung mit Isolation und Desinfektion.

Resultate von 100 neuinfizierten Beständen.

Von Abteilungsvorsteher Tierarzt Axel Thomsen.

Durch verschiedene Gesetzesbestimmungen, das seuchenhafte Verwerfen betreffend, ist in unserem Lande — sowie auch in mehreren anderen Ländern — ein Erstversuch gemacht worden, die weitere Ausbreitung des seuchenhaften

Verkalbens zu verhindern und der Krankheit nach und nach auf den Leib zu rücken, oder wenigstens ihr Wüten als Landesplage zu vermindern. Kann man nämlich die Zahl der Neuinfektionen bedeutend begrenzen, wird das

Verwerfen, als Landesplage betrachtet, automatisch zurückgedrängt, da die Krankheit in zahlreichen — besonders in kleinen und mittelgroßen Beständen — spontan behoben wird, vermutlich durch eine Selbstimmunisierung und Virulenzschwächung.

Wieviel in unserem Lande durch die öffentlichen Veranstaltungen erreicht wird, kann kaum mit Bestimmtheit gesagt werden, genau so wenig wie eine Abnahme der verfeuhten Bestände von Jahr zu Jahr mit Sicherheit bestimmt werden kann. Auch ob die Zahl der Neuinfektionen im Zurückgehen begriffen ist, kann mit Sicherheit nicht gesagt werden; dazu ist das seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über feuchtenhaftes Verwerfen (1920) eingefandte Material viel zu ungleichartig gewesen, u. a. des Auftretens der Maul- und Klauenfeuche wegen. Die praktischen Tierärzte, die 1923 um ihre Beobachtungen über das feuchtenhafte Verwerfen gefragt wurden, behaupteten sehr oft, daß das Verwerfen zurückgehe.

Soviel kann aber mit Sicherheit gesagt werden, daß in unserem Lande ein sehr ausgebreitetes Interesse für den Kampf gegen das feuchtenhafte Verwerfen und speziell für die Diagnosestellung geweckt worden ist. Das Interesse scheint nach dem neuen Gesetz vom 1. Juli 1927, trotzdem es den Wegfall der öffentlichen Bezahlung für den Tierarzt mit sich führte, noch besonders gestiegen zu sein. Die Ursache dieses zunehmenden Interesses scheint außer der wachsenden Kenntnis der Gesetze, darin zu suchen sein, daß bei negativem Laboratoriumsbefunde in Verbindung mit der klinischen Untersuchung des Tierarztes, der betreffende Bestand mit einem „Blauen Stempel“ versehen wird. Ein „Schwarzer Stempel“ wird den Beständen gegeben, die eine Untersuchung verfälscht haben; und um dieses zu vermeiden, versucht man durch die Untersuchung im Laboratorium ein negatives Resultat zu erreichen. Der „Schwarze Stempel“ hat unter anderem in manchen Fällen die praktische Folge, daß die Besitzer ihre Tiere nicht bei anderen Beständen bedecken lassen können. Zuweilen liegt das Interesse der Besitzer für die Diagnose sicher darin — obgleich mit Unrecht — daß man sich bei zukünftigem Handel von der zivilrechtlichen Verantwortung freimachen möchte, wenn in dem zum Laboratorium eingefandten Materiale feuchtenhaftes Verwerfen nicht festgestellt worden ist.

Außer dem Bestreben, die Diagnose gestellt zu bekommen, herrscht jetzt in unserem Lande ein wachsendes Interesse für die private Bekämpfung des feuchtenhaften Verwerfens. Damit ist man aber lange noch nicht weit genug gekommen. Dies scheint darin zu liegen, daß die von den Sachverständigen bewiesenen Ansteckungswege und Methoden und die Mittel, diesen zu entgehen, bei weitem noch nicht genügend bekannt sind und von den Landwirten nicht annähernd genug gefürchtet werden. Zweitens scheint es Ansteckungswege zu geben, die die Wissenschaft noch nicht erkannt hat oder denen noch nicht genügend Beachtung geschenkt wird. Die trotz der Gesetze unzulängliche Vorbeuge der Krankheit tritt, durch die vom Serumlaboratorium häufige Feststellung von Neuinfektionen in Beständen klar zu Tage. Wie viele Neuinfektionen oder vermeintliche Neuinfektionen jährlich im ganzen Lande vorkommen, kann man, wie schon oben bemerkt wurde, nicht mit Sicherheit angeben. Aber auf Grund des ins Laboratorium eingefandten Materials muß doch bemerkt werden, daß die Anzahl beunruhigend ist. Vom 1. April 1926 bis 1. April 1927 sind in eingefandtem Nachgeburtmaterial 2983 Fälle von feuchtenhaftem Verwerfen konstatiert worden. Das Material stammte fast ausschließlich aus Beständen, die vorher frei oder mindestens über 1 Jahr frei von feuchtenhaftem Verwerfen waren. Es war meistens gemäß den Gesetzesanordnungen über feuchtenhaftes Verwerfen eingefandt worden. Außer den 2983 Fällen, die hauptsächlich durch mikroskopische Untersuchungen festgestellt wurden, sind in derselben Zeitperiode

1530 Fälle durch positive Blutreaktion gefunden worden. Es handelte sich hier um Fälle, bei denen die mikroskopische Untersuchung ein negatives Resultat ergab. Trotzdem es sich bei vielen dieser ca. 4500 Fälle um dieselben Bestände handelt, wird man kaum zuviel rechnen, wenn man die Zahl der Neuinfektionen auf 4—5000 ansetzt. Es muß nämlich berücksichtigt werden, daß bei weitem nicht alle Fälle zur Untersuchung gelangen.

Man kann wohl annehmen, daß diese neuinfizierten Bestände für den praktischen Tierarzt ein übersehbares Arbeitsfeld bilden, ein Arbeitsfeld, das vermeintlich dankbar für eine rationelle Arbeit mit Isolation und Desinfektion sein wird. In diese Bestände kommt er zu Beginn der Seuche, ja sogar manchmal ehe das erste Verwerfen eingetreten ist, steht der Tierarzt in telephonischer Verbindung mit dem Gute, so kann er so schon die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen treffen oder anordnen.

Um die Arbeit des Tierarztes in diesen Beständen möglichst erfolgreich zu gestalten, müßte man auf Grund der Arbeiten S. v. Wallis und zahlreicher anderer Forscher berechtigt sein anzunehmen, daß die Hilfe des Serumlaboratoriums durch systematische Blutuntersuchung (Agglutination und Komplementbindung), obgleich nicht erforderlich, so doch von großer Bedeutung sein würde.

Die vorliegende Arbeit soll nun zeigen, wieviel man durch enges Zusammenarbeiten mit den praktischen Tierärzten und dem Serumlaboratorium in solchen Beständen erreichen kann. Der Verfasser möchte gern die Gelegenheit benutzen, den Kollegen, die hier mitgewirkt haben, für die große Arbeit zu danken, die sie oft kostenlos um der Sache willen ausgeführt haben, nicht nur draußen in den Beständen, sondern auch am Schreibtisch und am Telefon.

Die 100 Bestände, um die es sich hier handelt, sind aus dem, dem Laboratorium zur diagnostischen Untersuchung zugegangenem Material ausgewählt worden; speziell wurden solche Bestände genommen, in welchen früher kein oder wenigstens seit sehr langer Zeit kein feuchtenhaftes Verwerfen aufgetreten war. Bei geeigneten Beständen wurde mit der Mitteilung über das Vorhandensein des feuchtenhaften Verwerfens (mikroskopischer und serologischer Nachweis) dem Tierarzte ein Vorschlag zur vorläufigen Behandlung zugesandt; z. B. außer der Tünchung des ganzen Stalles, Verkauf der kranken Kuh, größtmögliche Reinigung und Desinfektion, mindestens des Standes der kranken Kuh, der Nachbarstände und der darinstehenden Kühe, samt der Jaucherinne, des Düngerganges und den infizierten Stallgeräten. War der Bestand auf der Weide, mußte der Platz, auf welchem die Kuh verworfen hatte, desinfiziert werden. In mehreren Fällen waren diese vorläufigen Maßnahmen schon beim ersten Besuch des Tierarztes nach dem Verkallbefall angeordnet worden.

Darnach sollte der Tierarzt, wenn Interesse für den Vorschlag vorhanden war, baldigst die Entnahme von Blutproben bei allen über ein Jahr alten Tieren durchführen und dem Laboratorium ein Verzeichnis über die Graviditätsverhältnisse im Bestande, samt einer näheren Beschreibung der Aufstallung der einzelnen Tiere (Stallskizze) zusenden. Gleichzeitig hatte er dem Laboratorium eine Reihe von Fragen zu beantworten, die wesentlich dahin zielten, die mehr oder weniger guten dortigen Arbeitsbedingungen mitzuteilen, von denen man vermuten mußte, daß sie das Resultat beeinflussen würden. Ferner wurden Fragen gestellt, um womöglich den Ansteckungsweg zu finden, d. h. den Weg, durch den die Infektion in jedem einzelnen Falle in den Bestand gelangt war.

Wurden bei der Blutuntersuchung keine anderen infizierten Tiere gefunden, oder wollte der Besitzer auf Isolation einzelner reagierender Tiere eingehen und eine erneute supplierende Desinfektion im Anschluß an diese Isolation vornehmen lassen, war es eine Voraussetzung, daß das Laboratorium außerdem den ganzen Bestand mindestens

noch einmal untersuchte, nämlich 3 Monate nach dem Auftreten des ersten feuchtenhaften Verwerfens. Bei etwa der Hälfte der Bestände ging man dazu über, drei Serien Blutproben mit 6 Wochen Zwischenraum zu entnehmen, damit man so schnell wie möglich die evtl. reagierenden Tiere feststellen konnte. Dadurch bekam man Gelegenheit, die Wirkung der Maßnahmen zu beobachten und gleichfalls konnte man erfahren, ob weitere Isolation und dergleichen erforderlich war. Außerdem konnten die betreffenden Besitzer erreichen, daß evtl. die Beschränkungen, die das Gesetz den verfeuchten Beständen auferlegt, aufgehoben wurden, wenn alle Tiere bei der Untersuchung 3 Monate nach dem ersten Verkalfbefall negative Reaktion ergaben. Weiter konnte man erwarten, daß die Besitzer, die auf diese Art und Weise relativ leicht über die Seuche hinweg kamen, sich bis aufs äußerste anstrengen würden, Neuinfektionen zu verhüten, ja daß sie vielleicht sogar unter ihren Standesgenossen für den Kampf gegen das feuchtenhafte Verwerfen agitieren und dadurch vielleicht die Initiative ergreifen würden, um eine Vereinigung von Landwirten zu schaffen, die reine, von feuchtenhaftem Verwerfen freie Bestände aufweisen können. Jedenfalls ist es zu hoffen, daß dies einmal so weit kommen möge.

Die Bestände, die hier gewählt worden sind, verteilen sich über das ganze Land, Jylland ist mit 37 Beständen vertreten, Seeland mit 36, Fünen mit 11 und die übrigen Inseln mit 16 Beständen. Die Anzahl der Kühe in den einzelnen Beständen schwankte zwischen 4 und 60 Tieren. Durchschnittlich war die Kuhzahl 13 und hat es sich deshalb wesentlich nur um kleinere Hofbesitzerbestände gehandelt. Im ganzen umfaßt das Material 1778 über 1 Jahr alte Tiere, davon waren 1342 Milchkühe. Im Verlauf der Arbeit sind 3275 Blutproben untersucht worden.

Die Untersuchungen begannen im September 1924, und wurden anfangs 1927 abgeschlossen, doch so, daß die letzten Mitteilungen über das Verwerfen gegen Jahreswechsel 1927/28 eingeholt worden sind. 98 von den 100 Beständen sind mindestens 1 Jahr nach dem ersten Falle von feuchtenhaftem Verwerfen kontrolliert worden, die restlichen zwei nur $9\frac{1}{2}$ — $10\frac{1}{2}$ Monate darnach. — 29 Bestände sind im Sommerhalbjahr (1. April bis 1. Oktober), 71 im Winterhalbjahr untersucht worden. Für die Kupierung der Ansteckungsgefahr ist der Sommer selbstredend die günstigste Zeit, was auch aus dem hier vorliegenden Material hervorgeht; weshalb die erreichten Resultate etwas besser geworden wären, wenn die Verteilung über die Jahreszeiten mehr gleich gewesen wäre. Andererseits mußte man annehmen, daß der Stallaufenthalt (im Winter) ein besseres Studium der Ansteckungsverhältnisse und Ansteckungswege gewährleistete. Diese Annahme hat aber getäuscht. Es ist mit vorliegender Arbeit nicht gelungen, bedeutend mehr Kenntnisse über die Ausbreitung der Krankheit zu gewinnen, es sei denn, daß es sich um die Verhältnisse im einzelnen Bestande oder von Bestand zu Bestand handelte. Hierüber wird in einem späteren Abschnitt noch mehr ausführlich mitgeteilt.

Resultate.

In 27 Beständen zeigten sich späterhin keine Fälle von feuchtenhaftem Verwerfen. In 3 Beständen trat das feuchtenhafte Verwerfen 7, $8\frac{1}{2}$ und $9\frac{1}{2}$ Monate nach dem ersten Verkalfbefall auf. Vermutlich handelte es sich hier um eine erneute, von außen eingeschleppte Infektion.

Im ersten dieser drei Bestände (mit 17 Milchkühen) erfolgte der erste feuchtenhafte Fall am 24. Oktober 1924. Bei der ersten Blutuntersuchung am 1. November 1924 waren alle Tiere reaktionsfrei, ebenso wie bei der folgenden und abschließenden Untersuchung am 15. Februar 1925. Erst am 3. Juni zeigte sich erneut ein feuchtenhafter Verkalfbefall, dem inzwischen neue Fälle am 5. Juli, 10. Juli, 21. Juli (zwei Fälle), 25. Juli usw. folgten, was ganz bestimmt auf eine Neuinfektion des Bestandes hinweist.

In dem anderen Bestande (mit 8 Milchkühen) trat das feuchtenhafte Verwerfen am 1. August 1926 auf. Bei der ersten Blutuntersuchung am 12. August und der zweiten am 14. September, sowie der dritten am 26. November, waren sämtliche Tiere reaktionsfrei. Erst am 15. April 1927 zeigte sich wieder ein feuchtenhafter Verkalfbefall, auf den am 17. April und 18. April weitere folgten.

Im dritten Bestande (mit 14 Milchkühen) zeigte sich der erste Fall am 21. Januar 1926. Bei der ersten Blutuntersuchung am 28. Januar reagierte nur eine 8 Jahre alte, nicht trächtige Kuh. Diese Kuh wurde sofort verkauft, darauf wurde erneute Desinfektion vorgenommen. Bei der zweiten Untersuchung am 5. März wurden keine reagierenden Tiere nachgewiesen, genau so bei der dritten am 11. April. Am 4. November trat wieder feuchtenhaftes Verwerfen auf, gefolgt von einem dritten Fall am 17. Juli (Neuinfektion?).

Was nun die 30 mit vermeintlich zufriedenstellendem Resultat behandelten Bestände angeht, so zeigt sich, daß elf von diesen bei der ersten Blutuntersuchung (von der mit feuchtenhaftem Verwerfen behafteten Kuh natürlich abgesehen) ganz rein waren, und daß sie während des ganzen Versuches rein verblieben. In 6 von diesen 11 Beständen war das Verwerfen außerhalb des Stalles vor sich gegangen. Die Desinfektion hatte sich in den überwiegend meisten Fällen in den Beständen, die dieser und der folgenden Gruppe zugehörten, als recht zufriedenstellend erwiesen.

In 7 Beständen befanden sich gleich oder bei späterer Blutuntersuchung 1—4 reagierende Tiere. Sie wurden schnellstens isoliert (oder verkauft) und supplierende Desinfektion von verschiedenem Umfang durchgeführt.

Es sind also in Wirklichkeit nur diese 7 Bestände, von denen man behaupten kann, daß die Blutdiagnostik etwas positives für das endliche Resultat bedeutet hat. Und man kann doch nicht mit Sicherheit behaupten, daß feuchtenhaftes Verwerfen in allen diesen 7 Beständen aufgetreten wäre, wenn die reagierenden Tiere nicht nachgewiesen und entfernt wurden, sowie keine Nachdesinfektion vorgenommen worden wäre. Denn in der folgenden Gruppe von 5 Beständen, ist auch ein zufriedenstellendes klinisches Resultat erreicht worden, trotzdem die Besitzer 2—3 reagierende Tiere (in 1 Fall 15) nicht isolieren wollten oder konnten und sie ruhig im Stall ließen. Übrigens ist dies ja nur eine Bestätigung der bekannten Verhältnisse, daß nicht alle infizierten Tiere zur Zeit der Untersuchung diese Reaktion zeigten.

Ähnliches gilt für die nächste Gruppe mit 7 Beständen, die bei der ersten Blutuntersuchung einige bis viele reagierende Tiere aufwiesen, immer so viel, daß man es für hoffnungslos anfaß, die Arbeit weiter fortzusetzen, aber wo es, wie in der vorhergehenden Gruppe, später nicht glückte, neue Fälle von feuchtenhaftem Verwerfen festzustellen. Dagegen ist es bei fünf von diesen Beständen möglich gewesen, festzustellen, daß es sich um alte Verwerferbestände handelte, doch mit so geringem klinischen Verwerfen in den letzten Jahren, daß die Besitzer ihre Bestände absolut für nicht verfeucht anfaßen. Wenn man nun so viele reagierende Tiere in einem Stall findet, ohne daß es der Besitzer ahnt, daß der Bestand verfeucht ist, darf man wohl mit Recht davon ausgehen, daß die Bakterien von erstaunlich geringer Virulenz sind, so gering, daß nicht einmal Färsen, oder daß diese nur ganz ausnahmsweise verwerfen, in Verbindung mit einer gewissen Immunität bei den Tieren des Bestandes.

Wie weit man nun eigentlich diese 7 Bestände zu den „guten“ Resultaten rechnen darf, ist natürlich zweifelhaft; es ist ja möglich, daß die Krankheit in einigen von diesen wieder aufflammen kann.

Es ist deshalb in Wirklichkeit eine sehr

begrenzte Hilfe, die man in der Blutdiagnostik bei einem Material wie dem vorliegenden hat, trotzdem daß 35 Prozent der Bestände bei der ersten Blutuntersuchung ganz „rein“ (reaktionsfrei) waren. Dieses Resultat ist ganz das Gegenteil von dem, was man von vornherein erwartet hatte.

Die Resultate von der letzten Hälfte der Bestände, wo man drei Serien Blutuntersuchungen mit 6 Wochen Zwischenraum unternahm, sind nicht besser als die der ersten Hälfte, wo man nur zwei Serien mit 3 Monaten Zwischenraum vornahm.

Im Rest der Bestände — 70 — folgten im Anschluß an den ersten Verkalbefall nach und nach starkes oder weniger stark ausgebreitetes feuchenhaftes Verwerfen. In vier von diesen 70 Beständen beobachtete man nur 1—2 feuchenhafte Abortfälle innerhalb der Observationszeit (einer der Bestände ist nur 9½ Monate nach dem ersten Verwerfenfalle beobachtet worden). Vermutlich sind die Abortusbakterien in diesen Fällen von Anfang an von geringer Virulenz gewesen, da es bei näherer Untersuchung möglich scheint, daß es sich um frisch infizierte (jedenfalls in 3 Fällen) Bestände handelt.

Es geht hieraus hervor, daß man in weniger als 1/3 von den Beständen, die man nach der hier besprochenen Methode unter vorbeugende Behandlung nimmt, ein positives klinisches Resultat erwarten kann.

Unter den 70 Beständen befindet sich zunächst eine Gruppe von 19 Beständen, wo man von vornherein annehmen mußte, daß eine gute Grundlage für Bekämpfungsmaßnahmen vorhanden war, da sich bei der ersten Blutuntersuchung keine reagierenden Tiere feststellen ließen. Wenn sich aber die Ansteckung, trotz aller möglichsten Anstrengungen, nicht verhindern ließ, ist dies ein Beweis dafür, wie schwer sich die gestellte Aufgabe durchführen läßt. Denn trotz Veräumnissen verschiedener Art bei einigen von diesen Fällen — das praktische Leben geht ja wie bekannt nicht immer nach angegebenen und vorgeschriebenen Richtlinien — bleiben doch auch hier viele Fälle übrig, bei denen man das schlechte Resultat nur dadurch erklären kann, daß die Ansteckung von Tier zu Tier ungeheuer leicht vor sich geht und sich schwer umgehen läßt. Andererseits muß man auch bei verschiedenen von diesen Fällen mit Seuchenverbreitung von der angegriffenen Kuh rechnen, ehe sie überhaupt das Kalb verworfen hat.

Ein mildernder Umstand für den mäßigen Ausfall liegt vielleicht darin, daß in 17 Fällen das Verwerfen innerhalb des Kuhstalls stattfand. Das kann und muß wesentlich geändert werden. Es kann im großen und ganzen gesagt werden, daß wenn die Besitzer bei größerer Aufmerksamkeit in Bezug auf Entfernung der infizierten Kuh, ehe das eigentliche Verwerfen eintrat, und mit mehr Willen die geforderte Isolation vorgenommen hätten, sie dazu beigetragen hätten, daß die zuletzt besprochene Gruppe und die folgende, weniger umfassend — und das Gesamtergebnis besser geworden wäre.

Das Gleiche kann vielleicht in verschiedenen Fällen den Tierärzten zur Last gelegt werden, da nämlich die vorläufige Desinfektion und Isolation recht oft zu spät eingeleitet worden war, ebenso wie (namentlich unter der Maul- und Klauenfeuche) es oftmals mit der rechtzeitigen Einsendung der Blutproben haperte.

Die nächste Gruppe umfaßt 15 Bestände. Diese unterscheidet sich von der vorhergehenden Gruppe nur dadurch, daß bei der ersten Blutuntersuchung ein einzelnes — oder ganz vereinzelt — reagierende Tiere festgestellt wurden, die verkauft oder isoliert wurden; aber trotz aller Anstrengungen war das Resultat auch wie in der vorigen Gruppe eine Enttäuschung. In 10 von diesen Beständen fand das erste feuchenhafte Verwerfen im Kuhstall statt.

Übrig bleiben also noch 36 Bestände. In allen diesen waren bei der ersten Blutuntersuchung so viele reagierende Tiere, daß die Besitzer sich nicht auf Isolierung einlassen konnten — oder wollten. In diesen Beständen trat dann nach und nach mehr oder wenig starkes feuchenhaftes Verwerfen ein. Wie schon vorher bemerkt, fanden doch in vier von den 36 Beständen nur ein einzelner oder ein paar Verkalbefälle innerhalb der Observationszeit statt.

Summarisch aufgestellt gruppieren sich die gewonnenen Resultate wie in nachstehendem Schema.

	Kein Verwerfen nach dem ersten Falle				Fortsetzendes Verwerfen (Fortsetzendes Anstecken)		
	sämtliche Tiere bei allen Blutuntersuchungen rein	1—4 reagierende Tiere wurden entfernt, wobei der Bestand gereinigt wurde	2—5 reagierende Tiere verblieben im Bestand	mehrere, manchmal viele reagierende Tiere bei erster Blutuntersuchung. Isolation ausgeschlossen. (In der Regel alte Verwerferbestände)	keine reagierenden Tiere bei der ersten Blutuntersuchung	Bei der ersten Blutuntersuchung wurden einzelne reagierende Tiere festgestellt, die entfernt wurden	Schon bei der ersten Blutuntersuchung wurden viele reagierende Tiere festgestellt. Isolation ausgeschlossen
Anzahl Bestände	11	7	5	7	19	15	36

Daß man in vielen Beständen schon in wenigen Tagen nach dem ersten Verkalbefall so viele reagierende Tiere findet, ist ebenso wie der hohe Prozentsatz (65 Prozent) von reagierenden Tieren in den Beständen bei der ersten Blutuntersuchung von verschiedenen Faktoren abhängig.

Von den Gründen über die genannten Verhältnisse sollen die vermeintlich bedeutendsten hervorgehoben werden.

Es ist schon früher besprochen worden, daß in den fünf Fällen einer Gruppe von 7 vermeintlich neuinfizierten Beständen mit vielen reagierenden Tieren schon bei der ersten Blutuntersuchung bei genauerer Nachforschung konstatiert worden ist, daß es sich in Wirklichkeit um alte Verkalbebestände handelte, womit die vielen Reaktionen zwanglos erklärt sind. Wenn man auf entsprechende Weise die Gruppe von 36 Beständen untersucht hätte (s. obenstehendes Schema), wo man bei der ersten Blutuntersuchung viele reagierende Tiere fand und wo das Verwerfen fortsetzend sich ausbreitete, da man nicht erreichen konnte, Isolationsmaßnahmen zu treffen, so ist es wahrscheinlich, daß man auch hier verschiedene alte Verkalbebestände gefunden hätte.

In anderen Fällen muß man sicher damit rechnen, daß die Ansteckung von der verwerfenden Kuh auf andere Tiere stattgefunden hat, ehe das Verkalben eingetreten war. Vielleicht handelt es sich hier um Ansteckung durch das Auscheiden von Bazillen mit der Milch oder eher mit dem Gebärmutterausfluß, der ja einige Zeit vor dem Verwerfen abgeht, doch geschieht dies nach den Handbüchern wohl kaum zeitiger als 14 Tage vor dem Abort. Vielleicht kann der Abortusbazillus auf eine noch nicht bekannte Weise kürzere oder längere Zeit vor dem Verwerfen vom Organismus ausgeschieden werden — ja vielleicht sogar ganz unabhängig vom Verwerfen.

Es scheint jedoch nicht so, als ob die Ansteckung vor dem Eintreten des Verwerfens besonders häufig vorkommt. In 15 Fällen des vorliegenden Materials kann die Seuchenübertragung mit einigermaßen Sicherheit auf die in den Bestän-

den neu zugekauften Kühe zurückgeführt werden. Aber nur in 2—3 Fällen von diesen Beständen konnte durch Blutuntersuchungen festgelegt werden, daß die betreffenden Tiere den Ansteckungsstoff weiter verbreitet haben ehe sie verwarfen. Jedenfalls sind in keinem Bestande Tiere so zeitig infiziert worden, daß es sich bei der ersten Blutuntersuchung hätte feststellen lassen können. In den 2—3 Fällen, wo es sich wahrscheinlich um Seuchenausbreitung vor dem Verwerfen handelte, waren die betreffenden Verwerfer nicht milchgebende Tiere (Färsen), so daß hier jedenfalls von einer Ausbreitung des Verwerfens durch Milch nicht die Rede sein kann.

Übrigens kann hier angeführt werden, daß der erste Verkalbefall in den 5 Beständen bei den angekauften älteren, vermutlich milchgebenden Kühen auftrat; aber in keinem von diesen 5 Beständen waren Anzeichen vorhanden, die auf die Ausbreitung der Seuche vor dem Eintritt des eigentlichen Verwerfens hinwiesen.

In gewissen Fällen — namentlich in solchen, wo die erste Blutuntersuchung etwas später wie gewöhnlich nach dem Verwerfen vorgenommen wurde — kann man sich wohl denken, daß die Blutreaktionen, die man bei der ersten Untersuchung fand, von der Ansteckungszeit herrührte, die zwischen dem Verwerfen und der ersten Blutentnahme lag. Doch ist es sehr wenig wahrscheinlich, daß dieses in nennenswerter Weise bei den hier besprochenen 100 Beständen vorgekommen ist; denn durchschnittlich waren für alle Fälle nur 8 Tage zwischen dem ersten Verkalbefalle und der ersten Blutuntersuchung verlaufen; in den 65 Beständen, in welchen bei der ersten Blutuntersuchung reagierende Tiere festgestellt wurden, war die entsprechende durchschnittliche Periode 8,5 Tage, während sie für die 35 reinen Bestände etwas länger dauerte, und 9,2 Tage betrug. Diese Zahlen deuten nicht auf eine Infektion mit darauffolgender Reaktion in der Zeit zwischen dem Verwerfen und der Blutentnahme hin. Hierzu kommt übrigens, daß typische Blutreaktion (Agglutination samt Komplementbindung) — hervorgerufen in kürzerer Zeit als 10 Tage nach der Infektion, wenigstens bei Fütterungsinfektion — als eine reine Ausnahme betrachtet werden muß.

Ein anderes Verhältnis, auf das in Verbindung mit den bei der ersten Blutuntersuchung gefundenen reagierenden Tieren hingewiesen werden muß, ist die Möglichkeit einer Ansteckung von einem gemeinschaftlichen Ansteckungsherd. Man muß hier namentlich an mehrere Tiere denken, die von einer gemeinschaftlichen Weide nach Hause genommen sind; oder an mehrere angekaufte Tiere, die aus einem verseuchten Bestande stammen.

Endlich muß noch erwähnt werden, daß der erste „Verkalbefall“ in einem Bestande — namentlich wenn es sich um eine verseuchte trächtige Kuh in einem altinfizierten Bestand handelt — sich vielleicht klinisch nicht einmal als Verwerfen erweist, ja sogar nicht einmal als eine Frühgeburt auftritt. Wenn dann der nächste Verwerfenfall eintritt und fehlerhaft als erster Fall betrachtet wird, wird man dann bei der nach diesem Falle folgenden Blutuntersuchung selbstredend sehr natürlich mehrere reagierende Tiere finden.

Wie oft dies bei dem vorliegenden Material vorgekommen ist, kann nicht bestimmt gesagt werden, weil eine Klärung der Verhältnisse in der Regel nicht möglich war.

Eine sehr wichtige Frage für die Bekämpfung des seuchenhaften Verwerfens ist durchgehend die Seuchenausbreitungsmethode und hier namentlich wieder die Ausbreitungswege von Bestand zu Bestand. Die Tierärzte, die bei dieser Arbeit mitgewirkt haben, sind deshalb bei jedem einzelnen Falle gebeten worden, soweit wie möglich den Ansteckungsweg nachzuweisen. Um anzudeuten, in welcher Richtung die Untersuchung des Tierarztes zu gehen hatte, führte man zur Überlegung einige von den Wegen an, die

man von vornherein vermuten konnte. Zugekaufte Tiere, gemeinschaftliche Weide usw.

Es ist schon vorher erwähnt worden, daß die Ansteckung mit einigermaßen Sicherheit in 15 von den 100 Beständen des Verfassers auf neuzugekaufte Tiere, die später alle verwarfen, zurückgeführt werden kann. Hierzu kommen noch einige (5) Bestände, wo die Ansteckung mit einem oder mehreren zugekauften Tieren vermutlich eingeschleppt worden ist, und die ohne verwarfen zu haben doch bei der ersten Blutuntersuchung positive Reaktion ergaben.

Daß solche neuzugekauften Tiere nicht ohne Blutuntersuchung und Quarantäne in gesunde Bestände eingesetzt werden dürfen, ist hiernach ja ganz klar, und es ist von Wichtigkeit, daß die Landwirte mit diesen Verhältnissen bekannt gemacht werden müssen. Die Zahlen erweisen ja übrigens, wie berechtigt die gesetzlichen Maßnahmen sind, aber sie zeigen auch, daß die gesetzlichen Verbote leider nicht eingehalten zu werden scheinen.

Aus den von den Tierärzten gegebenen Aufklärungen geht außerdem hervor, daß in weniger als etwa 10 Fällen der Stier mehr oder weniger verdächtigt worden ist, die Ansteckungsquelle zu sein. Der Verdacht wurde aber durch die serologischen Untersuchungen nicht bestätigt. Man konnte daher nicht ersehen, daß die wenig reagierenden Stiere die bei der Blutuntersuchung gefunden wurden, Anlaß zur Reaktion der Tiere im Bestand gegeben haben, die sie gedeckt hatten. Es sind im ganzen 82 Blutproben von Stieren bei der Serienuntersuchung bearbeitet worden. Von diesen reagierten nur fünf sicher, während vier eine zweifelhafte Reaktion ergaben. Hiermit reagierten also nur ca. 6 Prozent. Zum Vergleich wurden bei der ersten Serienuntersuchung im ganzen 331 sicher reagierende Kühe und Färsen unter 1705 Tieren konstatiert, was einem Reaktionsprozentatz von 19 entspricht. Diese Zahlen zeigen die bekannten Verhältnisse, daß der Reaktionsprozentatz bei Stieren viel niedriger ist, als bei Kühen. Nach neueren Untersuchungen muß die Bedeutung der Stiere für die Ausbreitung der Seuche unter allen Umständen als minimal angesehen werden, soweit es die Ansteckung beim Paarungsakt betrifft.*)

Bei 7 Beständen wird als Grund für die Seucheneinschleppung behauptet, daß das verkalbende Tier (Färse) von einer gemeinsamen Weide gekommen war. Bei zwei weiteren Beständen war die Kuh in einer eingezäunten Fenne gewesen, wo die größte Wahrscheinlichkeit vorlag, daß sie dort angesteckt worden war. Eine schärfere Kontrolle bei den gemeinsamen Weiden ist daher sicher sehr erwünscht, weil hier die gesetzlichen Verbote nicht genügend wirksam zu sein scheinen.

Endlich ist in 4 Fällen darauf aufmerksam gemacht worden, daß beim Nachbar seuchenhaftes Verwerfen herrschte; in zwei Fällen meinte man übrigens, daß die Hunde die Seuche von dem einen Hof zum andern gebracht hatten.

Übrig bleiben nur noch die 60 Bestände, bei denen man keinen anderen plausiblen Weg der Seuchenübertragung angeben konnte. Selbst wenn man, wie schon erwähnt, damit rechnen muß, daß es sich bei verschiedenen Fällen in Wirklichkeit überhaupt nicht um neuinfizierte Bestände handelte, und deshalb bei diesen Fällen nicht von einem „Ansteckungsweg“ die Rede sein kann, ist es doch mit Rücksicht auf das Gelagte denkbar anzunehmen, daß die Ansteckung andere Wege und Möglichkeiten hat, als gerade diejenigen, die man bisher gekannt und mit denen man gerechnet hat.

Ausschließen kann man die Ansteckung durch die Molkerien mit der Milch nicht, was deshalb zum Gegenstand näherer Untersuchung gemacht werden mußte. Weiter ist daran zu denken, in wie weit Fliegen die Seuche übertragen können; dies könnte man sich sehr wohl denken, daß rein

*) Thomsen, A., D. T. W. 1928, S. 477.

passiv bei Berührung der Konjunktiva, die sehr leicht dem Abortusbazillus gegenüber empfindlich ist, eine Infektion entsteht, eine Tatsache, die schon lange durch die Untersuchungen des Serumlaboratoriums gezeigt worden ist.

Wenn man bei einer Krankheit wie beim seuchenhaften Verwerfen nach Ansteckungswegen sucht, muß man daran denken, daß die Übertragung in der Regel schon 2—3 Monate vorher oder sogar noch früher stattgefunden hat. Die lange Inkubationszeit bedingt in vielen Beständen das schwere Auffinden des Infektionsweges.

Die Übertragungsmöglichkeit der Seuche innerhalb der Bestände ist auch bei der vorliegenden Untersuchungsreihe mit berücksichtigt worden. In dieser Hinsicht wurden die mitwirkenden Tierärzte gebeten, im Anschluß an die Blutprobenentnahmen eine detaillierte Stallzeichnung mitzuführen, aus der man ersehen konnte, wo jedes einzelne Tier untergebracht war. Man erwartete namentlich von den Beständen, die von Anfang an reaktionsfrei waren, sich später aber als angesteckt erwiesen, daß diese wertvolle Aufschlüsse über die Infektionsweise geben konnten. Leider ist es nicht geglückt, sichere Einzelheiten für die Stallinfektion nachzuweisen.

Man hat aber Gelegenheit gehabt zu beobachten, daß die Übertragung der Seuche beinahe explosiv vor sich gehen kann. Ein Bestand, der bei der ersten Blutuntersuchung ganz „rein“ vorgefunden wurde, konnte bei der folgenden und nächstfolgenden Untersuchung sehr stark, mit vielleicht einem Drittel — ja sogar mit der Hälfte des Tierbestandes reagieren. Schon 1909 wies Wall in einem einzelnen Bestände nach, daß sich die Seuche stark zwischen zwei Untersuchungen — vorgenommen mit je einem Monat Zwischenraum — ausgebreitet hatte. Es zeigt sich also jetzt — sogar oft trotz kräftiger Gegenmaßnahmen — daß dies ein recht häufig vorkommendes Phänomen ist.

Auch die Bedeutung des Jauche- und Wässerungssystems für die Seuchenübertragung, ist Gegenstand von Beobachtungen gewesen, aber man hat keinen sicheren Anhaltspunkt gefunden, daß eine Verbindung zwischen diesen Faktoren und der Seuchenübertragung besteht. Weiterhin konnte man nicht ersehen, wie weit die Seuchenübertragung mit der Fütterung zusammenhing. Aber es ist doch anzunehmen — und hier ist in dem vorliegenden Materiale ein Fingerzeig gegeben — daß die gemeinsamen Futter- und Wasserkrippen, samt der wenig hygienischen Art und Weise ihrer Reinigung, mitwirkende Faktoren bei der Seuchenübertragung sind.

Auch das Melken, dachte man, könnte bei der Stallverfeuchung mitwirken; aber diese Annahme konnte durch die gemachten Beobachtungen nicht bestätigt werden. Der Verdacht auf die Übertragung der Seuche war wachgerufen teils durch einige, u. a. in unserem Laboratorium vorgenommene Infektionsversuche, die erwiesen, daß man sehr leicht und sicher Tiere durch den Milchkanal infizieren kann, und teils durch die wohlbekannte Erscheinung, daß nicht-trächtige Färsen, trotzdem diese in demselben Stall wie die erwachsenen Tiere untergebracht sind, nur selten im Vergleich zu Milchkühen reagierten. Vielleicht ist der Grund, daß eine Reaktion bei Färsen nur relativ selten zu finden ist, eigentlich der, daß die Gebärmutter und das Euter, wo der Abortbazillus besonders gut gedeiht, wenig entwickelt sind.

Im großen und ganzen kann man über die Seuchenverbreitung im Stall behaupten, daß die ersten reagierenden Tiere sich oft in unmittelbarer Nähe von dem Platz im Stalle zeigen, wo das Verwerfen stattgefunden hat (namentlich Nachbarkühe oder vielleicht gerade so oft die nächstfolgende Kuh). In einzelnen Fällen hat man regelmäßig beobachtet, daß jede zweite Kuh reagierte, ohne daß es mög-

lich war, die Ursache dafür festzustellen. Oft scheint man überhaupt kein „System“ in der Seuchenverbreitung finden zu können; vielleicht beruht dieses zum Teil auf individueller Resistenz. Nicht selten geht die Seuchenverbreitung, wie schon erwähnt, explosiv von statten.

Auf Grund der zuletzt erwähnten Beobachtungen muß es uns als ganz hoffnungslos erscheinen, eine Wirkung zu erwarten, wenn man die Verwerfer und die reagierenden Kühe nur nach dem einen Ende des Stalles bringt. Die Seuchenausbreitung geht mit anderen Worten viel zu leicht vor sich, als daß diese Maßnahme von Nutzen sein würde.

Die Versuche lassen erkennen, daß noch viel Forschungsarbeit geleistet werden muß, um sichere und wirkungsvolle Bekämpfungsmaßnahmen gegen das seuchenhafte Verkalben zu finden. Besonders notwendig erscheinen Laboratoriumsversuche über Übertragungswege von Stall zu Stall und Übertragungsarten der Seuche innerhalb der einzelnen Bestände.

Zusammenfassung.

Es ist durch enges Zusammenarbeiten zwischen den praktischen Tierärzten und dem Serumlaboratorium versucht worden, seuchenhaftes Verwerfen in 100 neuinfizierten — oder vermeintlich neuinfizierten — Rinderbeständen zu kupieren. Es wurde in den Beständen so schnell wie möglich eine vorläufige Isolation der verkalbt habenden Tiere vorgenommen und eine Desinfektion bewerkstelligt, die mindestens den Stand der Verkalbekuh, die Nachbarstände und die darinstehenden Kühe, die Jaucherinne und den Düngergang samt der infizierten Stallgeräte umfaßten; außerdem wurde der ganze Stall getüncht. Sobald wie es sich ermöglichen ließ, wurden von allen über 1 Jahr alten Tieren Blutproben zur Untersuchung auf Agglutinine und komplementbindende Stoffe entnommen. Wo darnach eine Grundlage für weitere Arbeit gefunden wurde, wurden dann später im allgemeinen wenigstens ein- bis zweimal Blutproben untersucht und die evtl. reagierenden Tiere wurden entfernt oder isoliert, wonach eine supplierende Desinfektion vorgenommen wurde. Die letzte Blutuntersuchung wurde zeitigst 3 Monate nach dem ersten Verwerfenfalle vorgenommen.

Die Anzahl von untersuchten Milchkühen variierte in den verschiedenen Beständen zwischen 4—60 Stück; in der Regel handelte es sich um kleinere Hofbesitzerbestände von 10—15 Kühen. Im ganzen umfaßt das Material 1787 Rinder über 1 Jahr, davon 1342 Milchkühe. Blutproben sind alles in allem 3275 untersucht worden.

98 von den 100 Beständen wurden mindestens 1 Jahr nach dem ersten Verkalbefall kontrolliert, die zwei restlichen $9\frac{1}{2}$ und $10\frac{1}{2}$ Monate nach dem Verwerfen.

Resultate: In 27 Beständen zeigte sich später kein seuchenhaftes Verwerfen mehr. In 3 Beständen trat nach $7-8\frac{1}{2}$ und $9\frac{1}{2}$ Monaten nach dem ersten Verkalbefall wieder seuchenhaftes Verwerfen ein; es handelt sich hier vermutlich um Neuinfektionen, die von außen eingeschleppt worden waren. In den übrigen 70 Fällen trat im Anschluß an den ersten Verkalbefall, trotz der getroffenen Gegenmaßnahmen, eine mehr oder wenig heftige Verkalbeepizootie auf. Man kann also nur in $\frac{1}{3}$ der Bestände, die man unter solcher Behandlung hat, ein günstiges Resultat erwarten.

35 von den 100 Beständen waren bei der ersten Blutuntersuchung, die verkalbt habende Kuh selbstverständlich ausgenommen, reaktionsfrei. Zwischen den 65 übrigbleibenden Beständen fand man vermutlich mehrere altinfizierte Bestände, mit äußerst gering erkennbarem Verwerfen.

Der Anteil der Blutdiagnostik in den erreichten Resultaten war daher weit geringer, als man von vornherein erwartet hatte, da man höchstens in 7 von den 100 Beständen eine wirkliche Hilfe durch Blutuntersuchung gehabt hat.

Innere Medizin und Chirurgie.

Schouppé: Behandlungsversuche mit Röntgenstrahlen bei Aktinomykose und einigen anderen Krankheitsfällen. (Arch. für wiss. Tierheilkunde 1928, 57, S. 205.)

Verf. behandelte 9 Fälle von Aktinomykose mit günstigem Ergebnis, insofern, als 5 Fälle geheilt wurden. Noch besser waren die Erfolge bei 4 Fällen von Akne des Pferdes am Kamm und veralteten, mit starkem Juckreiz verbundenen Kronentritten, die sämtlich zur Heilung kamen.

Geiger.

Helsingius, S.: Der nagellose Hufbeschlag in geschichtlicher und chirurgisch-kritischer Bedeutung. (Inaug.-Diss. Leipzig 1927.)

Alle bis jetzt konstruierten nagellofen Beschläge haben sich nicht im Wettkampfe mit dem gewöhnlichen Hufbeschlag mit Nägeln bewähren können. Trotz mancher Vorteile überwogen in den meisten Fällen die Nachteile (ungünstige Wirkung auf die normalen Funktionen der Hufmechanik, Schädigungen einzelner Teile, Kompliziertheit, leichtes Verlorengehen, leichtes Streichen usw.). Auch die Herstellung aus zu schwachen und zu wenig widerstandsfähigen Stoffen trat als Nachteil auf, während andere sich wieder durch ihre zu hohen Herstellungskosten ungeeignet für einen allgemeineren Gebrauch zeigten, oder dadurch nicht Anwendung fanden, weil sie sich nicht ohne weiteres von einem mit dem üblichen Hufbeschlagswerkzeug ausgerüsteten Schmied befestigen ließen, sondern ganz spezielle, schwer zu beschaffende Zangen usw. forderten, auch sonst schwer und umständlich zu „beschlagen“ waren. Der größte Teil dieser Beschläge aber hatte den Nachteil, daß sie, wenn sie auch noch so gut am Hufe befestigt waren, doch keinen guten und dauernden Halt hatten, oder einfach nach wenigen Tagen ganz abfielen und verloren gingen. In Berücksichtigung aller dieser Tatsachen läßt sich zusammenfassend folgendes sagen: Wenn ein nagelloser Beschlag seinen Zweck überhaupt erfüllen und Aussicht auf allgemeinere Anwendung haben soll, so sind bei der Konstruktion desselben folgende Punkte zu beachten: 1. darf durch diesen Beschlag der Hufmechanismus in keiner Weise beeinträchtigt werden; 2. darf die Befestigungsart dieses Beschlages weder die Hornkapfel noch die Weichteile des Hufes bzw. die Ballen schädigen. Auch müssen seitlich und hinten hervorragende Teile der Befestigungsvorrichtung vermieden werden, um keine Möglichkeit des Streichens oder sonstiger Verletzungen zu bieten. Ballenwärts oder an den Schenkelenden des Eisens angebrachte Hervorragungen geben immer die Möglichkeit des Abtretens der Eisens; 3. die Konstruktion und die Befestigungsart sollen so einfach wie möglich sein; 4. die Herstellungskosten dürfen nicht erheblich höher sein als die des bisher üblichen Hufbeschlages; 5. die Widerstandsfähigkeit und Befestigung dürfen nicht hinter der des aufgenagelten Eisens zurückstehen. Bis jetzt hat noch keiner der vielen nagellofen Hufbeschläge alle diese Bedingungen restlos erfüllt. Verf. gibt zum Schluß 74 interessante Abbildungen.

A.

Voss, H. J.: Beitrag zur Ringbildung an den Klauen des Rindes. (In.-Diss. Leipzig 1928.)

Eine praktische Bedeutung ist den Ringbildungen im Anschluß an falsche Belastung nur insofern beizumessen, als man an ihnen die unphysiologische Stellung der Extremitäten feststellen kann. Ebenso dürften die Akkomodationsringe kaum von Wichtigkeit sein, es sei denn, daß von dem langsamen Wachstum des Weideringes dessen Entstehungszeit ungefähr bekannt ist, auf eine Ablenkung der Zirkulation nach dem Euter und damit auf die Milchleistung schließt. An mehreren lebenden Kühen, die im Sommer auf der Weide gingen und deren große Milchergebigkeit gerühmt wurde, hat Verf. in der Tat ein sehr langsames Herunterwachsen der Weideringe beobachten können. Größeres Interesse beanspruchen die Konditionsringe; denn eine innere

Erkrankung oder die Trächtigkeit an den Klauen feststellen zu können, würde die Diagnostik um ein wertvolles Mittel bereichern. In vielen Fällen wurden Ringbildungen bemerkt, die an Hand der Inspektion des ausgeflachteten Tierkörpers unbedingt mit einem gewissen „Zustand“ des Organismus in Zusammenhang standen. Doch würde man zu häufig Trugschlüsse ziehen müssen, als daß die Methode als unzuverlässig hinstellen könnte. Die Krone der Klaue ist durch ihre anatomische Beschaffenheit wie durch physiologische Verhältnisse sehr zu Ringbildungen veranlagt, und häufig trifft man diese Erscheinung, ohne sie mit irgend welchen Vorgängen im Körper in Einklang bringen zu können. Trotzdem glaubt Verf. bestimmt, daß man in manchen Fällen, wenn es sich darum handelt, die Dauer einer Erkrankung oder das Alter des Fetus festzustellen, die Ringbildung an den Klauen als Hilfsmittel heranziehen kann. Dies wird um so mehr möglich sein, je mehr man sich dieser interessanten Erscheinung mit ihren mannigfaltigen direkten und indirekten Ursachen widmet.

A.

Schouppé: Beitrag zur Chloralhydratnarkose des Pferdes. (Aus dem Landestierpitale Graz.) (Arch. für wissenschaftl. Tierheilkunde 1927, 57, S. 105.)

Verf. schildert die Nachteile, die mit der Narkose durch Äther, Chloroform und Morphinum und der intravenösen bzw. rektalen Chloralhydratnarkose verbunden sind. Am besten bewährte sich ihm die Chloralhydratnarkose per os, bei der jedoch das Mittel mit der Neumann-Schulz'schen Nasenschlundsonde und einer amerikanischen Kolikzunge eingegeben wird.

Geiger.

Neumann-Kleinpaul: Einiges zur Spezialdiagnose der Kolik des Pferdes. (Arch. für wissenschaftl. Tierheilkunde 1928, 57, S. 335.)

Verf. gibt eine Menge Hinweise, die bei der Diagnosestellung der Kolik zu beachten sind. Als Mittel, die zu einer genauen Diagnose führen können, sind zu nennen: Temperatur, Puls, Atmung, Auskultation und Perkussion der Brust und Bauchhöhle, das äußere Verhalten des Tieres, die rektale Untersuchung, Sondierung des Magens, die diagnostische Füllung des Magens, die äußere Palpation der Bauchdecken, insbesondere der Inguinalgegend, der Schenkelspalte bis zur Analgegend hinauf bei Hengsten. Im zweiten Teil werden die häufiger vorkommenden Kolikformen in ihren Krankheitsbildern beschrieben. Wegen Einzelheiten muß auf das Original verwiesen werden.

Geiger.

Wottschall, B. und Wheeler-Hill: Über die Ausscheidung des Nuktals. (Deutsche med. Wochenschr. 1928, S. 140. Narkose und Anästhesie 1928, I. Jahrg., H. 5, S. 265.)

Die Ausscheidung des Nuktals im Harn wird indirekt durch Ermittlung des Bromgehalts verfolgt. Die Hauptmenge wird in den ersten 24 Stunden ausgeschieden, wobei 1—3 Prozent wiedergefunden werden. Bis auf geringe Reste wird das Mittel im Organismus abgebaut. Durch fortlaufende Gaben ist eine wesentliche Steigerung der Ausscheidung nicht zu erzielen.

R. Völker, Leipzig.

Löhr, H.: Über die Behandlung von Herzkrankheiten mit Adonis vernalis. (M. m. Wschr. 1928, S. 816.)

Adonis (Blutströpfchen) gehört zu den Volksheilmitteln und hat namentlich in Rußland großen Anklang gefunden. Neuerdings ist es der Firma F. Hoffmann-La Roche & Co. in Basel gelungen, die wirksamen Bestandteile der Droge zu isolieren und frei von unwirksamen Begleitstoffen herzustellen. Das auf diese Weise hergestellte Präparat („Adovern“) ist von konstanter Zusammensetzung und stets gleichbleibender therapeutischer Wirkung. Versuche an einer größeren Anzahl von Herzkranken ergaben, daß wir im Adovern ein leistungsfähiges Kardiotonikum besitzen, das die Lücke zwischen Digitalis- und Strophantusmedikation ausfüllt. Die Wirkung setzt rasch ein und ist ohne die unerwünschte Kumulationswirkung. Auffällig ist die diu-

retische Wirkung des Mittels und die schnelle Auschwemmung von Odemen. Verf. führt noch eine ganze Reihe von Herzkrankheiten an, bei denen Adovern angezeigt ist.
Carl.

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Kalwaryjski, B. E.: Über Jodauffspeicherung und Jodbindung durch die Muskeltrichinen. (Aus dem histologisch-embryologischen Institut der Universität Lwow.) (C. f. B. 1928, I. Abt., Orig., Bd. 108, S. 186—192.)

Verf. konnte zeigen, daß die Muskeltrichinen bei Behandlung mit Lugol'scher Lösung eine ziemlich intensive Braunfärbung annehmen, was mit ihrer Fähigkeit, Jod aufzuspeichern und zu binden, zusammenhängt. Diese Eigenschaft ist in erster Linie im Glykogenegehalt des Trichinenkörpers begründet. Die relativ feste Jodbindung auch nach Behandlung mit Natriumthiosulfat ist auf die erschwerte Permeabilität für dieses Chemikal durch die Kutikula des Wurmes zurückzuführen. Durch längere Einwirkung von Thiosulfat vollständig entfärbte Trichinen verlieren dadurch die Eigenschaft der erneuten Jodspeicherung, eine Erscheinung, die ihre Erklärung in dem färberisch nachgewiesenen Fettmangel des Trichinenkörpers findet. Damit wird die Annahme, daß die jodophile Substanz der Parasiten hauptsächlich im Glykogen zu suchen ist, mittelbar bestätigt.
Carl.

Henk, A.: Dickdarmadenom als Ursache wiederholter Darmblutung beim Schwein. (Allatorvosi Lapok, 1927, Nr. 21, S. 266.)

Bei einem zweijährigen Mutterschwein trat im Verlaufe von 2 Monaten zweimal eine starke Darmblutung auf, die beim ersten Anfall durch subkutane Einspritzung von Pferdeblutserum zum Stillstand gebracht wurde, der zweite Anfall dagegen den Besitzer zur Schlachtung des Tieres veranlaßt hatte. Bei der Zerlegung fanden sich im Anfangsteil des Grimmdarmes drei kindsaufstgroße gestielte Geschwülste, die sich bei mikroskopischer Untersuchung als Adenome erwiesen haben und als die Ursache der Darmblutung zu betrachten sind.
Marek.

Bögli, W.: Verkalkungen und Nekrosen in den Nebennieren von Katzen unter einem halben Jahr. (Schweiz Arch. für Tierheilkunde 1928, S. 335.)

Verkalkungen in den Nebennieren von Katzen unter einem halben Jahr kommen vor. Makroskopisch sind sie nicht nachweisbar. Sie sitzen in der Rinde. Diese Verkalkungen entsprechen zum Teil verkalkten Thromben, zum Teil nicht. Nekrosen, hauptsächlich Kolloidationsnekrosen, kommen vor. Abnorme Kernformen (pyknotische, karyolytische und mißgestaltete Kerne) sind recht häufig. Die Blutversorgung der Nebennieren der jungen Katzen ist eine äußerst spärliche. Die ausgesprochene Verfettung der Epithelien ist einerseits eine Folge dieser mangelhaften Blutversorgung, andererseits ist sie eine Ursache für eine Verschlimmerung derselben. Die Verfettung der Epithelien der Rindensubstanz ist sehr unregelmäßig; bald betrifft sie nur die Zona fasciculata, bald die Zona fasciculata und reticularis, bald alle drei Schichten. Die direkt unter der Kapfel gelegenen Zellen der Zona glomerulosa sind meistens nicht verfettet. In dieser letzteren Zone kommen Zellen mit gut ausgebildeten Kernen vor, um die oft kein Protoplasma sichtbar ist. Warum die Nebennieren junger Katzen die beschriebenen Veränderungen zeigen, entzieht sich unserer Beurteilung.
G.

Seuchenlehre u. Seuchenbekämpfung.

Internationale Konferenz über das Tuberkuloseschutzimpfungsverfahren mit BCG.

In der Zeit vom 15.—18. Oktober 1928 tagte im Institut Pasteur in Paris eine von der Hygienesektion des Völkerbundes einberufene Kon-

ferenz, die sich mit dem gegenwärtigen Stande der Frage über die Schutzimpfung gegen Tuberkulose nach Calmette - Guérin zu befassen hatte. In der ersten Plenarsitzung der Experten, die durch Prof. Roux als Vorsitzenden eröffnet wurde, konstituierten sich drei Subkommissionen für die Durchberatung der zu erörternden Fragen im Kreise der Bakteriologen. (Präsident: Bordet - Brüssel), Veterinäre (Präsident: Nowak - Krakau) und Kliniker (Präsident: Léon Bernard - Paris).

An den Beratungen, die im Beisein von Prof. Madsen - Kopenhagen, als Präsident der Hygienesektion des Völkerbundes und von Calmette und seinen Mitarbeitern Guérin, Boquet und Negre stattfanden, nahmen teil: Neufeld, R. Kraus, Praussnitz (Breslau), Remlinger, Tsekhnowitz (Kharkoff), Cantacuzéne (Bukarest), Salimbeni, Ascoli, Berger und Frenkel (Holland), Gerlach, Vallée, Zeller; Heimbeck (Oslo), Nobel (Wien), Banzoni (Mailand), Savé (Barcelona), Schlossman (Düsseldorf), Petroff (Saranac Lake U.S.A.).

Der Konferenz hat ein ungemein umfangreiches Untersuchungsmaterial vorgelegen, das eifrig diskutiert wurde. Die Ergebnisse der in den Subkommissionen gepflogenen Beratungen, die dem Völkerbund vorgelegt werden, gelangen nachstehend auszugsweise in der Übersetzung des französischen Urtextes bzw. in Anlehnung an denselben zur Wiedergabe.

Beschlüsse der bakteriologischen Kommission.

Die erste hier behandelte Frage war die der Unschädlichkeit des BCG. Einstimmig wurde der Meinung Ausdruck gegeben, daß die experimentell erzielten Resultate den Schluß rechtfertigen, daß das BCG eine unschädliche Vakzine (vaccin inoffensiv) darstellt (Ascoli, Berger, Bordet, Cantacuzéne, Frenkel, Gerlach, Kraus, Neufeld, Nowak, Remlinger, Tsekhnowitz, Vallée, Zeller.)

Nobel beharrt jedoch darauf, daß unter besonderen Bedingungen bei Laboratoriumstieren durch BCG eine tödlich verlaufende Tuberkulose hervorgerufen werden kann.

Die Kommission ist der Meinung, daß die Gesamtheit der veröffentlichten Ergebnisse experimenteller Arbeiten an Laboratoriumstieren in klarster Weise ergibt, daß das BCG zu keiner progredienten Tuberkulose (tuberculose évolutive, progressive tuberculosis) führt.

Um über vergleichende Studien zu verfügen und hieraus in einem späteren Zeitpunkte gelegentlich einer neuerlichen Konferenz Schlüsse ziehen zu können, wurde eine Reihe von wissenschaftlichen Instituten namhaft gemacht, an denen die in Rede stehenden Probleme nach einem eigens hierfür festgelegten Programm bearbeitet werden sollten.

Beschlüsse der Veterinär-Kommission.

Aus der Gesamtheit der gesammelten experimentellen Erfahrungen und der einmütigen Überzeugung derjenigen Praktiker, die das BCG bei Rindern angewendet haben, geht hervor, daß sich die Vakzination nach der von Calmette und Guérin angegebenen Technik für Rinder vollkommen unschädlich erweist.

Die gleichen experimentellen Erfahrungen sowie die gelegentlich der praktischen Anwendung des BCG bei Rindern gemachten Beobachtungen beweisen in gewisser Hinsicht, daß dieser Bazillens Stamm schützende Eigenschaften gegenüber einer experimentellen und natürlichen tuberkulösen Infektion entfaltet.

Diese anerkannt immunisierenden Eigenschaften ermuntern zu einer weiteren Ausdehnung der Versuche einer Schutzimpfung von Rindern mit BCG. Die Durchführung solcher Versuche sollte aber in den verschiedenen Ländern gemäß dem internationalen Arbeitsprogramm unter Kontrolle der Veterinärbehörden und berufener Autoritäten auf dem Gebiete der Bakteriologie und der pathologischen Anatomie erfolgen im engen Konnex mit der von der Hygienesektion des Völkerbundes zum Studium dieses Problems eingesetzten Kommission. Überall, wo dies möglich ist, sollten die Versuche nach folgenden strengen Regeln vorgenommen werden.

Versuchsanordnung.

Während die Unschädlichkeit des BCG für Rinder als festgestellt gelten kann, vermag die Wirksamkeit des BCG erst im Verlaufe einer langen Zeit durch strenge vergleichende Prüfungen an vakzinierten Tieren und Kontrolltieren festgestellt werden, die jeweils dem gleichen infizierten Milieu angehören. Für solche Versuche kommen

Rinderbestände in Betracht, in denen Aufzucht betrieben wird und von denen ein gewisser Prozentsatz (wenigstens 40 Prozent) der Tiere eine positive Tuberkulinreaktion gibt. In solchen Ställen ist eine kleine gefonderte Abteilung vorzuziehen, die schon im voraus gründlich zu desinfizieren und ständig in sauberem Zustande zu halten ist, wofelbst ausschließlich die neugeborenen und schutzzuimpfenden Kälber sofort nach ihrer Geburt unterzubringen sind. Diese Kälber sind unbedingt künstlich mittels einer Saugflasche oder eines Tränkeimers zu ernähren und zwar entweder mit abgekochter Milch oder, was vorzuziehen ist, mit Milch von Kühen, die auf Tuberkulin nicht reagieren. Die Fütterung der Kälber mit der mütterlichen Kolostralmilch ist ausdrücklich zu unterfagen. Bloß die Hälfte der neugeborenen Kälber, weibliche und männliche Tiere möglichst in gleicher Zahl, wird der Schutzimpfung mit BCG innerhalb der ersten 15 Lebenstage unterzogen. Die Nachimpfung hat alljährlich einmal zu erfolgen. Jede Schutzimpfung geschieht mit einer Dosis von 50 Milligramm BCG, die in 10 ccm zu einem Viertel mit physiologischer NaCl-Lösung verdünnter Sauton-Flüssigkeit aufgeschwemmt sind.

Die andere Hälfte der neugeborenen Tiere, gleichfalls wenn möglich männliche und weibliche Tiere in gleicher Zahl, wird genau den gleichen Lebensbedingungen unterworfen, wie die Gruppe der Schutzgeimpften Tiere, jedoch werden auch diese bis zum Tage ihrer Aufteilung im gemeinsamen Stalle an einem eigenen Orte isoliert. Mit größter Genauigkeit ist die Abstammung eines jeden der Kälber beider Gruppen zu registrieren.

30 Tage nach vorgenommener Schutzimpfung ist der Impfschutz voll entwickelt und von diesem Zeitpunkte an werden die Schutzgeimpften und die Kontrolltiere unter normalen Bedingungen gehalten, d. h. nach Belieben unter die übrigen Tiere des Bestandes aufgeteilt. Nur durch eine Ohrmarke und genaues Signalement soll für die Möglichkeit einer jederzeitigen Identifizierung vorgesorgt sein.

Es wird ferner empfohlen, um in keiner Weise die Empfänglichkeit der Tiere zu beeinflussen, die **Vornahme von Tuberkulinproben zu unterlassen**. Lediglich der Schlacht- oder Obduktionsbefund bei den Schutzgeimpften und Kontrolltieren soll schließlich über den Erfolg der Impfungen unterscheiden. Der Obduktions- oder Schlachtbefund hätte besonders zu berücksichtigen: Die Beschaffenheit der verschiedensten Körperlymphknoten (praeskapuläre, retropharyngeale, bronchiale, mediastinale und mesenteriale), der serösen Häute und der Parenchyme. In jenen Fällen, in denen tuberkuloseverdächtige Veränderungen angetroffen werden, sind dieselben einer eingehenden bakteriologischen und histo-pathologischen Untersuchung zuzuführen.

Die Versuche werden solange als notwendig unter diesen Bedingungen, womöglich fünf aufeinanderfolgende Jahre hindurch fortgeführt, um ein Urteil über den Wert dieser Methode zu erlangen.

Beschlüsse der klinischen Kommission.

Aus den der Kommission vorgelegten Dokumenten geht hervor:

1. daß das BCG bei den Neugeborenen in den ersten 10 Lebenstagen per os verabreicht ebensowenig imstande ist, virulente tuberkulöse Läsionen zu verursachen, wie bei älteren Kindern und Erwachsenen nach subkutaner Applikation;
2. daß die Vakzination mit BCG einen gewissen Grad von Immunität hervorruft.

Es sind jedoch weitere, auf einheitlicher Basis vollführte Untersuchungen bei Vakzinierten erforderlich, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, die speziell auch gründliche Kenntnisse vermitteln sollen über Morbidität und Mortalität unter den Geimpften verschiedener Altersstufen und in verschiedenem Milieu. Eher vermag die Kommission nicht endgültig über den Wert der Schutzimpfung mit BCG zu urteilen.

Zu diesem Zwecke fordert sie beim Komitee Statistiker des Völkerbundes an, welche die Daten über Morbidität und Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensalter (sowohl von Geimpften als auch von Nichtgeimpften) sammeln und prüfen sollen.

Richtlinien für die Registrierung der wichtigsten und individuellen Daten seitens der Kliniker sowie für die Festlegung der bei den Autopsien beachtenswertesten Umstände wurden ausgearbeitet und der allgemeinen Beachtung empfohlen.

F. Gerlach-Mödling.

Standesangelegenheiten.

23. Fortbildungskursus des Deutschen Veterinärrats in Stettin.

27. und 28. Oktober 1928.

Der Vors. der Tierärztekammer für die Provinz Pommern, Dr. Riebe-Stralfund, eröffnete am Sonnabend um 9 Uhr den Kursus mit einer kurzen Begrüßungsansprache, in der er außer die erschienenen Vortragenden etwa 100 Tierärzte aus Pommern und den benachbarten Provinzen willkommen hieß.

Den ersten Vortrag hielt Prof. Nöller-Berlin über „Parasitäre Erkrankungen“. Nöller wies insbesondere darauf hin, wie wichtig die Bekämpfung der parasitären Krankheiten unserer Haustiere nicht allein für die Gefunderhaltung der Tiere und für die Sicherung des darin investierten Volksvermögens, sondern auch für die Vermeidung von Krankheiten des Menschen sei. Die Bekämpfung der Echinokokken ist dadurch so überaus erschwert, da auch heute noch vielfach in Schafhaltungen die Unsitte herrscht, nach Schlachtungen die inneren Organe dem Schäferhunde gewissermaßen als Deputat zum Fraße vorzuwerfen. In Ostpreußen und Pommern sollen ca. 40 Prozent, in Ostfriesland 36 Prozent der Hunde als infiziert zu betrachten sein. Das Gleiche gilt von *Coenurus cerebralis*. Die Verfütterung des Gehirns speziell drehwurmkranker Schafe an Hunde sei in manchen Gegenden durch einen Aberglauben nicht auszurotten. Sollen daher diese Krankheiten bekämpft werden, so ist die Fleischuntersuchung in allen Fällen auch bei Hauschlachtungen zu verlangen. Es folgte eine kurze Besprechung über den mikroskopischen Nachweis der Parasiteneier bezw. deren Larven in den natürlichen Abgängen der Tiere an Hand eines Formulars, wie es Prof. Nöller in seinem Institut eingeführt hat. Im allgemeinen sei dem praktischen Tierarzt anzuraten, 2 Kotproben dem Untersuchungsinstitut einzuliefern und zwar eine frische Probe und eine in Formalin fixierte Probe. Die frische Probe diene hauptsächlich zum Nachweis etwa vorhandener Lungenwürmer, da diese am einfachsten durch die im frischen Kot in der Zeit von der Entnahme bis zur Untersuchung aus ihren Eiern geschlüpften Larven, die sich in lebhafter Bewegung vorfinden, nachgewiesen werden können. Strongyliden Eier dagegen seien im fixierten Kot zu diagnostizieren. Darauf ging der Vortragende auf die Leberegelseuche ein. Die Seuche muß vornehmlich auch durch die Bekämpfung der Schnecke eingedämmt werden, die in frischen, klaren und flachen Wassern gedeiht. Interessant waren die Bilder, die Prof. Nöller über die den Gräsern anhaftenden Zysten zeigte, die an manchen Grashalmen in der Nähe der Wasseroberfläche dichtgehäuft bis zu 20 Stück faßen. Durch Austrocknung dellen sich die Zysten ein und schrumpfen mehr und mehr zusammen. Nach Nöller ist Heu 6 Wochen nach der Trocknung nicht mehr infektionstüchtig. Lehrreich waren auch Abbildungen, die die Lebern von leberegelkranken Schafen zeigten; das Leber-Parenchym war vollständig von Bohrgängen noch nicht geschlechtsreifer Leberegel durchsetzt. Der Tod der Schafe kann unter diesen Umständen eintreten, bevor es zur Ausbildung geschlechtsreifer Leberegel kommt.

Schlachthofdirektor Dr. Heine-Duisburg sprach darauf über „Milchkunde und Milchkontrolle“. Deutschland hat einen Bestand von 9 Millionen Milchkühen, die im Jahre 18 Milliarden Liter Milch erzeugen, deren Wert 3,6 Milliarden Mark beträgt. Dieser Wert ist höher als der der jährlichen Kohlenproduktion. Trotzdem haben wir Einfuhr von Milch und Milchprodukten. Während im Jahre 1913 für 39 Millionen Mark Milch eingeführt wurde, steigerte sich diese Summe im Jahre 1925 auf 68 Millionen Mark. Für die Einfuhr von Butter wurden im Jahre 1913 18 Millionen Mark, im Jahre 1925 81 Millionen Mark, für Käse im Jahre 1913 38 Millionen Mark, im Jahre 1925 175 Millionen Mark ausgegeben. Anzustreben ist eine einwandfrei gewonnene Milch von gesunden Kühen, die im frischen Zustande zum Konsumanten gelangt. Aus diesem Grunde ist die tierärztliche Untersuchung der Tiere vor ihrer Einstellung in eine Milchwirtschaft erforderlich. Die Milchkühe sind unter dauernder tierärztlicher Kontrolle zu stellen, um zu vermeiden, daß die Milch von Tieren mit Euterkrankheiten oder sonstigen für den Menschen gefährlichen Krankheiten in den Konsum gelangt. Es folgte die Besprechung der Milchuntersuchung, die in eine physikalische, chemische und hygienische einzuteilen sei. Es wäre an der Zeit, sich mit dem Chemiker zu einigen, anstatt die Zeit mit nutzlosem, verbissenen Streit verfließen zu lassen. Die hygienische Untersuchung der Milch sei aber auf alle Fälle dem Tierarzt zuzusprechen. Die weiteren sehr interessanten Ausführungen des

Vortragenden wurden durch Lichtbilder illustriert, die die Einrichtung und den Betrieb einer modern eingerichteten Molkerei zeigten. Die Molkerei in Duisburg, dem Referenten unterstellt, die, wie viele andere in Westdeutschland städtisch ist, gibt die Trinkmilch nach Dauerpasteurisierung in Stahlflaschen mit Aluminiumdeckelverschluß an die Verbraucher ab. Auf dem Aluminiumverschluß ist der Verwendungstermin angegeben, so daß nur frische Milch verkauft werden kann. Diese Art der Trinkmilchverförgung hält der Referent für die erstrebenswerte.

Anschließend sprach Vet.-Rat Dr. Baars-Stettin über „Die Typendifferenzierung der Bakterien der Paratyphus-Enteritis-Gruppe im Bezug auf ihre praktische Bedeutung“. Man unterscheidet innerhalb der Paratyphus-Enteritis-Bakteriengruppe bestimmte, streng voneinander zu trennende Bakterientypen. Die in ihrer Bedeutung wichtigsten sind das auch als Nahrungsvergifter zu bezeichnende Paratyphus-B (Schottmüller) Bakterium, das nur bei Menschen vorkommt und die 3 Fleischvergifter, das Breslau-, das Gärtner- und das Suipestifer-Bakterium, die vom Tiere aus durch Fleischgenuß beim Menschen Enteritiserkrankungen hervorrufen können. Nach Untersuchungen von Bitter werden Menschen nach Enteritiserkrankungen nicht zu Dauerauscheidern. Beim Tier ist das anders. Es sind bereits mehrere Fälle von Dauerauscheidern von Fleischvergiftern unter Rindern bekannt. Auch in Pommern hat der Referent auf einem Gute 2 Kühe ermittelt, die Dauerausseider von Gärtnerbakterien sind, ohne Krankheitserscheinungen zu zeigen. Während von dem menschenpezifischen Paratyphus-B (Schottmüller) Bakterium bereits wenige Keime zur Infektion des Menschen genügen, wirken die Fleischvergifter in der Regel erst dann gesundheitsschädlich, wenn sie Gelegenheit zur Anreicherung gehabt haben. Das bestätigt die Beobachtung, daß Fleisch, direkt nach der Schlachtung gegessen, häufig unschädlich ist, während es später die schwersten Vergiftungen auslösen kann. Die Typendifferenzierung hat insofern praktische Bedeutung, wenn es sich darum handelt, den Zusammenhang zwischen einer Epidemie und einem Bakterienbefund im Fleische usw. nachzuweisen. Dieser Zusammenhang kann nur dann angenommen werden, wenn die beim Patienten gefundenen Bakterien völlig identisch mit denen des Fleisches sind. Da wir heute in der Lage sind, die einzelnen Typen der Paratyphus-Enteritis-Bakterien zu bestimmen, muß, bei Fleischvergiftungen die genaue Identifizierung der gefundenen Keime verlangt werden. Was die Ubiquität der „Paratyphus-Bakterien“ anbetrifft, so stehen wir heute auf einem ganz anderen Standpunkt, wie etwa vor 10 Jahren. Damals wurden „Paratyphus-Bakterien“ überall in der Außenwelt nachgewiesen und daraus weittragende Schlüsse gezogen. Vornehmlich waren es die Paratyphus-C-Bakterien Uhlenhuths, die nachgewiesen wurden. Heute wissen wir, daß die Paratyphus-C-Bakterien zum größten Teil gar nicht in die Gruppe gehören, sondern harmlose Saprophyten sind.

Nach einer kurzen Mittagspause sprach Prof. Mießner über „Geflügelkrankheiten“. Die große Zunahme der Geflügelhaltungen in den Nachkriegsjahren und die damit natürlicherweise beobachtete Zunahme der Geflügelkrankheiten bedingt, daß heute von seiten der Tierärzte den Geflügelkrankheiten ein größeres Interesse zugewendet werden muß. Neben der Kükenruhr, die besonders der Aufzucht gefährlich wird, ist es die Tuberkulose, die ganze Geflügelbestände zum Aussterben bringen kann. Durch die Tuberkulinkhappenprobe gelingt es, kranke Tiere rechtzeitig zu erkennen und sie auszumerzen. Die Hauptbedingung für das Gelingen aller Bekämpfungsmaßnahmen bleibt aber die Durchführung hygienischer Anweisungen, insbesondere die Reinhaltung der Stallungen, so daß die Infektion durch Aufnahme von Kot vermieden wird. Auch die Leukose ist in Hochzuchten eine gefürchtete, häufig enzootisch auftretende Geflügelkrankheit. Gegen das „Diphtheroid“ des Geflügels ist heute die aktive Immunisierung in Anwendung. Es gelingt, durch einen Impfstoff, der in ähnlicher Weise, wie der für die Pockenimpfung des Menschen benutzte, gewonnen wird, gesunde Tiere vor der Ansteckung durch kutane Impfung zu schützen. Es empfiehlt sich, beim Auftreten der ersten Erkrankungen in einem Geflügelbestande sofort zur Impfung zu schreiten. In der Bekämpfung der Kükenruhr spielt die Blutuntersuchung der Legehühner und die hygienische Haltung der Zucht eine große Rolle. Vornehmlich der Haltung und Pflege der Aufzucht sei das besondere Augenmerk zuzuwenden. Man solle darauf achten, daß nicht zu viele Küken zusammengepfercht würden, damit bei etwaigen Kükenruhrerkrankungen nicht

gleich ein erheblicher Teil der gefundenen Küken der Infektion ausgesetzt ist, und die Überficht über den Bestand nicht unmöglich wird. Daneben sei größte Sauberkeit notwendig; die Kükenplätze seien täglich zu reinigen und zu desinfizieren. Lichtbilder aus dem Gebiete der Geflügelkrankheiten, sowie zwei Filme über Geflügelpest, Geflügelähme und moderne Geflügelfarmen illustrierten den mit Beifall aufgenommenen Vortrag. Die anschließende Diskussion dehnte sich bis etwa 8 Uhr abends aus, worauf ein gemütliches Beisammenfein im Konzerthause den ersten Tag beendete.

Die Vorträge des folgenden Tages wurden im Wirtschaftsraum des städtischen Schlachthofes gehalten. Prof. Goetze-Hannover sprach über „Sporadische und infektiöse Euterkrankheiten“. Die Behandlung der infektiösen Euterkrankheiten hat nur dann Zweck, wenn die Tiere frühzeitig zur Behandlung kommen. Die Behandlung von Tieren, bei denen mehr als zwei Eutervierviertel erkrankt sind, soll nur dann in Angriff genommen werden, wenn es sich um ganz besonders wertvolle Tiere handelt. Bei der Behandlung durch Euterinfusion unter Klopfmassage ist darauf zu achten, daß das Euter mit der Yatre- bzw. Rivanollösung wirklich prall gefüllt ist. Filmvorführungen leiteten in das Gebiet der Chirurgie über, wobei sehr interessante Operationen am Rinde unter Epiduralnarkose durchgeführt wurden. Der äußerst interessante 2½stündige Vortrag fesselte die Zuhörer, insbesondere die praktischen Tierärzte, denen eine Fülle von Neuerungen auf operativem und therapeutischem Gebiete der Rinderkrankheiten und Geburtshilfe gezeigt wurde.

Im Anschluß an den Vortrag fanden verschiedene Demonstrationen auf dem Schlachthofe statt. So wurde die elektrische Betäubung von Schlachtieren an Rindern und Schweinen von Müller und Weinberger gezeigt. Mießner führte die Blutentnahme beim Huhn und das Tuberkulinisieren der Hühner vor, während Götze das hannoversche Drahtfägenembryotom in seiner Anwendung und Wirkungsweise an toten Früchten demonstrierte. Hieran anschließend folgte der letzte Vortrag von Prof. Dr. Müller-München über „Pathologie und Bakteriologie in der Fleischschau und die Verantwortungsfrage bei Fleischvergiftungen“. Der Referent trat dafür ein, daß das Fleisch notgeschlachteter Tiere nicht mehr als volltauglich in den Handel gelangen, sondern als nicht volltauglich und dementsprechend gekennzeichnet auf der Freibank verkauft werden soll. Die meisten Fleischvergiftungen gingen vom Fleisch notgeschlachteter Tiere aus. Eine restlose Verhinderung von Fleischvergiftungen sei aus dem Grunde unmöglich, da die Paratyphusbakterien latent (verborgen) auch bei gesundererscheinenden einwandfrei geschlachteten Tieren vorkommen können.

Der Vors., Dr. Riebe, schloß mit Dankesworten an die Referenten und an die Erschienenen die wohlgelungene Veranstaltung, die durch ein Pommersches Gänsebratenessen ihren Abschluß fand.

Baars.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Prof. Dr. Dr. h. c. Kronacher, Direktor des Instituts für Tierzucht und Vererbungsforchung an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, hat einen Ruf an das Institut für Tierzucht und Züchtungsbiologie der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin, als Nachfolger für den am 1. April 1929 auscheidenden Geheimen Regierungsrat Prof. Dr. Hansen erhalten.

Prof. Nicolle, Direktor des Pasteurinstituts in Tunis hat den diesjährigen medizinischen Nobelpreis erhalten. Nicolle hat zahlreiche hervorragende Arbeiten auf dem Gebiete der Infektionskrankheiten, so über Tollwut, Malaria usw. verfaßt. Von besonderer Bedeutung ist seine im Jahre 1911 veröffentlichte Entdeckung, daß das Fleckfieber durch die Laus von Mensch zu Mensch übertragen wird.

Langemarck-Gedächtnisfeier der Studentenschaft der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Am Sonntag, den 11. November 1928, dem Jahrestage des Langemarck-Sturmes, fand in der Aula der Tierärztlichen Hochschule Hannover eine Langemarck-Gedächtnisfeier der Studierenden statt. Hierzu hatten sich eingefunden der Lehrkörper, die Assistentenschaft, einige Ehrengäste und die Studierenden. Eröffnet wurde die Feier nach dem Einzug der Chargen, Professoren und Ehrengäste und nach einem Orgelvorspiel durch einen Vortrag des Vorsitzenden der Studentenschaft,

cand. med. vet. Thiele. Er ging von dem Beschluß des Vorstandes der Deutschen Studentenschaft aus, die Verwaltung und Instandsetzung des Studenten-Friedhofes bei Langemarck zu übernehmen und für die Errichtung eines würdigen Denkmals Sorge zu tragen. Noch einmal zogen vor unserem geistigen Auge die Heldentaten, das Leben und Sterben jener jungen Freiwilligen vorüber, die in den ersten August-Tagen 1914 voller Begeisterung sich dem Vaterlande zur Verfügung stellten. Sie befeigelten nach unfählichen Anstrengungen der Ausbildungszeit, des Vormarsches in Feindesland und nach blutigen Kämpfen an der Front ihre Treue zum Vaterlande mit dem Herzblut und ruhen zu Tausenden in Feindesland. Auch die Deutsche Studentenschaft habe im vorigen Jahre anlässlich des 10. Deutschen Studententages in Würzburg im Beisein der Fahnen der tapferen Regimenter von Langemarck den Heldenstein für die im Weltkriege gefallenen Studenten enthüllt. Der trostlose Zustand der Friedhöfe bei Langemarck habe sie jedoch veranlaßt, noch eine weitere Dankespflicht zu erfüllen. Sie habe deshalb die Patenschaft über diese Studenten-Friedhöfe übernommen, um für einen dauernden würdigen Zustand der Heldengräber Sorge tragen zu können. So ergehe denn in dieser Stunde an alle Studenten, Alt-Akademiker, Freunde und Gönner der Hochschule der Ruf, auch ihrerseits beizusteuern zu diesem Werke der Dankbarkeit gegenüber den gefallenen Kommilitonen, damit auch dort in Feindesland ein Denkmal der Nachwelt Kunde gebe von den Heldentaten Deutschlands bester Jugend und dem Dank der jetzigen Generation. Zum Schluß der Ansprache wurde an der Gedenktafel in der Aula im Namen der Studierenden ein Kranz niedergelegt. Nach dem Liede vom guten Kameraden ergriff Magnifizenz Mießner das Wort. Er hob nochmals den Heldenmut und den von inniger Liebe zu Volk und Heimat getragenen Opferwillen jener jugendlichen Kämpfer hervor, die freudig den Hörtal mit dem Schlachtfelde vertauschten. Die Feinde haben uns alles genommen, die Einheit des Deutschen Reiches ist uns erfreulicherweise geblieben. Der Wiederaufbau kann nicht allein aus der Technik und aus dem Materialismus geboren werden, sondern aus dem Geiste, dem ein unbeugbarer Wille zur Seite steht. Die sittliche Freiheit, sowie Treue und Ehre sind das realste Gut, ohne die eine Wirtschaft nicht gedeihen kann. So möge das Blut der gefallenen Helden, die für ihr Vaterland kämpften, nicht nutzlos geflossen sein. Die edle Gesinnung, welche jene begeisterte, möge uns zur Nacheiferung anspornen. Auch die Hochschule betrachte es als ihre Ehrenpflicht, ihr Scherflein zur Erhaltung der Grabstätten unserer im Kriege gefallenen akademischen Jugend beizutragen. Mit dem Deutschlandliede schloß die erhebende Feier.

Veterinärat Otto Clausnitzer †.

Am 31. Oktober d. Js. starb nach kurzer Krankheit im 82. Lebensjahre der Vet.-Rat Schlachthofdirektor a. D. Otto Clausnitzer, Kriegsteilnehmer von 1870/71, tief betrauert von seiner treuen Lebensgefährtin und einem Sohne. Sein ältester Sohn, der staatl. Bergassessor Otto Clausnitzer war schon 1914 als Leutnant im 2. Garde-Regiment zu Fuß in Frankreich gefallen, ein Schicksalschlag, der die Eltern sehr schwer traf; ganz verwunden haben sie den schweren Verlust nie. Clausnitzer war von 1889—1920 Direktor des Schlachthofes und beider Viehhöfe in Dortmund und ebenso lange Mitglied unseres Vereins, dessen langjähriger Vorsitzender und späterer Ehrenvorsitzender er war, und um dessen Gedeihen er sich große Verdienste erworben hat. Auch war er langjähriger Kassenwart und später Ehrenmitglied des Tierärztereins Westfalens. Der Verstorbene gehörte zu den Senioren unter den Tierärzten, die die Fleischbeschau von ihren Anfängen an kennen gelernt und ausgeführt, und die den Aufstieg unseres Standes mit erlebt und mit errungen haben. An Anerkennungen fehlte es ihm nicht, die Regierung ernannte ihn am 3. Juni 1912 zum Vet.-Rat, die Stadt hat ihren treuen Beamten ebenfalls mehrfach geehrt. Jetzt ist er von uns gegangen, er, der noch auf der letzten Versammlung für die ihm zu Teil gewordenen Glückwünsche und für das Ehrengelichen des Vereins zu seinem 80. Geburtstage bewegt danken konnte. Er wird uns unvergesslich bleiben.

Dortmund, den 2. November 1928.

Verein der Schlachthof- und Gemeindetierärzte Westfalens.

Büscher, I. Vors.

Besichtigung der Staatlichen Forschungsanstalten Infel Riems.

Am 29. und 30. Oktober 1928 besichtigten etwa 20 Teilnehmer am

Vorbereitungskursus für Veterinärkandidaten und 20 Studierende des letzten Semesters der Tierärztlichen Hochschule Hannover die Staatlichen Forschungsanstalten Infel Riems. Wie früher, so hatte auch dieses Mal Prof. Dr. Waldmann in hervorragender Weise alles für Unterkunft und Verpflegung der Teilnehmer vorbereiten lassen. Die Besichtigung begann am Montag mit einem Vortrage von Professor Dr. Waldmann, Geschichte und Organisation der Anstalt. Mit Lichtbildern; Führung durch die Maul- und Klauenfeucheanstalt. Dr. Trautwein, Demonstration über den Verlauf der Maul- und Klauenfeuchefektion beim Rind, Schwein und Meerfchweinchen. Prof. Dr. Waldmann, Dr. Roemmel und Dr. Höve, Demonstration der Serumherstellung und Serumprüfung. Dienstag, den 30. Oktober: Prof. Dr. Waldmann, Grundsätze der Maul- und Klauenfeuchebekämpfung in Viehwirtschaft treibenden Kulturstaaten. Mit Lichtbildern. Dr. Trautwein: Die neue Bekämpfungsmethode in Deutschland und ihre experimentellen Unterlagen. Dr. Trautwein und Dr. Höve, Demonstrationen zur Maul- und Klauenfeuchebekämpfung. Diskussion. Neben den theoretischen Erörterungen, die den heutigen wissenschaftlichen Standpunkt unserer Kenntnisse auf dem Gebiete der Maul- und Klauenfeucheforschung sowie die jetzt geübte praktische Maul- und Klauenfeuchebekämpfung zum Gegenstande hatten, war den Teilnehmern Gelegenheit gegeben, an einem selten schönen und gut vorbereiteten Demonstrationsmaterial alle Phasen der Maul- und Klauenfeucheerkrankung beim Rinde, Schweine und Meerfchweinchen vom ersten Tage bis zur vollständigen Abheilung sowie auch die Ausführung der Impfung beobachten zu können. Es hat sich dabei ausgezeichnet bewährt, daß die Besichtigung statt wie früher auf einen Tag, auf zwei Tage ausgedehnt wurde. Nur so war es möglich, die Teilnehmer wirklich mit dem außerordentlich vielseitigen und wertvollen Material vertraut zu machen. Prof. Dr. Waldmann und seinen Mitarbeitern sei der allseitige Dank für das Gebotene zum Ausdruck gebracht.

Mießner.

7. praktischer Kursus auf dem Lehrgute Adendorf der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

In der Zeit vom 9. bis 24. Oktober nahmen 21 Studierende der Tierärztlichen Hochschule Hannover, meist der älteren Semester an dem Kursus auf dem Lehrgute Adendorf teil. Die Vormittage waren in der Hauptsache Demonstrationen durch Mitglieder des Lehrkörpers vorbehalten; die übrige Zeit wurden die Studierenden unter fachkundiger Leitung im Stall und auf dem Felde beschäftigt. Der nächste Kursus findet Anfang Januar 1929 statt.



EPONA,

die schützende Gottheit der Reit- und Zugtiere, der Pferde und Maultiere in der römischen Kaiserzeit wurde hauptsächlich verehrt von Leuten, die ständig mit ihren Schützlingen zu tun hatten, so den Angehörigen berittener Truppenteile; ihre Bilder pflegten auch die Ställe zu schmücken. Für die Darstellung der Epona gibt es zwei verschiedene Typen. Der eine im östlichen Gallien und Germanien, Italien und an

der Donau vorkommend, zeigt die Göttin in matronaler Haltung und Gewandung thronend, umgeben von zwei oder mehr Tieren, die sie aus der Schale auf ihrem Schoße füttert. So u. a. auf dem interessanten Relief aus Beihingen in Württemberg, jetzt in der Staatsammlung Vaterländischer Altertümer in Stuttgart, das im unteren Streifen das Dankopfer des Stifters nach einer glücklich beendeten weiten Fahrt — daher der Reisewagen — darstellt. Der andere Typus ausschließlich in Gallien und Germanien vorkommend, der rein keltische, zeigt Epona nach Frauenart auf dem munter ausschreitenden Pferde sitzend, wieder lang gewandt und oft mit wehendem Mantel, zuweilen Früchte im Schoß oder ein Füllhorn haltend. Auf dem anmutigen aquitanischen Beispiel aus Gannat, jetzt im Museum zu St. Germain bei Paris, hält sie als Hüterin und Bewahrerin der Stallungen fogar einen mächtigen Schlüssel (siehe Bild der Umschlagseite). Durch den gesteigerten Verkehr der Römerzeit ist das Bild der Epona in beiden Gestaltungen weit hin verbreitet worden. H. Thiersch, Göttingen.

Verein der Tierärzte des Reg.-Bezirks Düsseldorf.

Herbstversammlung am Bußtag, den 21. November 1928, in Düsseldorf, städt. Tonhalle, Ecke Shadow- und Tonhallenstraße. Anfang pünktlich 2½ Uhr nachmittags. 1. Geschäftliche Mitteilungen, (Kammerwahlen, Bericht über die Jubelfeier in Hannover und den rheinischen Tierärztetag). 2. Aufnahme neuer Mitglieder. 3. Vortrag von Prof. Dr. Mießner-Hannover über a) Blutgruppenfrage und ihre Bedeutung in der Human- und Veterinärmedizin; b) Geflügelkrankheiten. 4. Verschiedenes: Um Unterlagen für die Aussprache rechtzeitig zu beschaffen, wird gebeten, Punkte, welche zur Besprechung kommen sollen, dem Schriftführer spätestens bis zum 16. November schriftlich mitteilen zu wollen. Nach der Versammlung etwa 5 Uhr gemeinsames Mittagessen. Zahlreiche Teilnahme der Damen hieran, höflichst erbeten.

Düsseldorf-Krefeld, 6. November 1928.

Der Vors. Dr. Heyden. Der Schriftf. Dr. May.

Tierärzteverband Niederfachsen.

7. Hannoverische Tierärztetagung am 1. und 2. Dezember 1928 in Hannover.

Sonabend, den 1. Dezember 1928: Gruppenitzungen der prakt. Tierärzte, der Staatstierärzte und der Schlachthoftierärzte 15 Uhr in der Tierärztlichen Hochschule.

Veranstaltungen des Tierärzteverbandes Niederfachsen.

Sonntag, den 2. Dezember 1928: Vorstandssitzung 10 Uhr. Hauptversammlung 11 Uhr in der Tierärztlichen Hochschule. Gemeinschaftliches Essen mit Damen und Tanzkränzchen im Festsaal des Hotels Mußmann, Ernst-August-Platz 7, um 15 Uhr. Die Tagesordnungen werden noch bekanntgegeben. Die studentischen Korporationen der Tierärztlichen Hochschule sind gebeten, ihre Weihnachtskneipen, Sonabend, den 1. Dezember, abzuhalten, damit ihre AH.-AH. Gelegenheit haben, daran teilzunehmen.

Der geschäftsführende Vorstand:

Friese, Vors., Prof. Dr. Oppermann, stellv. Vors.,
Dr. Machens, Schriftf., Dr. Flemming, Kassenführer.

Tierärzteverband Niederfachsen.

7. Hannoverische Tierärztetagung am 1. und 2. Dezember 1928 in Hannover.

Gruppenitzungen.

Sonabend, den 1. Dezember 1928, 15 Uhr, in der Tierärztlichen Hochschule.

Staatstierärzte im klinischen Hörsaal (Apotheke).

1. Bericht über die Vollversammlung des Vereins beamteter Tierärzte Preußens am 20. Oktober 1928 in Berlin. 2. Tierärztekammerwahl. 3. Vortrag. 4. Besprechung über Fleischbeschaufragen besonders § 5 A.G. und § 7 A.B.I.

Gemeindetierärzte (Landesgruppe Nordwest des Reichsverbandes der Gemeindetierärzte) im Hörsaal des pathologischen Institutes.

1. Tätigkeitsbericht. 2. Bericht über die Karlsruher Tagung des R.D.G. (Ref.: Der Vorsitzende). 3. Über die pathol. Anatomie der Lungenentzündungen der Haustiere (mit Demonstrationen). Referent: Prof. Dr. Lund.

Praktische Tierärzte (Niederfachsengruppe des Reichsverbandes prakt. Tierärzte) im Hörsaal des anatomischen Institutes.

Vorberatung der Verhandlungsgegenstände der Hauptversammlung des Tierärzteverbandes Niederfachsen.

Verein der Tierärzte des Reg.-Bezirks Hannover.

Hauptversammlung am Sonntag, den 2. Dezember 1928, 9 Uhr, im Hörsaal des pathologischen Institutes.

1. Geschäftsbericht. 2. Beiträge.

Veranstaltungen des Tierärzteverbandes Niederfachsen.

Sonntag, den 2. Dezember 1928, 10 Uhr, im Hörsaal des anatomischen Institutes.

Vorbesprechung der in der Hauptversammlung zu beratenden Gegenstände.

11 Uhr: 61. Hauptversammlung im Hörsaal des anatomischen Institutes.

1. Geschäftsbericht. 2. Bericht über die 150jährige Jubelfeier der Hochschule. 3. Kassenbericht. Abnahme der Jahresrechnungen der Vereinskasse (§ 14 der Verbandsatzung) und der Unterstützungsquote für 1928 (§ 13 der S.U.K.). 4. Unterstützungsquote für 1928 (§ 8). 5. Verbandsbeitrag für 1929 (§ 13). 6. Beitragsbewilligungen: a) für die Gesellschaft der Freunde der Tierärztlichen Hochschule, b) für die Tierärztliche Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums, c) für die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, d) für das Ärztehaus, e. G. m. b. H., Referenten: Dr. Marks und Dr. Dunker, e) für den Provinzialmilchauschuß. 7. Neuwahl des geschäftsführenden Vorstandes (§ 5). 8. Fleischschau und Fleischvergiftungen. Vertrag von Ob.-Vet.-Rat Prof. Dr. Max Müller-München. 9. Fortsetzung der Aussprache über „Beziehungen zwischen Fleischschau und Fleischvergiftungen, unter Mitberücksichtigung der Frage der Aufhebung oder Abänderung des § 5 des Preuß. Gesetzes betr. Ausführung des Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetzes (A.G.) und § 7 der preussischen Ausführungs-Bestimmungen betr. die Schlachtvieh- und Fleischschau, einschl. Trichinenschau bei Schlachtungen im Inlande (A.B.I.). Referenten: Stadt-Vet.-Rat Brinkop-Lüneburg, Vet.-Rat Dr. Bette-Hildesheim, Dr. Machens-Elze. 10. Bericht über die Tierärztekammerwahl.

Nachmittags 3 Uhr, gemeinsames Essen mit Damen und Tanzkränzchen im Festsaal des Hotel „Mußmann“, Ernst-August-Platz 7 (Gedeck RM. 4,50). Anmeldungen zum Essen sind spätestens bis zum 30. November 1928 an den Tierärzteverband Niederfachsen, Hannover, Sallstraße 95, zu richten. — Gäste können nach vorheriger Anmeldung beim Vorsitzenden eingeführt werden, Je 1 Vertreter des Studentenausschusses und der Korporationen sind Gäste des Tierärzteverbandes.

Der geschäftsführende Vorstand:

Friese, Vors. Prof. Dr. Oppermann, stellv. Vors.
Dr. Machens, Schriftf. Dr. Flemming, Kassenf.

Tierärztlicher Zentralverein für die Prov. Sachsen, Thüringen u. Anhalt.

Es wird schon jetzt darauf aufmerksam gemacht, daß am Sonntag, den 2. Dezember d. Js., in Magdeburg, Hotel „Stadt Prag“, Bärplatz, eine Generalversammlung stattfinden wird. — Vet.-Rat Gundelach wird über „Fliegenplage und -bekämpfung“, Privatdozent Dr. Schmidt-Hoensdorf und Dr. Wilhelm Schmidt über „Milchhygiene und ansteckende Euterentzündungen mit Vorwürfen“ sprechen. Außerdem sollen chirurgische Fragen aus der Praxis (Dr. Wulfsberg) behandelt werden. Der Vorstand.

Verein der Getreidehändler der Hamburger Börse.

Der Verein der Getreidehändler der Hamburger Börse setzt einen Preis von RM. 1000. (Eintausend Reichsmark) für die Angabe von Mitteln und Wegen aus, auf welchen die auf Grund der Verordnung vom 27. September 1928 beanstandete nordamerikanische Gerste rationell während der vollen Maistperiode für die Schweinemast Verwendung finden kann. Das Verfahren darf keine wesentlichen, wirtschaftlich untragbaren Kosten verursachen und muß bisher noch unbekannt sein. Bekannt ist, daß die Gerste mit Milch in verschiedener Form und Kartoffeln, ferner nach Dämpfen und Walchen sowie in einzelnen Fällen nach Aspiration, Sieben, Bürsten, Spitzen, Schälen usw. gefressen wird. Derartige und andere zu teure Verfahren kommen nicht in Frage. Ferner ist bekannt, daß die Gerste von Rindern und Pferden ohne Schädigung an ihrer Gesundheit genommen wird.

Lösungen der vorstehenden Aufgabe sind schriftlich, spätestens bis zum 20. November 1928, an das Sekretariat des Vereins der Getreide-

händler der Hamburger Börse; Hamburg, Getreidebörse, Kontor Nr. 24, zu richten. Die Entscheidung darüber, welcher Lösung der ausgesetzte Preis zuzuteilen ist, bzw. über die Verteilung des Preises an mehrere Einfender wird vom Vorstand des Vereins der Getreidehändler der Hamburger Börse unter Ausschluß des ordentlichen Rechtsweges endgültig getroffen.

Der Vorstand des Vereins der Getreidehändler der Hamburger Börse.
I. A.: H. Bögel.

25. Fortbildungskursus des D.V.R.

Samstag und Sonntag, den 1. und 2. Dezember 1928, in Regensburg.

Samstag, den 1. Dezember Vet.-Medizinalrat Dr. Drescher - Oberschleißheim: „Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche durch Ringimpfung“; Prof. Dr. Stang - Berlin: „Neuzeitliche Fütterung“; Prof. Dr. Ernst - München: „Euterkrankheiten und ihre Therapie, milchhygienische und wirtschaftliche Bedeutung“; Prof. Dr. Stoss - München: „Neues auf dem Gebiete der Geburtshilfe“ (mit Demonstrationen). Sonntag, den 2. Dezember: Prof. Dr. Stoss - München: „Die klinische Trächtigkeitsdiagnose“ (mit Demonstrationen); Ministerialrat Dr. Niklas - München: „Tagesfragen aus dem Gebiete der Tierzucht“; Prof. Dr. Ernst - München: „Seuchenhaftes Verwerfen beim Rind und seine Bekämpfung“.

Stang.

Ein neuer Hanomag.

Internationale Automobilausstellung Berlin.

Der Stand der Hanomag zeigt neben dem bewährten 500 ccm $\frac{2}{10}$ PS-Wagen offener und geschlossener Ausführung als Neukonstruktion ein 750 ccm $\frac{3}{16}$ PS-Kabriolet — einen Zweifitzer mit eineinhalb Reserve-sitzen, das als ein besonderes Ereignis der Ausstellung bezeichnet werden muß und auch auf geschäftlichem Gebiete einen Erfolg verspricht. Es ist ein Kind unserer Zeit, die hohe Ansprüche stellt sowohl in Qualität, Geschmack und Preis. Der neue Hanomag wird ihr im vollsten Maße gerecht. Ausgestattet mit einem wohlgeprobten Vierzylinder-Viertaktmotor mit abnehmbarem Zylinderkopf und stehenden Ventilen, Thermosyphon-Kühlung, Druckumlaufschmierung und der übrigen erstklassigen Ausrüstung wie Bosch-Zündung, -Anlasser und Lichtmaschine, Vierradbremse, Tachometer, automatischer Scheibenwischer, Fahrtrichtungsanzeiger usw., kurz mit allen wünschenswerten, zeitgemäßen Einrichtungen, muß die Wahl als Kabriolet, der elegantesten und beliebtesten Ausführung, die eine Verwendung des Fahrzeuges bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit ermöglicht, als besonders glücklich bezeichnet werden, da jetzt auch der wirtschaftlich Schwache, vor allem der im Berufsleben auf einen Kleinwagen angewiesene Geschäftsmann, der Arzt usw. einen ebenso vollendeten wie eleganten Kleinwagen preiswert erwerben kann. Dank der modernen Einrichtungen der Erbauerin erfolgt die Herstellung in Großserien, so daß die Lieferung von vornherein zu einem volkstümlichen Preis gewährleistet ist. Es ist Frühjahr 1929 lieferbar.

Lukutate.

Nach Mitteilung der „Apotheker-Zeitung“ hat das Norwegische Departement für soziale Angelegenheiten den Handel mit Lukutate und „Dr. Hillers medizinischen Kräutern“ verboten.

Bücherbesprechungen.

Hauck, E.: Das seelische Verhalten des Pferdes und des Hundes. 178 S. Verlag Urban & Schwarzenberg, Berlin. 1928. Gebunden 7,80 Mk.

Das Studium der Psychologie der Haustiere ist ein ungemein reizvolles, aber auch sehr schwieriges. Mit vorliegender Arbeit will und kann Verf. nichts Abschließendes bringen. Seine besondere Zuneigung zu der in Frage stehenden Materie hat ihm die Feder in die Hand gedrückt. Ohne Berufspsychologie zu fein oder fein zu wollen, will Verf., dessen im Vorwort zum Ausdruck gebrachte Denkungsart sympathisch berührt, in seinem Buche vor allem die auf diesem Gebiete für den Laien meist weniger gut faßbare „Gelehrtensprache in die Sprache dieser Welt“ übersetzen und so die Psychologie der Haustiere auch dem weniger Gebildeten näher bringen. Wie weit das dem Verf. bei der Knappheit der Ausdrucksweise namentlich in den ersten Seiten des Buches gelungen ist, vermag Ref. als ein mit der Materie Vertrauter

nicht zu beurteilen. In den ersten umfangreichen Kapiteln macht Verf. den Leser mit den allgemeinen Grundbegriffen der Psychologie vertraut. Dabei scheut er nicht vor fachlicher Kritik zurück, wenn er die Auffassungen anderer neben die eigenen stellt. Besonders wertvoll und anregend betrachte ich die im letzten Teile des Werkes niedergelegten eigenen Beobachtungen, die mitteilen sollen, in wieweit die Psyche des Haustieres an den einzelnen geschilderten Vorgängen mitwirkt und in welchem Verhältnis diese zu der des Menschen steht. Die Haustiere stehen dem Menschen an Gehirnleistung nicht gleich, das offenbaren die Darlegungen des Verf. allenthalben. Freilich hätte man stellenweise ausführlichere psychologische Deutungen mancher mitgeteilter Handlungen gern gesehen. Trotz alledem bleibt das Werk gerade für den Tierarzt ein recht lesenswertes Buch und eine wertvolle Bereicherung unserer Kenntnisse auf dem Gebiete der Psychologie der Haustiere.

Trautmann.

Veröffentlichungen aus d. Gebiete der Medizinalverwaltung. Bd. XXVI.

Heft 3. Berlin 1928. Verlag R. Schoetz. Preis brosch. Mk. 4,20.

Der erste Aufsatz dieses Heftes stammt aus der Feder von W. Auer und beschäftigt sich mit der Frage: „Sind die heute geltenden Bestimmungen über die Verwendung des Fleisches der Schlachttiere zur menschlichen Ernährung im Hinblick auf die menschliche Gesundheit ausreichend oder abänderungsbedürftig?“ Verf. weist mit Nachdruck darauf hin, daß eine Erfolg versprechende Durchführung aller gesetzlichen Maßnahmen nur durch ein einheitliches Zusammenarbeiten der Sachverständigen auf dem Gebiete des Veterinärwesens, der öffentlichen Gesundheitspflege und der Nahrungsmittelchemie gewährleistet wird. — In der zweiten Hälfte des Heftes behandelt M. Skibba: „Die Verforgung Deutschlands mit Auslandsfleisch vom Standpunkt der Volksernährung und Sanitätspolizei.“ Nach Ansicht des Verf. erscheint in der Gegenwart für die Volksernährung die Verforgung mit Auslandsfleisch geboten, da der Fleischgebrauch aus eigener Produktion auf Jahre nicht aufzubringen ist. Die Preisgestaltung muß eine derartige sein, daß auch der arme Mann seinen Bedarf decken kann. Die Einfuhrerleichterungen vom 4. August 1914 haben gezeigt, daß die gegenwärtigen sanitätspolizeilichen Maßnahmen ausreichend sind, um Menschen und Tiere vor Erkrankungen zu schützen, zumal auch das Gefrierfleisch im Ursprungsland einer eingehenden sanitätspolizeilichen Überwachung nach deutschem Muster unterworfen wird.

Lund.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Assistentztierarzt am Bakteriolog. Institut der Landwirtschaftskammer in Breslau, Dr. Pallaske, zum Oberassistenten am Vet.-Patholog. Institut der Universität Leipzig; wissenschaftl. Assistent Dr. Walter Bolz zum Oberassistenten, Tierarzt Dr. Karl Dietrich aus Halle zum wissenschaftl. Assistenten an der Chirurg. Klinik der Tierärztlichen Hochschule in Berlin.

Übertragen: Anstelle der Tierarztes Dr. Ullrich in Münster i. W. die kommissarische Verwaltung der Veterinärstelle des Keises Steinfurt (Bezirk Münster) dem Tierarzt Dr. Bürmann in Dortmund.

Befördert: Ob.-Vet.-Rat Friedr. Zink in Feuchtwangen zum etatsmäßigen Bezirkstierarzt für den Verwaltungsbezirk in Ansbach.

Approbiert: in Berlin: Helmut Nieland aus Wilhelmshaven.

Verstorben: Amtstierarzt Richard Lammert in Hamburg.

Veränderungen im Vet.-Offizierkorps.

Befördert: Generaloberveterinär Prof. Dr. Lührs, Div.-Veterinär der 1. Kav.-Div. zum Generalveterinär; die Oberstabsveterinäre Dr. Wiedemann, 8. Reiter-Regt., Dr. Fiedler, 12. Inf.-Regt. zu Generaloberveterinären; die Stabsveterinäre Dr. Kröcher, 6. Fahr.-Abt., Dr. Pietzsch, 1. Inf.-Regt., Dr. Bruder, 4. Artl.-Regt., Dr. Nitsche, Heeres-Veterinär-Untersuchungsamt zu Oberstabsveterinären; die Oberveterinäre Dr. Zerrath, Stab der 3. Div., Dr. Schilling, Stab der 4. Div., Dr. Geweniger, Heeres-Veterinär-Untersuchungsamt, Dr. Gomolka, 6. Art.-Regt. zu Stabsveterinären; die Veterinäre Flachs, 1. Art.-Regt., Freyberger, 1. Reiter-Regt., Berner, 13. Reiter-Regt. zu Oberveterinären.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Veterinärhistorische Mitteilungen

Herausgegeben von der

Gesellschaft für Geschichte und Literatur der Veterinärmedizin

Schriftleiter:

Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

Zwanglos erscheinende Beilage zur „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“
Verlag von M. & H. Schaper in Hannover
Sonderbezugspreis 1,50 Goldmark das Jahr, freibleibend.

Nr. 11.

1928.

8. Jahrgang.

Albrecht Schmidts,

ein Berliner Marstallveterinär Friedrichs des Großen.

Von Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

In den letzten Jahrzehnten der Regierung Friedrichs II. von Preußen war der Berliner Marstall hinter den Potsdamer getreten. In Potsdam standen 1775 allein 48 englische und 10 polnische Reitpferde zur persönlichen Benutzung durch den König, außerdem 20 Pagen- und Klepperpferde, 92 Kutschpferde und 30 Maultiere. Da der König sich den größten Teil des Jahres über in Sanssouci aufhielt, genügten für den Berliner Marstall 89 Pferde und 52 Maultiere. In einer Beziehung war aber 1775 der Berliner Marstall dem Potsdamer überlegen, er hatte einen besonderen Cur- und einen besonderen Beflagelchmied. Im Potsdamer Marstall wurde hingegen damals noch die Pferdeheilkunde und der Hufbeschlag von ein- und derselben Person ausgeübt, und zwar von dem „Reit- und Artzschmid“ George Wheeler — einem englischen Veterinär — im Reitstalle, von dem Hof- und Artzschmid Samuel Siefert im Kutschstalle.

Der Berliner Marstallveterinär, der von 1775 bis zum 1. März 1783 lediglich kurativ tätig war, hieß Albrecht Schmidts. Er war schon vor 1775 Tierarzt am Berliner Marstall, läßt sich aber urkundlich erst nachweisen durch einen „accord“, den Graf von Schwerin, der Oberstallmeister des Alten Fritz, mit ihm schloß.

Da dieser Vertrag sowohl die Aufgaben wie auch die Bezahlung eines friderizianischen Marstallveterinärs festlegt, folgt sein Wortlaut: „Actum Berlin, den 1. Dec. 1775. Nach dem des Königl. General Major auch Ober-Stallmeisters Herrn Grafen von Schwerin Hochgebohrn zu verordnen geruhet: daß bey denen Medicin und Curen der Königl. Pferde und Maultieren, vom 1. Dec. 1775 an, eine Abänderung geschehen, und denen Königl. Artzschmieden (Artzschmid = Veterinär), fernerhin nicht mehr als vor Ein Pferd Ein grofchen, und vor Ein Maulthier 6 Pfennige Monatlich vor Medicin und Curen in Rechnung passiret und derer Betrag Quartaliter bezahlet werden solle; des Herrn Rittmeister von Drosedow Hochwohlgeboren haben dem nach den Königl. Artzschmid Albrecht Schmidts aufgegeben: diese Abänderung und respective verordnung folge zu leisten, nach welchen derselbe vor 89 Pferde à 1 gr. (= Grofchen) pro Stück Monatlich und also jährlich à 12 gr. 44 rthlr (= Reichsthaler) 12 gr. — vor 52 Maultiere à 6 gr. also jährlich 13 rthlr — dann zu der benöthigten Horn Salbe 10 rthlr, in Summa 67 rthlr 12 gr., und also Quartaliter 16 rthlr 21 gr. an Medicin und Curen inclusive

41

die Krankheit vergehen. (Bei der Hinde der Schafe hängt man ein Stück der Zwielenklauenhaut in den Rauchfang.) Rafen kann auch Träger des Schadens sein. Nimmt man Rafen, auf dem ein Pferd gestanden hat, auf und trocknet ihn hinter dem Herd oder am Ofen, so muß das Pferd dahinfahren, wie der Rafen verdorret, und sterben, wie die Pflanzen darin verdorren. Führt die Hexe das Vieh, dem sie die Milch nehmen will, über Rafen, auf den sie Stücke von Stricken ausgelegt hat, und bringt sie diesen Rafen dann in ihr Butterfaß, so entwendet sie dem Vieh die Milch. Um fremden Kühen die Milch zu stehlen, hängen die Hexen ein Grastuch auf einen Baum so auf, daß die vier Zipfel nach unten weifen; aus diesen melken sie die Milch in ihre Gefäße. In Irland hängt man drei Schnitt Gras, vor Sonnenaufgang von der Wiefe der Hexe geholt, in einem Kleidungsstück vor der Milchkammertür auf und verhütet dadurch, daß die Kühe behext werden. — Das Literaturverzeichnis weist 262 Nummern auf.

Reinhard Froehner.

Dr. O. D. Potthoff, Illustrierte Geschichte des Deutschen Fleischerhandwerks vom 12. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Mit Beiträgen von Georg Bark, Georg Dalichow, Dr. Felix Grüttnner, Dr. Ernst Guggenheim, Dr. Paul Schmiedicke. Berlin im Askanischen Verlag o. J. (1927).

Das Buch ist für die Angehörigen des Fleischerhandwerks bestimmt, es verzichtet daher im Texte auf Belegstellen. Für den Wissenschaftler ist aber im Anhang ein Quellen- und Literaturverzeichnis beigegeben. Das Werk gliedert sich in folgende Kapitel: Das Schlachten bei den alten Völkern, Ursprung und Wesen der Zünfte und der Fleischerzunft, Markt und Gasse, Schlachthaus und Fleischerbank, Organisation der Zunft und ihr Eigenleben, Frau Meisterin, Lehrling, Gefelle, Sitten und Gebräuche, Gewerbegliederung und Konkurrenz, politische und soziale Stellung, Stellung der Juden im Fleischerhandwerk des Mittelalters, Gewerbe und Obrigkeit, Übergang zur Gewerbefreiheit, Im Zeichen der Gewerbefreiheit bis zur Gegenwart, Die Geschichte der Fleischerhygiene, Fleischer in der Dichtung, Geschichte des Fachunterrichts, Entwicklung des Fleischerkonfums und der Preisbildung.

Papier, Druck und Illustrationsmaterial sind erstklassig, der Einband in Ganzleinen mit Goldzierat ist sehr gefällig. Das Buch, 4°, XIV und 513 Seiten, eignet sich besonders als Prämie für gute Leistungen bei der Gefellen- und Meisterprüfung usw.

Uns interessiert hier vorzüglich der von einem Tierarzt geschriebene Abschnitt XV, S. 340—379: Dr. Felix Grüttnner, Geschichte der Fleischerhygiene. Die Darstellung der altdeutschen Zeit erdient nun zwar im allgemeinen gelungen, sie entbehrt aber einer übersichtlichen Gliederung. Die Literatur seit etwa 1914 ist nicht genügend berücksichtigt. Die Entwicklung der Fleischerhygiene vom 18. Jahrhundert ab ist sehr gut geschildert, hier zeigt sich der Verfasser auf seinem Spezialgebiet als vorzüglich unterrichtet. — Die historischen und kulturgeschichtlichen Kapitel von Potthoff sind meisterhaft herausgearbeitet. Das Buch sei auch Tierärzten bestens empfohlen.

Reinhard Froehner.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Rieck, Berlin-Cöpenick, Kirchstraße 4
Verlag von M. & H. Schaper Hannover. — Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

ler Horn Salbe zu empfangen haben wird. Es versteht sich aber von selbst, daß wenn Abgang an Pferden und Maultiere vorkommt, ihm Arztshmid Schmidts nicht mehr als vor den Effectiven Befand diese Medicin und Curen bezahlet werden können. Zu mehrer Urkund ist dieler Neue accord, abtellen des Königl. Marfalles und des Arztshmid Schmidts gehörig unterschrieben. So gelchehen Berlin, im Jahr und Tag wie oben. Unterschritten: Schwerin, Oberfallmeister; v. Drosedow; A. Schmidts; Kosack; Jürgens."

Auf der Rückseite des Dienstvertrages steht seine Verlängerung: „Umtehen der Contract ist in Erfüllung aller darin enthaltenen Puncten auf Sr. Excellenz Ordre vom 1. Dec. 1779 bis den 1. Dec. 1785 auf 6 Jahre mit dem Arztshmid Schmidts prolongirt worden.“ Unterschritten: Schwerin, v. Drosedow; W. Müller; Jürgens."

Der Marfall schloß also einen Pauschalvertrag mit seinem Tierarzte ab, der verpflichtet war, „Medicin und Curen“ zu betorgen. Der Veterinär dispensierte selbst und nahm die erforderlichen „Curen“ an den Pferden und Maultieren vor. Jeden Morgen machte er einen Rundgang durch die königlichen Stallungen und erstarzte um 8 Uhr morgens dem Oberfallmeister „Rapport“. Die Bezahlung für die tierärztliche Behandlung einschließlich der Medikamente erfolgte nach der Stückzahl der jeweilig im Marfalle stehenden Pferde und Maultiere. Außer den Heilmitteln, die für kranke Tiere verbraucht wurden, mußte Albrecht Schmidts noch eine besondere Hufsalbe „praeparieren“, mit der alle Hufe täglich geschmiert wurden. Seinen Dienstvertrag, der bis zum 1. Dec. 1785 verlängert war, konnte Schmidts nicht innehalten. 1783 ist er „hohen Alters und Entkräftung wegen, seinen Posten als Arztshmid vorzuziehen außer Stande“, er wird „Invalide Cur Schmid“ — so lautet der Titel eines damaligen pensionierten Marfallveterinärs — und bezieht als Rente „7 reichshaler 8 großen Monatlichen Tractament“.

Sein Amt übernahm am 1. März 1783 der Arztshmid Gottlob Jaenckner (Näheres siehe „Friederizianische Urkunden zum Dispenferrrecht“, Berlin. Tierärztl. Wschr. 1928) der schon nach einem Jahre seinen Abschied nahm. Bei Jaenckners Nachfolger verließ der Oberfallmeister v. Schwerin leider den Grundplatz, einen besonderen „Arztshmid“ am Marfalle zu halten. Er ernannte den bisherigen langjährigen Reit- und Beflagshmid Elias Fischer am 1. März 1784 zugleich zum „Arzt Schmid“ und übertrug ihm „sowohl die Curen als den Beflag sämtlicher Pferde und Maul Thiere in denen Berlinischen Marfällen“. Darin lag natürlich ein Rückschritt in der Entwicklung der Stellung des Berliner Marfallveterinärs. Das Einverständnis des Königs dürfte diese Maßnahme des Oberfallmeisters schwerlich gefunden haben. Daß Friedrich der Große von der im 18. Jahrhundert noch allerorts üblichen Personalunion zwischen Kur- und Beflagshmid wenig hielt und ausdrücklich für den rein tierärztlichen Praktikus eintrat, zeigt sein Befehl, für den Potsdamer Marfall am 1. August 1780 „Einen aparte Cur und Arzt-Schmidt (George Wheeler) anzunehmen, der bloß allein, alle Curen, so wohl im Reit- als Kutsch-Stall zu verrichten, hingegen aber 2 geschickte Beflagshmid, die nichts anders als den Beflag der Pferde und Maultiere zu besorgen haben, und zwar einen aparten im Reit Stall, und einen andern im KutschStall.“

Quelle: Brandenburg-Preuß. Hausarchiv, Rep. 117, Marfall Handwerker Etat.

Bücherbesprechungen.

Ralenzauber.

Von Dr. Kurt Heckscher.

(Volk und Rasse, 3. Jahrgang (1928), Heft 2, S. 105—118.)

Ralenzauber ist Erbindezauber, er geht zurück auf die Vorstellungen von der gebärenden und alles Abgeforbene aufnehmenden Mutter Erde. Die Seelen ungetauft gestorbenen Kinder verwandeln sich nach französischem Volksglauben in grünen Ralen. Bei Beginn eines Landesunheils bluten die Grashalme, weil sie Unglücksgeister enthalten. Der Ralen ist auch Dornizil von Naturgeistern. (Rodnerinnen, Berg- und Holzweiblein, salige Frauen usw.) Ein Stück Ralen repräsentiert (pars pro toto) den ganzen Acker; durch Darbringen von Ralen wird der Acker aufgegeben, durch Niederlegen von Ralenstücken auf dem Altar wird er der Kirche geschenkt. Als Teil des Ackers dient auch der Grashalm. Der Grashalm symbolisiert den Abbruch von Bündnissen, das Brechen in zwei Teile einen Vertragsbruch, durch Übergeben eines Grashalmes erklärte sich der Kämpfer als bestieg (Lutegast im Nibelungenlied). Ralenstücke werden beim Erde auf den Kopf gelegt. Der Erbindezauber lebt fort im Abwehrzauber. Auf die Wiege eines beschriebenen Kindes legt man Ralen von einem Kindergrabe. Der Abwehrzauber des Ralens äußert sich besonders in der zauberischen Sicherung des Viehs. Gegen Behexung auf der Sommerweide, die als Grasfench (Böhmerwald) oder Lahmheit auftritt, schützt man das Vieh, wenn man es beim ersten Austrieb im Frühling über frischen vor die Schwelle gelegten Ralen gehen läßt, auf den man zur Verstärkung des Zaubers noch Eilenteile, Bel, Schlüssel usw., bringt. Auch im Stalle schützt man die Herde durch frischen Ralen, den man außen vor die Schwelle legt. Man kann noch Blütenblätter der Sumpfdotterblume darauf streuen. Die Hexe muß die Grashalme und die Blütenblätter zählen und kommt vor lauter Arbeit nicht in den Stall hinein. Besonders in der Walpurgisnacht, der Hexenzeit, muß man den Stall mit dem Ralen schützen. Wie der Ralen, so wirkt auch sein Derivat, das Gras, abwehrzauber. Am St. Georgstage vor Sonnenaufgang abgerienes Gras, das ohne Sonne unter dem Dache getrocknet ist, schützt das Vieh vor Behexung. Als Mittel, die Segnungen einer Heilszeit zu übertragen, dient Heu, das die Wihlenacht draußen (auf dem Dünger, vor der Diele, in der Dachtraufe, in der Viehtränke) gelegen hat; es schützt das ganze Jahr vor Behexung und Krankheit, insbesondere vor Tympanie. Gibt man in der Christnacht während der Mette dem Vieh Heu, das am Johannisstage vor Sonnenaufgang geschnitten und im Schatten getrocknet ist, so bewahrt man es vor schädlichen Geistern. In Toskana läßt man am 17. Februar einen Korb Heu kirchlich weihen zum Schutze des Viehs. Gefohlendes Heu muß man Kühen geben, die nicht trüchtig werden wollen. Der Bauer muß das Heu auf dem Leibe getragen oder er muß darauf geschlafen haben. Ralen und Gras dient auch dem Heilzauber. Zur Heilung von Hufleiden der Pferde wird der Ralen unter dem kranken Hufe ausgeschnitten, an dem kranken Fuße gerieben und dann wieder eingesetzt, dabei wird eine Bannformel gesprochen (Frankreich). Zur Heilung von allerlei Fuß- und Klauenleiden, insbesondere der fourche, wird das Ralenstück, auf dem der kranke Fuß steht, ausgeschnitten und auf einem Zaunpfahl oder Baumaft zum Trocknen gebracht. In dem Maße als das Ralenstück verdorrt, wird auch

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtnr, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrzabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zusendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 47.

Ausgegeben am 24. November 1928.

36. Jahrgang.

(Aus dem Landestierseuchenamt in Rostock.)

Die Bang-Infektion des Menschen.*)

Von Prof. Dr. K. Poppe.

Das Vorkommen der Abortus-Bang-Infektion beim Menschen ist früher überhaupt in Frage gestellt worden. Dieser ablehnende Standpunkt wurde damit begründet, daß Erkrankungen des Menschen bei dem häufigen Vorkommen von Abortus-Infektionen beim Rinde und bei der durch infizierte Milch gegebenen Infektionsmöglichkeit öfters hätten beobachtet werden müssen. Mitteilungen aus den letzten Jahren, namentlich aus den Vereinigten Staaten und aus Dänemark haben gezeigt, daß der Bangsche Abortusbazillus für den Menschen doch nicht so harmlos ist wie früher angenommen wurde.

Als Bang-Infektion können jedoch nur die Krankheitsfälle beim Menschen angesprochen werden, deren Ursprung auf das Rind oder auf Produkte vom Rind zurückzuführen ist. Demzufolge haben die Fälle, bei denen die Möglichkeit eines Zusammenhangs mit Ziegen nicht auszuschließen ist, als eigentliche Bang-Infektionen auszuscheiden und sind dem Maltafieber zuzurechnen. Zweckmäßig dürfte es sein, für die durch den Bangschen Bazillus veranlaßten Erkrankungen die Bezeichnung „Bang-Infektion“ zu wählen. Diese Benennung wäre auch für den infektiösen Abortus zutreffend, weil der Abortus nur ein Symptom der Infektion ist und die Tiere infiziert sein können, ohne daß ein Abortus eintritt. Auch mit Rücksicht auf die vergleichende Pathologie ist die allgemeinere Bezeichnung Bang-Infektion die richtigere, da es sich bei den Fällen beim Menschen um Allgemeininfektionen mit dem Bangschen Bazillus handelt, wobei der Erreger als Abortusursache nach den bisherigen Kenntnissen keine Rolle spielt.

Die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des Bangschen Bazillus als menschenpathogenen Erreger wurde zuerst durch die Feststellung gelenkt, daß der von B. Bang und Stribolt (1896) ermittelte Erreger des infektiösen Abortus des Rindes und der von Bruce (1887) gefundene, früher *Micrococcus melitensis* genannte Erreger des Maltafiebers nahe verwandt, vielleicht sogar artgleich sind (Alice C. Evans 1918). Diese Feststellung wurde von anderen Seiten bestätigt, so daß der Anregung von K. F. Meyer und Shaw zuzustimmen ist, beide Erreger in die Gruppe „*Melitensis-Abortus*“ zusammenzufassen, der nach

dem Vorschlag der Amerikaner die Gattungsbezeichnung *Brucella* zu geben wäre; weil Bruce als Entdecker des Erregers des Maltafiebers die Priorität zukommt. Es würde somit zu unterscheiden sein zwischen *Brucella melitensis*, dem Erreger des Maltafiebers, und *Brucella abortus* (Bang), dem Erreger des infektiösen Abortus des Rindes. Die *Melitensis-Abortus*-Gruppe ist nach ihrem serologischen Verhalten der einzelnen Typen von A. C. Evans wieder in verschiedene Untergruppen eingeteilt worden: *Melitensis A*, *Melitensis B*, *Paramelitensis*, *Abortus*, *Paraabortus*. Ohne auf Einzelheiten näher einzugehen, ist soviel zu sagen, daß zwischen der *Br. melitensis* und der *Br. abortus* engere Beziehungen bestehen als zwischen *B. typhi* und *B. paratyphi*; gegen eine völlige Identität sprechen aber die epidemiologischen Beobachtungen und das verschiedene pathogene Verhalten (Andrei, Basset-Smith, Khaled, Zeller u. a.).

Die ersten Fälle von Bang-Infektion beim Menschen sind nachweislich in den Vereinigten Staaten festgestellt worden. Es handelte sich um Kinder, die mit Milch ernährt wurden und adenoide Wucherungen, vergrößerte Tonsillen, Rachitis zeigten. Durch Meerschweinchenimpfung, durch Agglutination oder Komplementbindung wurde als Ursache der Erkrankung eine Bang-Infektion ermittelt (Mohler und Traum, Larson und Sedgwick, Nicoll und Pratt, Ramsey, Cooldge). Mehr Beweiskraft besitzen die bei Erwachsenen beobachteten Fälle, von denen in den Jahren 1924—1927 in den Vereinigten Staaten 20 näher beschrieben worden sind (A. C. Evans). Außer in den Vereinigten Staaten sind sichergestellte Bang-Infektionen in Südafrika, Niederländisch-Indien, Italien, Frankreich, in der Schweiz, in den Niederlanden, in Dänemark und neuerdings auch in Deutschland ermittelt worden. Das größte Material hat M. Kristensen (Kopenhagen) bearbeitet, der alle auf Typhus und Paratyphus zu prüfenden Blutproben des Serum-Instituts (Madsen) gleichzeitig auf Bang-Infektion untersucht hat mit dem Ergebnis, daß von 2150 Kranken 222 eine positive Agglutination (1:100 und höher) sowie von 3175 Proben zur Wassermann-Reaktion 13 mit Bangbakterien Komplementbindung gaben und in 18 von 27 Proben die Bangbakterien auch durch Blutkultur ermittelt wurden. Diese große Zahl von Fällen in Dänemark beweist, daß die Bang-Infektion für den Menschen nicht ohne Bedeutung und daß bei gewissen Krankheiten auf diese

*) Vortrag auf der 90. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg 1928; Abt. 35: Angewandte Veterinärmedizin.

Infektion zu achten ist. In Deutschland sind, soweit Mitteilungen vorliegen, bisher 8 Fälle beschrieben worden (Kreuter, Steinert, Dietel, Veilchenblau, Bürger, Habs). In vier von diesen Fällen handelte es sich um Infektionen von Tierärzten, die sich bei Abnahme der Nachgeburt oder auf andere Weise beim abortusinfizierten Tier angesteckt hatten. Die Mehrzahl der sonst beobachteten Fälle ist dagegen auf Infektion durch Genuß roher Kuhmilch oder aus Milch hergestellter Produkte, in einigen Fällen auch auf Laboratoriumsinfektion zurückzuführen.

Nachdem das Vorkommen der Bang-Infektion beim Menschen zweifelsfrei auch in Deutschland nachgewiesen war, lag es nahe, dieser Krankheit und ihrem Zusammenhang mit dem infektiösen Abortus des Rindes weiter nachzugehen. Bei der starken Ausbreitung des Abortus war anzunehmen, daß die Bang-Infektion beim Menschen häufiger festgestellt wird, wenn systematische Blutuntersuchungen aller verdächtigen Fälle vorgenommen werden.

Durch das Entgegenkommen der verschiedenen Universitätskliniken in Rostock und des Landesgesundheitsamts in Schwerin¹⁾ ist es möglich gewesen, bisher 454 Blutproben von Menschen zu untersuchen. Die überwiegende Zahl der Proben (340) stammte von Patienten, die unter dem klinischen Verdacht des Typhus, Paratyphus, der Grippe oder unter dem Verdacht der okkulten Tuberkulose erkrankt waren. Bei 86 Proben handelte es sich um Proben, die zur Vornahme der Wassermann-Reaktion eingefandt waren; 20 Proben stammten von jüngeren Kindern, 8 von abortierenden Frauen. Die Untersuchung hat nun ergeben, daß von den 340 Proben von Menschen 7 Seren eine ausgesprochene Agglutination mit dem Bangschen Abortusbazillus zwischen 1:200 und 1:6400 zeigten, mit Typhus- und Paratyphusbazillen dagegen keine oder eine nur geringgradige Reaktion aufwiesen. Damit war erwiesen, daß diese 7 Patienten nicht wie angenommen an Typhus, Paratyphus oder einer anderen Infektion erkrankt waren, sondern daß eine Infektion mit der *Brucella abortus* (Bang) vorlag. Es wurde nun weitere Rückfrage gehalten und festgestellt, daß 6 Personen in landwirtschaftlichen Betrieben tätig waren: 5 hatten ungekochte Milch genossen, 1 hatte mit abortusinfizierten Tieren zu tun gehabt. Bei einem weiteren positiven (8.) Fall, einem Fräulein aus einer größeren Stadt Norddeutschlands, deren Blutprobe dem Landestierseuchnamt eingefandt wurde, kam anscheinend ebenfalls eine Milchinfektion in Betracht. Die Ergebnisse der serologischen Prüfung mittels Agglutination²⁾ und Komplementbindung zeigt folgende Übersicht:

Patient	Infektion	Blutkultur	Agglutination mit			Komplementbindung Antigen Br. abortus
			Br. abortus	Br. hominis	Br. melitensis	
1. Frä. W. (Stadt)	Milch	neg.	1280	640		0,05
2. Diener G.	Milch		2500	1600		
			6400	3200		0,005
3. Hofbes. J.	Angabe fehlt		800	1600		0,005
4. Landwirt B.	Ablösung der Nachgeburt	neg.	300	400		
			400	200		
			800	800	400	0,02
5. Schnitter T.	Milch		200	200	100	
			800	1600	400	0,05
6. Landwirt N.	Milch	neg.	400	400	200	
			800	800	200	0,02
7. Landwirt K.	Milch	positiv	1600	1600	800	
			1600	1600	400	0,01
8. Weichenwarter Br.	Milch?		1600	1600	800	

Es wurde auch versucht, die Bangbakterien durch Kultur unmittelbar im Blut nachzuweisen. Unter Verwendung des Blutkuchens mit Anreicherung in Bouillon gelang dieser Nachweis in 1 von 4 geprüften Fällen.

Nachdem das Vorliegen der Bang-Infektion bei diesen Patienten festgestellt war, wurde die Infektionsquelle näher ermittelt. Durch das Entgegenkommen einiger Kollegen³⁾ war es möglich, aus den verdächtigen Rinderbeständen, so gar von den nachweislich als Überträger in Frage kommenden Kühen Blut- und Milchproben zu untersuchen. In den Fällen 2, 4, 5, 6 und 7 konnte der Beweis erbracht werden, daß es sich um infizierte Bestände handelte, in den Fällen 2, 5 und 7 wurde der Zusammenhang mit einer abortusinfizierten Kuh durch die serologische Untersuchung erbracht.

Zusammenhang der Bang-Infektion des Menschen mit dem infizierten Tier.

	Untersuchungsmaterial	Agglutination mit			Meerschweinchenimpfung
		Br. abortus	Br. hominis	Br. melit.	
2. Diener G.	Blut	6400	3200		
	Kuh Blut	3200	3200	3600	
	Milch	40	40	20	negativ
4. Landwirt B.	Blut	800	800	400	
	Kuh Blut	800	800	400	
	Milch	—	—	—	negativ
5. Schnitter T.	Blut	800	1600	400	
	Kuh? Blut	200	200	50	
	Milch	—	—	—	negativ
7. Landwirt K.	Blut	1600	1600	400	positiv
	Kuh Blut	400	200	200	
	Milch	—	—	—	negativ

Der Nachweis der Bangbakterien durch Züchtung aus der Milch oder durch den Meerschweinchenverfuch gelang nicht. O. Bang konnte in gemeinsamen Veruchen mit Bendixen durch Meerschweinchenimpfung Bakterienausscheider in solchen Beständen ermitteln, deren Besitzer an Bang-Infektion erkrankt waren. Über die Herkunft der Infektion haben Ermittlungen von Kristensen näheren Aufschluß gebracht: von den Infizierten stammten 40 aus Kopenhagen, 34 aus anderen dänischen Städten. 146 vom Lande; von 209 Fällen kam bei 43 Umgang mit Kühen, bei 60 Umgang mit Kühen oder Milch, bei 68 Milch allein in Betracht, bei 38 war die Infektionsquelle ungewiß. Nachdem seit Ende 1927 in Dänemark die Anzeigepflicht für die Bang-Infektion des Menschen eingeführt ist, sind im ersten Vierteljahr 1928 allein 68 Fälle ermittelt worden gegenüber 27 Typhus- und 19 Paratyphuserkrankungen.

Das klinische Bild der Bang-Infektion des Menschen zeigt mit den beim Maltafieber auftretenden klinischen Erscheinungen weitgehende Übereinstimmung, so daß die nahe Verwandtschaft der beiden Erreger auch damit gekennzeichnet ist. Das längere Zeit anhaltende täglich remittierende Fieber mit Tageschwankungen bis zu 2 Grad C und Höchsttemperaturen bis 41 Grad C, dabei nur wenig


¹⁾ Herrn Obermedizinalrat Prof. Dr. Reiter, Direktor des Landesgesundheitsamts, bin ich für Überlassung der Blutproben zu besonderem Danke verpflichtet.

²⁾ Außer *Br. abortus* und *Br. melitensis* wurde eine von Kristensen zur Verfügung gestellte Kultur vom Menschen verwendet, der Kürze halber mit *Br. hominis* bezeichnet.


³⁾ Den Herren Tierärzten Dr. Dierks, Ogilvie und Stadelmann danke ich für ihre weiteren Ermittlungen und für Übersendung von Blut- und Milchproben aus den infizierten Beständen.

gestörtes Allgemeinbefinden sind charakteristisch. Das Fieber gleicht dem undulierenden Typus beim Maltafieber, so daß die Bezeichnung *Febris undulans* für die Bang-Infektion des Menschen Berechtigung hat. Das Fieber kann monate- bis jahrelang (Kristensen) anhalten, wobei nach 10—14tägiger Fieberzeit fieberfreie Pausen eintreten können.

tionsbefunde liegen aber nicht vor. Ein von Moore und Carpenter mitgeteilter tödlich verlaufener Fall betraf einen 41jährigen Mann mit chronischer septischer Splenomegalie. Der weiteren Prüfung bedarf es, ob nicht in manchen Fällen von Splenomegalie, wo andere Ursachen auszuschließen sind, eine Bang-Infektion ursächlich beteiligt ist. Aus dem großen Material von Kristensen ergibt sich



Fieberkurven bei Bang-Infektion (remittierender Typus, unten mit fieberfreier Pause).
(Nach Kristensen.)



Neuralgien (wandernde Schmerzen in der Nacken-, Rücken- und Kreuzmuskulatur), Milz-, manchmal auch Leberanschwellung treten auf. Bei Beginn und zur Zeit des höchsten Fiebers besteht Leukopenie, später kommt es zur Vermehrung der Lymphozyten mit ausgesprochener Monozytose, die Diazo-Reaktion des Harns ist positiv (Bürger). Hinsichtlich des klinischen Bildes ist auf die nähere Beschreibung der in Deutschland und in Dänemark beobachteten Fälle zu verweisen (Bürger, Dietel, Habs, Kreuter, Steinert, Veilchenblau — S. Andersen, Gaarde, H. C. Gram, Holten u. a.). Das gesamte Krankheitsbild hat mit Typhus, Paratyphus oder einer kryptogenen Infektion (Grippe, Tuberkulose, Sepsis) manche Ähnlichkeit, so daß diese Infektionen in differential-diagnostischer Beziehung in Frage kommen. Besonderheiten im klinischen Bild der hier näher ermittelten Fälle waren nach Angabe der behandelnden Ärzte⁴⁾ nicht festzustellen. In zwei Fällen wurde über eine merkliche Gewichtsabnahme der Patienten berichtet im Gegensatz zu den sonstigen Mitteilungen, die weder eine Gewichtsverminderung, noch Störungen des Allgemeinbefindens verzeichnen. Bemerkenswert ist, daß bei infizierten männlichen Personen wie bei der Bang-Infektion des männlichen Rindes Hodenschwellungen (akute Orchitis mit Hydrozele) beobachtet worden sind (Kreuter). Wie erschwert manchmal die Diagnose sein kann, zeigt die von Dietel (Erlangen) beschriebene Infektion bei einem Tierarzt, bei dem eine zwei Jahre zurückliegende Kutaninfektion (hämorrhagisch-bulböse Dermatitis) nach Ausräumung eines Abortus der spätere Anlaß für eine im Anschluß an eine Indigestion aufgetretene Allgemeinerkrankung gewesen ist. In dem einen Fall von Steinert, ebenfalls bei einem Tierarzt, war das auslösende Moment für die Infektion eine Oberarmluxation. Diese Fälle können vielleicht mit der beim Rind vorkommenden latenten Infektion, bei der die Tiere lange Zeit Bangbakterien beherbergen, in Vergleich gesetzt werden (stumme Infektion nach Reiter). Der Verlauf der Infektion beim Menschen ist meist gutartig und die Prognose günstig. Todesfälle kommen nach den vorliegenden Beobachtungen selten vor. Von den 222 von Kristensen gesammelten Fällen endeten 4 tödlich, Sek-

auch, daß die meisten Infektionen zwischen dem 15. und 40. Lebensjahr vorkommen (unter 8 Jahren keine Infektion) und daß das männliche Geschlecht stärker beteiligt war als das weibliche (166 : 56).

Die Bedeutung der Bang-Infektion als Ursache von Abortusfällen bei Frauen ist noch nicht geklärt. Vereinzelt Angaben liegen zwar vor, die einer kritischen Prüfung aber nicht standhalten. Larson und Sedgwick sowie Nicoll und Pratt haben in den Vereinigten Staaten über positive serologische Reaktionen bei Frauen, die abortiert hatten, berichtet. Klimmer und Haupt haben auf die Möglichkeit hingewiesen, daß die Br. abortus als Abortusursache in Betracht kommen könnte, da Fehlgeburten bei Frauen vorgekommen seien in Gehöften, in denen eine Infektion des Rinderbestandes mit Abortus Bang bestanden hätte. Über einen ad exitum gekommenen Fall bei einer Frau, die nach einer Geburt an intermittierendem Fieber und an Maltafieber sehr ähnlichen Erscheinungen erkrankt war, hat G. Mayer kürzlich berichtet; der durch Blutkultur ermittelte Erreger zeigte jedoch in seinen Kultureigenschaften einige Abweichungen: Die im Landestierseuchenamt serologisch untersuchten 8 Abortusfälle aus der Universitäts-Frauenklinik (Geheimrat Sarwey), bei denen es sich um Ausräumungen handelte, hatten ein negatives Ergebnis.

Die Frage der pathogenen Wirkung der Br. abortus für Kinder bedarf ebenfalls noch weiterer Klärung. Larson und Sedgwick haben bei 17 Prozent der untersuchten Kinder, die an Tonsillitis, Tuberkulose, Rachitis usw. erkrankt waren, positive Agglutination und Komplementbindung erhalten und darauf aufmerksam gemacht, daß vielleicht Beziehungen zur Rachitis bestehen könnten, da bei der Bang-Infektion des Meerschweinchens die gleichen, von Th. Smith zuerst beobachteten Knochenveränderungen (Vergrößerung der Epiphysen) vorkommen. Fleischner und K. F. Meyer, die mit abortusbazillenhaltiger Milch ernährte Kinder untersuchten, haben bei Prüfung mittels allergischer Methoden eine Hautüberempfindlichkeit nicht nachweisen können. Die im Landestierseuchenamt untersuchten Blutproben von 20 Kindern aus der Universitäts-Kinderklinik (Professor Brünig) reagierten negativ. Schließlich wurden mit Rücksicht auf die Angaben von Larson und Sedgwick, daß Erkrankungen der Tonsillen bei Kindern zur Bang-Infektion in Beziehung stehen können, 4 exstirpierte Rachenmandeln

⁴⁾ Den Herren Ärzten Dr. Heinecke, Meyer, Pfautsch, San.-Rat Rotmann und Steinhart danke ich für die näheren Angaben über die Patienten und für die Übermittlung von Blutproben.

aus der Universitätsklinik für Ohren- und Kehlkopfkrankheiten (Geheimrat K ö r n e r) untersucht mit dem Ergebnis, daß weder durch bakteriologische Untersuchung noch durch den Meerfweinchenversuch Bangbakterien nachzuweisen waren.

Die im Schrifttum angeführten Fälle sowie die in Deutschland gemachten Beobachtungen — nach Mitteilung von Bürger sind in Schleswig-Holstein bisher 25 Fälle ermittelt und 10 Fälle in der medizinischen Klinik in Kiel beobachtet worden — zeigen, daß an dem Vorkommen der Bang-Infektion beim Menschen nicht mehr gezweifelt werden kann. Die Mehrzahl der Fälle ist auf Infektion durch rohe Kuhmilch oder auf aus unerhitzter Milch hergestellte Produkte zurückzuführen. Die Möglichkeit der Übertragung der Bang-Infektion mit der Milch ist dadurch gegeben, daß eine große Zahl der infizierten Kühe — nach Schroeder in den Vereinigten Staaten bis zu 60 Prozent, nach Beobachtungen in Deutschland bis zu 40 Prozent — Bangbakterien mit der Milch ausscheiden können (Zwick und Krage, Winkler u. a.). Die Gefahr der Übertragung der Infektion mit der Milch scheint aber nach den bisherigen Beobachtungen doch nicht groß zu sein; sonst müßten Bang-Infektionen beim Menschen noch häufiger vorkommen, wenn auch zuzugeben ist, daß manche unter Fieber verlaufende unbestimmte Infektionskrankheit nicht als Bang-Infektion erkannt worden ist. Selbstversuche an Menschen haben auch gezeigt, daß die Aufnahme von Bangbakterien mit der Milch nicht in jedem Falle zur Infektion führt (Cooleidge, Koegel).

Die Kontaktinfektion kommt bei den Personen vor, die mit abortusinfizierten Tieren und mit Material von solchen Tieren umzugehen haben (Tierärzte, Landwirte, Laboratoriumspersonal). Diese Infektionsmöglichkeit kann aber ebenfalls nicht zu groß sein, weil die Zahl der bisher festgestellten Fälle nur gering ist. Die Untersuchung von Blutproben von 29 Tierärzten, die in der Praxis (Abnahme der Nachgeburten, Impfungen mit lebenden Erregern) gefährdet sind, hatte ein negatives Ergebnis; von 14 im Laboratorium beschäftigten Personen zeigten zwei sich ganz gesund führende Laboratoriumsgehilfen eine positive Agglutination (Poppe). Daß die Kutaninfektion möglich ist, beweisen die Fälle von Dietel, Kreuter, Steinert, Veilchenblau, bei denen es sich um Berufsinfektionen von Tierärzten handelte, und die von Huddleson mitgeteilten Laboratoriumsinfektionen. Da Laboratoriumsinfektionen beim Arbeiten mit Maltafieber nicht selten sind, so dürfte bei der Artverwandtschaft beider Bakterien den Laboratoriumsinfektionen mit der Br. abortus in Zukunft Beachtung zu schenken sein. Die leichte Infektionsmöglichkeit durch die Haut wird bestätigt durch die Ergebnisse der Kutanimpfung von Meerfweinchen, wobei die Bangbakterien eine besonders hohe Virulenz haben (Violle). Infektionsversuche an Menschen von Nicolle, Burnet und Conseil hatten das Ergebnis, daß im Anschluß an die Infektion keine besonderen Krankheitsercheinungen auftraten und nur bei einer Person (von 5) ein erhöhter Agglutinationstiter (1:250) festgestellt wurde.

Nach Beobachtungen in den Vereinigten Staaten soll das Schwein als Infektionsquelle für den Menschen eine Rolle spielen. A. C. Evans hat nähere Angaben über zwei Fälle von Bang-Infektion gemacht, wobei es sich um Personen gehandelt hat, die mit geschlachteten Schweinen zu tun hatten (Fleischbeschauer, Schlächter). Da die Bang-Infektion des Schweines in den Vereinigten Staaten ziemlich verbreitet ist (Good und Smith, Hayes und Traum, Connaway, Durand und Newman, Hadley und Beach u. a.), so besteht vielleicht eine Infektionsgefahr auch für den Menschen, zumal die Schweinestämme erheblich virulenter sind als Rinderstämme (Schroeder und Cotton, Hadley und Beach). In Europa scheint die Übertragung vom Schwein auf den Menschen eine geringe

Bedeutung zu haben, da Abortusinfektionen beim Schwein nicht häufig beobachtet worden sind. Aus Italien ist ein Fall von Viviani im Zusammenhang mit einem Abortus beim Schwein, in Frankreich sind 3 Fälle bei Schweinefleischlächtern, ferner 2 weitere Fälle mitgeteilt worden, bei denen geschlachtete Schafe als Infektionsquelle angenommen werden (Césari).

Die Diagnose der Bang-Infektion des Menschen wird durch serologische und bakteriologische Blutuntersuchung gesichert. Die Agglutination und Komplementbindung sind für die serodiagnostische Feststellung von ausschlaggebender Bedeutung. Als positiver Grenzwert gilt für die Agglutination die Verdünnung 1:100 und für die Komplementbindung 0,1 ccm (Kristensen). Hohe Blutwerte scheinen nicht selten zu sein: Agglutination 1:2000 bis 1:6000, Bindung 0,01 ccm und darunter (Dietel, van der Hoeden, Kreuter, Poppe, Steinert, Veilchenblau). Kristensen sowie Habs haben darauf hingewiesen, daß bei der Agglutination mitunter paradoxe Befunde beobachtet werden, derart, daß ein Serum bei 1:25 bis 1:100 negativ, in den höheren Verdünnungen dagegen positiv reagiert. Zur Unterscheidung der Melitensis von den Bangbakterien kann die Agglutininabsättigung benutzt werden (A. C. Evans). Die von Ficaï und Alessandrini angegebene Agglutination mit erhitztem (65 Grad) Serum soll sich für die Differenzierung eignen (van der Hoeden, Sanarelli); diese Angabe konnte bei 6 der untersuchten 7 Seren bestätigt werden. In den als Septikämie verlaufenden Fällen ist es möglich, die Bangbakterien aus dem Blut mittels geeigneter Kulturverfahren nach Bouillonanreicherung und unter verminderter Sauerstoffspannung zu isolieren. Unterschiede in den Kultureigenschaften der Bangbakterien vom Menschen und der vom Rinde stammenden Bakterien bestehen nicht (Carpenter, A. C. Evans, Kristensen, Poppe, Zeller). Die Virulenz der aus dem Menschen isolierten Bangbakterien für das Rind und die Übereinstimmung dieser Stämme in ihren pathogenen Eigenschaften mit Rinderstämmen ist durch Infektionsversuche von Carpenter sowie von O. Bang bestätigt worden. Die Impfung tragender nichtinfizierter Rinder mit Kulturen vom Menschen bewirkte nach 5—29 Tagen Abortus, wobei die Abortusbakterien im Fötus, in der Plazenta und in der Milch nachgewiesen wurden. Melitensisstämme vom Menschen verursachen beim Rind ebenfalls Abortus (A. C. Evans). Für Meerfweinchen besitzen die menschlichen Stämme eine besonders hohe Virulenz und sind auch für das Rind erheblicher toxisch als bovine Stämme (Carpenter). Die Überempfindlichkeitsreaktion ist als diagnostische Methode von van der Hoeden geprüft worden mit dem Ergebnis, daß infizierte Personen nach intradermaler Injektion von Abortin (Melitin) Lokal- und Allgemeinercheinungen (Temperaturen über 40 Grad C) zeigten, während bei nichtinfizierten Personen in keinem Falle Allgemeinreaktionen auftraten. Für diagnostische Zwecke ist von Habs die Intrakutanprobe empfohlen worden.

Die Behandlung der Bang-Infektion mit symptomatischen Mitteln hat nachweisbare Erfolge nicht gebracht. Ein Rückgang des Fiebers wurde erreicht durch mehrmalige Omnadininjektionen (Dietel), durch Neosalvarsan in Verbindung mit Salizyl (Bürger, Habs) durch intravenöse Injektionen von Trypaflavin (Kreuter), das bei der Behandlung des Maltafiebers von guter Wirkung ist (Izar). Intravenöse Injektionen von Merkurochrom 220 sollen unter starker Allgemeinreaktion dauernden Fieberabfall und Heilung bewirken (Gage und Gregory). Maltafieberferum (vom Seruminstitut in Mailand) wurde in einigen der von Kristensen angeführten Fälle mit Erfolg angewandt; Rekonvaleszentenferum war weniger wirksam (Madsen); Sheather hält die Serumbehandlung für wertlos. Nach den bei der bovinen Abortusinfektion gewonnenen Erfah-

rungen sind Abortusimpfstoffe auch beim Menschen versucht worden. Über Erfolge mit dieser Art der Behandlung wird vor allem aus Dänemark berichtet. Eine Milchkvazine aus *Br. abortus* und *Br. melitensis* hat sich bei dem von Kreuter mitgeteilten Fall bewährt und nach fünf Injektionen dauernde Entfieberung bewirkt. Mit Chloroform behandelte Kochsalzaufschwemmungen von lebenden Bakterien sind von Eyre empfohlen worden. Lebende Bangbakterien enthaltende Impfstoffe sollen eine bessere Antigenwirkung haben als Impfstoffe, die mit durch Hitze abgetöteten Bakterien hergestellt sind.

Die Verhütung der Bang-Infektion des Menschen hat sich in erster Linie auf die Vermeidung der Aufnahme der Erreger mit der Milch zu erstrecken. Erhitzung der Milch auf 63–65 Grad C genügt zur sicheren Abtötung (Zwick und Wedemann, Pröscholdt, Zeller und Wedemann). Das häufigere Vorkommen der Bang-Infektion beim Menschen in den Vereinigten Staaten und in Dänemark dürfte mit dem Genuß von roher Milch, der in diesen beiden Ländern sehr verbreitet ist, im Zusammenhang stehen. Gegen die anderen Infektionsmöglichkeiten (Tierärzte, Landwirte) schützt die persönliche Prophylaxe beim Umgang mit infizierten Rindern. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch dürfte kaum vorkommen. Zusammenfassend ist darauf hinzuweisen, daß die Bangschen Abortusbakterien anscheinend keine große Pathogenität für den Menschen besitzen und nur massive Infektionen bei besonders exponierten und empfänglichen Personen eine Erkrankung auslösen.⁵⁾

Literatur.

Andersen, Gaarde, H. C. Gram, Holten, A. Johannessen, Norgaard, Vollmond: Infection med *Bac. abortus bovis* hos mennesket. Ugeskrift for Laeger 1927, S. 1146 u. f. — Andrei, G.: Su di alcuni rapporti di affinità fra il micrococco melitense e il bacillo di Bang. Zbl. f. Bakt. I. Ref. 1927, Bd. 84, S. 456. — Rierche sulla differenziazione del *B. melitense* dal *B. di Bang*. Ebenda Ref. 1927, Bd. 85, S. 462. — Bang, O.: Über Schutzimpfung mit lebenden Kulturen gegen das feuchthafte Verwerfen des Rindes. Festschrift für Eugen Fröhner (Enke-Stuttgart) 1928, S. 1. — Basset-Smith, P. W.: Mediterranean or undulant fever. Brit. med. Journ. 1922, II, S. 902. — Bürger: Infektion durch den *Bacillus abortus* Bang beim Menschen. Münch. med. Wschr. 1928, S. 754. — Die klinischen Erscheinungen der Infektion des Menschen mit dem Bangschen Bazillus. Verhandlungen der deutsch. pathol. Gesellschaft. 1928, S. 123. — Carpenter, C. M.: A comparison of strains of *Brucella abortus* isolated from man with those from cattle. Americ. Journ. of pathol. 1926, Bd. 2, S. 455. Jahresber. Vet.-Med. 1926, S. 1136. — Results of injecting pregnant heifers with *Brucella abortus* isolated from man. Journ. of Americ. Vet.-Med. Assoc. 1927, Bd. 70 (23), S. 459. — Abortus Infection in man. Vet.-Med. 1927, S. 487. — Césari, E.: La prophylaxie vét. de la fièvre méditerranéenne. Rec. de méd. vét. Bull. soc. centr. méd. vét. 1923, Bd. 99, S. 327. — Connaway, J. W., Durant, A. J. and Newman, H. G.: Contagious abortion investigations. Missouri Exper. Stat. Bull. Nr. 228, S. 84, 1925. Jahresbericht für Vet.-Med. 1925, S. 63. — Contagious abortion and undulant fever. Brit. med. Journ. 1925, I, S. 554. — Contagious bovine

abortion and undulant fever. Brit. med. Journ. 1926, I, S. 353. — Cooledge, L. H.: Is *Bact. abortus* pathogenic for human beings? Americ. Med. Assoc. 1927, Bd. 88, S. 630. — Eyre, J.: Contagious abortion and undulant fever. Brit. med. Journ. 1925, I, S. 554. — Ficaï, G. et Alessandrini, A.: Setticemia da *Bacillus abortus* (Bang) nell'uomo. Zbl. für Bakt. I. Ref. 1925, Bd. 79, S. 562. — Fleischner, E. C. and Meyer, K. F.: The bearing of cutaneous hypersensitiveness on the pathogenicity of the *Bacillus abortus bovinus*. Americ. Journ. of diseas. of childr. 1918, Bd. 16, S. 268. — Gage, E. E. and Gregory, D. A.: Human infection with *Brucella melitensis*, variety *abortus*, treated with mercurochrome. Journ. of Americ. Med. Assoc. 1926, Bd. 87, S. 848. — Good, E. S. and Smith, W. V.: *Bacillus abortus* (Bang) as an etiological factor in infectious abortion in swine. Journ. of bact. 1916, Bd. 1, S. 415. — Habs, H.: Die Menschenpathogenität des *Bacterium abortus* Bang. Klin. Wschr. Journ. of med. research 1916, Bd. 34, S. 459. — Cotton, W. E.: The character and possible significance of the Bang abortion bacillus that attacks swine. Journ. of Americ. Vet.-Med. Assoc. 1922, Bd. 62 (15), S. 179. — Dietel, Fr.: *Bacillus abortus* Bang-Infektion beim Menschen. Münch. med. Wschr. 1927, S. 1704. — Evans, Alice, C.: Further studies on *Bacterium abortus* and related bacteria. Journ. of infect. diseas. 1918, Bd. 22, S. 576, 580; Bd. 23, S. 354. — Malta fever. Cattle suggested as a possible source of infection, following a serological study of human serums. U. S. Publ. Health. Rep. 1924, Bd. 39, S. 501. — Studies on *Brucella* (alkaligenes) *melitensis*. U. S. Publ. Health Service, Hyg. Lab. Bull. Nr. 143, 1925. — Human infections with organism of contagious abortion of cattle and hogs. Journ. of 1928, S. 453. — *Bact. abortus* Bang als Erreger septischer Erkrankungen beim Menschen. Zschr. für klin. Med. 1928, Bd. 108, S. 445. — Febris undulans (*Bact. abortus* Bang) in Deutschland. Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde 1928, Bd. 34, S. 567. — Hadley, F. B. and Beach, B. A.: An experimental study of infectious abortion in swine. Wisconsin Agr. Exp. Stat. Bull. Nr. 55, 1922. — Hayes, F.: Some studies in swine abortion. Journ. of Americ. Vet.-Med. Assoc. 1922, Bd. 60 (13), S. 435. — Hayes, F. M. and Traum, J.: Preliminary report on abortion in swine caused by *Bacillus abortus* (Bang). North. Americ. Veterinarian 1920, Bd. 1, S. 58. — van der Hoeden, J.: Agglutination-proven met *Micrococcus* (s. *Brucella*) *melitensis* Bruce en *Bacterium abortus* infectiosus Bang. Tijdschr. f. Diergeneesk. 1925, Bd. 52, S. 42. — Huddleson, J. F.: Is *bacterium abortus* pathogenic for human beings? Journ. of Americ. Med. Assoc. 1926, Bd. 86, S. 943. — Human infections with *Bacillus abortus*. Journ. of Americ. Med. Assoc. 1925, Bd. 84, S. 1047. — Jzar, G.: Maltafieber und Chemotherapie. Seuchenbekämpfung 1928, Bd. 5, S. 147. — Khaled, Z.: A comparative study of bovine abortion and undulant fever from the bacteriological point of view. Journ. of Hyg. 1921, Bd. 20, S. 319. — A comparative bacteriological study of bovine abortion and undulant fever. Ebenda 1924, Bd. 22, S. 335. — Klimmer, M. und Haupt, H.: Ist das *Corynebacterium Abortus infectiosus* Bang für Menschen pathogen? Münch. Med. Wschr. 1922, S. 146. — Die pathogene Wirkung des *Corynebact. abortus infectiosus* Bang. Deutsches Arch. für klin. Med. 1922, Bd. 139, S. 33. — Koegel, A.: Beiträge zur Abortusforschung. Münch. tierärztl. Wschr. 1923, S. 610, 617, 629 und 641 und 1924, S. 73 und 95. — Kreuter, E.: Über menschliche Infektion mit *Bazillus* Bang. Münch. med. Wschr. 1926, S. 2193. — Kristensen, M.: Undersøgelser over den Bang'ske abortbacils rolle som menneskepatogén mikrob. Ugeskr. for Laeger 1927, S. 1123. — Untersuchungen über die Rolle des Bangschen Abortbazillus als menschenpathogenen Mikroben. Zbl. für Bakt. I. Orig. 1928, Bd. 108, S. 89. — Et aars erfaringer om Febris undulans i Danmark. Ugeskr. for Laeger 1928, S. 869. — Larson, W. P. and Sedgwick, J. P.: The complement fixation reaction of the blood of children and infants, using the *Bac. abortus* as an antigen. Am. J. of diseas. of childr. 1913, Bd. 6, S. 326. — Lustig, A. und Vernoni, G.: Maltafieber. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen von Kolle, Kraus, Uhlenhuth, 3. Aufl. 1927, Bd. IV, S. 511. — Madsen, Th.: Undulant fever (*B. abortus*). League of nations. Health Organisation, Epidemiological Report Nr. 114 vom 15. Mai 1928. — Über die durch *B. abortus* (Bang) veranlaßten Infektionen. Epidemiol. Monatsbericht der Hyg. Sektion des Völkerbundes vom 15. Mai 1928, Münch. Med. Wschr. 1928, S. 1060. —

⁵⁾ Die Untersuchungen und Ermittlungen über die Bang-Infektion des Menschen und über den Zusammenhang mit dem infektiösen Abortus des Rindes werden fortgesetzt. Die Herren Kollegen werden um nähere Mitteilung von verdächtigen Erkrankungsfällen und um Übersendung von Blut- und Milchproben von den für die Infektion in Frage kommenden Tieren gebeten (an Landestierseuchenamt in Rostock i. M., Blücherplatz). Sehr erwünscht wäre es, wenn Kollegen, die häufig mit abortusinfizierten Tieren zu tun haben und Impfungen mit lebenden Kulturen ausführen, Blutproben von sich einfinden würden zur weiteren Klärung der Frage, ob eine latente Infektion — ohne Krankheitsercheinungen — möglich ist.

Mayer, G.: *Corynebacterium parvum infectiosum*. Zbl. f. Bakt. I. Orig. 1926, Bd. 98, S. 370. — Meyer, K. F. and Shaw, E. B.: A comparison of the morphological, cultural and biochemical characteristics of *B. abortus* and *B. melitensis*. Journ. of infect. diseases. 1920, Bd. 27, S. 173. — Mohler, J. R. and Traum, J.: Infectious abortion of cattle. 28. Rep. of the Bureau of Animal Industry for 1911. Washington 1913, S. 147. — Moore, V. A. and Carpenter, Ch. M.: Undulant fever in man associated with *Bacteria* indistinguishable from *Brucella abortus*. Cornell Veterinarian 1926, Bd. 16, S. 147. — Nicoll, M. and Pratt, J. S.: Does the *Bacillus abortus* Bang infect. man? Americ. Journ. of diseases of childr. 1915, Bd. 10, S. 203. — Nicolle, Ch., Burner, Et. et Conseil, E.: Le microbe de l'avortement épzootique se distingue de la fièvre méditerranéenne par l'absence de pouvoir pathogène pour l'homme. Compt. Rend. Acad. Science 1923, Bd. 176, S. 1034. — Pröscholdt, O.: Seuchenbekämpfung und Dauererhitzung. Molkerei-Zeitung 1926, S. 425 und 461. — Ramsey, W. R.: The results of von Pirquet reactions. Americ. Journ. of diseases of childr. 1915, Bd. 10, S. 201. — Sanarelli, G.: Infection par le melitococcus et le bacillus abortus chez l'homme. Presse méd. 1926, S. 571. — Schroeder, E. C.: Pure milk production and the abortus bacillus. Americ. Vet. Review 1914, Bd. 44, S. 467. — Bovine infectious abortion among swine. Journ. of Americ. Vet.-Med. Assoc. 1922, Bd. 60 (13), S. 560. — Sheather, A. L.: Contagious abortion and undulant fever. Brit. med. Journ. 1925, I., S. 554. — Smith, Th.: The relation of *Bacillus abortus* from bovine sources to Malta fever. Journ. of exp. med. 1926, Bd. 43,

S. 207. — Smith, Th. and Fabyan, M.: Über die pathogene Wirkung des *Bacillus abortus* Bang. Zbl. für Bakt. I. Orig. 1912, Bd. 61, S. 549. — Steinert, K.: Zur Frage: Ist der *Bacillus abortus*-Bang für Menschen pathogen? Münch. tierärztl. Wschr. 1926, S. 73. — Veilchenblau: Die Infektion mit dem Bact. abort. Boum (Bang). Münch. m. Wschr. 1927, S. 1705. — Violle, H.: Essais de vaccination cutanée contre *B. abortus* de Bang. Compt. Rend. Soc. Biol. 1925, Bd. 92, S. 421. — Viviani, R.: A proposito della questione della patogenicità del *Bacillus abortus* di Bang nell'uomo. Policlinico, sez. prat. 1925, Bd. 32, S. 203. — Winkler, M.: Über die Ausscheidung des *Bacillus abortus* Bang mit der Milch. Vet.-med. Diss. Dresden-Leipzig 1919. — Zeller, H.: Beziehungen zwischen dem Erreger des infektiösen Abortus der Rinder und des Maltafiebers. Berl. tierärztl. Wschr. 1920, S. 345. — Weitere Untersuchungen über das feuchtharte Verwerfen des Rindes. Arch. für Tierheilkunde 1923, Bd. 49, S. 65. — Zeller, H., Wedemann, W. (Lange, L. und Gilde-meister, E.): Über die fog. niedrige Dauerpauteurisierung der Milch mit besonderer Berücksichtigung der Abtötung von Seuchenerregern. Zschr. f. Fleischhyg. 1928, Bd. 38 (Sonderheft). — Zwick und Krage: Über die Ausscheidung von Abortusbazillen mit der Milch infizierter Tiere. Berl. tierärztl. Wschr. 1913, S. 41. — Zwick und Wedemann: Biologische Untersuchungen über den Abortus-Bazillus. Arb. aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt 1913, Bd. 43, S. 130. — Weitere Angaben: Poppe: Der infektiöse Abortus des Rindes (Bang-Infektion der pathogenen Mikroorganismen von Kolle-Kraus-Uhlenhuth, 3. Aufl. 1928, Bd. VI.

Beitrag zur Diskussion der Artumwandlung der Paratyphus-Enteritisbakterien.*)

Von Direktor Dr. L. Bahr, Kopenhagen.

Wie bekannt, bezeichnete der geniale Forscher Robert Koch den Nachweis der Verschiedenheit und der Unabänderlichkeit der pathogenen Bakterien als eins der wichtigsten Ergebnisse seiner Untersuchungen, und durch die bahnbrechende Einführung seiner Methoden zur Reinzüchtung der Bakterien war er imstande, das Bestehen echter, nur in relativ geringem Maße morphologisch und biologisch variabler Bakterienarten darzutun.

Dieses war ein bedeutender Fortschritt und ermöglichte u. a. die Aufstellung eines natürlichen Bakteriensystems. Es ist ja die Grundlage aller Bakterienuntersuchungen, daß die Anfangskultur eine Reinkultur ist, und daß dies der Fall war, wurde bei Kochs Reinzüchtungsmethode im allgemeinen angenommen, wenn die Kultur, die untersucht werden sollte, von einer isolierten, auf sterilem Nährboden angelegten Kolonie herrührte; die selbstverständlich später gegen zufällige Verunreinigung geschützt werden mußte. Eine absolute Sicherheit, daß die Kultur rein war, war natürlich nicht vorhanden, weil man nicht immer damit rechnen konnte, daß die isolierte Kolonie sich aus einem einzelnen Keim entwickelt hatte. Speziell, wenn es sich z. B. um ziemlich ziliembekleidete Bakterien handelte, lag ja auch ab und zu die Möglichkeit vor, daß nicht eine einzelne Bakterie, sondern zwei oder mehrere, eventuell auch verschiedene solche (mit den Zilien zusammengeflochtene) den Ausgangspunkt der Kolonie bildeten, oder das auch zilienlose Bakterien (z. B. Kokken), sozusagen eingebettet in oder festgehalten von Zilien, vorhanden sein konnten.

Es war deshalb ein wesentlicher Fortschritt, als R. Burri (1) im Jahre 1909 eine neue Methode veröffentlichte, wodurch es möglich wurde, eine absolute Reinkultur, d. h. eine von einem einzelnen Keim stammende Kolonie, zu gewinnen. Orskov (2) hat, wie bekannt, später (1922) eine noch sichere Methode zu diesem Zwecke angegeben.

Was nun speziell die zu der Paratyphus-Enteritisgruppe gehörenden Bakterien anbelangt, muß man — nach den gemachten Beobachtungen zu beurteilen — unzweifelhaft damit rechnen, daß gewisse Bakterien dieser Gruppe in verschiedenen Richtungen „mutieren“ können (Spaltungsvermögen oder Assimilation von einigen Kohlenhydraten, Agglutinabilität). Solche „Mutation“ haben z. B. B. K. Baerthlein (3) Sobernheim und Seligmann (4) und mehrere andere Forscher beobachtet. Hier soll auch erinnert werden an die Untersuchungen von Reiner Müller (5) über das Verhalten von Typhusbazillen gegenüber Rhamnose und von Paratyphus B-Bazillen gegenüber Raffinose, und an die Beobachtungen von M. Christiansen (6) über das Verhalten der von C. O. Jensen von Kalberuhrfällen isolierten und beschriebenen Paracolibazillen gegenüber Arabinose. Ob es hier erlaubt ist, von Mutationen im Sinne von H. de Vries zu sprechen, oder ob es sich um Latenz- oder Anpassungsvorgänge handelt, ist wohl schwer zu beurteilen, daß aber Latenzzustände beobachtet werden können, haben meines Erachtens u. a. z. B. R. Burri (7) und später auch ich selbst (8) Gelegenheit gehabt zu konstatieren: a) Burri bei einem Colikeim (*B. coli imperfectum*), von gärendem Gras gezüchtet, welcher vom Anfang nicht imstande war, Saccharose zu spalten, sich aber später, nach mehrtägiger Züchtung in saccharosehaltigem Substrat, fähig zeigte, diese Zuckerart unter Gas- und Säureproduktion zu spalten und danach nun imstande war, diese Zuckerart im Laufe von 24 Stunden spalten zu können. b) Ich selbst bei der Untersuchung von einem, aus kranken Bienen gezüchteten, zur Paratyphus-Enteritisgruppe gehörenden Bazillus (*B. parat. alvei*), welcher derselben Zuckerart (Saccharose) gegenüber ein ganz ähnliches Verhalten zeigte. — Ich soll mich übrigens nicht näher in die sehr umfangreiche Literatur, die auf diesem Gebiete vorliegt, und die bekanntlich auch Agglutinationsverhältnisse umfaßt, vertiefen, sondern nur pointieren, daß Mutationen oder mutationsähnliche Umwandlungen, so weit es ersichtlich ist, bei gewissen Bakterienstämmen der oben erwähnten Bakteriengruppe, wie auch bei gewissen Bakterienstämmen anderer Bakteriengruppen nachgewiesen worden sind.

*) Vortrag, gehalten am 21. September 1928 in Hamburg. 90. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte.

Eine absolute Unabänderlichkeit ist also bei den Bakterien nicht vorhanden. Wenn aber gewisse Forscher glauben, aus ihren Untersuchungen den Schluß ziehen zu können, daß (u. a.) Bakterien der Paratyphus-Enteritisgruppe solchen Umwandlungen recht häufig unterliegen, und daß dies besonders der Fall mit alten, im Laboratorium längere Zeit aufbewahrten Kulturen sein sollte, und wenn sie z. B. dieses als Ausdruck eines Naturgesetzes auffassen, können derartige Behauptungen dazu Anlaß geben, daß eine gewisse Unsicherheit in unserer Klassifikation der Bakterien entsteht.

Denn, wäre es möglich, daß z. B. ein gewöhnlicher Darmbazillus, wie *B. coli communis* sich umwandelte, ja recht häufig umwandelte, und sämtliche Eigenschaften eines Gärtner- oder Paratyphus- oder selbst eines Typhusbazillus erwarb, daß ein Gärtnerbazillus sich in einen Paratyphusbazillus oder umgekehrt, umändern konnte, ja um nicht weiter zu gehen, — dann würde ja die ganze Basis unserer jetzigen Auffassung betreffs der Spezifität der Bakterien ernstlich erschüttert werden und die Behauptungen Kochs unrichtig sein; und wir würden dann in dieser Beziehung kaum weiter sein als in den Zeiten vor Pasteur und Koch, wo man mit großer Entschiedenheit die Anschauung verfochten hat, daß die Spaltpilze nur einen einzigen Typus von Zellen darstellten, daß die Verschiedenheit nur in der ungleichen Größe zu suchen sei und daß Mikrokokken oder Bakterien, Vibrionen oder Spirillen, unter dem Einflusse der Anpassung oder Akklimatisation, sich aus einander entwickeln konnten, und demgemäß bald Milchsäurebildung oder Fäulnis, bald verschiedene Erkrankungsformen bewirken konnten (z. B. Nägeli, 1877).

Mehrjährige, regelmäßige Untersuchungen einer größeren Reihe von Bakterienkulturen, gehörend zu der Paratyphus-Enteritisgruppe, haben mir den Eindruck gegeben, daß, mit Ausnahme des von Reiner Müller und M. Christiansen nachgewiesenen und oben erwähnten Verhältnis Raffinose bzw. Arabinose gegenüber, „Umwandlungen“ sehr selten festgestellt werden können (z. B. gegenüber Dulcit und Saccharose), vorausgesetzt, daß es sich um absolute Reinkulturen handelt. Agglutinationsänderungen lasse ich hier außer Betracht, indem meine später berührte Beobachtung nur das Gärvermögen eines Bazillus umfaßt.

Es ist deshalb mit einer gewissen Skepsis, daß ich Arbeiten von solchen Verfassern gelesen habe, welche der Meinung sind, Artumwandlungen bei den von ihnen untersuchten Bakterienstämmen konstatiert zu haben, ohne daß es aus ihren Beschreibungen klar zu ersehen war, ob sie sich dadurch gegen Fehlschlüsse gesichert hatten, daß sie immer mit absoluten Reinkulturen gearbeitet haben, d. h. mit Kulturen, gewonnen von einer isolierten Kolonie, die wieder von einem einzelnen Keim herrührt. Meine Skepsis ist nicht weniger gewesen denjenigen Verfassern gegenüber, welche mitteilen, daß sie nicht, oder nur ausnahmsweise, mit Einzelkulturen gearbeitet haben, denn besonders wenn es gilt, die eventuelle Artumwandlung einer Bakterie zu studieren, muß das fundamentale doch sein, eine absolute reine Kultur, d. h. eine Einzelkultur als Ausgangsmaterial zu haben.

Durch einen Zufall erhöhte sich meine Skepsis nicht wenig. Bei der Untersuchung in meinem Laboratorium von vielen Tausenden Ratinstämmen, die immer auf ihre Reinheit hin aufs genaueste geprüft werden, haben wir — allerdings sehr selten — aber doch einige Male einzelne Stämme gefunden, die sich (im Gegensatz zu den übrigen Kulturen, die sich ganz konstant verhielten), nach längerer Aufbewahrung im Eisschrank scheinbar artumgewandelt hatten. Ich muß beispielsweise zwei solche Ratinkulturen erwähnen, die nach Aufbewahrung im Eisschrank in bezw. 1½ und 3 Monaten plötzlich imstande waren, Laktose und Saccharose unter Gas- und Säurebildung zu spalten, Eigen-

schaften, die Ratinkulturen sonst nicht besitzen. Beide Kulturen waren nicht in Einzelkulturen, sondern aus blauen, isolierten Kolonien auf Lackmus-Laktose-Agarplatten, wo nur blaue Kolonien zum Vorschein kamen, aber nicht von Einzelkulturen gewonnen.

Die erste (R. I.) dieser zwei Kulturen verhielt sich anfangs genau wie eine normale Ratinkultur, war also u. a. selbst nach mehrtägigem Wachstum in Laktose- oder Saccharosebouillon, nicht imstande, die erwähnten Zuckerarten zu spalten. Nachdem diese Kultur zusammen mit anderen Ratinkulturen 1½ Monat im Eisschrank aufgehoben gewesen, wurde sie zufälligerweise wieder untersucht, und es stellte sich zu unserer Überraschung heraus, daß sie jetzt Laktose und Saccharose im Laufe von 24 Stunden bei 37 Grad C spalten konnte. Verteilung dieser Kultur auf Lackmus-Laktose-Agar wurde nun vorgenommen und es zeigte sich, daß nur rote, gleichaussehende Kolonien heranwuchsen, und diese enthielten Reinkulturen von Colibakterien, welche unter Gas- und Säurebildung Saccharose und Laktose im Laufe von 24 Stunden bei 37 Grad C spalteten; blaue Kolonien kamen aber nicht mehr zum Vorschein.

War hier die Rede von einer Artumwandlung? Die Sache wurde jetzt systematisch verfolgt, und zwar durch genaue Untersuchung einer größeren Reihe frisch von Ratten gezüchteter Ratinkulturen, die nach kürzerer oder längerer Aufbewahrung im Eisschrank wieder untersucht wurden, und als es uns nach längerer Zeit gelang, einen ähnlichen Stamm herauszufinden, waren wir auch imstande, Klarheit über die Frage zu erreichen. Die betreffende Kultur (R. II.) war wie gewöhnlich von einer isolierten, blauen Kolonie (Verteilung auf Lackmus-Laktose-Agar, wo nur blaue Kolonien zum Vorschein kamen), gewonnen. Diese Kultur verhielt sich gleich nach der Züchtung genau wie andere Ratinstämmen und war also u. a. nicht imstande, Laktose und Saccharose zu spalten. Eine zweite Verteilung dieser Kultur auf Lackmus-Laktose-Agar gab daselbe Resultat: nur blaue, nicht Laktose- oder Saccharose spaltende Ratinkolonien kamen zum Vorschein. Eine dritte Verteilung gab daselbe Resultat, als aber sämtliche Kolonien ganz genau untersucht wurden, wurden unter der großen Menge blauer Kolonien drei Kolonien entdeckt, die zwar blau waren, aber einen ganz schwachen, rötlichen Schimmer hatten. Diese drei „roten“ und eine Anzahl blauer Kolonien wurden nun näher untersucht. Die drei „roten“ Kolonien stellten sich als Reinkulturen von Colibazillen heraus, die u. a. im Laufe von 24 Stunden, unter Gas- und Säurebildung, Laktose und Saccharose spalteten, während die anderen Kulturen dies nicht vermochten und sich genau wie Ratinkulturen verhielten.

Trotz der anscheinenden Reinheit der Anfangskultur, zeigte es sich also, daß dieselbe doch keine absolute Reinkultur gewesen, sondern eine Mischkultur von Ratin- und Colibazillen. Auf der anderen Seite befanden sich aber nur außerordentlich wenige Colikeime unter den großen Mengen von Ratinbazillen (1). Die Original-Mischkultur (2), Stichkulturen in Agar von den drei „roten“ Colikolonien (3) und eine Anzahl Stichkulturen der blauen Kolonien wurden nun im Eisschrank aufbewahrt und nach drei Monaten wieder untersucht. Das Resultat war interessant und überraschend:

1. Die originale Mischkultur war nun imstande, im Laufe von 24 Stunden bei 37 Grad C Laktose und Saccharose unter Gas- und Säurebildung zu spalten, und nur rote Kolonien wuchsen auf der Lackmus-Laktose-Agarplatte.
2. Die drei Colikulturen waren unverändert, alle waren imstande, nach 24 Stunden Laktose und Saccharose zu spalten. Keine blaue Kolonien, nur rote Colikolonien kamen auf der Lackmus-Laktose-Agarplatte zum Vorschein.

3. Die von den blauen Kolonien angelegten Stichkulturen waren ebenfalls unverändert. Laktose und Saccharose wurden nicht gefaltet und nur blaue Kolonien erschienen auf der Lackmus-Laktose-Platte.

Aus diesen — natürlich ganz vorläufigen — Untersuchungen kann meines Erachtens folgender Schluß gezogen werden: Die betreffende ursprüngliche Ratinkultur, welche scheinbar eine Reinkultur von Ratinbazillen darstellte, ist keine absolute Reinkultur gewesen. Die Beimischung der sehr wenigen Colikeime hat sich aber nicht demaskiert, weil dieselben wahrscheinlich unter dem Einfluß der großen Menge von Ratinbazillen in einer Art von Latenzzustand gehalten gewesen sind. Die Ratinbazillen haben wahrscheinlich nach und nach in Anzahl abgenommen, die Colikeime aber zugenommen, bis zuletzt alle Ratinkeime zugrunde gegangen sind, teilweise vielleicht unter der Einwirkung der heranwachsenden Colibazillen, und das Endresultat ist also geworden, daß die Kultur sich als eine Coli-Reinkultur repräsentierte.

Die beobachtete „Artumwandlung“ eines Enteritisbazillus in einen Colibazillus hat sich also gezeigt, eine falsche Artumwandlung zu sein.

Wenn ich mir erlaubt habe, diese Beobachtung bereits jetzt bei dieser Gelegenheit vorzulegen, ist es u. a. weil ich etwas ähnliches bisher nicht veröffentlicht gesehen habe. Experimentelle Versuche *in vitro* über eine ähnliche Beeinflussung seitens z. B. Paratyphus B- und gewisser Enteritisbazillen auf Colibazillen liegen aber vor. Z. B. haben Theobald und Dorothea Smith (9) (Rockefeller Institute, U.S.A.) in 1920 darauf aufmerksam gemacht. Besson und de Lavergne (10) haben es bestätigen können (1922) und in Deutschland liegen diesbezügliche Arbeiten vor von A. v. Jeney (11) (Institut Robert Koch, 1923) und von Fritz Kaufmann (12) (1924). Der letzte teilt u. a. folgendes mit: „Eine Ausnahme machte bei den Versuchen ein Paratyphustamm, B. 628, der mit dem aus demselben Stuhl gezüchteten Coli 628 — weniger stark mit anderen Colistämmen — bei der Ausspätung, nach 24-stündiger Symbiose, fast nur B-Kolonien mit nur vereinzelt Colikolonien gab. Besonders auffallend waren hierbei die Colikolonien, die zuerst von einem der Sache fernstehenden kaum als Coli angesprochen werden konnten. Sie waren weiß, höchstens mit einem rötlichen Schimmer versehen und stark gezackt —.“

Mit solchen Latenz- oder Hemmungszuständen muß also gerechnet werden. Natürlich geben sie zum Nachdenken Anlaß; denn, wenn ein übrigens leicht erkennbarer Colikeim sich, wie im obengenannten Falle, auf diese Weise der

Aufmerksamkeit entziehen kann, wie schwer muß es dann oft sein, Klarheit zu erreichen, wenn in ähnlicher Weise mit z. B. einer anscheinenden Reinkultur von Breslau-Bakterien, worin sich sehr wenige Gärtnerbakterien (im Latenzzustande) — oder umgekehrt — befinden, gearbeitet wird. Wie leicht muß es vorkommen können, daß unrichtige Schlüsse aus selbst recht genauen Untersuchungen gezogen werden, und daß Artumwandlungen konstatiert werden, die falsche Umwandlungen sind.

Wenn die Kultur nicht in jedem einzelnen Falle von einer Einzelkultur herrührt und also nicht eine absolute Reinkultur darstellt, können m. E. keine beweiskräftige Schlüsse betreffs Artumwandlung gezogen werden, und wird es trotzdem getan, sind solche Untersuchungen im höchsten Grade dazu geeignet, statt Klarheit, Verwirrung in diese Frage hineinzubringen.

Auf die Bedeutung der Einzelkultur bei solchen Studien haben übrigens Kolle, Rosenthal, Czaplowski und Reichenbach schon im Jahre 1908 hingewiesen (2. Tagung der Freien Vereinigung für Mikrobiologie), später auch andere Forscher.

Literatur.

1. Burri, R.: Tuschmethode, Jena 1909.
2. Orskov, J.: a) Journ. of bacteriol. 1922, 7, S. 537; b) Zentralbl. für Bakteriologie ufw. 1924, Abt. I, Orig., Bd. 92.
3. Baerthlein, K.: Zentralbl. für Bakter. ufw. 1918, I. Abt., Orig., Bd. 81. — 4. Sobernheim, G. und Seligmann, E.: a) Deutsche med. Wschr. 1910; b) Zentralbl. für Bakt. I. Abt., Orig., Bd. 93 und 99.
5. Reiner Müller: Münchener med. Wschr. 1909, Nr. 7 ufw.
6. Christiansen, M.: Det kgl. danske Videnskab. Selsk. Skrifter, nat. og math. Afd. 8. R. I. 3. 1916.
7. Burri, R.: Zentralbl. für Bakt. ufw. Abt. II, Bd. 28.
8. Bahr, L.: D. T. W. 1926, Jahrg. 34, S. 127—131.
9. Theobald and Dorothea Smith: Journ. of gen. physiolog. 1920, 3, Nr. 1.
10. Besson et Lavergne: Comp. rend. des séances de la soc. biolog. 1922, 86 (7), S. 357.
11. A. v. Jeney: Zschr. für Hygiene und Infektionskrankheiten 1923, Bd. 100.
12. Kaufmann, F.: Zschr. für Hygiene und Infektionskrankheiten 1924, Bd. 102, S. 68—75.

Über einige Methoden zur Prüfung der Funktion von Sehnen und Muskeln.*)

Von Dr. Krüger.

Anmerkung: Die elektromyographischen Untersuchungen, die der in Pflügers Archiv veröffentlichten Arbeit zugrunde lagen und aus der die meinem letzten Artikel in dieser Zeitschrift beigegebenen Abbildungen stammen, sind vom Anatomischen Institut in Gemeinschaft mit dem Physiologischen Institut ausgeführt worden.

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 44, S. 736.

Innere Medizin und Chirurgie.

Schermer u. Hofferber: Individualitätsreaktionen (Isohämagglutination, Isolysis, Heteroagglutination und Heterolysis) des normalen Pferdeblutes. (Aus dem Tierärztl. Institut der Universität Göttingen. — Direktor: Dr. Schermer.) (Arch. für wissenschaftl. Tierheilkunde 1927, 57, S. 77.)

Verff. untersuchten Serum und Erythrozyten von 50 Pferden und konnten in 2121 Kombinationen 41omal Isoagglutination feststellen. Auch Isolysis konnten sie nachweisen, ebenso Heteroagglutinine und Heterolysine. Sie konnten fünf Haupt- und sechs Nebengruppen aufstellen. Die beiden Erythrozyteneigenschaften wurden mit X und Y, die zwei Serumeigenschaften mit x und y bezeichnet. Danach ergaben sich folgende Gruppen: 1. Xy in 10 Prozent, 2. Xo in 34 Prozent, 3. Yx in 6 Prozent, 4. Yo in 10 Prozent und 5. Oxy oder Oz in 18 Prozent. Den Nebengruppen gehörten insgesamt 22 Prozent an. Im Gegensatz zu den Verhältnissen beim Menschen sind die einzelnen Gruppen infolge einer Schwäche von Serum- bzw. Erythrozyteneigenschaften nicht in sich gefestigt. Es müssen daher große

Versuchsreihen angesetzt werden. Zur weiteren Aufteilung wurde die Abfättigung herangezogen. Geiger.

Fromherz, K.: Herzwirksame Glykoside von Adonis vernalis. (Aus dem wissenschaftl. Laboratorium der Firma L. Hoffmann-La Roche A.-G. in Basel.) (M. m. Wschr. 1928, S. 818.)

Verf. konnte aus der Droge von Adonis vernalis zwei hochwirksame digitalisartige Glykoside isolieren, die alle charakteristischen Wirkungen der bekannten herzwirksamen Glykoside besitzen. Sie unterscheiden sich durch den Grad der Wirksamkeit auf das Herz. Dabei besitzt aber das am Herzen schwächer wirkfame eine therapeutisch beachtenswerte sedative und vor allem eine starke spezifische diuretische Wirkung. Die beiden neu isolierten wirkfamen Bestandteile gehören zu den herzwirksamen Glykosiden zweiter Ordnung und wirken dementsprechend nicht kumulierend. Von einer Mischung der beiden Glykoside etwa im Verhältnis ihres Vorkommens in der natürlichen Droge ist nach den Befunden im Tierversuch eine besonders günstige Wirkung am Menschen zu erwarten. Carl.

Geßner, O. und K. Siebert: Über die blutzucker-senkende Wirkung von Phaseolus-Präparaten (Decoctum Fructus Phaseoli sine semine und Phaseolanum fluidum „Tosse“. (Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Marburg.) (M. m. Wschr. 1928, S. 853.)

Kaufmann hat im Jahre 1926 berichtet, daß ein altes Volksmittel gegen Zuckerkrankheit, nämlich Bohnenschalentee, nach feinen experimentellen und klinischen Untersuchungen in der Therapie dieses Leidens mit Vorteil angewandt werden könne. Verff. haben analoge Veruche angestellt, namentlich unter Benutzung eines von E. Tosse & Co in Hamburg aus Bohnenschalen hergestellten Extraktes des „Phaseolanum fluidum“, das einen Alkoholgehalt von 20 Prozent aufweist. Es wurde festgestellt, daß dieses Präparat wie auch der einfache Bohnenhüllentee nach peroraler Zufuhr den Nüchternblutzucker von Hungerkaninchen merklich herabsetzen. Phaseolum fluidum erniedrigt und verkürzt nach peroraler Gabe die Glukose- und Adrenalin-Hyperglykämie. Vergiftungserscheinungen wurden nicht beobachtet. Verff. empfehlen daher die Nachprüfung des Präparates an Zuckerkranken, wobei eine Tagesdosis von 6—8 Gramm zu verabreichen wäre. Carl.

Elkeles, A. und Heimann, F.: Weitere Untersuchungen über Störungen im Kohlehydratstoffwechsel bei Diphtherie. (Rudolf Virchow-Krankenhaus Berlin.) (Arch. für klin. Medizin 1928, 158, 238.)

Die alimentäre Blutzuckerkurve steigt bei Belastung mit 50 Gramm nicht höher an, als wenn man nur 20 oder nur 10 Gramm verabreicht. Der im Stadium der akuten Diphtherie auftretende sympathikotonische Zustand, der nicht durch Insulin zu beseitigen ist, klingt bei der Heilung schneller ab. R. Völker, Leipzig.

Überreiter: Fünf weitere operierte traumatische Harnblasenrupturen beim Hund. (Aus der chirurgischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule in Wien. — Vorstand: Prof. Dr. Th. Schmidt.) (Arch. für wissenschaftl. Tierheilkunde 1928, 57, S. 343.)

Durch klinische Beobachtungen und experimentelle Untersuchungen konnte Verf. feststellen, daß die meisten Rupturen am Blasenfundus eintreten. Für das Zustandekommen ist der Füllungsgrad von besonderer Bedeutung. Genaue Aufnahme des Vorberichtes ist nötig. Im einzelnen schildert Verf. sodann klinische Symptome, Diagnose und Differentialdiagnose, beschreibt die Operation und den weiteren Verlauf. In der Kasuistik werden fünf Fälle eingehend angeführt. Geiger.

Blumenberg: Über Dijozolseife als Händedesinfektionsmittel. (Aus dem Hygienischen Institut der Universität Bonn.) (M. m. Wschr. 1928, S. 694.)

Die von der Firma Trommsdorff in Aachen hergestellte Seife besteht zu 14 Prozent aus Kernseife und 86 Prozent aus einer Mischung von Dijozol (einem stark jodhaltigen Desinfektionsmittel) und 99prozentigem Alkohol. Das Präparat stellt eine salbenartige, angenehm riechende Masse von weißlicher Farbe dar und wird in Zinntuben in den Handel gebracht. Veruche ergaben, daß der Seife eine starke desinfizierende Wirkung zukommt. Da sie bequem anzuwenden ist, die Haut nicht angreift, und außerdem desodorisierende Eigenschaften besitzt, so kann ihr Gebrauch empfohlen werden. Carl.

Seuchenlehre u. Seuchenbekämpfung.

Veeartsennijkundig Instituut. (Tierärztliches Institut.) (Jahresbericht für 1927.) (Welteoreden 1928, 21 S.)

Im Berichtsjahr steigerte sich die Tätigkeit des „Laboratorium voor Veeartsennijkundig Onderzoek“ (Laboratorium für tierärztliche Untersuchung). Daher erhielt es die Bezeichnung „Veeartsennijkundig Instituut“. Um stets genügend Sera und Impfstoffe liefern zu können, wurden neue Serumställe eingerichtet, und die Kühleinrichtung wurde be-

nützt. Der Käfig für Veruche mit Fliegen wurde in einen fliegenfreien Stall umgebaut, eine neue Abteilung für Geflügelkrankheiten wurde eingerichtet, die Zahl der Serumtiere wurde um 20 vermehrt. Da fünf Tiere verloren gegangen waren, blieb am Ende des Berichtsjahres ein Bestand von 12 Pferden, 29 Rindern und 25 Büffeln übrig. Der Gesamtbestand des Institutes betrug 49 Pferde, 49 Rinder, 29 Büffel, 75 Schafe, 1 Schwein und mehrere kleine Versuchstiere.

Bei der biologischen Untersuchung auf Lyssa wurde außer der bisherigen Injektion in die Lendenmuskeln bei Kaninchen noch eine intrazerebrale Injektion bei Meerfischweinen ausgeführt. Von jedem mikroskopisch negativen Fall wurden also ein Kaninchen und ein Meerfischwein infiziert.

Bei der Septicaemia haemorrhagica bubalorum wurden Serienveruche angestellt, um zu ermitteln, wie lange Septikämiebazillen in zeretztem Material nachzuweisen sind. Die Untersuchung ergab, daß bei Anwendung der Tierimpfung kaum eine falsche Diagnose gestellt werden kann und daß die intramuskuläre Impfung den Vorzug der Ohrskarifikation verdient. Die Nachfrage nach Serum konnte im Berichtsjahr nicht befriedigt werden. Geliefert wurden an Serum 730 700 ccm (im vorhergehenden Jahr 667 275 ccm) und an Vakzine 95 510 ccm (im vorhergehenden Jahr 50 000 ccm). Die Schutzimpfung wurde günstig beurteilt, und auch die Heilimpfung erwies sich in 80 Prozent der Fälle erfolgreich. Für die Hochimmunisierung der Serumtiere wurden 32 neue Stämme aus den Bezirken, in denen die Krankheit herrscht, benutzt. Mit der im Jahre 1926 im Bezirk Bantam mit dem neuen Septikämievakzin ausgeführten Vakzinimpfungen wurde eine Immunität von wenigstens 5½ Monaten erzielt. Daher wurde der Impfstoff in der Praxis verwendet.

Auf Malleus wurden mit der Komplementbindung 2904, mit der Konglutination 126 Sera untersucht. Davon fielen bei der Komplementbindung 2098, bei der Konglutination 104 negativ, 224 bzw. 12 zweifelhaft, 104 bzw. 2 schwach positiv, 190 bzw. 4 positiv, 148 bzw. 1 stark positiv aus, keine spezifische Bindung trat ein bei 27, Eigenhemmung bei 113 bzw. 3. Vom Mallein wurden 19 596 ccm unverdünnt abgegeben.

Allgemeine Organtuberkulose beim Geflügel wurde bei zwei einheimischen Hühnern und bei einer einheimischen Gans festgestellt. An Tuberkulin wurden 2149 ccm Tuberkulin A (für subkutane Anwendung), 15 569 ccm Tuberkulin B (Ophthalmoreaktion) und 10 ccm Geflügeltuberkulin abgegeben. Mit diesem wurden in einem Hühnerbestand die infizierten Tiere ermittelt und unschädlich gemacht.

Die Nachfrage nach Milzbrandserum konnte im Berichtsjahr nicht befriedigt werden, trotzdem die Zahl der Serumtiere um 7 vermehrt war. Zum ersten Mal wurde Immunserum von Büffeln aus der Praxis verwendet. Anscheinend ist sein Immunitätswert ebenso hoch wie derjenige des Immunserums von Pferden. Abgegeben wurden 521 400 ccm Serum (im vorigen Jahr 269 600 ccm) und 16 910 ccm (im vorhergehenden Jahr 5470 ccm) Vakzin. Für die Hochimmunisierung der Serumtiere wurden 8 neue Stämme aus der Praxis verwendet.

Rauchbrand wurde in den Bezirken Magelang und Kediri mit Serumeinspritzung, der 14 Tage später Filtratimpfungen folgten, bekämpft. Daß diese Art der Bekämpfung günstig wirkt, beweist der Rückgang der Nachfrage nach Impfstoff aus den Rauchbranddistrikten, wo seit einigen Jahren das Filtrat verwendet worden ist. Denn während im Jahre 1926 an Rauchbrandfiltrat 625 000 ccm und 145 000 ccm Rauchbrandserum abgegeben wurden, betrug 1927 die entsprechende Menge nur 595 000 ccm bzw. 156 500 ccm.

Bei Abortus infect. bovis (Bang) wurde das Serum untersucht. Durch Agglutination wurden 677 Sera und

vermittelt Komplementbindung 634 Sera untersucht. Davon reagierten negativ bei Agglutination 517, bei Komplementbindung 531, zweifelhaft 60 bzw. 13, schwach positiv 10 bzw. 17, positiv 67 bzw. 37, stark positiv 23 bzw. 35; keine spezifische Bindung trat ein bei 4, Eigenhemmung bei 7. Abgegeben wurden 36 300 ccm Serum (im vorhergehenden Jahr 33 800 ccm) und 1440 ccm Vakzin. Dieses wurde nur zu Versuchszwecken abgegeben und bestand aus 380 ccm lebenden und 1060 ccm abgetötetem Vakzin. Mit Kulturen eines stallspezifischen Stammes des *Bacillus abortus* Bang wurde in dem betreffenden Stall ein Impfversuch gemacht.

Die Haupttätigkeit der **Abteilung für zoologische Untersuchungen** bestand im Studium der biologischen Seite des Surraproblems. Es wurden Übertragungsversuche mit Tabaniden, Musziden und Moskitos angestellt, und zwar im ganzen 250 Versuche mit 8181 Exemplaren, die zu 34 verschiedenen Arten gehörten. Mit Tabaniden wurden 226 Versuche mit 6877 Exemplaren angestellt. Dabei wurden 14 Arten ermittelt, von denen noch nicht bekannt war, daß sie die Krankheit übertragen. Die Versuche ergaben, daß wahrscheinlich jede Tabanidenart die Surra überträgt, daß das normale Maximum der Infektiosität bei Tabaniden zwischen 3 und 6 Stunden liegt, daß ziemlich leicht mehrere Versuchstiere (bis 4) durch dieselben Fliegen infiziert werden können. Die Versuche mit Musziden fielen negativ aus mit Ausnahme eines *Stomoxys*-versuches bei Verwendung kleiner Versuchstiere. Ebenso waren die Versuche mit Moskitos negativ. In der Gefangenschaft können die Tabaniden länger als 70 Tage leben, in der Natur bestimmt noch länger. Zu ihren natürlichen Feinden gehören 2 Schlupfwespen, *Phanurus* spp. Sie greifen die Eier der Tabaniden an. Mit dem Studium ihrer Biologie und Verbreitung ist begonnen worden.

Die **neue Abteilung für Geflügelkrankheiten** soll den Stand der Geflügelkrankheiten in Niederl.-Indien ermitteln und die Geflügelhalter über Hygiene und Bekämpfung der Geflügelkrankheiten unterrichten. Es wurden 84 Untersuchungen von kranken Vögeln, von Kadavern und Organen gestorbener Tiere, von konserviertem Darminhalt, von Parasiten usw. ausgeführt.

Die **weiße Kükenruhr** brach auf einer Geflügelfarm aus. Mit Hilfe der serologischen Untersuchung sämtlicher 200 Zuchttiere wurden die Ansteckungsstoffträger ermittelt.

Geflügelpocken und Geflügeldiphtherie herrschen endemisch. Die präventive Impfung mit dem Geflügelpocken-vakzin des Institutes wirkt gut. Es wurden 5260 Dosen gegen 3235 im Jahre 1926 abgegeben.

Eine **Pseudogeflügelpest** wurde an verschiedenen Stellen beobachtet. Sie wird durch ein filtrierbares Virus verursacht, das von dem der Geflügelpest verschieden ist. Denn Hühner, die gegen Pseudohühnerpest immun sind, sterben bei künstlicher Infektion mit Hühnerpest. Die Pseudohühnerpest wird durch direkte Berührung auf gesunde Hühner übertragen. Speichel und Fäzes sind sehr infektiös. Bekämpft werden kann die Krankheit nur durch strenge Isolierung der Gehöfte; Immunisierungsversuche sind im Gange.

Darmkokzidiosis tritt besonders in nasser Jahreszeit auf. Am 10. bis 12. Tage nach der Geburt erkranken die Küken, aber auch halbwüchsige Tiere und junge Hennen werden angegriffen. Die Behandlung ist rein hygienisch und medikamentell.

B a ß.

Standesangelegenheiten.

2. Tagung der Vereinigung der Tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten Deutschlands in Gießen am 9. und 10. November 1928.

Anwesend waren: Baum - Leipzig*), Bürker - Gießen, Elbs - Gießen, Herzog - Gießen, Jodlbauer - München, Küst - Gießen,

Martin - Gießen, Neumann - Kleinpaul - Berlin*), Nörr - Gießen, Herzog - Gießen, Jodlbauer - München*), Küst - Gießen, München*), Pfeiffer - Gießen*), Schauder - Gießen, Schermer-Göttingen, Schmidt-Leipzig*), Schmidt-Gießen, Schöttler - Berlin, Stang - Berlin*), Trautmann - Hannover*), Zietzschmann - Hannover, Zwick - Gießen*).

Die Namen derjenigen Herren, die als offizielle Vereinigungsvertreter der Tierärztlichen Hochschulen bzw. Fakultäten nach den Satzungen unbedingte Vollmacht besitzen und allein stimmberechtigt sind, sind mit einem *) versehen.

Nachdem in einer am 12. November 1927 im Reichsministerium des Innern abgehaltenen kommissarischen Beratung über die Frage der einheitlichen Regelung der Lehrpläne an den Tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten die Notwendigkeit der Aufstellung eines Normalstudienplanes allgemein anerkannt wurde, eine grundsätzliche Einigung damals aber nicht erzielt werden konnte, hat sich die Vereinigung bereits bei ihrer ersten Tagung am 10. März 1928 in Berlin mit Vorbereitungen für eine auf breiter Grundlage in Aussicht genommene Beratung innerhalb der Tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten befaßt. Damals wurden für die verschiedenen Studienfächer besondere Referenten aufgestellt, die mit den einzelnen Fachvertretern in Verbindung treten, deren Wünsche ermitteln und nach Beratung durch die Hochschulen und Fakultäten dem Vorsitzenden der Vereinigung zuleiten sollten. Die Umfragen hatten Ende September ihren Abschluß gefunden, so daß, wie geplant, im November zur 2. Tagung eingeladen werden konnte.

Entsprechend der großen Bedeutung des Gegenstandes nahmen naturgemäß die **Verhandlungen über die einheitliche Gestaltung des Studienplanes** weitaus die meiste Zeit der Tagung in Anspruch.

Nach herzlichen Begrüßungsworten gab der Vors. zunächst einen kurzen Bericht über die Ausführung der bei der Sitzung vom 10. März 1928 gefaßten Beschlüsse, um dann sogleich in die Beratungen über den Hauptverhandlungsgegenstand einzutreten. Die Verhandlungen, denen bei der Eröffnung auch Se. Magnifizenz, der Rektor der Gießener Universität, Prof. Dr. Herzog, beiwohnte, waren von Anfang bis zu Ende von dem ernstesten Willen getragen, zu einer einheitlichen, allseitig befriedigenden Regelung des Studienplanes zu gelangen, die zugleich als Unterlage für die zu erwartenden weiteren und endgültigen Beratungen im Reichsministerium des Innern zu gelten hätte. Grundsätzlich waren für die Beratungen die Richtlinien bestimmend, die bei der kommissarischen Beratung im Reichsministerium am 12. XI. 1927 zum Ausdruck gebracht worden waren. Abgewichen wurde davon nur in solchen Fällen, die vom fachtechnischen Standpunkte aus als hinreichend begründet angesehen werden konnten. Vor allem war der als notwendig anerkannten Forderung Rechnung zu tragen, den Begriff der „Pflichtvorlesungen“ und „Pflichtkurse“ im Rahmen der jetzt geltenden Prüfungsordnung etwas weiter zu ziehen, ohne die Durchschnittszahl von 32 vor-klinischen und 36 klinischen Wochenstunden zu überschreiten, weiterhin den § 42 der Prüfungsordnung, in dem die einzelnen Pflichtvorlesungen und Pflichtkurse aufgeführt sind, sowohl inhaltlich als auch, was die Bezeichnungen der Vorlesungen und Kurse anbetrifft, in Übereinstimmung mit dem § 45 zu bringen, der die Prüfungsfächer im einzelnen aufzählt. Endlich galt es, die einzelnen Vorlesungen und Übungen an den verschiedenen Hochschulen und Fakultäten in ihren Bezeichnungen denjenigen der Prüfungsordnung anzupassen und vor allem bestimmte Vorlesungen und Übungen einheitlich in bestimmte Semester (S.-S. bzw. W.-S.) zu verlegen, um so die Freizügigkeit der Studierenden in Zukunft in keiner Weise zu behindern. Die früheren Verhandlungen haben bereits gezeigt, daß sich einer derartigen Regelung zahlreiche Hindernisse in den Weg stellen, die zum Teil in der Prüfungsordnung selbst, zum Teil in der besonderen Eigenart der Hochschulen und Fakultäten oder gar einzelner Lehrstühle zu suchen sind. Diese Schwierigkeiten sind auch bei den jetzigen Verhandlungen erneut hervorgetreten. Wenn sie fast durchweg überwunden werden konnten, so ist dies in erster Linie den eingehenden Vorarbeiten der Herren Fachvertreter und nicht zuletzt der Einsicht der Tagungsteilnehmer zu verdanken. Es erscheint nicht tunlich, jetzt schon Einzelheiten und Beschlüsse in der Angelegenheit des Studienplanes bekannt zu geben. Soviel kann aber gesagt werden, daß es den Bemühungen der Vereinigung gelungen ist, einen Studienplan für die Pflichtfächer aufzustellen, dem sich zwanglos anzupassen nach übereinstimmender Ansicht der Versammlung durch-

aus möglich ist und der geeignet ist, eine Grundlage für die endgültige Behandlung des Gegenstandes im Reichsministerium abzugeben. Vor allem ist hervorzuheben, daß der Vorschlag, was die Zahl der Pflichtstunden in den einzelnen Semestern anbetrifft, durchschnittlich noch hinter den Maximalzahlen zurückbleibt, so daß auch für eine Reihe von fakultativen Fächern noch Zeit zur Verfügung steht. Wenn auch einige Änderungen in der Prüfungsordnung sich als unumgänglich und dringend notwendig herausgestellt haben, so lehnt sich der Vorschlag doch eng an die jetzige Fassung der Prüfungsordnung an.

Das eingehende Protokoll mit entsprechenden Begründungen und Beigabe des aus den Beratungen sich ergebenden Normalstudienplanes wird demnächst dem Reichsministerium des Innern sowie den Hochschulen und Fakultäten vorgelegt werden. Es darf dem Wunsche und der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, daß die Arbeit der Vereinigung die Angelegenheit um einen Schritt vorwärts und dem Ziele einer allseitig befriedigenden Lösung näher gebracht hat. Gerade in diesem Zusammenhange hat es — was allgemein anerkannt wurde — wieder aufs neue gezeigt, wie wertvoll es ist, daß sich die Tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben.

Unter den übrigen Punkten der Tagesordnung verdient noch die **Aufnahme der Vereinigung tierärztlicher Professoren außerhalb der tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten** besonders erwähnt zu werden. In Ausführung des Beschlusses der letzten Tagung hatte sich der Vorsitzende der Vereinigung Prof. Dr. Zwick an Prof. Casper-Breslau gewendet mit der Aufforderung, einen Verband der tierärztlichen Institutsdirektoren an deutschen nicht tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten zu gründen. Dies ist in der Zwischenzeit geschehen. Bis jetzt sind dem Verbands beigetreten: Casper - Breslau, Hieronymi - Königsberg, Hobstetter - Jena, Klein - Bonn, Schermer - Göttingen, Spann - Weihenstephan, Poppe - Rostock.

Prof. Schermer, der als Vertreter des Verbandes anwesend war, gab einen kurzen Bericht und bat um Aufnahme des Verbandes in die Interessengemeinschaft der Vereinigung der Tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten. Die Aufnahme erfolgte einstimmig. Der Verband wird nunmehr innerhalb der Vereinigung wie eine Fakultät bzw. Hochschule behandelt mit dem Unterschied, daß ihm mit Rücksicht auf die geringe Zahl seiner Mitglieder nur eine Stimme zugebilligt wurde.

In den weiteren Punkt der Tagesordnung (Internationaler Tierärztlicher Kongreß) wurde noch kein endgültiger Beschluß gefaßt. Zwar wurde die grundsätzliche Zustimmung zur Teilnahme Deutscher Professoren zum Ausdruck gebracht. Dagegen wurde zur Frage der Teilnahme Deutscher Professoren als Referenten noch nicht endgültig Stellung genommen. Die Tierärztlichen Hochschulen bzw. Fakultäten sollen noch eingehend darüber gehört werden.

Nach der Behandlung einiger nicht allgemein interessierender Anfragen, Beschlüsse und kleinen Satzungsänderungen sowie einem kurzen Kassenbericht des Vorsitzenden fand die Sitzung ihren Abschluß.

Außer bei den Beratungen, die an beiden Tagen bis in die späten Abendstunden hinein fortgesetzt wurden, trafen sich die Teilnehmer und die Mitglieder der Gießener Fakultät an zwei Abenden zu gefelligem Zusammensein, das hoffentlich noch recht lange in freundlicher Erinnerung bleiben wird.

Verein beamteter Tierärzte Preußens.

Generalversammlung, 20. Oktober 1928, in Berlin.

Oberregierungsrat Dr. Rust eröffnete die Versammlung mit herzlichen Begrüßungsworten. Insbesondere begrüßte er Ministerialrat Dr. Wiemann, Oberregierungsräte Dr. Müller und Dr. Klimmeck, ferner Magnifizenz Dr. Stang, die Geheimräte Fröhner und Schmaltz und Prof. Dr. Peter aus Hamburg. Ministerialrat Wiemann überbrachte zugleich Grüße und Wünsche des Ministerialdirigenten Müssmeier, der bedauert infolge einer Operation am Erscheinen verhindert zu sein. Telegraphisch wurden ihm die besten Wünsche für baldige Genesung überliefert. Dr. Bach und Beutler sprachen über das Thema „Betrachtungen über die Zweckmäßigkeit einer allgemeinen Vollbefoldung der Veterinärärzte“. Beide Referenten entledigten sich ihrer Aufgabe mit ganz außerordentlichem Geschick. Bach, der die allgemeinen Gesichtspunkte behandelte, wies darauf hin, daß die

von den Praktikern uns vorgehaltene Doppelanstellung in der Tat bestehe. Doch ein Gleiches sei der Fall bei den Freiberufstierärzten, die Praxis und Fleischbeschau ausübten. Dagegen aber seien Bedenken noch nicht erhoben. Bis jetzt seien, sowohl die Veterinärärzte als auch die Freiberufstierärzte gut mit ihrer Doppelstellung fertig geworden. Wenn wirklich an irgend einer Stelle Anlaß zu Beanstandungen vorlägen (Praxisjägerei mit und ohne Assistenten), so sei das zu verurteilen und Abhilfe zu schaffen. Die große Mehrheit der Vet.-Räte sei auf Praxis eingestellt, sie ihnen plötzlich zu nehmen, sei daher nicht gerecht. Vollbefoldung hätten bisher nur diejenigen Veterinärärzte gewünscht, die zur Privatpraxis keine Zeit oder keine Gelegenheit gehabt hätten. Bach nahm dann Stellung zu den bislang erschienenen Artikeln der Fachpresse. Wie sehr Vergleiche hinken, zeigte er an dem Beispiel des Freistaates Hessen. Seine Mitteilung, daß in Hessen 23 Veterinärbeamte tätig seien, dabei sei Hessen nicht viel größer als drei brandenburgische Kreise, erregte allgemeine Heiterkeit. Auch seine Bemerkungen zu dem Artikel eines Veterinärrates a. D., der vielfach als Kronzeuge von den Freiberufstierärzten angeführt wird, fanden allgemeine ungeteilte Zustimmung. Beutler behandelte die speziellen Verhältnisse des Themas. Die Seuchenbekämpfung habe bislang gut funktioniert, sonst würde das Ministerium von sich aus schon längst eine Änderung herbeigeführt haben. Zusammenlegungen von Kreisen seien unzweckmäßig. Das hätten die Seuchengänge genügend dargetan. Das Auto sei heute das Verkehrsmittel, insbesondere für den Veterinärarzt. Benutzen dürfe er es, doch liquidieren nur selten (s. Reisekostengesetz). Ohne Praxis könne kein Veterinärarzt ein Auto halten. Sollte die Vollbefoldung mit Praxisverbot eingeführt werden, so müsse eine andere Regelung der Gebührenfrage, der Dienstaufwandsentschädigung für die Schwerarbeiter unter den Beamten stattfinden. Das Praxisverbot würde den Freiberufstierärzten nur vorübergehend Vorteil bringen. In Württemberg habe die Landwirtschaftskammer das Praxisverbot einstimmig abgelehnt. Deshalb sei es geboten, wenn in Preußen die Neuordnung der Vollbefoldung mit Praxisverbot eingeführt werden solle, daß vorher auch die Interessenten gehört würden. Lauter einmütiger Beifall der Versammlung dankte beiden Referenten für ihre lichtvollen Ausführungen. Die Tafel, daß der Veterinärarzt erst in reiferen Jahren angestellt wird, wirkt sich im Gehalt — so führte ein Redner in der Besprechung aus — im Vergleich mit anderen Beamten wie folgt aus. Zu Grunde gelegt ist ein Lebensalter von 43—45 Jahren und eine Familie mit 2 Kindern. In diesem Alter bekommt der Veterinärarzt 6172 RM. Gehalt, der nicht vollbeforderte 4949 RM., der Kreissekretär 6372 RM., der Kreisaußschuß-Sekretär 7572 RM., der Lehrer 6272 RM., der Studienrat 8160 RM., der Richter 9660 RM. Da diese Zahlen von einem Spezialisten nachgeprüft sind, dürfte an der Richtigkeit nicht zu zweifeln sein. Ministerialrat Dr. Wiemann betonte, daß bisher nur solche Stellen als vollbeforderte umgewandelt seien, die eine volle Arbeitskraft erforderten. Wegen Zunahme der Beschäftigung würde auch die Zahl der vollbeforderten Stellen sich vermehren. Es sei zweckmäßig, rechtzeitig darüber sich schlüssig zu werden, welche Einnahmen bei allgemeiner Einführung der Vollbefoldung dem Veterinärärzte erwirkt werden sollen. Die Versammlung beschloß folgendes: 1. Der V. b. T. lehnt die allgemeine Vollbefoldung ab. 2. Die Referate von Bach und Beutler werden dem Ministerium als Material eingereicht. 3. Ein Ausschuß wird Vorschläge vorbereiten, welche Einnahmen dem vollbeforderten Veterinärarzt zu sichern sind. Über den gegenwärtigen Stand der Verwaltungsreform sprach Ob.-Reg.-Rat Dr. Zehl. Es sei z. B. die geplante Reform in statu nascendi. Wenn es in Deutschland 80 Minister gäbe, in Frankreich nur 18, in Amerika nur 10 und in Belgien nur 9, so sei es verständlich, wenn die Öffentlichkeit eine Reform fordere. Während Frankreich 911 Abgeordnete hätte, gäbe es in Deutschland 2315! Abgeordnete. Unter diesen Umständen würde es für das Berufsbeamtentum schädlich sein, wenn es sich einer Reform widersetzen wollte. Unsere Aufgabe sei vielmehr, selbst Wege für eine vernünftige Reform zu zeigen. Die Frage, ob Einheitsstaat oder Bundesstaat, berühre uns nicht. Den B. h. V. berühre z. Zt. nur die Reform in Preußen. Für Preußen kämen zwei Vorschläge in Frage. Der erste hätte zum Ziele, die Abschaffung der Regierungen. Die Befugnisse der Regierungspräsidenten würden dann auf die Landräte übergehen (Delegation). Der zweite Vorschlag wolle die Oberpräsidien abschaffen. Da selbst die Minister noch nicht darüber einig seien, ob die große oder die kleine Verwaltungsreform durchzuführen sei, würde für diesen Winter kaum

eine Entscheidung fallen. Um eine beschleunigte Regelung zu ermöglichen, sei die Schaffung eines Ermächtigungsgesetzes in Erwägung gezogen. Der Vortrag wurde mit großem Beifall aufgenommen. Die Vorstandswahl hatte folgendes Ergebnis: Dr. Pante, 1. Vors., Dr. Haan, 2. Vors., Dr. Vossage, Schriftf., Dr. Kassbaum, Kassenführer. Dr. Zehl bleibt Verbindungsmann mit der allgemeinen Beamtenorganisation. Einstimmig wurde zum Ehrenvorsitzenden Oberregierungsrat Dr. Rust ernannt. Vossage.

Reichsverband der Deutschen Gemeindetierärzte.

Hauptversammlung in Karlsruhe vom 11. bis 14. Oktober 1928.

Anwesend über 200 Kollegen. Von dem ersten Teil des überlanten Protokolls ist Abstand genommen worden, da Dr. Heine bereits die Freundlichkeit hatte, in der D. T. W. 1928, Nr. 43, S. 727, eine kurze Übersicht über die Vorträge zu geben. Es folgen hier nur die seitens der Versammlung gefassten Beschlüsse. 1. Neuwahl des Vorstandes: Kollege Hafemann wird einstimmig zum 1. Vors. wiedergewählt und nimmt die Wahl an. Zum 2. Vors. wird der von der Preussengruppe neu zu wählende Preussenvorsitzende bestimmt. Kollege Thomas hat gebeten, von seiner Wiederwahl zum 1. Schriftführer absehen zu wollen, da er den Landesgruppenvorsitz übernommen hat. An seiner Stelle wird der Delegierte des Provinzialvereins „Rheinprovinz“, Stadtbettierarzt Dr. Hessen-Barmen, zum 1. Schriftführer gewählt. Wiedergewählt werden: Dr. Karl-Bamberg zum stellv. Schriftführer, Dr. Brandt-Hannover zum Kassierer und Dr. Schaaf-Berlin zum 2. Beisitzer. Der 1. Beisitzer Kollege Becker-Elberfeld scheidet aus. Der 1. Vors. dankt für seine Mitarbeit. An seiner Stelle wird Kollege Thomas-Meissen zum 1. Beisitzer gewählt. 2. a) Der 1. Vors. berichtet über die ablehnende Antwort des Deutschen Städtetages, auf die Eingabe betreffs Befetzung von Direktorstellen. Es wird beschlossen, eine erneute Eingabe an den Deutschen Städtetag in dieser Angelegenheit zu machen. Es wird eine Kommission gewählt, bestehend aus dem 1. Vors., Koll. Bützler und Schmidt-Dresden, die diese neue Eingabe vorbereiten soll. b) Auf die Eingabe des Reichsverbandes der Deutschen Gemeindetierärzte betreffend Ausbau und Vermehrung der bakteriologischen Untersuchungsämter an den Schlachthöfen Deutschlands ist vom Reichsminister des Innern folgende Antwort eingelaufen: „Die feinerzeit hier übermittelte Denkschrift des Reichsverbandes Deutscher Gemeindetierärzte vom 10. März 1927 ist von mir als Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung der am 27. bis 28. Mai in Meersburg stattgehabten Veterinärkonferenz gesetzt und hier einer eingehenden Beratung unterzogen worden. Der der Eingabe zu Grunde liegende Gedanke, wonach auf jedem Schlachthofe ein bakteriologisches Laboratorium vorhanden sein muß, ist von den Landesregierungen als berechtigt anerkannt worden. Demgemäß werden die Landesregierungen darauf Bedacht nehmen, daß die Schlachthöfe nach Möglichkeit mit den entsprechenden Einrichtungen versehen werden, und werden die beamteten Tierärzte darauf hinweisen, bei den Kontrollen der Schlachthöfe auf die Beschaffung eines Mikroskops und auf Einrichtung eines geeigneten Raumes für einfachere bakteriologische Untersuchungen hinzuwirken. Bei der Beratung der Denkschrift wurde andererseits zum Ausdruck gebracht, daß es nicht angängig sei, jedem Schlachthof, auch wenn er die vorerwähnte Einrichtung besitze, ohne weiteres die bakteriologische Fleischuntersuchung zu übertragen, da diese zu schwierig sei und besondere Vorkenntnisse erfordere. Zur Durchführung der bakteriologischen Fleischuntersuchung kämen nur besonders eingerichtete Laboratorien mit spezialistisch geschultem Personal in Frage, und nur solche Tierärzte seien für diese Untersuchungen zuzulassen, die eine mindestens 3monatige Ausbildung in der bakteriologischen Fleischuntersuchung erhalten haben; es sei aber erwünscht, wenn eine größere Anzahl von Schlachthöfen vorhanden wäre, die die bakteriologische Fleischuntersuchung ausüben könnten.“ Einstimmig wird nach Dank an das Reichsministerium vom R.D.G. folgende Entschliessung gefasst: a) Damit die im Antwortschreiben des Reichsinnenministeriums vom 28. Juli 1927 auf Grund der Beschlüsse der in Meersburg abgehaltenen Veterinärkonferenz aufgestellte Forderung wegen Übertragung der bakteriologischen Untersuchung an die Schlachthoflaboratorien der Städte erfüllt werden kann, ist allgemein dahin zu wirken, daß in Zukunft an den größeren Schlachthöfen nur solche Tierärzte Anstellung finden, die den Nachweis einer mindestens 3monatlichen Spezialausbildung in der Bakteriologie und Serologie erbringen. b) Im Verfolg der in der ge-

nannten Eingabe aufgestellten Richtlinien für die Ausstattung der bakteriologischen Untersuchungsämter an den Schlachthöfen der großen Städte und in Übereinstimmung mit einem auf der Tagung des D.V.R. in Leipzig am 25. Juni 1927 einstimmig gefassten Beschlusse ist Sorge dafür zu tragen, daß in allen größeren Schlachthöfen ein derartiger Ausbau der Veterinär-Untersuchungsämter stattfindet, daß alle bakteriologischen und serologischen Arbeiten dort erledigt werden können. Die Veterinär-Untersuchungsämter sind so zu gestalten, wie die pathologischen Institute (Prosekturen) der Krankenhäuser schon längst eingerichtet sind. c) Der Vorstand des R.D.G. soll gehalten sein, sich nach Ablauf eines Jahres durch Umfrage vom Stand der Durchführung der Maßnahmen zu b) Kenntnis zu verschaffen und je nach Umständen im Verein mit dem zuständigen Schlachthofdirektor das weitere veranlassen. 3. Es wird über eine Eingabe des Provinzialvereins der Rheinprovinz mit folgendem Wortlaut verhandelt: „Auf Grund der Verfügung des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom 23. Mai 1927, Geschäftsnummer V 4511 M.f.L.N. I 46 969 und I M III 1619 ist bei Fleischvergiftungsverdacht das Material vom Kreisarzt an das Medizinaluntersuchungsamt, vom Kreisarzt an das Veterinäruntersuchungsamt (Schlachthof) zu senden. Beide Untersuchungsstellen verständigen sich über die Diagnose und der Kreisarzt bzw. Kreistierarzt ordnet die Beschlagnahme bei Fleischvergiftungen an. Der zuständige, mit den Revisionen betraute Polizeitierarzt erfährt nichts von der Sache, desgleichen erfährt die Schlachthofverwaltung von der Angelegenheit nichts, sie ist nicht im Stande, den Metzgern über das Ergebnis der Untersuchung Auskunft zu geben. Der Verein hält es für unbedingt nötig, daß auch die Schlachthofverwaltung von dem Verlauf und Ergebnis der Untersuchung bei Fleischvergiftungen vom Vet.-Rat in Kenntnis gesetzt wird. Vor allen Dingen müßte es erreicht werden, daß der Vet.-Rat die Schlachthofverwaltung von einer beabsichtigten Revision eines Geschäftes beim vorliegenden Verdacht einer Fleischvergiftung so rechtzeitig Kenntnis gibt, daß ein städt. Tierarzt an dieser Kontrolle teilnehmen kann. Der Verein bittet diese Punkte der Beratung des Reichsverbandes zu unterbreiten und geeignete Schritte bei den zuständigen Ministerialstellen zu unternehmen mit dem Ziele, regierungsseitig eine generelle Regelung bzw. Anordnung zur Hinzuziehung städt. Tierärzte bei Erhebungen in Fleischvergiftungsfällen zu veranlassen.“ Der Reichsverband billigt einstimmig diesen Antrag, da aber die Regelung dieser Fragen Landesache ist, wird beschlossen, die Landesgruppe Preußen zu erfuchen, eine Eingabe in dieser Angelegenheit an das preuß. Landwirtschaftsministerium zu richten, im übrigen aber wird den anderen Landesgruppen empfohlen, wo es nötig ist, im gleichen Sinne an ihre Behörden heranzutreten. 4. Es wird über den Antrag der Gruppe Nordwestdeutschland verhandelt, einen etwa 6tägigen Ausbildungskursus über frische und zubereitete Fische vom R.D.G. oder dem D.V.R. in Bremerhafen abhalten zu lassen. Eine amtliche Unterstützung des Antrages wird gewünscht. Der Antrag findet allseitige Zustimmung, doch wird aus besonderen Gründen, auf die öffentlich nicht näher eingegangen werden kann, beschlossen, in dieser Angelegenheit zunächst eine abwartende Stellung einzunehmen und von weiteren Schritten abzusehen. 5. Beratung über den Antrag: Jäger-Eschwege, vom R.D.G. aus Schritte zu unternehmen, daß das Beiheft zum Formblatt A der Jahresstatistik keine Anwendung auf Schlachthöfe finden soll. Es wird beschlossen, die Landesgruppen zu beauftragen, nach Ablauf eines Jahres über die mit dem Beiheft gemachten Erfahrungen Bericht an den Vorstand des Reichsverbandes zu erstatten und dann erst das Weitere zu unternehmen. 6. Bezüglich des Antrages der Landesgruppe Sachsen, vom D.V.R. oder R.D.G. möchte daraufhin gewirkt werden, daß das amtliche Examen im ganzen Reiche bei Anstellungen einheitlich bewertet werden soll, wird beschlossen, zunächst in dieser Frage keine Schritte bei den Behörden zu unternehmen. Es soll vielmehr auf die mit der Ausschreibung der Stellen betrauten Kollegen in dem Sinne eingewirkt werden, daß dem Verlangen der Sachsen-Gruppe Rechnung getragen wird. 7. Da die Eingabe an den Deutschen Städtetag betr. Entsendung der Direktoren und Stadttierärzte der Schlachthöfe abschlägig beschieden worden ist, mit der Begründung, daß der R.D.G. nach seinen Satzungen nicht allein eine Berufs-, sondern auch eine Standesorganisation sei, die die wirtschaftlichen Belange seiner Mitglieder vertrete, wird in Erwägungen darüber eingetreten, ob eine Statutenänderung, und zwar des § 2 der Satzungen, notwendig und erforderlich sei und zwar in dem Sinne, daß der § 2 nur lauten soll:

Der Reichsverband (R.V.) erstrebt die Förderung der Berufstätigkeit der Deutschen Gemeindetierärzte. Es wird beschlossen, den 1. Vors. zu beauftragen, in dieser Angelegenheit Rücksprache mit dem Deutschen Städtetag zu nehmen und nach dem Ergebnis der Verhandlungen das Weitere zu veranlassen. 8. Die Kasse ist geprüft und für richtig befunden. Einnahmen: 3845,72 RM., Ausgaben: 1874,44 RM., Bestand: 1971,28 RM. Es wird hervorgehoben, daß dieser günstige Kassenbestand nur dadurch möglich geworden ist, daß Vorstands- und Kommissionsitzungen so gut wie überhaupt nicht stattgefunden haben und daß der 1. Vors. fast alle Entscheidungen von sich aus hat treffen müssen. Dem Kassierer wird Entlastung erteilt und der Dank ausgesprochen. Es wird schließlich vom Kassierwart bemerkt, daß der Kassenbestand voll für die Ausgaben der Tagung in Karlsruhe verbraucht wird. 9. Es wird einstimmig beschlossen, für 1928 einen Extrabeitrag von 2,— RM. und für 1929 einen Jahresbeitrag von 6,— RM. zu erheben, da es unmöglich ist, mit der jetzigen Höhe der Beiträge die Geschäftsführung so vorzunehmen, wie es nötig und geboten ist. Die Gruppen werden gebeten, den Extrabeitrag für 1928 möglichst sofort an den Kassierwart abzuführen. 10. Die Provinzialgruppe Sachsen-Anhalt ist gegründet. Vorsitzender ist Schlachthofdirektor Dr. Wulff-Bernburg. Vertreter aus Württemberg geben bekannt, daß die Landesgruppe Württemberg in Kürze als selbständige Gruppe oder als Gruppe Baden-Württemberg gegründet worden sind. Damit ist das Ziel der deutschen Gemeindetierärzte, die Organisation auf alle Teile des Reiches auszudehnen, verwirklicht. 11. Als nächster Tagungsort wird Danzig gewählt gegen Breslau. Danzig erhielt 13, Breslau 7 Stimmen. Die Tagung findet voraussichtlich in der zweiten Hälfte des August statt.

Dr. Hafemann.

Dr. Thomas.

Fortbildungskursus für praktische Tierärzte in Leipzig.*)

Freitag, den 19. bis Sonntag, den 21. Oktober 1928.

Welch reges Interesse von Seiten der Praktiker auch diesem Kursus entgegen gebracht wurde, beweist die stattliche Zahl von 98 Teilnehmern. In der Auswahl der Vortragsgegenstände war dem Wunsche der Praktiker entsprochen worden. Aus dem Gebiete der Geburtshilfe führte Prof. Dr. Richter nach eingehender Besprechung der Epiduralnarkose, ihrer Indikation und Wirkung und folgender Ausführung derselben an mehreren Rindern der Geburtshilflichen Tierklinik die neueren Methoden der Embryotomie vor. Bei der Zerlegung je eines Kalbes nach der Stüvenschen Methode mit dem Rhachifor und Pelviklast, mit dem Vakufakt nach Becker-Schöttler und mit dem durch Liess modifizierten Drahtfäße-Embryotom nach Thygesen wurde den Kollegen Gelegenheit geboten, sich selbst von der Wirksamkeit der neuen tierärztlichen Geburtsinstrumente, in Sonderheit der neuzeitlichen Embryotomie-Instrumente zu überzeugen. Daß die Methode nach Thygesen wegen ihrer erstaunlichen Einfachheit und vielfachen Anwendungsmöglichkeit einen bedeutenden Fortschritt und zugleich eine große Vereinfachung der Fruchtzerstückelung bedeutet, war aus den Vorführungen klar zu erkennen. — Prof. Dr. Reinhardt besprach zunächst die Chemotherapie der Euterentzündungen und gab einen kritischen Überblick über die zur Anwendung kommenden Mittel, sowie über die Heilungsmöglichkeiten der chemotherapeutischen Behandlung. Hierauf wurden die neuesten Leberegelmittel, Vergiftungen durch dieselben und ihre Verhütung erörtert. Weiterhin machte der Vortragende auf verschiedene Ekzeme und Räudemittel, wie Pinal, Odylen, Perlacar aufmerksam. Bei hochgradigen Juckreiz empfahl er Bromostronsturan. Als beste, billigste und einfachste Bandwurmkur beim Hund wurde die stomachikale Einverleibung von Arecolin in wässriger Lösung genannt. Der Vortragende empfahl im übrigen vorsichtige Auswahl und kritisches Prüfen bei der Anschaffung neuer Arzneimittel. — Was der praktische Tierarzt von der Milchkontrolle wissen muß, darüber verbreitete sich Professor Dr. Klimmer. Nach kurzer Beleuchtung des Wertes der Milch als Nahrungsmittel und der wirtschaftlichen Bedeutung der Milcherzeugungen ging der Vortragende auf die Milchkontrolle selbst ein. Sie dürfe sich nicht nur auf die Laboratoriumskontrolle erstrecken, sondern müsse im Kuhstall beginnen. Ihre Aufgabe sei die Überwachung der Gesundheit der Milchtiere und des Personals, der Fütterung und Haltung der Tiere, der Milchgewinnung und der weiteren Be-

handlung der gewonnenen Milch. Die Fütterung der Tiere sei von großem Einfluß auf die Milchqualität. Fütterung besonders von Heu, unmittelbar vor dem Melken sei zu unterlassen wegen der Gefahr der Toxinbildung der in dem Heu befindlichen, die Milch peptonisierenden Bakterien. Was die Haltung der Milchtiere anbetrifft, so sei in erster Linie für Licht und Luft zu sorgen, wenn man eine vitaminreiche Milch erzielen will. Bei Überwachung der Milchgewinnung sei besonders auf die Sauberkeit des Melkpersonals zu achten, aber auch die Melkgeräte seien zu kontrollieren. Die Form der Melkeimer ist von Wichtigkeit. Melkmaschinen ermöglichen eine saubere Milchgewinnung. Der Vortragende kam dann auf das Molkereiwesen und den Milchhandel zu sprechen, schilderte schließlich den Gang der Milchkontrolle im Laboratorium und beendete seine Ausführungen mit einem kurzen Hinweis auf die Kosten der Milchkontrolle. — Ausgewählte Kapitel aus der Pathologie und pathologisch-anatomische Demonstrationen mit besonderer Berücksichtigung der Fleischbeschau. Prof. Dr. Nieberle behandelte zunächst die neuesten Ergebnisse auf dem Gebiete der Tuberkuloseforschung, befaßte sich dann eingehend mit dem pathologisch-anatomischen Krankheitsbild bei Paratyphus, Schweinepest, Milzbrand, Lymphadenose und anderen Krankheiten, wobei er seine Ausführungen durch Demonstration zahlreicher Präparate und gefärbter Schnitte wirkungsvoll ergänzte. — Prof. Dr. Schmidt berichtete über den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse über die periodische Augenentzündung. Er betonte, daß die Forschung neue Ergebnisse nicht gezeitigt hätte. Der Redner erörterte dann die Ätiologie, Pathologie und Therapie der periodischen Augenentzündung und machte die Hörer dabei mit der Literatur, insbesondere den Ansichten Jakobs bekannt. Den Jodpräparaten sei in der Behandlung eine bevorzugte Stellung einzuräumen. Vererbung des Leidens sei nicht erwiesen. — Über Eutererkrankungen und deren Einfluß auf die Beschaffenheit der Milch sprach Prof. Dr. Richter. Der Redner hatte die gegenwärtig sich immer mehr ausbreitende und daher wirtschaftlich sehr bedeutsame Streptokokken-Mastitis in den Vordergrund seiner Darlegungen gestellt und legte seinen Ausführungen seine eigenen Erfahrungen, sowie das reiche in der ihm unterstehenden Geburtshilflichen Klinik seit Jahren gesammelte Material zugrunde. Er ging zunächst auf die klinische Feststellung der Erkrankung aus Euterbefund und Sekretbeschaffenheit ein. Geschmacksprobe und Sedimentierung unterstützen die Diagnose, doch empfiehlt es sich, diese durch bakteriologische Untersuchung zu sichern. Von den gebräuchlichsten chemo-therapeutischen Mitteln Parenchymatol, Rivanol, Uberasan und Selektan übertreffe das ziemlich teure Uberasan die anderen an Wirksamkeit, doch sei wegen seiner verhältnismäßigen Billigkeit bei Massenapplikation dem Rivanol der Vorzug zu geben. Der Vortragende verspricht sich weiter von öfterem gründlichen Ausmelken günstige Erfolge und empfahl auch die Impfung der leicht-erkrankten und neuangestellten Rinder mit stallspezifischen Vakzinen. 50 Prozent der Fälle von Streptokokken-Mastitis seien heilbar. Es folgten Hinweise auf die Bedeutung der Euterfurunkulose, deren Auftreten und Behandlung (Wärme, Herde ausreifen lassen, Vorsicht bei chirurgischen Eingriffen zur Verhütung von Metastasenbildung). Redner berührte zum Schluß die metastatische Euterentzündung von der Gebärmutter und dem Darms aus und machte darauf aufmerksam, daß umgekehrt auch vom kranken Euter aus Metastasen und zwar zumeist in den Sprunggelenken auftreten können, wobei der Bacillus pyogenes eine besondere Rolle spielt. — Die Vortragsreihe schloß Professor Dr. Haupt mit seinen Ausführungen über Jungtier-Krankheiten beim Geflügel. Er wandte sich zunächst der Kükenruhr (Gallinarum-Bazilliose) zu und schilderte das klinische und pathologisch-anatomische Bild dieser Erkrankung, welches nach Ansicht des Vortragenden eine sichere Diagnose nicht gestattet. Diese sei vielmehr durch Agglutination zu erlangen. Die Kükenruhr gilt als unheilbar. Ihre Bekämpfung gestaltet sich sehr schwierig, da die erkrankten Tiere Bazillenträger sind und auch die Keimdrüsen betroffen werden. Rücksichtsloses Ausmerzen der durch die Blutuntersuchung ermittelten Tiere sei zu empfehlen. Als Darmdesinfizienz könne Ventrase, evtl. auch Chinosol verabreicht werden. Es folgten Ausführungen über die Geflügel-Kokzidiose, ihre Erkennung und Behandlung. Auch hier gestaltete sich die Bekämpfung nicht leicht und beschränkte sich in der Hauptsache auf öfteren (24stündigen) Ortswechsel. Angeraten werden ferner Austrocknung der Plätze, Gefrierenlassen, Übergießen mit kochendem Wasser, Drahtnetze, um Futterbeschmutzung zu vermeiden. Innerlich sei u. a.

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 40, S. 682 und 746.


Buttermilch zu verabreichen. Der Vortragende behandelte dann in kurzen Zügen die Geflügeltuberkulose. Die Feststellung der erkrankten Tiere geschehe am besten durch die Tuberkulinisierung (Kehllappenprobe). Die ermittelten kranken Tiere sind abzufondern bzw. abzuschlachten. Ställe und Boden im Freien sind gut zu desinfizieren, was bei ersterem leicht möglich, bei letzterem aber schwer ausführbar sei und durch Abtragen der obersten Bodenschicht zu geschehen habe. Auch bei Geflügeltuberkulose ist neben öfterer Tuberkulinisierung des ganzen Bestandes häufiger Ortswechsel zu empfehlen. Zum Schlusse kam der Vortragende auf die Ektoparasiten beim Geflügel zu sprechen, von welchen nur den Vogelmilben und den Hühnerläusen eine größere Bedeutung zukommt. Haupt empfiehlt, die befallenen Tiere an warmen Tagen in 0,5prozentiger wässriger Natriumfluorit-Lösung 40 Sekunden lang zu baden, was die Tiere ohne Schaden vertragen sollen. — Der Sonnabend Abend vereinte die Vortragenden und die Kurfesteilnehmer im Sachsenhof zu einem gemütlichen Beisammensein, wobei der Dekan der Vet.-med. Fakultät Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. Klimmer die Erschienenen herzlichst begrüßte und Kollege Dr. Hänsel-Bautzen den Veranstalter den Dank der Praktiker aussprach. — Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der Fortbildungskursus für praktische Tierärzte in Leipzig den Teilnehmern hohen wissenschaftlichen Gewinn und manche wertvolle Anregung für die Praxis und Fleischbeschau gebracht hat.

Sch.

Verschiedene Mitteilungen.

Schmitt †.

Am Nachmittag des 3. November 1928 starb in München der Vorstand der medizinischen Tierklinik o. ö. Universitätsprofessor Dr. Franz Schmitt. Am Vormittag sprachen ihn noch eine Reihe seiner Kollegen — darunter auch der Schreiber dieser Zeilen — oder sahen ihn wenigstens, als er in früher Morgenstunde seinen gewohnten Weg über den Institutshof zu den Hundestallungen ging. Einem kurzen Übelsein,



Dr. Franz Schmitt

daß ihn um 11 Uhr vormittags befiel, folgte ein rascher Tod, zum tiefsten Schmerz für seine Angehörigen, darunter seine lieben drei unmündigen Mädchen und seiner Schwägerin, die nach dem Tode seiner Gattin für ihn und die Kinder treu geforgt hat, sowie seiner Freunde und Kollegen. Am 6. November wurde er unter großer Anteilnahme feuerbestattet, wobei der Prorektor der Universität, Geheimrat Schüpfer, der Dekan der Tierärztlichen Fakultät, Prof. Paechter, sein langjähriger Mitarbeiter, Privatdozent Dr. Stettner, die Vertreter der Studentenschaft und besonders der Vertreter seines Korps Suevo-Salingia tief empfundene und die Trauerverammlung tief bewegende Worte sprachen. Schmitt war am 19. November 1868 in Ladenburg in Baden geboren, studierte 1887—1891 an der Tierärzt-

lichen Hochschule in Stuttgart, kam als Städtischer Tierarzt an den Münchener Schlachthof, wo er bis Frühjahr 1897 tätig war. Hier erwuchs sein Wunsch, sich den Wissenschaften zu widmen, und das Angebot Boveri's, einer Assistentenstelle am zoologischen Institut in Würzburg, war ihm höchst willkommen. Mit einer Arbeit über „Systematische Darstellung der Doppelbembryonen der Salmoniden“ promovierte er 1901 in Würzburg mit „summa cum laude“. Drei Jahre später wurde er als Direktor des Gesundheitsamtes der Landwirtschaftskammer für die Provinz Pommern berufen. 1911 erhielt er als erster Tierarzt in Preußen den Titel Professor. 1912 kehrte er als Professor für spezielle Pathologie und Therapie nach München zurück und wurde im Jahre 1914 bei der Angliederung der Tierärztlichen Hochschule an die Universität o. ö. Universitätsprofessor. Schmitt war ein bedeutender Forscher und von seinen vielen Arbeiten seien nur erwähnt die über die Rindertuberkulose, Raufchbrand, Hämoglobinurie der Rinder, seuchenhaftes Kälbersterben, Trypanosomenkrankheiten, Dämpfung der Pferde usw. Schmitt war ein begeisterter und begeisternder Lehrer, stets bemüht, die Jugend zu tüchtigen praktischen Tierärzten heranzubilden. Schmitt war ein edler Mensch mit einem goldenen Herzen, treu besorgt für seine Kinder, liebevoll gegen die studierende Jugend, vornehm und hilfsbereit gegen seine Kollegen, eifrig bemüht für das Wohl und Ansehen des tierärztlichen Standes. Schmitt liebte sein Vaterland und die Not des Vaterlandes bewegte ihn tief. So ist die Zahl derer, die ihm Liebe und Treue über den Tod hinaus bewahren, groß.

J.

Geheimer Studienrat Prof. Dr. med. vet. h. c. Haeseler †.

Am 15. November 1928 verchied im 75. Lebensjahre Geheimer Studienrat Prof. Dr. Otto Haeseler. Der Verstorbene hat vom Jahre 1890 bis 1924 als Dozent für Physik an der Tierärztlichen Hochschule Hannover gelehrt, geachtet und hochverehrt von seinen Kollegen und Schülern. Die Hochschule wird ihrem dahingegangenen Ehrendoktor allezeit ein treues Gedenken bewahren.

Akademische Nachrichten.

Der Dozent für Land- und Volkswirtschaft an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Landwirtschaftsrat Dr. phil. Engberding, hält am Donnerstag, den 29. November 1928, 18 Uhr, in der Aula seine öffentliche Antrittsvorlesung über das Thema „Betriebswirtschaftliche Grundlagen der Tierhaltung in der Landwirtschaft“.

Mehr „Normung“ in der wissenschaftlichen Literatur!

Ein Notschrei.

Von Prof. Dankwortt-Hannover.

Auf zahlreichen Gebieten sucht man eine „Normung“ vorzunehmen, um Zeit, Geld und Energie zu sparen. Energieverschwendung ist schlimmer als Diebstahl. Denn durch Diebstahl schädigt man nur die Anderen, durch Energieverschwendung aber sich selbst. Auch Geistes-Arbeiter können sehr viel Energie sparen, wenn sie sich in ihren literarischen Produkten einer gewissen Normung fügen. Davon hätten dann alle diejenigen ebenfalls Vorteil, die die Arbeiten oder wenigstens die Titel zu referieren, katalogisieren oder in Kartothekform zu bringen haben.

Befonders in medizinischen Zeitschriften ist man noch weit von einer „Normung“ entfernt. Vor geraumer Zeit haben deshalb 90 hervorragende Gelehrte eine Denkschrift über die mit dem Anwachsen der wissenschaftlichen Zeitschriften-Literatur verbundenen Übelstände ausgearbeitet, die von den in Frage kommenden medizinischen und chemischen Zeitschriften ernste Beachtung finden sollte. Es soll hier nicht über die Richtlinien für die Aufnahme von Arbeiten gesprochen werden, denn dies muß den Schriftleitungen überlassen bleiben. Aber was alle diejenigen angeht, die die wissenschaftlichen Arbeiten lesen und verarbeiten müssen, so können und müssen sie eine gewisse Einheitlichkeit, eine „Normung“ in dem äußeren Aufbau und in seinen Literaturangaben verlangen.

Ob es Zweck hat, eine bestimmte Arbeit zu lesen oder für ein Spezialfach zu referieren, läßt sich aus dem Titel, der nicht zu lang sein sollte, nicht immer entnehmen. Befonders sollte man allgemein gehaltene Titel, wie z. B.: „Kurze Mitteilung aus der Praxis“, mit dem beim Referieren überhaupt nichts anzufangen ist, vermeiden. In technischen Zeitschriften ist man dazu übergegangen, unter dem Titel in

kurzen Stichworten einen Vorbericht zu geben, wie folgendes Beispiel aus der Zeitschrift „Die chemische Fabrik“ zeigt:

Porenweite und Wirkungsweise der Berkefeldfilter.

Von Dr. H. Hoek, Celle.

Vorblick: Die nachfolgende Abhandlung behandelt die Frage, ob die bakterienzurückhaltende Kraft der Berkefeldfilter hauptsächlich auf Siebwirkung oder auf Adsorption beruht.

Hier weiß man sofort, ob man sich die Mühe nehmen muß, die Arbeit zu lesen oder nicht. So lange dieser nützliche Vorschlag nicht allgemein durchgeführt ist, sollte jeder Arbeit am Schlusse eine kurze Zusammenfassung, die eine Druckseite nicht übersteigen sollte, der wesentlichen Ergebnisse angefügt werden. Auch beim Lesen solcher Zusammenfassung läßt es sich meist beurteilen, ob man die Mühe und Zeit aufwenden soll, die gesamte Arbeit durcharbeiten.

Daß die Darstellung in fehlerfreiem Deutsch gehalten sein soll, erscheint selbstverständlich. Wie oft wird aber gerade in wissenschaftlichen Abhandlungen gegen unsere geliebte Muttersprache gefündigt. In der Zeitschrift für angewandte Chemie veröffentlicht E. O. v. Lippmann in regelmäßigen Abständen eine Zusammenstellung von Sätzen mit fehlerhaftem Deutsch, betitelt: „Stil in deutschen chemischen Zeitschriften.“ Auch Mediziner können aus solch einem „Spiegel“ lernen.

Was die Rechtschreibung anbetrifft, so hat sich seit mehr als zwanzig Jahren in wissenschaftlichen Kreisen ein lebhaft empfundenes Bedürfnis nach einheitlichen Grundsätzen bemerkbar gemacht. Unter Mitwirkung von Fachmännern wurde 1907, bearbeitet von Dr. Hubert Jansen¹⁾ eine „Rechtschreibung der naturwissenschaftlichen und technischen Fremdwörter“ herausgegeben. Wie eingetrostet alte Gewohnheiten sitzen, sieht man daraus, daß es die Bearbeiter des neuen Deutschen Arzneibuches nicht fertig bekommen haben, eine einheitliche Rechtschreibung anzuwenden.

Zu einem guten Deutsch gehört es auch, die lateinische Nomenklatur, die auf Rezeptformularen ihre Berechtigung hat, fortzulassen. Ebenfalls sollten chemische Formeln im Text an Stelle der Namen gebraucht werden. Man schreibe also nicht: „Es wurde Cuprum sulfuricum bis zur Blaufärbung zugesetzt“ oder noch schlimmer „Es wurde CuSO₄ bis zur Blaufärbung zugesetzt“, sondern man schreibt: „Es wurde Kupferulfat zugesetzt . . .“ Auch das bekannte Aqua destillata sollte endlich durch das deutsche destillierte Wasser ersetzt werden.

Wenigen ist es auch bekannt, daß für die Gewichte und Maße vom früheren Bundesrat ganz bestimmte Abkürzungen festgesetzt wurden, nach denen man sich doch nun endlich richten sollte. Kilogramm wird abgekürzt in kg, Gramm in g, Kubikzentimeter in ccm, Millimeter in mm und zwar ohne Punkt. Es muß also geschrieben werden: „Es wurden 5 g Kupferulfat zugesetzt“.

Ganz schlimm, wirklich ganz schlimm steht es aber in den medizinischen, auch in den veterinär-medizinischen Zeitschriften und Dissertationen mit den Literaturangaben. In der oben erwähnten Denkschrift ist auch hierauf wieder hingewiesen. Wieviel Zeit und Mühe und Ärger bliebe uns erspart, wenn endlich alle Autoren sich diesen vorgeschriebenen „Normen“ angeschlossen. **Literaturangaben bei Zeitschriftenaufsätzen sind ohne Titel mit Band, Seite und Jahreszahl, bei Büchern mit dem Titel anzugeben.** Es scheint leider notwendig, dies näher zu erläutern. Wenn ich die Arbeit von H. Mießner über „Paratyphus und Paratyphenterie“ erwähnen will, so habe ich als Literaturangabe unter Weglassung des Titels hinzuzufügen:

Dtsch. Tierärztl. Wschr. 35, 149 (1927).

Will ich eine Stelle aus einem Buch anführen, z. B. was P. Henckels über die Wirkung der Dakin-Lösung gesagt hat, so lautet die Angabe:

Die Chirurgie des Tierarztes, Paul Parey, Berlin 1928.

Also Verlag und Verlagsjahr oder Auflage nicht vergessen. Die Band-Zahl soll fett gedruckt werden (im Manuskript unterstrichen), die Jahreszahl soll in runden Klammern gesetzt werden. Die Reihenfolge: Bandzahl, Seitenzahl, Jahreszahl muß immer dieselbe bleiben. Auf diese Weise ist jeder weitere Zusatz unnötig. Man braucht nicht Bd. für Band oder Jg. für Jahrgang zu schreiben, man braucht nicht zur Seitenzahl S. oder das ganz entsetzliche „pag“ zuzusetzen. Dadurch, daß die Jahreszahl in Klammer kommt, kann sie mit der Seitenzahl nicht verwechselt werden.

Es ist auch eine andere Art der Literaturangaben vorgeschlagen worden. Die Vereinigung der Deutschen Medizinischen Fachpresse hat im ein Verzeichnis und Titelabkürzungen der wichtigsten Zeitschriften der Verlage von Springer-Berlin, unter dem Namen „Periodica medica“²⁾ Medizin und ihrer Grenzgebiete erscheinen lassen, worin Angaben von Band, Seitenzahl und Jahreszahl gemacht werden. Es heißt dort: Statt der Ordnungszahl eines Jahrganges steht die ebenfalls fett zu druckende Jahreszahl, wenn das Erscheinungsjahr des Jahrganges mit dem Kalenderjahr zusammenfällt, also „Dtsch. med. Wschr. 1927“ statt „Dtsch. med. Wschr. 53“. Zerfällt ein Jahrgang in zwei oder mehrere Teile, so werden ohne Trennungszeichen fett gedruckte römische Zahlen hinzugefügt, also „Münch. med. Wschr. 1926 II“. — Es ist richtig, daß bei manchen Zeitschriften die Jahreszahl schon deshalb an dieser Stelle angeführt werden muß, weil eine Bezeichnung der Jahrgänge mit Ordnungszahlen nicht vorgesehen ist, aber das ist wohl nur eine sehr geringe Zahl. Bei der Durchsicht der verschiedensten Zeitschriften medizinischer, landwirtschaftlicher und chemischer Art findet man, daß bei streng wissenschaftlichen Arbeiten meist die oben angegebene Reihenfolge: Band, Seitenzahl und Jahreszahl in Klammern bevorzugt wird. Wenn man nur die unnützen Zusätze wie Bd. Jg. S. und anderes weglassen wollte.

Ganz unnötig ist auf diese Weise auch die Nummer des Heftes. Leider wollen viele Zeitschriften bei ihren Referaten nicht von der Angabe der Heftnummer abgehen. Wenn die Seitenzahl dabei noch mitgeteilt würde, dann wäre es noch zu ertragen. — Bei manchen Zeitschriften ist die Angabe des Heftes widersinnig, wie z. B. bei dem Archiv für wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde, bei der Zeitschrift für klinische Medizin, bei der Zeitschrift für physiologische Chemie und vielen anderen, bei denen nach dem Einbinden die Heftnummer überhaupt nicht wiederzufinden ist. Und wenn die Deutsche tierärztliche Wochenschrift eingebunden ist, ist es da nicht leichter, eine bestimmte Seite zu finden, als erst die Heftnummer herauszufinden und dann die Arbeit in diesem Heft durch Umblättern von mehreren Seiten zu finden? Wirtschaft, Horatio! auch in wissenschaftlichen Dingen. Ganz streng wird auf die richtige Angabe von Literaturangaben in den meisten chemischen Zeitschriften geachtet. Man nehme sich daran ein Beispiel. So wie dort das Referatenblatt, das „Chemische Zentralblatt“, vorbildlich für alle Literaturangaben ist, so sollte es für die Veterinärmedizin der „Ellenberger-Schütz“ sein. In gewisser Weise haben sich die Herausgeber dieses Werkes den vorgeschriebenen Normen angepaßt, es könnte nur als völlig unnötig die Erwähnung des Heftes oder der Nummer fortfallen, ebenso wie die Zusätze wie Jg. Bd. und S. Was könnte dadurch an Platz gespart werden!

Wenn sich nun alle Autoren daran gewöhnen, Literaturangaben in der vorgeschriebenen Weise (Bandzahl, Seitenzahl und Jahreszahl in Klammern) zu machen, dann müssen auch die Zeitschriften selber dazu beitragen, daß man alle drei Zahlen auf jeder Seite der Zeitschrift vor Augen hat. Bei der Zeitschrift für angewandte Chemie und der Zeitschrift für Untersuchung der Lebensmittel ist dies in vorbildlicher Weise dadurch erreicht, daß sich oben auf jeder Seite auf der Innenseite der Vermerk findet: Zeitschr. f. Unterfuch. der Lebensmittel 53. Band, März 1927 und auf der Außenseite jeweils die Seitennummer. Man braucht also beim Lesen einer Arbeit nicht zu blättern, sondern hat alle drei für die Literaturangabe nötigen Zahlen sofort vor Augen. Wie steht es damit bei den veterinärmedizinischen Zeitschriften? Die Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene bringt nur die Seitenzahl, die Münchener Tierärztliche Wochenschrift, die Berliner Tierärztliche Wochenschrift, die Deutsche Tierärztliche Wochenschrift und die Tierärztliche Rundschau bringen außer der Seitenzahl auch das Datum der Herausgabe des Heftes, es fehlt aber die Zahl des Bandes oder des Jahrganges. Will man diese nachschlagen, so ist man bei der Tierärztlichen Rundschau sehr enttäuscht, weil diese auf ihrem äußeren Titelblatt die Zahl des Jahrganges überhaupt nicht erwähnt. Man muß schon mehrere Seiten weiterblättern, um es zu erfahren. Was bringt das alles für Zeitverlust!

Schließlich könnten sich die Autoren auch in den Titelabkürzungen der wichtigsten Zeitschriften einer gewissen „Normung“ unterwerfen. Die vorhin erwähnte „Periodica medica“ bringt eine Zusammenstellung solcher Titelabkürzungen. Jeder, der medizinische wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, sollte sich diese kleine Druckschrift kommen lassen und danach handeln. Auch für Chemiker existiert ein „Ver-

¹⁾ Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung.

zeichnis der im chemischen Zentralblatt referierten Zeitschriften mit Angabe der dazu gehörigen Druckabkürzungen“. Nur wenn einheitlich abgekürzt wird, können Verwechslungen vermieden werden. Andererseits ist es nicht empfehlenswert, daß in einer zum Druck bestimmten Arbeit allzu starke Abkürzungen gebraucht werden, da sie sonst in dieser Form auch in ausländische Zeitschriften übergehen können und dann nicht verstanden werden, also es darf nicht heißen „D. T. W.“, sondern „Dtsch. tierärztl. Wschr.“ Wer sich als Autor nicht danach richtet, schädigt sich selbst, weil jedem, der dem Gebiete fern steht, die Angaben unverständlich bleiben.

Was in den vorliegenden Zeilen angeregt werden sollte, ist nicht der Ausfluß eines pedantischen Gemütes, sondern es ist der Notchrei eines Vielbeschäftigten, der sich nicht auf das Durchlesen der fein allerfeinsten Arbeitsgebiete betreffenden Veröffentlichungen beschränken kann, sondern auch die Grenzgebiete berücksichtigen muß. Bei der sich noch vergrößernden Zahl der zu verfolgenden Zeitschriften wird aber unsere Zeit gar zu sehr in Anspruch genommen, so daß es verlangt werden muß, hier eine Erleichterung eintreten zu lassen. Es geht alle an, die wissenschaftlich weiter kommen wollen. Darum sollte jeder an seinem Teil mithelfen an der so notwendigen Normung in der wissenschaftlichen Literatur.

9. wissenschaftlicher Referierabend an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Montag, den 3. Dezember 1928, 20,15 Uhr. Hörsaal des anatomisch-pathologischen Instituts. Prof. Dr. Opperman: „Organotherapie“.

Tierärztlicher Zentralverein für die Provinz Sachsen, Thüringen und Anhalt.

94. Generalversammlung Sonntag, den 2. Dezember d. Js., 10,45 Uhr vormittags in Magdeburg, Hotel „Stadt Prag“, Bärfstraße 1/2. 1. Geschäftliches; 2. Vet.-Rat Gundelach-Magdeburg: Die Fliegenplage und das Bekämpfungsmittel Flit; 3. Privatdozent Dr. Schmidt-Hoensdorf und Dr. Wilhelm Schmidt-Halle: Milchhygiene und ansteckende Euterentzündungen des Rindes mit Vorweisungen; 4. chirurgische und andere Fragen aus der Praxis. Eingeleitet von Dr. Wulfsberg, Leiter der Universitäts-Tierklinik Halle (Saale). Die Sitzung findet gemeinsam mit dem Verein anhaltinischer Tierärzte statt. Nach Schluß der Versammlung um 2½ Uhr gemeinsames Essen, Gedeck RM. 4,— (kein Weinzwang). Anmeldungen zur Teilnahme am Essen an Vet.-Rat Gundelach, Magdeburg; Sternstraße 21, bis zum 29 d. Mts. erbeten. Gäste willkommen.

H. Raebiger, Vors. W. Schmidt, Schriftf.

Deutscher Veterinäroffizierbund.

Bundestag am Freitag, den 4. Januar 1929, nachmittags 5 Uhr, im Hörsaal des Heeres-Veterinär-Untersuchungsamtes, Berlin, Hannoverische Straße 27. 1. Jahresbericht; 2. Kassenbericht; 3. Kassenprüfung; 4. Entlastung des Vorstandes; 5. Festsetzen des Haushaltsplanes für 1929; 6. Festsetzen des Mitgliederbeitrages für 1929; 7. Anträge. — Anträge sind gemäß § 12 der Satzungen 14 Tage vor der Tagung des Bundes — also bis zum 20. Dezember 1928 — der Geschäftsstelle des D.V.O.B., Charlottenburg 2, Kantstraße 150a einzureichen. Am Schlusse des Bundestages findet eine Gedenkfeier des 10jährigen Bestehens des D.V.O.B. statt. Um zahlreiches Erscheinen der Mitglieder wird gebeten.

Der Vorstand des D.V.O.B. (E. V.).

Wöhler, 1. Vors. Dr. Meyer, 1. Schriftf.

25. Fortbildungskursus des D.V.R. am 1. und 2. Dezember 1928 in Regensburg.

Sonnabend, den 1. Dezbr., 10 Uhr: Vet.-Med.-Rat Dr. Drescher-Oberfleißheim: „Bekämpfung der Maul- und Klauenfeuche durch Ringimpfung“. 11 Uhr: Prof. Dr. Stang-Berlin: „Neuzeitliche Fütterung“. 14 Uhr: Prof. Dr. Ernst-München: „Euterkrankheiten und ihre Therapie, ihre milchhygienische und wirtschaftliche Bedeutung“. 15 Uhr: Prof. Dr. Stoss-München: „Neues auf dem Gebiete der Geburts-hilfe“ (mit Demonstrationen). Anschließend Besprechung.

Sonntag, den 2. Dezember, 9 Uhr: Prof. Dr. Stoss-München: „Unfruchtbarkeit, Eierstocksuntersuchungen und klinische Trächtigkeitsdiagnose“ (mit Demonstrationen). 11 Uhr: Ministerialrat Dr. Niklas-München: „Tagesfragen aus dem Gebiete der Tierzucht“. 12 Uhr:

Prof. Dr. Ernst-München: „Seuchenhaftes Verwerfen beim Rind und seine Bekämpfung“. Anschließend Besprechung. — Die Vorträge finden im Physikaal der Hochschule, die Demonstrationen auf dem Schlachthofe statt. Die Teilnehmergebühr beträgt für beide Tage 10 Mark. Anmeldungen mit Anschrift des Abfinders und Angabe über gewünschte Quartiere sind zu richten an: Dr. Gätjen, Regensburg, Malergasse 2/3. Stang.

Bücherbesprechungen

Bostroem, E.: Der Krebs des Menschen. 176 S. Leipzig 1928.

Verlag G. Thieme. Preis kart. Mk. 12,—.

Verf. legt in der vorliegenden Arbeit die Ergebnisse seiner jahrelangen Studien über die Morphogenese des menschlichen Krebses nieder. Er warnt vor der Überschätzung der experimentellen Geschwulstforschung und der anstandslosen Übertragung der bei dem biologisch grundsätzlich verschiedenen verimpfbaren Tierkrebs gewonnenen Ergebnisse auf den Krebs des Menschen. Nach kritischer Würdigung der verschiedenen Anschauungen wird die Zelle des Krebsgewebes als eine Körperzelle und demnach nichts Körperfremdes angesehen. Da das physiologische Wachstum sich in nichts von dem pathologischen und infolgedessen auch nicht von dem Geschwulstwachstum unterscheidet, muß das Muttergewebe für das physiologische Gewebe und die Neubildung das gleiche sein. Er weist auf die irrtümliche Hypothese von der unbegrenzten Teilungs-, Vermehrungs- und Wachstumsfähigkeit der epithelialen Körperzellen bei der Krebsbildung hin und stellt das Krebsproblem auf eine gesicherte morphologische Grundlage. Nach seiner Ansicht ist das Krebswachstum als ein Symptom einer Allgemeinerkrankung des Körpers aufzufassen, wodurch auch eine rationelle, wissenschaftlich begründete Behandlung des Krebses in den Kreis der Möglichkeit gerückt erscheint. Lund.

Hanspach: Die Bedeutung der Trichinose für die öffentliche Gesundheitspflege. Veröffentl. a. d. Gebiete d. Medizinalverwaltung Bd. XXVII. Heft 5. Berlin 1928. Verlag R. Schoetz. Preis broschiert Mk. 6,60.

In der lebenswerten Abhandlung bringt Verf. zunächst nach einigen geschichtlichen Vorbemerkungen einen kurzen Überblick über die Naturgeschichte der Trichine, das Wesen und den Verlauf der Krankheit bei Mensch und Tier. Hieran schließen sich eingehendere Betrachtungen über die Zahl, Gefährlichkeit und Ursache der bereits vorgekommenen Trichinosen sowie ihre Bekämpfungs- und Verhütungsmaßnahmen. Trotz der Einführung wirksamer Vorbeugungsmaßnahmen hat die Trichinose noch nicht jede Bedeutung für die öffentliche Gesundheitspflege verloren. Infolgedessen wird die obligatorische Ausdehnung der Trichinenschau in ganz Deutschland für alle Schlachtungen und auf alle für die Trichinenübertragung noch in Betracht kommenden Tiere gefordert. Weiterhin soll zur Erzielung eines vollen Erfolges die Rattenbekämpfung unter Zuhilfenahme der modernsten und bewährtesten Mittel gleichzeitig im ganzen Lande durchgeführt und die Anzeigepflicht für die menschlichen Trichinoseerkrankungen in ganz Deutschland eingeführt werden. Den Abschluß der Abhandlung bildet ein vollständiges, 375 Nummern umfassendes Literaturverzeichnis. Lund.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Polizeitierarzt Dr. Winkel in Liegnitz zum Vet.-Rat unter Übertragung der Veterinärstelle des Kreises Liegnitz; Vet.-Rat Dr. Metzger in Säckingen zum technischen Leiter des Verbandes der Vorderwälderzüchtergenossenschaften.

Übertragen: Tierarzt Dr. Müller aus Niesky (Bez. Liegnitz) die kommissarische Verwaltung der Veterinärstelle in Tönning (Bezirk Schleswig).

Approbiert in Berlin: Egon Gruschke aus Königlich Gräditz, Heinrich Brettner aus Berlin, Carl Heinz Wolf aus Gravenstein.

Verstorben: stud. med. vet. Hans Meyer aus Hannover-Döhren; Geheimer Studienrat Prof. Dr. med. vet. h. c. Haeseler.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inserenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 48.

Ausgegeben am 1. Dezember 1928.

36. Jahrgang.

(Aus dem Tierärztlichen Institut der Universität Göttingen. — Direktor: Prof. Dr. Schermer.)

Über das Vorkommen von Blutgruppen bei unseren Haustieren.


(Mit 1 Abbildung.)

Von S. Schermer.

Die Blutgruppenforschung hat in neuerer Zeit einen sehr erheblichen Aufschwung genommen und eine immer größere Bedeutung erlangt. Nicht nur in der Chirurgie und Gynäkologie gehören ihre Ergebnisse mit Hinblick auf die Technik der Bluttransfusion zum täglich notwendigen wissenschaftlichen Rüstzeug; auch die Probleme der Rassenbiologie und der Vererbungslehre haben durch die Blutgruppenforschung eine große Vertiefung erfahren. In der gerichtlichen Medizin findet die Blutgruppenuntersuchung zum Nachweis der Vaterschaft praktische Verwendung. Für die Lösung der auf diesem Gebiete noch vorhandenen Probleme sind nun Untersuchungen an Tieren, namentlich an Haustieren, von der allergrößten Wichtigkeit. Leider hat die Veterinärmedizin sich an dieser wichtigen Forschungsrichtung kaum beteiligt, trotzdem gerade sie vermöge des ihr zur Verfügung stehenden Materials dazu besonders berufen gewesen wäre. Daß die ganze Menschheit sich in vier Blutgruppen einteilen läßt, ist ein Phänomen, das ja zu vergleichenden Untersuchungen an Tieren geradezu herausfordert.

Auf welcher Tatsache gründet sich nun die Einteilung aller Menschen in vier Blutgruppen? Zunächst haben zweifellos die früher bei der Vornahme von Bluttransfusionen hin und wieder eingetretenen üblen Zufälle schon gelehrt, daß das menschliche Blut nicht immer die gleichen Eigenschaften besitzt. Worauf diese unerwünschten Zufälle beruhen, das läßt sich auch *in vitro* nachweisen. Bringt man rote Blutkörperchen des Menschen im Reagenzglas mit dem Plasma oder Serum eines anderen Menschen oder eines Tieres zusammen, so tritt in manchen Fällen eine Zusammenballung der Erythrozyten — eine Hämagglutination — auf, die man im 1. Falle, wenn es sich um eine Hämagglutination innerhalb derselben Spezies handelt, als *Isoagglutination* bezeichnet. Im anderen Falle, wenn Blutkörperchen und Serum verschiedenen Spezies entstammen, spricht man von *Heteroagglutination*. Im allgemeinen gelten für den eigentlichen Vorgang der Hämagglutination ähnliche Regeln wie für die Agglutination der Bakterien. Auch hier fassen sich die zusammengeballten Erythrozyten in Form von Klümpchen zu Boden, bilden auf dem Grunde des Röhrchens unter Umständen einen typischen Bodensatz, und die vorher rötliche, trübe Flüssigkeit im Röhrchen wird klar. Schüttelt man den Boden wieder auf, so lassen sich die Blut-

körperchen nur in Form von Klümpchen aufwirbeln, während die Suspensionsflüssigkeit selbst völlig klar bleibt. Ist dagegen eine Agglutination nicht eingetreten, so verteilen sich beim Schütteln die vorher sedimentierten Blutkörperchen wieder gleichmäßig in der Flüssigkeit (s. Abb.).



Isoagglutination beim Pferd.

Links negativ (homogene Trübung), rechts positiv (Klümpchenbildung).

Statt zu einer Agglutination kann es unter den gleichen Versuchsbedingungen auch zu einer Lösung der Erythrozyten kommen, die man als *Isolysis* bzw. *Heterolysis* bezeichnet. Zwischen der Isoagglutination und der Isolysis besteht eine enge Beziehung. Jeder Isolysis geht im allgemeinen eine Isoagglutination voraus, doch tritt erstere in manchen Fällen so schnell ein, daß eine Beobachtung der Agglutination dadurch verhindert wird. Im allgemeinen findet man allerdings die Isoagglutination allein, ohne daß es zu einer Lysis kommt. Durch geeignete Versuchsanordnung (längeres Stehenlassen oder Inaktivieren des Serums) kann man die Hämolyse verhindern, während die Hämagglutination dadurch nicht beeinflusst wird.

Diese Erscheinungen sind z. T. schon 1875 von Landeis beschrieben. Daß es sich hierbei um durchaus spezifische Vorgänge handelt, die nach ganz bestimmten Regeln verlaufen, ist aber erst 1901 von Landsteiner erkannt. Es gelang ihm, alle Menschen hinsichtlich des Verhaltens ihres Blutes in bestimmte Gruppen, Blutgruppen, einzuteilen und zwar zunächst in drei, zu denen im Laufe der weiteren Untersuchungen noch eine vierte kam. Bezüglich der Struktur dieser Gruppen muß man sich darüber klar sein, daß zum Zustandekommen der Reaktion zweierlei vorhanden sein muß, zunächst eine agglutinable Substanz in den roten Blutkörperchen (Agglutinogen), dann ein diese spezifisch beeinflussender Antikörper im Serum (Agglutinin). Erst durch die Bindung des Agglutinogens mit dem Agglutinin tritt die Reaktion ein. Das gegenseitige Verhalten der Blutkörperchen bzw. Sera geht am besten aus folgender Tabelle von Jansky hervor. Man sieht daraus, daß in der

Blutkörperchen	Serum			
	1	2	3	4
1	—	—	—	—
2	+	—	+	—
3	+	+	—	—
4	+	+	+	—

Gruppe 1 die Blutkörperchen von dem Serum anderer Gruppen niemals beeinflusst werden, daß andererseits das Serum dieser Gruppe die Blutkörperchen aller anderen Gruppen agglutiniert. Die Blutkörperchen der Gruppe 2 werden von den Seren der Gruppen 1 und 3 zusammengeballt; das Serum dieser Gruppe agglutiniert die Blutkörperchen 3 und 4. Die Blutkörperchen der Gruppe 3 werden von Seren 1 und 2 zusammengeballt, das Serum der Gruppe 3 agglutiniert die Blutkörperchen 2 und 4. Die Blutkörperchen der Gruppe 4 werden von allen anderen Seren zusammengeballt, eine Serumeigenschaft fehlt dagegen der Gruppe 4 völlig.

Die auf vorstehender Tabelle verzeichneten Reaktionen lassen sich erklären, wenn man für den Menschen zwei verschiedene Blutkörpercheneigenschaften, Agglutinogene, A und B annimmt, außerdem zwei ihnen entgegen gerichtete Serumeigenschaften, Agglutinine, die man als Anti-A oder α und Anti-B oder β bezeichnet. Wenn nun das Fehlen der Blutkörperchen- oder Serumeigenschaft mit O bzw. o bezeichnet wird, so ergeben sich für die Blutstrukturen des Menschen folgende Bezeichnungen:

Gruppe 1	O $\alpha\beta$
Gruppe 2	A β
Gruppe 3	B α
Gruppe 4	AB $\alpha\beta$

In demselben Blute können nur solche Blutkörperchen bzw. Sera vorhanden sein, welche sich gegenseitig nicht beeinflussen (Landsteinersche Regel), denn andernfalls würde ja eine Agglutination im eigenen Blute stattfinden, ein das Leben des betreffenden Individuums in Frage stellender Zustand. Die Blutkörpercheneigenschaften vererben sich nach den Mendelschen Regeln (v. Dungen und Hirschfeld) und sind schon im Fetus und Neugeborenen zu finden, während die Serumeigenschaften erst später, etwa bis zum 2. Lebensjahre, ausgebildet werden. Wenn sich auch die gleichen 4 Blutgruppen unter allen Menschenrassen feststellen lassen, so unterliegt ihre prozentuale Verteilung bei den einzelnen Rassen erheblichen Schwankungen (H. und L. Hirschfeld). Umfangreiche Untersuchungen der verschiedenen Menschenrassen auf das prozentuale Vorkommen der Blutgruppen haben weitgehend zur Klärung

anthropologischer Fragen beigetragen und sind weiterhin berufen, bei der Lösung eines der wichtigsten Probleme der Wissenschaft, der Menschenwerdung, mitzuwirken.

Wenn demnach auch bezüglich der Blutgruppen des Menschen die Wissenschaft bereits einen hohen Stand erreicht hat, so ist doch auch heute noch das eigentliche Wesen der Blutgruppen bei weitem nicht geklärt. Aus diesem Grunde sind die Isoreaktionen bei den Tieren von vergleichendem Standpunkte aus von hohem Interesse. Die bisher auf diesem Gebiet vorliegenden Veröffentlichungen lassen erkennen, daß Isoagglutination bzw. Isolysis bei den Tieren entweder ganz fehlen oder aber sehr viel seltener auftreten als beim Menschen und daß die auf Grund der Reaktionen anzunehmenden Blutstrukturen im allgemeinen einfachere, anscheinend primitivere Verhältnisse zeigen.

Völlig fehlen sollen die Isoreaktionen bei den Kaltblütern (Fishbein), der Maus (Mc. Dowel und Hubbard), dem Meerfischweihen (Hektoen, Fleischer u. a.), der Ratte (Rhodenberg, Snyder), nach den meisten Autoren auch beim Kaninchen (Hektoen, Fishbein, Ottenberg und Friedmann u. a.). Nur Matsuda hat beim Kaninchen 3 Gruppen gefunden, eine mit einem Agglutinogen aber keinem Agglutinin, die zweite verhält sich umgekehrt, in der dritten ist beides vorhanden. Zusammenfassend kann man sagen, daß bei den Nagetieren die Isoreaktionen zumeist fehlen. Widerprechende Ergebnisse finden sich außer bei dem Kaninchen noch bei Vögeln, der Katze (Ingebrigsten) und dem Hund. Brockman, Fishbein, ferner Mc. Enery, Ivy und Pechous stellten Isoreaktionen beim Hunde fest, allerdings ohne die Möglichkeit, Gruppen aufzustellen. von Dungen und Hirschfeld fanden beim Hund zunächst keine Reaktionen, erst durch kreuzweise Immunisierung gelang es ihnen, zwei verschiedene Blutkörpercheneigenschaften und vier Gruppen zu finden. Zwetkow hat die Reaktion bei Hunden wiederholt gefunden und nicht weniger als 19 Gruppen aufgestellt. Hier sind noch weitere Untersuchungen nötig, bevor auch nur einigermaßen Klarheit vorhanden ist.

Etwas günstiger liegen die Verhältnisse bei unseren, den Huftieren angehörenden Haustieren. Mit Ausnahme der Ziege und des Esels, bei denen Isoreaktionen anscheinend nicht vorkommen, liegen sowohl über das Schaf als auch das Rind, das Schwein und besonders das Pferd positive Ergebnisse vor.

Da unsere eigenen Untersuchungen sich auf die genannten Tiere mit Ausnahme des Esels erstreckten, so sollen die bisherigen Ergebnisse im Zusammenhang mit unseren eigenen angegeben werden.

Eigene Untersuchungen.

Für eine erfolgreiche Bearbeitung der Isoreaktionen ist eine einwandfreie Untersuchungstechnik die erste Voraussetzung. In dieser Hinsicht liegen die Verhältnisse bei den Tieren weit schwieriger als beim Menschen. Zur Bestimmung der Blutgruppe eines Menschen braucht man nur zwei Testsera, von denen eins Anti-A das andere Anti-B enthält. Für den praktischen Gebrauch bedient man sich einer Schnellmethode auf dem Objektträger: zu einem Tropfen jedes Testserums wird eine kleine Platinöse voll Blut der zu untersuchenden Person gebracht. Je nachdem, ob die Reaktion in dem einen oder anderen Serum oder in beiden auftritt, oder in beiden fehlt, kann man ohne weiteres die betreffende Gruppe ablesen. Diese einfache Methode ist für die Untersuchung tierischen Blutes nicht anwendbar, weil die Agglutinine hier viel zu schwach sind. Man muß daher von vornherein die auch in der Humanmedizin für sorgfältigere Untersuchungen gebräuchliche Reagenzglasermethode anwenden. Aus demselben Grunde darf man auch die Blutkörperchenaufschwemmung nur in sehr dünner Lösung verwenden, so daß das fertig beschickte

Röhrchen eine Blutkörperchenkonzentration von weniger als 1 Prozent besitzt.

Die echte Isoagglutination wird oft gestört durch eine Pseudoagglutination, die darauf beruht, daß die Blutkörperchen geldrollenartig verkleben und dicke Häufchen bilden, die von der echten Agglutination oft nicht zu unterscheiden sind. Zur Vermeidung der Pseudoagglutination kommt es in erster Linie auf die richtige Serum- bzw. Blutkörperchenkonzentration an. In dünnen Suspensionen tritt die Pseudoagglutination meist nicht auf. Sie verschwindet gewöhnlich bei weiterer Verdünnung der Suspensionsflüssigkeit im Gegensatz zu der echten Isoagglutination, die dabei bestehen bleibt. Sehr zu beachten ist ferner auch das Phänomen der Auto- bzw. Kälteagglutination (Panagglutination nach Mino). Sie beruht darauf, daß bei niederen Temperaturen (0—5 Grad) eine unspezifische Zusammenballung der roten Blutkörperchen — selbst im eigenen Serum — eintritt, die bei Erwärmung auf Körpertemperatur wieder verschwindet. Es ist festgestellt, daß die Reichweite der Kälteagglutinine (Wärme-Amplitude nach Hirschfeld) bei Tieren zuweilen höher geht als 5 Grad, nämlich bis zu 20 Grad, d. h. also, daß u. U. ein bei Zimmertemperatur angelegter Versuch noch durch Kälteagglutinine gestört werden kann. Die echten Isoagglutinine sind eben dadurch gekennzeichnet, daß die Bindung bei Körpertemperatur erfolgt. Infolgedessen ist ein Versuch bei Brutfranktemperatur zur sicheren Erfassung der Isoagglutinine nötig. Zur Beschleunigung der Reaktion und um das Bild prägnanter erscheinen zu lassen, ist es ferner zweckmäßig, ein Röhrchen in der Zentrifuge auszuschleudern und die Reaktion darauf abzulesen.

Die roten Blutkörperchen wurden aus defibriertem Blut ausgeschleudert und nur einmal gewaschen, da nach unseren Erfahrungen häufigeres Auswaschen die Agglutinogene schwächt. Die Blutkörperchen wurden nach Möglichkeit frisch verwandt, sie halten sich im Eisfrank, namentlich nach Zusatz einer 10prozent. Formalinlösung, 0,1 ccm auf 6,0 ccm defibriertes Blut (Schiff), etwa 2 bis 3 Wochen. Dagegen ist es nicht ratsam, ganz frisches Serum zu verwenden, da sich hier häufig unspezifische Reaktionen zeigten, zuweilen auch die Isoagglutination ausblieb. Nach manchen zeitraubenden Vorversuchen mit verschiedenen Konzentrationen von Serum und Erythrozyten haben wir im allgemeinen auf einen Teil Serum zwei Teile einer 1prozentigen Erythrozytenaufschwemmung gebracht. Man bekommt auch noch deutliche Bilder, wenn man die Serummenge 10 steigert, daß auf 2 Teile Serum 1 Teil der Erythrozytenaufschwemmung kommt. Von jeder Serum-Erythrozytenkombination wurden in der Regel 4 Versuche angelegt. Zu 0,1 ccm Serum wurden 0,2 ccm der knapp 1prozentigen Erythrozytenaufschwemmung hinzugefügt, die Mischung wurde kräftig geschüttelt, 5 Minuten stehen gelassen, darauf 2 Minuten lang bei 2000 Umdrehungen ausgeschleudert (Schiff). Ein zweites in gleicher Weise beschicktes Röhrchen blieb 12 Stunden bei Zimmertemperatur stehen, ein drittes kam sofort nach der Mischung in den Brutfrank (37 Grad). In dem gleichen Mischungsverhältnis wurde dann noch die mikroskopische Methode im hängenden Tropfen angewandt. Wir haben auch noch andere von den verschiedenen Autoren beschriebene Versuchsanordnungen geprüft, fanden aber die von uns angegebenen als die sichersten.

Isoagglutination und Blutgruppen beim Schaf.

Über Befunde beim Schaf liegt bisher nur eine Veröffentlichung von Bialosuknia und Kaczkowski vor. Sie untersuchten insgesamt 151 Tiere und zwar in Versuchsreihen von 20—24 Stück, unter denen Blutkörperchen und Serum gegeneinander ausgewertet wurden. Sie fanden eine Blutkörpercheneigenschaft A und ein dieser entgegengesetztes Agglutinin Anti-A. Dementprechend

konnten sie die Schafe in 3 Gruppen einteilen, von denen die erste eine Blutkörpercheneigenschaft aber keine Serumeigenschaft (Ao), die zweite eine Serumeigenschaft aber keine Blutkörpercheneigenschaft (O Anti-A) und die dritte keins von beiden enthält (Oo). Sie fanden die erste Gruppe in 44 Prozent, die zweite Gruppe in 25 Prozent und die dritte in 31 Prozent. Außerdem fanden sie noch bei einem Tiere eine zweite von ihnen nicht für spezifisch gehaltene Blutkörpercheneigenschaft.

Zu unseren eigenen Versuchen dienten 60 Schafe, die zumeist der in hiesiger Gegend beheimateten Leineschafraße angehörten und die auf dem hiesigen Schlachthofe geschlachtet wurden. Wir versuchten von vornherein, alle Tiere in einem großen Versuch gegeneinander auszuwerten, nicht aber, wie es bisher meist geschehen ist, in besonderen Versuchsanordnungen kleinere Gruppen zu untersuchen. Ganz ist das infolgedessen nicht gelungen, als die Blutkörperchen ja nur eine begrenzte Haltbarkeit besitzen, und eine wiederholte Blutentnahme bei denselben Tieren nicht möglich war. Infolgedessen konnten wir bei den 60 Tieren nur 2311 Kombinationen von Blutkörperchen und Serum vornehmen. Von diesen verliefen 88 positiv, also 3,8 Prozent. Eine Tabelle der Reaktionen wird in einer Sonderarbeit von Kayser veröffentlicht werden. Sämtliche Reaktionen lassen sich in folgendes Schema einordnen.

Blutkörperchen	Serum		
	1 (o)	2 (Anti-A)	3 (o)
1 (A)	—	+	—
2 (O)	—	—	—
3 (O)	—	—	—

Es ergibt sich daraus, daß in einer Gruppe eine Blutkörpercheneigenschaft A, in der zweiten eine ihr entgegengesetzte Serumeigenschaft Anti-A, in der dritten keins von beiden enthalten ist, also Übereinstimmung mit Bialosuknia und Kaczkowski. Wir können also das Vorkommen von 3 Blutgruppen beim Schaf von folgender Struktur bestätigen:

1. Ao. 2. O Anti-A. 3. Oo.

Der Gruppe 1 gehörten 24 Tiere (40 Prozent) an, der Gruppe 2 14 (23,3 Prozent), der Gruppe 3 22 (36,7 Prozent), also auch hier hinreichende Übereinstimmung mit den genannten Autoren. Die Kombination A mit Anti-A wurde 20mal vorgenommen, davon waren aber nur 88 positiv, gegenüber 120 Ausfällen. Wir sehen hier die bei Tieren im Gegensatz zum Menschen häufige Erscheinung, daß positive Reaktionen ausfallen dort, wo sie nach dem Gruppenschema eigentlich zu erwarten wären. Diese Ausfälle betragen nach unseren Versuchen beim Schaf 57,6 Prozent.

Die von Bialosuknia und Kaczkowski bei einem von 151 Schafen nachgewiesene zweite Blutkörpercheneigenschaft konnten wir bei unseren Versuchen nicht nachweisen. Ich möchte daher annehmen, daß hierbei nur ein Zufallsbefund vorgelegen hat.

Daß es sich beim Schaf um echte Isoagglutination handelt, läßt sich durch den Abfättigungsverfuch nachweisen. Kombiniert man ein Anti-A-haltiges Serum mit A-haltigen Erythrozyten und entfernt die Erythrozyten durch Ausschleudern, so wird das Serum frei von Agglutininen. Benutzt man zu demselben Versuch Erythrozyten der Gruppe O, so bleiben die Agglutinine im Serum enthalten, wie sich durch erneute Kombination mit A-Erythrozyten nachweisen läßt. Benutzt man zu der Abfättigung Erythrozyten der Gruppe A, die mit diesem Anti-A nicht positiv reagierten (Ausfälle), so bleiben die Agglutinine in dem Serum enthalten. Auch die Abfärbung der

eingetretenen Bindung A-Anti-A gelang nach der von Schiff angegebenen Versuchsanordnung. Die zusammengeballten Erythrozyten werden durch Zentrifugieren von dem Serum getrennt, darauf in physiologische Kochsalzlösung gebracht und nun im Wasserbade auf 54 Grad erhitzt. Dabei löst sich die eingetretene Bindung, die Agglutinine treten in die Kochsalzlösung über und diese Kochsalzlösung, die außer den Agglutininen kaum noch irgendwelche Serumbestandteile besitzt, kann in einem neuen Versuch mit A-Erythrozyten kombiniert werden. In mehreren Fällen trat dann auch die Reaktion ein. Allerdings war sie meistens nicht so deutlich wie mit Serum und blieb in der Hälfte der Fälle ganz aus. Die Agglutinine sind demnach so schwach, daß sie bei dem immerhin etwas komplizierten Absprengungsversuch nicht völlig erhalten bleiben.

Isoagglutination bei der Ziege.

In der Literatur fand ich nur eine kurze Mitteilung von Hirschfeld, nach der Isoreaktionen bei Ziegen nicht vorkommen. Wir benutzten zu unseren Versuchen 11 Ziegen der Harz- und Saanenrassen. Sämtliche angestellten 121 Kombinationen verliefen negativ. Um zu sehen, ob das Ziegenblut überhaupt irgendwelche Agglutinine bzw. agglutinable Substanzen besitzt, prüften wir das Ziegenblut noch auf Kälteagglutinine und Heteroagglutinine. 44 Kombinationen von Ziegenferum und Ziegenerythrozyten wurden eiskalt gemischt und 12 Stunden im Eischrank stehen gelassen. In 6 Fällen war eine deutliche Agglutination eingetreten, niemals aber im eigenen Serum.

Bei der Untersuchung auf Heteroagglutination zeigten sich in 25 Kombinationen von Ziegenerythrozyten mit Pferdeferum 14 positive Reaktionen. Interessant waren auch die Ergebnisse der Kombinationen von Schafblut mit Ziegenblut, weil man ja eine ziemlich nahe Verwandtschaft zwischen diesen Tieren annehmen darf. Von 132 Kombinationen zwischen Schafferum und Ziegenerythrozyten waren 72 positiv. Bei der Isoagglutination der Schafe war der Prozentatz positiver Reaktionen weit geringer (3,8 Prozent), man muß demnach die zwischen Schaf und Ziege eintretenden Reaktionen wohl als Heteroagglutination auffassen. Die Kombination von Schafererythrozyten mit Ziegenferum verlief ganz ähnlich. Die Reaktionen erfolgten so verstreut, daß sie sich in ein Gruppenschema nicht einreihen ließen.

Isoagglutination und Blutgruppen beim Schwein.

Isoreaktionen beim Schwein wurden von Fishbein und Wesceczky festgestellt, ohne daß sie sich nach Gruppen ordnen ließen. Doch haben Szymanowsky, Stetkiewicz und Wachler, neuerdings auch Berczy festgestellt, daß beim Schwein eine sehr ausgesprochene Gruppenbildung vorhanden ist. Wie beim Schaf bestehen auch hier 3 Gruppen, von denen die erste agglutinable Erythrozyten, die zweite ein Agglutinin im Serum und die dritte keins von beiden enthält. Es ergeben sich daraus folgende Strukturen:

1. A o. 2. O Anti-A. 3. O o.

Szymanowsky und Mitarbeiter haben bereits Untersuchungen über den Erbgang der Blutgruppen an fünf Kreuzungen von Schweinen, die gleichen oder verschiedenen Gruppen angehörten, angestellt.

Zu unseren eigenen Versuchen haben wir 20 auf dem hiesigen Schlachthof getötete Schweine, welche ausnahmslos der veredelten Landrasse angehörten, untersucht. Von den 400 angestellten Kombinationen waren 77 positiv, also 19,25 Prozent. Sämtliche Reaktionen lassen sich ohne weiteres in das gleiche Schema einordnen wie das beim Schaf angegebene. Die Reaktionen sind aber beim Schwein sehr viel deutlicher als bei jedem anderen Tier, auch zeigten sich bei unseren Versuchen keinerlei Ausfälle, sondern die Reaktionen traten immer ein, wenn sie nach dem Gruppenschema

zu erwarten waren. In dieser Hinsicht ähnelt das Blut des Schweines sehr dem des Menschen. Von den untersuchten 20 Tieren gehörten der Gruppe 1 (A o) 7 Tiere an (35%), der zweiten Gruppe (O Anti-A) 11 Tiere (55 Prozent) und der dritten Gruppe (O o) 2 Tiere (10 Prozent). Die beim Schaf beschriebenen Absättigungsversuche gelangen in derselben Weise auch beim Schwein. Auch der Absprengungsversuch gelang in manchen Fällen, in anderen nicht. Die Heteroagglutination mit Schweineferum bzw. -erythrozyten einerseits und Pferde-, Ziegen-, Schafererythrozyten bzw. -serum andererseits verlief in der großen Mehrzahl der Fälle positiv, das Schweineblut scheint in dieser Hinsicht besonders aktiv zu sein. Auch die Kälteagglutination ließ sich im Schweineblut deutlich beobachten.

Isoagglutination beim Rinde.

Über das Rind liegt eine Veröffentlichung von Ottenberg und Friedmann vor, aus der hervorgeht, daß die gleichen 3 Gruppen, die wir beim Schaf und Schwein kennen gelernt haben, auch hier vorhanden sind.

Zu unseren eigenen Versuchen verwandten wir 50 auf dem hiesigen Schlachthof geschlachtete Rinder, zumeist Kühe, welche überwiegend der schwarzbunten Niederungsrasse angehörten. Da die erwarteten Reaktionen ausblieben, bemühten wir uns um Tiere anderer Rassen und benutzten auch noch Simmentaler-, Harzer- und Frankensinder. Auch hier konnten wir niemals eine positive Reaktion feststellen. Wir können demnach auf Grund unserer Untersuchungen die in Amerika erhobenen Befunde von Ottenberg und Friedmann nicht bestätigen. Doch ist dabei zu bedenken, daß das Fehlen einer A- oder Anti-A-haltigen Gruppe natürlich dazu führen muß, daß sämtliche Reaktionen negativ verlaufen. Es besteht also die Möglichkeit, daß eine dieser beiden Gruppen in unserer Gegend so selten vorkommt, daß wir sie zufällig nicht beobachtet haben. Untersuchungen an einem größeren Material werden diese Frage noch zu klären haben.

Im Gegenlatz zur Isoagglutination ließ sich die Heteroagglutination zwischen Rind und Pferd in beiderlei Serum-Erythrozytenkombinationen deutlich nachweisen.

Isoagglutination und Blutgruppen beim Pferd.

Von allen Haustieren bietet das Pferd bezüglich der Isoreaktionen die interessantesten Verhältnisse. Daß die Reaktion vorkommt, ist von Panisset und Verge, Fishbein, Walsh u. a. festgestellt, ohne daß es ihnen gelang, sie in Gruppen einzuordnen. Der erste Versuch einer Gruppeneinteilung ist von Hirschfeld und Przemycki vorgenommen. Sie untersuchten 45 Pferde und stellten 3 Gruppen und außerdem noch Nebengruppen fest, über deren Zahl, Art und Zusammensetzung sie sich nicht äußern. In den ersten beiden Gruppen reagieren sowohl die Sera als auch die Blutkörperchen, in der dritten nur die Sera. Wendet man die beim Menschen übliche Bezeichnung an, so haben die 3 Hauptgruppen folgende Struktur:

1. A β . 2. B α . 3. Oa β .

Die Serumeigenschaften sind nicht immer nachweisbar. Das β der Gruppe 1 ließ sich nur in 10 Prozent der Kombinationen feststellen, das α der Gruppe 2 in 60 Prozent, das α der Gruppe 3 in 100 Prozent und das β der Gruppe 3 in 50 Prozent. Sie stellten weiter fest, daß der Gruppe 1 70 Prozent, der Gruppe 2 15 Prozent und der Gruppe 3 9 Prozent der Pferde angehörten, der Rest den Nebengruppen. Landsteiner und v. d. Scheer haben die Ergebnisse Hirschfelds bestätigt. Eine wertvolle Arbeit von Schwarz aus dem Jahre 1926 ist mir leider erst bekannt geworden, nachdem meine ersten Veröffentlichungen über den gleichen Gegenstand schon erfolgt sind. Schwarz untersuchte 100 Pferde in Serien von 20 Stück und versuchte auf Grund der beobachteten Reaktionen das

4-Gruppenschema des Menschen auf das Pferd anzuwenden. Ganz ist ihm das nicht geglückt. Auch hat er aus dem Fehlen von Agglutininen im Serum geschlossen, daß ein solches Blut der Gruppe (ABo) angehören müsse, was beim Pferde keineswegs zutrifft. In der letzten Zeit hat ferner Groll wiederholt über Isoagglutinationen beim Pferde berichtet; ich will darauf erst nach Bekanntgabe der eigenen Untersuchungsergebnisse eingehen.

Auf Grund der unter meiner Leitung von Hofferber durchgeführten Untersuchung des Blutes von 50 Pferden ergab sich folgendes. In 2121 Kombinationen wurde 410mal eine Agglutination beobachtet, also in knapp 20 Prozent der Fälle. Sämtliche beobachteten Reaktionen sind in meiner Arbeit über die Blutgruppen des Pferdes im 57. Band der Zschr. für Immunitätsforschung in Tabellenform dargestellt. Sie lassen sich mit Ausnahme der noch zu besprechenden Nebengruppen in nachfolgendes Gruppenschema einordnen:

Blutkörperchen	Serum					
	1 β	2 o	3 α	4 o	5 $\alpha\beta$	6 o
1 A	—	—	+	—	+	—
2 A	—	—	+	—	+	—
3 B	+	—	—	—	+	—
4 B	+	—	—	—	+	—
5 O	—	—	—	—	—	—
6 AB	+	—	+	—	+	—

Wir können vorstehende Reaktionen ohne weiteres erklären, wenn wir zwei verschiedene Blutkörpercheneigenschaften und außerdem zwei ihnen entgegengesetzte Serumeigenschaften annehmen. Wir haben dafür in früheren Veröffentlichungen die Bezeichnung X und Y verwandt, weil wir gewissermaßen eine Gleichung aus lauter Unbekannten vor uns hatten. Nachdem wir aber aus dem prozentualen Vorkommen wissen, daß unser X identisch mit dem A Hirschfelds und demnach Y gleich B ist, halten wir es für richtig, die beim Menschen übliche Bezeichnung auch beim Pferde anzuwenden. Die Gruppen 1—6 haben demnach folgende Strukturen:

1. A β . 2. Ao. 3. Ba. 4. Bo. 5. Oa β . 6. ABo.

Das Fehlen der Serumeigenschaften bei den Gruppen 2 und 4 ist nun kein zwingender Grund, dafür besondere Gruppen aufzustellen, zumal auch bei den übrigen Gruppen die Serumeigenschaften sehr oft ausfallen und es ja ohnehin in erster Linie auf die Blutkörpercheneigenschaft ankommt. Kombiniert man also 1 mit 2 und 3 mit 4, so ergeben sich für das Pferd folgende Hauptgruppen:

1. A β . 2. Ba. 3. Oa β . 4. ABo,

d. h., das Pferd besitzt die gleichen Blutstrukturen wie der Mensch. Damit ist allerdings noch nicht gesagt, daß das A und B des Pferdes identisch mit dem des Menschen ist, vielmehr ist nur das gegenseitige Verhalten der entsprechenden Komponenten des Pferdeblutes damit gekennzeichnet.

Bei dem Vergleich mit den von Hirschfeld aufgestellten Gruppen zeigt sich mit unseren drei ersten Gruppen Übereinstimmung, neu ist die von Hirschfeld nicht beobachtete Gruppe IV (ABo), durch deren Vorhandensein erst die Übereinstimmung mit der Blutstruktur des Menschen vollständig ist und die genau wie beim Menschen auch beim Pferde am seltensten vorkommt. Von den den Hauptgruppen zuzurechnenden Pferden gehören bei unseren Untersuchungen an:

der Gruppe 1 (A β einschließlich Ao)	44,4 Prozent
der Gruppe 2 (Ba einschließlich Bo)	25 Prozent
der Gruppe 3 (Oa β)	25 Prozent
der Gruppe 4 (ABo)	5,6 Prozent

Demgegenüber fand Hirschfeld zu 1 70 Prozent, zu 2 15 Prozent und zu 3 9 Prozent. Unsere Zahlen werden aber denen Hirschfelds ähnlicher, wenn wir aus unserem Untersuchungsmaterial die warmblütigen Pferde leichteren Schlages herausziehen.

Warmblut	Kaltblut
Gruppe 1 66,66 Prozent	40 Prozent
Gruppe 2 16,6 Prozent	26,66 Prozent
Gruppe 3 16,6 Prozent	26,66 Prozent
Gruppe 4 o	6,66 Prozent

Man ersieht daraus, daß die Hirschfeld'schen Zahlen eine erhebliche Übereinstimmung mit den von uns bei Warmblutpferden ermittelten zeigen. Die von Hirschfeld in Polen untersuchten Pferde werden vermutlich den dort vorkommenden leichten Schlägen angehört haben, während bei unserem Material die schweren Pferde belgischer Abkunft überwogen. Aus dieser Gegenüberstellung geht ferner hervor, daß die Blutkörpercheneigenschaft A bei den Warmblutpferden bedeutend überwiegt, während bei Kaltblutpferden der Faktor B sich deutlicher bemerkbar macht, ohne allerdings auch hier an Häufigkeit A zu erreichen. Es bestehen also genau wie beim Menschen auch beim Pferde Rassenunterschiede.

Die Untersuchungen auf Isoagglutinine beim Pferde werden stark beeinträchtigt durch den großen Ausfall von Agglutininen dort, wo sie nach dem Gruppenschema eigentlich zu erwarten wären. Nach unseren Beobachtungen ist das β der Gruppe 1 nur in 17,5 Prozent der Fälle, das α der Gruppe 2 in 17,8 Prozent, das α der Gruppe 3 in 83 Prozent und das β derselben Gruppe ebenfalls in 83 Prozent der Fälle nachweisbar; das $\alpha\beta$ der Gruppe 3 ergibt mit AB der Gruppe 4 80 Prozent positive Reaktionen. Bei dieser Berechnung sind die anfangs gesondert aufgestellten Gruppen Ao und Bo, in denen niemals Serumreaktionen beobachtet werden, den Gruppen 1 bzw. 2 als Ausfallerscheinungen zugerechnet. Rechnet man diese ab, so ist die Serumeigenschaft β der Gruppe 1 ebenso wie α der Gruppe 2 zu fast 50 Prozent nachweisbar. Infolge dieser zahlreichen Ausfälle gelingt die Einreihung eines Pferdes in das Gruppenschema nur dann mit Sicherheit, wenn große Versuchsreihen angelegt werden.

Vorstehendes gilt nur für die Hauptgruppen, in die sich nach unseren Untersuchungen 84 Prozent aller Pferde einreihen lassen. Bei diesen kommt man mit der Vorstellung von zwei gegeneinander gerichteten Blutkörperchen- bzw. Serumeigenschaften aus.

Bei den 16 Prozent den Nebengruppen zuzurechnenden Pferden gelingt das nicht mehr. Wollte man auch bei diesen Pferden nur zwei bestimmende Faktorenpaare annehmen, so müßten diese Gruppen Strukturen besitzen wie B β , Aa β , Ba β , ABo, ABa β ; das sind aber physiologische Unmöglichkeiten. Vielleicht hat es sich bei einem Teil der von uns beobachteten Reaktionen auch um Pseudoagglutinationen gehandelt. Daß aber ein Teil der Pferde sich nicht in die Hauptgruppen einreihen läßt, ist auch von Hirschfeld und Przemycki beobachtet. Vielleicht gibt es beim Pferde mehr als zwei die Reaktionen bestimmende Faktoren. Eine genaue Analyse der Nebengruppen muß das Ziel künftiger Forschungen sein.

Die Agglutinine des Pferdeblutes lassen sich durch im Überschuß hinzugefügte Blutkörperchen einer entgegengesetzten Gruppe abfälligen. Die Trennung der beiden Serumeigenschaften α und β der Gruppe 3 durch elektive Abfälligung ist uns aber bisher nicht gelungen. Es ist anzu-

nehmen, daß der negative Ausfall des Trennungsversuchs nur auf die große Schwäche der Agglutinine zurückzuführen ist und bei geeigneter Versuchsanordnung doch noch zum Ziele führt.

Wenn demnach auch bei den Isoreaktionen des Pferdes noch manches zu klären ist, so lassen sich die wesentlichsten Verhältnisse doch schon übersehen. In dieser Hinsicht ist die Anwendbarkeit des menschlichen Viergruppenschemas auf das Pferd die bedeutungsvollste Feststellung. Im Gegensatz zu allen anderen Tieren zeigt sich beim Pferd an den Nebengruppen sogar eine anscheinend noch weitergehendere Differenzierung.

Zu ganz anderen Ergebnissen ist Groll bei seinen Untersuchungen auf Isoagglutination an Pferden gekommen. Seine Untersuchungstechnik unterscheidet sich von der üblichen schon dadurch, daß die Isoagglutination nur nach den Bodensatzbildern beurteilt wird. Nach Groll tritt die Isoagglutination bei jeder Kombination von Serum und Erythrozyten auf. Nur der Verdünnungsgrad der Blutkörperchen, bei dem die Reaktion am deutlichsten sichtbar wird, ist verschieden. Tritt die Agglutination erst bei einer sehr starken Verdünnung ein, so schließt Groll auf eine starke Homogenität des Bluteiweißes der beiden zum Versuch verwandten Tiere. Solche Tiere hält er gegebenenfalls zur gegenseitigen Paarung für besonders geeignet.

Die Angaben Grolls sind von Kronacher und seinen Mitarbeitern in großen Versuchsreihen nachgeprüft und nicht bestätigt worden. Trotzdem hält Groll in späteren Veröffentlichungen an der Richtigkeit seiner Angaben fest.

Die Beurteilung der Isoreaktionen nur auf Grund der Bodensatzbilder muß lebhaftes Bedenken herausfordern. Es trifft zwar im allgemeinen zu, daß bei positiver Agglutination sich die roten Blutkörperchen in Form eines gezackten Schleiers zu Boden senken, während man bei negativer Reaktion eine Knopfbildung sieht. Doch tritt auch bei positiver Reaktion zuweilen Knopfbildung auf, seltener allerdings ein Schleier bei negativer. Es trifft auch zu, daß nach dem Aufschütteln eines Schleiers sich gewöhnlich wieder ein Schleier bildet und bei negativer Reaktion nach Aufschütteln immer wieder ein Knopf entsteht. Bei den positiven Reaktionen mit Knopfbildung zeigt sich nach Aufschütteln gewöhnlich ein Schleier. Eine Gesetzmäßigkeit der Bodensatzbildung im Sinne Grolls ist also nicht vorhanden. Besonders auffällig ist aber die Tatsache, daß wir bei unseren Kombinationen von Pferde- und Pferdeerythrozyten knapp 20 Prozent positive Reaktionen bekommen haben, während Groll 100 Prozent bekommt. Das dürfte zunächst dafür sprechen, daß nicht alle nach Groll positiven Reaktionen als echte Isoagglutination anzusehen sind. Wenn Groll eine positive Reaktion sogar dann bekommt, wenn er Blutkörperchen und Serum desselben Pferdes mischt, so müßte er sich darüber klar sein, daß das keine echte Isoagglutination sein kann. Aus der ganzen Versuchsordnung Grolls geht hervor, daß er dem etwaigen Auftreten von Pseudo- bzw. Kälteagglutination kaum Beachtung geschenkt hat. Er benutzt mit Vorliebe frisches Untersuchungsmaterial, da „älteres keine sicheren Ergebnisse“ lieferte. Gerade bei frischem Serum sind aber unspezifische Reaktionen unvermeidlich, wie auch Hirschfeld beobachtet hat. Nach alledem ist Groll nicht berechtigt, seine Bodensatzbilder

als Isoagglutination zu bezeichnen. Selbst wenn seine Reaktion etwa als Eiweißreaktion ohne Zusammenhang mit der echten Isoagglutination für sich bestehen sollte, so muß diese Reaktion durch die wirkliche Isoreaktion weitgehend beeinflusst werden. Beim Pferd können aber genau wie beim Menschen zwei Individuen gleicher Rasse verschiedenen Blutgruppen angehören und umgekehrt. In dem ersten Falle muß das die Groll'sche Reaktion im Sinne der Heterogenität, im zweiten der Homogenität erscheinen lassen. Dadurch wird den Groll'schen **Schlußfolgerungen bezüglich des Wertes seiner Reaktion zum Nachweis von Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Einzelindividuen jeder Rasse entzogen.**

Wenn wir uns nunmehr noch die Frage vorlegen, welche Bedeutung die Blutgruppenforschung für die Veterinärmedizin einmal haben kann, so müssen wir zunächst sagen, daß das, was für die Humanmedizin der Ausgangspunkt der ganzen Forschung gewesen ist, die Bluttransfusion, bei uns kaum eine große Rolle spielen wird. Abgesehen davon, daß die Transfusion von uns nur selten vorgenommen wird, müssen wir bedenken, daß die Isoagglutination bei Tieren in Anbetracht ihres prozentual seltenen Auftretens, sowie ihrer geringen Stärke, etwaige Transfusionen kaum stören würde. Eine praktische Bedeutung können die Isoagglutinine dagegen auch bei Tieren zum Nachweis der Abstammung gewinnen. Die Voraussetzung dazu würde allerdings ein genaues Studium des Erbgangs der Blutgruppen sein, das bei den Tieren noch aussteht. Gerade dieses Studium ist aber bei den Haustieren besonders erfolgversprechend. Wir müssen die Blutgruppen auffassen als genotypisch bedingte Unterschiede innerhalb derselben Spezies, Mutationen, die infolge des Kreuzungsexperimentes der Erbanalyse zugänglich sind. Beim Menschen sind die Blutgruppen eins der wenigen Merkmale, die in dieser Hinsicht Erfolge gebracht haben. Wenn auch bei den Tieren infolge der weniger scharfen Prägung der Blutgruppen, besonders des häufigen Ausfalls der Agglutinine die Arbeit wesentlich schwieriger ist, so dürften sich diese Schwierigkeiten doch wohl überwinden lassen. Wir haben hier einen Zweig der Immunitätsforschung vor uns, der uns ferner noch zeigt, daß es auch bei den Immunitätsvorgängen etwas konstitutionell Bedingtes, Unabänderliches, Individuumspezifisches gibt, das vererbbar ist und die Immunitätsvorgänge z. T. unabhängig von äußeren Reizen in vorgezeichneten Bahnen ablaufen läßt.

Schrifttum.

1. Berczy, L.: cit. B. T. W. 1928, S. 425. 2. Bialosuknia u. Kaczkowski: Journ. of immunol. 1924, Bd. 9, S. 593. 3. Groll: Züchtungskunde 1927, Bd. 2, S. 65. 4. Hirschfeld und Przyemcki: Cpt. rend. des séanc. de la soc. de biol. 1923, Bd. 89, S. 1360. 5. Hirschfeld: Konstitutionsserologie und Blutgruppenforschung. Verlag Jul. Springer, Berlin 1928. 6. Kronacher, Böttger und Schäper: Zschr. für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie 1927, Bd. 9, S. 323. 7. Lattes: Die Individualität des Blutes. Verlag von Jul. Springer, Berlin, 1925. 8. Ottenberg und Friedmann: Journal of exper. med. 1911, Bd. 13, S. 531. 9. Schermer: Zschr. für Immunitätsforschung 1928, Bd. 58, S. 130. 10. Schermer und Hofferber: Arch. für wissenschaftl. und prakt. Tierheilkunde 1927, Bd. 57, S. 77. 11. Schiff: Die Technik der Blutgruppenuntersuchung. Verlag Jul. Springer, Berlin, 1926. 12. Schwarz: Zschr. für Immunitätsforschung 1926, Bd. 48, S. 79. 13. Szymanowski, Stetkiewicz und Wachler: Cpt. rend. des séanc. de la soc. de biol. 1926, Bd. 94, S. 204.

Einführung einer internationalen einheitlichen Bezeichnung für die menschlichen Blutgruppen.

(Reichsgesundheitsamt.)

Durch den Gebrauch verschiedener Bezeichnungen für die menschlichen Blutgruppen in den einzelnen Ländern war eine beträchtliche

Verwirrung in der Literatur eingetreten. Es war deshalb sehr zu begrüßen, daß der Vorsitzende des Hygienekomiteés des Völkerbundes,

Prof. Madsen, vorschlug, eine internationale einheitliche Nomenklatur einzuführen und als solche die von v. Dungern und Hirschfeld vorgeschlagene zu wählen. Der vom Reichsgesundheitsrat für die Blutgruppenfragen eingesetzte Sachverständigenausschuß hat diesem Vorschlag zugestimmt. Die permanente Standardisierungskommission des Hygienekomités des Völkerbundes hat auf ihrer Tagung in Frankfurt a. M. im April d. Js. diesen Vorschlag ebenfalls angenommen. Die vier menschlichen Blutgruppen werden demnach in Zukunft einheitlich nach v. Dungern und Hirschfeld mit O, A, B und AB bezeichnet, wobei es freigestellt bleibt, daß in den Ländern, in denen bisher eine andere Nomenklatur gebräuchlich war, diese während einer gewissen Übergangszeit noch in Klammern beigelegt wird. Von dem

vom Reichsgesundheitsrat eingesetzten Sachverständigenausschuß für Blutgruppenfragen wurde außerdem noch empfohlen, auch die im Handel befindlichen Testsera einheitlich zu benennen und bei den Testseren neben der Blutgruppenzugehörigkeit auch noch die betreffende Serum-eigenschaft in Klammern hinzu zufügen, demgemäß die beiden Testsera als „Testserum der Gruppe A (Anti B)“ und „Testserum der Gruppe B (Anti A)“ zu bezeichnen, sowie bei den Firmen, welche Testsera in den Handel bringen, eine einheitliche Verpackung, d. h. gleiche Farbe der Kapillaren für das gleiche Testserum anzuregen, damit Verwechslungen nach Möglichkeit ausgeschlossen werden. Diesen Empfehlungen ist auch die permanente Standardisierungskommission des Hygienekomités des Völkerbundes beigetreten.

(Aus dem Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer Niederschlesien. — Direktor: Dr. Schumann.)

Entstehung und Bekämpfung der Rotwurmseuche des Geflügels.

(Mit 6 Abbildungen.)

Von Abteilungsvorsteher Dr. Lerche, Breslau.

Die Rotwurmseuche ist eine Krankheit des Geflügels, die durch *Syngamus trachealis*, einen in der Luftröhre schmarotzenden Parasiten, hervorgerufen wird. Ihre Kenntnis ist nicht neu. Schon 1799 beschrieb sie Wiesenenthal in Baltimore unter der Bezeichnung „Japsen“. Im Laufe des 19. Jahrhunderts folgten dann Arbeiten von Leuckart, Ehlers, Mégnin, Walker und Klee, während sich in neuerer Zeit Eber, Jerke, Lichtenstern, Schultheiss, Berge, Csontos, Ssisow und kürzlich Szidat mit ihr befaßten. — Feuereissen schilderte einen Befall von Gänsen mit *Syngamus bronchialis*. Auf diese *Syngamus*-art gehe ich nicht näher ein, da ich sie nur ein einziges Mal fand. Vielmehr erstrecken sich meine Beobachtungen und Versuche speziell auf *Syngamus trachealis*.

Während ich den Parasiten in Mitteldeutschland nur ganz selten antraf, beobachtete ich ihn in Schlesien recht oft, und die Züchter klagten viel über seine Schäden. Die durch ihn bewirkten Verluste waren aber durchaus nicht einheitlich. Meist betrug er nur 10—20 Prozent des Kükenbestandes, mitunter aber auch 35—40 Prozent und in einzelnen Gegenden Oberschlesiens erklärten die Landwirte, gar keine Geflügelaufzucht mehr treiben zu können, weil alle Küken durch den Rotwurm zugrunde gingen. Ähnliche Seuchengänge durch *Syngamus trachealis* traten früher in Schleswig-Holstein und neuerdings auch in Ostpreußen auf.

Wir Tierärzte haben also allen Grund, uns einmal mit der Entwicklung und Bekämpfung dieser Parasiten zu befaßen, zumal wir häufig von den Züchtern zu Rate gezogen werden und zumal bisher nur recht empirische Maßnahmen Anwendung fanden.

Vom *Syngamus trachealis* werden Hühner und Puten befallen. Sehr häufig finden wir ihn bei Fasane, und in den meisten Fasanerien ist er ein äußerst gefürchteter Gast. Seltener ist er bei Tauben und beim Wassergeflügel. Recht oft beherbergen ihn aber auch wildlebende Vögel. So wurde er bei Raben, Krähen, Dohlen, Amseln, Staren, Elstern, Rebhühnern und verschiedenen anderen Vogelarten gefunden. Ich selbst fand ihn in der Luftröhre einer ganzen Reihe von Dohlen, die in der Nähe einer verfeuchten Fasanerie in großer Zahl nisteten. Diese wildlebenden Vögel können Träger des *Syngamus* sein, ohne irgendwelche Krankheitserrscheinungen zu zeigen; und da sie von Hof zu Hof fliegen, tragen sie erheblich zur Verbreitung der Rotwurmseuche bei. Anfangs glaubte ich, daß trotz morphologischer Ähnlichkeiten die Parasiten der Dohlen und Hühner vielleicht nicht identisch seien. Daher nahm ich wechselseitige Übertragungen vor. Hierbei gelang es, eine Dohle mit dem Rotwurm des Fasan und ein Hühnchen mit dem Rotwurm einer Dohle zu infizieren. Wollen wir also der Krankheit entgegenreten, so dürfen wir die wildlebenden Parasitenträger nicht außer Acht lassen.

Besonders empfänglich ist das Geflügel für den *Syngamus* in den ersten Lebenswochen, und wir sehen gewöhnlich nur Erkrankungen im Alter von 4 bis höchstens 8 Wochen. Später macht sich der Parasitenbefall äußerlich wenig bemerkbar, und das erwachsene Geflügel kann den Rotwurm lange ohne wesentlichen Schaden in der Luftröhre beherbergen.

Als Krankheitserrscheinungen finden wir bei den Hühner- und Fasanenküken häufiges Öffnen des Schnabels, schleudernde Kopfbewegung, Niesen, Röcheln, Atemnot. Bald gefellen sich Abmagerung und struppiges Gefieder hinzu, und die Tiere gehen entweder durch Kachexie oder durch Erstickung zugrunde.

Bei Zerlegung derartiger Küken sehen wir in der Luftröhre in wechselnder Zahl rötliche, in Ypsilonform zusammenliegende Würmer. Meist liegen sie in der Mitte oder im unteren Drittel der Trachea und nicht im oberen Teil, wie die meisten Autoren angeben. Die nicht abgestorbenen Parasiten haften der Luftröhre außerordentlich fest an und lassen sich nicht leicht entfernen. Ganz besonders ist dies beim Männchen der Fall. Der Grund dieser festen Verankerung wird uns sofort klar, wenn wir die Anheftungsstelle im Schnittpräparat betrachten. Hier sehen wir, daß der Kopf sich nicht bloß auf der Schleimhaut festsaugt, sondern durch sie hindurch dringt bis in die Submukosa (Abb. 4). Die um den Parasiten herum befindliche Schleimhaut beginnt durch Bindegewebsvermehrung zu wuchern, auch sammeln sich Entzündungszellen, insbes. Rundzellen und eosinophile Zellen an. Die Submukosa ist stark verdickt, und der Luftröhrenknorpel ragt zapfenförmig der Mundöffnung des Wurmes entgegen. Diese Erhebungen lassen sich nach Entfernen der Parasiten schon makroskopisch als warzenähnliche Gebilde erkennen und stellen nicht, wie in den Lehrbüchern angegeben ist, Abszesse dar.

Im Zoologischen System bilden die Luftröhrenwürmer eine Tribus Syngameae und gehören in die Unterfamilie Strongylinae der Familie Strongylidae. Letztere sind der Ordnung Nematoden und der Klasse der Nematelminthen, den Rundwürmern, eingruppiert. Seinen Namen verdankt der *Syngamus trachealis* Siebold (1836). — Der Körper des Wurmes ist zylindrisch, glatt und von roter Farbe, daher die Bezeichnung Rotwurm; ältere Exemplare erscheinen auch gelblich. Der Kopf ist breiter als der Körper und hebt sich als helle Kuppe deutlich ab. Die Mundöffnung ist kreisrund und liegt am Grunde eines halbkuglichen Napfes. Sie ist von acht rosettenartig angeordneten weißen Papillen umgeben. Rings um den Napf befinden sich sechs weiße, symmetrisch gelagerte Lippen, die von einem roten wulstigen Rande umgeben sind (Abb. 6a).

Das Weibchen ist nach meinen Messungen 6 bis 20 mm, vereinzelt sogar 25—30 mm lang und 0,3—1 oder gar 2 mm dick. Sein Hinterende läuft in einer kurzen

Spitze aus (Abb. 6c). Den Uterus, der bei ausgewachsenen Exemplaren stark mit Eiern gefüllt ist, sieht man als weißen gewundenen Strang durchscheinen, der sich leicht als dünner langer Faden herauspräparieren läßt. Die Geschlechtsöffnung wölbt sich hügelig hervor und liegt am Übergang vom ersten zum zweiten Viertel des Wurmes.

Sie ist gewöhnlich nicht frei, sondern fest kopuliert mit dem Männchen, das als winziger, höchstens $\frac{1}{3}$ mm dicker, 2–6 mm langer Wurm dem Weibchen anhaftet. Diese Kopulation findet schon sehr frühzeitig statt, ich fand sie schon bei 6 mm langen Weibchen. Das Männchen ist nur von dem Weibchen durch Zerreißen zu trennen und umschließt die Vulva durch eine glockenförmige Bursa, die auf der einen Seite offen ist, 12 Rippen trägt und makroskopisch als kleine weiße Kuppe erscheint (Abb. 6b). Ihre Einrichtung ist schwer zu studieren, weil die Trennung beider Geschlechter äußerst selten gelingt.

Wegen dieser festen Vereinigung sollen nach den Angaben einiger Autoren (Klee, Olt und Ströse) Eier nicht zu Lebzeiten von dem Weibchen abgegeben werden. Dies trifft aber, worauf jetzt auch Szidat hinweist, nicht zu. Ich konnte mit Regelmäßigkeit die Parasiteneier, auch wenn nur ein einziges in Syngamie befindliches lebendes Weibchen sich in der Luftröhre fand, im Kote der Hühner nachweisen. Demnach ist die Geschlechtsöffnung nicht verschlossen, sondern es werden auch während der Kopulation Eier ausgestoßen. Diese Eier gelangen in das Sekret der Luftröhre und werden zum Teil ausgepruft, meist aber abgeschluckt und mit dem Darminhalte entleert. Im Kote infizierter Tiere lassen sich die Parasiteneier leicht nach Anreicherung mit konzentrierter Zuckerlösung nachweisen. Kochsalzlösung eignet sich nicht so gut. Eine Anreicherung mit Wasserglas bietet keine Vorzüge gegenüber der Zuckerlösung.

Die Eier des *Syngamus trachealis* sind 74 bis 80 μ lang und 37–50 μ breit. Wegen ihrer Größe können sie mit anderen Parasiteneiern des Geflügels kaum verwechselt werden. Sie besitzen elliptische Form und tragen an jedem Pole eine 6,2 μ große, kreisrunde Öffnung, die durch je einen kleinen, kappenartigen Deckel verschlossen ist. Die Eier weisen entweder ein gleichmäßig verteiltes Protoplasma mit einem hellen Fleck auf oder befinden sich im Wirtskörper höchstens im Furchungszustand (Abb. 1). Embryonen enthalten sie niemals. Wenn einige Autoren (vgl. Klee, Olt und Ströse, Hutyla und Marek, Reinhardt) bereits embryonierte Eier in den Parasiten oder in der Luftröhre des Geflügels gesehen haben wollen, dürfte ein Irrtum vorliegen. Die Eier embryonieren niemals in der Luftröhre oder im Darm des Geflügels, sondern erst wenn sie ins Freie gelangen und wenn bestimmte Entwicklungsbedingungen erfüllt werden. Das Embryonieren im Wirtskörper wird durch die hohe Körperwärme unterbunden. Dahingehende Versuche zeigten mir, daß die Syngamuseier bei einer Temperatur von 37 Grad C stets unverändert bleiben und bei mehrwöchiger Aufbewahrung im Brutraum ihre Entwicklungsfähigkeit sogar verlieren.

Welche Entwicklungsbedingungen sind aber notwendig?

Die geeignetste Temperatur zur raschen Embryonierung liegt zwischen 20 und 30 Grad. Unter 10 Grad bleiben die Eier unverändert. Sie verlieren aber durch Kälte nicht ihre Entwicklungsfähigkeit, sondern embryonieren, sobald man sie wieder in höhere Temperatur zurücknimmt.

Notwendig ist zur Entwicklung der Embryonen ferner eine gewisse Feuchtigkeit. Nicht Tümpel oder gar Teiche bieten hierzu die besten Bedingungen. Zu viel Wasser hemmt im Gegenteil das Embryonieren. Es genügt die gewöhnliche Feuchtigkeit des Erdbodens. Ein völliges Austrocknen des Erdbodens kommt bei etwas Gras-

wuchs kaum in Betracht. Absolute Trockenheit schädigt allerdings die Eier so, daß sie sich nicht weiter entwickeln.

Schließlich brauchen die Eier etwas Sauerstoff, der in hinreichendem Maße gewöhnlich vorhanden ist und der nur fehlt, wenn die Wassermenge, in welche die Eier abgelegt werden, oder die darüber befindliche Erdschicht sehr groß ist.

Die Zeit, in welcher sich die Embryonierung im Ei abspielt, beträgt 7 Tage. Beginnt das Material zu trocknen, so beschleunigt sich der Prozeß und kann schon nach sechs Tagen abgelaufen sein; bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad braucht er sogar nur 5 Tage.




Abb. 1.

Abb. 2.

Abb. 3.

Abb. 1. Ei von *Syngamus trachealis* vor der Embryonierung.

Abb. 2. Ei von *Syngamus trachealis* mit Embryo.

Abb. 3. Embryonen von *Syngamus trachealis* während und nach dem Schlüpfen.

Während der Entwicklung beginnt das Protoplasma zuerst Bohnen- oder Nierenform anzunehmen, dann streckt es sich zu einer gebogenen Wurst und schließlich erscheint ein mehrfach gewundener Embryo mit einem spitzen und einem stumpfen Ende (Abb. 2). Dieser Embryo zeigt häufig schon im Ei eine lebhafteste Bewegung. Nach weiteren 7–14 Tagen schlüpft er unter Sprengen der einen Kappe aus und bewegt sich schlängelnd in dem ringsherum befindlichen Medium (Abb. 3). Die Bewegungsfähigkeit der Embryonen geht nach einigen Tagen verloren. Ihr Körper ist dann starr und wird meist leicht gekrümmt. Ob die Embryonen zuvor eine Häutung durchmachen, wie es Jerke beobachtete, konnte ich nicht mit Sicherheit nachweisen. Die Länge der Embryonen beträgt 200–250 μ , die Dicke 12,4 μ . Eine Geschlechtsanlage ist noch nicht erkennbar. Bei weitem nicht alle Embryonen schlüpfen aus dem Ei, sondern oft verbleibt ein hoher Prozentsatz im Ei. Läßt man die geschlüpften Embryonen trocknen, so gehen sie nicht sofort zugrunde, sondern bleiben noch einige Zeit am Leben. Bei Zufügen von Flüssigkeit erlangen sie ihre Beweglichkeit zurück.

Meine Untersuchungen, wie lange sich die Embryonen im getrockneten Zustande halten, erstreckten sich auf einen Zeitraum von 2½ Monaten. Nach 10 Tagen waren die Embryonen noch lebensfähig, nicht dagegen nach 1 bis 2½ Monaten. Auch in den Eiern schrumpfen die Embryonen während dieser Zeit völlig und gehen zugrunde. Weitere Infektionsversuche mit Eiern, die unter verschiedenen Bedingungen aufbewahrt wurden, sollen zeigen, wie groß die Tenazität sowohl der Eier als auch der Embryonen ist. Gerade diese Lebensfähigkeit dürfte für die Bekämpfung der Seuche von besonderer Bedeutung sein, weil man verfeuchte Plätze dann nur eine bestimmte Zeit zu meiden braucht und später wieder benutzen kann. Bisher konnte

ich mit 1 und 2 Monate alten Embryonen Küken infizieren, dagegen nicht mit 4 Monate altem Material.

Sowohl durch embryonierte Eier als auch durch Embryonen gelingt es, den Rotwurm auf Hühnerküken zu übertragen. Ein Zwischenwirt ist also nicht nötig. Wenn Walker in Regenwürmern die Embryonen des *Syngamus trachealis* vorfand, so hatten die Regenwürmer die Embryonen nur mit der Erde aufgenommen. In Regenwürmern fand ich in der gleichen Weise zahlreiche mit der Erde gefressene Larven anderer Würmer. Eine Passage des Regenwurmes ist also nicht erforderlich. Nach Aufnahme der Parasiteneier vergehen bis zum Auftreten der ersten Krankheitsercheinungen gewöhnlich 14 Tage. Welchen Weg die Embryonen nehmen, ist noch nicht einwandfrei geklärt.



Abb. 4. Schnitt durch die Luftröhre eines Hühnerkükens an der Anheftungsstelle von *Syngamus trachealis*.

Nach Walker sollen sie durch die Wand der Speiseröhre nach der Luftröhre vordringen. Nach 3 Tagen konnte ich die Parasiten aber noch nicht in der Luftröhre auffinden, dagegen nach 5–6 Tagen. In dieser Zeit war eine geschlechtliche Differenzierung deutlich erkennbar. Eine Kopulation hatte noch nicht stattgefunden. Die Männchen, welche in der Zahl bei weitem die Weibchen überwogen, waren 1,82 bis 1,86 mm lang und 0,093–0,12 mm dick (Abb. 5). Die Weibchen hatten eine Länge von 1,8 mm und eine Dicke von 0,093 mm. Das Männchen hatte also in dieser Zeit noch die gleiche Größe wie das Weibchen. — Vergeblich kann man auf Krankheitsercheinungen warten, wenn für den Infektionsversuch zu alte Küken Verwendung finden. Schon 4–5 Wochen alte Küken reagieren vielfach auf die künstliche Infektion nicht, indem entweder die Embryonen gar nicht haften oder nur vereinzelte Luftröhrenwürmer sich entwickeln. Es ist dies ein Zeichen dafür, daß das Alter und die Konstitution der Hühnchen von erheblichem Einfluß sind.

Die Diagnose des Befalles mit *Syngamus trachealis* ist am lebenden Huhn nicht schwer. Schon die klinischen Symptome sind sehr typisch, so daß sie kaum mit anderen Krankheiten verwechselt werden können. Sehr leicht lassen

sich aber die Parasiten in der Luftröhre erkennen, wenn der Hals des Tieres gegen eine Lampe gehalten wird. Die Federn brauchen nicht entfernt zu werden, sondern es genügt, mit zwei Fingern die Haut unter Beiseitestreichen der Federn so nach vorn zu ziehen, daß die Luftröhre sichtbar wird. Eine Täufchung kann nur durch stark gefüllte Hautvenen verursacht werden; sie läßt sich aber vermeiden, wenn man während der Durchleuchtung die Haut hin- und herschiebt. — Weiter sichern kann man die Diagnose auch durch eine mikroskopische Untersuchung des Luftröhrensekrets; geeigneter ist aber noch nach meinen Erfahrungen eine Kotuntersuchung.

Wie würde sich nun die Bekämpfung des Rotwurmes zu gestalten haben?




Abb. 5.

Abb. 6.

Abb. 5. 6 Tage alter männlicher *Syngamus trachealis*; natürliche Größe 1,8 mm.

Abb. 6. Kopf (a) und Schwanzende (b und c) von *Syngamus trachealis*; b = Schwanzende von männlichen, c vom weiblichen Parasiten.

Auch hier gilt das alte ärztliche Wort „Vorbeugen ist besser als Heilen.“

Man müßte sich doch alles, was wir bisher über das Vorkommen und die Entwicklung der Luftröhrenwürmer kennen lernten, zunutze machen und entsprechend verfahren. Dort, wo die Syngamose heimisch ist, sollten nach Möglichkeit neue Aufzuchtplätze Verwendung finden und die Küken müßten während der ersten sechs Lebenswochen von jeder Berührung mit alten Hühnern und wildlebenden Vögeln ferngehalten werden. Das Herankommen der Vögel ließe sich durch Drahtgitter mit Oberspannung vermeiden. Auch könnte man die Gefahr der wilden Vögel durch Abschluß oder Beseitigen der Niststätten verringern. Da alte Hühner, Puten oder Fasanen Parasitenträger sind, darf man sie zum Brüten und Führen nur verwenden, wenn sie sich durch Kotuntersuchung als unverdächtig erweisen. Auch bei Ankauf von Zuchttieren, insbesondere von Fasanen, kann man sich vor der Einschleppung der Seuche durch eine Kotuntersuchung schützen. Daß jede Berührungsmöglichkeit gesunder und kranker Tiere zu vermeiden ist, halte ich für selbstverständlich.

Zur Vorbeuge empfiehlt Reinhardt dem Trinkwasser Natrium salicylicum zuzusetzen, auch wurde von verschiedenen Autoren (Ménin, Reinhardt, Eber, Hutyrá und Marek) zum Ausstreuen von Salz geraten. Dies veranlaßte mich, die Wirksamkeit verschiedener chemischer Präparate auf die Parasiteneier nachzuprüfen. Die Eier embryonierten und behielten ihr normales Aussehen in

3prozentiger Kupferfulfatlösung, in 3promilliger Eisen-sulfatlösung, in 1prozentiger Roh- und Streuchloraminlösung, in 3promilliger Betalysol, in 1 prozentiger Formalinlösung, in 5prozentigem Sulfoliquid, in „Syngamol“-Trink- und Desinfektionswasser, in 5prozentiger Lösung von Natrium salicylicum und in konzentrierter Kochsalzlösung. Auch das Bestreuen der Eier mit dicker Salzschicht verhinderte ein normales Embryonieren nicht. Nur eine 3prozentige Betalysollösung vermochte die Entwicklung der Eier völlig zu unterbinden und eine 1prozentige Eisen-sulfatlösung hemmte die Embryonierung in fast allen Eiern bis auf vereinzelte, in denen zwar Embryonen entstanden, die aber später degenerierten. — Demnach könnte nach meinen bisherigen Untersuchungen nur eine 1prozentige Eisenfulfatlösung als Trinkwasser in Frage kommen, wenn durch irgend ein Präparat die Übertragungsmöglichkeit des Trinkwassers ausgeschaltet werden soll. Betalysol könnte in 3prozentiger Lösung für die Reinigung von Tümpeln herangezogen werden.

Zum Abtöten der Eier auf dem Fußboden und an Gegenständen erwies sich ein anderes Verfahren als außerordentlich billig und brauchbar, und zwar heißes Wasser. Es gelingt schon durch einfaches Übergießen mit Wasser von 70 Grad C das Protoplasma der Eier sofort zur Gerinnung zu bringen, so daß eine Embryonierung nicht mehr stattfindet. Diese einfache Methode, mit heißem Wasser zu arbeiten und hiermit Stallräume, Aufzuchtkästen, Saugnäpfe und Futtergeschirre von den Parasiten zu befreien, können wir den Züchtern gar nicht genug empfehlen. Es ist aber zweckmäßig, nicht bloß „heißes“ Wasser zu verlangen, sondern „kochendes“, weil erfahrungsgemäß „heiß“ ein sehr dehnbarer Begriff ist und weil während des Verbrauches sich das Wasser erheblich abkühlt. — Ob wir auf diese Weise auch desinfizieren können, ist fraglich. Einfacher dürfte es sein, nach Abtragen der oberen Erdbodenschicht in den Auslauf Sand zu verbringen, der zuvor erhitzt wurde, eine Methode, die früher auch schon Ströse anwandte.

Nun zur eigentlichen Behandlung kranker Tiere!

Es ist vielfach empfohlen worden, die Parasiten mechanisch aus der Luftröhre mit einer Pinzette, mit einer Feder oder mit einem Roßhaar zu entfernen. Derartige Eingriffe sind aber ohne besondere Bedeutung für eine Behandlung im Großen, weil es nur bei ganz einzelnen Tieren gelingt, den Rotwurm herauszuziehen. Gewöhnlich sitzen die Parasiten so tief, daß man sie vom Schnabel aus nicht fassen kann, auch haften sie an der Luftröhrenschleimhaut außerordentlich fest an. Wer sich einmal mit solchen Versuchen befaßt hat, wird die für die Praxis sich ergebenden Schwierigkeiten bald einsehen. Auch der Luftröhrenschnitt kann nur in Einzelfällen in Betracht gezogen werden.

Meine ersten therapeutischen Versuche nahm ich mit „Syngamol“, einem Präparat der Firma Ziegler in Osterhagen vor. Ich vermochte aber damit 20 Küken weder gegen die Invasion zu schützen noch sie zu heilen. Auch intratracheale Injektionen 5prozentiger Lösungen von Natrium salicylicum, die von Klee und neuerdings von Szidat besonders empfohlen wurden, hatten nicht den erwarteten Erfolg. Sie bewirkten weder die Ausstoßung noch die Abtötung der Luftröhrenwürmer. Es gelang mir nicht einmal, den Syngamus zum Lösen von der Schleimhaut zu bringen, als ich eine herauspräparierte Luftröhre mit einer Lösung von Natrium salicylicum übergießte. Die Würmer zeigten in dieser Flüssigkeit noch lange Beweglichkeit und bei weiterer Aufbewahrung embryonierten in ihr die Eier normal. — Auch Injektionen von Kalium pikronitricum waren erfolglos. — Einige Küken vermochte ich durch Inhalationen von Karbolsäuredämpfen zu retten, und zwar mußten die Küken eine Woche lang täglich einmal 5 Minuten lang Dämpfe einatmen, die sich durch Ein-

gießen der Karbolsäure in kochendheißes Wasser entwickelten. Diese Inhalationen wirkten stark Husten erzeugend, ohne daß sie den Parasiten selbst abzutöten vermochten.

Mehrere Präparate prüfte ich zunächst herauspräparierten lebenden Parasiten gegenüber. Jede abtötende Wirkung ließen Terpentinöl, Flit, Hexachloraethan, Benzol, Kupfersulfat, Eisensulfat, Kamala, Arekafamen vermissen. Dagegen ging die Beweglichkeit der Würmer verloren nach der Berührung mit Blackerite, einem Präparat von Spratt, das aus Kalk und Tonbestandteilen, Eisenoxyd und einer geringen Menge Phenolen besteht.

Im Tierversuch verlagte jedoch auch Blackerite, obwohl ich es direkt in die Luftröhre einblies. — Auspünslungen der Luftröhre mit Terpentinöl führten in einigen Farmen zu befriedigenden Resultaten. Einen durchschlagenden Erfolg vermochte ich aber auch damit nicht zu erzielen.

Nach diesen Versuchen schien die Aussicht auf eine befriedigende Behandlungs- und Heilmethode recht gering und die wenig erfreulichen Behandlungsergebnisse haben auch oft die Tierärzte und Züchter empfunden. Eine günstige Wendung dieser Lage brachten mir erst vor einigen Wochen Versuche mit einem Jodderivat. Schon wenige Sekunden nach der Berührung mit diesem Präparat starben die Parasiten und nach dessen Injektion in die Luftröhre rotwurmkranker Küken wurden sämtliche darin befindliche Exemplare abgetötet. Den Erfolg der Behandlung prüfte ich stets durch Schlachtung der kranken Tiere am Tage nach der Injektion nach. — Auf die Injektion hin zeigen die Hühner meist starke Atemnot, husten heftig und sind die erste Zeit benommen. Dieser Zustand geht aber bald vorüber. Die Injektionstechnik ist nicht schwer. Mit einer 1 ccm Rekordpritze werden je nach der Größe der Tiere 0,2 bis 1 ccm Flüssigkeit in die Trachea eingespritzt. Ich verwende eine leicht gebogene Kanüle, die anstelle der Spitze eine kleine Kugel trägt. Die Kanüle wird durch die Kehlkopföffnung möglichst tief in die Luftröhre eingeführt und dann die Lösung langsam entleert. Bei einiger Übung läßt sich diese Methode bequem und schnell durchführen.

Meine Ausführungen darf ich kurz dahin zusammenfassen, daß wir unter Berücksichtigung der Entwicklungsbedingungen und der Widerstandsfähigkeit der Parasiten-eier sowie ihrer Embryonen erfolgreich gegen die Rotwurm-seuche des Geflügels vorbeugen können und daß wir in dem Jodderivat ein geeignetes Mittel zur Behandlung kranker Tiere besitzen.

Schrifttum.

Berge: Syngamus trachealis als Ursache für umfangreiches Kükensterben. D. T. W. 1920, Nr. 33, S. 384. — Csontos: Die Syngamose des Geflügels. Ref. Deutsch-österreich. Tierärztl. Wschr. 1926, Nr. 15. — Eber: Kleintier- und Geflügelkrankheiten. D. T. W. 1917, S. 348. — Fiebiger: Die tierischen Parasiten der Haus- und Nutztiere, sowie d. Menschen. Braumüller. Wien und Leipzig 1923. — Feuer-eissen: Beitrag zur Kenntnis von Syngamus trachealis. Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene Bd. 27, S. 17. — Fröhner: Jahresbericht beamt. Tierärzte Preußens 1920, Teil 2, S. 40, Berlin. — Huttyra und Marek: Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. Fischer, Jena 1920. — Jerke: Die Lungenwurmkrankheit der Haustiere und des Wildes. D. T. W. 1914, S. 177. — Klee: Der gepaarte Luftröhrenwurm (Syngamus trachealis und der Wurmhusten des Geflügels). D. T. W. 1899, S. 465. — Lewis: Stare als Verbreiter des Luftröhrenwurmes des Geflügels. Journ. of Helminthol. Bd. 3, S. 81–82 und Bd. 4, S. 43–48. — Lichtenstern: Über Syngamus trachealis bei Gänsen. Münch. t. W. 1920, S. 844. — Olt und Ströse: Die Wildkrankheiten und ihre Bekämpfung. Neumann, Neudamm 1914. — Reinhardt: Handbuch der Geflügelkrankheiten. Schaper-Hannover 1925. — Ssissow: Enzootie des Syngamus trachealis unter Küchlein. Bote f. Allg. Vet.-Wesen, Jahrg. 1926, Nr. 4, S. 189. — Sanders:

Einiges über Geflügelkrankheiten. Vet.-Journ. Bd. 82, Nr. 12, S. 602 bis 606. — Schultheis: Die Syngamose des Geflügels. In.-Diss. Gießen 1920. — Szidat: Die Parasiten des Hausgeflügels. [2. Synga-

mus trachealis (Montayn) von Siebold, ein Parasit der Luftröhre unserer Hühnervögel, seine Entwicklung und Übertragung.] Arch. für Geflügelkunde 1928, 2. Jahrg., S. 237.

Innere Medizin und Chirurgie.

Graf, Hans: „Zur Theorie der intrauterinen Kohlewirkung in ihrer Beziehung zur Prophylaxis und Therapie der komplikativen Metritis.“ (Habilitationsschrift Berlin 1928.)

In langdauernden Zuchtungsversuchen mit ubiquitären Saprophyten als Sporensponder wurden erhalten:

- a) auf Carbovent vereinzelte Hyphen, keine Fruchträger,
- b) auf Carbo medicinalis neu Merck und
- c) auf Carbo medicinalis vegetabilis Merck keine mikroskopisch erkennbaren Pilzfäden,
- d) auf Carbo medicinalis vegetabilis Ingelheim nahezu Reinkulturen von Penicillium,
- e) auf den leeren und vollen Gelatine kapseln Mucor, Pencillium, Rhizopodus, Aspergillus,
- f) auf dem Elastischen Stab außer diesen die seltene generative Form von Aspergillus flavus,
- g) auf den Kohlegranulatkonstituten Merck nach 8 Wochen ein sehr großmächtiges Myzel ohne Fruchträger.

Die Merck'schen Pulver und Granulatkonstitute gegen Verschimmelung sind sehr widerstandsfähig und eignen sich für intrauterine Kohlebehandlung besonders. Betrachtet man hierzu die Ergebnisse über die Giftwirkungen von Penicillium und auch Aspergillus auf das Nervensystem und die Kapillaren, so wird man die Granulate den Gelatinekonstituten vorziehen. Die Einführung gelatinehaltiger Konstitute nach längerer Aufbewahrung in stark feuchter Luft in die stark bakterien- und toxinhaltige Residualflüssigkeit des Uterus stellt keinen idealen therapeutischen Wert dar. Die Gelatine der Kapseln gibt dem Konstitut zwar genügende Festigkeit, hemmt aber die Loslösung und Streuung der an sich gut wirklichen Kohle.

Die Kohlegranulatstäbe kommen, kolloidchemisch betrachtet, dem idealen Pulver am nächsten. Sie geben nach der Einführung keine oder nur sehr geringe Nährsubstrate für die Bakterien ab und leiten den Auflösungsprozeß im Stagnat durch einen aktiven Sprengungsmechanismus ein. Die Festigkeit der neuen verstärkten Stifte ist bei der hohen Luftfeuchtigkeit um ca. 30 Prozent größer. Die Kohleteilchen werden nicht durch die intakte Membran resorbiert, wohl aber können sie durch Leukozyten verschleppt werden. Es wird festgestellt, wieviel von der über dem faulen Serum im geschlossenen Raum vorhandenen fiebertemperierten Dampfmenge durch die Kohlen aufgenommen werden, bis sie gesättigt sind.

Die Grenzwerte wurden nahezu erreicht bei der Kapsel nach 14, dem Granulat 2, dem Stift und Stab 8 Tagen.

Am raschesten ziehen also die Granulate aus der Zone über dem faulen Serum die Feuchtigkeit an.

Die rein mechanische Tätigkeit des Uterus ist in Bezug auf die Entwicklung der Oberfläche einer eingebrachten Kohle nur klein, deshalb muß diese künstlich durch aktive Sprengung, leichter Zerfall in die Einzelteilchen befördert werden.

Es wurde für Methylenblau-Wasser ausgerechnet, daß von der ideal notwendigen minimalen Oberfläche der Granulatmasse durch Eigenexpansion zur Wirkung gelangen: für den Stab 91,9 — 100 Prozent.

Die Adsorptionskraft der Granulate ist auch in Serum für den körperfremden Farbstoff eine sehr große.

Aus den Adsorptionsversuchen geht hervor, daß die technischen Eingriffe zur Konstituierung des Stabes keine Beein-

trächtigung der hohen Leistung feiner Kohle geschaffen haben. Die Granulatkohle entfernt aus Bouillon-Kolikultur das Indol. Auch bei Zusatz von Tyramin zu den wirklichen Kulturen ist das Adsorptionsresultat der Granulatkohle ein sehr befriedigendes. Nahezu die ganze Gruppe bakterieller Giftsubstanzen geht an die Kohle. Die Adsorptionsleistung der Granulatkohle ist auch in infiziertem Serum eine sehr gute. Es gelingt zwar nicht, alle testaffinen Gifte zu eliminieren, aber die Giftwirkung des Serums nach der Kohlebehandlung ist eine viel schwächere. Man könnte sie durch höhere Kohledosen sicher noch mehr verringern. Auch in Kulturen von B. coli 100 ccm + Tyramin 0,1 + Indol 0,1 ist der Schutz ein sehr hochgradiger, nahezu vollkommener. Gegenüber den Coli-Giften in Blutserum ist durch die über dem Gewebe liegende Kohleschicht ein vollständiger Schutz vor der Resorption vorhanden.

Nach den Versuchen kann gesagt werden, daß die Kohle nicht nur den Eintritt einer Resorptivwirkung verhindern oder erschweren kann, sondern daß sie auch den Nachschub der Gifte in die Zelle stark stört bzw. verhindert. Sie bildet eine schwerdurchdringbare Schutzschicht. Eine Schädigung der Entwicklung wirksamer Bakteriengifte wird erst durch eine Kohlemenge erreicht, welche die Feuchtigkeit des Nährbodens vollkommen aufsaugt.

Zusammenfassung: Es wurde eine durchaus befriedigende Leistung durch die Granulatstäbe erzielt. Bei Bewegung wäre diese bedeutend erhöht worden. Das Kohle-Sediment (schon bei 0,6 mm Dicke) bietet einen sehr großen Schutz vor dem Übertritt von Giften in das Gewebe. Wird das Kohlegranulat in die gifthaltigen Medien gegeben, bevor am Gewebe die toxische Wirkung auftritt, und vermag sie diese zu verhindern, so liegt eine indirekte prophylaktische Leistung vor. Sie ist in zahlreichen Versuchen experimentell nachgewiesen! Es gelang aber auch, eine indirekt therapeutische Wirkung gegen die Coli-Gifte Tyramin, Indol, Skatol u. a. nachzuweisen, indem durch Applikation von Kohle in das gifthaltige Medium im Zeitpunkt der Höhe der Reaktion diese allmählich erlosch oder sich gegenüber den Kontrollen auffällig verminderte.

Kch.

Völker, R.: Über die Beziehungen der Haffkrankheit der Menschen zur Hämoglobinurie der Tiere. (Zschr. für Inf.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 1/3, S. 147.)

Völker hat es unternommen, die Beziehungen der bei Anwohnern des Frischen Haffs in Ostpreußen im Jahre 1924 aufgetretenen sog. Haffkrankheit zur Hämoglobinurie der Tiere klarzustellen. Nach eingehender Erörterung der bisher über die Haffkrankheit (die bekanntlich mit Erkrankung der Muskulatur und Hämoglobinurie einhergeht) vorliegenden Untersuchungen, die aber die Ätiologie noch nicht in einwandfreier Weise klären konnten, vergleicht Verf. diese Krankheit mit den bei Tieren mit Muskelerkrankungen und Hämoglobinurie einhergehenden Krankheiten. Er kommt schließlich zu dem Ergebnis, daß die Haffkrankheit der Menschen mit den unter Hämoglobinurie einhergehenden Erkrankungen der Tiere, insbesondere mit der paralytischen Hämoglobinurie der Pferde, zwar gewisse Symptome gemeinsam hat, sich aber durch ihr epidemiologisches Verhalten, den klinischen Verlauf, pathologisch-histologischen Befund, sowie durch ihre Pathogenese und Ätiologie von diesen unterscheidet und sich als selbständige, verhältnismäßig wohlcharakterisierte, wenn auch noch nicht in allen Einzelheiten geklärte Erkrankung darstellt.

Ziegler.

Kreitmaier, H. und Th. Moll: **Hypervitaminose durch große Dosen Vitamin D.** (Aus dem wissenschaftlichen Laboratorium der Fabrik E. Merck in Darmstadt.) (M. m. Wschr. 1928, S. 637.)

Die Vitamine wurden bis jetzt in toxikologischer Hinsicht ziemlich indifferent angesehen, was damit zusammenhängt, daß bis vor kurzem noch keine Vitamine in reiner Form und in größeren Mengen zur Verfügung stand. Erst die Entdeckung von Windaus, daß Vitamin D nichts anderes sei, als durch ultraviolette Strahlen aktiviertes Ergosterin, ermöglichte es, ein Vitamin in unbegrenzten Mengen herzustellen. Daselbe spielt unter dem Namen Vigantol bei der Behandlung der Rachitis und ähnlichen Knochenerkrankungen eine wichtige Rolle, wobei die therapeutische und prophylaktische Wirkung schon durch kleinste Mengen erreicht wird. Verff. haben nun die Beobachtung gemacht, daß nach Verabreichung großer Dosen bestrahlten Ergosterins bei den Versuchstieren (Maus, Ratte, Meerschweinchen, Kaninchen, Katze, Hund) eine akut verlaufende Krankheit entsteht, die mit einer Verkalkung der großen und kleinsten Gefäße zusammenhängt. Im übrigen sind die Ergebnisse der Versuche folgende: Durch starke Überdosierung mit Vitamin D läßt sich Hypervitaminose experimentell erzeugen. Sie äußert sich in Beschleunigung des Stoffwechsels, vor allem des Kalkstoffwechsels. Bei gewissen Tierarten und nach bestimmten Dosen, deren Höhe für die einzelnen Tierarten verschieden ist, kommt es zu einer enormen Kalkablagerung an den dazu disponierten Stellen. Das Vitamin D ist in toxikologischer Hinsicht nicht indifferent. Es besteht jedoch für den Menschen keine Gefahr der Vergiftung, da die therapeutische Wirkungsbreite sehr groß ist; zur Erkrankung an Hypervitaminose wäre die chronische Einnahme von enormen Mengen nötig. Auf jeden Fall empfiehlt es sich aber, das Vitamin D nur in exakt dosierbarer Form zu verabreichen. Carl.

Vogt: Über die Steigerung der Brustdrüsenfunktion durch die Bestrahlung mit der künstlichen Höhensonne.

(Aus der Universitäts-Frauenklinik Tübingen. — Direktor: Professor Dr. J. Mayer.) (D. med. Wschr. 1928, Nr. 33, S. 1367.)

In der Klinik wurden bisher bei 30 stillenden Müttern die Brustdrüsen bestrahlt. Dabei wurden regelmäßig Erfolge erzielt, vorausgesetzt, daß eine gewisse Menge von Drüsengewebe vorhanden war. Unter den Fällen waren die verschiedensten Formen von Hypogalaktie. Es gelang fast stets, sofern die Bestrahlung lange genug fortgesetzt werden konnte, allein durch die Bestrahlung die Milchabsonderung deutlich zu steigern. Zur Erklärung für diese Wirkung, wird allgemein auf den lokalen Einfluß der Hyperämie durch die Höhensonne hingewiesen. Stolte glaubt dagegen an eine Allgemeinwirkung der Bestrahlung. Genau so wie in der Gravidität besteht auch während der Laktation eine negative Kalk- und Phosphorbilanz. Beim Kinde führt die Verarmung an diesen Stoffen zur englischen Krankheit, bei der stillenden Mutter aber zur ungenügenden Laktation. Stolte glaubt nun, daß die Bestrahlung mit der künstlichen Höhensonne ganz ähnlich bei stillenden Müttern wirkt wie bei Kindern mit englischer Krankheit. Verf. weist des besonderen darauf hin, daß in allen Fällen, wo infolge Mastitis die Laktation mehr oder weniger verlagert, unter allen Umständen der Versuch gemacht werden muß, mit Hilfe der Bestrahlung die Laktation wieder in Gang zu bringen. (Versuche, bei Kühen mit Hilfe der künstlichen Höhensonne die Laktation zu steigern, sind bisher günstig ausgefallen.) Zusammenfassend sagt der Autor folgendes: Wir besitzen in der Bestrahlung der Brustdrüse mit der künstlichen Höhensonne ein einfaches, wirksames und unschädliches Mittel, die primäre und sekundäre Unergiebigkeit der Brustdrüse günstig zu beeinflussen. Schmey.

Seuchenlehre u. Seuchenbekämpfung.

Bericht des Sachverständigenkomitees für veterinärpolizeiliche Maßnahmen über seine zweite Tagung vom 20. bis 23. Juni 1928 in Genf.

Das Wirtschaftskomitee des Völkerbundes hat vor einiger Zeit den Bericht des Sachverständigenkomitees für veterinärpolizeiliche Maßnahmen über die von diesem im Februar und Juni 1928 in Genf abgehaltene Tagungen veröffentlicht. In der Veröffentlichung ist der Bericht über die zweite Tagung im Juni über die Organisation des Veterinärdienstes, über die Gesundheitsberichte und die Schlußfolgerungen von allgemeinem Interesse, so daß die Übersetzung hier wiedergegeben ist:

In seinem Bericht vom 2. Februar 1928 hat das Sachverständigenkomitee für veterinärpolizeiliche Maßnahmen die Notwendigkeit festgestellt, die für jeden Staat besteht, eine staatliche Veterinärorganisation zu besitzen, die in der Lage ist, eine wirksame Gesundheitskontrolle über die gesamte Ausdehnung des in Bezirke eingeteilten Staatsgebietes auszuüben. Dieser Dienst — so führte das Komitee aus — muß einem Fachmann unterstehen, der unmittelbar dem entsprechenden Minister unterstellt ist.

Das Sachverständigenkomitee betonte ebenfalls die Notwendigkeit, daß jeder Staat regelmäßig und ohne Verzögerung einen Gesundheitsbericht veröffentlichten müsse, der nach den vom Internationalen Tierseuchenausschuß in Paris angenommenen Formeln aufzustellen ist.

Um für seine späteren Arbeiten die genaue Kenntnis der Veterinärorganisation und der Gesundheitsberichterstattung der verschiedenen Länder zu erleichtern, hat das Komitee das Wirtschaftskomitee gebeten, einen von ihm aufgestellten Fragebogen zu versenden. Dieser Fragebogen enthielt eine Reihe von Fragen, deren Kenntnis es dem Komitee erlaubte, seine Aufgabe zu verfolgen.

Der Hauptgegenstand der gegenwärtigen Tagung war das Bestreben, die erhaltenen Antworten zu prüfen, sie auf Grund der Unterlagen kritisch zu studieren und deren Angaben und Tragweite zu analysieren.

Das Sachverständigenkomitee ist der Meinung, daß die Unterlagen in vielen wichtigen Punkten mehr als ausreichend sind, um ihm zu gestatten, das Wirtschaftskomitee damit zu befragen. Es war daher der Meinung, daß es ihm möglich sei, im Prinzip eine bestimmte Ansicht über die Organisation der Veterinärdienste und über die Arten der Veröffentlichung ihrer Gesundheitsberichte äußern zu können.

1. Organisation der Veterinärdienste.

16 von den eingeladenen Staaten haben bis heute den ihnen vom Völkerbundsekretariat überfandten Fragebogen beantwortet und genaue Angaben gemacht.

Man ist auf den ersten Blick von der Tatsache überrascht, daß der Veterinärdienst fast aller europäischen Staaten nach demselben Muster organisiert zu sein scheint. Man findet nur Unterschiede von nebensächlicher Bedeutung.

Das Sachverständigenkomitee ist nach gründlichem Studium dieser Unterlagen abermals zu dem Schluß gekommen, daß eine gebieterische Notwendigkeit vorliegt, in jedem Staate einen von einem dem entsprechenden Minister unterstellten und von einem Fachmann geleiteten Veterinärdienst zu besitzen.

Es stellt mit Genugtuung fest, daß eine solche Organisation bei der großen Mehrheit der befragten Staaten vorhanden ist.

Es glaubt, die besondere Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken zu müssen, daß einige europäische Länder dieser Notwendigkeit noch nicht vollkommen genügt haben, von der die Erreichung der vom Wirtschaftskomitee verfolgten Ziele auf das engste abhängt.

Die von den verschiedenen befragten Staaten eingegangenen Informationen zeigen, daß in Bezug auf das Verhältnis zwischen der Zahl der staatlichen Veterinäre und der Ausdehnung des bebauten Landes einerseits und der Zahl des Rindviehs andererseits, je nach den betreffenden Ländern beträchtliche Unterschiede bestehen. Die Unterschiede zwischen der Zahl der Staatsveterinäre und der Ausdehnung des bebauten Landes sind übrigens viel ausgesprochener als die zwischen der Zahl der Veterinäre und der Wichtigkeit der Viehzucht.

1. Das Komitee stellt fest, daß als Staatsveterinäre nur die Veterinäre angesehen werden können, die als Staatsbeamte vom Staate bezahlt werden. Es ist der Meinung, daß Privatveterinäre ausnahmsweise mit einer offiziellen Funktion betraut werden können, daß in diesen Fällen jedoch der Staat für diese tierärztlichen Beauftragten verantwortlich ist.

2. Die Staatsveterinäre und diejenigen, die zu gewissen amtlichen Aufträgen herangezogen werden, müssen approbierte Tierärzte sein.

3. Jedes Land muß über einen Veterinär-Gesundheitsdienst verfügen, der ihm gestattet, zuverlässig und in jedem Augenblick Ursprung und Gesundheitszustand der zur Ausfuhr bestimmten Tiere zu bescheinigen.

Die Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse müssen von einem Staatsveterinär gezeichnet oder gegengezeichnet sein und unter allen Umständen die Verantwortlichkeit des Staates, der sie ausstellt, festlegen.

4. Die Gesundheitskontrolle an den Grenzen darf nur von beamteten oder vom Staate ermächtigten Veterinären ausgeübt werden.

5. Das Komitee ist nach der stattgehabten Beratung der Meinung, daß

- a) es empfehlenswert ist, daß die Beschau des zum Verkaufe und zum Verbrauch durch die Allgemeinheit bestimmten Fleisches in der Regel approbierten Tierärzten anvertraut und daß sie der Kontrolle durch den staatlichen Veterinärdienst unterzogen werde;

- b) in Bezug auf das zum Export bestimmte Fleisch und dessen Zubereitung die Gesundheitskontrolle durch Staatsveterinäre oder durch vom Staate zu diesem Zwecke ermächtigte Veterinäre ausgeübt werde.

6. Das Komitee stellt nach eingehender Beratung und in Anerkennung der Bedeutung der Desinfektion aller zum Transport von Tieren und tierischen Produkten dienenden Transportmittel mit Genugtuung fest, daß fast alle Länder, die Antworten eingefandt haben, diese Maßnahmen obligatorisch nach jedem Transport vollziehen. Es fordert, daß diese Desinfektion immer unter der Kontrolle von Staatsveterinären ausgeführt werde.

II. Gesundheitsberichte.

Entsprechend dem vom Sachverständigenkomitee in seiner Sitzung vom Februar 1928 ausgesprochenen Wunsche hat das Internationale Tierseuchenamt folgende Richtlinien für die Aufstellung der von jedem Lande zu liefernden Gesundheitsberichte aufgestellt:

1. Die Gesundheitsberichte müssen am 1. und 15. jeden Monats veröffentlicht werden und alle die vorhergehenden 14 Tage betreffenden Angaben enthalten.

2. Sie müssen auf dem direkten Wege spätestens 8 Tage nach ihrer Veröffentlichung abgehandelt werden.

3. Sie haben alle statistischen Angaben über folgende Krankheiten zu enthalten: Rinderpest, Maul- und Klauenseuche, Lungenseuche, Milzbrand, Schafpocken, Tollwut, Rotz, Beschälseuche, Schweinepest.

4. Jedes Land kann außerdem statistische oder andere Angaben über andere Krankheiten machen.

Das Internationale Tierseuchenamt hat die Formel eines einheitlichen Gesundheitsberichtes studiert. Seiner Auffassung nach müßte der Gesundheitsbericht notwendigerweise folgendes enthalten:

- a) Die Gesundheitslage am Tage der Veröffentlichung, d. h. Zahl und Angabe der Gebietseinteilung (Provinzen, Departements, Bezirke); die Zahl der verseuchten Gemeinden, unter Umständen deren Angabe; der Gattung nach die Anzahl der erkrankten und angesteckten Tiere;

- b) den Zustand der Krankheitsherde und der neuen, in dem oben erwähnten Zeitraum von 14 Tagen aufgetretenen Fälle. Das Büro des Amtes wird anlässlich der Maitagung 1929 einen Entwurf oder mehrere Entwürfe zu einem Gesundheitsberichtformular vorlegen, das den aufgestellten Forderungen entspricht.

Das Sachverständigenkomitee hat nach Prüfung die oben erwähnten Anordnungen gut geheißen; es ist der Meinung, daß das Muster zum einheitlichen Gesundheitsbericht, das demnächst aufgestellt werden soll, vorkommendenfalls in die internationalen, bilateralen oder plurilateralen Veterinär-Abmachungen aufgenommen werden solle.

Schlußfolgerungen.

Die Erklärung 1, Seite 46, die sich am Ende des Schlußaktes der Konferenz zur Abschaffung der Ein- und Ausfuhrbeschränkungen befindet, drückt den Wunsch aus, daß das Studium der Kampfmittel gegen die Tierseuchen Fachleuten anvertraut werde, um den Regierungen ein einheitliches, wirksames Vorgehen gegen die zu bekämpfenden Übel vorzuschlagen zu können, daß zugleich die souveränen Rechte jedes Staates und die Interessen des internationalen Handels berücksichtigt.

Das Sachverständigenkomitee ist der Meinung, daß die von ihm über die Organisation der Veterinärdienste und die Veröffentlichung der Gesundheitsberichte aufgestellten Grundsätze die wesentlichen Punkte zum Schutze gegen die Tierseuchen bilden und den Einfuhrländern eine not-

wendige Minimalgarantie bieten, um sie in die Lage zu setzen, in wünschenswertem Maße den Interessen des internationalen Handels, der Veterinärpolizei und dem Gesundheitsdienste Genüge zu tun.

Das Sachverständigenkomitee glaubt also dem Wirtschaftskomitee folgende einstimmige und festumrissene Meinung unterbreiten zu sollen:

„die erste Voraussetzung, um den in der Erklärung der oben erwähnten Konferenz festgelegten Zweck zu erreichen, deren Möglichkeiten und Rahmen das Wirtschaftskomitee festlegen wird, wäre, daß alle beteiligten Staaten sich ins Einvernehmen setzten, um ihren Veterinärdienst und die Veröffentlichung ihrer Gesundheitsberichte nach den in diesem Bericht umrissenen Punkten zu organisieren.“

Das Komitee hält sich weder für berechtigt noch ermächtigt, um dem Wirtschaftskomitee vorzuschlagen, in welcher Form ein internationales Vorgehen unternommen oder zu diesem Zwecke eingeleitet werden könne. Es beschränkt sich darauf, seine Meinung dahin zu äußern, daß es ihm nicht unmöglich erscheint, daß die über die Organisation der Veterinärdienste und das System der Gesundheitsberichte aufgestellten Grundsätze die Elemente einer internationalen Abmachung bilden könnten.

Standesangelegenheiten.

8. wissenschaftlicher Referierabend an der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover am 5. November 1928.

P. Dankwört: Die Hanauer Analysen-Quarzlampe und ihre Anwendung in Chemie und Medizin. In der Hanauer Analysen-Quarzlampe und ähnlichen Analysenlampen wird das von einem Quarzquecksilber-Brenner ausgestrahlte ultraviolette Licht durch einen Schwarzschilder-Filter filtriert, so daß in der Hauptfläche nur Strahlen von $365\text{ m}\mu$ hindurchgelassen werden. Dieses filtrierte ultraviolette Licht hat die merkwürdige Eigenschaft, bei vielen Stoffen eigenartige Fluoreszenzercheinungen hervorzurufen. Es hat sich seit kurzer Zeit darauf eine ganz neue Untersuchungstechnik, die Lumineszenz-Analyse, aufgebaut, die vorausichtlich auch für die Medizin große Bedeutung bekommen wird. Nach der Erklärung der Methodik wurde die Anwendung zur Untersuchung von anorganischen Stoffen, Mineralien, Edelsteinen, organischen Verbindungen besprochen. Auf dem Gebiete der Lebensmittelchemie findet die Analysen-Quarzlampe reiche Verwendung zur Unterscheidung von fetten Ölen und Mineralfetten, von Butter und Margarine, von Traubenwein und Obstwein, von Obstkraut und Rübenkraut u. a. Für Biologie und Medizin liegen in der neuen Methode noch unbearbeitete Forschungsgebiete von ungeahnter Tragweite vor. Nicht nur, daß man gewisse Hautkrankheiten und Pigmentationen in ihrem Ursprung früher identifizieren kann, als es sonst möglich war, sondern man kann auch durch mikroskopische Untersuchung im filtrierten ultravioletten Licht, für die vom Vortragenden eine einfache Apparatur zusammengestellt wurde, Stoffe ausfindig machen, die sich bis jetzt der chemischen Analyse entzogen haben. Gezeigt wurde das Porphyrinvorkommen in Eierschalen, in wachsenden Knochen, das verschiedene Leuchten von Kaninchenhaaren, die Fluoreszenz der Zähne und Hornsubstanzen. Ganz unentbehrlich ist die Analysen-Quarzlampe für das Gebiet der gerichtlichen Chemie oder Kriminalistik geworden. Hierher gehören die Auffindung von Blutspuren, Spermaflecken, die Unterscheidung von Klebstoffen und Siegel-lacken. Durch Lichtbilder wurde die Aufdeckung von Geheimchriften, Banknotenfälschungen, Radierungen auf Schecks, Übermalungen an Ölgemälden u. a. illustriert. Für solche kriminalistische Untersuchungen wurde im chemischen Institut der Tierärztlichen Hochschule vom Vortragenden in Gemeinschaft mit Dr. Jürgens eine photographische Aufnahmetechnik ausgearbeitet, mit deren Hilfe es möglich ist, die Lumineszenzbilder in Form einer Photographie dem Richter als corpus delicti vorzulegen. Eine rege Aussprache beschloß den überaus anregenden Vortrag.

Otto Zietzschmann.

Vet.-med. Fakultät der Universität Leipzig.

Antrittsvorlesung von Prof. Dr. med. vet. Berge.

Vor Sr. Magnifizenz dem Herrn Rektor der Universität, dem Herrn Dekan der Vet.-med. Fakultät, zahlreichen Mitgliedern des Lehrkörpers der Universität, sowie einer großen Zahl von Studierenden usw. hielt am 17. November 1928, 12 Uhr, Prof. Dr. med. vet. Ewald Berge im Hörsaal 16 der Universität (Augusteum) seine öffentliche Antrittsvorlesung über „Vergleichende Betrachtung der Speicheldrüsen-

erkrankung bei Pferd, Rind und Hund“. Der Vortragende führte folgendes aus: Bei einer vergleichenden Betrachtung der Speicheldrüsen-erkrankungen bei Pferd, Rind und Hund, die vorwiegend chirurgische Bedeutung haben, zeigt es sich, daß Entzündungen der Speicheldrüsen häufiger bei Pferd und Rind, selten beim Hund sind, und sich vorwiegend in der Ohrspeicheldrüse lokalisieren. Die primäre akute idiopathische Parotitis läßt Zusammenhänge mit dem Ziegenpeter des Menschen erkennen, die sekundäre Parotitis ist meist eitriger Natur. Der Infektionsstoff kann hierbei auf verschiedenen Wegen in die Drüse gelangen und hier Abszeßbildung hervorrufen. Eine recht unangenehme Komplikation bildet dabei das Überkriechen der Eiterung auf den Gesichtsnerven. Neubildungen, die gut oder bösartig sein können, finden sich beim Pferde ebenfalls meist in der Ohrspeicheldrüse; beim Rind kommen Aktinomykome vor, die ihren Sitz in allen Speicheldrüsen haben können. Wunden der Speicheldrüsen finden sich bei den verschiedenen Tieren vorzugsweise in der Ohrspeicheldrüse. Speichelfisteln werden besonders an dem Ausführungsgang der Ohrspeicheldrüse beobachtet. Konkrementbildungen finden sich wiederum im Gang der Ohrspeicheldrüse, und zwar in erster Linie beim Pferde, ganz selten bei Hund und Rind. Dieser Befund ist einerseits damit zu erklären, daß der Speichel der Einhufer mehr feste Bestandteile anorganischer Natur enthält als bei Hund und Rind, und andererseits damit, daß das Pferd im Gegensatz zu Hund und Rind die rohe Nahrung langsam kaut, wodurch die Möglichkeit des Eindringens kleiner Futterteilchen in den Speichelgang begünstigt wird. Diese Futterteilchen bilden den Kristallisationspunkt für das Konkrement. Die Speichelfeste liegen gewöhnlich in der Nähe der Ausmündung des Speichelganges. Das Gewicht der Steine schwankt sehr, es wurden Steine von 400 bis ca. 1000 Gramm beobachtet, in einem ganz seltenen Falle ein Stein von 2640 Gramm. Meist ist nur ein Stein vorhanden, es kommen aber auch manchmal mehrere vor. Die Steine brauchen zur Entwicklung längere Zeit. Sie können eine Erweiterung des Ganges — eine sog. Sialokele — zur Folge haben. Eine weitere Folge der Konkrementbildung ist die Perforation des Speichelganges, Nekrose der Backenschleimhaut und Atrophie der Speicheldrüse. Eine letzte Gruppe von Erkrankungen der Speicheldrüsen sind die Retentionszysten, die durch Verstopfung eines Ausführungsganges einer Speicheldrüse verursacht werden. Die eine dieser Retentionszysten ist Ranula, die in der Mundhöhle ihren Sitz hat; sie wird fast nur beim Hund beobachtet. Eine zweite Retentionszystenform findet sich beim Hunde an der Ventralfläche des Halses. Diese Zysten können sehr groß werden, man hat sie schon in der Größe eines Mannskopfes gesehen. Die lange Zeit umstrittene Ätiologie der Zysten ist nunmehr dahin geklärt, daß die Ranula und die Halszysten durch Verstopfung des Ausführungsganges der Unterkieferdrüse oder der großen Unterzungendrüse entstehen. Bei der jeweils abgehandelten Erkrankung wurden die gebräuchlichsten und erfolgversprechendsten Wege der Therapie angegeben.

Tierärztl. Fortbildungskursus im Bakt. Institut der Landw.-Kammer Niederschlesien. 13. und 18. Oktober 1928 in Breslau.*)

Wie schon seinerzeit bei der Einführung der Sterilitätsbehandlung veranstaltete auch jetzt das Bakteriologische Institut der Landwirtschaftskammer Niederschlesien einen Demonstrationskursus über das wichtige Gebiet der Milchhygiene und Euterkrankheiten. Infolge der sehr zahlreichen Anmeldungen seitens der Tierärzte aus Niederschlesien mußte der Kursus wiederholt werden, und zwar waren jedesmal ca. 30 Teilnehmer erschienen, die sich zum größten Teil aus Praktikern, zum geringeren aus beamteten Tierärzten zusammensetzten. Der Institutsdirektor Dr. Schumann sprach zunächst über Milchhygiene und die Bedeutung der Milchkontrolle für den Tierarzt. Zur Einführung in das Gebiet der Euterkrankheiten erläuterte dann Dr. Pallaske zunächst die anatomischen und physiologischen Verhältnisse in den Milchorganen und im Anschluß daran die pathologische Anatomie und Pathogenese der Euterkrankheiten. Im dritten Vortrag bebandelte Dr. Lerche die Bakteriologie der gefundenen und der kranken Milch. Als dann folgten klinische Demonstrationen durch Dr. Schumann und sein Vortrag über die Klinik der Euterkrankheiten, in dem besonders auf die Symptome des gelben Galtess eingegangen wurde. Die Therapie der Euterkrankheiten wurde durch Dr. Müller in einem Vortrag abgehandelt. Hervorzuheben ist, daß gegen die Streptokokken-Mastitis folgende Maßnahmen vom Institut empfohlen werden: Untersuchung der

Einzelmilchproben des gesamten Bestandes, auf Grund dieser Untersuchung Absonderung der gefundenen von den kranken Tieren, häufiges Ausmelken der erkrankten Viertel, Heilimpfung der kranken und Schutzimpfung der gefundenen Tiere mit stallspezifischer Streptokokken-Vakzine, die im Breslauer Bakteriologischen Institut hergestellt wird. Dr. Lerche demonstrierte alsdann im Laboratorium die für die Praxis gebräuchlichen Milchuntersuchungen und die Methoden, die zur Kontrolle der Vorzugsmilch angewandt werden. Zum Schluß sprach Dr. Grasnitz über den jetzigen Stand der Pasteurierungsfrage der Milch. Nach kurzer Mittagspause führte ein Gesellschaftsauto die Kurfesteilnehmer nach der Preussischen Versuchs- und Forschungsanstalt für Tierzucht in Tschechnitz bei Breslau, wofolbst eine moderne Milchwirtschaft vorgeführt wurde. Es wurden uns dort die mustergültigen Stalleinrichtungen gezeigt, ferner konnten wir uns orientieren über Anbinde-, Aufstall- und Tränkanlagen, sowie über verschiedene Methoden des Hand- und elektrischen Melkens, um eine hygienisch einwandfreie Milch zu erhalten. Auch die Milchverarbeitungsräume und die Siloanlagen in Tschechnitz boten uns viel Interessantes. Der Demonstrationskursus, der fast den ganzen Tag in Anspruch nahm, brachte dem Praktiker außerordentlich viel Anregungen, so daß man dem Bakteriologischen Institut dankbar sein muß, daß es die Initiative ergriffen hat, uns Tierärzte über das wichtige Gebiet der Milchhygiene aufzuklären.

Dr. Willenberg, Groß-Hartmannsdorf.

2. Tagung der Vereinigung der Tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten Deutschlands in Gießen am 9. und 10. November 1928.

In Nr. 47, 1928, S. 790, rechte Spalte, 2. Reihe sind die Worte von Herzog-Gießen bis Küst-Gießen zu streichen und dafür zu setzen: Olt-Gießen, Oppermann-Hannover, Paechter-.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Von dem Hessischen Ministerium für Kultus- und Bildungswesen in Darmstadt wurde als Nachfolger des am Weihnachtsabend 1927 infolge einer Infektion verstorbenen Professors Dr. Knell der Vet.-Rat Dr. med. vet. Küst, Kreistierarzt in Springe (Hannover) mit Wirkung vom 16. November 1928 zum planmäßigen außerordentlichen Professor und Direktor der geburtshilflichen und ambulatoirischen Klinik an der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Gießen ernannt. Prof. Dr. Küst ist am 2. März 1888 zu Vess, Kreis Bersenbrück, Provinz Hannover, als Sohn eines Gutsbesitzers und Pferdezüchters geboren. Er besuchte das Realgymnasium zu Quakenbrück, an dem er 1906 die Maturität erhielt. Dann widmete er sich dem Studium der Veterinärmedizin in Hannover, Dresden und Berlin. Das Tentamen physicum bestand er 1908 zu Hannover, das Staatsexamen 1910 in Berlin. 1911 wurde er ebendort zum Dr. med. vet. promoviert, war dann ein halbes Jahr Assistent und Vertreter des Kreistierarztes in Flatow (Westpreußen) und genügte im Anschluß daran seiner Militärdienstplicht beim 2. Garde-Ulanen-Regiment in Berlin, bei dem er nach erfolgreicher Übung zum Veterinär der Reserve ernannt wurde. Inzwischen wirkte er verschiedentlich als Vertreter in der Praxis und wurde am 1. September 1913 städtischer Tierarzt in Duisburg. Am 2. August 1914 rückte er als Veterinär mit der 2. Munitionskolonnenabteilung des XVI. A.-K. ins Feld, kam 1915 als Oberveterinär zum 12. Jägerregiment zu Pferd, 1917 zum Stabe der 221. Division und machte den ganzen Feldzug teils an der West-, teils an der Ostfront mit. In der ersten Zeit nach dem Kriege war er stellvertretender Leiter der Milchverforgung der Stadt Duisburg. Mit dem 1. Januar 1920 wurde ihm die Stelle eines Oberassistenten an der Ambulatorischen Klinik (unter Oppermann) an der Tierärztlichen Hochschule Hannover übertragen, die er bis zum 15. Oktober 1924, also fast 5 Jahre, inne hatte, worauf seine Ernennung zum Veterinärat des Kreises Springe (Hannover) erfolgte. — Seine Veröffentlichungen betreffen die Tumoren an den äußeren weiblichen Geschlechtsorganen, die Aphthenfeuche bei Rindern und Ziegen, die Urtikaria des Schweines, die Osteomalazie der Ziegen, das Foramen ovale beim Schaf, Urachuszysten beim Rinde und die moderne Embryotomie.

Amtstierarzt Lammert †.

Am 3. November d. Js. ist unser Kollege Amtstierarzt Lammert nach mehrwöchiger Krankheit im 61. Lebensjahre verschieden. Am 31. Dezember v. Js. konnte Kollege Lammert noch in voller Rüstig-

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 40, S. 682.

keit auf eine 25jährige amtliche Tätigkeit zurückblicken. Niemand dachte damals daran, daß wir diesen ausgezeichneten Menschen so bald verlieren müßten. Richard Lammert's Heimgang wird nicht nur von seinen näheren Freunden, sondern von allen, die mit ihm beruflich zu tun hatten, auf das schmerzlichste empfunden. Lammert ist am 15. Februar 1868 in Tespe im Kreise Lüneburg geboren und war ein echter Sohn seiner geliebten niedersächsischen Heimat. Fremden gegenüber zurückhaltend, fast wortkarg, seinen Freunden gegenüber treu und zuverlässig, war er einer jener seltenen Menschen, von welchem man sagen kann, daß er tatsächlich keinen Feind besaßen hat. Er war ein tüchtiger Diagnostiker und ein ernster, pflichttreuer Beamter, dessen Erfahrung, Urteilskraft und Hingabe das hamburgische Veterinärwesen hinsichtlich der Seuchenbekämpfung viel zu verdanken hat. Seine vornehme Gesinnung, seine persönliche Bescheidenheit und seine echte Kollegialität sichern ihm bei allen, die ihn kannten, ein treues Gedenken.

Welch' hohen Ansehens sich der Entschlafene in allen Kreisen zu erfreuen hatte, das kam bei der am 7. November d. Js. erfolgten Beisetzung in ergreifender Weise zum Ausdruck. Der Sarg verschwand völlig unter den prächtigen Blumenpenden, mit welchen die trauernden Hinterbliebenen und treue Freunde ihrer Liebe und Verehrung Ausdruck verliehen hatten. Nach der Rede des Geistlichen dankte Landestierarzt Dr. Mayer dem Entschlafenen im Namen des hamburgischen Veterinärwesens mit tief empfundenen Worten für alles, was er dem tierärztlichen Amt und dem tierärztlichen Stand gewesen war, und manches Auge schimmerte feucht, als die sterbliche Hülle unseres lieben Lammert aus der Friedhofs-Kapelle hinausgetragen und nach dem Krematorium in Ohlsdorf überführt wurde. Nach einem höheren Willen ist der Entschlafene von uns geschieden, in unserem Herzen aber hat er sich selbst ein Denkmal errichtet, das sein Andenken dauernd wach halten wird.

Namens des Tierärztlichen Hauptvereins von Hamburg und Umgegend:
Dr. Stödter, Vors.

Dr. Albert Rössle †.

Am 8. November 1928 verschied unerwartet der Direktor des städt. Schlachthofs in Ulm, Dr. Albert Rössle. Mit ihm ist ein Kollege von großem Wissen und reicher Erfahrung, ein Mann von untadeligem Charakter und beneidenswertem Humor von uns gegangen. Die Wertschätzung, deren sich der Verstorbene in allen Kreisen erfreuen durfte, kam bei der würdigen Trauerfeier in beredten Worten zum Ausdruck. Im Namen der Stadtverwaltung dankte Oberbürgermeister Dr. Schwammberger für die vorzüglichen und treuen Dienste, die Rössle der Stadt Ulm geleistet hat. Weitere Kränze wurden niedergelegt für die Beamten und Angestellten des Schlachthofs durch Dr. Molfenter, für die Metzgerinnung durch deren Obermeister Urban, für die städt. Beamtschaft, der Rössle lange Jahre Führer gewesen ist, durch Baurat Schefold, für den Tierärztlichen Landesverein in Württemberg, in dessen Ausschuß der Verstorbene lange Zeit erfolgreich tätig war, der Vorsitzende, Schlachthofdirektor Dr. Feeser, Heilbronn, für den Verein der Privat- und Gemeindetierärzte, dessen Vorstand Rössle in schwerer Zeit war, Dr. Siegel-Gerstetten für die Altherrenschaft der Münchener Burfchenschaft Alemannia Vet.-Rat Dr. Stolpp-Esslingen. Nachdem die Fahne der Alemannia sich über dem Grabe gefenkt hatte, sprach noch in zu Herzen gehenden Worten ein Vertreter der Loge, der Rössle angehörte. Dr. Feeser.

Ellenberger-Schütz Jahresbericht 1927.

Die W.d.T. will bis zu 100 Mitgliedern die Anschaffung des neuesten Ellenberger-Schütz Jahresberichtes über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinärmedizin für das Jahr 1927, erschienen 1928, dadurch erleichtern, daß sie 38 Mk. der Anschaffungskosten selbst trägt. Der Jahr-

gang wird von der W.d.T. mithin zum Preise von 60 Mk. statt 98 Mk., allerdings nur in dem beschränkten Umfange von 100 Exemplaren abgegeben. Es kann etwa jeder Vierzigte Genosse der Wirtschafts-genossenschaft von der Vergünstigung Gebrauch machen.

Neumann-Kleinpaul.

Kraftfahrer-Vereinigung Deutscher Ärzte e. V.

Gau IX. Hessen, Hessen-Nassau und Waldeck.

Sonntag, den 6. Januar 1929 Gaufahrt nach Wiesbaden. — Das Zweigbüro Frankfurt a. M. wird nach der Fellnerstr. 14, I. Stock (Ecke Eschersheimer Landstraße) verlegt. Fernsprechananschluß Amt Zeppelin Nr. 5 13 10. I. A.: Johannes Lemke, Zweigbüro-Leiter.

Photographische Vervielfältigung von Buchtexten.

Es ist noch längst nicht allgemein bekannt, daß man sich Kopien von Text, Abbildungen usw. aus Werken der Preussischen Staatsbibliothek in Berlin auf dem Wege der Photographie beschaffen kann. Man gibt genauen Titel des Buches an (Verfasser, Titel, Band, Jahrgang, Seitenzahl, möglichst auch Signatur der Bibliothek) und bestimmt, ob Originalgröße oder Verkleinerung, ferner ob das Photogramm negativ (weiß auf schwarz) oder positiv (schwarz auf weiß) sein soll. Die Preise sind außerordentlich niedrig: 10 Quadratcentimeter kosten negativ — weiße Schrift — 5 Pfg., positiv — schwarze Schrift — 10 Pfg., Ausland das doppelte. Als Unterlage für Reproduktionen von Bildern eignet sich weiß auf schwarz nicht. Das photographische Kopialverfahren ist viel billiger als eine Abschrift und selbstverständlich absolut korrekt. Man erhält nach meiner Erfahrung die photographische Kopie meist eine Woche nach Bestellung. In Eilfällen kann man aber auch schon nach drei Tagen beliefert werden; für Eilausführung zahlt man 100 Prozent Aufschlag. Die Anschrift der Dienststelle lautet: Reichszentrale für naturwissenschaftliche Berichterstattung, Berlin NW 7., Unter den Linden 38.

Reinhard Froehner.

Zu unserem Bilde.

Karl Sudhoff zum 75. Geburtstag.

Der Meister der Medizingeschichte, Geheimrat Sudhoff, o. ö. Prof. an der Universität in Leipzig, emeritierter Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin daselbst, ist am 26. November d. Js. 75 Jahre alt geworden. Sudhoff war praktischer Arzt in Düsseldorf. Durch seine Arbeiten über Paracelsus, über die Iatromathematiker u. a. Arbeiten hatte er sich als Historiker der Medizin so bekannt gemacht, daß er 1905 als o. ö. Professor nach Leipzig berufen wurde. Das von Sudhoff geschaffene Institut der Geschichte der Medizin in Leipzig wurde rasch führend. Neben den Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften (26 Bände), erschienen die Klassiker der Medizin (32 Bände), die Studien zur Geschichte der Medizin (16 Bände), das Archiv für Geschichte der Medizin (19 Bände) und das Archiv für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik (9 Bände). Sudhoff wurde 1919 Ordinarius, seit 1925 ist er nach Erreichung der Altersgrenze emeritiert. Aber er schafft in ungebrochener Arbeitslust und Arbeitskraft weiter. Auch die tierärztlichen Fachhistoriker nehmen an dem Ehrentage des Altmeisters mit aufrichtigen Glückwünschen herzlich Anteil.

Reinhard Froehner.

Personal-Nachrichten.

Übertragen: Tierarzt Dr. Richard Lehmann in Beeskow i. M. die kommissarische Verwaltung der Veterinärstation in Wehlau (Bezirk Königsberg).

Verstorben: Vet.-Rat i. R. Otto Heine in Halle a. S.; Stadttierarzt Hans Hoffmeister in Berlin; Ob.-Vet.-Rat Dr. Albert Rössle, Schlachthofdirektor in Ulm a. D.

Veterinär-medicinisches Studentenblatt.*)

Aufgaben der vet.-med. Fachgruppe.

An sechs Hochschulen und Universitäten bestehen veterinärmedizinische Fachschaften. Diese sind der Deutschen Studentenschaft angeschlossen und bilden zusammen die Veterinärmedizinische Fachgruppe.

*) Auf Anregung des zeitigen Vors. der Veterinärmedizinischen Fachgruppe der Deutschen Studentenschaft, Cand. med. vet. Ludwig

Ihre Aufgabe ist es in erster Linie, die Fachinteressen der Studierenden gegenüber Behörden und Ministerien zu vertreten. Viele Mängel Brandes, sollen der D. T. W. wieder regelmäßig Berichte über die Tätigkeit der veterinärmedizinischen Fachgruppe zugesandt werden. Ihre Veröffentlichung erfolgt wie früher unter der Überschrift „Veterinärmedizinisches Studentenblatt“.

und Lücken bestehen augenblicklich in den Studienplänen und besonders erschwerend wirkt es, daß die Prüfungsbestimmungen und Lehrpläne in den einzelnen Ländern des Reiches verschieden sind. Hier eine Änderung anzuregen, wird sich die Leitung der Fachgruppe besonders angelegen sein lassen. Wenn das erreicht ist, wird auch der allgemein gewünschte Austausch der Studierenden erleichtert und die Annäherung der einzelnen Reichsteile gefördert werden. Bei Aufstellung neuer Studienpläne ist ferner zu berücksichtigen, daß endlich dem allgemeinen Wunsch nach mehr Praxis während des Studiums entgegengekommen wird. Um diese Pläne zu verwirklichen, ist es nötig, die Standesorganisationen dafür zu gewinnen. Eine weitere Aufgabe sieht die Fachgruppe darin, den Fachschaften geeignetes Material für die Studienberatung zu vermitteln. Zum Schluß sei auf den Studientag hingewiesen, der auf Beschluß des Fachgruppentages in Danzig im Mai des nächsten Jahres stattfinden soll.

gez. Schlegelberger.

Veterinärmedizinische Fachschaft München.

Am 2. November eröffnete Geheimrat Prof. Dr. Stoss seine Vorlesungsfolge für das W.-S. 1928/29. An diesem Tage überbrachten ihm die Vorsitzenden der Veterinärmedizinischen Fachschaft unter lebhaftem Beifall des Auditoriums die Geburtstagswünsche der Studentenschaft anlässlich seines 70. Geburtstages. Am gleichen Tage beging Geheimrat Prof. Dr. Kitt seinen 70. Geburtstag. Bei dieser Gelegenheit wurde ebenfalls der Glückwunsch der Fachschaft übermittelt. Einige Tage später hatte die Fachschaft die traurige Pflicht, ihrem verehrten Lehrer, Geheimrat Prof. Dr. Schmitt die letzte Ehre zu erweisen.

L. Kutzner.

Veterinärmedizinische Fachschaft Leipzig.

W.-S. 1927/28 und S.-S. 1928.

Die letzte Fachschaftsversammlung im S.-S. 1927 setzte den Vorstand für das W.-S. 1927/28 wie folgt zusammen: Vors.: cand. med. vet. W. Lormann; Schriftf.: cand. med. vet. W. Neumer, Wirtschafts- und Kassenwart: cand. med. vet. Zimmer, Beisitzer: cand. med. vet. Nordmeyer, stud. med. vet. Knöbel. Am 13. Dezember fand im „Tunnel“ eine Weihnachtskneipe der Fachschaft statt, die auch von Seiten der Dozentenschaft und Assistentenschaft fast vollständig besucht worden ist. Als ein weiterer Ausdruck für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Lehrkörper und Studenten ist die Bildung einer gemischten Kommission zu betrachten, die über die wirtschaftlichen Verhältnisse zu beraten hat und die Vermittlungsstelle zwischen Fakultät und Studentenschaft darstellt. Da die mensa academica vor allem in der kurzen Mittagszeit zu weit von unseren Instituten entfernt liegt, sind durch Vermittlung der Fakultät unseren Studenten, die Vergünstigungen oder einen Freitisch in der mensa academica haben, dieselben Vergünstigungen in unserer Kantine eingeräumt worden. In der letzten Fachschaftsversammlung wurde der Fachausschuß für das S.-S. 1928 folgendermaßen zusammengesetzt: Vors.: cand. med. vet. W. Lormann, Schriftf.: cand. med. vet. W. Neumer, Wirtschafts- und Kassenwart: cand. med. vet. Kuntze, Beisitzer: cand. med. vet. Marwitz, stud. med. vet. Grünwaldt. Anlässlich der D.L.G.-Ausstellung in Leipzig konnte die Fachschaft mehreren Studenten Arbeits- und gute Verdienstmöglichkeit verschaffen, obwohl dies sonst vom studentischen Arbeitsvermittlungsamte getan wird. Die Fachschaft ist weiterhin bemüht, die von ihr eingerichtete fachliche Zeitschriftensammlung sowie die Zeitschriften der Nachbargebiete möglichst zu vervollständigen. Auch zur stärkeren Hebung der Pflege des Reitsports hat die Fachschaft die ersten Schritte unternommen, und sie wird es sich weiterhin angelegen sein lassen, nunmehr auch gestützt auf die Besprechungen zum Danziger Fachgruppentag, diesen Sport zu fördern.

Veterinärmedizinische Fachschaft an der Universität Leipzig.

gez. W. Lormann, Vors.

Kammer der Deutschen Studentenschaft der Tierärztlichen Hochschule in Wien.

S.-S. 1928.

Die unter Punkt 2, 3, 4, 6, 7, 8 des Würzburger Protokollens dargelegten Wünsche haben die Zustimmung des Kollegiums gefunden. Der unter Punkt 5 angeregte Reitunterricht ist von der Hochschule schon vor vielen Jahren ins Auge gefaßt worden, jedoch rückt die Verwirklichung eines solchen Planes im Rahmen des Betriebes unserer Hochschule aus

materiellen Gründen in immer weitere Ferne. Der geforderten Einführung des Latinums dürfte bei Erneuerung der Studienordnung Rechnung getragen werden, doch wäre es empfehlenswert, nicht nur Kurse und Prüfungen für Nichtlateinschüler einzuführen, sondern auch allgemeine Kurse für die klinische Terminologie abzuhalten. Als Zeitpunkt für die ebenfalls durchzuführende Studienreise nach Leipzig unter Führung von Professoren wurde als günstiger Termin der Juni des Jahres 1929 vorgeschlagen. Die Satzung für die verfahrensweise Einsetzung des gemeinsamen Arbeitsausschusses von Professoren und Studenten zur Beratung von Hochschulangelegenheiten studentischer Natur wurden für das nächste Jahr in der Sitzung des Professorenkollegiums vom 27. April d. Js. neuerdings genehmigt. Die dem Professorenkollegium eingereichte Satzung, Geschäftsordnung und Wahlordnung der Deutschen Studentenschaft wurde am 8. Juni 1928 vom Rektor genehmigt, desgl. das Studentenrecht. Die neue Studienordnung, welche die Studierenden von neun Semestern betrifft, ist vom Rektor gemeinsam mit der Kammer in Erledigung begriffen. Prof. Dr. Habacher übermittelte als Präsident der Gesellschaft der Tierärzte die Einladung an die Studentenschaft zur Teilnahme an den Sitzungen und Vorträgen der Gesellschaft, wofür ihm an dieser Stelle nochmals der beste Dank ausgesprochen sei, weil damit ein wesentlicher Schritt zur engeren Fühlungnahme mit den in Praxis stehenden Tierärzten getan ist. Im heurigen Sommersemester kam zum ersten Male ein Wettkampf zwischen unserer Hochschule und der Hochschule für Bodenkultur zur Austragung. Der Wettkampf wurde derart durchgeführt, daß in jeder der 8 Einzelkonkurrenzen jede Hochschule 4 Wettkämpfer zu stellen hatte. Wurden mehr genannt, so wurden die Leistungen der vier besten berücksichtigt. Alle Konkurrenzen waren vorgegeben: 100 m-, 800 m-, 3000 m-Lauf; Keulenweitwurf; Kugelstoßen; Schleuderballweitwurf; Weitsprung; Hochsprung 4×100 m-Staffel und ein Faustballwettkampf.

Akademische Legion.

Zur Wahrung deutscher Kulturgüter und wahrhaften Geistes, sowie zur Pflege echter Kameradschaft, schlossen sich vor Jahresfrist Jung- und Altakademiker in der Akademischen Legion zusammen. Auch die Studentenschaft unserer Hochschule beschloß die Reihen der A. L. zu stärken und die Aufstellung einer Hundertschaft zu unterstützen. Von Mann zu Mann, unter Mithilfe einer fliegenden Werbestelle ging die Werbung vor sich und nach 4 Wochen stand unsere Veterinär-Hundertschaft, als schlagende Beweise für die Notwendigkeit dieser studentischen Bewegung, die in die Zukunft weist und das Beispiel gibt, alle bodenständigen Kräfte des Volkes zusammen zu fassen, Schulter an Schulter mit ihren übrigen Kommilitonen der Akademischen Legion, auf dem Übungsplatz, um durch Schulung jene stramme Disziplin zu erzielen, die der A. L. zur Erfüllung ihrer Aufgabe unerlässlich ist. Die Leitung der A. L. und die Vertretung nach außen, liegt in den Händen des Führerausschusses, der aus gewählten Professoren und Studenten besteht und dem die Ernennung der Hundertschaftsführer zusteht. Zum Hundertschaftsführer der 12. Hundertschaft, das ist die Hundertschaft unserer Hochschule, wurde Herr Alfred Ordelt ernannt. Der Ausbildung zur Wehrhaftigkeit dienen die monatlichen Hauptübungen der gesamten A. L. sowie selbstständige Veranstaltungen der einzelnen Hundertschaften, in die sich die A. L. unterteilt. Mangels eines Mitgliedbeitrages ist die A. L. zur Deckung der Verwaltungskosten auf die Unterstützung wohlwollender Kreise angewiesen. Opferfreudig haben sich die Studierenden unserer Hochschule in den Dienst dieser idealen Bewegung gestellt, deren Förderung durch die Tierärzteschaft in ihnen neue Kraft zum weiteren Ausbau der A. L. geben soll. — Frequenz S.-S. 1928: Gesamtzahl der Hörer 283, davon 169 Inländer und 114 Ausländer. — Was das Pressewesen unserer Hochschule betrifft, so liegen die verschiedensten Zeitschriften in der Kammer auf und ist daher jedem Hörer unserer Hochschule die Möglichkeit gegeben, sich einerseits mit fachlichen Artikeln zu beschäftigen und andererseits Einblick zu nehmen in hochschul- und standespolitischen Fragen. Von den Fachzeitschriften, die bei uns ausliegen, und die uns in liebenswürdiger Weise kostenlos zur Verfügung gestellt werden, seien von den wichtigsten erwähnt: Wiener, Deutsche, Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift, der österr. Tierarzt u. a.

gez. Sepp Becher.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrzabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung fein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 49.

Ausgegeben am 8. Dezember 1928.

36. Jahrgang.

Zu Geheimrat Wehrles 60. Geburtstag.

Am 13. Dezember 1928 vollendet der Direktor der Veterinärabteilung im Reichsgesundheitsamt zu Berlin, Geheimrat Regierungsrat Dr. med. vet. h. c. et med. h. c. Erwin Wehrle in voller Gesundheit und Rüstigkeit sein 60. Lebensjahr. Geboren zu Karlsruhe i. B. hat er früh seinen Vater verloren und ist deshalb bei seinem Onkel im Pfarrhaus zu Kombach bei Wertheim aufgewachsen. In Karlsruhe besuchte er das Gymnasium, das er im Juli 1887 verließ, um sich aus Neigung zum tierärztlichen Beruf dem Studium der Tierheilkunde zuzuwenden. Die vorklinischen Semester verbrachte er in Stuttgart, die klinischen in Berlin, wo er am 24. August 1891 die Approbation als Tierarzt erhielt. Nachdem er sich wenige Wochen am Karlsruher Schlachthof betätigt hatte, trat er am 1. Oktober 1891 als Einjährig-Freiwilliger beim 1. Badischen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 14 ein. Dort wurde er nach einem halben Jahr zum Unteroffizier befördert und war als solcher gleichzeitig Assistent bei dem Großherzoglichen Bezirks- und Marstalltierarzt Kohlhepp in Karlsruhe. Nach Erfüllung seiner Militärdienstplicht trat Wehrle für 2 Jahre als Tierarzt zur Badischen Pferdeversicherungsanstalt über und bereifte in dieser Eigenschaft zur Vornahme von Schadensregulierungen und Pferderevisionen das ganze Versicherungsgebiet dieser Anstalt (Baden, Elsaß-Lothringen, Schweiz). Am 13. März 1894 erhielt er auf Grund ordnungsmäßig abgelegter Dienstprüfung die Befähigung zur Anstellung als Bezirkstierarzt. Schon einen Monat später wurde er zum Bezirkstierarzt für Heidelberg II mit dem Wohnsitz in Neckargemünd ernannt. Hier hat er sich in allen Zweigen des tierärztlichen Berufes außerordentlich rührig betätigt. In seinem Bezirk, der 27 meist in den fruchtbaren Tälern des Neckars und der Elsenz gelegene Ortschaften umfaßte, sind unter seiner Mitwirkung 10 Ortsversicherungsanstalten sowie eine Pferde- und eine Viehzuchtgenossenschaft gegründet worden. Seuchenpolizeilich waren insbesondere Maul- und Klauenfeuche, Milzbrand und Schweinerotlauf zu bekämpfen.

In seine Neckargemünder Zeit fällt auch die Gründung des eigenen Hausstandes und damit der Beginn eines glücklichen, selten harmonischen und in jeder Hinsicht vorbildlichen, zu unser aller Freude heute noch bestehenden Familienlebens. Drei fröhliche Söhne hat das Ehepaar Wehrle heranwachsen sehen: einer von ihnen ist in der Blüte der Jahre im Weltkrieg geblieben.

Nach vierjähriger Tätigkeit in Neckargemünd siedelte Wehrle im Juni 1898 in den Bezirk Mosbach über, der als einer der größten Bezirke des Badener Landes 45 Ortschaften umfaßte. Hier hat er sich als Bezirkstierarzt neben der amtlichen Bekämpfung von Tierfeuchen mit besonderer Vorliebe und viel Eifer, Fleiß, Geschick und Glück der Förderung der Tierzucht gewidmet, wozu in dem rein landwirtschaftlichen Bezirke die besten Vorbedingungen gegeben waren. Er übernahm die Leitung der vorhandenen Pferde- und Rindvieh-Zuchtgenossenschaften sowie die Beaufsichtigung einer Fohlenweide des Verbandes der Unterbadischen Pferdezuchtgenossenschaften, die mit 50—60 Kaltblüterfohlen jährlich beschickt war.

Als Mensch erfreute sich der fröhliche junge Bezirkstierarzt mit seinem sonnigen Gemüt und goldenen Humor in allen Kreisen größter Beliebtheit und Wertschätzung. Da er sich auch gesellschaftlich gerne betätigte und allenthalben Vertrauen genoß, leitete er verschiedene Vereine und war ein geschätztes Vorstandsmitglied der hauptsächlich aus Beamten bestehenden Gesellschaft „Harmonie“ in Mosbach.

Einen Wendepunkt in Wehrles Leben bedeutete das Jahr 1903, zu dessen Beginn er als kommissarischer Hilfsarbeiter in das Kaiserliche Gesundheitsamt nach Berlin berufen wurde. Sechs Monate nach seinem Eintritt in den Reichsdienst, am 1. Juli 1903, erhielt er seine Ernennung zum Regierungsrat und Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes. Als solcher bearbeitete er hauptsächlich die Angelegenheiten der Veterinärpolizei und Veterinärstatistik, wirkte aber auch bei der Erledigung von Fragen aus anderen tierärztlichen Gebieten vielfach mit. Als Referent für Veterinärpolizei war er in besonderem Maße bei der Ausarbeitung des Entwurfs von Ausführungsbestimmungen zum Reichsviehseuchengesetz mitbeteiligt. Die von ihm hierbei geleistete große Arbeit wurde durch die Verleihung des Roten Adlerordens IV. Klasse anerkannt, mit dem er am 28. Mai 1912 anlässlich des Abschlusses der gesetzgeberischen Arbeiten auf dem Gebiete des Veterinärwesens ausgezeichnet worden ist.

Während seiner Regierungsratsjahre hat Wehrle eine Reihe von monographischen Darstellungen über das Veterinärwesen in verschiedenen Ländern (Großbritannien und Irland, Belgien, Italien, Frankreich, Britisch-Indien und Argentinien) geschrieben, auch zahlreiche Beiträge in Form von kurzen Mitteilungen und Referaten aus der medizinischen

Literatur in der Berliner Tierärztlichen Wochenschrift veröffentlicht, deren geschätzter Mitarbeiter er heute noch ist. An experimentellen Untersuchungen, insbesondere solchen über Maul- und Klauenfeuchefragen, ist er mehrfach beteiligt gewesen. Im Dezember 1913 wurde ihm der Charakter als Geheimer Regierungsrat verliehen.

Als die Berliner Tierärztliche Wochenschrift vom 6. August 1914, die dem X. Internationalen Tierärztlichen Kongreß in London als Festnummer gewidmet war und für die Wehrle eine „Geschichte der Internationalen Tierärztlichen Kongresse“ geschrieben hatte, erschien, war der Weltkrieg bereits ausgebrochen. Mit ihrem Direktor von Ostertag an der Spitze ist damals fast die ganze Veterinärabteilung des Reichsgesundheitsamtes ins Feld gezogen. Wehrle, der bereits im Mai 1909 zum Stabsveterinär des Beurlaubtenstandes ernannt worden war, wurde bald zum Oberstabsveterinär befördert und mit der Stelle eines Korpsveterinärs beim V. Reservekorps beliehen. Als solcher hat er mit nie ermüdendem Eifer seine ganze Arbeitskraft für die Erhaltung der Pferdebestände seines Korps eingesetzt. Seine reichen Kenntnisse und sein ausgeprägtes Organisationstalent sind ihm insbesondere bei der Einrichtung von Pferdelazaretten und -Erholungsheimen sehr zu gute gekommen. Bei Vorgesetzten und Untergebenen in gleichem Maße beliebt hat Wehrle als Korpsveterinär Vorbildliches geleistet und sich große Verdienste erworben, die auch äußerlich durch die Verleihung des Eisernen Kreuzes II. und I. Klasse sowie des Badischen Ritterkreuzes II. Klasse mit Eichenlaub und Schwertern des Ordens vom Zähringer Löwen gewürdigt worden sind. Kein Wunder, daß unter diesen Umständen sein Generalkommando ihn nur äußerst ungern scheiden ließ, als er am 1. April 1918 aus dienstlichen Gründen ins Reichsgesundheitsamt zurückberufen wurde. Hier hat Wehrle ein überreiches Maß von Arbeit vorgefunden und zu leisten gehabt, zumal Herr von Oster-

tag nach Abschluß des Krieges nicht mehr als Direktor in das Reichsgesundheitsamt zurückkehrte. Am 25. August 1920 ist Wehrle als Nachfolger von Ostertags zum Direktor der Veterinärabteilung im Reichsgesundheitsamt ernannt worden. Was er in dieser verantwortungsvollen Stellung als immer beforgter und jederzeit hilfsbereiter Berater seiner Mitarbeiter wie auch als kenntnisreicher, streng gewissenhafter fachtechnischer Sachverständiger seiner Vorgesetzten geleistet hat und noch heute leistet, kann und soll hier im einzelnen nicht dargelegt werden.

Daß seine Tätigkeit auch bei seinen Fachgenossen und darüber hinaus in medizinischen und landwirtschaftlichen Kreisen Anerkennung gefunden hat, geht daraus hervor, daß Wehrle, der bereits im Jahre 1920 durch die Verleihung der Würde eines Ehrendoktors der Veterinärmedizin von der Berliner Tierärztlichen Hochschule ausgezeichnet wurde, im Jahre 1926 anlässlich des 50jährigen Jubiläums des Reichsgesundheitsamtes von der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover zum Ehrenbürger und weiterhin von der Medizinischen Fakultät der Hessischen Landesuniversität Gießen zum Doktor der Medizin ehrenhalber ernannt worden ist. Seine Verdienste auf landwirtschaftlichem Gebiete sind seitens der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, deren Tierfeuchenauschuß er seit Jahren als 2. Vorsitzender angehört, durch Verleihung der silbernen Max-Eyth-Denkmünze gewürdigt worden.

Die aufrichtigsten und herzlichsten Wünsche der Angehörigen des Reichsgesundheitsamtes und ebenso diejenigen seiner vielen Verehrer und Freunde zum 60. Geburtstag gehen dahin, daß Direktor Wehrle vor allem sein glückliches Temperament erhalten bleiben und daß es ihm beschieden sein möchte, in körperlicher und geistiger Frische und Gesundheit weiterhin seines verantwortungsreichen Amtes zu walten und an der Seite seiner treuen Lebensgefährtin noch lange Jahre ungetrübten Glückes zu genießen. Zeller.

(Aus der Veterinärabteilung des Reichsgesundheitsamts.)

Die histologische Wurstuntersuchung und das Lebensmittelgesetz.

Von G. Biermann.

Am 5. Juli 1927 ist das neue Reichsgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Lebensmittelgesetz, Reichsgesetzbl. I, S. 134) in Kraft getreten, zu dem die Ausführungsbestimmungen zur Zeit in Vorbereitung sind. Bei der Ausarbeitung dieser Bestimmungen sowie ihrer Durchführung wird man, soweit animalische Nahrungsmittel, insbesondere Fleisch und Fleischwaren, Wild, Fische usw. in Frage kommen, weitgehendst die anatomischen, physiologischen sowie die pathologischen und bakteriologischen Verhältnisse berücksichtigen müssen, die bei diesen Nahrungsmitteln und ihrer Kontrolle eine außerordentlich bedeutsame Rolle spielen. Daher wird dem Tierarzt als dem für diese wissenschaftlichen Zweige zuständigen Sachverständigen ein weites Betätigungsgebiet eingeräumt werden.

Aus diesem vielseitigen Arbeitsfeld sei nur ein Gebiet im Rahmen dieser Auslassung herausgegriffen und zwar das der Wurstkontrolle, über das in letzter Zeit besonders von Tierärzten gearbeitet worden ist. Durch die Untersuchungen von Braunert, Frickinger, Glamsner, Lund und Schröder, Mayer, Renner und von Seel, Zeeb und Reihling ist das Gebiet der Wurstuntersuchung, speziell das der histologischen Untersuchung der Wurst eingehend bearbeitet worden. Sie haben die Grundlagen dafür geschaffen, die Wurstuntersuchung von einer ganz neuen und sehr wichtigen Seite aus anzufassen, die für die kommende Beratung der Ausführungsbestimmungen zum neuen Lebensmittelgesetz große Bedeutung haben dürfte.

Den tierärztlichen Instituten und Laboratorien, die sich mit der Untersuchung animalischer Nahrungsmittel befassen,

werden in der Regel Wurstproben zur Beurteilung mit der Frage vorgelegt, ob die Wurst verdorben ist oder von welchen Tierarten das zur Wurfbereitung verwandte Fleisch stammt. Nur selten wird danach gefragt, was für Organe in die Wurst verarbeitet worden sind.

Bei der Leberwurst spielt die letzte Frage eine bedeutende Rolle, da diese Wurst zu einem Sammelplatz der verschiedensten Organe z. B. Lunge, Pansen, Gekröse, Milz und Euter werden kann, die der Käufer nicht in ihr vermutet. Die Untersuchungsmethoden nach dieser Richtung hin sind in den einschlägigen Lehrbüchern nur ganz kurz behandelt. In der Literatur befinden sich die ersten vereinzelt. Arbeiten der vorstehend erwähnten Autoren erst vom Jahre 1918 ab. Zum ersten Mal wurde diese wichtige Untersuchungsmethode im Winter-Semester 1927/28 anlässlich eines Fortbildungskurses für Schlachthoftierärzte von Herrn Prof. Lund-Hannover einem größeren Kreise von Fachleuten praktisch vorgeführt. Zu diesem Zwecke wurden histologische Schnitte von Leberwürsten verwandt, denen für menschlichen Genuß untaugliche Organteile, wie Augen, Ohrausschnitte usw. zugesetzt waren, die dann nach histologischer Bearbeitung auf mikroskopischem Wege nachgewiesen werden konnten. Dem vom Schlachter gekauften Wurstgut wurden verschiedene Organe zugesetzt, nach kurzem Kochen durch einen Fleischwolf getrieben, gründlich durchmischt in Därme gefüllt und nochmals aufgewellt; dann wurden wahllos Stücke zur Fixierung und Einbettung herausgeschnitten. Hierbei kam die Gaskel-Gräff'sche Gelatine-Einbettungsmethode in Anwendung und wurde als die zweckmäßigste befunden, weil bei dieser Methode die fettauflösende Alkoholbehandlung nicht erforderlich ist. Die

Schnitte wurden dann mit Sudan III oder mit Hämatoxylin-Eosin gefärbt. Es wurden auch beide Färbungen vereinigt angewandt, so daß die Schnitte neben der Fettfärbung eine distinkte Organfärbung erhielten. Es konnte gezeigt werden, daß all die verschiedenen unerlaubten Beimengungen trotz des vorherigen Kochens und der Zerkleinerung histologisch nachweisbar sind. Lund und Schröder haben diese Untersuchungen systematisch fortgeführt. (Festschrift D. T. W. 1928). Sie haben die Versuche nach folgenden Gesichtspunkten ausgebaut: a) wie lange kann das hinzugefügte Material vorher erhitzt werden, ohne daß seine Struktur leidet; b) wie sehen die histologischen Bilder bei der größtmöglichen Zerkleinerung durch die Fleischmaschine aus; c) in welchen Verdünnungen ist es noch einwandfrei nachzuweisen. Selbst wenn das Material 2 Stunden gekocht war, gelang es, die verschiedenen Gewebe zu erkennen; der Zusatz war gleichfalls nachzuweisen, nachdem die Beimengungen zerkleinert das feinste Sieb des Fleischwolfes passiert hatten. Wenn der Grundmasse Hoden oder Uterus im Verhältnis 1:50 zugefetzt war, wurden diese Organe fast in jedem Schnitt nachgewiesen, bei einer Beimengung im Verhältnis 1:100 ungefähr in jedem zweiten Schnitt.

Auf Grund der Arbeiten der genannten Autoren, kann man heute sagen, daß die histologische Untersuchung der Wurst möglich und nötig ist, und daß man sich nicht nur auf die chemische Untersuchung beschränken darf, wenn man zu einem einwandfreien Resultat bei der Beurteilung gelangen will. Diese Arbeit erfordert eine gründliche Kenntnis der Anatomie, speziell der Histologie, die nur der Tierarzt besitzt, der daher als der gegebene Fachmann für diese Untersuchungen anzusehen ist. Es ist erklärlich, daß eine Darmzotte oder ein Stück Milz oder sonst irgend ein beliebiges Organstück im normalen Schnittpräparat, nachdem es zunächst sorgsam ausgefucht, ausge schnitten und pfleglich bis zum Einbetten mit dem Deckglas behandelt ist, ein anderes Aussehen hat, als wenn es gekocht, durch die Maschine gedreht und gezerzt und in den verschiedensten Richtungen zer schnitten wurde. Man hat oft im Präparat nur Organrümpfer vor sich und doch läßt sich für den geschulten Untersucher bei genauem Vergleichen und sorgfältiger Durchmusterung fast immer sagen, was für Organe verarbeitet sind, so daß minderwertige Zusätze, seien es nun

zur Verarbeitung verbotene Organe, wie Augen, Hoden, Uterus usw. oder mangelhaft gereinigte, wie Pansen oder Gekröse, histologisch nachgewiesen werden können. Es sind durch die Möglichkeit der histologischen Untersuchung des Wurstgutes auf seine Bestandteile der Sanitätspolizei Mittel an die Hand gegeben, die Preiswürdigkeit der Wurst zu beurteilen und dadurch den Käufer vor Übervorteilung zu schützen. Schon von Seel wird bei jeder Wurftuntersuchung neben der chemischen die histologische Untersuchung gefordert, denn nur so könne seiner Meinung nach der wahre Wert einer Wurst herausgefunden werden. Durch die chemische Untersuchung könne z. B. die Verwendung von Leber zu Leberwurst praktisch kaum nachgewiesen werden, wohl aber könne diese Verwendung durch die histologische Untersuchung schnell und sicher festgestellt werden. Ferner führt er an, daß durch die chemische Untersuchung eine wasserreiche Wurst als verfälscht angesehen werden kann, trotzdem sie bedeutend mehr Nährstoffe besitzt und wertvoller ist als eine wasserarme.

In der oben erwähnten Arbeit von Lund und Schröder wurde festgestellt, daß bei einer Verarbeitung von Hoden, z. B. im Verhältnis von 1 z. H. zum Wurstgut, das hinzugefetzte Organ in einer bestimmten Zahl von Schnitten gefunden wurde. Vielleicht wird es möglich, mit Hilfe der histologischen Methode nicht nur eine qualitative, sondern auch eine quantitative Feststellung des zum Wurstgut verwendeten Materials herbeizuführen, so daß die prozentuale Zusammensetzung mit einiger Sicherheit bestimmt werden kann. Diese Frage kann aber erst nach umfangreichen Versuchen endgültig beantwortet werden. Immerhin wird die histologische Untersuchung unentbehrlich sein im Hinblick auf den § 5 Ziffer 4 des Lebensmittelgesetzes, wonach Begriffsbestimmungen für die einzelnen Lebensmittel aufzustellen und Grundsätze darüber festzusetzen sind, unter welchen Voraussetzungen Lebensmittel als verdorben*), nachgemacht oder verfälscht unter die Verbote des § 4 des neuen Lebensmittelgesetzes fallen, sowie welche Bezeichnungen, Angaben oder Aufmachungen als irreführend diesem Verbot unterliegen.

*) Zum Nachweis des Grades der Verdorbenheit kommen andere Untersuchungsmethoden in Frage.

Zur tierärztlichen Fortbildung.

Von Cl. Giese, Berlin.

Wenn man heute die tierärztlichen Fachzeitschriften durchsieht, so ist es eine Freude, festzustellen, wie die vor etwa 2½ Jahren vom Reichsministerium des Innern ausgegangene Anregung, bei den Tierärzten durch periodisch abzuhaltende Fortbildungskurse etwa vorhandene Lücken in der Ausbildung auszufüllen und sie mit den neuesten Errungenschaften der Wissenschaft und Praxis vertraut zu machen, mit anderen Worten: die tierärztliche Fortbildung entsprechend der ärztlichen Fortbildung zu organisieren, sich in der kurzen Zeit ausgewirkt hat. Fast in jeder Nummer findet sich irgend eine Anzeige oder Mitteilung über einen stattfindenden oder stattgehabten Fortbildungskurses, sei es ein vom Deutschen Veterinärat oder ein von den tierärztlichen Hochschulen und veterinärmedizinischen Fakultäten, von irgend einer Landwirtschaftskammer oder gar von einem tierärztlichen Verein veranstalteter Kursus oder auch eine vom „Tierärzterundfunk“ eingerichtete Vortragsreihe. Namentlich sind es die vom Deutschen Veterinärat abgehaltenen Fortbildungskurse, denen das größte Interesse entgegengebracht wird, einmal weil sie von der ältesten Ständevertretung ausgehen, deren Wiederauf- und Ausbau die Angehörigen aller Fachgruppen in den Vorjahren lebhaft beschäftigt hat, zum anderen weil diese Kurse nicht an bestimmte Örtlichkeiten gebunden sind, sondern an vielen

Orten stattfinden und regionär so verteilt sind, daß auch die äußersten Winkel unseres Vaterlandes bedacht werden.

Gerade auf diese Art der Abhaltung der Kurse, „daß der Dozent sich zu dem Hörer begibt“, war vom Reichsministerium des Innern bei den seinerzeit mit dem Preussischen Landwirtschaftsministerium und den verschiedenen Ständevertretungen gepflogenen Beratungen über die Organisation des tierärztlichen Fortbildungswesens der größte Wert beigelegt worden, um auf diese Weise auch denjenigen Tierärzten Gelegenheit zur Fortbildung zu geben, die sich früher aus wirtschaftlichen Gründen von den Fortbildungskursen der Hochschulen und Fakultäten ferngehalten haben oder fernhalten mußten. Bestimmend war hierbei die Absicht, den Gedanken der beruflichen Fortbildung möglichst weit in die Reihe der Praktiker hinauszutragen. Wenn man sich die Orte ansieht, an denen seit ihrer Aufnahme die Kurse abgehalten wurden, dann muß anerkannt werden, daß der D.V.R. die Aufgabe der Abhaltung der Fortbildungskurse nach diesem neuen Prinzip in hervorragender Weise gelöst hat. Es wurden im Jahre 1927/28 folgende Kurse abgehalten:

in Kiel am 29. und 30. Januar 1927,

in Stettin am 19. und 20. Februar 1927,

in Königsberg i. Pr. am 25. bis 27. Februar 1927,

in Gießen am 12. und 13. März 1927,
 in Perleberg am 2. und 3. April 1927,
 in Leipzig am 30. April und 1. Mai 1927,
 in Landsberg a. W. am 30. April und 1. Mai 1927,
 in Berlin am 28. und 29. Mai 1927,
 in München am 30. und 31. Juli 1927,
 in Würzburg am 5. und 6. November 1927,
 in Düsseldorf am 5. und 6. November 1927,
 in Breslau am 26. und 27. November 1927,
 in Magdeburg am 3. und 4. Dezember 1927,
 in Kailerslautern am 4. und 5. Februar 1928,
 in Oldenburg am 21. und 22. Januar 1928,
 in Erfurt am 28. und 29. Januar 1928,
 in Dortmund am 4. und 5. Februar 1928,
 in Hannover am 25. und 26. Februar 1928,
 in Rostock am 10., 11. und 12. März 1928,
 in Cottbus am 17. und 18. März 1928.

Es war bei den erwähnten Vorbereitungen im Reichsministerium des Innern ferner großer Wert darauf gelegt worden, daß die Teilnahme an den Kursen, wenn nicht ohne Kosten, so doch nur gegen eine mäßige Gebühr ermöglicht werden sollte. Die Teilnahme an den ersten vier Kursen war denn auch versuchsweise frei, für die übrigen ist eine Teilnehmergebühr von 10 RM. erhoben worden. Die Erhebung des Beitrags erwies sich als notwendig, um für die Kurse auf die Dauer die besten Fachleute gewinnen zu können. Die Gebühr muß für das in den Kursen Gebotene als sehr mäßig bezeichnet werden; sie wird auch von den Teilnehmern gerne bezahlt.

Es wird sicher von Interesse sein, etwas Näheres über die Kosten der Fortbildungskurse, die nicht gering sind, zu erfahren. Die Gesamtkosten der vorstehend aufgeführten 20 Kurse beliefen sich auf rund 19761 RM. Sie setzten sich zusammen aus den Ausgaben für Vortragshonorare und Reisekosten der Vortragenden von rund 15089 RM. und aus den sachlichen Kosten (Bereitstellung von Versuchs- und Demonstrationstieren, Leihgebühr für Film- und Projektionsapparate, Mieten für Räumlichkeiten, Entschädigung an Institutsgehilfen, Arbeiter, Heizung, Reinemachefrauen usw.) von rund 4672 RM. Demnach betrugen die Ausgaben im Durchschnitt für einen Fortbildungskurs rund 1000 RM. Die Gesamteinnahme aus den erhobenen Teilnehmergebühren beliefen sich auf 11995 RM., die Durchschnittseinnahmen aus den 16 Kursen betragen somit rund 854 RM. Jeder Kursus erforderte also einen Zuschuß von rund 308 RM. Diese Zuschüsse werden vornehmlich aus den alljährlich zu Zwecken der tierärztlichen Fortbildung zur Verfügung gestellten Mitteln des Reichsministeriums des Innern, ferner aus Beihilfen des Preussischen Landwirtschaftsministeriums und anderer Landeszentralbehörden sowie aus Geldmitteln des D.V.R. bestritten.

Die Vortragsgegenstände in den einzelnen Kursen waren je nach der Gegend, in welcher der Fortbildungskursus abgehalten wurde und je nach den bestehenden örtlichen Erfordernissen verschieden. Es war nach den vorangegangenen Beratungen über die Organisation der tierärztlichen Fortbildung beabsichtigt, namentlich folgende Lehrgebiete bei den Vorträgen zu berücksichtigen: Fleischbeschau mit Berücksichtigung der bakteriologischen Fleischuntersuchung, Verhalten beim Vorliegen des Verdachtes von Fleischvergiftungen, Chirurgie (Vorführen von neuzeitlichen Operationen verschiedener Art), Bekämpfung der Unfruchtbarkeit und der Aufzuchtkrankheiten, Milch- und Nahrungsmittelkontrolle und neuzeitliche Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche. Bei den stattgehabten Kursen wurde außer für die vorstehend aufgeführten Lehrgebiete auch für Vorträge über neuzeitliche Geburtshilfe, über böartige Euterkrankheiten, über Schweinekrankheiten, Fütterungsfragen, Organotherapie und Tierzucht Interesse bekundet. Ganz besonderes Interesse erweckten die Fremd-

körperoperationen am Rind (nach Kübitz, Hofmann und Götze), die bei mehreren Kursen an lebenden, zum Schlachten bestimmten Rindern vorgeführt wurden; auch Vorträge über die Feststellung und Behandlung der Unfruchtbarkeit mit Demonstrationen an sterilen, an kurz-, halb- und hochtragenden Rindern fanden bei den praktischen Tierärzten großen Anklang. Es müssen besonders hervorgehoben werden die Vorträge in Stettin und Königsberg, wo etwa 20 Kühe aufgestellt waren, die von Fachtierärzten genau untersucht waren und bei denen der Befund und die Hauptmerkmale auf Tafeln über den Tieren aufgezeichnet waren. Die Teilnehmer konnten auf diese Weise leicht Nachuntersuchungen vornehmen und die charakteristischen Symptome feststellen. Auch die Vorführung des vor kurzem eingeführten „VacuFact“, der im Film und an Kälberföten gezeigt wurde, erregte großes Interesse. In letzter Zeit wurden auch Vorträge über Geflügelkrankheiten, ein Gebiet, das in Zukunft den Tierärzten ein größeres Betätigungsfeld zu bieten vermag, sehr gewünscht. — Die Vorträge dauerten jeweils 45—50 Minuten; über jeden Vortrag fand eine meist eingehende Aussprache statt, eine Einrichtung, die von allen Teilnehmern als sehr zweckmäßig befunden wurde. —

Ursprünglich war beabsichtigt worden, dreitägige Kurse (Freitag bis Sonntag) abzuhalten, zweitägige Kurse (Sonntag und Sonntag) haben sich aber als zweckmäßiger herausgestellt, weil für viele Tierärzte ein dreitägiger Kurs eine 4—5tägige Abwesenheit vom Orte der Niederlassung verlangt, was für viele als zu teuer und praxischädigend empfunden wurde. — Die Vortragenden waren in der Hauptsache Professoren der Tierärztlichen Hochschulen und Fakultäten, daneben haben sich in dankenswerter Weise auch beamtete Tierärzte, Fachtierärzte und praktische Tierärzte zur Verfügung gestellt.

Was endlich den Besuch der Kurse angeht, so wird von dem Präsidenten des D.V.R., Prof. Dr. Stang, die Durchschnittszahl der Teilnehmer an einem Fortbildungskursus mit mindestens 100 angegeben. In den von April 1927 bis März 1928 abgehaltenen 16 Fortbildungskursen betrug die Zahl der Tierärzte, die gegen Entrichtung der Gebühr von 10 RM. an den Kursen teilgenommen haben, 1602. Hierbei sind die Tierärzte, die mit der Organisation am jeweiligen Kursort betraut waren, Institutsangehörige und die Dozenten, die ohne Entrichtung einer Gebühr an den Kursen teilnahmen, nicht eingerechnet; das sind insgesamt etwa 200. Die große Anzahl der Teilnehmer an den einzelnen Fortbildungskursen und die rege Anteilnahme an den den Vorträgen sich anschließenden Aussprache sowie der wiederholt bekundete Wunsch, bald wieder einen Kursus am gleichen Ort abhalten zu lassen, zeigen, welche Wichtigkeit die Tierärzteschaft der Einrichtung beimißt und wie stark das Bedürfnis nach Fortbildung ist. Hält sich das Interesse in Zukunft auf der gleichen Höhe, so kann man hinsichtlich der erwähnten Teilnehmerzahl und unter Berücksichtigung der Zahl der Teilnehmer an den von den Hochschulen und Fakultäten usw. abgehaltenen Kursen sagen, daß alle Jahre etwa ein Viertel aller Tierärzte an Fortbildungskursen teilnimmt oder anders ausgedrückt: daß jeder deutsche Tierarzt alle vier Jahre etwas für seine Fortbildung tut. Damit wäre der Stand wie bei der ärztlichen Fortbildung erreicht.

Der D.V.R. hat für die zukünftige Abhaltung der Fortbildungskurse folgenden Plan aufgestellt: Das Reichsgebiet wird in 22 Kursbezirke eingeteilt, 8 rechts der Elbe, 8 links der Elbe und 6 in Süddeutschland, jedes Jahr sollen 14 Kurse durchgeführt werden, und zwar 4 rechts und 4 links der Elbe und 3 in Süddeutschland, so daß alle 2 Jahre jeder Kursbezirk seinen Fortbildungskursus haben würde.

Meine Abhandlung über die tierärztliche Fortbildung wäre unvollständig, wenn der „tierärztliche Fortbildungsrundfunk“ unerwähnt bliebe. Schon im vorigen Jahre nach

einjährigem Bestehen des „Tierärzterundfunks“ habe ich ausführen können, daß auch der „Tierärzterundfunk“, das modernste Hilfsmittel der Fortbildung, das gehalten hat, was man von ihm erwartete. Das trifft auch heute noch zu. Zwar kann der Rundfunk einen Fortbildungskursus nicht ersetzen, er kann vielmehr nur eine Unterstützung der Fortbildung darstellen, indem er sich namentlich an die in kleinen Orten und auf dem Lande wohnenden Kollegen wendet, diesen eine kleine Möglichkeit der beruflichen Weiterbildung erschließt und ihnen Gelegenheit bietet, wissenschaftliche Vorträge zu hören und neben Belehrung auch Anregungen zu empfangen.

Zwei Namen werden unauslöschlich mit der Geschichte

der tierärztlichen Fortbildung verbunden sein: D a m m a n n und S t a n g. Ministerialdirektor Dr. D a m m a n n wegen der von ihm ausgegangenen Anregung für die Organisation der Berufsfortbildung der Tierärzte und wegen der Ermöglichung der Durchführung durch Bereitstellung von Reichsmitteln, der ehemalige ehrenamtliche Geschäftsführer und spätere Präsident des D.V.R. Prof. Dr. S t a n g, weil er die Anregungen — wie wir aus den vorstehenden Ausführungen ersehen — in mustergültiger Weise in die Tat umgesetzt und damit bewirkt hat, daß die Fortbildungskurse des D.V.R. zum Segen der deutschen Tierärzteschaft, insbesondere der praktischen Tierärzte eine ständige Einrichtung geworden sind.

(Aus der Veterinärabteilung des Reichsgesundheitsamtes, Zweigstätte Dahlem.)

Zur Frage der Schutzimpfung der Hunde gegen die Tollwut.

(Mit 1 Abbildung und 2 Tabellen im Texte.)

Von P. Karmann.

Zum Schutze der Menschen vor der Tollwut gibt es eine Reihe bewährter Verfahren, von denen das P a s t e u r'sche das älteste und das am meisten angewandte ist. Alle ließen sich ohne weiteres für das Tier, im besonderen für den Hund, gebrauchen, wenn sie weniger umständlich und weniger kostspielig wären. Ein weiterer Nachteil der beim Menschen angewandten Verfahren besteht darin, daß sie eine große Impfstoffmenge erfordern, die für Massenimpfungen von Hunden schwer zu beschaffen ist. In einer früheren Veröffentlichung habe ich (18) bereits darauf hingewiesen, daß eine Methode, die zur Schutzimpfung von Hunden dienen soll, möglichst einfach und möglichst auf einmal ausführbar sein muß. Ferner muß sie bei vollkommener Ungefährlichkeit für das zu impfende Tier (keine Impfwut!) einen sicheren und lange dauernden Schutz herbeiführen.

Die Japaner U m e n o und D o i (38) haben ein Impfverfahren für Hunde angegeben, das nur eine einzige Einspritzung erfordert und einen zuverlässigen Schutz verleihen soll. Sie gewinnen ihren Impfstoff aus dem Gehirn und dem Rückenmark von Kaninchen, die mit einem Virus fixe behandelt werden, das spätestens 7 Tage nach der subduralen Infektion zum Ausbruch der Wutkrankheit führt. Sobald die Tiere den Höhepunkt der Krankheit erreicht haben, werden sie getötet. Gehirn und Rückenmark werden herausgenommen, fein zerrieben und mit der vier bis fünffachen Gewichtsmenge einer Glycerin-Karbol-Kochsalzlösung (40 Teile 0,5prozentiger Karbol-Kochsalzlösung und 60 Teile Glycerin) vermischt. Diese Emulsion ist wegen ihrer zu hohen Virulenz für Impfzwecke noch nicht verwendbar. Sie muß erst durch Stehenlassen bei Zimmertemperatur (14 Tage bei etwa 18 Grad C) oder im Eischrank (30 Tage lang) abgeschwächt werden. Nach Ablauf dieser Zeit ist der Impfstoff gebrauchsfertig. Hunde erhalten davon einmal subkutan 3—5 ccm, zweckmäßig auf mehrere Körperstellen verteilt. Die Haltbarkeit der Vakzine beträgt etwa 3 Wochen (A u j e s z k y [2]).

H a t a (15) berichtet, daß in Tokio und in Yokohama mit dem Impfstoff nach U m e n o und D o i über 100 000 Hunde erfolgreich präinfektionell geimpft worden sind. In Amerika ist das japanische Verfahren gleichfalls bei einer großen Zahl von Hunden angewandt worden. Über günstige Impfergebnisse dortselbst haben E i c h h o r n und L y o n (6), S c h e r n (31, 32), der den Impfstoff nach U m e n o und D o i modifizierte, und andere berichtet. Weniger günstig verliefen die Nachprüfungsversuche S c h o e n i n g s (37). In neuerer Zeit ist man nach B e d e r k e (4) in Nordamerika in manchen Bezirken, so in Los Angeles, von der Tollwutschutzimpfung der Hunde wieder abgekommen. In Italien hat man nach K i t t (19) mit der von F i n z i modifizierten Schutzimpfung nach U m e n o und D o i gute Erfolge erzielt.

In Deutschland und Österreich wurde das japanische Verfahren bisher von M i e ß n e r und B a a r s (3, 24, 25, 26), G i e s e (11) und W i r t h (39) nachgeprüft. M i e ß n e r und B a a r s haben unter Verwendung von Virus fixe Breslau eine Vakzine hergestellt, die Kaninchen nach subduraler Einspritzung in 7—10 Tagen tötete, während

das frische Virus fixe Breslau den Tod der Kaninchen in 6—7 Tagen zur Folge hatte. Von dieser Vakzine haben sie insgesamt 40 Hunden je 5 ccm subkutan injiziert. Die beiden Autoren kamen zu dem Ergebnis, daß der japanische Impfstoff zwar einen sicheren Schutz gegen eine spätere intramuskuläre Wutinfektion verleihe, daß aber bei Verwendung von Virus fixe Breslau die Impfdosis von 5 ccm zu groß und Impferkrankungen möglich seien. Vielfach rufe der Impfstoff — wahrscheinlich wegen seines Glyceringehaltes — Hautentzündungen oder Abszesse in der Umgebung der Impfstellen hervor. G i e s e hat mit japanischer Vakzine 45 Hunde vorbehandelt. Von diesen Tieren starben 2 interkurrent, 4 verendeten einige Zeit nach der Impfung an Wut. Von den übrigbleibenden 39 Hunden erwiesen sich 33 immun gegen eine Infektion mit frischem Straßenvirus, während 6 infolge mangelnder Immunität an Wut eingingen. Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß das japanische Verfahren zwar Hunden einen Schutz gegen eine künstliche Infektion mit Straßenvirus zu verleihen vermag, daß aber dieser Schutz nicht in allen Fällen ausreicht. Andererseits kann der Impfstoff nicht als ungefährlich bezeichnet werden, da er in den Versuchen von G i e s e bei 4 Hunden Tollwut hervorrief. W i r t h hat im Jahre 1925 6 Hunde und im Jahre 1926 238 Hunde mit japanischem Impfstoff, der für Kaninchen bei subduraler Injektion avirulent war, geimpft. Die Hunde erhielten subkutan je 0,5—1,0 ccm Vakzine. Die Impfungen wurden im allgemeinen gut vertragen, doch beobachtete W i r t h im Anfang häufig Abszesse und Hautverdickungen an den Injektionsstellen. Er führt diese unangenehmen Nebenerscheinungen auf eine zu starke Konzentration des Impfstoffes zurück. Einen Fall von Impfwut oder von spontaner Wut hat W i r t h unter den Geimpften nicht gesehen.

Wie beim japanischen Verfahren ist auch bei der Lyssinimpfung der Hunde nach M i e ß n e r und B a a r s nur eine einzige Einspritzung erforderlich. Nach ihren Angaben wird das Lyssin in folgender Weise gewonnen: Gehirn und Rückenmark von Virus-fixe-Kaninchen werden fein zerrieben. Dabei wird zu 5 Teilen Nervensubstanz 1 Teil Kreidepulver gegeben. Nachdem die Masse zu einem gleichmäßig dicken Brei verrieben ist, wird sie in der dreifachen Menge physiologischer Kochsalzlösung aufgeschwemmt, durch ein feines Drahtsieb in eine Trockenschale filtriert und innerhalb von 24 Stunden bei 25 Grad C im Faust-Heim'schen Exsikkator getrocknet. Der inzwischen an den Schalenboden angetrocknete Brei wird mit einem Spatel losgestoßen und zu Pulver verrieben. Aus 1 Gramm frischem Virus fixe stellen M i e ß n e r und B a a r s 0,364 Gramm Kreidelyssin her. Das Lyssin soll mindestens 60 Tage haltbar sein. Es ist leicht aufzubewahren und bequem zu versenden. Zum Gebrauche wird es in der dreifachen Menge physiologischer Kochsalzlösung gleichmäßig verrieben. M i e ß n e r und B a a r s haben insgesamt 120 Hunde mit Lyssin geimpft und dabei festgestellt, daß es mit einer einzigen subkutanen Injektion gelingt, Hunde gegen Tollwut präinfektionell zu immunisieren. Bei einer Impfdosis von 0,33 Gramm Kreidelyssin sei ein Ausbruch von Impftollwut nicht zu befürchten. Der Impfschutz erstreckte sich über 1 Jahr. Großen Wert legen M i e ß n e r und B a a r s auf die Virulenzprüfung des Lyssins. Das bei ihren Versuchen verwendete Lyssin tötete Kaninchen nach sub-

duraler Infektion in 6—9 Tagen. Zu einem weniger günstigen Urteil über das Lyssin ist Herrmann (16) gekommen. Nach seinen Erfahrungen kann das Lyssin nicht als gefahrlos angesehen werden. Außerdem biete es bei einmaliger subkutaner Einverleibung nur einen verhältnismäßig geringen Schutz gegen Tollwut.

Neben dem japanischen und dem Lyssin-Verfahren zeichnet sich die Schnürer'sche (34, 35) Impfmethode durch große Einfachheit aus. Schnürer immunisiert feine Hunde subkutan oder intraperitoneal mit frischem, durch Gaze filtriertem Virus fixe (Wien). Die Tiere erhalten an vier auf einander folgenden Tagen insgesamt 0,76 Gramm Virus fixe einverleibt. Die Impfungen werden von den Hunden im allgemeinen gut vertragen. Nur in seltenen Fällen sind geringe Temperatursteigerungen, lokale Ödeme und Mattigkeit zu beobachten. Andere einfache Impfverfahren für Hunde stammen von Puntoni (28) und von Remlinger (30).

Besondere Beachtung verdient nach meiner Meinung die Vakzination nach Fermi (7,8). Die Fermi'sche Vakzine ist eine 5prozentige, 1—10 Tage alte Aufschwemmung von lebendem, durch Zusatz von 1 Prozent Karbolsäure avirulent gemachtem Virus fixe. Die Vakzine besitzt nach Fermi bei vollkommener Unschädlichkeit ein ausgezeichnetes Immunisierungsvermögen. Als weiterer Vorteil kommt hinzu, daß die Vakzine leicht und schnell hergestellt werden kann. Später hat Fermi die Vakzinebehandlung mit einer Serumimpfung verbunden und damit beim Menschen noch bessere Erfolge erzielt als mit der Vakzination allein. Den Vorteilen des Fermi'schen Verfahrens steht der große Nachteil gegenüber, daß es eine große Anzahl von Einspritzungen erfordert. So verlangt die Vorschrift, daß Hunde von dem „Antilyssin“ genannten Impfstoff 15 Tage lang täglich 2 subkutane Injektionen zu 3—5 ccm erhalten.

Eigene Untersuchungen.

a) Allgemeine und technische Vorbemerkungen.

Nachdem im Reichsgesundheitsamte bereits in den Jahren 1924/26 von Giese Tollwutschutzimpfungsversuche bei Hunden, in der Hauptsache nach dem japanischen Verfahren, ausgeführt worden sind, habe ich in den Jahren 1926/27 noch eine Reihe von Versuchen mit der Vakzine nach Fermi, der Vakzine nach Umeno und Doi sowie mit dem Mießner'schen Lyssin vorgenommen. Leider waren mir durch die örtlichen Verhältnisse bestimmte Grenzen gezogen, so daß die Wirksamkeit der genannten Impfstoffe jeweils nur an einer beschränkten Anzahl von Hunden geprüft werden konnte.


Zu den Versuchen sind nur vollkommen gesunde Hunde verwendet worden. Sie wurden einzeln in Käfigen untergebracht und mindestens 30 Tage lang genau beobachtet, ehe sie in den Versuch genommen wurden. Dann wurde einem Teil der Hunde Impfstoff und nach einer bestimmten Zeit zur Prüfung des Immunitätszustandes Straßenvirus injiziert. Der andere Teil der Hunde (Kontrollhunde) erhielt nur Straßenvirus. Nach dessen Injektion wurden die Hunde mindestens 6 Monate lang beobachtet, wobei dem allenfallsigen Auftreten von Wutsymptomen besonderes Augenmerk zugewandt worden ist.

Die zur Gewinnung und zur Prüfung der Impfstoffe sowie die als Kontrollen dienenden Kaninchen waren ebenfalls einwandfrei gesund. Sie wurden wie die Hunde in Einzelkäfigen gehalten und beobachtet.

Die verschiedenen Impfstoffe (Fermi-Vakzine, Impfstoff nach Umeno und Doi, Lyssin nach Mießner und Baars) habe ich genau nach den Originalvorschriften unter Verwendung von Virus fixe Breslau, das mir Herr Prof. Koch-Berlin in liebenswürdiger Weise überließ, mit Hilfe von Kaninchen hergestellt.

Die der Gewinnung und Prüfung der Vakzinen dienenden Kaninchen habe ich intrazerebral infiziert. Dabei hat sich mir folgendes Schnellverfahren gut bewährt: Die Kopfhaut der Kaninchen wurde in der Gegend der in Aussicht genommenen Einstichstelle (an der linken oder der rechten Schädelseite) durch Rasieren oder durch Behandeln mit einem Enthaarungsmittel von Haaren befreit, mit warmem

Wasser gereinigt, getrocknet und mit einem Jodanstrich versehen. Dann wurden die Tiere in eine leichte Chloroformnarkose versetzt. In dem Winkel, den die Sagittal- und die Koronarnaht mit einander bilden, wurde ein einfacher, spitzer, etwa 0,6 cm langer, frisch sterilisierter Metallpfriem (s. Abb.) durch die Haut und die Schädelwand getrieben.



Pfriem zur intrazerebralen Injektion bei Kaninchen (vergrößert).

Durch die entstandene Öffnung wurde eine feine Injektionskanüle eingeführt und damit die Einspritzung vorgenommen. Die ganze Operation geht sehr leicht und rasch vor sich, wenn der Pfriem genügend spitz ist. Zweckmäßig ist es, den Pfriem mit einer verstellbaren Metallplatte zu versehen, um fein zu tiefes Eindringen und dadurch bedingte schwerere Schädigungen des Gehirnes zu vermeiden. Bei Anwendung meines Verfahrens fällt das Spalten der Kopfhaut mit dem Messer, das Abheben der Beinhaut, das Arbeiten mit dem Trepan oder dem Bohrer sowie das Verschließen der Hautwunde fort. Der Pfriem wird durch Einhängen in kochendes Wasser sterilisiert. Es empfiehlt sich, mehrere Pfriemen vorrätig zu halten; man kann dann innerhalb kurzer Zeit eine große Zahl von Versuchstieren (Kaninchen und Meerschweinchen) intrazerebral infizieren. Nachteilige Folgen habe ich bis jetzt im Anschluß an die Anwendung des Pfriems nicht gesehen.

Zur Prüfung der Versuchstiere auf Immunität hatte ich drei verschiedene Straßenvira (I, II und III), die ich ebenfalls Herrn Prof. Koch-Berlin verdanke, zur Verfügung. Die Straßenvira stammten von Hunden, die im Leben Tollwuterscheinungen gezeigt hatten. Die Diagnose Tollwut war durch den Nachweis Negri'scher Körperchen bestätigt worden. Die Straßenvira wurden fein zerrieben und in physiologischer Kochsalzlösung im Verhältnis 1:10 aufgeschwemmt. Die Versuchs- und die Kontrolltiere (Hunde und Kaninchen) erhielten von einer solchen Aufschwemmung je 1,0 ccm an verschiedenen Stellen in die Lendenmuskulatur eingespritzt. Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, daß sowohl die Verarbeitung der Straßenvira als auch die Herstellung, die Aufbewahrung und die Einspritzung der Impfstoffe unter streng sterilen Kautelen erfolgte.

Im ganzen wurden 5 Schutzimpfungsversuche an Hunden durchgeführt, und zwar mit

Fermi-Vakzine, intrazerebral	(Versuch I),
Fermi-Vakzine, subkutan	(Versuch II),
japanischem Impfstoff, subkutan	(Versuch III),

Lyssin, subkutan, Vorversuch (Versuch IV),
Lyssin, subkutan, Hauptversuch (Versuch V).

Da die Versuche I—IV zu gleicher Zeit stattfanden, konnten bei ihnen dieselben Hunde und dieselben Kaninchen als Kontrollen dienen. Der Hauptversuch mit Lyssin (Versuch V) wurde erst nach Abschluß der genannten vier Versuche begonnen, weshalb für ihn besondere Kontrollhunde und besondere Kontrollkaninchen verwendet worden sind.

Starb während der Versuche ein Hund oder ein Kaninchen, so wurde zunächst eine genaue Sektion vorgenommen; alsdann wurde das Gehirn des betreffenden Tieres auf das Vorhandensein Negri'scher Körperchen untersucht. Dazu bediente ich mich der von Gerlach (9, 10, 21) angegebenen Färbemethode. Die Färbung der Negri'schen Körperchen geht bei diesem Verfahren sehr rasch vor sich. Die Negri'schen Körperchen erscheinen rot, ihre Innenstruktur schwarzblau, die Ganglienzellen blau und die roten Blutkörperchen blaßrot oder ungefärbt.

Die Diagnose „Wut“ habe ich bei den in der Versuchszeit eingegangenen Hunden und Kaninchen gestellt, wenn klinisch das Bild der Wut vorgelegen hatte und wenn außerdem 1. Negri'sche Körperchen nachgewiesen wurden oder 2. beim Fehlen Negri'scher Körperchen 2 mit je 0,1 ccm Gehirnemulsion (1:10 physiologischer Kochsalzlösung) des verendeten Tieres intrazerebral gespritzte Kaninchen unter Wuterscheinungen eingingen und Negri'sche Körperchen aufwiesen. Trafen diese Voraussetzungen nicht zu, so wurde die Diagnose „interkurrent verendet“ gestellt.

b) Die verschiedenen Versuche.

Versuch I.

(Intrazerebrale Impfung von vier Hunden mit Fermi-Vakzine.)

Von dem Gedanken ausgehend, daß das Tollwutvirus in der Hauptsache seinen Sitz im Zentralnervensystem hat und infolgedessen dort am schnellsten und wirksamsten angegriffen werden kann, injizierte ich am 7. Juni 1926 vier Hunden intrazerebral je 0,1 ccm nach Fermi's Angaben hergestellter Vakzine (s. Tabelle 1). Der Impfstoff war 24 Stunden alt und avirulent; 2 Kaninchen blieben nach intrazerebraler Einspritzung des Impfstoffes vollkommen gesund. Die vier Hunde haben die Impfung gut vertragen.

Nach 67 Tagen, am 13. August 1926, wurden zwei Hunde und nach 179 Tagen, am 3. Dezember 1926, wiederum zwei Hunde auf das Vorhandensein von Wutimmunität geprüft dadurch, daß den beiden ersten Tieren eine Aufschwemmung von Straßenvirus I und den beiden letzten Tieren eine Aufschwemmung von Straßenvirus II intramuskulär eingespritzt wurde. Als Kontrollen dienten am 13. August 1926 vier Hunde und zwei Kaninchen (Straßenvirus I) und am 3. Dezember 1926 sechs Hunde und zwei Kaninchen (Straßenvirus II). Die Kontrolltiere erhielten intramuskulär die gleiche Menge Straßenvirus wie die intrazerebral mit Fermi-Vakzine vorbehandelten Versuchshunde.

Von den Kontrolltieren vom 13. August 1926 starben die beiden Kaninchen (nach 21 und nach 23 Tagen) und zwei Hunde (nach 18 und nach 30 Tagen) an stiller Wut. Ein Kontrollhund zeigte zwar vom 23. Tage nach der Injektion des Straßenvirus ab die Erscheinungen von stiller Wut, erholte sich aber innerhalb einiger Tage wieder vollständig. Ein Kontrollhund blieb gesund.

Von den Kontrolltieren vom 3. Dezember 1926 starben die beiden Kaninchen (nach 26 und nach 29 Tagen) und zwei Hunde (nach 16 und nach 22 Tagen) an stiller Wut, während die übrigen Kontrollhunde gesund blieben.

Von den zwei intrazerebral mit Fermi-Vakzine vorbehandelten und nach 67 Tagen auf das Vorhandensein von Immunität geprüften Hunden starb einer nach 20 Tagen

interkurrent, während der zweite Hund Krankheitsercheinungen nicht aufwies. Von den zwei nach 179 Tagen auf Immunität geprüften Hunden starb einer nach 27 Tagen an stiller Wut; der zweite Hund blieb gesund.

Wenn auch die Zahl der bei Versuch I verwendeten Tiere gering ist, so geht doch aus der Tatsache, daß von den vier intrazerebral mit Fermi-Vakzine vorbehandelten Hunden einer im Anschluß an die Injektion von Straßenvirus an Wut einging, hervor, daß die einmalige intrazerebrale Impfung von Hunden mit Fermi-Vakzine einen zuverlässigen Schutz gegen Wut nicht verleiht.

Bemerkenswert ist, daß ein bereits unter den Erscheinungen der stillen Wut erkrankter Kontrollhund wieder genes und daß sowohl bei den Hunden als auch bei den Kaninchen nur die stille und nie die rasende Wut aufgetreten ist.

Versuch II.

(Subkutane Impfung von vier Hunden mit Fermi-Vakzine.)

Am gleichen Tage, an dem die Hunde des Versuches I intrazerebral mit Fermi-Vakzine geimpft wurden (7. Juni 1926), wurden vier andere Hunde mit demselben 24 Stunden alten, avirulenten Impfstoff subkutan behandelt. Die Hunde erhielten je 5 ccm Vakzine an mehreren Stellen des Halses eingespritzt. Sie haben ohne Ausnahme die Impfung gut überstanden.

Nach 67 Tagen, am 13. August 1926, erhielten zwei von diesen Hunden eine intramuskuläre Injektion von Straßenvirus I und am 3. Dezember 1926, also nach 179 Tagen, die beiden anderen Hunde eine intramuskuläre Injektion von Straßenvirus II. Die Kontrollen waren die gleichen wie beim Versuch I.

Das Ergebnis war, daß innerhalb einer Beobachtungszeit von mehr als 6 Monaten keiner der vier einmal subkutan mit Fermi-Vakzine vorbehandelten Hunde irgendwelche Erscheinungen von Wut aufwies.

Wenn auch aus dem Verhalten von nur vier Hunden weittragende Schlüsse nicht gezogen werden können, so dürfte doch das Ergebnis dazu anregen, auf breiter Basis Untersuchungen darüber anzustellen, ob Hunde durch eine einmalige subkutane Injektion einer größeren Menge von Fermi-Vakzine in allen Fällen einen sicheren Wutschutz erwerben.

Versuch III.

(Subkutane Impfung von 16 Hunden mit dem Impfstoff nach Umeno und Doi.)

Mit einem Impfstoff, der nach den Angaben von Umeno und Doi hergestellt und 14 Tage bei Zimmertemperatur gehalten worden war, wurden am 7. Juni 1926 16 Hunde vorbehandelt. Jeder Hund erhielt, auf mehrere Stellen des Halses verteilt, subkutan 3 ccm Impfstoff. Der Virulenzgrad der Vakzine war derart, daß zwei Kaninchen 8 und 9 Tage nach der intrazerebralen Einspritzung an Wut starben.

Die Impfung mit dem japanischen Impfstoff wurde nicht von allen Hunden gleich gut vertragen. Während 12 Hunde durch die Impfung keinerlei Schädigungen erlitten, bekamen vier Hunde am Halse in der Gegend der Impfstellen mehr oder weniger große Abszesse, die eine Zeit lang das Allgemeinbefinden der Hunde ziemlich stark beeinträchtigten und bei einem Hunde sogar den Tod herbeiführten.

Von den übrigbleibenden 15 Hunden wurden am 13. August 1926 sechs Hunde mit Straßenvirus I und am 3. Dezember 1926 neun Hunde mit Straßenvirus II infiziert. Als Kontrollen dienten dieselben Hunde und dieselben Kaninchen wie bei Versuch I und II.

Alle mit dem japanischen Impfstoff vorbehandelten Hunde blieben gesund und zeigten keinerlei Erscheinungen von Wut. Der japanische Impfstoff hat demnach zu einer

Überficht über die Veruche I—IV.

Impfung der Hunde (7. 6. 1926)					Prüfung der Hunde auf Immunität									
Nummer des Versuches	Art und Anwendung des Impfstoffes	Zahl der Hunde	Bemerkungen	Somit blei- ben Hunde	nach 67 Tagen (13. 8. 1926) mit Straßenvirus I					nach 179 Tagen (3. 12. 1926) mit Straßenvirus II				
					Zahl der Tiere	Gesund geblieben	Inter- kurrent gestorben	An Wut erkrankt, aber wieder genesen	An Wut gestorben	Zahl der Tiere	Gesund geblieben	Inter- kurrent gestorben	An Wut erkrankt, aber wieder genesen	An Wut gestorben
Versuch I	Fermi-Vakzine, intrazerebral	4	—	4	2	1	1	—	—	2	1	—	—	1
" II	Fermi-Vakzine, subkutan	4	—	4	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—
" III	Japanischer Impfstoff, subkutan	16	Bei 4 Hunden Abszesse; 1 Hund gestorben	15	6	6	—	—	—	9	9	—	—	—
" IV	Lyssin I, subkutan (Vorversuch)	16	1 Hund interkurrent ge- storben (Pleuropneumonie)	15	6	6	—	—	—	9	9	—	—	—
Nicht vorbehandelte Kontrolltiere					4 Hunde	1	—	1	2	6 Hunde	4	—	—	2
					2 Kanin- chen	—	—	—	2	2 Kanin- chen	—	—	—	2

deutlich sichtbaren, wenigstens 179 Tage dauernden Immunität geführt. Fälle von mangelndem Impfschutz, wie sie Giese gesehen hat, und Fälle von Impfwut, wie sie Mießner und Baars sowie Giese beobachtet haben, sind nicht vorgekommen. Ein Nachteil des japanischen Impfstoffes ist jedoch der, daß man zu seiner Herstellung viel Virus fixe benötigt, daß der Impfstoff nur beschränkte Zeit haltbar ist und daß er unter Umständen Abszesse hervorruft, die wahrscheinlich auf das in ihm enthaltene Glycerin zurückzuführen sind. Ein Hund ist sogar infolge von Impfabzessen eingegangen. Solche Abszeßbildungen nach der Impfung mit dem japanischen Impfstoff wurden auch von Mießner und Baars, von Wirth sowie von Michin und Titow (23) beobachtet.

Versuch IV.

(Subkutane Impfung von 16 Hunden mit Lyssin nach Mießner und Baars.)
(Vorversuch.)

Mit Lyssin (Lyssin I) wurden am 7. Juni 1926 16 Hunde vorbehandelt. Jeder Hund erhielt subkutan an mehreren Stellen des Halses 3,3 ccm mit physiologischer Kochsalzlösung 1 : 10 hergestellter Lyssinaufschwemmung. Die Impfstoffmenge betrug demnach 0,33 Gramm Trockenlyssin oder, auf Virus fixe umgerechnet, etwa 0,9 Gramm Virus fixe. Das Lyssin war bei seiner Verimpfung 14 Tage alt und tötete zwei Kaninchen nach intrazerebraler Einpritzung in acht Tagen. Von den Hunden wurde das Lyssin gut vertragen.

Ein Hund starb 5 Tage nach der Impfung interkurrent an Pleuropneumonie.

Die Prüfung der mit Lyssin vorbehandelten Hunde erfolgte wie bei den Versuchen I—III nach 67 und nach 179 Tagen, und zwar erhielten am 13. August 1926 sechs Hunde Straßenvirus I und am 3. Dezember 1926 die übrigen neun Hunde Straßenvirus II in die Lendenmuskulatur eingespritzt. Die Kontrollen waren die gleichen wie bei den Versuchen I—III.

Alle mit Lyssin vorbehandelten Hunde blieben gesund und frei von Wuterscheinungen. Somit hat die Lyssinimpfung zu einer deutlich erkennbaren, mindestens 179 Tage währenden Immunität geführt.

Versuch V.

(Subkutane Impfung von 29 Hunden mit Lyssin nach Mießner und Baars.)
(Hauptversuch.)

Das günstige Ergebnis, das im Versuch IV mit Lyssin erzielt worden ist, ermunterte zu einem weiteren, größeren Versuch (Versuch V, Tabelle II). Ich habe deshalb am 2. November 1927 29 Hunde mit einem anderen 4 Tage alten Lyssin (Lyssin II) an mehreren Stellen des Halses geimpft. Jeder Hund erhielt wiederum 0,33 Gramm Trockenlyssin, in physiologischer Kochsalzlösung im Verhältnis 1 : 10 aufgeschwemmt. Der Impfstoff tötete, intrazerebral eingespritzt, zwei Kaninchen nach 7 und nach 9 Tagen. Die mit Lyssin vorbehandelten Hunde blieben alle gesund.

Versuch V.

Impfung der Hunde (2. 11. 1927)				Prüfung der Hunde auf Immunität nach 86 Tagen (27. 1. 1928) mit Straßenvirus III				
Art und Anwendung des Impfstoffes	Zahl der Hunde	Bemerkungen	somit bleiben Hunde	Zahl der Tiere	Gesund geblieben	Inter- kurrent gestorben	An Wut erkrankt, aber wieder genesen	An Wut gestorben
Lyssin II, subkutan (Hauptversuch)	29	—	29	29	23	—	2	4
Nicht vorbehandelte Kontrolltiere				13 Hunde	2	—	1	10
				2 Kaninchen	—	—	—	2

Nach 86 Tagen, am 27. Januar 1928, wurden alle 29 Hunde zur Prüfung ihres Immunitätszustandes mit Straßenvirus III infiziert. Als Kontrollen dienten 13 Hunde und 2 Kaninchen. Die Kontrolltiere erhielten dieselbe Menge Straßenvirus III wie die 29 mit Lyssin vorbehandelten Hunde.

Von den 13 Kontrolltieren starben zehn an stiller Wut, und zwar nach 13, 15, 18, 19 (2 Hunde), 24 (2 Hunde), 29, 31 und nach 54 Tagen. Die beiden Kontrollkaninchen starben nach 15 und nach 22 Tagen, ebenfalls unter den Erscheinungen der stillen Wut. Ein Kontrollhund erkrankte nach 20 Tagen unter den Symptomen der stillen Wut, er erholte sich aber nach einigen Wochen wieder vollständig. Zwei Kontrollhunde blieben gesund.

Von den 29 mit Lyssin vorbehandelten Hunden erkrankten sechs an stiller Wut; während zwei von ihnen sich allmählich wieder erholten, starben die anderen vier Hunde, und zwar nach 13, 15, 22 und 36 Tagen.

Das Lyssin II hat demnach nicht alle Hunde vor einer Wuterkrankung geschützt. Ein hoher Grad von Immunität wurde den Hunden durch das Lyssin II aber sicherlich verliehen, was daraus hervorgeht, daß von den 29 mit Lyssin vorbehandelten Hunden nur 4 = 13,8 Prozent an Wut starben, während von den 13 Kontrollhunden 10 = 76,9 Prozent an Wut eingingen.

Zusammenfassung der Ergebnisse der Versuche I—V.

Mit F e r m i - Vakzine sind intrazerebral und subkutan je 4, mit japanischem Impfstoff 16 und mit Lyssin 45, insgesamt also 69 Hunde gegen Tollwut schutzgeimpft worden. Die einmalige intrazerebrale Einspritzung von F e r m i - Vakzine hat einen zuverlässigen Impfschutz nicht verliehen. Dagegen wurden mit der einmaligen subkutanen Verimpfung einer größeren Menge von F e r m i - Vakzine günstigere Ergebnisse erzielt. Eine deutlich sichtbare Immunität verlieh nach einmaliger subkutaner Anwendung der Impfstoff von U m e n o und D o i sowie das Lyssin nach M i e ß n e r und B a a r s. Ein Nachteil der beiden zuletzt genannten Verfahren liegt darin, daß zur Impfstoffherstellung verhältnismäßig große Mengen von Virus fixe benötigt werden. Beim japanischen Impfstoff kommt hinzu, daß er nur während einer beschränkten Zeit haltbar ist und bei der Verimpfung verhältnismäßig häufig unangenehme Abszesse hervorruft; beim M i e ß n e r'schen Impfstoff scheint die Schutzkraft der einzelnen Lyssine nicht immer gleich stark zu sein.

c) Befondere Beobachtungen.

Wenn beim zweiten Lyssinversuch sich nicht alle immunisierten Hunde geschützt erwiesen, so hängt das jedenfalls nicht nur mit der geringeren Schutzkraft des Lyssins II, sondern auch mit der hohen Virulenz des Straßenvirus III zusammen. Tötete dieses doch beide Kontrollkaninchen (= 100 Prozent) und 10 von 13 Kontrollhunden (= 76,9 Prozent), während die Straßenvira I und II von vier und sechs Kontrollhunden nur je zwei (= 50 und 33 1/3 Prozent), jedoch sämtliche Kaninchen (= 100 Prozent) töteten. Die Prozentzahlen 50 und 33 1/3 entsprechen ungefähr den Beobachtungen S c h n ü r e r s und D a v i d s (36), deren Kontrollhunde eine Mortalität von 50 Prozent aufwiesen, und den Angaben S c h e r n s, nach denen etwa 40 Prozent der von tollen Hunden gebissene Hunde an Wut sterben. Die dreimal zwei Kontrollkaninchen, die wie die Hunde intramuskulär mit Straßenvirus infiziert wurden, sind sämtlich an Wut eingegangen. Danach scheinen Kaninchen gegen Straßenvirus empfindlicher zu sein als Hunde.

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß alle Hunde und Kaninchen, bei denen die Infektion anging, stets nur an stiller Wut erkrankten. Die Hunde lagen zunächst teilnahmslos und traurig in einem Winkel ihres Käfigs und verfielen dem Futter und Getränk. Gelang es, sie durch güt-

liches Zureden zum Aufstehen zu bewegen, so zeigten sie stets eine mehr oder weniger starke Lähmung der Nachhand. Diese Lähmung wurde von Tag zu Tag stärker und ging meist auf die Vorhand über, so daß sich die Hunde nach einigen Tagen überhaupt nicht mehr erheben konnten. In mehreren Fällen traten Lähmungen des Unterkiefers auf, die zur Folge hatten, daß die Tiere die Mundpalte nicht mehr schließen konnten. Ihr Bellen nahm dann einen eigenartigen, klagenden Ton an. Zwei Hunde zeigten einen starken Juckreiz in der Lendengegend in der Nähe der Virusinjektionsstelle, der sich darin äußerte, daß die Hunde diese Stelle ständig beleckten. In einigen Fällen war Verstopfung, in anderen Durchfall zu beobachten. Vollkommen apathisch starben die Tiere 3—10 Tage nach dem Beginn der Krankheitsercheinungen. Bei den Hunden trat der Tod zwischen dem 13. und dem 54. Tag nach der Infektion mit Straßenvirus ein, während die Kaninchen, bei denen die Krankheitssymptome ähnlich waren wie bei den Hunden, zwischen dem 15. und dem 29. Tag nach der Injektion des Straßenvirus starben. Ein Fall von rasender Wut, wie er in den Versuchen von G i l d e m e i s t e r und K a r m a n n (12, 13) bei einem Meerschweinchen auftrat, war weder bei den Hunden noch bei den Kaninchen zu beobachten.

Ich möchte daraus folgern, daß die stille Wut häufiger vorkommt als die rasende Wut, und möchte glauben, daß bei der Schwierigkeit der Diagnosestellung, in der Praxis manche Fälle von stiller Wut nicht erkannt werden. Auch Tiere mit stiller Wut, die nicht beißfüchtig sind, können ihrer Umgebung unter Umständen durch Ausscheiden von Virus gefährlich werden. So mag mancher Fall von Tollwut, dessen Herkunft nicht zu erklären war, auf ein Tier mit nicht erkannter stiller Wut zurückzuführen sein.

Die Tollwut gilt mit Recht im allgemeinen für eine tödlich verlaufende Krankheit. Daß aber auch Ausnahmen vorkommen, zeigen meine Beobachtungen, nach denen in den Versuchen I—IV ein Kontrollhund und beim Versuch V ein Kontrollhund und zwei mit Lyssin vorbehandelte Hunde von der bereits ausgebrochenen und deutlich sichtbaren stillen Wut (Depressionsercheinungen, Lähmungen der Nachhand) sich wieder erholten. Bei den beiden vorbehandelten Tieren könnte die Genesung unter Umständen auf die Impfung mit Lyssin zurückgeführt werden. Bemerkenswert bleibt jedoch die Selbstheilung bei den zwei Kontrollhunden. Solche Selbstheilungen bei Tollwut sind bisher nur selten beobachtet worden. In letzter Zeit haben A u j e s z k y (1) und L e h r (22) über solche Fälle berichtet. A u j e s z k y sah zwei Rinder und ein Schwein, L e h r ein Kaninchen von der bereits ausgebrochenen Wut sich wieder erholen.

Von Wichtigkeit scheint mir des weiteren die Beobachtung zu sein, daß 88 Prozent der an Wut gestorbenen Hunde und 66 2/3 der an Wut gestorbenen Kaninchen bei der Sektion eine meist schwere Magen-Darmentzündung und gleichzeitig eine mehr oder weniger starke Schwellung der Leber aufwiesen. Fremdkörper (Stroh, Ansammlungen von Haaren), die man für die Gastroenteritis hätte verantwortlich machen können, waren nur bei fünf Hunden im Magen vorhanden. Mithin können die von wütenden Tieren bisweilen aufgenommenen Fremdkörper nicht die alleinige Ursache der Magen-Darmentzündung sein. Nach P u n t o n i (29) ist die Gastroenteritis darauf zurückzuführen, daß das Wutvirus das Bestreben hat, den Körper auf der ganzen Verdauungsfläche — durch die Mundhöhle, durch den Magen und durch den Darm — zu verlaufen, wobei es Entzündungsercheinungen hervorruft, die unabhängig von dem Vorhandensein von Fremdkörpern sind. Dadurch, daß in manchen Fällen von Wut die gastrointestinalen Störungen in den Vordergrund treten und das klinische Bild beherrschen, kann nach P u n t o n i die Diagnosestellung sehr erschwert werden. Die Leberschwellungen, die ich bei den Hunden mit Gastroenteritis sah, stehen wohl mit den

Darmveränderungen in Zusammenhang. Bei zahlreichen an Tollwut eingegangenen Hunden und Kaninchen war bei der Sektion eine pralle Füllung der Harnblase festzustellen. Diese pralle Füllung dürfte mit der allgemeinen Lähmung der Nachhand in Verbindung stehen.

Ganz kurz möchte ich auf den Nachweis Negri'scher Körperchen bei den an Wut gestorbenen Hunden und Kaninchen eingehen. Es gelang mir, in 85 Prozent der Fälle Negri'sche Körperchen nachzuweisen. Diese Befunde stimmen etwa mit denen von Hahn (14) überein, der in 90 von 100 Fällen die Diagnose Wut mikroskopisch stellen konnte, während Schlegel (33) in 44 von 45 Tollwutfällen, also in 97,8 Prozent der Fälle, Negri'sche Körperchen nachwies.

d) Impfung oder veterinärpolizeiliche Maßnahmen?

Die von Giese und mir im Reichsgesundheitsamte sowie die von anderen Forschern durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, daß die bisher zur Schutzimpfung von Hunden gegen Tollwut angegebenen Verfahren, wenn sie auch teilweise sehr gutes leisten, immer noch an Mängeln kränken, die ihre praktische Anwendung in Deutschland nicht empfehlenswert erscheinen lassen. In besonders gefährdeten Gebieten, namentlich in Grenzbezirken, könnte man bei gleichzeitiger Anwendung der veterinärpolizeilichen Maßnahmen von der Schutzimpfung wohl Gebrauch machen. Für innerdeutsche Verhältnisse muß nach wie vor als das geeignetste und wirksamste Bekämpfungsverfahren der Tollwut die strenge Durchführung der im Reichsviehseuchengesetz vorgeschriebenen veterinär-polizeilichen Maßnahmen angesehen werden. Daß es bei richtiger Anwendung dieser und gegebenenfalls einiger Ergänzungsmaßnahmen möglich ist, die Tollwut wirksam zu bekämpfen, haben in den letzten Jahren Mitteilungen hervorragender Fachleute, wie von Ostertags (27), von Hutyras (17), Jos. Kochs (20) u. a. dargetan. In gleichem Sinne hat sich kürzlich Blankenburg (5) dahin geäußert, daß die Abwehr- und Tilgungsmaßnahmen nach den Vorschriften des Reichsviehseuchengesetzes mit aller Strenge durchgeführt werden müssen, wobei sämtliche fakultative Maßnahmen zu obligatorischen zu erheben seien.

e) Zusammenfassung und Schlußsätze.

1. Es wird ein Verfahren zur schnellen und sicheren intrazerebralen Impfung kleiner Versuchstiere (Kaninchen und Meerschweinchen) angegeben.
2. Die einmalige intrazerebrale Impfung mit Fermi-Vakzine verlieh den Versuchshunden keinen zuverlässigen Schutz gegen Wut; dagegen führte die einmalige subkutane Einverleibung einer größeren Menge von Fermi-Vakzine zu günstigeren Ergebnissen.
3. Die einmalige subkutane Einspritzung von Impfstoff nach Umeno und Doi hatte eine deutlich sichtbare, wenigstens 179 Tage dauernde Immunität gegen Wut zur Folge. Der japanische Impfstoff hat jedoch den Nachteil, daß man viel Virus fixe zu seiner Herstellung benötigt, daß er nur beschränkte Zeit haltbar ist und öfters zur Entstehung von Impfabzessen führt.
4. Die einmalige subkutane Einspritzung von Lyssin führte bei einem Versuch zu einer vollkommenen, mindestens 179 Tage währenden Immunität gegen Wut. Bei einem zweiten Versuch erwiesen sich nach 86 Tagen nicht alle mit Lyssin vorbehandelten Hunde vor einer Wuterkrankung geschützt. Auch das Lyssin hat den Nachteil, daß zu seiner Herstellung verhältnismäßig viel Virus fixe benötigt wird.

5. Sämtliche Versuchshunde und -Kaninchen, bei denen die Wutinfektion anging, erkrankten stets nur an stiller Wut. In der Praxis dürften bei der Schwierigkeit der Diagnosestellung manche Fälle von stiller Wut nicht erkannt werden.
6. Zwei Kontrollhunde und zwei mit Lyssin vorbehandelte Hunde, die bereits unter ausgesprochenen klinischen Erscheinungen an stiller Wut erkrankt waren (Depressionsercheinungen, Lähmungen der Nachhand), sind spontan wieder genesen.
7. 88 Prozent der an Wut gestorbenen Hunde und 66⅔ Prozent der an Wut gestorbenen Kaninchen wiesen bei der Sektion eine meist schwere Magendarmentzündung auf, die nicht auf das Vorhandensein von Fremdkörpern im Verdauungstraktus zurückgeführt werden konnte, vielmehr auf eine spezifische Wirkung des Tollwutvirus zurückzuführen sein dürfte.
8. Bei 85 Prozent der an Wut gestorbenen Hunde und Kaninchen konnten Negri'sche Körperchen nachgewiesen werden.
9. Für innerdeutsche Verhältnisse ist das wirksamste und zweckmäßigste Bekämpfungsverfahren der Hundetollwut die strenge Durchführung der im Reichsviehseuchengesetz vorgeschriebenen veterinärpolizeilichen Maßnahmen. Die Schutzimpfung bei Hunden kann allenfalls in besonders gefährdeten Grenzgebieten bei gleichzeitiger Anwendung der veterinärpolizeilichen Maßnahmen in Betracht gezogen werden.

Literatur.

1. Aujeszky, A.: D. T. W. 35 (1927), S. 399.
2. Derselbe: Centralbl. für Bakt., Orig., 107 (1928), S. 358.
3. Baars, G.: D. T. W. 35 (1927), S. 99.
4. Bederke, O.: Berliner Tierärztliche Wochenschr. 44 (1928), S. 97.
5. Blankenburg, W.: Archiv für wiss. und prakt. Tierheilkunde 55 (1927), S. 1.
6. Eichhorn, A. und Lyon, B. M.: Journ. of Americ. vet. med. ass. 64 (1924), S. 690.
7. Fermi, C. I.: I metodi Fermi di vaccinazione e di sierovaccinazione antirabbica confrontati con tutti gli altri metodi esistenti. Mailand 1924, Verlag des Serotherapeutischen Instituts.
8. Derselbe: Seuchensbekämpfung 3 (1926), S. 114.
9. Gerlach, Fr.: Wiener Tierärztl. Monatsschr. 4 (1917), S. 303.
10. Derselbe: Desgl. 7 (1920), S. 1.
11. Giese, C. I.: Arbeiten aus dem Reichsgesundheitsamte 57 (1926), S. 410.
12. Gildemeister, E. und Karmann, P.: Centralbl. für Bakt., Orig., 106 (1928), S. 63.
13. Derselben: Desgl. 108 (1928), S. 254.
14. Hahn, H.: Münch. Tierärztliche Wochenschr. 78 (1927), S. 336.
15. Hata, S.: The Journ. of Immunology 9 (1924), S. 89.
16. Herrmann, O.: Centralbl. für Bakt., Orig., 107 (1928), S. 84.
17. v. Hutyras, F.: Berliner Tierärztl. Wochenschr. 44 (1928), S. 474.
18. Karmann, P.: Reichsgesundheitsblatt 1 (1926), S. 897.
19. Kitt, Th.: Münch. Tierärztl. Wochenschr. 78 (1927), S. 497.
20. Koch, Jos.: Klin. Wochenschr. 2 (1923), S. 650.
21. Kraus, R., Gerlach, F. und Schweinburg, F.: Lyssa bei Mensch und Tier, Urban & Schwarzenberg, Berlin-Wien 1926, S. 209.
22. Lehr, E.: Archiv für wiss. und prakt. Tierheilkunde 56 (1927), S. 372.
23. Michin, N. und Titow, N. (Moskau): 2. Kongreß der wiss. und prakt. veterinären Arbeiter der U.S.S.R. in Charkow 1927, S. 204.
24. Mießner, H.: D. T. W. 31 (1923), S. 195.
25. Mießner, H. und Baars, G.: Centralbl. für Bakt., Orig., 97, 1926, Beiheft, S. 55.
26. Derselben: Desgl. 101 (1927), S. 79.
27. v. Ostertag, R.: Berl. Tierärztl. Wochenschr. 41 (1925), S. 417.
28. Puntoni, V.: La Clinica Veterinaria 49 (1926), S. 411.
29. Derselbe: L'eliminazione del virus rabbico per la via digestiva e le lesioni gastro-enteriche nella rabbia. Estratto degli Annali d'Igiene 37 (1927), Rom, Verlag S. Buciarelli.
30. Remlinger, P.: Rev. génér. de méd. vét. 35 (1926), S. 87.
31. Schern, K.: Seuchensbekämpfung 3 (1926), S. 46.
32. Der-

felbe: Berliner Tierärztl. Wochenschr. 43 (1927), S. 298. 33. Schlegel, M.: Berliner Tierärztl. Wochenschr. 42 (1926), S. 329. 34. Schnürer, J.: D. T. W. 31 (1923), S. 295. 35. Derfelbe: Wiener Tierärztliche Monatschrift 12 (1925), S. 15 und S. 65. 36. Schnürer, J. und

David, H.: Berliner Tierärztl. Wochenschr. 43 (1927), S. 273. 37. Schoening, W. H.: Journ. of agric. Res. 30 (1925), S. 431. 38. Umeno, S. und Doi, Y.: Kitasato Archiv of exp. med. 4 (1921), S. 89. 39. Wirth, D.: Wiener Tierärztl. Monatschr. 14 (1927), S. 654.

(Aus der Veterinärabteilung des Reichsgesundheitsamtes.)

Die Schlacht- und Viehhöfe im Deutschen Reiche.

(Nach dem Stand vom 1. Juli 1927.)

(Mit 1 Abbildung.)

Von R. Meyer.

Über Schlachthausanlagen im Deutschen Reiche ist vom Reichsgesundheitsamt im Jahre 1887 erstmalig eine Zusammenstellung gefertigt und in den Veröffentlichungen des Kais. Gesundheitsamts abgedruckt worden, die nach Ländern geordnet, sowohl die gesetzlichen Grundlagen für die Errichtung öffentlicher Schlachthäuser, als auch die Anzahl der bestehenden Anlagen umfaßt. Diese Zusammenstellung zeigt, daß bereits im Jahre 1887 im Deutschen Reiche 335 Gemeinden mit öffentlichen Schlachthäusern vorhanden waren, von denen 36 gleichzeitig Viehmarktanlagen besaßen. In der Zwischenzeit ist keine amtliche Ergänzung dieses Verzeichnisses erfolgt. Dagegen befindet sich im Handbuch von Schwarz „Bau, Einrichtung und Betrieb öffentlicher Schlacht- und Viehhöfe“ eine auf privaten Mitteilungen beruhende Übersicht, wonach am 1. Juli 1911 im Reiche 934 öffentliche Schlachthöfe gezählt wurden. Von Ostertag gibt in der 7. und 8. Auflage seines Handbuchs der Fleischbeschau für das Jahr 1920, nach Wegfall der abgetretenen Gebiete, die Zahl der Schlachthöfe im Reiche auf etwa 867 an. Endlich wird im Adreßbuch der deutschen Tierärzte 1926 die Zahl der öffentlichen Schlachthöfe in diesem Jahre mit 902 angeführt.

Auf Anregung des Reichsgesundheitsamts ist nun im Jahre 1927 eine amtliche Erhebung über die Zahl der öffentlichen Schlachthöfe, ihre Leitung, ihre wesentlichen Einrichtungen und besonderen Verhältnisse angestellt worden, deren Ergebnis, da es wohl von allgemeinem Interesse sein dürfte, nachfolgend veröffentlicht werden soll. Besondere und ins Einzelne gehende Angaben über die öffentlichen Schlachthöfe in Preußen sind auf Grund dieser Erhebung von Klimmek in der Deutschen Schlachthofzeitung von 1928, Seite 114 gemacht worden.

Im Deutschen Reiche waren am 1. Juli 1928 insgesamt 730 öffentliche Schlachthöfe vorhanden. Außerdem befinden sich in Baden noch 26 öffentliche Schlachtstätten in ländlichen Gemeinden, die in erster Linie zum Zwecke der Vornahme von Notfischlachtungen errichtet worden sind.

Von den 730 Schlachthöfen sind 677 (92,9 Prozent) Gemeinde-Schlachthöfe, während 53 (7,1 Prozent) Innungsschlachthöfe sind. Auf die einzelnen deutschen Länder verteilen sich die öffentlichen Schlachthöfe folgendermaßen:

		davon Gemeinde- Proz. Schlachthöfe	Innungs- Schlachthöfe
Preußen	395 = 54,1	381	14
Bayern	100 = 13,7	99	1
Sachsen	34 = 4,6	22	12
Württemberg	62 = 8,5	40	22
Baden	76 = 10,4	76	—
Thüringen	14 = 1,9	12	2
Hessen	20 = 2,7	18	2
Hamburg	1 = 0,1	1	—
Mecklbg.-Schwerin	11 = 1,5	11	—
Braunschweig	3 = 0,4	3	—
Oldenburg	1 = 0,1	1	—
Anhalt	5 = 0,7	5	—
Bremen	1 = 0,1	1	—
Lippe-Detmold	2 = 0,3	2	—
Lübeck	1 = 0,1	1	—

davon Gemeinde-
Proz. Schlachthöfe

Innungs-
Schlachthöfe

Mecklbg.-Strelitz
Waldeck
Schaumburg-Lippe

2 = 0,3
2 = 0,3
— = —

2
2
—

Es befinden sich in

Gemeinden unter 10 000 Einwohnern
337 Gemeinde-, 24 Innungsschlachthöfe,
Gemeinden von 10—50 000 Einwohnern
244 Gemeinde-, 27 Innungsschlachthöfe,
Gemeinden von 50—100 000 Einwohnern
46 Gemeinde-, 2 Innungsschlachthöfe,
Gemeinden von 100—500 000 Einwohnern
43 Gemeinde-Schlachthöfe,
Gemeinden über 500 000 Einwohnern
7 Gemeinde-Schlachthöfe.

Die Größe der Schlachthöfe schwankt naturgemäß in weiten Grenzen. Der kleinste öffentliche Schlachthof befindet sich in Württemberg. Er besteht nur aus einem öffentlichen Schlachtraum für Schlachtungen von Großvieh und hat einen Flächenraum von 18 qm. Weitere fünf Gemeinden haben derartige Schlachträume von unter 100 qm Flächenraum.

In den Gemeinden unter 10 000 Einwohner
hat der kleinste 18 qm, der größte Schlachthof
19 480 qm Flächenraum,
in den Gemeinden über 10 000 bis 50 000 Einwohner
hat der kleinste 180 qm, der größte Schlachthof
40 000 qm Flächenraum,
in den Gemeinden von 50 000 bis 100 000 Einwohner
hat der kleinste 554 qm, der größte Schlachthof
65 000 qm Flächenraum,
in den Gemeinden über 100 000 bis 500 000 Einwohner
hat der kleinste 1 200 qm, der größte 90 000 qm
Flächenraum,
in den Gemeinden über 500 000 Einwohner
hat der kleinste 52 225 qm, der größte Schlachthof
172 500 qm Flächenraum.

Mit Viehhöfen sind verbunden 66 Schlachthöfe
(= 9 Prozent aller Schlachthöfe) und zwar
in Gemeinden mit unter 10 000 Einwohnern 5mal
(= 1,4 Prozent dieser Schlachthöfe),
in Gemeinden mit über 10—50 000 Einwohnern 12mal
(= 4,4 Prozent dieser Schlachthöfe),
in Gemeinden mit über 50—100 000 Einwohnern 12 mal
(= 25 Prozent dieser Schlachthöfe),
in Gemeinden mit über 100—500 000 Einwohnern 3mal
(= 70 Prozent dieser Schlachthöfe),
in Gemeinden mit über 500 000 Einwohnern 7mal
(= 100 Prozent dieser Schlachthöfe).

In den einzelnen deutschen Ländern befinden sich folgende öffentliche Schlachthöfe, die mit Viehhöfen verbunden sind:

in Preußen: Aachen, Altenessen, Barmen, Berlin, Beuthen (außer Betrieb), Breslau, Dortmund, Duisburg, Duisburg-Meiderich, Düsseldorf, Elberfeld, Erfurt, Essen, Frankfurt (Main), Gelnhausen (ohne Auftrieb), Gel-

senkirchen, Hagen, Hannover, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Königsberg, Krefeld, Magdeburg, Mülheim (Ruhr), München-Gladbach, Neuß, Osnabrück, Stargard (nur Kleinviehhof), Stettin, Wiesbaden;
 in Bayern: Ansbach, Augsburg, Bamberg, Fürth, Hof, Landau, München, Neustadt a. H., Nürnberg, Regensburg, Würzburg;
 in Sachsen: Aue, Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen, Reichenbach, Zittau, Zwickau;
 in Württemberg: Aalen, Heilbronn, Stuttgart;
 in Baden: Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim;
 in Hessen: Darmstadt, Mainz, Offenbach;
 in Hamburg: Hamburg;
 in Braunschweig: Braunschweig;
 in Mecklenburg-Schwerin: Stavenhagen;
 in Bremen: Bremen;
 in Lübeck: Lübeck.

Auf diesen Viehhöfen werden jährlich aufgetrieben

bis zu 10 000 Stück Vieh . . . 5mal,
 bis zu 50 000 Stück Vieh . . . 28mal,
 bis zu 100 000 Stück Vieh . . . 8mal,
 bis zu 1 000 000 Stück Vieh . . . 23mal,
 über 1 000 000 Stück Vieh . . . 1mal.

Auf den öffentlichen Schlachthöfen sind folgende Nebenanlagen vorhanden:

- a) Talgschmelzen 42 mal (= 5,75 Prozent aller Schlachthöfe),
 b) Häuteverwertungen 236 mal (= 32,3 Prozent aller Schlachthöfe),
 c) Blutverwertungen 23 mal (= 3,15 Prozent aller Schlachthöfe),
 d) Konfiskatverwertungseinrichtungen 70 mal (= 9,95 Prozent aller Schlachthöfe).

Mit mehreren dieser Einrichtungen sind versehen 65 Schlachthöfe und zwar mit

a und b = 12 Schlachthöfe,
 b und d = 27 Schlachthöfe,
 c und d = 4 Schlachthöfe,
 a, b, c = 2 Schlachthöfe,
 a, b, d = 6 Schlachthöfe,
 a, c, d = 1 Schlachthof,
 b, c, d = 6 Schlachthöfe,
 a, b, c, d = 7 Schlachthöfe.

Diese Nebeneinrichtungen sind meist Eigentum der Fleischerorganisationen oder sie sind an diese verpachtet.

Die Leitung von 575 öffentlichen Schlachthöfen, = 78,8 Prozent aller öffentlichen Schlachthöfe, liegt in den Händen von Tierärzten; Nichttierärzte leiten 155 Schlachthöfe = 21,5 Prozent aller öffentlichen Schlachthöfe.

Die Leitung der öffentlichen Schlachthöfe erfolgt

		durch Tierarzt	durch Nichttierarzt
in Preußen	343mal = 86,8 Prozent	52mal	
in Bayern	78mal = 78,0 Prozent	22mal	
in Sachsen	34mal = 100,0 Prozent	—mal	
in Württemberg	39mal = 63,0 Prozent	23mal	
in Baden	33mal = 43,4 Prozent	43mal	
in Thüringen	13mal = 92,8 Prozent	1mal	
in Hessen	7mal = 35,0 Prozent	13mal	
in Hamburg	—mal = 0,0 Prozent	1mal	
in Mecklbg.-Schwerin	1mal = 100,0 Prozent	—mal	
in Oldenburg	1mal = 100,0 Prozent	—mal	
in Braunschweig	3mal = 100,0 Prozent	—mal	
in Anhalt	5mal = 100,0 Prozent	—mal	
in Bremen	1mal = 100,0 Prozent	—mal	
in Lippe-Detmold	2mal = 100,0 Prozent	—mal	
in Lübeck	1mal = 100,0 Prozent	—mal	
in Mecklbg.-Strelitz	2mal = 100,0 Prozent	—mal	
in Waldeck	2mal = 100,0 Prozent	—mal	
in Schaumburg-Lippe	—mal = 0,0 Prozent	—mal	

Als Leiter öffentlicher Schlachthöfe sind im Hauptberuf

tätig 418 Tierärzte (= 72,7 Prozent aller tierärztlichen Schlachthofleiter), im Nebenberuf 157 Tierärzte (= 27,3 Prozent).

Von den nichttierärztlichen Leitern sind hauptberuflich 100, nebenberuflich 57 tätig.

In Gemeinden mit über 10 000 Einwohnern werden die öffentlichen Schlachthöfe in 348 Fällen (= 94 Prozent dieser Schlachthöfe) von Tierärzten, in 22 Fällen (= 6 Prozent) von Nichttierärzten geleitet, in Gemeinden unter 10 000 Einwohnern 227mal (= 63 Prozent) von Tierärzten, 133mal (= 37 Prozent) von Nichttierärzten.

Innungsschlachthöfe werden 37mal von Tierärzten (= 70 Prozent aller Innungsschlachthöfe), 16mal (= 30 Prozent) von Nichttierärzten geleitet und zwar in Gemeinden mit über 10 000 Einwohnern 26mal von Tierärzten (= 84 Prozent dieser Innungsschlachthöfe) und 5mal von Nichttierärzten (= 16 Prozent dieser Innungsschlachthöfe). In Gemeinden unter 10 000 Einwohnern sind Leiter von Innungsschlachthöfen je 11mal Tierärzte und Nichttierärzte.

Den Titel Schlachthofdirektor führen 351 Tierärzte (= 84 Prozent aller hauptberuflich tierärztlichen Schlachthofleiter) und fünf nichttierärztliche Leiter.

Einen Gesamtüberblick über die in den einzelnen deutschen Ländern vorhandene Anzahl von Gemeinde- und Innungsschlachthöfen, deren Leitung durch Tierärzte im Haupt- oder Nebenberuf oder durch Nichttierärzte, in Gemeinden über und unter 10 000 Einwohnern, gibt folgende Zusammenstellung:

	Öffentliche Schlachthöfe in Gemeinden mit									
	über 10000 Einwohnern					unter 10000 Einwohnern				
	Leitung durch Tierarzt im Haupt- beruf	im Ne- ben- beruf	Nicht- tierarzt	Eigentum der Ge- meinde	In- nung	Leitung durch Tierarzt im Haupt- beruf	im Ne- ben- beruf	Nicht- tierarzt	Eigentum der Ge- meinde	In- nung
Preußen	226	3	6	224	11	53	61	46	157	3
Bayern	30	4	3	36	1	6	38	19	63	—
Sachsen	27	—	—	18	9	7	—	—	4	3
Württemberg	12	—	4	8	8	10	17	19	32	14
Baden	7	3	5	15	—	—	23	38	61	—
Thüringen	12	—	1	11	2	—	1	—	1	—
Hessen	3	1	2	6	—	2	1	11	12	2
Hamburg	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Mecklbg.- Schwerin	6	—	—	6	—	2	3	—	5	—
Braun- schweig	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Oldenburg	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Anhalt	4	—	—	4	—	—	1	—	1	—
Bremen	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Lippe- Detmold	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Lübeck	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Mecklbg.- Strelitz	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Waldeck	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—
Schaumbg.- Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	337	11	22	339	31	81	146	133	338	22

Über die Ausübung der Veterinärpolizei in den Schlachthöfen liegen Angaben von 724 Schlachthöfen vor. Danach wird die Veterinärpolizei

in 588 Schlachthöfen durch den staatlichen Tierarzt,
in 68 Schlachthöfen durch den tierärztl. Schlachthofleiter,
in 68 Schlachthöfen durch beide Vorgenannte ausgeführt.

Außer dem Schlachthofleiter sind auf den öffentlichen Schlachthöfen noch 618 Tierärzte beschäftigt und zwar

als Beamte festangestellt	298 Tierärzte,
auf Privatdienstvertrag angestellt	105 Tierärzte,
als Hilfstierärzte nur an den	
Hauptschlachttagen tätig	215 Tierärzte.

Von diesen neben dem Schlachthofleiter tätigen Tierärzten sind auf den einzelnen Schlachthöfen

als Beamte festangestellt:	auf Privat-Dienstvertrag angestellt:	als Hilfstierarzt beschäftigt:
41mal je 1	63mal je 1	56mal je 1
33mal je 2—5	12mal je 2—5	19mal je 2—5
7mal je 6—10	—mal je —	2mal je 6—10
5mal je über 10	—mal je —	3mal je über 10

Außerdem sind auf den öffentlichen Schlachthöfen noch 372 Fleischbeschauer in der Fleischschau und 2055 Trichinenschauer in der Trichinenschau beschäftigt.

Mit Gleisanschluß sind versehen 156 öffentliche Schlachthöfe (= 21,4 Prozent aller öffentlichen Schlachthöfe), davon mit Normalspurgeleise 147 (= 20,1 Prozent aller Schlachthöfe) und mit Schmalspurgeleise 9 (= 1,2 Prozent).

Gleisanschluß besitzen folgende Schlachthöfe:

a) Normalspurgeleise:

in Preußen: Aachen, Altenessen, Afchersleben, Bad Godesberg, Barmen, Berlin, Beuthen (Ob.-Schl.), Bochum, Bonn, Bottrop, Brandenburg (Hav.), Breslau, Cochem, Cüstrin, Dortmund, Duisburg, Duisburg-Meiderich, Düsseldorf, Elberfeld, Elbing, Emden, Emmerich, Erfurt, Essen, Frankfurt (Main), Frankfurt (Oder), Gelsenkirchen, Gladbeck, Gleiwitz, Görlitz, Grünberg (Schles.), Guben, Hagen, Halberstadt, Halle (Saale), Hamborn, Hamm, Hannover, Harburg (Elbe), Haspe, Hattingen, Herne, Hildesheim, Hindenburg, Höchst (Main), Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Königsberg, Krefeld, Langensalza, Liegnitz, Lippstadt, Magdeburg, Merseburg, Minden, Moers, Mühlhausen, Mülheim (Ruhr), München-Gladbach, Neuß, Nordhausen, Oberhausen, Osnabrück, Paderborn, Potsdam, Quedlinburg, Ratibor, Recklinghausen, Remscheid, Rheine, Rheydt, Solingen, Spandau-Berlin, Stettin, Stolberg (Rheinl.), Tilsit, Weißenfels, Wesermünde-Bremerhaven, Wiesbaden, Wilhelmsburg-Harburg, Wilhelmshaven-Rüstringen, Witten;

in Bayern: Amberg, Augsburg, Bamberg, Garmisch-Partenkirchen, Hof, Kaiserslautern, Landau (Pfalz), Ludwigshafen (Rhein), München, Nürnberg, Passau, Regensburg, Rosenheim, Straubing, Würzburg, Zweibrücken;

in Sachsen: Annaberg, Aue, Chemnitz, Dresden, Freiberg, Glauchau, Leipzig, Limbach, Olbernhau, Olchatz, Penig, Plauen, Riesa, Stollberg, Zwickau;

in Württemberg: Bad Mergentheim, Ravensburg, Schwenningen, Stuttgart;

in Baden: Baden, Karlsruhe, Lahr, Lörrach, Mannheim, Offenburg, Pforzheim, Villingen;

in Thüringen: Altenburg, Arnstadt, Gera, Gotha, Ilmenau, Weimar;

in Hessen: Darmstadt, Mainz, Offenbach, Worms;

in Hamburg: Hamburg;

in Mecklenburg-Schwerin: Rostock, Schwerin;

in Oldenburg: Oldenburg;

in Braunschweig: Wolfenbüttel;

in Anhalt: Ballenstedt, Bernburg, Dessau;

in Bremen: Bremen;

in Lübeck: Lübeck.

b) Schmalspurbahn:

Bad Kissingen, Forst i. d. Lausitz, Heidelberg, Herford, Insterburg, Iserlohn, Ohligs, Zittau.

Kühlanlagen sind vorhanden auf 477 öffentlichen Schlachthöfen (= 65,3 Prozent aller öffentlicher Schlachthöfe). Von 414 dieser Kühlanlagen liegen Angaben über die Kühlraumfläche vor. Die Gesamtkühlraumfläche dieser 414 Anlagen beträgt 237 589 qm. Die kleinste Kühlanlage hat einen Flächenraum von 10 qm, die größte einen solchen von 28 054 qm. Die Schlachthöfe in Gemeinden unter 10 000 Einwohner haben zu 39,6 Prozent Kühlanlagen, die Schlachthöfe in Gemeinden über 10 000 Einwohner zu 91,9 Prozent.

Von den Kühltysystemen, die auf den öffentlichen Schlachthöfen Verwendung gefunden haben, steht an der Spitze die Ammoniakkühlung, besonders nach Linde; 295 Kühlanlagen (= 62 Prozent aller öffentlicher Schlachthofkühlanlagen) sind nach diesem System gebaut. Hiernach folgt in fast gleich hoher Anzahl das CO₂- (36mal = 4,8 Prozent) und das SO₂- (35mal = 4,8 Prozent) Kühlverfahren. Die übrigen verschiedenen Systeme finden sich meist auf den kleineren öffentlichen Schlachthöfen vor.

Gefrieranlagen sind auf 68 Schlachthöfen (= 9,3 Prozent aller Schlachthöfe) vorhanden.

Eine Eisfabrikation findet in 344 Schlachthöfen (= 47 Prozent aller Schlachthöfe) statt.

An weiteren besonderen Anlagen sind vorhanden:

1 Pferdefschlachthaus in 425 Schlachthöfen

(= 58,2 Prozent aller Schlachthöfe),

1 Sanitätschlachthaus in 427 Schlachthöfen

(= 58,5 Prozent aller Schlachthöfe),

Freibankanlagen in 682 Schlachthöfen

(= 93,4 Prozent aller Schlachthöfe).

Die Gesamtzahl der Freibankverkaufsstellen, von denen öfters mehrere in einer Schlachthofgemeinde vorhanden sind, beträgt 716.

Laboratoriumseinrichtungen zur Untersuchung von Fleisch befinden sich auf 325 öffentlichen Schlachthöfen (= 46 Prozent aller Schlachthöfe), davon sind Laboratorien zur Vornahme von nur einfachen Untersuchungen 177 (= 24 Prozent aller Schlachthöfe). Für feinere Untersuchungen, insbesondere zur Vornahme von Untersuchungen auf Fleischvergiftungen sind eingerichtet 148 Laboratorien (= 20,3 Prozent aller Schlachthöfe).

Außerdem besitzen 118 Schlachthöfe Milchlaboratorien (= 16,2 Prozent aller Schlachthöfe).

Da nicht alle deutschen Länder eine obligatorische Trichinenschau besitzen, so wird die Trichinenschau nur auf 539 Schlachthöfen (= 73,8 Prozent aller Schlachthöfe) ausgeführt und zwar

mit dem Mikroskop auf 445 Schlachthöfen

(= 82,5 Prozent der Schlachthöfe, auf denen die Trichinenschau ausgeführt wird),

mit dem Trichinoskop auf 59 Schlachthöfen,

(= 10,9 Prozent der Schlachthöfe, auf denen die Trichinenschau ausgeführt wird),

mit dem Mikroskop und Trichinoskop auf 35 Schlachthöfen

(= 6,5 Prozent der Schlachthöfe, auf denen die Trichinenschau ausgeführt wird).

Die Art der Betäubung der Schlachttiere erfolgt in den öffentlichen Schlachthöfen in folgender Weise:

durch Schlag 80mal

(= 10,9 Prozent aller Schlachthöfe),

durch Bolzenapparat 93mal

(= 12,7 Prozent aller Schlachthöfe),

durch Schußapparat 56mal

(= 7,7 Prozent aller Schlachthöfe),

durch Bolzenschußapparat 60mal

(= 8,2 Prozent aller Schlachthöfe),

durch Schlag und Bolzenapparat 84mal

(= 11,5 Prozent aller Schlachthöfe),
 durch Schlag und Schußapparat 85mal
 (= 11,6 Prozent aller Schlachthöfe),
 durch Schlag und Bolzenschußapparat 62mal
 (= 8,5 Prozent aller Schlachthöfe),
 durch Schlag, Schuß und Bolzenapparat 101mal
 (= 13,8 Prozent aller Schlachthöfe),
 durch Schlag, Bolzenschuß und Bolzenapparat 18mal
 (= 2,5 Prozent aller Schlachthöfe),
 durch Schuß und Bolzenapparat 63mal
 (= 8,6 Prozent aller Schlachthöfe),
 durch Schlachtmaske 9mal
 (= 1,2 Prozent aller Schlachthöfe),
 durch Schlag, Schlachtmaske und Schußapparat 5mal
 (= 0,7 Prozent aller Schlachthöfe),
 durch Schlag, Schlachtmaske und Bolzenapparat 9mal
 (= 1,2 Prozent aller Schlachthöfe),
 durch Schlag, Schlachtmaske, Schlagbolzen und Schußapparat
 5mal (= 0,7 Prozent aller Schlachthöfe).

Es ist also die Betäubung durch Schlag, d. h. durch unmittelbaren Hammerschlag und Schlag mittels Bolzen- bzw. Schlagbolzenapparates in den meisten Schlachthöfen noch üblich. Der unmittelbare Schlag kommt in 449 Schlachthöfen (= 61,5 Prozent aller Schlachthöfe), der Schlagbolzen in 373 Schlachthöfen (= 51 Prozent aller Schlachthöfe) zur Anwendung. Schußapparate werden in 455 Schlachthöfen (= 62,3 Prozent aller Schlachthöfe) benutzt.

Schächungen erfolgen in 404 Schlachthöfen (= 55,3 Prozent aller Schlachthöfe). Von den geschlachteten Tieren werden geschächtet

bis 15 Prozent in 148 Schlachthöfen
 (= 20 Prozent aller Schlachthöfe),
 über 15 Prozent in 27 Schlachthöfen
 (= 3,7 aller Schlachthöfe).

Von 229 Schlachthöfen, in denen Schächungen erfolgen, fehlen die Angaben über die Anzahl der geschlachteten Tiere.

Die Schlachthöfe, in denen 15 Prozent und mehr der geschlachteten Tiere geschächtet werden, sind folgende:

- 15 Prozent in Höxter, Linnich, Gilgenburg, Fürth i. B.;
- 20 Prozent in Bad Ems, Vallendar, Wittlich;
- 24 Prozent in Limburg;
- 25 Prozent Großvieh, 16 Prozent Kälber in Köln;
- 25 Prozent in Saarburg, Regenwalde;
- 26 Prozent Großvieh, 9 Prozent Kälber in Frankfurt am Main;
- 30 Prozent in Paderborn, Warburg;
- 33,3 Prozent in Neustadt a. S.;
- 40 Prozent Großvieh, 30 Prozent Kälber in Köln-Mülheim;
- 46 Prozent Großvieh, 30 Prozent Kälber in Neuwied;
- 50 Prozent in Gelnhausen, Gladenbach;
- 50 Prozent des Großviehs in Bad Mergentheim;
- 60 Prozent in Freystadt;



- 75 Prozent des Großviehs in Babenhausen (Hessen);
- 80 Prozent der Schafe in Gronau;
- 90 Prozent des Großviehs in Elschwege;
- 100 Prozent des Großviehs in Aurich;
- 100 Prozent in Buchau a. F.

Eine Übersicht, wie die öffentlichen Schlachthäuser über das Gebiet des Deutschen Reiches verteilt sind, gibt die nachfolgende Karte. Diese zeigt, daß eine gleichmäßige Verteilung über das Land in Baden und Württemberg sowie in Ostpreußen zu finden ist, während eine gewisse Massierung

in den Hauptverbrauchsgegenden, den westfälischen und sächsischen Industriegebieten, um Frankfurt a. Main und Mannheim deutlich erkennbar ist. Wenig öffentliche Schlachthöfe sind in Schleswig, Hannover, Oldenburg und der Provinz Brandenburg zu finden.

Außerdem sind auf der Karte die Schlachthöfe mit bakteriologischen Laboratorien kenntlich gemacht, die Untersuchungsämter und Institute, in denen die bakteriologische Fleischbefchau amtlich ausgeführt wird, sowie die Auslandsfleischbefchautellen.

(Aus der Veterinärabteilung des Reichsgesundheitsamtes, Zweigstätte Dahlem.)

Erfahrungen bei der staatlichen Prüfung ausländischen Schweinepest-Serums.

(Mit 3 Abbildungen.)

Von H. Zeller und K. Beller.

Seitdem im Jahre 1926 auf Grund des § 17, Abs. 17 des Reichsviehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 die Länderregierungen im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister des Innern Verordnungen erlassen haben, nach denen Schweinepestserum vom Ausland nur nach Prüfung durch das Reichsgesundheitsamt eingeführt werden darf, sind bis zum 1. Juni 1928 insgesamt neun solcher Prüfungsverfahren zur Durchführung gelangt, über die im Nachstehenden unter Berücksichtigung der in diesem Zusammenhang gemachten Beobachtungen und Erfahrungen kurz berichtet werden soll.

Wie bereits Mießner und Geiger¹⁾ ausgeführt haben, sind die besonderen Schwierigkeiten der Prüfung von Serum gegen Schweinepest darin begründet, daß diese Krankheit nicht auf kleine Versuchstiere übertragbar und in ihrem Verlauf auch beim Schwein selbst von verschiedenen, bis jetzt noch nicht in allen Teilen genau bekannten Bedingungen abhängig ist. Eines der wichtigsten Momente in dieser Hinsicht ist die ungleichmäßige, oft in weiten Grenzen schwankende Virulenz des Schweinepestvirus, über dessen Lebenseigenschaften wir nur mangelhaft unterrichtet sind. Sodann ist erfahrungsgemäß auch die Widerstandskraft einzelner Tiere gegenüber einer Infektion mit Schweinepestvirus sehr verschieden.

Diesen Verhältnissen mußte bei der Aufstellung eines Prüfungsplanes Rechnung getragen werden, wobei das Reichsgesundheitsamt sich die von Uhlenhuth²⁾ und seinen Mitarbeitern auf diesem Gebiete gesammelten Erfahrungen zunutze machen konnte. Danach war die Brauchbarkeit eines Serums als erwiesen zu betrachten, wenn es Schweine, die im Seuchenstall der Infektion ausgesetzt wurden, vor einer Erkrankung bewahrte. Dieser in die Prüfungsbestimmungen übernommene Grundsatz hat sich, soweit die bisher ausgeführten Prüfungsverfahren ein Urteil darüber zulassen, bewährt.

Im Gegensatz zu dieser den praktischen Verhältnissen bei der reinen Serumimpfung angepaßten Wertbemessung hat man in den Vereinigten Staaten von Amerika das Hauptgewicht darauf gelegt, zu prüfen, inwieweit bei simultaner Verabreichung von Virus und Immunserum das letztere den Ausbruch der Schweinepest aufzuhalten vermag. Im Hinblick auf die langjährigen Erfahrungen, die das Bureau of Animal Industry auf diesem Gebiet zu sammeln in der Lage war, mögen die von dieser Behörde erlassenen Vorschriften für die Prüfung von Schweinepestserum nach ihrem hauptsächlichsten Inhalt an Hand der am 10. Oktober 1922 von

John R. Mohler³⁾ veröffentlichten „Regulations governing the preparation, sale, barter, exchange, shipment and importation of viruses, serums, toxins and analogous products intended for use in treatment of domestic animals“ kurz skizziert werden:

Von 8 gefunden Schweinen mit einem Gewicht von 40—90 Pfund werden 5 mit 20 ccm des zu prüfenden Serums und 2 ccm Schweinepestvirus, die restlichen 3 nur mit 2 ccm Virus geimpft, wobei das Serum gleichmäßig in der rechten, das Virus in der linken Achselhöhle unter die Haut gespritzt werden soll. Sämtliche Schweine sind dann unter gleichen Bedingungen mindestens 21 Tage lang in einer Bucht zu halten und zu beobachten, sofern der Versuch nicht infolge störender Einflüsse vorher abgebrochen werden muß. Dies hat immer dann zu erfolgen, wenn alle oder mehrere Schweine vor dem 3. Tag nach der Infektion erkranken oder Abszesse an der Impfstelle aufweisen. Erkrankt nur eines der simultan geimpften Schweine, so darf das Serum nur dann als brauchbar bezeichnet werden, wenn das betreffende Tier vor Abschluß des Versuches wieder mindestens 3 Tage hintereinander einen vollständig gefunden Eindruck gemacht hat. Außerdem müssen von 3 Kontrolltieren mindestens 2 bis zum 7. aber nicht vor dem 3. Prüfungstag an den Erscheinungen der Schweinepest erkranken und bei der Zerlegung die pathologisch-anatomischen Veränderungen dieser Krankheit aufweisen. Ist dies nicht der Fall, so muß der Versuch wiederholt werden.

Die weiteren in allen Einzelheiten festgelegten Vorschriften befassen sich mit der Brauchbarmachung erstmalig zurückgewiesener Schweinepestseren und mit der Wiederholung der Prüfung, wobei zu beachten ist, daß in den Vereinigten Staaten von Amerika drei verschiedene Arten von Schweinepestserum hergestellt werden:

1. Antihogcholera- oder totalserum, auch whole blood-serum oder bloody serum genannt, das mit 10 Prozent Gewichtsteilen einer 5prozentigen Karbolsäure-Kochsalzlösung konserviertes defibriniertes Blut von immunisierten Schweinen darstellt.

2. Clear unconcentrated oder completed antihog-cholera-serum (clear serum, filled serum, refined serum, diluted serum) besitzt denselben Wertigkeitsgehalt wie whole blood-serum, nur sind bei ihm die roten Blutkörperchen durch daselbe Volumen (25 Prozent) physiologischer Kochsalzlösung ersetzt.

3. Clear concentrated oder blood cleared serum endlich stellt das vom Blut befreite Serum dar, das zur Erhöhung der Wertigkeit genügend wirksamer Seren der erst beschriebenen Art benützt werden kann. Außerdem besitzen die geklärten Seren vor den bluthaltigen den Vorzug, daß sie durch ½stündige Erhitzung auf 59—60 Grad von bakteriellen Verunreinigungen zu befreien sind, ohne dadurch an Wertigkeit zu verlieren.

Über den Verbrauch der einzelnen Serumarten in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt Tabelle 1 Auskunft, in der auf Grund der „Bureau of Animal Service and Regulatory Announcements“ die Mengen des staatlich geprüften Schweinepestserums in Kubikzentimetern aufgeführt sind:

³⁾ Mohler, J. R.: U.S.A. Dep. of. Agric. B. A. 1922, Order 276.

¹⁾ Mießner, H. und Geiger, W.: Die staatliche Prüfung des Virus Schweinepestserums. D. T. W. 1926, S. 325.

²⁾ Uhlenhuth, Xylander, Hübener, Haendel, Gildemeister, Bohtz und Schern: Untersuchungen über die Schweinepest. Arbeiten aus dem Kais. Gesundheitsamt 1908 bis 1914, Bd. 27, 30 und 47.

Tabelle 1.

	Total serum	Clear serum completed	Hyperimmune blood clear
Januar 1928	55, 385, 210	36, 384, 518	34, 192, 341
Januar 1927	78, 319, 893	37, 477, 739	42, 999, 330
Januar-Dezember 1927	1, 386, 321, 487	655, 320, 590	736, 924, 869
Januar-Dezember 1926	118, 903, 465	45, 831, 451	45, 646, 535

Aus dieser Tabelle geht hervor, daß die in den Vereinigten Staaten von Amerika verbrauchte Menge von „Total serum“ fast ebenso groß ist wie die der beiden anderen Serumarten zusammen. Außerdem läßt die Tabelle den gewaltigen Anstieg der Produktion im Jahre 1927 erkennen, der den das Jahr vorher fühlbar in die Erscheinung getretenen Mangel an Serum ausgleichen sollte und im Januar 1928 nur wenig zurückgegangen ist.

In Ungarn, wo nächst den Vereinigten Staaten von Amerika am meisten Schweinepestserum hergestellt wird, scheinen keine einheitlichen Prüfungsvorschriften zu bestehen. Nach einer privaten Mitteilung von Köves werden an der unter seiner Leitung stehenden Serumgewinnungsanstalt „Phylaxia“ in Budapest zu einem Prüfungsversuch 24 Schweine benützt. Davon werden 8 nur mit Virus, 8 mit dem zu untersuchenden Serum geimpft und weitere 8 bleiben unbehandelt. Das Serum wird als brauchbar bezeichnet, wenn von den Schutzgeimpften Tieren nicht mehr als 2, von den beiden übrigen Reihen dagegen mindestens 5 Tiere tödlich erkranken.

Diesem Vorgehen ist die auf Grund eines Reichsgesundheitsratsbeschlusses vom Reichsministerium des Innern empfohlene Prüfungsvorschrift weitgehend angepaßt mit dem Unterschied, daß neben der reinen Schutzwirkung des Serums auch das in Amerika vorwiegend angewandte simultane Verfahren berücksichtigt wurde.

Von den 24 zu einem Versuch notwendigen Schweinen im Gewicht von 30–40 kg werden 8 sowohl mit Virus als auch mit Serum entsprechend den Angaben der Gebrauchsanweisung, doch höchstens mit 30 ccm geimpft (1. Prüfungsreihe), 8 weitere bleiben solange unbehandelt, bis eines oder mehrere der Tiere bei der täglich zweimal vorzunehmenden Messung Temperaturen über 40,5 Grad C aufweisen (2. Prüfungsreihe). Diese Tiere erhalten dann die doppelte Serumdosierung (Notimpfung), während die fieberfreien Schweine nur mit der einfachen Serummenge entsprechend der Gebrauchsanweisung geimpft werden. Die letzten 8 Schweine endlich stellen die Kontrollreihe dar und werden zu Beginn des Versuches mit Virus allein (1 ccm hinter dem Ohr) infiziert.

Gültig ist der Prüfungsversuch nur dann, wenn von diesen 8 Kontrollschweinen mindestens 6 an Schweinepest erkranken und innerhalb von 20 Tagen daran verenden. Ist dies nicht der Fall, oder erkranken mehr als 2 dieser Tiere schon innerhalb der beiden ersten Versuchstage fieberhaft, so muß der Versuch wiederholt werden. Von den simultan geimpften Schweinen der ersten Prüfungsreihe dürfen höchstens 3, von den 8 Schweinen der zweiten Prüfungsreihe außer den notgeimpften höchstens 25 Prozent der z. Zt. der Impfung noch gefunden Tiere eingehen. Andernfalls wird das Serum als unbrauchbar bezeichnet. Der Abschluß eines Prüfungsversuches erfolgt nach 21 Tagen.

Der schon beschriebenen Prüfung auf Wertigkeit geht die Untersuchung auf Unschädlichkeit voraus, die wiederum in

- a) die Prüfung auf Klarheit und Keimfreiheit und
- b) die Prüfung des Phenol- oder Trikresolgehaltes zerfällt.

Die Seren müssen keimfrei, ohne Niederschläge fein und dürfen nicht mehr als 0,5 Prozent Phenol oder 0,4 Prozent Trikresol enthalten.

Nach dieser Methode sind im Reichsgesundheitsamt bis-

her 6 Prüfungsversuche mit 3 Wiederholungen durchgeführt worden, deren Ergebnisse in Tabelle 2 zusammengefaßt sind. Die geprüften Seren entstammten 3 ungarischen Herstellungsstätten, die mit A, B und C bezeichnet wurden, während die einführenden deutschen Firmen durch Anfügung fortlaufender Ziffern an diese Buchstaben kenntlich gemacht sind. Als Ansteckungsstoff diente bei allen Versuchen deutsches Virus, das vom Institut zur Bekämpfung der Virus-schweinepest in Eystrup zur Verfügung gestellt und von uns in zahlreichen Passagen fortgeführt wurde. Parallelversuche mit ungarischem und russischem Schweinepestvirus haben, wie hier vorweggenommen werden soll, keine Änderung der Wertigkeit bei den untersuchten Seren ergeben. Eine Pluralität des Schweinepestvirus konnte also in Übereinstimmung mit den Angaben von Uhlenhuth, Mießner und Geiger⁴⁾ nicht ermittelt werden.

Die ersten vier Prüfungsversuche wurden in einem behelfsmäßig eingerichteten Stall innerhalb des Seuchengeländes der Zweigstätte Dahlem des Reichsgesundheitsamtes ausgeführt. Ihr nur teilweise befriedigender Verlauf, auf dessen Urfachen noch zurückgekommen wird, gab Veranlassung zum Bau eines besonderen, für diese Zwecke eingerichteten neuen Stallgebäudes, dessen Inneres durch die untenstehenden Abbildungen 1 und 2 veranschaulicht wird.



Abb. 1. Innenansicht des Prüfungstalles vom Mittelgang aus gesehen.




Abb. 2. Fütterung am Automaten, während gleichzeitig das Messen der Tiere stattfindet.

Es enthält durch einen Mittelgang getrennt auf jeder Seite je zwei 5,25×3 m große Buchtungen für je 12 Schweine, so daß 2 Prüfungsversuche gleichzeitig vorgenommen werden können. Die Buchtungen lassen einen rechteckigen Raum von 2,75×4 m frei, in dessen Mitte der für 12 Schweine berechnete Futterautomat steht. Durch Gittertüren ist dieser Raum nach den beiden Gangseiten hin verschließbar, so daß

⁴⁾ Uhlenhuth, Mießner und Geiger: Virus-schweinepest aus: Kollé - Kraus - Uhlenhuth, Handbuch der pathogenen Mikroorganismen 1928, Bd. 9.

auf diese Weise nach Bedarf ein gemeinsamer Fütterungsraum geschaffen werden kann. Solange die Tiere mit der Futteraufnahme beschäftigt sind, lassen sie sich, auch bei sonst großer Widerstandsfähigkeit, messen ohne Anwendung von Gewaltmaßnahmen, deren Vermeidung mit Rücksicht auf die dadurch verursachte Steigerung der Körperinnentemperatur geboten erscheint. Außerdem war dadurch, daß der Reihe nach die Infassen sämtlicher Buchten an den Futterautomaten kommen mußten, eine bessere Beobachtung der einzelnen Tiere, sowie ihre gleichmäßige Infektion gewährleistet — das letztere deshalb, weil Schweine erfahrungsgemäß hauptsächlich während der Futteraufnahme oder im Anschluß daran Kot und Urin absetzen.

Von der Überlegung ausgehend, daß gleiche Gewichtszunahmen eine gleichmäßige Fütterung zur Voraussetzung haben, wurden pro Tag $1\frac{1}{2}$ kg folgender Futtermischung, auf zwei Mahlzeiten verteilt, gereicht:

- 30 Prozent Maischrot,
- 30 Prozent Gerstenschrot,
- 20 Prozent Roggenkleie,
- 19 Prozent Fischmehl,
- 1 Prozent Schlemmkreide.

Daneben erhielten die bereits vor dem Versuch an diese Fütterungsart gewöhnten Schweine als Füllsel noch eingeweichte gekochte Kartoffeln bis zu $1\frac{1}{2}$ kg pro Tier und Tag.

erfolgenden Todesfälle berücksichtigen. Offenbar war bei Aufstellung der Prüfungsvorschriften die Meinung vorherrschend gewesen, daß die Impfreaktion innerhalb dieser Zeit abgeklungen sei. Daß dies nicht gänzlich der Fall ist, geht aus den Spalten hervor, die über das weitere Schicksal der Schweine nach Abschluß des Prüfungsversuchs Aufschluß geben. Allerdings fällt auf, daß die Prüfungsversuche 2, 3 und 4 in dieser Beziehung ungünstiger abschneiden, als die späteren, wenn man von den mißlungenen Versuchen 6 und 7 abieht, und damit befinden wir uns bei dem Grund, der die unmittelbare Veranlassung für den Neubau eines besonderen Schweinepestserumprüfungsstalles abgegeben hatte. Bei der anfänglichen Unterbringung stand den 24 Versuchsferkeln nur eine Fläche von $3,80 \times 3$ m zur Verfügung, wovon außerdem noch der von dem Futtertrog eingenommene Raum in Abzug kam. Die Folge davon war, daß die Tiere sich sehr schmutzig hielten und der durch die Abgänge vervielfachten Infektion in besonders starkem Maß ausgesetzt waren, zu deren Paralytierung anscheinend die verabreichte Serummenge nicht völlig ausreichte. Bekanntlich hat auch Pfeiler⁵⁾ bei seinen unter praktischen Verhältnissen durchgeführten Schutzimpfungsversuchen mit Schweinepestserum die Mißerfolge auf eine massive Infektion bei zu enger Befetzung der Ställe zurückgeführt, und wir möchten diesen besonderen Verhältnissen bei der

Tabelle 2.

Lfd. Nr.	Datum des Prüfungs- beginns	Herkunftsland und einführende Firma		Sterilitäts- und Un- schädlichkeitsprüfung			Wertigkeitsprüfung												Beurteilung des Versuchs
				Boden- satz	steril	Über- schuß an Kon- servirgs mitteln	I. Versuchsreihe				II. Versuchsreihe				Kontrollreihe				
							vor Abschluß		nach Abschluß		vor Abschluß		nach Abschluß		vor Abschluß		nach Abschluß		
		tot	Fieber				tot	Fieber	tot	Fieber	tot	Fieber	tot	Fieber	tot	Fieber			
1	4. Juni 1926	Ungarn	A 1	nein	ja	nein	1	3	—	2	1	4	1	—	1	4	2	2	ungültig
2	9. Juli 1926	"	A 1	Wiederholung des 1. Versuchs		nein	4	4	2	1	1	7	2	2	8	—	—	—	den staatlichen Anforde- rungen ent- sprechend
3	9. Juli 1926	"	B 2	nein	ja	nein	5	3	2	—	1	7	1	4	7	1	1	—	
4	7. Jan. 1927	"	A 1	nein	ja	nein	1	5	2	1	1	5	3	—	7	1	1	—	
5	8. Sept. 1927	"	A 1	nein	nein	nein	—	8	—	1	2	6	2	—	8	—	—	—	
6	21. Dez. 1927	"	A 1	nein	nein	nein	4	4	3	—	5	3	2	—	8	—	—	—	ungültig
7	21. Dez. 1927	"	C 3	nein	ja	nein	5	3	2	—	4	4	2	—					
8	1. Febr. 1928	"	A 1	Wiederholung der Versuche Nr. 6 und 7		nein	—	6	—	—	2	6	—	—	8	—	—	—	den staat- lichen Anfor- derungen entsprechen
9	1. Febr. 1928	"	C 3			nein	1	6	—	1	2	6	—	1					

Aus Tabelle 2 geht hervor, daß die in der Prüfungsvorschrift gestellte Forderung auf Keimfreiheit in den meisten Fällen ohne einen unerlaubten Zusatz von Konservierungsmitteln erfüllt wurde. Bei den zwei Proben, wo dies nicht zutraf, lag der Verdacht nahe, daß eine nachträgliche Verunreinigung der Behälter bei der Probenahme stattgefunden hatte. In diesen Fällen wurde durch einen nochmaligen Filtrationsprozeß ausnahmslos vollständige Sterilität erzielt. Wir heben dies ausdrücklich hervor, weil man bisweilen die Ansicht hört, daß gerade Schweinepestserum nur schwer keimfrei zu machen sei, betonen aber dabei, daß unsere Beobachtungen sich nur auf reines, von zelligen Elementen vollständig befreites Serum (das amerikanische cleared serum) beziehen. Defibriniertes Blut von hyperimmunisierten Schweinen, wie es anscheinend in den Vereinigten Staaten von Amerika in großen Mengen zur Verwendung gelangt, wird von der deutschen Prüfungsvorschrift schon deshalb ausgeschlossen, weil darin außer der Keimfreiheit vollständige Klarheit verlangt wird.

Was die Wertigkeit anlangt, so entsprach diese bei den unterfuchten sechs Serumsendungen den staatlichen Anforderungen, die nur die innerhalb der 21tägigen Versuchsdauer

Schweinepest nach unseren Erfahrungen ebenfalls eine nicht geringe Bedeutung für die Einschätzung der Schutzwirkung eines Immunserums beimesen.

Eine andere Schwierigkeit liegt, wie bereits eingangs ausgeführt worden ist, in der schwankenden Virulenz des Schweinepestvirus, an der gleich unser erster Prüfungsversuch scheiterte. Der zu diesem Versuch vom Institut zur Bekämpfung der Viruschweinepest in Eystrup bezogene Ansteckungsstoff war nicht kräftig genug, um die Kontrolltiere innerhalb der Versuchszeit von 21 Tagen zu töten. Die Ferkel kümmerten, gingen zum Teil nach dieser Zeit auch noch ein, ohne jedoch die anatomischen Merkmale der Schweinepest aufzuweisen. Diese Erfahrung sagte uns, daß es notwendig sei, jedem Prüfungsversuch einen Vorversuch zur Auswertung des Virus vorausgehen zu lassen, so daß in der Folge zur Prüfung eines Serums nicht wie in den Vorschriften vorgesehen 24, sondern mindestens 25 Schweine erforderlich waren.

⁵⁾ Pfeiler, Warum vermag die Schutzimpfung gegen die Schweinepest in der deutschen landwirtschaftlichen Praxis? Berliner Tierärztl. Wochenschrift 1915, S. 277.

Um keine Abchwächung des Virus durch längere Aufbewahrung oder durch eine irgendwie geartete Vorbehandlung befürchten zu müssen, wurde zur Infektion der Kontrollen und der acht in die erste Versuchsreihe eingestellten Tiere jeweils das Blut eines 8—10 Tage vorher infizierten Ferkels benutzt, das aus dem Schwanz entnommen und durch Schütteln mit Glasperlen in steriler Glasflasche vom Fibrin befreit worden war. Trotzdem die zu diesem Vorversuch benutzten Tiere aus derselben Zucht stammten wie diejenigen des Hauptversuchs, kam es auf diese Weise in dem Doppelversuch 6/7 zu einer Mischinfektion mit Bakterien aus der Gruppe der hämorrhagischen Septikämie, die den Schutz des Schweinepestserums unwirksam machte und auch auf die zweite Versuchsreihe übergriff. Wir filtrierten von da ab das zur Infektion dienende Blutserum durch Berkefeld-Kerzen, ohne uns deshalb der Gewißheit hinzugeben, gegen solche Vorkommnisse in Zukunft vollständig gesichert zu sein.

Sieht man von diesen zum Teil unvermeidlichen Zwischenfällen ab, so blieb die Wertigkeit des innerhalb zweier Jahre aus der Herstellungsstätte A gelieferten Schweinepestserums, an den Abgängen von Tieren infolge Todes während der Versuchsdauer gemessen, ziemlich konstant, obwohl diese in den einzelnen Versuchen zeitlich verschieden erfolgten. Bei der Kontrollreihe traten in unseren Versuchen die ersten Todesfälle mitunter bereits am dritten bis vierten Tag nach der Infektion auf, bevor die Tiere noch klinisch erkennbare Krankheitszeichen aufgewiesen hatten, wenn man von den in der Praxis nicht immer durchzuführenden Temperaturmessungen absteht, die den Ausbruch der Krankheit allerdings bereits 12—24 Stunden früher anzeigen. Wir stimmen auch mit Geiger⁶⁾ darin überein, daß das Virus bereits innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Infektion aus dem Körper wieder ausgeschieden werden muß, denn wir fahen nicht selten einzelne Tiere der zweiten Versuchsreihe schon am dritten Versuchstag zusammen mit den Kontrollen erkranken, während in der Simultanreihe die kritische Zeit zwischen dem 9. und 12. Tag zu liegen schien.

Bis dahin sind die pathologisch-anatomischen Veränderungen der Schweinepest in der Regel schon so deutlich ausgebildet, daß die Diagnose keine Schwierigkeiten bereitet. Insbesondere die Schwellung und die von den Rändern ausgehende blutige Marmorierung der Lymphknoten bieten dafür einen ziemlich zuverlässigen Anhaltspunkt, wenn auch das Fehlen dieser Veränderungen keineswegs den Ausschluß der Schweinepest gestattet. Ihre früheste und stärkste Ausbildung erfahren die genannten Veränderungen nach unseren Beobachtungen an den Kehlgangs-, Hals- und Brusteingangslymphknoten, während die Lymphknoten des Darmes in Bezug darauf noch hinter den Fleischlymphknoten zurückbleiben, die wiederum je nach ihrer Entfernung von der Infektionsstelle zeitliche und graduelle Abstufungen aufweisen. Außerdem bietet sich nach Verlauf der ersten 8—10 Tage bereits das Bild der hämorrhagischen Diathese auch in anderen Organen dar, von denen Nieren und Lungen eine besondere Disposition zu besitzen scheinen, während die Milz davon feltener, die Leber so gut wie gar nicht betroffen sind. Dazu kommen unter Umständen, aber wiederum nicht regelmäßig, Blutungen unter dem Peritoneum, an den Herzohren und im Kehlkopf, sowie — und darauf haben wir besonders achten gelernt — unter dem serösen Überzug des Magenblindsacks, der, wenn man ihn am geöffneten Tier aus der Tiefe heraushebt, oft wie mit Blut bespritzt aussieht. Auch die Magenschleimhaut reagiert mit entzündlicher Rötung, die anfänglich punktförmig, dann diffus den ganzen Fundusteil ausfüllt, verhältnismäßig frühzeitig. Ausnahmsweise haben wir auch die Schlundschleimhaut mit Blutungen besetzt ge-

funden. Den vorderen Abschnitten des Verdauungstrakts folgen Blase und Dickdarm, wo infolge der Wirkung der Darmbakterien die bekannte käsig-diphtheroide Verfärbung der durch kleinste Substanzverluste in der Schleimhaut entstandenen Geschwürsflächen vom Beginn der dritten Woche ab mehr und mehr das Bild beherrscht und nach unseren Beobachtungen dann nur selten fehlt. Ähnliche Veränderungen finden sich bisweilen im Magen, auf dem Kehldeckel, an den Mandeln, auf der Zunge und bei männlichen Tieren mit großer Regelmäßigkeit in dem Vorhautsack (vergl. Abb. 3).




Abb. 3. Der dem Penis aufliegende Vorhautsack mit geschwürigen Veränderungen. (Von der Bauchseite her nach Entfernung der darüber liegenden z. T. blutig unterlaufenen äußeren Deckel eröffnet.)

Mit der Dauer der Krankheit vermehren sich somit die Möglichkeiten ihrer Erkennung, umso mehr, als nunmehr auch die klinischen Merkmale, wie Erbrechen, Verminderung oder vollständige Verweigerung der Futteraufnahme, Durchfall, unsicherer Gang, Schwanken besonders in der Hinterhand und Blaufärbung der Haut, unterstützend hinzukommen. Sie fehlen, wie gesagt, bei dem akuten Verlauf, der bereits innerhalb der ersten Woche zum Tode infolge plötzlich einsetzender Atemnot mit anschließender Erstickung führt, wobei den innerhalb weniger Stunden blaurot überlaufenden Tieren Schaum vor den Mund tritt. Die Zerlegung fördert in diesen Fällen ein akutes Lungenödem mit Blutanschoppung in der stark erweiterten rechten Herzkammer zutage. Die Nieren sind, ebenso wie die Leber, vergrößert, vermehrt blutreich und brüchig. Demgegenüber erscheint die Muskulatur häufig blaßgelb oder fischfleischfarben. Auf den im übrigen noch unveränderten Darmschlingen findet sich außerdem mitunter ein für Beginn der Erkrankung offenbar charakteristischer fädiger, fibrinöser Belag.

Eines der sichersten Anzeichen nicht nur für die erfolgte Ansteckung, sondern auch für den Verlauf der Erkrankung ist die Steigerung der Körperinnentemperatur, für die als Grenzwert in den deutschen Prüfungsvorschriften 40,5 ° C angegeben sind. Im Gegensatz zu den amerikanischen Prüfungsvorschriften bleibt jedoch in den deutschen bei der abschließenden Beurteilung das Bestehen einer fieberhaften Erkrankung unberücksichtigt, obwohl diese unter Umständen in des Wortes wahrster Bedeutung doch wesentlich ins Gewicht fällt und, wenn sie länger anhält, für den Züchter

⁶⁾ Geiger, W.: Die sanitätspolizeiliche Bedeutung der Virus-schweinepest. D. T. W. 1927, S. 813.

nicht gleichgültig ist. Da diese Überlegung für die in neuester Zeit auch in Deutschland erwogene Simultanimpfung gegen die Schweinepest bedeutungsvoll erscheint, haben wir in Tabelle 2 die vor und nach dem Abschluß der 21tägigen Versuchszeit festgestellte Zahl der Todesfälle sowohl wie diejenige der fieberhaften Erkrankungen in den einzelnen Versuchsreihen aufgeführt. Daraus geht zunächst hervor, daß trotz der nach Erkrankung von ein oder zwei Tieren in der zweiten Versuchsreihe erfolgten Notimpfung die Erkrankung bei den übrigen sich nicht aufhalten läßt. Das Überleben der Tiere dieser zweiten Versuchsreihe muß als Folge einer aktiven Immunisierung aufgefaßt werden, wie sie in der ersten Versuchsreihe angestrebt wird, womit unsere Beobachtung übereinstimmt, daß trotz monatelangen Zusammenlebens der Schweine aus der ersten und zweiten Versuchsreihe niemals eine nachträgliche Erkrankung der letzteren vorkam, obwohl deren Serumschutz in der Zwischenzeit unwirksam geworden sein mußte. Er genügt aber offenbar, um das durch die Schleimhäute des Verdauungsapparates eindringende Virus an der Überflutung des Organismus zu verhindern. Ist diese Überflutung bereits vor der Impfung erfolgt, so hat sich in den meisten Fällen auch die Serumwirkung als unzureichend erwiesen.

Dieser Nachteil der zu späten Serumimpfung ist bei der ersten Prüfungsreihe ausgeschaltet. Die doppelte Infektion auf subkutanem und oralem Wege scheint jedoch bei gleichzeitig mit Virus und Serum geimpften Tieren eine stärkere Alteration mit sich zu bringen, die eine vermehrte Anfälligkeit bakteriellen Einflüssen gegenüber zur Folge hat, so daß

der Krankheitsverlauf nicht selten durch das Auftreten von Mischinfektionen mehr oder weniger ungünstig beeinflusst wird. Noch deutlicher als aus den Temperatortabellen ist dies aus den Gewichtszunahmen ersichtlich, die sich durch den Vergleich der in den Prüfungsvorschriften jeweils am Anfang und am Ende der Versuchszeit vorgeschriebenen Wägungen ergeben. Sie schwanken in den einzelnen Versuchen durchschnittlich zwischen 4 und 13,5 kg je Tier und geben im Einzelfall oft ein zutreffenderes Bild über die Stärke der Impfreaktion als die Messung der Körpertemperatur allein, die trotz schwerer klinischer Erscheinungen nicht immer den Fiebergrenzwert übersteigt.

Zusammenfassung.

Es werden die in neun Schweinepestserumprüfungsversuchen mit sechs verschiedenen Serumlieferungen von drei ungarischen Herstellungsstätten gesammelten Erfahrungen kurz zusammengestellt. Danach hat sich eine Ergänzung der bestehenden Prüfungsvorschriften insofern als notwendig erwiesen, als dem Hauptversuch immer ein Vorversuch zur Prüfung der Virulenz und der Reinheit des Ansteckungstoffes vorauszugehen hat. Die für die Beurteilung der Wertigkeit aufgestellten Grundsätze haben sich im Hinblick auf die Schutzkraft des Schweinepestserums bewährt. Bei der gleichzeitigen Verabreichung von Serum und Virus bedarf es der sorgfältigen Fernhaltung aller den Ablauf der Impfreaktion störenden Einflüsse.

Seuchenlehre u. Seuchenbekämpfung.

Manninger, R.: Über die Ursache der Dysenterie bei neugeborenen Tieren. (Allatorvosi Lapok, 1928, Nr. 8, S. 99.)

Es wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß, mit Ausnahme des Bang'schen Abortusbazillus, die bisher als Erreger der Dysenterie der neugeborenen Tiere beschriebenen Mikroorganismen in sich die Krankheit nicht hervorrufen können, sondern nur beim Vorhandensein einer besonderen Disposition. Abgesehen von etwaiger angeborener konstitutioneller Schwäche, sehr oft spielt eine ätiologische Rolle die Ansteckung der Muttertiere mit dem Bang'schen Abortusbazillus oder mit dem *Bacillus paratyphi abortus*, wo dann in den protrahierten Fällen mit den Abortus-Erregern behaftete lebende Feten zur Welt gebracht werden und dann entweder unmittelbar an einem durch den Erreger selbst hervorgerufenen Durchfall sterben oder in ihrem geschwächten Organismus durch irgend einen unspezifischen Mikroorganismus eine Darmentzündung zur Entwicklung gebracht wird. Eine besonders bei Ferkeln bedeutende Rolle spielt eine unzureichende Fütterung der Muttertiere während der Trächtigkeit. Namentlich eine ungenügende Zufuhr von Mineralstoffen und Vitaminen kommt in Betracht. Ob die Inzucht zur Entwicklung einer konstitutionellen Schwäche beitragen kann, müssen weitere Beobachtungen entscheiden. Als weitere prädisponierende Umstände lassen sich anführen Diätfehler bei Eutererkrankungen der Muttertiere und bei künstlicher Aufzucht der Jungtiere. Sehr wichtig sind ferner ungünstige Stallverhältnisse.

Hiernach läßt sich von den verschiedenen Impfmethoden kein Erfolg erwarten. Ein solcher läßt sich dagegen erzielen durch Behebung der Disposition der Jungtiere, wenn man deren Widerstandsfähigkeit durch rationelle Verbesserung der Lebensverhältnisse hebt. Außerdem muß man bestrebt sein, das Eindringen übergroßer Mengen unspezifischer Mikroorganismen in den Verdauungsschlauch der neugeborenen Tiere zu verhindern durch Absonderung und durch Reinhaltung.

Marck.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Keller, Fr.: Versuche einer Sensibilisierung von Meerfischweinen gegen Alttuberkulin auf unspezifischem Wege. (Aus dem Institut „Robert Koch“. — Leiter: Prof. B. Lange.) Zschr. für Hygiene 1928, 108, H. 4, S. 784.)

Keller liefert einen Beitrag zu der Frage, ob es gelingt, durch Vorbehandlung mit nicht spezifischen Stoffen eine Empfindlichkeit gegen Tuberkulose herbeizuführen. Er stellte folgendes fest: Werden Meerfischweine mit normalen Meerfischweinenorganen vorbehandelt und intrakutan mit Tuberkulin nachgeprüft, so treten vielfach im Anschluß an die zweite evtl. noch bei der dritten Prüfung Reaktionen auf, die mit der Tuberkulinreaktion gewisse Ähnlichkeit haben. Diese Reaktionen gehen im Gegensatz zur Tuberkulinreaktion in 48 Stunden zurück. Durch wiederholte Tuberkulin-intrakutanprüfungen gelingt regelmäßig eine Desensibilisierung. Wenn schon diese Beobachtungen darauf hindeuten, daß es sich bei der Reaktion nicht um eine Überempfindlichkeit gegenüber den Bestandteilen des Tuberkelbazillus, sondern um eine solche gegen unspezifische Eiweißstoffe handelt, so geht dies sicher aus 2 weiteren Tatsachen hervor. 1. Gelingt die Auslösung der Reaktion bei den mit Organextrakten präparierten Meerfischweinen nicht wie beim tuberkulösen Tier mit wässrigen von Nährbodenbestandteilen freien Extrakten von Tuberkelbazillen, 2. lassen sich die Reaktionen genau in gleicher Stärke wie durch Tuberkulin durch eingeeengte Glycerinbouillon hervorrufen. Ziegler.

Aoki, K.: Über agglutinatorische Typen von Paratyphusbazillen, welche bei Fleischvergiftung nachweisbar sind (*B. enteritidis* Gärtner ausgenommen). (Aus dem Bakteriolog. Institut der Universität zu Sendai. — Direktor: Prof. Dr. K. Aoki.) (Zschr. für Hygiene 1928, 108, H. 3, S. 554.)

Auf Grund jahrelanger Untersuchungen hat Aoki festgestellt, daß es unter den Paratyphusbazillen, welche bei Fleischvergiftungen nachweisbar sind, spe-

zifische und unspezifische Varianten gibt. Die spezifischen Varianten sind ganz differenziert, so daß sie gegenseitig gar nicht mitagglutinieren. Die unspezifischen Varianten wirken ganz anders; sie werden nicht nur von dem eigenen Serum, sondern auch von anderem unspezifischen Serum mehr oder minder mitagglutiniert, jedoch von dem spezifischen Serum von anderen Arten gar nicht beeinflusst. Auf diese Weise wurden von ihm im ganzen 7 spezifische und ihnen entsprechende 7 unspezifische Seren dargestellt, wodurch diese Paratyphusbazillen in 7 agglutinatorische Typen differenziert wurden. Diese Typen waren folgende: Typus Paratyphus B, Mäufetyphus, Paratyphus A, Hogcholera, Newport, L. und Stanley. Nach diesem agglutinatorischen Schema wurden 43 Stämme von Paratyphusbazillen, welche teils in Europa, teils in Japan bei Fleischvergiftung oder Nahrungsmittelvergiftung nachgewiesen worden waren, genau untersucht. Dabei wurde festgestellt, daß der Typus Mäufetyphus 21, Typus Newport 6, Typus Hogcholera 3, Typus PB. 3, Typus Stanley 1, Typus L. einmal vorhanden war. Ferner wurden vier Stämme als Gärtner, zwei andere Stämme als schweragglutinable festgestellt. Geographisch betrachtet wurde festgestellt, daß der Typus Mäufetyphus ubiquitär vorhanden ist, so daß er nicht nur in allen Ländern von Westeuropa, sondern auch in Japan nachweisbar war. Deshalb kann man wohl so annehmen, daß der Typ. Mäufetyphus als Erreger von Fleischvergiftungen eine große Rolle spielt. Dabei muß bemerkt werden, daß bei Typ. Mäufetyphus drei Varianten nachweisbar sind. Durch dieses Verhalten war die Bestimmung dieser Typen immer erschwert. Der Typ. Newport, welcher in England bei Fleischvergiftung nachgewiesen war, wurde auch unter deutschen Stämmen nachgewiesen, welche als B. enteritidis breslaviensis abgegeben waren. Der Typ. Hogcholera wurde sowohl bei englischen als auch deutschen Stämmen nachgewiesen, welche bei Fleischvergiftung von Menschen beobachtet waren. Deshalb muß angenommen werden, daß der Hogcholera oder B. suipestifer, wenn auch nicht so häufig wie der Typ. Mäufetyphus, doch bei Menschen Fleischvergiftung verursachen kann. Der Typ. Paratyphus B, welcher gewöhnlich bei typhösen Erkrankungen von Menschen nachweisbar ist, wurde auch bei Fleischvergiftung sicher nachgewiesen. Doch scheint er nicht so häufig vorzukommen wie der Typ. Mäufetyphus. Von dem Typus Stanley wurde auch angegeben, daß er einmal bei Fleischvergiftung, ein andermal bei typhöser Erkrankung nachgewiesen war. Was den Typus L. anbelangt, so scheint man über ihn nicht viel zu wissen, da er bei Fleischvergiftung nur einmal bei Bruce White beobachtet wurde. Ziegler.

Verschiedene Mitteilungen.

Akademische Nachrichten.

Der Landestierarzt von Bayern und Referent für das Veterinärwesen im Ministerium des Innern, Dr. Gasteiger, ist zum Geheimen Rat mit dem Range eines Ministerialdirektors ernannt worden.

Oberregierungsveterinärarzt im Sächsischen Landesgesundheitsamt Dr. Hugo Zietzschmann ist zum Landestierarzt von Sachsen und Ministerialrat im Wirtschaftsministerium ernannt.

Zum Dekan der vet.-med. Fakultät der Universität Gießen für das Kalenderjahr 1929 ist Prof. Dr. med. vet. J. Nörr, Direktor der Medizinischen Veterinärklinik in Gießen gewählt worden. Prof. Dr. Nörr wird vom 1. Januar 1929 ab als Dekan amtieren.

Der Privatdozent für landwirtschaftliche Betriebslehre Dr. H. Zörner in Berlin-Lichterfelde ist mit dem Lehrauftrag für allgemeine Landwirtschaftslehre an der Tierärztlichen Hochschule Berlin und mit der Abhaltung der Prüfungen in diesem Fache betraut worden.

Dem Tierarzt Dr. F. L. Huber, Bakteriologe am Tierärztlichen

Institut zu Buitenzorg (Niederl.-Ind.) ist seitens der Deutschen Reichsregierung der Titel Professor verliehen worden.

Für die Prüfung von Geflügelzuchtleitern (-innen) wurde Professor Dr. Mießner-Hannover als Prüfungskommissar und Professor Dr. Raebiger-Halle a. S. als Stellvertreter ernannt.

Ob.-Regierungs- und Vet.-Rat Dr. Heyden †.

Soeben trifft die erschütternde Nachricht ein, daß Ob.-Regierungsrat Dr. Heyden im Alter von 51 Jahren infolge eines Herzschlages plötzlich verstorben ist. Nachruf folgt.

Ein Tierarzt Direktor des Zoologischen Gartens in Halle.

Der wissenschaftliche Hilfsarbeiter am Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen, Privatdozent Dr. Fritz Schmidt in Halle a. S., ist von den städtischen Körperschaften einstimmig zum Direktor des Zoologischen Gartens in Halle gewählt worden. Dem Vernehmen nach ist die Anregung zur Wahl aus dem Kreise der Tiergärtner hervorgegangen.

Prüfung für Veterinärärzte.

Die nächste praktisch-mündliche Prüfung für Veterinärärzte wird an der Tierärztlichen Hochschule in Berlin in der Zeit vom 28. Januar bis 7. Februar 1929 abgehalten werden.

Der Vors.: Müssemeier.

Tierärztlicher Verein der Neumark und Grenzmark Posen-Westpreußen.

Versammlung Sonnabend, den 15. Dezember d. Js., 13 Uhr, im großen Hörsaal der Preuß. Landwirtschaftlichen Versuchs- und Forschungsanstalten in Landsberg (Warthe), Theaterstraße 25—28. 1. Geschäftliches. 2. Neuwahl des Vorstandes. 3. Prof. Dr. Götze-Hannover: a) Vortrag über puerperale Erkrankungen des Rindes; b) Filmvorführungen aus Bujatrik und Geburtshilfe; c) Praktische Demonstrationen. 4. Anträge. — Um 16 Uhr gemeinsames Essen (2,— RM.) mit Damen im Hotel Landsberger Hof, Bahnhofstraße 3. Anschließend gefelliges Beisammensein. Treffpunkt der Damen: Landsberger Hof, kleines Zimmer vor dem Saal. Die Versammlung schließt sich an die um 11 Uhr im Landsberger Hof stattfindende Generalversammlung der W.D.T. an. Ein Postauto zur Fahrt von hier nach dem Institut für Tierhygiene steht 12,30 Uhr vor dem Landsberger Hof, Bahnhofstr. 3, bereit.

Landsberg (Warthe), den 30. November 1928.

Kurtzwig, 1. Vors. Stieckdorn, Schriftf.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Tierarzt Dr. W. Baier aus Neustadt zum Prosektor; Dr. Paul Schünke aus Nikolaiken zum wissenschaftl. Assistenten am anatomischen Institut der Tierärztlichen Hochschule in Berlin.

Ausgeschieden: Dr. Schönberg als Prosektor des anatomischen Instituts der Tierärztlichen Hochschule in Berlin.

Übertragen: Tierarzt Dr. Lehr in Potsdam die Veterinärassessorstelle in Wefermünde (Bez. Stade).

Approbiert in München: Aarne Aarno aus Tyrvis in Finnland; Heinrich Panförder aus Berghausen (Kr. Recklinghausen).

Verstorben: Ob.-Regierungs- und Vet.-Rat Dr. Paul Heyden in Düsseldorf; Dr. Rudolf Ehlers in Allenstein (Ostpr.); Vet.-Rat a. D. Ernst Julius Schulte-Freckling in Ibbenbüren; Dr. Ephraim Kuhn in Pomehrendorf (Kr. Elbing).

Personalveränderungen im Veterinäroffizierkorps.

1. Dezember 1928.

Versetzt: Die Stabsvet. Dr. Zschocke, 5. Fahr-Abt. zur Militärlehrschmiede Berlin; Dr. Vollert, 7. Reiter-Regt. zur 5. Fahr-Abt.; Dr. Günther, 3. Art.-Regt. zum 7. Reiter-Regt.

Befördert: Obervet. Dr. Meyer (Alfred), 12. Reiter-Regt. zum Stabsvet.

Ausgeschieden: Stabsvet. Dr. Leber, Militärlehrschmiede Berlin, mit dem Charakter als Oberstabsvet. sowie der Berechtigung zum Tragen feiner bisherigen Uniform.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtner, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zusendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inserenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 50.

Ausgegeben am 15. Dezember 1928.

36. Jahrgang.

(Aus der Klinik für Geburtshilfe und Rinderkrankheiten der Tierärztl. Hochschule Hannover.)

Erfahrungen mit der Sakral- und Lumbalanästhesie beim Rinde.

(Mit 4 Abbildungen.)

Von R. Götze, Hannover.

1. Sakralanästhesie.

Unter Sakral-, Extradural- oder Epiduralanästhesie versteht man in der Humanmedizin die Aufhebung der Sensibilität im kaudalen Körperabschnitt nach Injektion geeigneter Lösungen durch den Hiatus sacralis in den Extraduralraum.

Diese von Cathelin (5) 1901 entdeckte Anästhesiemethode fand zunächst keinen Anklang. Sie wurde im Jahre 1909 von Stöckel (17) aufgegriffen und in die Geburtshilfe und Gynäkologie eingeführt. Seitdem sind Laewen, Schlimpert, Kehrer, Fischer u. a. ihre eifrigsten Förderer gewesen. Es wird streng zwischen „tiefer“ und „höher“ Extraduralanästhesie unterschieden. Bei der tiefen Anästhesie werden kleine Dosen des Betäubungsmittels in kleinerem Lösungsvolumen (0,01–0,08 Gramm Novocain in 1–2prozentiger Lösung) in den Hiatus sacralis gebracht. Eine wesentliche Rolle spielt auch die Lagerung des Patienten während und nach der Injektion. Die Einspritzung erfolgt bei der tiefen Sakralanästhesie im Sitzen, also bei senkrecht gestellter Wirbelsäule, so daß die injizierte Flüssigkeit nicht nach kranial aufsteigen kann. Zur „hohen“ Sakralanästhesie werden größere Dosen im größeren Lösungsvolumen (0,4–0,8 Gramm Novocain in 1–1½prozentiger Lösung) weiter kranial in den Wirbelkanal vorgegeben. Nach der Injektion kommt der Patient in Beckenhochlagerung, damit die anästhesierende Flüssigkeit kopfwärts abfließen kann. Die hohe Epiduralanästhesie wird meist mit dem Morphin-Scopolamin-Dämmer Schlaf kombiniert.

Als Indikationsgebiet für die tiefe Extraduralnarkose kommen nach Laewen (10) beim Menschen in Frage alle Operationen im Bereich des unteren Mastdarms, des Afters, der Prostata, des Penis, der Scheide, Vulva, Harnröhre, des äußeren Hodenackes, nicht aber seines Inhalts, ferner schmerzhaftes Geburten und geburtshilfliche Eingriffe. Die hohe Epiduralanästhesie kann für alle Operationen vom Zwerchfell abwärts mit Ausnahme der Gallenblase angewandt werden.

Beim Studium der umfangreichen humanmedizinischen Literatur fällt auf, wie wenig es bisher gelungen ist, das Verfahren einheitlich zu gestalten und wie weit die Ansichten selbst in grundlegenden Fragen, z. B. der Dosierung, aus-

einanderweichen. Während der eine Unterfucher eine Gabe von 0,4 Gramm Novocain als lebensgefährlich bezeichnet, erzielt der andere mit der doppelten Dosis glänzende Erfolge. Auffallend ist in den Statistiken auch die verhältnismäßig große von den einzelnen Autoren angegebene Zahl der Verfolger. Entgegen der bisher überwiegenden günstigen Einstellung der Chirurgen, Gynäkologen und Geburtshelfer mehren sich in neuerer Zeit die Stimmen bedeutender humanmedizinischer Autoren, die die Sakralanästhesie in jeder Form ablehnen (Finsterer (6)) oder der Lumbalanästhesie den Vorzug geben (Franz (27), Braun (4)).

Nachdem durch Retzgen (14), Pape und Pitzschk (13) in der Silbersiepe'schen Klinik die Extraduralanästhesie in Anlehnung an die beim Menschen geläufige Methodik beim Pferde ausgeführt und mit Erfolg gebraucht worden war, berichtete Benesch (2) über ihre ausichtsreiche Verwendung beim Rinde. Seine Vermutung hat sich inzwischen voll und ganz bestätigt. Nach meinen an bisher über 200 Fällen gesammelten Erfahrungen ist die Sakral- (Epidural- oder Extradural-) -anästhesie ein unentbehrliches Rüstzeug in der Rinderpraxis geworden. Aus dieser Erkenntnis heraus habe ich auch gelegentlich der zahlreichen Fortbildungskurse des D.V.R. seit dem Winter 1926 durch Demonstrationsvorträge und Film immer wieder auf diese beim Rinde einfache und im Gegensatz zum Menschen anscheinend völlig ungefährliche Form der Anästhesie der weiblichen Genitalsphäre hingewiesen. Trotzdem gelangen neben Mitteilungen über den ausgezeichneten Erfolg mit der Narkose noch immer Anfragen an die Klinik, nach denen Zweifel über die Technik und die Anwendungsmöglichkeiten bestehen. Teilweise sind auch Befürchtungen über schädliche Nebenwirkungen laut geworden. Ich sehe mich deshalb veranlaßt, im folgenden in aller Kürze, ohne auf kasuistische Einzelheiten einzugehen, die hier gemachten Erfahrungen zusammenzufassen.

Das Wesen der Sakralanästhesie besteht darin, daß ein lokales Narkosemittel in den Wirbelkanal an das Filum terminale und in die in seiner Umgebung liegenden Nervenstämmen gebracht wird. Da im Bereich der letzten Kreuz- und Schwanzwirbel die Dura mater dem Endfaden des Rückenmarks direkt aufliegt, erfolgt die Injektion stets extradural. Es läßt sich ähnlich wie beim Menschen je nach Bedarf die

hohe oder die tiefe Sakralanästhesie ausführen. Im ersteren Falle wird das Anästheticum bei Beckenhochlagerung- oder -Stellung möglichst weit kranial und in größerer Dosis verabreicht. Im zweiten Falle wählt man die Injektionsstelle weiter kaudal und gibt bei normal gehaltenem Becken eine kleinere Dosis. Man hat es also in der Hand, die Anästhesie weiter kranial (beim Menschen nach oben) zu treiben oder sie auf die kaudalen (unteren, tieferen) Partien zu beschränken.

Als Injektionsstelle für die hohe Sakralanästhesie wird beim Rinde die weiche Stelle zwischen letztem Kreuz- und erstem Schwanzwirbeldornfortsatz benutzt. Für die tiefe Sakralanästhesie, die in den weitaus meisten praktischen Fällen genügt, wählt man die weiche Stelle zwischen 1. und 2. Schwanzwirbelfortsatz (Abb. 1). Das Auffuchen dieser Stellen geschieht durch Abtasten der Kreuz- bzw. Schwanzwirbeldornfortsätze mit dem Zeigefinger bei gleichzeitigem Auf- und Abbewegen des Schwanzes. Da, wo der Schwanz sich beweglich an das Kreuzbein, dessen Wirbel fest verwachsen sind, ansetzt, befindet sich zwischen dem Dornfortsatz des letzten Kreuzwirbels und dem des 1. Schwanzwirbels die Injektionsstelle für die hohe Sakralanästhesie. Geht man von diesem Punkte aus mit dem Zeigefinger weiter kaudal, so gelangt man über den flachen Dornfortsatz des ersten Schwanzwirbels an die Injektionsstelle für die tiefe Sakralanästhesie.




Abb. 1. Schematische Darstellung der Einstichstelle und der Nadelführung bei der tiefen Sakralanästhesie des Rindes.

An der in Aussicht genommenen Injektionsstelle werden die Haare mit einer krummen Schere kurz entfernt. Nach Reinigung mit Alkohol oder Wasser und Seife erfolgt Desinfektion mit Jodtinktur oder Dijozol. Als Instrumentarium benötigt man eine saubere gut desinfizierte oder ausgekochte Rekordspritze mit einer scharfen etwa 6 cm langen, 1,8 mm starken gewöhnlichen Kanüle. Die Kanüle wird im Winkel von 45–60 Grad zur Schwanzoberkante schräg kranio-ventral soweit eingestochen, bis plötzlich der Widerstand schwindet (Abb. 1 und 2). Je nach der Dicke der Schwanzwurzel dringt die Kanüle 2–4 cm vor. Die Nadel sitzt falsch, solange sie mit ihrer Spitze auf irgendwelchen festen Widerstand stößt. Sie sitzt richtig, wenn sofort nach dem Einstechen etwas Luft einströmt und wenn die Injektionsflüssigkeit durch leichten Druck auf den Spritzenstempel zu entleeren ist (Abb. 2). Tritt eine Blutung aus der Kanüle ein, so wird die Kanüle ein klein wenig zurückgezogen und erneut nach kranial in Richtung des Wirbelkanals, nicht senkrecht in die Tiefe gestoßen. Die Anästhesie kann sowohl am stehenden als auch am liegenden Tier ausgeführt werden.

Der Anfänger macht fast regelmäßig den Fehler, daß er die Kanüle etwas zu steil einführt; er beachtet nicht, daß der Wirbelkanal an der Einstichstelle zwischen 1. und 2. Schwanzwirbel recht oberflächlich liegt und die Nadel möglichst in seiner Längsrichtung eingeführt werden soll. Am Schlachtier kann man sich die Technik leicht aneignen.



Abb. 2. Sakralanästhesie. Injektion der anästhesierenden Flüssigkeit.

Als Narkotika sind von mir bisher Tutocain und Novocain mit gleich gutem Erfolg und in denselben Dosierungen angewandt worden. Aus der Praxis höre ich, daß Neocain (Bengen) dieselben Dienste tut. Die Höhe der Dosierung richtet sich danach, was mit der Anästhesie erreicht werden soll. Neben der Anästhesie treten stets Motilitätsstörungen der Nachhand auf. Diese sind nicht immer erwünscht und bei der hohen Sakralanästhesie am stärksten. Sie wachsen mit der Höhe der Dosis. Es hat sich herausgestellt, daß bei den schwarzweißen Niederungskühen die tiefe Sakralanästhesie mit 10 ccm einer 0,5 prozentigen Tutocain- oder Novocain-Lösung (0,05 : 10) am stehenden Tier injiziert, in den meisten Fällen völlig ausreicht. Nach Bedarf kann eine zweite Dosis verabreicht werden. Kräftige gut genährte Tiere vertragen von vornherein die doppelte Dosis, ohne zum Liegen zu kommen. Bei Verwendung von Neocain Bengen sind diese kleinen Dosen nach unseren bisherigen Erfahrungen nicht genügend. Es muß mindestens die 3–4fache Menge also 0,2 : 20 angewandt werden. Die Tiere vermögen sich bei Anwendung dieser niedrigen Dosen stehend zu erhalten. Haben sie sich gelegt, so können sie sich auf Verlangen mit etwas Nachhilfe erheben, wenn das Aufstehvermögen überhaupt noch erhalten ist. Die Anästhesie der Genitalsphäre ist nach 7–10 Minuten eingetreten. In drei Fällen konnten wir bisher bei Verwendung der genannten Dosen keine genügende Anästhesie erzielen. Es schien, als ob bei diesen Tieren der Wirbelkanal besonders weit gewesen sei. Die Narkose kann an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen

ohne Schaden wiederholt werden, doch verliert sie dann in manchen Fällen ebenfalls an Tiefe und Sicherheit. Die I. G. Farbenindustrie und die Firma Bengen & Co. stellen 10 ccm Ampullen der 0,5prozentigen Lösung her. Auf Adrenalinzusatz verzichte ich. Ich habe davon keine besonderen Vorteile gesehen. Aus Erfahrungen bei der subkutanen Verabreichung von Adrenalinpräparaten weiß ich aber andererseits, daß durch die lokale Adrenalin-Anämie die Widerstandskraft des betroffenen Gewebes gegenüber lokalen Infektionen leiden kann.

Werden bei stehenden Tieren höhere Dosen angewandt, so sinken die Tiere in der Regel in der Nachhand zusammen oder taumeln so stark, daß der Operateur bzw. Untersucher, falls er am stehenden Tier arbeiten will, gestört oder beeinträchtigt werden kann, insbesondere ist dies bei geschwächten und mageren Tieren der Fall. Liegen die Tiere und sollen oder können sie auch nicht zum Aufstehen bewegt werden, so müssen zweckmäßigerweise von vornherein höhere Dosen verabreicht werden. Mit niedrigen Dosen 0,05:10 erhält man bei liegenden Tieren mitunter völlige Verlager, offenbar weil sich die geringe Menge Injektionsflüssigkeit einseitig nach der unten liegenden Körperhälfte hin verteilt und nicht alle Nervenbündel trifft. Ich injiziere bei liegenden Kühen, die sich nicht erheben sollen oder können, 30—40 ccm der 0,5prozentigen Lösung eventuell auch noch mehr, und richte platt auf der Seite liegende Tiere vorher auf.

Nach alledem wird sich eine ganz bestimmte Dosis für jeden Fall, in welchem die tiefe Sakralanästhesie angebracht ist, nicht angeben lassen. Die Dosis wird je nach Lage des Falles wechseln. Als Grunddosis für das stehende Rind benutze ich 10 ccm der 0,5prozentigen Tutocain- oder Novocainlösung. Kräftige Tiere erhalten 20 ccm. Liegende Kühe erhalten mindestens 30—40 ccm dieser Lösung.

Die Ausdehnung der Anästhesie beschränkt sich bei Verwendung von 10 bis 40 ccm der 0,5prozentigen Lösung auf Vulva, Scheide, After, Mastdarm und deren nächste Umgebung. Der Schwanz und die Schwanzwurzel sind stets, ein schmaler Streifen entlang der Kreuzwirbeldornfortsätze sowie auch verschiedene begrenzte Teile der Schenkelhinter- und Innenfläche sind mitunter anästhesiert. Im übrigen bleibt das Gefühl an den Hinterschenkeln bis in die Zehenspitze hinunter völlig erhalten, ebenso wenig sind das Euter und die Eierstöcke und bei männlichen Tieren Hoden, Penis und Präputium gefühllos geworden. Die Anästhesie hält trotz Anwendung der niedrigen Dosis etwa $\frac{1}{2}$ —1 Stunde an. Die Scheide weitet sich; bei ihrer Unterluchung strömt leicht Luft ein, die Defäkation ist ununterbrochen. Das Drängen und Pressen unterbleibt oder ist erheblich abgeschwächt, die Wehentätigkeit der Gebärmutter ist nicht immer ganz aufgehoben. Aus diesen Beobachtungen geht schon hervor, daß die tiefe (kaudale) Sakralnarkose in vielen Fällen der geburts-hilflich-gynäkologischen Rinderpraxis ganz außerordentliche Vorteile bietet.

Die hohe (kraniale) Sakralanästhesie wird bei hochgestelltem Hinterteil möglichst zwischen letztem Kreuzwirbel und 1. Schwanzwirbel vorgenommen. Bei Anwendung von 80—100 ccm der 1prozentigen Tutocainlösung für magere und kleinere Tiere und von 120—150 ccm derselben Lösung für große kräftige Tiere (Bullen) ist eine weit kranial aufsteigende Anästhesie zu erzielen. Die Tiere kommen dabei in jedem Falle nach 7—15 Minuten zum Liegen. Schon vor der Injektion werden daher die Vorbereitungen zum Niederlegen getroffen. Sobald erhebliche Schwankungen in der Nachhand auftreten, werden die Tiere gelegt und gefesselt, damit sie sich durch Aufstehversuche nicht unnötig aufregen und schädigen. Die Anästhesie reicht

in der Regel bis zu einer Transversalebene in Höhe der letzten Lendenwirbel, ist aber nicht immer ganz symmetrisch. Diejenige Seite, auf welche das nieder sinkende Tier zu liegen kommt, ist vielfach besser anästhesiert. Gefühllos werden Vulva, Scheide, After, Mastdarm. Die Hinterschenkel bis hinunter in die Zehenspitzen, das Euter, bei männlichen Tieren Hoden, Penis und Präputium.

Ich habe bei insgesamt weit über 200 Injektionen bisher weder nach Ausführung der tiefen noch der hohen Sakralanästhesie, abgesehen von den je nach der Dosis wechselnden vorübergehenden Motilitätsstörungen, irgendwelche unliebsame Folgen gesehen. Nach dem Schwinden der Motilitätsstörungen sind die Tiere selbst nach der hohen Extraduralanästhesie stets wieder wohl auf gewesen. Es wurde auch nicht der Eindruck erweckt, daß die Rinder an den auf die Injektion folgenden Tagen an Übelkeit und Kopfschmerzen leiden, wie dies mitunter beim Menschen nach der Sakralnarkose beobachtet wird.

Das Indikationsgebiet für die tiefe Sakralnarkose beim Rinde ist sehr vielseitig. Es sollen hier nur allgemeine Hinweise gegeben werden:

Bei Schweregeburten, soweit sie nicht durch verstärkte und geregelte Zugleistung unter Ausnützung der Wehenkräfte zu vollenden sind, ist die Sakralanästhesie sowohl für das Muttertier als auch den Geburtshelfer eine große Erleichterung. Die Wirkung der Bauchpresse sowie die Kraft der starken Gebärmutterkontraktionen sind gebrochen. Die Defäkation unterbleibt, die Geburtswege weiten sich gewissermaßen von selbst. Geburtshilfliche und embryotomische Manipulationen können ungehindert, sauber und schnell ausgeführt werden. Stehende Tiere bekommen 10 ccm der 0,5prozentigen Lösung. Größere Dosen halte ich bei Schweregeburten für kontraindiziert, weil die Wehenkraft, die vielleicht nach Beseitigung des Hindernisses für einen Zugversuch sehr notwendig gebraucht werden kann, für zu lange Zeit und zu vollkommen unterbrochen ist. Muß die Injektion im Liegen vorgenommen werden, so sind allerdings mitunter höhere Dosen (30 bis 40 ccm derselben Lösung) nötig, um die Wehenkraft zu brechen.

Torsio uteri. Die Berichtigung der Torsio uteri kann durch die Epiduralnarkose sehr erleichtert werden, die Scheidenwandung und die einengenden Falten werden lockerer, die Teile des Fötus sind mit der eingölten oder eingefetteten Hand besser erreichbar. Wehen und Defäkation sind abgestellt. Dadurch wird die Retorsion auch bei Verdrehungen höheren Grades ganz gleich, ob sie mit der Wälzmethode oder durch direktes Aufdrehen vorgenommen werden soll, wesentlich gefördert. Nach der Retorsion wird man nicht so große Eile mit dem Ausziehen der Frucht haben, sondern warten, bis die Narkose vorbei ist, die Wehen wieder einsetzen, etwaige von der Verfrühen herrührende Stauungsödeme am Muttermund und sonstige Schwellungen verstrichen sind. Dadurch werden Zervixrisse vermieden.

Retentio secundinarum. Wer ungestört durch lebhaftes Drängen und Pressen, sowie verunreinigende Kotmassen eine Nachgeburt abnehmen will, der wird gern bei dieser Operation die Sakralnarkose mit 0,05:10 Tutocain oder Novocain ausführen. Das Zufließenlassen von Luft durch die erschlaffte Vulva in den Genitalweg und den Uterus muß dabei nach Möglichkeit vermieden werden.

Das Vernähen eines frischen oder auch alten Dammrisses ist in der Sakralnarkose mit 0,05:10 Tutocain — bei kräftigen Tieren mit doppelter Dosis — am stehenden Tier leicht durchführbar. Auf die hierbei von mir geübte Technik komme ich an anderer Stelle zu sprechen. Besonders begünstigend für die spätere Heilung wirkt der Umstand, daß die Defäkation während der Narkose unterbrochen ist.

Prolapsus uteri. Nach Injektion von 10 ccm der

0,5prozentigen Tutocain- oder Novocainlösung bei stehenden, von 30—40 ccm bei liegenden Tieren, beginnt man das vorgefallene Organ mit kalter physiologischer Kochsalzlösung zu reinigen und von Nachgeburtsresten zu säubern. Dadurch, daß die Defäkation unterbrochen ist, wird diese Säuberung sehr erleichtert. Es folgt eine milde Desinfektion mit Neurogen oder Therapogen, und Bestreichen der Gebärmutterflehnhaut mit Öl, oder Bepudern mit Kohlepulver. Das Zurückbringen des Prolapses ist bei etwas Beckenhochlagerung- bzw. -Stellung ohne besondere Mühe auszuführen. Etwaiges Einströmen von Luft muß nach Möglichkeit durch festes Andrücken der Schamlippen mit zwei Handtüchern, die mit Desinfektionsflüssigkeit getränkt sind, an den Arm des Operateurs vermieden werden. Eine entstandene Pneumometra kann unangenehme Folgen, zum mindesten verzögerte Rekonvaleszenz bringen. Beim Zurückbringen der Gebärmutter am liegenden Tier ist das Einströmen von Luft in die schlaffen Geburtswege weniger zu befürchten. Das Anlegen eines Flessa-Verchlusses geht schmerzlos von statten.

Die Amputatio uteri wird vorkommendenfalls auch in der Epiduralnarkose auszuführen sein.

Bei der Untersuchung und Behandlung auf Sterilität kann in besonderen Fällen von der tiefen Sakralanästhesie Gebrauch gemacht werden. Auch hierbei kommt nur die niedrige Dosis 0,05 : 10 in Frage. Tiere, die unruhig sind, heftige Mastdarmkontraktionen haben, lassen sich in der Narkose vaginal, rektal und auch bimanuell genau untersuchen. Die Albrechtsen-Behandlung ist in der Sakralanästhesie ungefährlicher und sauberer als ohne Narkose, weil die Kontraktionen und die Defäkation unterbleiben. Eine Öffnung des geschlossenen Muttermundes tritt allerdings während der Anästhesie nicht ein. Die Narkose erleichtert ferner das Entfernen dickwandiger Zysten und feststehender Corpora lutea von der Scheide aus, dadurch daß die in das Rektum eingeführte linke Hand der in der Scheide befindlichen rechten das Ovarium übergibt. Alle vorkommenden kleinen Operationen in der Scheide (Amputationen oder politerierender Falten an der Portio vaginalis, Spaltung von Zysten, Durchtrennung von Spangen, Spaltung der vereiterten Gärtnerischen Gänge, blutige Erweiterung der verengten Scheide der Färsen, dorsal am diaphragma pelvis, die vaginale Kastration usw. sind bei empfindlichen Tieren nach extraduraler Verabreichung von 0,05 : 10 Tutocain zwischen 1. und 2. Schwanzwirbel in den meisten Fällen nahezu schmerzlos und sicher auszuführen. Das Durchstoßen des Bauchfelles und das Absetzen der Eierstöcke bei der Kastration bleibt schmerzhaft.

Schließlich kann die tiefe Epiduralnarkose mit 10 ccm der 0,5prozentigen Lösung bzw. der 2—4fachen Menge Neocain auch in verschiedenen anderen Fällen gelegentlich angewandt werden. Bei vorzeitigen Wehen oder starkem Drängen und Pressen nach Geburten läßt sich vorübergehend Abhilfe schaffen. Während der Narkose werden die Genitalorgane mit milden schmerzlindernden Salben bestrichen. — Einläufe in den Mastdarm werden in der Sakralanästhesie viel leichter behalten als sonst, usw.

Das Indikationsgebiet für die hohe Sakralanästhesie ist viel kleiner.

Penisoperationen. Entfernen von Warzen, Lösung von Verwachsungen der Präputialfalte mit der Penisspitze oder dem Corpus penis, werden in der Regel dadurch erschwert, daß der Penis in die Vorhaut zurückgezogen wird und nicht zugänglich wird. Mit Hilfe der hohen Sakralanästhesie (Einstechen zwischen letztem Kreuz- und erstem Schwanzwirbel, Verabreichung von 60—150 ccm der 1prozentigen Tutocainlösung, Injektion in Beckenhochstellung) ist es mir immer gelungen, den Penis zu narkotisieren. Er fällt ohne weiteres Zutun im erschlafften Zustande aus dem Präputium vor, ist leicht herauszuziehen und ist unempfindlich. Mitunter gelingt es, kräftige, schwere Bullen bei der

angegebenen niedrigsten Dosis noch stehend zu erhalten und im Stehen zu operieren. Bei Verwendung der höheren Dosen sinken die Tiere stets in der Nachhand zusammen. Vorforglich lege ich deshalb vor der Narkose die Beinfesseln und das Schnürfeil an, so daß das Tier nach dem Niederfallen sofort festgelegt werden kann.

Beim Kaiserschnitt verwandte ich (9) die hohe Sakralanästhesie mit größeren Dosen zur Abstellung der Wehen. Dadurch wird die Operation sehr erleichtert. Die Operationsstelle ist leider durch die Sakralanästhesie auch bei Anwendung der hohen Dosis von 150 ccm der 1prozentigen Lösung nicht immer in ganzer Ausdehnung gefühllos. Die Lumbalanästhesie tut in dieser Beziehung bessere Dienste.

Euteramputationen lassen sich nach unseren Versuchen in der hohen Sakralanästhesie mit 100—150 ccm der 1prozentigen Tutocainlösung völlig schmerzlos ausführen.

Lumbalanästhesie.

Die von Bier (3) im Jahre 1899 erstmalig beim Menschen angewandte Lumbalanästhesie wird von humanmedizinischen Autoren ebenso wie die Sakralanästhesie außerordentlich verschieden beurteilt. (Siehe Braun (4)). Auf der einen Seite größte Zurückhaltung, auf der anderen Seite volle Anerkennung. Auf Grund eigener großer Erfahrungen sagt Franz (7), daß die Lumbalanästhesie wie alle Anästhesieverfahren auch ihre Gefahren habe, diese seien aber bestimmt nicht größer als bei der Inhalationsnarkose. Den Gefahren stünden außerordentlich große Vorteile, besonders bei gynäkologischen Operationen gegenüber. Daß der Lumbalanästhesie bei nötiger Vorsicht eine große Bedeutung beizumessen sei, stehe außer Zweifel.

Seit dem Jahre 1901 ist die Lumbalanästhesie auch bei Haustieren verschiedentlich angewandt und empfohlen worden. Sicard (16) veruchte sie bei Hunden, Sacconi (15) und Baldoni (1) bei Klein- und Großtieren. Auf Anregung von Pfeiffer stellten ferner Maass (12) bei Hunden und Lichtenstern (11) bei Pferd und Rind Versuche an. In der Chirurgischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover bechäftigte sich Frey (8) mit der Lumbalanästhesie bei Pferden. Aus den genannten Arbeiten geht hervor, daß die Lumbalanästhesie auch bei den Haustieren anwendbar ist. Es wird von allen Autoren betont, daß besondere Nachteile nicht beobachtet worden sind. Trotzdem hat aber die Narkose des Lendenmarks bisher keinen Eingang in die tierärztliche Praxis und die Kliniken gefunden.

Da ich mir aus eigener Erfahrung ein Urteil darüber zu bilden wünschte, wie sich die Lumbalanästhesie beim Rinde auswirkt, wurden in der Klinik in der Hauptfäche von Alms (Dissertation) Versuche angestellt. Insgesamt sind bis jetzt 23 Lumbalnarkosen beim Rinde ausgeführt worden.

Die Injektionsstelle liegt genau in der Medianebene, da wo der letzte Lendenwirbel mit dem Kreuzbein in gelenkige Verbindung tritt. Die Stelle ist selbst bei gut genährten Rindern durch das Tastgefühl zu ermitteln. Man tastet mit dem Daumen unter Anwendung eines ziemlich erheblichen Druckes von kranial nach kaudal auf den dorsalen Enden der Lendenwirbeldornfortsätze entlang, bis plötzlich nach dem Abtasten des letzten Lendenwirbeldornfortsatzes eine weichere Stelle erscheint, die sich mit dem Daumen eindrücken läßt. Tastet man weiter, so gelangt man auf den allmählich ansteigenden Dornfortsatz des 1. Kreuzwirbels. Der Einstichpunkt befindet sich genau im Zentrum dieser weichen Stelle zwischen letztem Lendenwirbel- und erstem Kreuzwirbeldornfortsatz.

Als Instrumentarium benötigt man eine 20 ccm Rekordspitze mit einer besonderen Kanüle. Eine Neukonstruktion war jedoch nicht erforderlich. Die beim

Menschen für die Lumbalanästhesie von Franz (7) benutzte 14 cm lange, 1,7 mm dicke Nadel mit genau eingepaßtem Mandrin (s. Abb. 3) hat sich beim Rinde als völlig ausreichend erwiesen. Der Mandrin bleibt beim Einstechen in der Nadel und soll verhindern, daß Gewebsteile in das Lumen der Nadel eindringen und entweder die Injektion verhindern oder in den *canalis vertebralis* abgeschwemmt werden.




Abb. 3. Punktionsnadel mit genau passendem Mandrin für die Lumbalanästhesie beim Rind. 14 cm lang, 1,7 mm dick. (Nach Franz.)

Nach Entleerung, Reinigung und Desinfektion der Einstichstelle wird die Nadel unbedingt senkrecht angelegt (Abb. 4). Der senkrechte Weg ist der kürzeste. Bei irgendwie schiefer Nadelführung gelingt es meist nicht, die dorsale Zwischenwirbelöffnung sicher zu erreichen. Den größten Widerstand leistet die Haut, durch die längsfaserigen Bänder (*lig. supraspinale*, *lig. interspinale*, *lig. interarcuale*) gleitet die Nadel verhältnismäßig leicht. Erfährt die Nadelspitze keinen Widerstand mehr, so befindet sie sich in dem an dieser Stelle verhältnismäßig weiten *canalis vertebralis*.



Abb. 4. Lumbalanästhesie beim Rind. Injektion der anästhesierenden Flüssigkeit.

Entfernt man jetzt den Mandrin, so strömt in der Regel ein wenig Luft ein und die Injektionsflüssigkeit fließt ohne besonderen Druck auf den Spritzenstempel leicht ab. Unter Umständen muß man die Kanüle nach Entfernen des Mandrins noch ein wenig tiefer einführen. Wird die Nadel nicht gewaltsam bis auf den Boden des Wirbelkanals durchgestoßen, so ist die Gefahr der Verletzung des Rückenmarks sicher sehr gering, denn das Rückenmark ist an der Einstichstelle beim Rinde nur 5–6 mm dick, der Wirbelkanal hat dagegen einen senkrechten Durchmesser von 2,4–2,9 cm. Liquorabfluß, der beim Menschen als Kriterium für den richtigen Sitz der Nadel gilt, wurde nur in einem einzigen Falle beobachtet. In diesem Falle

muß die Nadelspitze subdural gefesselt haben, in allen anderen Fällen ist sie vermutlich extradural geblieben, was auch unsere Absicht war.

Besondere Zwangsmaßnahmen waren bei der Einführung der Kanüle nicht notwendig. Der hauptsächlichste Schmerz entsteht offensichtlich beim Durchdringen der äußeren Haut und der Subcutis. Durch festen Nafengriff läßt sich dieses Schmerzgefühl unterbrechen. Beim Einstechen krümmen die Tiere den Rücken zunächst in der Regel nach unten, dann aber nach oben durch. Die Durchkrümmung nach oben kann für das Auffinden der dorsalen Zwischenwirbelöffnung nur günstig sein, weil diese dadurch erweitert und leichter zugänglich wird. Nachdem die Nadel richtig sitzt, wird die anästhesierende Lösung langsam ohne besonderen Druck injiziert, wobei keinerlei Schmerzen mehr bestehen. Nach der Injektion wird der Mandrin wieder eingeführt, die Kanüle entfernt und die Einstichstelle mit Autosept und einer feinen Lage Watte bedeckt.

Sofort nach der Injektion oder schon vorher werden alle Vorkehrungen getroffen, das Tier niederzulegen oder niederzufnüren. Sobald erhebliche Motilitätsstörungen auftreten, erfolgt das Niederlegen, und zwar so, daß der Vorderkörper etwas höher liegt.

Für die Lumbalanästhesie wurde ausschließlich Tutocain benutzt. Aus den Versuchen ergab sich, daß mit 20 bis 30 ccm einer 3prozentigen Lösung je nach Größe und Kräftezustand des Tieres eine zuverlässige Anästhesie des gesamten Hinterkörpers zu erzielen ist.

Die ersten Anzeichen der Anästhesie bestanden in geringen Motilitätsstörungen im Verlauf von 1 bis 5 Minuten nach der Injektion: leichtes Schwanken, Unterstellen der Hintergliedmaßen, starke Winkelung der Sprunggelenke, oftmals Überköten. Nach 5–15 Minuten waren die Motilitätsstörungen in der Regel so stark geworden, daß die Tiere sich nicht mehr aufrecht erhalten konnten. Die volle Anästhesie war nach 8–10 Minuten erreicht. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gliedmaßen bis zur Klauen Spitze, After, Vulva, Hoden und Hodensack, Präputium, Penis, Euter sowie die Rumpfoberfläche bis an die letzte bis drittletzte Rippe völlig empfindungslos. In einem Falle reichte die Anästhesie bis an die Ankonäenlinie; die vollständige Anästhesie hielt 30–180 Minuten, durchschnittlich eine gute Stunde an. Es ist ein offensichtlicher Nachteil der Lumbalanästhesie, daß man die Bestimmung der Dauer der Narkose nicht in der Hand hat.

Zu Beginn der Narkose sind manche Tiere aufgeregt, weil sie die Nachhand nicht mehr gebrauchen können. Aufstehversuche müssen durch Fixierung namentlich des Kopfes und der Vorderbeine unterbunden werden. Sehr bald ergeben sich dann die Tiere in ihr Schicksal und liegen ruhig. Liegen sie längere Zeit platt auf der Seite, so entstehen mitunter Tympanie und Atembeschwerden. Solche Tiere müssen auf das Brustbein aufgerichtet werden. In der Rückenlage ist die Gefahr der Aufblähung geringer.

Die Folgen der überstandenen Narkose sind bei den einzelnen Tieren verschieden gewesen. Die Mehrzahl der Rinder zeigte am Tage nach der Injektion keine Bewegungsstörungen mehr, bei anderen blieb die Bewegung der Nachhand bis zu drei Tagen nach der Anästhesie ein wenig steif. Mitunter zeigte sich auch eine geringgradige einseitige Lahmheit. In einem Falle blieb bei einer sehr mageren Kuh eine Lähmung des linksseitigen Nerv. peroneus zurück, die vermutlich durch Druck während des Liegens in der Narkose entstanden war. Erhöhungen der Atem- und Pulsfrequenzen, Temperaturstörungen, konnten an den auf die Anästhesie folgenden Tagen in keinem Falle festgestellt werden, doch zeigten verschiedene Tiere offensichtlich ein niedergeschlagenes und schläfriges Wesen, lagen mehr als vorher und sprachen dem Futter nicht in der gewohnten Weise zu. Der Zustand währte, sich allmählich bessernd, 3–5 Tage.

Nach diesen bisherigen Erfahrungen mit der Lumbalanästhesie beim Rinde muß sie an ihrer Bedeutung für die Praxis und Klinik ohne Zweifel hinter die Sakralanästhesie zurücktreten. Da wo die Sakralanästhesie ausreicht, kommt die Lumbalanästhesie beim Rinde nicht in Frage. Das Gefahrenmoment ist offenbar bei der Lumbalanästhesie größer, wenn auch nicht bedenklich; mit postnarkotischen Nebenwirkungen ist in manchen Fällen zu rechnen. Alles das fällt bei der Sakralanästhesie fort. Interessant ist es, daß in der Humanmedizin die vergleichende Bewertung der beiden Formen der medullären Leitungsanästhesie seitens mancher Autoren, gerade umgekehrt ausgefallen ist. Finsterer (6), Franz (7), Braun (4). Es mag dies durch die Verschiedenheit der anatomischen Verhältnisse bedingt sein.

Als Indikationen für die Lumbalanästhesie beim Rinde wären zu nennen: 1. die Euteramputation, die sich in dieser Narkose völlig schmerzlos, sehr sauber und unter völliger Beherrschung der Blutung ausführen läßt, ferner der Kaiserschnitt und Penisoperationen beim Bullen, schließlich alle sonstigen Eingriffe, die kaudal von der letzten Rippe vorgenommen werden sollen und am liegenden Tier auszuführen sind. Meist wird allerdings in allen den genannten Fällen, wie oben ausgeführt wurde, auch die hohe Sakralanästhesie genügen, die ich nach den bisherigen Beobachtungen der Lumbalanästhesie vorziehe.

Literatur.

1. Baldoni: Anästhesie mit Hilfe von Cocaininjektionen in den

- Wirbelkanal bei Tieren. La clinica vet. 1901. Ref. Ellenberger-Schütz, Jahresberichte, Jahrg. 1901, S. 183. 2. Benesch, Fr.: Eine Anästhesierungsmethode am stehenden Rind für das Albrechtsensche Verfahren der Sterilitätsbehandlung. Wiener Tierärztliche Mschr. 1926, S. 130. 3. Bier, A.: Versuche über die Cocainisierung des Rückenmarkes. Deutsche Zschr. für Chirurgie Bd. 51, S. 361, ebenda Bd. 95, S. 373. 4. Braun, H.: Die örtliche Betäubung. Leipzig 1925, S. 198. 5. Cathelin: La ponctoin canal sacré et la méthode épidurale. La presse médicale Nr. 48, Juni 1901. Jahresberichte über Fortschritte auf dem Gebiete der Chirurgie VII, 1902, S. 1238. 6. Finsterer, H.: Die Methoden der Sakralanästhesie in der Bauchchirurgie und ihre Erfolge. Berlin 1923. 4. Aufl. S. 196. Zentralbl. für die ges. Chirurgie 1924, Bd. 24, S. 390. 7. Franz, K.: Gynäkologische Operationen. Berlin 1925, S. 40. 8. Frey: Lumbalanästhesie beim Pferd. In-Diss. Hannover 1926. 9. Götze, R.: Der Kaiserschnitt beim Rinde. Deutsche Tierärztl. Wschr. 1928, Sondernummer, Jubiläumsfestschrift. 10. Laewen, A.: Münch. med. Wschr. 1910, S. 2207. Deutsche Zschr. für Chirurgie 1910, Bd. 108, S. 1. Dasselbst 1911, Bd. 111, S. 289; Münch. med. Wschr. 1925, Jahrg. 72, S. 1448. Ergebnisse der Chirurgie und Orthop. 1913, Bd. 5, S. 39. 11. Lichtenstern, G.: Lumbalanästhesie beim Pferd und beim Rind. Hannover (Schaper) 1910. Münch. tierärztl. Wschr. Bd. 54, S. 369. 12. Maass: Lumbalanästhesie beim Hunde. In-Diss. Gießen 1906. 13. Pape und Pitzschk: Versuche über extradurale Anästhesie beim Pferde. Arch. f. wissensch. u. praktische Tierheilkunde 1925, Jahrg. 52, S. 558. 14. Retzgen, B.: Beitrag zur Frage der örtlichen Betäubung des Schwanzes vom Pferd und Hund durch Leitungsanästhesie. In-Diss. Berlin 1925. 15. Saccani: Cocaininjektionen in den Rückenmarkskanal. Il nuovo Ercolani 1901, S. 292. Ref. Ellenberger-Schütz Jahresberichte 1901, S. 183. 16. Sicard: Des injections sous-archnoidiennes etc. La semaine médicale 1899, Nr. 23. 17. Stöckel, W.: Lehrbuch der Geburtshilfe. 2. Aufl. Jena 1923, S. 231.

Die Bekämpfung der Leberegelkrankheit in der Osterfäder Wesermarsch (Kr. Geestemünde) in den Jahren 1927/28.

Von Dr. med. vet. H. Hildebrandt, Sandstedt.

Die Bekämpfung der Leberegelfeuche der Rinder und Schafe ist schon oft Gegenstand von Mitteilungen in der Fachpresse gewesen. Sie sind aber meistens von Seiten wissenschaftlicher Institute oder Leberegelpräparate herstellender Fabriken gemacht worden. Es erschien mir daher angebracht, meine in der Praxis bei der systematischen Bekämpfung der Leberegelfeuche der Rinder während des letzten Jahres gemachten Erfahrungen bekannt zu geben.

Das Interesse für die Bekämpfung der Leberegelfeuche der Rinder ist in den Kreisen Geestemünde und Lehe bei den Landwirten ein sehr großes. Insbesondere waren es die vom Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover in der Gemeinde Nesse erfolgreich durchgeführten systematischen Bekämpfungsmaßnahmen, die viele einsichtige Landwirte von der Möglichkeit und Notwendigkeit der Bekämpfung der Leberegelfeuche überzeugt haben. Ich benutzte in meiner Praxis jede Gelegenheit, die Landwirte immer und immer wieder auf die in Nesse durchgeführten Bekämpfungsmaßnahmen hinzuweisen. Man trat dann meistens an mich heran, Kotuntersuchungen und Behandlungen durchzuführen. Im ganzen untersuchte ich im Winter 1927/28 zum Teil mehreremals die Kotproben von 1823 Rindern. Die Verteilung der Tiere auf die einzelnen Gemeinden meiner Praxis sowie der Prozentsatz der infizierten sind aus nachstehender Tabelle zu ersehen.

Sandstedt	untersucht	249	befallen	192	=	77 Prozent
Offenwarden	untersucht	288	befallen	235	=	81 Prozent
Wurthfleth	untersucht	186	befallen	157	=	85 Prozent
Rechtebe	untersucht	52	befallen	44	=	85 Prozent
Aschwarden-Bruch	untersucht	170	befallen	123	=	72 Prozent
Driftsethe-Weissenberg	untersucht	168	befallen	126	=	75 Prozent
Rechtenfleth	untersucht	181	befallen	150	=	83 Prozent

Wersabe	untersucht	198	befallen	162	=	83 Prozent
Uthlede	untersucht	211	befallen	155	=	74 Prozent
Neuenlande-Büttel	untersucht	120	befallen	96	=	80 Prozent
insgesamt	untersucht	1823	befallen	1440	=	80 Prozent

Es ergab sich also, daß von den 1823 untersuchten Tieren 1440, das sind rund 80 Prozent, mit Leberegeln behaftet waren. Ich bin überzeugt, daß bei wiederholter Untersuchung sich die Zahl der infizierten Tiere noch erhöht hätte.

Am schwersten waren nach meinen Beobachtungen solche Tiere infiziert, die auf besten Marschweiden gehalten wurden. Hier waren etwa 85 Prozent der Tiere befallen. Bemerkenswert ist außerdem, daß schon während der letzten Wochen der Weidezeit die äußeren Zeichen der Leberegelfeuche (Abmagerung, struppiges Haarkleid, Durchfälle) auftraten. Die Untersuchungen und die Behandlung der Tiere setzte schon im Oktober und November ein.

Auf Sand- und ausgesprochenen Moorweiden gewesene Rinder zeigten sich im allgemeinen nicht so stark verfeucht. Es waren etwa nur 75% der Tiere mit Leberegeln behaftet. Auch traten wegen des geringeren Befalls beim Einzeltier die äußeren Krankheitserrscheinungen viel später und bei weitem nicht so ausgeprägt auf. Die Folge davon war, daß bei diesen Tieren eine Untersuchung und Behandlung erst von den Besitzern im Februar—März begehrt wurde. Die zwischen Marsch- und Moorweiden bestehenden Unterschiede hinsichtlich der Verfeuchtung mit Leberegeln beginnen sich schon stellenweise zu verwischen. Es müssen daher energische Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Zur Behandlung der Leberegelkrankheit der Tiere habe ich ausschließlich das Distolcomb gebraucht. Das Mittel war frei von irgendwelchen unerwünschten Neben-

wirkungen, die bei anderen Präparaten bekannt geworden sind. Es wirkte schnell und sicher parasitentötend, so daß selbst schwerkranke Tiere in kurzer Zeit genasen. Mit selbst sind Fälle bekannt, wo jährige Rinder durch die Leberegel-seuche derartig entkräftet waren, daß sie sich nicht mehr erheben konnten. Drei Tage nach der Distolbehandlung vermochten sie wieder allein aufzustehen und nahmen im Laufe von einigen Wochen mehr als 1 Zentner an Gewicht zu. Als Beispiel sei nachstehend über einen Fütterungsversuch berichtet, den ein Besitzer an seinen 10 einjährigen Rindern mit Kraftfutter und Fischmehl machte. Die mit Leberegeln behafteten Tiere hatten trotz des hervorragenden Futters anstatt zugenommen bis zu $\frac{1}{2}$ Zentner verloren. Drei Wochen nach der Distolbehandlung war bei allen Tieren eine erhebliche Gewichtszunahme zu verzeichnen. Sie machte bei dem besten Tier 45 Pfund aus. Die Gewichtszunahmen hielten an und nach weiteren drei Wochen hatte das beste Tier nochmals 65 Pfund zugenommen, das sind 110 Pfund innerhalb

von sechs Wochen. Die Gewichtszunahmen aller 10 Tiere bis zum Austrieb betrug 565 Pfund.

Ich strebte danach, in verseuchten Beständen alle Tiere, und nicht nur die äußerlich sichtbar kranken zu behandeln. Man erreicht dadurch, daß die Tiere zum nächsten Auftrieb frei von Parasiten auf die Weide kommen und keine Leberegeleier mehr austreten. Auf diese Weise müßte auch die Infektiosität der Weiden allmählich erlöschen. Leider scheiterte die praktische Durchführung in vielen Fällen an der Kostenfrage, so daß sich die Behandlung nur auf die schon äußerlich kranken Tiere des Bestandes beschränken mußte. Damit wird man aber niemals eine Tilgung der Seuche erreichen. Im Interesse unserer Volkswirtschaft muß aber angestrebt werden, die Bezirke allmählich zu entseuchen. Dazu müssen alle Rindviehbestände einer Behandlung unterzogen werden. Die Aufgabe kann aber meines Erachtens nur mit Hilfe erheblicher staatlicher Unterstützungen gelöst werden.

Zur Erkennung von Störungen in der Milchsekretion.

(Mit 1 Abbildung.)

Von Dr. Georg Roeder. Laboratoriumsvorstand der Firma Dr. N. Gerber's Co. m. b. H., Leipzig.

Die immer weiter um sich greifende Verbreitung der Euterentzündungen, insbesondere auch der Streptokokken-Mastitis, zieht die Aufmerksamkeit und Besorgnis aller Kreise immer mehr und mehr auf sich, die sich mit der Gewinnung und Verwertung der Milch befassen. So kommt es auch, daß sich gerade in der jüngsten Literatur, namentlich auf ausgesprochen milchwirtschaftlichem Gebiet eine große Reihe von Abhandlungen vorfindet, welche sich mit diesem Thema und zwar vorwiegend mit den wirtschaftlich bedeutungsvollsten Fragen, nämlich der Erkennung und Bekämpfung dieser Krankheiten beschäftigen. Diese letzteren beiden Fragen sind eng miteinander verknüpft, enger, als es vielleicht auf den ersten Blick den Anschein erwecken möchte. Denn nach Feststellungen verschiedener Autoren, so z. B. Skarr (1), treten die Mastitiden und hier wieder vor allem die verschiedenen, bekannten Formen der Streptokokken-Mastitis sehr häufig in solcher Art auf, daß sie selbst von einem aufmerksamen Beobachter leicht übersehen werden, wenn er sich zu ihrem Nachweis nicht besonderer Hilfsmittel bedient. So ist in vielen Fällen das Allgemeinbefinden der Tiere nur wenig oder gar nicht gestört; die Milchbeschaffenheit läßt bei der Sinnenprüfung nichts auffallend Unnormales erkennen und auch die klinische Untersuchung des Euters erweckt keinen Verdacht. Erst die mikroskopische Untersuchung der Milch bzw. des Zentrifugenbodenatzes derselben würde die vorliegende Störung aufdecken; diese unterbleibt aber, da ja keine äußeren Verdachts-Anzeichen die Ausführung einer solchen überhaupt veranlassen — und die ständige, systematische Kontrolle ganzer Bestände durch mikroskopische bzw. bakteriologische Untersuchungen wird heute noch in den aller seltensten Fällen durchgeführt.

Die Folge davon ist es, daß eine große Zahl von derartigen Erkrankungen überhaupt nicht wahrgenommen und daher auch gar nicht dagegen eingeschritten wird. Unsauberkeit und Unvorsichtigkeit im Stalle, beim Melken, das Wegmelken der ersten, bakterienreichsten Milchstrahlen in die Streu usw. vermitteln naturgemäß dann sehr leicht die Infektion weiterer Viertel und Kühe, um so mehr als die Streptokokken-Mastitis an sich eine außerordentlich leicht übertragbare Krankheit ist. — Nach der Meinung des Verfassers dürfte im übrigen die Gefahr der Ansteckung bei neu eintretenden (also noch leichten, wenig auffälligen) Krankheiten besonders groß sein, da in diesen Fällen die Bakterien durch die Gegenwirkung des Organismus noch am wenigsten geschwächt, somit also am virulentesten sein werden. — Auf diese Weise erklärt es sich auch, daß die Euterentzündungen

eine so große Ausdehnung finden konnten, bevor man auf die Notwendigkeit aufmerksam wurde, ihnen ernstlich und mit allem Nachdruck entgegenzutreten.

Den letzten Anstoß dazu gab wohl vielleicht die nach dem Kriege einsetzende, großzügige Propagandatätigkeit für die Milchwirtschaft im allgemeinen, welche die Aufmerksamkeit der Beteiligten sowohl auf eine zielbewußte Förderung der Produktionsmenge als auch auf eine Hebung der Qualität lenkte; denn nur, wenn die Güte der einheimischen Molkereierzeugnisse mit jener der ausländischen gleichen Schritt hält, ist es möglich, mit letzteren erfolgreich in den Wettbewerb zu treten. Den Kernpunkt für die Erzeugung von Qualitätsware bildet aber stets die Qualität des Ausgangsproduktes — also der Milch. Man forschte demzufolge ganz automatisch nach den Quellen, aus welchen auftretende Fehler der Milch und der daraus hergestellten Produkte entsprungen sein können und stieß eben bei dieser Gelegenheit auch auf die weite Verbreitung und die schlimmen Folgen der Euterentzündungen. Daß sich als solche nicht selten Betriebsstörungen bei der Verarbeitung der Milch einstellen, worunter die Qualität der Erzeugnisse weiterhin leiden muß, wurde in letzter Zeit verschiedentlich festgestellt, so z. B. von Weigmann (2), Neugschwendtner (3), Hans Roeder (4) und anderen. Aber selbst auch gesundheitliche Schädigungen vermag der Genuß von Milch mastitiskranker Tiere nach sich zu ziehen, wie unter anderen Jensen (5) und Schneider (6) unter Beifügung einwandfrei nachgewiesener Fälle berichten.

Zu diesen für den Verarbeiter bzw. für den Verbraucher nachteiligen Folgen gefellte sich als für den Erzeuger von besonders großer Bedeutung der Umstand, daß mit den Euterentzündungen in der Regel eine beträchtliche Verminderung der Milchleistung wie auch des Fettgehaltes der Milch einherzugehen pflegt, was sich natürlich unmittelbar in einer empfindlichen Verringerung der von dem Milchverkauf abgeworfenen Rente auswirken muß. Gerade in einer Zeit, in welcher die Not an flüssigem Kapital mit zu den schwersten Sorgen der Wirtschaft gehört, dürfte es jedoch ganz selbstverständlich sein, daß man einer möglichst vorteilhaften und ausgiebigen Milchgewinnung — welche wie wenig andere landwirtschaftliche Produkte sozusagen tagtäglich flüssiges Geld einbringt — besondere Beachtung schenkt. Aber auch in dieser Beziehung dürfte in sehr vielen Fällen infolge der Nichtbeachtung bzw. Nichterkennung auftretender Erkrankungen der wahre Grund des Ertragsausfalls verborgen bleiben oder letzterer irrtümlich falschen Ursachen zugeschrieben werden. Es fehlt damit die Mög-

lichkeit, das Übel an der Wurzel zu fassen und ihm wirksam zu begegnen; man laboriert vielleicht noch etwas herum und schickt sich schließlich in das scheinbar Unvermeidliche, obwohl die Erkenntnis der wirklichen Ursache bald zu Besserungsmaßnahmen, wenn auch schließlich nicht gleich zur vollständigen Behebung des Mißstandes führen könnte.

Die erste und wesentlichste Voraussetzung zur Bekämpfung der Euterentzündungen und ihrer Folgen stellt somit die möglichst frühzeitige Erkennung derselben dar, welche nach obigen Ausführungen genau so im Interesse des Konsumenten wie des Produzenten und Verarbeiters, wie schließlich der gesamten Wirtschaft liegt.

Den sichersten Nachweis für das Vorliegen von Euterentzündungen erbringt bekanntlich die mikroskopische Feststellung von Krankheitskeimen und Entzündungsprodukten in der Milch, womit nicht nur allein zu ermitteln ist, daß eine Erkrankung vorliegt, sondern auch, welcher Art dieselbe ist. Die bakterioskopische Untersuchung gestattet vielfach ferner eine sichere Unterscheidung hinsichtlich des Stadiums der Krankheit, wenngleich andererseits nicht verkannt werden soll, daß es auch nicht selten Fälle gibt, in welchen die sichere Identifizierung pathogener und nicht pathogener Formen unter dem Mikroskop selbst dem Geübten kaum möglich ist. Derartige Feststellungen müssen daher zweifellos dem Wissenschaftler überlassen bleiben.

Andererseits hat aber und muß nach den vorstehenden Ausführungen der Laie, der Viehhalter und der Milchverarbeiter das größte Interesse daran haben, sich fortlaufend in einfacher Weise vom dem Gesundheitszustand der Milchkühe zu überzeugen. Zu diesem Zweck ständig in kurzen Zeitabständen eingehende, ziemlich umständliche und daher auch verhältnismäßig kostspielige Untersuchungen der Milchproben sämtlicher Tiere von wissenschaftlicher Seite anstellen zu lassen, dürfte jedoch generell, wenigstens vorläufig, kaum durchführbar erscheinen. Wenn diese Art einer fortlaufenden, planmäßigen Kontrolle auch vielleicht die idealste wäre und unter günstigen Vorbedingungen in verschiedenen Betrieben auch wohl zur Einführung gelangen könnte, so würde sie doch für sehr viele andere, wirtschaftlich schwächer gestellte Betriebe zweifellos eine hohe Belastung darstellen, von welcher es sehr fraglich erscheint, ob sie zu tragen wäre. Aus diesem Grunde ist es nach dem Dafürhalten des Verfassers unbedingt notwendig, über einfache, leicht ausführbare Schnellmethoden zu verfügen, die es dem Laien ermöglichen, zuverlässig festzustellen, ob Eutererkrankungen vorliegen oder nicht. Diese Feststellung genügt für den Praktiker vollkommen, da, sofern durch die Schnellmethode ein Krankheitsverdacht ermittelt wird, für jeden Fall der Tierarzt zugezogen werden muß, schon um erkrankte Tiere möglichst frühzeitig in Behandlung zu nehmen; je eher die Behandlung einsetzt, je leichter die Erkrankung also noch ist, desto leichter, rascher und sicherer darf auch mit ihrer Heilung gerechnet werden — veraltete, chronisch gewordene Leiden sind oft überhaupt nicht mehr heilbar! — Der Tierarzt wird und muß dann selbstverständlich genauere Untersuchungen darüber anstellen, welcher Art die vorliegende Störung ist.

Aber auch der Wissenschaftler selbst hat Interesse an derartigen zuverlässigen Schnellmethoden, einmal, um sich bei Kontrollen in der Praxis, wo ihm kein Mikroskop und keine Laboratoriumsausrüstung zur Verfügung steht, rasch über den Gesundheitszustand des Euters zu orientieren. Dann vermögen aber die Ergebnisse der Schnellmethoden unter Umständen auch unterstützende Anhaltspunkte zu geben, wenn das Resultat der histologischen und bakterioskopischen Untersuchung nicht zweifelsfrei ist. Und schließlich ist es zu erwägen, ob nicht bei systematisch durchgeführten Kontrollen ganzer Bestände, evtl. ganzer Bezirke, eine Voruntersuchung der Proben mit Hilfe einer hinreichend zu-

verlässigen Schnellmethode dazu geeignet erscheint, vorweg die sicher einwandfreien Proben von den verdächtigen zu scheiden. Es würde auf diese Weise die genauere Untersuchung wenigstens nur auf einen kleinen Teil der Proben beschränkt bleiben, wodurch sich die Kontrolle ganz wesentlich verbilligen und damit im Interesse der praktischen Bekämpfung der Krankheiten einem viel größeren Kreis von Betrieben zugänglich machen ließe. Verfasser glaubt, daß sich auf diesem Wege eine so wünschenswerte, breit angelegte, planmäßige Kontrolle unserer Viehbestände in Bezug auf Euterkrankheiten leichter und einfacher ermöglichen läßt, als auf dem Wege der rückwärts schreitenden Isolierung, d. h. durch Untersuchung von Sammelmilch und anschließend verkleinerten Gruppen von Tieren, deren Milch in der verdächtigen Sammelmilch enthalten war.

Von diesen Erwägungen ausgehend hat Verfasser (7) vor kurzem die bisher gebräuchlichsten Untersuchungsmethoden zur Erkennung krankhaft veränderter Milch, insbesondere die Schnellmethoden an Hand vorliegender Literaturangaben wie auch eigener Feststellungen einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Dabei ergab sich, daß von denselben eine Reihe für den praktischen Gebrauch immer noch zu kompliziert und umständlich erscheinen, während andere wieder zu wenig eindeutige Resultate zu geben scheinen. Als recht brauchbar erschienen dagegen Methoden, welche auf einfache Weise die mit auftretenden Funktionsstörungen der Milchdrüse stets verbundene Veränderungen der Wasserstoffionenkonzentration des Sekretes anzeigen — wie etwa die Alizarolprobe, auf deren Verwertbarkeit für den vorliegenden Zweck neuerdings Neugschwendtner (3) besonders hingewiesen hat. Leider hat das Alizarin die unangenehme Eigenschaft, gerade in dem fraglichen Umschlagsbereich seine Farbe nicht nur unter dem Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration zu wechseln, sondern außerdem offenbar auch auf sonstige Einflüsse anzusprechen, indem es nach den vorliegenden Salzverhältnissen bald eine mehr nach Rot, bald eine mehr nach Blau liegende Färbung annimmt. Da hierdurch die sichere Beurteilung der Probe sehr erschwert wird, nicht selten sogar ganz falsche Schlüsse veranlaßt werden können, ersetzte Verfasser (8) das Alizarin durch einen geeigneteren Indikator und gelangte auf diese Weise zu der „Thybmolprobe“; die zur Ausführung dieser Probe erforderlichen Geräte wie die Lösung sind durch die Firma Dr. N. Gerber's Co. m. b. H. Leipzig, zu beziehen, wobei — in Anbetracht dessen, daß die Probe, wenn sie ihren praktischen Zweck erfüllen soll, weitesten Kreisen zugänglich sein muß, — besonders auf möglichst einfache Gestaltung der Hilfsmittel und dementsprechend niedrigen Preis geachtet wurde.

Dieses Schnelluntersuchungsverfahren stützt sich auf folgende beide Grundlagen:

1. Sobald eine Sekretionsstörung eintritt, verändert sich die Wasserstoffionenkonzentration der Milch, wie bereits oben erwähnt und schon früher, z. B. von Köstler (9) festgestellt worden war. Diese Veränderung der Wasserstoffionenkonzentration wird mit Hilfe der Thybmolprobe kolorimetrisch wahrnehmbar gemacht.

2. Wie eingehende Versuche ergeben haben, ist die Wasserstoffionenkonzentration der Milch zwar bei verschiedenen Tieren unter dem Einfluß mancher Faktoren (Rasse, Individualveranlagung, Laktationsstadium usw.) gewissen Schwankungen unterworfen, welche sich allerdings in viel geringeren Grenzen bewegen wie die hinsichtlich vieler anderer Eigenschaften auftretenden. Die absolute Größe der Wasserstoffionenkonzentration, etwa in dem Gesamtgemerk, gibt daher ebenso wie die absolute Größe sonstiger Eigenschaften nur bei relativ schon ziemlich starken Veränderungen sicheren Aufschluß. Dagegen ist bei unge störter normaler Sekretion die Wasserstoffionenkonzentration in

dem Sekret der einzelnen, jeweils zusammengehörigen Euterviertel stets so konstant, daß die möglicherweise vorliegenden, minimalen Verschiedenheiten bei der Thybromolprobe nicht in Erscheinung treten; (hinsichtlich anderer Eigenschaften, welche zum Nachweis von Sekretionsstörungen durch Untersuchung der Milch herangezogen werden, haben diesbezügliche Feststellungen bei normaler Sekretion wesentlich größere Schwankungen innerhalb der vier Euterviertel ergeben).

Tritt dagegen in dem einen oder anderen Viertel eine Erkrankung auf, so geht damit zunächst — und zwar schon in einem sehr frühen Zeitpunkt — eine auffällige Erniedrigung der Wasserstoffionenkonzentration des Sekretes Hand in Hand, welche durch die Thybromolprobe sofort deutlich erkannt wird und mit der Weiterentwicklung der Störung noch erheblich zunimmt. In Fällen sehr weit vorgeschrittener schwerer Erkrankungen kann aber auch plötzlich stark saure Reaktion, also eine starke Erhöhung der Wasserstoffionenkonzentration eintreten, welche sich bei der Thybromolprobe ebenfalls sehr auffällig zeigt. Insofern kann also mit Hilfe dieser Probe nicht nur ermittelt werden, ob eine Störung vorliegt, sondern wenigstens bis zu einem gewissen Grade auch, in welchem Stadium bzw. wie heftig dieselbe ist. Über die Art der Erkrankung gibt die Probe dagegen natürlich keine Auskunft, da ja die Störung, durch welche die Veränderungen in den Eigenschaften des Sekretes bedingt werden, ganz verschiedene Ursachen haben kann. —

Es tritt nun erfahrungsgemäß der Fall, daß alle vier Viertel eines Euters gerade zu gleicher Zeit gleich stark erkrankt sind, praktisch nie ein, so daß die Verschiedenheit der Wasserstoffionenkonzentration in den vier Viertelsproben stets mit Sicherheit auf eine krankhafte Störung hinweist, selbst wenn alle vier Viertel krank sind — das eine stärker, das andere weniger stark. Veränderungen nicht krankhafter Natur wirken sich hingegen auf alle vier Viertel gleichmäßig aus; es besteht ja auch gar keine Veranlassung, daß etwa z. B. bei Fütterungswechsel die Sekretion in einem Viertel anders beeinflusst werden soll wie in den anderen, oder daß bei fortchreitender Laktation die Sekretionstätigkeit einzelner Drüsenpartien sich verschieden von den übrigen ändere. In solchen Fällen kann also wohl eine Veränderung auch in der Wasserstoffionenkonzentration des Sekretes eintreten; diese ist aber in allen vier Vierteln gleich — und die Unterschiede zwischen den Viertelsproben sind nachher so groß bzw. so klein wie vorher.

Die Thybromolprobe beruht sonach auf einem Vergleich der Wasserstoffionenkonzentration des Sekretes aus den zusammengehörigen Strichen jeweils eines Euters bzw. zu gleicher Zeit aus den einzelnen Vierteln entnommener Milchproben und bedingt deshalb stets die Untersuchung einzelner Viertelsproben. Diese Untersuchung ist jedoch auch praktisch ohne nennenswerten Zeitaufwand, selbst während der Melkarbeit leicht möglich, weil eben die Ausführung der Probe außerordentlich einfach ist.

Von den vier Vierteln werden in vier Gläschen je 5 cm³ bzw. etwas mehr Milch direkt hineingemolken; der Überschuß wird entfernt, je 1 cm³ der Thybromollösung zugegeben, umgeschüttelt und die Farbe der vier Proben miteinander verglichen. Ist die Milch normal, das Euter also in Ordnung, so sind die Proben gleichmäßig (ob nun ein wenig heller oder dunkler) gelb-grün gefärbt. Bei im Entstehen begriffenen, leichteren Störungen zeigt sich in den betreffenden Proben eine auffällige Verfärbung nach blau-grün, welche sich bei fortchreitender Verstärkung der Krankheitserscheinungen noch mehr vertieft (Erniedrigung der Wasserstoffionenkonzentration!) Bei sehr weit vorgeschrittenen, heftigen Erkrankungen, welche dann allerdings zumeist auch schon ohne besondere Hilfsmittel erkennbar sind, wird die Farbe der Proben dagegen

rein gelb und ist mit dem Gelbgrün normaler Proben ebenfalls nicht zu verwechseln (stark erhöhte Wasserstoffionenkonzentration!)

Zur Ausführung der Untersuchung kann man sich einfacher Reagenzgläser bedienen, welche bei 5 cm³ Inhalt eine Marke haben; noch rascher und bequemer gestaltet sich die Abmessung der erforderlichen Milchmenge, welche übrigens nicht allzu genau fein braucht, mit Hilfe der untenstehend



abgebildeten Probiergläser, welche am Boden ein Röhrchen eingeschmolzen enthalten, das bei der Probenahme mit einem Stopfen verschlossen wird. Man milkt bis über die obere Öffnung des erwähnten Röhrchens voll, wobei selbst erhebliche Schaumbildung nicht schadet und entfernt dann den Stopfen, während man das Gläschen senkrecht über ein beliebiges Gefäß hält. Der Überschuß läuft ab und das erforderliche Quantum (5 cm³) bleibt in dem Gläschen stehen.*) Bevor die Thybromollösung zugegeben wird, muß natürlich der Stopfen wieder verschlossen werden; zur Zugabe derselben findet vorteilhaft ein einfacher automatischer Abmesser Verwendung, wie ein solcher der Apparatur beigegeben ist.

Auf diese Weise läßt sich in kürzester Zeit eine große Anzahl Proben untersuchen, so daß Verfasser selbst in großen Stallungen während der Melkarbeit und ohne dieselbe zu verzögern oder zu stören, Proben von den einzelnen Vierteln untersuchen konnte. Hierzu gefellte sich neben dem niedrigen Preis der Untersuchung die Haltbarkeit und besonders auch die Ungefährlichkeit der Lösung, so daß auch bei etwas unvorsichtiger Arbeitsweise durch Verschütten derselben oder dergleichen kein Schaden entstehen kann.

Bezüglich der Zuverlässigkeit und Empfindlichkeit der Probe, sowohl für sich betrachtet als auch im Vergleiche zu anderen, dem gleichen Zwecke dienenden Untersuchungsmethoden wurden im hiesigen Laboratorium eine große Anzahl eingehender Untersuchungen angestellt, welche zu sehr guten Resultaten führten: In rund 90 Prozent der untersuchten Fälle — sowohl bei gestörter als auch bei normaler Sekretion — stimmte das Ergebnis der Thybromolprobe mit den feststehenden Untersuchungsergebnissen überein; die übrigen 10 Prozent der Ergebnisse waren falsch oder zweifelhaft. (Ein eingehender Bericht über diese Untersuchungen wird demnächst zur Veröffentlichung gelangen.) Auch von anderer Seite erfuhr die Probe schon günstige Beurteilungen.

Es darf somit wohl mit Recht erwartet werden, daß dieselbe sowohl in der Hand des Praktikers wie auch für unterstützende Untersuchungen des Wissenschaftlers gute Dienste leisten und dazu beitragen wird, die weit verbreiteten Euterentzündungen einzudämmen, vor allem aber eine noch weitergehende Ausdehnung derselben zu verhindern.

Literatur.

1. Skar: Zschr. für Infektionskrankheiten, parasitäre Krankheiten und Hygiene der Haustiere, 34, Heft 1, 1928. Weigmann: Mitteilungen des deutschen milchwirtschaftl. Reichsverbandes, 43, 4, 1928.
2. Neugschwendtner: Milchwirtschaftl. Forschungen 5, 1, 1927.
3. Hans Roeder: Tätigkeitsbericht des Vereins zur Förderung der

*) Die beschriebenen Probiergläser, oben und unten mit einem Gummistopfen verschlossen, eignen sich auch gut zum Versand der Proben; sofern die Untersuchung noch vor Ablauf der Inkubationszeit erfolgt, wird das Ergebnis nicht beeinträchtigt, wenn zwischen Probenahme und Untersuchung einige Zeit verstreicht. Auf nicht zu weite Entfernungen ist es daher möglich, die Proben zur Untersuchung zu verschicken.

Milchwirtschaft in Ostpreußen vom Sommer 1926 bis Herbst 1927. 5. Jensen: Grundriß der Milchkunde und Milchhygiene, S. 90, Verlag Ferd. Enke, Stuttgart, 1903. 6. Schneider: Molkerei-Zeitung Berlin, 18, 566, 1908. 7. Georg Roeder: Milchwirtschaftl. Forschungen

6, 403, 1928. 8. Derselbe: Molkerei-Zeitung Hildesheim, 42, 1063, 1928. 9. Köstler: Milchwirtschaftl. Zentralblatt, 49, 217, 1920 und Mitteil. aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene 11, 154, 1920.

Die in den Bakteriologischen Instituten der Landwirtschaftskammern im Geschäftsjahr 1927/28 ausgeführten Fleischuntersuchungen.

Berichtigung: In Nr. 36/28 D. T. W. muß es auf Seite 603, linke Spalte, Abf. 3, Zeile 4, 1927/28 anstatt 211 heißen „224 Einfendungen erhalten“. Entsprechend erhöht sich in Absatz 3, Zeile 8, die Zahl 144 auf 157 Untersuchungen. Im folgenden Absatz sind die

Zeilen 3—5 wie folgt zu ändern: „An zweiter Stelle steht das Bakteriologische Institut der Landwirtschaftskammer in Halle mit 42 Fällen. Darauf folgt die Thüringische Veterinär-Anstalt in Jena mit 38 Untersuchungen.“
Raebiger.

Innere Medizin und Chirurgie.

Heßler: Selectan. (B. T. W. 1928, S. 297.)

Die Ergebnisse der mit vorliegendem Präparate vorgenommenen Heilverfuche (11 Pferde und 7 Kühe) sind vom Verf. in Form einer Tabelle niedergelegt. Zusammenfassend kann folgendes festgestellt gelten: Selectan beeinflusst den Verlauf der Druse günstig, es führt in frischen Mastitisfällen zur Heilung, bei Ferkelkrankheiten verschiedenen Ursprungs stellt es anscheinend ein beachtliches Heilmittel dar, bei der bösartigen Nekrobazillose des Rindes hat es als einziges Mittel eine hervorragende Heilwirkung entfaltet. Erforderlich erscheint die Verabreichung großer Dosen, d. h. bei der Druse 125 ccm intravenös und gegebenenfalls gleichzeitig örtlich. Bei Mastitis scheinen 75 ccm intraparenchymatös in jedes erkrankte Viertel bzw. intravenöse Verabreichung erforderlich zu sein. Bei Ferkelkrankheiten sind 10—15 ccm angezeigt. Bei bösartiger Nekrobazillose der Rinder sind 125 ccm einmal bzw. wiederholt intravenös erforderlich. Schädliche Nebenwirkungen wurden weder bei den angegebenen Mengen noch bei wiederholter Verabfolgung beobachtet.
Carl.

Timofeeff, P. P.: Zur Behandlung der Genickfistel beim Pferde. (Aus der chirurgischen Abteilung der Tierklinik zu Kaluga [U.S.S.R.]) (B. T. W. 1928, S. 159.)

Das vorliegende Leiden verläuft gewöhnlich in zwei Stadien; von denen das erste in der Entzündung des unter der pars occipitalis des Nackenbandes befindlichen Schleimbeutels, das zweite in der Entzündung des Nackenbandes selbst besteht. Man kann ferner seröse und eiterige Schleimbeutelentzündungen unterscheiden. Erstere gehen oft bei Anwendung von zerteilenden scharfen Salben in Heilung über, letztere erfordern eine ausgiebige chirurgische Behandlung, die in dem Spalten der Abszesse, in der ausgiebigen Erweiterung der Fistel, im Anlegen von Gegenöffnungen, Drainieren, antiseptischen Ausspülungen usw. besteht. Diese Methode ist sehr langwierig und führt oft nicht zum Ziele. Verf. wandte sich daher dem Verfahren von Prof. Mirzel zu, das darin besteht, daß man das gewöhnlich miterkrankte Nackenband durchtrennt und auf eine verschiedene Länge und Breite in toto herauschneidet, damit der erkrankte Schleimbeutel bzw. Herd freigelegt, für antiseptische Mittel zugänglich und die Ausbreitung der Nekrose verhindert wird. Erforderlichenfalls muß diese Methode mit der feither üblichen Behandlungsweise kombiniert werden. Die auf diese Weise in den letzten 3 Jahren erzielten Resultate waren stets befriedigend.

In letzter Zeit machte Verf. Gebrauch von der gleichzeitigen Anwendung der Autovakzination nach Besredka, wodurch die Heilungsdauer noch mehr verkürzt wurde. Die Arbeit gelangt zu nachstehenden Schlußfolgerungen: 1. Die gewöhnlichen Operationsmethoden bleiben bei der Behandlung der Genickfistel sehr oft ohne Erfolg. 2. Als die beste und radikale Operationsmethode muß bei diesem Leiden die Mirzelsche angesehen werden. 3. Dieses Verfahren mit Autovakzination kombiniert gab in unserer Praxis überraschende Resultate. 4. Die Autovakzination allein ohne operativen Eingriff nach Mirzel führte sehr selten zum

Ziele, und es trat die Heilung dann erst nach mehreren Monaten ein.
Carl.

v. Ostertag, B. und K. Müller: Eine Spontanavitaminose des jungen Hundes. (Aus der Prosektur u. dem Neuro-pathologischen Laboratorium der Heil- und Pflegeanstalt Buch. — Prosektor: Dr. B. v. Ostertag.) (Zschr. für Inf.-Krankheiten der Haustiere 1928, 34, H. 1, S. 74.)

Die Verff. konnten bei drei von vier Jungen einer kräftigen deutschen Schäferhündin vier Wochen nach der Geburt motorische Lähmungsercheinungen in den vorderen und hinteren Extremitäten beobachten. Die Jungen, die seit der Geburt alle gesund, kräftig und lustig waren, wurden vier Wochen gefügt und außerdem noch mit gekochter Milch und gekochtem Reis ernährt. Nach dem Absetzen erkrankten drei Tiere kurz nacheinander, eins starb, das zweite wurde getötet. Der dritte Hund, der nur leicht erkrankte, bekam Vitakalk, der B-Vitamin, Chlorkalzium und Phosphorsäure enthalten soll; er genas daraufhin sehr schnell. Auch der vierte Hund blieb bei Verfütterung des Vitakalkes gesund. Bei der Untersuchung des getöteten Hundes konnten abgesehen von degenerativen Veränderungen der großen Körperparenchyme, keinerlei Veränderungen aufgefunden werden. Durch die eingehende neurologische Untersuchung des Zentralnervensystems konnte eine Erkrankung der motorischen Bahnen, wie sie sich bei chronischen Avitaminosen in Gestalt der Polyneuritis findet, nicht festgestellt werden; dagegen fand sich eine charakteristische Zellerkrankung, die an Nissls primäre Reizung erinnert, und die besonders die großen somatochromen Ganglienzellen in den Vorderhörnern des Rückenmarkes, die motorische Zentralregion, die großen vegetativen Kerne der Medulla oblongata und der Purkinjeschen Zellen ergriffen hat. Die gliösen Reaktionen sind außerordentlich gering. Es scheint charakteristisch für eine ganze Anzahl von Mangelkrankheiten mit neurologischen und physischen Symptomen zu sein, daß trotz der vorhandenen Lähmungen in frischeren Stadien mit den uns zur Verfügung stehenden Methoden keinerlei Veränderungen an den Nerven und Nervenfasern, sondern ausschließlich solche an den großen motorischen Elementen nachzuweisen sind.
Ziegler.

Golaszewski: Zwei Fälle aus der Pferdepraxis (Tibiafraktur, Torsio uteri, Heilung). (W. t. Mschr. 1928, Jg. XV., S. 398.)

Beschreibung zweier Fälle aus der Praxis, bei denen beide-mal durch die eingeleitete Behandlung eine Heilung erzielt wurde.
Berge (Hann.).

Ochmann: Einige praktische Erfahrungen mit Sulfolid. (B. T. W. 1928, S. 523.)

Verf. hatte ausgezeichnete Erfolge mit dem Präparate bei Behandlung der Fußräude der Pferde, des sog. Ziegengrindes, der Kalkbeine der Hühner und der Windpocken am Euter der Kühe. Das Mittel wurde in allen diesen Fällen unverdünnt aufgetragen. Es war auch wirksam bei Personen, die sich mit dem Ziegengrind infiziert hatten.
Carl.

Kozma, S. und Székely, E.: Ein Fall von Adams-Stokes'scher Krankheit beim Pferd. (Allatorvosi Lapok 1927, Nr. 24, S. 299.)

Ein achtjähriges Pferd überfiel sich nach einleitendem

Zittern sowohl im Stall wie unter dem Reiter in immer kürzeren Zwischenräumen und namentlich nach einer einjährigen Dauer der Krankheit bis 13mal in einem Tage. Die ein volles Jahr bestehende Herzintermission verschwand während stärkerer Körperbewegung unter entprechendem Anwachsen der Zahl der Herzschläge, später aber wurde die sich allmählich einstellende leichte Bradykardie (40—32 Herzschläge in der Minute) durch eine 3—3½ Minuten lang fortgesetzte Trabbewegung und dieser folgenden Bewegung in Galopp kaum beeinflusst (Steigerung der Zahl der Herzschläge nur um acht in der Minute). Mittlerweile wurde beiderseits eine bedeutende Vergrößerung der Herzdämpfung bemerkbar. Die Zerlegung ergab eine Umfangsvermehrung besonders der rechten Herzhälfte und das Vorhandensein von drei blaßrötlich bis weiß gefärbten Entartungsherden in der Muskulatur des rechten Vorhofs, deren einer im Bereiche des Hischen Bündels zur Entwicklung kam.

Marek.

Seuchenlehre u. Seuchenbekämpfung.

Benner: Einige praktische Winke für die Simultanimpfung bei Viruschweinepest. (Cornell veterinarian 18, 1928, S. 98.)

Die Ausführung der Simultanimpfung scheint dem Laien so einfach, daß er glaubt, ohne Sachverständigen auszukommen. Aber es sind doch gewisse Punkte zu beachten, bei deren Vernachlässigung schwerer Schaden entstehen kann. Als solche nennt Verf.: Bei Anmeldung zur Impfung ist stets Zahl und Gewicht der Schweine zu nennen, die summarische Gewichtsangabe genügt nicht. Wird die Simultan-Impfung bei gefundenen Schweinen bereits infizierter Bestände ausgeführt, so muß die Serumdosis um $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ erhöht werden. Der Besitzer muß auf die Möglichkeit des Eintretens von Verlusten aufmerksam gemacht werden. Erstes Erfordernis für das Gelingen der Impfung ist sorgfältige Ausführung, an zweiter Stelle stehen genügende Dosierung des Serums und Verwendung von kräftigem Virus. Werden dann nur einwandfrei gesunde Schweine geimpft, so müssen unbedingt stärkere Impfreaktionen ausbleiben. Daher ist es erforderlich, die Impflinge vorher auf etwaige andere Erkrankungen (Pneumonien, Askariden-Befall usw.) zu untersuchen.

Geiger.

Theil: Der *Bacillus pyogenes suis*, ein fast unbekannter Feind im Schweinefall. (Zeitschr. für Schweinezucht 1928, 35, S. 195.)

Nach den Beobachtungen des Verf. tritt neuerdings in Schweine- und Mastbeständen das *Bact. Pyogenes suis* häufiger, und zwar in seuchenhafter Verbreitung auf. Es ist die Ursache des Mopskopfes der Schweine und wird deshalb vom Verf. als „Mops“ bezeichnet. Zunächst erkranken die Ferkel unter Niesen, Nasenbluten, Verwachsungen und Verbiegungen der Kopfknochen und Kümern, was hauptsächlich durch Überreifen des Prozesses auf die Lungen bedingt wird. Solche Tiere fallen dann nach Ansicht des Verf. der Pest besonders leicht zum Opfer. Therapeutisch kommen hygienische Maßnahmen und spezifische Impfung in Betracht.

Geiger.

Mc. Bryde, Niles and Moskey: Untersuchungen über die Übertragung und Ätiologie der Schweineinfluenza. (Journ. of the Americ.-Veterin. Med. Assoc. 1928, 73, S. 331.)

In Amerika wurde erstmalig im Herbst 1918, gleichzeitig mit der großen Grippe-Epidemie, eine neue Schweinekrankheit beobachtet, die Influenza oder Grippe der Schweine, zutreffender „infektiöse Bronchitis“ genannt. Die Krankheit tritt plötzlich auf und befällt in 1—2 Tagen den ganzen Bestand. Freßunlust, Unvermögen aufzustehen, Fieber, stoßweise, pumpende Atmung, Husten sind die hauptsächlichsten klinischen Erscheinungen. In wenigen Tagen erfolgt meist völlige Genesung, abgesehen von einem raschen Gewichtsverlust, der erst allmählich wieder ausgeglichen wird. Die

Mortalität beträgt gewöhnlich nur 1—3 Prozent. Der Tod wird dann durch eine hinzutretende lobuläre Pneumonie vervielfacht. Meist tritt die Krankheit im Spätherbst und frühen Winter auf, wenn die Witterungsverhältnisse ungünstig werden. Immunität scheint nicht einzutreten. Die Behandlung beschränkt sich auf hygienische Maßnahmen. Nach den von den Verf. in 7 Jahren in 35 Beständen ausgeführten Untersuchungen hat die Influenza mit der Viruschweinepest nicht das Geringste zu tun. Übertragungsversuche mit Blut kranker Schweine verliefen völlig negativ. Dagegen gelang es, durch Einträufeln von Tracheal- und Bronchialschleim kranker Schweine auf die Nasenschleimhaut Schweine in Passagen zu infizieren. Ebenso gelang in 65 Prozent eine künstliche Infektion durch Nasenschleim. Dadurch wird auch die schnelle Ausbreitung der Krankheit in einem Bestande verständlich, da sich bekanntlich die Schweine immer gegenseitig beschnupern. Die bloße Kontaktinfektion gelang in etwa 40 Prozent, war aber in verschiedenen Jahren anscheinend abhängig von gewissen Virulenzunterschieden und Außenverhältnissen. Durch Filtrationsversuche konnte nachgewiesen werden, daß der Erreger der Influenza nicht zu den filtrierbaren Virusarten gehört. Im Tracheal- und Bronchialschleim natürlich und künstlich infizierter Schweine konnte das *Bact. suis* in 65—83 Prozent, ein pleomorphes, grampositives Bakterium in 50—55 Prozent nachgewiesen werden. Bei gefundenen Schweinen fanden sich die entsprechenden Keime in 37 bzw. 26 Prozent, das pleomorphe, grampositive Bakterium erwies sich für Schweine, Meerschweinchen und Kaninchen apathogen. Es ist wahrscheinlich identisch mit einem ähnlichen, bereits von Spray in den Lungen gefundener Schweine nachgewiesenen Keime. Es wird unter gewissen Umständen, die die Widerstandsfähigkeit des Organismus herabsetzen, anscheinend virulent und wirkt krankmachend.

Geiger.

Schlegel: Mitteilungen des Tierhygienischen Institutes der Universität Freiburg i. Br. im Jahre 1926. (Archiv für wissenschaftl. Tierheilkunde 1927, 56, S. 268.)

In der mit 6 Abbildungen ausgestatteten Arbeit berichtet Verf., wie alljährlich, über die Arbeiten des ihm unterstellten Instituts, die sich gliedern in bakteriologische Fleischuntersuchung, bakteriologisch-chemische Prüfungen, Rotlaufschutz- und Heilimpfungen, bakteriologische Nachprüfung der Rindertuberkulose, Sektionen. An bemerkenswerten Krankheitsfällen wurde beobachtet: Rotlaufendokarditis mit Infarktbildungen in den Lungen der Schweine, Tuberkulose des Pankreas beim Rind, seltene Form der Tuberkulose des Nebenhodens beim Farnen, Ektopia testis und Mikrophallie beim Rind, Stieltorsion des Samenstranges und hämorrhagische Infarzierung des von der Bauchhöhle retinierten Hodens beim Spitzbock, kongenitaler ausgedehnter Defekt am Perikard beim Kalb, umfangreiche Verknöcherungen der Wandungen der rechten Herzkammer beim Pferd, mächtige Mola carnea im Uterus einer Kuh und riesenhafte Cystocarcinoma papilliferum der Niere beim Rind.

Geiger.

Mikrobiologie und Immunitätslehre.

Merkens, J.: Antisera verkregen door inspuiting van eiwitcoagulaat. (Durch Einspritzung von Eiweißkoagulat gewonnene Antisera.) (Mitteilung aus der Abteilung Viehzucht der N.-Ind. Tierarznschule. — Direktor: Dr. H. J. Smit.) Nederl.-Indische Bladen voor Diergeneeskunde 1928, S. 184—187.)

Der Verf. versuchte nach der Methode Fujiwara hochwertige Antisera von einzelnen Rindern zu gewinnen, und zwar behandelte er zwei Serien von Kaninchen mit einem Koagulat eines und desselben Zebu-tieres (Ongole); eine Serie mit dem Koagulat eines anderen Zebu-tieres und eine Serie mit demjenigen eines friesisch-holländischen Rindes. Mit dem Antiserum des Zebu-tieres prüfte er das Serum von *Bos sondaicus*, *Bos taurus*, *Bos bubalus*, vom

Schaf und vom Pferd und mit dem des friesisch-holländ. das homologe Serum, dasjenige von Zerney-, Shorthorn-, Babiceser-, Madoera-, Java-, Ongole- und Hissacrindern. Er kam auf Grund seiner Versuche zu der Schlußfolgerung, daß 1. die Methode F u j u w a r a vor anderen Methoden keinen Vorzug verdient; 2. bei den durch Injektion koagulierten Blutserums gewonnenen Antiseris mit Serum nahe verwandter Tiere ebenso gut Präzipitate auftreten wie bei Seris, die auf andere Weise gewonnen worden sind. Der einzige Vorteil dieser Methode ist, daß sich das Koagulat unter Toluol monatelang aufbewahren läßt und daß stets Injektionsmaterial zur Verfügung steht. Baß.

Lang, W. J.: Über die Verbreitung des *Bacillus Tetani* Nicolaier im Erdboden der Schweiz, unter spezieller Berücksichtigung der Kantone Graubünden, Waadt und Wallis und der Höhenverbreitung. (Schweiz. Archiv f. Tierheilkunde 1928, S. 249 u. 296.)

Der Bazillus ist wie der Botulinus als Saprophyt allgemein in der Erde verbreitet und kann unter Umständen zum fakultativen Parasiten übergehen. In gewissen (tetanusantigenen Zonen) kann er vollständig fehlen. Die Höhe bedingt Abnahme der Existenzmöglichkeiten, schließt aber das Vorhandensein dennoch nicht aus. Fäzes von Haustieren sind sehr oft, aber nicht regelmäßig und dauernd von Tetanussporen infiziert. Die Haustiere können somit zur Verschleppung der Sporen beitragen. Die Entwicklungsmöglichkeiten werden durch Anwesenheit von organischen, sich in Verwesungsprozessen befindenden Stoffen oder auch durch Pflanzenteile, die sich im Fermentationsprozeß befinden, befördert. Für die Schweiz ergibt sich eine zonenhafte Verbreitung (negativ im Osten, positiv im Westen) und ein Mittelwert von 39 Prozent. Die Untersuchungen erstrecken sich auf 200 Erdproben. In der Statistik ist die Verbreitung um bewohnte Orte besonders für die Gegenden Graubündens interessant, wo in Davos 62 Prozent positiv waren, dagegen in der Umgebung kein Tetanus nachzuweisen war. Auch die Gebirgsgegenden von Wallis sind verhältnismäßig reich an Sporen, ebenso die Umgebung von Lausanne (82 Prozent). Das Berner Oberland wies 65 Prozent positive Fälle auf. G.

Schneider, L.: Ist die Verforgung der Nachkommenschaft mit spezifischen Agglutininen fetaler oder laktogener Herkunft? (Közlemények az össehaszonlító élet — és és kórtan köreből. 1927, XXI, Bd., S. 86.)

Es wurden Ziegen mit Kulturen von Typhus-, Paratyphus- und Colibazillen immunisiert und ihr Blut während der Trächtigkeit, ferner ihr Eutersekret, desgleichen das Blut der neugeborenen Ziegenlämmer vor dem ersten Saugen und später auch während der Saugzeit auf die betreffenden spezifischen Agglutinine untersucht. Es hat sich nun ergeben, daß das Muttertier beim Herannahen der Geburt seine agglutininbereitende Fähigkeit einzubüßen scheint, weil die gebildeten Agglutinine an das Eutersekret abgegeben werden. Dementsprechend enthält sowohl das Eutersekret kurz vor der Geburt wie auch das Kolostrum reichliche Mengen von den spezifischen Agglutininen. Da im Blute der neugeborenen Tiere vor dem ersten Saugen die entsprechenden Agglutinine überhaupt nicht nachgewiesen werden konnten, nach der Aufnahme von Kolostralmilch dagegen solche reichlich in ihrem Blute gefunden wurden, so spricht das Ergebnis dafür, daß das neugeborene Tier die in seinem Blute beim Beginn der Saugzeit auftretenden Agglutinine mit der Kolostralmilch aufnimmt und die Immunstoffe dann in seinem noch der Dissé'schen Schleimzone entbehrenden Darme unverändert ins Blut resorbiert werden. Mit der allmählichen Entwicklung der Schleimzone werden auch die mitaufgenommenen Immunstoffe im Darme zerstört, der Gehalt des Blutes an Immunstoffen nimmt dementsprechend allmählich ab. Hiernach gelangen Agglutinine und wohl auch sonstige Immunstoffe nicht durch Vermittlung des displazentaren Blutkreislaufs vom Muttertier in den Fetus,

sondern sie werden durch das Sekret der Milchdrüse dem neugeborenen Tiere einverleibt. Marek.

Standesangelegenheiten.

Verein der Schlachthof- und Gemeindetierärzte Westfalens.

Herbstversammlung am 17. November 1928 in Dortmund.

Anwesend 60 Mitglieder, 5 Gäste. Der Vors., Schlachthofdirektor Büscher, Wanne-Eickel, gedachte beim Beginn der Versammlung in warmen Worten unseres verstorbenen Ehrenvorsitzenden, Schlachthofdirektors a. D. Clausnitzer-Dortmund, der stets ein vorbildliches Mitglied unseres Vereins gewesen sei. Zu Ehren des Verstorbenen erhoben sich die Anwesenden.

Neu aufgenommen: Sibbe-Gelsenkirchen-Buer, Balke-Lünen und Hanhoff-Münster.

Die Vorstandswahl erfolgte bei dem 1. Vors. durch Stimmzettel, mit dem Resultat: 37 Stimmen für Büscher und 4 für Frickinger. Büscher nahm die Wahl mit Dank für das Vertrauen wieder an. Die Wahl der übrigen Mitglieder des Vorstandes, die sämtlich wiedergewählt wurden, erfolgte durch Zuruf. Zunächst erstattete nun der Vors. Bericht über die Tagung des Reichsverbandes deutscher Gemeindetierärzte in Karlsruhe, für deren großartigen Verlauf man nur ein Wort des Lobes haben könne. Von weiterer Wiedergabe des Referats wird im Hinblick auf die Veröffentlichungen in den Fachzeitschriften an dieser Stelle abgesehen.

Stellungnahme zu den Ausführungen des Dr. Junack in Nr. 11 der deutschen Schlachthofzeitung 1928, wurde folgende Entschließung gefaßt:

„Der Verein der Schlachthof- und Gemeindetierärzte Westfalens nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Herrn Dr. Junack-Berlin, Schlachthofzeitung 1928, Nr. 11. Falls Dr. Junack die Provinz Westfalen zum „Westen“ rechnet, weist der Verein die Ausführungen als unzutreffend zurück, in der Überzeugung, daß die Fleischbeschau in unserer Provinz ordnungsgemäß durchgeführt wird und sich mit der Fleischbeschau an jeder anderen Stelle messen kann. Die „sehr autoritative Stelle“, auf die sich Dr. Junack in seinem Artikel beruft, kann sich ihre Meinung unmöglich auf Grund eigener Feststellung gebildet haben.“

Punkt 7: „Mitteilungen aus der Praxis“, löste eine rege Debatte aus. Auf Antrag eines Mitgliedes erfolgte die Annahme folgender Resolution: „Die Ortsgruppe Westfalen des Reichsverbandes deutscher Gemeindetierärzte hegt ernste Bedenken gegen die Art der Ausschreibung der Direktorenstelle am Schlacht- und Viehhofe der Stadt Erfurt. Der Leiter eines solchen großen kommunalen Betriebes gehört nicht in das Angestelltenverhältnis, sondern es erfordert die Bedeutung der Stelle nach Können und Verantwortung unbedingt beamtete Anstellung. Die Gruppe Westfalen bittet daher den Reichsverband deutscher Gemeindetierärzte bei dem Deutschen Städtetage und dem Magistrat in Erfurt gegen die Art der Ausschreibung Einspruch zu erheben.“

Nach einer kurzen Pause sprach Dr. Mayer, Leiter des Veterinäruntersuchungsamtes, Dortmund, über die Typentrennung innerhalb der Paratyphus-Enteritis-Gruppe und erwähnte hierbei die Abtrennung der vier Gruppen: 1. die Paratyphus B-Schottmüller Bakterien, als streng von den Fleischvergiftungen zu trennende, ferner 2. die eigentlichen Enteritis-Bakterien der Gruppe Gärtner, 3. Breslau und 4. die Supestifer-Bakterien, die sämtlich bei Menschen Enteritis-Erkrankungen hervorrufen können. Nicht allein das sporadische Auftreten von Gärtner-Infektionen beim Rind, sondern auch das feuchthafte, in Form der sog. Gärtner-Enzootien, wurde besprochen. In dem technischen Teil ging der Vortragende eingehend auf die biochemische Differenzierung und einige Wachstumeigentümlichkeiten, insbesondere auf die Schleimwallbildung ein. Auch wies er noch auf die Wichtigkeit der Untersuchung der Blut- und Kotproben von Tieren des infizierten Bestandes hin und betonte, daß die Widalsche Reaktion ein vorzügliches Mittel zur Feststellung verdächtiger bzw. infizierter Tiere sei, da schon frühzeitig spezifische Agglutinine im Blutserum bei solchen Erkrankungen auftreten. Zum Schluß ergänzte er seinen Vortrag durch Vorführung der bunten Reihen der einzelnen Stämme und durch wohlgeungene, diaskopische Projektionen verschiedener Wuchsformen der Paratyphaceen. Eckardt, Schriftführer.

In der Berichtigung auf Seite 842 dieser Nummer muß es statt Fleischuntersuchungen Fischuntersuchungen heißen.

Verschiedene Mitteilungen.

Oberregierungs- und Veterinärarzt Dr. Paul Heyden-Düsseldorf †.

Nach kurzer Krankheit ist Oberregierungs- und Veterinärarzt Dr. Paul Heyden am 30. November d. Js. plötzlich an Herzschlag verschieden. Er hat nur ein Alter von 51 Jahren erreicht. Alle Kollegen des Reg.-Bezirktes sind im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert durch das Hinscheiden dieses vortrefflichen Mannes, der es in überaus kurzer Zeit verstanden hat, die Sympathien aller zu erwerben, die mit ihm zu tun hatten. Das bringt auch der ehrenvolle Nachruf des Herrn Regierungspräsidenten zum Ausdruck. Erst 1926 wurde der Entschlafene von der Regierung Trier, wo er schwere Jahre der Befatzung durchgemacht und 6 Monate im Kerker der Franzosen gefchmachtet hatte, nach Düsseldorf überwiesen. Neben den Veterinärangelegenheiten, die in unserem Bezirk mit zahlreichen Schlachthöfen und hochentwickelter Viehzucht am Niederrhein ein großes Gebiet darstellen, bearbeitete Heyden von Trier aus noch Winzerangelegenheiten und in letzter Zeit die landwirtschaftliche Umschuldung. Nur dank seiner hohen Geistesgaben und seiner fast übermenschlichen Arbeitskraft konnte er all' dies erledigen. Leider hat sein schon etwas angegriffenes Herz solche Leistungen nicht ertragen. Trotz seiner Arbeitsüberlastung war der Verstorbene stets von einer bestrickenden Liebenswürdigkeit.



In geschickter Weise verstand er es, Gegensätze zu überbrücken. Schon $\frac{1}{2}$ Jahr nach seinem Dienstantritt wählten ihn alle drei Berufsgruppen einstimmig zum Vorsitzenden des Vereins der Tierärzte des Reg.-Bezirktes Düsseldorf, dessen letzte Versammlung am Bußtag, dem 21. November d. Js., unter seiner Leitung einen glänzenden Verlauf nahm. 28 Kollegen ließen sich infolge eines Aufrufes, den er verfaßt hatte, aufnehmen. Heyden wünschte, wie er in dem Aufruf schrieb, daß neben der Pflege der Wissenschaft und Behandlung von Standesfragen durch eine in angemessenen Grenzen gehaltene Gefelligkeit im Verein auch die persönliche Bekanntschaft der Kollegen sowie ihrer Damen vermittelt und gefördert würde. Bei der Tafel herrschte echt rheinische Fröhlichkeit und niemand merkte dem Vorsitzenden an, daß er nachts vorher einen schweren Anfall durchgemacht hatte, wie wir später erfahren. Seine Lebensfreude und seine erstaunliche Energie überwand alles. Wir fahen in dem Entschlafenen einen Führer, der das Ansehen unseres Standes im Reg.-Bezirk und weit über dessen Grenzen hinaus aufs Beste fördern würde. Sein Verlust erscheint uns unerfetzlich. Die Beerdigung fand am 4. Dezember, vormittags 11 Uhr, in Düsseldorf auf dem Nordfriedhof statt. Außer etwa 100 Kollegen waren der Oberpräsident der Rheinprovinz und sein Vertreter, der Regierungspräsident von Trier, der Vizepräsident der Regierung Düsseldorf, Prälat Kaas von Trier, Vertreter der Stadtverwaltung und sonst zahlreiche Herren anwesend. Das überaus große Trauergefolge gab beredtes Zeugnis von der Wertschätzung, dessen sich der Verstorbene überall erfreute. Nach den kirchlichen Handlungen sprach

am Grabe zuerst ein Vertreter der Burfschenschaft Cimbria, der ihm Band und Mütze mit ins Grab gab; darauf widmete unser früherer Vorsitzender Kollege Bettelhäuser dem Verstorbenen kernige, warme Worte und legte ihm einen Strauß herrlicher, roter Rosen auf den Sarg. Vom Friedhof begaben sich etwa 90 Kollegen ins Hotel Germania zu einer akademischen Trauerfeier, die Bettelhäuser leitete und bei der Kollege Wigge in einer zu Herzen gehenden Trauerrede nochmals des Verstorbenen als Menschen und Kollegen gedachte. Ein Trauersalamander beschloß die Feier.

Der Verein der Tierärzte des Reg.-Bezirktes Düsseldorf.

I. A.: May.

Schlachthofdirektor Franz Gladen, Gelsenkirchen-Buer †.

Am 2. Dezember starb in seiner Heimatstadt Buer, jetzt Gelsenkirchen-Buer, der Schlachthofdirektor Tierarzt Gladen. Ein tückisches Lungenleiden, das ihn vor 5 Monaten befiel, führte trotz aller ärztlichen Bemühungen schließlich zum Tode dieses vordem so kerngefunden Mannes. Der Verstorbene, der ein Alter von 56 Jahren erreichte, hat die Entwicklung Buer's von einer Landgemeinde zur Großstadt an verantwortungsvoller Stelle miterlebt. Nachdem er 1896 in Hannover die Approbation erhalten, ließ er sich in Buer als Tierarzt nieder. Im Jahre 1908 wurde ihm die Leitung des neubauten Schlachthofes übertragen. Seine gewissenhafte und sehr erfolgreiche Amtsführung trug ihm die uneingeschränkte Anerkennung seiner vorgesetzten Behörde, und die Hochachtung aller, die beruflich mit dem Schlachthof zu tun hatten, ein. Obgleich sein Wesen schlicht und bescheiden, war er doch eine allgemein geachtete Persönlichkeit. Zeugnis hiervon legte ab der imposante Leichenzug, der sich am 5. Dezember morgens vom Schlachthof durch die Straßen von Buer zum Kirchhof bewegte. Die ältesten Angestellten des Schlachthofes, alle im Dienst ergrauten Männer, rechneten es sich zur Ehre, ihren verehrten Direktor selber zu Grabe zu tragen. Kurz vor dem Sarge schritten die drei Chargierten der kath. studentischen Verbindung Saxo-Silesia in Vollwuchs und Fahne. Es folgten die in der Umgegend wohnenden Bundesbrüder des Verstorbenen und die ortsanwesenden Mitglieder des C. V. Philisterzirkels in Mütze und Band ihrer Verbindung. Ein Saxo-Silese trug auf einem schwarzen Sammetkissen des Verstorbenen Band und Mütze. Als Vertreter der Stadtverwaltung war der Oberbürgermeister Zimmermann mit mehreren Beigeordneten erschienen. Man sah viele Kollegen, speziell Schlachthofkollegen im Zuge. Nachdem der Sarg in die Gruft gelenkt und die kirchliche Einsegnung vollzogen war, trat der Verbindungslenior, cand. med. vet. Morsch vor und hielt eine ergreifende Abschiedsrede an den toten alten Herrn. Zum Schluß fandte er ihm Band und Mütze nach in das Grab. Stumm senkte sich die Fahne, auf die der Verstorbene einst die Hand zum Burfscheideid gelegt, zu ihm in die Gruft, leise klirrten die sich kreuzenden Schläger — ein letztes Lebewohl. Ein ganzer Berg von prächtigen Kränzen, die teilweise im Leichenzug getragen und mit ehrenden Worten am Grabe niedergelegt waren, bedeckten den frischen Grabeshügel. Die Gattin und vier Kinder — der älteste Sohn ist Oberarzt am Krankenhaus in Gladbeck, der jüngste besucht die Tertia des heimatlichen Gymnasiums — betrauern den Tod des liebevollen Gatten und treuforgenden Vaters. Schreiber dieses beklagt den Verlust eines lieben treuen Freundes. Sein Andenken wird von allen, die ihn gekannt, stets hoch in Ehren gehalten werden.

Feldhuß, Herten.

Antrittsvorlesung an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Am 29. November d. Js. hielt der Honorarprofessor für Land- und Volkswirtschaft an der Tierärztlichen Hochschule Hannover und Generalsekretär des Land- und Forstwirtschaftlichen Hauptvereins Hannover, Landwirtschaftsrat Dr. Engberding hier selbst vor versammeltem Lehrkörper, der Studentenschaft und zahlreichen Ehrengästen in der Aula der Hochschule seine Antrittsvorlesung über das Thema: „Betriebswirtschaftliche Grundlagen der Tierhaltung in der Landwirtschaft.“ Der Vortragende führte folgendes aus: Die deutsche Tierhaltung besitzt im Rahmen der Aufgaben der Volkswirtschaft eine hohe Bedeutung. Der Verkehr an Fleisch ist im Laufe der letzten Jahrzehnte, abgesehen von der durch den Krieg und die Nachkriegszeit bedingten Unterbrechung, wesentlich gestiegen. Er ist gegenwärtig annähernd so groß wie vor dem Kriege — er belief sich auf den Kopf

der Bevölkerung bezogen, Säuglinge und Greise eingerechnet, im Jahre 1927 auf 51,760 kg. Auch die 20—30 Milliarden Liter, d. h. auf einen Wert von 3—4 Milliarden Mark jährlich zu schätzende Milchproduktion zeigt den großen Verbrauch in der deutschen Bevölkerung. Die Einfuhr an Fleisch, Milch und Milcherzeugnissen ist angesichts des großen Bedarfs der Bevölkerung in absoluten Zahlen ausgedrückt erheblich. In Wirklichkeit beträgt sie nur einen verhältnismäßig geringen Prozentsatz des ganzen Verbrauches. Demgegenüber steht allerdings für die Bedürfnisse der Schweinehaltung eine ziemlich starke Einfuhr an Futtermitteln. Demgegenüber stehen auf der andern Seite ausgedehnte Futterflächen, deren Erträge durch meliorationstechnische und landwirtschaftlich-technische Maßnahmen noch gesteigert werden können, in Deutschland zur Verfügung. Aus diesem Grunde sowie auch angesichts der Fortschritte auf dem Gebiete der Tierzucht, der Haltung, der Ernährung und auch der Gesundheitspflege der Haustiere erscheint es möglich, durch technische Maßnahmen eine wesentliche Steigerung der Inlandsproduktion und eine weitgehende Unabhängigkeit vom Auslande in der Verforgung mit tierischen Erzeugnissen zu erreichen. In wirtschaftlicher Hinsicht liegen die Dinge jedoch etwas anders. Die Preisgestaltung ist gegenwärtig nicht so, daß die deutsche Landwirtschaft mit dem teilweise unter günstigeren Bedingungen produzierenden Auslande auf allen Gebieten wettbewerbsfähig ist. Dazu kommt, daß die Verbesserung der Güte und der Absatzfähigkeit der einzelnen Erzeugnisse, namentlich von Butter, Eiern und Fleisch der deutschen Landwirtschaft noch sehr wichtige Aufgaben stellt. Von größter Bedeutung ist daher gegenwärtig für die Tierhaltung in der Landwirtschaft die Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze. In der Hauptsache besitzt die Tierhaltung die Aufgabe, die großen Mengen voluminösen Futters der landwirtschaftlichen Betriebe in zweckmäßiger Weise in tierische Erzeugnisse umzuwandeln. Diesem Gesichtspunkte ist heutzutage in der Hauptsache der Umfang und die Nutzungsrichtung der Tierhaltung anzupassen. Auf der andern Seite ergibt sich unter den verschiedenen natürlichen und wirtschaftlichen Bedingungen ein verschiedener Grad der Abstufung der Bedeutung der Tierhaltung im landwirtschaftlichen Betrieb. Für jeden Betrieb kann letzten Endes nur ein bestimmter Umfang und eine bestimmte Nutzungsrichtung der Tierhaltung zweckmäßig sein. Außerdem ist von dem Gesichtspunkte der Verwertung der im landwirtschaftlichen Betriebe gewonnenen Futtermittel die Frage dieser Verwertung eingehend von Fall zu Fall zu prüfen. Dabei spielen Fragen der Tierhygiene eine außerordentlich große Rolle. Es wurde festgestellt, daß der Einfluß der verschiedenen Ernährungsmöglichkeiten, der Haltung, der Pflege und der Ernährung, sowie auch der wirtschaftlichen Bedingungen letzten Endes eine ungemein große Mannigfaltigkeit in der Verwertung der Futterstoffe der Tierhaltung bedingen.

Zahlen aus der landwirtschaftlichen Verwaltung, die den Tierarzt angehen.

Im Verlage der Reichsdruckerei in Berlin erscheinen in fortlaufender Reihenfolge die „Statistischen Nachweisungen aus dem Gebiete der landwirtschaftlichen Verwaltung von Preußen“, bearbeitet im Preuß. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Diese Nachweisungen enthalten auch manches, was für den tierärztlichen Wissenschaftler und Praktiker von Interesse ist. Da sie namentlich den in der Praxis stehenden Kollegen schwer zugänglich sein dürften, sei im Nachstehenden eine kurze Darstellung des Inhalts und der für den Tierarzt wertvollen statistischen Zahlen der Nachweisungen für das Jahr 1926 gegeben. Die statistischen Angaben erstrecken sich auf folgende Gebiete: Unterrichtswesen (Landwirtschaftliche Lehranstalten, Gärtnerische Lehranstalten, Hauswirtschaftliche Lehranstalten, Tierärztliche Hochschulen, Forstliche Hochschulen), Landwirtschaftliches einschließlich Tierärztliches Versuchs- und Forschungswesen, Verwendung der Dispositionsfonds des Landwirtschaftsministeriums, Einnahmen und Ausgaben der Landwirtschaftskammern, Landwirtschaftliche Ausstellungen, Bäuerliche Beispielswirtschaften, Ergebnisse öffentlicher Maßnahmen zur Förderung der Tierzucht, Jagd- und Fischereiwesen, Anbauflächen und Ernteergebnisse, Pflanzenschutz, Landeskultur- und Kulturämter sowie Meliorationswesen.

Tierärztliche Hochschulen: Die laufenden Ausgaben im Rechnungsjahr 1926 betrugen bei der Tierärztlichen Hochschule in Berlin 1 066 657 RM., bei der Tierärztlichen Hochschule in Hannover 732 316 RM., insgesamt 1 798 973 RM. Hiervon entfallen u. a. auf

laufende Ausgaben für Lehrmittel und Sammlungen bei der Tierärztlichen Hochschule in Berlin 66 650 RM., bei der Tierärztlichen Hochschule in Hannover 56 050 RM., insgesamt 122 700 RM.; für Viehwirtschaft und Molkereibetrieb bei der Tierärztlichen Hochschule in Berlin 21 500, bei der Tierärztlichen Hochschule in Hannover 19 000 RM., insgesamt 40 500 RM.; für Stipendien und Preisaufgaben je 1500 RM., für Turnlehrer und Sportgerät für Studierende je 4000 RM. und für Sonderausgaben zu wissenschaftlicher Erforschung von Tierkrankheiten und zu Versuchen bei der Tierärztlichen Hochschule in Berlin 56 117 RM., bei der Tierärztlichen Hochschule in Hannover 12 400 RM., zusammen 68 517 RM.

Die einmaligen und außerplanmäßigen Ausgaben beliefen sich bei der Tierärztlichen Hochschule in Berlin auf 1 622 149 RM., bei der Tierärztlichen Hochschule in Hannover auf 955 662 RM., insgesamt auf 2 577 811 RM. Hiervon entfallen auf Ausgaben für soziale Bestrebungen der Studentenschaft bei der Tierärztlichen Hochschule in Berlin 975 RM., bei der Tierärztlichen Hochschule in Hannover 1203 RM., zusammen 2178 RM.; für innere und apparative Ausstattung bei der Tierärztlichen Hochschule in Berlin 38 534 RM., bei der Tierärztlichen Hochschule in Hannover 30 520 RM., zusammen 69 054 RM. Für Ankauf von Raffetieren wurden bei der Tierärztlichen Hochschule in Berlin 7000 RM. verausgabt.

Die Zahl der Hörer betrug an der Tierärztlichen Hochschule in Berlin im Sommer-Halbjahr 1926 218 (119 Studierende und Hörer aus früheren Halbjahren, 50 neu eingetretene Studierende und 49 Gasthörer), im Winter-Halbjahr 1926/27 235 (151 und 41 und 43), zusammen 453; an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover im Sommer-Halbjahr 1926 229 (156 und 63 und 10), im Winter-Halbjahr 1926/27 229 (175 und 51 und 3), zusammen 458, mithin überhaupt im Sommer-Halbjahr 1926 447 (275 und 113 und 59), im Winter-Halbjahr 1926/27 464 (326 und 92 und 46), insgesamt also 911 Hörer (601 Studierende und Hörer aus früheren Halbjahren, 205 neu eingetretene Studierende und 105 Gasthörer).

Die Anzahl der Ausländer, die im Rechnungsjahre 1926 auf den Tierärztlichen Hochschulen Preußens studierten, betrug bei der Tierärztlichen Hochschule in Berlin im Sommer-Halbjahr 1926 46, im Winter-Halbjahr 1926/27 39, zusammen 85; bei der Tierärztlichen Hochschule in Hannover im Sommer-Halbjahr 42, im Winter-Halbjahr 1926/27 31, zusammen 73, insgesamt also im Sommer-Halbjahr 1926 88, im Winter-Halbjahr 1926/27 70, zusammen 158.

Von der Prüfungskommission des Landesveterinäramts sind im Rechnungsjahre 1926 183 Tierärzte zwecks Erlangung des Befähigungszeugnisses zum beamteten Tierarzt geprüft worden. 27 Tierärzte erhielten das Befähigungszeugnis zum beamteten Tierarzt, 144 Kandidaten setzten die Prüfung fort. 12 Kandidaten sind von der Prüfung zurückgetreten.

Die Mitglieder des Landesveterinäramts erstatteten im Rechnungsjahre 1926 36 Obergutachten und zwar 9 Obergutachten in gerichtlichen Zivilprozessen, 26 Obergutachten in Viehseuchenentschädigungssachen und 1 Obergutachten in Verwaltungsangelegenheiten. Die Gerichtsgutachten betrafen: Nachprüfung der Forderungen eines Tierarztes, Anwendung von Kresolbädern zur Behandlung von Schafen (2 Fälle), unsachgemäße Behandlung durch einen Tierarzt, Unterlassung der Anzeige beim Verdacht von Milzbrand, fahrlässige Impfung mit Pesterreger, Wurst aus Gefrierfleisch ohne Deklaration, Dummkoller und Dämpfigkeit. Die Obergutachten in Viehseuchenentschädigungssachen betrafen: 20 Fälle Nachkrankheiten bei Maul- und Klauenfeuche (Lungenentzündung, Magendarmentzündung, Klauenentzündung, Schluckpneumonie, Euterentzündung, Herzmuskelerkrankung), 2 Fälle ansteckende Blutarmut, 2 Fälle Tuberkulose, 1 Fall Lungenfeuche und 1 Fall Gefchwulst in der Milz.

Ferner wurde Beschluß gefaßt über die Erstattung von Obergutachten für Schiedsgerichte.

Für veterinärpolizeiliche Zwecke wurden nach der Übersicht über die Verwendung der Fonds der Veterinärverwaltung im Rechnungsjahr 1926 insgesamt 3 149 746 RM. verausgabt, darunter an Ausgaben für Entschädigungen für Viehverluste, die nach §§ 66 ff. des Viehseuchengesetzes und nach landesrechtlichen Bestimmungen aus der Staatskasse gewährt worden sind, 2 002 328 RM., für Entschädigungen und Reisekosten der Hilfstierärzte 211 355 RM., für Ausgaben zur Feststellung und Bekämpfung der Leberfäule und Leberegelteuche 13 152 RM., der Maul- und Klauenfeuche 423 417 RM., der Paratuberkulose 15 265 RM.,

der Tollwut 13 200 RM., für Ausgaben zur Durchführung des Tuberkulosefütterungsverfahrens 105 258 RM., für staatliche Prüfung von Seris 12 050 RM., für Betriebskosten der Veterinäruntersuchungsämter und der Quarantäneanstalt Saßnitz 244 238 RM. sowie für verschiedene Ausgaben 51 529 RM.

An Entschädigungen aus Anlaß von Viehseuchen wurden im Kalenderjahr 1926 folgende Beträge verausgabt:

Für Milzbrandverluste wurden 27 Pferde mit 20 125,23 RM., 950 Rinder mit 451 265,03 RM., 235 Schafe mit 10 319,74 RM. und 59 Schweine mit 13 336,— RM. entschädigt.

Wegen Maul- und Klauenseuche sind 33 939 gefallene bzw. notgeschlachtete Rinder mit 7 053 530,55 RM., 1980 Schweine mit 117 293,22 RM. und 152 Ziegen mit 4198,— RM. entschädigt worden. Davon entfallen auf den Reg.-Bezirk Schleswig 10 327 Rinder mit 2 068 520,39 RM. und 1831 Schweine mit 103 908,73 RM., auf den Reg.-Bezirk Stade 2207 Rinder mit 513 777,08 RM., auf den Reg.-Bezirk Münster 2402 Rinder mit 468 909,62 RM. und auf den Reg.-Bezirk Düsseldorf 2363 Rinder mit 495 392,99 RM.

Für auf polizeiliche Anordnung wegen Lungenseuche getötete oder nach der Anordnung der Tötung an Lungenseuche gefallene Rinder wurden für insgesamt 411 Rinder 146 629,24 RM. gezahlt, davon zum vollen Werte für 343 Rinder 123 049,04 RM. und zu $\frac{1}{8}$ des Wertes 68 Rinder mit 23 580,20 RM.

Aus Anlaß der Tuberkulosebekämpfung sind zum vollen Werte 250 Rinder mit 96 182,20 RM. und zu $\frac{1}{8}$ des Wertes 22 550 Rinder mit 5 069 392,08 RM. entschädigt worden, darunter im Reg.-Bezirk Königsberg 1822 Rinder mit 369 400,46 RM., im Reg.-Bezirk Gumbinnen 807 Rinder mit 216 600,87 RM., im Reg.-Bezirk Potsdam 2188 Rinder mit 523 894,74 RM., im Reg.-Bezirk Frankfurt a. Oder 2285 Rinder mit 565 993,94 RM., im Reg.-Bezirk Magdeburg 2228 Rinder mit 480 941,67 RM., im Reg.-Bezirk Merseburg 2413 Rinder mit 551 305,62 RM. und im Reg.-Bezirk Schleswig 1213 Rinder mit 344 687,06 RM. Insgesamt wurden 22 800 Rinder mit 5 165 574,28 RM. entschädigt. Hiervon entfallen auf den Staat 1 785 979,52 RM. und auf die Provinzial- ufw. Verbände 3 379 594,76 RM.

Aus dem Forschungsfonds sind im Rechnungsjahre 1926 für Forschungen und Untersuchungen über Seuchen- und Tierkrankheiten insgesamt 93 617 RM. bewilligt worden.

In den staatlichen Landgestüten deckten im Jahre 1926 2813 Landbeschäler. Die Anzahl der gedeckten Stuten betrug 76 610. Davon sind gültig geblieben 26 626 Stuten und tragend geworden 49 984 Stuten. Verfohlt haben 5508 Stuten. An lebenden Fohlen sind 20 731 Hengste und 21 441 Stuten, zusammen 42 172*) geboren. Jeder Hengst hat demnach durchschnittlich 27 Stuten gedeckt, 18 Stuten befruchtet und 15 Fohlen erzeugt. Von den lebend geborenen Fohlen stammten 11 335 von Kaltbluthengsten und 30 837 von Warmbluthengsten. 57 Geburten waren Zwillingsgeburten. Von den gedeckten Stuten sind 708 Stuten verkauft worden, 2020 Stuten gefallen und 467 Stuten nicht nachgewiesen.

Am Schlusse des Jahres 1926 waren bei den staatlichen Landgestüten insgesamt 2750 Beschäler vorhanden. Davon entfallen auf Klasse I (leichter Reitichlag) 164 Beschäler, Klasse II (starker Reit- und leichter Wagenichlag) 981 Beschäler, Klasse III (starker Wagen- und leichter Arbeitsichlag) 959 Beschäler und auf Belgier (auch Ardenner, Rheinländer und ähnliche) 646 Beschäler. Unter diesen 2750 Beschälern befanden sich 33 Vollbluthengste (rein englisches Blut 32 und rein arabisches Blut 1). Von dem Bestande an Beschälern sind 296 Beschäler in preußischen Hauptgestüten gezogen und 2454 Beschäler von den Züchtern angekauft worden.

Auf Privatbeschälstationen waren insgesamt 2691 Hengste (580 Warmblüter und 2111 Kaltblüter) aufgestellt. Gedeckt wurden von warmblütigen Hengsten 14 466 Stuten, von kaltblütigen Hengsten 63 149 Stuten, zusammen 77 615 Stuten. Von den gedeckten Stuten haben Fohlen gebracht: nach warmblütigen Hengsten 4112 männliche und 4091 weibliche, nach kaltblütigen Hengsten 18 471 männliche und 18 470 weibliche, zusammen 45 144. Verfohlt haben 3938 Stuten, gültig

geblieben sind 23 204 Stuten. Jeder Hengst hat also durchschnittlich 28 Stuten gedeckt, 20 Stuten befruchtet und 16 Fohlen erzeugt. 70 Geburten waren Zwillingsgeburten. Von den gedeckten Stuten sind 1388 tragende Stuten gefallen und 1979 tragende Stuten verkauft worden. In 2032 Fällen fehlten z. Zt. der Berichterstattung noch die Abfohlungsergebnisse.

Den Körungskommissionen wurden vorgestellt: 720 Warmblüter und 2002 Kaltblüter, zusammen 2722 Hengste. Angekört wurden 528 Warmblüter und 1578 Kaltblüter, zusammen 2106 Hengste.

Zuchttiere: Vorgestellt wurden 42 580 Stiere (Höhenvieh 9530, Niederungsvieh 33 038, Kreuzungen von Höhen- und Niederungsvieh 12). Angekört wurden 38 348 Stiere (Höhenvieh 8543, Niederungsvieh 29 801, Kreuzungen von Höhen- und Niederungsvieh 4).

Zuchteber: Vorgestellt wurden 12 249 Eber, angekört wurden 11 195 Eber.

Schafböcke: Vorgestellt wurden 539 Böcke, angekört wurden 404 Böcke.

Ziegenböcke: Vorgestellt wurden 21 233 Böcke, angekört wurden 19 072 Böcke.

Zur Förderung der Viehzucht wurden folgende Ausgaben geleistet:

- a) zu Preisen für die Zucht von Hengsten und Stuten ufw. 917 233,— RM.
- b) Beihilfen zur Unterstützung und Förderung der Geflügelzucht, insbesondere in den bäuerlichen Wirtschaften 136 250,— RM.
- c) Beihilfen zur Unterstützung und Förderung der Kleintierzucht 107 551,— RM.
- d) Beihilfen zur Förderung der Rindvieh-, Schweine- und Schafzucht ufw., besonders auch in den Wirtschaften landw. Arbeiter und zur Förderung des Molkereiwesens 1 255 274,— RM.

W i e m a n n.

Eugen Fröhner-Stiftung für Studierende der Tierärztlichen Hochschule Berlin.

Die Herrn Geheimrat Fröhner anlässlich seines 70. Geburtstages von deutschen Tierärzten überreichte Geldsumme hat der Genannte zu einer Eugen Fröhner-Stiftung verwandt. Das Preussische Staatsministerium hat kürzlich die Genehmigung zu dieser Stiftung erteilt. Die Satzung derselben sieht u. a. vor, daß die Zinsen des Stiftungsvermögens zur Unterstützung eines oder mehrerer würdiger deutscher Studierender der Tierärztlichen Hochschule in Berlin ohne Unterschied der Konfession verwendet werden sollen. Söhne verstorbener Tierärzte verdienen bei sonst gleichen Voraussetzungen den Vorrang. Fleiß und wissenschaftliche Befähigung sind durch Zeugnisse zu beweisen, gegebenenfalls auch die Bedürftigkeit. Die Stipendien sollen in der Regel jährlich vor Weihnachten und für ein Jahr vergeben werden. Der Einzelbetrag soll aber nicht weniger als 100 Mark betragen. An der Spitze steht ein Vorstand, der aus dem jeweiligen Rektor und zwei Professoren der Tierärztlichen Hochschule besteht und dem die Entscheidung über die Verwendung der Zinsen im angegebenen Sinne obliegt.

Unterstützungskasse für Tierärzte (E. V.).

Zu Beginn des Winters häufen sich die Unterstützungsgefuche von Standesangehörigen, besonders Witwen, die kaum in der Lage sind, sich warme Kleidung und ein warmes Zimmer zu leisten, viel weniger an eine Weihnachtsfreude denken können. Dankbar sind diese vom Schicksal schwer Geprüften für die geringen Beträge von etwa 30 RM., welche der Unterstützungsverein bei dem derzeitigen Kassenbestand jeweils höchstens bewilligen kann. Es ist Sache der gesamten Kollegenschaft, den Verein in den Stand zu setzen, daß er weiterhin solche Beihilfe — besonders zum Weihnachtsfeste — an Bedürftige gewähren kann. Sonder Spenden sowie die rückständigen Jahres-Mitgliederbeiträge von 5 RM., nimmt der Kassenwart, Polizeitierarzt Dr. Theobald Dahme, Berlin N. 58, Schönhauser Allee 147, auf das Postcheckkonto: „Berlin 1 08744“ entgegen.

Der Unterstützungsverein für Tierärzte.

Berlin, Dezember 1928.

Dr. Zehl, Vors.

Dr. Nährich, Schriftf.

*) Das Deckgeld wird zur Hälfte erst nach der Geburt erhoben, deshalb dürften diese Zahlen tatsächlich günstiger sein (v. B.).

Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde.

Herbsttagung zu Heidelberg 1928.

Prof. Völtz-Königsberg: „Die Bedeutung der naturgemäßen Haltung unserer Haustiere für das Wachstum und die Konstitution im Vergleich zu der absoluten Stallhaltung mit und ohne Anwendung der künstlichen Höhenfonne nach Versuchen am Rind.“ Der Vortragende berichtete über Versuche, die er am Tierzuchtinstitut der Albertus-Universität Königsberg und auf dem Versuchsgut Adl. Fräulenhof in Gemeinschaft mit Dr. Kirsch an 18 jungen Sterken durchgeführt hat. Die Versuchstiere wurden in 3 Gruppen von je 6 Stück eingeteilt. Gruppe I und II befanden sich in üblicher Weise dauernd im Stall. Dabei erhielt Gruppe I tägliche Bestrahlung mit künstlicher Höhenfonne. Die Tiere der Gruppe III waren ebenfalls überwiegend im Stall, hatten jedoch täglich einen dreistündigen Auslauf ins Freie, wodurch sie die nötige Bewegung erhielten. Bei der Auswertung der Versuche ergab sich, daß der Futterverbrauch bei den Tieren der Gruppe I und II annähernd übereinstimmend und bei denen der Gruppe III am geringsten war. Die höchste Futterverwertung für den Ansatz erzielten die Tiere der Gruppe III, die Auslauf hatten. Außer den gewichtsmäßigen Feststellungen wurden auch Körpermessungen durchgeführt. Es stellte sich heraus, daß die Rumpfmäße, besonders Brustbreite und Tiefe bei den Tieren mit Auslauf (Gruppe III) wesentlich stärker zunahmen als bei den beiden anderen Gruppen. Das zeigte sich sowohl während der anschließenden etwa 2½ monatigen Stallhaltung als auch während des darauf folgenden 5 monatigen Weideganges, bei denen die Tiere sämtlicher 3 Gruppen unter den gleichen Bedingungen sich befanden. — Eine besonders günstige Wirkung der Bestrahlung mit künstlicher Höhenfonne ließ sich nicht nachweisen. Hinsichtlich der übrigen Körpermaße waren wesentliche Unterschiede bei den Tieren der 3 Gruppen nicht vorhanden. Die Versuchsergebnisse bestätigen die große Bedeutung einer naturgemäßen Haltung unserer Haustiere, zu der ein mehrstündiger täglicher Aufenthalt in freier Natur, auch während des Winters, gehört.

Prof. Frölich-Halle über: „Die Beziehungen zwischen Umwelt und Rasse, dargestellt nach den Ergebnissen einer Studienreise durch Zentralasien“. Der Redner berichtet zunächst über den Verlauf seiner gemeinsamen mit Prof. Golf-Leipzig zur Erforschung der Verhältnisse der Karakulzucht im Originalzuchtgebiet durchgeführten Studienreise; dabei wurde an Hand einer großen Anzahl hervorragender Lichtbilder ein Überblick über die Geschichte, Kultur, Entwicklung und Tierzucht russisch Zentralasiens gegeben. Bei den Karakuls, deren Zucht in erster Linie wegen des als Persianer bekannten Lammpelzes betrieben wird, war in besonderem Maße durch Vergleich der seit 20 Jahren in Halle ohne Blutzufuhr fortgezüchteten Tiere mit den im Ursprungsgebiet lebenden Gelegenheit gegeben, die Wirkung der Umwelt auf die Rassegestaltung zu untersuchen. Es zeigte sich dabei, daß das bekannte Merkmal des Jugendhaarkleides, schwarzes Haar von spezifischem Glanz und eigentümlicher Gestaltung der Locke, sich in Halle so gut ausgeprägt erhalten hat, daß die Felle denen der Ursprungsländer vollständig gleichwertig sind. Als Ergebnis kann festgestellt werden, daß der Einfluß der Umwelt sich hier nicht in dem Maße geltend macht, wie allgemein angenommen wird. Die im Spiele befindlichen Faktoren, Klima, Scholle und Nahrung, sind sehr vielseitiger Natur und können sich infolgedessen in ihrer Wirkung aufheben. Es ist daher sehr schwer, die einzelnen Momente klar zu erkennen. Auch im Ursprungsland wird die Zucht der Karakuls durch wissenschaftliche Institute gefördert. Die den Zuchtgenossenschaften angehörenden Tiere können nur gekört werden, wenn eine Photographie des Jugendhaarkleides, welches besonderen Anforderungen entsprechen muß, beigebracht wird. Es gibt bereits 22 derartige Genossenschaften, die über je 40 000 Schafe verfügen.

Dr. Freiherr von Patow-Hannover: „Der heutige Stand der Frage der Milchvererbung beim Rinde“. Die Erforschung der Milchvererbung steht noch im Anfangsstadium und erfordert noch sehr viel Zeit und Arbeit zu ihrer Klärung. Bisher sind in der Hauptache erst die für die Bearbeitung vorliegenden Schwierigkeiten aufgedeckt worden. Eine kurze Betrachtung der Hauptlehren der Vererbungswissenschaft und ihrer Anwendung bei der Untersuchung der Milchvererbung zeigt, daß man in der Zucht mit sehr großen Zahlen von Faktorkombinationsmöglichkeiten zu rechnen hat. Das Ziel der Milchleistungszucht ist also in erster Linie die Schaffung homozygoter Bestände. Weiter wurden die physiologischen Grundlagen der Milchsekretion erörtert. Wenn danach auch die erblichen Grundlagen vielseitig sind, so

besteht doch Aussicht, die Komplexe von Erbfaktoren, welche die praktisch wichtigen Leistungsunterschiede bedingen, mit der Zeit zu erforschen. — Versuche, den Erbgang durch Kreuzung weit auseinanderstehender Rassen zu ergründen, sind mißglückt, weil die dabei kombinierten, ganz allgemein sehr verschiedenen Anlagen das Bild zu unübersichtlich machen und weil die Zahl der zur Durchführung der Versuche nötigen Tiere sehr bald zu groß wird. Ein zweiter gangbarer Weg ist die Auswertung des in der Praxis anfallenden Zahlenmaterials der Leistungskontrolle. Dieses ist ohne Korrekturen für Alter, Kalbmonat, Länge der Melk- und Trockenzeit und besonders die verschiedene Jahreswitterung nicht verwertbar. Korrektornormen, die für diese Einflüsse aus dem Durchschnitt großer Zahlen errechnet sind, sind nicht allgemein anwendbar, da die Tiere sich hiergegen oft individuell verschieden verhalten. Variationsstatistische Untersuchungen können daher nur Vorarbeit leisten, nicht den Erbgang klären. Verfolgen der Einzeltiere in der eigenen Herde kann zum Ziele führen. Die Nachprüfung im Versuch wird später darin bestehen, daß Tiere aus einer untersuchten Herde in eine andere gleichfalls untersuchte versetzt und dort ihre Leistungen und die ihrer Nachkommen weiter verfolgt werden. Zur Durchführung dieser mühevollen, langwierigen Arbeit bedarf es des verständnisvollen Zusammenwirkens von in jeder Beziehung gut durchgebildeten Züchtungsbiologen und erfahrenen praktischen Züchtern.

Zahl der Studierenden an den Tierärztlichen Hochschulen und Vet.-med. Fakultäten im W.-S. 1928/29.

Ort	Gesamtzahl	davon I. Semester
Berlin	295	15
Giessen	109	7
Hannover	331	15
Leipzig	125	7
München	201	8
	1061	52

Bücherbesprechungen.

Kästner, P.: Anleitung zur Eierprüfung (mit 4 Abb.). Berlin 1928. Verlag von Richard Schoetz. Preis RM. 1,—.

Die 16 Seiten starke Broschüre stammt aus dem staatlich polizeitierärztlichen Lebensmittelkontrollinstitut zu Berlin und bringt die Erfahrungen, die in fast 20jähriger Tätigkeit durch die dortigen tierärztlichen Sachverständigen bei der Überwachung des Eierhandels gemacht wurden. Kurz und sachlich werden die im Handel zu unterscheidenden Eierforten sowie ihre Merkmale abgehandelt und durch mehrere Abbildungen demonstriert. Das kleine Werk dürfte somit allen Tierärzten, die auf dem Gebiete der Lebensmittelkontrolle tätig sind, willkommen sein. Michels, Hannover.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Distriktstierarzt Dr. Eduard Denk in Dorfen zum Bezirkstierarzt für den Verwaltungsbezirk Schongau; Dr. Fritz Schönborg, bisher Prosektor am anatomischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Berlin in den Dienst der polizeitierärztlichen Lebensmittelkontrolle beim Polizeipräsidium in Berlin übergetreten.

Verliehen: Titel eines Geheimen Rates mit dem Rang eines Ministerialdirektors dem Ministerialrat Dr. Gasteiger; Titel und Rang eines Oberveterinärates den Bezirkstierärzten Ludwig Bierling in Aibling; Johann Bichlmaier in Aichach, Aug. Lösmeister in Wasserburg, Otto Eisen in Dekesbühl, Gustav Käppel in Schwabmünchen, Ferdinand Diem in Pegnitz.

Befördert: Bezirkstierarzt Dr. Hans Ehrhardt zum Veterinärmedizinerrat.

Verstorben: Dr. Fritz Eichacker in Langenbrücken (Baden); Schlachthofdirektor Franz Gladen in Gelsenkirchen-Buer.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtnr, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zufendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten.

Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Erstattungsansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 51.

Ausgegeben am 22. Dezember 1928.

36. Jahrgang.

(Aus der Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung in Mödling.)

Immunität bei Tuberkulose.*)

Von Direktor Dr. F. Gerlach.

Zwei Wege sind es im allgemeinen, die bei der Bekämpfung von Seuchen vor allem zum Erfolg führen: die Wahrnehmung und Einhaltung geeigneter hygienischer Maßnahmen einerseits, andererseits die Immunisierung des empfänglichen Organismus gegen die Infektion. Bei der Tuberkulose im besonderen liegen die Verhältnisse so, daß mittels hygienischer Maßnahmen erfahrungsgemäß wohl ansehnliche Erfolge insofern zu erreichen sind, als eine Eindämmung der Tuberkulose erzielt wird. Bei der enormen Verbreitung und dem ständigen Umsichgreifen der Tuberkulose in aller Welt wird aber auf die Dauer hinsichtlich der Tuberkulosebekämpfung mit der hygienischen Prophylaxe allein ein Auslangen nicht zu finden sein. Ein voller Erfolg ist erst zu gewärtigen, wenn die Immunitätsforschung uns Mittel an die Hand gegeben haben wird, um auch den zweiten Weg gangbar zu machen. Soll daher das weitere Ziel, das wir anstreben, die Tilgung der Tuberkulose, erreicht werden, so ergibt sich die Notwendigkeit, alles aufzubieten, um auch Schutzimpfung und experimentelle Therapie für dieses weltbewegende Problem dienstbar zu machen.

I.

Werfen wir zunächst die Frage auf, wie es sich in der Tierreihe mit der natürlichen Widerstandskraft gegen Tuberkulose verhält. Ursprünglich hat man verschiedene Tierarten von Haus aus für immun gegen Tuberkulose gehalten, bis sich herausstellte, daß kaum eine Säugetierart einer Infektion mit Säugetiertuberkelbazillen zu widerstehen vermag, weder einer unter bestimmten Kautelen künstlich gesetzten, noch wie sich nun immer häufiger zeigt, einer spontanen Infektion. Bei den verschiedenen Vogelarten kennen wir die mannigfaltigsten Formen der Erkrankung und bei Kaltblütlern ist sie bei Fröschen, Fischen, Schildkröten und Schlangen beschrieben worden. Solange derartige Erkrankungsfälle nur bei in Menagerien gehaltenen und nicht bei wildlebenden Tieren angetroffen wurden, war man geneigt, als Ursache solcher Vorkommnisse die unnatürliche Haltung dieser Tiere geltend zu machen. Seitdem man auch den Tieren in freier Wildbahn diesbezüglich ein besonderes Augenmerk zuwendet, ist man bei manchen von ihnen eben-

falls schon auf Spontanerkrankungen an Tuberkulose gestoßen. Es kommt also, sofern ich mich so allgemein fassen darf, in diesem Sinne eine angeborene Immunität gegen die tuberkulöse Infektion in der Tierreihe nirgends zum Ausdruck, wohl aber lassen sich diesbezüglich Dispositionsverschiedenheiten feststellen. Unter Umständen können sich Vögel und gewisse Wüsten- und Zieselmäuse einer tuberkulösen Infektion gegenüber refraktär verhalten, wie Versuche von Metschnikoff und Dembinski lehren, wenn nämlich denselben subkutan humane oder bovine Tuberkelbazillen einverleibt werden, die dann nicht zu einer tuberkulösen Erkrankung dieser Tiere führen, ja nicht einmal bis zu den regionären Lymphknoten gelangen, sondern bloß an der Impfstelle deponiert bleiben, wo sie sich allerdings lange Zeit hindurch, sogar auf Jahre hinaus lebend und vollvirulent erhalten können. Ähnlich verhalten sich Kaltblütler gegenüber einer Infektion mit Warmblüttertuberkelbazillen. Die in den Rückenlymphsack des Frosches verimpften Tuberkelbazillen können daselbst noch nach Wochen und Monaten von Leukozyten phagozytiert, aber vollkommen intakt und lebend, sowie vollvirulent für empfindliche Tierarten angetroffen werden.

II.

Wenden wir uns den experimentellen Grundlagen der Tuberkulose-Immunität zu, so muß zunächst darauf verwiesen werden, daß Robert Koch schon in seiner ersten Arbeit über die Ätiologie der Tuberkulose diese Frage angeschnitten hat. Er berichtete von einem Versuche, der darauf abzielte, Hunde gegen eine spätere künstliche Infektion mit Reinkulturen von Tuberkelbazillen zu immunisieren. Erst nachdem sich die an diese Versuchsanordnung geknüpften Hoffnungen nicht erfüllt hatten, verfolgte er diese Idee von anderen Gesichtspunkten aus. Mit seinem Fundamentalversuch am tuberkulösen Meerfischweinch (im Jahre 1891) wurde nicht allein die experimentelle Basis für dieses schwierige Forschungsgebiet geschaffen, sondern auch eine Vorstellung über die bei Tuberkulose herrschenden Immunitätsverhältnisse angebahnt. Dieser grundlegende Versuch Robert Kochs hat gezeigt, daß nach einer subkutanen Super- oder Reinfektion beim tuberkulösen Meerfischweinch, im Gegensatz zum Primäraffekt, nicht mehr ein tuberkulöses Geschwür entsteht, das zur Progredienz neigt und zur Generalisierung des Krankheitsprozesses führt, son-

*) Referat, gehalten gelegentlich der 90. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg am 20. September 1928.

dern daß die Reaktion bloß auf einen rasch entstehenden und vollständig ausheilenden Lokalaffect beschränkt bleibt.

Diese Beobachtung Robert Kochs konnte zunächst bei der Nachprüfung durch namhafte Forscher nicht nur nicht bestätigt werden, sondern stieß auf lebhaften Widerspruch. (Charrin, Baumgarten, Arloing, Czaplewsky, Roloff, Grammatschikoff.) Erst Detre-Deutsch, Della Cella, Feistmantel u. a. bestätigten Robert Koch und Calmette und Guérin, Römer, R. Kraus in Gemeinschaft mit Gross und Volk, sowie Hamburger vermochten viel zur Klarstellung der hier herrschenden komplizierten Verhältnisse beizutragen. Nebenbei soll daran erinnert werden, daß diese eigenartige Feststellung, allgemein als „Phänomen von Robert Koch“ bezeichnet, den großen Forscher zur Entdeckung des Tuberkulins führte. Aber lange Jahre hindurch haben weder Robert Koch selbst, noch andere Experimentatoren die Bedeutung erfaßt, die diesem Phänomen für die Erklärung des Mechanismus der Immunität gegen Tuberkulose zukommt. Baut sich doch heute eigentlich die gesamte Lehre von der Tuberkuloseimmunität auf dieser von Robert Koch entdeckten Tatsache auf. Aus der großen Reihe von Versuchen jener Autoren, die sich um die Klarstellung der Immunitätsfrage besonders verdient gemacht haben, sind vor allem jene von Römer hervorzuheben, weil gerade diese es sind, durch welche zuerst die Bedingungen ermittelt wurden, unter denen es zu einem nachweisbaren Immunitätszustand kommt. Zunächst einmal bestätigte Römer die Tatsache, die übrigens eine Zeitlang gegen die Richtigkeit des Phänomens von Robert Koch ins Treffen geführt wurde, daß die Einverleibung großer Dosen lebender oder toter Tuberkelbazillen tuberkulöse Tiere akut tötet. Wenn aber die Reinfektionsdosis nur niedrig bemessen wird, doch eben noch so hoch, daß sie bei Kontrolltieren eine Erkrankung an Tuberkulose hervorruft, so gelingt es relativ leicht, eine Immunität gegen die Reinfektion nachzuweisen. Das Kriterium bei dieser Versuchsanordnung liegt demnach lediglich in peinlichst quantitativen Arbeiten, unter strenger Berücksichtigung zeitlicher Momente, da sich zeigt, daß die Resistenz der tuberkulösen Tiere gegen die Reinfektion um so sinnfälliger wird, je länger der tuberkulöse Krankheitsprozeß bestanden hat. Von besonderer Wichtigkeit ist die Feststellung Römers, daß sich subkutan oder intraabdominal infizierte Tiere gegen Reinfektionen verschiedener Art, also auch gegen stomachale, aerogene und unter natürlichen Verhältnissen erfolgende Infektionen bzw. Superinfektionen immun zeigen, allerdings unter der Bedingung, daß man sich für die Vorbehandlung der Versuchstiere, d. h. für die Erstinfektion, lebender, virulenter Bazillen bedient. Der Versuch versagt jedoch, sobald avirulente oder abgetötete Tuberkelbazillen verwendet werden.

Von nicht minderer Bedeutung für eine Nutzenanwendung in der Praxis ist ferner der Umstand, auf den sowohl Römer als auch R. Kraus hingewiesen haben, daß nämlich eine Erstinfektion mit Tuberkelbazillen vom humanen Typus auch gegen Reinfektion mit bovinen Tuberkelbazillen Immunität verleiht und umgekehrt. Diese Tatsache finden wir bei den Tuberkuloseimpfungen bei Rindern nach v. Behring und Koch u. a., sowie bei jenen des Menschen nach Calmette berücksichtigt, insofern als im ersteren Falle die Immunisierung mit einem humanen Typus, im letzteren mit einem bovinen Typus angestrebt wird.

Die Ergebnisse seiner Versuche führten Römer dazu, ein Gesetz zu formulieren, nach welchem ein tuberkulöser Prozeß eine erhöhte Resistenz gegen eine tuberkulöse Reinfektion, also eine Immunität hervorruft.

Ebenso wie Römer hat Hamburger auf die Notwendigkeit des quantitativen Arbeitens bei Vornahme von Immunitätsversuchen hingewiesen und besonders nachdrücklich betont, daß der Erfolg dieser Versuche in absoluter Abhängigkeit zur angewendeten Reinfektionsdosis steht. Als Beweis dafür infizierte er das tuberkulöse Tier links mit einer schwachen und rechts mit einer starken Dosis von Tuberkelbazillen mit dem Ergebnis, daß links ein Angehen der Infektion nicht erfolgte, während rechts ein typisches tuberkulöses Geschwür entstand.

In ähnlicher Weise ging später Selter vor: Meerfischweinch, die durch Inhalation mit etwa je 100 Tuberkelbazillen künstlich infiziert worden waren, reinfizierte er nach 2½ Monaten mit 100 000 bzw. 10 000 000 Tuberkelbazillen. Bei der niedrigeren Dosis verschwanden

die Bazillen in manchen Fällen spurlos, bei der höheren Dosis entwickelte sich ein Abszeß an der Inokulationsstelle, der ausnahmslos binnen zwei Wochen ausheilte.

Drei Kardinalfragen sind es also, wie aus der Gesamtheit dieser Versuche hervorgeht, nach denen beim Studium der Immunität gegen Tuberkulose vorzugehen ist, um zu einem klaren Bild zu gelangen:

1. darf die Erstinfektion nur eine äußerst milde sein, damit eine möglichst langsam verlaufende, chronische Tuberkulose entsteht;
2. soll die Reinfektion möglichst spät nach der Erstinfektion vorgenommen werden; je älter der tuberkulöse Prozeß ist, umso deutlicher wird die Resistenz-erhöhung;
3. muß sich die Reinfektionsdosis innerhalb bestimmter Grenzen halten.

Zu ähnlichen Versuchsergebnissen wie die vorangeführten gelangten Kraus und Volk und Kraus und Gross auf einem anderen Wege. Diese Forscher bedienten sich tuberkulöser Hautprozesse als Indikator für den Reinfektionsinfekt, nachdem sie in Vorversuchen festgestellt hatten, daß man bei Affen (Makaken) durch intrakutane Infektion in der Gegend der Augenbrauen gerade so wie bei Syphilis-übertragungen Primäraffekte und progrediente Krankheitsprozesse erzeugen kann. Durch humane oder bovine Tuberkelbazillensämme hervorgerufene Primäraffekte bedingten einen Schutz gegen eine Reinfektion selbst in mäßigen Dosen mit hochvirulenten Tuberkelbazillen sowohl vom humanen als auch vom bovinen Typus. Der Ausfall dieser Versuche war stets der gleiche, solange die Tuberkulose progredient verlief. Negativ verliefen die Versuche, wenn die Affen mit schwach virulenten Stämmen oder mit Geflügeltuberkulosebazillen vorbehandelt und hernach einer virulenten Reinfektion unterworfen wurden. Auf die zweite Impfung entwickelte sich dann immer ein progredienter tuberkulöser Prozeß, selbst dann, wenn die Reinfektion direkt in die von der Erstinfektion nach Ausheilung zurückgebliebene Narbe vorgenommen wurde. Von Dold liegen Versuche vor, wonach die abgeheilte Tuberkulose beim Meerfischweinch keine Immunität hinterläßt.

Wir gewinnen somit den Eindruck, daß bezüglich der Immunität bei Tuberkulose ganz besonders komplizierte Verhältnisse vorherrschen. Bei einer ganzen Reihe von Infektionskrankheiten sehen wir das Bestehenbleiben einer Immunität nach Abheilung der Infektion, bei der Tuberkulose erlischt mit dem Bestehen der Infektion auch die Immunität. Aber auch bei schwach virulenten Infektionen ist eine Immunität nicht nachweisbar, selbst dann nicht, wenn sich die injizierten schwachvirulenten Bazillen an der Impfstelle enorm vermehren.

Bei Rindern, deren tuberkulöse Herde verkalkt und abgekapselt waren, stellte Römer die normale Empfänglichkeit für eine künstliche Reinfektion fest. Calmette und Guérin dagegen fanden stomachal infizierte und ausgeheilte Kälber immun gegen Reinfektion.

Von weiteren Versuchen, die in ihren Ergebnissen in vollem Einklang stehen mit den bisher aufgezählten, wären außerdem u. a. jene zu nennen, die Römer mit Erfolg ausführte und durch die er analog wie bei künstlicher Infektion auch gegen eine natürliche Ansteckung eine hohe Resistenz ermittelte, jene von Lewandowsky, Kleinhans, Löwenstein und Przygode und speziell die von Selter mit schwach virulenten Bazillen, bei denen eine Resistenz gegen die Reinfektion resultierte, was ihn zu Versuchen an Kindern veranlaßte.

Eingehende und äußerst lehrreiche Studien über Reinfektionen verzeichnen noch E. R. Baldwin, Leroy und Gardner des Trudeau-Sanatoriums in Saranac Lake (U.S.A.). Mit einem schwach virulenten, einen 2—3 Jahre dauernden Krankheitsverlauf bedingenden Tuberkulosestamm infizierte Meerfischweinch wurden ungefähr 1 Jahr nach der Erstinfektion durch Inhalation mit virulenten Bazillen reinfiziert. Sämtliche Versuchstiere erkrankten nur milde im Vergleich zu den Kontrollen. Die Meerfischweinch einer zweiten Versuchsreihe, die 18 Monate später in ganz gleicher Weise mit demselben Stamme reinfiziert

wurden, blieben vollkommen gefund. Eine dreimal hintereinander erfolgende pulmonale Reinfektion bei diesen Tieren führte aber nicht einmal zu einer Lungentuberkulose in einem solchen Ausmaße, wie bei den nur einmal infizierten Tieren. Diese Versuchsreihen dienen nicht allein den schon angeführten Experimenten zur Bestätigung, denn es ergab sich außerdem auch ein günstiger Einfluß auf den Verlauf der Erstinfektion.

Ein spezielles Interesse beanspruchen die am Auge von Versuchstieren ausgeführten Studien über Tuberkulose-Immunität. Zunächst beobachtete E. Löwenstein, daß nach subkutaner Infektion von Kaninchen eine Injektion von Tuberkelbazillen in die vordere Augenkammer zu einer Erkrankung des Auges nicht führt, wogegen es bei den Kontrollen zu typischer Irstuberkulose mit Phthise des Augenfeldes kommt. Schieck fand das eine Auge gegen Infektion mit schwachen Dosen von Tuberkelbazillen geschützt, wenn das andere Auge künstlich infiziert worden war. In ganz ähnlicher Weise ermittelte Crusius, daß die Infektion des einen Auges einen hohen Grad von Immunität des anderen Auges bedingt. Ähnliche Versuchsergebnisse verzeichnen auch Igersheimer und Schloßberger.

Von Uhlenhuth und seiner Schule umfassend angestellte Versuche erwiesen die Unmöglichkeit einer Immunisierung mit großen Mengen abgetöteter Tuberkelbazillen. Deshalb verlegte sich Uhlenhuth auf die Prüfung des Verhaltens von Tieren, die mit schwach virulenten oder nahezu avirulenten Stämmen boviner und humaner Abkunft vorbehandelt worden waren. Uhlenhuth und Jötten verimpften von diesen schwach virulenten Stämmen an Rinder, Meerschweinchen, Kaninchen, Efel bis zu 60 Gramm intraperitoneal, ohne daß eine antigene Wirkung zu erkennen gewesen wäre.

So wie sich der tuberkulöse Organismus nach experimenteller Erstinfektion immun zeigt gegen Reinfektion, verhält es sich auch mit dem spontan infizierten Organismus, wie v. Behring, v. Hutyrá, Calmette, Vallée, Mc. Fadyean gezeigt haben. Bei acht von Finzi subkutan mit großen Dosen Perlsuchtbazillen geimpften tuberkulösen Rindern war ein Haften der Reinfektion ebensowenig zu bemerken, wie eine Affektion der regionären Lymphknoten.

Das Gesamtergebnis aller vorangeführten Experimente wäre demnach folgendermaßen zu postulieren:

1. Die Reinfektion des tuberkulösen Organismus mit geringen Dosen von Tuberkelbazillen führt weder zur Entstehung eines Primärattaktes, noch werden die regionären Lymphknoten affiziert.
2. Bei tuberkulösen Tieren, die mit höheren Dosen von Tuberkelbazillen reinfiziert werden, stellt sich die Reaktion im Vergleich zur Erstinfektion früher ein und sie klingt rascher ab. Es beantwortet also der tuberkulöse Organismus die neuerliche Einverleibung von Tuberkelbazillen mit einem akuten Entzündungsprozeß, entgegen dem üblichen chronischen Verlauf der Tuberkulose nach Erstinfektion.
3. Eine Schutzwirkung gegen die Reinfektion tritt nur bei einem aktiven tuberkulösen Prozeß zu Tage, der durch lebende, virulente Tuberkelbazillen verursacht ist. Mit der Ausheilung des tuberkulösen Prozesses erlischt die Immunität gegen Reinfektion.

III.

Die Frage, was mit den bei der Superinfektion dem tuberkulösen Organismus einverleibten Tuberkelbazillen geschieht, kann derzeit mit Sicherheit nicht beantwortet werden und demgemäß ist die Erklärung des Mechanismus der Tuberkuloseimmunität schwierig und strittig, was sich schon in der Nomenklatur ausdrückt. Am häufigsten spricht man wohl von einer Infektionsimmunität. Waleminsky gebraucht die Bezeichnung Lymphbahnmunität. Petruschky lehnt den Ausdruck Immunität bei Tuberkulose überhaupt ab und prägt dafür den Begriff „Durchseuchungsresistenz“, womit festgelegt sein soll, daß zwar die wiederholte Infektion nicht angeht, der erste Infektionsprozeß aber ein progredienter ist. Joest anerkennt eine Durchseuchungsresistenz nur für die exogene additionelle Superinfektion, nicht aber auch für eine meta-

statische, endogene Reinfektion. Tatsache ist, daß die Immunität bei Tuberkulose wesentlich anders geartet ist, als bei akuten Infektionskrankheiten und daß sie am ehesten gleichkommt jener bei Syphilis, wo ebenfalls nur ein aktiver Krankheitsprozeß oder aber (bei Bestehen einer symptomlosen Infektion) das Vorhandensein von Spirochäten gegen die neuerliche Infektion schützt.

Nicht identisch mit Schutz gegen Infektion mit Tuberkelbazillen ist die **Giftüberempfindlichkeit**, die Allergie gegen Tuberkulin. (Selter, Calmette.) Immunität und Allergie gehen wohl häufig parallel miteinander, sie sind aber nicht immer miteinander verbunden. Es ist bekannt, daß noch vor dem Auftreten einer Immunität bei tuberkulösen Tieren Tuberkulinüberempfindlichkeit bestehen kann und andererseits kann der Schutz schon aufgehoben sein und die Allergie besteht weiter.

Metelnikow und Secretewa haben in experimentellen Arbeiten gezeigt, daß die Tuberkelbazillen von Leukozyten phagozytiert werden. Bail stellte eine erhöhte Auflösungsmöglichkeit der Körperflüssigkeiten fest, ebenso beobachtete Markl neben Phagozytose extrazelluläre Auflösungsvorgänge. Kraus und Hofer fanden im tuberkulösen Organismus eine Auflösung der Tuberkelbazillen, Verlust der Säurefestigkeit und Auftreten Much'scher Granula, wogegen sich im gefundenen Organismus eine rege Phagozytose als Abwehrmaßnahme gegen die Infektion geltend macht. Die Zerstörung der Tuberkelbazillen durch Lyse, die sog. **Tuberkulolyse** läßt sich nach übereinstimmenden Angaben verschiedener Forscher am besten bei Peritonealversuchen studieren. Ähnliche Befunde über Tuberkulolyse lieferten auch Arbeiten von Bergel, Much, Much und Leschke, Manwaring und Bronfenbrenner.

Gegen eine extrazelluläre Auflösung der Bazillen im tuberkulösen Organismus sprechen sich u. a. Calmette und Burnet aus, die der Phagozytose allein als Abwehrmaßnahme Geltung zu verschaffen bestrebt sind. Auch Braatz nimmt gegen die Tuberkulolyse Stellung, Blumenberg und Möhrke wieder finden sie bei einzelnen Tuberkulosestämmen, bei anderen nicht.

Die Entscheidung darüber, ob der Tuberkulolyse oder der Phagozytose eine Bedeutung für den Mechanismus der Tuberkuloseimmunität zuzuerkennen ist, dürfte bei den Arbeiten der letzten Zeit zu suchen sein. Wie die Untersuchungen von Töppich und Gromelsky, Grünberg, O. Ornstein gezeigt haben, dürfte der Mechanismus der Immunität bei Tuberkulose am ehesten mit dem Zusammenwirken von Phagozytose und Tuberkulolyse zu erklären sein, also mit einer erhöhten Tätigkeit sowohl der leukozytären Elemente als auch des Retikuloendothels.

IV.

Die ersten Versuche einer Immunisierung gegen Tuberkulose bei Rindern gehen auf Maffucci (1889) zurück und besondere Hoffnungen knüpften sich in dieser Hinsicht an die Entdeckung des Tuberkulins durch Robert Koch im Jahre 1890. Unter den vielen Forschern, die zu der Überzeugung gelangen mußten, daß sich sowohl die Roh-, als auch die gereinigten Tuberkuline, selbst durch lange Zeit in großen Dosen injiziert für die Anregung von Immunisierungsvorgängen nicht eignen, seien nur Calmette und Guérin, Arloing und Guinard, Trudeau und Brown genannt. Mc. Fadyean sowie Pearson und Gilliland geben der Meinung Ausdruck, daß nach Tuberkulinbehandlung bei Rindern doch eine gewisse erhöhte Resistenz zu bemerken ist. Auch auf verschiedenen Wegen aus Tuberkelbazillen von Koch, Klebs, von Behring, Hirschfelder, Maragliano u. a. gewonnenen Toxinen blieb der Erfolg verlagert. Ebenso vermochten die durch Extraktion gewonnenen Lipotide der Tu-

berkelbazillen wie z. B. Methylextrakt von L. Nègre und A. Boquet, gegen virulente Infektionen nicht zu schützen.

Mit abgetöteten Tuberkelbazillen gegen Tuberkulose zu immunisieren, ist wiederholt versucht worden. So berichtet Vallée von Impfversuchen mit abgetöteten Tuberkelbazillen bei Rindern. Neufeld gelang es bei Ziegen ebenfowenig wie Lignières bei Rindern durch wiederholte Impfungen mit abgetöteten humanen und bovinen Tuberkelbazillen eine Immunität zu erzielen. Die von Weber und Titze mit abgetöteten Tuberkelbazillen in Mengen bis zu 5 Gramm zweimal vorbehandelten Rinder erkrankten bei der Immunitätsprüfung an schwerer Tuberkulose.

Von günstigeren Resultaten haben J. Strauß, Trudeau und Dembinski Mitteilung gemacht, doch können die Ergebnisse ihrer Versuche bestenfalls als Ausdruck einer nur in sehr begrenztem Ausmaße erhöhten Widerstandsfähigkeit gedeutet werden. Bei Meerfischweinen und Kaninchen vorgenommene wiederholte subkutane Injektionen abgetöteter Bazillen verursachen Abszesse und wie A. Borell zeigen konnte, gehen Kaninchen nach intrabdominalen Impfungen häufig zugrunde. Calmette und Breton beobachteten nach Verfütterung erhitzter Bazillen bei jungen Meerfischweinen eine Verzögerung im tödlichen Ablauf der Infektion gegenüber den Kontrollen. Ganz ebenso wurde bei Rindern durch intravenöse Injektionen von in der Hitze abgetöteten Tuberkelbazillen anstatt der rasch verlaufenden Miliartuberkulose, wie sie sich bei den nicht vorbehandelten Kontrollen einstellte, ein langsam fortschreitender, chronischer Krankheitsverlauf, aber keine Immunität beobachtet (Calmette und Guérin). In gewissem Sinne sprechen sich Rothe und Bierbaum für eine gegen die virulente Infektion gerichtete Schutzwirkung aus, die sie bei Rindern nach Behandlung mit schonend erhitzten Bazillen beobachten konnten. Petroff schreibt der intraperitonealen Injektion eine immunisierende Wirkung zu. Loeffler und Matsuda glaubten eine Immunität zu erzielen mit in der Kälte getrockneten und durch langsame Erhitzen getöteten Bazillen. Maragliano bediente sich für die Schutzimpfung der Menschen glyzerinierter Bazillenemulsionen in Form der Hautimpfung. Nathan Raw praktiziert in England seit 1922 ein prophylaktisches Impfverfahren, bei dem junge Rinder mit humanen und Kinder mit bovinen, in der Hitze abgetöteten Tuberkelbazillen geimpft werden. Auch die Versuche Langers, Kinder durch dreimalige subkutane Impfung mit abgetöteten Bazillen gegen Tuberkulose zu schützen, sind hier zu erwähnen.

Die diversen eben aufgezählten Methoden der Immunisierung mit abgetöteten Tuberkelbazillen sind wieder gänzlich aufgegeben worden, der beste Beweis dafür, daß die Ansicht der meisten Autoren (Lignières, Calmette - Guérin, Th. Smith, Vallée u. v. a.), die gegen die Möglichkeit einer Immunisierung mit abgetöteten Tuberkelbazillen Stellung nehmen, auf Richtigkeit beruht.

Der Mangel immunisierender Fähigkeiten bei abgetöteten Bazillen ist auch auf Grund umfangreicher experimenteller Arbeiten aus der neuesten Zeit von Uhlenhuth, Selter, Dold u. a. neuerlich nachdrücklichst vermerkt und bekräftigt worden.

Es fehlt des weiteren nicht an Versuchen, Tuberkelbazillen durch physikalische und chemische Mittel zu modifizieren, bzw. zu mitigieren, um die Einwirkung der Erhitzung auf das Bakterienplasma zu umgehen und so vielleicht eher zu einem wirksamen Impfstoff zu gelangen. Wegen der Unmöglichkeit hier näher darauf einzugehen, soll bloß eine gedrängte Aufzählung diesbezüglicher Versuche ein Bild davon geben, was alles bisher aufgewendet wurde, ohne zu einem brauchbaren Resultate zu führen: Di Donna tötete die als Impfstoff dienenden Bazillen durch Sonnenlicht, Victor und Henry durch ultraviolette Strahlen, Herm. Schrötter mittels Radiumemanation. Auch Fermente wurden für diesen Zweck herangezogen und zwar wählte Loeffler solche tierischer und pflanzlicher Herkunft. Livierato, Bartel, Fontes setzten die Bazillen der Einwirkung von Proteasen und Lipasen aus. Von Chemikalien ließ man auf die Kulturen einwirken: Chlorverbindungen, Eau de Javel (Moussu und Goupil), jodiertes Wasser (Vallée), Natriumfluorid (Rappin), Oleate (Noguchi), Neurin, Cholin, Monochlorhydrin, ferner Glycerin, Harnstoff und Galaktose (F. Levy, Blumenthal und Marxer). Deycke und Much wandten das

Ovolecithin an. Rabinowitsch bediente sich des Formols, Uhlenhuth der Mazeration in 15—20prozentiger Antiforminlösung. Shiga schwächte die Virulenz durch Trypaflavin, Erythrosin und Neutralrot ab und die so behandelten Bazillen wurden erst noch mit antituberkulösem Serum sensibilisiert. Nicht zu vergessen die Züchtung der Bazillen auf Saponinnährböden (Arima, Aoyama und Ohnawa, Dostal). Auch schwache Säuren, Azeton, Benzin, Toluol, Äther, Tetrachlorkohlenstoff und viele andere Mittel wurden in zahlreichen Versuchen für die Abtötung der Tuberkelbazillen benützt, ohne daß es gelungen wäre, zu einem brauchbaren Impfstoff zu gelangen.

Zusammenfassend ist hierüber nur noch zu sagen, daß manche dieser Methoden, die schonender auf das Bakterienprotoplasma einwirken, eine deutlich wahrnehmbare, jedoch nur sehr flüchtige Resistenzhöhung gegen die virulente Infektion, aber keine Immunität erzeugen.

V.

Es war daher naheliegend, nach den vielen vergeblichen Versuchen, mittels abgetöteter Bakterien zu immunisieren und nach all dem, was über die schützende Wirkung einer leichten Infektion gegen Superinfektion bekannt geworden ist, anzunehmen, daß eine **Tuberkulosefchutzimpfung mit lebenden Bazillen** von besserer Wirksamkeit sein wird.

Die ersten Immunisierungsversuche mit lebenden Bakterien sind schon 1886 von Cavagnis und zwar mit phenolisiertem, tuberkulösem Sputum und von Maffucci 1889 bei Rindern mit lebenden menschlichen Tuberkelbazillen vorgenommen worden. Es folgen dann die Versuche von Grancher und Ledoux - Lebard, von Héricourt und Richet, neben vielen anderen, bis zu dem Zeitpunkte, da Behring (1902) gemeinsam mit Römer und Ruppel mit seiner Methode der „**Bovovakzination**“, die er ursprünglich als „Jennerisation“ bezeichnet hatte, vor die Öffentlichkeit trat.

Ausgehend von der Annahme, daß die Erreger der menschlichen und der Rindertuberkulose Varietäten der gleichen Bazillenart sind, entschloß sich v. Behring nach dem Vakzinationsprinzip von Jenner - Pasteur zu einer Immunisierung mit der weniger virulenten Varietät gegen die Infektion mit der virulenteren, mit anderen Worten mit Bazillen vom humanen Typus eine Schutzwirkung gegen die Infektion mit dem bovinen Typus hervorzurufen.

Als wesentlich wurde die Isolierung der Impflinge während des zur Immunisierung notwendigen Zeitraumes und während der darauffolgenden 6 Wochen angegeben, um vorerst noch eine zufällige Infektion auszuschalten.

Die von v. Behring versuchsweise mit Bovovakzin Schutzgeimpften Rinder zeigten auf eine künstliche virulente Infektion hin, die Kontrollrinder sicher tötete, während einer mehrmonatlichen Beobachtung keine klinischen Anzeichen einer Erkrankung.

Bis zum Jahre 1910 wurde das Bovovakzin in den verschiedensten Ländern sowohl experimentell im Laboratorium, als auch in der Praxis einer eingehenden Überprüfung unterzogen.

Schon die Prüfung der Virulenz des Bovovakzins beim Meerfischweinen führte zu inkonstanten Resultaten. (Rossignol und Vallée, Weber und Titze, Dammann u. a.). Neben virulenten Proben des Impfstoffes traf man auch unschädliche, woraus schon eine ungleichmäßige Wirkung der Immunisierung in der Praxis abgeleitet werden muß und daraus dürften auch wohl die sich so sehr widersprechenden Ergebnisse bei den Arbeiten mit Bovovakzin, wie sie aus den verschiedenen Ländern gemeldet wurden, zu erklären sein. (v. Hutyra, Lorenz, Thomassen, Pearson und Gilliland, Belfanti und Stazzi, Degive, Stubbe, Lienaux und Mullie, Th. Smith, G. Regner und Stenström.)

Eber, auf Grund seiner ausgedehnten Erfahrungen einer der besten Beurteiler des Verfahrens, gelangte zu dem Schlusse, daß das Behring'sche Impfverfahren bei Rindern zwar eine erhöhte Widerstandskraft gegen eine künstliche Tuberkuloseinfektion auslöst, daß es aber bei der unter natürlichen Verhältnissen einwirkenden Infektion in der Praxis versagt. Das gleiche Urteil fällten Weber und Titze am Reichsgesundheitsamte in Berlin, ferner v. Hutyra, Dammann, sowie viele andere Nachprüfer. Eine ähnliche Beurteilung er-

fuhr die Bovovakzination auch in dem von Rossignol und Vallée an die französische Studienkommission erstatteten Berichte. Die beiden letztgenannten Autoren äußerten sich u. a. dahin, daß durch Bovovakzin eine deutliche, aber sich rasch erschöpfende Resistenzhöhung festzustellen ist.

Wenn diese Schutzimpfungsmethode nicht durchzudringen vermochte, so sind hierfür mehrfache Gründe maßgebend. Abgesehen davon, daß die kurzdauernde und nicht genügende Resistenzhöhung eine häufige, wirtschaftlich schwer zu ertragende Wiederholung des Immunisierungsverfahrens notwendig machen würde, besteht bei dieser Impfung die Gefahr der intermittierenden Ausscheidung lebender und virulenter Tuberkelbazillen mit der Milch und der Infektion des Fleisches dieser Tiere. Der Genuß solcher Milch und solchen Fleisches muß daher als bedenklich erscheinen.

Auf die Vorschläge von Almgren, Jungklaus, Römer einzugehen, wonach der Kombination der Bovovakzination mit hygienischen Maßnahmen das Wort geredet wird, dürfte sich erübrigen, da damit keineswegs bessere Erfolge zu gewärtigen sind, als mit dem Tilgungsverfahren von Bang und v. Ostertag an sich.

Die ungünstigen Ergebnisse der Immunisierung mit Bovovakzin führten selbstredend zu einer ganzen Reihe von Modifikationen des Behring'schen Verfahrens, ohne daß ihnen mehr Erfolg beschieden gewesen wäre, als diesem. v. Behring selbst hat zwei andere Impfstoffe aus Tuberkelbazillenderivaten angegeben, die **Tuberkulase** und das **Tulaselaktin**, die praktisch bedeutungslos sind.

Ein unter dem Namen „**Tauruman**“ für veterinäre Zwecke in den Handel gebrachter Impfstoff gegen Tuberkulose ist aus Versuchen von R. Koch, Schütz, Neufeld und Mießner hervorgegangen, in denen verschiedenen Versuchstieren gleichfalls mittels humaner Tuberkelbazillen, aufgeschwemmt in physiologischer NaCl-Lösung, ein relativ hoher Grad von Tuberkulose-Immunität verliehen werden konnte. Nicht nur mit menschlichen Tuberkelbazillen, sondern auch mit solchen von bovinem Typus gelang die Immunisierung. Das Endergebnis der Nachprüfungen dieser Methode stimmt mit jenem bei der Bovovakzination überein. Es handelt sich hier um einen Impfstoff von noch höherer Virulenz. Wie sich zeigte, waren die Organe aller mit Tauruman geimpften Tiere 1 Monat nach der Impfung virulent für das Meerschweinchen. Ausscheidung der intravenös geimpften Bazillen mit der Milch wurde nachgewiesen. Überdies verlag die Immunität nach Mießner und Eber gegenüber der natürlichen Infektion.

Die von v. Baumgarten inaugurierte sog. „**Tübinger Methode zur Immunisierung der Rinder gegen Tuberkulose**“ besteht darin, daß die Tiere einmal subkutan mit kaninchenvirulenten menschlichen Tuberkelbazillen geimpft werden. Lokalisierung der verimpften Bazillen an der Impfstelle oder in den regionären Lymphknoten, während das Blut und die übrigen Organe von demselben freibleiben, wird als besonderer Vorteil dieses Verfahrens angegeben. Über die praktische Anwendung der „Tübinger Methode“ ist nichts berichtet worden. Lediglich über eine hohe Immunität von versuchsweise nach Schutzimpfung künstlich infizierten Rindern liegen Mitteilungen von v. Baumgarten vor.

Einen ganz ähnlichen Vorgang der Tuberkulosechutzimpfung mit menschlichen Tuberkelbazillen auf subkutanem Wege beobachtete Lignières gelegentlich der Rindertuberkulosebekämpfung in Argentinien. Eine nach einem halben Jahr vorgenommene Prüfung der Immunität solcher Rinder sprach für eine sehr bedeutende Resistenz gegen die Infektion.

Die Widerstandsfähigkeit gegen die natürliche Infektion nach einmaliger subkutaner Impfung war fast gleichzeitig und unabhängig von v. Baumgarten durch v. Hutyra studiert worden, der einen nicht unwesentlichen Immunitätsgrad feststellte, jedoch dessen rasches Zurückgehen im Verlaufe von etwa einem halben Jahr.

Als ein weiteres Verfahren wäre dann Heymanns **Schilffäckchenmethode** anzuführen, bei welcher getrocknete lebende und virulente, in Schilffäckchen eingeschlossene Menschen- und Rindertuberkelbazillen mittels eines eigenen Troikarts unter der Haut deponiert werden. In der Zeit von 1908—1911 beschäftigte sich eine von der belgischen Regierung eingesetzte Kommission mit der Prüfung dieser Methode und gelangte zu einer recht ungünstigen Beurteilung derselben, da sich die nach Heymanns behandelten Rinder bei einer durch Kohabitation mit tuberkulösen Tieren oder durch Fütterung ausgesetzten Infektion nicht

vakziniert erwiesen, so daß der Methode ein praktischer Wert abgesprochen wird. Auch alle sonstigen Nachprüfungen, es seien nur jene von Eber und Edelmänn genannt, führten zu derart ungünstigen Ergebnissen.

In der Absicht, die Gefahren, welche eine Schutzimpfung mit lebenden, virulenten Bazillen in sich birgt, zu umgehen, hat Klimmer die Schutzimpfung gegen Tuberkulose mit „**Antiphymatol**“ empfohlen. Der Impfstoff ist eine Vakzine, bestehend aus humanen Bazillen, die nach Erhitzen auf 52—53 Grad für das Meerschweinchen eben noch avirulent sind (Impfstoff TH) und aus modifizierten humanen Bazillen, die nach wiederholten Passagen im Kaltblüterorganismus (Molch) ihre Virulenz für Säugetiere, Vögel und Kaltblüter verloren haben (Impfstoff AV). Als Dosis werden 5 ccm einer wässerigen Aufschwemmung der Bazillen angegeben. Zu impfen sind Rinder ohne Unterschied des Alters und des Geschlechtes und zwar jetzt subkutan, während früher der intravenöse Modus vorgeschrieben war. Nach den Angaben Klimmers erreicht der Impfschutz etwa 2 Monate nach der Schutzimpfung den Höhepunkt und soll ungechwächt fast $\frac{3}{4}$ Jahre hindurch andauern.

Außer auf die Impfung legt Klimmer besonderen Wert auf die Anwendung einer Reihe von hygienischen Maßnahmen. Seine Wahrnehmungen mit dieser Kombination von Impfung und hygienischer Prophylaxe schildert Klimmer im günstigsten Lichte, ebenso wie die Heilwirkung des Antiphymatols bei tuberkulösen Kühen.

Daß die Klimmer'sche Schutzimpfung für die Tuberkulose tilgung Ersprießliches zu leisten vermag, ist zu bezweifeln (Zwick und Witte), nachdem die prophylaktisch-hygienischen Maßnahmen, die einen integrierenden Bestandteil dieses Verfahrens bilden, schon für sich allein eine Eindämmung der Tuberkulose bewirken. Aus den Prüfungsergebnissen von Krautstrunk, Eber, Edelmänn, Nielson geht übereinstimmend hervor, daß die Schutzimpfung mit Antiphymatol einen nennenswerten Schutz gegen die natürliche Infektion nicht zu bieten vermag. Wenn Erfolge zu verbuchen sind, dann dürften diese den bei dieser Methode unerlässlichen hygienischen Maßnahmen zuzuschreiben sein, ohne die sich die Immunität als unzureichend herausstellt. Zwick und Witte bezeichnen daher den Wert des Klimmer'schen Impfverfahrens als fraglich.

Nach umfangreichen Versuchen an Kleintieren und Kälbern gelangte Selter zur Anwendung seines „**Vitaltuberkulins**“, eines Impfstoffes für den Menschen und das Rind aus virulenten, artgleichen Tuberkelbazillen. Als Vorläufer für diese Methode ist Zwick zu nennen, der bei Immunisierungsversuchen neben intravenös injizierten menschlichen Tuberkelbazillen auch artgleiche virulente Bazillen subkutan injizierte, wodurch ein auf die Impfstelle und die regionären Lymphknoten lokalisierter tuberkulöser Herd gesetzt wurde, was die Grundlage der Methode von Selter bildet. Er nimmt nämlich an, daß eine tuberkulöse Infektion nur dann Immunität verleiht, wenn sie vom Organismus überwunden wird, wenn sie also auf einen bestimmten Herd lokalisiert bleibt, daß hingegen die bloße Anwesenheit lebender und selbst virulenter Tuberkelbazillen im Körper für das Zustandekommen einer Immunität nicht ausreicht, wofür ihm die bisher gesammelten Erfahrungen bei den mit lebenden Tuberkelbazillen arbeitenden Schutzimpfungsmethoden zu sprechen scheinen. Selter bedient sich deshalb eines Impfstoffes aus artgleichen Bazillen von schwächerer Virulenz, die im Achatmörser verrieben werden. Die Dosierung geschieht durch Auszählung der erhalten gebliebenen Bazillen, die Impfung erfolgt subkutan. Die Impfung bei Meerschweinchen und Kälbern führt zu Positivwerden der Tuberkulinreaktion und zu einer tuberkulösen Erkrankung der der Impfstelle benachbarten Lymphknoten, die jedoch ausheilen soll. Nach wiederholten Versuchen gelangen Selter, Knauer und Blumenberg zu einer günstigen Beurteilung der Impfung mit Vitaltuberkulin, in dem Sinne, daß der an der Impfstelle lokalisiert bleibende tuberkulöse Prozeß als ungefährlich anzusehen ist und der die Grundlage eines ausreichenden Schutzes gegen eine Spontaninfektion bildet.

Vorerst wird aber noch das Ergebnis ausgedehnter Versuche in der Praxis abzuwarten sein, die nach zwei Rich-

tungen hin Aufschluß geben werden müssen: ob nämlich der an der Impfstelle auftretende tuberkulöse Prozeß tatsächlich keine Neigung zum Fortschreiten entfaltet und ob eine Immunität gegen eine unter natürlichen Verhältnissen einsetzende Infektion in ausreichendem Maße zustandekommt.

Eber hat sich erst kürzlich über das Selter-Knauer-Blumenberg'sche Impfverfahren dahin geäußert, daß die bisher mit anderen ähnlichen Immunisierungsmethoden gemachten Erfahrungen einen Erfolg der Selter'schen Schutzimpfung bei der Tuberkulosebekämpfung nicht erwarten lassen.

Aus der letzten Zeit (1927) sei hier auch die Meinung Uhlenhuths zitiert, der das Verfahren von Selter als nicht ungefährlich und für die praktische Anwendung nicht hinreichend gestützt bezeichnet.

Der gleiche Einwand richtet sich übrigens auch gegen das von Böhme an Rindern und von A. Moeller u. a. an Säuglingen angewendete Verfahren der intrakutanen Impfung mit lebenden, virulenten Tuberkelbazillen, die im Wege eines lokalen tuberkulösen Prozesses zur Immunität führen soll.

Von sonstigen Immunisierungsversuchen gegen Tuberkulose wären ferner jene zu nennen, bei denen Geflügeltuberkelbazillen auf intravenösem Wege injiziert wurden, ohne daß dies zum Ziele geführt hätte, wie die Untersuchungen von Grancher und Ledoux-Lebard, Héricourt und Richard, Trudeau, Babes, Römer, Mc. Fadyean, Sheater und Minett u. a. lehren.

Seit 1897 war A. Moeller um die Immunisierung tuberkulöser Kranker mittels Impfung mit einer „Blindschleichenvakzine“ bemüht. Es handelte sich um eine Kultur säurefester, aus einer Blindschleiche isolierter Stäbchen mit einem Wachstumsoptimum bei 25 Grad C. Die experimentelle Prüfung hat diese Vakzine nicht bestanden.

Friedmann hat aus einer Wafferschilddrüse einen säurefesten Bazillus isoliert, der völlig avirulent für Warmblüter, sowohl als prophylaktischer Impfstoff, als auch als Heilmittel dienen soll. Der Friedmann'sche Impfstoff wurde in der ganzen Welt probeweise zur Anwendung gebracht, was in der Folge zu unliebsamen Polemiken geführt hat. Wir verwenden darauf unser Augenmerk nur insoweit, als diese Frage den Veterinär unmittelbar interessiert. Auch in der Veterinärmedizin liegen sehr zahlreiche Mitteilungen über Ergebnisse von Schutz- und Heilimpfungen an Tieren, namentlich an Rindern in der Praxis vor, die sich günstig sowohl, als auch ungünstig über die Erfolge äußern. Viele von ihnen fallen durch eine besondere Kritiklosigkeit auf. Kollé und Schloßberger, Bruno Lange ist es nicht gelungen, durch Einverleibung von Schilddrüsentuberkelbazillen bei Versuchstieren eine nachweisbare Resistenzhöhung zu bewirken.

Wenn ein Eingreifen in die um das Friedmann-Mittel entbrannten Streitfragen vermieden werden soll, erübrigt sich die Beurteilung des Verfahrens an der Hand offizieller Berichte. So haben Anderson und Stinson (1914) einen offiziellen Bericht des Public Health Service in Washington veröffentlicht, der ebenso wie der offizielle Bericht (1923) einer vom preussischen Landtage eingesetzten Prüfungskommission, welcher die namhaftesten deutschen Forscher angehörten, zu ungünstigen Schlüssen gelangt. Auch als Schutz- und Heilmittel gegen Geflügeltuberkulose hat der Friedmann'sche Impfstoff verfaßt (Casparius, Baumann, Sustmann).

Mit säurefesten Bazillen verschiedener Art, Timothee-, Pseudoperlsucht- und Blindschleichtuberkelbazillen versuchten Koch, Schütz, Neufeld und Mießner Ziegen zu immunisieren. Die Ergebnisse waren nicht befriedigend. Ähnliche Erfahrungen machten Moeller, Klemperer, Dieudonné, Weber und Titze, Bataillon und Terre, sowie Lindner.

Vallée und Guinard, F. Meyer verwendeten mit antituberkulösem Serum sensibilisierte Tuberkelbazillen. Beobachtet wurde eine stark herabgeminderte Toxizität der Bazillen und eine Resistenzhöhung bei den geimpften Tieren.

Zu gedenken wäre des weiteren der Arbeiten von Arloing (Vater und Sohn) mit humanen Tuberkelbazillen in homogenen Kulturen zur Immunisierung von Rindern. Die Züchtung der Bazillen erfolgte in der Tiefe flüssiger Nährmedien unter andauerndem Schütteln, wobei sich

eine besondere fixe Virulenz ergab, die ohne besondere Gefahr eine Verwendung derartiger Kulturen als Impfstoff ermöglichte. Die Beurteilung des Effektes der zweimaligen intravenösen Impfung ist nicht möglich, da es an systematischen Untersuchungen hierüber mangelt. In Anlehnung an die Arloing'schen Versuche ist O. Schreiber zu einem Impfstoffe gegen Tuberkulose gelangt, „Katebin“, aus Bazillen vom Typus gallinaceus für Geflügel, aus bovinen Bazillen für Rinder hergestellt. Die Tuberkelbazillen sind lebend, verursachen aber weder an der Impfstelle, noch im Wege von Metastasen tuberkulöse Herde. Nach Schreibers Angaben müßte die bei Laboratoriumstieren durch Katebinimpfung zustandgekommene Immunität gegenüber einer virulenten Infektion eine hohe sein. Die Nachprüfung des Impfstoffes ist zur Zeit im Gange.

Mit einem Tuberkelbazillens Stamm equinen Ursprunges experimentierte Vallée. Um ihn unzugänglicher für die Leukozyten zu machen, emulgierte er die Bazillen in Vaselinöl, in dem Talk oder Porphyriandstein suspendiert war. Versuche in der Praxis, die erfolgverheißenden Vorversuchen folgten, enttäuschten.

Auch Calmette und Guérin waren auf ähnliche Art bestrebt, die zu injizierenden Tuberkelbazillen vor der Zerstörung durch Körperzellen zu schützen. Sie ließen nämlich die Bazillen durch Vakuumwirkung in die Poren kleiner Bimsteinperlen einfangen, die mittels eines eigenen Troikarts in der Subkutis der Impfinge deponiert wurden. Wie sich alsbald zeigte, waren auch diese Bemühungen erfolglos.

Die Reihe vergeblicher Immunisierungsversuche gegen Tuberkulose wäre nicht vollständig, wenn nicht auch noch der eigenartigen Arbeiten von J. Ferran in Barcelona gedacht würde. Aufgebaut auf der Hypothese, daß der Tuberkelbazillus durch Mutation aus einem Coliähnlichen, nicht säurefesten Saprophyten des Intestinaltraktes entsteht, den er „Alphabakterium“ benannt hat, gelangt er zu einem „Antialphavakzin“. Schuldig geblieben ist J. Ferran bisher den experimentellen Beweis für die Richtigkeit seiner Theorie und für das Immunisierungsvermögen dieses Bakteriums gegenüber einer künstlich oder spontan hervorgerufenen tuberkulösen Infektion.

VI.

Damit bin ich mit meinen Ausführungen soweit gekommen, daß ich mich einer gegenwärtig hochaktuellen Frage, der Schutzimpfung der Neugeborenen gegen Tuberkulose mit BCG nach Calmette-Guérin zuwenden kann. Auf diese Immunisierungsmethode sind derzeit einerseits große Hoffnungen gesetzt, andererseits mangelt es diesbezüglich nicht an pessimistischen Auffassungen. Den augenblicklichen Stand unseres Wissens auf diesem Gebiete in Kürze darzulegen, kann nicht unterlassen werden, womit die Besprechung der aktiven Immunisierungsmethoden in diesem Referate zum Abschlusse gelangt.

In einer großen Reihe von Arbeiten haben Calmette, Guérin, Boquet und Nègre den Entwicklungsgang und die Ergebnisse langjähriger Versuche mitgeteilt, die auf eine wirkliche Prophylaxe gegen die Infektion mit Tuberkulose abzielen. Sie bedienten sich für diese Zwecke der Vakzination mit einem Tuberkulosestamm vom bovinen Typus (Bacillus Calmette-Guérin, abgekürzt als BCG bezeichnet), der nach Angaben Calmettes und seiner Mitarbeiter durch 13jährige Fortzüchtung in 230 Generationen auf einem Rindergalle-Glyzerinkartoffelnährboden vollkommen apathogen und avirulent geworden ist. Von der Überzeugung ausgehend, daß die Infektion mit Tuberkelbazillen in den allermeisten Fällen bei Säuglingen zustandekommt, gelangte Calmette dazu, der Erkrankung an Tuberkulose durch Vakzination der Neugeborenen vorzubeugen, die er praktisch beim Menschen auf dem Fütterungswege, bei Tieren durch subkutane Injektion einer Emulsion des BCG bewerkstelligen will. Auch andere Arten der Einverleibung entsprechender Dosen des Stammes BCG sollen eine wirkliche Tuberkuloseimmunität bewirken, der eine Dauer von etwa 1 Jahr zugesprochen wird. Die in entsprechenden Zeitpunkten wiederholte Einverleibung des BCG-Stammes soll eine immunisierende Wirkung für die weitere Lebensdauer nach sich ziehen. Im Verlaufe eines

Jahres werden die Bazillen durch die Galle, bei weiblichen Individuen auch durch die Milch ausgeschieden. Calmette und seine Mitarbeiter verfügen nicht allein über die Ergebnisse von großangelegten Versuchen im Laboratorium, sondern sie beziehen sich in ihren Publikationen bereits auch auf ihre Beobachtungen nach Präventivimpfungen gegen Tuberkelbazillen mit dem Impfstoffe BCG, die in den letzten Jahren an tausenden von Kälbern, an Affen und bei vielen tausenden Säuglingen in Frankreich und Indochina vorgenommen worden sind und die, wie aus den diesbezüglichen Mitteilungen zu entnehmen ist, zu keinerlei üblen Vorkommnissen, wohl aber zu überraschenden Erfolgen geführt haben, insofern, als es auf diese Weise gelungen sein soll, die vakzinieren, im tuberkulösen Milieu lebenden Individuen vor einer offensichtlichen Erkrankung an Tuberkulose zu bewahren.

Die französischen Autoren sind überzeugt von der völligen Unschädlichkeit des BCG-Stammes. Das Verhalten des BCG-Bazillus im Organismus ist das eines Saprophyten, der nicht befähigt ist, seine Virulenz zu steigern, weshalb seine Ausscheidung aus dem Körper oder dessen Verstreung keinerlei Gefahr für Menschen und Tiere mit sich bringt. Die Unschädlichkeit und die supponierte hohe Wirksamkeit wären als jene unerlässlichen Eigenschaften zu bezeichnen, die ein Immunisierungsverfahren gegen Tuberkulose erst zu einem brauchbaren machen und an denen es den verschiedenen bisher zur Anwendung gekommenen Methoden gemangelt hat.

Wenn wir uns den Ergebnissen der verschiedenen Nachprüfungen zuwenden, so wäre zunächst die Frage der Unschädlichkeit des BCG aufzuwerfen.

Schon im Jahre 1925 haben R. Kraus und ich gleichzeitig und unabhängig voneinander die Biologie des Stammes BCG studiert. Es mußte besonders interessieren, ob dieser Stamm tatsächlich, den Angaben Calmettes entsprechend, vollkommen avirulent ist, was mit den eingangs erörterten Grundlagen der Tuberkuloseimmunität im Gegensatz zu stehen scheint.

Die an großen Reihen von Kaninchen und Meerschweinchen durchgeführten Versuche führten übereinstimmend zu der Erkenntnis, daß der Stamm BCG in höheren Dosen, intravenös oder intraperitoneal eingebracht, nach wenigen Wochen zu pathologischen Organveränderungen bei den geimpften Tieren führt, die makroskopisch als typische tuberkulöse Läsionen angesprochen werden müssen. Am häufigsten betreffen sie Netz, Leber, Milz, Lymphknoten und Lunge. Der Nachweis säurefester Stäbchen ist in diesen Herden leicht zu erbringen. Wie die histologische Untersuchung ergibt, handelt es sich um kleine Knötchen mit allen Kennzeichen typischer Tuberkel mit epitheloiden Zellen, zentraler Nekrose (Verkäsung) und Riesenzellen. In einzelnen Fällen ergab die peritoneale Verimpfung von Organbrei auf gesunde Tiere ein positives Resultat und ebenso konnten mitunter aus den vorgefundenen Läsionen der Versuchstiere die Bazillen herausgezüchtet werden.

Diese Unstimmigkeiten in den Angaben Calmettes und seiner Mitarbeiter einerseits und unseren Überprüfungsergebnissen andererseits waren Anlaß zu einer direkten Fühlungnahme mit Calmette, den wir zu überzeugen vermochten, daß es sich hier um spezifische Veränderungen mit allen Kennzeichen eines tuberkulösen Prozesses handelt. Nach Calmettes Versuchen mit längerer Beobachtungszeit mußte diesen tuberkulösen Prozessen allerdings ein benigner Charakter zu eigen sein, so zwar, daß diese zur Ausheilung kommen und nicht progredient werden.

Wie wir uns in fortgesetzten Versuchen überzeugen konnten, indem wir mit BCG auf verschiedene Weise infizierte Versuchstiere nach längerer Zeit, bis zu 1—1½ Jahren nach vorgenommener Impfung töteten, war bei keinem dieser Tiere ein makroskopisch erkennbarer tuberkulöser Prozeß nachweisbar, während die wenige Wochen

nach erfolgter Impfung getöteten Tiere der gleichen Versuchsserien noch die vorhin geschilderten Knötchen in verschiedenen Organen aufgewiesen hatten.

Hätte Calmette, wie H. Schrötter dies treffend bemerkte, seinen Stamm nicht als „absolut avirulent und nicht tuberkulogen“ bezeichnet, wären wir bei unseren Nachprüfungen nicht zu derartig abweichenden Auffassungen gelangt.

Wie unsere Untersuchungen gezeigt haben, besitzt der Stamm BCG unzweifelhaft einen geringen Virulenzgrad, der sich an Experimentaltieren erweisen läßt. Er ist wohl tuberkulogen aber nicht nosogen. Die nach Impfung von Versuchstieren mit BCG zur Wahrnehmung kommenden tuberkulösen Prozesse sind nicht progredient, vielmehr benigner Art mit Tendenz zur vollständigen Ausheilung. Wie Coulaud, Selter, Chiari gefunden haben, sind Merkmale solcher tuberkulöser Veränderungen an einzelnen Organen histologisch noch nach Monaten kenntlich, Übertragungsversuche bleiben aber ergebnislos.

Gerade dieser geringe Virulenzgrad des BCG, der Anlaß zu einer leichten tuberkulösen Erkrankung des Organismus gibt, legt den Gedanken nahe, daß von den BCG-Impfungen denn doch mehr zu erwarten sein könnte, als von einer Impfung mit vollständig abgetöteten Bazillen.

Zu ähnlichen Ergebnissen wie wir, ist in Amsterdam Schuurmanns-Steckhoven gelangt. Aus einer Anzahl von Abbildungen ist die Entstehung von typischen Tuberkeln nach Impfung mit BCG zu entnehmen. Auch dieser Autor billigt dem BCG-Stamm unter gewissen Kautelen tuberkulogene Eigenschaften zu. Rückübertragungsversuche sind ihm nicht gelungen.

Diesbezüglich umfassende Untersuchungen sind auch von Tschernowitzer durchgeführt worden, die folgendes ergaben: Entstehung regressiver tuberkulöser Prozesse nach BCG-Impfung, Unmöglichkeit einer Virulenzsteigerung des Stammes durch Passagen, Rückübertragung gelingt nicht.

Ganz ähnlich äußern sich Korschun und seine Mitarbeiter. Sie konstatieren einen bestimmten Grad von Virulenz des BCG.

Von Remlinger und Baily sind nach subkutanen Impfungen mit sehr hohen Dosen des BCG nur lokale Veränderungen vermerkt worden.

Die von Selter und Blumberg angestellten Studien decken sich in ihren Ergebnissen weitgehend mit jenen von Kraus und mir. Ebenso auch die von B. Lange und Lydtin in diesem Gegenstande mitgeteilten Befunde.

S. A. Petroff hat auf Gentianaviolett Nährböden zweierlei Kolonietypen des BCG festgestellt, von denen er die rauhen, unregelmäßigen und trockenen, dem gewöhnlichen Kolonietypus der Tuberkulose entsprechenden, als R-Kolonien bezeichnet, die nicht virulent für Meerschweinchen sind und außerdem runde, glattrandige, glänzende Kolonien, S-Kolonien benannt, die er virulent für das Meerschweinchen findet.

Nur Nobel, Chiari und Solé treten auf Grund ihrer Versuchsergebnisse, entgegen der übereinstimmenden Beurteilung, die dem Stamme BCG hinsichtlich seiner Unschädlichkeit zuteil wird, für eine Pathogenität und Gefährlichkeit ein. Obwohl Calmette und B. Lange und Lydtin diese Ausführungen zu entkräften bemüht waren, haben Nobel, Chiari und Solé erst kürzlich wieder in der Wiener Gesellschaft der Ärzte und in der Wiener klinischen Wochenschrift ihre warnende Stimme erhoben. Darauf kann nur erwidert werden, daß die genannten Autoren die pathologischen Veränderungen, die sich nach Impfung mit BCG unter gewissen Umständen ergeben können, reichlich spät aufzeigen, da dieselben seit 1925 nicht nur uns, sondern auch allen andern Nachprüfern wohlbekannt sind und mehrfach demonstriert wurden. Wir haben uns auch schon längst, seit 1926, dazu bekannt, daß wir es da-

bei mit ausgesprochen benignen Prozessen zu tun haben. Meines Erachtens ist es hoch an der Zeit, nachdem die Unschädlichkeit des BCG als feststehend gelten kann, sich in dieser Hinsicht endlich von Laboratoriumsexperimenten zu emanzipieren und den Schritt in die Veterinärpraxis unter gewissen strengen Bedingungen zu wagen, wie es unter andern auch ich bereits getan habe. Es scheint mir überhaupt, daß die endgiltige Lösung einer Reihe von Fragen in Bezug auf die BCG-Impfungen der Veterinärmedizin vorbehalten bleiben dürften.

Von außerordentlicher Wichtigkeit ist die Entscheidung der Frage, ob eventuell eine Virulenzsteigerung des BCG-Stammes zu gewärtigen ist, wie dies E. Löwenstein, Nobel, Heymans in den Bereich der Möglichkeit stellen. Diesfällige Versuche von Calmette, Ascoli und eigene unveröffentlichte, die ich bei Meerfischweinen, Kaninchen, Ziegen, Affen und beim Pferd vorgenommen habe, sprechen dafür, daß der Stamm BCG, auch wenn er durch viele Monate im Organismus der verschiedensten Tierarten verweilt und mehrfache Passagen durchmacht, niemals eine Steigerung seiner Virulenz erfährt.

R. Kraus hat daher unter Berücksichtigung der Gesamtheit dieser Versuchsergebnisse der Meinung Ausdruck gegeben, daß es sich beim BCG-Stamm ebenso wie beim Virus fixe der Lyssa, bei Variolavakzine und Milzbrandimpfstoffen um eine Dauermodifikation des Virus, also um ein Virus fixe handelt und daß der Stamm BCG als ein Vakzin im Sinne Pasteurs aufzufassen ist.

Wir wollen nun sehen, wie es sich mit einer Immunität nach BCG-Impfung verhält. Eine Immunitätsprüfung bei den mit BCG vorbehandelten Tieren, die von verschiedenen Untersuchern und in verschiedener Weise vorgenommen wurde, hat beachtenswerte Ergebnisse gezeigt.

An erster Stelle wären die vielen bei mit BCG vorbehandelten Laboratoriumstieren und Jungrindern in wiederholten Versuchsreihen angestellten Infektionsversuche von Calmette, Guérin und ihrer Mitarbeiter zu nennen, die unter wechselnden Bedingungen durchgeführt und zwar sowohl durch künstliche Infektion als auch im Kontaktversuch auf den Nachweis einer Immunität abzielten, die aber aus mehreren Gründen eine Beurteilung des praktischen Wertes des Verfahrens nicht ermöglichen. Hingegen berichten Calmette und Guérin über vielversprechende Ergebnisse ihrer seit 1921 im Gange befindlichen Immunisierungsversuche mit BCG in mit Tuberkulose verseuchten Stallungen bzw. Rinderherden, denen bereits viele tausende Stück Jungvieh unterworfen wurden. Die Beurteilung der Ergebnisse dieser großangelegten Versuche lautet günstig, sie erfährt jedoch eine Einschränkung in gewissem Sinne, insofern nämlich, als Guérin nun die Forderung aufstellt, daß die neugeborenen Kälber in infizierten Beständen für die Dauer der ersten vier Lebenswochen sofort zu isolieren und mit tuberkulosefreier Milch zu ernähren sind, da der durch BCG verliehene Impfschutz so wie jede aktive Immunität einen bestimmten Zeitraum bis zu seiner Etablierung erfordert. Guérin konnte zeigen, daß der durch BCG ausgelöste Impfschutz 14 Tage nach erfolgter Schutzimpfung noch unvollständig und erst etwa am 20. Tage vollständig ist. Die systematische Einhaltung derartiger prophylaktischer Maßnahmen wird gewiß oftmals möglich sein, ob aber überall und immer erscheint mir zweifelhaft.

Nachdem A. Ascoli in Mailand bei Ziegen und Kälbern gelungene Immunisierungsversuche mit BCG gegen Reinfektion mit virulenten Bazillen aufzuweisen hatte, ging auch er zu einer groß angelegten Prüfung der Methode in der Praxis in verschiedenen Provinzen Italiens über. Die bisherigen Mitteilungen über den Verlauf dieser an mehreren tausend Kälbern vorgenommenen Versuche lauten überaus günstig. Ascoli hat bei den schutzgeimpften Kälbern nie einen Todesfall an Tuberkulose oder klinische

Symptome einer tuberkulösen Erkrankung beobachtet, ebensowenig fand er gelegentlich von Autopsien solcher Kälber, die verendet waren oder geschlachtet wurden, irgendwelche tuberkulöse Veränderungen.

In ähnlicher Weise wurde, wie ich mich persönlich überzeugt habe, vom Institute Nacional de Hygiene de Alfonso XIII. in Madrid eine Erprobung der BCG-Impfung bei neugeborenen Kälbern in Spanien in großem Umfange aufgenommen.

Im zweiten Jahre meiner eigenen Immunisierungsversuche an Kälbern, die sowohl auf dem Fütterungs- als auch peroralen Wege vor sich gingen, ist seit Anfang 1928 über meinen Antrag nun auch in Österreich die Prüfung des Wertes der BCG-Impfung in der Veterinärpraxis im Gange. Das zweite Hundert so schutzgeimpfter Kälber ist bereits erreicht. In die Versuche sind ungeimpfte Kontrollkälber einbezogen. Der Erfolg ist natürlicher Weise vorerhand unmöglich zu beurteilen. Als feststehend ist nur zu verzeichnen, daß die Impflinge die Vakzination anstandslos vertragen und sich sehr gut entwickeln. Diese beiden schon in Vorversuchen an Kälbern ermittelten Umstände im Verein mit der von mir erlangten Überzeugung von der Inoffensivität des Impfstoffes veranlaßten das österreichische Landwirtschaftsministerium, die praktische Erprobung des Verhaltens in stark mit Tuberkulose verseuchten Rinderbeständen unter Kontrolle des Mödlinger Institutes gutzuheißen, um so allmählich aus Eigenem ein Urteil über die Brauchbarkeit der Impfung nach Calmette-Guérin zu erlangen.

Daß durch die Vorbehandlung des tierischen Organismus mit BCG tatsächlich ein gewisser Grad von Immunität gegen experimentelle und natürliche Infektion erzeugt wird, zeigen außer den schon aufgezählten, neuere Immunisierungsversuche verschiedener Forscher. So berichtet Tschschnowitzer, daß stomachal-subkutan geimpfte Kaninchen und Rinder gegen eine virulente Infektion resistent sind. Korschun zeigte, daß Meerfischweinen durch die parenterale Einverleibung des BCG in Mengen von $\frac{1}{10}$ —5 mg gegen eine Reinfektion mit virulentem Material geschützt werden können. Besonders instruktiv sind Immunitätsstudien nach BCG-Impfung, die Selter ausgeführt hat: Meerfischweinen, auf einer Seite subkutan mit BCG vorbehandelt, wurden nach ca. 6 Wochen auf der anderen Bauchseite ebenfalls mit $\frac{1}{1000}$ mg virulenter Tuberkelbazillen injiziert. Die nach 150 Tagen getöteten Tiere zeigten an der Seite, an der die virulente Infektion vorgenommen worden war, bohngroße Kniefaltendrüsen, die verkäst, verkreidet oder vernarbt erschienen, bei den unvorbehandelten Kontrolltieren hingegen war es neben den stark tuberkulös veränderten Drüsen auch zu einer Generalisation des Krankheitsprozesses in den inneren Organen gekommen. Nach Selter vermag demnach die BCG-Impfung die Generalisation nach künstlicher Infektion hintanzuhalten. Von Lange und Lydtin ist eine quantitative und zeitlich begrenzte Resistenzerhöhung gegen Infektion mit virulenten Bazillen festgestellt worden und zwar war dieser Impfschutz offensichtlich wirksamer nach peroraler Einverleibung als nach stomachaler. Die Frage der Immunität nach BCG-Impfung habe ich ferner selbst in Laboratoriumsversuchen von verschiedenen Gesichtspunkten aus geprüft und gefunden, daß eine perorale Immunisierung bei Meerfischweinen und Kaninchen unter gewissen Kautelen in unverkennbarem Maße eine Immunität nach sich zieht, insofern als die vakzinierten Versuchstiere im Gegensatz zu ungeimpften Kontrollen auf die virulente Infektion, selbst in massiven Dosen, entweder nicht reagieren oder erst viel später und in ungleich geringerem Grade tuberkulöse Veränderungen aufweisen.

Ein spezielles Interesse beanspruchen die von Wilbert an 15 Schimpansen und 59 Pitheciassaffen im Pasteurinstitute von Kindia (Guinea) unter schweren Bedingungen ausge-

führten Impfversuche mit BCG. Die Schutzgeimpften Affen wurden einer andauernden natürlichen Infektion dadurch ausgesetzt, daß sie mit offen tuberkulösen Affen zusammengeperrt gehalten wurden. Wilbert konstatiert zunächst die absolute Unschädlichkeit des BCG und äußert sich dahin, daß Schimpansen und Pitheciassaffen aller Altersstufen leicht mittels einer einzigen subkutanen Inokulation von 50 mg BCG ebenso auch durch 5 Fütterungen à 5 mg in Intervallen von 8—10 Tagen gegen eine tuberkulöse Spontaninfektion auf die Dauer eines Jahres geschützt werden können. Dieser Schutz kann verlängert werden durch weitere subkutane Impfung oder jährlich wiederholte stomachale Verabreichung von BCG. Beide Arten der Einverleibung alterieren den Gesundheitszustand nicht.

Zu nennen sind außerdem noch die neueren Laboratoriumsversuche eines Immunitätsnachweises nach BCG-Impfung seitens der japanischen Forscher Imamura und Takahashi und von Sataku, welche den Angaben Calmettes und Guérins über die immunisierende Wirkung des BCG zur Stütze dienen.

R. Harnach ist es durch subkutane und intramuskuläre Impfung mit einem BCG-Stamm vom aviären Typus in Dosen von 0,5 Gramm gelungen, Geflügel gegen tuberkulöse Infektion zu schützen, die sowohl vom Verdauungstrakt aus, als auch unter natürlichen Verhältnissen erfolgten.

In Gemeinschaft mit R. Kraus habe ich weitere Versuche unternommen, die Immunität nach BCG-Impfung ad oculos zu demonstrieren. Dabei sind wir so vorgegangen, daß wir Affen (*Macacus rhesus*) zunächst mit je 30 bis 50 mg des BCG-Stammes subkutan geimpft haben. Nach verschieden langer Zeit wurden dann die Tiere mit virulenten Tuberkelbazillen des bovinen und humanen Typus in abgestuften Dosen intrakutan in der Gegend einer Augenbraue infiziert. Die Kontrollversuche an unvorbehandelten Affen zeigen, daß eine derartige Infektion zu einer lokalen Entzündung und späterhin zu Geschwürbildung und Progredienz des tuberkulösen Prozesses führt. Bei den mit BCG vorbehandelten Affen entwickelte sich an der Stelle der Infektion mit hochvirulenten Bazillen bloß ein kleines derbes Infiltrat in der Haut von etwa Linsengröße, aber ohne jede Neigung zu Exulzeration und Fortschreiten des Prozesses. Die mit BCG vorbehandelten Affen haben demnach eine Immunität erlangt gegenüber einer künstlichen Infektion mit solchen Mengen virulenter Tuberkelbazillen, die bei den Kontrollaffen ausnahmslos zu schweren tuberkulösen Veränderungen geführt haben, wie bei den Autopsien festgestellt werden konnte.

Gegen eine Anwendung des BCG in der Praxis hat sich E. Löwenstein ausgesprochen, der darin einen heroischen Versuch von großer Verantwortung erblickt.

A. Eber gibt der Meinung Ausdruck, daß bis nun keine ausreichenden Beobachtungen vorliegen, die uns zu der Überzeugung berechtigen würden, daß der Impfstoff BCG Rindern eine erhöhte Schutzwirkung gegenüber der späteren enzootischen Stallinfektion verleiht und daß solche Schutzimpfungen für ältere, in voller Milchleistung stehende Rinder absolut harmlos sind. Eber bezweifelt es, daß der Impfstoff BCG in der Zukunft eine Rolle bei der Bekämpfung der Rindertuberkulose zu spielen berufen sein wird. Eine jährlich zu wiederholende Vakzination aller tuberkulosegefährdeten Rinder bezeichnet er als praktisch undurchführbar und wirtschaftlich untragbar.

Zur Vervollständigung der Beurteilung, welche dem immunisierenden Effekt der BCG-Impfung zuteil geworden ist, sei aber auch noch der Versuche von Nobel gedacht, die er gemeinsam mit Chiari und Solé angestellt hat, umfomehr als dieselben bisher noch von keiner Seite einer Kritik unterzogen wurden. Diese Autoren gelangen zu der Meinung, daß es nicht gelingt, durch intraabdominale Vorbehandlung mit BCG einen wirklichen Schutz gegen

eine nachträgliche Infektion mit virulenten Tuberkelbazillen zu erzeugen. Die Erklärung für dieses den sonstigen Überprüfungen entgegengesetzte Ergebnis liegt aber darin, daß in ihrer Versuchsanordnung fundamentale Fehler begangen wurden. Nobel bediente sich nämlich für die Infektion der mit BCG vorbehandelten Meerfischweinchens eines **virulenten Tuberkulosestammes** von nicht näher bestimmter und daher **unbekannter Virulenz** und die von ihm gewählten **Infektionsdosen** wurden exorbitant hoch, mit 1,2 bzw. 5 mg der virulenten Kultur bemessen. Es erscheint deshalb abnormals der Hinweis darauf angebracht, daß das Meerfischweinchens als eines der empfänglichsten Versuchstiere für Tuberkulose gilt und daß für das Zustandekommen einer tödlichen Infektion nach Findel rund 100, nach Reichenbach bloß 8 Tuberkelbazillen, nach Selter unter Umständen schon ein einziger Bazillus ausreicht und daß Immunitätsprüfungen ohne quantitatives Arbeiten ein Unding sind, höchstens dazu angetan, Verwirrung anzurichten. Wenn daher trotz einer so monströsen Dosierung, wie in den Versuchen von Nobel die Lebensdauer der geimpften und infizierten Tiere mit Ausnahme eines einzigen doch noch eine längere war, als jene der Kontrolltiere, so muß dies immerhin auch als Ausdruck eines Immunitätsgrades angesehen werden, entgegen der mißverständlichen Auslegung Nobels.

Im gegenwärtigen Zeitpunkt wäre es müßig, den Wert oder Unwert der BCG-Impfungen für die Praxis ohne Voreingenommenheit endgiltig beurteilen zu wollen. Darüber müssen erst noch weitere Immunisierungsversuche in tuberkulösen Rinderbeständen Klarheit bringen, von denen zu wünschen wäre, daß sie in möglichst ausgedehntem Maße seitens der verschiedenen Forschungsinstitute zur Ausführung kommen. Um zu einer abschließenden Kritik zu gelangen, ist wie bei jedem Tuberkulosebekämpfungsverfahren ein Zeitraum von mehreren Jahren erforderlich. Vor dem Bekanntwerden der Ergebnisse derartig umfangreicher und langdauernder Nachprüfungen unter autoritativer Leitung kann daher eine allgemeine Freigabe des Verfahrens für die Zwecke der Praxis nicht gutgeheißen werden.

Eines darf aber nicht außer Acht gelassen werden bei der Beurteilung der Frage, ob ein Tuberkulosechutzimpfungsverfahren erfolgreich ist oder nicht: Daß wir nämlich keine Schutzimpfungsmethode und sei es die wirksamste, gegen irgendeine virulente Infektion kennen, die nicht in einem gewissen Prozentsatz versagt. Es wird daher auch einem noch so vorzüglichen Schutzimpfungsverfahren gegen Tuberkulose niemals eine Sicherheit von 100 Prozent innezuwohnen können. Vor allem wird hier an etwaige intrauterin zustandgekommene Infektionen zu denken sein und an die massivsten Infektionen, zumal wenn dieselben in den allerersten Lebenswochen erfolgen. Ein minimaler Prozentsatz von Mißerfolgen wird uns daher nicht ohne weiteres zu einer vernichtenden Kritik berechtigen.

Damit ist in den hauptsächlichsten Zügen die aktive Immunität bei Tuberkulose besprochen worden und zwar vorwiegend unter Bedachtnahme auf die Möglichkeit ihrer Auswirkung auf die Tuberkuloseverhütung.

VII.

Abschließend sei es mir nun noch gestattet, mit wenigen Worten auch bei der passiven Immunität gegen Tuberkulose zu verweilen, der sich zeitweilig ein besonderes Interesse zuwendete, in der Erwartung, daß es doch gelingen dürfte, mittels eines wirksamen Tuberkuloseferums zumindest einen Stillstand weit fortgeschrittener und eine Heilung leichter Krankheitsfälle herbeizuführen.

Die Anwendung von Normalferum, früher namentlich von solchen Tieren gewonnen, denen man unzutreffender Weise eine gewisse angeborene Resistenz gegen die Erkrankung zubilligte (Hunde, Ziegen), versagte vollends. Eine große Zahl von Forschern mühte sich späterhin vergeblich, wirksame **Hochimmunsera** gegen Tuberkulose bei

verschiedenen Tierarten zu gewinnen, von denen nur die allerwichtigsten erwähnt werden sollen.

Maragliano dienten für die Gewinnung seines Tuberkuloseferums Pferde, Rinder und Kälber, die er subkutan und intravenös mit Kulturfiltraten und Bazillensextrakten behandelte. Marmorek erzeugte ein antitoxisches Tuberkuloseferum, das Meerfischweinen gegen Infektion mit Bazillenaufschwemmungen zu schützen vermochte. Hier ist ferner das Tuberkuloseferum von Vallée anzuführen, durch intravenöse Injektionen schwach virulenter Bazillen beim Pferd hergestellt. Das von Ruppel und Rickmann von Rindern und Eseln gewonnene Immunserum zeigte die Eigenschaft, bei intraperitonealer Injektion eine Phagozytose anzuregen. Bruschettini verwendete für die Behandlung tuberkulöser Personen in Italien und London eine Serum-Vakzine. Wenn nun noch das von Uhlenhuth bei Eseln gewonnene Serum angeführt wird, mit dem es ihm nicht gelungen ist, in Tierversuchen Erfolge zu erzielen, so mag damit die Aufzählung beendet sein.

Die Erfahrungen, die mit der passiven Immunisierung

bei Tuberkulose, mit der Anwendung von Tuberkuloseferis gemacht wurden, lassen sich einheitlich dahin beurteilen, daß wir hierin über das Stadium der Vorversuche noch nicht herausgekommen sind und daß wir nicht einmal noch theoretisch zu entscheiden vermögen, ob von der passiven Immunisierung überhaupt nennenswerte Erfolge erwartet werden dürfen. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkte hat kein Serum, weder von normalen noch von immunisierten Tieren eine tuberkulöse Infektion überzeugend günstig zu beeinflussen vermocht.

An den Schluß meines Sammelreferates stelle ich die Erkenntnis, daß wir in Bezug auf die Immunität bei Tuberkulose wohl über einige fundamentale Entdeckungen verfügen, daß sich aber, um dieselben in die Praxis umzusetzen und sie nutzbringend auswirken zu lassen, noch so gut wie alles zu tun erübrigt. Obwohl in den letzten Jahrzehnten so viele Bemühungen für diese Zwecke aufgewendet worden sind, denen der Erfolg verlagert blieb und deren Ergebnis vielfach nur Enttäuschungen waren, soll und darf das Ringen um neue Erkenntnisse, die in das hier noch waltende Dunkel hereinleuchten, nicht erlahmen.

Innere Medizin und Chirurgie.

Lendle, L.: Experimentelle Untersuchungen über die Dosierung und die Elimination des Avertins. (Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Leipzig.) (Narkose und Anästhesie 1928, I. Jahrg., H. 5, S. 237—258.)

Die Rektalnarkose mit Avertin hat von klinischer und auch von pharmakologischer Seite mehrfach Ablehnungen gefunden, obgleich die mehr als 4000 Avertinnarkosen die praktische Verwendungsmöglichkeit dieser Rektalnarkosen erkennen lassen. Der prinzipielle Nachteil mittels einer einmal applizierten Dosis ist bekanntlich der, daß sie „steuerlos“ ist. Im Gegensatz zu ihr ist die Inhalationsnarkose „steuerbar“, weil auf der großen Lungenoberfläche eine Mehraufnahme und Ausscheidung des Narkotikums schnell zu erreichen und somit die Narkose leicht zu dosieren ist.

Dosierung und Entgiftung sind somit die schwachen Stellen des neuen Narkoseverfahrens. Der Verf. ist der Frage nachgegangen, ob durch eine besondere Dosierungsart, nämlich durch eine fraktionierte Applikation sich Veränderungen für Narkosebreite und für Narkosedauer ergeben. Er hat ferner festzustellen versucht, ob sich pharmakologisch die Elimination, worunter die Entgiftung und die Ausscheidung zu verstehen ist, gemessen an der Erholungszeit der Narkose, beeinflussen läßt. Es ergab sich, daß die fraktionierte Dosierung des Avertins (intraperitoneale Injektion an Ratten) eine Abnahme der Wirkungsstärke, bei gleichwirksamer Dosierung eine Verlängerung der Narkosedauer, aber keine Veränderung der Narkosebreite bewirkt. Nach intraperitonealer Injektion betrug die mittlere Erholungszeit (10 Prozent unterletale Dosis) 172 Minuten, nach einer 20 Proz. unterletalen Dosis 137 Minuten. Nüchtern gehaltene Ratten zeigen eine verlängerte Erholungszeit. Gegen die Anwendung der üblichen Analeptika in der Avertinnarkose besteht keine Kontraindikation. Sie haben aber keinen besonderen Einfluß auf die Avertin-Elimination, nur Lobelin und Cardiazol beschleunigen die Erholung aus der Narkose. Insulin-Vor- und Nachbehandlung beeinflußt die Erholungszeit nicht, dagegen eliminieren Tiere, die unter dem Einfluß von Thyroxin stehen, das Avertin schneller als normale Tiere. R. Völker.

Ist ein reichlicher Befall an Darmtrichinen gegeben, so wird der Darminhalt und die oberste Schicht der Darm Schleimhaut leicht abgestrichen und in ein zylindrisches Gläschen gegeben. Alsdann wäscht man durch Zusatz von physiologischer Kochsalzlösung die Trichinen aus, indem man kräftig schüttelt. Hierauf zentrifugiert man, schwemmt das Zentrifugat wieder mit NaCl-Lösung auf und wiederholt diesen Vorgang drei- bis viermal. Dadurch werden die Trichinen von den ihnen anhaftenden Darmepithelien und Schleimpartikelchen befreit.

Nun folgt die Färbung mit Karmalaun nach P. Mayer, welches man 24 Stunden einwirken läßt. Dieses setzt sich zusammen aus:

Kaliaun	10,0	Acid. salicyl.	0,2
Karmisinsäure	1,0	Formaldehyd	1,0
Aqua dest. 200,0			

Eine eigene Fixation ist nicht notwendig, da diese durch das im Karmalaun enthaltene Formaldehyd bewirkt wird.

Nach dem Abzentrifugieren der Farblösung benutzt man zur Differenzierung eine 1prozentige Alaunlösung, die jedoch nicht länger als eine Minute einwirken soll. Das Zentrifugat versetzt man hierauf mit reichlich Brunnenwasser und läßt die Trichinen darin einige Stunden weiter differenzieren. Die als kleinste rote Fasern sich erweisenden Trichinen können nun mit einer Öse einzeln aus der Flüssigkeit genommen und in Glycerin-Gelatine eingebettet werden. Es empfiehlt sich, noch die Deckgläser mit Asphaltlack zu umranden.

Die auf diese Weise hergestellten Präparate sind jahrelang haltbar und durch ihre unwesentlichen Veränderungen, welche sie bei der Fixation und Färbung erleiden, sehr wohl zu morphologischen und histologischen Studien geeignet.

Acht Literaturangaben sind der Arbeit angefügt.

Edelmann.

Baudet, E. A. R. F.: Trichostrongylose bei Kälbern. (Mit 4 Abbildungen.) (Tijdschr. v. Diergeneesk. 1928, S. 115—120.)

In einem Bestande, in dem bereits ein Kalb gestorben war, magerten die Kälber ab, husteten und einzelne hatten Diarrhöe. Im Sputum wurden Lungenwurmeier nachgewiesen, und deswegen wurden die Tiere intratracheal behandelt. Die Diarrhöe verschwand hierauf, aber ein Kalb bekam etwa 10 Tage später doch wieder Durchfall und starb. Bei der Sektion wurden neben einer großen Menge Lungenwurmeiern unregelmäßige Rötung der Bronchialschleimhaut, Schwellung, Rötung und körnige Beschaffenheit der Labmagen Schleimhaut, dünner, etwas schleimiger Mageninhalt sowie heftige Darmstrongylose festgestellt. Es fanden sich auf der etwas geschwollenen und etwas zu roten Darm Schleimhaut zahlreiche kleine Nematoden, die zur Familie der Trichostrongylen, und zwar zum Geschlecht Cooperia gehörten. Es handelte sich um Cooperia oncophora.

Ihr Kopf ist 30—35 μ breit. Hinter dem Kopf verbreitert sich die Kutikula bis auf eine Länge von 90—122 μ (Fig. 1 o. c.). Die Quer-

Patholog. Anatomie und Parasitologie.

Sedlmeier, H.: Beitrag zur mikroskopischen Darstellung der Darmtrichinen. (Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 39. Jahrg., S. 9 und 10.) (Mit 1 Abbildung.)

Zur Darstellung der Darmtrichinen hat Sedlmeier folgendes Verfahren bearbeitet und erprobt:

streifung dieses verbreiterten Kopfteles war nicht an allen Exemplaren deutlich zu sehen und reichte nicht bei allen bis an die Grenze des verbreiterten kutikulären Teiles, sondern hörte in dessen Mitte auf (Fig. 1 o. c.). Ösophagus 300—384 μ lang, im kaudalen Teil 35—38 μ breit. An der Grenze des zweiten und des letzten dritten Teiles liegt der Nervenring (Fig. 1 z. r.). Der Ösophagus geht mit einer Verbreiterung in den Darm (d) über.

Das Weibchen ist 6—10 mm lang. An beiden Uteri befindet sich am distalen Ende ein muskulöser Teil, die Ovejektoren. Sie liegen an beiden Seiten der Vulva, die etwa 2—2½ mm vom Körperende entfernt ist und deutliche mehr oder weniger austülpbare Lippen trägt (Fig. 4 o.). Die Ovejektoren bestehen aus drei scharf von einander getrennten Teilen. Ein zylindrischer, meistens etwas kugelförmig ausgedehnter Teil trifft in der Höhe der Vulva mit dem der anderen Seite zusammen (Fig. 4 O. 1). Darauf folgt ein kurzer mehr kegelförmiger Ovejektor (Fig. 4 O. 2), dessen Wand muskulös ist, und an ihn schließt sich der dritte Ovejektor, der mit einer Verbreiterung in den Uterus übergeht (O. 3). In der Höhe der Vulva, wo der Körper außerdem verbreitert ist (Fig. 4 o.), zeigt der Wurm eine knieförmige Biegung. Dadurch ist das Weibchen bereits mit bloßem Auge vom Männchen zu unterscheiden. Im Uterus und in den Ovejektoren liegen zahlreiche Eier (Fig. 4 e.). Beide gemeinschaftliche Ovejektoren sind etwa 800—900 μ lang. Die Eier in den Ovejektoren sind 52—70 μ lang und 30—32 μ breit. Sie können aber nach anderen Autoren auch 60—72 μ lang und 30—38 μ breit sein. Bei den älteren Weibchen und in den Eiern bereits Teilungsformen zu sehen (Fig. 4). Die Entfernung vom Anus bis zum Ende des Körpers beträgt 150—175 μ . Das Männchen ist 6—11 mm lang. Die Bursa wird




Fig. 1. Kopfteil der Cooperia. Verbreiterte Kutikula, v. c.; die Querstreifung läuft bis zur Mitte dieses verbreiterten Teiles. Ösophagus, oes. Nervenring, z. r. Darm, d.

Fig. 2 Männchen. Ventroventrale Rippe, v. o.; lateroventrale Rippe, l. v.; externolaterale Rippe, e. l.; mediolaterale Rippe, m. l.; posterolaterale Rippe, p. l.; dorsale Rippe, d.; externodorsale Rippe, e. d.; kleiner Vor sprung, k. u.; seitlicher Vor sprung, z. u.; Genitalkonus, g. c.; Spikulum, sp.; Spikulümäckchen, sp. z.

durch lange Rippen gestützt. Die ventroventrale Rippe (Fig. 2 o. o.) ist dünn und kürzer als die übrigen. Auf der Zeichnung ist, um die Rippen deutlich hervortreten zu lassen, die sonst glockenförmig zusammengefaltete Bursa weit ausgebreitet. Die lateroventrale Rippe (l. o.) ist viel stärker gebaut und länger als die ventroventrale. Beide ventralen Rippen am Ende stark gebogen. Die größte Rippe ist die externolaterale (e. l.), die aus demselben Stamm wie die beiden ventralen ent-

steht. Die mediolateralen und posterolateralen Rippen (m. l. und p. l.) sind wieder viel schwächer und entspringen aus dem Körper des Wurmes. Die verschiedenen dorsalen Rippen sind dünn und lang und entspringen aus einem gemeinschaftlichen Stamm. Die dorsale Rippe entspringt hoch am dorsalen Körperende (Fig. 3 d.) und teilt sich am Ende in zwei. Jeder Ast davon spaltet sich noch einmal (Fig. 2 und 3 d.).



Fig. 3. Wurm in Seitenlage; dorsale Rippen, d. Die externodorsalen Rippen sind auf dieser Figur nicht gezeichnet. Die übrigen Rippen sind nicht deutlich besonders zu sehen.




Fig. 4. Weibchen. Knieförmig gebogener Teil; Uterus, Ut.; Darm, d.; Ovejektor 1, 2 und 3; o. 1, o. 2, o. 3; Ei, e.; Vulva, v.

Die von dieser Rippe entspringenden externodorsalen Rippen (Fig. 2 e. d.) sind symmetrisch und umschließen die dorsale Rippe bogenförmig. In Fig. 3 ist allein die dorsale Rippe gezeichnet, die externodorsalen Rippen sind weggelassen worden. Der Parasit liegt auf der Seitenfläche. Die richtige Stellung der übrigen Rippen ist da in dieser Figur nicht zu sehen, sie sind durch einander gezeichnet. Der Genitalkonus, mit dem der Körper endet (Fig. 2 g. c.) ragt deutlich hervor und ist mit zwei knopförmigen Vor sprüngen ausgestattet. Außerdem sind zwei seitliche, ziemlich lange Vor sprünge (z. u.) zu sehen. Die Spikula (Fig. 2 sp.) ist 210—300 μ lang. Sie besitzt weder Vor sprünge noch scharfe Ränder. Beide Enden sind mehr oder weniger knopförmig; das distale Ende trägt einen typischen flachen Knopf. Zwischen dem dicksten Ende der Spikula und der Körperwand liegt eine blasenförmige Höhle (Fig. 2 sp. z.), das Spi-

kulumfäckchen. Durch den typischen und von einander abweichenden Bau der Spikula kann man die verschiedenen Trichostromyiden von einander unterscheiden. Baß.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Pallaske, G.: Untersuchungen über den Nachweis von Präzipitinen in Eihäuten und Organen von Feten beim infektiösen Abortus (Bang) beim Rinde. (Aus d. Forschungsabteilung [Leiter: Prof. Dr. Ziegler] der Staatl. Veterinärpolizeiuntersuchungsanstalt zu Dresden [Oberleitung: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Edelmann].) (Zschr. für Inf.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 1/3, S. 179.)

Pallaske stellte Untersuchungen an über die Möglichkeit, das Präzipitationsverfahren mit Eihautextrakten als Hilfsmittel zur Diagnose des infektiösen Abortus der Rinder heranzuziehen. In der Zusammenfassung seiner Ergebnisse stellt der Verf. fest, daß die Abort-Organ- und Eihautpräzipitation anscheinend eine spezifische Reaktion darstellt. Was den diagnostischen Wert dieser Reaktion anlangt, so deuten die Untersuchungsergebnisse, soweit aus den relativ wenigen Fällen ein Schluß gezogen werden kann, darauf hin, daß von einer praktischen Nutzenanwendung dieser Reaktion als sicher arbeitendes diagnostisches Verfahren nur bedingt die Rede sein kann, da fast die Hälfte der vom Verf. untersuchten sicher infizierten Eihäute keine Reaktion gab. Die Ergebnisse gleichen in dieser Beziehung denen früherer Autoren beim Versuch des Präzipitationsnachweises des Serums infizierter Tiere mit spezifischem Antigen, wobei fast stets eine nicht geringe Anzahl sicher infizierter Tiere keine Reaktion gab. Inwieweit besonders hochwertige Sera und besonders geeignete Extraktmethoden die Aussichten dieser Reaktion als diagnostisches Verfahren günstiger gestalten, müssen weitere Untersuchungen lehren. Ziegler.

Hódecsy, I.: Affinität des Hodengewebes zur pathogenen Wirkung des Bangschen Abortusbazillus. (Közlemények az össehasznált élet- és kórtan köréből 1928, XXI. Bd., S. 146.)

Durch intraperitoneale, subkutane und stomachale Einverleibung von Abortusbazillenkulturen wurden insgesamt 33 männliche Meerfischweinen infiziert. Bei einem hohen Prozentsatz der Versuchstiere entwickelte sich nebst einer Leber- und Milzerkrankung Bauchfell- und Hodenentzündung, wobei nach intraperitonealer Einspritzung das zentrifugale Umsichgreifen der pathologischen Veränderungen deutlich zu verfolgen war, insofern als die Abortusbazillen aus der Bauchhöhle auf die Scheidenhaut der Hoden und von hier in das Hodengewebe gelangt waren. Hingegen ließ sich nach subkutaner oder stomachaler Einverleibung der Weg der Bakterienverschleppung nicht ermitteln, wiewohl eine hämatogene und bei gleichzeitiger Peritonitis eine metastatische Verschleppung als naheliegend zu betrachten ist. Die Erkrankung des Hodengewebes beginnt mit Entartung des Keimepithels, der sich dann eine interstitielle Entzündung mit reichlicher Eiterbildung anschließt. In dem später durch eine bindegewebige Kapsel umschlossenen nekrotischen Herd tritt Verkalkung ein. Marek.

Merkens, J.: Verwantschapsreactie bij de praecipitatie. (Verwandtschaftsreaktion bei der Präzipitation.) (Mitteilg. aus der Abteilung Viehzucht der N.-Ind. Tierarztschule. — Direktor: Dr. H. J. Smit.) (Nederl. Indische Bladen voor Diergeneeskunde 1928, S. 188—193.)

Der Verfasser versuchte nach der Methode Ilchum die heterologe Präzipitation bei Eiweißreaktionen zu entfernen. Er mischte 2 Teile verdünnten Antiserums vom Büffel bzw. Ongolerind mit 1 Teil verdünnten Antigen, schüttelte die Mischung, stellte sie 2 Stunden in den Brutschrank bei 37 Grad, bewahrte sie darauf 14 Stunden im Eischrank und zentrifugierte sie schließlich 12 Minuten mit einer Geschwindigkeit von 1500 Umdrehungen in der Minute. Auf diese Weise erhielt er eine klare Flüssigkeit, mit

der er die verschiedenen Reaktionen ausführte. Auch tat er dies mit einem konzentrierten Antiserum, das er auf dieselbe Weise erhalten hatte, das aber nicht zentrifugiert worden war. Als Antigen zum Sättigen wurde normales Serum vom Büffel, vom Balineser-, Ongole-, friesisch-holländischen Rind, vom Schaf und vom Pferd benutzt. Von den 144 Reaktionen gaben 142 sogar bei einer Antigenverdünnung von 1:10 keine Spur einer Präzipitation. Die Antisera waren also durch das Sättigen vollständig wirkungslos geworden. Nur zweimal erhielt man eine sehr abgeschwächte Reaktion mit Antibüffelerum, und zwar mit folchem, das mit Pferde Serum gefärbt war. Die Absorptionsmethode von Ilchum durch verdünnte Antisera und verdünnte Antigene mit darauffolgendem Zentrifugieren, um die heterologen Präzipitine zu entfernen, ist also nicht zu verwenden, da auch die homologen Präzipitine dabei verschwinden. Baß.

Ullmann, A.: Gehäufte Fälle von Vergiftung durch Luzerne. (Allavortosi Lapok 1928, Nr. 16, S. 195.)

In einem Pferdebestande mit 24 Tieren traten unmittelbar nach der erstmaligen Aufnahme eines Mischfutters aus frisch geschnittenen Luzerne und Gerstenstroh folgende Krankheitsercheinungen auf: Hochgradige Depression, schwach gelbliche Verfärbung der sichtbaren Schleimhäute, stark beschleunigte und erschwerte Atmung, krampfartige Hustenanfälle, bei zwei Tieren mit der Entleerung von schaumigem Sekret aus der Nase und der Mundhöhle, Erhöhung der Körpertemperatur auf 38,4 bis 39,2 Grad C, aussetzende Herztätigkeit, leichte Kotverhaltung. Diese Erscheinungen stellten sich bei sechs Tieren in schwerem Grade ein, während die übrigen Tiere sich weniger schwer erkrankt zeigten. Zwei Tiere starben im Laufe des ersten Krankheitstages. Die Obduktion ergab keine nennenswerten Organveränderungen, nur Lungenödem. Die Behandlung bestand in subkutaner Einspritzung von Koffein, in Verabreichung von Istizin und in Anwendung von Priessnitzumschlägen auf den Brustkorb. Marek.

Bechdel, S. J.: Der Einfluß des Reifestadiums des Maises auf die Qualität von Silage für die Milchproduktion. (Nach Pennsylvania Sta. Bul. 207, 1926 bzw. Exp. Sta. Rec. 1927 ref. von Schieblich in D. Zschr. für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie 1928, Bd. XII, Heft 1.)

Die Versuche ergaben, daß die günstige Wirkung die Silage auf die Milch- und Butterfettproduktion mit zunehmender Reife des Maises anstieg. Es sind (in Pennsylvania) für Silagezwecke solche Maisarten zu empfehlen, die vor dem Erfrieren entweder das Milch- oder das frühe Teigstadium zu erreichen vermögen. A. Hink.

Murray, J. A.: Die Futteraufnahmefähigkeit des Rindes. (Nach Journ. Agr. Sci. 1926 ref. von Schieblich in D. Zschr. für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie Bd. XII, Heft 1, Juli 1928, S. 165.)

In absolute Trockensubstanz umgerechnet steigerte sich die Futteraufnahmefähigkeit bei Tieren von der Geburt an bis zum Alter von 12—14 Monaten in jedem Monat um 40 Lbs = 1 engl. Pfund = und 453,60 Gramm. Von dieser Zeit an bis zum Alter von 4 Jahren blieb die durchschnittliche Aufnahmefähigkeit konstant (etwa 18 Lbs absolute Trockensubstanz je Kopf). Bei Milchkühen betrug sie etwa das Doppelte. A. Hink.

Bienen- und Fischkrankheiten.

Prell, H.: Beiträge zur Kenntnis der Milbenseuche der Honigbiene. (Archiv für Bienenkunde 1927, VIII. Jahrg., Heft 7, Seite 241.)

In einer 33 Seiten langen Arbeit gibt Verf. einen kurzen Überblick über einige Fragen, welche die z. Zt. in den Mittelpunkt des Interesses für den deutschen Imker gerückte Milbenseuche betreffen. Auf einen ersten Seuchenfall im März 1927 ist im April ein zweiter in Sachsen festgestellt

worden. Im einzelnen werden behandelt: der Nachweis von Bienenmilben in einem Volk (Massenuntersuchungen mittels Walchflüssigkeit, Einzeluntersuchungen durch Tracheenpräparation, Tracheenuntersuchung durchsichtig gemachter Bienen); die Verbreitung der Milben im Tracheensystem (auch in den Luftfäcken des Bienenkopfes und -hinterleibes wurden schon Milben gefunden); die Schädigung der befallenen Bienen durch die Milben (Ausaugen von Körperflüssigkeiten durch die Tracheenwände und dadurch Schädigung der Tracheen selbst); der Einfluß des Milbenbefalles auf das Verhalten der Bienen (Atmungsbehinderung und Beeinträchtigung der Flugmuskulatur, verdrehte Flügelstellungen); die Übertragung der Milbenseuche von Biene zu Biene innerhalb eines Stockes (Milbenüberwanderung von Biene zu Biene vorwiegend während des Winters, in der übrigen Zeit während längerer Flugpausen); das Problem der extratracheal auftretenden Milben (möglicherweise gibt es neben der vorwiegend intratracheal lebenden Milbe eine ausschließlich extratracheal lebende); die Ausfichten der Milbenseuche im einzelnen Volk (Klima und ungünstige Witterungsverhältnisse, Flugpausen tragen sicherlich zur Verschlimmerung der Seuche bei; gutes Wetter und gute Tracht sind geeignet, die Seuche zu hemmen; Vorchwärme und Schwärme gehen eher ein als die Muttervölker); Milbenseuche und Nosemaseuche (epidemiologischer Parallelismus zwischen den beiden Seuchen); die Übertragung der Milbenseuche von Volk zu Volk (durch Bienen, imkerische Maßnahmen u. a.); die Behandlung der Milbenseuche (Aufmerksamkeit auf verdächtige Symptome, Einlieferung von Bienenproben zur Untersuchung); zuverlässige Heilmethoden gibt es nicht; also Abtöten milbenkranker Völker und Entseuchung von Beuten und Wabenwerk, (am besten mit schwefeliger Säure). Lang.

Rösch, G.: Beitrag zur Kenntnis der Maikrankheit. (Archiv für Bienenkunde 1927, VIII. Jahrg., Heft 4, S. 171.)

Die Maikrankheit (auch Sandläuterei, Zitterkrankheit, Flugunfähigkeit, Tollkrankheit genannt) ist nicht infektiös und hat trotz empfindlicher Bienenverluste vorwiegend harmlosen Charakter. Maikranke Bienen flattern hilflos auf dem Flugbrett umher, fallen plump zu Boden, kriechen hier unruhig herum, zittern, versuchen erfolglos abzufliegen und gehen in großen Massen rasch ein. Der Hinterleib ist prall aufgetrieben, wobei der Enddarm von einem dicken Pollenbrei stark verstopft ist. Durch Kennzeichnung von je 100 frisch geschlüpften Bienen eines Volkes während 23 Tagen und nachfolgendem Maikrankheitsbefall war es Verf. möglich, genau festzustellen, daß lediglich Bienen in einem Alter von 3—13 Tagen erkranken. Genau in dieser Altersperiode obliegt aber den Bienen das Brutpflegegeschäft, während dessen sie eifrig Pollen und Honig zehren. Eine Schädigung durch den Honig kommt nicht in Frage, da auch ältere Bienen Honig in gleicher Menge verzehren, aber nicht erkranken. Die Blütenstaubaufnahme ist bei älteren Bienen aber ganz geringfügig. Die Ursache der Maikrankheit ist somit allein in der üppigen Pollenzehrung zu suchen, wobei jedoch die Frage, wie die Schädigung zustande kommt, noch nicht geklärt ist.

Neben der Kotblasenverstopfung scheint noch eine andere bis jetzt unbekannte Schädigung des Gesamtorganismus zum Krankheitsbild der Maikrankheit zu gehören, denn einmal erkrankte Tiere gehen auch nach Kotentleerungen ein. Lang.

Morgenthaler, O.: Beiträge zur Kenntnis der Bienenkrankheiten Nr. 1, 2. (Archiv für Bienenkunde 1927, VIII. Jahrgang, Heft 4, S. 145.)

1. Überwinterung und Nosema.

Der Kampf gegen die zu den gefährlichsten Feinden der Bienenzucht zählende Nosemaseuche ist eine der wichtigsten Aufgaben der Bienenzüchter. Nach den Forschungen der

letzten Jahre sind die drei Erscheinungsformen der Nosema: Ruhr, Frühjahrsschwundfucht und chronisches Schwachbleiben der Völker. Amerikanische Forscher schieben diese drei Symptome einer fehlerhaften Einwinterung zu. Der *circulus vitiosus* ist dabei folgender: Nahrungsaufnahme-Belastung des Darmes — Unruhe — Lockerung der Wintertraube — Sinken der Stocktemperatur — vermehrte Wärmeproduktion — folglich vermehrte Nahrungsaufnahme. Besonders schädigende Faktoren für einzelne Punkte können sein: Für Darmbelastung ungeeignetes Futter (Waldhonig infolge hohen Dextringehaltes) und evtl. abgestoßene Epithelzellen, peritrophische Membran; für Traubenlockerung Beunruhigung durch Störungen (Menschen, Mäuse, Weisellofigkeit); für Sinken der Stocktemperatur schlechte Winterpackung, geringe Volksstärke. Wirkt Nosema auf das zu überwinternde Volk ein, so ist ihr Einfluß genau wie der anderer schädigender Faktoren (Parasitenbefall, Abstoßung von Epithelzellen und Ansammlung von Sporen im Darm, Ruhr, Unruhe der Tiere usw., vermehrte Wärmeproduktion, Frühbruten usw.) Die drei Erscheinungsformen können also parasitärer und nicht parasitärer, aber auch gemischter Natur sein, weshalb das Mikroskop nur in Händen erfahrener Bienenzüchter wirklichen Wert hat. Bei schlechter Überwinterung ist also vor allem zu erforschen, ob und in welchem Maße Nosema dafür verantwortlich gemacht werden kann. Ohne die nicht parasitären Faktoren zu unterschätzen, mißt Verf. der Nosema unter Umständen eine primäre ursächliche Bedeutung für schlechte Überwinterung bei.

2. Der gegenwärtige Stand der Nosemaseuche.

Verf. gibt zunächst einen Überblick über die Entwicklung der Nosemaseuchebekämpfung in der Schweiz vom Jahr 1909 ab und betont die Notwendigkeit einer engen Verbindung zwischen Untersuchungen am Bienenstand und im Laboratorium. 1925 wurde die schweizerische Nosemakommission gegründet. Den Imkervereinen obliegt in erster Linie die Feststellung der Seuchenverbreitung; der schweizerischen milchwirtschaftlichen und bakteriologischen Anstalt in Liebefeld-Bern das Studium des Erregers und der Verarbeitung der Erfahrungen der Vereine.

Hinsichtlich des Erregers, dessen Studium in erster Linie genaue Kenntnis der normalen Physiologie und Anatomie des Bienenkörpers voraussetzt, sind noch viele Fragen ungelöst; möglicherweise spielt sich ein Teil der Entwicklung der Parasiten in einem anderen Bienenorgan als im Mitteldarm ab, vielleicht sogar in einem anderen Tier.

Aus der Statistik geht jetzt schon hervor, daß in der Schweiz kaum mehr eine nosemafremde Gegend ist. Für die Nachbarländer mögen die gleichen Verhältnisse zutreffen. Besonders wertvoll sind Statistiken auf geographischen Karten, weil sie vielleicht wichtige Einblicke gestatten in die Beziehung zwischen Nosema und Lage des Standes. 1926 waren trotz starker bis in den späten Herbst hinein dauernder Verfeuchung die Völker normal stark. Einmalige Untersuchungen können nur ein lückenhaftes Bild geben, wertvoll sind dagegen periodische Untersuchungen der Völker das ganze Jahr hindurch. Bei einer derartigen Kontrolle auf einem Stand von 42 Völkern mit gutem Durchschnittshonigertrag ergab sich hinsichtlich des Nosemabefalles eine zweigipflige Kurve, deren Spitzen im April und Juni liegen. Erwähnenswert ist, daß ein Schwarm bei sämtlichen Kontrollen nosemafremd war, wogegen das Muttervolk sich als befallen erwies und der Befall nach dem Schwärmen noch beträchtlich zunahm. Auffallend ist, daß die Auswirkungen der Seuche bei gleichen Völkern in verschiedenen Jahren grundverschieden sein können. Das Auf- und Abflanken der Volksstärke scheint geradezu typisch für Nosemavölker zu sein, daher die Bezeichnung Gigampfiros (= Schaukelpferd). Heilmittel gibt es bis jetzt nicht.

Im dritten Teil der Arbeit bespricht Verf. noch drei Fragen:

1. Welche bei *Nosema* krankheitsfördernde Faktoren sollen und können einer genaueren Prüfung unterworfen werden? Die krankheitsfördernden Faktoren: Witterung und Tracht sind unbeeinflussbar; dagegen soll künftig vermehrte Aufmerksamkeit auf das Vorkommen anderer Parasiten neben *Nosema* (Amöben!) und auf die Überwinterungsfrage gerichtet werden.
2. Ist *Nosema* überhaupt ansteckend? Nach den Beobachtungen in der Praxis muß, auch wenn entsprechende Übertragungsversuche bisweilen negativ ausfallen, der ansteckende Charakter der Seuche bejaht werden.
3. Ist der *Nosemaparasit* die eigentliche Ursache der Krankheit oder befällt er nur sonstwie schon geschwächte Völker?

In den Beobachtungen, daß stärkste Infektionen bei den stärksten Völkern vorkommen, geringer oder kein Befall aber vorwiegend bei den Schwächlingen gefunden wird, erblickt Verf. einen Beweis dafür, daß *Nosema* ap. ein echter Parasit (im Gegensatz zu einem Schwächeparasiten) ist, womit er für manches bisherige *Nosemarätsel* (z. B. Selbstheilung) eine Erklärung gefunden zu haben glaubt.

Der Arbeit ist ein reichhaltiges Schriftenverzeichnis angefügt. Lang.

Standesangelegenheiten.

Verein der Tierärzte des Reg.-Bezirks Düsseldorf.

Herbstversammlung am 21. November (Bußtag) 1928 in Düsseldorf.

Der Vors., Oberregierungsrat Dr. Heyden, begrüßt die 80 Anwesenden. Als Folge eines Aufrufes haben sich 28 Kollegen zur Aufnahme gemeldet. Dem früheren Vors. Bettelhäuser wird ein Kristallkrug überreicht, wobei H. an B. warme Worte richtet. Wigge berichtet über die Kammerwahlen und ermahnt alle Kollegen, möglichst das Dispenserrecht auszuüben, ferner die Fleischschau genau nach den gesetzlichen Vorschriften zu erledigen. Prof. Dr. Mießner-Hannover: 1) Blutgruppenfrage und ihre Bedeutung in der Human- und Veterinärmedizin; 2) Geflügelkrankheiten.

In eingehender, klarer und verständlicher Weise behandelt M. zuerst die Blutgruppentheorie. 1900 entdeckte Landsteiner-Wien, daß das Serum bestimmter Menschen die Blutkörperchen anderer Menschen zu agglutinieren vermochte. Die weiteren Untersuchungen ergaben, daß sich die Menschenrasse in vier scharf voneinander getrennte Blutgruppen teilen läßt, je nach den verschiedenen Eigenschaften der Blutkörperchen und des Serums. Bei den Blutkörperchen sind zwei verschiedene agglutinable Substanzen A und B vorhanden. Die Blutgruppe A enthält ein Serum gegen die Blutgruppe B (Anti-B β), die Blutgruppe B solche gegen A (Anti-A α). In der dritten Gruppe (o) sind die Blutkörperchen frei von agglutinabler Substanz; das Serum dagegen enthält Agglutinine gegen A (α) und gegen B (β). In der weiteren Gruppe, mit dem griechischen Buchstaben o bezeichnet, besitzen die Blutkörperchen Substanz A und B (A + B), das Serum ist frei von Agglutininen. Das Serum enthält nie Autoantikörper, immer (oder fast immer) Antikörper gegen die fehlenden Blutbestandteile. Die agglutinable Substanz der Blutkörperchen ist bereits im vierten Monat des embryonalen Lebens nachweisbar, die Agglutinine im Serum erst im 2. Lebensjahre. Die Unabänderlichkeit der einzelnen Blutgruppen während des ganzen Lebens ist erwiesen. In Europa ist etwa 40 Proz. der O- und A-Gruppe, 15 Prozent B- und 5 Prozent der AB-Gruppe; nach Osten zu eine B-Gruppenzunahme festgestellt. Praktische Anwendung findet die Lehre 1. bei der Transfusion von Blut, 2. zum forensischen Nachweis der Herkunft von Blutflecken, 3. zum Nachweis der Vater- oder Mutterchaft, 4. in der Rassenhygiene, 5. für die Pathologie vielleicht zu verwerten. Versuche sind im Gange, ob Infektionskrankheiten, Geschwülste ufw. mit Gruppenzugehörigkeit in Zusammenhang stehen. Einheitliche Resultate noch nicht erzielt. Bei Tieren ähnliche Untersuchungen ausgeführt. Bei

Wiederkäuern wurden die A-Gruppe und Anti-A-Agglutinine festgestellt. Bei Pferden ähnliche Gruppierung wie beim Menschen ermittelt (Schermer). Die Aktivität der Tiersera ist nicht so hoch wie die der Menschenserum; die Agglutinine sind nicht in der gleichen Menge wie beim Menschen vorhanden. Anschließend an diesen lichtvollen Vortrag bespricht M. die Geflügelkrankheiten und zwar eingehend nur die Kükenruhr, welche auch in Deutschland große Bedeutung erlangt hat seit Einführung der künstlichen Aufzucht und des Gluckensystems. Erreger: *Bact. pullorum*; durch Ankauf wird sie in den Bestand gebracht. Die Krankheit tritt in den ersten Lebenstagen ein. Die Tiere verkriechen sich, plußern sich auf, die Flügel hängen; sie drängen zur Wärme, Durchfall, Massensterben. Das Junge wird schon von der Mutter angesteckt, das Ei enthält den Erreger. Veränderungen an den Eierstöcken feststellbar. Zwecks leichter Bekämpfung der Krankheit höchstens 200—250 Tiere unter die Glucke bringen, kranke Tiere töten, ins Feuer werfen. Matten zum Desinfizieren der Füße auflegen; Pfleger müssen sich oft die Hände waschen, Mutterhennen durch Agglutination prüfen, periodische Blutuntersuchungen einführen, hygienische Verhältnisse beachten. Zahlreiche Lichtbilder erläuterten das Vorgetragene. Anschließend behandelt M. an Hand von Lichtbildern in kurzer Form noch zahlreiche andere Geflügelkrankheiten: Leukose, Pocken, Tuberkulose, Bandwürmer, Kokzidiose, Diphtherie. Reicher Beifall und Dankesworte des Vors. belohnen den Redner.

Heine berichtet über die Sitzung des Milchausschusses beim deutschen Veterinärrat.

Wenn der Bericht in die Hände der Leser kommt, weil leider unser hochverehrter Vors., Oberregierungsrat Dr. Heyden, nicht mehr unter den Lebenden; neun Tage nach der Versammlung, am 30. November, ist er plötzlich an Herzschlag gestorben. Sein Verlust erscheint für den Verein unerlässlich. May, Schriftf.

„Schwerarbeiter“!

In der Generalversammlung beamteter Tierärzte Preußens vom 20. Oktober 1928 in Berlin ist nach dem Bericht der D. T. W. Nr. 47 vom 24. November 1928 u. a. auch die Frage der Zweckmäßigkeit einer Vollbefolgung der Veterinärärzte behandelt worden. Ohne auf diese gegenwärtig mit im Brennpunkt des tierärztlichen Interesses stehende Frage prinzipiell näher einzugehen, soll im folgenden nur das von dem Referenten Beutler geprägte Wort vom „Schwerarbeiter unter den Beamten“, das in seiner Überheblichkeit nicht unwidersprochen bleiben darf, einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, daß dieses, andere Berufskategorien recht nachdenklich stimmende Werturteil im Interesse der deutschen Beamenschaft und nicht zuletzt unseres gesamten tierärztlichen Standes besser unterblieben wäre, zumal in der gegenwärtigen Notzeit, in der eine geschlossene Einheitsfront aller deutschen Beamten im allgemeinen und der Tierärzte im besonderen einfach ein Gebot der Selbsterhaltung bedeutet! Ganz abgesehen davon, ob sich der von dem Referenten geprägte Begriff des „Schwerarbeiters unter den Beamten“ auf die Tätigkeit beziehen soll, die dem Staatstierarzt aus seinem amtlichen Aufgabenkreis erwächst, oder mehr auf seine gewiß aufreibende Tätigkeit in der Privatpraxis, so bleibt doch die Tatsache bestehen, daß es ein recht bedenkliches Unterfangen darstellt, eine Sondergruppe der Beamenschaft, insbesondere derjenigen mit akademischer Vorbildung, als die mit geistiger und körperlicher Arbeit am schwersten belastete hinzustellen. Mit einer derartigen Selbsteinschätzung einer Einzelgruppe dürfte schwerlich die so dringend notwendige Befriedigung innerhalb der deutschen Tierärzteschaft erreicht werden! Nächstens kann es dann dahin kommen, daß sich wieder eine andere Sondergruppe nunmehr als „Schwer“-arbeiter unter den Beamten zu bezeichnen aufschwingt! Diese übertrieben hohe Beurteilung der dienstlichen und außerdienstlichen Tätigkeit des Staatstierarztes als „Schwer“-arbeit stellt im gleichen Atemzuge eine Herabwürdigung der Art und Bedeutung der Tätigkeit dar, die Angehörige anderer tierärztlichen Sondergruppen in ihrer Eigenschaft als Beamte ausüben. Jeder deutsche Tierarzt, ganz gleichgültig, ob er in der freien Praxis, im Dienste des Staates, der Gemeinde oder sonst einer öffentlichen Organisation steht, mit oder ohne Qualifikation zum Staatsdienst, ein jeder tut seine Pflicht zum Wohle des Volksganzen und ist dabei wohl kaum von der selbstgefälligen Vorstellung befangen, daß nur er allein gerade die schwerste und wichtigste Arbeit leistet. Wir alle müssen unsere Pflicht und Schuldigkeit tun, jeder an seinem Platze und

unter der drückenden Not der heutigen Verhältnisse, und darum fort mit diesem deplazierten Begriff „Schwer“-arbeiter, denn die sind wir alle ohne Ausnahme im Dienste unseres Volkes in des Wortes wahrster und edelster Bedeutung!

Langhof-Bautzen.

Verschiedene Mitteilungen.

Dankfagung.

Zu meinem 60. Geburtstage sind mir von befreundeten Kollegen des In- und Auslandes so zahlreiche Glückwunsch-Schreiben und -Telegramme zugegangen, daß ich sie im einzelnen erst nach und nach beantworten kann. Inzwischen möchte ich deshalb meinen herzlichsten Dank hiermit allgemein zum Ausdruck bringen.

Berlin, den 16. Dezember 1928.

Dr. E. Wehrle.

Zur Reichsstatistik des tierärztlichen Personals.

Von Edelmann, Dresden.

In seiner Bearbeitung der Reichsstatistik des tierärztlichen Personals nach dem Stande vom 1. Juli 1927 (1. Beiheft zur Nr. 38 vom 19. September 1928 des Reichs-Gesundheitsblattes) hat Zschiesche auch die Beteiligung der Tierärzte an der Fleischbeschau gebührendermaßen berücksichtigt. Dabei hat er u. a. auch den Hundertsatz der an der Fleischbeschau beteiligten Tierärzte aus der Gesamtzahl der im Deutschen Reich vorhandenen Tierärzte (Spalte 11 der Zusammenstellung) errechnet. Dies ergibt indessen nach meinem Dafürhalten kein den Tatsachen allenthalben entsprechendes Bild, weil in dieser Gesamtzahl Tierärzte mit enthalten sind, die nach ihrer Stellung oder der Art ihrer Berufstätigkeit für die Ausübung der Fleischbeschau nicht ohne weiteres in Betracht kommen. Es sind dies: Tierärztliches Lehrpersonal (Spalte 3b), Militärärzte (Spalte 4), Tierärzte, die ausschließlich in oder für wissenschaftliche Institute, Anstalten usw. tätig sind (Spalte 6), und die keinerlei Berufstätigkeit mehr ausübenden Privatärzte (Spalte 9). Läßt man die in den genannten 4 Spalten aufgeführten Tierärzte bei der Feststellung der Gesamtzahl der Tierärzte im Deutschen Reich für den vorliegenden Zweck unberücksichtigt, so vermindert sich diese Gesamtzahl von 7600 auf 6781 und damit erhöht sich der von Zschiesche mit 72,5 errechnete Hundertsatz der in der Fleischbeschau tätigen Tierärzte auf 81,42.

Ähnlich gestalten sich diese Zahlenverhältnisse bei den von Zschiesche besonders berücksichtigten 11 Ländern, so daß sich folgendes Bild ergibt, in dem die in Klammern stehenden Zahlen die von Z. errechneten sind.

Es waren in der Fleischbeschau tätig:

in Preußen von	4071 (4552)	Tierärzten	3258 = 80,02 (71,6) %
in Bayern von	954 (1075)	Tierärzten	773 = 81,27 (71,9) %
in Sachsen von	435 (508)	Tierärzten	381 = 87,58 (75,0) %
in Württemberg von	253 (291)	Tierärzten	230 = 99,09 (79,0) %
in Baden von	244 (255)	Tierärzten	221 = 90,57 (86,7) %
in Thüringen von	171 (189)	Tierärzten	149 = 87,13 (78,8) %
in Hessen von	169 (194)	Tierärzten	124 = 73,37 (63,9) %
in Mecklb.-Schw. von	121 (144)	Tierärzten	112 = 92,56 (77,8) %
in Oldenburg von	86 (93)	Tierärzten	78 = 90,69 (83,9) %
in Braunschweig von	66 (73)	Tierärzten	64 = 98,48 (87,7) %
in Anhalt von	49 (55)	Tierärzten	40 = 81,63 (72,7) %

Hiernach beschäftigt Württemberg mit 99,09 Prozent nahezu alle seine Tierärzte in der Fleischbeschau, es folgen Braunschweig mit 98,48 Prozent, Mecklenburg-Schwerin mit 92,56 Prozent, Oldenburg mit 90,69 Prozent, Baden mit 90,57 Prozent, Sachsen mit 87,58 Prozent, Thüringen mit 87,13 Prozent, Anhalt mit 81,63 Prozent, Bayern mit 81,27 Prozent, Preußen mit 80,02 Prozent und Hessen mit 73,37 Prozent. Nach Zschiesches Berechnung war die Reihenfolge Braunschweig, Baden, Oldenburg, Württemberg, Thüringen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen, Anhalt, Bayern, Preußen und Hessen.

Reichsausschuß für hygienische Volksbelehrung.

Der Reichsausschuß veranstaltete am 28. November d. Js. in Berlin im Kaiserin Friedrich-Hause eine Aussprache der Geschäftsführer seiner Landes- und Provinzialausschüsse. Außer Fragen der zweckmäßigsten Organisation der hygienischen Volksbelehrung wurde auch auf die Be-

deutung lokaler Lehrmittelsammlungen, der Vortrags- und Ausstellungstätigkeit für die hygienische Volksbelehrung eingegangen. Auch die Aufgaben der Schule, des Films, des Rundfunks, des Theaters, des Kasperltheaters und der Presse bei der Verbreitung hygienischer Kenntnisse waren Gegenstand von Referaten. Am Abend desselben Tages wurde vom Reichsausschuß für hygienische Volksbelehrung ein Presseabend in den Räumen der Deutschen Gesellschaft 1914 veranstaltet, der dazu dienen sollte, die Fühlungnahme des Reichsausschusses mit der Presse noch inniger zu gestalten. Nach Begrüßungsworten des Vorsitzenden des Reichsausschusses für hygienische Volksbelehrung, Präsident des Reichsgesundheitsamtes Dr. Hamel, sprachen im Namen der Ärzteschaft Professor Dr. Bruck-Berlin und im Namen der Presse Prof. Wolff-Dresden, die die wichtigen Aufgaben der Presse bei der hygienischen Volksbelehrung hervorhoben. Der Generalsekretär des Reichsausschusses für hygienische Volksbelehrung, Prof. Dr. Adam, schilderte die Entstehungsgeschichte des Reichsausschusses, während der Referent für Presseangelegenheiten beim Reichsausschuß, Dr. Kayser, Angaben über die Organisation der Pressepropaganda des Reichsausschusses machte. Der Presseabend war ein Auftakt zu der am nächsten Tage, dem 29. November stattfindenden öffentlichen Tagung des Landesausschusses für hygienische Volksbelehrung in Preußen, die im Plenarsitzungsfaal des Wohlfahrtsministeriums abgehalten wurde. Die Tagung, zu der zahlreiche Vertreter von Behörden und an der hygienischen Volksbelehrung interessierten Organisationen erschienen waren, wurde durch eine Begrüßungsansprache des Vorsitzenden, Ministerialdirektor Dr. Krohne, eröffnet. Danach sprachen der Wohlfahrtsminister Dr. Hirtsiefer über die Bedeutung der hygienischen Volksbelehrung für die Volksgesundheit und der Kultusminister Dr. Becker über die Schule und die hygienische Volksbelehrung. Im Anschluß an die drei großen Hauptreferate kamen Vertreter der Landesversicherungsanstalten, der Krankenkassen, der Gewerkschaften, der sozialhygienischen Reichsfachverbände, der Medizinalbeamten, der Kommunalärzte, der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker, der Ärztekammern, der Schulbehörden, der Lehrerschaft, der evangelischen und katholischen Geistlichkeit sowie der Frauenverbände zu Wort, die einmütig den großen Wert der hygienischen Volksbelehrung betonten. Der Generalsekretär des Landesausschusses für hygienische Volksbelehrung in Preußen, Dr. Bornstein, rief in einem Schlußwort die Anwesenden auf, die Aufgaben des preußischen Landesausschusses zu unterstützen.

10. wissenschaftl. Referierabend an der Tierärztl. Hochschule Hannover.

Montag, den 13. Januar 1929, 20,15 Uhr, im Hörsaal des anatomischen Institutes. Dr. O. Schultz, Direktor des Milchwirtschaftlichen Laboratoriums zu Grebenstein: „Das D-Vitamin und die D-Avitaminosen der Tiere“.

Zietzschmann.

Doktorinstitute.

Nicht bloß in Amerika gibt es Schwindelinstitute, die den Professor- und Dokortitel „verleihen“ (D. med. W. 1928, Nr. 48, S. 2034); auch in Belgien werden unbegreiflicherweise derartige „Fabriken“ geduldet. Diese Tatsache wurde uns bekannt, als der Lukate-Hiller eines Tages von der „Universität in Brüssel“ den „Medizinischen Ehrendokortitel“ erhielt. Nachfragen ergaben, daß sich hinter dieser „Körperschaft“ die dortige „Université philotechnique“ verbarg. (Eine Anfrage bei der Brüsseler Medizinischen Fakultät wurde mir übrigens nicht beantwortet.) Wie die „Berliner Montagpost“ am 19. September gelegentlich eines kürzlich in Leipzig gegen einen Vermittler von Schwindeltiteln verhandelten Prozesses mitteilte, sind der oben erwähnten „Université“ in Brüssel gleichwertig die Kolonialhochschule in Lüttich, die Gewerbeschule zu Verviers, die Friedensschule zu Monts, die Schule der weisen Schriften in Namur. Bis vor kurzem seien derartige Doktordiplome vom Ministerium des Äußern in Brüssel durch Stempel und Unterschrift beglaubigt worden! Seit etwas mehr als einem Jahr aber werde der staatlichen belgischen Beglaubigung der Zusatz beigefügt: „Sans valeur légale.“ (D. med. W. 1928, Nr. 50, S. 2118.)

Zu unserem Bilde.

Conrad Gesner, geb. 26. März 1516 zu Zürich, gest. 13. Dezbr. 1565 daselbst an der Pest, studierte in Bourges griechische Mediziner und Botaniker, in Straßburg und Paris Sprachwissenschaften, dann in Montpellier und Basel Medizin, promovierte in Basel zum Dr. med. und er-

hielt nach verschiedenen kleinen Stellen im Lehrfach eine Professur für Medizin, Ethik und Physik am Collegium Carolinum in Zürich, die er 24 Jahre inne hatte. Seit 1554 war Gesner nebenher Oberstadtarzt in seiner Vaterstadt. Gesner hat eine erstaunlich reiche literarische Tätigkeit entfaltet. Von 1545—1555 veröffentlichte er seine vierbändige Bibliotheca universalis seu Catalogus omnium scriptorum in tribus linguis, von 1551—1558 die vierbändige Historia animalium, er gab den Valerius Cordus und den Hieronymus Tragus (Kräuterbuch) heraus, schrieb eine Sammlung de chirurgiae scriptoribus, ein Enchiridion rei medicae, zwei Bücher de remediis secretis, drei Bücher epistolarum medicinalium und viele andere Schriften über philologische, naturkundliche und historische Gegenstände, zusammen 72 Bücher und Schriften; dazu hinterließ er 26 unvollendete Arbeiten und ein wertvolles Herbarium. Gesners Arbeiten in der Zoologie sind in jeder Beziehung grundlegend, auch der Botanik hat er neue Wege gewiesen. Als Verfasser des liber I (de quadrupedibus viviparis) der Historia animalium

ist Gesner einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler des 16. Jahrhunderts, die für die Veterinärmedizin Bedeutung gewonnen haben.

Reinhard Froehner.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Reg.-Veterinär Dr. Göhre in Großenhain vom 1. Jan. 1929 zum Oberregierungsveterinär und geschäftsführenden Mitglied der II. (Veterinär-) Abteilung des Sächs. Landesgesundheitsamtes in Dresden; Dr. Lübke, Assistentztierarzt am Bakt. Institut der Landwirtschaftskammer in Breslau zum wissenschaftl. Assistenten an der med.-forensischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule in Berlin.

In den Ruhestand getreten: Veterinär Dr. Bettkober in Görlitz.

Verstorben: Veterinär i. R. Otto Peters in Reichenbach (Erzgebirge); Generaloberveterinär a. D. Georg Klimmer, Schlachthof-tierarzt in Ziegenhals; Tierarzt Patett in Stendal.

Veterinär-medizinisches Studentenblatt.

Veterinärmedizinische Fachschaft München.

S.-S. 1928.

In der Fachschaftsversammlung am 14. Mai 1928 wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: 1. Demeter, cand. med. vet., 2. Kutzner, cand. med. vet., 3. Seegmüller, stud. med. vet. Die Fachschaft hatte es sich sehr angelegen sein lassen, zwischen den praktischen Tierärzten und ihr eine enge Verbindung herzustellen, was ihr auch gelang. Es konnte von der Fachschaft aus sämtlichen Praktikern, die Vertreter suchten, Genüge getan werden. Auch wurden Bücher und Instrumente zwischen Praktikern und Studenten vermittelt. Ein großes Interesse zeigte die Studentenschaft an den tierärztlichen Fachzeitschriften, die im Fachschaftszimmer auslagen oder verteilt wurden. Gut besucht waren auch die Reitkurse. Es fand einer für Anfänger und einer für Fortgeschrittene zu ermäßigtem Honorar statt. In besonders gutem Einvernehmen stand die Fachschaft mit dem Asta der Universität, die daher auch die Reise eines Vertreters nach Hannover zum 150jährigen Jubiläum und zum Studententag in Danzig finanzierte, was um ein Vielfaches das überschritt, was die Fachschaft im Haushaltsplan des Asta zu fordern hatte. Der traditionelle Fachschaftsabend am 9. Juni 1928 stand im Zeichen einer regen Beteiligung und nahm einen feuchtfröhlichen Verlauf, bei dem sich das gute Einvernehmen zwischen der Dozentenchaft und der Studentenschaft zeigte.

gez. Demeter.

Winterball der Tierärztlichen Hochschule Berlin.

Wie in der vorigen Saison veranstalten die Studierenden der Tierärztlichen Hochschule auch in dieser Saison einen Ball. Der Ausschuss hat aus der regen Beteiligung seitens der Tierärzteschaft und der Freunde der Tierärztl. Hochschule im vorigen Jahre geschlossen, daß es allen Festteilnehmern auf diesem Hochschulball besonders gefallen hat. Vielfach hatten sich aber Unerquicklichkeiten eingeschlichen, denn der Saal im Lehrvereinshaus ist für 800 Personen doch etwas zu klein. Aus diesem Grunde wird der Ball im Marmor- und Bankettsaal des Zoologischen Gartens abgehalten.

Allen Freunden und Gönnern der Hochschule sei auch schon jetzt der Termin für diese Veranstaltung bekannt gegeben, damit sie sich diesen Tag für diese Veranstaltung frei halten können. Da dieser Ball zu einem gesellschaftlichen Ereignis Berlins werden soll, sind die Vorbereitungen zu diesem Fest auf eine viel breitere Basis gestellt worden. Der Hochschulball der Tierärztlichen Hochschule soll zu einem Tierärzteball werden. Deshalb sind zu diesem Feste nicht nur die Tierärzte Berlins, sondern auch diejenigen der weiteren Umgebung Berlins eingeladen worden.

Der Ball findet am 4. Februar 1929 statt.

Die Tanzmusik wird von derjenigen Kapelle ausgeführt, die auch schon im vorigen Jahre aufspielte. Es ist die allseits bekannte und berühmte Kapelle Kermbach. Eine Tombola und die Verteilung einer Damenpende sollen zur Hebung der Festfreude beitragen.

Die Unkosten sind natürlich weit größer als diejenigen, die die vorjährigen verursachten. Trotzdem ist es seitens gütiger Unterstützung

von verschiedenen Gönnern der Hochschule möglich, alle diese Unkosten nicht den Festteilnehmern aufzubürden. Der Festbeitrag beläuft sich auf 4 RM., Studierende zahlen 2 RM.

Müller. Brandes.

Veterinärmedizinische Fachschaft Gießen.

S.-S. 1928.

Auf der ordentlichen Fachschaftsitzung vom 24. Februar 1928 wurde unter anderm der Ausschuss gewählt, der sich wie folgt zusammensetzt: 1. Vors. cand. med. vet. J. Frey, 2. Vors. stud. med. vet. Birk, Schriftf. cand. med. vet. Buding, Kassenwart cand. med. vet. Röttig, Bücherwart cand. med. vet. Brauer.

Unsere Tierärztliche Fachschaft entandte zum 150jährigen Jubiläum der Tierärztlichen Hochschule Hannover cand. med. vet. Frey, der uns später auf einer Sitzung ausführlichen Bericht über den glänzenden Verlauf dieser Hochschulfeyer erstattete. Von mehreren Kollegen wurde an dem Universitäts-Reitunterricht wie auch an einem verbilligten Autofahrkurs teilgenommen.

Am 19. Juni brachte uns eine Fachschaftskneipe einen erneuten Beweis der guten Zusammenarbeit zwischen dem Lehrkörper und der Studentenschaft. Neben ernst und feuchtfröhlichen Gesprächen kam die Fidelitas zu ihrem Recht. An einem Universitätsportfest konnte die vet.-med. Fachschaft durch cand. med. vet. Langlotz die meisten Erfolge buchen. Herrn Geheimrat Prof. Dr. Martin überreichte die Fachschaft am Schluß des Semesters anlässlich seiner Emeritierung eine Blumenpende.

Der Ausschuss für das W.-S. 1928/29 setzt sich aus folgenden Herren zusammen: 1. Vors. cand. med. vet. Frey, 2. Vors. stud. med. vet. Ritter, Schriftf. cand. med. vet. Buding, Kassenwart cand. med. vet. Röttig, Bücherwart cand. med. vet. Jäger, Presse-Berichterstatter cand. med. vet. Bertrams.

gez. Frey.

Vet.-medizinische Fachschaft Gießen.

Am Sonnabend, den 1. Dezember 1928, hielt Prof. Dr. Nörr für die hiesige vet.-med. Fachschaft im Hörsaale der Anatomie einen Lichtbildervortrag über: „Die tierärztlichen Lehrstätten in Südosteuropa und in Holland.“ Er schilderte dabei die Verhältnisse ihrer Gründung, ihrer Entwicklung und ihres heutigen Bestandes und verbreitete sich besonders eingehend über die im Jahre 1924 gegründete tierärztliche Fakultät der Universität Sofia, an welcher er in den Jahren 1925—1927 als Ordinarius gewirkt hat. — In 65 wohlgeordneten Lichtbildern zeigte Prof. Nörr die einzelnen Institute und Kliniken der vet.-med. Fakultäten von Utrecht, Sofia, Agram und Bukarest und der tierärztlichen Hochschule von Konstantinopel.

cand. med. vet. Bertrams.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.
Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.
Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Angeloff, Sofia; Tierarzt Eugen Bass, Görlitz; Prof. Dr. Eber, Leipzig; Ministerialrat Prof. Dr. Edelmann, Dresden; Prof. Dr. Ernst, München; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frick, Hannover; Dr. Heine, Duisburg; Prof. Dr. Marek, Budapest; Prof. Dr. Max Müller, München; Prof. Dr. Paechtnr, München; Prof. Dr. Poppe, Rostock; Prof. Dr. Raebiger, Halle a. S.; Prof. Dr. Skrjabin, Moskau; Prof. Dr. Trautmann, Hannover.

Herausgeber und Schriftleiter: Professor Dr. Mießner, Hannover.

Die „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift“ erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis für Deutschland vierteljährlich RM. 7,50 durch alle Buchhandlungen und Postanstalten; bei Zusendung unter Kreuzband RM. 8,70. Nach dem Ausland mit ermäßigtem Porto RM. 8,10; nach dem übrigen Auslande RM. 8,80. Abbestellungen müssen 14 Tage vor Beginn der neuen Bezugszeit in Händen der Verlagsbuchhandlung sein.

Postcheckkonto: Hannover 141 64. Fernsprecher 8 12 75.

Sämtliche redaktionelle Zuschriften und Korrekturen werden an Professor Dr. Mießner in Hannover, Misburger Damm 16, erbeten. Alle weiteren Anfragen wie Anzeigen an die Verlagsbuchhandlung M. & H. Schaper in Hannover.

Im Falle von höherer Gewalt, Streik, Sperre, Aussperrung, Maschinenbruch, Betriebsstörung in unserem eigenen Betrieb oder denen unserer Lieferanten hat der Bezieher keinen Anspruch auf Lieferung oder Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. In gleichen Fällen haben auch Inferenten keine Ersatzansprüche, wenn die Zeitschrift verspätet, in beschränktem Umfang oder gar nicht erscheint. Erfüllungsort Hannover. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet zur Anerkennung vorstehender Bedingungen.

Nr. 52.

Ausgegeben am 29. Dezember 1928.

36. Jahrgang.

Wild- und Rinderseuche und Schweineseuche.

Von Veterinärarzt Dr. Glässer, Hannover.

Im Archiv für Tierheilkunde 1928, Bd. 58, Heft 2, S. 117, wird von Veterinärarzt Migge in Osterode (Ostpreußen) über das Auftreten der Wild- und Rinderseuche in seinem Kreise gegen Ende des Jahres 1927 berichtet. Ähnliche Fälle, die in den Jahren 1915—1919 im Reg.-Bezirk Marienwerder aufgetreten waren, hatte in derselben Zeitschrift im Jahre 1925 bereits Veterinärarzt Gude beschrieben. Diese Mitteilungen haben nicht nur für den Osten Preußens, sondern für ganz Deutschland eine erhebliche Bedeutung, da jederzeit solche Fälle einmal auch in anderen Landesteilen vorkommen können und in der Veterinärmedizin Deutschlands vielfach diese im allgemeinen feltene Krankheitsform einen verschwommenen und legendären Charakter annahm. Sehr wertvoll an den Veröffentlichungen von Gude und Migge sind die Beobachtungen über das Übergreifen der Seuche von den zuerst erkrankten Rindern auf andere Tiere, insbesondere auf Schweine, gelegentlich auch auf Pferde und anscheinend auch auf Hühner, wenn ähnliche Beobachtungen auch schon früher gemacht worden sind. Trotz des Übergreifens der Erkrankung auf andere Tiere besonders auf Schweine und der Mitteilung des Veterinärunterforschungsamtes in Königsberg, daß an den bipolaren Bakterien, die in dem von Migge eingefandten Materiale nachgewiesen wurden, weder durch bakteriologische Untersuchung noch durch den Tierversuch eine Unterscheidung der Wild- und Rinderseuche von der Schweineseuche möglich sei, bleibt Migge wie übrigens früher auch Gude der Ansicht, daß Wild- und Rinderseuche eine besondere, von der Schweineseuche verschiedene Krankheit sei, bei deren Erreger es sich nach Migge um eine gute Art, wenigstens um eine scharf begrenzte Unterart im Sinne der botanischen Terminologie handelt.

Für diese Ansicht wird folgendes angeführt:

Greift die Wild- und Rinderseuche auf Schweine über, so ist die bei diesen dann entstehende Krankheit nur von sehr kurzer Dauer, meist tritt schon innerhalb von 24—36 Stunden der Tod ein. Die Atmung vollzieht sich meist auffällig angestrengt, die Tiere atmen z. T. mit offenem Maule, röcheln ja schnarchen. Bei der Zerlegung werden bei einem Teile der Fälle umfangreiche sulzige Ergüsse im Kehlgange, um Kehlkopf und Luftröhre herum oder in der Nachbarschaft von Hautwunden, besonders solcher an den Schenkeln und bei einem anderen Teile der Fälle akut fibrinöse Pneumonien mit starker ödematöser Durchtränkung und Verbreiterung der interlobulären Septen gesehen. Vereinzelt kamen auch Fälle reiner Septikämien vor. Mäßige entzünd-

liche Erscheinungen bestanden außerdem manchmal am Darme. Der Ansteckungsstoff scheint mit Vorliebe von kleinen Wunden im Maule oder der äußeren Haut aus einzudringen. Träger des Ansteckungsstoffes sind besonders Fleischteile und Blut geschlachteter, kranker Tiere. Durch direktes Verfüttern oder durch Zwischenträger werden sie empfänglichen Tieren zugänglich gemacht. Der Wild- und Rinderseucherreger soll sich nach Migge nun besonders noch dadurch auszeichnen, daß er dazu neigt, nach dem Tode des Tieres in dessen Organen rasch zu zerfallen, möglicherweise soll dadurch schon seine Artfeststellung gesichert sein. Es fragt sich nun, ob das Vorgebrachte tatsächlich ausreicht, die Ansicht, daß die Wild- und Rinderseuche und die Schweineseuche zwei besondere, trennbare Krankheiten seien, zu begründen. Wirft man zur Beantwortung dieser Frage einen Blick in die geschichtliche Entwicklung der Lehre der Schweineseuche, so erhält man folgendes Bild: Eggeling, der als erster es öffentlich aus sprach, daß der damalige Rotlauf ein Sammelbegriff für mehrere, seuchenartige Krankheiten sei, schied zwischen Rotlauf und Schweineseuche und beschrieb dabei als Schweineseuche unseren heutigen Rotlauf, unter Rotlauf sicher auch unsere heutige Schweineseuche mit. Von seinem Rotlaufe sagt er nämlich, daß nicht selten die Haut unter dem Halse, namentlich im Bereiche des Kehlkopfes geschwollen und schmerzhaft sei und daß in manchen Fällen die Atmung angestrengt verlaufe und Schluckbeschwerden dazu treten. Bei der Sektion seien an den äußerlich geschwollenen Stellen Haut, Unterhaut und angrenzende Muskeln serös durchtränkt, die Schleimhaut der Respirationswege gerötet und geschwollen und die Lungen ödematös durchtränkt. Löffler, der im Reichsgesundheitsamte in den Jahren 1882—1885 Untersuchungen über Schweineseuchen anstellte und darüber 1885 berichtete, hatte schon im Jahre 1882 in eingefandten Schweinen öfter einen besonders feinen Bazillus und in einem Falle ovoide Bakterien, die denen der Kaninchenseptikämie glichen, gefunden. Er bezeichnete nun die Krankheit, als deren Ursache er die feinen Bazillen erkannt hatte, als Rotlauf und überließ weiteren Untersuchungen die Entscheidung, ob die von ihm in einem Falle gefundenen ovoiden Bakterien zu rotlaufähnlichen Epidemien Anlaß geben und als Schweineseuche oder Schweineseptikämie von dem eigentlichen Rotlauf abzutrennen seien. Die Veränderungen des Schweines, worin Löffler die ovoiden Bakterien gefunden hatte, hatten in einem enormen Ödeme am Halse, einer Rötung und Schwellung des Pharynx, einer dunkelroten Verfärbung und geringem Luftgehalt einiger Partien der Lunge und einer intensiven Rötung der Magen- und Zwölffingerdarmschleimhaut bestanden. Mit den Reinkulturen der ovoiden Bakterien, die Löffler aus diesem Schweine gezüchtet hatte, konnte er durch subkutane Impfung nicht nur kleine Versuchstiere, sondern auch ein Schwein tödlich infizieren. Dieses Schwein starb bereits 2 Tage nach der Impfung und wies neben einem enormen Ödem an der Impf-

stelle und deren Umgebung einen dem Ausgangschweine entsprechenden Organ- und bakteriologischen Befund auf.

Schütz, der bereits im nächsten Jahre (1886) das Ergebnis seiner Untersuchungen über Schweinefeuche mitteilte, ergänzte die Löfflerschen Beobachtungen zunächst dahin, daß auch akute, rasch tödlich ausgehende, fibrinös-nekrotisierende Lungenentzündungen durch die ovoiden, sich in den Ausstrichen aus dem Tierkörper meist bipolar färbenden Bakterien verursacht werden. Er hob sowohl bei den spontanen als auch bei den künstlich erzeugten Krankheitsfällen beim Schwein die teilweise sehr starke Verbreitung der Interstitien durch seröse Ergüsse in den entzündeten Lungen und auch die starken entzündlichen Ödeme nach subkutanen Impfungen an den Impfstellen und ihrer Umgebung hervor.

In der Schützschen Veröffentlichung findet sich nun außer den akuten Krankheitsfällen noch ein besonderer Fall verzeichnet, bei dem chronische Prozesse in Gestalt abgekapselter, käsiger Herde in den Lungen, den Lymphdrüsen und anderen Organen aufgetreten waren. Wenn Schütz nun auch in dem Falle bipolare Bakterien nachwies und den Fall danach der Schweinefeuche zurechnete, so gehörte dieser Krankheitsfall doch, wie später erkannt wurde, nicht zu dem Kreise der durch die bipolaren Bakterien hervorgerufenen Krankheiten. Dieser Krankheitsfall bildete seinerzeit aber doch die Überleitung zur Angliederung der chronisch katarrhalischen Lungenentzündungen als chronische Schweinefeuche an die damalige Schweinefeuche und bald danach auch noch zur weiteren Angliederung mehrerer anderer Krankheiten, darunter der Schweinepest, weil man auch bei diesen chronisch katarrhalischen Lungenentzündungen und den erwähnten anderen, Krankheiten vielfach bipolare Bakterien nachweisen konnte. Jahrzehntelanger, mühevoller Arbeit zahlreicher Forscher hat es bedurft, um die Schweinefeuche von dem aufgenommenen Ballast wieder zu befreien. Gelungen ist dies erst nach der Klärung der Ätiologie der Schweinepest. Diese Arbeiten über die Schweinefeuche ließen als ihr zugehörig schließlich nur übrig akute Septikämien im Anschlusse an Infektionen von der äußeren Haut oder der Maulhöhle, insbesondere des Nasenrachenringes oder auch des Darmes aus verbunden meist mit akut entzündlichen Erscheinungen an diesen Eintrittspforten, oft auch noch mit akuten Lungenentzündungen. Von fast allen Experimentatoren mit den bipolaren Bakterien wurde auch wieder darauf hingewiesen, daß diese Bakterien im lockeren Bindegewebe, so besonders in der Unterhaut und in den Interstitien der Lunge umfangreiche entzündliche Ödeme erzeugen können. Naturgemäß blieb der Nachweis der bipolaren Bakterien ein integrierender Bestandteil der Diagnose Schweinefeuche. Gegen diese Feststellungen sind ernst zu nehmende Einwände bislang nicht erhoben worden, gleichwohl geistert die Schweinefeuchtblähform der Vergangenheit noch immer durch Literatur und Praxis.

Über die Resistenz und Nachweisbarkeit der Schweinefeuchebakterien lehren die bisherigen Untersuchungen, daß sie sich nicht anders verhalten als die anderen bipolaren Bakterien bei unseren Haustieren. In den rasch tödlich ausgehenden Fällen und bei frühzeitiger Sektion sind sie leicht und reichlich in den Eintrittspforten, den besonderen Krankheitslokalisationen, in allen Organen und im Blute nachweisbar. Bei der im allgemeinen geringen Resistenz der bipolaren Bakterien können sie aber nachträglich durch Fäulnis oder andere Umstände verhältnismäßig rasch zugrunde gehen, auch können sie sich in Anfangsstadien und in den seltenen in Heilung übergehenden Endstadien nur in den Eintrittspforten und den Krankheitslokalisationen finden.

Vergleicht man nun das von Gude und Migge beschriebene Krankheitsbild der Wild- und Rinderfeuche des Schweines mit dem in der Geschichte niedergelegten der Schweinefeuche, naturgemäß unter Ausschaltung der ihr irrümlicherweise eine Zeitlang angegliedert gewesenen anderen Krankheiten, so zeigt sich, daß die beiden Bilder sich gleichen wie ein Ei dem andern derselben Tierart. Niemand ist auch beim besten Willen in der Lage sie auseinander zu halten. Daß man sich aber bei der Benennung der Krankheit lediglich in den einzelnen Fällen danach richten soll, ob anzunehmen ist, daß ein Erkrankungsfall unter Schweinen von einer Erkrankung unter Rindern ausging, oder ob für eine solche Annahme ein ausreichender Grund nicht vorliegt, wird selbst der schärfste Vertreter des Dualismus der beiden Krankheiten nicht verlangen wollen. Wohin sollte eine Fortsetzung dieses Benennungsverfahrens auch führen? Die seit langem bekannte Büffelfeuche, die nach Ursache und Erscheinungen völlig mit der Wild- und Rinderfeuche übereinstimmt, hat bei ihrem Auftreten oft auch auf Schweine

übergegriffen, ebenso sind Fälle von Übertragungen der Schweinefeuche auf Lämmer und Geflügel, der Geflügelcholera auf Nagetiere und von Migge anscheinend auch Übertragungen der Wild- und Rinderfeuche auf Hühner gesehen worden. Wir kämen danach zu einer Büffelfeuche des Schweines, außer der Wild- und Rinderfeuche des Schweines und der Schweinefeuche; einer Schweinefeuche und einer Wild- und Rinderfeuche des Geflügels neben der Geflügelcholera usw. Sicher ist, daß die einzelnen Varietäten der bipolaren Bakterien in ihrem pathogenen Verhalten große Unterschiede aufweisen. Solche Virulenzunterschiede lassen sich aber auch leicht künstlich an einem Stamme dieses bipolaren Bakteriums durch fortgesetzte Tierpassage durch eine bestimmte Tierart hervorrufen, wie es andererseits auch gelungen ist, durch besondere Ausleseverfahren bei der Kultivierung dieser Bakterien völlig apathogene Stämme zu erzeugen. Es sind auch kleine morphologische und kulturelle Unterschiede zwischen manchen Stämmen dieses Bakteriums festgestellt worden, Unterschiede, die viel tiefer greifen als es eine etwas wechselnde Resistenz einzelner Stämme im toten Tierkörper könnte. Gleichwohl darf v. Huttyra, einer unserer besten Kenner des bipolaren Bakteriums der Zustimmung aller Veterinärbakteriologen sicher sein, wenn er in der neuesten Auflage des Handbuches der pathogenen Mikroorganismen von Kolle-Wassermann (1928) sein Urteil über diesen Punkt in folgendem Satz zusammenfaßt: Die wesentliche Übereinstimmung der morphologischen, biochemischen und pathogenen Eigenschaften der Erreger der zur Gruppe der hämorrhagischen Septikämie gehörenden Krankheiten läßt keinen Zweifel darüber obwalten, daß sie sämtlich einer Bakterienart zugehören, die lediglich Standortsvarietäten (Rassen oder Typen) derselben darstellen. Gewiß wird es manchmal zweckmäßig und notwendig sein zum Ausdruck zu bringen, daß eine Infektion durch bipolare Bakterien bei einer bestimmten Tierart primär von einer anderen Tierart ihren Ausgang nahm, also beispielsweise zu sprechen von einer Schweinefeuche bedingt durch einen Rinder- oder Büffelfamm des bipolaren Bakteriums, widersinnig ist es aber geradezu, eine Krankheit, die sich weder nach dem Krankheitsbilde noch nach dem dabei gefundenen Erreger zerlegen läßt, lediglich nach dem Vorberichte einmal als Schweinefeuche, das andere Mal als Wild- und Rinderfeuche des Schweines und das dritte Mal als Büffelfeuche des Schweines bezeichnen zu wollen.

Zusammenfassend läßt sich demnach hier sagen: **Erwiesen ist für das Schwein genau wie für die anderen Haustiere das Vorkommen einer Infektionskrankheit, bedingt durch das bipolare Bakterium. Einzig und allein diese Krankheit hat der Geschichte nach ein Anrecht auf den Namen Schweinefeuche. Eine Zergliederung der Schweinefeuche in mehrere Krankheiten etwa nach der Herkunft des dem jeweiligen Erkrankungsfall zugrunde liegenden Bakterienstammes ist unmöglich.**

Nomenklatur.

Da es sich bei den bipolaren Bakterien, die Krankheiten unserer Haustiere verursachen, um eine Bakterienart handelt, so bleibt nichts anderes übrig, als sie unter einem gemeinsamen Namen zusammenzufassen. Die Vorschläge, die bislang in dieser Hinsicht gemacht worden sind und zwar teilweise schon vor langer Zeit, gehen zum Teil vom Krankheitsbilde, zum Teil von der Krankheitsursache aus. Vom Krankheitsbilde leiten sich die Bezeichnungen hämorrhagische und pluriforme Septikämie her, wovon die Bezeichnung pluriforme Septikämie wegen ihrer Unbestimmtheit eine Beibehaltung nicht verdient und die Bezeichnung hämorrhagische Septikämie insofern leider zu Mißdeutungen Veranlassung geben kann, als andere Septikämien unserer Haustiere, beispielsweise die akute Schweinepest, in viel höherem Maße einen hämorrhagischen Charakter zur Schau stellen als die Septikämie bedingt durch bipolare Bakterien. Von der Krankheitsursache geht aus die Bezeichnung Pasteurellose und die von mir vorgeschlagene Bezeichnung Bipolarisbazilliose (Gürtelbakterienfeuche) der Haustiere. Ich bin dabei der Meinung, daß man einem Namen, der etwas Kennzeichnendes für den Erreger einer Krankheit ausagt, einem solchen der aus dem Namen eines Forschers gebildet wurde, vorziehen soll und dies im vorliegenden Falle

um so mehr, als Pasteur nicht der Entdecker des bipolaren Bakteriums war.

Veterinärpolizeiliches.

Bei einer Neubearbeitung des Viehseuchengesetzes wird die Veterinärpolizei nicht umhin können, dem neueren Stande der Wissenschaft auf dem Gebiete der hämorrhagischen Septikämie (Gürtelbakterienseuche) unserer Haustiere gerecht zu werden, d. h. die Wild- und Rinderseuche vom Milzbrand und Rauschbrand, die Schweineseuche von der Schweinepest und auch die Geflügelcholera von der Hühnerpest trennen und diese drei Krankheiten unter einer Seuchenummer abhandeln müssen. Dabei würden sich die Maßregeln im jeweiligen Falle wie bisher im gleichen Umfange auf die direkt betroffene Tierart, bei der Geflügelcholera naturgemäß von vornherein weiter auf die gesamten Geflügelarten des betreffenden Gehöftes zu erstrecken haben. Auch könnten die jetzt bestehenden Maßregeln gegen die Geflügelcholera, die sich als zweckentsprechend bewährt haben, mit ganz geringfügigen Änderungen auf die Gürtelbakterienseuche des Schweines und des Rindes Anwendung finden. Die heute noch in Kraft befindlichen Bestimmungen gegen die Schweineseuche stammen bekanntlich aus einer Zeit, in der es unmöglich war, die Schweinepest von der Schweineseuche auseinanderzuhalten und wie wir jetzt sicher wissen, waren nach Ausscheidung der sogenannten chronischen Schweineseuche aus der veterinärpolizeilichen Bekämpfung die meisten als Schweineseuche angesehenen Erkrankungsfälle solche der Schweinepest. Da wir nunmehr bei der Diagnosestellung dieser beiden Krankheiten etwa die gleiche Höhe wie bei anderen Tierseuchen erreicht haben, so kann unbedenklich veterinärpolizeilich diese Trennung auch vorgenommen werden. Der Weg für eine einstweilige Angliederung der Schweineseuche an die Wild- und Rinderseuche wäre daher, solange das derzeitige Viehseuchengesetz in Kraft bleibt, auch jetzt schon geebnet. Von einem Schlachtverbot schweineseuchekranker, schweineseucheverdächtiger und ansteckungsverdächtiger Tiere wäre allerdings weiter abzusehen, da ein solches bei dieser Seuche Beobachtung der entsprechenden Schutzmaßregeln und unter Überwachung besondere Gefahren nicht in sich schließt.

Migge bemängelt am Schlusse seiner Arbeit die bestehende Bestimmung, wonach bei der Wild- und Rinderseuche eine Nachprüfung des amtstierärztlichen Gutachtens an einer anderen Stelle (Veterinäruntersuchungsamt) stattzufinden hat. Da beim Schwein bakteriologisch eine Unterscheidung von Wild- und Rinderseuche und Schweineseuche nicht möglich sei, dürfte sich seines Erachtens die Einfendung von Ausstrichpräparaten und Organanteilen dieser Tierart in jedem Falle erübrigen und in allen Fällen eines negativen Ergebnisses der Nachuntersuchung beim Rinde und Pferde müßte das Gutachten des beamteten Tierarztes für die Entschädigungsleistung von ausschlaggebender Bedeutung sein. Dieser Vorschlag bedeutet nicht mehr und weniger, als die Erklärung der völligen Bedeutungslosigkeit einer solchen Nachprüfung überhaupt. Ein solcher Vorschlag muß bei einem Vertreter eines Zweiges unseres Berufes, der sich spezialistisch mit der Bekämpfung von Infektionskrankheiten befaßt, überraschen. In voller Würdigung der Bedeutung des Vorberichtes, des klinischen und des Sektionsbefundes für die Diagnose einer Infektionskrankheit, muß doch gesagt werden, daß auf das wichtigste diagnostische Kriterium, den Nachweis des Erregers, da wo er irgendwie möglich ist, nicht verzichtet werden kann. Der Erregernachweis kann sicher bei der vorliegenden Krankheit auch nur in einem bakteriologischen Institute erfolgen, da bei bloßer mikroskopischer Untersuchung leicht Verwechselungen mit anderen Bakterien vorkommen können. Würde man auf diesen Erregernachweis verzichten, so würde, da das Krankheitsbild vielfach nicht ausreichend charakteristisch ist, die Rin-

derseuche verstreut über alle Provinzen so gut wie ständig vorkommen und aus den Fehldiagnosen könnte den betreffenden Veterinärbeamten noch nicht einmal ein Vorwurf gemacht werden. Wenn man Migge hierin also nicht zustimmen kann, so muß man ihm doch darin beitreten, daß die Bestimmung betreffs der Art des einzufendenden Materials verbesserungsbedürftig ist. Statt der Deckglasausstriche empfehlen sich zweifellos Objektträgerausstriche und neben Milz- und veränderten Muskelstückchen sollten noch Teile aus anderen Krankheitslokalisationen (Teile aus entzündlichen Ödemen mit regionären Lymphknoten, die etwa entzündeten Lungen oder auch die gesamten Eingeweide und bei vorgeschrittener Fäulnis auch noch der Fäulnis lange widerstehende Teile (Röhrenknochen) eingefandt werden. Auf möglichste Beschleunigung der Sektionen ist außerdem Bedacht zu nehmen. Ist schon wegen des in Betracht kommenden hohen Wertes beim Großvieh eine solche Materialeinfendung unentbehrlich, so sollte sie zum mindesten für eine gewisse Zeit auch für alle Schweineseuchefälle gelten und nicht nur für solche, die ihre Entstehung einem Gürtelbakterienstamme des Rindes ihre Entstehung verdanken, schon um endlich einmal einen zutreffenden Überblick über Vorkommen und Häufigkeit der Schweineseuche in der Gegenwart zu gewinnen.

Forensisches.

Wenn schon in der Veterinärpolizei für die Dauer das Zusammenwerfen der Schweinepest und der Schweineseuche untragbar wird, so gilt dies für die Forensis in noch weit höherem Maße. Während in der Veterinärpolizei die Grundzüge der Bekämpfung bei allen Seuchen die gleichen sind, ein Eingreifen bei ihr auch erforderlich wird in Verdachtsfällen und Sofortentscheidungen bei ihr die Regel sind, liegen in der Forensis nahezu bei jeder Krankheit die Verhältnisse wesentlich anders, die Diagnose muß auch unter Heranziehung aller Hilfsmittel des jeweiligen Standes der Wissenschaft gestellt werden und der Sachverständige kann sich bei der Diagnosestellung Zeit lassen. Eine Trennung der beiden Krankheiten ist daher in forensischer Hinsicht viel leichter durchzuführen als in veterinärpolizeilicher, damit entfällt auch jeder Grund für ihr weiteres Zusammenabhandeln als ein Gewährmangel. In jeder Hinsicht unbefriedigend ist das, was über Schweineseuche noch in der letzten Auflage von Fröhners Gerichtlicher Tierheilkunde (1928) vorgetragen wird. Eine Schweineseuche einer vergangenen Zeit blickt uns da entgegen, ein Gemisch aus der eigentlichen Schweineseuche (Gürtelbakterienseuche), der Schweinepest, der enzootischen Pneumonie und dazu noch einer weiteren Schweineseucheforte, deren Ursache nach einer schon vor einigen Jahren aufgestellten Behauptung in einem eigenen, filtrierbaren Virus gegeben sein soll, für deren Existenz aber irgend etwas Beweisendes bislang nicht beigebracht worden ist, trotzdem die Aufforderung in der Veterinärliteratur an den Urheber dieser Behauptung seinerzeit gerichtet wurde, für seine Behauptung auch den Beweis antreten zu wollen. Für dieses Krankheitsgemisch hält Fröhner eine durchschnittlich zehntägige Inkubation noch aufrecht, meint allerdings, daß nicht selten dabei ein kürzeres Inkubationsstadium (5 Tage) vorkomme. Er hält, wenn die Erkrankung erst in den letzten Tagen (8—10) der Gewährfrist bei dem Käufer zu Tage tritt, unter gewissen Voraussetzungen die Führung des Gegenbeweises gegen die rechtliche Vermutung, daß die Krankheit schon vor dem Kaufe vorhanden war, für möglich. Es ist aber keine Frage, daß man mit solchen Flickversuchen ein innerlich so stark auseinanderstrebendes Gebilde nicht mehr zusammenhalten kann. Man kann daher auch nur davor warnen, der Fröhnerschen Anleitung zu folgen. Es steht fest, daß die Schweineseuche genau wie die Gürtelbakterienseuche bei unseren anderen Hauttieren ein sehr kurzes Inkubationsstadium unter Umständen weniger als 24 Stunden haben

kann und daß ihre Diagnose einwandfrei, wie es für die Forensis doch unbedingt erforderlich ist, nur durch den Nachweis der bipolaren Bakterien und nicht wie Fröhner meint, allein schon auf Grund der epidemiologischen Verhältnisse und des Krankheitsbildes gestellt werden kann. Daraus ergibt sich einmal, daß die Schweinefeuche sich als Hauptmangel überhaupt nicht eignet und daher aus der

Hauptmängelliste gestrichen werden muß und zum anderen, daß die Diagnose Schweinefeuche zu forensischen Zwecken ohne den Erregernachweis einem Kunstfehler gleichkommt. Nur so ist auf diesem Gebiete zu einer Rechtspredung zu gelangen und werden Willkürentscheidungen, für die die Veterinärmedizin die Verantwortung trägt, für die Zukunft unmöglich gemacht.

(Aus dem Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover. — Direktor: Prof. Dr. Mießner.)

Das Bacterium bipolare.

(Mit 1 Abbildung.)

Von Dr. M. Rolle, Riga.

I. Morphologische und kulturelle Eigenschaften.

Die Studien über das Bacterium bipolare stammen aus der Zeit, in der man zuerst bei bestimmten Tierseuchen eigenartige kleine Spaltpilze im Blute kranker und toter Tiere beobachtete. Vom Beginn der bakteriologischen Forschung bis zu unserer Zeit herrschte über die Eigenschaften des Bacterium bipolare manche Unklarheit. Die in der Literatur angegebenen Eigenschaften sind so unbestimmt und vielfach auch bei anderen Bakterien zu finden, daß Verwechslungen oft vorgekommen sind.

Ich habe mir die Aufgabe gestellt, die Eigenschaften des B. bipolare systematisch nachzuprüfen. In dem vorliegenden Bericht will ich nur die morphologischen und kulturellen Eigenschaften behandeln. Zunächst sei an der Hand der Literatur ein Überblick über die Entwicklung unserer Kenntnisse von Bact. bipolare gegeben, wobei ich einiges über die Eigenschaften des Bakteriums anführen werde, wie sie in der Literatur niedergelegt sind.

Literatur.

Im Jahre 1877 hat Semmer in Dorpat eine Geflügelseuche beobachtet.

Das Blut der verendeten Tiere enthielt kleine Mikrokokken. Angestellte Fütterungsversuche an vier gefundenen Hühnern verliefen tödlich und ergaben ähnliche Krankheitsercheinungen wie bei natürlich erkrankten Tieren.

Im Jahre 1878 beschrieb Bollinger eine eigentümliche Seuche bei Wildschweinen, Hirschen und Rindern. Im Sommer des Jahres 1878 gingen in der Umgebung von München 234 Wildschweine und 153 Hirsche ein. In derselben Zeit kamen in verschiedenen Ortschaften der Umgebung Erkrankungs- und Todesfälle bei Rindern vor. Die Krankheitssymptome und Veränderungen in den Organen stimmten mit den beim Wild beobachteten überein.

Später hat Kitt von Bollinger getrocknete und aufbewahrte Blutausstriche untersucht und konnte kleine an den Polen färbbare Kurzstäbchen nachweisen.

Im Jahre 1879 berichtet Perroncito über eine Hühnerseuche unter dem Namen epizootisches Typhoid der Hühner. Er versteht darunter die schon früher bekannte Cholera der Hühner. Die Seuche hat er von Oktober 1877 bis 1878 beobachtet. Sehr häufig fand er im Blutplasma an der Seuche verendeter Hühner mehr oder weniger viel blasse Körner mit Brown'scher Molekularbewegung. Mit solchem Blut konnte er gesunde Hühner tödlich infizieren.

Im selben Jahr hat Toussaint endgültig festgestellt, daß der Erreger ein bestimmtes Bakterium ist. Er züchtete den Erreger in neutralem Urin.

Pasteur (1880) züchtete das Bakterium in alkalischer Hühnerbouillon in Reinkultur und leitete seine klassischen Immunisationsstudien ein. Über die Morphologie äußerte sich Pasteur, daß das Bakterium jedenfalls nicht in die Gruppe der Vibrionen gehört. Er sah den Mikroben in der Mitte leicht eingeschnürt und die Enden erschienen ihm im ersten Augenblick als zwei isolierte Punkte.

Im Jahre 1881 hat Löffler denselben Mikroben aus einem Huhn mit hämorrhagischer Enteritis schon auf festem Nährboden gezüchtet (Hühnerbouillon-Gelatine).

1884 untersuchte Kitt aus einem Bestand mit epizootischem Typhoid 2 Hühner. Im Blute und Lungenfate beider Tiere fanden sich im Methylvioletpräparat zahllose kreisrunde Kokken.

Auf Fleischwasserpeptongelatine äußerte sich das Wachstum „in dem Auftreten eines mattweißen, durchsichtigen, zarten Oberflächenbelages, welcher den Nährboden fest ließ“. Im Jahre 1880 beschrieb Davaine eine Kaninchenseptikämie. Das Blut verendeter Kaninchen war infektiös für gesunde Tiere.

Gaffky (1881) hat an 2 Kaninchen durch Einspritzung von Panke-Wasser eine Septikämie hervorgerufen und bei den Tieren eine bestimmte Bakterienart gefunden, welche für Kaninchen, Mäuse, Tauben und Hühner infektiös war, aber für Hunde apathogen. Im Blut von toten Tieren gefundene Bakterien charakterisiert Gaffky folgendermaßen: „Die Bakterien sind etwas mehr als doppelt so lang wie breit, haben abgerundete Enden und färben sich mit Anilinfarben in der Weise, daß zwischen den intensiv gefärbten Polen in der Mitte etwa ein Drittel der ganzen Länge ungefärbt bleibt. Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man sie für je zwei nebeneinanderliegende Mikrokokken halten. Die Größe dieser Organismen, die man als in der Mitte zwischen Mikrokokken und Bazillen stehend, nach der gebräuchlichen Terminologie als Bakterien im engeren Sinne bezeichnen müßte, beträgt in der Längsrichtung 0,0014 mm, in der Breite 0,0006 bis 0,0007 mm.

Die Bakterien wuchsen vortrefflich, wenn auch nur langsam, in Blutserumgelatine, sowie in Fleischwasserpeptongelatine. In diesen Nährsubstanzen haben diese septikämischen Bakterien ein so charakteristisches Wachstum in Gestalt runder, auf den Impfstich beschränkter, bleibender, heller, ganz fein graumeliertes Tröpfchen, daß wir regelmäßig mit großer Sicherheit entscheiden konnten, ob die Kultur rein sei oder nicht. Die Bakterien zeigen keine selbständigen Bewegungen.“

Eber (1882) hat einen ähnlichen Mikroorganismus bei einem spontan eingegangenen Kaninchen gefunden. Auf der Pleura und dem Perikard des Kaninchens befand sich ein dicker, käsiger, rahmähnlicher Belag. Toussaint (1879) hat als erster den Verdacht geäußert, daß die Kaninchenseptikämie und die Hühnercholera identisch sind. Im Jahre 1882 untersuchte Löffler ein Schwein, welches an Rotlauf eingegangen sein sollte. Die isolierten Bakterien waren den bei der Kaninchenseptikämie gefundenen sehr ähnlich. Auf Grund seiner Untersuchungen hat Löffler die von diesen Bakterien hervorgerufene Krankheit als Schweinefeuche oder Schweineseptikämie bezeichnet.

Aus einem Bestande, in dem im Laufe eines Jahres ca. 200 Schweine unter ähnlichen Symptomen eingegangen waren, untersuchte Schütz (1886) drei Tiere, bei denen er eine akute Lungenbrustfellentzündung feststellte. Er fand ähnliche Veränderungen, wie sie Bollinger schon bei Wildschweinen gesehen hatte und bezeichnete sie als multiple mortifizierende Pneumonie. Über die Krankheit selbst äußert sich Schütz folgendermaßen: „Es steht nunmehr fest, daß die durch die ovalen Bakterien bedingte und als Schweinefeuche bezeichnete Krankheit mit Rotlauf nichts zu tun hat, auch keine Septikämie im Sinne des Wortes, sondern eine infektiöse Pneumonie ist.“ Die morphologischen und kulturellen Eigenschaften des Erregers sind ähnlich wie Gaffky sie bereits schilderte.

Hueppe (1886), der hauptsächlich mit künstlich infizierten Tieren arbeitete, beobachtete oft septikämische Erscheinungen und auf Grund seiner Befunde und der einschlägigen Literatur schreibt er: „Ich möchte deshalb vorschlagen, die Wildseuche Septicaemia haemorrhagica zu nennen und eine kutane, pectorale und eine intestinale Form zu unterscheiden. Die Auffassung von Schütz, daß die Schweinefeuche keine Septikämie im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern eine infektiöse Pneumonie sei, schien ihm viel zu weit zu gehen.“ Seit dieser Zeit

spricht man von der hämorrhagischen Septikämie und bezeichnet oft den Erreger als *Bacterium septicaemiae haemorrhagicae*.

Kitt beobachtete eine ähnliche Krankheit bei Rindern und Schweinen, welche mit der von Bollinger beschriebenen übereinstimmte und statt *Septicaemia haemorrhagica* schlug er vor, sie *Septicaemia pluriformis* zu nennen. Den Erreger bezeichnete er als *Bacterium bipolare pluricidum*. Kitt beschrieb das Bakterium als einen kurzen unbeweglichen sporenlosen gramnegativen Mikroorganismus, welcher sich mit wässrigen Anilinfarbstoffen zu färben pflegt, aber nur an den beiden Polen sich intensiv tigt und wobei ein Mittelteil ungefärbt bleibt oder nur schwache Färbung annimmt. Er wächst aerob auf Gelatine und Agar in Gestalt weißlicher, hyaliner Tropfen auf der Oberfläche und im Stich; die Gelatine wird dabei nicht verflüssigt, Bouillon wird schwach getrübt und Indol gebildet. Kohlehydrate werden überhaupt nicht angegriffen. Unter dem Namen *Septicaemia pluriformis* versteht Kitt nur die sog. Wild- und Rinderseuche. Den Erreger der Geflügelcholera bezeichnet er als *Bacterium bipolare avisepticum* und den Erreger der Schweineseuche als *Bacterium suisepiticum*.

Lignières (1900) charakterisiert daselbe Bakterium als unbeweglichen, polymorphen und involutionsfähigen Kokkobazillus, welcher Gelatine nicht verflüssigt, Milch nicht zur Gerinnung bringt und ihre Reaktion nicht verändert, keine sichtbaren Kulturen auf der natürlich sauren Kartoffel gibt, keine Indolbildung zeigt und keine Sporen und keine Geißeln besitzt. Die Bakterien belegt er mit dem Sammelnamen *Pasteurella*.

Hutyra (1913) tritt für die Bezeichnung *Bacillus bipolaris septicus* ein, wobei durch die Vorausstellung des Tiergattungsnamens vor das zweite Beiwort die jeweilige Varietät leicht und klar bezeichnet werden kann. Er beschreibt den *Bacillus bipolare septicus* wie Lignières, und fügt hinzu, daß auf Endo- und Malachitgrün-Agar kein Wachstum erfolgt, während der Bazillus auf Drigalski-Agar ohne dessen blasse Farbe zu ändern gut gedeiht. Er bildet keine Hämolyse. Indolbildung ist dagegen manchmal vorhanden.

Busson (1922) führt die biochemischen Eigenschaften von 21 Stämmen „aus der Gruppe der hämorrhagischen Septikämie“ an. 16 Stämme bildeten Säure in Barsiekow Traubenzucker; 7 von diesen auch in Barsiekow Milchsüßer. Alle 16 Stämme bildeten Indol. Vier Stämme, welche Milch- und Traubenzucker nicht unter Säurebildung angriffen, waren auch Indol negativ. Ein in Zucker säurenegativer Stamm erzeugte in Traubenzucker Gas und bildete Indol.

Plasaj und Pribram (1922) haben 20 Stämme des *Bacterium bipolare* untersucht, von welchen 7 beweglich und 13 unbeweglich waren. Von den letzteren waren 7 mit Geißeln versehen. Im allgemeinen bildeten die beweglichen mit Geißeln behafteten Stämme Gas in Traubenzucker, brachten Milch zur Gerinnung und bildeten Indol. Die Stämme ohne Geißeln erzeugten kein Gas und kein Indol und ließen die Milch unverändert. Auf Grund ihrer Untersuchungsbefunde behaupteten die Autoren, daß die Bakterien der hämorrhagischen Septikämie einerseits mit dem *Bacterium coli* und andererseits mit den Bakterien der Paratyphus-Gruppe nahe verwandt erscheinen.

Lehmann und Neumann (1927) sprechen von einer Sammelart des *Bacterium septicaemiae haemorrhagicae* und teilen sie in folgende Unterarten ein: 1. *Bact. suicida*, 2. *Bact. multocidum*, 3. *Bact. des Barbone dei Buffali*, 4. *Bact. avicidum*, 5. *Bact. cuniculicida*.

Reed und Etinger (1927) beschrieben eine Meerfischweinchenseuche unter dem Namen „hämorrhagische Septikämie“ und gaben an, daß der Erreger Hämolyse auf der Blutplatte hervorruft.

Aus der angeführten Literatur ist zu ersehen, daß über die Eigenschaften des *Bacterium bipolare* bisher noch manche Unklarheit herrscht. Die von den verschiedenen Autoren angegebenen Definitionen sind sehr unbestimmt und von einander abweichend und zum Teil widersprechend.

Eigene Untersuchungen.

Um die morphologischen und kulturellen Eigenschaften des *Bacterium bipolare* einer Nachprüfung zu unterziehen, habe ich insgesamt 60 Stämme untersucht und zwar: 13 Stämme Geflügelcholera, 34 Stämme Schweineseuche, 7 Stämme Kaninchenseuche, 1 Stamm Wild- und Rinder-

seuche, 2 Stämme aus dem Meerfischweinchenseuche, 2 Stämme Kälberpneumonien, 1 Stamm aus der Katze.

In Ausstrichen von veränderten Organen oder bei akut eingegangenen Tieren aus dem Herzblut, die mit verdünntem Karbolfuchsin gefärbt sind, sieht man Stäbchen, die wenig länger als breit sind, die meistens oval aussehen. Bei nicht zu starker Färbung erscheint bei einzelnen Stäbchen das Mittelstück etwas heller als die Pole. In den veränderten Organen sieht man mitunter etwas längere Stäbchen als gewöhnlich.

In Kulturausstrichen treten die Größenunterschiede zwischen den einzelnen Bakterien sehr deutlich hervor. Auf Nährböden sind die Bakterien sehr veränderlich in ihrer Form. In Ausstrichen aus ein und demselben Stamm sieht man sowohl ziemlich lange ovale Stäbchen, als auch daneben sehr kurze Formen, welche mehr den Kokken als den Stäbchen ähneln. Unter den Stäbchen findet man oft lange und dicke Fäden. In einzelnen Fällen überwiegen sogar die Fäden die anderen Formen. Neben den langen Fäden zeigen sich immer auch kurze ovale und mitunter kugelförmige Gebilde. Nach dem morphologischen Bilde könnte man fast annehmen, verunreinigte Kulturen vor sich zu haben. Bei der Nachprüfung kann man sich überzeugen, daß eine Reinkultur vorliegt. Im Dunkelfeld sieht man unbewegliche, ovale, kurze Stäbchen. Die Enden brechen das Licht mehr als die Mitte. Färberisch erscheint das *Bact. bipolare* gramnegativ. Auf gewöhnlichem Agar wächst das *Bact. bipolare* in mattgrauen kleinen Kolonien. Auf Serumagar ist das Wachstum üppiger und die Kolonien sind größer. Bouillon wird getrübt und manchmal bildet sich auch ein geringer Bodensatz. In Milch- und Traubenzuckerbouillon wird kein Gas gebildet. In Barsiekow mit Milch- und Traubenzucker wird keine Säure gebildet. Die Milch bleibt unverändert. Die Indolbouillon*) ist nach 24stündiger Bebrütung bei 37 Grad C getrübt. Nach dem Zusatz von 1 ccm Ehrlichschem Reagenz zu jedem Röhrchen (p. Dimethylamidobenzaldehyd 5,0, Methylalkohol 50,0, Acid. hydrochloricum 40,0) tritt Rotfärbung ein.


Auf der Blutplatte sehen die Kolonien des *Bact. bipolare* nach 24 Stunden rund und etwas erhaben aus, haben keine Eigenfarbe, verursachen keine Hämolyse und lassen den Nährboden unverändert. Nach 36—48 Stunden Brutfrankaufenthalt bilden die Kolonien flache, runde Scheibchen. Am Rande sind diese Scheibchen erhaben und erinnern an Wallbildung. Die Erhabenheit gehört der Kolonie an und umläuft sie völlig wie ein Ring. Manchmal bilden sich zwei konzentrische Ringe (s. Abb.). Diese Kolonieförmigkeit auf der Blutplatte ohne Veränderung des Nährbodens ist typisch für das *Bact. bipolare*. Bei anderen Bakterien habe ich bis jetzt eine solche Wuchsform nicht beobachtet. Die Blutplatte darf nicht zu trocken sein. Am besten ist sie 12—30 Stunden nach der Zubereitung zu benutzen.

Differentialdiagnose.

Auf normalen Schleimhäuten und vielfach auch als Begleitbakterien in krankhaft veränderten Organen kann man morphologisch dem *Bact. bipolare* sehr ähnliche Mikroorganismen finden. Manchmal tritt bei ihnen die Bipolarität mehr in Erscheinung als bei dem eigentlichen *Bact. bipolare*. Aber die erwähnten Bakterien wachsen auf der Blutplatte ganz anders. Im Grunde genommen sind sie

*) Zu 1000 ccm einer 1prozentigen Peptonlösung setzt man 5 Gramm Liebig's Fleischextrakt, 5 Gramm Kochsalz und 7 ccm n/10-NaCl-Lösung über den Lackmuspunkt zu, kocht auf, läßt auf ca. 40 Grad C abkühlen, füllt in eine Flasche mit gutschließendem Glasstopfen, gibt 0,2 Gramm Trypsin und 10 ccm Chloroform hinzu, schüttelt tüchtig und bebrütet 24 Stunden bei 37 Grad C. Die Brühe wird dann filtriert, mit drei Teilen physiologischer Kochsalzlösung verdünnt und in Röhrchen zu etwa 5 ccm-abgefüllt und im Dampftopf sterilisiert.

keine einheitlichen Bakterien. Einige wuchsen in großen grauen Kolonien mit Hämolyse, andere in Form kleiner runder Kolonien von milchiger Farbe. In der Regel bilden sie kein Indol.



a) Kolonien des Bact. bipolare. b) Mikrokokkenkolonie.

Nur coliartige Bakterien, welche sich bekanntlich auch bipolar färben, bilden immer Indol; aber sie sind beweglich und bilden Säure und Gas in zuckerhaltigen Nährböden. Auf der Blutplatte wachsen sie als große Kolonien von milchiger Färbung mit Hämolyse.

Einzelne Streptokokkenarten bilden auf der Blutplatte nach 40—60 Stunden Brutfrankaufenthalt auch kleine flache Kolonien, an deren Rand zuweilen auch ein Ring bemerkbar ist.

Aber an der Umgrenzung der Kolonien ist zumeist mehr oder weniger Hämolyse zu beobachten. Ein gefärbter Ausstrich und das Anstellen der Indolprobe machen den Unterschied stets sehr deutlich.

Aus dem oben Gefagten können wir entnehmen, daß bei der Identifizierung des Bact. bipolare die Blutplatte unentbehrlich ist; ferner ist die Indolbildung eine konstante Eigenschaft. Durch sie erfahren wir, daß das Bact. bipolare ein Eiweiß zersetzendes Bakterium ist. Milchsücker und Traubenzucker greift es nicht an.

Unter dem Namen Bact. bipolare müssen wir Bakterien mit nachstehenden ganz bestimmten morphologischen und kulturellen Eigenschaften verstehen:

Das Bakterium bipolare ist ein kleiner, ovaler, manchmal ganz runder, manchmal in Kulturen zu dicken Fäden auswachsender Mikroorganismus. In zuckerhaltigen Nährböden bildet es keine Säure und kein Gas; auf der Blut-

platte bildet es nach 36—48 Stunden Brutfrankaufenthalt scheibchenartige, flache, runde, mit Ringbildung versehene, farblose Kolonien, die keine Hämolyse und andere Veränderungen des Nährbodens bedingen. In Neisserscher Indolbouillon bildet es Indol.

Die von Busson, Plasaj und Pribram unterfuchten Bakterien sind auf Grund der angeführten Eigenschaften nicht als Bacterium bipolare zu bezeichnen.

Auf die weitere Einheit oder Verschiedenheit des Bact. bipolare werde ich nach Abschluß meiner Studien über das Verhalten des Bakteriums im Tierkörper eingehen.

Literatur.

1. Bollinger: Über eine neue Wild- und Rinderseuche, welche im Sommer 1878 in der Umgebung von München beobachtet wurde. München, Finsterlin 1878.
2. Busson: Die Erreger der hämorrhagischen Septikämie. Centralbl. für Bakt. ufw. Abt. I, Orig., Bd. 86, S. 101, 1922.
3. Ebert, J. C. und Mandry, G.: Die spontane Kaninchen-Septikämie. Fortschritte der Medizin 1890, Bd. 8, Nr. 14. Centralblatt f. Bakt. ufw. 1890, Bd. 8, S. 775.
4. Gaffky: Experimentell erzeugte Septikämie mit Rücksicht auf progressive Virulenz und akkomodative Züchtung. Mitteilungen aus dem Kaiserl. Gesundheitsamte 1881, Bd. I, S. 80.
5. Hueppe: Über die Wildseuche und ihre Bedeutung für die Nationalökonomie und die Hygiene. Berliner Klinische Wschr. 1886, S. 753.
6. Hutyrá: Septicaemia haemorrhagica. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen 1913, Bd. 6.
7. Kitt: Bakterienkunde und Pathologische Mikroskopie für Tierärzte 1908, S. 246. Derselbe: Experimentelle Beiträge zur Kenntnis des epizootischen Geflügeltyphoids. Jahresbericht der K. Central-Tierarztschule in München 1883—1884, S. 62.
8. Lehmann-Neumann: Bakteriologische Diagnostik. 7. Aufl. Bd. II, S. 337.
9. Lignières: Contrib. a l'étude et a la classif. des Sept. hemorrh. Buenos Aires 1900.
10. Löffler: Experimentelle Untersuchungen über Schweinerotlauf, ausgeführt in der Zeit vom Juli 1882 bis Dezember 1883 im Kaiserl. Gesundheitsamte. Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamte 1886, Bd. I, S. 46.
11. Pasteur: Sur les maladies virulentes, et en particulier sur la maladie appelée vulgairement „cholera des poules“. Recueil de Medicine Veterinaire 1880, Vol. 57, T. 7, 6. Serie, S. 125.
12. Perroncito: Über das epizootische Typhoid der Hühner. Archiv für wissenschaft. und prakt. Tierheilkunde 1879, Bd. 5, S. 22.
13. Plasaj und Pribram: Zur Systematik der Bacteria bipolaria. Centralbl. für Bakt. ufw. 1922, Bd. 87, S. 1.
14. Reed G. B. and Ettinger: An epizootic of hemorrhagic Septicemia in Guinea-Pigs. The Journal of infectious Diseases 1927, Vol. 41, S. 439.
15. Semmer: Über die Hühnerpest. D. Zschr. f. Tiermedizin u. vergleichende Pathologie 1887, Bd. 4, S. 244.
16. Schütz: Über die Schweineseuche. Archiv für wissenschaft. und prakt. Tierheilkunde 1886, Bd. 12, S. 210.
17. Toussaint: Identite de la septicaemie experimentale aigue et du cholera des poules. Compt. rend. 12. Aug. 1880. T. XCI. Nr. 5.
18. Voges: Kritische Studien und experimentelle Untersuchungen über die Bakterien der hämorrhagischen Septikämie und die durch sie bewirkten Krankheitsformen. Zschr. für Hygiene und Infektionskrankheiten 1896, Bd. 23, S. 149.

(Aus dem Institut für Seuchenlehre der Tierärztlichen Hochschule in Budapest.)

Zur bakteriologischen Differentialdiagnose zwischen Geflügelcholera und Hühnertyphus. *)

Von Prof. Dr. R. Manninger.

Die Erreger der Geflügelcholera (*Bacillus avisepticus*) einerseits und die des Hühnertyphus und der Kükenruhr (*B. gallinarum*) andererseits sind wohl charakterisierte Bakterienarten, zwischen denen hinlänglich konstante Unterschiede bestehen, um eine sichere Bestimmung zu ermöglichen. Dennoch kommen auch in der neuesten Zeit noch, offenbar infolge der Anwendung unrichtig diagnostizierter Vergleichsstämme, Verwechslungen häufig vor, ja es wurde

fogar des öfteren die Vermutung ausgesprochen, *B. gallinarum* gehöre in die Gruppe der Bakterien der hämorrhagischen Septikämie. Es schien mir daher nicht überflüssig, die Unterscheidungsmerkmale zwischen den beiden Bakterienarten einer kurzen Besprechung zu unterziehen. Dabei sei betont, daß ich, entsprechend meiner Auffassung¹⁾ über die Arteinheit von *B. gallinarum* und seiner gasbildenden Varianten (*B. pullorum*), zu der etwa gleichzeitig und

*) Vorgetragen auf der 90. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg 1928.

¹⁾ Közlem. az össeghasonlító élet-és kórtan köréből (ungarisch) 1927, 21, 101; Zschr. für Inf.-Krankheiten ufw. der Haustiere 1928, 32, 265.

unabhängig von mir auch Klimmer und Haupt²⁾, sowie Dalling, Mason und Gordon³⁾ gelangt sind, die gasbildenden Gallinarum-Stämme nicht gelondert zu behandeln gedenke.

Daß Verwechslungen vorgekommen sind und noch vorkommen, hat seinen letzten Grund darin, daß beiderlei Bakterien unbewegliche, nach Gram nicht färbbare, nicht sporenbildende, Laktose nicht vergärende und Gelatine nicht verflüssigende Mikroorganismen sind, deren Kulturen auch auf Agar nicht hinlängliche Unterschiede aufweisen. Die dennoch feststellbaren durchgreifenden Unterschiede sind teils morphologischer, teils kultureller, teils immunobiologischer Natur.

Was nun vorerst die Morphologie der beiden Bakterienarten betrifft, so muß betont werden, daß in erster Linie die sog. Bipolarität des *B. avisepticus* das meiste dazu beigetragen hat, daß *B. avisepticus* und *B. gallinarum* seit altersher vielfach in eine Gruppe zusammengeworfen worden sind. Tatsächlich ist die bipolare Färbbarkeit eine sehr auffallende Eigenschaft des Geflügelcholerabazillus, die ihm scheinbar mit Recht den Namen *B. bipolaris avisepticus* eingetragen hat. Eben diese besondere Betonung der Bipolarität des *B. avisepticus* war aber der Grund davon, daß vielfach der Nachweis einer Bipolarität genügt hat, um einen fraglichen Stamm in die Art *B. avisepticus* einzureihen. Nun ist bekannt, daß auch andere gramnegative Keime die Neigung haben, unter gewissen Umständen eine bipolare Färbung anzunehmen, so insbesondere Bakterien der Coliparatyphusgruppe und auch der *B. gallinarum*. Dies ist, wie auch beim Geflügelcholerabazillus, der Fall, wenn die Keime unter ungünstigen Verhältnissen einer Entartung unterliegen. Die Bipolarität ist somit, sowohl bei dem *B. avisepticus* als auch bei dem *B. gallinarum*, bloß der Ausdruck einer mehr oder weniger vorgeschrittenen Entartung und darf daher keineswegs als ein Artmerkmal des Geflügelcholera-bazillus aufgefaßt werden.⁴⁾ Es wäre daher dringend erwünscht, die Bezeichnung des Geflügelcholera-bazillus als bipolares Stäbchen ganz fallen zu lassen.

Wenn nach dem Gesagten die bipolare Färbbarkeit kein Unterscheidungsmerkmal zwischen den hier in Rede stehenden Mikroorganismen abgibt, so lassen sich unter geeigneten Verhältnissen beide Bakterienarten auf Grund morphologischer Eigentümlichkeiten dennoch unterscheiden und zwar durch die verschiedenen Größenverhältnisse. Untersucht man nämlich junge, 12–24 Stunden alte Kulturen, dann sind die einzeln stehenden Bazillen der Art *B. avisepticus* überaus klein, kokkenähnlich oder Kokkobazillen, mit einem Durchmesser von nur 0,15–0,25 μ , während die der Art *B. gallinarum* deutliche Stäbchenform zeigen und etwa 0,6–1,1 μ lang sind. Diese Größendifferenz reicht hin, um von einem *B. avisepticus*-Stamm sagen zu können, daß er sicherlich kein *B. gallinarum* ist und umgekehrt. Diese Größenverhältnisse lassen sich jedoch nur verwerten, solange die untersuchten Bazillen gesund sind und namentlich keinerlei Anflug einer bipolaren Färbbarkeit zeigen. Sobald nämlich eine Entartung einsetzt (sei es zufolge der Einwirkung von Stoffwechselprodukten in nicht ganz jungen Kulturen, oder infolge lytischer Einwirkungen im Tierkörper, oder aus einem anderen Grunde), so quellen die Bakterien durch Wasseraufnahme auf und nehmen gleichzeitig den Farbstoff nicht mehr gleichmäßig an. Damit verwischt sich dann der Größenunterschied zwischen den beiden Arten, da unter solchen Umständen auch der Geflügel-

cholerabazillus ebenso wie der *B. gallinarum* bedeutende Dimensionen (über 2–3 μ Länge) annehmen kann.

Es klingt paradox, es ist dem jedoch so, daß folglich der als Prototyp der „bipolaren“ Bakterien bekannte Geflügelcholerabazillus auf Grund von morphologischen Erhebungen nur dann sicher als solcher erkannt werden kann, wenn er keine bipolare Färbung erkennen läßt. Bei der Verarbeitung von Material von kranken Tieren, insbesondere von Kadavern, wo es besonders viele degenerierte Bazillen gibt, darf somit durch die mikroskopische Untersuchung allein die Diagnose Geflügelcholera im besten Falle nur dann gestellt werden, wenn sich neben verschiedenen großen bipolar gefärbten Stäbchen auch kokkenähnliche, die Farbe gleichmäßig annehmende Individuen vorfinden mit einem Durchmesser von höchstens 0,25 μ . In jedem anderen Falle hat man die Diagnose durch die kulturelle Prüfung der Keime zu erhärten.

Ist man nämlich mit der mikroskopischen Untersuchung nicht immer imstande, *B. avisepticus* und *B. gallinarum* voneinander zu unterscheiden, so gelingt dies immer, wenn man in Kulturen die Gärungsfähigkeit sowie die Indolbildung prüft.

In Bezug auf das Gärvermögen Kohlehydraten und höheren Alkoholen gegenüber sind Stämme beider Bakterienarten durch eine Reihe von Forschern geprüft worden und zwar sind hierzu die verschiedensten Verbindungen verwendet worden. In differentialdiagnostischer Hinsicht lassen sich jedoch praktisch nur zwei Zuckerarten gebrauchen: Laktose und Saccharose. Das Unvermögen Laktose anzugreifen ist beiden Bakterienarten gemein und daher zu ihrer Unterscheidung von Laktose vergärenden Arten (*B. coli*, *B. aerogenes*) praktisch verwertbar. Zur Unterscheidung des *B. avisepticus* vom *B. gallinarum* ist hingegen nur die Prüfung der Gärungsfähigkeit Saccharose gegenüber anwendbar. Saccharose wird nämlich nur durch den *B. avisepticus* unter Säurebildung angegriffen, vom *B. gallinarum* dagegen überhaupt nicht. Differentialdiagnostisch wichtig ist somit die Tatsache, daß der *B. avisepticus*, im Gegensatz zum *B. gallinarum*, Saccharose zerlegt. Diese Regel läßt sich praktisch bereits bei der Herauszüchtung des Geflügelcholera-bazillus aus dem Tierkörper verwerten, wenn man die Ausfaat des Untersuchungsmaterials auch auf einem Nährboden vornimmt, der dem Drigalski'schen Agar ähnlich, jedoch ohne Kristallviolett hergestellt, statt Laktose Saccharose enthält. *B. avisepticus* entwickelt sich nämlich auf diesem Nährboden ziemlich üppig in Form roter Kolonien, während *B. gallinarum* in farblosen Kolonien wächst. Es empfiehlt sich gleichzeitig auch eine Platte mit Drigalskischem Agar (ohne Kristallviolettzusatz) zu beimpfen, auf dem beiderlei Bakterienarten farblose Kolonien bilden. (Unterschied gegenüber *B. coli* und verwandten Keimen, die z. T. Saccharose ebenfalls vergären und darin dem *B. avisepticus* gleichen.)

Ebenso wichtig wie die Saccharosevergärung, ist auch die Fähigkeit des *B. avisepticus*, aus Tryptophan Indol abzuspalten, während *B. gallinarum* Indol nicht zu bilden vermag. In der Literatur finden sich allerdings Angaben vor, wo bei der Prüfung unzweifelhaft richtig diagnostizierter Geflügelcholerabazillen keine Indolbildung nachgewiesen wurde. In diesen Fällen war indes offenbar die unzureichende Technik an dem Mißlingen des Versuchs Schuld. Eigene Versuche sowie solche von Fazakas und Takáts im Institut für Seuchenlehre zeigten nämlich, daß die Indolbildungsfähigkeit des Geflügelcholerabazillus nur dann, aber in diesem Falle stets, energisch in Erscheinung tritt, wenn für die Erfüllung folgender Bedingungen Sorge getragen wird.

1. Zunächst hat man einen Nährboden, Bouillon, zu verwenden, in dem sich die Bakterien bei entsprechender chemischer Reaktion üppig zu vermehren vermögen. In dieser

²⁾ Centralbl. für Bakt. 1928, I. Abt., Orig., 105, 99.

³⁾ The Vet. Journ. 1927, 83, 555.

⁴⁾ Ich bin auf diese Verhältnisse in meiner Darstellung der Geflügelcholera im Handbuch der pathogenen Mikroorganismen von Kollé und Wassermann (3. Aufl., Bd. 6, S. 529) näher eingegangen und darf mich daher hier mit einem Verweis auf die genannte Arbeit begnügen.

Hinsicht ist zu beachten, daß die Wasserstoffionenkonzentration, in pH ausgedrückt, nicht weniger als 7,4 und nicht mehr als 7,8 betragen soll.

2. Dann muß der Nährboden auch genügend Rohstoff, Tryptophan, für die Indolabspaltung enthalten. In dieser Hinsicht ist von Wichtigkeit, daß es nicht genügt, einfach ein Peptonpräparat dem Nährboden beizumischen, denn nicht jedes Peptonpräparat enthält genügend Tryptophan. Man muß sich daher gegebenenfalls vergewissern, ob der Tryptophangehalt des verwendeten Peptons tatsächlich ausreicht, um eine Indolabspaltung durch Standardstämme zu ermöglichen. Am vorteilhaftesten ist es übrigens, Martin'sche Bouillon zu verwenden, die bei regelrechter Herstellung stets reichlich Tryptophan enthält.

3. Endlich kann die Indolbildung durch Geflügelcholera-bazillen nur stattfinden, wenn der Geflügelcholera-bazillus gezwungen wird, Tryptophan abzubauen und auf diese Weise Indol zu erzeugen. Dies trifft jedoch nur zu, wenn dem Bazillus nicht leicht vergärbare Verbindungen zur Verfügung stehen, namentlich Zuckerarten oder hochmolekulare Alkohole, die durch den Geflügelcholera-bazillus zerlegt werden können. Ist z. B. in der tryptophanhaltigen Bouillon Glykose, Saccharose oder Mannit zugegen, dann wird der Geflügelcholera-bazillus überhaupt nicht oder nur nach längerer Zeit ein wenig Indol bilden, da er mit dem schwerer angreifbaren Tryptophan überhaupt nicht oder erst dann fürlieb nimmt, wenn die mit weniger Mühe als Energiequelle verwendbaren Verbindungen bereits verbraucht sind. Daß in diesem Falle tatsächlich diese Ursache für das Ausbleiben der Indolbildung vorliegt, geht u. a. auch daraus hervor, daß bei Anwesenheit dem Geflügelcholera-bazillus nicht zugänglicher Kohlehydrate oder Alkohole, z. B. Laktose oder Glycerin, die Indolbildung regelrecht erfolgt. Hieraus folgt als dritte Bedingung der Indolbildung, daß der benutzte Nährboden womöglich frei sei von Kohlehydraten und höheren Alkoholen oder von ähnlichen Verbindungen höchstens nur solche enthalte, die durch den Geflügelcholera-bazillus nicht vergoren werden. Aber auch solche, beispielsweise Laktose oder Glycerin, dürfen nur in geringen Mengen, nicht über 2 Prozent vorhanden sein, denn sonst

wird durch ihre Anwesenheit das Entwicklungsvermögen der Kultur mehr oder weniger eingeschränkt, wodurch wieder gegen die oben an erster Stelle angeführte Bedingung verstoßen wird. Nach dem Gefagten ist somit die Verschiedenheit in der Indolbildung ein prinzipiell wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen *B. avisepticus* und *B. gallinarum*, jedoch darf die negative Reaktion nur dann verwertet werden, wenn durch einen mitlaufenden Kontrollversuch mit einem einwandfreien Geflügelcholera-stamm die Erfüllung der genannten drei Bedingungen erwiesen ist.

Die in differential-diagnostischer Hinsicht wichtigsten Eigenschaften von *B. avisepticus* und *B. gallinarum* sind in nachstehender Tabelle zusammengefaßt, wo auch das Verhalten von zwei weiteren, bei Hausvögeln häufiger vorkommenden Bakterienarten (*B. Breslaviensis* und *B. coli*) verzeichnet ist.

Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen *Bacillus avisepticus*, *gallinarum*, *Breslaviensis* und *coli*.

Bakterienart	Beweglichkeit	Säurebildung aus		Indolbildung
		Laktose	Saccharose	
<i>B. avisepticus</i>	—	—	+	+
<i>B. gallinarum</i>	—	—	—	—
<i>B. Breslaviensis</i> . . .	+	—	—	—
<i>B. coli</i> und Verwandte	±	+	±	+

Außer den angeführten morphologischen und kulturellen Unterschieden kann auch die Agglutinationsprobe zur Unterscheidung des *B. avisepticus* vom *B. gallinarum* herangezogen werden, falls hochwertige agglutinierende monovalente Sera zur Verfügung stehen. Die beiden Bakterienarten enthalten nämlich keine übergreifenden Rezeptoren; die durch sie im Tierkörper hervorgerufenen Agglutinine sind streng spezifisch, einerlei, ob man zur Herstellung von Immunsereen Pferde oder Kaninchen benutzt.

Zu dem Artikel von F. Froboese „Neue Erkenntnisse über die biologischen Wirkungen der Milchsäure“.)

Von Prof. Dr. Kurt Schern, Montevideo.

Der Artikel von Froboese veranlaßt mich, von dieser Stelle kurz auf die ausgezeichnete Wirkung der bakteriologisch zu 100 Prozent aus Bulgarikusbakterien bestehenden Joghurt hinzuweisen, bei Erkrankungen des Darmes, speziell der Säuglinge (Sommerdiarrhöen usw.). Froboese erwähnt das Bulgarikusjoghurt zu 100 Proz. nicht. Die Periode, in welcher man an die Darstellungen Metschnikoffs glaubte, daß das Joghurt ein langes Leben verleiht, ist überwunden. Aber vom Joghurt ist etwas geblieben: das ist seine ausgezeichnete Wirkung auf den erkrankten Intestinaltraktus, welche durch die Milchsäure, wahrscheinlich „in statu nascendi“ bedingt wird. Außerdem wissen wir aber heute auch, daß der *Bacillus Bulgaricus*-B. Vitaminbildner ist, im Gegensatz zu Streptokokken, Kokken usw. bestimmter Art. Da hier in den wärmeren Gegenden Südamerikas die intestinalen Erkrankungen Erwachsener und Kinder zu den Alltäglichkeiten gehören, so hat hier das Joghurt ausgebreitete Verbreitung gefunden in der Therapie menschlicher Darmleiden. Das fällt besonders auf, wenn man aus Europa kommt.

Jedoch ist eine einwandfreie, bakteriologisch wichtige Herstellung des Joghurt für den Laien nicht leicht; denn

die zu der Sauermilch zu verarbeitende Süßmilch, die bei dem Herstellungsprozeß verwendeten Gefäße, die Verschlüsse dieser usw. weisen Bakterien auf, welche das spätere Joghurt verunreinigen. Meist enthält dieses auch säurebildende Hefen und vor allen Dingen Eiweißfäulnisbakterien. Diese sind die Antagonisten der Bulgarikusbakterien und man muß sie, wenn man ein gut auf den kranken Darm wirkendes Joghurt erzielen will, bei der Bereitung des Joghurt von der zu verarbeitenden Milch fernhalten. Auch muß diese Milch von den in ihr vorhandenen Bakterien vorher befreit werden. Zweckmäßig beimpft man sie danach mit Reinkulturen des *Bacillus bulgaricus*¹⁾ und darnach läßt man die Milch bis zur schwachen Säuerung bebrüten. Nach meinen heutigen Kenntnissen glaube ich, daß die Gewinnung von Bulgaricus-Joghurt in die Hand von Spezialbakteriologen gelegt werden muß, wenigstens soweit milchindustrielle Betriebe in Frage kommen. Das nach den Methoden der Hausfrauen hergestellte Joghurt kann den Anforderungen eines einwandfreien Handelsproduktes vom bakteriologischen Standpunkte heutzutage nicht mehr genügen.

In den Fällen, in denen Joghurt therapeutisch für Säug-

*) Siehe D. T. W. 1928, Nr. 34, S. 574.

¹⁾ Bulgarikuskulturen sind käuflich erhältlich in Montevideo, Calle Jaguaron 1184.

linge und andere kleine Kinder verwendet werden soll, empfiehlt es sich, die Reinkultur des *Bac. bulgaricus* in leicht flüssigen Medien wachsen oder suspendieren und dann teelöffelweise geben zu lassen. Dadurch vermeidet man die Überlastung des erkrankten Organismus mit größeren Eiweißmassen. — Das Gleiche gilt auch für den Gebrauch des *Bac. bulgaricus* in ähnlichen Fällen in der Tiermedizin. Ich kann die Anwendung dieser Bakterien weitgehend emp-

fehlen, besonders für Säuglinge mit den Sommerbrechdurchfällen, welche durch peptonisierende, in der Milch vorhandene Bakterien ausgelöst werden. Selbstverständlich muß der Genuß solcher Milch bei Beginn der Behandlung des Kranken sofort eingestellt werden. Zur Diagnose dieser Milch empfehle ich bei der dauernden Milchkontrolle die Ausführung der aeroben und anaeroben Kochgarprobe.

Innere Medizin und Chirurgie.

Schmidt, J.: Die kombinierte Schweif-Sphinkteren-Lähmung des Pferdes. (Aus der Medizinischen Univers.-Tierklinik Leipzig.) (Zschr. für Inf.-Krankheiten der Haustiere 1928, 33, H. 1/3, S. 117.)

Schmidt berichtet über drei weitere Fälle der kombinierten Schweif-Sphinkteren-Lähmung des Pferdes. Im ersten Falle handelte es sich um eine chronische Pachymeningitis spinalis bei einer sechs-jährigen ostpreussischen Fuchstute als Folge eines Traumas (Hufbeschlag) mit sich anschließender Perineuritis. Auffallend war die auf lange Zeit sich erstreckende Entwicklungsdauer der Erkrankung und das Ausbleiben von Muskelatrophie und Gangstörungen. Auch der zweite Fall, der ein dreijähriges Stutfohlen betraf, läßt eine traumatische Einwirkung als Ursache des Leidens erkennen, daß sich ziemlich rasch entwickelte, ein typisches Symptomenbild lieferte und mit Hilfe einer Modifikation der Elektrotherapie wider Erwartung zur Abheilung gebracht werden konnte. Der dritte Fall fand sich bei einer sechs-jährigen braunen Stute. Er zeichnete sich klinisch im Vergleich zu anderen Beobachtungen dadurch aus, daß seine Anamnese keinerlei Anhalt für die Ätiologie gibt, Atemzüge und Pulse ständig erhöht sind, der Schweif bei der Bewegung des Pferdes im Trab eine eigentümliche rotierende Bewegung um seine Längsachse vollführt, die Harnentleerung in der Hauptfache nur beim Führen erfolgt, während der ersten Zeit des Klinikaufenthaltes sich eine akute Dermatitis ohne erkennbare Ursachen ausbildet und wieder abheilt, an der linksseitigen Kuppe und etwas später auch an einem Teil der zugehörigen Ober-schenkelmuskulatur schon in verhältnismäßig kurzer Zeit eine hochgradige Muskellatrophy zur vollen Entwicklung kommt, der Patient schließlich in der Ruhe eine ganz eigenartige Stellung einnimmt, der bisherige gute Nährzustand sich verschlechtert und die Körperkräfte sichtlich nachlassen. Alle anderen Symptome entsprechen dem sonstigen regelrechten Krankheitsbild der kombinierten Schweif-Sphinkterenlähmung. Die pathologisch-anatomische Untersuchung dieses Falles ergab, daß im Bereich des Rückenmarkes eine durch besonders starke Hyperämie, die fogar zu ausgedehnten Blutungen geführt hatte, gekennzeichnete chronische Pachymeningitis spinalis in Verbindung mit chronischer Peri- und Endoneuritis sowie degenerativer Atrophie der Nervenfasern das Wesen des in Rede stehenden Krankheitsfalles darstellte. Die Ätiologie der Schweif-Sphinkterenlähmung ist zur Zeit im allgemeinen noch unklar. Da nun aber das in Rede stehende Leiden mit seiner typischen Form nur beim Pferde und nicht auch bei anderen Tieren oder beim Menschen vorkommt, so spricht der Verf. die Vermutung aus, daß eine besondere, nur beim Pferde auftretende Art tierischer Parasiten und zwar im frühesten Stadium ihrer Entwicklung begriffene und bei ihrer Wanderung verirrte Sklerostomenlarven, den Anlaß zu Zirkulationsstörungen und proliferierender Entzündung in der Cauda equina Anlaß geben könnte. Ziegler.

Depisch, F. und Hasenöhl, R.: Die alimentäre Hyperglykämie als Funktionsprüfung des Inselorgans. (I. Med. Abt. Kaiserin-Elisabeth Spital Wien.) (Zschr. ges. exp. Med. 1927, 58, S. 81—109.)

Die Verff. wollen die Schwierigkeit der Beurteilung ali-

mentärer Hyperglykämiekurven dadurch mindern, daß sie die Prüfung des Inselorgans in der Weise vornehmen, daß sie das Absinken des Blutzuckers unter den Ausgangswert als Funktionsprüfung vorschlagen. Die Kurve aus Hyperglykämie und Hypoglykämie mit Berücksichtigung des zeitlichen Verlaufs und des Unterschreitungs Wertes gibt einen Anhalt für die Reizbarkeit und die Leistungsfähigkeit des Pankreas. Eine Reihe von pathologischen Fällen wird besprochen. R. Völker (Leipzig).

Vajda: Die Verabreichung flüssiger Medikamente durch das Maul und die Einspritzung derselben durch die Nase bei Schweinen. (T. R. 1928, S. 367.)

Verf. beschreibt eine Methode zur Verabreichung flüssiger Medikamente mittels einer Rekordspritze durch die Nase. Man führt den Konus der Spritze am ventralen Rand des Nasenloches in das Vestibulum nasi ein. Um ein Eintreten der Flüssigkeit in die Luftröhre auf alle Fälle zu verhüten, empfiehlt es sich, den Kopf etwas anzuheben, da dadurch der muskulös weiche Gaumen den Eingang des Kehlkopfes völlig bedeckt. Die Versuche wurden fast nur mit ölartigen Medikamenten ausgeführt. Ob auch dünnflüssige, wasserartige Medikamente ohne jede Gefahr durch die Nase eingespritzt werden können, bedarf weiterer Nachprüfung. K. H. Meyer.

Mikuscha, G.: Bromostrontiuran, ein Mittel zur Behandlung der Ekzeme und der nervösen Staupe des Hundes. (Aus dem „Wiener Hundesanatorium“.) (B. T. W. 1928, S. 397—399.)

Das vorliegende Mittel stellt eine Kombination von Bromsalzen mit dem von Rosenthal in die Dermatologie eingeführten Strontiuran (Strontiumchloridharnstofflösung) dar. Es wird in Ampullen von 10 ccm in den Handel gebracht und bei der Applikation in die Vena saphena injiziert. Die Anwendung erfolgte jeden vierten, in schweren Fällen jeden zweiten Tag. Manchmal waren 8—10 Injektionen notwendig. Auf Grund der an einer größeren Anzahl von Patienten gemachten Erfahrung gelangt Verf. zu folgendem Urteil:

1. Bromostrontiuran ist ein hervorragendes Mittel zur Bekämpfung des Juckreizes und bewirkt auch überall dort, wo die bisherigen antipruriginösen Medikamente versagten, Besserung.

2. Die durch Bromostrontiuran erzeugte Juckreizstillung bewirkt Ruhestellung der erkrankten ekzematösen Hautpartien und dadurch allein Schwinden der Entzündungssymptome. Durch die Wirkung auf die sensiblen Nerven tritt Desensibilisierung der Haut für reizende Medikamente ein, und wird dadurch erst eine gründliche und ungestörte medikamentelle Therapie ermöglicht.

3. Die Kombination Brom-Strontium und die dadurch erzielte erhöhte sedative Wirkung sichern dem Bromostrontiuran einen hervorragenden Platz bei der Bekämpfung der mit Exzitations- und tetanischen Zuständen verlaufenden Krankheiten des Hundes, vor allen Dingen bei der nervösen Staupe und der gemeinen Epilepsie.

4. Erscheint das Indikationsgebiet damit noch keineswegs erschöpft, sondern es wäre die Beeinflussung der Ek-lampsie der säugenden Hündinnen und andere Erkrankungen, bei denen der nervöse Apparat gestört ist, zu erforschen. Auch die Behandlung urtikarieller Erkrankungen, sowie die erzielte Verhütung postoperativer Pneumonien bei Men-

schen wäre in analogen Fällen in der Veterinärmedizin zu versuchen. Schließlich wären die beim Hunde gemachten Erfahrungen ohne weiteres auf das Anwendungsgebiet der Großtierpraxis übertragbar.

5. Bromostronturan zeigte keinerlei schädliche Nebenwirkungen oder unerwünschte Begleitererscheinungen (Anaphylaxie, kumulative Wirkung) und wird auch bei häufiger Wiederholung reaktionslos vertragen. Carl.

Seuchenlehre u. Seuchenbekämpfung.

Herrmann, O.: Lyssavirus im menschlichen Speichel. (Zschr. für Immunitätsforschung 1928, 58, S. 384.)

Mit dem Speichel eines trotz abgeschlossener Schutzimpfung an Tollwut erkrankten Knaben wurden 1 Kaninchen und 2 Meerschweinchen i. m. infiziert. Das Kaninchen verendete nach 24 Tagen an Wut. Die Meerschweinchen waren nach 3 Monaten noch am Leben. — Da der Speichel lyssakranker Menschen manchmal nur schwach, manchmal aber auch stark virulent sein kann, ist es notwendig, daß alle von lyssakranken Menschen Gebissenen sich der Schutzimpfung unterziehen. Meyn.

Herrmann, O.: Plazentare Übertragung der Wut. (Zschr. für Immunitätsforschung 1928, 58, S. 371.)

Einer an Lyssa erkrankten und infolge der Krankheit gestorbenen Frau wurde ein vier Monate alter Fetus entnommen. Während die mit Gehirnmaterie der Frau infizierten Kaninchen und Meerschweinchen an Tollwut verendeten, waren die mit Gehirnmaterie der Frucht infizierten Versuchstiere nach 7½ Monaten noch am Leben. Eins von den infizierten Meerschweinchen warf zwei Junge, von denen eins nach 128 Tagen unter den Erscheinungen der Wut erkrankte und verendete. — Es werden weiterhin eine Anzahl Fälle von plazentarer Übertragung von Wut bei Versuchstieren mitgeteilt. Daraus wird gefolgert, daß das durch die Plazenta übertragene Wutvirus von verschiedener Virulenz sein kann, sich durch die Übertragung aber meistens bedeutend abzuschwächen scheint. Das Virus konnte nicht nur bei den nach dem Tode des Muttertieres entnommenen Feten oder bei den während der Krankheit geworfenen Jungen, sondern auch bei Jungen gefunden werden, die 16 Tage vor der Erkrankung des Muttertieres geworfen wurden. Andererseits wurden aber auch negative Resultate nicht nur bei den 4—20 Tage vor der Erkrankung geworfenen Jungen, sondern auch bei Jungen, die während der Krankheit zur Welt kamen und auch bei voll- und halbentwickelten Feten beobachtet.

Verf. empfiehlt, für ähnliche Versuche gleichzeitig junge Kaninchen und Meerschweinchen zu verwenden. Die Beobachtungen müssen auf 1 Jahr und länger ausgedehnt werden. Meyn.

Le Blanc: Die tuberkulöse Infektion des Menschen im Vergleich zu den übrigen bakteriellen Infektionen des Menschen. (Beitr. zur Klinik der Tuberkulose 1928, 70, S. 357.)

Bei dem meist chronischen Verlauf der tuberkulösen Infektion tritt die Organveränderung so in den Vordergrund, daß ihr gegenüber der Eindruck als Infektionskrankheit zurücktrat. Nur bei den akuten Verlaufsformen der tuberkulösen Infektion des Menschen wie Miliartuberkulose, Typhobazillose, käsige Pneumonie und Meningitis ist die Analogie zu anderen bakteriellen Infektionen so groß, daß sie als Infektionskrankheiten erscheinen und bewertet werden. Das Akute des Verlaufs ist bei ihnen für die Bewertung als Infektionskrankheit maßgebend gewesen. Aber auch bei Chronizität der tuberkulösen Infektionen ist der Krankheitsverlauf zusammengesetzt aus einer aneinander gereihten Kette von akuten Krankheitszuständen.

Bei der tuberkulösen Infektion spielen sich dieselben Vorgänge ab, wie bei anderen bakteriellen Infektionen. Man sollte daher auch zu ihrer Bezeichnung immer nur von einer

„Tuberkulose“ oder von einer „tuberkulösen Infektion“ sprechen, ohne Hinzufügung oder alleinige Benennung der diagnostisch allein nachweisbaren oder klinisch besonders imponierenden Organerkrankung. Jedenfalls wird man sich bei Benennung nach Organtuberkulose immer bewußt bleiben müssen, daß es sich bei der Organtuberkulose nur um eine Äußerung der immer gleichzeitig vorhandenen Allgemeininfektion handelt.

Die biologischen Eigenschaften können allein und in Zusammenwirkung mit Bakteriämien auf den Gesamtorganismus Einfluß gewinnen und so mannigfaltige Variationen des Krankheitsbildes verursachen. Das gilt auch für das Tuberkelbakterium. Schwankungen in der Virulenz, Toxinbildung, Vitalität und Resistenz des Bakteriums können hierbei entscheidenden Einfluß haben. Dieser Anteil des Tuberkelbakteriums selbst an der Infektionsgestaltung wird heute durch die höhere Bewertung hypothetischer Abwehr- und Immunitätskräfte im Organismus zu sehr in den Hintergrund gedrängt. Die klinische Beobachtung legt aber außerordentlich die Vermutung nahe, daß der individuelle Krankheitsablauf bei jedem einzelnen Tuberkulosekranken zum mindesten so sehr von der Eigenart des krankmachenden Bakterienstammes als von den dem Individuum zur Verfügung stehenden Reaktions- und Abwehrmöglichkeiten abhängig sein kann. So kann man sich oft klinisch des Eindrucks nicht erwehren, daß die therapeutische unbeeinflussbare rapide Progredienz einer tuberkulösen Erkrankung mehr von der Bösartigkeit des krankmachenden Bakteriums als von der mangelnden Widerstandsfähigkeit des befallenen Organismus abhängt. Für die Klärung dieser Dinge muß man der klinischen Bakteriologie eine weit größere Bedeutung zuerkennen als bisher.

Verf. kommt dann eingehend auf das Metastasierungsproblem zu sprechen und betont, daß über den Verbleib der ins Blut eingeschwemmten Bakterien nichts Sicheres bekannt ist. Wir wissen, daß sie sich im Blut nicht vermehren können, aber ihre Ausscheidungs- und Vernichtungsstätten sind unbekannt. Warum einerseits trotz dauernder und massiver Bakteriämien Metastasen ausbleiben (Endocarditis lenta), andererseits schon durch eine einmalige Bakteriämie zahlreiche Metastasen gesetzt werden können, ist nicht bekannt. Auch der Allergiebegriff gibt keine ausreichende Erklärung für das Metastasenproblem. Denn selbst wenn man dafür eine verminderte Durchfeuchungsresistenz annehmen würde, so bleibt doch die besondere Organprädisposition für die Metastasen bestehen.

Die Schwankungen des Allgemeinzustandes des tuberkulösen Organismus, die auf der einen Seite als Verlust des Durchfeuchungswiderstandes, auf der anderen als Immunität imponieren könnten, sind Schwankungen des Vergiftungszustandes. Vom Vergiftungsgrad werden auch wieder die bakteriellen Veränderungen im Organismus beeinflusst. Örtliche Isolierung (Abkapselung) im Organ kann nur von gesunden, schlecht oder gar nicht von vergifteten Zellen geleistet werden. Ist die Isolierung erreicht, so ruht die Infektion. Das, was die Infektion aber über Jahre ruhen läßt, ist die Annahme oder das Versiegen der Giftproduktion und das Ausbleiben von Bakteriämien infolge Blockierung der offenen Verbindungen mit dem Säftestrom, nicht aber eine Allergie.

Die verschiedenen Empfänglichkeiten des Menschen und die großen Mannigfaltigkeiten der tuberkulösen Erkrankungsformen finden ihre Erklärung in der Wechselwirkung zwischen Giftquelle und Gifttoleranz des Organismus. Der Vergleich der tuberkulösen Infektion des Menschen mit den übrigen bakteriellen Infektionen des Menschen erlaubt daher nicht, daß man die Allergie für das Mittel zur Klärung aller Infektionsvorgänge hält und daß man in ihr den ausschlaggebenden Faktor für die gesamte Krankheitsgestaltung und den Krankheitsverlauf erblickt. Meyn.

Lange, L. und Clauberg, K. W.: Tierexperimentelle Nachprüfung der Schutzimpfung gegen Tuberkulose mit BCG. I. Mitteilung: Versuche an Meerfischweincheln über die Virulenz des BCG-Stammes unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses von Schädigungen der Versuchstiere. (Beitr. zur Klinik der Tuberkulose 1928, 70, S. 346.)

Bei kritischer Würdigung ihrer Untersuchungsergebnisse kommen Verff. zu folgendem Ergebnis:

Der BCG ist in massiven Dosen für Meerfischweincheln nur schwach virulent. Die durch ihn bewirkten tuberkuloseartigen Veränderungen sind umschrieben lokalisiert, erreichen ihre größte Ausdehnung in relativ kurzer Zeit nach der Injektion und bilden sich bald wieder bis zum völligen Verschwinden zurück. Sie sind in ihren Ausmaßen bei höheren Dosen nicht proportional der verimpften Bakterienmasse. Der BCG ist aus den durch ihn veränderten Organen auf künstlichen Nährböden züchtbar, jedoch sind Verimpfungen bakterienhaltiger, spezifisch veränderter Gewebe auf andere Meerfischweincheln im großen und ganzen ohne erkennbare Wirkung. Dasselbe gilt für die Übertragung der Passagiertierorgane auf weitere Versuchstiere. An dem genannten Tatbestand ändert sich nichts, wenn die Versuchstiere absichtlich früher oder später den verschiedenartigsten akuten oder chronischen Schwächungen und Schädigungen ausgesetzt sind. Alle Bestrebungen, eine Virulenzzunahme des BCG im Körper des Meerfischweincheln zu erzwingen, waren bisher erfolglos. Meyn.

Clauberg: Versuche an Meerfischweincheln zwecks Immunisierung mittels „verfeilter“ Kochscher Bazillen gegen nachträgliche Infektion mit lebenden Tuberkelbazillen. (Beitr. zur Klinik der Tuberkulose 1928, 69, S. 551.)

Es werden Immunisierungsversuche an Meerfischweincheln beschrieben. Als Impfstoff wurde ein aus älteren Tuberkelbakterienkulturen durch Lauge-Wärmebehandlung gewonnenes, alle Bakterienbestandteile enthaltendes Material benutzt. Gegenüber der Nachinfektion mit lebenden Erregern verhielten sich von 12 dreimal in Abständen von 2½ bis 3 Wochen Schutzgeimpften Tieren 10 völlig refraktär, eines erkrankte nur schwach, ein weiteres starb an generalisierter Tuberkulose. Letztgenanntes Tier hatte die geringste Dosis einer in mehrfacher Hinsicht schlechteren Vakzine erhalten. Die 12 Kontrollen erkrankten mit vier Ausnahmen spezifisch, meistens schwer. Fünf von ihnen starben an generalisierter Tuberkulose rund ¼ Jahr vor Beendigung der Versuche. Meyn.

Geburtshilfe, Tierzucht und Fütterung.

Kronacher, C., Th. Böttger und C. von Patow: Der Duerst'sche Rippenwinkel als Kennzeichen für die Milchleistung. (Zschr. für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie Bd. XII, Heft 1, Juli 1928, S. 1 folg.)

Die Züchtungsbiologie war seit langem bemüht, etwaige Zusammenhänge zwischen äußerer Körpergestaltung (einem Teil der Konstitution) und Leistung (Stoffumsatz und -Ansatz, Milch- und Mastleistung) aufzuklären. J. U. Duerst, Bern glaubte nun, wie er schon in seinem Vortrage gelegentlich der Herbstversammlung der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde 1926 darlegte und worüber ich (d. Ref.) damals starke Zweifel äußerte, in dem Winkel, den die letzte (falsche) Rippe nahe am Rückgrat mit der Horizontalen bildet, ein besonderes Kennmal der Eignung eines Rindes für Milch- oder Mastleistung gefunden zu haben. Je intensiver ein Tier atmet, d. h. einen je größeren Gasaustausch es hat, wie dies beim ausgesprochenen Milchrind mit seinem „Atmungstyp“ zutrifft, desto größer sollte der fragliche Rippenwinkel, d. h. desto schräger die letzte Rippe gestellt sein, während bei weniger intensiver Atmung, wie sie das Mastrind („Verdaustyp“) zeigt, der Rippenwinkel kleiner, d. h. die letzte Rippe steiler gestellt sei. Für das

Messen des Rippenwinkels (in der Regel rechts) konstruierte Duerst ein besonderes Costalgoniometer mit Wasserwaage und gab dazu eine Gebrauchsanweisung.

Bei der äußerst genauen Nachprüfung der Angaben Duerst's an 420 leistungsgeprüften und eingetragenen Kühen aus dem Gebiete des Vereins ostfriesischer Stammviehzüchter ergab sich, daß nicht der geringste Zusammenhang zwischen der Milchleistung und der Rippenwinkelgröße besteht, gleichviel ob man das Gesamtmaterial, innerhalb der Altersgruppen, oder die einzelnen Stallungen in Betracht zog. Nach Ermittelung der sichersten Handgriffe beim Messen wurde das Goniometer jeweils mindestens dreimal frisch angefertigt und allenfalls das arithmetische Mittel berechnet. Auch die Behauptung Duerst's, daß die Rippenwinkelgröße des Vaters auf die Töchter und die der Mutter auf die Söhne sich vererbe, war nicht zu bestätigen. Beim Vergleich von Kühen, die Töchter des gleichen Vaters waren, ergaben sich oft ziemlich weitgehend von einander abweichende Rippenwinkelwerte. Die fragliche Vererbung war auch genetisch-zytologisch nicht zu erklären.

Als Referent möchte ich zu obigem Ergebnis noch mitteilen, daß Duerst am 24. Januar 1928 gelegentlich der ostpreussischen landw. Woche in Königsberg einen Vortrag hielt über: „Neue, objektive, wissenschaftliche Methoden zur praktischen Vervollkommen der Leistungszucht beim Rinde“. (D. Landw. Tierzucht 1928, Nr. 29 und 30 vom 21. und 28. Juli) und dabei u. a. ausführte: „Die praktische Ausführung der Habitusbestimmung und damit die Bestimmung des Grades der Intensität des Stoffwechsels, an den der Körper bisher angepaßt war, ist sehr einfach (? d. Ref.). Ich habe nach langem Tasten und Suchen gefunden, daß der Winkel, den die letzte Rippe rechts mit der Rückgratachse bildet, mit großer Präzision der Lungenkapazität resp. den Atmungsanstrengungen des betreffenden Tieres parallel geht.“ (! ? d. Ref.). Außerdem wurden dann noch die Leistungstypen einfacher und komplexer Art in Verbindung gebracht mit dem Funktionsgrad der inneren Sekretion (Schilddrüse), sowie mit der Beschaffenheit von Haut und Haar nebst dessen Farbe. Auch diese Behauptungen bedürfen m. E. noch einer gründlichen Nachprüfung. Sie erscheinen mir in mancher Hinsicht recht absonderlich und unwahrscheinlich. A. Hink.

Ehrhardt, K. und Wiesbader, H.: Intradurale Hypophysininjektionen während der Schwangerschaft. Ein Beitrag zur Ätiologie der Geburt. (Aus der Universitäts-Frauenklinik in Frankfurt a. M.) (M. m. Wschr. 1928, S. 1827.)

Dixon und Marshall teilten vor einiger Zeit mit, daß der Liquor cerebrospinalis am Ende der Gravidität eine Anreicherung von Hypophysen-Hinterlappeninkret erfahre und sprachen die Vermutung aus, daß diese Anreicherung des Liquors mit Hypophysenhormon vielleicht einen wichtigen Faktor für den Eintritt der Geburt darstellen könne. Zur Nachprüfung dieser Vermutung haben Verff. tierexperimentell (an trächtigen Kaninchen) und klinisch die Frage studiert, ob es möglich wäre, durch künstliche Anreicherung des Liquors mit Hypophysen-Hinterlappeninkret in Form von intraduralen Hypophysininjektionen die Gravidität zu unterbrechen. Sämtliche Versuche ergaben negative Resultate. Letztere sind ein weiterer Ausdruck dafür, daß das alte, bis heute noch ungelöste Problem von der Ursache der Geburt, sehr komplexer Natur ist, und daß unsere heutigen Vorstellungen über dieses Problem noch sehr unvollkommen sind. Carl.

Ferber, Karl-Erich: Die Zahl und Masse der Infusorien im Pansen und ihre Bedeutung für den Eiweißaufbau beim Wiederkäuer. (Aus dem tierphysiolog. Institut der Landw. Hochschule Berlin. — Direktor: Prof. Dr. E. Mangold.) (Zschr. für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie, Juli 1928, Bd. XII, Heft 1, S. 31 folg.)

Schon 1843 hatten Gruby und Delafond ziliäre Infusorien im Pansen der Wiederkäuer gefunden. Seitdem sind darüber zahlreiche weitere Arbeiten erschienen. Die ernährungsphysiologische Bedeutung dieser Infusorien wurde aber erst in neuester Zeit genauer geprüft. Es handelte sich vor allem um die Ermittlung der Rolle der Mikroorganismen bei der Umwandlung nichteiweißartiger Stickstoffverbindungen in Eiweiß. N. Zuntz (1891 und 1913) und Hagemann (1891) waren von einer gewissen Bedeutung der Mikroorganismen in fraglicher Hinsicht überzeugt. Müller, Gerlach und Vogel wiesen 1905 die Fähigkeit bestimmter Bakterien, aus Amidien Eiweiß zu bilden, experimentell nach. Schwarz (1925/26) ging so weit, den Bakterien, besonders aber den Infusorien im Pansen eine ernährungsphysiologisch ausschlaggebende Bedeutung zuzuschreiben. Die Amide werden als Infusorien- und Bakterien-Stickstoff im Pansen gestapelt und kommen so dem Wirtstier als verdauliches Eiweiß zugute.

Nach F. finden sich folgende Arten und davon jeweilig mehrere Unterarten von Infusorien im Pansen: Ophryoskolex, Diplodinium, Entodinium, Isotricha, Bütschli. Dabei besteht ein bestimmtes Verhältnis der verschiedenen Arten zueinander. Es handelte sich um die Ermittlung der Zahl, Gewichtsmenge und Eiweißmenge dieser Panseninfusorien. Bei Schaf- und Ziege fanden sich etwa 800—1000 Infusorien in 1 Kubikmillimeter des Panseninhalts. Bei Hunger zeigte sich eine schnelle Abnahme, bei wieder einsetzender Fütterung eine langsame Zunahme der Infusorien. Bei kohlehydratreicher, aber eiweißarmer Fütterung und Ersatz des Eiweißes durch Ammoniumazetat oder Harnstoff, waren die Infusorien nicht imstande, diese Amide zu verwerten. Nur gesteigerte Eiweißgaben im Futter vermochten Zahl und Lebenstätigkeit der Infusorien zu erhöhen. Bei einer Ziege im Trächtigkeitszustand und nach dem Lammern stieg die Infusorienzahl bis über 2000 im Kubikmillimeter an bei vermehrtem Eiweißumsatz. Eine gewisse Mithilfe und Nützlichkeit der Infusorien für den Eiweißaufbau erschien beim Wiederkäuer wahrscheinlich. Dabei war auch ein relativ höherer Anteil des Infusorienstickstoffs am Gesamtstickstoff des Panseninhalts als bei normalem Ernährungszustand festzustellen. Die Panseninfusorien verdienen deshalb als Symbionten und nicht als Parasiten bezeichnet zu werden. Die Gesamtmenge der Infusorien, die nach einer neuen Methode mittels Aufschwemmens und Zentrifugierens bestimmt wurde, betrug beim geschlachteten Schafe 165 Gramm des Panseninhalts. Die aufgenommenen Stärkekörner werden von den Infusorien selbst fermentativ verdaut, während Milchfetttröpfchen im Innern der Infusorien wie in dem sie umgebenden Panseninhalt bakteriell zersetzt werden.

A. Hink.

Nahrungsmittelhygiene.

Müller, R.: Zum Nachweis der Schmutz- und Farbstoffbakterien in der Milch. (Aus dem Hygienischen Institut der Universität Köln.) (M. m. W. 1928, S. 726.)

Eine der Hauptaufgaben der hygienischen Milchüberwachung besteht in der Feststellung des bakteriellen Verschmutzungsgrades. Letzterer kann zunächst auf dem Wege des Kulturversuchs unter Verwendung der Gelatineplatte zur Anschauung gebracht werden und zwar haben die mit dem Stallstaub, Strohhalmen, Kuhhaaren usw. in die Milch gelangten Bakterien die Eigenschaft, diesen Nährboden zu verflüssigen im Gegensatz zu den normalen Milchbakterien. Allerdings ist das Alter der Milchprobe und die Aufbewahrungstemperatur zu berücksichtigen. Die hier in Betracht kommenden sind seit langem als Sporenbildende Fäulnisbazillen (*B. subtilis*; *B. mesentericus*; *B. vulgatus*; *B. mycoides* u. a.) bekannt. Der Nachweis des *Bact. coli*, das häufig mit dem Kuhkot in die Milch gelangt, mittels der Endo- oder Drigalski-Platte ist dadurch erschwert, daß die zahl-

reichen normalen Milchsäurebakterien ebenfalls Rötung hervorrufen. Als Maßstab für die Verunreinigung mit Darmbakterien benutzte Verf. daher die Malachitgrünagar-Platte, von der bekannt ist, daß auf ihr bei Fäzesaussaaten noch viele Darmbakterien wachsen. Frische saubere Milch zeigt bei Ausaat von $\frac{1}{2}$ ccm auf die Platte keine oder nur wenige Kolonien, manche Marktmilch jedoch in 0,05 ccm Tausende. Das Endergebnis läßt sich auf diese Weise schneller feststellen wie bei Verwendung der Gelatine-Platte. Auf der Malachitgrünplatte traten öfters außerdem noch farbstoffbildende Bakterien (*Prodigiousus* und gelbe Milchbakterien) in die Erscheinung. Zum Nachweis von Pilzen unter Hemmung der Milchsäurebakterien (*Mucor* und *Oidium*) benutzte Verf. Kaliumtellurit in Nähragar (1 : 10 000). Zum Schlusse macht Verf. Vorschläge über die bakteriologische Untersuchung der Handelsmilch in der Großstadt. Angelernte Beamte der Nahrungsmittelpolizei entnehmen Milchproben in keimfreien Gefäßen und bringen dieselben am besten mit Kraftwagen nach dem Untersuchungsamte, wo die Prüfung hauptsächlich durch Ausaat auf die Grünplatte stattfindet. Bei festgestelltem starkem Gehalte an Schmutzbakterien findet eine amtliche Befichtigung des betr. Betriebes statt. Bei niedriger Keimzahl erhält der betr. Milchhändler ein die Tatsache anerkennendes Schreiben. Carl.

Kallert, E.: Vergleichende Untersuchungen über die Haltbarkeit von Hackfleisch aus Frischfleisch und Gefrierfleisch. (B. T. W. 1928, S. 547—551.)

Veranlassung zu der vorliegenden Untersuchung war das Verbot des Magistrats in Berlin der Herstellung von Hackfleisch aus zollfreiem Gefrierfleisch. Diese Bestimmung wurde offenbar auf Grund der Erwägung getroffen, daß zu Hackfleisch verarbeitetes Gefrierfleisch viel leichter verderblich sei wie aus frischem Fleisch hergestelltes. Auf Veranlassung des Großhandels hat nun Verf. diesbezügliche Versuche angestellt, die zu folgendem Ergebnis führten:

1. Hackfleisch aus Gefrierfleisch ist unter den gleichen äußeren Bedingungen mindestens ebenso lange haltbar wie Hackfleisch aus frischem Fleisch. Die Herstellung und den Verkauf von Gefrierfleischhack durch Ausnahmebestimmungen stärker einzuschränken als bei Frischfleischhack entbehrt somit jeder tatsächlichen Grundlage und ist vollkommen ungerechtfertigt.

2. Hackfleisch im allgemeinen ist als ein stets stark mit Fäulniskeimen behaftetes Nahrungsmittel anzusehen, das verhältnismäßig schnell verderbt. Es ist deshalb nur aus ganz einwandfreiem Fleisch und peinlich sauber herzustellen und so schnell als möglich zu verzehren.

3. Zur Prüfung auf Verdorbenheit sind das Aussehen, die Konsistenz, der Geruch festzustellen. Veränderungen der Farbe kommt nur geringe Bedeutung zu. Ein sehr brauchbares objektives Hilfsmittel ist die Ermittlung der Reaktion gegen blaues und rotes Lackmuspapier, das mit destilliertem Wasser gut anzufeuchten und kurze Zeit an das Fleisch anzudrücken ist. Hackfleisch, das neben der natürlichen sauren bereits eine deutlich erkennbare alkalische Reaktion zeigt, ist als nicht mehr einwandfrei anzusehen. Als weiteres, allerdings wenig zuverlässiges Hilfsmittel kann die Anfertigung von gefärbten Klatfchpräparaten zwecks Orientierung über den Keimgehalt herangezogen werden. Carl.

v. Osterreich, R.: Zur strafrechtlichen Verantwortung des in der Fleischbeschau tätigen Sachverständigen bei Zuwiderhandlungen gegen die Ausführungsbestimmungen des Fleischbeschaugesetzes. (Zschr. f. Fleisch- und Milchhygiene, 39. Jahrg., S. 1—2.)

Unter Abdruck einer Entscheidung des Reichsgerichts, II. Strafenats, vom 26. März 1928, macht v. Osterreich darauf aufmerksam, daß die Ansicht auch hervorragender Verwaltungsjuristen, daß Zuwiderhandlungen gegen die Ausführungsbestimmungen des Fleischbeschaugesetzes z. B. hinsichtlich der Vorschriften über die Untersuchung der ge-

schlachteten Tiere nur disziplinar, nicht dagegen strafrechtlich zu ahnden seien, unzutreffend ist. Die gen. Reichsgerichtsentscheidung hat zum Ausdruck gebracht, daß die Vorschriften des § 27 Nr. 3 des Fleischbeschaffungsgesetzes die Gefahren abwenden sollen, welche durch ein wie immer geartetes Inverkehrbringen genußuntauglichen Fleisches für die menschliche Gesundheit entstehen können. Deshalb kann Täter der strafbaren Handlung auch der Sachverständige sein, der durch fahrlässige Freigabe des von ihm zu untersuchenden Fleisches dessen Inverkehrbringen veranlasse.

Edelmann.

Raschke, Otto: Die Polizeidrüse. (Zschr. f. Fleisch- und Milchhygiene, 39. Jahrg., S. 2—3.)

Unter Bezugnahme auf einen Artikel Baums in Nr. 1 des 38. Jahrgangs der Zschr. für Fleisch- und Milchhygiene erörtert Raschke das Wesen und den Begriff der sog. Reißmannschen oder Polizeidrüse dahingehend, daß darunter der Lg. bifurcationis dexter nach den Feststellungen Baums zu verstehen ist. Sein weiterer Schluß, daß bei alleiniger tuberkulöser Erkrankung des gen. Lymphknotens nur der rechte Herzlappen der Lungen zu befallen sei, ist mit der Vorschrift in § 35 Ziffer 4 B.B.A. nicht wohl vereinbar.

Edelmann.

Standesangelegenheiten.

Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte e. G. m. b. H.
in Hannover.

40. ordentl. Generalversammlung am 15. Dezember in Landsberg a. W.

Über das wiederum erfolgreiche Geschäftsjahr 1927/28 wurde durch den Vorstand Bericht erstattet. Der Bestand an eingetragenen Genossen beträgt 4281 mit 165 158 Geschäftsanteilen und 4 954 740 RM. Haftsumme. Die Zahl der Mitglieder hat sich gegenüber dem Vorjahr um 41 vermehrt. Das Geschäftsjahr war ein durchaus günstiges und der innere Ausbau der Genossenschaft vollzog sich in fachgemäßer Weise. Der Revisionsbericht für die letzten zwei Geschäftsjahre wurde zur Kenntnis der Teilnehmer gebracht und, da er keine besonderen Anstände enthielt, wurde er einstimmig genehmigt. Die für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegte Bilanz, welche mit einem Gewinn von 216 999,56 RM. abschloß, wurde einstimmig genehmigt. Es wurde ebenfalls einstimmig beschlossen, für die dividendenberechtigten Geschäftsanteile 10 Prozent Dividenden zu verteilen, unter Abzug der Kapitalertragssteuer von 10 Prozent. Der Sterbekasse wurden 25 000 RM. überwiesen, dem Reservefonds und der Betriebsrücklage je 10 000 RM. Die in der letzten Generalversammlung gewünschte Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates von 9 auf 12 Mitglieder wurde abgelehnt, weil man sich keinen besonderen Nutzen von der Erhöhung versprach und andererseits kein zwingender Grund zu dieser Maßnahme, die im übrigen mit Kosten verknüpft wäre, vorlag. Die satzungsmäßig ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates: Dr. Becker - Bevensen, Dr. Machens - Elze und Dr. Borchert - Calbe M., wurden ebenso wie das ausscheidende Vorstandsmitglied Arnous in Berlin wiedergewählt. Die Aussichten für das neue Geschäftsjahr sind im allgemeinen günstig, wenngleich die allgemeine wirtschaftliche Lage zu ernststen Bedenken Anlaß gibt. Die allgemeine Geldnot macht sich bei der Verarmung der Landwirtschaft auch in Kollegenkreisen sehr erheblich bemerkbar, wir hoffen aber, auch über diese schwere Krisenzeit wie bisher über die Kriegs- und Inflationszeit glücklich hinwegzukommen, damit auch das 25. Jahr des Bestehens der W. d. T. sich als ein glückhaftes auswirken möge.

Dr. Marks, Hannover.

Verein Ostfriesischer Tierärzte.

Herbstversammlung am 4. November 1928 in Emden.

Um den Kollegen einen Einblick zu geben in das für uns Tierärzte augenblicklich so wichtige Gebiet der animalischen Nahrungsmittelkontrolle, war Schlachthofdirektor Dr. Grüttner-Quedlinburg unserer Einladung zu einem Vortrag gefolgt. In seinen glänzenden Ausführungen, unterstützt durch ein mit viel Fleiß und großer Mühe zusammengebrachtes Demonstrationsmaterial, gelang es ihm trotz der Kürze der Zeit, die Versammlung an der Hand von Tabellen und des Materials, mit dem Gang der schwierigen Untersuchung sowie mit den wesentlichen Veränderungen bei Fleisch, Wurstwaren, Wurst- und Fischkon-

serven und den postmortalen Veränderungen bei Fischen bekannt zu machen. Kollege Dr. Grüttner hat es verstanden, durch seinen ausgezeichnet aufgebauten, klaren Vortrag, die Zuhörer für dieses Neuland in unserm Berufe zu interessieren. Anschließend fand im Hotel „Kronprinz“ ein gemeinsames Essen und eine kurze Versammlung statt. Die Kollegen Nanninga, Hage und Dr. Entjer-Wittmund wurden aufgenommen. Nächste Versammlung im Januar.

Dr. Neemann, Schriftf.

Verschiedene Mitteilungen.

Ehrenmitglied.

Prof. Dr. P. Danckwortt, Direktor des Chem. Instituts der Tierärztlichen Hochschule Hannover, wurde von der Magdeburger Apothekerkonferenz, der ältesten deutschen Apothekervereinigung, anlässlich der Feier ihres 130jährigen Bestehens zum Ehrenmitglied ernannt.

Haftpflicht und Haftpflichtversicherung des Tierarztes.

Urteil des Kammergerichts vom 3. Oktober 1928.

Der Kläger war bei der Beklagten gegen Haftpflichtschäden versichert; ausgeschlossen von der Versicherung war die Haftpflicht wegen Kastrationschaden. Nach § 5 der allgemeinen Versicherungsbedingungen ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und alle Umstände, welche auf den Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen. Nach § 6 hat die Verletzung dieser Obliegenheit die Leistungsfreiheit des Versicherers zur Folge, es sei denn, daß die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. Am 6. Mai 1926 folgte der Kläger einen Hengst des F. kastrieren. Der Hengst ging an den Folgen der Behandlung durch den Kläger ein. F. erhob wegen eines Teilbetrags seines Schadens in Höhe von 5000 RM. nebst Zinsen gegen den Kläger Klage. Der Kläger wurde klagegemäß verurteilt. Nunmehr nahm der Kläger die Beklagte aus dem Versicherungsbetrag auf Zahlung des Urteilsbetrags in Anspruch. Er behauptete, er habe die Kastration selbst ordnungsgemäß durchgeführt; der Hengst sei an den Folgen von Injektionen eingegangen, die mit der Kastration nicht in Zusammenhang gestanden hätten. Die Beklagte wendete ein, es liege ein Kastrationschaden vor, der Kläger habe die Injektionen nicht vorgenommen, um den Hengst zu untersuchen oder die Kastration einzuleiten; vielmehr habe er zunächst die Kastration begonnen und nach Beginn dem Pferde die Injektionen beigebracht. Ferner habe der Kläger den Versicherungsanspruch verwirkt, weil er über den Schadensfall ihm wahrheitswidrige Berichte erstattet habe; er habe weder in der Anmeldung des Schadens am 18. Mai 1926 noch in dem auf eine Rückfrage der Beklagten nach Art der behandelten Krankheit erstatteten Bericht vom 25. Mai 1926 irgend etwas von der Kastration erwähnt. Das Landgericht III in Berlin verurteilte die Beklagte nach dem Klageantrag. Es entnahm aus den vorliegenden Gutachten, daß der Tod des Pferdes weder als unmittelbare noch als mittelbare Folge der Kastration, sondern infolge der Kunstfehler des Klägers bei der Vorbehandlung, Mangel an Sauberkeit und Vorsicht bei der Einspritzung eingetreten ist, und hielt den Kläger auch nicht für verpflichtet, in seiner Berichterstattung die Kastration zu erwähnen, weil sie nicht mit dem Tode in Zusammenhang stand. Hiergegen legte die Beklagte Berufung ein. Der Kläger gab jetzt zu, daß er die Operation zunächst begonnen und sich zur Injektion entschlossen habe, weil infolge der begonnenen Operation der Hengst besonders unruhig geworden sei und zu schlagen angefangen habe; er habe die Injektion nur zu seinem eigenen Schutze vorgenommen, für die Operation selbst sei sie nicht notwendig gewesen; die Injektion habe daher mit der Operation selbst nichts zu tun gehabt, und er habe daher, da nur die fehlerhafte Injektion, nicht aber die ordnungsmäßig ausgeführte Kastration den Tod des Tieres herbeigeführt habe, der Beklagten von der Kastration auch keine Mitteilung zu machen brauchen. Das Kammergericht wies die Klage ab mit folgender Begründung:

„Unstreitig ist der Kläger gegen Kastrationschäden nicht versichert. Die Parteien streiten in erster Linie darüber, ob ein Kastrationschaden vorliegt. Diese Frage ist vom Vorderrichter zu Unrecht verneint worden. Ausschlaggebend für die Beantwortung dieser Frage ist nicht, ob das Pferd an den Folgen der Kastration selbst verendet ist oder an den Folgen der Injektion. Entscheidend ist vielmehr, daß nach der Darstellung, die der Kläger selbst in der Berufungsinstanz von dem Vor-

gang gibt, die Injektion während der Kastration und nur zu Zwecken der Kastration vorgenommen worden ist. Seine erstinstanzlichen Angaben, er habe die Injektion zu Zwecken der Untersuchung des Hengstes vorgenommen oder um die Kastration einzuleiten, sind ersichtlich unrichtig. Er gibt jetzt zu, daß er die Kastration nach Anlegung einer Nasenbremse begonnen hat. Wenn das Pferd sich von der Nasenbremse zu befreien vermochte und den Kläger durch Schlagen so gefährdete, daß er zu seinem eigenen Schutz die Injektion vornehmen mußte, so ist eben die Injektion infolge der begonnenen Kastration des Hengstes notwendig geworden, weil auf andere Weise die begonnene Kastration nicht fortgeführt werden konnte. Da das Pferd infolge dieser Injektion, die unstreitig fehlerhaft erfolgt ist, eingegangen ist, so liegt ein Kastrationschaden vor, den die Beklagte nicht zu ersetzen braucht.

Durchgreifend ist übrigens auch der zweite Einwand der Beklagten, daß sie wegen der wahrheitswidrigen Schadensberichte des Klägers von der Leistung frei sei. Der Kläger hat in den Schadensberichten nur gesagt, die Injektion sei von ihm gemacht worden, um eine genaue Untersuchung des Hengstes vornehmen zu können. Nach seiner jetzigen Darstellung hat er sie zu seinem eigenen Schutze machen müssen, um die begonnene Kastration zu beenden. Der Kläger hätte der Beklagten den Schadensbericht so machen müssen, wie er den Vorgang in seinem Schriftsatz vom 13. September 1928 geschildert hat. Dann hätte die Beklagte sich darüber schlüssig machen können, ob sie einen Kastrationschaden als vorliegend ansehe oder nicht. Der Kläger hat durch seine arglistigen und wahrheitswidrigen Berichte gegen die ihm nach § 5 Abs. 2 obliegende Verpflichtung verstoßen, der Beklagten ausführliche und wahrheitsgemäße Schadensberichte zu erstatten und alle Tatumstände, die auf den Schadensfall Bezug haben, mitzuteilen. Wegen Verletzung dieser Obliegenheit ist die Beklagte von der Verpflichtung zur Leistung nach § 6 der Allgemeinen Vericherungsbedingungen frei.

Reichsverband der Deutschen Fleischwaren-Industrie. E. V.

Eine außerpreussische Bezirksgruppe unseres Reichsverbandes steht mit dem Magistrat einer Großstadt in Verhandlungen über Beseitigung bzw. Ermäßigung der Gebühren für eine Nachuntersuchung von bereits tierärztlich untersuchtem Fleisch. Der fragliche Magistrat erhebt 2 Pfg. je Kilogramm für ausländisches und 4 Pfg. je Kilogramm für inländisches Fleisch und hat unseren Reichsverband gebeten, anzugeben, in welchen Gemeinden, insbesondere solche mit Schlachthofzwang, die Einfuhr von frischem Fleisch, besonders von frischem Schinkenabschnittfleisch (entsteht bekanntlich beim Kurantschneiden von frischen Schinken für die gleichmäßige Herstellung von Schinken verschiedenster Art in Großbetrieben) gestattet ist, wenn ja in welcher Form und mit welchen Nachuntersuchungsgebühren, ferner welche Vergünstigungen hinsichtlich der bei der Nachuntersuchung zur Erhebung gelangenden Gebühren Fleischwarenfabriken gewährt werden.

Wir werden uns mit einer entsprechenden Rundfrage auch an unsere Mitglieder wenden, würden jedoch zur Vervollständigung Mitteilungen seitens der Schlachthofverwaltungen (Schlachthofdirektoren) über die fraglichen Angaben dankbar erkennen.

Der geschäftsführende Vorstand:

Dr. Schwerdt. Berlin W. 9, Köthenerstr. 44.

Kraftfahrer-Vereinigung Deutscher Ärzte e. V.

Gau IX. Hessen, Hessen-Nassau und Waldeck.

Sonntag, den 6. Januar 1929. Gau-Neujahrsfahrt nach Wiesbaden. Treffpunkt dortselbst 3 Uhr vor dem Kurhaus. Gäste willkommen. Angabe der Teilnehmerzahl bis spätestens 30. d. Mts. an Dr. F. Schüttler, Frankfurt a. M., Querstraße 7.

Der Fahrtenauschuß des Gaues IX.

Prof. Dr. Krusius. Dr. Schüttler. Dr. Greger.

Bücherbesprechungen.

Dissertationen der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Karl Alms: Beitrag zur Lumbalanästhesie beim Rinde. Heinrich Altemeier: Das Vorkommen von B. pullorum in Bruteiern. Theodor Johannes Tallqvist: Über die Beeinflussung der Bakterien, insbesondere der Paratyphusbakterien, durch die Herstellung der Brühwürste, mit besonderer Berücksichtigung des Wasserbades und des heißen Rauchs. Detlef Veers: Beitrag zur Sakralanästhesie beim Rinde.

Die klinische Untersuchung des Rindes. Von Dr. Ew. Weber, o. Professor und Direktor der ambulatorischen Tierklinik an der Universität Leipzig. 155 Seiten mit 51 Abb. im Text und 3 farbigen Tafeln. Berlin 1928, Verlagsbuchhandlung von Richard Schoetz, Wilhelmstraße 10. Preis gebunden Mk. 12,—.

Weber hat, den Fußstapfen von Harms und Dieckerhoff folgend, das große Verdienst, die tierärztliche Lehrbuchliteratur über das Rind in neuer Form geschaffen zu haben. Das vorliegende Buch über die klinische Untersuchung des Rindes füllt zweifellos eine seit langem bestehende Lücke aus und wird ebenso wie „Die Krankheiten des Rindes“ überall verdienten Anklang finden. Auf jeder Seite begegnet uns in der Behandlung aber auch in der Einteilung des Stoffes eine stark persönliche Note, die den nach Aufdeckung der Krankheitsbilder suchenden Praktiker und Wissenschaftler verrät. Der Autor hält sich vollkommen frei von dem Aneinanderreihen und Diskutieren wissenschaftlicher Meinungen. Mit einfachen, kurzen, klaren Sätzen werden Krankheitsbilder und Untersuchungsgang gekennzeichnet.

Freilich wird mancher Lücken finden und der Meinung sein können, daß die oder jene Untersuchungsmethode nicht erwähnt oder in ihrer Ausführung nicht genau genug geschildert, die Spezialdiagnose mancher Krankheiten nicht erschöpfend berücksichtigt sei. Dann aber hätte ein Handbuch daraus werden müssen und der Charakter des übersichtlichen Führers und Wegweisers wäre verloren gegangen. Inhaltlich wird man, wie es bei der ersten Auflage eines so kurz und prägnant geschriebenen Buches nicht anders zu erwarten ist, hier und da anderer Meinung sein können. So vermag ich, um einige Beispiele zu nennen, dem Verfasser nicht zu folgen, wenn er Rektaltemperaturen von 40,0 Grad und darüber bei scheinbar klinisch negativem Befund noch der Norm zurechnet (S. 1). Es liegt in solchen Fällen nach den Erfahrungen in der hiesigen Klinik immer ein versteckter Krankheitsprozeß zu Grunde, der nur nicht ohne weiteres aufgefunden wird. Hochtragende Rinder mit derartigen Temperaturen neigen sehr zu Retentio secundinarum (intrauterine Infektion), oder das Euter ist nicht gefund, oder der Körper beherbergt sonst einen Krankheitsherd, Lunge, Magen, Leber. — Mit Hilfe der intravenösen Chloralhydratinfusion (S. 16) kann man beim Rinde mit therapeutischen Dosen (bis zum Eintritt des Schwankens oder zum Niederstürzen) zwar einen Dämmerzustand von etwa 1 bis 2 Stunden Dauer, aber nur eine sehr vorübergehende wirkliche allgemeine Narkose, Anästhesie, erreichen. Die Gefahr der Schluckpneumonie ist dabei ziemlich groß. In der Empfehlung dieser Narkose beim Rinde bin ich aber sehr vorsichtig geworden. — Die Angabe über die Feststellung der Lungenwurmfecie durch Suche nach Strongylideniern im Kot (S. 81) wird viele Kritiker finden. Embryonierete Strongylideneier im Trachealschleim, blutig oder unblutig entnommen, bürgen für die Sicherheit der Diagnose. Bei den Kotbefunden dagegen gibt es vielfach Unklarheiten, weil „einige Strongylideneier im Kot“ beim Rind in Weidegegenden die Regel sind. — Das Auftreten von Kolostralmilch längere Zeit vor der Geburt (S. 122) kann nach meinen Erfahrungen keineswegs immer als Zeichen für das Absterben der Frucht gerechnet werden. Zur Diagnose „abgestorbene Frucht“ sollten stets mehrere Symptome herangezogen werden, wobei das Abhören der Herztöne in der Veterinärmedizin viel zu wenig geübt wird. R. Götze.

Personal-Nachrichten.

Ernannt: Regierungsrat Dr. Werner Meyer in Weimar, II. Referent für das Veterinärwesen im Thüring. Wirtschaftsministerium zum Oberregierungsrat; Tierzuchtreferent im Thür. Wirtschaftsministerium Regierungs- und Vortragender Rat Dr. Koch, zum Oberregierungsrat.

Approbiert in Hannover: Johann Holle aus Mussum (Kr. Borken), Josef Landwehr aus Westerholte (K. Bersenbrück), Richard Behrens aus Wendezelle b. Braunschweig, Heinrich Hencke aus Bad Oeynhausen, Josef Eistrup aus Nottuln (Kr. Münster).

Promoviert in Hannover: Karl Alms aus Delmenhorst, Heinrich Altemeier aus Spradow, Johannes Tallqvist aus Tammerfors (Finnland), Detlef Veers aus Epenwöhrdener Feld.

Schriftleiter: Professor Dr. Mießner in Hannover.

Verlag: M. & H. Schaper in Hannover.

Druck von Fritz Eberlein, Hannover.

Veterinärhistorische Mitteilungen

Herausgegeben von der
Gesellschaft für Geschichte und Literatur der Veterinärmedizin

Schriftleiter:

Dr. Wilhelm Rieck, Berlin-Cöpenick.

zwanglos erscheinende Beilage zur „Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift“
Verlag von M. & H. Schaper in Hannover
Sonderbezugspreis 1,50 Goldmark das Jahr, freibleibend.

Nr. 12.

1928.

8. Jahrgang.

Erster Entwurf der Tierärztlichen Hochschule Berlin (1767).

Von Dr. Wilhelm Rieck.

Mit einem gewissen Recht läßt sich heute von der Tierärztlichen Hochschule Berlin sagen, daß ihre Vorgeschichte einen längeren Zeitraum als ihre bisherige Geschichte umfaßt. Vor der Eröffnung der Berliner Tierarzneischule am 1. Juni 1790 liegt eine sich über drei Perioden erstreckende Vorgeschichte. Als älteste und längste Periode — sie währte wohl über ein Jahrhundert — gilt jene Zeit, in der im Berliner Marfball pferdeärztlicher Unterricht an Scholaren mit landesherrlicher Erlaubnis erteilt wird. In diesen Jahren spielt sich der Unterricht in der Pferdeheilkunde zumtiefst ab. Der Meister der tierärztlichen Handwerkskunst, der „Arztchirurgmeister“ (auch Reitschmied-Meister, Pferdearzt, Rofarzt), ist der alleinige Lehrer. Der Humanmediziner denkt noch gar nicht daran, sich auf dem Gebiete der Tierheilkunde als Praktiker oder Lehrer zu betätigen. Die Lehrstätte der Pferdeheilkunde am Berliner Marfball — die Vorläuferin der alten Berliner Tierarzneischule — wird leider 1711 unter König Friedrich I. in Preußen als offizielle Einrichtung aufgehoben. Unbarmherziges Verhalten der Veterinärcholaren selbst hat die Marfalleitung diese Maßnahme ergreifen lassen: „Weilen die Erfahrung bezeugt, daß diejenige, welche Seine Königliche Majestät die Pferde Cur bey dero Mehr Stall erlernen lassen, solche gemißbraucht. Alß ist bereits vorlängst-resolviret worden, hinführo niemand weiter die Pferde Cur erlernen zu lassen . . . Cölln (an der Spree), 19. Martij 1711 (Brandenburg-Preuß. Hausarchiv, Rep. XVII, E, 90). Laut dieser Urkunde kommt also die erste Periode der Vorgeschichte der Berliner Hochschule anno 1711 zu einem tragischen Abschluß: Durch Verhulden der Veterinärcholaren verliert Berlin seine älteste tierärztliche Bildungsstätte.

In der folgenden Periode liegen die Anfänge des ärztlichen Bildungswesens zu Berlin. 1713 wird das Theatrum anatomicum gegründet, 1724 wird es zu einem Collegium medico-chirurgicum erweitert, in dem Ärzte für innere und äußere Krankheiten ausgebildet werden. Die Tierheilkunde findet unter Friedrich Wilhelm I., der ja auch die preussische Kavallerie arg vernachlässigte, und noch während des Siebenjährigen Krieges so gut wie keine Beachtung. Erst mitten im Wiederaufbau der gänzlich verarmten preussischen Provinzen erkennt Friedrich der Große die Bedeutung der Veterinärmedizin für die Landwirtschaft. Er versucht, Abhilfe zu schaffen. Da Frankreich schon seit dem 16. Februar 1762 seine école vétérinaire zu Lyon in Betrieb hat, sendet er 1763 zwei preussische Chirurgen zum Studium dorthin. Aus Lyon zurück-

45

Allerdings ist zu beachten, daß seiner Zeit nach dem hannoverschen Militärsystem im Frieden fast alle Regimenter nur aus Depots bestanden, und insbesondere die Mannschaften mit ihren Pferden in die Heimat entlassen wurden, wie heutzutage in der Schweiz. Das Depot des 3. hannoverschen Hülarenregiments bestand nur aus 160 Pferden.

Heilmittel, Verbandsmaterial und andere Utensilien, die der hannoversche Militär-veterinär zum Selbstdispensieren brauchte, bezog er aus der Feldapotheke zu Hannover, in der Regel stets für ein halbes Jahr im Voraus. In dringenden Fällen durfte er auch fehlende Drogen anderwärts kaufen. In keinem Falle durfte er mehr als 96 Reichsthaler für Medikamente, Bandagen und sonstige Utensilien in einem Halbjahr für sein Regiment verbrauchen. Damit man eine Übersicht über die Art und den Verbrauch der verschiedenen Heilmittel erhält, bringe ich im folgenden ihre Aufzählung, die sich stützt auf Hertwigs Kopie der Sachrechnung, die der Regiments-Veterinär und Leutnant J. Hillmer am 1. April 1828 zu Northem über die Zeit vom 1. Oktober 1827 bis 31. März 1828 an die Feldapotheke zu Hannover eingereicht hat.

Der alten Bezeichnung der Arzneimittell ist die moderne in Klammern hinzugefügt, nötigenfalls mit eingehender Erklärung; die Maße und Gewichte sind umgerechnet und zwar ist: 1 Elle = 66,6 cm; 1 Pfund = 467 Gramm = 12 Unzen; 1 Unze = 39,0 Gramm; 1 Buch = 24 Bogen Schreibpapier.

Der Verbrauch der Veterinär-Apotheke wird angedeutet durch 7 verschiedene lateinische Buchstaben, die hinter dem Heilmittelnamen und vor den betreffenden Gewichtsmengen stehen. Das Ausfallen eines der 7 Buchstaben bedeutet Fehlanzeige. Im einzelnen geben diese Buchstaben an: B. = Bestand am 1. Oktober 1827; E. = Empfangen aus der Feldapotheke zu Hannover (bis Ende März 1828); A. = durch Ankauf in dringenden Fällen anderswo erworben; S. = Summe von B. und A.; V. = Verbrauch im Berichts-Halbjahr; R. = Restbestand Ende März; N. = Neuanforderung an die Feldapotheke zur Ergänzung des Heilmittelbestandes der Dispensieranstalt.

I. Heilmittel.

1. Adeps suillus: A, S, N: 2802,0. 2. Ammonium muriaticum seu Sal ammoniacum: E, S, N: 934,0; V, R: 467,0. 3. Arsenicum: B, V: 117,0; V: 39,0; R: 78,0.
4. Bliester (Bliester), (eine Mischung von Hydrargyrum bijodatatum mit anderen Scharffalben im Verhältnis 1:3—5, wurde bei chronischen Sehnenentzündungen angewendet): E, S: 2802,0; V: 2335,0; R: 467,0; N: 3269,0. 5. Calomelas (Hydrargyrum muriaticum mite): E, S: 78,0; V, R: 39,0. 6. Campher (Camphora): R, S, B: 39,0. 7. Cuprum Sulphuricum: E, S: 1868,0; V: 467,0; R: 1401,0. 8. Extractum Daturae stramonii: E, S: 156,0; V: 39,0; R: 117,0.
9. Glasgalle (Mischung von schwefelsauren Alkalien und Chloriden, sie entsteht bei der Zubereitung des Glases im Schmelzofen): V, S, B: 934,0. 10. Herba Menthae pipertae: B, S, R: 934,0. 11. Hydrargyrum oxydulatum nigrum: N: 78,0. 12. Liquor Hoffmanni (Liquor anodynus mineralis Hoffmanni): B, S: 273,0; V: 39,0; R: 234,0. 13. Mercurius sublimatus corrosivus: R, S, B: 78,0.
14. Natrium chloricum: A, S: 11208,0; N, V: 9340,0; R: 1868,0. 15. Oleum Lini: A, S, V: 1868,0; N: 2802,0. 16. Oleum Terbinthinac: E, S: 5604,0; V: 3269,0; R: 2335,0; N: 1868,0. 17. Oleum vitriole (Acidum sulphuricum): R, S, B: 156,0.

(Schluß folgt.)

gekommen, erzählen die beiden Chirurgen: sie „haben keine einzige Rind-Vieh-anatomie gesehen; sondern es ist daselbst nur von Pferden gehandelt worden.“ Damit ist Friedrich II. nicht zufrieden. Er will gründlichere und ernstere Arbeit leisten als Frankreich und bringt den Stein ins Rollen durch folgendes Schreiben „An das Collegium Sanitatis, wegen besserer Excultation der Anatomie von denen Tieren“. Wir haben Uns allerhöchst in Absicht auf die zunehmende Praecautiones gegen das Vieh-Sterben dahin geäußert, daß sich Leute mehr auf die Anatomie der Thiere legen, auch wovon das Rindvieh eigentlich crepirt sey, durch das Bewohnen bey dem Aufhauen lernen mögen, und erwarten nähere gutachtliche Vor schläge von euch, wie diese Unlere geäußerte Höchste Intention am besten zu erreichen seyn mögte . . . Gegeben zu Berlin den 23ten Junii 1767.“ Dies Rescript an das Ober-Collegium Sanitatis auf Blatt 1 des Rep. 87 B im Preuß. Geheimen Staatsarchiv trägt nun eine veterinärhistorisch äußerst wertvolle Randbemerkung: Kein Geringerer als Christian Andreas von Cothenius, Dr. med., erster Leibarzt und Generalstabs-Medicus Friedrichs des Großen, hat hier aus dem Stegreif den ersten Entwurf der Berliner „école vétérinaire“ zu Papier gebracht.

Er schreibt: „Es könnte kein institutum löblicher seyn als die Aufrichtung einer ecole veterinaire. Wenn ein Haus zur anatomie der Thiere am wasser erbauet und mit etlichen Stuben für den Castellan versehen würde; dieses wäre an Gebäuden hinlänglich. Das Theatrum müßte dem Zweck der Schule gemäß seyn. Solche Schule würde aus zween Professorsibus Einem Prosector und Einem Castellan bestehen. Ihr gemeinschaftlicher Zweck wäre nicht allein die anatomie des Rindviehes sondern auch der Pferde, Schweine, Schaaf, ja sogar des feder Viehes erstlich selbst zu lernen und hienznächst zu lehren. Einer von denen Professoribus gäbe sich vornehmlich mit der anatomie ab. Der andere gienge aus einer provinz in die andere, wo irgend eine Vieh-Krankheit wäre, und wohnete dem Aufhauen bei. Dahero der Scharf Richter und dessen Knecht instruiert werden, diesem Mann alle hülfliche Hand zu leisten. — Die anatomie muß eigentlich bei gefunden Vieh erlernt werden. Man braucht nicht allezeit das ganze Stück Vieh zu kaufen. Man braucht die mehrtheile Zeit nur einen Theil davon zum Exempel den Kopf, die Lunge, die Kaldanen. Diefes bekommt man von Schlächtern. Könnte noch ein dritter Lehrer angenommen werden; so wäre die Schule vollkommenener. Dieser könnte eigentlich die Cur besorgen und würde mit dem 2ten Professore gemeinschaftlich handeln mit herum reisen, die Anfallen bey denen Vieh-Krankheiten besonders besorgen, alles was bei denselben vorgehet aufschreiben, was gebraucht worden in seiner Ordnung und dosi bemerken und wann das Vieh gestorben es aufhauen lassen und sorgfältig Acht haben auf was vor Theile das angewandte medicament gewircket habe. Denn nur die auf dieser Art angestellte Veruche, da ich die ganze Krankheit mit ihrem Anfang, Fortgang und Ausgang, und wie in der Cur dabei verfahren worden, vor Augen habe, kan zu vernünftigen Speculationen Anlaß geben: und nur allein in dieser Absicht ist es nützlich, wenn Leute welche von der Sache Känntis haben bei dem aufhauen des verreckten Viehes gegenwärtig sind: und zwar um so mehr wenn man 2 Stück krankes Vieh beobachtet, davon das eine keine Artzeney bekommt und die Krankheit der Natur überlassen worden, das andere aber von Anfang bis zu Ende Artzeneyen bekommen. So müßte auch Ein noch lebendes Vieh gleich

anfangs, wie man eine Krankheit bemercket, ein anderes nach dem Ersten, ein drittes nach dem dritten oder 4ten studio morbi tod geschlagen und besichtigt werden. —

Ohne Kosten gehet es nicht; und wenn es seinen gewissen Nutzen haben und Leute sich einzig darauf appliciren sollen, so muß ein jeder Professor nicht unter 600 reichsthaler haben. Dieses verliehret man nicht gerne und man kan dabei wenn man vernünftig haus hält, ohne Brod Sorgen seyn. Und also verliehret man dergleichen Leute nicht wieder. Die beyden jungen Chirurgen, welche zu der Ecole veterinaire nach Frankreich*) geschickt worden, haben keine einzige Rind-Vieh anatomie gesehen; sondern es ist daselbst nur von Pferden gehandelt worden. Wenn man keine bessern wüßte; so würde man sie employiren können. Zu dem dritten Professorat bequemet sich noch wohl ein oder anderer erfahrener geschulter Physicus welcher Lust oder eine natürliche Neigung zu dieser Art Arbeit hat. Diese ganze Schule stehet unter der Direction des Collegii Sanitatis. Sic sentio C o t h e n i u s . Potsdamii d. 12. accepti et die 14. Julii remisii.“

Diesem ersten Entwurfe folgt eine Reihe genau ausgearbeiteter Pläne. Drei Jahre lang beschäftigt sich das Ober Collegium Sanitatis erstlich mit den Vorbereitungen für die Berliner école vétérinaire. 1770 scheint sie wirklich unmittelbar vor der Eröffnung zu stehen. Da verzögert Friedrich II. in einem Schreiben vom 21. Auguß 1770 die Gründung der Schola veterinaria Berolinensis:

„Es wird aber damit vor der Hand noch Aufwand haben müssen, bis zu den großen Kosten des Baues und der jährlichen Bedürfnis ein convenabler Fond ausgemittelt werden kann.“ Damit schließt die zweite Periode in der Vorgelichte der Berliner Hochschule ab. Die für die Zeit charakteristischen Pläne der Humannmedizin, eine Veterinärhule ins Leben zu rufen, führen zu keinem praktischen Resultat.

Der Erfolg ist erst der dritten Periode belohnt. Wohl eingedenk seiner ergebnislosen Veruche unter Friedrich dem Großen überläßt 1787 das Ober Collegium Sanitatis unter Friedrich Wilhelm II. dem Obermarfcallamt die leitende Rolle bei der Einrichtung der Berliner Tierarzneihule und begnügt sich damit, lediglich als Gutachter, dem Obermarfcallmeister beisteite zu stehen. Dem Obermarfcallamt, das ja in der ersten Periode bereits eine pferdeärztliche Lehrstätte unterhalten hat, glückt nun endlich in der dritten Periode die Gründung der Berliner Tierarzneihule. Mit ihrer Eröffnung am 1. Juni 1790 schließt die „Vorgelichte der Tierärztlichen Hochschule Berlin“ (mit allen erreichbaren Urkunden im Veterinärhistorischen Jahrbuch 1928 dargestellt).

Eine hannoversche Militär-Veterinärapotheke um 1828.

Von cand. med. vet. Herrmann Schmidt, Hameln a. W.

Aus dem Arzneimittelrapport eines hannoverschen Militär-Veterinärs, wie ihn C. H. Hertwig in seinem Reisetagebuch, dessen Abdruck mir Dr. Wilhelm Rieck dankenswerterweise zur Verfügung stellte, wiedergibt, läßt sich feststellen, welche Mittel vor hundert Jahren in der Dispenfieranstalt des hannoverschen Hufarenregiments verbraucht wurden.

*) Es handelt sich um die école vétérinaire zu Lyon, in Alfort begann erst am 12. Oktober 1766 der erste tierärztliche Unterricht.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA

619.05DE C001
DEUTSCHE TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT\$HAN
36 1928



3 0112 005789851